

Додаток 2
до Порядку здійснення фармаконагляду
(підпункт 3 пункту 2 розділу III)

**Перелік
клінічних проявів небажаних реакцій при застосуванні вакцин,
туберкуліну**

Коди	Клінічні прояви небажаних реакцій при застосуванні вакцин, туберкуліну
1	2
1	Підвищення температури $<39^{\circ}\text{C}$
2	Підвищення температури $\geq 39^{\circ}\text{C}$
3.1	Біль у місці введення
3.2	Набряк м'яких тканин у місці введення
3.3	Гіперемія у місці введення
3.4	Інфільтрат у місці введення
4	Сильна місцева реакція
5	Лімфаденопатія
6	Головний біль
7	Дратівливість
8	Сонливість
9	Висипання неалергічного генезу
10.1	Нудота
10.2	Біль у животі
10.3	Диспепсія
10.4	Діарея
11	Катаральні явища
12.1	Міалгія
12.2	Артралгія
13	Тривалий пронизливий крик/плач (більше 3 годин)
14.1	Стан, схожий на епідемічний паротит
14.2	Стан, схожий на епідемічний орхіт
15	Тромбоцитопенія
16	Абсцес на місці ін'єкції
17.1	Анафілактичний шок
17.2	Анафілактоїдна реакція
18	Алергічна реакція
19.1	Гострий в'ялий параліч у щепленого
19.2	Гострий в'ялий параліч у контактного

20	Судоми фебрильні
21	Судоми афебрильні
22	Апноє
23	Підшкірний холодний абсцес
24	Поверхнева виразка > 10 мм
25	Лімфаденіт
26	Келоїдний рубець
27	Генералізована БЦЖ-інфекція, в тому числі остеїт, остеомієліт
28	Неврит плечового нерва, синдром Гієна-Барре
29	Синдром Гієна-Барре
30	Енцефалопатія
31	Гіпотонічно-гіпореспонсивний синдром
32	Інвагінація кишківника
33	Сироваткова хвороба

* Перелік не є вичерпним, також необхідно користуватися короткою характеристикою/інструкцією для медичного застосування вакцин, туберкуліну, зареєстрованих в Україні.
