

Додаток 3

до Порядку здійснення фармаконагляду
(підпункт 3 пункту 2 розділу III)

Строки розвитку

клінічних проявів небажаних реакцій при застосуванні вакцин, туберкуліну

за кодами

[illegible]

		ін'єкції, подраз- нення, свербіж <72 год.			біль <48 год.										
Ротавірусна вакцина**	срн	-	-	-	драті вливів сть	-	срн	-	-	-	-	-	-	<48 год.	<72 год.
Сироватки з чужорідним білком**	срн	срн	срн	срн	срн	-	срн	-	срн	-	-	-	-	срн	срн

Вакцини, туберкулін	Клінічні прояви небажаних реакцій при застосуванні вакцин, туберкуліну за кодами та строки їх розвитку														
	19. 1	19.2	20	21	22*	23	24	25	26	27. 1- 27. 2	28	29	30	31	32
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
АКДП, АДП, АДП-М**	-	-	<48 год.	7-14 доба	2-3 доба	-	-	-	-	-	2-28 діб	0-2 доби	<48 год. Іноді >48 год.	-	-
АаКДП, комбіновані вакцини на основі АаКДП**	-	-	<48 год.	7-14 доба	2-3 доба	-	-	-	-	-	2-28 діб	0-2 доби	<48 год. Іноді >48 год.	-	-
Вакцини для профілактики кору, паротиту, краснухи**	-	-	6- 12 доба	-	-	-	-	-	-	-	-	6- 12 діб	<48 год. Іноді >48 год.	-	-
БЦЖ**	-	-	-	-	срн	1,5- 6 міс.	1, 5- 6 міс.	1- 12 міс.	5- 12 міс.	1- 24 міс.	-	-	<48 год. Іноді >48 год.	-	-
ОПВ**	4-30 доба	4-75 доба	-	-	срн	-	-	-	-	-	-	-	<48 год. Іноді >48 год.	-	-
ІПВ**	-	-	срн	-	срн	-	-	-	-	-	-	-	<48 год. Іноді >48 год.	-	-

Вакцини для профілактики гепатиту В**	-	-	<48 год.	<72 год.	срн****	-	-	-	-	-	-	-	<48 год. Іноді >48 год.	-	-
Полісахаридні вакцини (Hib) **	-	-	<48 год.	срн****	2-3 доба	-	-	-	-	-	-	-	<48 год. Іноді >48 год.	-	-
Туберкулін**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ротавірусна вакцина**	-	-	-	-	срн****	-	-	-	-	-	-	-	-	21 доба	-
Сироватки з чужорідним білком**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7-14 діб

* У глибоко недоношених дітей, що народилися на 28 тижні вагітності або раніше

** Перелік не є вичерпним, необхідно користуватися короткою характеристикою/інструкцією для медичного застосування вакцин та алергенів туберкульозних, зареєстрованих в Україні

*** ср – специфічна реакція на введення вакцини БЦЖ;

****срн – строки розвитку невідомі.