

Додаток  
до Порядку скринінгу і ранньої  
діагностики раку шийки матки та  
моніторингу стану здоров'я  
пацієток з груп  
(пункт 1 розділу II)

**Маршрут пацієнтки у надавача первинної медичної допомоги  
або лікаря -акушера-гінеколога**

№	Вік пацієнтки	Вид профілактичного заходу	Періодичність профілактичного заходу	Результат профілактичного заходу	Подальші дії лікаря з надання первинної медичної допомоги чи лікаря-акушера-гінеколога
<b>Первинна профілактика раку шийки матки</b>					
1	21-35 років	опитування стосовно факторів ризику та симптомів, що можуть свідчити про рак шийки матки, у тому числі з використанням анамнестичної анкети	рекомендовано кожні 5 років	фактори ризику або симптоми раку шийки матки виявлені чи ні	фактори ризику чи симптоми не виявлені – інформування про профілактику раку шийки матки та наступні заходи первинної профілактики  фактори ризику виявлені – обстеження у лікаря з надання первинної медичної допомоги чи лікаря-акушера-гінеколога  симптоми виявлені – направлення на скринінг (ПАП-тест чи ПРЛ тест)
<b>Вторинна профілактика раку шийки матки</b>					

1	30-35 років і більше	популяційний скринінг – направлення на ПАП-тест чи ПРЛ тест	у віці 30-35 років  з 35 до 55 років (для жінок, які не проходили перший популяційний скринінг у віці 30-35 років)  далі кожні 10 років до досягнення 55 років	симптоми раку шийки матки не виявлені (негативний) або виявлені (позитивний)	негативний результат – інформування про профілактику раку шийки матки та наступні скринінги  позитивний результат – направлення до лікаря-онколога для подальшої діагностики та лікування
2	25 років і більше за наявності ВІЛ/СНІД	скринінг груп ризику – гінекологічний огляд та направлення на ПАП-тест чи ПРЛ тест	кожні 5 років	симптоми раку шийки матки не виявлені (негативний) або виявлені (позитивний)	негативний результат – інформування про профілактику раку шийки матки та наступні скринінги  позитивний результат – направлення до лікаря-онколога для подальшої діагностики та лікування
3	21-35 років	скринінг груп ризику –	після виявлен	симптоми раку шийки	негативний результат –

	за наявності факторів ризику	гінекологічний огляд та направлення на ПАП-тест чи ПРЛ тест	ная факторів ризику або симптомів хвороби за результатами проведеного опитування	матки не виявлені (негативний) або виявлені (позитивний)	інформування про профілактику раку шийки матки та наступні скринінги  позитивний результат – направлення до лікаря-онколога для подальшої діагностики та лікування
--	------------------------------	---	--	--	--

---