

Додаток
до Порядку скринінгу і ранньої
діагностики колоректального раку та
моніторингу стану здоров'я пацієнтів
з груп ризику
(пункт 1 розділу II)

Маршрут пацієнта у надавача первинної медичної допомоги

№	Вік пацієнта	Вид профілактичного заходу	Періодичність профілактичного заходу	Результат профілактичного заходу	Подальші дії лікаря з надання первинної медичної допомоги
Первинна профілактика колоректального раку					
1	40-49 років	опитування стосовно факторів ризику та симптомів, що можуть свідчити про колоректальний рак, у тому числі з використанням анамнестичної анкети	кожні 2 роки, у разі виявлених факторів ризику щороку	фактори ризику або симптоми виявлені чи ні	фактори ризику чи симптоми не виявлені – інформування про профілактику колоректального раку та наступні заходи первинної профілактики фактори ризику виявлені – обстеження у лікаря з надання первинної медичної допомоги симптоми виявлені – направлення на тест калу на приховану кров або на фекальний імунохімічний тест (ФІТ)
Вторинна профілактика колоректального раку					

1	50-75 років	популяційний скринінг – огляд та направлення на тест калу на приховану кров або на фекальний імунохімічний тест (ФІТ)	кожні 2 роки	симптоми колоректального раку не виявлені (негативний) або виявлені (позитивний)	негативний результат – інформування про профілактику колоректального раку та наступні скринінги позитивний результат – направлення на колоноскопію та до лікаря-спеціаліста (лікаря-проктолога або лікаря-онколога) для подальшої діагностики та лікування
2	50-75 років за наявності факторів ризику	скринінг груп ризику – огляд та направлення на тест калу на приховану кров або на фекальний імунохімічний тест (ФІТ)	щороку	симптоми колоректального раку не виявлені (негативний) або виявлені (позитивний)	негативний результат – інформування про профілактику колоректального раку та наступні скринінги позитивний результат – направлення на колоноскопію або до лікаря-спеціаліста (лікаря-проктолога або лікаря-онколога) для подальшої діагностики та лікування