

Додаток  
до Порядку скринінгу і ранньої  
діагностики раку молочної залози та  
моніторингу стану здоров'я пацієнток з  
груп ризику  
(пункт 1 розділу II)

**Маршрут пацієнтки у надавача первинної медичної допомоги  
або лікаря-акушера-гінеколога**

№	Вік пацієнтки	Вид профілактичного заходу	Періодичність профілактичного заходу	Результат профілактичного заходу	Подальші дії лікаря з надання первинної медичної допомоги чи лікаря-акушера-гінеколога
<b>Первинна профілактика раку молочної залози</b>					
1	21-29 років	опитування стосовно факторів ризику та симптомів, що можуть свідчити про рак молочної залози, у тому числі з використанням анамнестичної анкети	рекомендовано кожні 3 роки	фактори ризику або симптоми виявлені чи ні	фактори ризику чи симптоми не виявлені – інформування про профілактику раку молочної залози та наступні заходи первинної профілактики  фактори ризику виявлені – обстеження у лікаря з надання первинної медичної допомоги чи лікаря-акушера-гінеколога  симптоми виявлені – огляд та пальпація молочних залоз, направлення на

					мамографію, направлення до онколога або хірурга-онколога для подальшої діагностики та лікування
2	30-49 років	опитування стосовно факторів ризику та симптомів, що можуть свідчити про рак молочної залози, у тому числі з використанням анамнестичної анкети	кожні 2 роки	фактори ризику або симптоми виявлені чи ні	фактори ризику чи симптоми не виявлені – інформування про профілактику раку молочної залози та наступні заходи первинної профілактики  фактори ризику виявлені – обстеження у лікаря з надання первинної медичної допомоги чи лікаря-акушера-гінеколога  симптоми виявлені – огляд та пальпація молочних залоз, направлення на мамографію, направлення до лікаря-онколога або лікаря-хірурга-онколога для подальшої діагностики та лікування
3	30-49 років з фактора	опитування стосовно симптомів,	щороку	симптоми виявлені чи ні	симптоми не виявлені – інформування про

	ми ризику	що можуть свідчити про рак молочної залози, у тому числі з використанням анамнестичної анкети			профілактику раку молочної залози та наступні заходи первинної профілактики  симптоми виявлені – огляд та пальпація молочних залоз, направлення на мамографію, направлення до лікаря-онколога або лікаря-хірурга-онколога для подальшої діагностики та лікування
<b>Вторинна профілактика раку молочної залози</b>					
1	50-69 років	популяційний скринінг – огляд та направлення на мамографію	кожні 2 роки	симптоми раку молочної залози не виявлені (негативний) або виявлені (позитивний)	негативний результат – інформування про профілактику раку молочної залози та наступні скринінги  позитивний результат – направлення до онколога або хірурга-онколога для подальшої діагностики та лікування
2	40-49 років за наявності факторів ризику	скринінг груп ризику – огляд та направлення на мамографію	кожні 2 роки	симптоми раку молочної залози не виявлені (негатив	негативний результат – інформування про профілактику раку молочної залози та наступні скринінги

				ний) або виявлені (позитивний)	позитивний результат – направлення до лікаря-онколога або лікаря-хірурга-онколога для подальшої діагностики та лікування
--	--	--	--	--------------------------------	--

---