Додаток 1
до Порядку організації надання
перинатальної та неонатальної
допомоги
(пункт 3 розділу V)

Перелік медичних показань для надання медичної допомоги на другому рівні перинатальної мережі

1. Жінки з акушерськими ускладненнями, зокрема:
гестаційний діабет (компенсований, без потреби в інсулінотерапії);
помірна прееклампсія;
анемія середнього ступеня;
низьке прикріплення плаценти;
розрив плодових оболонок у терміні 34 тижні та більше;
загроза передчасних пологів у терміні 34 тижні та більше;
один рубець на матці після кесаревого розтину без ознак деформації або загрози розриву;
передчасне відшарування нормально розташованої плаценти (за показаннями до невідкладного розродження).

2. Жінки з обтяженим анамнезом, зокрема:
мертвонародження або неонатальна смертність в анамнезі;
попередні пологи, які відбулись у терміні до 34 тижні;
наявність ускладнень під час попередніх пологів (наприклад, кровотечі, гіпотонія, гіпоксія плода);
вік матері <18 або >40 років у поєднанні з іншим фактором ризику;
відсутність медичного спостереження в I триместрі;
сідничне передлежання плода (без інших акушерських ускладнень).

3. Жінки з екстрагенітальними захворюваннями, які потребують міждисциплінарного контролю:
серцево-судинна недостатність 0 або I ступеня;
артеріальна гіпертензія (контрольована, без ознак органного ураження);
легеневі захворювання (за відсутністю дихальної недостатності);
артеріальна гіпертензія (контрольована, без ознак органного ураження);
бронхіальна астма (персистуючий перебіг, легка або середня форма тяжкості);
ендокринні захворювання (компенсований гіпотиреоз, гестаційний діабет, відсутність порушення функції відповідної ендокринної залози);
захворювання нирок без порушення функції;
захворювання гепатобіліарної системи без порушення функції;
доброякісні захворювання системи крові;
хронічні вірусні інфекції (ВІЛ, гепатити В та С у стадії ремісії).

4. Стани плода:

затримка росту плода I ступеня;

вроджені аномалії розвитку, які не потребують анте- та/або негайного постнатального хірургічного втручання.

5. Стани новонародженого:

гестаційний вік ≥ 32 тижнів;

маса тіла при народженні ≥ 1500 г;

гіпоксично-ішемічна енцефалопатія легкого та середнього ступеня (за наявності ВІТН);

дихальні розлади, що потребують лише кисневої терапії, неінвазійної дихальної підтримки або короткочасної ШВЛ (лише за наявності ВІТН);

неонатальні інфекції;

жовтяниці, які не потребують обмінного переливання крові;

потреба будь-яких діагностичних або лікувальних заходів, недоступних у ЗОЗ першого рівня перинатальної мережі.