

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
протипоказань до транспортування в межах аеромедичної евакуації

1. Активна кровотеча.
 2. Дихальна недостатність без можливості досягти нормовентиляції за допомогою апарата штучної вентиляції легень, наявного в евакуаційному транспорті.
 3. Стани, при яких для підтримання нормального рівня артеріального тиску потрібна інфузія вазопресорних або інотропних препаратів у високих дозуваннях, зокрема норадреналін вище 0,5 мкг/кг/хв, добутамін 10 мкг/кг/хв, дофамін вище 10 мкг/кг/хв тощо.
 4. Посттравматична анемія з гемоглобіном менше 80 г/л у перші 48 годин з моменту поранення, а у випадках черепно-мозкових травм — менше 90 г/л.
 5. Гідроторакс, гемоторакс або пневмоторакс без дренування.
 6. Температура тіла пацієнта нижче 35 °С.
 7. Переломи великих трубчастих кісток та тазу, спроб стабілізації яких не було здійснено на попередніх етапах надання допомоги.
 8. Черепно-мозкові травми з дислокаційним синдромом та набряком мозку, лікування яких може бути забезпечене у межах стандартних евакуаційних маршрутів.
 9. Відсутність необхідного медичного обладнання або медичного персоналу відповідної кваліфікації, що має бути задіяний під час аеромедичної евакуації.
-