

Додаток 2
до Правил визначення медичної
придатності особи за станом здоров'я
для роботи на морських суднах
або суднах внутрішнього плавання
(пункт 3 розділу II)

Перелік медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа є непридатною для роботи на морських суднах або суднах внутрішнього плавання за станом здоров'я

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
A00–B99	ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ		
A00–09	Кишкові інфекційні хвороби <i>Інфікування інших осіб, рецидиви</i>	Т – У разі виявлення на суші (на час тривання симптомів чи очікування результатів аналізу) або підтвердження статусу носія до усунення збудника	Відсутність симптомів, які перешкоджають безпечній роботі
A15–16	Туберкульоз легенів <i>Інфікування інших осіб, рецидиви</i>	Т – У разі позитивного результату скринінгового тесту або минулих прецедентів до обстеження. У разі інфікування до стабілізації лікування та усунення збудника П – Рецидив або серйозні наслідки для здоров'я	Успішне завершення курсу лікування
A50–64	Інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом	Т – У разі виявлення на суші: до підтвердження діагнозу, початку лікування та успішного завершення курсу лікування	Відсутність симптомів, які перешкоджають безпечній роботі

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
	<i>Гостре погіршення стану, рецидиви</i>	П – Невиліковні пізні ускладнення, що призводять до порушення працездатності	
B15	Гепатит А <i>Передається через воду та їжу</i>	Т – До вилікування жовтяниці або відновлення придатності до фізичних навантажень	Відсутність симптомів, які перешкоджають безпечній роботі
B16–19	Гепатит В <i>Передається через контакт із кров'ю та іншими біологічними рідинами. Імовірність незворотних порушень роботи печінки та раку печінки</i>	Т – До вилікування жовтяниці або відновлення придатності до фізичних навантажень П – Невиліковні порушення роботи печінки з симптомами, які перешкоджають безпечній роботі, або імовірністю ускладнень	Відсутність симптомів, які перешкоджають безпечній роботі. Максимальний термін придатності – два роки
	Гепатит С <i>Передається через контакт із кров'ю та іншими біологічними рідинами. Імовірність незворотних порушень роботи печінки</i>	Т – До вилікування жовтяниці або відновлення придатності до фізичних навантажень П – Невиліковні порушення роботи печінки з симптомами, які перешкоджають безпечній роботі, або імовірністю ускладнень	Відсутність симптомів, які перешкоджають безпечній роботі
B20–24	ВІЛ <i>Передається через контакт із кров'ю та іншими біологічними рідинами. Ускладнення у формі інших хвороб, пов'язаних із ВІЛ, або СНІДу</i>	Т – Належна поінформованість про власний стан здоров'я та неухильне дотримання рекомендацій щодо лікування П – Невиліковні хвороби, пов'язані з ВІЛ, які призводять до порушення працездатності. Тривалий шкідливий вплив ліків	Відсутність симптомів, які перешкоджають безпечній роботі. Максимальний термін придатності – два роки
A00–B99 не зазначені	Інші інфекційні захворювання	Т – У разі тяжких інфекційних хвороб та високого ризику інфікування інших осіб	Відсутність симптомів, які перешкоджають безпечній роботі

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
окремо	<i>Порушення працездатності, інфікування інших осіб</i>		
		П – У разі тривалої імовірності рецидиву або можливості інфікування інших осіб	
C00–48	РАК		
C00-48	Злоякісні новоутворення – включаючи лімфому, лейкомію та інші захворювання цього типу <i>Рецидиви – зокрема, гострі ускладнення, як-от кровотеча тощо</i>	Т – До обстеження, лікування та оцінки прогнозу П – Тривалий перебіг хвороби з симптомами, які перешкоджають безпечній роботі, або високою імовірністю рецидиву	Відсутність симптомів, які перешкоджають безпечній роботі За результатами формальної оцінки фахівцем
D50–89	ХВОРОБИ КРОВІ		
D50–59	Анемія/Гемоглобінопатія <i>Обмежена придатність до фізичних навантажень. Епізодичні аномалії еритроцитів</i>	Т – До нормалізації або стабілізації рівня гемоглобіну П – Рецидивна чи тривала анемія в тяжкій формі або симптоми розпаду еритроцитів, які призводять до порушення працездатності і не можуть бути усунені	Відсутність симптомів, які перешкоджають безпечній роботі
D73	Спленектомія (хірургічна процедура) <i>Підвищена вразливість до певних інфекційних хвороб</i>	Т – До закінчення клінічного лікування та відновлення придатності до фізичних навантажень	Відсутність симптомів, які перешкоджають безпечній роботі
D 50–89 не зазначені окремо	Інші хвороби крові та кровотворних органів <i>Різне – рецидиви аномальної кровотечі та, у деяких</i>	Т – На час обстеження П – Хронічна коагулопатія	Залежно від конкретного випадку

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
	<i>випадках, обмежена придатність до фізичних навантажень або сприйнятливості до інфекційних хвороб</i>		
E00–90	ХВОРОБИ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ТА ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН		
E10	Цукровий діабет – інсулінозалежний <i>Значне порушення працездатності внаслідок гіпоглікемії. Ускладнення через неналежний контроль рівня глюкози в крові. Підвищена ймовірність неврологічних і серцевих захворювань та проблем із зором</i>	Т – У разі: 1) Неналежного контролю, 2) Недотримання режиму лікування або 3) Непоінформованості щодо гіпоглікемії П – У разі неналежного контролю або недотримання режиму лікування. Виникнення гіпоглікемії в минулому або недостатня поінформованість щодо гіпоглікемії. Викликані діабетом ускладнення, які призводять до порушення працездатності	Залежно від конкретного випадку. Максимальний термін придатності – п'ять років за умови належного контролю, дотримання рекомендацій щодо лікування та відповідного рівня поінформованості щодо гіпоглікемії. Можливе застосування обмеження 04***
E11–14	Цукровий діабет – інсулінонезалежний Лікування іншими препаратами <i>Розвиток інсулінозалежності, підвищена ймовірність неврологічних і серцевих захворювань та проблем із зором</i>	Т – У разі: 1) Неналежного контролю, 2) Недотримання режиму лікування або 3) Непоінформованості щодо гіпоглікемії	Після стабілізації, за умови відсутності ускладнень, які призводять до порушення працездатності. Максимальний термін придатності – п'ять років

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
	Цукровий діабет – інсулінонезалежний Лікування виключно шляхом дієти <i>Розвиток інсулінозалежності, підвищена ймовірність неврологічних і серцевих захворювань та проблем із зором</i>	Т – У разі: 1) Неналежного контролю, 2) Недотримання режиму лікування або 3) Непоінформованості щодо гіпоглікемії	Після стабілізації, за умови відсутності ускладнень, які призводять до порушення працездатності. Максимальний термін придатності – п'ять років
E65–68	Ожиріння/Аномальна маса тіла – висока або низька <i>Нещасні випадки, обмежені рухливості та придатність до фізичних навантажень для виконання обов'язків в умовах звичайних та надзвичайних обставин. Підвищена ймовірність цукрового діабету, захворювання артеріальних судин і артриту</i>	Т – У разі нездатності виконувати завдання, необхідні для підтримки безпеки, незадовільних результатів тестування фізичного стану або здатності виконувати обов'язки та індексу маси тіла (ІМТ) ≥ 40 (ожиріння III ступеню) П – Нездатність виконувати завдання, необхідні для підтримки безпеки; незадовільні результати тестування фізичного стану або здатності виконувати обов'язки та неспроможність покращити результати	Здатність виконувати завдання, необхідні для підтримки безпеки, в умовах звичайних та надзвичайних обставин Можливе застосування обмежень 07*** та/або 09***
E00–90 не зазначені окремо	Інші хвороби ендокринної системи та порушення обміну речовин (хвороби щитоподібної та надниркової залоз, включаючи Аддісонову хворобу, хвороби гіпофіза, яєчників, яєчок)	Т – До обстеження, відновлення належного контролю та початку лікування. Рік після первинного діагнозу або рецидиву за умови регулярного обстеження	Залежно від конкретного випадку. За умови стабільного курсу лікування, відсутності потреби в регулярному моніторингу стану хворого, незначного впливу хвороби на здоров'я та дуже низької ймовірності ускладнень

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
	<i>Імовірність рецидивів або ускладнень</i>	П – У разі тривалого перебігу хвороби, потреби в коригуванні курсу лікування або підвищеної імовірності значних ускладнень	
F00–99	РОЗЛАДИ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ		
F10	Згубне вживання алкоголю (залежність) <i>Рецидиви, нещасні випадки, непередбачувана поведінка/нестабільність у підтриманні безпеки</i>	Т – До обстеження, відновлення належного контролю та початку лікування. Рік після первинного діагнозу або рецидиву за умови регулярного обстеження П – У разі тривалої залежності або наявності супутнього розладу, загострення або рецидив якого в робочих умовах є імовірним	Перші три роки: максимальний термін придатності – один рік за умови застосування обмежень 04**** та 05****. Далі: термін придатності – три роки за умови застосування обмежень 04**** та 05****. Далі: терміни придатності – два, три і п'ять років по чергово без обмежень, за умови задовільного результату аналізу крові наприкінці кожного періоду
F11–19	Наркозалежність/тривале згубне вживання психоактивних речовин, включаючи незаконне вживання наркотиків та залежність від рецептурних препаратів <i>Рецидиви, нещасні випадки, непередбачувана поведінка/нестабільність у підтриманні безпеки</i>	Т – До обстеження, відновлення належного контролю та початку лікування. Рік після первинного діагнозу або рецидиву за умови регулярного обстеження П – У разі тривалої залежності або наявності супутнього розладу, загострення або рецидив якого в робочих умовах є імовірним	Перші три роки: максимальний термін придатності – один рік за умови застосування обмежень 04**** та 05****. Далі: термін придатності – три роки за умови застосування обмежень 04**** та 05****. Далі: терміни придатності – два, три і п'ять років по чергово без обмежень, за умови задовільного результату аналізу крові наприкінці кожного періоду
F20–31	Психоз (гостра форма) – органічні, шизофренічні та інші згідно з МКХ. Біполярні (маніакально-депресивні розлади)	<i>Після одиничного епізоду, спровокованого конкретними чинниками:</i>	За наявності інсайту, дотримання режиму лікування та відсутності несприятливих побічних ефектів, пов'язаних із препаратами. Особа визнається придатною

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
F32–38	<i>Рецидиви, що призводять до порушення сприйняття/пізнавальної діяльності, нещасних випадків, непередбачуваної та небезпечної поведінки</i>	Т – До обстеження, відновлення належного контролю та початку лікування. Три місяці після первинного діагнозу <i>Після одиничного епізоду, не спровокованого конкретними чинниками, або кількох епізодів незалежно від чинників, які їх спровокували</i> Т – До обстеження, відновлення належного контролю та початку лікування. Два роки після останнього епізоду П – Кілька приступів або тривала ймовірність рецидиву. Невідповідність критеріям придатності за станом здоров'я з обмеженнями або без них	за умови застосування обмеження 04***. Можливе застосування обмеження 05***. Придатність без обмежень: через один рік після епізоду за умови можливості уникнення чинників, які його спровокували Термін придатності – перші два роки, шість місяців. Далі: п'ять років, один рік За відсутності рецидивів без медикаментозного лікування протягом двох років та за умови однозначного медичного висновку про тимчасовий характер причин епізодів та низьку ймовірність рецидиву
	Розлади настрою/афективні розлади. Гострий тривожний стан, депресія або будь-який інший психічний розлад, що з високою імовірністю може позначатися на працездатності	Т – Протягом гострої фази, на час обстеження або за наявності симптомів, які призводять до порушення працездатності, чи побічних ефектів від препаратів	Після повного одужання та після всебічної оцінки конкретного випадку. Придатність

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
	<i>Рецидиви, порушення працездатності, зокрема в умовах надзвичайних обставин</i>	П – Тривалі або рецидивні симптоми, які призводять до порушення працездатності	особи залежить від особливостей і тяжкості розладу. Термін придатності: перші два роки, шість місяців. Можливе застосування обмеження 04**** та/або 07****. Далі: п'ять років, один рік
	Розлади настрою/афективні розлади. Незначні або реактивні симптоми тривоги/депресії. <i>Рецидиви, порушення працездатності, зокрема в умовах надзвичайних обставин</i>	Т – До припинення симптомів та курсу лікування П – Тривалі або рецидивні симптоми, які призводять до порушення працездатності	За умови відсутності симптомів або викликаних препаратами побічних ефектів, які призводять до порушення працездатності. Можливе застосування обмеження 04**** та/або 07****
F00–99 не зазначені окремо	Інші розлади наприклад, розлади особистості, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ), розлади розвитку (аутизм тощо) <i>Порушення працездатності, непередбачувана поведінка, проблеми з соціалізацією</i>	П – Якщо вважається, що наявність розладу є загрозою для безпеки	Якщо очікується, що розлад не позначатиметься на роботі. За відсутності інцидентів під час попередніх періодів роботи. Можливе застосування обмеження 04**** та/або 07****
G00–99	ХВОРОБИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ		
G40–41	Одиничний напад епілепсії <i>Заподіяння шкоди плавзасобу та іншим особам або загроза здоров'ю хворого внаслідок епілептичних нападів</i>	Одиничний напад епілепсії Т – На час обстеження і протягом року після нападу	Через рік після нападу в разі регулярного приймання препаратів: за умови застосування обмеження 04**** Придатність без обмежень: через рік після нападу і рік після закінчення курсу лікування

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
	Епілепсія – за відсутності конкретних чинників <i>(неодноразові напади)</i> <i>Заподіяння шкоди плавзасобу та іншим особам або загроза здоров'ю хворого внаслідок епілептичних нападів</i>	Т – На час обстеження і протягом двох років після останнього нападу П – Рецидивні напади, які не контролюються препаратами	Після припинення курсу лікування або в разі регулярного приймання препаратів і дотримання режиму лікування: за умови застосування обмеження 04*** Придатність без обмежень: через десять років після останнього нападу і припинення курсу лікування
	Епілепсія – спричинена алкоголем, медикаментами, травмою голови <i>(неодноразові напади)</i> <i>Заподіяння шкоди плавзасобу та іншим особам або загроза здоров'ю хворого внаслідок епілептичних нападів</i>	Т – На час обстеження і протягом двох років після останнього нападу П – Рецидивні напади, які не контролюються препаратами	Після припинення курсу лікування або в разі регулярного приймання препаратів і дотримання режиму лікування: за умови застосування обмеження 04*** Придатність без обмежень: через п'ять років після останнього нападу і припинення курсу лікування
G43	Мігрень (часті приступи, які призводять до непрацездатності) <i>Імовірність рецидивів, які призводитимуть до непрацездатності</i>	П – Часті приступи, які призводять до непрацездатності	Якщо очікується, що мігрень не позначатиметься на працездатності. За відсутності інцидентів під час попередніх періодів роботи
G47	Апноє уві сні <i>Втома і сон на робочому місці</i>	Т – Три місяці за умови проходження курсу лікування та його позитивних результатів П – Безрезультатність або недотримання курсу лікування	За умови явного покращення після тримісячного періоду лікування. Перевірка дотримання режиму лікування кожні пів року. Можливе застосування обмеження 05***

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
	Нарколепсія <i>Втома і сон на робочому місці</i>	Т – Щонайменше два роки за умови проходження курсу лікування, який забезпечує контроль захворювання П – Безрезультатність або недотримання курсу лікування	Після підтвердження фахівцем повного контролю захворювання протягом щонайменше двох років: за умови застосування обмеження 04***
G00–99 не зазначені окремо	Інші органічні хвороби нервової системи наприклад, розсіяний склероз, хвороба Паркінсона <i>Рецидиви/прогресія. Обмеження, пов'язані з м'язовою силою, відчуттям рівноваги, координацією та рухливістю</i>	Т – До обстеження, за умови належного контролю та дотримання режиму лікування П – Якщо обмеження позначаються на придатності до безпечної роботи або фізичних навантажень	Залежно від конкретного випадку, зважаючи на обов'язки працівника в умовах звичайних і надзвичайних обставин, на підставі рекомендацій фахівця в галузі неврології та психіатрії
R55	Непритомність та інші розлади свідомості	Т – До обстеження з метою визначення причини та підтвердження контролю проблеми-чинника	
	<i>Рецидиви, які призводять до травмування або втрати самоконтролю</i>	Клінічна картина: (а) Звичайна втрата свідомості / ідіопатична непритомність (б) Незвичайна втрата свідомості / ідіопатична непритомність Розлад невідомої етіології: відсутність рецидивів та виявлених серцевих,	Залежно від конкретного випадку. Можливе застосування обмеження 04*** Залежно від конкретного випадку. Можливе застосування обмеження 04***

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
		метаболічних чи неврологічних порушень, які можуть бути причиною розладу Т – Чотири тижні (в) Розлад: рецидиви або можливість серцевих, метаболічних чи неврологічних порушень, які можуть бути причиною розладу Т – У разі можливості невиявлених або невиліковних порушень, які спричиняють розлад: шість місяців після останнього випадку втрати свідомості Т – У разі виявлення та лікування порушення, яке спричинило розлад: один місяць за умови успішного лікування (г) Розлад свідомості з епілептичними ознаками. Див. G40–41 П – У разі неприпинення вищеописаних розладів протягом тривалого періоду попри повне обстеження та відповідне лікування	
T90	Внутрішньочерепні операції/травми, включаючи лікування судинних аномалій або серйозних травм голови з пошкодженням головного мозку.	Т – Один рік або більше до підтвердження фахівцем низької імовірності* рецидиву епілептичних нападів	Щонайменше через один рік за низької імовірності* рецидиву епілептичних нападів та відсутності негативного впливу хвороби чи травми на здоров'я: за умови застосування обмеження 04***

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
	<i>Заподіяння шкоди плавзасобу та іншим особам або загроза здоров'ю хворого внаслідок епілептичних нападів. Порушення когнітивних, сенсорних та моторних функцій. Рецидиви або ускладнення</i>	П – Тривалий негативний вплив на здоров'я хвороби чи травми або рецидиви епілептичних нападів	Придатність без обмежень: за відсутності негативного впливу хвороби чи травми на здоров'я та після припинення лікування антиепілептичними препаратами. Низька ймовірність* рецидиву епілептичних нападів
Н00–99	ХВОРОБИ ОКА І ВУХА		
Н00–59	Хвороби ока: прогресивні або рецидивні (глаукома, макулопатія, діабетична ретинопатія, пігментний ретиніт, кератоконус, диплопія, блефароспазм, увеїт, виразка рогівки, відшарування сітківки) <i>Невідповідність мінімальним вимогам до зору в майбутньому, ризик рецидиву</i>	Т – Тимчасова невідповідність мінімальним вимогам до зору (див. додаток 1) та низька ймовірність подальшого погіршення зору або рецидиву після вилікування або відновлення П – Невідповідність мінімальним вимогам до зору (див. додаток 1) або, у разі вилікування, підвищена ймовірність подальшого погіршення зору або рецидиву	Дуже низька ймовірність рецидиву. Погіршення зору до рівня невідповідності мінімальним вимогам на період чинності сертифікату є дуже малою ймовірним
Н65–67	Отит – зовнішній або середній <i>Рецидиви, ризик зараження їжі працівниками камбузу, проблеми з використанням засобів захисту органів слуху</i>	Т – За наявності симптомів, які перешкоджають безпечній роботі П – Хронічні вушні виділення у працівника камбузу	Ефективне лікування та відсутність передумов для рецидиву
Н68–95	Хвороби вуха: прогресивні (отосклероз тощо)	Т – Тимчасова невідповідність мінімальним вимогам до слуху (див. додаток 2) та низька	Дуже низька ймовірність* рецидиву. Погіршення слуху до рівня невідповідності

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
		ймовірність подальшого погіршення слуху або рецидиву після вилікування або відновлення П – Невідповідність мінімальним вимогам до слуху (див. додаток 2) або, у разі вилікування, підвищена ймовірність подальшого погіршення слуху або рецидиву	мінімальним вимогам на період чинності сертифікату є дуже мало ймовірним
H81	Хвороба Мен'єра та інші форми хронічного або рецидивного запаморочення, яке призводить до порушення працездатності <i>Нездатність тримати рівновагу, що спричиняє втрату рівноваги та нудоту</i>	Т – На час гострої фази П – Регулярні приступи, які призводять до втрати працездатності	Низька ймовірність* порушення працездатності під час роботи
I00–99	СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА		
I05–08 I34–39	Вроджені вади серця та хвороби серцевих клапанів (включаючи пов'язані з ними операції). Раніше не досліджені шуми серця <i>Ймовірність прогресії, обмежена придатність до фізичних навантажень</i>	Т – До обстеження та, в разі потреби, вилікування П – У разі обмеженої придатності до фізичних навантажень, періодичної втрати працездатності, приймання антикоагулянтів або незмінно високої ймовірності порушення працездатності, пов'язаної з таким захворюванням	Залежно від конкретного випадку на підставі рекомендацій кардіолога

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
I10–15	Артеріальна гіпертензія <i>Підвищена ймовірність ішемічної хвороби серця, ураження нирок і очей та інсульту. Можливість гіпертензивних кризів</i>	Т – Зазвичай у разі систолічного тиску >160 або діастолічного тиску >100 мм рт.ст. до обстеження та, за потреби, вилікування П – У разі систолічного тиску >160 або діастолічного тиску >100 мм рт.ст. протягом тривалого періоду, незалежно від лікування	За умови вилікування та відсутності негативного впливу на здоров'я внаслідок захворювання або приймання препаратів
I20–25	Кардіальні події , зокрема інфаркт міокарду, виявлені за допомогою ЕКГ ознаки перенесення інфаркту міокарду в минулому, нововиявлена блокада лівої ніжки пучка Гіса, стенокардія, зупинка серця, коронарне шунтування, коронарна ангіопластика <i>Раптова втрата працездатності, обмежена придатність до фізичних навантажень. Проблеми з перенесенням повторних кардіальних подій під час роботи</i>	Т – Три місяці після первинного обстеження та початку лікування або довше в разі тривання симптомів та підвищеної ймовірності рецидиву з огляду на виявлені патології П – У разі невідповідності критеріям для видачі сертифікату та низької ймовірності подальшого зниження ризику рецидиву	Дуже низька ймовірність* рецидиву та неухильне дотримання рекомендацій щодо зниження ризику рецидиву. Відсутність супутніх захворювань. Термін чинності сертифіката: перший – пів року, далі – рік. Низька ймовірність* рецидиву: за умови застосування обмеження 04*** Термін придатності – один рік
I44–49	Аритмії серця та порушення серцевої провідності (включаючи ті, які вимагають уживлення електрокардіостимулятора або	Т – До обстеження, початку лікування та підтвердження задовільності лікування П – За наявності симптомів, які призводять до втрати працездатності, або надмірно високої ймовірності порушення	Низька ймовірність* рецидиву: за умови застосування обмеження 04*** Термін придатності – один рік

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
	імплантованого кардіовертера-дефібрилятора (ІКД)) <i>Імовірність порушення працездатності внаслідок рецидиву, раптова втрата працездатності, обмежена придатність до фізичних навантажень. Можливе порушення роботи електрокардіостимулятора/ІКД через потужні електричні поля</i>	працездатності внаслідок рецидиву, а також уживлення ІКД	
I61–69 G46	Ішемія судин головного мозку (інсульт або транзиторна ішемічна атака) <i>Імовірність порушення працездатності внаслідок рецидиву, раптова втрата працездатності, обмежена рухливість. Висока ймовірність розвитку інших серцево-судинних захворювань, які можуть призводити до раптової втрати працездатності</i>	Т – До обстеження, відновлення належного контролю та початку лікування. Три місяці після первинного діагнозу П – У разі порушення працездатності через залишкові симптоми або за надмірно високої ймовірності рецидиву	Залежно від конкретного випадку. За умови застосування обмеження 04*** та придатності до виконання обов'язків за звичайних та надзвичайних обставин. Під час прийняття рішення слід враховувати ймовірність кардіальних подій у майбутньому. Термін придатності – один рік
I73	Хвороби судин – переміжна кульгавість	Т – До обстеження П – У разі нездатності виконувати обов'язки	За умови застосування обмеження 04***, якщо симптоми є незначними та не перешкоджають виконанню основних обов'язків або якщо їх було усунуто

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
	<i>Імовірність розвитку інших серцево-судинних захворювань, які можуть призводити до раптової втрати працездатності. Обмежена придатність до фізичних навантажень</i>		внаслідок операції або лікування. Під час прийняття рішення слід враховувати імовірність кардіальних подій у майбутньому. Термін придатності – один рік
I83	Варикозне розширення вен <i>Ризик кровотечі в разі травмування, проблем зі шкірою та появи виразок</i>	Т – До вилікування в разі наявності симптомів, які призводять до порушення працездатності. Після операції – до одного місяця	Відсутність симптомів або ускладнень, які призводять до порушення працездатності
I80.2–3	Тромбоз глибоких вен/тромбоемболія легеневої артерії <i>Імовірність рецидивів та загострення тромбоемболії. Імовірність кровотечі внаслідок приймання антикоагулянтів</i>	Т – До обстеження, початку лікування і зазвичай у разі приймання антикоагулянтів на тимчасовій основі П – Залежно від випадку в разі рецидивів і приймання антикоагулянтів на постійній основі	Придатність можлива за умови низької імовірності ушкоджень після стабілізації стану антикоагулянтами та за умови регулярного моніторингу рівня згортання крові
I00–99 не зазначені окремо	Інші хвороби серця , наприклад кардіоміопатія, перикардит, серцева недостатність <i>Імовірність рецидивів, раптова втрата працездатності, обмежена придатність до фізичних навантажень</i>	Т – До обстеження, початку лікування та підтвердження задовільності лікування П – За наявності симптомів, які призводять до порушення працездатності, або ймовірності порушення працездатності внаслідок рецидиву	Залежно від конкретного випадку та висновку фахівця
J00–99	РЕСПІРАТОРНА СИСТЕМА		

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
J02–04 J30–39	Хвороби носа, горла і синусів <i>Порушення працездатності хворого. Зараження їжі/інших членів екіпажу в разі деяких хвороб</i>	Т – До усунення симптомів, які перешкоджають безпечній роботі П – У разі рецидивів, які призводять до порушення працездатності	Після закінчення лікування, за відсутності передумов для рецидиву
J40–44	Хронічний бронхіт та/або емфізема <i>Обмежена придатність до фізичних навантажень та симптоми, які призводять до порушення працездатності</i>	Т – У разі гострої форми П – У разі кількох рецидивів у гострій формі, невідповідності загальним вимогам до стану здоров'я або сильної задишки	За умови придатності до виконання призначених обов'язків, необхідних для підтримки безпеки, в умовах звичайних та надзвичайних обставин. Термін придатності – один рік
J45–46	Астма (ретельне обстеження всіх кандидатів з урахуванням інформації від фахівця) <i>Непередбачувані приступи сильної задишки</i>	Т – До припинення приступу, виявлення причини (з урахуванням робочих факторів) та дотримання ефективного режиму лікування Якщо хворим є особа віком до 20 років, яка була госпіталізована або приймала оральні стероїди протягом останніх трьох років П – У разі ймовірності раптових небезпечних для життя приступів під час роботи або виникнення неконтрольованих приступів у минулому, які супроводжувалися госпіталізацією	За умови розвитку астми в дорослому віці** та належного контролю з використанням інгаляторів, якщо хворий не був госпіталізований та не приймав оральні стероїди протягом останніх двох років і не хворіє на астму фізичного навантаження, що потребує регулярного лікування
J93	Пневмоторакс (спонтанний чи травматичний)	Т – Зазвичай 12 місяців після першого епізоду	Зазвичай через 12 місяців після епізоду або менше, зважаючи на рекомендації фахівця

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
	<i>Істотне порушення працездатності внаслідок рецидиву</i>	П – Після рецидивів, якщо не проведено плевректомію або плевродез	
K00–99	ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ		
K01–06	Здоров'я ротової порожнини <i>Гострий зубний біль. Рецидиви інфекційних захворювань ясен і ротової порожнини</i>	Т – До усунення симптомів, які перешкоджають безпечній роботі	За умови здорового стану зубів і ясен (за відсутності зубів – якщо немає проблем з яснами, а зубні протези належно зафіксовані і в задовільному стані). За відсутності складного протезу або в разі проходження стоматологічного огляду протягом останнього року з проведенням подальших процедур та повним вилікуванням
K25–28	Пептична виразка <i>Рецидиви, які супроводжуються болем, кровотечею або перфорацією</i>	Т – До загоєння або вилікування шляхом оперативного втручання чи контролю гелікобактерій за умови перебування на нормальній дієті протягом трьох місяців П – У разі безрезультатності лікування та операцій	Після вилікування та перебування на нормальній дієті протягом трьох місяців
K40–41	Грижі – пахові та стегнові <i>Ризик странгуляції</i>	Т – До обстеження, підтвердження відсутності ризику странгуляції та, за потреби, вилікування	Після належного вилікування або підтвердження відсутності ризику странгуляції хірургом
K42–43	Грижі – пупкові та черевні <i>Нестабільність черевної стінки під час нахилиння або піднімання важких предметів</i>	Залежно від тяжкості симптомів, впливу на стан здоров'я та оцінки наслідків регулярного фізичного навантаження на всі частини тіла	Залежно від тяжкості симптомів, впливу на стан здоров'я та оцінки наслідків регулярного фізичного навантаження на всі частини тіла

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
K44	Грижі – діафрагмальна (стравохідний отвір) <i>Рефлюкс умісту шлунку або кислоти, що призводить до печії тощо</i>	Залежно від тяжкості симптомів у лежачому положенні та відповідних порушень сну	Залежно від тяжкості симптомів у лежачому положенні та відповідних порушень сну
K50, 51, 57, 58, 90	Неінфекційний ентерит, коліт, хвороба Крона, дивертикул тощо <i>Порушення працездатності та біль</i>	Т – До обстеження та вилікування П – У разі гострої форми або рецидивів	Залежно від конкретного випадку та висновку фахівця. Низька ймовірність рецидиву
K60 I84	Захворювання заднього проходу: геморой, тріщини, нориці <i>Імовірність приступів болю та порушення працездатності</i>	Т – За наявності симптомів, які перешкоджають безпечній роботі П – Залежно від випадку в разі рецидивів та безрезультатності лікування	Залежно від конкретного випадку
K70, 72	Цироз печінки <i>Печінкова недостатність. Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу</i>	Т – До повного обстеження П – У разі гострої форми або ускладнень через асцит або варикозне розширення вен стравоходу	Залежно від конкретного випадку та висновку фахівця. Термін придатності – один рік
K80–83	Хвороби жовчовивідних шляхів <i>Жовчна колька, спричинена жовчаними каменями, жовтяницею, печінковою недостатністю</i>	Т – До повного вилікування жовчної кольки П – Захворювання печінки на пізній стадії, рецидивні або тривалі симптоми, які призводять до порушення працездатності	Залежно від конкретного випадку та висновку фахівця. Низька ймовірність раптового приступу жовчної кольки

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
K85–86	Панкреатит <i>Імовірність рецидивів</i>	Т – До вилікування П – У разі рецидивів або розвитку на фоні вживання алкоголю, якщо не підтверджено утримання	Залежно від конкретного випадку та висновку фахівця
Y83	Стома (ілеостома, колостома) <i>Порушення працездатності в разі втрати контролю – потреби в калоприймачі тощо. Труднощі в умовах тривалих надзвичайних обставин</i>	Т – До обстеження, відновлення належного контролю та початку лікування П – Неналежний контроль	Залежно від конкретного випадку
N00–99	ХВОРОБИ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ		
N00, N17	Гострий нефрит <i>Ниркова недостатність, артеріальна гіпертензія</i>	П – До вилікування	Залежно від конкретного випадку за наявності залишкових явищ
N03–05, N18–19	Підгострий або хронічний нефрит чи нефроз <i>Ниркова недостатність, артеріальна гіпертензія</i>	Т – До обстеження	Залежно від конкретного випадку та висновку фахівця, зважаючи на ниркову функцію та ймовірність ускладнень
N20–23	Конкремент нирки або сечоводу <i>Біль унаслідок ниркової кольки</i>	Т – До обстеження та підтвердження відсутності симптомів, які перешкоджають безпечній роботі П – У разі тяжких рецидивів	Залежно від конкретного випадку
N33, N40	Аденома простати/обструкція сечових шляхів	Т – До обстеження та вилікування	Залежно від конкретного випадку

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
		П – У разі невиліковності	
	<i>Гостра затримка сечовипускання</i>		
N70–98	Гінекологічні захворювання – гостра маткова кровотеча, сильний менструальний біль, ендометріоз, випадання статевих органів тощо <i>Порушення працездатності внаслідок болю або кровотечі</i>	Т – У разі порушення працездатності або потреби в обстеженні та вилікуванні	Залежного від конкретного випадку за ймовірності потреби в лікуванні під час рейсу або порушення працездатності
R31, 80, 81, 82	Протеїнурія, гематурія, глікозурія або інші порушення сечовипускання <i>Ознака захворювань нирок або інших хвороб</i>	Т – Якщо результати первинного обстеження є клінічно значущими П – Якщо причиною є серйозна та невиліковна хвороба, пов'язана з порушенням функцій нирок тощо	Дуже низька ймовірність того, що порушення спричинене серйозним захворюванням
Z90.5	Видалення нирки або одна німа нирка <i>Порушення регуляції водного балансу за надзвичайних умов у разі неповноцінного функціонування іншої нирки</i>	П – Новий член екіпажу: будь-яке порушення функціонування іншої нирки. Чинний член екіпажу: серйозне порушення функціонування іншої нирки.	За умови підтвердження на підставі обстеження та висновку фахівця повноцінного функціонування іншої нирки та відсутності передумов для розвитку хвороби
O00–99	ВАГІТНІСТЬ		
O00–99	Вагітність <i>Ускладнення, обмежена рухливість на пізній стадії.</i>	Т – Рішення на підставі національного законодавства Відхилення, які обумовлюють потребу в особливому нагляді	Неускладнена вагітність без порушення працездатності: рішення приймається на підставі національної практики і законодавства

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
	<i>Можливість загрози здоров'ю матері та дитини в разі передчасних пологів під час роботи</i>		
L00 – 99	ШКІРА		
L00–08	Інфекційні хвороби шкіри <i>Рецидиви, інфікування інших осіб</i>	Т – За наявності симптомів, які перешкоджають безпечній роботі П – Залежно від випадку в разі рецидивів у членів екіпажу, які працюють на палубі	Залежно від характеру та форми інфекційної хвороби
L10–99	Інші хвороби шкіри, зокрема екзема, дерматит, псоріаз <i>Рецидиви, можливе виникнення внаслідок робочих факторів</i>	Т – За наявності симптомів, які перешкоджають безпечній роботі	Залежно від конкретного випадку та з відповідними обмеженнями в разі виникнення внаслідок робочих факторів, як-от впливу хімічних речовин або високих температур
M00–99	ХВОРОБИ КІСТКОВО-М'ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ		
M10–23	Остеоартроз, інші хвороби суглобів та пов'язана з ними артропластика <i>Біль та обмежена рухливість, що перешкоджає виконанню обов'язків в умовах звичайних чи надзвичайних обставин. Імовірність інфекційних хвороб або зміщення та обмежений термін придатності протезів</i>	Т – Підтвердження повного відновлення функції суглобів за результатами формальної оцінки фахівцем до поновлення на роботі в разі протезування колінного або кульшового суглоба П – Якщо хвороба в тяжкій формі або на пізній стадії	Залежно від конкретного випадку. Здатність виконувати обов'язки в умовах звичайних та надзвичайних обставин та дуже низька ймовірність порушення працездатності

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
M24.4	Звична нестабільність функції плечових або колінних суглобів <i>Раптові періоди обмеження рухливості, які супроводжуються болем</i>	Т – До належного відновлення та стабілізації функції суглобів	Залежно від конкретного прояву звичної нестабільності
M54.5	Біль у спині <i>Біль та обмежена рухливість, що перешкоджає виконанню обов'язків в умовах звичайних або надзвичайних обставин. Загострення болю</i>	Т – У разі гострої форми П – У разі рецидивів або порушення працездатності	Залежно від конкретного випадку
Y83.4 Z97.1	Протези кінцівок <i>Обмеження рухливості, що перешкоджає виконанню обов'язків в умовах звичайних або надзвичайних обставин</i>	П – Якщо наявність протеза перешкоджає виконанню основних обов'язків	Здатність виконувати обов'язки в умовах звичайних та надзвичайних обставин. Допускаються обмеження щодо виконання певних другорядних обов'язків. Можливе застосування обмеження 03***
	ІНШЕ		
R47, F80	Розлади мовлення <i>Обмежена здатність до комунікації</i>	П – Якщо розлад перешкоджає стабільному, безпечному та ефективному виконанню обов'язків в умовах звичайних і надзвичайних обставин	За відсутності істотних порушень мовлення
T78 Z88	Алергії (за винятком алергічного дерматиту і астми)	Т – До усунення симптомів, які перешкоджають безпечній роботі П – У разі значного ризику виникнення небезпечної для життя реакції	Якщо алергічна реакція не є небезпечною для життя, а її симптоми можуть контролюватися хворим самостійно, шляхом довгострокового приймання нестероїдних препаратів або модифікації

Діагностичні коди МКХ-10 ¹	Хвороба або патологічний стан ² <i>Обґрунтування критеріїв</i>	Непридатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ³ – вважається тимчасовою (Т) – вважається постійною (П)	Придатність до виконання призначених обов'язків у будь-який час ⁴
	<i>Імовірність рецидивів та загострення алергічної реакції. Обмеження працездатності</i>		способу життя з дотриманням вимог до безпечного виконання робочих обов'язків
Z94	Трансплантовані органи – нирка, серце, легені, печінка (щодо протезів, зокрема протезів суглобів чи кінцівок, лінз, слухових апаратів, штучних клапанів серця, див. відповідні розділи) <i>Імовірність відчуження. Побічні ефекти медикаментів</i>	Т – До стабілізації післяопераційного стану та ефектів імунодепресантів П – Залежно від конкретного випадку та на підставі формальної оцінки фахівцем	Залежно від конкретного випадку та на підставі рекомендацій фахівця. Термін придатності – один рік
Залежно від конкретного випадку	Прогресивні хвороби , які відповідають чинним критеріям, наприклад хвороба Гантінгтона (включаючи випадки хвороби серед членів сім'ї), кератоконус	Т – До обстеження та вилікування в разі виявлення П – За ймовірності прогресії	Залежно від конкретного випадку та на підставі рекомендацій фахівця. Хвороби такого характеру допускаються за умови низької ймовірності прогресії до подальшого обстеження
Залежно від конкретного випадку	Не зазначені окремо хвороби або патологічні стани	Т – До обстеження та вилікування в разі виявлення П – У разі постійного порушення працездатності	Пор. зі схожими хворобами чи патологічними станами. До факторів, які слід враховувати, належать ймовірність раптової втрати працездатності, рецидивів або прогресії, а також обмеження, пов'язані з виконанням обов'язків в умовах звичайних і надзвичайних обставин. У разі сумнівів слід проконсультуватися з фахівцем або розглянути можливість застосування обмежень та направлення хворого до відповідного спеціаліста

Примітки:

* Імовірність рецидивів:

У разі використання термінів «низька» і «дуже низька» на позначення ймовірності рецидиву. Попри те, що ймовірність рецидиву є насамперед предметом клінічної оцінки, щодо певних захворювань існують відповідні кількісні дані. Такі дані (наприклад, щодо епілепсії або кардіальних подій) можуть вказувати на необхідність подальшого обстеження з метою визначення ймовірності рецидиву в конкретної особи. Кількісне вираження рівнів ймовірності приблизно таке:

низька: ймовірність рецидиву менш ніж 2 відсотки на рік;

низька: ймовірність рецидиву 2–5 відсотків на рік.

** Розвиток астми в дорослому віці

Астма може виявлятися з дитячого віку або розвиватися після 16 років. Існує різноманіття внутрішніх і зовнішніх факторів, які сприяють виникненню астми в дорослому віці. Оцінка придатності кандидатів із набутою в дорослому віці астмою передбачає дослідження впливу певних алергенів, включаючи таких, які спричиняють професійну астму. Також до уваги мають братися такі загальні чинники, як застудні захворювання, фізичне навантаження та респіраторні інфекції. Усі з нижчезгаданих видів астми можуть позначатися на придатності до роботи на судах.

Легка переміжна астма – епізоди легких свистячих хрипів не частіше ніж один раз на два тижні, які швидко припиняються після застосування інгалятора з бета-агоністами;

Легка астма – часті епізоди свистячих хрипів, що вимагають застосування інгалятора з бета-агоністами або переходу на використання інгалятора з кортикостероїдами. Регулярне застосування інгаляційних стероїдів (або стероїдних бета-агоністів/бета-агоністів довгої дії) може ефективно усунути симптоми та потребу в лікуванні бета-агоністами.

Астма фізичного навантаження – епізоди свистячих хрипів і задишки, спровоковані фізичним навантаженням, особливо при низьких температурах. Ефективне лікування можливе шляхом застосування інгаляційних стероїдів (або стероїдних бета-агоністів/бета-агоністів довгої дії) чи інших пероральних препаратів.

Помірна астма – часті епізоди свистячих хрипів попри регулярне застосування інгаляційних стероїдів (або стероїдних бета-агоністів/бета-агоністів довгої дії), що вимагають постійного лікування з регулярним застосуванням інгалятора з бета-агоністами або додаткових препаратів. Потреба в періодичному застосуванні пероральних стероїдів.

Тяжка астма – часті епізоди свистячих хрипів і задишки, регулярна госпіталізація, регулярне застосування стероїдів.

*** допоміжні заходи та обмеження

01 Потреба в корекції зору (окуляри та/або контактні лінзи)

02 Потреба у слуховому апараті

03 Потреба у протезі кінцівок

04 Самостійне несення ваhti у стерновій рубці не дозволяється

05 Лише при денному світлі

06 Не дозволяється виконання обов’язків, пов’язаних із навігацією

07 Лише на певному судні

08 Лише в певному районі

09 Лише певні види роботи

У разі потреби допоміжні заходи та обмеження можуть бути поєднані.

¹ Міжнародна класифікація хвороб ВООЗ 10-го перегляду (МКХ-10). Коди наведені як допомога для аналізу та, зокрема, для міжнародної компіляції даних.

²загальна назва умови або групи умов із коротким викладом щодо їхнього значення для роботи на морі та внутрішніх водних шляхах.

³критерії придатності за станом здоров'я, які призвели до прийняття рішення: несумісність.

⁴критерії придатності за станом здоров'я, на підставі яких було прийнято рішення: здатний виконувати доручені обов'язки в будь-який час.
