

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я
України

16 квітня 2026 року № 514

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 01 травня 2026 року за

№ 603/45997

Зміни

до Державних медико-санітарних нормативів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2016 року № 55, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2016 року за № 207/28337 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 травня 2020 року № 1276)

1. У таблиці 6:

1) рядок 102 викласти у такій редакції:

«

102	Параго, РК	дикват дибромід у перерахунку на дикват іон, 150 г/л	0,002	соняшник (насіння)	0,5	0,05 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,003	0,02 орг.	0,2	7	не потр.	3	2 (небезпеч- ний при потраплян-
-----	------------	---	-------	-----------------------	-----	--	-------	--------------	-----	---	----------	---	--

				сояшник (олія)	0,1				-	-	-	ні на шкіру та слизові оболонки очей)
				soя (зерно)	0,5				7	не потр.	3	
				soя (олія)	0,1				-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,4				7	не потр.	3	
				ріпак (олія)	0,5				-	-	-	

».

2. У таблиці 7:

1) рядок 78 викласти у такій редакції:

«

78	Марсель, КС			<i>Контроль за ізоксафлютолом (як суми ізоксафлютолу і його метаболіта RPA 202248 в перерахунку на ізоксафлютол)</i>									2
		ізоксафлютол, 480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,02	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0	не потр.*	не потр. *	3*	
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	

».

3. Доповнити новою таблицею такого змісту:
«Таблиця 8

№ з/п	Назва препарату	Назва діючої речовини	Допустима добова доза, мг/кг	Максимально допустимий рівень в продуктах харчування, мг/кг (мг/л)		Гранично допустима концентрація в повітрі робочої зони, мг/м³	Гранично допустима концентрація в атмосферному повітрі, мг/м³	Гранично допустима концентрація у воді водойм, мг/дм³	Гранично допустима концентрація у ґрунті, мг/кг	Строки очікування до збору врожаю, дні	Строки виходу на оброблені ділянки, дні		Клас небезпечності
				культура	максимально допустимий рівень						ручні роботи	механізовані роботи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абалід, КС (Abalid, SC)			<i>Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та боскалідом</i>		<i>Контроль за протіоконазолом (2) та боскалідом</i>			<i>Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та боскалідом</i>				3 (високотій-кий у воді та ґрунті)
		боскалід, 250 г/л +	0,04	ріпак (насіння)	1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4	35	не потр.	3	
		протіоконазол, 150 г/л	0,001 (1,2)		0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
		боскалід, 250 г/л +	0,04	ріпак (олія)	1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4	-	-	-	
		протіоконазол, 150 г/л	0,001 (1,2)		не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
		боскалід, 250 г/л +	0,04	соняшник (насіння)	1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4	35	не потр.	3	
		протіоконазол, 150 г/л	0,001 (1,2)		0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				

		боскалід, 250 г/л +	0,04	соняшник (олія)	2,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4	-	-	-	
		протіоконазол, 150 г/л	0,001 (1,2)		не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
		боскалід, 250 г/л +	0,04	соя (зерно)	3,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4	35	не потр.	3	
		протіоконазол, 150 г/л	0,001 (1,2)		0,05 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
		боскалід, 250 г/л +	0,04	соя (олія)	1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4	-	-	-	
		протіоконазол, 150 г/л	0,001 (1,2)		не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
2	Абамат (Abamat), КС			<i>Контроль за абамектином та сумою спіротетрамату і спіротетрамат-енолу, вираженою як спіротетрамат</i>		<i>Контроль за абамектином та спіротетраматом</i>							2
		абамектин, 40 г/л +	0,0002	яблука	0,01	0,04	0,0002	0,0003 заг.-сан.	0,3	21	7	3	
		спіротетрамат, 240 г/л	0,01		0,3	1,0	0,003	0,005 заг.-сан.	0,25				
		абамектин, 40 г/л +	0,0002	яблучний сік	не потр.	0,04	0,0002	0,0003 заг.-сан.	0,3	-	-	-	
		спіротетрамат, 240 г/л	0,01		0,1	1,0	0,003	0,005 заг.-сан.	0,25				
		абамектин, 40 г/л +	0,0002	груші	0,01	0,04	0,0002	0,0003 заг.-сан.	0,3	21	7	3	
		спіротетрамат, 240 г/л	0,01		0,3	1,0	0,003	0,005 заг.-сан.	0,25				

		абамектин, 40 г/л +	0,0002	грушевий сік	не потр.	0,04	0,0002	0,0003 заг.-сан.	0,3	-	-	-	
		спіротетрамат, 240 г/л	0,01		0,1	1,0	0,003	0,005 заг.-сан.	0,25				
3	Авіседа АХ, МД	мезотріон, 75 г/л +	0,001	<i>Контроль за мезотріоном та нікосульфуроном</i>						не потр.*	не потр.*	3*	3 (високо- стійкий у воді)
		нікосульфурон, 30 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,1	0,2	0,006	0,02 сан.-токс.	0,4				
		мезотріон, 75 г/л +	0,001	кукурудза (олія)	не потр.	0,2	0,006	0,02 сан.-токс.	0,4	-	-	-	
		нікосульфурон, 30 г/л	2,0		не потр.	1,0	0,01	0,001 заг.-сан.	0,2				
4	Агер Форте, РК	2М-4Х (МСРА) у формі диметиламінної солі, 750 г/л	0,008	кукурудза (зерно)	0,1	1,0	0,02	0,003 орг.	0,02	не потр.	не потр.	3	2
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	

5	Агрітер Супер 500, РК	2М-4Х (МСРА), 500 г/л	0,008	багаторічні газонні трави ²	не потр.	1,0	0,02	0,003 орг.	0,02	не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
6	Агрітокс, РК	2М-4Х (МСРА) у формі диметиламінної солі, 500 г/л	0,008	пшениця	0,2	1,0	0,02	0,003 орг.	0,02	не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
7	Агрозтар, РК	2М-4Х (МСРА) у формі диметиламінної солі, 500 г/л	0,008	кукурудза (зерно)	0,1	1,0	0,02	0,003 орг.	0,02	не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
8	Адавелт, КЕ	флорил-пікоксамід, 100 г/л	0,03	Контроль за сумою флорилпікоксаміду та Х12485649, вираженою як флорилпікоксамід		Контроль за флорилпікоксамідом		Контроль за сумою флорил-пікоксаміду та Х12485649, вираженою як флорилпікоксамід		не потр.	не потр.	3	3 (високостійкий у воді та ґрунті)
				пшениця	0,02	1,0	0,003	0,03 заг.-сан.	0,2	21	7	3	
9	Азоксидифен 125 125, КС			Контроль за дифеноконазолом та азоксистробіном									3 (високо-

	(Azoxystrobin 125 SC)	дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	соє (зерно)	0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	42*	не потр.*	3*	стійкий у воді)
		азоксистробін, 125 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	соє (олія)	0,1	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	-	-	-	
		азоксистробін, 125 г/л	0,03		не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	соняшник (насіння)	0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	42*	не потр.*	3*	
		азоксистробін, 125 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	соняшник (олія)	0,4	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	-	-	-	
		азоксистробін, 125 г/л	0,03		не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	ріпак (насіння)	0,1	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	42*	не потр.*	3*	
		азоксистробін, 125 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	ріпак (олія)	0,2	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	-	-	-	
		азоксистробін, 125 г/л	0,03		не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				

10	АзоПро, КС / Азоріт Протіо, КС			<i>Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та азоксистробіном</i>		<i>Контроль за протіоконазолом (2) та азоксистробіном</i>			<i>Контроль за протіо- коназолом- дестіо (1) та азоксистро- біном</i>				3 (високост й-кий у воді)
		протіоконазол, 200 г/л +	0,001 (1, 2)	соняшник (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	35*	не потр.*	3*	
		азоксистробін, 125 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		протіоконазол, 200 г/л +	0,001 (1, 2)	соняшник (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	
		азоксистробін, 125 г/л	0,03		не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
11	Акартіс Про, КС			<i>Контроль за тебуфніпірадом та абамектином</i>									2
		тебуфенпірад, 350 г/л +	0,002	соє (зерно)	0,05	0,5	0,002	0,004 сан.-токс.	0,1	36*	не потр.*	3*	(небезпеч - ний при потрапля н- ні на слизові оболонки очей, високості й-кий у воді)
		абамектин, 50 г/л	0,0002		0,01	0,04	0,0002	0,0003 заг.-сан.	0,3				
		тебуфенпірад, 350 г/л +	0,002	соє (олія)	0,05*	0,5	0,002	0,004 сан.-токс.	0,1	-	-	-	
		абамектин, 50 г/л	0,0002		0,01	0,04	0,0002	0,0003 заг.-сан.	0,3				
12	Акебоно 900, КС			<i>Контроль за S-метолахлором та кламазоном</i>									3
		S-метолахлор, 825 г/л +	0,01	ріпак (насіння)	0,2	0,5	0,02	0,02 сан.-токс.	0,02	не потр.	не потр.	3	(небезпеч - ний при потрапля н- ні на слизові

		кломазон, 75 г/л	0,04		0,5	0,5	0,01	0,01 заг.-сан.	0,4				оболонки очей, алерген, високості й-кий у воді)
		S-метолахлор, 825 г/л +	0,01	ріпак (олія)	не потр.	0,5	0,02	0,02 сан.-токс.	0,02	-	-	-	
		кломазон, 75 г/л	0,04		не потр.	0,5	0,01	0,01 заг.-сан.	0,4				
		S-метолахлор, 825 г/л +	0,01	горох (зерно)	0,2	0,5	0,02	0,02 сан.-токс.	0,02	не потр.	не потр.	3	
		кломазон, 75 г/л	0,04		0,02	0,5	0,01	0,01 заг.-сан.	0,4				
13	Альстт 80 WG, ВГ	фосетил алюмінію, 800 г/л	2,0	<i>Контроль за сумою фосетил алюмінію та фосфористої кислоти в перерахунку на фосетил алюмінію)</i>						30	7	3	3 (небезпеч- ний при потрапля- нні на слизові оболонки очей)
				яблука	10,0	2,0	0,02	0,3 сан.-токс.	0,5				
				яблучний сік	15,0								
				груші	30,0								
				грушевий сік	45,0								
				черешні	2,0								
				черешневи й сік	0,5								
				персики	2,0								
				персиковий сік	0,5								

				хміль сухий	10,0					30	7	3	
				лохина	20,0					30	7	3	
				лохина (сік)	10,0					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,5					30	не потр.	3	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				соя (зерно)	0,5					35	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				розсадники суніці	не потр. (забороняється використання ягід)					не потр.	7	3	
14	Альтерно, КЕ	метконазол, 80 г/л + піраклостробін, 130 г/л	0,001 0,03	Контроль за метконазолом та піраклостробіном						45	не потр.	3	2 (небезпеч- ний при потрапля- н-ні на слизові оболонки очей, високості й-кий у воді та ґрунті)
		метконазол, 80 г/л + піраклостробін, 130 г/л	0,001 0,03	льон (насіння)	0,08 0,05	0,2 1,0	0,001 0,01	0,002 сан.-токс. 0,02 заг.-сан.	0,1 водн.-мігр. 0,6				
		метконазол, 80 г/л + піраклостробін, 130 г/л	0,001 0,03	льон (олія)	0,2 0,1	0,2 1,0	0,001 0,01	0,002 сан.-токс. 0,02 заг.-сан.	0,1 водн.-мігр. 0,6	-	-	-	

15	Амісект 150, ВГ			<i>Контроль за ацетаміпридом та тіаклопридом</i>						30*	не потр.*	3*	2 (високот- ий-кий у воді)
		ацетаміприд, 250 г/кг +	0,005	ріпак (насіння)	0,05	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1				
		тіаклоприд, 50 г/кг	0,006		0,05	0,3	0,002	0,005 заг.-сан.	0,09 водн.-мігр., фітотокс.				
		ацетаміприд, 250 г/кг +	0,005	ріпак (олія)	не потр.	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1				
		тіаклоприд, 50 г/кг	0,006		не потр.	0,3	0,002	0,005 заг.-сан.	0,09 водн.-мігр., фітотокс.	-	-	-	
16	Амкопик, РК (Amcorpic, SL)			<i>Контроль за амінопіралідом, клопіралідом, піклорамом</i>						не потр.	не потр.	3	3 (небезпеч- ний при потрап- лянні на слизові оболонки очей, висок- остійкий у воді)
		амідапіролін, 17 г/л, +	0,05	ріпак (насіння)	0,01	1,5	0,05	0,002 заг.-сан.	0,4				
		клопіралід, 267 г/л +	0,15		0,2	2,0	0,01	0,04 сан.-токс.	0,1				
		піклорам, 80 г/л	0,02		0,05	5,0	0,02	0,04 сан.-токс.	0,05 трансл.				
		амідапіролін, 17 г/л, +	0,05	ріпак (олія)	не потр.	1,5	0,05	0,002 заг.-сан.	0,4				
		клопіралід, 267 г/л +	0,15		не потр.	2,0	0,01	0,04 сан.-токс.	0,1				

		пiклорам, 80 г/л	0,02		не потр.	5,0	0,02	0,04 сан.-токс.	0,05 трансл.				
17	Ампіліго 150 ZC, ФК			<i>Контроль за хлорантраніліпролом та лямбда-цигалотрином</i>									2 (високост й-кий у воді та ґрунті)
		хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	пшениця	0,02	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	не потр. (осіння обробка)	не потр.	4	
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,05	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	ячмінь	0,02	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	не потр. (осіння обробка)	не потр.	4	
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,05	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
18	Анріал, КЕ			<i>Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та дифеноконазолом</i>		<i>Контроль за протіоконазолом (2) та азоксистробіном</i>			<i>Контроль за протіо- коназолом- дестіо (1) та дифеноко- назолом</i>				3 (небезпе- чний при потрап- лянні на слизові оболонки очей, високо- стійкий у воді)
		протіоконазол, 150 г/л +	0,001 (1, 2)	соняшник (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	42	не потр.	3	

		дифеноконазол, 150 г/л	0,03		0,05	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		протіоконазол, 150 г/л +	0,001 (1, 2)	соняшник (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	
		дифеноконазол, 150 г/л	0,03		0,4	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		протіоконазол, 150 г/л +	0,001 (1, 2)	пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	42	не потр.	3	
		дифеноконазол, 150 г/л	0,03		0,05	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		протіоконазол, 150 г/л +	0,001 (1, 2)	ячмінь	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	42	не потр.	3	
		дифеноконазол, 150 г/л	0,03		0,05	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
19	Антизлак Макс, КЕ	клетодим, 240 г/л	0,01	<i>Контроль за сумою кетодиму, метаболітів кетодим-сульфону і кетодим-сульфоксиду в перерахунку на кетодим)</i>		0,07	0,005	0,01 заг.-сан.	0,1	не потр.	не потр.	3	3 (небезпе- чний при потрап- лянні на слизові оболонки очей, високо- стійкий у воді)
				буряки цукрові	0,1								
				соняшник (насіння)	0,05					не потр.	не потр.	3	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	

				соє (зерно)	0,1					не потр.	не потр.	3	
				соє (олія)	не потр.					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,15					не потр.	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
20	Антракол 70 WG, ВГ	пропінеб, 700 г/кг	0,0015	<i>Контроль за пропінебом та пропілен-тіосечовиною</i>		<i>Контроль за пропінебом</i>			<i>Контроль за пропіне-бом та пропілен- тіосечови- ною</i>	30	7	3	2 (алерген)
				цибуля (ріпка)	0,05	0,5	0,001	0,003 сан.-токс.					
		пропілен- тіосечовина (метаболіт пропінебу)	0,0001		0,01				0,02				
21	Апіс 200 SE, CE	ацетаміпрід, 200 г/л	0,005	соняшник (насіння)	0,1					50	не потр.	3	2 (високо- стійкий у воді)
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
22	Аргумент Форте 500 SL, PK	гліфосату калійна сіль, 614 г/л, у кислотному еквіваленті - 500 г/л	0,01	соє ¹ (зерно)	0,3	1,0	0,01	0,02 сан.-токс.	0,5 трансл.	14 (десикаці я)	не потр.	3	3 (високо- стійкий у воді)

				соє (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник ¹ (насіння)	0,3					11 (десикація)	не потр.	3	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
23	Артемікс, КС	міді оксихлорид, 239,36 г/л +	0,05 (по міді)	буряки цукрові	5,0	0,5	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова	1,0 орг.	3,0 заг.-сан.	30	7	3	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
		міді гідроксид, 236,64 г/л у загальному перерахунку на металеву мідь, 272 г/л	0,05 (по міді)		5,0	0,5	0,03 – максимальна разова; 0,005 – середньо- добова	1,0 орг.	3,0 заг.-сан.				
24	Аспік 250 ЕС, КЕ	протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	<i>Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та тебуконазолом</i>		<i>Контроль за протіоконазолом (2) та тебуконазолом</i>			<i>Контроль за протіокона- золом-дестіо (1) та тебукона- золом</i>	30*	не потр.*	3*	2 (високо- сті-кий у воді)
		тебуконазол, 125 г/л	0,03	пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
					0,2	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				

		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	ячмінь	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	30*	не потр.*	3*	
		тебуконазол, 125 г/л	0,03		0,2	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				
		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	50*	не потр.*	3*	
		тебуконазол, 125 г/л	0,03		0,5	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				
		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	
		тебуконазол, 125 г/л	0,03		0,5	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				
25	Аутбаг, КЕ	карфентразон- етил, 400 г/л	0,01	Контроль за сумою карфентразон-етилу та його метаболіту карфентразону		1,5	0,01	0,01 заг.-сан.	0,6	не потр.*	не потр.*	3*	2
				пшениця	0,05*								2
				ячмінь	0,05*								
26	Баскайд Тріо, КС			Контроль за протіокназолом-дестіо (1), піраклостробіном та боскалідом		Контроль за протіокназолом (2), піраклостробіном та боскалідом		Контроль за протіокона- золом- дестіо (1), піракло- стрібіном та боскалідом				3 (високо- стійкий у воді та ґрунті)	

		протіоконазол, 160 г/л +	0,001 (1,2)	пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	35*	не потр.*	3*	
		піраклостробін, 110 г/л +	0,03		0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
		боскалід, 120 г/л	0,04		0,1	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
		протіоконазол, 160 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	35*	не потр.*	3*	
		піраклостробін, 110 г/л +	0,03		0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
		боскалід, 120 г/л	0,04		1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
		протіоконазол, 160 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	
		піраклостробін, 110 г/л +	0,03		0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
		боскалід, 120 г/л	0,04		2,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
		протіоконазол, 160 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	30*	не потр.*	3*	
		піраклостробін, 110 г/л +	0,03		0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
		боскалід, 120 г/л	0,04		1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				

		протіоконазол, 160 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	
		піраклостробін, 110 г/л +	0,03		0,3	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
		боскалід, 120 г/л	0,04		1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
27	Бастіон Тріо, ТН			<i>Контроль за дифеноконазолом та флудіоксонілом</i>						не потр.	не потр.	не потр.	2 (високост ій-кий у воді)
		дифеноконазол, 25 г/л +	0,002	пшениця	0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		ципроконазол, 3 г/л +	0,002		0,05	0,1	0,01	0,03 сан.-токс.	0,01				
		флудіоксоніл, 25 г/л	0,015		0,02	1,0	0,002	0,1 орг.	0,2	не потр.	не потр.	не потр.	
		дифеноконазол, 25 г/л +	0,002	ячмінь	0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		ципроконазол, 3 г/л +	0,002		0,05	0,1	0,01	0,03 сан.-токс.	0,01				
		флудіоксоніл, 25 г/л	0,015		0,02	1,0	0,002	0,1 орг.	0,2				
28	Бетагарт, КЕ			<i>Контроль за етофумезатом</i>						не потр.	7	3	3
		етофумезат, 112 г/л +	0,1	буряки столові	0,2	0,1	0,01	0,05 заг.-сан.	0,15				
		фенмедифам, 91 г/л +	0,03		0,2	0,5	0,001	0,5 орг.	0,25 трансл.				

		десмедифам, 71 г/л	0,001		0,1	1,0	0,01	0,1 заг.-сан.	0,25 трансл.				
29	Біс SC, КС	хлороталаніл, 720 г/л	0,003	квасоля (зерно)	0,01*	0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,01	0,05 сан.-токс.	0,2	35*	не потр.*	3*	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
30	Бларкс, КС	хлорантранілі- прол, 500 г/л	0,02	соняшник (насіння)	0,1*	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	30*	не потр.*	3*	3 (високі кий у воді та ґрунті)
				соняшник (олія)	не потр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,4*					30*	не потр.*	3*	
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,02*					30*	не потр.*	3*	
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
				яблука	0,1					30*	7*	3*	
				яблучний сік	не потр.					-	-	-	
31	Блейд, КЕ			<i>Контроль за сумою клетодиму, метаболітів клетодим-сульфону і клетодим-сульфоксиду в перерахунку на клетодим)</i>									3 (небезпечний при потраплянні на слизові

		клетодим, 120 г/л	0,01	льон- довгунець	не потр.	0,07	0,005	0,01 заг.-сан.	0,1	не потр.	не потр.	3	оболонки очей, високо- стійкий у воді)
32	Бостон, КЕ	клетодим, 240 г/л	0,01	Контроль за сумою клетодиму, метаболітів клетодим-сульфону і клетодим-сульфоксиду в перерахунку на клетодим)		0,07	0,005	0,01 заг.-сан.	0,1	не потр.	не потр.	3	3 (небезпе- чний при потрап- лянні на слизові оболонки очей)
				соя (зерно)	0,1					-	-	-	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,05					не потр.	не потр.	3	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
33	Босфан Ультра, КС	боскалід, 200 г/л +	0,04	Контроль за боскалідом та азоксистробіном						30*	не потр.*	3*	2 (небезпе- чний при потрап- лянні на слизові оболонки очей, високо- стійкий у воді та ґрунті)
		азоксистробін, 300 г/л	0,03	соняшник (насіння)	1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
		боскалід, 200 г/л +	0,04	соняшник (олія)	2,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
		азоксистробін, 300 г/л	0,03	не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3					

34	Брамкар, ТН			Контроль за тіаметоксамом, флудіоксонілом та протіоконазолом-дестіо (1)		Контроль за тіаметоксамом, флудіоксонілом та протіоконазолом (2)			Контроль за тіаметок- самом, флудіоксо- нілом та протіокона- золом- дестіо (1)				3 (високо- стійкий у воді та ґрунті)
				пшениця									
		тіаметоксам, 150 г/л +	0,02		0,2	0,5 аерозоль	0,03	0,04 сан.-токс.	0,1	не потр.*	не потр.*	не потр.*	
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015		0,02	1,0	0,002	0,1 орг.	0,2				
		протіоконазол, 25 г/л +	0,001 (1, 2)		0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
		флуопірам, 7,5 г/л	0,01		0,1	1,0	0,003	0,02 сан.-токс., заг.-сан.	0,08				
		тіаметоксам, 150 г/л +	0,02	ячмінь	0,2	0,5 аерозоль	0,03	0,04 сан.-токс.	0,1	не потр.*	не потр.*	не потр.*	
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015		0,02	1,0	0,002	0,1 орг.	0,2				
		протіоконазол, 25 г/л +	0,001 (1, 2)		0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				

		флуопірам, 7,5 г/л	0,01		0,1	1,0	0,003	0,02 сан.-токс., заг.-сан.	0,08				
35	Бреаніс, КС	<i>Контроль за трифлуксистробіном та боскалідом</i>											3 (високо- стійкий у воді та ґрунті)
		трифлукси- стобін, 250 г/л +	0,02	пшениця	0,05*	0,8	0,01	0,03 заг.-сан.	0,1	35*	не потр.*	3	
		боскалід, 250 г/л	0,04		0,1	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
		трифлукси- стобін, 250 г/л +	0,02	соняшник (насіння)	0,05	0,8	0,01	0,03 заг.-сан.	0,1	35*	не потр.*	3	
		боскалід, 250 г/л	0,04		1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
		трифлукси- стобін, 250 г/л +	0,02	соняшник (олія)	0,1	0,8	0,01	0,03 заг.-сан.	0,1	-	-	-	
		боскалід, 250 г/л	0,04		2,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
		трифлукси- стобін, 250 г/л +	0,02	соє (зерно)	0,05	0,8	0,01	0,03 заг.-сан.	0,1	35*	не потр.*	3	
		боскалід, 250 г/л	0,04		3,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				

		трифлоркси- стробін, 250 г/л +	0,02	соя (олія)	0,1	0,8	0,01	0,03 заг.-сан.	0,1	-	-	-	
		боскалід, 250 г/л	0,04		1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
		трифлоркси- стробін, 250 г/л +	0,02	ріпак (насіння)	0,05	0,8	0,01	0,03 заг.-сан.	0,1	35*	не потр.*	3	
		боскалід, 250 г/л	0,04		1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
		трифлоркси- стробін, 250 г/л +	0,02	ріпак (олія)	0,1	0,8	0,01	0,03 заг.-сан.	0,1	-	-	-	
		боскалід, 250 г/л	0,04		1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
		трифлоркси- стробін, 250 г/л +	0,02	яблука	0,04	0,8	0,01	0,03 заг.-сан.	0,1	20*	7*	3	
		боскалід, 250 г/л	0,04		0,5	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
		трифлоркси- стробін, 250 г/л +	0,02	яблучний сік	0,05*	0,8	0,01	0,03 заг.-сан.	0,1	-	-	-	
		боскалід, 250 г/л	0,04		0,05*	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				

36	Вайбранс 500 FS, TH	седаксан, 500 г/л	0,1	буряки цукрові	0,01	1,0	0,03	0,004 заг.-сан.	0,2	не потр.	не потр.	не потр.	2 (високостійкий у воді та ґрунті)
37	Вайпер Плюс, КС	Контроль за біфентрином та клотіанідиним											
		біфентрин, 100 г/л +	0,02	кукурудза (зерно)	0,05	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1	36*	не потр.*	4*	3 (високостійкий у воді та ґрунті)
		клотіанідин, 100 г/л	0,08		0,05	1,50	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.				
		біфентрин, 100 г/л +	0,02	кукурудза (олія)	0,1	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1	-	-	-	
		клотіанідин, 100 г/л	0,08		не потр.	1,50	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.				
		біфентрин, 100 г/л +	0,02	соя (зерно)	0,1	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1	36*	не потр.*	4*	
		клотіанідин, 100 г/л	0,08		0,02	1,50	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.				
		біфентрин, 100 г/л +	0,02	соя (олія)	0,1*	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1	-	-	-	
		клотіанідин, 100 г/л	0,08		не потр.	1,50	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.				

		біфентрин, 100 г/л +	0,02	соняшник (насіння)	0,2	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1	36*	не потр.*	4*	
		клотіанідин, 100 г/л	0,08		0,05	1,50	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.				
		біфентрин, 100 г/л +	0,02	соняшник (олія)	0,5	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1	-	-	-	
		клотіанідин, 100 г/л	0,08		не потр.	1,50	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.				
		біфентрин, 100 г/л +	0,02	ріпак (насіння)	0,2	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1	36*	не потр.*	4*	
		клотіанідин, 100 г/л	0,08		0,05	1,50	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.				
		біфентрин, 100 г/л +	0,02	ріпак (олія)	0,3	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1	-	-	-	
		клотіанідин, 100 г/л	0,08		не потр.	1,50	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.				
38	Вамп Дуо 220, КС	ацетаміприд, 115 г/л +	0,005	Контроль за ацетаміпридом та лямбда-цигалотрином									2 (небезпе- чний при потрап- лянні на слизові
				яблука ²	0,05	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1	45	10	4	

		лямбда-цигалотрин, 106 г/л	0,003		0,01	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				оболонки очей, високо-стійкий у воді)
		ацетаміприд, 115 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л	0,005	яблучний сік	0,02					-	-	-	
		ацетаміприд, 115 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л	0,003		0,05	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		ацетаміприд, 115 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л	0,005	томати ²	0,1	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1	20	10	4	
		ацетаміприд, 115 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л	0,003		0,01	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		ацетаміприд, 115 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л	0,005	томатний сік	0,05					-	-	-	
		ацетаміприд, 115 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л	0,003		0,05	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
39	Вердавіс 250 ZС, ФК			Контроль за пліназоліном (ізоциклосерамом) та лямбда-цигалотрином									2 (алерген, високо-

		пліназолін (ізоцикloserам) 100 г/л +	0,005	ріпак (насіння)	0,01	1,0	0,0015	0,0001 заг.-сан., орг.	0,05	40	не потр.	3	стійкий у воді та ґрунті)
		лямбда- цигалотрин, 150 г/л	0,003		0,1	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		пліназолін (ізоцикloserам) 100 г/л +	0,005	ріпак (олія)	0,1	1,0	0,0015	0,0001 заг.-сан., орг.	0,05				
		лямбда- цигалотрин, 150 г/л	0,003		0,2	0,1небезпечн ий при потраплянні на шкіру	0,001	0,01сан.-токс.	0,05	-	-	-	
		пліназолін (ізоцикloserам) 100 г/л +	0,005	картопля ²	0,01	1,0	0,0015	0,0001 заг.-сан., орг.	0,05	30	7	3	
		лямбда- цигалотрин, 150 г/л	0,003		0,01	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
40	Віктрато 500 FS, TH	тайміріум™ (циклобутри- флурам), 500 г/л	0,006	буряки цукрові	0,02	1,0	0,002	0,01 заг.-сан.	0,1	не потр.	не потр.	не потр.	3 (високо- стійкий у воді)
				кукурудза (зерно)	0,02					не потр.	не потр.	не потр.	
				кукурудза (олія)	0,2					-	-	-	

41	Вінат, КС	боскалід, 500 г/л	0,04	соняшник (насіння)	1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4	35	не потр.	3	3 (високо- стійкий у воді та ґрунті)
				соняшник (олія)	2,0					-	-	-	
				ріпак (насіння)	1,0					35	не потр.	3	
				ріпак (олія)	1,0					-	-	-	
				соє (зерно)	3,0					35	не потр.	3	
				соє (олія)	1,0					-	-	-	
42	Вініл (Vinyl), КЕ	клетодим, 480 г/л	0,01	<i>Контроль за сумою клетодиму, метаболітів клетодим-сульфону і клетодим-сульфоксиду в перерахунку на клетодим)</i>		0,07	0,005	0,01 заг.-сан.	0,1	не потр.	не потр.	3	2
				соє (зерно)	0,1								
				соє (олія)	не потр.							-	
				соняшник (насіння)	0,05							не потр.	
				соняшник (олія)	не потр.							-	
				буряки цукрові	0,1							не потр.	

				горох (зерно)	0,1					не потр.	не потр.	3	
43	Гардекс, ТН			<i>Контроль за протіоконазолом-дестію (1), клотіанідином та дифеноконазолом</i>		<i>Контроль за протіоконазолом (2), клотіанідином та дифеноконазолом</i>			<i>Контроль за протіоко- назолом- дестію (1), клотіа- нідином та дифеноко- назолом</i>				3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високо- стійкий у воді та ґрунті)
		клотіанідин, 350 г/л +	0,08	пшениця	0,02	1,50	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.	не потр.*	не потр.*	не потр.*	
		дифеноконазол, 50 г/л +	0,002		0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		протіоконазол, 50 г/л +	0,001 (1,2)		0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
		азоксистробін, 30 г/л	0,03		0,5	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		клотіанідин, 350 г/л +	0,08	ячміннь	0,02	1,50	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.	не потр.*	не потр.*	не потр.*	
		дифеноконазол, 50 г/л +	0,002		0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		протіоконазол, 50 г/л +	0,001 (1,2)		0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
		азоксистробін, 30 г/л	0,03		0,5	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				

		клотіанідин, 350 г/л +	0,08	soя (зерно)	0,02	1,50	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.	не потр.*	не потр.*	не потр.*	
		дифенокназол, 50 г/л +	0,002		0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		протіоконазол, 50 г/л +	0,001 (1,2)		0,05 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
		азоксистробін, 30 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		клотіанідин, 350 г/л +	0,08	soя (олія)	не потр.	1,50	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.	-	-	-	
		дифенокназол, 50 г/л +	0,002		не потр.	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	-	-	-	
		протіоконазол, 50 г/л +	0,001 (1,2)		не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
		азоксистробін, 30 г/л	0,03		не потр.*	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
44	Гека-Стар SC, KC	гекситіазокс, 134 г/л +	0,04	<i>Контроль за гекситіазоксом та абамектином</i>						30*	не потр.*	3*	2
		абамектин, 356 г/л	0,0002	soя (зерно)	0,05	0,5	/0,05	0,001 заг.-сан.	/0,1				
		гекситіазокс, 134 г/л +	0,04	soя (олія)	не потр.	0,5	/0,05	0,001 заг.-сан.	/0,1				
		абамектин, 356 г/л	0,0002		0,01	0,04	/0,0002	0,0003 заг.-сан.	/0,3				

45	Гліф К, РК	гліфосату калійна сіль, 664 г/л (у кислотному еквіваленті - 540 г/л)	0,01	соя (зерно)	0,3	1,0	0,01	0,02 сан.-токс.	0,5 трансл.	не потр.*	не потр.*	3*	3 (алерген, високо- стійкий у воді)
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
46	Гранд WG, ВГ	трибенурон- метил, 750 г/кг	0,005	соняшник (насіння)	0,02	0,1	0,003	0,06 заг.-сан.	0,01	не потр.	не потр.	3	3
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
47	Грінекс Ультра, РК	алюміній фосфоново- кислий, 400 г/л + сульфат міді, 30 г/л +	2,0 (по фосфо- новій кислоті) 0,05 (по міді)	<i>Контроль за фосфоновою кислотою (сума фосфонової кислоти та її солей, виражена як фосфонова кислота), пропамокарбом (сума пропамокарбу та його солей, виражена як пропамокарб) та міддю</i>		<i>Контроль за фосфоновою кислотою, пропамокарбом та міддю</i>		<i>Контроль за пропамокарбом та міддю</i>					3 (небезпе- чний при потрап- лянні на слизові оболонки очей, високо- стійкий у воді та ґрунті)
				томати ²	0,6*	0,2	0,02	0,3 сан.-токс.	0,5	20*	7*	3*	
					5,0	0,5	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова	1,0 орг.	3,0 заг.-сан.				

		пропамокарб, 200 г/л	0,02 (по пропамо- карб гідро- хлориду)		0,05*	0,8	0,06	0,08 сан.-токс.	0,1				
		алюміній фосфоново- кислий, 400 г/л +	2,0 (по фосфо- новій кислоті)	томатний сік	0,4*	0,2	0,02	0,3 сан.-токс.	0,5	-	-	-	
		сульфат міді, 30 г/л +	0,05 (по міді)		5,0	0,5	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова	1,0 орг.	3,0 заг.-сан.				
		пропамокарб, 200 г/л	0,02 (по пропамо- карб гідро- хлориду)		0,025*	0,8	0,06	0,08 сан.-токс.	0,1				
48	Грінофлют ол WG, ВГ	ізоксафлютол, 750 г/кг	0,001	<i>Контроль за ізоксафлютолом (як суми ізоксафлютолу і його метаболіта RPA 202248 в перерахунку на ізоксафлютол)</i>						не потр.*	не потр.*	3*	3 (небезпе- чний при потрап- лянні на слизові оболонки очей)
				кукурудза (зерно)	0,02	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				
				кукурудза (олія)	не потр.								
49	Гуру, ВГ	емамектин бензоат, 100 г/кг +	0,001	<i>Контроль за емамектин бензоатом та ацетаміпридом</i>						28*	не потр.*	3*	2 (високо- стійкий у воді)
				кукурудза ¹ (зерно)	0,01	0,1	0,0004	0,002 сан.-токс.	0,3				

		ацетаміприд, 240 г/кг	0,005		0,01	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1				
		емамектин бензоат, 100 г/кг +	0,001	кукурудза (олія)	не потр.	0,1	0,0004	0,002 сан.-токс.	0,3	-	-	-	
		ацетаміприд, 240 г/кг	0,005		не потр.	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1				
		емамектин бензоат, 100 г/кг +	0,001	соняшник ¹ (насіння)	0,01	0,1	0,0004	0,002 сан.-токс.	0,3	28*	не потр.*	3*	
		ацетаміприд, 240 г/кг	0,005		0,1	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1				
		емамектин бензоат, 100 г/кг +	0,001	соняшник (олія)	не потр.	0,1	0,0004	0,002 сан.-токс.	0,3	-	-	-	
		ацетаміприд, 240 г/кг	0,005		не потр.	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1				
		емамектин бензоат, 100 г/кг +	0,001	ріпак (насіння)	0,01	0,1	0,0004	0,002 сан.-токс.	0,3	40*	не потр.*	3*	
		ацетаміприд, 240 г/кг	0,005		0,05	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1				
		емамектин бензоат, 100 г/кг +	0,001	ріпак (олія)	не потр.	0,1	0,0004	0,002 сан.-токс.	0,3	-	-	-	
		ацетаміприд, 240 г/кг	0,005		не потр.	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1				
50	Данеріс, МД (Daenerys, OD)			Контроль за мезотріоном та нікосульфуроном									3 (високо- стійкий у воді)

		мезотріон, 75 г/л +	0,001	кукурудза (зерно)	0,1	0,2	0,006	0,02 сан.-токс.	0,4	не потр.*	не потр.*	3*	
		нікосульфурон, 30 г/л	2,0		0,01	1,0	0,01	0,001 заг.-сан.	0,2				
		мезотріон, 75 г/л +	0,001	кукурудза (олія)	не потр.	0,2	0,006	0,02 сан.-токс.	0,4	-	-	-	
		нікосульфурон, 30 г/л	2,0		не потр.	1,0	0,01	0,001 заг.-сан.	0,2				
51	Дартон, КС	ацетаміпрід, 500 г/л	0,005	яблука	0,05	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1	45	7	3	3 (високо- стійкий у воді)
				яблучний сік	0,02					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,1					50	не потр.	3	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,05					45	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	

52	Деларо Івлон 431 SC, KC			<i>Контроль за протіоконазолом-дестію (1), трифлуксистербіном та ізофлуципрамом</i>		<i>Контроль за протіоконазолом (2), трифлуксистербіном та ізофлуципрамом</i>			<i>Контроль за протіо- коназолом- дестію (1), трифлукси- стербіном та ізофлуцип- рамом</i>				2 (високо- стійкий у воді та ґрунті)
		протіоконазол, 204 г/л +	0,001 (1, 2)	пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	43	не потр.	3	
		трифлукси- стербін, 159 г/л +	0,02		0,05	0,8	0,01	0,03 заг.-сан.	0,1				
		ізофлуципрам, 68 г/л	0,02		0,05	1,0	0,005	0,02 заг.-сан.	0,1				
		протіоконазол, 204 г/л +	0,001 (1, 2)	ячмінь	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	29	не потр.	3	
		трифлукси- стербін, 159 г/л +	0,02		0,05	0,8	0,01	0,03 заг.-сан.	0,1				
		ізофлуципрам, 68 г/л	0,02		0,1	1,0	0,005	0,02 заг.-сан.	0,1				
53	Демофон, ТН (Demophon , FS)			<i>Контроль за протіоконазолом-дестію (1) та азоксистербіном</i>		<i>Контроль за протіоконазолом (2) та азоксистербіном</i>			<i>Контроль за протіо- коназолом- дестію (1) та азоксистер- біном</i>				3 (високо- стійкий у воді)

		протіоконазол, 300 г/л +	0,001 (1, 2)	пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	не потр.	не потр.	не потр.	
		азоксистробін, 15 г/л	0,03		0,5	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		протіоконазол, 200 г/л +	0,001 (1, 2)	ячмінь	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	не потр.	не потр.	не потр.	
		азоксистробін, 125 г/л	0,03		0,5	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		протіоконазол, 300 г/л +	0,001 (1, 2)	кукурудза (зерно)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	не потр.	не потр.	не потр.	
		азоксистробін, 15 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		протіоконазол, 200 г/л +	0,001 (1, 2)	кукурудза (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	
		азоксистробін, 125 г/л	0,03		не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
54	Десавіо, КЕ	трінексапак- етил, 500 г/л	0,004	<i>Контроль за трінексапак- етилом (як сумою трінексапак-етилу та трінексапак-кислоти)</i>		<i>Контроль за трінексапак- етилом</i>		<i>Контроль за трінексапак- етилом (як сумою трінексапак-етилу та трінексапак-кислоти)</i>		не потр.*	не потр.*	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
				пшениця	0,2	1,5	0,01	0,005 заг.-сан.	0,6				

				ріпак (насіння)	0,2					не потр.*	не потр.*	3	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
55	Дивіденд 30 FS, TH	дифеноконазол, 30 г/л	0,002	пшениця	0,05	0,2	0,001	0,001 сан.- токс.	0,3	не потр.	не потр.	не потр.	3 (високо- стійкий у воді та ґрунті)
				ячінь	0,05					не потр.	не потр.	не потр.	
				жито	0,05					не потр.	не потр.	не потр.	
56	Динаміт, KE	диметенамід-П, 720 г/л	0,02	ріпак (насіння)	0,05	0,7	0,01	0,01 орг.	0,1	не потр.*	не потр.*	3	2 (небезпеч- ний при потрап- лянні на слизові оболонки очей, високо- стійкий у воді)
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,02					не потр.*	не потр.*	3	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,02					не потр.*	не потр.*	3	
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
57	Дифазокс, КС / Азоріт Голд, КС	дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	Контроль за дифеноконазолом та азоксистробіном						35*	не потр.*	3*	3 (високо- стійкий у воді)
				соняшник (насіння)	0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				

		азоксистробін, 125 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		дифенокназол, 125 г/л +	0,002	соняшник (олія)	0,4	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	-	-	-	
		азоксистробін, 125 г/л	0,03		не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
58	Дімефоль Соло, КС	диметенамід-П, 720 г/л	0,02	соняшник (насіння)	0,02	0,7	0,01	0,1 орг.	0,1	не потр.*	не потр.*	3	3 (високо- стійкий у воді)
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,02					не потр.*	не потр.*	3	
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
59	Евадро, РК	дикват іон, 270 г/л	0,002	ріпак (насіння)	0,4	0,05 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,003	0,02 орг.	0,2	7	не потр.	3	2 (небезпеч- ний при потрап- лянні на слизові оболонки очей)
				ріпак (олія)	0,5					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,5					7	не потр.	3	
				соняшник (олія)	0,1					-	-	-	

				соя (зерно)	0,5					7	не потр.	3	
				соя (олія)	0,1					-	-	-	
				ріпак ¹ (насіння)	0,4					7	не потр.	3	
				ріпак (олія)	0,5					-	-	-	
				соняшник ¹ (насіння)	0,5					7	не потр.	3	
				соняшник (олія)	0,1					-	-	-	
				соя ¹ (зерно)	0,5					7	не потр.	3	
				соя (олія)	0,1					-	-	-	
60	Еквінокс, КС (Equinox, SC)	флуміоксазин, 480 г/л	0,002	горох (зерно)	0,02	1,0	0,001	0,004 сан.-токс.	0,4	не потр.	не потр.	3	2
61	Елисор WG, ВГ	тифенсульфурон -метил, 500 г/кг +	0,01	Контроль за тифенсульфурон-метилом та флорасуламом						не потр.*	не потр.*	3*	2 (високо- стійкий у воді)
				кукурудза (зерно)	0,05	0,1	0,01	0,01 сан.-токс.	0,05				

		флорасулам, 170 г/кг	0,05		0,1	1,0	0,003	0,1 сан.-токс.	0,05 фітотокс.				
		тифенсульфурон -метил, 500 г/кг +	0,01	кукурудза (олія)	не потр.	0,1	0,01	0,01 сан.-токс.	0,05	-	-	-	
		флорасулам, 170 г/кг	0,05		не потр.	1,0	0,003	0,1 сан.-токс.	0,05 фітотокс.				
62	Елатус Ера 225 ЕС, КЕ			<i>Контроль за протіоконазолом-дестію (1) та солатенолом</i>		<i>Контроль за протіоконазолом (2) та солатенолом</i>			<i>Контроль за протіо- коназолом- дестію (1) та солатено- лом</i>				3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, алерген, високостійкий у воді та ґрунті)
		протіоконазол, 150 г/л +	0,001 (1, 2)	пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	30	не потр.	3	
		солатенол, 75 г/л	0,01		0,04	1,0	0,002	0,001 заг.-сан.	0,03				
		протіоконазол, 150 г/л +	0,001 (1, 2)	ячмінь	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	30	не потр.	3	
		солатенол, 75 г/л	0,01		0,04	1,0	0,002	0,001 заг.-сан.	0,03				
63	Емакс Про, КЕ	емамектин бензоат, 19 г/л	0,001	ріпак (насіння)	0,01	0,1	0,0004	0,002 сан.-токс.	0,3	20*	не потр.*	3*	3 (небезпечний при потрап-

				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	лянні на слизові оболонки очей, високо- стійкий у воді)
64	Ефікон™, РК	дімпропіридаз, 120 г/л	0,1	томати	0,02	0,3	0,01	0,02 заг.-сан.	0,04	14	7	3	3 (високо- стійкий у воді)
				томатний сік	0,01								
				груші	0,02					20	7	3	
				грушевий сік	0,01					-	-	-	
				яблука	0,02					20	7	3	
				яблучний сік	0,01					-	-	-	
65	Імаза 40 SL, РК (Imaza 40 SL)	імаазамокс, 40 г/л	3,0	соняшник (насіння)	1,0	1,0	0,04	0,06 заг.-сан.	0,4	не потр.*	не потр.*	3*	3 (високо- стійкий у воді)
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				ріпак (насіння)	1,0					не потр.*	не потр.*	3*	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	

				soя (зерно)	0,5					не потр.*	не потр.*	3*	
				soя (олія)	не потр.					-	-	-	
				люцерна	не потр.*					не потр.*	не потр.*	3*	
66	Імацид 40 Актив, ЕВ			<i>Контроль за імазамоксом та хізалофоп-п-тефурилом</i>						не потр.*	не потр.*	3*	3 (небез- печний при потрап- лянні на слизові оболонки очей, високо- стійкий у воді)
		імазамокс, 38 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0	1,0	0,04	0,06 заг.-сан.	0,4				
		хізалофоп-п- тефурил, 30 г/л	0,005		0,1	0,2	0,001	0,001 заг.-сан.	0,1				
		імазамокс, 38 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.	1,0	0,04	0,06 заг.-сан.	0,4	-	-	-	
		хізалофоп-п- тефурил, 30 г/л	0,005		0,2	0,2	0,001	0,001 заг.-сан.	0,1				
67	Імпрего, РК	імаазамокс, 50 г/л	3,0	соняшник (насіння)	1,0	1,0	0,04	0,06 заг.-сан.	0,4	не потр.	не потр.	3	3 (високо- стійкий у воді)
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				ріпак (насіння)	1,0					не потр.	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	

				soя (зерно)	0,5					не потр.	не потр.	3	
				soя (олія)	не потр.					-	-	-	
				горох (зерно)	0,5					не потр.	не потр.	3	
68	ІНШУР® КОМБІ, ТН	метилтетрапрол, 20 г/л +	0,5	<i>Контроль за клотіанідиним</i>						не потр.	не потр.	не потр.	2 (небезпечний при потрап- лянні на шкіру, високо- стійкий у воді та ґрунті)
		третіконазол, 20,5 г/л +	0,025	пшениця	0,01	1,0	0,08	0,001 орг.	0,1				
		третіконазол, 20,5 г/л +	0,025		0,025	0,2	0,002	0,001 заг.-сан.	0,05 водн.-мігр.				
		клотіанідин, 160,5 г/л	0,08		0,02	1,50	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.				
		метилтетрапрол, 20 г/л +	0,5	ячмінь	0,01	1,0	0,08	0,001 орг.	0,1	не потр.	не потр.	не потр.	
		третіконазол, 20,5 г/л +	0,025		0,025	0,2	0,002	0,001 заг.-сан.	0,05 водн.-мігр.				
		клотіанідин, 160,5 г/л	0,08		0,02	1,50	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.				

69	Інфініто 687,5 SC, КС			<i>Контроль за флуопіколідом та пропамокарбом (як сума пропамокарбу та його солей, виражена як пропамокарб)</i>		<i>Контроль за флуопіколідом та пропамокарб гідрохлоридом</i>			<i>Контроль за флуопіко- лідом та пропамо- карбом (як сума пропамо- карбу та його солей, виражена як пропамо- карб)</i>	14	7	3	2 (високо- стійкий у воді та ґрунті)
		флуопіколід, 62,5 г/л +	0,02										
		пропамокарб гідрохлорид, 625 г/л	0,02	картопля	0,04	1,5	0,01	0,01 сан.-токс.	0,1				
					0,05	0,7	0,007	0,08 сан.-токс.	0,1				
70	Кайзо Про, КС	тіаметоксам, 141 г/л +	0,02	<i>Контроль за тіаметоксамом та лямбда-цигалотрином</i>						35	не потр.	4	2 (високо- стійкий у воді)
		лямба- цигалотрин, 106 г/л	0,003	ріпак (насіння)	0,4	0,5 аерозоль	0,03	0,04 сан.-токс.	0,1				
					0,1	0,1 небезпечн ий при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		тіаметоксам, 141 г/л +	0,02	ріпак (олія)	не потр.	0,5 аерозоль	0,03	0,04 сан.-токс.	0,1	-	-	-	

		лямбда-цигалотрин, 106 г/л	0,003		0,2	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		тіаметоксам, 141 г/л +	0,02	соняшник (насіння)	0,01	0,5 аерозоль	0,03	0,04 сан.-токс.	0,1	30	не потр.	4	
		лямбда-цигалотрин, 106 г/л	0,003		0,2	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		тіаметоксам, 141 г/л +	0,02	соняшник (олія)	не потр.	0,5 аерозоль	0,03	0,04 сан.-токс.	0,1	-	-	-	
		лямбда-цигалотрин, 106 г/л	0,003		0,4	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
71	Каптиво, КЕ			<i>Контроль за протіоконазолом-дестію (1) та піраклостробіном</i>		<i>Контроль за протіоконазолом (2) та піраклостробіном</i>			<i>Контроль за протіоконазолом-дестію (1) та піраклостробіном</i>				2 (високостійкий у воді)
		протіоконазол, 250 г/л +	0,001 (1,2)	пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	30*	не потр.*	3*	
		піраклостробін, 200 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				

		протіоконазол, 250 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	50*	не потр.*	3*	
		піраклостробін, 200 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
		протіоконазол, 250 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	
		піраклостробін, 200 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
		протіоконазол, 250 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	50*	не потр.*	3*	
		піраклостробін, 200 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
		протіоконазол, 250 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	
		піраклостробін, 200 г/л	0,03		0,3	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
72	Каратель Плюс ЕС, КЕ	біфентрин, 100 г/л	0,02	кукурудза (зерно)	0,05	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1	36	не потр.	4	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у грунті)
				кукурудза (олія)	0,1					-	-	-	

73	Карбо- фоль, КС	карбендазим, 500 г/л	0,01	пшениця	0,1	0,1	0,001	0,1 орг.	0,1	30*	не потр.*	3*	3 (високо- стійкий у воді)
				ячмінь	0,5								
74	Квінзалор, КС	квінмерак, 83 г/л + метазахлор, 333 г/л	0,08 0,03	<i>Контроль за квінмераком та метазахлор</i>						не потр.*	не потр.*	3*	3 (високо- стійкий у воді)
		квінмерак, 83 г/л + метазахлор, 333 г/л	0,08 0,03	ріпак (насіння)	0,2 0,05	1,0 1,0	0,02 0,01	0,16 заг.-сан. 0,002 заг.-сан.	0,2 0,03				
		квінмерак, 83 г/л + метазахлор, 333 г/л	0,08 0,03	ріпак (олія)	не потр. не потр.	1,0 1,0	0,02 0,01	0,16 заг.-сан. 0,002 заг.-сан.	0,2 0,03	-	-	-	
75	Кент, ТН / Дуостар, ТН	прохлораз, 60 г/л + третіконазол, 20 г/л	0,001 0,025	<i>Контроль за прохлоразом та третіконазолом</i>						не потр.	не потр.	не потр.	3 (високо- стійкий у воді та ґрунті)
		прохлораз, 60 г/л + третіконазол, 20 г/л	0,001 0,025	пшениця	0,1 0,025	0,1 0,2	0,001 0,002	0,06 сан.-токс. 0,001 заг.-сан.	0,3 0,05 водн.-мігр.				
76	Кідім, KE (Keedim, EC)			<i>Контроль за сумою клетодиму, метаболітів клетодим-сульфону і клетодим-сульфоксиду в перерахунку на клетодим)</i>									2 (небезпеч- ний при попаданні на слизові)

		клетодим, 240 г/л	0,01	соя (зерно)	0,1	0,07	0,005	0,01 заг.-сан.	0,1	не потр.	не потр.	3	оболонки очей)
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,05					не потр.	не потр.	3	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,15					не потр.	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				буряки цукрові	0,1					не потр.	не потр.	3	
77	Кіер 450 SC, КС	азоксистробін, 200 г/л +	0,03	<i>Контроль за азоксистробіном, дифенокназолом та тебуконазолом</i>						30	не потр.	3	2 (високо- стійкий у воді)
		дифенокназол, 125 г/л +	0,002	жито	0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		тебуконазол, 125 г/л	0,03		0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	тритикале	0,2	1,0	0,01	0,025 заг.-сан.	1,0	30	не потр.	3	
								0,01 заг.-сан.	0,3				

		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002		0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		тебуконазол, 125 г/л	0,03		0,2	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3	50	не потр.	3	
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002		0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		тебуконазол, 125 г/л	0,03		0,07	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3	-	-	-	
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002		0,4	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		тебуконазол, 125 г/л	0,03		0,07	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соє (зерно)	0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3	38	не потр.	3	
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002		0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		тебуконазол, 125 г/л	0,03		0,15	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соє (олія)	не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3	-	-	-	

		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002		0,1	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		тебуконазол, 125 г/л	0,03		0,15	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	буряки цукрові	0,1	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3	30	не потр.	3	
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002		0,1	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		тебуконазол, 125 г/л	0,03		0,1	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				
78	Клобіфен Дуо, КС	клогіанідин, 100 г/л +	0,08	<i>Контроль за клотіанідином та біфентрином</i>						30*	не потр.*	4*	3 (високо- стійкий у воді та ґрунті)
		біфентрин, 100 г/л	0,02	пшениця	0,02	1,50	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.				
		клогіанідин, 100 г/л +	0,08	соняшник (насіння)	0,05	1,50	0,02	0,005 заг.-сан.	0,1	35*	не потр.*	4*	
		біфентрин, 100 г/л	0,02		0,2	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1				
		клогіанідин, 100 г/л +	0,08	соняшник (олія)	не потр.	1,50	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.	-	-	-	
		біфентрин, 100 г/л	0,02		не потр.	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1				
79	Клодакс, РК	клопіралід, 300 г/л	0,15	буряки цукрові	0,1	2,0	0,01	0,04 сан.-токс.	0,1	не потр.	не потр.	3	3 (високо- стійкий у воді)

				кукурудза (зерно)	0,1					не потр.	не потр.	3	
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,2					не потр.	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
80	Клорид SL, PK	клопіралід, 300 г/л	0,15	пшениця	0,2	2,0	0,01	0,04 сан.-токс.	0,1	не потр.*	не потр.*	3*	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високо- стійкий у воді)
				ріпак (насіння)	0,2					не потр.*	не потр.*	3*	
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,1					не потр.*	не потр.*	3*	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
81	Клорид Форте SL, PK			<i>Контроль за клопіралідом та піклорамом</i>									3 (високо- стійкий у воді)
		клопіралід, 267 г/л +	0,15	ріпак (насіння)	0,2	2,0	0,01	0,04 сан.-токс.	0,1	не потр.*	не потр.*	3*	
		піклорам, 67 г/л	0,02		0,05	5,0	0,02	0,04 сан.-токс.	0,05 трансл.				
		клопіралід, 267 г/л +	0,15	ріпак (олія)	не потр.	2,0	0,01	0,04 сан.-токс.	0,1	-	-	-	

		пiклорам, 67 г/л	0,02		не потр.	5,0	0,02	0,04 сан.-токс.	0,05 трансл.				
82	Когерент, КС	хлорантрани- ліпрол, 200 г/л	0,02	горох (зерно)	0,01	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	30*	не потр.*	3*	3 (високо- стійкий у воді та ґрунті)
				картопля ²	0,01					30*	7*	3*	
83	Культон Плюс, ВГ (Culton Plus, WG)	флорасулам, 200 г/кг + трибенурон- метил, 600 г/кг	0,05	Контроль за флорасуламом та трибенурон-метилом						не потр.	не потр.	3	3 (високо- стійкий у воді)
		трибенурон- метил, 600 г/кг	0,005	пшениця	0,01	1,0	0,03	0,1 сан.-токс.	0,05 фітотокс.				
		флорасулам, 200 г/кг + трибенурон- метил, 600 г/кг	0,05	ячмінь	0,01	1,0	0,03	0,1 сан.-токс.	0,05 фітотокс.	не потр.	не потр.	3	
		трибенурон- метил, 600 г/кг	0,005		0,01	0,1	0,003	0,06 заг.-сан.	0,01				
84	Кураж Дуо, ФК	хлорантрани- ліпрол, 100 г/л +	0,02	Контроль за хлорантраниліпролом та лямбда-цигалотрином						20	не потр.	4	3 (високо- стійкий у воді та ґрунті)
				кукурудза ¹ (зерно)	0,01	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1				

		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		хлорантрانی- ліпрол, 100 г/л +	0,02	кукурудза (олія)	не потр.	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	-	-	-	
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,2	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		хлорантрانی- ліпрол, 100 г/л +	0,02	соняшник ¹ (насіння)	0,05	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	30	не потр.	4	
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,2	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		хлорантрانی- ліпрол, 100 г/л +	0,02	соняшник (олія)	не потр.	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	-	-	-	
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,4	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		хлорантрانی- ліпрол, 100 г/л +	0,02	соя (зерно)	0,05	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	40	не потр.	4	

		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,02	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		хлорантрані- ліпрол, 100 г/л +	0,02	соя (олія)	не потр.	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	-	-	-	
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,02	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		хлорантрані- ліпрол, 100 г/л +	0,02	ріпак (насіння)	0,2	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	20	не потр.	4	
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,1	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		хлорантрані- ліпрол, 100 г/л +	0,02	ріпак (олія)	не потр.	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	-	-	-	
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,2	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		хлорантрані- ліпрол, 100 г/л +	0,02	яблука	0,1	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	30	10	4	

		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		хлорантраніліпрол, 100 г/л +	0,02	яблучний сік	не потр.	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	-	-	-	
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
85	Кураж Тріо, ФК	Контроль за хлорантраніліпролом, ацетаміпридом та лямбда-цигалотрином								20	не потр.	4	3 (високостійкий у воді та ґрунті)
		хлорантраніліпрол, 100 г/л +	0,02	кукурудза ¹ (зерно)	0,01	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1				
		ацетаміприд, 100 г/л +	0,005		0,01	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1				
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		хлорантраніліпрол, 100 г/л +	0,02	кукурудза (олія)	не потр.	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1				

		ацетаміприд, 100 г/л +	0,005		не потр.	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1				
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,2	0,1 небезпечн ий при попада́ннї на шкіру	0,001	0,01 сан.- токс.	0,05				
		хлорантрани- ліпрол, 100 г/л +	0,02	соняшник ¹ (на́сіння)	0,05	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	30	не потр.	4	
		ацетаміприд, 100 г/л +	0,005		0,1	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1				
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,2	0,1 небезпечний при попада́ннї на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		хлорантрани- ліпрол, 100 г/л +	0,02	соняшник (олія)	не потр.	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	-	-	-	
		ацетаміприд, 100 г/л +	0,005		не потр.	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1				
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,4	0,1 небезпечний при попада́ннї на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				

		хлорантрانی-ліпрол, 100 г/л +	0,02	соя (зерно)	0,05	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	40	не потр.	4	
		ацетаміпрід, 100 г/л +	0,005		0,1	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1				
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,02	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		хлорантрانی-ліпрол, 100 г/л +	0,02	соя (олія)	не потр.	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	-	-	-	
		ацетаміпрід, 100 г/л +	0,005		не потр.	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1				
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,02	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		хлорантрانی-ліпрол, 100 г/л +	0,02	ріпак (насіння)	0,2	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	20	не потр.	4	
		ацетаміпрід, 100 г/л +	0,005		0,05	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1				

		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,1	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		хлорантрні- ліпрол, 100 г/л +	0,02	ріпак (олія)	не потр.	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	-	-	-	
		ацетаміпрід, 100 г/л +	0,005		не потр.	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1				
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,2	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		хлорантрні- ліпрол, 100 г/л +	0,02	яблука	0,1	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	30	10	4	
		ацетаміпрід, 100 г/л +	0,005		0,05	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1				
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		хлорантрні- ліпрол, 100 г/л +	0,02	яблучний сік	не потр.	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	-	-	-	

		ацетаміприд, 100 г/л +	0,005		0,02	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1				
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01	0,1 небезпечний при по потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		хлорантрні- ліпрол, 100 г/л +	0,02	виноград	0,1	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	30	10	4	
		ацетаміприд, 100 г/л +	0,005		0,2	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1				
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,02	0,1 небезпечний при по потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		хлорантрні- ліпрол, 100 г/л +	0,02	виноградний сік	не потр.	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	-	-	-	
		ацетаміприд, 100 г/л +	0,005		0,01	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1				
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,02	0,1 небезпечний при по потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				

86	Лазер SC, КС	темботріон, 420 г/л	0,0001	Контроль за темботріоном, як сумою темботріону та 4,6 дигідрокситемботріону		Контроль за темботріоном				не потр.*	не потр.*	3*	2 (високо- стійкий у воді)
				кукурудза (зерно)	0,02	0,1	0,00005	0,0002 сан.-токс.	0,4				
				кукурудза (олія)	не потр.								
87	Ламіфан Екстра, МЕ	прохлораз, 400 г/л +	0,001	Контроль за прохлоразом та пропіконазолом						30*	не потр.*	3*	2 (високо- стійкий у воді та грунті)
			пшениця	0,1	0,1	0,001	0,06 сан.-токс.	0,3					
		пропіконазол, 125 г/л	0,04		0,1	0,5	0,001	0,15 орг.	0,2				
		прохлораз, 400 г/л +	0,001	ячмінь	0,1	0,1	0,001	0,06 сан.-токс.	0,3	30*	не потр.*	3*	
		пропіконазол, 125 г/л	0,04		0,1	0,5	0,001	0,15 орг.	0,2				
88	Лантіс, СЕ	тербутилазин, 290 г/л +	0,003	Контроль за хтербутилазином, S-метолахлором та пропізохлором						не потр.	не потр.	3	3 (небезпе- чний при потрап- лянні на слизові оболонки очей, високо- стійкий у воді)
			соняшник (насіння)	0,4	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04					
		S-метолахлор, 234 г/л +	0,01		0,1	0,5	0,02	0,02 сан.-токс.	0,02				
		пропізохлор, 305 г/л	0,01		0,2	1,0	0,01	0,002 орг.	0,6				

		тербутилазин, 290 г/л +	0,003	соняшник (олія)	не потр.	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04	-	-	-	
		S-метолахлор, 234 г/л +	0,01		не потр.	0,5	0,02	0,02 сан.-токс.	0,02				
		пропізохлор, 305 г/л	0,01		не потр.	1,0	0,01	0,002 орг.	0,6				
		тербутилазин, 290 г/л +	0,003	кукурудза (зерно)	0,4	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04	не потр.	не потр.	3	
		S-метолахлор, 234 г/л +	0,01		0,05	0,5	0,02	0,02 сан.-токс.	0,02				
		пропізохлор, 305 г/л	0,01		0,2	1,0	0,01	0,002 орг.	0,6				
		тербутилазин, 290 г/л +	0,003	кукурудза (олія)	не потр.	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04	-	-	-	
		S-метолахлор, 234 г/л +	0,01		не потр.	0,5	0,02	0,02 сан.-токс.	0,02				
		пропізохлор, 305 г/л	0,01		не потр.	1,0	0,01	0,002 орг.	0,6				
		тербутилазин, 290 г/л +	0,003	соя (зерно)	0,2	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04	не потр.	не потр.	3	
		S-метолахлор, 234 г/л +	0,01		0,05	0,5	0,02	0,02 сан.-токс.	0,02				

		пропізохлор, 305 г/л	0,01		0,2	1,0	0,01	0,002 орг.	0,6				
		тербутилазин, 290 г/л +	0,003	соя (олія)	не потр.	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04	-	-	-	
		S-метолахлор, 234 г/л +	0,01		не потр.	0,5	0,02	0,02 сан.-токс.	0,02				
		пропізохлор, 305 г/л	0,01		не потр.	1,0	0,01	0,002 орг.	0,6				
89	Лаудіс 30 WG, ВГ			<i>Контроль за темботріоном, як сумою темботріону та 4,6 дигідрокситемботріону</i>		<i>Контроль за темботріоном</i>							2 (небезпечний при потрап- лянні на слизові оболонки очей, високо- стійкий у воді)
		темботріон, 200 г/кг +	0,0001	кукурудза цукрова (зерно)	0,02	0,1	0,00005	0,0002 сан.-токс.	0,4	не потр.	не потр.	3	
		антидот ізоксадіфен-етил, 100 г/кг	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		темботріон, 200 г/кг +	0,0001	кукурудза цукрова (олія)	не потр.	0,1	0,00005	0,0002 сан.-токс.	0,4	-	-	-	
		антидот ізоксадіфен-етил, 100 г/кг	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
				<i>Контроль за ципродинілом та флудиоксонілом</i>									
90	Лексіон, ВГ			<i>Контроль за ципродинілом та флудиоксонілом</i>									2
		ципродиніл, 375 г/кг +	0,03	яблука	0,2*	1,0	0,05	0,02 заг.-сан.	0,2	36	7	3	

		флудиоксоніл, 250 г/кг	0,015		0,2*	1,0	0,002	0,1 орг.	0,2				
		ципродиніл, 375 г/кг +	0,03	яблучний сік	0,05	1,0	0,05	0,02 заг.-сан.	0,2	-	-	-	
		флудиоксоніл, 250 г/кг	0,015		0,1	1,0	0,002	0,1 орг.	0,2				
91	Лікур, КЕ	дифеноконазол, 375 г/л	0,002	яблука	0,1	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	36	7	3	3 (високо- стійкий у воді)
				яблучний сік	0,05					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,05					42	не потр.	3	
				соняшник (олія)	0,4					-	-	-	
92	Лямбда 100 СК (Lambda 100 CS)	лямбда- цигалотрин, 100 г/л	0,003	пшениця	0,05	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05	42*	не потр.*	4*	3
				кукурудза (зерно)	0,01					35*	не потр.*	4*	
				кукурудза (олія)	0,02					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,1					35*	не потр.*	4*	

				ріпак (олія)	0,2					-	-	-	
93	Манвіт, ЗП	манкоцеб, 750 г/кг	0,005	буряки цукрові	0,05	0,5	0,01	0,01 заг.-сан., орг	0,1	50	не потр.	3	2
		ЕТС (метаболіт манкоцебу)	0,0003		0,02	не потр.	не потр.	не нормується	не нормується				
94	Манес, ЗП	манкоцеб, 800 г/кг	0,005	яблука	0,04	0,5	0,01	0,01 заг.-сан., орг	0,1	30	7	3	2 (небезпе- чний при потрап- лянні на слизові оболонки очей)
		ЕТС (метаболіт манкоцебу)	0,0003		0,02	не потр.	не потр.	не нормується	не нормується				
		манкоцеб, 800 г/кг	0,005	яблучний сік	0,01	0,5	0,01	0,01 заг.-сан., орг	0,1	-	-	-	
		ЕТС (метаболіт манкоцебу)	0,0003		0,02	не потр.	не потр.	не нормується	не нормується				
95	Манзат, ВГ	манкоцеб, 750 г/кг	0,005	буряки цукрові	0,05	0,5	0,01	0,01 заг.-сан., орг	0,1	50	не потр.	3	2
		ЕТС (метаболіт манкоцебу)	0,0003		0,02	не потр.	не потр.	не нормується	не нормується				

96	Марсель Дуо Флекс, КС			Контроль за ізоксафлютолом (як сумою ізоксафлютолу і його метаболіта RPA 202248 в перерахунку на ізоксафлютол) та тербутилазином		Контроль за ізоксафлютолом та тербутилазином			Контроль за ізоксафлю- толом (як сумою ізоксафлю- толу і його метаболіта RPA 202248 в перера- хунку на ізоксафлю- тол) та тербути- лазином				2 (високост й-кий у воді та ґрунті)
		ізоксафлютол, 50 г/л +	0,001	кукурудза (зерно)	0,02	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0	не потр.*	не потр.*	3*	
		тербутилазин, 375 г/л +	0,003		0,4	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04				
		ципросульфамід, 50 г/л (антидот)	0,02		0,5	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		ізоксафлютол, 50 г/л +	0,001	кукурудза (олія)	не потр.	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0	-	-	-	
		тербутилазин, 375 г/л +	0,003		не потр.	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04				
		ципросульфамід, 50 г/л (антидот)	0,02		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
97	Медакс Топ, КС			Контроль за менікват-хлоридом та прогексационом кальцію									2 (високо-

		мепікват-хлорид, 300 г/л +	0,2	соняшник (насіння)	1,0	0,35	0,01	0,15 заг.-сан.	0,8	50	не потр.	3	стійкий у воді)
		прогексадіон кальцію, 50 г/л	0,02		0,01	1,0	0,01	0,03 заг.-сан.	0,2				
		мепікват-хлорид, 300 г/л +	0,2	соняшник (олія)	не потр.	0,35	0,01	0,15 заг.-сан.	0,8	-	-	-	
		прогексадіон кальцію, 50 г/л	0,02		не потр.	1,0	0,01	0,03 заг.-сан.	0,2				
		мепікват-хлорид, 300 г/л +	0,2	ріпак (насіння)	1,0	0,35	0,01	0,15 заг.-сан.	0,8	50 не потр. (осіння обробка)	не потр.	3	
		прогексадіон кальцію, 50 г/л	0,02		0,01	1,0	0,01	0,03 заг.-сан.	0,2				
		мепікват-хлорид, 300 г/л +	0,2	ріпак (олія)	не потр.	0,35	0,01	0,15 заг.-сан.	0,8	-	-	-	
		прогексадіон кальцію, 50 г/л	0,02		не потр.	1,0	0,01	0,03 заг.-сан.	0,2				
98	Мезо-Йодос-Мефен 30 6 90 WG, ВГ (Meso-Iodos-			Контроль за мезосульфурон-метилом та йодсульфурон-метилом натрію		Контроль за мезосульфурон-метилом	Контроль за мезосульфурон-метилом та йодсульфурон-метилом натрію						3 (небезпечний при потрап-лянні на слизові

	Mefen 30 6 90 WG)	мезосульфурон-метил, 30 г/кг +	0,1	пшениця	0,01	0,6	0,02	0,001 заг.-сан.	0,2	не потр.*	не потр.*	3*	оболонки очей, високо- стійкий у воді та ґрунті)
		йодсульфурон-метил натрію, 6 г/кг +	0,03		0,01*	1,0	0,002	0,01 сан.-токс.	0,01 трансл.				
		мефенпір-діетил, 90 г/кг (антидот)	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		мезосульфурон-метил, 30 г/кг +	0,1	жито	0,01*	0,6	0,02	0,001 заг.-сан.	0,2	не потр.*	не потр.*	3*	
		йодсульфурон-метил натрію, 6 г/кг +	0,03		0,01*	1,0	0,002	0,01 сан.-токс.	0,01 трансл.				
		мефенпір-діетил, 90 г/кг (антидот)	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		мезосульфурон-метил, 30 г/кг +	0,1	тритикале	0,01*	0,6	0,02	0,001 заг.-сан.	0,2	не потр.*	не потр.*	3*	
		йодсульфурон-метил натрію, 6 г/кг +	0,03		0,01*	1,0	0,002	0,01 сан.-токс.	0,01 трансл.				
		мефенпір-діетил, 90 г/кг (антидот)	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
99	Мезо-Ніко 75 30 OD, МД			Контроль за мезотріоном та нікосульфуроном									3 (високо-

		мезотріон, 75 г/л +	0,001	кукурудза (зерно)	0,1	0,2	0,006	0,02 сан.-токс.	0,4	не потр.*	не потр.*	3*	стійкий у воді)
		нікосульфурон, 30 г/л	2,0		0,01	1,0	0,01	0,001 заг.-сан.	0,2				
		мезотріон, 75 г/л +	0,001	кукурудза (олія)	не потр.	0,2	0,006	0,02 сан.-токс.	0,4	-	-	-	
		нікосульфурон, 30 г/л	2,0		не потр.	1,0	0,01	0,001 заг.-сан.	0,2				
100	Мезонір OD, МД	мезосульфурон- метил, 30 г/л +	0,1	пшениця	0,01	0,6	0,02	0,001 заг.-сан.	0,2	не потр.*	не потр.*	3*	3 (високо- стійкий у воді та ґрунті)
		мефенпір- діетил, 90 г/кг (антидот)	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
101	Мепік 300 SL, PK	мепікват- хлорид, 300 г/л	0,2	соняшник (насіння)	1,0	0,35	0,01	0,15 заг.-сан.	0,8	30	не потр.	3	2
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
102	Мепік- Метко 210 30 SL, PK (Мепік- Metco 210 30 SL)	мепікват- хлорид, 210 г/л +	0,2	Контроль за мепікват-хлоридом та метконазолом						42*	не потр.*	3*	2 (небезпе- чний при потрап- лянні на слизові оболонки очей, високо- стійкий у воді та ґрунті)
		метконазол, 30 г/л	0,001	ріпак (насіння)	1,0	0,35	0,01	0,15 заг.-сан.	0,8				
		мепікват- хлорид, 210 г/л +	0,2	ріпак (олія)	не потр.	0,35	0,01	0,15 заг.-сан.	0,8				
		метконазол, 30 г/л	0,001		0,3*	0,2	0,001	0,002 сан.-токс.	0,1 водн.-мігр.				

103	Меткізо, РК	метконазол, 100 г/л	0,001	пшениця	0,1	0,2	0,001	0,002 сан.-токс.	0,1 водн.-мігр.	42*	не потр.*	3	2 (високо- стійкий у воді та ґрунті)
				ріпак (насіння)	0,2					50*	не потр.*	3	
				ріпак (олія)	0,3*					-	-	-	
104	Меткізо Профі, КЕ			<i>Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та метконазолом</i>		<i>Контроль за протіоконазолом (2) та метконазолом</i>			<i>Контроль за протіоконна- золом- дестіо (1) та меткона- золом</i>				2 (високо- стійкий у воді та ґрунті)
		протіоконазол, 160 г/л +	0,001 (1,2)	пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	42*	не потр.*	3*	
		метконазол, 60 г/л	0,001		0,1	0,2	0,001	0,002 сан.-токс.	0,1 водн.-мігр.				
		протіоконазол, 160 г/л +	0,001 (1,2)	ячмінь	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	42*	не потр.*	3*	
		метконазол, 60 г/л	0,001		0,1*	0,2	0,001	0,002 сан.-токс.	0,1 водн.-мігр.				
		протіоконазол, 160 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	50*	не потр.*	3*	
		метконазол, 60 г/л	0,001		0,2	0,2	0,001	0,002 сан.-токс.	0,1 водн.-мігр.				
		протіоконазол, 160 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	

		метконазол, 60 г/л	0,001		0,3	0,2	0,001	0,002 сан.-токс.	0,1 водн.-мігр.				
		протіоконазол, 160 г/л +	0,001 (1,2)	соя (зерно)	0,05 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	42*	не потр.*	3*	
		метконазол, 60 г/л	0,001		0,05	0,2	0,001	0,002 сан.-токс.	0,1 водн.-мігр.				
		протіоконазол, 160г/л +	0,001 (1,2)	соя (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	
		метконазол, 60 г/л	0,001		0,25*	0,2	0,001	0,002 сан.-токс.	0,1 водн.-мігр.				
105	Міябі, ЕВ	цифлуфенамід, 50 г/л	0,01	пшениця	0,05	1,0	0,006	0,005 заг.-сан.	0,1	36	не потр.	3	2 (небез- печний при потрап- лянні на шкіру, високо- стійкий у воді)
				ячмінь	0,05					36	не потр.	3	
				ріпак (насіння)	0,05					36	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				яблука	0,05					15	7	3	
				яблучний сік	не потр.					-	-	-	

106	Молтекс, РК	2М-4Х (МСРА) у формі диметиламіної солі, 750 г/л	0,008	кукурудза (зерно)	0,1	1,0	0,02	0,003 орг.	0,02	не потр.*	не потр.*	3*	3 (небезпе- чний при потрап- лянні на слизові оболонки очей)
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
				пшениця	0,2					не потр.*	не потр.*	3*	
				ячмінь	0,2					не потр.*	не потр.*	3*	
				горох (зерно)	0,05					не потр.*	не потр.*	3*	
107	Моспілан, ВП	ацетаміприд, 200 г/кг	0,005	яблука ²	0,05	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1	44	7	3	2 (високо- стійкий у воді)
				яблучний сік	0,02					-	-	-	
108	Моспілан, РК	ацетаміприд, 200 г/л	0,005	ріпак (насіння)	0,05	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1	30	не потр.	3	3 (небезпе- чний при потрап- лянні на слизові оболонки очей, високо- стійкий у воді)
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,1					35	не потр.	3	

				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
109	Муссон Дуо, МД			<i>Контроль за топрамезоном та нікосульфуроном</i>						не потр.*	не потр.*	3*	2 (високо- стійкий у воді)
		топрамезон, 20 г/л +	0,002	кукурудза (зерно)	0,2	0,5	0,002	0,004 сан.-токс.	0,3				
		нікосульфурон, 60 г/л	2,0		0,01	1,0	0,01	0,001 заг.-сан.	0,2				
		топрамезон, 20 г/л +	0,002	кукурудза (олія)	не потр.	0,5	0,002	0,004 сан.-токс.	0,3	-	-	-	
		нікосульфурон, 60 г/л	2,0		не потр.	1,0	0,01	0,001 заг.-сан.	0,2				
110	Муссон, КС	нікосульфурон, 40 г/л	2,0	кукурудза цукрова (зерно)	0,01	1,0	0,01	0,001 заг.-сан.	0,2	не потр.	не потр.	3	3 (високо- стійкий у воді)
				кукурудза цукрова (олія)	не потр.					-	-	-	
111	Мушкет Універсал 460 OD, МД	2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 430 г/л +	0,0001	<i>Контроль за 2,4-Д та йодсульфурон-метилом натрію</i>		<i>Контроль за 2,4-Д 2- етилгексиловим ефіром та йодсульфурон-метилом натрію</i>		<i>Контроль за 2,4-Д та йодсульфурон-метилом натрію</i>		не потр.	не потр.	3	3 (небезпеч- ний при потрап- лянні на слизові оболонки очей, високо- стійкий у воді)
				кукурудза (зерно)	0,015	0,5	0,0005	0,002 сан.-токс.	0,1 трансл.				

		йодсульфурон-метил натрію, 5 г/л + мефенпір-діетил, 25 г/л (антидот)	0,03 не потр.		0,025 не потр.	1,0 не потр.	0,002 не потр.	0,06 сан.-токс. не потр.	0,01 трансл. не потр.				
		2,4-Д 2-етил-гексиловий ефір, 430 г/л + йодсульфурон-метил натрію, 5 г/л + мефенпір-діетил, 25 г/л (антидот)	0,0001 0,03 не потр.	кукурудза (олія)	не потр. не потр.	0,5 1,0 не потр.	0,0005 0,002 не потр.	0,002 сан.-токс. 0,06 сан.-токс. не потр.	0,1 трансл. 0,01 трансл. не потр.	-	-	-	
112	Найвор, ВГ	ципродиніл, 750 г/кг	0,030	яблука яблучний сік	0,2* 0,05	1,0	0,05	0,02 заг.-сан.	0,2	35*	7*	3*	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
113	Нікоцид Ультра, МД	2,4-Д 2-етил-гексиловий ефір, 470 г/л +	0,0001	Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2-етилгексиловим ефіром		Контроль за 2,4-Д		не потр.*	не потр.*	3*	3 (високостійкий у воді)
				кукурудза (зерно)	0,015	0,5	0,0005	0,002 сан.-токс.	0,1 трансл.				

		флорасулам, 5,5 г/л +	0,05		0,1	1,0	0,003	0,1 сан.-токс.	0,05 фітотокс.				
		нікосульфурон, 90 г/л	2,0		0,01	1,0	0,01	0,001 заг.-сан.	0,2				
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 470 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не потр.	0,5	0,0005	0,002 сан.-токс.	0,1 трансл.	-	-	-	
		флорасулам, 5,5 г/л +	0,05		не потр.	1,0	0,003	0,1 сан.-токс.	0,05 фітотокс.				
		нікосульфурон, 90 г/л	2,0		не потр.	1,0	0,01	0,001 заг.-сан.	0,2				
114	Нордокс 75, ВГ (Nordox 75 WG)	окис міді, 860 г/кг	0,05 (по міді)	буряки цукрові	5,0	0,5	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова	1,0 орг.	3,0 заг.-сан.	20	7	3	3 (небезпеч- ний при потрап- лянні на слизові оболонки очей)
				картопля	5,0					20	7	3	
				лохина	5,0					30	7	3	
				лохина (сік)	5,0					-	-	-	
115	Норестар Плюс, КС	епоксиконазол, 42 г/л +	0,004	Контроль за епоксиконазолом, піраклостробіном та боскалідом						50*	не потр.*	3*	2 (високо- стійкий у воді та ґрунті)
				соняшник (насіння)	0,05	0,01	0,0005	0,004 заг.-сан.	0,4				

		піраклостробін, 70 г/л +	0,03		0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
		боскалід, 150 г/л	0,04		1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
		епоксиконазол, 42 г/л +	0,004	соняшник (олія)	0,1*	0,01	0,0005	0,004 заг.-сан.	0,4	-	-	-	
		піраклостробін, 70 г/л +	0,03		0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
		боскалід, 150 г/л	0,04		2,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
116	Норестим Дуо, КЕ	прохлораз, 400 г/л +	0,001	<i>Контроль за пролоразом та тебуконазолом</i>						30*	не потр.*	3*	2 (небезпечний при потрап- лянні на слизові оболонки очей, висок- остійкий у воді та ґрунті)
		тебуконазол, 125 г/л	0,03	пшениця	0,1	0,1	0,001	0,06 сан.-токс.	0,3				
					0,2	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				
117	Овація, КС			<i>Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та флуопірамом</i>		<i>Контроль за протіоконазолом (2) та флуопірамом</i>		<i>Контроль за протіокона- золом- дестіо (1) та флуопірамом</i>					3 (високо- стійкий у воді та ґрунті)

		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	49*	не потр.*	3*	
		флуопірам, 125 г/л	0,01		0,2	1,0	0,003	0,02 сан.-токс., заг.-сан.	0,08				
		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	
		флуопірам, 125 г/л	0,01		0,3*	1,0	0,003	0,02 сан.-токс., заг.-сан.	0,08				
		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	42*	не потр.*	3*	
		флуопірам, 125 г/л	0,01		0,7*	1,0	0,003	0,02 сан.-токс., заг.-сан.	0,08				
		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	
		флуопірам, 125 г/л	0,01		не потр.	1,0	0,003	0,02 сан.-токс., заг.-сан.	0,08				
		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	соя (зерно)	0,05 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	42*	не потр.*	3*	
		флуопірам, 125 г/л	0,01		0,2	1,0	0,003	0,02 сан.-токс., заг.-сан.	0,08				

		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	соя (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	
		флуопірам, 125 г/л	0,01		не потр.	1,0	0,003	0,02 сан.-токс., заг.-сан.	0,08				
118	ОТОС, КС (OTHOS, SC)			<i>Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та азоксистробіном</i>		<i>Контроль за протіоконазолом (2) та азоксистробіном</i>			<i>Контроль за протіокона- золом- дестіо (1) та азоксистро- біном</i>				2 (небезпе- чний при потрап- лянні на слизові оболонки очей, високо- стійкий у воді)
		протіоконазол, 160 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	50	не потр.	3	
		азоксистробін, 160 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		протіоконазол, 160 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	
		азоксистробін, 160 г/л	0,03		не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		протіоконазол, 160 г/л +	0,001 (1,2)	пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	42	не потр.	3	
		азоксистробін, 160 г/л	0,03		0,5	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		протіоконазол, 160 г/л +	0,001 (1,2)	ячмінь	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	42	не потр.	3	

		азоксистробін, 160 г/л	0,03		0,5	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		протіокназол, 160 г/л +	0,001 (1,2)	тритикале	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	35	не потр.	3	
		азоксистробін, 160 г/л	0,03		0,5	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		протіокназол, 160 г/л +	0,001 (1,2)	овес	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	42	не потр.	3	
		азоксистробін, 160 г/л	0,03		0,5	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		протіокназол, 160 г/л +	0,001 (1,2)	жито	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	35	не потр.	3	
		азоксистробін, 160 г/л	0,03		0,5	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
119	Палдіс Макс, КС	темботріон, 420 г/л	0,0001	<i>Контроль за темботріоном, як сумою темботріону та 4,6 дигідрокситемботріону</i>		<i>Контроль за темботріоном</i>				не потр.	не потр.	3	2 (високо- стійкий у воді)
				кукурудза (зерно)	0,02	0,1	0,00005	0,0002 сан.-токс.	0,4				
				кукурудза (олія)	не потр.								

120	Пардус 480, РК	бентазон, 480 г/л	0,1	горох (зерно)	0,05	1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,05	0,01 сан.-токс.	0,4	не потр.*	не потр.*	3*	2
				соя (зерно)	0,1					не потр.*	не потр.*	3*	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
121	Патруль, ГР	метальдегід, 6 %	0,006	капуста	0,4	0,2	0,003	0,01	0,5	28	5	2	2 (високо- стійкий у грунті)
				полуниця	0,05					15	5	2	
				полунични й сік	0,04					-	-	-	
				прибудин- кові території	не потр.					не потр.	5	не потр.	
122	Персей 480, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	соя (зерно)	0,02	0,5	0,01	0,01 заг.-сан.	0,4	не потр.*	не потр.*	3*	2 (високо- стійкий у воді)
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,5					не потр.*	не потр.*	3*	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	

123	Піноден ЕС, КЕ	піноксаден, 50 г/л +	0,005	<i>Контроль за сумою піноксадену та метаболіту піноксадену М4 в перерахунку на піноксаден</i>		<i>Контроль за піноксаденом</i>				не потр.*	не потр.*	3*	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, алерген, високо-стійкий у воді)
		кловінтосет-мексил, 12,5 г/л (антидот)	не потр.	пшениця	0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		піноксаден, 50 г/л +	0,005	ячмінь	0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		кловінтосет-мексил, 12,5 г/л (антидот)	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
124	Піноксан, КЕ	піноксаден, 50 г/л +	0,005	<i>Контроль за сумою піноксадену та метаболіту піноксадену М4 в перерахунку на піноксаден</i>		<i>Контроль за піноксаденом та флорасуламом</i>				не потр.*	не потр.*	3*	2 (високо-стійкий у воді)
		кловінтосет-мексил, 12,5 г/л (антидот)	не потр.	пшениця	0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		піноксаден, 50 г/л +	0,005	ячмінь	0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
					не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				

		кловінтосет-мексил, 12,5 г/л (антидот)	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
125	Піноксер, КЕ	піноксаден, 50 г/л + кловінтосет-мексил, 12,5 г/л (антидот)	0,005	<i>Контроль за сумою піноксадену та метаболіту піноксадену М4 в перерахунку на піноксаден</i>		<i>Контроль за піноксаденом</i>				не потр.*	не потр.*	3*	2
				пшениця	0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
			не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
126	Пріаксор® Тріо, КЕ	флуксапіроксад, 40 г/л + мефентрифлу-коназол, 30 г/л + піраклостробін, 200 г/л флуксапіроксад, 40 г/л + мефентрифлу-коназол, 30 г/л +	0,02	<i>Контроль за флуксапіроксадом, мефентрифлуконазолом та піраклостробіном</i>						30	не потр.	3	2 (небезпечний при потрап-лянні на шкіру та слизові оболонки очей, високо-стійкий у воді та ґрунті)
				ріпак (насіння)	0,01	0,7	0,01	0,004 заг.-сан.	0,3				
			0,035		0,01	0,5	0,01	0,001 заг.-сан.	0,08				
			0,03		0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
			0,02	ріпак (олія)	0,1	0,7	0,01	0,004 заг.-сан.	0,3	-	-	-	
			0,035		0,1	0,5	0,01	0,001 заг.-сан.	0,08				

		піраклостробін, 200 г/л	0,03		0,3	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
		флуксапіроксад, 40 г/л +	0,02	соняшник (насіння)	0,1	0,7	0,01	0,004 заг.-сан.	0,3	30	не потр.	3	
		мефентрифлу- коназол, 30 г/л +	0,035		0,01	0,5	0,01	0,001 заг.-сан.	0,08				
		піраклостробін, 200 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
		флуксапіроксад, 40 г/л +	0,02	соняшник (олія)	0,05	0,7	0,01	0,004 заг.-сан.	0,3	-	-	-	
		мефентрифлу- коназол, 30 г/л +	0,035		0,1	0,5	0,01	0,001 заг.-сан.	0,08				
		піраклостробін, 200 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
127	Пропазал 10, КЕ	пропахізафоп, 100 г/л	0,003	соняшник (насіння)	0,2	1,0	0,0003	0,001 заг.-сан.	0,15	не потр.*	не потр.*	3*	3
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,2					не потр.*	не потр.*	3*	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				соя (зерно)	0,2					не потр.*	не потр.*	3*	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	

128	Проміно Плюс, КС			<i>Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та трифлуксистербіном</i>		<i>Контроль за протіоконазолом (2) та трифлуксистербіном</i>			<i>Контроль за протіокона- золом- дестіо (1) та трифлукси- стербіном</i>				2
		протіоконазол, 175 г/л +	0,001 (1,2)	пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	30*	не потр.*	3*	
		трифлукси- стербін, 150 г/л	0,02		0,05*	0,8	0,01	0,03 заг.-сан.	0,1				
		протіоконазол, 175 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	50*	не потр.*	3*	
		трифлукси- стербін, 150 г/л	0,02		0,05	0,8	0,01	0,03 заг.-сан.	0,1				
		протіоконазол, 175 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	
		трифлукси- стербін, 150 г/л	0,02		не потр.	0,8	0,01	0,03 заг.-сан.	0,1				
129	Проміно Про, КС			<i>Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та тебуконазолом</i>		<i>Контроль за протіоконазолом (2) та тебуконазолом</i>			<i>Контроль за протіокона- золом-дестіо (1) та тебукона- золом</i>				2 (високо- стійкий у воді)

		протиоконазол, 210,5 г/л +	0,001 (1,2)	пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	42*	не потр.*	3*	
		тебуконазол, 210,5 г/л	0,03		0,2	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				
130	Пропізо- цид 400, СЕ			<i>Контроль за прометрином та пропізохлором</i>									2
		прометрин, 200 г/л +	0,005	сосяшник (насіння)	0,1	5,0	0,02	0,002 сан.-токс.	0,5 трансл.	не потр.*	не потр.*	3*	(небезпе- чний при потрап- лянні на слизові оболонки очей, високо- стійкий у воді та грунті)
		пропізохлор, 200 г/л	0,01		0,2	1,0	0,01	0,002 орг.	0,6				
		прометрин, 200 г/л +	0,005	сосяшник (олія)	0,1	5,0	0,02	0,002 сан.-токс.	0,5 трансл.	-	-	-	
		пропізохлор, 200 г/л	0,01		не потр.	1,0	0,01	0,002 орг.	0,6				
131	Пропі- фоль, КЕ	пропізохлор, 720 г/л	0,01	сосяшник (насіння)	0,2	1,0	0,01	0,002 орг.	0,6	не потр.*	не потр.*	3*	2 (високо- стійкий у воді)
				сосяшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,2					не потр.*	не потр.*	3*	
				сосяшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				соя (зерно)	0,2					не потр.*	не потр.*	3*	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	

132	Протеб 240 ЕС, КЕ			<i>Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та тебуконазолом</i>		<i>Контроль за протіоконазолом (2) та тебуконазолом</i>			<i>Контроль за протіокона- золом-дестіо (1) та тебукона- золом</i>				2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, алерген, високо-стійкий у воді)
		тебуконазол, 160 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,5	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0	35	не потр.	3	
		протіоконазол, 80 г/л	0,001 (1,2)		0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
		тебуконазол, 160 г/л +	0,03	ріпак (олія)	0,5	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0	-	-	-	
		протіоконазол, 80 г/л	0,001 (1,2)		не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
133	Протег 550 EW, EB			<i>Контроль за трінексапак- етилом (як сумою трінексапак-етилу та трінексапак-кислоти) і мепікват-хлоридом</i>		<i>Контроль за мепікват- хлоридом та трінексапак- етилом</i>		<i>Контроль за трінексапак- етилом (як сумою трінексапак-етилу та трінексапак-кислоти) і мепікват-хлоридом</i>					2 (високотій-ний у воді)
		мепікват- хлорид, 450 г/л +	0,2	пшениця	0,4	0,35	0,01	0,15 заг.-сан.	0,8	30	не потр.	3	
		трінексапак- етил, 100 г/л	0,004		0,2	1,5	0,01	0,005 заг.-сан.	0,6				
		мепікват- хлорид, 450 г/л +	0,2	ячмінь	0,4	0,35	0,01	0,15 заг.-сан.	0,8	30	не потр.	3	

		трінексапак- етил, 100 г/л	0,004		0,2	1,5	0,01	0,005 заг.-сан.	0,6				
134	Проті 250 ЕС, КЕ	протіоконазол, 250 г/л	0,001 (1,2)	<i>Контроль за протіоконазолом-дестіо (1)</i>		<i>Контроль за протіоконазолом (2)</i>			<i>Контроль за протіокона- золом-дестіо (1)</i>				3 (небезпе- чний при потрап- лянні на слизові оболонки очей, високо- стійкий у воді)
				пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	42*	не потр.*	3*	
				ячмінь	0,1 (1)					42*	не потр.*	3*	
				ріпак (насіння)	0,1 (1)					42*	не потр.*	3*	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,1 (1)					35*	не потр.*	3*	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				буряки цукрові	0,3 (1)					21*	не потр.*	3*	

135	Протізол Тріо, КС		0,03	Контроль за протіоконазолом-дестіо (1), піраклостробіном та дифенокназолом		Контроль за протіоконазолом (2), піраклостробіном та дифенокназолом			Контроль за протіокона- золом- дестіо (1), піракло- стробіном та дифеноко- назолом	50*	не потр.*	3*	3 (високо- стійкий у воді)
				соняшник (насіння)	0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.					
		піраклостробін, 125 г/л +							0,6				
		протіокназол, 125 г/л +	0,001 (1,2)		0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
		дифенокназол, 80 г/л	0,002		0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		піраклостробін, 125 г/л +	0,03	соняшник (олія)	0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6	-	-	-	
		протіокназол, 125 г/л +	0,001 (1,2)		не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
		дифенокназол, 80 г/л	0,002		0,4	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		піраклостробін, 125 г/л +	0,03	пшениця	0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6	35*	не потр.*	3*	
		протіокназол, 125 г/л +	0,001 (1,2)		0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
		дифенокназол, 80 г/л	0,002		0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				

136	Проті Метко 100 48, KE (Proti Metco 100 48 EC)	протіокназол, 100 г/л +	0,001 (1,2)	Контроль за протіокназолом-дестіо (1) та метконазолом		Контроль за протіокназолом (2) та метконазолом			Контроль за протіокона- золом- дестіо (1) та меткона- золом	42*	не потр.*	3*	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді та ґрунті)
				пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
		метконазол, 48 г/л	0,001		0,1	0,2	0,001	0,002 сан.-токс.	0,1 водн.-мігр.				
		протіокназол, 100 г/л +	0,001 (1,2)	жито	0,1* (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	42*	не потр.*	3*	
		метконазол, 48 г/л	0,001		0,06	0,2	0,001	0,002 сан.-токс.	0,1 водн.-мігр.				
		протіокназол, 100 г/л +	0,001 (1,2)	тритикале	0,1* (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	42*	не потр.*	3*	
		метконазол, 48 г/л	0,001		0,05	0,2	0,001	0,002 сан.-токс.	0,1 водн.-мігр.				
137	Протіюште ф, KE	протіокназол, 250 г/л	0,001 (1,2)	Контроль за протіокназолом-дестіо (1)		Контроль за протіокназолом (2)			Контроль за протіокона- золом- дестіо (1)	35*	не потр.*	3*	3 (високостійкий у воді)
				пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
				соняшник (насіння)	0,1 (1)				42*	не потр.*	3*		

				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
138	Протіпізол, КЕ			<i>Контроль за протіконазолом-дестіо (1) та пропіконазолом</i>		<i>Контроль за протіконазолом (2) та пропіконазолом</i>			<i>Контроль за протікона- золом- дестіо (1) та пропікона- золом</i>				3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді та ґрунті)
		протіконазол, 250 г/л +	0,001 (1,2)	пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	35*	не потр.*	3*	
		пропіконазол, 250 г/л	0,04		0,1	0,5	0,001	0,15 орг.	0,2				
		протіконазол, 250 г/л +	0,001 (1,2)	соя (зерно)	0,05 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	42*	не потр.*	3*	
		пропіконазол, 250 г/л	0,04		0,1	0,5	0,001	0,15 орг.	0,2				
		протіконазол, 250 г/л +	0,001 (1,2)	соя (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	
		пропіконазол, 250 г/л	0,04		0,2	0,5	0,001	0,15 орг.	0,2				
139	Профініті SC, KC			<i>Контроль за пропамокрб гідрохлоридом та флуопіколідом</i>									3 (високостійкий у воді та ґрунті)
		пропамокрб гідрохлорид, 625 г/л +	0,02	картопля	0,05	0,7	0,007	0,08 сан.-токс.	0,1	20*	7*	3*	

		флуопіколід, 62,5 г/л	0,02		0,04	1,5	0,01	0,01 сан.-токс.	0,1				
		пропамокарб гідрохлорид, 625 г/л +	0,02	соя (зерно)	0,01	0,7	0,007	0,08 сан.-токс.	0,1	30*	не потр.*	3*	
		флуопіколід, 62,5 г/л	0,02		0,01*	1,5	0,01	0,01 сан.-токс.	0,1				
		пропамокарб гідрохлорид, 625 г/л +	0,02	соя (олія)	не потр.	0,7	0,007	0,08 сан.-токс.	0,1	-	-	-	
		флуопіколід, 62,5 г/л	0,02		0,05*	1,5	0,01	0,01 сан.-токс.	0,1				
		пропамокарб гідрохлорид, 625 г/л +	0,02	соняшник (насіння)	0,1	0,7	0,007	0,08 сан.-токс.	0,1	30*	не потр.*	3*	
		флуопіколід, 62,5 г/л	0,02		0,01	1,5	0,01	0,01 сан.-токс.	0,1				
		пропамокарб гідрохлорид, 625 г/л +	0,02	соняшник (олія)	не потр.	0,7	0,007	0,08 сан.-токс.	0,1	-	-	-	
		флуопіколід, 62,5 г/л	0,02		не потр.	1,5	0,01	0,01 сан.-токс.	0,1				

140	Радикал Турбо, КС			Контроль за протіоконазолом-дестію (1) та боскалідом		Контроль за протіоконазолом (2) та боскалідом			Контроль за протіокона- золом- дестію (1) та боскалідом				3 (високо- стійкий у воді та грунті)
		протіоконазол, 225 г/л +	0,001 (1,2)	пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	30*	не потр.*	3*	
		боскалід, 250 г/л	0,04		0,1	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
		протіоконазол, 225 г/л +	0,001 (1,2)	ячмінь	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	30*	не потр.*	3*	
		боскалід, 250 г/л	0,04		0,1	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
		протіоконазол, 225 г/л +	0,001 (1,2)	соя (зерно)	0,05 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	50*	не потр.*	3*	
		боскалід, 250 г/л	0,04		3,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
		протіоконазол, 225 г/л +	0,001 (1,2)	соя (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	
		боскалід, 250 г/л	0,04		не потр.	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
		протіоконазол, 225 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	30*	не потр.*	3*	
		боскалід, 250 г/л	0,04		1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				

		протіоконазол, 225 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	
		боскалід, 250 г/л	0,04		1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
		протіоконазол, 225 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	50*	не потр.*	3*	
		боскалід, 250 г/л	0,04		1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
		протіоконазол, 225 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	
		боскалід, 250 г/л	0,04		2,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
141	Ранман А, КС	ціазофамід, 400 г/л	0,017	соняшник (насіння)	0,02	1,5	0,005	0,001 заг.-сан.	0,2	не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей)
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
142	Ранчо, КС	клотіанідин, 480 г/л	0,08	кукурудза (зерно)	0,05	1,50	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.	30	не потр.	3	3 (високостійкий у воді та ґрунті)
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	

143	Раундап Про Макс 613 SL, PK	гліфосату калійна сіль, 613 г/л	0,010	поля, призначені під посів (посадку) зернових, картоплі, кукурудзи, буряка цукрового, сої, ріпаку, соняшнику	не потр.	1,0	0,01	0,02 сан.-токс.	0,5 трансл.	не потр.	7	3	3 (високо- стій кий у воді)
				пари	не потр.					не потр.	7	3	
				міжряддя садів та виноград- ників	не потр.					не потр.	7	3	
				пшениця	3,0					14 (десикаці я)	не потр.	3	
				ячмінь	3,0					14 (десикаці я)	не потр.	3	
				ріпак (насіння)	2,0					14 (десикаці я)	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,3					14 (десикаці я)	не потр.	3	
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	

				соє (зерно)	0,3					14 (десикація)	не потр.	3	
				соє (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,3					11 (десикація)	не потр.	3	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
144	Ректор, ВГ	трибенурон-метил, 310 г/кг + тифенсульфурон-метил, 300 г/кг + флорасулам, 103 г/кг	0,005	Контроль за трибенурон-метилом, тифенсульфурон-метилом та флорасуламом						не потр.*	не потр.*	3*	3 (високостійкий у воді)
				пшениця	0,01	0,1	0,003	0,06 заг.-сан.	0,01				
			0,01		0,01*	0,1	0,01	0,01 сан.-токс.	0,05				
			0,05		0,01	1,0	0,003	0,1 сан.-токс.	0,05 фітотокс.				
		трибенурон-метил, 310 г/кг + тифенсульфурон-метил, 300 г/кг + флорасулам, 103 г/кг	0,005	ячмінь	0,01	0,1	0,003	0,06 заг.-сан.	0,01	не потр.*	не потр.*	3*	
			0,01		0,01*	0,1	0,01	0,01 сан.-токс.	0,05				
			0,05		0,01	1,0	0,003	0,1 сан.-токс.	0,05 фітотокс.				
145	Репрез, ЕВ			Контроль за диметенамідом-П									3 (небезпеч-)

		диметенамід-П, 490 г/л +	0,02	ріпак (насіння)	0,05	0,7	0,01	0,1 орг.	0,1	не потр.	не потр.	3	чний при потрап- лянні на слизові оболонки очей, алерген, високо- стійкий у воді)
		амінопіралід, 6 г/л	0,05		0,01	1,5	0,05	0,002 заг.-сан.	0,4				
		диметенамід-П, 490 г/л +	0,02	ріпак (олія)	не потр.	0,7	0,01	0,1 орг.	0,1	-	-	-	
		амінопіралід, 6 г/л	0,05		не потр.	1,5	0,05	0,002 заг.-сан.	0,4				
146	Ріальт, КС			<i>Контроль по піраклостробіну та боскаліду</i>						35	не потр.	3	3 (високо- стійкий у воді та ґрунті)
		піраклостробін, 300 г/л +	0,03	соя (зерно)	0,05	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
		боскалід, 200 г/л	0,04		3,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
		піраклостробін, 300 г/л +	0,03	соя (олія)	0,1	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6	-	-	-	
		боскалід, 200 г/л	0,04		1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
147	Роудіс, КС			<i>Контроль за темботріоном, як сумою темботріону та 4,6 дигідрокситемботріону</i>		<i>Контроль за темботріоном</i>				не потр.*	не потр.*	3*	2 (високо- стійкий у воді)
		темботріон, 420 г/л +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,02	0,1	0,00005	0,0002 сан.-токс.	0,4				
		антидот ізоксадіфен- етил, 210, г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				

		темботріон, 420 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не потр.	0,1	0,00005	0,0002 сан.-токс.	0,4	-	-	-	
		антидот ізоксадіфен- етил, 210, г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
148	Саксессор Т, СЕ	Контроль за петоксамідом та тербутилазином								не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при потрап- лянні на шкіру та слизові оболонки очей, високо- стійкий у воді)
		петоксамід, 300 г/л +	0,005	кукурудза (зерно)	0,01	0,5	0,0015	0,01 заг.-сан., сан.-токс.	0,1				
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		0,4	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04				
		петоксамід, 300 г/л +	0,005	кукурудза (олія)	не потр.	0,5	0,0015	0,01 заг.-сан., сан.-токс.	0,1	-	-	-	
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		не потр.	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04				
		петоксамід, 300 г/л +	0,005	соняшник (насіння)	0,01	0,5	0,0015	0,01 заг.-сан., сан.-токс.	0,1	не потр.	не потр.	3	
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		0,4	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04				
		петоксамід, 300 г/л +	0,005	соняшник (олія)	не потр.	0,5	0,0015	0,01 заг.-сан., сан.-токс.	0,1	-	-	-	
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		не потр.	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04				
		149	Свейн, ВГ	емамектин бензоат, 100 г/кг	0,001	соняшник (насіння)	0,01	0,1	0,0004	0,002 сан.-токс.	0,3	36	

				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
150	Селвіон Про, KE (Selvion Pro EC)			<i>Контроль за протіоконазолом-дестію (1) та флуксапіроксадом</i>		<i>Контроль за протіоконазолом (2) та флуксапіроксадом</i>			<i>Контроль за протіокона- золом- дестію (1) та флуксапі- роксадом</i>				3 (небезпе- чний при потрап- лянні на слизові оболонки очей, високо- стійкий у воді та ґрунті)
		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	35*	не потр.*	3*	
		флуксапіроксад, 62,5 г/л	0,02		0,2*	0,7	0,01	0,004 заг.-сан.	0,3				
		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	ячмінь	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	35*	не потр.*	3*	
		флуксапіроксад, 62,5 г/л	0,02		0,2*	0,7	0,01	0,004 заг.-сан.	0,3				
		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	42*	не потр.*	3*	
		флуксапіроксад, 62,5 г/л	0,02		0,9*	0,7	0,01	0,004 заг.-сан.	0,3				
		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	

		флуксапіроксад, 62,5 г/л	0,02		0,2*	0,7	0,01	0,004 заг.-сан.	0,3				
		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	43*	не потр.*	3*	
		флуксапіроксад, 62,5 г/л	0,02		0,01	0,7	0,01	0,004 заг.-сан.	0,3				
		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	
		флуксапіроксад, 62,5 г/л	0,02		0,1	0,7	0,01	0,004 заг.-сан.	0,3				
151	Селеніт Макс, КЕ	клетодим, 240 г/л	0,01	<i>Контроль за сумою клетодиму, метаболітів клетодим-сульфону і клетодим-сульфоксиду в перерахунку на клетодим)</i>		0,07	0,005	0,01 заг.-сан.	0,1	не потр.	не потр.	3	3 (небезпе- чний при потрап- лянні на шкіру та слизові оболонки очей)
				соя (зерно)	0,1								
				соя (олія)	не потр.								
				ріпак (насіння)	0,15								
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
										не потр.	не потр.	3	
										-	-	-	

152	Сенсево, ТН			Контроль за протіоконазолом-дестіо (1), металаксилом-М та дифеноконазолом		Контроль за протіоконазолом (2), металаксилом-М та дифеноконазолом			Контроль за протіокона- золом- дестіо (1), металак- силом-М та дифеноко- назолом				2 (високо- стійкий у воді)
				пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.					
		протіоконазол, 80 г/л +	0,001 (1,2)						0,2 (1)	не потр.*	не потр.*	не потр.*	
		металаксил-М, 60 г/л +	0,03		0,05	0,5	0,01	0,001 заг.-сан.	0,05				
		дифеноконазол, 50 г/л	0,002		0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		протіоконазол, 80 г/л +	0,001 (1,2)	ячмінь	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	не потр.*	не потр.*	не потр.*	
		металаксил-М, 60 г/л +	0,03		0,05	0,5	0,01	0,001 заг.-сан.	0,05				
		дифеноконазол, 50 г/л	0,002		0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
153	Септостон SC, KC	флуксапіроксад, 300 г/л	0,02	пшениця	0,2*	0,7	0,01	0,004 заг.-сан.	0,3	35*	не потр.*	3*	3 (високо- стійкий у воді та ґрунті)
				ячмінь	0,2*					35*	не потр.*	3*	

				соняшник (насіння)	0,9*					42*	не потр.*	3*	
				соняшник (олія)	0,2*					-	-	-	
				соє (зерно)	0,01					42*	не потр.*	3*	
				соє (олія)	не потр.					-	-	-	
154	Систіва® Плюс, ТН			<i>Контроль за флуксапіроксадом та тритіконазолом</i>									
		метилтетрапрол, 20,6 г/л +	0,5	пшениця	0,01	1,0	0,08	0,001 орг.	0,1	не потр.	не потр.	не потр.	2 (високо- стійкий у воді та ґрунті)
		третіконазол, 40,8 г/л +	0,025		0,025	0,2	0,002	0,001 заг.-сан.	0,05 водн.-мігр.				
		флуксапіроксад, 167,3 г/л	0,02		0,2	0,7	0,01	0,004 заг.-сан.	0,3				
		метилтетрапрол, 20,6 г/л +	0,5	ячмінь	0,01	1,0	0,08	0,001 орг.	0,1	не потр.	не потр.	не потр.	
		третіконазол, 40,8 г/л +	0,025		0,025	0,2	0,002	0,001 заг.-сан.	0,05 водн.-мігр.				
		флуксапіроксад, 167,3 г/л	0,02		0,2	0,7	0,01	0,004 заг.-сан.	0,3				

155	Сіванто Прайм 200 SL, РК	флупірадіфурон, 200 г/л	0,02	ріпак (насіння)	0,02	1,0	0,01	0,002 заг.-сан.	0,4	43	не потр.	3	2 (високо-стійкий у воді)
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				малина	0,05					28	7	3	
				малиновий сік	0,01					-	-	-	
156	Сіван, КС			Контроль за дифеноконазолом та піраклостробіном									3 (високо-стійкий у воді)
		дифеноконазол, 130 г/л +	0,002	томати ²	0,1	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	30	7	3	
		піраклостробін, 130 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
		дифеноконазол, 130 г/л +	0,002	томатний сік	0,01	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	-	-	-	
		піраклостробін, 130 г/л	0,03		0,1	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
		дифеноконазол, 130 г/л +	0,002	огірки ²	0,1	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	30	7	3	
		піраклостробін, 130 г/л	0,03		0,05	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				

157	C-Meto 960 EC, KE (S-Meto 960 EC)	S-метолахлор, 960 г/л	0,01	кукурудза (зерно)	0,05	0,5	0,02	0,02 сан.-токс.	0,02	не потр.*	не потр.*	3*	3 (високо-стійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
				соя (зерно)	0,05					не потр.*	не потр.*	3*	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,2					не потр.*	не потр.*	3*	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,1					не потр.*	не потр.*	3*	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
158	Солідер, KE	трифлусульфурон-метил, 150 г/л	0,05	буяки цукрові	0,05	1,0	0,1	0,15 заг.-сан.	0,01	не потр.*	не потр.*	3*	3 (алерген, високо-стійкий у воді)
159	Спектр, ВГ	піраклостробін, 67 г/кг +	0,03	<i>Контроль за піраклостробіном та боскалідом</i>						40*	7*	3*	3 (високо-стійкий у воді та ґрунті)
				абрикоси ²	0,15	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				

		боскалід, 267 г/кг	0,04		0,3	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
		піраклостробін, 67 г/кг +	0,03	абрикосови й сік	0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6	-	-	-	
		боскалід, 267 г/кг	0,04		0,3	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
160	Старінта, КЕ			<i>Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та біксафеном</i>		<i>Контроль за протіоконазолом (2) та біксафеном</i>			<i>Контроль за протіокона- золом- дестіо (1) та біксафеном</i>				3 (високо- стійкий у воді та ґрунті)
		протіоконазол, 150 г/л +	0,001 (1,2)	пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	30*	не потр.*	3*	
		біксафен, 75 г/л	0,01		0,1*	1,0	0,005	0,02 заг.-сан.	0,1				
		протіоконазол, 150 г/л +	0,001 (1,2)	тритикале	0,1* (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	30*	не потр.*	3*	
		біксафен, 75 г/л	0,01		0,1*	1,0	0,005	0,02 заг.-сан.	0,1				
		протіоконазол, 150 г/л +	0,001 (1,2)	ячмінь	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	30*	не потр.*	3*	
		біксафен, 75 г/л	0,01		0,1*	1,0	0,005	0,02 заг.-сан.	0,1				

161	Старлайт SC, КС	азоксистробін, 300 г/л	0,03	соляшник (насіння)	0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3	30	не потр.	3	3 (високо- стійкий у воді)
				соляшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,2					30	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
162	Стедіс SC, КС	протіоконазол, 480 г/л	0,001 (1,2)	Контроль за протіоконазолом- дестіо (1)		Контроль за протіоконазолом (2)			Контроль за протіокон- золом- дестіо (1)				3 (високо- стійкий у воді)
				пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	42	не потр.	3	
				соляшник (насіння)	0,1 (1)					42	не потр.	3	
				соляшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,1 (1)					52	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
163	Стробіфан Екстра, КЕ			Контроль за піраклостробіном та пропіконазолом									3 (високо-

		піраклостробін, 130 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6	30*	не потр.*	3*	стійкий у воді та ґрунті)
		пропіконазол, 230 г/л	0,04		0,1	0,5 (с/г роботи), 1,5 (умови виробництва)	0,001	0,15 орг.	0,2				
		піраклостробін, 130 г/л +	0,03	соняшник (олія)	0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6	-	-	-	
		пропіконазол, 230 г/л	0,04		0,04	0,5 (с/г роботи), 1,5 (умови виробництва)	0,001	0,15 орг.	0,2				
164	Сфінкс Екстра, ВГ			Контроль за фолпетом та диметоморфом						21	7	3	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
		фолпет, 600 г/кг +	0,01	полуниця ²	0,1	0,5	0,001	0,04 орг.	0,3				
		диметоморф, 113 г/кг	0,10		0,05	1,0	0,002	0,1 заг.-сан.	0,04				
		фолпет, 600 г/кг +	0,01	полуничний сік	0,01	0,5	0,001	0,04 орг.	0,3	-	-	-	
		диметоморф, 113 г/кг	0,10		0,01	1,0	0,002	0,1 заг.-сан.	0,04			-	
165	Таймер, КС			Контроль за металаксил-М та азоксистробіном						20*	7*	3*	3 (високостійкий у воді)
		металаксил-М, 124 г/л +	0,03	томати ²	0,04	0,5	0,01	0,001 заг.-сан.	0,05				

		азоксистробін, 322 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3							
		металаксил-М, 124 г/л +	0,03	томатний сік	0,04	0,5	0,01	0,001 заг.-сан.	0,05	-	-	-				
		азоксистробін, 322 г/л	0,03		0,01	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3							
166	Тарвекс, КС	Контроль за тербутилазином та мезотріоном								не потр.	не потр.	3	3 (високо- стійкий у воді)			
		тербутилазин, 300 г/л +	0,003	кукурудза (зерно)	0,4	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04							
		мезотріон, 200 г/л +	0,001		0,1	0,2	0,006	0,02 сан.-токс.	0,4							
		ізоксадіфен- етил, 100 г/л (антидот)	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.							
		тербутилазин, 300 г/л +	0,003	кукурудза (олія)	не потр.	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04					не потр.	не потр.	не потр.
		мезотріон, 200 г/л +	0,001		не потр.	0,2	0,006	0,02 сан.-токс.	0,4							
		ізоксадіфен- етил, 100 г/л (антидот)	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.							
167	Тачигарен, РН	гімексазол, 440 г/л	0,01	буряки цукрові	0,02	1,0	0,004	0,002 сан.-токс.	0,08	не потр.	не потр.	не потр.	2 (високо- стійкий у воді)			

168	Тебук 250, ЕВ (Тебус 250 EW)	тебуконазол, 250 г/л	0,03	пшениця	0,2	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0	42*	не потр.*	3*	3 (високо-стійкий у воді)
				ячмінь	0,2					42*	не потр.*	3*	
				соняшник (насіння)	0,07					50*	не потр.*	3*	
				соняшник (олія)	0,07					-	-	-	
				соя (зерно)	0,15					42*	не потр.*	3*	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,5					42*	не потр.*	3*	
				ріпак (олія)	0,5					-	-	-	
169	Тебу-Стар, КЕ	тебуконазол, 250 г/л	0,03	пшениця	0,2	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0	35	не потр.	3	3 (високо-стійкий у воді)
				ячмінь	0,2					35	не потр.	3	
				ріпак (насіння)	0,5					50	не потр.	3	
				ріпак (олія)	0,5					-	-	-	
170	Тебуфан Про, КС			Контроль за карбендазимом та тебуконазолом									3 (високо-

		карбендазим, 250 г/л +	0,01	пшениця	0,1	0,1	0,001	0,1 орг.	0,1	30*	не потр.*	3*	стійкий у воді)
		тебуконазол, 120 г/л	0,03		0,2	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				
171	Теларон Альфа, КС			<i>Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та азоксистробіном</i>		<i>Контроль за протіоконазолом (2) та азоксистробіном</i>			<i>Контроль за протіокона- золом- дестіо (1) та азокси- стробіном</i>				2 (високо- стійкий у воді)
		протіоконазол, 200 г/л +	0,001 (1,2)	пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	35	не потр.	3	
		азоксистробін, 160 г/л	0,03		0,5	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		протіоконазол, 200 г/л +	0,001 (1,2)	ячмінь	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	35	не потр.	3	
		азоксистробін, 160 г/л	0,03		0,5	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		протіоконазол, 200 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	45	не потр.	3	
		азоксистробін, 160 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		протіоконазол, 200 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (олія)	не потр. (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	

		азоксистробін, 160 г/л	0,03		не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
172	Тендор, ВГ	флонікамід, 500 г/кг	0,004	<i>Контроль за сумою флонікаміду та метаболітів TFNA і TFNG в перерахунку на флонікамід</i>		1,0	0,002	0,008 сан.-токс.	0,4	35*	7*	3*	2 (високо- стійкий у воді)
				капуста	0,1								
173	Теппекі, ВГ	флонікамід, 500 г/кг	0,004	<i>Контроль за сумою флонікаміду та метаболітів TFNA і TFNG в перерахунку на флонікамід</i>		1,0	0,002	0,008 сан.-токс.	0,4	44	7	3	2 (небезпеч- ний при потрап- лянні на слизові оболонки очей, високо- стійкий у воді)
				яблука	0,3								
				яблучний сік	0,03								
				Яблучний сік не рекомендується для використання у дитячому харчуванні									
174	Тербутилаз ин-Стар, КС	тербутилазин, 500 г/л	0,003	кукурудза (зерно)	0,4	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04	не потр.*	не потр.*	3*	2 (високо- стійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не потр.								
										-	-	-	

175	Тефуріцид, КЕ			<i>Контроль за клетодимом (сума клетодиму, метаболітів клетодим-сульфону і клетодим-сульфоксиду в перерахунку на клетодим) та хізалофоп-п-тефурілом</i>		<i>Контроль за клетодимом та хізалофоп-п-тефурілом</i>				не потр.*	не потр.*	3*	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високо-стійкий у воді)
		клетодим, 120 г/л + хізалофоп-п-тефуріл, 40 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,05	0,07	0,005	0,01 заг.-сан.	0,1				
			0,005		0,1	0,2	0,001	0,001 заг.-сан.	0,1				
		клетодим, 120 г/л + хізалофоп-п-тефуріл, 40 г/л	0,01	соняшник (олія)	0,05	0,07	0,005	0,01 заг.-сан.	0,1				
176	Тивіар, КС			<i>Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та тебуконазолом</i>		<i>Контроль за протіоконазолом (2) та тебуконазолом</i>			<i>Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та тебуконазолом</i>	35*	не потр.*	3*	3 (високо-стійкий у воді)
		протіоконазол, 200 г/л + тебуконазол, 200 г/л	0,001 (1,2)	пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
			0,03		0,2	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				
				<i>Контроль за тіаметоксамом та альфа-циперметрином</i>									
177	Тіасект Плюс, КС			<i>Контроль за тіаметоксамом та альфа-циперметрином</i>									3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високо-стійкий у воді)

		тіаметоксам, 250 г/л +	0,02	пшениця	0,2	0,5 аерозоль	0,03	0,04 сан.-токс.	0,1	30*	не потр.*	4*	чний при потрап- лянні на слизові оболонки очей, високо- стійкий у воді)
		альфа- циперметрин, 100 г/л	0,005		0,01	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,003	0,002 заг.-сан.	0,03				
178	Триплекс, ТН	флутріафол, 37,5 г/л +	0,01	Контроль за флутріафолом, тіабендазолом та флудіоксонілом						не потр.*	не потр.*	не потр.*	2 (високо- стійкий у воді та ґрунті)
				пшениця	0,1	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,006 сан.-токс.	0,1 трансл.				
		тіабендазол, 25 г/л +	0,1		0,2*	1,0	0,08	0,05 сан.-токс.	1,0				
		флудіоксоніл, 20 г/л	0,015		0,02	1,0	0,002	0,1 орг.	0,2				
		флутріафол, 37,5 г/л +	0,01	горох (зерно)	0,4	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,006 сан.-токс.	0,1 трансл.	не потр.*	не потр.*	не потр.*	
		тіабендазол, 25 г/л +	0,1		0,4	1,0	0,08	0,05 сан.-токс.	1,0				
		флудіоксоніл, 20 г/л	0,015		0,2	1,0	0,002	0,1 орг.	0,2				

		флутріафол, 37,5 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,2	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,006 сан.-токс.	0,1 трансл.	не потр.*	не потр.*	не потр.*	
		тіабендазол, 25 г/л +	0,1		0,05	1,0	0,08	0,05 сан.-токс.	1,0				
		флудіоксоніл, 20 г/л	0,015		0,4	1,0	0,002	0,1 орг.	0,2				
		флутріафол, 37,5 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,006 сан.-токс.	0,1 трансл.	-	-	-	
		тіабендазол, 25 г/л +	0,1		не потр.	1,0	0,08	0,05 сан.-токс.	1,0				
		флудіоксоніл, 20 г/л	0,015		не потр.	1,0	0,002	0,1 орг.	0,2				
179	Торрес, МД	темботріон, 100 г/л +	0,0001	<i>Контроль за темботріоном, як сумою темботріону і 4,6 дигідроксitemботріону та нікосульфуроном</i>		<i>Контроль за темботріоном та нікосульфуроном</i>				не потр.*	не потр.*	3*	2 (високостійкий у воді)
		нікосульфурон, 40 г/л +	2,0	кукурудза (зерно)	0,02	0,1	0,00005	0,0002 сан.-токс.	0,4				
					0,01	1,0	0,01	0,001 заг.-сан.	0,2				

		ізоксадіфен-етил, 50 г/л (антидот)	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		темботріон, 100 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не потр.	0,1	0,00005	0,0002 сан.-токс.	0,4	-	-	-	
		нікосульфурон, 40 г/л +	2,0		не потр.	1,0	0,01	0,001 заг.-сан.	0,2				
		ізоксадіфен-етил, 50 г/л (антидот)	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
180	Тріо, ТН / Тріостар, ТН			<i>Контроль за тіаметоксамом, тебуконазолом та азоксистробіном</i>									2 (високо- стійкий у воді)
		тіаметоксам, 150 г/л +	0,02	пшениця	0,2	0,5 аерозоль	0,03	0,04 сан.-токс.	0,1	не потр.*	не потр.*	не потр.*	
		тебуконазол, 50 г/л +	0,03		0,2	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				
		азоксистробін, 50 г/л	0,03		0,5	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
181	Тумен, ТН			<i>Контроль за дифеноконазолом</i>									3 (високо- стійкий у воді)
		дифеноконазол, 167 г/л +	0,002	соя (зерно)	0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	не потр.	не потр.	не потр.	
		азоксистробін, 67 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				

		дифеноконазол, 167 г/л +	0,00	соє (олія)	не потр.	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	-	-	-	
		азоксистробін, 67 г/л	0,03		не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
182	Універсал, КС	тебуконазол, 500 г/л	0,03	пшениця	0,2	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0	30	не потр.	3	3 (високо- стійкий у воді)
				ріпак (насіння)	0,5					35	не потр.	3	
				ріпак (олія)	0,5					-	-	-	
183	Фамоксаніл л, КС			<i>Контроль за цимоксанілом та фамоксадонем</i>									3
		цимоксаніл, 230 г/л +	0,05	соє (зерно)	0,5	1,0	0,03	0,06 сан.-токс.	0,04	20*	не потр.*	3*	
		фамоксадон, 170 г/л	0,01		0,04	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,4				
		цимоксаніл, 230 г/л +	0,05	соє (олія)	не потр.	1,0	0,03	0,06 сан.-токс.	0,04	-	-	-	
		фамоксадон, 170 г/л	0,01		не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,4				
		цимоксаніл, 230 г/л +	0,05	квасоля (зерно)	0,01*	1,0	0,03	0,06 сан.-токс.	0,04	20*	не потр.*	3*	
		фамоксадон, 170 г/л	0,01		0,05*	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,4				
184	Феніпроп EW, EB	феноксапроп-п- етил, 69 г/л +	0,01	пшениця	0,2	0,6	0,002	0,0003 заг.-сан.	0,04	не потр.*	не потр.*	3	3

		мефенпір-діетил, 35 г/л (антидот)	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
185	Фітолікар, КС	флутріафол, 250 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,4	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,006 сан.-токс.	0,1 трансл.	36	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високо-стійкий у воді та ґрунті)
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
186	Флейм WG, BG	флуметсулам, 800 г/кг	0,2	кукурудза (зерно)	0,02	1,0	0,02	0,02 заг.-сан.	0,05 трансл., фітотокс., водно-мігр.	не потр.	не потр.	3	3 (високо-стійкий у воді та ґрунті)
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
187	Флорацид Актив Про, BG	трибенурон-метил, 570 г/кг + флорасулам, 190 г/кг +	0,005 0,05	<i>Контроль за трибенурон-метилом</i>						не потр.*	не потр.*	3*	3
				пшениця	0,01	0,1	0,003	0,06 заг.-сан.	0,01				
					0,01	1,0	0,003	0,1 сан.-токс.	0,05 фітотокс.				
188	Флуоп-Проті 125 SE (Fluor-Protі 125 SE)			<i>Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та флуопірамом</i>		<i>Контроль за протіоконазолом (2) та флуопірамом</i>		<i>Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та флуопірамом</i>					3 (високо-стійкий у воді та ґрунті)

		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	48*	не потр.*	3*	
		флуопірам, 125 г/л	0,01		0,2	1,0	0,003	0,02 сан.-токс., заг.-сан.	0,08				
		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	
		флуопірам, 125 г/л	0,01		0,3*	1,0	0,003	0,02 сан.-токс., заг.-сан.	0,08				
		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	42*	не потр.*	3*	
		флуопірам, 125 г/л	0,01		0,7*	1,0	0,003	0,02 сан.-токс., заг.-сан.	0,08				
		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	
		флуопірам, 125 г/л	0,01		не потр.	1,0	0,003	0,02 сан.-токс., заг.-сан.	0,08				
		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	соя (зерно)	0,05 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	42*	не потр.*	3*	
		флуопірам, 125 г/л	0,01		0,2	1,0	0,003	0,02 сан.-токс., заг.-сан.	0,08				
		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	соя (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	

		флуопірам, 125 г/л	0,01		не потр.	1,0	0,003	0,02 сан.-токс., заг.-сан.	0,08				
189	Флуп SC, КС	флуопірам, 500 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,7*	1,0	0,003	0,02 сан.-токс., заг.-сан.	0,08	42*	не потр.*	3*	3 (високо- стійкий у воді та ґрунті)
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				соя (зерно)	0,2					42*	не потр.*	3*	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
190	Флутрідез ін Про, ТН	флутріафол, 30 г/л +	0,01	Контроль за тиразом						не потр.*	не потр.*	не потр.*	3 (високо- стійкий у воді та ґрунті)
		пшениця		0,1	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,006 сан.-токс.	0,1 трансл.					
		тирам, 400 г/л	0,005		0,05*	0,05 – максимальна разова; 0,02 – середньо- добова	0,05	0,01 сан.-токс.	0,2				
191	Фортеця Тотал ЕС, КЕ	тебуконазол, 250 г/л	0,03	соняшник (насіння)	0,07	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0	42	не потр.	3	2 (небезпе- чний при потрап- лянні на слизові

				соняшник (олія)	0,04								оболонки очей, високо- стійкий у воді)
192	Фуріл Pro, КС	тебуконазол, 500 г/л	0,03	пшениця	0,2	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0	35	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді)
				ріпак (насіння)	0,50					28	не потр.	3	
				ріпак (олія)	0,50					-	-	-	
193	Харбор 320, КС	тіаметоксам, 150 г/л + біфентрин, 170 г/л	0,02	<i>Контроль за тіаметоксамом та біфентрином</i>						36	не потр.	4	3 (високо- стійкий у воді та грунті)
				кукурудза (зерно)	0,4	0,5 аерозоль	0,03	0,04 сан.-токс.	0,1				
					0,05	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1				
				кукурудза (олія)	не потр.	0,5 аерозоль	0,03	0,04 сан.-токс.	0,1	-	-	-	
					0,1	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1				
194	Хелліан Форте, КС	піраклостробін, 250 г/л + боскалід, 150 г/л	0,03	<i>Контроль за піраклостробіном та боскалідом</i>						50*	не потр.*	3*	3 (високо- стійкий у воді та грунті)
				соняшник (насіння)	0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
			0,04		1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				

		піраклостробін, 250 г/л +	0,03	соняшник (олія)	0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6	-	-	-	
		боскалід, 150 г/л	0,04		2,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
		піраклостробін, 250 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6	30*	не потр.*	3*	
		боскалід, 150 г/л	0,04		1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
		піраклостробін, 250 г/л +	0,03	ріпак (олія)	0,3	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6	-	-	-	
		боскалід, 150 г/л	0,04		1,0*	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
195	ХлТН 200 SC, KC	хлорантрانی- ліпрол, 200 г/л	0,02	кукурудза (зерно)	0,01	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	20*	не потр.*	3*	3 (високо- стійкий у воді та грунті)
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,05					30*	не потр.*	3*	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,2					35*	не потр.*	3*	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	

196	Цеделіс, МД	циантраніліпрол, 300 г/л	0,00	яблука	0,1	1,5	0,003	0,004 сан.-токс.	0,3	20	7	3	3 (алерген)
				яблучний сік	0,1					-	-	-	
				томати	0,1					20	7	3	
				томатний сік	0,1					-	-	-	
				капуста	0,1					20	7	3	
				цибуля (ріпка)	0,05					14	7	3	
197	Чаклун, КС	протіоконазол, 480 г/л	0,001 (1,2)	<i>Контроль за протіоконазолом-дестіо (1)</i>		<i>Контроль за протіоконазолом (2)</i>			<i>Контроль за протіоконазолом-дестіо (1)</i>				3 (високостійкий у воді)
				ріпак (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	43*	не потр.*	3*	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,1 (1)					35*	не потр.*	3*	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
198	Ченон 600 SC, КС	аклоніфен, 600 г/л	0,01	пшениця	0,01	1,0	0,005	0,01 заг.-сан.	0,08	не потр.	не потр.	3	2 (алерген, високостійкий у ґрунті)
				ячмінь	0,01					не потр.	не потр.	3	

				тритикале	0,01					не потр.	не потр.	3	
				горох (зерно)	0,01					не потр.	не потр.	3	
199	Шериф, ВГ	трибенурон-метил, 750 г/кг	0,005	соняшник (насіння)	0,02	0,1	0,003	0,06 заг.-сан.	0,01	не потр.	не потр.	3	3 (високо- стійкий у воді)
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
200	ЮНІ- АКЛОН, КС	аклоніфен, 600 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,05	1,0	0,005	0,01 заг.-сан.	0,08	не потр.*	не потр.*	3*	2 (високо- стійкий у грунті)
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				соя (зерно)	0,01					не потр.*	не потр.*	3*	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				горох (зерно)	0,01					не потр.*	не потр.*	3*	
201	ЮНІ- КАРБЕНД ЗИМ 500, КС	карбендазим, 500 г/л	0,01	ячмінь	0,5	0,1	0,001	0,1 орг.	0,1	30	не потр.	3	2 (високо- стійкий у воді та грунті)
				сорго	0,01					30	не потр.	3	
				соя (зерно)	0,15					30	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
202				Контроль за ацетаміпридом та лямбда-цигалотрином									3

	ЮНІ-КС 3,5 %, КЕ	ацетаміприд, 20 г/л +	0,005	ячмінь	0,1	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1	30	не потр.	4	
		лямбда- цигалотрин, 15 г/л	0,003		0,05	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	/0,05				
		ацетаміприд, 20 г/л +	0,005	сорго	0,02	0,2	0,003	0,01 сан.-токс.	0,1	30	не потр.	4	
		лямбда- цигалотрин, 15 г/л	0,003		0,2	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	/0,05				
203	ЮНІ- ТИФЕН, ВГ	тифенсульфу- рон-метил, 750 г/кг	0,01	кукурудза (зерно)	0,05	0,1	0,01	0,01 сан.-токс.	0,05	не потр.*	не потр.*	3*	3
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
				соя (зерно)	0,02					не потр.*	не потр.*	3*	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
204	Якоб, КС	боскалід, 500 г/л	0,04	соя (зерно)	3,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4	45	не потр.	3	3
				соя (олія)	1,0					-	-	-	(високо- стійкий у воді та ґрунті)

				соняшник (насіння)	1,0					50	не потр.	3	
				соняшник (олія)	2,0					-	-	-	
205	Янкі, КС			<i>Контроль за міддю</i>		<i>Контроль за сіркою та міддю</i>		<i>Контроль за міддю</i>					3
		сірка, 640 г/л +	не нормується	виноград	не потр.	6,0	0,07	не нормується	не нормується	35	7	3	
		сульфат міді, 80 г/л	0,05 (по міді)		5,0	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.				
		сірка, 640 г/л +	не нормується	виноградни й сік	не потр.	6,0	0,07	не нормується	не нормується	-	-	-	
		сульфат міді, 80 г/л	0,05 (по міді)		5,0	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.				
		сірка, 640 г/л +	не нормується	буряки цукрові	не потр.	6,0	0,07	не нормується	не нормується	30	7	3	
		сульфат міді, 80 г/л	0,05 (по міді)		5,0	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.				

		сірка, 640 г/л +	не нормується	буряки столові	не потр.	6,0	0,07	не нормується	не нормується	30	7	3	
		сульфат міді, 80 г/л	0,05 (по міді)		5,0	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.				
		сірка, 640 г/л +	не нормується	горіхи	не потр.	6,0	0,07	не нормується	не нормується	35	7	3	
		сульфат міді, 80 г/л	0,05 (по міді)		20,0	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.				
		сірка, 640 г/л +	не нормується	томати	не потр.	6,0	0,07	не нормується	не нормується	20	7	3	
		сульфат міді, 80 г/л	0,05 (по міді)		20,0	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.				
		сірка, 640 г/л +	не нормується	томати ²	не потр.	6,0	0,07	не нормується	не нормується	20	7	3	

		сульфат міді, 80 г/л	0,05 (по міді)		20,0	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.				
--	--	-------------------------	-------------------	--	------	------	--	--------------	-------------------	--	--	--	--

* - термін дії нормативу - 3 роки.

¹ Препарат рекомендовано для внесення з повітря за допомогою безпілотного повітряного судна (БПС).

² Препарат рекомендовано для роздрібного продажу населенню.».

В.о. директора Департаменту громадського здоров'я

Ігор ПОВОРОВНИК