

Додаток
до Порядку організації скринінгу та
діагностики порушень слуху у дітей
(пункту 1 Розділу II)

**Етапи проведення
скринінгу з урахуванням груп ризику**

Етап скринінгу	Опис	Методи	Результати	Примітки
1	2	3	4	5
Перший етап	Первинний скринінг для всіх новонароджених у закладах охорони здоров'я, що надають медичну допомогу при пологах, зазвичай перед випискою, але не пізніше 1-го місяця життя.	Отоакустична емісія (далі - ОАЕ) Коротколатентні слухові викликані потенціали (далі – КСВП)	- «Відхилень не виявлено» (для правого/лівого вуха) - «Виявлено відхилення » (для правого/лівого вуха) - «Потребує повторного тестування»	Добровільна інформована згода батьків обов'язкова. Відмова оформлюється письмово у довільній формі.
Другий етап	Діагностичні обстеження до 3 місяців, у випадку, якщо дитина не проходила перший етап скринінгу, та ті випадки, що потребують уточнення діагнозу для дітей із підтвердженими порушеннями слуху.	ОАЕ КСВП	Аналогічні результати, як і на першому етапі.	Обстеження та оцінювання здійснюються лікарем – отоларингологом дитячим, лікарем – сурдологом, або лікарями інших спеціальностей, що пройшли відповідне навчання, у закладах охорони здоров'я, що проводять обстеження із застосуванням діагностичного обладнання для проведення ОАЕ, КСВП.

1	2	3	4	5
Діагностичне аудіологічне обстеження	Уточнення діагнозу та при повторних невдалих результатах другого етапу для дітей із груп ризику.	Тимпанометрія, КСВП, ОАЕ, тональна порогова аудіометрія та інші.	Встановлення діагнозу втрати слуху або виключення патології.	Обстеження, інтерпретація результатів та надання діагностичних висновків здійснюється лікарем – отоларингологом дитячим, лікарем – сурдологом, або лікарями інших спеціальностей, що пройшли відповідне навчання.
Третій етап	Початок раннього втручання для дітей із підтвердженою втратою слуху, не пізніше 6 місяців життя.	Слухопротезування або кохлеарна імплантація, логопедична допомога.	Встановлення діагнозу втрати слуху або виключення патології.	Згідно встановлених показів і/або скерувань лікаря -отоларинголога дитячого, лікаря-педіатра, лікаря загальної практики - сімейного лікаря.
Скринінг слуху для груп ризику	Контрольні аудіологічні обстеження	Методи діагностики підбираються індивідуально, враховуючи вік дитини, наявність супутніх захворювань та фізіологічні особливості.	Встановлення діагнозу втрати слуху або виключення патології та своєчасність втручання.	Згідно встановлених показів і/або скерувань лікаря -отоларинголога дитячого, лікаря-педіатра, лікаря загальної практики - сімейного лікаря.