

## Додаток

до Порядку скринінгу і ранньої діагностики колоректального раку та моніторингу стану здоров'я пацієнтів з груп ризику та з передпухлинною патологією  
(пункт 1 розділу II, пункт 1 розділу III, пункт 2 розділу IV)

### Маршрут пацієнта у надавача ПМД

№	Вік пацієнта	Вид профілактичного заходу	Періодичність профілактичного заходу	Результат профілактичного заходу	Подальші дії лікаря з надання ПМД
<b>Первинна профілактика колоректального раку (КРР)</b>					
1	40-49 років	опитування стосовно факторів ризику (ФР) та симптомів, що можуть свідчити про КРР, у тому числі з використанням анамнестичної анкети	кожні 2 роки,  у разі виявлених ФР щороку	ФР або симптоми виявлені чи ні	ФР чи симптоми не виявлені – інформування про профілактику КРР та наступні заходи первинної профілактики  ФР виявлені – обстеження у лікаря з надання ПМД  симптоми виявлені – направлення на тест калу на приховану кров або на фекальний імунохімічний тест (ФІТ)
<b>Вторинна профілактика КРР</b>					
1	50-75 років	Популяційний скринінг – огляд та	Кожні 2 роки	Симптоми КРР не виявлені	Негативний результат – інформування

		направлення на тест калу на приховану кров або на фекальний імунохімічний тест (ФІТ)		(негативний) або виявлені (позитивний)	про профілактику КРР та наступні скринінги  Позитивний результат – направлення на колоноскопію або до лікаря-спеціаліста (проктолог або онколог) для подальшої діагностики та лікування
2	50-75 років за наявності ФР	Скринінг груп ризику – огляд та направлення на тест калу на приховану кров або на фекальний імунохімічний тест (ФІТ)	Щороку	Симптоми КРР не виявлені (негативний) або виявлені (позитивний)	Негативний результат – інформування про профілактику КРР та наступні скринінги  Позитивний результат – направлення на колоноскопію або до лікаря-спеціаліста (проктолог або онколог) для подальшої діагностики та лікування
<b>Моніторинг стану здоров'я пацієнтів з груп ризику та з передпухлинною патологією</b>					
1	пацієнти з передпухлинною патологією	Опитування та медичне обстеження лікарем з надання ПМД	1 раз на 3 місяці	Симптомів КРР не виявлено (негативний) або виявлено (позитивний) результат	Негативний результат – інформування про профілактику КРР та наступні обстеження  Позитивний результат –

					направлення на колоноскопію або до лікаря-спеціаліста (проктолог або онколог) для подальшої діагностики та лікування
2	пацієнт після лікування КРР	Опитування та медичне обстеження лікарем з надання ПМД	1 раз на 3 місяці в перший рік після закінчення лікування; двічі на рік – в другий рік після закінчення лікування; Третій і наступні роки після закінчення лікування – щороку.	Симптомів КРР не виявлено (негативний) або виявлено (позитивний) результат	Негативний результат – інформування про профілактику КРР та наступні обстеження  Позитивний результат – направлення на колоноскопію або до онколога для подальшої діагностики та лікування

---