

Додаток

до Порядку скринінгу і ранньої діагностики раку шийки матки та моніторингу стану здоров'я пацієнок з груп ризику та з передраковим станом шийки матки (пункт 1 розділу II, пункт 2 розділу III, пункт 2 розділу IV)

Маршрут пацієнтки у надавача ПМД або акушера-гінеколога

№	Вік пацієнтки	Вид профілактичного заходу	Періодичність профілактичного заходу	Результат профілактичного заходу	Подальші дії лікаря з надання ПМД чи акушера-гінеколога
Первинна профілактика раку шийки матки (РШМ)					
1	21-29 років	опитування стосовно факторів ризику (ФР) та симптомів, що можуть свідчити про РШМ, у тому числі з використанням анамнестичної анкети	Рекомендовано кожні 5 років	ФР або симптоми РШМ виявлені чи ні	ФР чи симптоми не виявлені – інформування про профілактику РШМ та наступні заходи первинної профілактики ФР виявлені – обстеження у лікаря з надання ПМД чи акушера-гінеколога симптоми виявлені – направлення на скринінг
2	30 років і більше	опитування стосовно факторів	кожні 2 роки	ФР або симптоми	ФР чи симптоми не виявлені – інформування про

		ризик (ФР) та симптомів, що можуть свідчити про РШМ, у тому числі з використанням анамнестичної анкети		РШМ виявлені чи ні	профілактику РШМ та наступні заходи первинної профілактики ФР виявлені – обстеження у лікаря з надання ПМД чи акушера-гінеколога симптоми виявлені – направлення на скринінг
Вторинна профілактика РШМ					
1	30-35 років і більше	Популяційний скринінг – направлення на ПАП-тест чи ПРЛ тест	у віці 30-35 років далі кожні 10 років	Симптоми РШМ не виявлені (негативний) або виявлені (позитивний)	Негативний результат – інформування про профілактику РШМ та наступні скринінги Позитивний результат – направлення до онколога для подальшої діагностики та лікування
2	30 років і більше за наявності виявлених за результатами опитування ФР	Скринінг груп ризику – гінекологічний огляд та направлення на ПАП-тест чи ПРЛ тест	Щоразу після проведення опитування у разі виявлення ФР	Симптоми РШМ не виявлені (негативний) або виявлені (позитивний)	Негативний результат – інформування про профілактику РШМ та наступні скринінги Позитивний результат – направлення до онколога для подальшої діагностики та лікування
Моніторинг стану здоров'я пацієнок з груп ризику та з передраковим станом					

1	пацієнтки з передраковим станом	Опитування та медичне обстеження лікарем з надання ПМД чи акушером-гінекологом	1 раз на 3 місяці	Симптомів РШМ не виявлено (негативний) або виявлено (позитивний) результат	Негативний результат – інформування про профілактику РШМ та наступні обстеження Позитивний результат – направлення до онколога для подальшої діагностики та лікування
2	пацієнтки після лікування РШМ	Опитування та медичне обстеження лікарем з надання ПМД чи акушером-гінекологом	1 раз на 3 місяці в перший рік після закінчення лікування; двічі на рік – в другий рік після закінчення лікування; Третій і наступні роки після закінчення лікування – щороку.	Симптомів РШМ не виявлено (негативний) або виявлено (позитивний) результат	Негативний результат – інформування про профілактику РШМ та наступні обстеження Позитивний результат – направлення до онколога для подальшої діагностики та лікування