

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства охорони  
 здоров'я України  
 20.07.2018 року № 1363

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
 16 серпня 2018 року за № 937/32389

### Зміни до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів

1. Після пункту 26 доповнити новим пунктом 27 такого змісту:

27	Альєтт 80 WP, ЗП	фосетил алюмінію, 800 г/кг	2	<i>Контроль по сумі фосфонової кислоти та фосетилу в перерахунку на фосетил алюмінію</i>					30	не потр.	3	2
				соняшник (насіння)	0,5* (межа визн. ФМ-0,2)	/2,0	/0,02	0,3/ сан.-токс.				
				соняшник (олія)	не потр.*				-	-	-	
				соя (зерно)	0,5 (межа визн. ВЕРХ-0,5)				40	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.				-	-	-	

У зв'язку з цим пункти 27-472 вважати відповідно пунктами 28-473.

».

2. Пункт 33 викласти у такій редакції:

«

33	Антилопа, КЕ	клетодим, 360 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1	не потр.	не потр.	3	3 (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей)
				соняшник (олія)	не потр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,05)					не потр.	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.*					-	-	-	

».

3. Після пункту 50 доповнити новим пунктом 51 такого змісту:

«

51	Балерина, СЕ	2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 615 г/л +	0,0001	Контроль по 2,4-Д		Контроль по 2,4-Д 2- етилгексиловому ефіру		Контроль по 2,4-Д		не потр.	не потр.	3	3 (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки ...)
				сорго (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.- токс.	0,1/ трансл.				
		флорасулам, 7,4 г/л	0,05		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				

».

У зв'язку з цим пункти 51-473 вважати відповідно пунктами 52-474.

4. Після пункту 54 доповнити новим пунктом 55 такого змісту:

«

55	Бард 200 SL, РК	дикват, 200 г/л	0,002	соняшник (насіння)	0,5* (межа визн. ФМ-0,05)	0,05/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	6	не потр.	3	2
				соняшник (олія)	не потр.*					-	-	-	

				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ФМ-0,25)					6	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.*					-	-	-	

».

У зв'язку з цим пункти 55-474 вважати відповідно пунктами 56-475.

5. Пункт 60 викласти у такій редакції:

«

<b>60</b>	<b>Белт 480 SC, KC</b>	флубендіамід, 480 г/л	0,003	соя (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,003/ заг.-сан.	0,25/ трансл.	30	не потр.	3	2 (високостій- кий у воді та ґрунті)
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				сорго (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					30	не потр.	3	

».

6. Після пункту 68 доповнити новим пунктом 69 такого змісту:

«

<b>69</b>	<b>Блокбастер, KE</b>	біфентрин, 100 г/л	0,02	яблука	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.- сан.	/0,1	30	10	4	3 (високостій- кий у воді)
				яблучний сік	0,15 (межа визн. ГРХ-0,15)					-	-	-	
				картопля	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)					30	10	4	
				троянди	не потр.					не потр.	10	4	
				ялівець	не потр.					не потр.	10	4	

».

У зв'язку з цим пункти 69-475 вважати відповідно пунктами 70-476.

7. Пункт 73 викласти у такій редакції:

«

73	Борей Нео, КС	Контроль по альфа-циперметрину та імідаклоприду							30	не потр.	4	2
		альфа-циперметрин, 125 г/л +	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.				
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04			
		клогіанідин, 50 г/л	0,08		0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл., фітотокс.			
		альфа-циперметрин, 125 г/л +	0,005	буряки цукрові	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1 небезпечний при потраплянні на	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	30	10	4
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04			
		клогіанідин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл., фітотокс.			
		альфа-циперметрин, 125 г/л +	0,005	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпечний при потраплянні на	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	30	не потр.	4
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04			

(небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді та гравті)

		клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.- сан.	0,03/ трансл., фітотокс.				
		альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	соняшник (олія)		/0,1 небезпечний при потраплянні на	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	-	-	-	
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		не потр.*	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		не потр.*	/1,5	/0,02	0,004/ заг.- сан.	0,03/ трансл., фітотокс.				
		альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	картопля	0,03* (межа визн. ГРХ- 0,03)	/0,1 небезпечний при потраплянні на	/0,003	0,002/ заг.- сан.	/0,03	30	10	4	
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04				
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл., фітотокс.				
		альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	томати	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,1 небезпечний при потраплянні на	/0,003	0,002/ заг.- сан.	/0,03	30	10	4	
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.- сан.	0,03/ трансл., фітотокс.				

		альфа-циперметрин, 125 г/л +	0,005	томатний сік	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1 небезпечний при потраплянні на	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	-	-	-	
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл., фітотокс.				
		альфа-циперметрин, 125 г/л +	0,005	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1 небезпечний при потраплянні на	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	30	не потр.	4	
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл., фітотокс.				
		альфа-циперметрин, 125 г/л +	0,005	кукурудза (олія)	не потр.	/0,1 небезпечний при потраплянні на	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	-	-	-	
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		не потр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		не потр.	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл., фітотокс.				

	альфа-циперметрин, 125 г/л +	0,005	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,1 небезпечний при потраплянні на	/0,003	0,002/ заг.- сан.	/0,03	30	не потр.	4
	імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04			
	клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.- сан.	0,03/ трансл., фітотокс.			

	альфа-циперметрин, 125 г/л +	0,005	соя (олія)	не потр.	/0,1 небезпечний при потраплянні на	/0,003	0,002/ заг.- сан.	/0,03	-	-	-
	імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04			
	клотіанідин, 50 г/л	0,08		не потр.	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл., фітотокс.			
	альфа-циперметрин, 125 г/л +	0,005	ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на	/0,003	0,002/ заг.- сан.	/0,03	30	не потр.	4
	імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04			
	клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.- сан.	0,03/ трансл., фітотокс.			
	альфа-циперметрин, 125 г/л +	0,005	ріпак (олія)	1,0* (межа визн. ГРХ-0,4)	/0,1 небезпечний при потраплянні на	/0,003	0,002/ заг.- сан.	/0,03	-	-	-
	імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		не потр.*	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04			

	клогіанідин, 50 г/л	0,08		не потр.*	/1,5	/0,02	0,004/ заг.- сан.	0,03/ трансл., фітотокс.				
	альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	горох (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,1 небезпечний при потраплянні на	/0,003	0,002/ заг.- сан.	/0,03	20	10	4	
	імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04				
	клогіанідин, 50 г/л	0,08		0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.- сан.	0,03/ трансл., фітотокс.				

».

8. Після пункту 91 доповнити новим пунктом 92 такого змісту:

«

92	Віжн, ВГ			Контроль по амікарбазону та мезотріону						не потр.	не потр.	3	3
				кукурудза (зерно)	0,02 (сума амікарбазону та його метаболітів) (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,5 (межа визн. ВЕРХ-0,25)	/0,001 (межа визн. ВЕРХ- 0,001)	0,002/ заг.- сан. (межа визн. ВЕРХ- 0,002)	/0,2 (межа визн. ВЕРХ- 0,02)				
	амікарбазон, 280 г/кг +	0,005	кукурудза (зерно)	0,02 (сума амікарбазону та його метаболітів) (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,5 (межа визн. ВЕРХ-0,25)	/0,001 (межа визн. ВЕРХ- 0,001)	0,002/ заг.- сан. (межа визн. ВЕРХ- 0,002)	/0,2 (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	не потр.	не потр.	3	3 (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей, високостій- кий у воді)	
	мезотріон, 288 г/кг	0,001		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан.- токс.	/0,4					
	амікарбазон, 280 г/кг +	0,005	кукурудза (олія)	не потр.	/0,5 (межа визн. ВЕРХ-0,25)	/0,001 (межа визн. ВЕРХ- 0,001)	0,002/ заг.- сан. (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/0,2 (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	-	-	-		
	мезотріон, 288 г/кг	0,001		не потр.	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-						

».

У зв'язку з цим пункти 92-476 вважати відповідно пунктами 93-477.

9. Після пункту 98 доповнити новим пунктом 99 такого змісту:

«



99	Гамбіт, КС	прометрин, 500 г/л	0,005	горох (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	5,0/	/0,02	0,002/ сан.- токс.	0,5/ трансл.	не потр.	7	3	2  (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей, високостій- кий у воді)
				картопля	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)					90	7	3	
				морква	0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)					120	7	3	

».

У зв'язку з цим пункти 99-477 вважати відповідно пунктами 100-478.

10. Після пункту 130 доповнити новим пунктом 131 такого змісту:

«

131	Дикафлор 440, КЕ			Контроль по дикамбі									
				зерно хлібних злаків	0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)	1,0/	/0,01	0,02/ сан.- токс.	0,25/ трансл.				
		дикамба, 422 г/л +	0,004							не потр.	не потр.	3	3  (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей, високостій- кий у воді)
		флорасулам, 18 г/л	0,05		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.- токс.	0,05/ фітотокс.				
		дикамба, 422 г/л +	0,004	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	1,0/	/0,01	0,02/ сан.- токс.	0,25/ трансл.	не потр.	не потр.	3	
		флорасулам, 18 г/л	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.- токс.	0,05/ фітотокс.				
		дикамба, 422 г/л +	0,004	кукурудза (олія)	не потр.*	1,0/	/0,01	0,02/ сан.- токс.	0,25/ трансл.	-	-	-	

		флорасулам, 18 г/л	0,05		не потр.*	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-	0,05/ фітотокс.				
--	--	-----------------------	------	--	-----------	------	--------	---------------	--------------------	--	--	--	--

».

У зв'язку з цим пункти 131-478 вважати відповідно пунктами 132-479.

11. Після пункту 176 доповнити новим пунктом 177 такого змісту:

«

<b>177</b>	<b>Індіго, ТН</b>	імідаклоприд, 600 г/л	0,06	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04	не потр.	не потр.	не потр.	2 (високостій- кий у воді)
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					не потр.	не потр.	не потр.	
				соняшник (олія)	не потр.*					-	-	-	

».

У зв'язку з цим пункти 177-479 вважати відповідно пунктами 178-480.

12. Після пункту 221 доповнити новими пунктами 222,223 такого змісту:

«

<b>222</b>	<b>Кредо, КС</b>	карбендазим, 500 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	30	не потр.	4	3 (високостій- кий у воді)	
				буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,06)					20	10	4		
				соняшник (насіння)	0,3* (межа визн. ТШХ-0,3)					30	не потр.	4		
				соняшник (олія)	0,4* (межа визн. ТШХ-0,4)					-	-	-		
<b>223</b>	<b>Кремед 330, КС</b>	<i>Контроль по крезоксим-метилу, епоксиконазолу та дифенконазолу</i>												3
		крезоксим- метил, 125 г/л +	0,1	зерно хлібних злаків	0,05** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,05	0,3/ орг.,	/0,1	30	не потр.	3	(високостій- кий у воді та грунті)	
		епоксиконазол, 125 г/л +	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.- сан.	/0,4					

	дифеноконазол, 80 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.- токс.	/0,3				
	крезоксим- метил, 125 г/л	0,1	соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,01)	/1,0	/0,05	0,3/ орг.,	/0,1	30	не потр.	3	
	епоксиконазол, 125 г/л	0,004		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.- сан.	/0,4				
	дифеноконазол, 80 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.- токс.	/0,3				
	крезоксим- метил, 125 г/л	0,1	соняшник (олія)	не потр.**	/1,0	/0,05	0,3/ орг.,	/0,1	-	-	-	
	епоксиконазол, 125 г/л	0,004		не потр.*	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-	/0,4				
	дифеноконазол, 80 г/л	0,002		0,4* (межа визн. ГРХ-0,4)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.- токс.	/0,3				
	крезоксим- метил, 125 г/л	0,1	соєа (зерно)	0,01** (межа визн. ГРХ-0,01)	/1,0	/0,05	0,3/ орг.,	/0,1	30	не потр.	3	
	епоксиконазол, 125 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.- сан.	/0,4				

	дифеноконазол, 80 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.- токс.	/0,3				
	крезоксим- метил, 125 г/л	0,1	соєа (олія)	не потр.*	/1,0	/0,05	0,3/ орг.,	/0,1	-	-	-	
	епоксиконазол, 125 г/л	0,004		не потр.*	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-	/0,4				
	дифеноконазол, 80 г/л	0,002		не потр.*	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-	/0,3				
	крезоксим- метил, 125 г/л	0,1	буєаки цукрові	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,05	0,3/ орг.,	/0,1	30	7	3	
	епоксиконазол, 125 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.- сан.	/0,4				
	дифеноконазол, 80 г/л	0,002		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.- токс.	/0,3				



	тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04	не потр.	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді)
	S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,02	0,02/ сан.- токс.	/0,02				
	тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (олія)	не потр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04	-	-	-	
	S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*	/1,0	/0,02	0,02/ сан.-	/0,02				
	тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04	не потр.	не потр.	3	
	S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,02	0,02/ сан.- токс.	/0,02				
	тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04	-	-	-	
	S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*	/1,0	/0,02	0,02/ сан.-	/0,02				
	тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	сорго	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04	не потр.	не потр.	3	

	S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,02	0,02/ сан.- токс.	/0,02				
	тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04	не потр.	не потр.	3	
	S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ- 0,2)	/1,0	/0,02	0,02/ сан.- токс.	/0,02				
	тербутилазин, 187,5 г/л	0,003	соя (олія)	не потр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-	/0,04	-	-	-	
	S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*	/1,0	/0,02	0,02/ сан.-	/0,02				

16. Після пункту 277 доповнити новим пунктом 278 такого змісту:

«													
278	Оплот Трію, КС	тебуконазол, 45 г/л +	0,03	Контроль по дифеноконазолу						не потр.	не потр.	не потр.	3 (високостій- кий у воді)
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.- сан.	/1,0				
		дифеноконазол, 90 г/л +	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.- токс.	/0,3				
		азоксистробін, 40 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.- сан.	/0,3				

У зв'язку з цим пункти 278-484 вважати відповідно пунктами 279-485.

17. Після пункту 311 доповнити новим пунктом 312 такого змісту:

«													
312	Пропоніт Т, СЕ	пропізохлор, 450 г/л +	0,01	Контроль по пропізохлору та тербутилазину						не потр.	не потр.	3	2  (небезпеч- ний при попаданні на шкіру та слизові оболонки очей, алерген, високостій- кий у воді)
				соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6				
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04				

		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	-	-	-	
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		не потр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-	/0,04				
		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не потр.	не потр.	3	
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04				

	пропізохлор, 450 г/л	0,01	соя (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	-	-	-	
	тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		не потр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-	/0,04				

У зв'язку з цим пункти 312-485 вважати відповідно пунктами 313-486.

18. Після пункту 316 доповнити новим пунктом 317 такого змісту:

317	Ракурс, КС	Контроль по ципроконазолу та епоксиконазолу								30	не потр.	3	2 (високостій- кий у воді та ґрунті)
		ципроконазол, 160 г/л	0,002	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
	ципроконазол, 160 г/л	0,002	соя (олія)	не потр.*	/0,1	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,01	-	-	-		
	епоксиконазол, 240 г/л	0,004		не потр.*	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4					
	ципроконазол, 160 г/л	0,002	сосяшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01	30	не потр.	3		
	епоксиконазол, 240 г/л	0,004		0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4					
	ципроконазол, 160 г/л	0,002	сосяшник (олія)	не потр.*	/0,1	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,01	-	-	-		
	епоксиконазол, 240 г/л	0,004		не потр.*	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4					

У зв'язку з цим пункти 317-486 вважати відповідно пунктами 318-487.

19. Після пункту 321 доповнити новим пунктом 322 такого змісту:

«

322	Рандеву, ВГ	трифлусульфурон-метил, 500 г/кг	0,05	буряки цукрові	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,1	0,15/ заг.-сан.	/0,1	не потр.	7	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, алерген)
-----	-------------	------------------------------------	------	----------------	---------------------------------	------	------	--------------------	------	----------	---	---	--

».

У зв'язку з цим пункти 322-487 вважати відповідно пунктами 323-488.

20. Після пункту 331 доповнити новим пунктом 332 такого змісту:

«

332	Рекс Плюс, СЕ	Контроль по фенпропіморфу та епоксиконазолу								30	не потр.	3	3 (високостійкий у ґрунті)
		зерно хлібних злаків	0,2 (межа визн. ТШХ-0,2)	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,5	30	не потр.				
	фенпропіморф, 250 г/л +	0,003	зерно хлібних злаків	0,2 (межа визн. ТШХ-0,2)	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,5	30	не потр.	3	3 (високостійкий у ґрунті)	
	епоксиконазол, 84 г/л	0,004		0,1 (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4					
	фенпропіморф, 250 г/л +	0,003	буряки цукрові	0,5 (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,5	30	7	3		
	епоксиконазол, 84 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4					

».

У зв'язку з цим пункти 332-488 вважати відповідно пунктами 333-489.

21. Після пункту 353 доповнити новим пунктом 354 такого змісту:

«

354	Селфос, ПГ			Контроль по фосфіну								
-----	------------	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



		фосфід алюмінію, 560 г/кг		зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,001)	0,1/	0,01 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	0,005/ сан.- токс.	/0,4	20 ≤МДР	5-10<ГДК	5-10<ГДК	1  (небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру та слизові оболонки очей)
				соя (зерно)	0,05* (межа визначення лінійно-коло- ристичним методом (далі – межа визн. ЛКМ)-0,007)					20 ≤МДР	5-10<ГДК	5-10<ГДК	
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ЛКМ-0,007)					20 ≤МДР	5-10<ГДК	5-10<ГДК	
				ріпак (насіння)	0,05** (межа визн. ЛКМ-0,007)					20 ≤МДР	5-10<ГДК	5-10<ГДК	
				кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ЛКМ-0,007)					20 ≤МДР	5-10<ГДК	5-10<ГДК	
				трюми, вагони, контейнери						-	5-10<ГДК	5-10<ГДК	

».

У зв'язку з цим пункти 354-489 вважати відповідно пунктами 355-490.

22. Після пункту 355 доповнити новим пунктом 356 такого змісту:

356	Синтозан SA, СЕ	клопіралід, 267 г/л +	0,15	Контроль по клопіраліду та піклораму						не потр.	не потр.	3	3  (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей, високостій- кий у воді та грунті)
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	2,0/	/0,01	0,04/ сан.- токс.	/0,1				

		пiклорам, 80 г/л	0,02		0,05 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	5,0/	/0,02	0,04/ сан.-токс.	0,05/ трансл.				
		+ амiнопiралiд, 17 г/л	0,05		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/1,5	/0,05	0,002/ заг.- сан.	/0,4				
		+ клопiралiд, 267 г/л	0,15	рiпак (олiя)	не потр.*	2,0/	/0,01	0,04/ сан.- токс.	/0,1	-	-	-	
		+ пiклорам, 80 г/л	0,02		не потр.*	5,0/	/0,02	0,04/ сан.- токс.	0,05/ трансл.				
		+ амiнопiралiд, 17 г/л	0,05		не потр.*	/1,5	/0,05	0,002/ заг.-	/0,4				

».

У зв'язку з цим пункти 356-490 вважати відповідно пунктами 357-491.

23. Після пункту 359 доповнити новим пунктом 360 такого змісту:

«

<b>360</b>	<b>Сiмба, KE</b>	S-метолахлор, 960 г/л	0,01	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5	/0,02	0,02/ сан.- токс.	/0,02	не потр.	не потр.	3	3
				кукурудза (олiя)	не потр.*								(небезпеч- ний при потраплян- нi на слизовi оболонки олiй високостiй- кий у водi)
				соняшник (насiння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					не потр.	не потр.	3	
				соняшник (олiя)	не потр.*					-	-	-	
				рiпак (насiння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)					не потр.	не потр.	3	
				рiпак (олiя)	не потр.*					-	-	-	
				буряки цукровi	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)					не потр.	7	3	

				соя (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)					не потр.	не потр.	3	
--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	----------	----------	---	--

				соя (оля) капуста	не потр.* 0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)					- не потр.	- не потр.	- 3	
--	--	--	--	-------------------------	---	--	--	--	--	---------------	---------------	--------	--

».

У зв'язку з цим пункти 360-491 вважати відповідно пунктами 361-492.

24. Після пункту 365 доповнити новим пунктом 366 такого змісту:

«

<b>366</b>	<b>Сквар, РК</b>	дикват-іон, 150 г/л у формі дикват диброміду	0,002	горох (зерно)	0,05* (межа визн. ФМ- 0,025)	0,05/	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	7	10	3	2  (небезпеч- ний при по потраплян- ні на шкіру та слизові оболонки очей)
------------	------------------	---	-------	------------------	---------------------------------------	-------	--------	---------------	------	---	----	---	---

».

У зв'язку з цим пункти 366-492 вважати відповідно пунктами 367-493.

25. Після пункту 367 доповнити новим пунктом 368 такого змісту:

«

<b>368</b>	<b>Слаш, КЕ</b>	клопіралід, 120 г/л +	0,15	<i>Контроль по клопіраліду</i>						не потр.	не потр.	3	3  (небезпеч- ний при по потраплян- ні на шкіру та слизові оболонки очей, високостій- кий у воді)
				ріпак (насіння)	0,5** (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	2,0/	/0,01	0,04/ сан.- токс.	/0,1				
				галауоксифен- метил, 5 г/л	0,02	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,006	0,04/ сан.- токс.				
		клопіралід, 120 г/л +	0,15	ріпак (оля)	не потр.	2,0/	/0,01	0,04/ сан.- токс.	/0,1	-	-	-	

	галауксифен-метил, 5 г/л	0,02		не потр.	/1,0	/0,006	0,04/ сан.-токс.	/0,3					
--	-----------------------------	------	--	----------	------	--------	---------------------	------	--	--	--	--	--

».

У зв'язку з цим пункти 368-493 вважати відповідно пунктами 369-494.

26. Після пункту 370 доповнити новим пунктом 371 такого змісту:

371	Смартфреш ТМ Протабс, ТБ	1-метил-циклопропен, 2,0%	0,0009	яблука	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/50	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	1	1	3  (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей)
				яблучний сік	не потр.*								

».

У зв'язку з цим пункти 371-494 вважати відповідно пунктами 372-495.

27. Після пункту 392 доповнити новим пунктом 393 такого змісту:

393	Суперкіл Форте, 550 КЕ	<i>Контроль по хлорпірифосу</i>											
		хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,3/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	30	не потр.	4	2
		циперметрин, 50 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,04 – максимальна разова; 0,01 – середньо- добова/	0,006/ сан.-токс.	0,02/ трансл.				
	хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	яблука	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,3/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	40	10	4		

	циперметрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,04 – максимальна разова; 0,01 – середньо- добова/	0,006/ сан.- токс.	0,02/ трансл.					
	хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	яблучний сік	0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	0,3/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.- сан.	0,2/ трансл.	-	-	-		

	циперметрин, 50 г/л	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,04 – максимальна разова; 0,01 – середньо- добова/	0,006/ сан.- токс.	0,02/ трансл.					
	хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,02)	0,3/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.- сан.	0,2/ трансл.	40	10	4		
	циперметрин, 50 г/л	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,04 – максимальна разова; 0,01 – середньо- добова/	0,006/ сан.- токс.	0,02/ трансл.					
	хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,3/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.- сан.	0,2/ трансл.	40	не потр.	4		
	циперметрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,04 – максимальна разова; 0,01 – середньо- добова/	0,006/ сан.- токс.	0,02/ трансл.					

	хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	соя (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,3/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.- сан.	0,2/ трансл.	-	-	-	
	циперметрин, 50 г/л	0,003		не потр.*	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,04 – максимальна разова; 0,01 – середньо- добова/	0,006/ сан.- токс.	0,02/ трансл.				
	хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,3/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.- сан.	0,2/ трансл.	30	не потр.	4	
	циперметрин, 50 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,04 – максимальна разова; 0,01 – середньо-добова/	0,006/ сан.- токс.	0,02/ трансл.				
	хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	ріпак (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,3/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.- сан.	0,2/ трансл.	-	-	-	
	циперметрин, 50 г/л	0,003		не потр.*	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,04 – максимальна разова; 0,01 – середньо- добова/	0,006/ сан.- токс.	0,02/ трансл.				

У зв'язку з цим пункти 393-495 вважати відповідно пунктами 394-496.

28. Пункт 422 викласти у такій редакції:

«

422	Торнадо 540, РК	гліфосату калійна сіль, 662,0 г/л, в кислотному еквіваленті – 540 г/л	0,01	осіння та весняна обробка сільськогос- подарських угідь, обробка землі під пар, землі несільськогос- подарського призначення	не потр.	1,0/	/0,01	0,02/ сан.- токс.	0,5/ трансл.	не потр. (гербіцид)	7  (гербіцид)	3  (гербіцид)	3  (високостій- кий у воді)
				соняшник <sup>1</sup> (насіння)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					11 (десикант)	не потр. (десикант)	3 (десикант)	
				соняшник (олія)	не потр.*					-	-	-	
				горох <sup>1</sup> (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					14 (десикант)	не потр. (десикант)	3 (десикант)	
				кукурудза <sup>1</sup> (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					14 (десикант)	не потр. (десикант)	3 (десикант)	
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
				ріпак <sup>1</sup> (насіння)	2,0* (межа визн. ВЕРХ-0,4)					14 (десикант)	не потр. (десикант)	3 (десикант)	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				соя <sup>1</sup> (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					14 (десикант)	не потр. (десикант)	3 (десикант)	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	

».

29. Після пункту 428 доповнити новим пунктом 429 такого змісту:

429	Трінті, КС	дифлуфенікан, 40 г/л +	0,05	<i>Контроль по дифлуфенікану, хлортолурону, пендиметаліну</i>						не потр.	не потр.	3	2 (високостій- кий у воді та грунті)
				зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,5	/0,001	/0,15 сан.- токс.	/0,15				

	хлортолурон, 250 г/л	0,01	0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1	/0,003	0,02/ заг.-сан.	/0,06					
	+ пендиметалін, 300 г/л	0,008	0,01 (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5/	/0,002	0,05/ орг.	/0,2					

».

У зв'язку з цим пункти 429-496 вважати відповідно пунктами 430-497.

30. Після пункту 438 доповнити новим пунктом 439 такого змісту:

439	Фастак, КЕ	альфа- циперметрин, 100 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	30	не потр.	4	2
				соя (зерно)	0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)					30	не потр.	4	(небезпеч- ний при потраплян- ні оболонки очей)
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)					30	не потр.	4	
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	

».

У зв'язку з цим пункти 439-497 вважати відповідно пунктами 440-498.

31. Після пункту 449 доповнити новим пунктом 450 такого змісту:

450	Фокс 325 SC, КС	трифлоркси- стробін, 150 г/л	0,02	<i>Контроль по трифлорксистробіну, протіоконазолу-дестію (1) та протіоконазолу (2)</i>						50	не потр.	7	2
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,8	/0,01	0,03/ заг.- сан.	/0,1				



		протиоконазол, 175 г/л	0,001		0,1 (1) (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
		трифлкси- стробін, 150 г/л +	0,02	соняшник (оля)	не потр.	/0,8	/0,01	0,03/ заг.- сан.	/0,1	-	-	-	
		протиоконазол, 175 г/л	0,001		не потр.	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
		трифлкси- стробін, 150 г/л +	0,02	соє (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,8	/0,01	0,03/ заг.- сан.	/0,1	35	не потр.	7	
		протиоконазол, 175 г/л	0,001		0,05** (1) (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
		трифлкси- стробін, 150 г/л +	0,02	соє (оля)	не потр.**	/0,8	/0,01	0,03/ заг.- сан.	/0,1	-	-	-	
		протиоконазол, 175 г/л	0,001		не потр.	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
		трифлкси- стробін, 150 г/л +	0,02	горох (зерно)	0,01** (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,8	/0,01	0,03/ заг.- сан.	/0,1	25	не потр.	7	
		протиоконазол, 175 г/л	0,001		0,05 (1) (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				

».

У зв'язку з цим пункти 450-498 вважати відповідно пунктами 451-499.

32. Після пункту 462 доповнити новим пунктом 463 такого змісту:

«

463	Хізал 125, КЕ	хізалофоп- п-етил, 125 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.- сан.	/0,8	не потр.	не потр.	3	2  (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей)
				соняшник (оля)	не потр.**					-	-	-	

				соє (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					не потр.	не потр.	3	
				соє (олія)	не потр.**					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)					не потр.	не потр.	3	
				кукурудза (олія)	не потр.**					-	-	-	
				буряки цукрові	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					не потр.	7	3	

».

У зв'язку з цим пункти 463-499 вважати відповідно пунктами 464-500.

33. Після пункту 468 доповнити новим пунктом 469 такого змісту:

«

<b>469</b>	<b>Церон 480 SL, РК</b>	ефекон, 480 г/л	0,006	соєшник (насіння)	0,1 (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,02	0,01/	/0,5	не потр.	не потр.	3	3
				соєшник (олія)	не потр.					-	-	-	(небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей)

».

У зв'язку з цим пункти 469-500 вважати відповідно пунктами 470-501.

**В.о. начальника управління громадського здоров'я**

**І. Руденко**