

Додаток 3
до Порядку профілактики
інфекційних хвороб, пов'язаних
з наданням медичної допомоги
(підпункт 1 пункту 5 розділу IV)

Показання до постановки сечового катетеру

| Показання | Недоречне застосування |
|---|--|
| <p>1. Гостра затримка сечі або блок сечового міхура.</p> <p>2. Необхідність точного вимірювання діурезу у критично хворих пацієнтів.</p> <p>3. Периопераційне використання для наступних процедур:</p> <p> пацієнти, які перенесли урологічні оперативні втручання або інші операції в області сечовивідних шляхів та органів;</p> <p> довготривалі оперативні втручання (більше 8 годин) – такі сечові катетери мають бути видалені в післяопераційній кімнаті або ВАІРТ;</p> <p> пацієнтам, які під час оперативного втручання планово мають отримати велику кількість інфузії або діуретики;</p> <p> необхідність інтраопераційного моніторингу діурезу.</p> <p>4. У пацієнтів з нетриманням сечі після оперативних втручань в області куприку та промежини.</p> <p>5. Пацієнтам, які потребують довготривалої іммобілізації (наприклад, при переломі кісток тазу).</p> <p>6. З метою підвищення комфорту при догляді за хоспісними пацієнтами, у разі необхідності.</p> | <p>1. Пацієнтам із нетриманням сечі без показань.</p> <p>2. Взяття зразку сечі для посіву, у випадках якщо пацієнт контролює сечопускання.</p> <p>3. Довготривале використання у пацієнтів у післяопераційний період без відповідних показань.</p> |