

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я
України

20.05.2020 р. № 1227

**Зміни до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба
(COVID-19)»**

1. Пункт 4 Стандарту 1. Організація протиепідемічних заходів та медичної допомоги в осередку інфікування SARS-CoV-2 викласти в такій редакції:

«4. Лабораторне тестування на COVID 19 проводиться з використанням методу полімеразної ланцюгової реакції (далі - ПЛР) та методу імуноферментного аналізу (далі - ІФА).

Зразки перших п'яти позитивних випадків та перших десяти негативних, які відповідають визначенню випадку COVID-19 для тестування, необхідно підтвердити:

лабораторними центрами МОЗ України – у лабораторії Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України»;

всіма іншими лабораторіями, які проводять дослідження на COVID-19,– у лабораторних центрах МОЗ України за адміністративно-територіальною належністю.

**Категорії осіб, біологічний матеріал для дослідження, строки його відбору,
перелік тестів**

Особи, які підлягають тестуванню	Біологічний матеріал, що підлягає дослідженню	Строки відбору біологічного матеріалу	Перелік та послідовність застосування тестів
Пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної хвороби	Верхні дихальні шляхи: носоглоткові мазки; ротоглоткові мазки; фарингальний аспірат. Нижні дихальні шляхи:	Відразу при виявленні	1.ПЛР 2.ІФА ІgМякщо ПЛР негативний 3. ІФА ІgМ при неможливості проведення ПЛР впродовж однієї доби

	мокротиння; аспірат; бронхо – альвеолярний лаваж Сироватка/плазма		
Пацієнти з пневмонією	Ротоглоткові мазки; мокротиння; аспірат; бронхо – альвеолярний лаваж Сироватка/плазма	Відразу при виявленні	1.ПЛР 2.ІФА ІgМ 3. ІФА ІgМ при неможливості проведення ПЛР впродовж однієї добы
Особи, що контактували з підтвердженим випадком	Верхні дихальні шляхи: носоглоткові мазки; ротоглоткові мазки; фарингальний аспірат Сироватка/плазма	На 14 добу після контакту	1.ПЛР 2. ІФА ІgМ, при неможливості проведення ПЛР впродовж однієї добы
Особи, які потребують планової госпіталізації та/або операції	Верхні дихальні шляхи: носоглоткові мазки; ротоглоткові мазки; фарингальний аспірат Сироватка/плазма	Перед госпіталізацією та/або операцією	1.ПЛР обов'язково для осіб з імуносупресією 2. Для інших груп ІФА ІgМ 3. ПЛР якщо ІФА позитивне
Медичні працівники, які безпосередньо надають медичну допомогу хворим або проводять догляд за хворими на COVID-19 в умовах стаціонару Працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів отримані від хворих на COVID-19 Працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які приймають участь у розтині тіла, в тому числі взятті зразків секційного матеріалу»	Сироватка/плазма Верхні дихальні шляхи: носоглоткові мазки; ротоглоткові мазки; фарингальний аспірат	1 раз на 14 днів (до отримання перших позитивних результатів у конкретної особи)	1. ІФА ІgМ та ІФА ІgG 2. ПЛР якщо ІФА позитивні

Працівники Національної поліції, Національної гвардії, Держприкордонслужби Інші медичні та фармацевтичні працівники	Сироватка/плазма Верхні дихальні шляхи: носоглоткові мазки; ротоглоткові мазки; фарингальний аспірат	1 раз на 30 днів (до отримання перших позитивних результатів у конкретної особи)	1. ІФА IgM та ІФА IgG 2. ПЛР якщо ІФА позитивні
--	--	---	--

».

2. У пункті 12 Стандарту 3. Стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 слово «двократного» виключити.

В. о. Генерального директора Директорату громадського здоров'я

Ірина ГАНЖА