

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

№ _____

Зміни до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів

Доповнити Гігієнічні нормативи і регламенти таблицею 4 такого змісту:

«Таблиця 4

№ з/п	Назва препарату	Назва діючої речовини	Допустима добова доза, мг/кг	Максимально допустимий рівень в продуктах харчування, мг/кг (мг/л)		Гранично-допустима концентрація/орієнтовно безпечний рівень впливу в повітрі робочої зони, мг/м³	Гранично-допустима концентрація/орієнтовно безпечний рівень впливу в атмосферному повітрі, мг/м³	Гранично-допустима концентрація/орієнтовно допустимий рівень у воді водойм, мг/дм³	Гранично-допустима концентрація /орієнтовно допустима концентрація у ґрунті, мг/кг	Регламенти безпечного застосування			Клас небезпечності
				культура	максимально допустимий рівень					строки, дні			
										очікування до збору врожаю	виходу на оброблені ділянки		
											ручні роботи	механізовані роботи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	«RembeK ONE» (РембеK ONE) ПР (RB)	ацетаміприд, 1 г/кг	0,01	картопля	0,025* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	не потр.	не потр.	не потр.	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				томати відкритого та закритого ґрунту	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,025)					не потр.	не потр.	не потр.	
				томатний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,01)					-	-	-	
				огірки відкритого та закритого ґрунту	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,025)					не потр.	не потр.	не потр.	
2	Азорро, КС			Контроль за карбендазимом та азоксистробіном									
		карбендазим, 300 г/л + азоксистробін, 100 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ТШХ-0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	30	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді та ґрунті)
		азоксистробін, 100 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		карбендазим, 300 г/л + азоксистробін, 100 г/л	0,01	соляшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	30	не потр.	3	
		азоксистробін, 100 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		карбендазим, 300 г/л + азоксистробін, 100 г/л	0,01	соляшник (олія)	не потр.*	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	-	-	-	
		азоксистробін, 100 г/л	0,03		не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		карбендазим, 300 г/л + азоксистробін, 100 г/л	0,01	соя (зерно)	0,15* (межа визн. ВЕРХ-0,15)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	30	не потр.	3	
		азоксистробін, 100 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		карбендазим, 300 г/л +	0,01	соє (олія)	не потр.*	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	-	-	-	
		карбендазим, 300 г/л +	0,01	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ТШХ-0,06)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	30	7	3	
		азоксистробін, 100 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
3	Акробат МЦ, ВГ	диметоморф, 90 г/кг +	0,1	Контроль за диметоморфом, манкоцебом та ЕТС						30	7	3	2 (високостій- кий у воді)
		манкоцеб, 600 г/кг	0,005	виноград ²	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04				
		диметоморф, 90 г/кг +	0,1	виноградний сік	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		манкоцеб, 600 г/кг	0,005		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,01	0,01 заг.-сан., орг.	/0,1				
		диметоморф, 90 г/кг +	0,1	картопля ²	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	20	7	3	
		манкоцеб, 600 г/кг	0,005		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,01	0,01/ заг.-сан., орг.	/0,1				
		диметоморф, 90 г/кг +	0,1	огірки ²	0,1* (межа визн. ГРХ-0,01)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	14	7	3	
		манкоцеб, 600 г/кг	0,005		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,01	0,01/ заг.-сан., орг.	/0,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		диметоморф, 90 г/кг +	0,1	томати ²	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	20	7	3	
		манкоцеб, 600 г/кг	0,005		0,5* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,01	0,01/ заг.-сан., орг.	/0,1				
		диметоморф, 90 г/кг +	0,1	томатний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		манкоцеб, 600 г/кг	0,005		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,01	0,01/ заг.-сан., орг.	/0,1				
		ЕТС (метаболіт манкоцебу)	0,0003	виноград	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	не потр.	не потр.	не нормується	не нормується	-	-	-	
				виноградний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)					-	-	-	
				картопля	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	не потр.	не потр.	не нормується	не нормується	-	-	-	
				огірки	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	не потр.	не потр.	не нормується	не нормується	-	-	-	
				томати	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	не потр.	не потр.	не нормується	не нормується	-	-	-	
				томатний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)					-	-	-	
4	АЛГЕБРА (ALGEBRA), КЕ	клетодим, 360 г/л	0,01	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1	не потр.	7	3	3
				ріпак (насіння)	0,15* (межа визн. ТШХ-0,08)					не потр.	не потр.	3	(небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки листь)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	очей)
5	АЛГЕДІ (ALGEDI), PK	дикват дибромід, 300 г/л	0,002	сосяшник ¹ (насіння)	0,5* (межа визн. ФМ- 0,05)	0,05/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	7	не потр.	3	2 (небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру та слизові оболонки очей)
				сосяшник (олія)	0,1 (межа визн. ФМ- 0,05)					-	-	-	
				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ФМ- 0,2)					7	не потр.	3	
				соя (олія)	0,1 (межа визн. ФМ- 0,05)					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. ФМ- 0,4)					7	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	
6	Алгоритм (Agorithm), KC	епоксиконазол, 187 г/л + тіофанат- метил, 310 г/л карбендазим (метаболіт тіофанат- метилу)	0,004 0,08 0,01	Контроль за епоксиконазолом та карбендазимом		Контроль за епоксиконазолом та тіофанат-метилом		Контроль за епоксиконазолом та карбендазимом		30	не потр.	3	2 (високостій- кий у воді та ґрунті)
				зерно хлібних злаків	0,1 (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.- сан.	/0,4				
					1,0* (межа визн. ТШХ-0,5)	0,1/	/0,01	0,05/орг.	/0,4				
					0,2* (межа визн. ТШХ-0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		епоксиконазол, 187 г/л +	0,004	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4	30	7	3	
		тіофанат- метил, 310 г/л	0,08		0,5* (межа визн. ТШХ-0,5)	0,1/	/0,01	0,05/орг.	/0,4				
		карбендазим (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		0,1* (межа визн. ТШХ-0,06)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
7	Алдака 480 (Aldaka 480, SL), PK	дикамби диметиламінна сіль, 640,3 г/л (у перерахунку на дикамбу (кислота) - 480 г/л)	0,004	зерно хлібних злаків	0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансл.	не потр.	не потр.	3	2 (небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру та слизові оболонки очей, високостій- кий у воді)
				кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					-	-	-	
				кукурудза (олія)	не потр.*								
				землі несільсько- господарсь- кого призначення	не потр.*					не потр.	не потр.	3	
8	Алкіон (Alcyon), KC	тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	Контроль за тербутилазином та S-метолахлором						не потр.	не потр.	7	2 (високостій- кий у воді)
				соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не потр.	не потр.	7	
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соя (олія)	не потр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
9	Алхімія (Alchemy), KE	тебуконазол, 167 г/л +	0,03	Контроль за спіроксаміном						30	не потр.	3	2 (високостій- кий у воді та ґрунті)
		тріадименол, 43 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		спіроксамін, 250 г/л	0,01		0,03* (межа визн. ГРХ-0,026)	/0,5	/0,01	/0,05 сан.-токс.	0,02/ трансл.				
					0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,03	0,02/ сан.- токс.	/0,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		тебуконазол, 167 г/л +	0,03	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	14	7	3	
		тріадименол, 43 г/л +	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,5	/0,01	/0,05 сан.-токс.	0,02/ трансл.				
		спіроксамін, 250 г/л	0,01		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,03	0,02/ сан. токс.	/0,4				
10	Альbedo (Albedo), KE	хізалофоп-п- етил, 200 г/л	0,01	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	не потр.	не потр.	3	3
				соє (олія)	не потр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					не потр.	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	
11	Альпака (Alpaca), KC	азоксистробін, 200 г/л +	0,03	Контроль за азоксистробіном та ципроконазолом						30	не потр.	3	2 (високостій- кий у воді та ґрунті)
		ципроконазол, 80 г/л	0,002	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг. сан.	/0,3				
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01				
					не потр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан. токс.	0,01				
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	35 (ячмінь)	не потр.	3	
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,1 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1	/0,01	0,03/ сан. токс.	0,01				
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соє (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не потр.	3	
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01				
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соє (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01				
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не потр.	3	
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01				
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	ріпак (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01				
12	Альтрон, КС	альфа- циперметрин, 200 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	30	не потр.	4	3 (небезпеч- ний при потраплян- ні на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)					30	не потр.	4	під на слизові оболонки очей, високостій- кий у воді)
				ріпак (олія)	1,0* (межа визн. ГРХ-0,4)					-	-	-	
				соляшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					40	не потр.	4	
				соляшник (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					-	-	-	
				соя (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)					40	не потр.	4	
				соя (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)					30	не потр.	4	
				кукурудза (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					-	-	-	
				буряки цукрові	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)					30	10	4	
				горох (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)					30	10	4	
				яблука	0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)					25	10	4	
				яблучний сік	0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Альфа-Дикват Форте, РК	дикват дибромід, 300 г/л	0,002	ріпак ріпак (олія) зерно хлібних злаків	0,4 (межа визн. СФ-0,4) 0,5 (межа визн. СФ-0,5) 0,4 (межа визн. СФ-0,4)	0,05/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	7 - 7	3 - 3	не потр. - не потр.	2
				соняшник (насіння) соняшник (олія) соя (зерно) соя (олія)	0,5 (межа визн. СФ-0,05) 0,1 (межа визн. СФ-0,05) 0,5 (межа визн. СФ-0,25) 0,1 (межа визн. СФ-0,05)					6 - 6 -	3 - 3 -	не потр. - не потр. -	
14	Альфа-Мідь, ЗП	міді гідроксид, 770 г/кг	0,05 (по міді)	яблука яблучний сік	5,0* (межа визн. атомно-емісійною спектрометрією з індуктивно-зв'язаною плазмою (ААС-ІЗП)-0,028) 5,0* (межа визн. ААС-ІЗП-0,016)	0,5/	0,03 – максимальна разова; 0,005 – середньодобова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	30 -	7 -	3 -	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
15	Анелас, КЕ			Контроль за міклобутанілом та піраклостробіном									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		міклобутаніл, 250 г/л +	0,03	яблука	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,7	/0,003	0,05/ заг.-сан.	0,35/ трансл., водн.-мігр., /0,6	30	7	3	2 (небезпеч- ний при потраплян- ні на слийзові оболонки очей, високостій- кий у ґрунті)
		піраклостробін, 250 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.					
		міклобутаніл, 250 г/л +	0,03	яблучний сік	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,7	/0,003	0,05/ заг.-сан.	0,35/ трансл., водн.-мігр., фітотокс.	-	-	-	
		піраклостробін, 250 г/л	0,03		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
16	Антихрущ, КС	імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	Контроль за імідаклопридом та біфентрином						30	10	4	3 (високостій- кий у воді та ґрунті)
		біфентрин, 100 г/л	0,02	виноград	0,07* (межа визн. ТШХ-0,07)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	виноградний сік	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		біфентрин, 100 г/л	0,02		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		біфентрин, 100 г/л	0,02		0,15 (межа визн. ГРХ-0,15)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-	
17	Ар'єргард, ВГ	римсульфурон, 250 г/кг	0,02	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,002 / заг.-сан.	/0,03	не потр.	не потр.	3	3 (небезпеч- ний при потраплян- ні на слийзові оболонки очей)
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
18	Аркєро, КС			Контроль за ацетаміпридом та біфентрином									2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ацетаміприд, 375 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан. токс.	/0,1	30	не потр.	3	(високостій- кий у воді)
		біфентрин, 165 г/л	0,02		0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетаміприд, 375 г/л +	0,01	виноград	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан. токс.	/0,1	40	7	3	
		біфентрин, 165 г/л	0,02		0,2 (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетаміприд, 375 г/л +	0,01	виноградний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2	/0,003	0,02/ сан. токс.	/0,1	-	-	-	
		біфентрин, 165 г/л	0,02		0,15 (межа визн. ГРХ-0,15)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетаміприд, 375 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан. токс.	/0,1	30	не потр.	3	
		біфентрин, 165 г/л	0,02		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетаміприд, 375 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.*	/0,2	/0,003	0,02/ сан. токс.	/0,1	-	-	-	
		біфентрин, 165 г/л	0,02		не потр.*	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетаміприд, 375 г/л +	0,01	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан. токс.	/0,1	30	не потр.	3	
		біфентрин, 165 г/л	0,02		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетаміприд, 375 г/л +	0,01	ріпак (олія)	не потр.*	/0,2	/0,003	0,02/ сан. токс.	/0,1	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		біфентрин, 165 г/л	0,02		не потр.*	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетаміпрід, 375 г/л +	0,01	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2	/0,003	0,02/ сан. токс.	/0,1	40	7	3	
		біфентрин, 165 г/л	0,02		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетаміпрід, 375 г/л +	0,01	картопля	0,025* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2	/0,003	0,02/ сан. токс.	/0,1	30	7	3	
		біфентрин, 165 г/л	0,02		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетаміпрід, 375 г/л +	0,01	томати	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2	/0,003	0,02/ сан. токс.	/0,1	20	7	3	
		біфентрин, 165 г/л	0,02		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетаміпрід, 375 г/л +	0,01	томатний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2	/0,003	0,02/ сан. токс.	/0,1	-	-	-	
		біфентрин, 165 г/л	0,02		не потр.*	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
19	Артис Плюс, КС	міклобутаніл, 125 г/л +	0,03	<i>Контроль за мікробутанілом, тебуконазолом та карбендазимом</i>		<i>Контроль за мікробутанілом, тебуконазолом та тіофанат- метилом</i>		<i>Контроль за мікробутанілом, тебуконазолом та карбендазимом</i>					2 (високостій- кий у воді та ґрунті)
		тебуконазол, 125 г/л +	0,03	яблука	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,7	/0,003	0,05/ заг.-сан.	0,35/ трансл., водн.-мігр., фітотокс.	30	7	3	
					0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		тіофанат-метил, 250 г/л	0,08		0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,08)	0,1/	/0,01	0,05/орг.	/0,4				
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
		міклобутаніл, 125 г/л +	0,03	яблучний сік	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,7	/0,003	0,05/ заг.-сан.	0,35/ трансл., водн.-мігр., фітотокс.	-	-	-	
		тебуконазол, 125 г/л +	0,03		0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		тіофанат-метил, 250 г/л	0,08		0,03* (межа визн. ВЕРХ-0,03)	0,1/	/0,01	0,05 / орг.	/0,4				
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,03* (межа визн. ТШХ-0,03)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
		міклобутаніл, 125 г/л +	0,03	соє (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,7	/0,003	0,05/ заг.-сан.	0,35/ трансл., водн.-мігр., фітотокс.	30	не потр.	3	
		тебуконазол, 125 г/л +	0,03		0,15** (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		тіофанат-метил, 250 г/л	0,08		0,5* (сума тіофанат-метилу та карбендазиму) (межа визн. ВЕРХ-0,2)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4				
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,15 (межа визн. ВЕРХ-0,15)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		міклобутаніл, 125 г/л +	0,03	соє (олія)	не потр.*	/0,7	/0,003	0,05/ заг.-сан.	0,35/ трансл., водн.-мігр., фітотокс. /1,0	-	-	-	
		тебуконазол, 125 г/л +	0,03		не потр.*	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.					
		тіофанат- метил, 250 г/л	0,08		не потр.*	0,1/	/0,01	0,05 / орг.	/0,4				
		карбендазим (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		не потр.*	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
20	Асистент Максі, КС	ацетаміприд, 400 г/л	0,01	соєшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан. токс.	/0,1	30	не потр.	3	2 (високостій- кий у воді)
				соєшник (олія)	не потр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					30	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	
21	АС-Кольд Дуо, ТН	клотіанідин, 200 г/л +	0,08	<i>Контроль за клотіанідином та альфа-циперметрином</i>						не потр. (крім надранньо- стиглих столових сортів)	не потр.	не потр.	3 (високостій- кий у воді та ґрунті)
		альфа- циперметрин, 100 г/л	0,005	картопля ²	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл., фітотокс.				
					0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	/0,1 небезпечний при погортаванні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		клотіанідин, 200 г/л +	0,08	капуста ²	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл., фітотокс.	не потр. (крім ранньо- стиглих сортів)	не потр.	не потр.	
		альфа- циперметрин, 100 г/л	0,005		0,04* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03				
		клотіанідин, 200 г/л +	0,08	томати ²	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл., фітотокс.	не потр.	не потр.	не потр.	
		альфа- циперметрин, 100 г/л	0,005		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03				
		клотіанідин, 200 г/л +	0,08	томатний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл., фітотокс.	-	-	-	
		альфа- циперметрин, 100 г/л	0,005		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03				
22	Астрел Макс (Astrel Max), СЕ	ацетохлор, 450 г/л +	0,001	Контроль за ацетохлором та тербутилазином						не потр.	не потр.	3	2 (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей, високостій- кий у воді)
		тербутилазин, 214 г/л +	0,003	соляшник (насіння)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	1,0/	/0,0001	0,002/ сан.-токс.	0,5/ водн.-мігр.				
		антидот АД-67, 45 г/л	не потр.		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		ацетохлор, 450 г/л +	0,001		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		тербутилазин, 214 г/л +	0,003	соляшник (олія)	не потр.*	1,0/	/0,0001	0,002/ сан.-токс.	0,5/ водн.-мігр.	-	-	-	
		ацетохлор, 450 г/л +	0,001		не потр.*	не потр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		антидот АД-67, 45 г/л ацетохлор, 450 г/л + тербутилазин, 214 г/л +	не потр. 0,001 0,003	кукурудза (зерно)	не потр. 0,03* (межа визн. ГРХ-0,008) 0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	не потр. 1,0/ /1,0	не потр. /0,0001 /0,05	не потр. 0,002/ сан.-токс. 0,005/ заг.-сан.	не потр. 0,5/ водн.-мігр. /0,04	не потр.	не потр.	3	
		антидот АД-67, 45 г/л ацетохлор, 450 г/л + тербутилазин, 214 г/л + антидот АД-67, 45 г/л	не потр. 0,001 0,003 не потр.	кукурудза (олія)	не потр. не потр.* не потр.* не потр.	не потр. 1,0/ /1,0 не потр.	не потр. /0,0001 /0,05 не потр.	не потр. 0,002/ сан.-токс. 0,005/ заг.-сан. не потр.	не потр. 0,5/ водн.-мігр. /0,04 не потр.	-	-	-	
23	Баскайд, КС	боскалід, 252 г/л + піраклостробін, 128 г/л боскалід, 252 г/л + піраклостробін, 128 г/л боскалід, 252 г/л +	0,04 0,03 0,04 0,03 0,04	Контроль за піраклостробіном та боскалідом						35	не потр.	3	2 (високостій- кий у воді та грунті)
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05) 0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5 /1,0	/0,01 /0,01	0,03 заг.-сан. 0,02/ заг.-сан.	/0,4 /0,6				
				соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1) не потр.*	/1,5 /1,0	/0,01 /0,01	0,03 заг.-сан. 0,02/ заг.-сан.	/0,4 /0,6	-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,01	0,03 заг.-сан.	/0,4	40	не потр.	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		піраклостробін, 128 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 252 г/л +	0,04	ріпак (олія)	не потр.*	/1,5	/0,01	0,03 заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		піраклостробін, 128 г/л	0,03		0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 252 г/л +	0,04	соє (зерно)	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01	0,03 заг.-сан.	/0,4	45	не потр.	3	
		піраклостробін, 128 г/л	0,03		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 252 г/л +	0,04	соє (олія)	не потр.*	/1,5	/0,01	0,03 заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		піраклостробін, 128 г/л	0,03		не потр.*	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
24	БЕЛЕМ 08 МГ	циперметрин, 8 г/кг	0,003	картопля ²	0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,2	0,04 – максимальна разова; 0,01 – середньо- добова/	0,006/ сан.-токс.	0,02/ трансл.	20	7	3	2
				томати ²	0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)					20	7	3	
				томатний сік	не потр.*					-	-	-	
				газони	не потр.*					не потр.	7	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Біошок, КС	хлорокис міді, 340 г/л	0,05 (по міді)	яблука	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0; межа визначення методом атомно- адсорбційної спектроскопії (далі – ААС)- 0,5)	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	30	7	3	2 (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей, алерген)
				яблучний сік	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0; ААС-0,5)					-	-	-	
26	Вайбранс Преміум 90 FS, TH	седаксан, 40 г/л + флудіоксоніл, 50 г/л	0,1 0,015	Контроль за седаксаном та флудіоксонілом						не потр.	не потр.	не потр.	2 (високостій- кий у воді)
				картопля	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,03	0,004/ заг.-сан.	/0,2				
					0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
27	ВАМП ДУО 220, КС	ацетаміприд, 115 г/л + лямбда- цигалотрин, 106 г/л	0,01 0,003	Контроль за ацетаміпридом та лямбда-цигалотрином						30	не потр.	4	2 (високостій- кий у воді)
		ацетаміприд, 115 г/л + лямбда- цигалотрин, 106 г/л	0,01 0,003	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		ацетаміприд, 115 г/л + лямбда- цигалотрин, 106 г/л	0,01 0,003	ріпак (насіння)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		ацетаміприд, 115 г/л + лямбда- цигалотрин, 106 г/л	0,01 0,003		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	не потр.	4	
		ацетаміприд, 115 г/л + лямбда- цигалотрин, 106 г/л	0,01 0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ацетаміприд, 115 г/л + лямбда- цигалотрин, 106 г/л	0,01 0,003	ріпак (олія)	не потр.*	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		ацетаміприд, 115 г/л + лямбда- цигалотрин, 106 г/л	0,01 0,003	яблука	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		ацетаміприд, 115 г/л + лямбда- цигалотрин, 106 г/л	0,01 0,003	яблука	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	45	10	4	
		ацетаміприд, 115 г/л + лямбда- цигалотрин, 106 г/л	0,01 0,003	яблучний сік	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		ацетаміприд, 115 г/л + лямбда- цигалотрин, 106 г/л	0,01 0,003	яблучний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		ацетаміприд, 115 г/л + лямбда- цигалотрин, 106 г/л	0,01 0,003	яблучний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
28	Вантакор, КС	хлорантранілі- прол, 600 г/л	0,02	кукурудза (зерно)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,5	/0,015	0,001/ заг.-сан.	/0,1	30	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді та ґрунті)
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
29	ВАСП, ВГ	ацетаміприд, 700 г/кг	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	не потр.	3	2 (високостій- кий у воді)
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)						не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	Віоліс, КС	хлорокис міді, 350 г/л	0,05 (по міді)	яблука ² яблучний сік	5,0* (межа визн. ААС-ІЗП- 0,028) 5,0* (межа визн. ААС-ІЗП- 0,016)	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	30 -	7 -	3 -	3
31	Геліос Максі, РГ	амонійна сіль гліфосату, 757 г/кг, у кислотному еквіваленті - 680 г/кг	0,01	обробка земель, відведених під пари; обробка полів, призначених під посів сільськогос- подарських культур	не потр.	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не потр.	7	3	3 (високостій- кий у воді)
32	Гемблер, КС	азоксистробін, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л	0,03 0,002	<i>Контроль за азоксистробіном та ципроконазолом</i>						35	не потр.	4	2 (високостій- кий у воді та грунті)
		азоксистробін, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л	0,03 0,002	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг. сан.	/0,3				
		азоксистробін, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л	0,03 0,002	соняшник (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01	-	-	-	-
		азоксистробін, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л	0,03 0,002	зерно хлібних злаків	не потр.	/0,1	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	35	не потр.	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,1 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1	/0,01	0,03/ сан. токс.	0,01				
33	Геокс 50 WG, ВГ	флудіоксоніл, 50 г/л	0,015	яблука	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	20	7	3	2
				яблучний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					-	-	-	
				груші	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					20	7	3	
				грушевий сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					-	-	-	
				персики	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					20	7	3	
				персиковий сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	Гліфа 480 SL, PK	гліфосату ізопропіламінна сіль, 480 г/л	0,01	осіння післязбиральна та весняна передпосівна обробка сільськогосподарських угідь, землі несільськогосподарського призначення	не потр.	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не потр.	7	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
35	ГрінДжаснт (Green-Giant), KE	піраклостробін, 250 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	30	не потр.	3	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
36	Грифон, КС	оксихлорид міді, 239,36 г/л + гідроксид міді, 236,64 г/л, в перерахунку на чисту металеву мідь, 272 г/л)	0,05 (по міді)	яблука яблучний сік виноград	5,0* (межа визн. ААС-ІЗП-0,028) 5,0* (межа визн. ААС-ІЗП-0,016) 5,0* (межа визн. ААС-ІЗП-0,028)	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньодобова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	30 - 30	7 - 7	3 - 3	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				виноградний сік	5,0* (межа визн. ААС-ІЗП-0,016)					-	-	-	
				томати	5,0* (межа визн. ААС-ІЗП-0,028)					14	7	3	
				томатний сік	5,0* (межа визн. ААС-ІЗП-0,016)					-	-	-	
				горіх волоський (ядро)	20,0* (межа визн. ААС-ІЗП-0,1)					35	7	3	
37	Дефіс, СК	диметоморф, 200 г/л +	0,1	Контроль за диметоморфом та флуазинамом						20	7	3	3 (високостійкий у воді)
				томати	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04				
		флуазинам, 200 г/л	0,01	томатний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,2	-	-	-	
		диметоморф, 200 г/л +	0,1		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04				
		флуазинам, 200 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,2				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		спіротетрамат, 100 г/л +	0,01	яблука	0,3 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,003	0,005/ заг.-сан.	/0,25	20	7	3	2
		абамектин, 20 г/л	0,0002		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3				
		спіротетрамат, 100 г/л +	0,01	яблучний сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,003	0,005/ заг.-сан.	/0,25	-	-	-	
		абамектин, 20 г/л	0,0002		не потр.	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3				
		спіротетрамат, 100 г/л +	0,01	томати	1,0 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,003	0,005/ заг.-сан.	/0,25	20	7	3	
		абамектин, 20 г/л	0,0002		0,005 (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3				
		спіротетрамат, 100 г/л +	0,01	томатний сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,003	0,005/ заг.-сан.	/0,25	-	-	-	
		абамектин, 20 г/л	0,0002		не потр.	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3				
		спіротетрамат, 100 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,9 (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,003	0,005/ заг.-сан.	/0,25	50	не потр.	3	
		абамектин, 20 г/л	0,0002		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3				
		спіротетрамат, 100 г/л +	0,01	соя (олія)	0,4 (межа визн. ВЕРХ-0,4)	/1,0	/0,003	0,005/ заг.-сан.	/0,25	-	-	-	
		абамектин, 20 г/л	0,0002		не потр.	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	Джалентра, КС	хлорантранілі-прол, 106 г/л + біфентрин, 159 г/л	0,02	<i>Контроль за хлорантраніліпролом та біфентрином</i>						30	не потр.	3	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді та ґрунті)
		хлорантранілі-прол, 106 г/л + біфентрин, 159 г/л	0,02	кукурудза (зерно)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,5	/0,015	0,001/ заг.-сан.	/0,1				
		хлорантранілі-прол, 106 г/л + біфентрин, 159 г/л	0,02	кукурудза (олія)	не потр.*	/1,5	/0,015	0,001/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-	
		хлорантранілі-прол, 106 г/л + біфентрин, 159 г/л	0,02	кукурудза (олія)	не потр.*	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		хлорантранілі-прол, 106 г/л + біфентрин, 159 г/л	0,02	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,015	0,001/ заг.-сан.	/0,1	30	не потр.	3	
		біфентрин, 159 г/л	0,02	соя (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		хлорантранілі-прол, 106 г/л + біфентрин, 159 г/л	0,02	соя (олія)	не потр.*	/1,5	/0,015	0,001/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-	
		біфентрин, 159 г/л	0,02	соя (олія)	не потр.*	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		хлорантранілі-прол, 106 г/л + біфентрин, 159 г/л	0,02	соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,015	0,001/ заг.-сан.	/0,1	30	не потр.	3	
		біфентрин, 159 г/л	0,02	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		хлорантранілі- прол, 106 г/л + біфентрин, 159 г/л	0,02 0,02	соняшник (олія)	не потр.* не потр.*	/1,5 /0,01	/0,015 /0,001	0,001/ заг.-сан. 0,005/ заг.-сан.	/0,1 /0,1	- -	- -	- -	
40	Дімілін 480, КС	дифлубензурон, 480 г/л	0,020	яблука яблучний сік капуста соняшник (насіння) соняшник (олія) соя (зерно) соя (олія)	0,05 (межа визн. ТШХ-0,03) 0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01) 0,05 (межа визн. ГРХ-0,02-0,05) 0,15 (межа визн. ГРХ-0,08) 0,1 (межа визн. ГРХ-0,1) 0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05) 0,5 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/3,0	/0,006	0,006/ заг.-сан.	/0,07	30 - 40 30 - 30 -	3 - 3 не потр. - не потр. -	1 - 1 3 - 3 -	3
41	Дінта, КС	тіаклоприд, 480 г/л	0,006	соняшник (насіння) соняшник (олія)	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02) не потр.*	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн.-мігр., фітотокс.	30 -	не потр. -	3 -	3 (високостій- кий у воді)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	Елатус PIA 358 ЕС, КЕ	пропіконазол, 208,33 г/л + солатенол, 83,3 г/л + ципроконазол, 66,67 г/л	0,04 0,01 0,002	Контроль за пропіконазолом та солатенолом						30	не потр.	3	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, алерген, високостійкий у воді та ґрунті)
				зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,01) 0,04** (межа визн. ВЕРХ-0,01) 0,05* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5/ /0,1 /0,1	/0,001 /0,002 /0,01	0,15/ орг. 0,001/ 0,03/ сан.-токс.	/0,2 /0,03 /0,01				
43	Ельбрус, КС	тіаметоксам, 141 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л	0,02 0,003	Контроль за тіаметоксатом та лямбда-цигалотрином						30	не потр.	4	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,1) 0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,5 аерозоль /0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,03 /0,001	0,04/ сан.-токс. 0,01/ сан.-токс.	/0,1 /0,05				
		тіаметоксам, 141 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л	0,02 0,003	кукурудза (олія)	не потр.* 0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,5 аерозоль /0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,03 /0,001	0,04/ сан.-токс. 0,01/ сан.-токс.	/0,1 /0,05	-	-	-	
44	Етасил, ВГ	етаметсульфрон-метил, 750 г/кг	0,02	соняшник (насіння) соняшник (олія) ріпак (насіння) ріпак (олія)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01) не потр.* 0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01) не потр.*	/1,7	/0,006	0,015/ заг.-сан.	/0,1	не потр. - не потр. -	не потр. - не потр. -	3 - 3 -	3 (високостійкий у воді)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	Етафорон, ВГ	етаметсульфурон-метил, 750 г/кг	0,02	соняшник (насіння) соняшник (олія) ріпак (насіння) ріпак (олія)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01) не потр.* 0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01) не потр.*	/1,7	/0,006	0,015/ заг.-сан.	/0,1	не потр. - не потр. -	не потр. - не потр. -	3 - 3 -	3 (високостійкий у воді) - 3 -
46	Захисник Екстра, КС			Контроль за карбендазимом (сумою тіофанат-метилу і карбендазиму) та флутріафолом		Контроль за тіофанат-метилом та флутріафолом			Контроль за тіофанат-метилом, карбендазимом, флутріафолом				3 (високостійкий у воді та ґрунті)
		тіофанат-метил, 310 г/л +	0,08	виноград	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	30	7	3	
		флутріафол, 190 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.				
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
		тіофанат-метил, 310 г/л +	0,08	виноградний сік	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	-	-	-	
		флутріафол, 190 г/л	0,01		0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		карбендазим (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	0,1/ 	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
47	Імадекс, 40 SL, РК	імазамокс, 40 г/л	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не потр.	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді)
				соняшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
48	Імацид Актив, ЕВ	імазамокс, 38 г/л + хізалофоп-п- тефурил, 30 г/л	3,0 0,005	<i>Контроль за імазамоксом та хізалофоп-п-тефурилом</i>						не потр.	не потр.	3	3 (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей, високостій- кий у воді)
		імазамокс, 38 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4				
		хізалофоп-п- тефурил, 30 г/л	0,005		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,1				
		імазамокс, 38 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		хізалофоп-п- тефурил, 30 г/л	0,005		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/0,2	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,1				
49	Імідаголд, РК	імідаклоприд, 200 г/л	0,06	зерно хлібних злаків	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	не потр. (перед- посівна обробка насіння); 30 (обробка по вегетації)	не потр.	3	2 (високостій- кий у воді)
				соняшник (насіння)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				соняшник (олія)	не потр.								
				ріпак (насіння)	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)					-	-	-	
				ріпак (олія)	не потр.								
50	Іназума, ВГ	ацетаміприд, 100 г/кг + лямбда- цигалотрин, 30 г/кг	0,01 0,003	<i>Контроль за ацетаміпридом та лямбда-цигалотрином</i>						35	не потр.	4	2 (високостій- кий у воді)
		ацетаміприд, 100 г/кг + лямбда- цигалотрин, 30 г/кг	0,01	кукурудза ¹ (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		ацетаміприд, 100 г/кг + лямбда- цигалотрин, 30 г/кг	0,003	кукурудза (олія)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		ацетаміприд, 100 г/кг + лямбда- цигалотрин, 30 г/кг	0,01	кукурудза (олія)	не потр.	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		лямбда- цигалотрин, 30 г/кг	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
51	Інверт, КЕ	абамектин, 20 г/л	0,0002	яблука	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3	20	7	3	3 (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей)
				яблучний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)					-	-	-	
				соя (зерно)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,005)					30	не потр.	3	
				соя (олія)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	Інспір Голд, КЕ	тебуконазол, 200 г/л + протиконазол, 100 г/л	0,03 0,001	Контроль за тебуконазолом, протіконазолом (1) та протіконазолом-дестіо (2)						40	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді)
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07) 0,1* (2) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,4 /0,2 (1)	/0,02 /0,003 (1)	0,025/ заг.-сан. 0,001/ (1) заг.-сан.	/1,0 /0,2 (2)				
53	К1, КС	тіаклоприд, 480 г/л	0,006	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн.-мігр., фітотокс.	30	не потр.	3	2 (високостій- кий у воді)
					ріпак (олія)	не потр.*				-	-	-	
54	Камзол Турбо, КС	ципроконазол, 80 г/л +	0,002	Контроль за ципроконазолом та метконазолом						30	не потр.	3	2 (високостій- кий у воді та ґрунті)
				зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01				
		метконазол, 60 г/л	0,001	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,002/ сан.-токс.	0,1/ водн.-мігр.	30	не потр.	3	
		ципроконазол, 80 г/л +	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01				
		метконазол, 60 г/л	0,001	соняшник (олія)	0,2 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,002/ сан.-токс.	0,1/ водн.-мігр.	-	-	-	
		ципроконазол, 80 г/л +	0,002		не потр.*	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01				
		метконазол, 60 г/л	0,001		не потр.*	/0,2	/0,001	0,002/ сан.-токс.	0,1/ водн.-мігр.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ципроконазол, 80 г/л +	0,002	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01	30	не потр.	3	
		метконазол, 60 г/л	0,001		0,2 (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,2	/0,001	0,002/ сан.-токс.	0,1/ водн.-мігр.				
		ципроконазол, 80 г/л +	0,002	ріпак (олія)	не потр.*	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01	-	-	-	
		метконазол, 60 г/л	0,001		не потр.*	/0,2	/0,001	0,002/ сан.-токс.	0,1/ водн.-мігр.				
		ципроконазол, 80 г/л +	0,002	соє (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01	30	не потр.	3	
		метконазол, 60 г/л	0,001		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,002/ сан.-токс.	0,1/ водн.-мігр.				
		ципроконазол, 80 г/л +	0,002	соє (олія)	не потр.*	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01	-	-	-	
		метконазол, 60 г/л	0,001		не потр.*	/0,2	/0,001	0,002/ сан.-токс.	0,1/ водн.-мігр.				
55	Кандопа (Sandopa), KE	трінексапак- етил, 250 г/л	0,004	<i>Контроль за сумою трінексапак-етилу та трінексапак-кислоти в перерахунку на трінексапак- етил</i>		<i>Контроль за трінексапак- етилом</i>		<i>Контроль за сумою трінексапак- етилу та трінексапак-кислоти в перерахунку на трінексапак- етил</i>		не потр.	не потр.	3	3 (небезпеч- ний при погорта- нні на слизові оболонки очей, високостій- кий у воді)
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01	0,005/ заг.-сан.	/0,6				
56	Карате Зеон 050 CS, СК	лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003	соє (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1 небезпечний при погорта- нні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05	30	не потр.	4	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				соє (олія)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)					-	-	-	
57	Катадін, КЕ	ацетаміприд, 6,4% + емамектин бензоат, 4,8%	0,01 0,001	<i>Контроль за ацетаміпридом та емамектин бензоатом</i>						14	не потр.	3	3 (небезпеч- ний при попаданні на слизові оболонки очей, (високостій- кий у воді)
		ацетаміприд, 6,4% + емамектин бензоат, 4,8%	0,01 0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		ацетаміприд, 6,4% + емамектин бензоат, 4,8%	0,01 0,001	кукурудза (олія)	не потр.*	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		ацетаміприд, 6,4% + емамектин бензоат, 4,8%	0,01 0,001	ріпак (насіння)	не потр.*	/0,1	/0,0004	0,002/ сан.-токс.	/0,3	40	не потр.	3	
		емамектин бензоат, 4,8%	0,001		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1	/0,0004	0,002/ сан.-токс.	/0,3				
		ацетаміприд, 6,4% + емамектин бензоат, 4,8%	0,01 0,001	ріпак (олія)	не потр.*	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		емамектин бензоат, 4,8%	0,001		не потр.*	/0,1	/0,0004	0,002/ сан.-токс.	/0,3				
58	Квікфос, ТБ			<i>Контроль за фосфіном</i>									1 (небезпеч-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		фосфід алюмінію, 560 г/кг		зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. індикатор- ними трубками- 0,007)	0,1/	0,01 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	0,005/ сан.-токс.	/0,4	20 ≤МДР	5-10<ГДК	5-10<ГДК	(небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру та слизові оболонки очей)
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. індикатор- ними трубками- 0,007)					20 ≤МДР	5-10<ГДК	5-10<ГДК	
				кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. індикатор- ними трубками- 0,007)					20 ≤МДР	5-10<ГДК	5-10<ГДК	
				соя (зерно)	0,05* (межа визн. індикатор- ними трубками- 0,007)					20 ≤МДР	5-10<ГДК	5-10<ГДК	
				обробка лісу (деревини) в трюмах суден, контейнерах, складах; знезаражен- ня незавантаже- жених складських приміщень						-	5-10<ГДК	5-10<ГДК	
59	Керамокс Екстра (Ceramoх XTRA), ВГ	цимоксаніл, 250 г/кг +	0,05	Контроль за фамоксодоном та цимоксанілом						20	7	3	3 (небезпеч- ний при потраплян- ні на
				картопля	0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		фамоксадон, 250 г/кг	0,01		0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4				слизові оболонки очей)
60	Клефандим, КЕ	клетодим, 240 г/л	0,01	ріпак (насіння)	0,15* (межа визн. ТШХ-0,08)	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1	не потр.	не потр.	3	3 (небезпеч- ний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				соя (зерно)	0,1 (межа визн. ТШХ-0,05)					не потр.	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,02)					не потр.	не потр.	3	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				буряки цукрові	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)					не потр.	7	3	
61	Колізей, ТН	тіаметоксам, 350 г/л	0,02	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1	не потр.	не потр.	не потр.	3 (високостій- кий у воді)
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
62	Кордус Флекс, ВГ			Контроль за дикамбою									3 (таблетки)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВГ	дикамби натрієва сіль, в перерахунку на дикамбу, 561,5 г/кг + римсульфурон, 31,3 г/кг + нікосульфурон, 62,5 г/кг + антидот ізоксадифен- етил, 31,25 г/кг	0,004 0,02 2,0 не потр.	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ, ВЕРХ-0,1) 0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05) 0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01) не потр.	1,0/ /1,0 /1,0 не потр.	/0,01 /0,01 /0,01 не потр.	0,02/ сан.-токс. 0,002/ заг.-сан. 0,001/ заг.-сан. не потр.	0,25/ трансл. /0,03 /0,2 не потр.	не потр.	не потр.	3	(необезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей, високостій- кий у воді)
		дикамби натрієва сіль, в перерахунку на дикамбу, 561,5 г/кг + римсульфурон, 31,3 г/кг +	0,004 0,02	кукурудза (олія)	не потр. не потр.	1,0/ /1,0	/0,01 /0,01	0,02/ сан.-токс. 0,002/ заг.-сан.	0,25/ трансл. /0,03	-	-	-	
		нікосульфурон, 62,5 г/кг + антидот ізоксадифен- етил, 31,25 г/кг	2,0 не потр.		не потр. не потр.	/1,0 не потр.	/0,01 не потр.	0,001/ заг.-сан. не потр.	/0,2 не потр.				
63	Кудос, ВГ	прогексадіон кальцію, 100 г/кг	0,02	яблука	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,2	30	7	3	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				яблучний сік	не потр.*					-	-	-	
				груші	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,2	30	7	3	
				грушевий сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)					-	-	-	
64	Кураж, КС	хлорантранілі- прол, 200 г/л	0,02	кукурудза (зерно)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,5	/0,015	0,001/ заг.-сан.	/0,1	20	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді та ґрунті)
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
				соняшник ¹ (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)					30	не потр.	3	
				соняшник (олія)	не потр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					35	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.*					-	-	-	
				яблука	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					25	не потр.	3	
				яблучний сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)					-	-	-	
				виноград	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					45	не потр.	3	
				виноградний сік	не потр.*					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	Лаготрин, СК	лямбда-цигалотрин, 250 г/л	0,003	зерно хлібних злаків	0,05** (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				2
				кукурудза (зерно)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)					30	не потр.	4	
				кукурудза (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					-	-	-	
				соляшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)					30	не потр.	4	
				соляшник (олія)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					30	не потр.	4	
				ріпак (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					-	-	-	
66	Лайвіт, ТН	протіоконазол, 50 г/л + дифеноконазол, 50 г/л + піраклостробін, 25 г/л	0,001 0,002 0,03	Контроль за дифеноконазолом, протіоконазолом (1) та протіоконазолом-дестіо (2)						не потр.	не потр.	не потр.	3 (високостійкий у воді)
				зерно хлібних злаків	0,1* (2) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 (1)	/0,003 (1)	0,001/ (1) заг.-сан.	/0,2 (2)				
					0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
					0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
67	Лірум 78 SC, КС	абамектин, 18 г/л +	0,0002	Контроль за циантраніліпролом						20	7	3	2
				капуста	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		циантранілі- прол, 60 г/л	0,002		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,003	0,004/ сан.-токс.	/0,3				
		абамектин, 18 г/л +	0,0002	цибуля (ріпка)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3	14	7	3	
		циантранілі- прол, 60 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,003	0,004/ сан.-токс.	/0,3				
68	Леноцет Плюс (Lenocet Plus), КС	дифлюфенікан, 100 г/л +	0,05	<i>Контроль за дифлюфеніканом та флуфенацетом</i>						не потр.	не потр.	3	2 (високостій- кий у воді та ґрунті)
		флуфенацет, 400 г/л	0,004	зерно хлібних злаків	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,5	/0,001	/0,15 сан.-токс.	/0,15				
					0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,7	/0,001	0,002/ заг.-сан., сан.-токс.	/0,2				
69	Лентагран 600 ЕС, КЕ	піридат, 600 г/л	0,002	сорго (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,002/ заг.-сан.	/0,03	не потр.	3	не потр.	3
70	Лонгас, КС	абамектин, 70 г/л +	0,0002	<i>Контроль за гекситіазоксом та абамектином</i>						30	7	3	2
				яблука	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3				
		гекситіазокс, 180 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,05	0,001/ заг.-сан.	/0,1				
		абамектин, 70 г/л +	0,0002	яблучний сік	не потр.*	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		гекситіазокс, 180 г/л	0,04		не потр.*	/0,5	/0,05	0,001/ заг.-сан.	/0,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	Луазит, КЕ	флуазифоп-п- бутил, 150 г/л	0,01	соляшник (насіння)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	не потр.	не потр.	3	3
				соляшник (олія)	не потр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)					не потр.	не потр.	3	
				ріпак (насіння)	не потр.*					-	-	-	
72	Максентіс, КС	азоксистробін, 200 г/л +	0,03	<i>Контроль за азоксистробіном, протіоконазолом-дестію (1) та протіоконазолом (2)</i>						30	не потр.	3	2 (високостій- кий у воді)
		протіоконазол, 150 г/л	0,001	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соляшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	50	не потр.	3	
		протіоконазол, 150 г/л	0,001		0,1 (1) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соляшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		протіоконазол, 150 г/л	0,001		не потр.*	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	50	не потр.	3	
		протіоконазол, 150 г/л	0,001		0,1 (1) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	ріпак (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		протіоконазол, 150 г/л	0,001		не потр.*	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	7	3	
		протіоконазол, 150 г/л	0,001		0,1 (1) (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
73	Малахіт, КС	дитіанон, 250 г/л +	0,01	яблука ²	3,0** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,5 подразнює шкіру	/0,01	0,06/ сан.-токс.	/0,3	30	7	3	2 (алерген, небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру та слизові оболонки очей)
		піриметаніл, 250 г/л	0,02		0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,02	0,04/ сан.-токс.	/0,3				
		дитіанон, 250 г/л +	0,01	яблучний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,04)	/0,5 подразнює шкіру	/0,01	0,06/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	
		піриметаніл, 250 г/л	0,02		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,02	0,04/ сан.-токс.	/0,3				
74	Маргас, ТН	імідаклоприд, 600 г/л	0,06	зерно хлібних злаків	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	не потр.	не потр.	не потр.	3 (високостій- кий у воді)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	Мега Дикват, РК	дикват дибромід, 374 г/л	0,002	соняшник ¹ (насіння) соняшник (олія) зерно хлібних злаків горох (зерно)	0,5* (межа визн. ФМ-0,05) 0,1 (межа визн. ФМ-0,05) 0,4* (межа визн. ФМ-0,4) 0,5* (межа визн. ФМ-0,025)	0,05/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	7 - 7 7	не потр. - не потр. не потр.	3 - 3 3	3 (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей)
76	Меганік, КЕ	дифенокназол, 125 г/л + протіокназол, 175 г/л дифенокназол, 125 г/л + протіокназол, 175 г/л	0,002 0,001 0,002 0,001	<i>Контроль за дифенокназолом, протіокназолом-дестіо (1) та протіокназолом (2)</i>						30 50	не потр. не потр.	3 3	3 (високостій- кий у воді та ґрунті)
				зерно хлібних злаків соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05) 0,1 (1) (межа визн. ВЕРХ-0,1) 0,05* (межа визн. ГРХ-0,05) 0,1 (1) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 /0,2 (2) /0,2 /0,2 (2)	/0,001 /0,003 (2) /0,001 /0,003 (2)	0,001/ сан.-токс. 0,001/ (2) заг.-сан. 0,001/ сан.-токс. 0,001/ (2) заг.-сан.	/0,3 /0,2 (1) /0,3 /0,2 (1)				
		дифенокназол, 125 г/л + протіокназол, 175 г/л дифенокназол, 125 г/л +	0,002 0,001 0,002	соняшник (олія) ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,4) не потр.* 0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2 /0,2 (2) /0,2	/0,001 /0,003 (2) /0,001	0,001/ сан.-токс. 0,001/ (2) заг.-сан. 0,001/ сан.-токс.	/0,3 /0,2 (1) /0,3	- 50	- не потр.	- 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		протіоконазол, 175 г/л	0,001		0,1 (1) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
		дифенокназол, 125 г/л +	0,002	ріпак (олія)	не потр.*	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	
		протіокназол, 175 г/л	0,001		не потр.*	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
		дифенокназол, 125 г/л +	0,002	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	30	7	3	
		протіокназол, 175 г/л	0,001		0,1 (1) (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
77	Мезоген (Mezogen, SC), КС	мезотріон, 480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4	не потр.	не потр.	3	2 (вискоcтій- кий у воді)
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
78	Мезонік, МД	мезотріон, 75 г/л +	0,001	Контроль за мезотріоном та нікосульфуроном						не потр.	не потр.	3	3 (вискоcтій- кий у воді)
		нікосульфурон, 30 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ (сан.-токс.)	/0,4				
					0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ (заг.-сан.)	/0,2				
		мезотріон, 75 г/л +	0,001	кукурудза (олія)	не потр.*	/0,2	/0,006	0,02/ (сан.-токс.)	/0,4	-	-	-	
		нікосульфурон, 30 г/л	2,0		не потр.*	/1,0	/0,01	0,001/ (заг.-сан.)	/0,2				
79	Мезонікс, МД	мезотріон, 100 г/л +	0,001	Контроль за мезотріоном та нікосульфуроном						не потр.	не потр.	3	3 (вискоcтій- кий у воді)
				кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		нікосульфурон, 40 г/л	2,0		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
		мезотріон, 100 г/л +	0,001	кукурудза (олія)	не потр.*	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4	-	-	-	
		нікосульфурон, 40 г/л	2,0		не потр.*	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
80	Мезонік-Стар, МД	мезотріон, 75 г/л +	0,001	<i>Контроль за мезотріоном та нікосульфуроном</i>						не потр.	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді)
		нікосульфурон, 30 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4				
		мезотріон, 75 г/л +	0,001	кукурудза (олія)	не потр.*	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4	-	-	-	
		нікосульфурон, 30 г/л	2,0		не потр.*	/1,0	/0,01	0,001 / заг.-сан.	/0,2				
81	Мекар, МЕ	абамектин, 18 г/л	0,0002	яблука	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3	14	7	3	2 (небезпеч- ний при попаданні на слизові оболонки очей)
				яблучний сік	не потр.*					-	-	-	
				виноград	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)					14	7	3	
				виноградний сік	не потр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,005)					14	7	3	
				соя (олія)	не потр.*					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	Мелоді Компакт 49 WG, ВГ	оксихлорид міді, 406 г/кг +	0,05 (по міді)	Контроль за міддю та іпровалікарбом						30	7	3	3 (небезпеч- ний при попаданні на слизові оболонки очей, високостій- кий у воді)
		іпровалікарб, 84 г/кг	0,005	виноград	5,0* (межа визн. AAC-0,5)	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.				
		оксихлорид міді, 406 г/кг +	0,05 (по міді)	виноградний сік	5,0* (межа визн. AAC-0,5)	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	-	-	-	
		іпровалікарб, 84 г/кг	0,005		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,005	0,007/ заг.-сан.	0,6/ (трансл., водно-мігр.)				
		оксихлорид міді, 406 г/кг +	0,05 (по міді)	томати	5,0* (межа визн. AAC-0,5)	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	20	7	3	
		іпровалікарб, 84 г/кг	0,005		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,005	0,007/ заг.-сан.	0,6/ (трансл., водно-мігр.)				
		оксихлорид міді, 406 г/кг +	0,05 (по міді)	томатний сік	5,0* (межа визн. AAC-0,5)	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		іпровалікарб, 84 г/кг	0,005		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,005	0,007/ заг.-сан.	0,6/ (трансл., водно-мігр.)				
		оксихлорид міді, 406 г/кг +	0,05 (по міді)	цибуля (ріпка)	5,0* (межа визн. ФМ- 2,5)	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	30	7	3	
		іпровалікарб, 84 г/кг	0,005		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,005	0,007/ заг.-сан.	0,6/ (трансл., водно-мігр.)				
83	Мерівон Про, КС	флуksапіроксад, 250 г/л +	0,02	<i>Контроль за флуksапіроксадом та піраклостробіном</i>						не потр.	не потр.	не потр.	2 (високостій- кий у воді та ґрунті)
		піраклостробін, 250 г/л	0,03	soя (зерно)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01) 0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,7 /1,0	/0,01 /0,01	0,004/ заг.-сан. 0,02/ заг.-сан.	/0,3 /0,6				
		флуksапіроксад, 250 г/л +	0,02	soя (олія)	не потр.*	/0,7	/0,01	0,004/ заг.-сан.	/0,3				
		піраклостробін, 250 г/л	0,03		не потр.*	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
84	Мілан 40, МД	нікосульфурон, 40 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2	не потр.	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді)
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
85	Міравіс Дуо 200 SC EC			<i>Контроль за адепідіном (підіфлуметофеном) та дифенокназолом</i>									3 (високостій- кий у воді)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	200 SC, KC	адепідин™ (підіфлумето- фен), 75 г/л + дифеноконазол, 125 г/л	0,03 0,002 0,03 0,002	соє (зерно) соє (олія)	0,04 (межа визн. ВЕРХ-0,01) 0,05 (межа визн. ГРХ-0,05) 0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05) 0,02 (межа визн. ГРХ-0,02)	/1,0 /0,2 /1,0 /0,2	/0,01 /0,001 /0,01 /0,001	0,002/ заг.-сан. 0,001/ сан.-токс. 0,002/ заг.-сан. 0,001/ сан.-токс.	0,06/ водн.-мігр. /0,3 0,06/ водн.-мігр. /0,3	30 -	не потр. -	3 -	(високостій- кий у воді та ґрунті)
86	Міравіс Ейс 275 SE, CE	адепідин™ (підіфлумето- фен), 150 г/л + пропіконазол, 125 г/л	0,03 0,040	Контроль за адепідином (підіфлуметофеном) та пропіконазолом						30 (пшениця); 35 (ячмінь)	не потр.	3	2 (високостій- кий у воді та ґрунті)
				зерно хлібних злаків	0,03 (межа визн. ВЕРХ-0,01) 0,1* (межа визн. ГРХ-0,01)	/1,0 0,5/	/0,01 /0,001	0,002/ заг.-сан. 0,15/ орг.	0,06/ водн.-мігр. /0,2				
87	Місол 100 FS, TH	протіконазол, 100 г/л	0,001	Контроль за протіконазолом (1) та протіконазолом-дестіо (2)						не потр.	не потр.	не потр.	2 (алерген, високостій- кий у воді)
				зерно хлібних злаків	0,1* (2) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 (1)	/0,003 (1)	0,001/ (1) заг.-сан.	/0,2 (2)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	Моддус Старт 250 DC, КД	тринексапак- етил, 250 г/л	0,004	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,5	/0,01	0,005/ заг.-сан.	/0,6	30	не потр.	3	3 (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей, високостій- кий у воді)
89	Напалм Супер, РК	гліфосату калійна сіль, 663 г/л	0,01	кукурудза ¹ (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	14 (десикант)	не потр.	3	3 (небезпеч- ний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостій- кий у воді)
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
				соє (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					14 (десикант)	не потр.	3	
				соє (олія)	не потр.*					-	-	-	
				виноград	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					не потр.	не потр.	3	
				виноградний сік	не потр.*					-	-	-	
				яблука	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					не потр.	не потр.	3	
				яблучний сік	не потр.*					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				обробка полів, призначених під посів сільсько- господарських культур; земель, відведених під пари; земель несільсько- господарсь- кого призначен- ня (смуги відчуження ліній електро- передач, газо- та нафто- проводів, узбіччя доріг, залізничні насипи)						не потр.	не потр.	3	
90	Нікопид Тотал, МД	2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 470 г/л + флорасулам, 5,5 г/л + нікосульфурон, 90 г/л	0,0001 0,05 2,0	Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2- етилгексиловим ефіром		Контроль за 2,4-Д		не потр.	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді)
				кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.				
					0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
					0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 470 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не потр.*	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	-	-	-	
		флорасулам, 5,5 г/л +	0,05		не потр.*	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
		нікосульфурон, 90 г/л	2,0		не потр.*	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
91	Оберон Рапід 240 SC, KC	спіромезифен, 228,6 г/л +	0,01	<i>Контроль за спіромезифеном</i>						30	не потр.	3	2
		абамектин, 11,4 г/л	0,0002	соняшник (насіння)	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,8	/0,002	0,0002/ сан. заг.-	/0,4				
		спіромезифен, 228,6 г/л +	0,01	соняшник (олія)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,8	/0,002	0,0002/ сан. заг.-	/0,4	-	-	-	
		абамектин, 11,4 г/л	0,0002		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,04	/0,0002	0,0003/ сан. заг.-	/0,3				
		спіромезифен, 228,6 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,8	/0,002	0,0002/ сан. заг.-	/0,4	30	не потр.	3	
		абамектин, 11,4 г/л	0,0002		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,04	/0,0002	0,0003/ сан. заг.-	/0,3				
		спіромезифен, 228,6 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,8	/0,002	0,0002/ сан. заг.-	/0,4	-	-	-	
		абамектин, 11,4 г/л	0,0002		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,04	/0,0002	0,0003/ сан. заг.-	/0,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	Овсюген Супер, КЕ	феноксапроп-п- етил, 140 г/л + антидот клоквінтосет- мексил, 47 г/л	0,01 не потр.	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2) не потр.	/0,6 не потр.	/0,002 не потр.	0,0003/ заг.-сан. не потр.	/0,04 не потр.	не потр.	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді)
93	Орвего, КС	аметоктрадин, 300 г/л + диметоморф, 225 г/л	0,2 0,1	<i>Контроль за аменоктрадином та диметоморфом</i>						20	7	3	3 (високостій- кий у воді)
		аметоктрадин, 300 г/л + диметоморф, 225 г/л	0,2 0,1	картопля ²	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,7	/0,02	0,005/ заг.-сан.	/0,6 водн.-мігр.				
		аметоктрадин, 300 г/л + диметоморф, 225 г/л	0,2 0,1	огірки ²	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,7	/0,02	0,005/ заг.-сан.	/0,6 водн.-мігр.	20	7	3	
		аметоктрадин, 300 г/л + диметоморф, 225 г/л	0,2 0,1	томати ²	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,7	/0,02	0,005/ заг.-сан.	/0,6 водн.-мігр.	20	7	3	
		аметоктрадин, 300 г/л + диметоморф, 225 г/л	0,2 0,1	томатний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,7	/0,02	0,005/ заг.-сан.	/0,6 водн.-мігр.	-	-	-	
		аметоктрадин, 300 г/л + диметоморф, 225 г/л	0,2 0,1		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	Парма, СЕ			<i>Контроль за 2,4-Д</i>		<i>Контроль за 2,4-Д 2-етилгексиловим ефіром</i>		<i>Контроль за 2,4-Д</i>		не потр.	не потр.	3	3
		2,4-Д 2-етилгексиловий ефір, 452 г/л + флорасулам, 6,25 г/л	0,0001	кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.				
			0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
		2,4-Д 2-етилгексиловий ефір, 452 г/л + флорасулам, 6,25 г/л	0,0001	кукурудза (зерно)	не потр.*	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.				
			0,05		не потр.*	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.	-	-	-	
95	Петра (Брод-страйк, Пігон), ВГ	флуметсулам, 800 г/кг	0,2	соє (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,02	0,02/ заг.-сан.	0,05/ фітотокс., водно-мігр., трансл.	не потр.	не потр.	3	3 (високостійкий у воді)
				соє (олія)	не потр.					-	-	-	
96	Піраклін, КЕ	піраклостробін, 250 г/л	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	35	не потр.	3	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				соняшник (олія)	не потр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					40	не потр.	3	
				ріпак (олія)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				соє (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					45	не потр.	3	
				соє (олія)	не потр.*					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					40	не потр.	3	
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					35	не потр.	3	
97	Пірівіо, ВГ	тіаметоксам, 250 г/л	0,02	зерно хлібних злаків	0,2 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1	30	не потр.	3	2
98	Пончо Вотіво 610 FS, ТН	клотіанідин, 508 г/л + Bacillus firmus, 102 г/л	0,08	Контроль за клотіанідином						не потр.	не потр.	не потр.	2 (високостій- кий у воді та ґрунті)
		Bacillus firmus, 102 г/л	не потр.	соєшаник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл., фітотокс.				
		клотіанідин, 508 г/л + Bacillus firmus, 102 г/л	0,08	соєшаник (олія)	не потр.	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл., фітотокс.				
99	Президент, КС	імідаклоприд, 140 г/л +	0,06	Контроль за імідаклопридом, ацетаміпридом та лямбда-цигалотрином						35	не потр.	4	3 (високостій- кий у воді)
				зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ацетаміприд, 160 г/л +	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		лямбда- цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,05** (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		імідаклоприд, 140 г/л +	0,06	ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	не потр.	4	
		ацетаміприд, 160 г/л +	0,01		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		лямбда- цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		імідаклоприд, 140 г/л +	0,06	ріпак (олія)	не потр.*	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		ацетаміприд, 160 г/л +	0,01		не потр.*	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		лямбда- цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		імідаклоприд, 140 г/л +	0,06	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	не потр.	4	
		ацетаміприд, 160 г/л +	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		лямбда-цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		імідаклоприд, 140 г/л +	0,06	соняшник (олія)	не потр.*	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		ацетаміприд, 160 г/л +	0,01		не потр.*	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		лямбда-цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
100	Пріаксор, КЕ	флуксапіроксад, 75 г/л +	0,02	<i>Контроль за флуксапіроксадом та піраклостробіном</i>						30	не потр.	3	2 (високостій- кий у воді та ґрунті)
		піраклостробін, 150 г/л	0,03	соняшник (насіння)	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,7	/0,01	0,004/ заг.-сан.	/0,3				
		флуксапіроксад, 75 г/л +	0,02	соняшник (олія)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		піраклостробін, 150 г/л	0,03		0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,7	/0,01	0,004/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		флуксапіроксад, 75 г/л +	0,02		0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
101	Продезин Комплекс, ТН	імідаклоприд, 250 г/л +	0,06	<i>Контроль за імідаклопридом, ацетаміпридом та лямбда-цигалотрином</i>						не потр.	не потр.	не потр.	3 (високостій- кий у воді та ґрунті)
		зерно хлібних злаків			0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		прохлораз, 150 г/л +	0,001		0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,1	/0,001	0,06/ сан.-токс.	/0,3				
		тебуконазол, 30 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
102	Пропігерб, КЕ	пропізохлор, 720 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не потр.	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді)
				соняшник (олія)	не потр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					не потр.	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					не потр.	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.*					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					не потр.	не потр.	3	
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
103	Пропізоцид, СЕ	прометрин, 200 г/л +	0,005	Контроль за прометрином та пропізохлором						не потр.	не потр.	3	2 (небезпеч- ний при попаданні на слизові оболонки очей, високостій- кий у воді та ґрунті)
		пропізохлор, 200 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	5,0/	/0,02	0,002/ сан.-токс.	0,5/ трансл.				
					0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		прометрин, 200 г/л +	0,005	соляшник (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	5,0/	/0,02	0,002/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	-	-	-	
		пропізохлор, 200 г/л	0,01		не потр.	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6				
104	Пумс, ЕВ	феноксапроп-п- етил, 69 г/л +	0,01	<i>Контроль за феноксапроп-п-етиом</i>						не потр.	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді)
		антидот мефенпір- діетил, 75 г/л	не потр.	зерно хлібних злаків	0,2 (межа визн. ТХШ, ВЕРХ- 0,2) не потр.	/0,6 не потр.	/0,002 не потр.	0,0003/ заг.-сан. не потр.	/0,04 не потр.				
105	Разит, КС	альфа- циперметрин, 100 г/л +	0,005	<i>Контроль за ацетаміпридом та імідаклопридом</i>						30	10	4	3 (високостій- кий у воді)
		іміаклоприд, 140 г/л +	0,06	яблука	0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при погтраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03				
		ацетаміприд, 160 г/л	0,01		0,07* (межа визн. ВЕРХ-0,07)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		альфа- циперметрин, 100 г/л +	0,005	яблучний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
					0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	/0,1 небезпечний при погтраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		іміаклоприд, 140 г/л +	0,06		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		ацетаміприд, 160 г/л	0,01		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
106	Ревікер, КЕ	мефентрифлу- коназол, 100 г/л + піраклостробін, 100 г/л	0,035 0,03	<i>Контроль за мефентрифлуконазоом та піраклостробіном</i>						30	не потр.	3	3 (небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру та слизові оболонки очей, високостій- кий у ґрунті)
				зерно хлібних злаків	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,01) 0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/05 /1,0	/0,01 /0,01	0,001/ заг.-сан. 0,02/ заг.-сан.	/0,08 /0,6				
107	Ревістар, КЕ	мефентрифлу- коназол, 100 г/л + флуксапіроксад, 50 г/л	0,035 0,02	<i>Контроль за мефентрифлуконазолом та флуксапіроксадом</i>						30	не потр.	3	2 (небезпеч- ний при попаданні на шкіру та слизові оболонки очей, високостій- кий у воді та ґрунті)
				зерно хлібних злаків	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,01) 0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,5 (межа визн. ВЕРХ-0,1) /0,7	/0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,0016) /0,01	0,001/ заг.-сан. (межа визн. ВЕРХ-0,0008) 0,004/ заг.-сан.	/0,08 (межа визн. ВЕРХ-0,04) /0,3				
108	Реглон Ейр 200 SL, РК	дикват іон, 200 г/л	0,002	ріпак (насіння) ріпак (олія)	0,4 (межа визн. СФ-0,4) 0,5 (межа визн. СФ-0,5)	0,05/ (небезпечний при потраплянні на шкіру)	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	7 -	не потр. -	3 -	2 (небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру та слизові оболонки очей)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				соняшник (насіння)	0,5 (межа визн. СФ-0,05)					6	не потр.	3	
				соняшник (олія)	0,1 (межа визн. СФ-0,05)					-	-	-	
109	Релеванс, КС			<i>Контроль за карбендазимом (сумою тіофанат-метилу та карбендазиму) та цимоксанілом</i>		<i>Контроль за тіофанат-метилом та цимоксанілом</i>		<i>Контроль за тіофанат-метилом, карбендазимом та цимоксанілом</i>					3 (високостій- кий у воді)
		тіофанат-метил, 375 г/л +	0,08	соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	30	не потр.	3	
		цимоксаніл, 225 г/л +	0,05		0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04				
		продукт ферментації Актиномицетів spp., 5 г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,15* (межа визн. ВЕРХ-0,15)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
		тіофанат-метил, 375 г/л +	0,08	соя (олія)	не потр.*	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	-	-	-	
		цимоксаніл, 225 г/л +	0,05		не потр.*	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		продукт ферментації Актиноміцетів spp., 5 г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		не потр.*	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
		тіофанат-метил, 375 г/л + цимоксаніл, 225 г/л +	0,08	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	30	не потр.	3	
			0,05		0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04				
		продукт ферментації Актиноміцетів spp., 5 г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
		тіофанат-метил, 375 г/л + цимоксаніл, 225 г/л +	0,08	соняшник (олія)	не потр.*	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	-	-	-	
			0,05		не потр.*	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04				
		продукт ферментації Актиноміцетів spp., 5 г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		карбендазим (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		не потр.*	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
110	Ридоміл Голд R 162 WG, ВГ	хлорокис міді, 141 г/кг +	0,05 (по міді)	Контроль за міддю та іпровалікарбом						30	7	3	2
		металаксил-М, 20 г/кг	0,03	виноград ²	5,0* (межа визн. ААС-0,5)	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.				
		хлорокис міді, 141 г/кг +	0,05 (по міді)	виноградний сік	5,0* (межа визн. ААС-0,5)	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	-	-	-	
		металаксил-М, 20 г/кг	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		хлорокис міді, 141 г/кг +	0,05 (по міді)	картопля ²	10,0* (межа визн. ААС-0,5)	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	20	7	3	
		металаксил-М, 20 г/кг	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		хлорокис міді, 141 г/кг +	0,05 (по міді)	цибуля (ріпка)	5,0* (межа визн. ААС-0,5)	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	14	7	3	
		металаксил-М, 20 г/кг	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		хлорокис міді, 141 г/кг +	0,05 (по міді)	кавуни	5,0 (межа визн. ААС-0,5)	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	30	7	3	
		металаксил-М, 20 г/кг	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		хлорокис міді, 141 г/кг +	0,05 (по міді)	томати ² (відкритий та закритий грунт)	5,0 (межа визн. ААС-0,5)	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	14	7	3	
		металаксил-М, 20 г/кг	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		хлорокис міді, 141 г/кг +	0,05 (по міді)	томатний сік	5,0 (межа визн. ААС-0,5)	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	-	-	-	
		металаксил-М, 20 г/кг	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		хлорокис міді, 141 г/кг +	0,05 (по міді)	огірки (відкритий та закритий грунт)	5,0 (межа визн. ААС-0,5)	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	14	7	3	
		металаксил-М, 20 г/кг	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
111	Римон Фаст, КС	новалурон, 50 г/л +	0,01	<i>Контроль за новалуроном та біфентрином</i>						30	не потр.	3	2 (високостій- кий у воді)
		біфентрин, 50 г/л	0,02	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,01	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		новалурон, 50 г/л +	0,01	ріпак (олія)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		біфентрин, 50 г/л	0,02		не потр.	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
112	Сантьяго, ТН	тіаметоксам, 262,5 г/л +	0,02	<i>Контроль за тіаметоксаом</i>						не потр.	не потр.	не потр.	2 (високостій- кий у воді)
		дифеноконазол, 25 г/л +	0,002	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1				
		флудіоксоніл, 25 г/л	0,015		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
					0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	0,2/				
113	Саньджо, КС	тіаметоксам, 141 г/л +	0,02	<i>Контроль за тіаметоксаом та лямбда-цигалотрином</i>						35	не потр.	4	
				соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1				2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		лямбда-цигалотрин, 106 г/кг	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		тіаметоksam, 141 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/кг	0,002 0,003	соняшник (олія)	не потр.*	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
					0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
114	Сатурн Дуо, МД	нікосульфурон, 40 г/л + мезотріон, 55 г/л	2,0 0,001	<i>Контроль за нікосульфуроном та мезотріоном</i>						не потр.	не потр.	3	2 (високостійкий у воді)
		нікосульфурон, 40 г/л + мезотріон, 55 г/л	2,0 0,001	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
		нікосульфурон, 40 г/л + мезотріон, 55 г/л	2,0 0,001	кукурудза (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4				
		нікосульфурон, 40 г/л + мезотріон, 55 г/л	2,0 0,001	кукурудза (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
		нікосульфурон, 40 г/л + мезотріон, 55 г/л	2,0 0,001	кукурудза (олія)	не потр.*	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4	-	-	-	
115	Серкадіс, КС	флуксапіроксад, 300 г/л	0,02	картопля ²	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,7	/0,01	0,004/ заг.-сан.	/0,3	45	7	3	3 (високостійкий у воді та ґрунті)
				виноград ²	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,01)					35	7	3	
				виноградний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	Синева, КС	міді сульфат триосновний, 345 г/л	0,05 (по міді)	яблука	5,0* (межа визн. ААС-ІЗП- 0,028)	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	30	7	3	3 (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей)
				яблучний сік	5,0* (межа визн. ААС-ІЗП- 0,016)					-	-	-	
				виноград	5,0* (межа визн. ААС-ІЗП- 0,028)					30	7	3	
				виноградний сік	5,0* (межа визн. ААС-ІЗП- 0,016)					-	-	-	
117	Сігнум, ВГ	<i>Контроль за піраклостробіном та боскалідом</i>											3 (високостій- кий у ґрунті)
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	томати ²	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	20	7	3	
		піраклостробін, 67 г/кг	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	томатний сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		піраклостробін, 67 г/кг	0,03		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	капуста ²	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	35	7	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		піраклостробін, 67 г/кг	0,03		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	сунія ²	0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	14	7	3	
		піраклостробін, 67 г/кг	0,03		0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	суничний сік	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		піраклостробін, 67 г/кг	0,03		0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	вишні ²	0,25 (межа визн. ВЕРХ-0,25)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	40	7	3	
		піраклостробін, 67 г/кг	0,03		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	вишневий сік	0,3 (межа визн. ВЕРХ-0,3)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		піраклостробін, 67 г/кг	0,03		0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	абрикоси ²	0,3 (межа визн. ВЕРХ-0,3)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	40	7	3	
		піраклостробін, 67 г/кг	0,03		0,15 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	абрикосовий сік	0,3 (межа визн. ВЕРХ-0,3)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		піраклостробін, 67 г/кг	0,03		0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
118	Сіметра 325 SC, KC	азоксистробін, 200 г/л +	0,03	<i>Контроль за азоксистробіном та ізопіразамом</i>						30	не потр.	3	2 (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей, високостій- кий у воді)
		ізопіразам, 125 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
					0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,5	/0,005	0,001/ заг.-сан.	/0,4				
119	Сінан, KC	дифенокназол, 130 г/л +	0,002	<i>Контроль за дифенокназолом та піраклостробіном</i>						40	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді)
		піраклостробін, 130 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		дифенокназол, 130 г/л +	0,002	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	35	не потр.	3	
		піраклостробін, 130 г/л	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		дифенокназол, 130 г/л +	0,002	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	-	-	-	
		піраклостробін, 130 г/л	0,03		0,4* (межа визн. ГРХ-0,4)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		дифенокназол, 130 г/л +	0,002		не потр.*	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
120	Скарабей, SE			<i>Контроль за дифлубензуроном та есфенвалераом</i>									3 (високостій- кий у воді)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		дифлубензурон, 300 г/л +	0,02	соляшник (насіння)	0,15 (межа визн. ГРХ-0,08)	/3,0	/0,006	0,006/ заг.-сан.	/0,07	35	не потр.	4	(високостіт- кий у воді)
		есфенвалерат, 88 г/л	0,003		0,05 (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,05 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,0004	0,003/ орг.	/0,1				
		дифлубензурон, 300 г/л +	0,02	соляшник (олія)	0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)	/3,0	/0,006	0,006/ заг.-сан.	/0,07	-	-	-	
		есфенвалерат, 88 г/л	0,003		0,1 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,05 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,0004	0,003/ орг.	/0,1				
		дифлубензурон, 300 г/л +	0,02	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,06)	/3,0	/0,006	0,006/ заг.-сан.	/0,07	35	не потр.	4	
		есфенвалерат, 88 г/л	0,003		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,05 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,0004	0,003/ орг.	/0,1				
		дифлубензурон, 300 г/л +	0,02	кукурудза (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/3,0	/0,006	0,006/ заг.-сан.	/0,07	-	-	-	
		есфенвалерат, 88 г/л	0,003		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,05 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,0004	0,003/ орг.	/0,1				
		дифлубензурон, 300 г/л +	0,02	ріпак (насіння)	0,15 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/3,0	/0,006	0,006/ заг.-сан.	/0,07	40	не потр.	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		есфенвалерат, 88 г/л	0,003		0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,05 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,0004	0,003/ орг.	/0,1				
		дифлубензурон, 300 г/л +	0,02	ріпак (олія)	0,5 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/3,0	/0,006	0,006/ заг.-сан.	/0,07	-	-	-	
		есфенвалерат, 88 г/л	0,003		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,05 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,0004	0,003/ орг.	/0,1				
		дифлубензурон, 300 г/л +	0,02	томати	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/3,0	/0,006	0,006/ заг.-сан.	/0,07	30	10	4	
		есфенвалерат, 88 г/л	0,003		0,1 (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,05 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,0004	0,003/ орг.	/0,1				
		дифлубензурон, 300 г/л +	0,02	томатний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/3,0	/0,006	0,006/ заг.-сан.	/0,07	-	-	-	
		есфенвалерат, 88 г/л	0,003		0,01 (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,05 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,0004	0,003/ орг.	/0,1				
		дифлубензурон, 300 г/л +	0,02	виноград	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/3,0	/0,006	0,006/ заг.-сан.	/0,07	35	10	4	
		есфенвалерат, 88 г/л	0,003		0,01 (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,05 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,0004	0,003/ орг.	/0,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		дифлубензурон, 300 г/л + есфенвалерат, 88 г/л	0,02 0,003	виноградний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01) 0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/3,0 /0,05 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,006 /0,0004	0,006/ заг.-сан. 0,003/ орг.	/0,07 /0,1	- -	- -	- -	
121	Снукер, КС	метконазол, 60 г/л	0,001	ріпак (насіння) ріпак (олія) зерно хлібних злаків	0,2** (межа визн. ГРХ-0,02) не потр.* 0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,2	/0,001	0,002/ сан.-токс.	0,1/ водн.-мігр.	50 - 30	не потр. - не потр.	3 - 3	3 (високостій- кий у воді та ґрунті)
122	Сорател, КЕ	протіоконазол, 250 г/л	0,001	Контроль за протіоконазолом (1) та протіоконазолом-дестіо (2)						30	не потр.	3	3 (небезпеч- ний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей, високостій- кий у воді)
				зерно хлібних злаків	0,1 (2) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 (1)	/0,003 (1)	0,001/ (1) заг.-сан.	/0,2 (2)	50	не потр.	3	
				соняшник (насіння)	0,1 (2) (межа визн. ГРХ-0,1)					-	не потр.	-	
				соняшник (олія)	не потр.*					30	не потр.	3	
				ріпак (насіння)	0,1 (2) (межа визн. ГРХ-0,1)					-	не потр.	-	
				ріпак (олія)	не потр.*					30	не потр.	3	
				буряки цукрові	0,1 (2) (межа визн. ГРХ-0,1)					30	не потр.	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	Спліт Дуо, КС	Контроль за дифеноконазолом та азоксистробіном											3 (високостій- кий у воді)
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	30	не потр.	3	
		азоксистробін, 250 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,02)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	ріпак (олія)	не потр.*	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	
		азоксистробін, 250 г/л	0,03		не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	соя (зерно)	0,05 (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	30	не потр.	3	
		азоксистробін, 250 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	соя (олія)	0,1 (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	
		азоксистробін, 250 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	соняшник (насіння)	0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	30	не потр.	3	
		азоксистробін, 250 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	соняшник (олія)	0,4 (межа визн. ГРХ-0,4)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	
		азоксистробін, 250 г/л	0,03		не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	30	7	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		азоксистробін, 250 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
124	Старлент, СЕ	<i>Контроль за тербутилазином та пропізохлором</i>								не потр.	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді)
		пропізохлор, 360 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6				
		тербутилазин, 190 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		пропізохлор, 360 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	-	-	-	
		тербутилазин, 190 г/л	0,003		не потр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		пропізохлор, 360 г/л +	0,01	соляшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не потр.	не потр.	3	
		тербутилазин, 190 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		пропізохлор, 360 г/л +	0,01	соляшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	-	-	-	
		тербутилазин, 190 г/л	0,003		не потр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		пропізохлор, 360 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не потр.	не потр.	3	
		тербутилазин, 190 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		пропізохлор, 360 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		тербутилазин, 190 г/л пропізохлор, 360 г/л + тербутилазин, 190 г/л	0,003 0,01 0,003 0,01 0,003	горох (зерно) нут (зерно)	не потр.* 0,2 (межа визн. ГРХ-0,2) 0,01 (межа визн. ГРХ-0,01) 0,01 (межа визн. ГРХ-0,01) 0,01 (межа визн. ГРХ-0,01)	/1,0 /1,0 /1,0 /1,0 /1,0	/0,05 /0,01 /0,05 /0,01 /0,05	0,005/ заг.-сан. 0,002/ орг. 0,005/ заг.-сан. 0,002/ орг. 0,005/ заг.-сан.	/0,04 /0,6 /0,04 /0,6 /0,04	не потр. не потр. не потр.	не потр. не потр. не потр.	3 3 3	
125	Стейт, СК	лямбда- цигалотрин, 250 г/л	0,003	зерно хлібних злаків ріпак (насіння) ріпак (олія) соя (зерно) соя (олія)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,01) 0,1 (межа визн. ГРХ-0,1) 0,2 (межа визн. ГРХ-0,05) 0,02 (межа визн. ГРХ-0,02) 0,02 (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05	30 30 - 30 -	не потр. не потр. - не потр. -	4 4 - 4 -	2
126	Стробі, ВГ	крезоксим- метил, 500 г/л	0,1	яблука ² яблучний сік	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05) 0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,05	0,3/ орг., заг.-сан.	/0,1	30 -	7 -	3 -	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	Стробифан, КЕ	піраклостробін, 130 г/л + пропіконазол, 230 г/л	0,03 0,04	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	30	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді та ґрунті)
		піраклостробін, 130 г/л + пропіконазол, 230 г/л	0,03 0,04	соняшник (олія)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	-	-	-	
128	Стронг, РК	хлормекват хлорид, 750 г/л	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ТШХ-0,05)	0,3/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,02	0,2/ сан.-токс.	/0,2	не потр.	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді)
129	Тамер, ВП	ацетаміпрід, 100 г/кг	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	35	не потр.	3	2 (високостій- кий у воді)
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
130	Тебуфан 500, КС	карбендазим, 250 г/л + тебуконазол, 120 г/л	0,01 0,03	Контроль за карбендазимом та тебуконазолом						30	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді)
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ТШХ-0,1)	0,1/ /0,4	/0,001 /0,02	0,1/ орг. 0,025/ заг.-сан.	/0,1 /1,0				
131	Теламус, КЕ			Контроль за пропіконазолом, піраклостробіном та боскалідом									3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		пропіконазол, 200 г/л +	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30	не потр.	3	(небезпеч- ний при попаданні на слизові оболонки очей, високостій- кий у воді та ґрунті)
		піраклостробін, 167 г/л +	0,03		0,2** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 133 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4				
132	Тефурицид 600, КЕ	клетодим, 120 г/л +	0,01	Контроль за клетодимом та хізалофоп-п-тефурилом						не потр.	не потр.	3	3 (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей)
		хізалофоп-п- тефурил, 40 г/л	0,005	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1				
		клетодим, 120 г/л +	3,0	соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,1				
		хізалофоп-п- тефурил, 40 г/л	0,005		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4				
					0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/0,2	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-	
133	Тіасект Контрол, КС	тіаметоксам, 250 г/л +	0,02	Контроль за тіаметоксамом та альфа-циперметрином						30	не потр.	4	3 (небезпеч- ний при попаданні на слизові оболонки очей, високостій- кий у воді)
		альфа- циперметрин, 100 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан. токс.	/0,1				
					0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг. сан.	/0,03				
134	Толазин Ультра СЕ			Контроль за S-метолахлором та тербутилазином									2 (високостій-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Златра, СЛ	S-метолахлор, 468 г/л + тербутилазин, 281 г/лн	0,01 0,003	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1) 0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,5 /1,0	/0,02 /0,05	0,02/ сан.-токс. 0,005/ заг.-сан.	/0,02 /0,04	не потр.	не потр.	3	(вискокіст- кий у воді)
		S-метолахлор, 468 г/л + тербутилазин, 281 г/лн	0,01 0,003	соняшник (олія)	не потр.* не потр.*	/0,5 /1,0	/0,02 /0,05	0,02/ сан.-токс. 0,005/ заг.-сан.	/0,02 /0,04	-	-	-	
		S-метолахлор, 468 г/л + тербутилазин, 281 г/лн	0,01 0,003	кукурудза (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05) 0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,5 /1,0	/0,02 /0,05	0,02/ сан.-токс. 0,005/ заг.-сан.	/0,02 /0,04	не потр.	не потр.	3	
		S-метолахлор, 468 г/л + тербутилазин, 281 г/лн	0,01 0,003	кукурудза (олія)	не потр.* не потр.*	/0,5 /1,0	/0,02 /0,05	0,02/ сан.-токс. 0,005/ заг.-сан.	/0,02 /0,04	-	-	-	
135	Толедо 75 FS, ТН	флуоксастробін, 37,5 г/л + протіоконазол, 37,5 г/л	0,007 0,001	Контроль за флуоксастробіном, протіоконазолом (1) та протіоконазолом-дестіо (2)						не потр.	не потр.	не потр.	2 (алерген, вискокіст- кий у воді та ґрунті)
				зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05) 0,1* (2) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0 /0,2 (1)	/0,005 /0,003 (1)	0,01/ сан.-токс. 0,001/ (1) заг.-сан.	0,4/ трансл. /0,2 (2)				
136	Топмазин Плюс (Tormazin Plus), РК	топрамезон, 50 г/л +	0,0005	Контроль за топрамезоном та дикамбою						не потр.	не потр.	3	3 (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові
				кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/0,5	/0,002	0,002/ сан.-токс.	/0,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		дикамба, 160 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансл.				слизові оболонки очей, високостій- кий у воді)
		топрамезон, 50 г/л +	0,0005	кукурудза (олія)	не потр.	/0,5	/0,002	0,002/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	
		дикамба, 160 г/л	0,004		не потр.	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансл.				
137	Трегус 500, КЕ	трінексапак- етил, 500 г/л	0,004	<i>Контроль за сумою трінексапак-етилу та трінексапак-кислоти в перерахунку на трінексапак- етил</i>		<i>Контроль за трінексапак- етилом</i>		<i>Контроль за сумою трінексапак- етилу та трінексапак-кислоти в перерахунку на трінексапак- етил</i>		не потр.	не потр.	3	2 (небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру та слизові оболонки очей, високостій- кий у воді)
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01	0,005/ заг.-сан.	/0,6				
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)								
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
138	Триггер, ВГ	трибенурон- метил, 200 г/кг	0,005	соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,1	/0,003	0,06/ сан.	/0,01	не потр.	не потр.	3	3 (небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру)
				соняшник (олія)						-	-	-	
139	Туріл, ВГ	емамектин бензоат, 100 г/кг	0,001	яблука ²	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1	/0,0004	0,002/ сан.-токс.	/0,3	14	7	3	2 (високостій- кий у воді)
				яблучний сік	не потр.*					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				капуста ²	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,005)					14	7	3	
140	Ультралін, ВГ			Контроль за цимоксанілом та азоксистробіном						30	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді)
		цимоксаніл, 300 г/кг +	0,05	соляшник (насіння)	0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04				
		азоксистробін, 250 г/кг	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		цимоксаніл, 300 г/кг +	0,05	соляшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	-	-	-	
		азоксистробін, 250 г/кг	0,03		не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		цимоксаніл, 300 г/кг +	0,05	соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	30	не потр.	3	
		азоксистробін, 250 г/кг	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		цимоксаніл, 300 г/кг +	0,05	соя (олія)	не потр.*	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	-	-	-	
		азоксистробін, 250 г/кг	0,03		не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
141	Уніко ККР, КЕ			Контроль за флуроксипіром		Контроль за флуроксипір- мептилом		Контроль за флуроксипіром		не потр.	не потр.	3	3 (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей, високостій- кий у воді)
		флуроксипір- мептил, 145 г/л +	0,2	зерно хлібних злаків	0,05 (межа визн. ГРХ-0,025)	/1,0	/0,003	0,01/ заг.-сан.	/0,2				
		флорасулам, 200 г/л	0,05		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	Фавор, КС	імідаклоприд, 333 г/л + дифеноконазол, 67 г/л + тебуконазол, 17 г/л	0,06 0,002 0,03	Контроль за імідаклопридом та дифеноконазолом						не потр.	не потр.	не потр.	3 (високостій- кий у воді)
				зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
					0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
					0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
143	Флорасулам- Стар, КС	флорасулам, 200 г/л	0,05	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.	не потр.	не потр.	3	3
144	Флорацид Актив, ВГ	трибенурон- метил, 570 г/кг + флорасулам, 190 г/кг	0,005 0,05	Контроль за трибенурон-метилом та флорасуламом						не потр.	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді)
				зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1	/0,003	0,06/ заг.-сан.	/0,01				
					0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
145	Флубен-Стар, КС	флубендіамід, 480 г/л	0,003	кукурудза (зерно) кукурудза (олія)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05) не потр.*	/0,2	/0,001	0,003/ заг.-сан.	0,25/ трансл.	30 -	не потр. -	3 -	3 (високостій- кий у воді та ґрунті)
146	Флуксіс (Fluxis, SC), КС	флутріафол, 125 г/л +	0,01	Контроль за флутріафолом та азоксистробином						30	не потр.	3	2 (високостій- кий у воді та ґрунті)
				соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		азоксистробін, 250 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		флутріафол, 125 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.*	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	-	-	-	
		азоксистробін, 250 г/л	0,03		не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		флутріафол, 125 г/л +	0,01	соє (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	35	не потр.	3	
		азоксистробін, 250 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		флутріафол, 125 г/л +	0,01	соє (олія)	не потр.*	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	-	-	-	
		азоксистробін, 250 г/л	0,03		не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
147	Флумайт, КС	дифловідазин (флуфензин), 200 г/л	0,008****	соє (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,001 (межа визн. ВЕРХ-0,001)	0,001/ заг.-сан. (межа визн. ВЕРХ-0,001)	/0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	40	не потр.	3	2
				соє (олія)	не потр.								
148	Флутрідезін, тн			Контроль за тираном									3 (високотій-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		флутріафол, 30 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	не потр.	не потр.	3	(високостій- кий у воді та ґрунті)
		тирам, 400 г/л	0,005		0,05* (межа визн. ТШХ-0,05)	0,5/	0,05 – максимальна разова; 0,02 – середньо- добова/	0,01/ сан.-токс.	/0,2				
149	Фокс 325 SC, KC			<i>Контроль за трифлуксистробіном, протіоконазолом (1) та протіоконазолом-дестіо (2)</i>						30	не потр.	3	2 (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей, алерген, високостій- кий у воді)
		трифлукси- стробін, 150 г/л +	0,02	ріпак (насіння)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,8	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1				
		протіоконазол, 175 г/л	0,001		0,1* (2) (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2 (1)	/0,003 (1)	0,001/ (1) заг.-сан.	/0,2 (2)				
		трифлукси- стробін, 150 г/л +	0,02	ріпак (олія)	не потр.*	/0,8	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-	
		протіоконазол, 175 г/л	0,001		не потр.*	/0,2 (1)	/0,003 (1)	0,001/ (1) заг.-сан.	/0,2 (2)				
150	Форпро, KE			<i>Контроль за фенпропідіном, протіоконазолом (1) та протіоконазолом-дестіо (2)</i>						30	не потр.	3	3 (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей, алерген, високостій- кий у воді)
		фенпропідин, 250 г/л +	0,005	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,03	0,03/ заг.-сан.	/0,4				
		протіоконазол, 175 г/л	0,001		0,1 (2) (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2 (1)	/0,003 (1)	0,001/ (1) заг.-сан.	/0,2 (2)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													та ґрунті)
151	Харвіста 1.3, КС	метилциклопропен, 1,3 % (17,15 г д.р./л)	0,0009	яблука	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/50,0	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	1	1	3 (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей)
				яблучний сік	не потр.*					-	-	-	
152	Хоук, ВГ	флудіоксоніл, 250 г/кг +	0,015	Контроль за флудіоксоном та ципродинілом						14	7	3	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
		ципродиніл, 370 г/кг	0,03	томати	0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
		флудіоксоніл, 250 г/кг +	0,015	томатний сік	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,05	0,02/ заг.-сан.	/0,2	-	-	-	
		ципродиніл, 370 г/кг	0,03		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
		флудіоксоніл, 250 г/кг +	0,015	лохина	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	14	7	3	
		ципродиніл, 370 г/кг	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,02/ заг.-сан.	/0,2				
153	Цилліон FC, ТН			Контроль за імідаклопридом та дифенокназолом		Контроль за імідаклопридом, дифенокназолом та флудіоксоном		Контроль за імідаклопридом та дифенокназолом					2 (високотійкий у воді)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		дифенокназол, 25 г/л +	0,002	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	не потр.	не потр.	не потр.	
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
		імідаклоприд, 350 г/л	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		дифенокназол, 25 г/л +	0,03	соє (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	
		флудіоксоніл, 25 г/л +			0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
		імідаклоприд, 350 г/л			0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		дифенокназол, 25 г/л +		соє (олія)	не потр.*	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	
		флудіоксоніл, 25 г/л +			не потр.*	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
		імідаклоприд, 350 г/л	0,002		не потр.*	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
154	Ширма, КС	флуазинам, 500 г/л	0,01	виноград	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,2	50	7	3	3
				виноградний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	небезпечний при потраплянні на шкіру				-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				яблука	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					60	7	3	
				яблучний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					-	-	-	
				картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)					20	7	3	
155	Штефрел, РК	клопіралід, 300 г/л	0,15	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ/УФ-0,1)	2,0/	/0,01	0,04/ сан.-токс.	/0,1	не потр.	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді)
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
156	ЮНІ- АЦЕТАМІП- РИД 200, КС	ацетаміприд, 200 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан. токс.	/0,1	не потр. (перед- посівна обробка)	не потр.	3	2 (високостій- кий у воді)
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					40	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					30	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.*					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					30	не потр.	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				соляшник (олія)	не потр.*					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)					30	не потр.	3	
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
157	ЮНІ- КАРБЕНДА- ЗИМ 500, КС	карбендазим, 500 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	30	не потр.	3	2 (високостій- кий у воді та ґрунті)
				ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					45	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.*								
				соляшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					50	не потр.	3	
				соляшник (олія)	не потр.*								
158	ЮНІ- ЛЯМБДА 100, СК	лямбда- цигалотрин, 100 г/л	0,003	зерно хлібних злаків	0,05** (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05	35	не потр.	4	3 (високостій- кий у воді)
				ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					30	не потр.	4	
				ріпак (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					-	-	-	
				соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)					40	не потр.	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				соє (олія)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)					30	не потр.	4	
				кукурудза (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					-	-	-	
159	ЮНІ-ПРОТІО 480, КС	протіоконазол, 480 г/л	0,001	<i>Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та протіоконазолом (2)</i>						30	не потр.	3	3 (вискоcтій- кий у воді)
				зерно хлібних злаків	0,1 (1) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
				соєшник (наcіння)	0,1 (1) (межа визн. ВЕРХ-0,1)								
				соєшник (олія)	не потр.*								
				ріпак (наcіння)	0,1*** (1) (межа визн. ВЕРХ-0,1)								
				ріпак (олія)	не потр.*								
				соє (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)								
				соє (олія)	не потр.*					-	-	-	
160	Ямато, СЕ			<i>Контроль за тіофанат- метилом, карбендазимом та тетраконазолом</i>		<i>Контроль за тіофанат-метилом та тетраконазолом</i>		<i>Контроль за тіофанат- метилом, карбендазимом та тетраконазолом</i>					2 (вискоcтій- кий у воді та ґрунті)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		тіофанат-метил, 233 г/л +	0,08	буряки цукрові	0,5* (межа визн. ТШХ-0,5)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	20	7	3	
		тетраконазол, 70 г/л +	0,002		0,03 (межа визн. ГРХ-0,015)	/0,3	/0,001	0,005/ сан.-токс.	/0,1				
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,1* (межа визн. ТШХ-0,06)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				

¹ Препарат рекомендовано для застосування авіаційним методом.

² Препарат рекомендовано для роздрібного продажу населенню.

* Державні санітарні правила та норми «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті» (ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001), затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 20 вересня 2001 р. № 137.

** EU Pesticides database.

*** Codex Maximum Residue Limits (MRLs), Codex Alimentarius Commission

**** Нормативи тимчасові.»

**В.о. Генерального директора Директорату громадського
здоров'я та профілактики захворюваності**

Олексій ДАНИЛЕНКО