

Оцінювання ризику інфікування ВІЛ статевим шляхом

Надавач послуг проводить обговорення з пацієнтом щодо оцінювання потенційних ризиків інфікування ВІЛ, розробляє індивідуальний комплекс профілактичних заходів із запобігання інфікуванню ВІЛ, зокрема пропонує ДКП для осіб, які мають високий ризик інфікування ВІЛ, інформує пацієнтів про ДКП, проводить обговорення щодо репродуктивного здоров'я (зокрема планування сім'ї), ПСШ, вакцинації від ВГВ, покращення психічного здоров'я. При оцінюванні можливості інфікування ВІЛ враховують наявність ризикованих ситуацій протягом останніх 6 місяців та визначають фактори високого ризику інфікування ВІЛ статевим шляхом:

1. Наявність статевого партнера з ВІЛ-позитивним статусом, якщо:
 - партнер з ВІЛ має визначуваний рівень ВН ВІЛ;
 - дані щодо ефективності АРТ, зокрема з результатами досліджень рівня ВН, у партнера з ВІЛ є невідомими;
 - відомо, що партнер з ВІЛ допускає пропуски прийому АРВП;
 - пара відкрито не обговорює АРТ, прихильність до АРТ та результати обстежень на ВН ВІЛ у партнера з ВІЛ-позитивним статусом.
2. Наявність статевого партнера з невідомим ВІЛ-статусом, якщо:
 - партнер не застосовує бар'єрні методи контрацепції на постійній регулярній основі та практикує ризиковану поведінку щодо інфікування ВІЛ;
 - вживає ПАР ін'єкційним шляхом;
 - вживає ПАР будь-яким шляхом, якщо це вживання призводить до неконтрольованої сексуальної поведінки;
 - практикує секс із чоловіками;
 - надає сексуальні послуги за винагороду;
 - мав/має вагінальні або анальні статеві контакти без презервативів з більш, ніж одним партнером;
 - мав/має ПСШ (що діагностовано лабораторно або за даними анамнезу отримувач лікування);
 - отримувач ПКП через ризик інфікування статевим шляхом протягом останніх 6 місяців.
3. Сексуальна активність самої особи супроводжується ризикованою поведінкою щодо інфікування ВІЛ:
 - мала/має вагінальні або анальні статеві контакти без презервативів з більш ніж одним партнером з невідомим ВІЛ-статусом протягом року;
 - мала/має статевого партнера з одним або кількома факторами щодо ризику інфікування ВІЛ (див. пункт 1 та 2);
 - вживає ПАР, якщо це вживання призводить до неконтрольованої сексуальної поведінки;

надає сексуальні послуги за винагороду;
мала/має ПСШ (що діагностовано лабораторно або за даними анамнезу/отримувала лікування);
отримувала ПКП через ризик інфікування статевим шляхом протягом останніх 6 місяців.
