

Фактори, що пов'язані з недостатньою прихильністю пацієнта до АРТ

Фактори, що безпосередньо пов'язані з пацієнтом або його найближчим оточенням:

наявність психічних захворювань та розладів (депресія, нейрокогнітивні розлади);

наявність низького рівня обізнаності з питань здоров'я, ВІЛ-інфекції, АРТ, ППМД;

відсутність підтримки з боку найближчого оточення, опікунів;

нерозкриття статусу, страх щодо стигми та дискримінації;

зловживання алкоголем та вживання ПАР;

безпритульність, бідність, стресові життєві обставини;

відсутність доступу до послуг «рівний–рівному»;

відмова прийняття ВІЛ-статусу, відмова визнавати факти, пов'язані з ВІЛ-інфекцією, хибне уявлення про токсичність АРВП, зокрема вплив на плід та здоров'я дитини;

наявність випадків, коли пацієнт забуває вчасно прийняти препарат;

наявність випадків, коли пацієнт знаходиться не вдома, зміни у щоденному розкладі;

стани, пов'язані із вагітністю, а саме – нудота та блювання;

домашнє насильство.

Фактори, що пов'язані із особливостями прийому АРТ:

велика кількість таблеток;

частота прийому понад один раз на добу;

токсичність АРВП та негативний досвід прийому АРВП через ПР;

виникнення небажаних взаємодій лікарських засобів;

залежність від вимог до харчування;

обмежений вибір педіатричних форм лікарських засобів;

органолептичні особливості (незадовільний смак лікарських засобів у рідких формах);

незручність умов зберігання лікарських засобів (наприклад, необхідність зберігання в холодильнику).

Фактори, що пов'язані із системою надання медичної допомоги та супроводу АРТ:

відсутність у суб'єкта господарювання у сфері охорони здоров'я стратегії формування та підтримки прихильності;

відсутність навичок у персоналу щодо налагодження довірливих стосунків з пацієнтами;

нестача досвіду та навичок у медичних і соціальних працівників щодо формування прихильності;

відсутність доступу до інтегрованої, комплексної допомоги, необхідність отримання послуг у багатьох закладах;

недоліки в організації надійного та зручного для пацієнта доступу до АРТ, відсутність запасів лікарських засобів у суб'єкта господарювання у сфері охорони здоров'я, що не дозволяє здійснити видачу АРВП на тривалий термін;

віддалене розташування медичного закладу, через що для отримання послуг пацієнту необхідно подолати додаткову відстань;

тривале очікування для отримання медичної допомоги та препаратів;

видача препаратів на короткі терміни, що потребує більш частого звернення пацієнта до суб'єкта господарювання у сфері охорони здоров'я задля отримання препаратів;

упереджене ставлення до ЛЖВ з боку персоналу суб'єкта господарювання у сфері охорони здоров'я;

відсутність доступу до психологічної та соціальної підтримки;

відсутність оцінювання медичними працівниками суб'єкта господарювання у сфері охорони здоров'я психічного здоров'я пацієнта та надання необхідної допомоги у разі його порушення;

недостатнє використання інформаційно-комунікаційних технологій.
