

Додаток 3
до Стандарту медичної
допомоги «ВІЛ-інфекція»
(підпункт 1 пункту 3 Розділу I)

**Розлади здоров'я, особливості ризикованої поведінки щодо інфікування
ВІЛ та способу життя, при яких доцільно надавати ПТВ**

Перелік індикаторних станів, при яких пропонують ПТВ		Рекомендована кратність ПТВ
<i>Злоякісні новоутворення</i>		
1.	Рак/дисплазія прямої кишки, рак легенів, рак шийки матки	Один раз при зверненні
2.	Лімфома (головного мозку або В-клітинна неходжкінська та інші злоякісні лімфоми)	
3.	Саркома Капоші	
<i>Бактеріальні інфекції</i>		
1.	ТБ (незалежно від клінічної форми)	При зверненні з приводу нового випадку та кожні 3–6 місяців у разі негативного результату тестування на ВІЛ
2.	Нетуберкульозна мікобактеріальна інфекція	Один раз при зверненні
3.	Рецидивуюча пневмонія (два або більше епізодів протягом одного року)	
4.	Рецидивуюча сальмонельозна бактеріємія, викликана нетифоїдною сальмонелою	
5.	Тяжкі бактеріальні інфекції (пневмонія, менінгіт, емпієма, гнійний міозит, артрит або остеомієліт, бактеріємія, тяжкі запальні захворювання малого таза тощо)	
<i>Вірусні та паразитарні інфекції</i>		
1.	Цитомегаловірусний ретиніт	Один раз при зверненні
2.	Цитомегаловірусна інфекція з ураженням інших органів (крім печінки, селезінки)	
3.	Хронічна або персистуюча інфекція, викликана вірусом простого герпесу тривалістю понад один місяць (герпетичний бронхіт, пневмонія)	

4.	Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія	
5.	Церебральний токсоплазмоз	
6.	Криптоспоридіоз (з діареєю тривалістю понад один місяць)	
7.	Мікроспоридіоз (тривалістю понад один місяць)	
8.	Ізоспороз (тривалістю понад один місяць)	
9.	Атиповий дисемінований лейшманіоз	
<i>Грибкові інфекції</i>		
1.	Пневноцистна пневмонія	Один раз при зверненні
2.	Кандидоз стравоходу, бронхів, трахеї, легенів	
3.	Криптококова інфекція (позалегенева)	
4.	Гістоплазмоз (дисемінований, позалегеневий)	
5.	Кокцидіомікоз (дисемінований, позалегеневий)	
<i>Інші інфекції, захворювання та стани</i>		
1.	ВГВ та/або ВГС	При зверненні з приводу нового випадку та кожні 3-6 місяців у разі негативного результату тестування на ВІЛ
2.	Наркотична/алкогольна залежність	Один раз при зверненні
3.	Дисплазія шийки матки	
4.	Оперізуючий лишай	
5.	Лейкопенія /тромбоцитопенія (тривалістю понад один місяць) невідомої етіології	
6.	Себорейний дерматит/недиференційовані екзантеми	
7.	Інвазивна пневмококова інфекція	
8.	Лихоманка тривалістю понад один місяць невідомої етіології	
9.	Волосиста лейкоплакія язика	
10.	Позалікарняна пневмонія	

11.	Нозокоміальна діарея		
12.	Втрата маси тіла понад 10% протягом 6 місяців невідомої етіології		
13.	Лімфоцитарний менінгіт		
14.	Тяжкі форми псоріазу		
15.	Синдром Гійєна-Барре		
16.	Мононеврити		
17.	Субкортикальна деменція		
18.	Стани, подібні захворюванню на розсіяний склероз	Один раз при зверненні	
19.	Периферична нейропатія		
20.	Лімфаденопатія невідомої етіології (безболісне збільшення (понад 1 см) лімфатичних вузлів більше ніж однієї групи (за винятком пахової) тривалістю понад один місяць)		
21.	Рецидивуючий кандидоз слизової оболонки ротової порожнини		
22.	Хронічна діарея невідомої етіології тривалістю понад один місяць		
23.	Хронічна ниркова недостатність невідомої етіології		
24.	Перед призначенням імуносупресивної терапії		
25.	Симптоми гострої ВІЛ-інфекції/мононуклеозоподібні стани		
26.	ІПСШ та симптоми ІПСШ		При зверненні з приводу нового випадку та кожні 3–6 місяців у разі негативного результату тестування на ВІЛ
27.	Відсутність протягом тривалого часу результату лікування захворювання; неможливість протягом тривалого часу встановити діагноз		
Перелік категорій та груп населення, яким пропонують ПТВ		Рекомендована кратність ПТВ	
1.	Ризикована сексуальна поведінка та/або незахищені статеві контакти з більш ніж	При кожному первинному зверненні та через 4 тижні, якщо	

	одним партнером, статеві партнери людей, які живуть з ВІЛ	ризикована поведінка тривала протягом останніх трьох місяців перед зверненням по ПТВ; у разі негативного результату тестування на ВІЛ – один раз на рік
2.	Люди, які вживають наркотики ін'єкційно	Щонайменше один раз на рік у разі негативного результату тестування на ВІЛ
3.	СП	
4.	ЧСЧ	
5.	Бездомні повнолітні особи, мігранти та внутрішньо переміщені особи	
6.	Люди, які перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, а також звільнені з них	
7.	Трансгендерні люди	
8.	Статеві партнери та партнерки людей, які живуть з ВІЛ	
9.	ВІЛ-експоновані діти, народжені жінками з ВІЛ-позитивним статусом або жінками, статус яких невідомий	Відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я
10.	Донори крові (її компонентів), інших біологічних рідин, клітин, тканин і органів людини	Відповідно до законодавства України
11.	Особи, які мали контакт з кров'ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненим ними інструментарієм, обладнанням чи предметами, зокрема у разі сексуального насильства	Відповідно до додатку 5 до цього Стандарту
12.	Недійсний результат тестування	Одразу після отримання недійсного результату тестування
13.	Невизначений (сумнівний) результат тестування	Проведення тестування через 14 діб, а у разі отримання

		повторного невизначеного результату – повторне тестування через 30 діб
14.	При зверненні з приводу взяття під медичний нагляд у зв'язку з ВІЛ-інфекцією або перед призначенням АРТ	Відповідно до законодавства України
15.	Особи, які отримують ДКП	Відповідно до додатку 4 цього Стандарту
16.	Вагітні жінки, статеві партнери вагітних жінок	Відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я
17.	Планування вагітності; планування незахищених контактів з постійним статевим партнером	Один раз на початку планування вагітності
18.	Особи, які звернулися самостійно по ПТВ для визначення власного ВІЛ-статусу, зокрема особи, які отримали позитивний результат при самотестуванні, та не належать до наведених вище категорій та груп населення	При кожному зверненні за відсутності підтвердженої інформації про перебування особи на обліку з приводу ВІЛ-інфекції