

Додаток 15
до Стандарту медичної
допомоги «ВІЛ-інфекція»
(підпункт 3 пункту 3 Розділу IV)

Клінічні стадії ВІЛ-інфекції у дорослих, підлітків та дітей (ВООЗ, 2016)

Дорослі та підлітки	Діти
Клінічна стадія I	
Безсимптомна. Персистуюча генералізована лімфаденопатія.	Безсимптомна. Персистуюча генералізована лімфаденопатія.
Клінічна стадія II	
Помірна втрата маси тіла невизначеної етіології (<10% ймовірної або визначеної маси тіла). Рецидивуючі інфекції дихальних шляхів (синусит, тонзиліт, отит середнього вуха, фарингіт). Герпес зостер. Ангулярний хейліт. Рецидивуючі виразки ротової порожнини. Папульозне свербляче висипання. Грибкова інфекція нігтів. Себорейний дерматит	Персистуюча гепатоспленомегалія невизначеної етіології. Рецидивуючі або хронічні інфекції верхніх дихальних шляхів (отит середнього вуха, оторея, синусит, тонзиліт). Герпес зостер. Лінійна еритема ясен. Рецидивуючі виразки ротової порожнини. Папульозне свербляче висипання. Грибкова інфекція нігтів. Розповсюджені (розсіяні) бородавки. Розповсюджений контагіозний моллюск. Персистуюче збільшення привушної слинної залози невизначеної етіології.
Клінічна стадія III	
Значна втрата маси тіла невизначеної етіології (>10% ймовірної або визначеної маси тіла). Хронічна діарея невизначеної етіології, що триває понад один місяць. Персистуюча лихоманка невизначеної етіології (інтермітуюча або постійна, що триває понад один місяць). Персистуючий кандидоз ротової порожнини.	Помірна недостатність харчування невизначеної етіології, що не піддається належним чином стандартному лікуванню. Персистуюча діарея невизначеної етіології (понад 14 днів). Персистуюча лихоманка невизначеної етіології (температура тіла вище 37,5 °С, інтермітуюча або постійна, що триває понад один місяць). Персистуючий кандидоз ротової порожнини (після перших шести місяців життя).
Волосиста лейкоплакія ротової порожнини. Легеневий ТБ. Тяжкі бактеріальні інфекції (пневмонія, емпієма, піоміозит, інфекція кісток або суглобів, менінгіт, бактеріємія). Гострий некротичний виразковий	Волосиста лейкоплакія ротової порожнини. ТБ лімфатичних вузлів; легеневий ТБ. Тяжка рецидивуюча бактеріальна пневмонія. Гострий некротичний виразковий гінгівіт або

Дорослі та підлітки	Діти
<p>стоматит, гінгівіт або пародонтит. Анемія (<8 г/дл), нейтропенія (<0,5×10⁹/л) та/або хронічна тромбоцитопенія (<50×10⁹/л) невизначеної етіології.</p>	<p>пародонтит. Анемія (<8 г/дл), нейтропенія (<0,5×10⁹/л) та/або хронічна тромбоцитопенія невизначеної етіології (<50×10⁹/л). Симптоматичний лімфоїдний інтерстиціальний пневмоніт. Хронічне ВІЛ-асоційоване захворювання легенів, зокрема бронхоектаз.</p>
Клінічна стадія IV	
<p>Спричинений ВІЛ-інфекцією синдром виснаження.</p> <p>Пневмонія, спричинена <i>Pneumocystis jirovecii</i>. Рецидивуюча тяжка бактеріальна пневмонія.</p> <p>Хронічна інфекція вірусу простого герпесу (оролабіальна, генітальна або аноректальна, що триває понад один місяць, з вісцеральним розташуванням у будь-якій зоні). Кандидоз стравоходу (або трахеї, бронхів чи легенів). Позалегеневий ТБ. Саркома Капоші. Цитомегаловірусна інфекція (ретиніт або інфекція інших органів).</p>	<p>Тяжке виснаження, затримка росту або тяжка недостатність харчування, що не піддається стандартному лікуванню.</p> <p>Пневмонія, спричинена <i>Pneumocystis jirovecii</i>.</p> <p>Рецидивуючі тяжкі бактеріальні інфекції (пневмонія, епієма, піоміозит, інфекція кісток або суглобів, менінгіт, але за виключенням пневмонії).</p> <p>Хронічна інфекція вірусу простого герпесу (оролабіальна або шкірна, що триває понад один місяць, з вісцеральним розташуванням у будь-якій зоні).</p> <p>Позалегеневий ТБ. Саркома Капоші. Цитомегаловірусна інфекція (ретиніт або інфекція інших органів, що розвивається у дитини віком старше одного місяця).</p>
<p>Токсоплазмоз ЦНС.</p> <p>ВІЛ-енцефалопатія. Позалегенева криптококова інфекція, зокрема менінгіт. Дисемінована нетуберкульозна мікобактеріальна інфекція. Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія. Хронічний криптоспоридіоз. Хронічний ізоспоріаз. Дисемінований мікоз (позалегеневий гістоплазмоз, кокцидіоз).</p> <p>Лімфома головного мозку або В-клітинна неходжкінська лімфома.</p>	<p>Токсоплазмоз ЦНС (після неонатального періоду). ВІЛ-енцефалопатія. Позалегенева криптококова інфекція, зокрема менінгіт. Дисемінована нетуберкульозна мікобактеріальна інфекція. Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія. Хронічний криптоспоридіоз (з діареєю). Хронічний ізоспоріаз. Дисемінований ендемічний мікоз (позалегеневий гістоплазмоз, кокцидіоз, пеніциліоз). Лімфома головного мозку або В-клітинна неходжкінська лімфома.</p>

Дорослі та підлітки	Діти
Симптоматична ВІЛ-асоційована нефропатія або кардіоміопатія. Рецидивуюча септицемія (зокрема нетифоїдний сальмонельоз). Інвазивна карцинома шийки матки. Атиповий дисемінований лейшманіоз.	ВІЛ-асоційована нефропатія або кардіоміопатія.
