

Додаток 22
до Стандарту медичної
допомоги «ВІЛ-інфекція»
(підпункт 4 пункту 3 Розділу V)

**Режими АРТ першого ряду для дітей:
рекомендовані, альтернативні та ті, які використовують за певних
обставин**

Вікова категорія	Рекомендовані режими першого ряду	Альтернативні режими першого ряду	Режими АРТ першого ряду, які використовують за певних обставин
0–4 тижні	AZT+3TC+RAL ¹	AZT+3TC+LPV/r ^e	ABC+3TC+RAL ¹ (LPV/r ^e) AZT+3TC+NVP
4 тижні – 3 роки	ABC+3TC+DTG ^a	ABC+3TC+LPV/r ABC+3TC+RAL ^b	AZT+3TC+DTG ^a AZT+3TC+RAL ^b AZT+3TC+NVP AZT+3TC+LPV/r
3–6 років	ABC+3TC+DTG	ABC+3TC+LPV/r TDF+3TC(FTC)+DTG ABC+3TC+RAL ^b	ABC+3TC+EFV ^r ABC+3TC+RAL ^b AZT+3TC+DTG AZT+3TC+EFV ^r (або NVP) AZT+3TC+LPV/r AZT+3TC+RAL ^b
6–12 років	ABC+3TC+DTG	TDF+3TC(FTC)+DTG TAF ^b +3TC(FTC)+DTG AZT+3TC+DTG	TDF+3TC(FTC)+EFV TDF+3TC(FTC)+III/r TDF+3TC(FTC)+RAL TAF ^b +3TC(FTC)+EFV TAF ^b +3TC(FTC)+III/r TAF ^b +3TC(FTC)+RAL ABC+3TC+EFV ABC+3TC+III/r AZT+3TC+EFV AZT+3TC+RAL AZT+3TC+III/r

Примітки: у схемах АРТ знак «+» відокремлює АРВП, зокрема у складі однієї таблетки, і не означає окремі форми випуску препаратів. Наприклад, комбінований препарат з фіксованим дозуванням TLD може бути відображено як TDF+3TC+DTG. 3TC та FTC є взаємозамінними лікарськими засобами, оскільки обидва препарати є аналогами цитидину, мають аналогічні фармакологічні властивості та профіль резистентності;

^a – дозування відповідно до віку та маси тіла дитини (дозволено застосування у дітей віком від 4 тижнів та з масою тіла понад 3 кг);

^b – RAL застосовують за відсутності таблетованої лікарська форма LPV/r відповідно до віку дитини;

- ^b – TAF застосовують при виявленому остеопорозі, порушеннях функції нирок та інших ПР на TDF;
- ^г – EFV не застосовують у дітей молодше трьох років;
- ^д – Немовлята, які починають АРТ за схемою із вмістом RAL, якнайшвидше мають бути переведені на режим із вмістом DTG;
- ^е – Рідкі форми LPV/г можна застосовувати у дітей віком від двох тижнів.
-