

Додаток 10
до Заходів та засобів щодо
попередження інфікування
при проведенні догляду за
пацієнтами
(пункт 8 розділу VII)

**Схеми постконтактної хіміопротекції
менінгококової інфекції**

Антимікробний препарат	Вікова група	Дозування	Тривалість і спосіб застосування
Рифампіцин	Діти до 1 місяця	5 мг/кг кожні 12 годин	Перорально протягом 2 днів
	Діти старше 1 місяця	10 мг/кг кожні 12 годин	Перорально протягом 2 днів
	Дорослі	600 мг кожні 12 годин	Перорально протягом 2 днів
Ципрофлоксацин	Дорослі	500 мг	Перорально одноразово
Цефтріаксон	Діти до 15 років	125 мг	Внутрішньом'язово одноразово
	Дорослі	250 мг	Внутрішньом'язово одноразово

Рифампіцин не рекомендований до прийому вагітними, оскільки спричиняє тератогенний вплив у лабораторних тварин. Крім того, терапія рифампіцином може знижувати ефективність оральних контрацептивів, тому рекомендовано використовувати альтернативні методи контрацепції під час прийому препарату.

Ципрофлоксацин не рекомендовано приймати дітям до 18 років, вагітним та під час грудного вигодовування, так як препарат може викликати пошкодження хрящової тканини у незрілих лабораторних тварин. Однак, за відсутності альтернативи ципрофлоксацин може використовуватися у даних груп пацієнтів, враховуючи що клінічні дослідження не доводять розвиток незворотних змін хрящової тканини або інших небажаних наслідків у людей в залежності від віку.

**Генеральний директор Директорату
громадського здоров'я**

Андрій СКПАЛЬСЬКИЙ