

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
№ _____

ДЕРЖАВНИЙ ФОРМУЛЯР

лікарських засобів

Випуск тринадцятий

Київ-2021

УДК 615.015.083.2 (477)
ISBN

Затверджено Міністерством охорони здоров'я України
Випуск тринадцятий

Редакційна колегія:

Апихтіна О.Л., Бебешко В.Г., Волошина Н.О., Гаврилюк А.О., Гончарова В.М., Грищенко М.А., Кава Т.В., Кіреєв І.В., Ковальчук Т.С., Кузьменко К.О., Лапій Ф.І., Лясковський Т.М., Ніженковська І.В., Петренко В.І., Серединська Н.М., Хайтович М.В., Ховака В.В., Чоп'як В.В., Шум С.С., Шунько Є.Є.

Д 362 Державний формуляр лікарських засобів. Випуск тринадцятий. – К. 2021.

Видання є Державним формуляром лікарських засобів. Містить рекомендації щодо раціонального призначення та використання лікарських засобів з урахуванням ефективності, безпеки та економічної доцільності їх застосування при медикаментозному лікуванні хвороб та станів.

Розрахований на лікарів всіх спеціальностей, клінічних фармакологів, провізорів, клінічних провізорів, організаторів системи охорони здоров'я, студентів вищих медичних навчальних закладів.

**Видання підготовлене
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»**

Зміст

Вступ

Колектив розробників тринадцятого випуску Державного формуляра лікарських засобів

Як користуватись Державним формуляром лікарських засобів

Зміни, внесені до тринадцятого випуску Державного формуляра лікарських засобів

Основні позначення та скорочення

- 1. Невідкладна допомога при гострих отруєннях**
- 2. Кардіологія. Лікарські засоби**
- 3. Гастроентерологія. Лікарські засоби**
- 4. Пульмонологія. Лікарські засоби, що застосовуються при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів**
- 5. Лікарські засоби, що застосовуються у лікуванні розладів психіки та поведінки**
- 6. Неврологія. Лікарські засоби**
- 7. Ендокринологія. Лікарські засоби**
- 8. Ревматологія. Лікарські засоби**
- 9. Дерматовенерологія. Лікарські засоби**
- 10. Анестезіологія та реаніматологія. Лікарські засоби**
- 11. Акушерство, гінекологія. Лікарські засоби**
- 12. Урологія, андрологія, сексопатологія, нефрологія. Лікарські засоби**
- 13. Гематологія. Лікарські засоби**
- 14. Неонатологія. Лікарські засоби**
- 15. Офтальмологія. Лікарські засоби**
- 16. Оториноларингологія. Лікарські засоби**
- 17. Протимікробні та антигельмінтні засоби**
- 18. Імуномодулятори та протиалергічні засоби**
- 19. Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутворень**
- 20. Вітаміни**
- 21. Вакцини та анатоксини**

Додаток 1. Правила виписування рецептів та вимог – замовлень на ЛЗ і виробу медичного призначення

Додаток 2. Взаємодія лікарських засобів

Додаток 3. Особливості застосування ЛЗ у жінок в період вагітності та в період лактації

Додаток 4. Особливості застосування ЛЗ при недостатності функції внутрішніх органів (печінки, нирок, легень, серця)

Додаток 5. Особливості застосування і обмеження у дітей та осіб похилого та старечого віку.

Додаток 6. Фармацевтична опіка, скерована на лікарів та медичний персонал (попередження та інформація для медичного персоналу) (при необхідності зазначити ці дані) та фармацевтична опіка, скерована на пацієнта (попередження та інформація для пацієнта)

Додаток 7. Фармаконагляд за побічними реакціями, відсутністю ефективності лікарських засобів, вакцин, туберкуліну та несприятливими подіями після вакцинації

Додаток 8. Лікарські засоби для надання паліативної та хоспісної допомоги

Додаток 9. Законодавча база формулярної системи в Україні

Додаток 10. Формуляр первинної медичної допомоги

Додаток 11. Рекомендації ВООЗ щодо сприяння раціональному використанню лікарських засобів

ВСТУП

Тринадцятий випуск Державного формуляра лікарських засобів (далі - Державний формуляр) спрямований на подальший розвиток в Україні формулярної системи лікарських засобів (далі - ЛЗ). Стаття 14-1 Основ законодавства України про охорону здоров'я визначає лікарський формуляр, тобто перелік зареєстрованих в Україні лікарських засобів, що включає ліки з доведеною ефективністю, допустимим рівнем безпеки, використання яких є економічно прийнятним, як складову системи галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.

Перегляд та оновлення Державного формуляра здійснюється відповідно до рекомендацій ВООЗ щодо створення національного формуляра, які реалізовані у наказі МОЗ України від 22.07.2009 № 529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров'я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.11.2009 за №1003/17019 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я № 429 від 26.06.2014 та від 12.08.2020 № 1856).

Метою розробки Державного формуляра лікарських засобів є створення на державному рівні та впровадження якісної формулярної системи раціональної фармакотерапії - безпечної, ефективного та економічно обґрунтованого застосування ліків через забезпечення працівників охорони здоров'я об'єктивною професійно спрямованою інформацією про них, що є вагомим складовою покращання якості та підвищення клінічної та економічної ефективності медичної допомоги.

Структура документу є традиційною і відповідає міжнародним вимогам до складання формулярів. Державний формуляр містить, зокрема, інформацію щодо фармакотерапевтичної дії, вибору, випускування, особливостей призначення, правил відпуску ЛЗ тощо.

Розробка тринадцятого випуску Державного формуляра здійснювалась за 21 основними розділами та 11 додатками. Наведення даних про рівень доказовості ефективності ЛЗ, а також їх перспективне опрацювання, є пріоритетним, проте не простим питанням, механізм реалізації якого активно розробляється та буде постійно удосконалюватись при подальшому перегляді Державного формуляра.

У тринадцятому випуску оновлено всі розділи, вилучені ЛЗ, що не були зареєстровані в Україні станом на 01.09.2020 р.

Включення до Державного формуляра нових ЛЗ з доведеною ефективністю, безпекою, базувалось на даних первинних, вторинних, третинних джерел наукової інформації у відповідності до засад доказової медицини.

Фаховий науковий супровід Державного формуляра здійснено консультативно-експертними групами, в складі яких працювали провідні спеціалісти, співробітники науково-дослідних установ, підпорядкованих НАМН та МОЗ України. Авторський колектив включає фахівців з клінічної фармації, клінічної фармакології, клініцистів, представників професійних медичних асоціацій, науковців, організаторів охорони здоров'я та ін. (детальніше – див. «Колектив розробників тринадцятого випуску Державного формуляра лікарських засобів»).

Для забезпечення публічності процесу створення даного медико-нормативного документу проект тринадцятого випуску Державного формуляра традиційно розміщується на сайтах МОЗ України, (www.moz.gov.ua) та Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» (www.dec.gov.ua) для громадського обговорення.

Розробка тринадцятого випуску Державного формуляра забезпечує впровадження багатовекторної системи раціонального використання лікарських засобів в медичній практиці. На виконання Концепції розвитку фармацевтичного сектору охорони здоров'я України на 2011 – 2020 роки, затвердженого наказом МОЗ України від 13.09.2010 № 769, із змінами, у редакції наказу МОЗ України від 27.03.2013 № 242 протягом 2008-2020 рр. в Україні створюються умови, необхідні для раціонального використання ЛЗ, зокрема впроваджена та удосконалюється державна формулярна система, яка впроваджує в медичну практику формуляри 3 рівнів:

1. Державний формуляр лікарських засобів – у вигляді керівництва, що включає перелік ЛЗ, зареєстрованих в Україні з доведеною ефективністю, допустимою безпекою та економічно вигідним використанням.
2. Регіональний формуляр лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (у форматі формулярного переліку).
3. Локальний формуляр лікарських засобів закладу охорони здоров'я (у форматі формулярного переліку).

Створення та забезпечення регулярного перегляду та оновлення формулярів ЛЗ покладено відповідно на такі структури:

1. Центральний формулярний комітет МОЗ України;
2. Регіональні формулярні комітети МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
3. Фармакотерапевтичні комісії закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності.

Авторський колектив висловлює щирі подяку за поради та рекомендації усім, хто прийняв участь в роботі над черговим випуском Державного формуляра.

Автори висловлюють надію, що тринадцятий випуск Державного формуляра принесе користь у роботі широкого кола лікарів, провізорів, клінічних провізорів, організаторів охорони здоров'я, а також у процесі підготовки студентів медичних та фармацевтичних вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації та фахівців медичної галузі на післядипломному етапі.

Колектив розробників тринадцятого випуску Державного формуляра лікарських засобів

Розділ 1. Невідкладна допомога при гострих отруєннях

Трахтенберг І.М. , <i>голова консультативно-експертної групи</i>	академік НАМНУ, член-кор. НАНУ, д.мед.н., проф.	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України», зав. лаб. промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин
Апихтіна О.Л.	к.мед.н.	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України», с.н.с.
Волошина Н.О.	к.мед.н.	Національний медичний університету ім. О.О. Богомольця (НМУ ім. О.О.Богомольця), доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
Яворовський О.П.	академік НАМНУ, д.мед.н., проф.	НМУ ім. О.О.Богомольця, зав. каф. гігієни та екології № 2
Курділь Н.В.	к.мед.н.	Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. акад. Л.І. Медведя МОЗ України, с.н.с.

Розділ 2. Кардіологія. Лікарські засоби

Сіренко Ю.М. , <i>голова консультативно-експертної групи</i>	д.мед.н., проф.	ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска», зав.від.симптоматичних гіпертензій
Бабій Л.М.	д.мед.н., проф.	ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска» провідний наук. співроб. відділу інфаркту міокарда
Іркін О.І.	д.мед.н., проф.	ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска», провідний наук. співроб. відділу реанімації та інтенсивної терапії
Зінченко Ю.В.	д.мед.н.	ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска», старший наук. співроб. відділу аритмій серця.

Розділ 3. Гастроентерологія. Лікарські засоби

Мосійчук Л. М. , <i>голова консультативно-експертної групи</i>	д.мед.н.	ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», зав. відділу захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки, дієтології та лікувального харчування, с.н.с.
Сергієнко О. І.	д.мед.н., проф.	Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО), проф. кафедри гастроентерології
Губська О. Ю.	д.мед.н., проф.	НМУ ім. О.О.Богомольця, зав. кафедри терапії, інфекційних хвороб і дерматовенерології ФПО
Осьодло Г. В.	д.мед.н., проф.	Українська військово-медична академія МО України, начальник кафедри військової терапії
Косинська С. В.	к.мед.н.	ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», доцент кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО, експерт з напрямку «гастроентерологія» ДОЗ ДОДА

Розділ 4. Пульмонологія. Лікарські засоби, що застосовуються при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів

Фещенко Ю.І. , <i>голова консультативно-експертної групи</i>	академік НАМНУ, д.мед.н., проф.	ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України», директор
Рекалова О.М.	д.мед.н.	ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України», зав. лабораторією клінічної імунології
Добрянський Д.В.	к.мед.н.	НМУ ім. О.О.Богомольця, доц. кафедри внутрішньої медицини №3
Гуменюк Г.Л.	д.мед.н., проф.	Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (НМАПО ім. П.Л.Шупика), професор кафедри фтизіатрії і пульмонології
Мостовий Ю.М.	д.мед.н., проф.	Вінницький національний медичний університет, зав. каф. пропедевтики внутрішньої медицини
Полянська М.О.	к.мед.н.	ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України», с.н.с. від. діагностики, терапії та клінічної фармакології захворювань легень
Процик Л. М.	к.мед.н.	ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України», с.н.с.

Розділ 5. Лікарські засоби, що застосовуються у лікуванні розділів психіки та поведінки

Хаустова О.О. , <i>голова консультативно-експертної групи</i>	д.мед.н., проф.	НМУ ім. О.О.Богомольця, професор кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії
Бондарчук А.Г.	к.мед.н.	НМАПО імені П.Л. Шупика, доцент кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології
Лінський І.В.	д.мед.н., проф.	Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМ України, директор
Мішиєв В.Д.	д.мед.н., проф.	НМАПО ім. П.Л. Шупика, завідувач кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології; ТМО «Психіатрія» у м. Києві, директор

Пустовойт М.М.	д.мед.н., проф.	Одеський національний медичний університет, зав. кафедри психіатрії та наркології
Суховій О.О.		ДУ «Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України», начальник відділу координації надання допомоги з охорони психічного здоров'я на рівні громади, первинної медичної допомоги та реабілітації

Розділ 6. Неврологія. Лікарські засоби

Соколова Л.І., голова консультативно-експертної групи	д.мед.н., проф.	НМУ ім. О.О.Богомольця, зав.каф. неврології
Дубенко А.Є.	д.мед.н., проф.	ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології» НАМНУ, відділ судинної патології головного мозку, провідний н.с.
Ткаченко О.В.	д.мед.н., проф.	НМАПО ім. П.Л.Шупика, зав. каф. неврології №2
Гриб В. А.	д.мед.н., проф.	Івано-Франківський національний медичний університет, зав. кафедри неврології та нейрохірургії
Антоненко К. В.	к.мед.н.	НМУ ім. О.О.Богомольця, доцент кафедри неврології

Розділ 7. Ендокринологія. Лікарські засоби

Тронько М.Д., голова консультативно-експертної групи	академік НАМНУ, член-кор. НАНУ, д.мед.н., проф.	віце-президент НАМНУ, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України», директор, зав.каф.ендокринології НМАПО ім. П.Л.Шупика
Резніков О.Г.	академік НАМНУ, член-кор. НАНУ, д.мед.н., проф.	ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України», зав.відділу ендокринології репродукції та адаптації
Маньковський Б.М.	член-кор. НАМНУ, д.мед.н., проф.	НМАПО ім. П.Л.Шупика, зав. каф. діабетології
Орленко В.Л.	д.мед.н.	ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України», зав. науково-консультативного відділу, ст.н.с.
Ховака В.В.	к.мед.н.	ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України», відділ вікової ендокринології та клінічної фармакології, ст.н.с.

Розділ 8. Ревматологія. Лікарські засоби

Яременко О.Б., голова консультативно-експертної групи	д.мед.н., проф.	НМУ ім. О.О.Богомольця, зав. каф. внутрішньої медицини № 3
Борткевич О.П.	д.мед.н., проф.	ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад.М.Д.Стражеска» НАМН України», головний н.с. відділу ревматології та некоронарогенних захворювань серця
Станіславчук М.А.	д.мед.н., проф.	Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, зав. каф. факультетської терапії №1
Федьков Д.Л.	к.мед.н.	НМУ ім. О.О.Богомольця, доцент кафедри внутрішньої медицини № 3
Сміян С.І.	д.мед.н., проф.	Тернопільський державний медичний університет ім. І.Горбачевського, зав. каф. внутрішньої медицини

Розділ 9. Дерматовенерологія. Лікарські засоби

Степаненко В.І., голова консультативно-експертної групи	д.мед.н., проф.	НМУ ім. О.О. Богомольця, зав. каф. дерматології та венерології
Головченко Д.Я.	к.мед.н.	НМУ ім. О.О. Богомольця, доц. каф. дерматології та венерології
Наумова Л.О.	к.мед.н.	НМУ ім. О.О. Богомольця, асистент каф. дерматології та венерології
Міхєєв О.Г.	к.мед.н.	НМУ ім. О.О. Богомольця, доц. каф. дерматології та венерології
Степаненко Р.Л.	д.мед.н.	НМУ ім. О.О. Богомольця, доц. каф. дерматології та венерології

Розділ 10. Анестезіологія та реаніматологія. Лікарські засоби

Мазур А.П., голова консультативно-експертної групи	д.мед.н., проф.	Національний Інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова НАМН України, керівник відділу анестезіології та інтенсивної терапії
Кобеляцький Ю.Ю.	д.мед.н., проф.	Дніпропетровська Державна медична академія, зав. кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
Лісний І.І.	д.мед.н., проф.	Національний інститут раку, зав. відділу анестезіології та інтенсивної терапії
Підгірний Я.М.	д.мед.н., проф.	Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького (ЛНМУ ім. Данила Галицького), зав. каф. анестезіології та інтенсивної терапії

Розділ 11. Акушерство, гінекологія. Лікарські засоби

Жук С.І., голова консультативно-експертної групи	д.мед.н., проф.	НМАПО ім. П.Л.Шупика, зав. каф. акушерства, гінекології та медицини плода
Татарчук Т.Ф.	член-кор. НАМНУ, д.мед.н., проф.	ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», зав. від. ендокринної гінекології

Камінський В.В.	член-кор. НАМНУ, д.мед.н., проф.	НМАПО ім. П.Л.Шупика, зав. кафедрою акушерства, гінекології та репродуктології, директор Київського Міського Центру Репродуктивної та Перинатальної Медицини
Венцківська І.Б.	д.мед.н., проф.	НМУ ім.О.О.Богомольця, проф. кафедри акушерства і гінекології № 1
Шляхтіна А.О.		НМАПО ім. П.Л.Шупика, старший лаборант каф. акушерства, гінекології та медицини плода

Розділ 12. Урологія, андрологія, сексопатологія та нефрологія. Лікарські засоби

Возіанов С.О., <i>голова консультативно-експертної групи</i>	член-кор. НАМНУ, д.мед.н.проф.	ДУ «Інститут урології НАМН України», директор
Горпінченко І.І.	д.мед.н., проф.	ДУ «Інститут урології НАМН України», зав. відділу сексології та андрології, НМАПО ім. Шупика, професор кафедри урології
Пасєчніков С.П.	д.мед.н., проф.	ДУ «Інститут урології НАМН України», зав.відділу запальних захворювань нирки, НМУ ім. О.О.Богомольця, зав. кафедри урології
Черненко В.В.	д.мед.н., проф.	ДУ «Інститут урології НАМН України», зав. відділу сечокам'яної хвороби
Дудар І.О.	д.мед.н., проф.	ДУ «Інститут нефрології НАМН України», зав. відділу еферентних технологій
Желтовська Н.І.	п.н.с., к.б.н.	ДУ «Інститут нефрології НАМН України», відділ ендоскопічної урології та літотрипсії

Розділ 13. Гематологія. Лікарські засоби

Перехрестенко П.М. <i>голова консультативно-експертної групи</i>	д.мед.н., проф.	ДУ «Інститут гематології і трансфузіології НАМН України», зав. від. організації трансфузіологічної та гематологічної допомоги, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки
Бєбешко В.Г.	член-кор. НАМНУ, д.мед.н., проф.	ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», радник Генерального директора, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки
Бруслова К.М.	д.мед.н., проф.	ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», зав.відділенням радіаційної гематології дитячого віку
Перехрестенко Т.П.	д.мед.н.	ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», с.н.с.
Видиборець С.В.	д.мед.н., проф.	НМАПО ім. П.Л. Шупика, завідувач кафедри гематології та трансфузіології

Розділ 14. Неонатологія. Лікарські засоби

Аряєв Н.Л., <i>голова консультативно-експертної групи</i>	член-кор. НАМНУ, д.мед.н., проф.	Одеський державний медичний університет, зав. кафедри педіатрії №1
Знаменська Т.К.	д.мед.н., проф.	ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України», заступник директора з перинатальної медицини інституту, завідувача відділення неонатології
Добрянський Д.О.	д.мед.н., проф.	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, професор кафедри педіатрії № 2
Похилько В.І.	д.мед.н., проф.	Українська медична стоматологічна академія, Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, кафедра педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією, Заслужений лікар України
Яблонь О.С.	д.мед.н., проф.	Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, завідувач кафедра педіатрії №1

Розділ 15. Офтальмологія. Лікарські засоби

Пасєчнікова Н.В. <i>голова консультативно-експертної групи</i>	Член-кор. НАМНУ, д.мед.н., проф.	ДУ «Інститут очних хвороб та тканинної терапії НАМН України», директор
Вітовська О.П.	д.мед.н., проф.	НМУ імені О.О. Богомольця, професор кафедри офтальмології
Зборовська О.В.	д.мед.н.	ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії НАМН України», зав. від. запальних захворювань ока та мікрохірургічного лікування їх наслідків
Знаменська М.А.	д.мед.н.	ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України», п.н.с.відділення метаболічних порушень та вад розвитку плода
Гладуш Т.І.	к.мед.н.	Поліклініка МВС України, начальник

Розділ 16. Оториноларингологія. Лікарські засоби

Заболотний Д.І. <i>голова консультативно-експертної групи</i>	академік НАМНУ, д.мед.н., проф.	віце-президент НАМНУ, ДУ «Інститут отоларингології ім.проф. О.С.Коломійченка НАМН України», директор, Заслужений діяч науки і техніки України
Зарицька І.С.	к.мед.н.	ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України», п.н.с. від. запальних захворювань ЛОР-органів
Рильська О.Г.	к.мед.н.	ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН

		України», с.н.с. від. запальних захворювань ЛОР-органів
Смагіна Т.В.	к.мед.н.	ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України», н.с. відділу запальних захворювань ЛОР-органів
Нестерчук В.І.	к.мед.н.	ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України», ст.н.с. відділення запальних захворювань ЛОР-органів з групою ендоскопії

Розділ 17. Протимікробні та антигельмінтні засоби

Широбоков В.П. <i>голова консультативно-експертної групи</i>	акад. НАНУ, акад. НАМНУ, проф. д.мед.н.	НМУ ім. О.О. Богомольця, зав. кафедри мікробіології, вірусології та імунології
Шилов М.В.	к.мед.н.	НМУ ім. О.О. Богомольця, доц. кафедри мікробіології, вірусології та імунології

Розділ 18. Імуномодулятори та протиалергічні засоби

Бутенко Г.М. <i>голова консультативно-експертної групи</i>	академік НАМНУ, д.мед.н., проф.	ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України», директор, консультант Центру
Чоп'як В.В.	д.мед.н., проф.	Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, зав. каф. клінічної імунології та алергології, консультант Центру
Чернишова Л.І.	д.мед.н., проф.	НМАПО ім. П.Л.Шупика, зав. кафедри дитячих інфекційних хвороб
Кайдашев І.П.	д.мед.н., проф.	Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія", зав. кафедри внутрішньої медицини № 3, проректор з наукової роботи
Господарський І.Я.	д.мед.н., проф.	ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського», зав. кафедри загального догляду за хворими з курсом клінічної імунології та алергології
Уманець Т.Р.	к.мед.н.	ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», провідний спеціаліст відділення проблем алергії та імунореабілітації дітей, с.н.с.
Курченко А.І.	д.мед.н., проф.	НМУ ім. О.О. Богомольця, зав. кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики
Мельников О.Ф.	д.мед.н., проф.	ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», керівник лабораторія патофізіології та імунології

Розділ 19. Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутворень

Чешук В.Є. <i>голова консультативно-експертної групи</i>	д.мед.н., проф.	НМУ ім.Богомольця, проф.кафедри онкології
Шляховенко В.О.	д.мед.н., проф.	Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, зав. від. ензимології пухлин
Шарикіна Н.І.	д.мед.н., проф.	ДУ «Інститут фармакології та токсикології» НАМН України, зав. відділу онкофармакології
Пономарьова О.В.	к.мед.н.	НМАПО ім. П.Л.Шупика, кафедра онкології, с.н.с.
Міщенко О.Ю.	к.мед.н.	ДНУ "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами, с.н.с.

Розділ 20. Вітаміни та мінеральні речовини

Резніков О.Г. , <i>голова консультативно-експертної групи</i>	академік НАМНУ, член-кор. НАНУ, д.мед.н., проф.	ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України», зав. відділу ендокринології репродукції та адаптації
Бойцова Л.В.	к.біол.н.	ДУ «Інститут токсикології та фармакології НАМН України», с.н.с. відділу експериментальної терапії
Поворознюк В.В.	д.мед.н., проф.	ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України», керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату
Корзун В.Н.	д.мед.н., проф.	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», гол.н.с.лабораторії профілактики аліментарно-залежних захворювань
Гулич М.П.	д.мед.н., проф.	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», зав. лаб. профілактики аліментарно-залежних захворювань

Розділ 21. Вакцини та анатоксини

Задорожна В.І. , <i>голова консультативно-експертної групи</i>	Член-кор. НАМНУ, д.мед.н., проф.	ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського НАМН України», директор
Васильсва В.А.	к.мед.н.	ДЕЦ МОЗ України, заступник директора з питань фармаконагляду
Сахнюк О.М.		ДЕЦ МОЗ України, начальник відділу експертизи препаратів крові та вакцин
Шагінян В.Р.	д.мед.н.	ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського НАМН України», керівник Центру діагностики інфекційних та

		паразитарних хвороб, с.н.с.
Винник Н.П.	к.мед.н.	ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського НАМН України», вчений секретар
Маричев І.Л.	к.мед.н.	ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського НАМН України», с.н.с. лабораторії епідеміологічного аналізу та вакцинопрофілактики
Максименко О.В.	к.біол.н.	ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського НАМН України», лабораторія епідеміології парентеральних вірусних гепатитів та ВІЛ-інфекції, с.н.с.

Розробка додатків 1, 7 та 9

Хоромська О.Л.		начальник управління фармаконагляду Центру
Ковальчук Т.С.		начальник організаційно-комунікаційного відділу Департаменту оцінки медичних технологій Центру

Розробка додатку 8

Лісний І.І., голова консультативно-експертної групи	д.мед.н., проф	Національний інститут раку, зав. від. анестезіології та інтенсивної терапії
Головенко М.Я.	академік НАМНУ, д.біол.н., проф.	Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАМН України, лабораторія фізико-хімічної фармакології, гол.н.с.
Бабійчук О.М.		НМАПО ім. П.Л.Шупика, каф. паліативної та хоспісної медицини, юрисконсульт, м.н.с.
Бабенко Л.П.	Наук. співроб.	ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України", м.н.с.

Розробка додатку 10

Висоцька О.І., голова консультативно-експертної групи	к.мед.н., доцент	Директор Навчально-наукового центру - Українського тренінгового центру сімейної медицини НМУ імені О.О. Богомольця
Мацьков Олександр Григорович		Завідувач відділом антибіотикорезистентності та інфекційного контролю ДУ «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України», м. Київ
Новицька Агла Володимирівна	к.м.н., доцент	В.о. зав. кафедри загальної практики (сімейної медицини) НМУ імені О.О.Богомольця
Пасієшвілі Людмила Михайлівна	д.м.н., проф.	Завідувач кафедри сімейної медицини Харківського НМУ
Мешкова Олена Михайлівна	к.м.н., доцент	Навчально-науковий центр - Український тренінговий центр сімейної медицини НМУ імені О.О. Богомольця
Пронюк Христина Омелянівна	к.м.н.	Асистент кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О.О.Богомольця, головний позаштатний спеціаліст за спеціальністю «Інфекційні хвороби» ДЗОЗ Київської ОДА
Терещенко Наталія Миколаївна		Завідувач амбулаторії загальної практики-сімейної медицини КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 Дарницького району м. Києва»
Власенко Олександр Борисович		Головний лікар КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1», головний позаштатний спеціаліст з загальної практики – сімейної медицини ДЗОЗ Дон ОДА, асистент кафедри внутрішньої медицини №1 Дон НМУ, м.Краматорськ, Донецька область

Департамент оцінки медичних технологій Центру

Піняжко О.Б.	директор Департаменту оцінки медичних технологій Центру (далі – Департамент)
Малишевська Ю.Є.	заст. директора Департаменту
Ковальчук Т.С.	нач. відділу організаційно-комунікаційного забезпечення Департаменту, заст. Голови ЦФК МОЗ України
Сівоздрав О.Л.	заст.начальника відділу організаційно-комунікаційного забезпечення Департаменту
Романенко І.М.	нач.відділу оцінки клінічної ефективності лікарських засобів Департаменту
Клименко М.М.	заст.начальника відділу оцінки клінічної ефективності лікарських засобів Департаменту
Грищенко М.А.	експерт відділу організаційно-комунікаційного забезпечення Департаменту
Іванченко О.В.	експерт відділу організаційно-комунікаційного забезпечення Департаменту
Кава Т.В.	експерт відділу організаційно-комунікаційного забезпечення Департаменту
Семенюта Ю.П.	експерт відділу організаційно-комунікаційного забезпечення Департаменту
Двоєглазова М.В.	експерт відділу оцінки клінічної ефективності лікарських засобів Департаменту
Лескевич Т.Н.	пров. фах. відділу організаційно-комунікаційного забезпечення Департаменту
Садовничий Ю.С.	пров. фах. відділу організаційно-комунікаційного забезпечення Департаменту

Як користуватись

Державним формуляром лікарських засобів

Державний формуляр містить загальну інформацію, основні розділи та додатки.

Загальна інформація включає зміст, вступ, колектив розробників, рекомендації щодо користування державним формуляром, перелік основних позначень та скорочень, зміни, що внесені до тринадцятого випуску Державного формуляра лікарських засобів.

Основні розділи формуляра структуровані за групами ЛЗ, що застосовуються в фармакотерапевтичному лікуванні хвороб та станів відповідно напрямку медицини, в яких переважає консервативна терапія.

Лікарські засоби у Державному формулярі систематизовані за міжнародною непатентованою назвою (далі – МНН). Інформація про ЛЗ, що включені до ДФ, подається відповідно до формату формулярної статті. Джерелом наповнення формулярної статті є діюча Інструкція для медичного застосування (далі - Інструкція) оригінального ЛЗ, зареєстрованого в Україні; за відсутності реєстрації в Україні оригінального ЛЗ використовується Інструкція генеричного ЛЗ, що першим був зареєстрований в Україні. Формулярні статті розроблено тільки на монопрепарати, оскільки вони є пріоритетними для включення до формуляра.

Поряд з МНН ЛЗ проставляються **додаткові позначки (індекси):**

(*) мають ЛЗ, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і виробу медичного призначення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1081);

(**) мають ЛЗ, що включені до Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом МОЗ України від 18.04.2019 № 876, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.05.2019 р. за № 509/33480.

^[ПМД] – наявність рекомендацій в уніфікованих клінічних протоколах медичної допомоги щодо застосування ЛЗ на етапі первинної медичної допомоги.

Наявність рекомендацій у третинних джерелах наукової інформації до застосування ЛЗ позначена додатковими індексами формулярної статті у рубриці «Показання для застосування лікарського засобу»:

^{БНФ} – у Британському Національному Формулярі, 2018 рік випуску.

^{ВООЗ} – у Базовому формулярі ВООЗ, 2008 рік випуску.

Торговельні назви всіх зареєстрованих в Україні ЛЗ розміщуються в алфавітному порядку у двох підрозділах:

I – ЛЗ вітчизняного виробництва

II – ЛЗ іноземного виробництва

Якщо в різних розділах вказано **однакові ЛЗ в однакових лікарських формах, то повна формулярна стаття розміщена в тому розділі, який відповідає основним/переважним показанням.** Наприклад, повна формулярна стаття Еналаприл (Enalapril) розміщена у розділі «Кардіологія. Лікарські засоби», а в інших розділах, що містять рекомендації до застосування цього ЛЗ, після назви Еналаприл (Enalapril) міститься тільки посилання на розділ «Кардіологія. Лікарські засоби».

Якщо в одному розділі вказано **різні лікарські форми з вмістом однакової діючої речовини**, то вся інформація вміщена до однієї формулярної статті з відповідною МНН. В такому разі **кожен пункт формулярної статті містить узагальнену інформацію з інструкції для медичного застосування кожної вказаної лікарської форми.** Наприклад, повна формулярна стаття Сальбутамол (Salbutamol), що розміщена у розділі «Пульмонологія. Лікарські засоби, що застосовуються при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів», включає інформацію про всі лікарські форми, рекомендовані до застосування в пульмонології (аерозоль для інгаляцій, дозований, р-н для інгаляцій у небулах, р-н для ін'єкцій, капс. з модифікованим вивільненням).

Якщо в різних розділах вказано **ЛЗ, що містять однакову діючу речовину в різних лікарських формах, то повна формулярна стаття розміщена в тому розділі, де рекомендується застосування лікарської форми системної дії** (р-н для ін'єкцій, табл., капс. та ін.). В тих розділах, де рекомендується застосування місцевих лікарських форм (мазі, гелі, краплі очні/вушні та ін.), після МНН вказується стисла інформація стосовно показання до застосування, способу застосування, форми випуску та торгової назви ЛЗ. Наприклад, повна формулярна стаття Гідрокортизон (Hydrocortisone) розміщена у розділі «Ендокринологія. Лікарські засоби» з інформацією про лікарські форми системної дії - суспензія для ін'єкцій, порошок ліофілізований для приготування р-ну для ін'єкцій. В той час в розділі «Дерматовенерологія. Лікарські засоби», де рекомендовано застосування препаратів місцевої дії з діючою речовиною «гідрокортизон» (крем, мазь для зовнішнього застосування, емульсія на шкірні), вказана лише стисла інформація про застосування лікарської форми місцевої дії та міститься посилання на розділ «Ендокринологія. Лікарські засоби», де розміщена повна формулярна стаття даного ЛЗ.

Інформація про комбіновані препарати подається стисло - в назву виносяться всі діючі речовини, далі вказується інформація стосовно торговельної назви, форми випуску, вмісту (кількості) діючих речовин та назви виробника.

У тринадцятому випуску також міститься інформація щодо цінової характеристики ЛЗ. Розробка та регулярне оновлення реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і виробу медичного призначення, визначеного наказом МОЗ України від 18.08.2014 № 574 «Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і виробу медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2014 за № 1097/25874, стали юридичним підґрунтям для реалізації в Україні міжнародних підходів до відображення цінової характеристики лікарського засобу у Державному формулярі.

У тринадцятому випуску надається інформація про ціну визначеної добової дози (Defined Daily Dose – DDD) або стандартної добової дози, для розрахунку яких використовуються дані реєстру оптово-відпускних цін та офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на ЛЗ (така інформація представлена з округленням до другого знаку після коми). DDD – це середня підтримуюча доза на день для лікарських засобів, що використовуються за їх основним

показанням, для дорослих вагою 70 кг. DDD розраховується Міжнародним Центром співпраці ВООЗ та Інститутом Громадського Здоров'я Норвегії з питань методології статистичних досліджень лікарських засобів і повинна розглядатися не як «правильна доза», а як міжнародний компроміс, що базується на огляді баз доказової медицини, доступних на момент розрахунку DDD (офіційний сайт зазначеної вище організації - www.who.no).

Оскільки станом на 01.09.2020 р. не всі ЛЗ, що включені до Державного формуляра, мали DDD, для відображення цінової характеристики ЛЗ використовувалась стандартна доза. Інформацію про величину DDD та стандартної дози, використану авторами для розрахунків цінової характеристики ЛЗ, представлено у рубриці формулярної статті «Визначена/стандартна доза». Така характеристика лікарського засобу має стати для управлінців системи охорони здоров'я об'єктивним інструментом у виборі препарату з числа лікарських засобів різних виробників.

Додатки включають інформацію щодо правил виписування рецептів, взаємодії ЛЗ, особливості застосування ЛЗ у пацієнтів окремих вікових груп, застосування ЛЗ у пацієнтів з порушеннями функції життєвонеобхідних органів та систем, питання фармацевтичної опіки, скерованої на лікарів та пацієнтів, післяреєстраційний нагляд за побічними реакціями та відсутністю ефективності ЛЗ в Україні та предметні показники ЛЗ. Структурно Додатки 2-6 розроблені у вигляді таблиць, в крайній лівій колонці яких розміщено список ЛЗ (монопрепаратів), включених до ДФ українському мовою в алфавітному порядку, в інших колонках – тематична інформація.

Додаток 7 окрім загальних питань фармаконагляду також містить бланк карти-повідомлення про побічну реакцію чи відсутність ефективності ЛЗ при медичному застосуванні із зазначенням вимог до складання.

Додаток 8 представлений формуляром лікарських засобів для паліативної та хоспісної допомоги.

У Додатку 9 наведено накази МОЗ України щодо створення, впровадження формулярної системи лікарських засобів в Україні, а також щодо впровадження нового механізму збору інформації про ефективність та безпеку медичного застосування лікарських засобів – моніторинг стаціонарів. Починаючи з третього по шостий випуск включно, Державний формуляр містив

Додаток 10 – формуляр первинної медичної допомоги, який формувався на основі Переліку основних (життєвонеобхідних) ЛЗ, рекомендованого ВООЗ. У зв'язку з імплементацією положень уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги у частині рекомендацій щодо застосування ЛЗ на етапі первинної медичної допомоги, відповідну інформацію перенесено до формулярних статей ЛЗ, включених до основних розділів Державного формуляра. Зважаючи на актуальність надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, як основи охорони здоров'я, забезпечення надання гарантованого обсягу доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медичної допомоги пацієнту, у тринадцятому випуску Державного формуляра відновлено Додаток 10.

Додаток 11 - рекомендації ВООЗ щодо сприяння раціональному використанню лікарських засобів має на меті рекомендувати належну практику призначення лікарських засобів та важливі фактори, які можуть впливати на результат медикаментозної терапії.

**Зміни, внесені до тринадцятого випуску
Державного формуляра лікарських засобів
ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВИКЛЮЧЕНІ
З ТРИНАДЦЯТОГО ВИПУСКУ ДЕРЖАВНОГО ФОРМУЛЯРА**

Розділ 2. «Кардіологія. Лікарські засоби»	Прокаїнамід
Розділ 3. «Гастроентерологія. Лікарські засоби»	Інтерферон альфа-2а
Розділ 9. «Дерматовенерологія. Лікарські засоби»	Пефлоксацин
Розділ 10. «Анестезіологія та реаніматологія. Лікарські засоби»	Кальцію хлорид + Магнію хлорид + Глюкоза + Натрію хлорид + Калію хлорид + Натрію гідрокарбонат (Calcium chloride + Magnesium chloride + Glucose + Sodium chloride + Potassium chloride + Sodium hydrocarbonate) Ізолейцин + лейцин + лізин + метіонін + фенілаланін + треонін + триптофан + валін + аргінін + кислота глутамінова + гістидин + аланін + кислота аспарагінова + гліцин + пролін + серин + магнію ацетату тетрагідрат + натрію ацетата тригідрат + калію дигідрофосфат + калію гідроксид + натрію гідроксид + глюкози моногідрат + натрію хлорид + кальцію хлорид (Isoleucine + leucine + lysine + methionine + phenylalanin + threonine + tryptophan + valin + arginin + glutamic acid + histidine + alanin + aspartic acid + glycine + prolin + serine + magnesium acetate tetrahydrate + sodium acetate thrihydrate + kalium dihydrophosphate + kalium hydroxide + sodium hydroxide + glucose monohydrate + sodium chloride + calcium chloride)
Розділ 11. «Акушерство, Гінекологія. Лікарські засоби»	Метронідазол + хлорхінальдол
Розділ 12. «Урологія, андрологія, сексопатологія та нефрологія. Лікарські засоби»	Пефлоксацин
Розділ 13. «Гематологія. Лікарські засоби»	Третиноїн
Розділ 14. «Неонатологія. Лікарські засоби»	Палівізумаб
Розділ 15. «Офтальмологія. Лікарські засоби»	Фраміцетин + граміцидин с + дексаметазон
Розділ 17. «Протимікробні та антигельмінтні засоби»	Пефлоксацин
	Ломефлоксацин
	Мефлохін
Розділ 19. «Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутворень»	Третиноїн

**ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВІДНОВЛЕНІ В ТРИНАДЦЯТОМУ ВИПУСКУ
ДЕРЖАВНОГО ФОРМУЛЯРА**

Розділ 2. «Кардіологія. Лікарські засоби»	Бісопролол+гідрохлортіазид
	Аторвастатин + Езетиміб
	Метилдопа
Розділ 5. «Лікарські засоби, що застосовуються у лікуванні розладів психіки та поведінки»	Флуфеназин
Розділ 7. «Ендокринологія. Лікарські засоби»	Тиротропін альфа
Розділ 11. «Акушерство, Гінекологія. Лікарські засоби»	Терліпресин
Розділ 12. «Урологія, андрологія, сексопатологія та нефрологія. Лікарські засоби»	Метилдопа
Розділ 13. «Гематологія. Лікарські засоби»	Кладрибін
Розділ 18. «Імуномодулятори та протиалергічні засоби»	Ебастин
Розділ 19. «Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутворень»	Гефітініб

**ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ В ТРИНАДЦЯТИЙ ВИПУСК
ДЕРЖАВНОГО ФОРМУЛЯРА ЗА РІШЕННЯМ ЦФК**

Розділ 17. «Протимікробні та антигельмінтні засоби»	Дасабувір
	Омбітасвір + паритапревір + ритонавір
Розділ 19. «Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутворень»	Венетоклакс

ОСНОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

α	–	альфа
AUC	–	площа на графіку під кривою "концентрація - час"
AV	–	атріовентрикулярний
β	–	бета
DDD	–	визначена добова доза
Hb	–	рівень гемоглобіна
Ig	–	імуноглобулін
pH	–	водневий показник
t°	–	температура
T_{1/2}	–	період напівіснування
a/б	–	антибіотик
a/г	–	антиген
a/т	–	антитіло
АБЗ	–	антибактеріальний засіб
АГ	–	артеріальна гіпертензія
АДФ	–	аденозиндифосфат
АКТГ	–	адренокортикотропний гормон
АЛТ	–	аланінамінотрансфераза
амп.	–	ампула
антиIgE	–	антиімуноглобулін Е
АПФ	–	ангіотензин-перетворюючий фермент
АР	–	алергічні реакції
АСТ	–	аспартатамінотрансфераза
АТ	–	артеріальний тиск
АТФ	–	аденозинтрифосфат
БА	–	бронхіальна астма
бл.	–	блістер
в/в	–	внутрішньовенне введення
в/м	–	внутрішньом'язеве введення
в/о	–	вкрита оболонкою
ВГА	–	вірусний гепатит А
ВГВ	–	вірусний гепатит В
ВГС	–	вірусний гепатит С
ВДШ	–	верхні дихальні шляхи
ВІЛ	–	вірус імунодефіциту людини
ВР	–	внутрішньоочна рідина
ВТ	–	внутрішньоочний тиск
г.	–	гострий
ГД	–	гемодіаліз
ГК	–	глюкокортикоїди
ГКС	–	глюкокортикостероїди
год	–	година
Гр (-)	–	грамнегативний
Гр (+)	–	грампозитивний
ГРВІ	–	гості респіраторно-вірусні інфекції
ГСіС	–	гемосорбція на іонообмінних смолах
ГСв	–	гемосорбція на активованому вугіллі
ДН	–	дихальна недостатність
ДНК	–	дезоксирибонуклеїнова кислота
ДПК	–	дванадцятипала кишка
ЕКГ	–	електрокардіограма
ІКС	–	інгаляційний кортикостероїд
ІМ	–	інфаркт міокарда
ІХС	–	ішемічна хвороба серця
КА	–	карбоангідраза
капс.	–	капсула
к-та	–	кислота
крап.	–	краплі
КФК	–	креатинфосфокіназа
ЛДГ	–	лактатдегідрогеназа
ЛЗ	–	лікарський засіб
ЛФ	–	лужна фосфатаза
м/о	–	мікроорганізм
МАО	–	моноамінооксидаза
МБТ	–	мікобактерії туберкульозу
МДД	–	максимальна добова доза
МО	–	міжнародні одиниці

МПД	–	максимально переносима доза
МТІК	–	монометилтриазеноїмідазолкарбоксаміду
НДШ	–	нижні дихальні шляхи
НІЗТ	–	нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
ННІЗТ	–	ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
НПЗЗ	–	нестероїдні протизапальні засоби
ОФВ1	–	об'єм форсованого видиху за першу секунду
оч.	–	очні
п/ш	–	підшкірне введення
ПД	–	перитонеальний діаліз
п/о	–	плівкова оболонка
ПОШвид	–	пікова об'ємна швидкість видиху
ПРВЗ	–	протиретровірусні засоби
прол. дії	–	продовженої дії
ПТП	–	протитуберкульозні препарати
ПФ	–	плазмаферез
р/добу	–	кількість разів на добу
РА	–	ревматоїдний артрит
РЕФР	–	рецептор епідермального фактору росту
р-н	–	розчин
РНК	–	рибонуклеїнова кислота
СА	–	синатріальний
СІТ	–	специфічна імунотерапія
СКС	–	системні глюкокортикостероїди
с-м	–	синдром
с-м WPW	–	синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта
С_{макс}	–	максимальна концентрація в плазмі
СНІД	–	синдром набутого імунodefіциту
СН	–	серцева недостатність
СНП	–	сенсоневральна приглухуватість
СС	–	серцево-судинний
СССВ	–	синдром слабкості синусового вузла
СтДД	-	стандартна добова доза
ст.л.	–	столова ложка
табл.	–	таблетка
ФД	–	форсований діурез
ФЖЕЛ	–	форсована життєва ємкість легень
фл.	–	флакон
хв	–	хвилина
ХГА	–	хронічний гепатит А
ХГВ	–	хронічний гепатит В
ХГС	–	хронічний гепатит С
ХОЗЛ	–	хронічні обструктивні захворювання легенів
хр.	–	хронічний
ЦД	–	цукровий діабет
ЦМВ	–	цитомегаловірус
ЦНС	–	центральна нервова система
ц/о	–	цукрова оболонка
ч.л.	–	чайна ложка
ЧМТ	–	черепно-мозкова травма
ЧСС	–	частота серцевих скорочень
чар/уп.	–	чарункова упаковка
ШВЛ	–	штучна вентиляція легенів
ШКТ	–	шлунково-кишковий тракт
р/os	–	перорально

1. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ

- 1.1. Основні принципи надання невідкладної допомоги при гострих отруєннях
- 1.2. Детоксикаційна (антидотна) терапія
- 1.3. Ентеросорбція
- 1.4. Детоксикаційні лікарські засоби

1.1. Основні принципи надання невідкладної допомоги при гострих отруєннях

Причинами отруєння можуть бути: лікарські засоби, харчові продукти, речовини побутової хімії, отрути рослин і тварин. Отруйна речовина може потрапити в організм різними шляхами: ч/з шлунково-кишковий тракт, дихальні шляхи, шкіру, кон'юнктиву, при введенні речовини п/ш, в/м, в/в. Отруйна речовина може чинити токсичну дію у місці надходження, що проявляється найчастіше опіками різного ступеня, місцевоподразнюючою дією, ушкодженням шкіри та/або слизової оболонки тощо. У разі надходження отрути в організм, вона викликає загальнотоксичну (резорбтивну) дію, що характеризується переважним ураженням окремих органів і систем організму. Надання невідкладної медичної допомоги при г. отруєннях повинно проводитись із врахуванням шляхів надходження отрути в організм, кількості отрути, процесів біотрансформації та шляхів виведення із організму, а також механізму розвитку інтоксикації та клінічної синдроматики.

Лікування г. екзогенних інтоксикацій має характерні особливості, які полягають у необхідності поєданого проведення лікувальних заходів, а саме використання методів прискороного виведення токсичних речовин з організму; одночасного застосування специфічної (антидотної) терапії, яка впливає на метаболізм токсичних речовин в організмі або зменшує їх токсичність; проведення лікувальних заходів, направлених на захист і підтримання тієї функції організму, яка переважно вражається даною токсичною речовиною.

Основні лікувальні заходи при наданні невідкладної медичної допомоги при г. інтоксикаціях наступні:

1. Забезпечення та підтримка життєво важливих функцій організму, що полягає у наступному:
 - 1.1. Підтримка й відновлення адекватної функції зовнішнього дихання:
 - забезпечення вільної прохідності дихальних шляхів (аспірація з верхніх дихальних шляхів слизу, блювотних мас, видалення сторонніх предметів та ін.);
 - респіраторна терапія (оксигенотерапія, штучна вентиляція легень за показаннями).
 - 1.2. Підтримка й відновлення функції серцево-судинної системи:
 - забезпечення адекватного венозного доступу до периферичних судин (пункція/катетеризація судин);
 - підтримка ефективного рівня артеріального тиску для забезпечення адекватного кровообігу.
 - 1.3. Підтримка й відновлення функції ЦНС: протисудомна терапія.
2. Видалення токсичної речовини з місць її надходження до організму постраждалого (дерма, слизові оболонки, шлунково-кишковий тракт та ін.):
 - обробка шкіри – за умов наявних або потенційно можливих ознак перебування на її поверхні токсичної речовини та/або інформації про інтрадермальний шлях надходження отрути до організму;
 - обробка слизових оболонок ротової порожнини - за умов наявних або потенційно можливих ознак перебування на їх поверхнях токсичної речовини та/або інформації про пероральний шлях надходження отрути до організму;
 - обробка слизових оболонок очей - за умов наявних або потенційно можливих ознак перебування на слизових оболонках очей токсичної речовини та/або інформації про інтракон'юнктивальний шлях надходження отрути до організму;
 - санація шлунку (зондова, беззондова) - за умов наявних або потенційно можливих ознак перебування у верхніх відділах ШКТ токсичної речовини та/або інформації про пероральне надходження отрути до організму;
 - санація кишечника із застосуванням антидотних препаратів та ентеросорбентів (зондовий лаваж, очищувальна клізма) - за умов наявних або потенційно можливих ознак перебування у нижніх відділах ШКТ токсичної речовини та/або інформації про інтестинальний шлях надходження отрути до організму.
3. Детоксикаційна терапія спрямована на видалення отрути із організму. При цьому поряд із застосуванням специфічних детоксикаційних ЛЗ (антидотів) важливу роль відіграє водне навантаження (ентеральне та/або парентеральне) з форсованим діурезом (р-н глюкози 5-10-20%, р-н натрію хлориду 0,9%, сольові р-ни, альбумін 5-10%, реополіглюкін, реосорбілакт, рефортан, гелофузин, теофілін 2,4 %, фуросемід, сечовина, манітол, трисамін), корекція дизелектролітемії (р-н калію хлориду 7,5 %, р-н кальцію хлориду 10 %, натрію гідрокарбонату 4%), а також екстракорпоральна детоксикація: методи діалізоної терапії (гемодіаліз, перитонеальний діаліз), методи роздільної терапії (плазмаферез), методи фільтраційної терапії (гемодіафільтрація, гемофільтрація), методи сорбційної терапії (гемосорбція, плазмасорбція). Показання до операції водного навантаження з форсованим діурезом та екстракорпоральної детоксикації в залежності від характеру отрути та важкості отруєння передбачені чинними клінічними протоколами.

Успіх лікування при г. інтоксикаціях в основному залежить від своєчасного виконання всього комплексу терапевтичних процедур, проведених на догоспітальному етапі і безпосередньо в лікувальних закладах.

1.2. Детоксикаційна (антидотна) терапія

Таблиця 1.

Детоксикаційні засоби, які використовуються для інактивації отрут в місцях їх надходження до організму (дерма, слизові оболонки, гастро-інтестинальний тракт та ін.) та для знешкодження в організмі (антидоти)

Отрута	Засоби, для специфічної інактивації отрути в	Лікарські засоби для
--------	--	----------------------

	шлунку, на шкірі та слизових оболонках (варіанти вибору та/або поєднання)	детоксикаційної терапії (варіанти вибору та/або поєднання)
Отруєння антибіотиками системного призначення (Т.36)		
Антибактеріальні засоби	Для інактивації отрути в шлунку: вугілля активоване, сульфат магнію 10 % р-н. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; - вугілля активоване	-піридоксину гідрохлорид у дозі 1.0 г в/в; при необхідності – повторне введення
Отруєння іншими протимікробними та протипаразитарними засобами (Т.37)		
Перманганат калію	Для інактивації отрути в шлунку: крохмаль; вугілля активоване; 0.5-1 % р-н аскорбінової к-ти (20 мл 5 % р-ну аскорбінової к-ти розводять в 80 мл води - співвідношення 1:4). Для обробки уражених слизових оболонок порожнини рота: 0.5-1 % р-н аскорбінової к-ти; гліцерин; суміш 3 % р-ну перекису водню та 3 % р-ну оцтової к-ти у співвідношенні 1:1. Для промивання очей: 0.5-1 % р-н аскорбінової к-ти. Для інактивації отрути на уражених ділянках шкіри: суміш з 200 мл 3 % р-ну перекису водню, 400 мл 3 % р-ну оцтової к-ти, 2.0 л теплої питної води.	Антидот в Україні не зареєстровано
Йод	Для інактивації отрути в шлунку: тіосульфат натрію 0.5 % р-н (16.6 мл 30 % р-ну тіосульфату натрію на 100 мл питної води, або розвести антидот з водою в співвідношенні 1:5), у дозі: немовлята - 10.0; молодший вік - 20.0; шкільний вік - 50.0; крохмаль. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	- тіосульфат натрію в дозі: 25 мг/кг, в/в, крап. 0.15-0.33 мл/кг (але не більше 10 мл 3 % р-ну) - для дітей; 10-20 мл 1-2% р-ну, в/в (для дорослих)
Борна к-та	Для інактивації отрути в шлунку: 2 % р-н окису магнію; 15 % р-н манітолу (комплекси, що утворюються, стабілізують 2 % р-ном питної соди (20 г на 1 л води). Для інактивації отрути на уражених ділянках шкіри: 2-3 % р-н аміаку.	- 15 % р-н манітолу, в/в, крап. у вікових дозах
Отруєння гормонами та їх синтетичними замінниками та антагоністами, не класифікованими в інших рубриках (Т.38.)		
Препарати, які викликають гіпоглікемію	Для інактивації отрути в шлунку: вугілля активоване; сульфат магнію 10 % р-н. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	- глюкоза 40 % р-н 20-60 мл (залежно від віку хворого), в/в, болюсно; повторне введення - під контролем рівня цукру в крові; - глюкагон (під контролем рівня калію та глюкози в крові), в/в, крапельно, в дозі: 0.1-0.2 мг/кг; 0.5 мг/кг/добу; доза насичення - 0,15 мг/кг; доза підтримуюча - 0.005-0.1 мг/(кг/год)
Отруєння неопіодними анальгезуючими, протигарячковими та протиревматичними засобами (Т.39)		
	Для інактивації отрути в шлунку: вугілля активоване у дозі 1 г/кг; тіосульфат натрію в дозі (16.6 мл 30 % р-ну тіосульфату натрію на 100 мл питної води, або розвести антидот з водою в співвідношенні 1:5); немовлята - 10.0; молодший вік - 20.0; шкільний вік - 50.0; сульфат магнію 10 % р-н (р/ос, кожних 4-6 год., до одержання ефекту). При отруєнні аніліновими похідними (парацетамол, ацетамінофен): вугілля активоване; вазелінова олія. При отруєнні сульфаніламидами: 0.1 % р-н перманганату калію. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	- ацетилцистеїн: доза насичення - 140 мг/кг маси тіла р/ос; потім 70 мг/кг маси тіла ч/з кожні 4 год. протягом 3 діб; доза підтримки - 0,7 мг/кг 20 % р-н 6 р/добу протягом 4-5 днів; - метіонін: 2.5 г кожні 6 год., р/ос; - токоферол: 5-10 мг/кг на доб., р/ос; - тіосульфат натрію в дозі: 25 мг/кг, в/в, крап. 30 % р-н; 5-10 % р-н після промивання шлунка по 1 ложці 3 р/день усередину; 10-20 мл 1-2% р-ну, в/в (для дорослих). 10 мл 3 % р-ну, в/в, протягом 3-5 хв. При відсутності реакції (максимальне підвищення рівня метгемоглобіну в крові протягом 30 хв. після введення) повторне введення препарату в половинній дозі; 0.15-0.33 мг/кг (але не більше 10 мл 3 % р-ну) - для дітей. Примітка: При отруєнні

		ацетилсаліциловою к-тою (Аспірином) антидот відсутній.
Отруєння наркотичними засобами та психодислептиками (галюциногенами) (Т.40)		
Опій та інші опоїди	Для інактивації отрути в шлунку: вугілля активоване; сульфат магнію 10 % р-н. При отруєнні морфіном: 0.02 % р-н перманганату калію. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	- налоксон у дозі: 0.03-0.01 мг/кг, в/в, болюсно, кожні 2-8 хв.; 0.4-0.8 мг/год. в 5 % р-ні глюкози, в/в, крапельно.
Галюциногени		- бензодіазепіни (діазепам), в/м, в/в, у дозі: 0.12-0.8 мг/кг на добу., в/в, в 2-4 введення; не більше 10 мг, в/в, болюсно. - галантамін, в/м, п/ш, у дозі: до 1 року - 0.2-0.5 мг; 2-4 року - 1-2 мг; 5-7 років - 3-4 мг; 8-10 років - 4-5 мг; старше 10 років - 5-10 мг. - хлорпромазин у дозі: 0.5 мг/кг, в/м, 2-3 рази на день; 0.05 мг/кг, в/в, 3-4 рази на день.
Кокаїн		- адреноблокатори у вікових дозах.
Т.41. Отруєння анестезуючими засобами та терапевтичними газами		
Т.42. Отруєння протиепілептичними, седативно-снодійними та протипаркінсоністичними лікувальними засобами		
Бензодіазепіни	Для інактивації отрути в шлунку: вугілля активоване; сульфат магнію 10 % р-н. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	- налоксон у дозі: 0.03-0.01 мг/кг, в/в, болюсно, кожні 2-8 хв.; 0.4-0.8 мг/год. в 5 % р-ні глюкози, в/в, крапельно; 0.4 мг, в/в, болюсно, кожні 2-3 хв., до досягнення мінімального "пробуджуючого" ефекту (у дорослих).
Барбітурати		- Антидот в Україні не зареєстровано.
Снодійні засоби		- Антидот в Україні не зареєстровано.
Т.43. Отруєння психотропними препаратами, не класифікованими в інших рубриках		
Трициклічні антидепресанти	Для інактивації отрути в шлунку: вугілля активоване; сульфат магнію 10 % р-н. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	- гідрокарбонат натрію у дозі: 5 ммоль/кг маси тіла за добу (50 % дози у перші 6 год. під контролем рН плазми та утримання у межах 7,45 – 7,55); хворим, що перебувають на ШВЛ (особливо при застосуванні режиму гіпервентиляції) дози гідрокарбонату натрію зменшувати на 20-30 %.
Бутерофенони		- Біперіден (5 мг в амп.) у дозі 0.04 мг/кг, в/в, крапельно, на фізіологічному р-ні або р-ні глюкози. Інші антидоти в Україні не зареєстровано.
Нейролептики		При виникненні екстрапірамідної симптоматики - дифенгідрамін у дозі 50-100 мг або 1-2 мг/кг (для дорослих); діазепам у дозі 5-10 мг, в/в, в/м (для дорослих).
Солі бромю	Для інактивації отрути в шлунку: тіосульфат натрію в дозі 0.5-2 г у вигляді 10 % р-ну. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	- тіосульфат натрію в дозі 0.5 - 2 г у вигляді 10 % р-ну.
Т.44. Отруєння препаратами, які переважно впливають на вегетативну нервову систему		
Холінолітичні препарати (у т.ч. інгібітори холінестерази)	Для інактивації отрути в шлунку: вугілля активоване; сульфат магнію 10 % р-н. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	- галантамін у вікових дозах Інші антидоти в Україні не зареєстровано.
Стимулятори бета-2-адренергічних рецепторів		- епінефрин у дозі 1-4 мг/хв., в/в, титруючи, аж до досягнення позитивного клінічного ефекту. При отруєнні стимуляторами β ₂ -адренергічних рецепторів: пропранолол 0.01-0.02 мг/кг маси тіла, в/в.
Т.45. Отруєння переважно системними та гематологічними препаратами, не класифікованими в інших рубриках		
Залізо та його сполуки	Для інактивації отрути в шлунку: - дефероксамін , р/ос: у загальний обсяг рідини для промивання шлунка додати 5-10 г дефероксаміну; - натрію гідрокарбонат (у лужному	- дефероксамін у вікових дозах залежно від ступеня важкості отруєння.

	середовищі, при рН вище 5.0, закисне залізо перетворюється в окисне й може бути зв'язано основним антидотом дефероксаміном). Повторні санації кишечника гіперосмолярним водним р-ном ч/з кожні 8 год., протягом першої доби від моменту госпіталізації пацієнта. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване	
Антикоагулянти	Для інактивації отрути в шлунку: вугілля активоване; сульфат магнію 10 % р-н. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	- протамін у вікових дозах; - менадін у вікових дозах; - вітамін К1.
Цитостатичні препарати		- фолієва к-та в дозі 2.5 мг (не більше 10 мг/кг на доб.), в/м.
Метатрексат		- кальцій фолінат у дозі 10 мг/м ² поверхні тіла, в/в, крапельно.
Т.46. Отруєння засобами, які діють переважно на серцево-судинну систему		
Серцеві глікозиди	Для інактивації отрути в шлунку: вугілля активоване; сульфат магнію 10 % р-н. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	Специфічні антидоти в Україні не зареєстровано.
Блокатори кальцієвих каналів бензодіазепінового та фенілалкіламінового ряду		- кальцію хлорид 10 % (у максимальній віковій дозі) або кальцію глюконат 10 % (0.2 мл/кг маси), вводять кожні 5-10 хв. до досягнення клінічного ефекту.
Блокатори кальцієвих каналів похідні 1,4-дегідро-перидину		- глюкагон (під контролем рівня калію і глюкози в крові), в/в, крапельно, в дозі: 0.1-0.2 мг/кг; 0.5 мг/кг/доб.; доза насичення - 0,15 мг/кг; доза підтримуюча - 0.005-0.1 мг/(кг/год.); 2-5 мг, в/в, болюсно, з наступною інфузією по 2-3 мг у год. (для дорослих).
Клонідин		- налоксон у дозі: 0.03-0.01 мг/кг, в/в, болюсно, кожні 2-8 хв.; 0.4-0.8 мг/год. в 5 % р-ні глюкози, в/в, крапельно; - метоклопрамід 0.5 % р-н: доза насичення - 0.5 мг/кг; доза підтримуюча - 0.25 мг/кг, в/в, крапельно, протягом 4-5 год.
Дигіталіс		Специфічні антидоти в Україні не зареєстровано.
β-блокатори		- атропіну сульфат 0.1 % р-н (підтримка адекватної ЧСС): показаний при ізольованій синусовій брадикардії без порушень провідності і ритму серця. Дорослі: 0,5 – 1,0 мг в/в з повторенням зазначеної дози ч/з 5 хв. до отримання відповіді. При зупинці серця - 1 мг атропіну, в/в, з повторенням ч/з 3- 5 хв. Мінімальна доза 0,6 мг; максимальна доза - 0,04 мг/кг. Діти: 0.02 мг/кг, в/в; повторно - ч/з кожні 5 хв. до припинення брадикардії (загальна максимальна доза 1 мг; дітям старшого віку - до 5 мг); доза атропіну менше 0.1 мг (для дітей) і 0.5 - 1 мг (для дорослих) супроводжується розвитком тахікардії; доза менше 0,5 мг може викликати парадоксальну реакцію. атропін у дозі в 3-5 мг визначає повну блокаду холінергічних систем; подальше збільшення дози не супроводжується збільшенням ЧСС. Паралельно із застосуванням антидотних заходів налагоджується інгаляція зволоженого O ₂ і кардіомоніторинг. - глюкагон: 150 мкг/кг, болюсно; 5-10 мг (для дорослих); пік дії за 5-7 хв. загальна тривалість дії 10-15 хв.; подальше призначення: болюсно, кожні 10 хв., або постійна інфузія у дозі 50-

		100 мкг/кг/год (нормалізує інотропну та хронотропну відповіді). Катехоламіни – додаються до лікування у випадках тяжкої АТ-гіпотензії, яка мало піддається корекції. - допамін у дозі від 2-5 до 7-10 мкг/кг у хв., в/в; - добутамін у дозі від 2.4-4 до 10-12 мкг/кг у хв., в/в; - норепінефрин: 2мкг/хв. - початкова доза може збільшуватися за показами; 0,1 мкг/кг/хв. (для дітей); - епінефрин: 1 мкг/хв. - початкова доза, менший α - та більший β -адреноміметичний ефект, більш ефективно сприяє зменшенню брадикардії і відновленню провідності серця; 0,1 мкг/кг/хв. (для дітей).
Т.48. Отруєння препаратами, які діють переважно на гладку і скелетну мускулатуру та органи дихання		
Міорелаксанти		- сугамадекс; - галантамін у вікових дозах
Т.50. Отруєння діуретиками, іншими та неуточненими лікувальними засобами, медикаментами та біологічними субстанціями		
Препарати срібла	Для інактивації отрути в шлунку (варіанти вибору та/або поєднання): вугілля активоване у дозі 1 г/кг; 1-2 % р-н натрію хлориду (10-20 г повареної солі на 1 л води); тіосульфат натрію 0.5 % р-н (16.6 мл 30 % р-ну тіосульфату натрію на 100 мл питної води, або розвести антидот з водою в співвідношенні 1:5) у дозі: немовлята - 10.0; молодший вік - 20.0; шкільний вік - 50.0.	Для парентерального застосування: - 10 % р-н натрію хлориду, в/в (перетворює нітрат срібла в нетоксичний хлорид срібла); ацетилцистеїн р/ос, 5-10 % р-н, табл., порош., у дозі: 140 мг/кг, р/ос, 1 доза. Потім по 50-70 мг/кг на 5 % р-ні глюкози, кожні 4 год. (але не більше 1330 мг за 72 год., у дорослих); 1.4 мл/кг 10 % р-н; 0.7 мл/кг 20 % р-н.
Феноли	Для інактивації отрути в шлунку: 10 % р-н кальцію глюконату (1 мл на рік життя); сульфат натрію в дозі 1г/рік життя, усередину в 100 мл води; тіосульфат натрію 0.5 % р-н (16.6 мл 30 % р-ну тіосульфату натрію на 100 мл питної води, або розвести антидот з водою в співвідношенні 1:5) у дозі: немовлята – 10.0; молодший вік – 20.0; шкільний вік – 50.0; вугілля активоване (20 г на 200 мл води).	- 10 % р-н кальцію глюконату в дозі 0.2 мл/кг маси тіла, кожні 2 год., в/в.
Формальдегід	Для інактивації отрути в шлунку: 1-3 % р-н хлориду амонію; Для інактивації отрути на уражених ділянках шкіри: 5% р-н аміаку.	- Антидот відсутній
Невідомі (неідентифіковані) лікарські засоби	Для інактивації отрути в шлунку: вугілля активоване, сульфат магнію 10 % р-н. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване	Для парентерального застосування: піридоксину гідрохлорид, в/в, в/м, у дозі 5-10 мг/кг; 1 г піридоксину на 1 г гідразину; по 50 мг, кожні 6 год., до усунення ацидозу.
Т.51. Токсична дія алкоголю (спиртів)		
Етанол	Для інактивації отрути в шлунку: вугілля активоване; сульфат магнію 10% р-н. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	- Антидот відсутній
Метанол		- етанол в/в 5% р-н (або 30% р-н - внутрішньо) у загальній дозі 1г/кг маси тіла (96% етанолу) на добу у вигляді 5% р-ну на 5% глюкозі, або перорально по 50 мл 30% етанолу кожні 3 год. Введення етанолу проводити підтримуючи його концентрацію в крові на рівні 1г/л протягом 2-5 діб.
Пропанол		
Сивушні масла та спирти неуточнені		

Т.52. Токсична дія органічних розчинників		
Нафтопродукти (бензин, керосин, петролейний ефір)	Для інактивації отрути в шлунку: вазелінова олія; 2 % р-н двовуглекислої соди; рослинна олія. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	- Антитодот відсутній
Бензол та його гомологи	Для інактивації отрути в шлунку: вазелінова олія; вугілля активоване; ацетилцистеїн 5-10 % р-н, табл., порош., у дозі: 140 мг/кг, р/ос, 1 доза; потім по 50-70 мг/кг на 5 % р-ні глюкози, кожні 4 год.	- тіосульфат натрію в дозі: 25 мг/кг, в/в, крап.; 0.15-0.33 мл/кг (але не більше 10 мл 3 % р-ну) - для дітей; 10-20 мл 1-2% р-ну, в/в (для дорослих).
Дихлоретан	Для інактивації отрути в шлунку: вазелінова олія. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	- ацетилцистеїн
Фторвмісні сполуки	Для інактивації отрути в шлунку: 2 % р-н двовуглекислої соди; 0.5 % р-н хлориду кальцію. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване	- Антитодот відсутній
Гліколі	Для інактивації отрути в шлунку: вугілля активоване; сульфат магнію 10 % р-н. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване	- етанол в/в 5% р-н (або 30% р-н - внутрішньо) у загальній дозі 1г/кг маси тіла (96% етанолу) на добу у вигляді 5% р-ну на 5% глюкозі, або перорально по 50 мл 30% етанолу кожні 3 год. Введення етанолу проводити підтримуючи його концентрацію в крові на рівні 1г/л протягом 2-5 діб. -10% кальцію глюконат (або хлорид) по 10-20 мл 2 р/добу.
Т.53. Токсична дія галогенопохідних летких та ароматичних вуглеводнів (у т.ч. фреон)		
Галогенопохідні летких та ароматичних вуглеводнів	Для інактивації отрути в шлунку: вугілля активоване; сульфат магнію 10 % р-н. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	- ацетилцистеїн: доза насичення - 140 мг/кг маси тіла р/ос; потім 70 мг/кг маси тіла ч/з кожні 4 год. протягом 3 діб; доза підтримки - 0,7 мл/кг 20 % р-н 6 р/добу протягом 4-5 днів.
Т.54. Токсична дія їдких речовин		
Фенол та його гомологи (карболова к-та, крезол, лізол, резорцин, гідрохінон)	Для інактивації отрути в шлунку: вугілля активоване; сульфат магнію 10 % р-н. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване	- ацетилцистеїн: доза насичення - 140 мг/кг маси тіла р/ос; потім 70 мг/кг маси тіла ч/з кожні 4 год. протягом 3 діб; доза підтримки - 0,7 мл/кг 20 % р-н 6 р/добу протягом 4-5 днів.
Їдкі кислоти	Для промивання шлунка: холодна кип'ячена вода; 0.9 % р-н NaCl; 2 % р-н магнію оксиду; збиті яєчні білки (4-12 білків на 1 л води); молоко. Для інактивації отрути в шлунку: антацид (алюміній + магнію гідроксид + бензокаїн й ін.); холодне некип'ячене молоко (до 500 мл); 10 % водна емульсія рослинного масла 200 мл з 2 г анестезину: по 2.5-20 мл препарату кожні 2 год., протягом доби. Обробка шкірних покривів: обмивання уражених ділянок шкіри проточною водою; Гідрокортизон, мазь; Лідокаїн, гель; мазь із а/б. Обробка очей: промивання 0.9 % р-ном NaCl; проточною водою; місцеві анестетики.	- Антитодот відсутній
- синильна к-та та її солі	Інактивація отрути в шлунку: тіосульфат натрію в дозі 0.5 - 2 г у вигляді 5-10 % р-ну; 0.04 % р-н перманганату калію; вугілля активоване.	- тіосульфат натрію в дозі 25 мг/кг, в/в, крап.; 0.15-0.33 мл/кг (але не більше 10 мл 3 % р-ну) - для дітей; 10-20 мл 1-2% р-ну, в/в (для дорослих). Інші антитодоти в Україні не зареєстровано.
- щавлева к-та, фториста к-та	Для інактивації отрути в шлунку: 0.5 % р-н хлориду або глюконату кальцію; молоко.	-кальцію глюконат або кальцію хлорид в/в у вікових дозах.
Їдкі луги (аккумуляторна рідина, аміак, нашатирний)	Санация шлунку: при отруєнні лугами промивання шлунку протипоказане. Для інактивації отрути в шлунку: яєчні білки, молоко; рослинне масло (луг перетворюється в	- Антитодот відсутній

спирт, каустична сода)	мило). Для інактивації отрути на уражених ділянках шкіри: 1) при опіках їдкими лугами омивання 8 % р-н оцтової кислоти; 4 % р-н борної к-ти; 1 % р-н лимонної к-ти; 2) при опіках аміаком омивання: керосин; спирт. Примітка: обмивання водою протипоказано, тому що приводить до самозапалювання! 3) при опіку аніліном омивання 5 % р-н оцтової к-ти, після промивання водою з милом. Примітка: не обробляти алкоголем! 4) при опіку фенолами - омивання етиловим спиртом.	
Окислювачі (перекис водню, гідроперит, пергідроль)	Для промивання шлунка: холодна кип'ячена вода; 0.9 % р-н NaCl; збиті яєчні білки (4-12 білків на 1 л води). Після промивання, у шлунок необхідно ввести (варіанти вибору та/або поєднання) - до 200 мл 10 % водної емульсії рослинного масла; 2 г анестезину: по 2.5-20 мл препарату кожні 2 год., протягом доби. Для обробки уражених ділянок шкіри: обмивання проточною водою; Гідрокортизон, мазь; Лідокаїн, гель; мазь із а/б. Для обробки уражених ділянок очей промивання 0.9 % р-ном NaCl; промивання проточною водою; місцеві анестетики.	- Антитодот відсутній
Т.55. Токсична дія мила та дезінфікуючих засобів		
Мило та дезінфікуючі засоби	Для інактивації отрути в шлунку: вугілля активоване; сульфат магнію 10 % р-н. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	-тіосульфат натрію в дозі: 25 мг/кг, в/в, крап.; 0.15-0.33 мл/кг (але не більше 10 мл 3 % р-ну) - для дітей; 10-20 мл 1-2% р-ну, в/в (для дорослих).
Т.56. Токсична дія металів		
Свинець та його сполуки	Для інактивації отрути в шлунку: вугілля активоване; сульфат магнію 10 % р-н; тіосульфат натрію в дозі (16.6 мл 30 % р-ну тіосульфату натрію на 100 мл питної води, або розвести антидот з водою в співвідношенні 1:5, р/ос); немовлята - 10.0; молодший вік - 20.0; шкільний вік - 50.0.; збиті яєчні білки (при відсутності антидотів). Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	- тіосульфат натрію в дозі: 25 мг/кг, в/в, крап.; 0.15-0.33 мл/кг (але не більше 10 мл 3 % р-ну) - для дітей; 10-20 мл 1-2% р-ну, в/в (для дорослих).
Ртуть та її сполуки		- пеніциламін, вводити усередину після промивання шлунка; поєднувати із введенням піридоксину гідрохлориду (1; 2,5; 5 % р-н): добова доза для дорослих усередину 15-40 мг/кг на доб. в 4-6 прийомів; добова доза для дітей у віці до 5 років - 300 мг; добова доза для дітей у віці 5-10 років - 600 мг; добова доза для дітей у віці старше 10 років - 840 мг (в 2-4 прийому, усередину, протягом 5-6 днів).
Хром та його сполуки		- пеніциламін, вводити усередину після промивання шлунка; поєднувати із введенням піридоксину гідрохлориду (1; 2,5; 5 % р-н): добова доза для дорослих усередину 15-40 мг/кг на доб. в 4-6 прийомів; добова доза для дітей у віці до 5 років - 300 мг; добова доза для дітей у віці 5-10 років - 600 мг; добова доза для дітей у віці старше 10 років - 840 мг (в 2-4 прийому, усередину, протягом 5-6 днів).
Олово та його сполуки		Інші антидоти в Україні не зареєстровано.
Кадмій та його сполуки		-Ацетилсаліцилова к-та (для зняття «металевої лихоманки»).
Мідь та її сполуки		
Цинк та його сполуки		
Т.57. Токсична дія інших неорганічних речовин		
Миш'як та його сполуки	Для інактивації отрути в шлунку: вугілля активоване; сульфат магнію 10 % р-н; тіосульфат натрію в дозі (16.6 мл 30 % р-ну тіосульфату натрію на 100 мл питної води, або розвести антидот з водою в співвідношенні 1:5, р/ос); немовлята - 10.0; молодший вік - 20.0; шкільний	Тіосульфат натрію в дозі: 25 мг/кг, в/в, крап.; 0.15-0.33 мл/кг (але не більше 10 мл 3 % р-ну) - для дітей; 10-20 мл 1-2% р-ну, в/в (для дорослих).
Фосфор та його сполуки		- Антитодот відсутній

Марганець та його сполуки	вік - 50.0.; збиті яєчні білки (при відсутності антидотів). Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	- Антидот відсутній
Ціаніди (синильна к-та та її солі, ціаністий калій, ціаністий водень)	Інактивація отрути в шлунку: тіосульфат натрію в дозі 0.5 - 2 г у вигляді 5-10 % р-ну; 0.04 % р-н перманганату калію; вугілля активоване.	-тіосульфат натрію в дозі: 25 мг/кг, в/в, крап.; 0.15-0.33 мл/кг (але не більше 10 мл 3 % р-ну) - для дітей; 10-20 мл 1-2% р-ну, в/в (для дорослих).
Т.58. Токсична дія монооксиду вуглецю		
Монооксид вуглецю	Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	- ацизол (діацетат біс (1-вінілімідазол-N) цинку) по 1 мл в/м 2-4 рази на добу. МДД для дорослого - 240 мг (4 мл); курс лікування 7 – 10 днів.
Т.59. Токсична дія інших газів, димів та випарів		
Сполуки сірки, сірководень	Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	- гіпербарична оксигенація
Сполуки хлору, хлорпікрин		
Газоподібний фтор та фтористий водень		
Ацетонітрил		- гіпербарична оксигенація - тіосульфат натрію в дозі: 25 мг/кг, в/в, крап.; 0.15-0.33 мл/кг (але не більше 10 мл 3 % р-ну) - для дітей; 10-20 мл 1-2% р-ну, в/в (для дорослих)
Інші гази, дими та випари		-гіпербарична оксигенація
Т.60. Токсична дія пестицидів		
Фосфорорганічні сполуки	Для інактивації отрути в шлунку: р-н перманганату калію (1:2000); міді сульфат у дозі 0.1-0.2 г. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	Для парентерального застосування: - атропіну сульфат 0.1 % р-н, застосовується протягом часу, необхідного для повної елімінації ФОС (2-4 доби) в наступних дозах та режимах введення: а) легкий ступінь важкості отруєння – 1-ша доба - 2 разові (2 мл 0,1 % р-ну) дози болюсно, п/ш або в/м; 2-3 доба – болюсно, разова доза, п/ш або в/м; б) середній ступінь – 1-ша доба -2 разові (2 мл 0,1 % р-ну) дози болюсно; потім кожні 15-20 хв. протягом декількох год., п/ш або в/м; 2-3 доба – болюсно, кожні 3-4 год., разова доза, п/ш або в/м; в) важкий ступінь - 4-6 разових доз в/в відразу, а далі кожні 5-8 хв. двократні дози в/м або п/ш до появи ознак переатропінізації протягом 3-4 діб. - верапаміл 0.25 % р-н у дозі 0.1-0.2 мг/кг, в/в. Примітка: При отруєннях фосфорорганічними сполуками не застосовувати антагоністи кальцію дигідропіридинового ряду! - діазепам 0.5 % р-н, в/в, в/м (або табл. р/ос). Реактиватори холінестерази (тільки протягом першої доби). Специфічні антидоти (реактиватори холінестерази) в Україні не зареєстровано.
Хлорорганічні (гексахлоран, гептахлор, ДДТ тощо)	Для інактивації отрути в шлунку: вугілля активоване г/кг; сульфат магнію 10 % р-н. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	Не вводити епінефрин, фенілефрин, норепінефрин – дуже обережно.
Т.62. Токсична дія інших шкідливих речовин продуктів харчування		
Рослини, що містять отрути переважно	Для інактивації отрути в шлунку: вугілля активоване; сульфат магнію 10 % р-н. Ентеросорбція протягом усього гострого	

нейротропної дії: 1) белена, беладона та інші рослини, які містять парасимпатоміметичні засоби	періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	- галантамін в/м, п/ш, у дозі: до 1 року - 0.2-0.5 мг; 2-4 роки - 1-2 мг; 5-7 років - 3-4 мг; 8-10 років - 4-5 мг; старше 10 років - 5-10 мг. - неостигмін, в/в, повільно, у дозі 0.03-0.05 мг/кг (під контролем частоти пульсу).
2) аконіти, болиголов		- 0.1 % р-н атропіну сульфату - 0.01 мг/кг, в/в (лікування «холіноміметичного» синдрому).
Рослини, що містять отрути переважно кардіотропної дії		- атропіну сульфат 0.1 % р-н у дозі: (0.01 % р-н) 0.02 мг/кг, в/м, 2 р/день; (0.1 % р-н) 1-2 крап., р/ос, 3 р/день. Антидоти в Україні не зареєстровано.
Грибні токсини нейро-вегетотропної дії	Для інактивації отрути в шлунку: вугілля активоване; сульфат магнію 10 % р-н. Ентеросорбція протягом усього г. періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	При переважанні мускарину: - атропіну сульфат 0.1 % р-н (1-2 доби): в умовах проведення хірургічних методів детоксикації дози антидота збільшити на 25-30 % ; доза насичення - в/в болюсно по 0.01-0.05 мг/кг ч/з кожні 5-15 хв. до появи ознак легкої атропінізації (зниження гіперсаливації, бронхореї, сухість шкіри); підтримуюча доза: в/в, крап., 0.02-0.08 мг/кг за год. (підтримуючі дози атропіну протягом 1 - 2 дні залежно від важкості отруєння з наступним переходом на в/м введення); застосування атропіну показане після промивання шлунка. - діазепам 0.5 % р-н, в/в, в/м, у дозі: 0.12-0.8 мг/кг на доб., в/в, в 2-4 введення; 0.3-0.5 мг/кг у хв., в/в; не більше 10 мг, в/в, болюсно. - верапаміл 0.25 % р-н у дозі 0.1-0.2 мг/кг, в/в. - реактиватори холінерастери (тільки протягом першої доби). При переважанні мускарину, мусцимолу, іботенової к-ти: - галантамін: 0,5 - 0,75 мг/кг/добу.
Грибні токсини гепато-нефротропної дії		При отруєнні грибними токсинами грибів наступних видів: Amonita phalloides – пеніцилін, сілібінін у вікових дозах; Gyrometra esculenta – піридоксин; Clitocybe dealbata, C. Cerusata, Inocybe, Omphalotus olearius – атропін.
Грибні токсини гастро-ентеротропної дії		- Антидот відсутній
Т.63. Токсична дія внаслідок контакту з отруйними тваринами		
Укуси гюрзи	Лікарські засоби, які застосовуються у місці укусу: - антисептики: спиртові р-ни йоду, брильянтової зелені; - кругова прокаїнова інфільтраційна блокада (0.5 % р-н прокаїну) вище (більш проксимально) місця укусу; - обколювання місця укусу 0.3-0.5 мл 0.1 % р-н епінефрину гідрохлориду.	- Інгібітори протеолізу (апротинін); - протиправцева сироватка. Специфічна сироватка в Україні не зареєстрована.
Укуси гримучої або коралової змії		Специфічна сироватка в Україні не зареєстрована.
Укуси кобри		- протиправцева сироватка. Специфічна сироватка в Україні не зареєстрована.
Укуси каракурта, скорпіона, сколопендри, інших павукоподібних		Специфічна сироватка в Україні не зареєстрована.
Укуси павука "чорної вдови":		кінський імуноглобулін (Ig) - 2-5 мл розвести в 50 мл фізіологічного р-ну, в/в, повільно, протягом 30 хв.
Укуси скорпіона		- Специфічна сироватка в Україні не зареєстрована.
Укуси невідомих		- протиправцева сироватка.

отруйних членистоногих, ящірки-ядозуба		Специфічна сироватка в Україні не зареєстрована.
Укуси земноводних		-Антидот в Україні не зареєстровано.
Укуси медоносної бджоли		- епінефрину гідрохлорид (використати при важких отруєннях, алергічних реакціях, укусах у слизові оболонки порожнини рота, дихальних шляхів, шию, рефлексогенні зони, судини) - 0.01 мг/кг, в/к, в/м, в/в з наступною в/в крапельною інфузією.
Ужалення медуз	Для інактивації отрути на шкірі: омивання уражених місць 3-9 % р-ном столового оцту протягом 30 сек. Примітка: при опіках медузами не можна терти й скребти уражену ділянку шкіри; промивати уражену ділянку прісною водою; використовувати для обробки ураженої ділянки ізопропіловий спирт; застосовувати р-ни кислот для знезаражування (при опіках американської сітчастої медузи).	Антидот відсутній
Поранення коралами	Для інактивації отрути на шкірі: омивання ураженої ділянки обмити прісною водою; обробка етиловим спиртом або р-ном аміаку; на місця порізів накласти пов'язки із сірчаною кислотою магnezією. Обробка слизової оболонки очей (за виникнення кон'юнктивіту): промити прісною водою; содовим р-ном; закапати анестезуючі очні краплі.	Антидот відсутній
Поранення багатощетинковим и хробаками	Для інактивації отрути на шкірі: 1) видалити уламки; 2) уражену ділянку шкіри обробити: ізотонічним р-ном NaCl; антисептичним р-ном (етиловим спиртом та ін.); - р-ном соди.	Антидот відсутній
ураження, нанесені моллюсками роду Conus		Антидот відсутній
ураження отрутою голотурій		Антидот відсутній
Т.64. Токсична дія афлатоксину та інших забруднюючих харчові продукти мікотоксинів		
Т.65. Токсична дія інших та неуточнених речовин		
Стріхнін та його солі	Для інактивації отрути в шлунку: вугілля активоване; сульфат магнію 10 % р-н.	- тіосульфат натрію в дозі: 25 мг/кг, в/в, крап. 0.15-0.33 мл/кг (але не більше 10 мл 3 % р-ну) - для дітей; 10-20 мл 1-2% р-ну, в/в (для дорослих).
Нітрозопохідні та амінопохідні бензолу та його гомологів (анілін, тротил)	Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване. Для очищення шкіри: проточна вода; слабкий (1-3 %) р-н столового оцту.	
Нафталін		- тіосульфат натрію в дозі: 25 мг/кг, в/в, крап. 0.15-0.33 мл/кг (але не більше 10 мл 3 % р-ну) - для дітей; 10-20 мл 1-2% р-ну, в/в (для дорослих).
Нікотин		- Антидот відсутній
Радіактивні речовини, у т.ч. радіоактивні метали	Для інактивації отрути в шлунку: вугілля активоване; сульфат магнію 10 % р-н; тіосульфат натрію в дозі (16.6 мл 30 % р-ну тіосульфату натрію на 100 мл питної води, або розвести антидот з водою в співвідношенні 1:5, р/ос); немовлята - 10.0; молодший вік - 20.0; шкільний вік - 50.0.; збиті яєчні білки (при відсутності антидотів) Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої к-ти; вугілля активоване.	- антиоксиданти (аскорбінова к-та, токоферол та ін.); - естрогени; - гепарин, полісахариди, нуклеїнові к-ти, полінуклеотиди; - біологічні радіопротектори – (адаптогени, антиоксиданти, з гемо- і імуностимулюючими, антимутагенними властивостями, вітаміни тощо).

1.3. Ентеросорбція

При гострих отруєннях застовується ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання: гідрогель метилкремнієвої кислоти; вугілля активоване

1.4. Детоксикаційні лікарські засоби

- **Кислота аскорбінова (Ascorbic acid)** (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")

Показання для застосування ЛЗ: передозування антикоагулянтів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають в/в струминно або краплинно і в/м; при отруєннях добову дозу підвищують до 500 мг; максимальна разова доза - 200 мг, МДД - 1 г.

- **Атропін (Atropine)** * (див. п. 3.3.3. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: специфічний антидот при отруєннях холіноміметичними сполуками і антихолінергічними (у тому числі фосфорорганічними) речовинами^{ВООЗ, БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при отруєнні антихолінергічними препаратами вводять по 2 мг^{ВООЗ} в/м кожні 20-30 хв. до виникнення почервоніння і сухості шкіри, розширення зіниць і появи тахікардії, нормалізації дихання; при помірному і тяжкому отруєнні атропін можна вводити протягом 2-х днів (до появи ознак «переатропінізації»).

- **Вугілля медичне активоване (Medicinal charcoal)** * ** (див. п. 10.8.1. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: г. отруєння^{ВООЗ, БНФ} побутового, промислового та харчового походження, лікарськими препаратами, отруєння алкалоїдами, солями важких металів; диспепсія, метеоризм, харчові токсикоінфекції.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при отруєннях: табл. внутрішньо дорослим у дозі 20-30 г на прийом у вигляді водної суспензії (на 0,5-2 склянки води); така суспензія використовується і для промивання шлунка. При підвищеній кислотності дорослим призначати 1-2 г препарату 3-4 рази на добу. Капс.: при отруєннях та інтоксикаціях дорослим застосовувати по 2 - 6 капс. 3 р/добу; при різних отруєннях дітям віком від 3 до 7 років: внутрішньо 5 г 3 р/добу; дітям віком від 7 до 14 років: 7 г 3 р/добу. Дітям Вугілля активоване завжди призначати у вигляді суспензії подрібнених таблеток у невеликій кількості води, після приймання якої необхідно випити склянку води; курс лікування при г. захворюваннях - 3-5 днів, при хр. захворюваннях, зумовлених ендогенними інтоксикаціями, - 10-15 днів.

- **Галантамін (Galantamine)** (див. п. 5.6.1. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЛІКУВАННІ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ")

Показання для застосування ЛЗ: отруєння антихолінергічними засобами.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: як антикурарний засіб та антидот при передозуванні периферичними недеполяризуючими нейром'язовими блокаторами препарат вводиться в/в в дозі 10-20 мг/добу; при післяопераційних парезах ШКТ і сечового міхура вводиться п/ш, в/м або в/в у дозах відповідно віку, розподілених на 2-3 р/добу. Дітям застосовувати в/в, дітям від 1 до 2 років в/в: 0,25-1 мг (0,03-0,08 мг/кг); дітям від 3 років - 0,03-0,28 мг/кг або: дітям від 3 до 5 років: 0,5-5 мг; дітям від 6 до 8 років: 0,75-7,5 мг; дітям від 9 до 11 років: 1-10 мг; дітям від 12 до 15 років: 1,25-12,5 мг; дітям від 15 років і дорослі: 1,25-15 мг.

- **Гідрогель метилкремнієвої кислоти (Methylsiliconic acid hydrogel)** ** (див. п. 3.12.2.2. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: отруєння алкоголем і наркотичними засобами.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо 3 р/добу за 1,5-2 год. до або ч/з 2 год. після їди або прийому медикаментів, запиваючи достатньою кількістю води; для дорослих та дітей віком від 14 років разова доза - 15 г (1 ст. л.), добова доза - 45 г; для дітей від народження до 5 років разова доза 5 г (1 ч.л.), добова - 15 г; від 5 до 14 років разова доза - 10 г (дес.л.), добова доза - 30 г; курс лікування 7 - 14 діб; при тяжких формах захворювань протягом перших 3-х діб можна застосовувати подвійну разову дозу, при хр. перебігу хвороби можливе більш тривале (до 1 місяця) застосування препарату.

- **Глюкагон (Glucagon)** * ** (див. п. 7.2. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: тяжкі гіпоглікемічні реакції, які можуть виникати у хворих на інсулінозалежний ЦД^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим вводять весь вміст фл. - 1 мл; застосування дітям залежить від віку або/та маси тіла дитини: дітям з масою тіла > 25 кг або віком від 6-8 років вводять весь вміст фл. - 1 мл; дітям з масою тіла < 25 кг або віком до 6-8 років вводять вміст ½ фл. - 0,5 мл; вводять п/ш, в/м.

- **Калію перманганат (Potassium permanganate)** * ** (див. п. 9.1.4. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: V03AB18 - антидоти.

Основна фармакотерапевтична дія: антидотна при отруєннях фосфором, опіюдами; сильний окислювач; у присутності органічних речовин, що легко окислюються (компоненти тканин, гнійні виділення), легко відщеплює кисень і перетворюється у діоксид марганцю, який в залежності від концентрації р-ну проявляє в'язучу, подразнювальну, припікальну дію; кисень, що вивільнився, зумовлює протимікробний і дезодораційний вплив.

Показання для застосування ЛЗ: отруєння опіюдами, алкалоїдами, фосфором, ніотином, синильною к-тою, хініном; для промивання шлунка; при потрапленні аніліну на шкіру; для припікання місця укусу комах і змії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при отруєннях для промивання шлунка застосовувати 0,01-0,1 % р-ни; для змазування (зрошення) виразкових і опікових поверхонь застосовувати 2-5 % р-ни.

- **Кальцію глюконат (Calcium gluconate)** * (див. п. 7.7.1.5. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: токсичні ураження печінки; гіперкаліємія^{БНФ}; як антидот при отруєннях солями магнію, щавлевою кислотою або її розчинними солями, розчинними солями фтористої к-ти.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в або в/м, повільно, протягом 2-3 хв.; дорослим та дітям віком від 14 років вводять по 5-10 мл 10 % р-ну 1 р/добу, залежно від характеру захворювання і стану хворого - щодня, ч/з день або ч/з 2 дні; дітям, залежно від віку, 10 % р-н глюконату кальцію вводять в/в у таких дозах: віком до 6 місяців - 0,1-1 мл, віком 6-12 місяців - 1-1,5 мл, 1-3 роки - 1,5-2 мл, 4-6 років - 2-2,5 мл, 7-14 років - 3-5 мл.

- **Кальцію хлорид (Calcium chloride)** (див. п. 10.5.5. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: гіпокаліємія^{БНФ}, що потребує швидкого підвищення концентрації іонів кальцію у плазмі крові (тетанія при функціональній недостатності параситовидної залози, тетанія при

недостатності вітаміну D, гіпокальціємія при обмінному переливанні крові та вливанні цитратної крові, алкалозі); у складі комплексної терапії при г. свинцевій коліці; магневіа інтоксикація, що виникає при передозуванні магнею; гіперкаліємія, зареєстрована на ЕКГ порушенням серцевої функції.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в струминно: 5 мл 10 % р-ну вводять зі швидкістю 1 мл/хв; в/в краплинно: 5-10 мл 10 % р-ну - розводять в 100-200 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду або 5 % р-ну глюкози, вводять зі швидкістю 6-8 крапель/хв. Обмінне переливання крові та переливання цитратної крові: дорослим і дітям по 30 мг (0,3 мл) на кожні 100 мл крові. Тетанія у дорослих: 10 мл 10 % р-ну (1 г) протягом 10-30 хв, у разі необхідності повторюють ч/з 6 год.; дітям: при гіпокальціємії вводять повільно, зі швидкістю до 0,5 мл/хв, у дозі 10-20 мг/кг маси тіла (0,1-0,2 мл/кг маси тіла), при необхідності повторюють кожні 4-6 год.; при тетанії: 10 мг/кг маси тіла (0,1 мл/кг маси тіла) протягом 5-10 хв., у разі необхідності повторюють ч/з 6 год або продовжують у вигляді інфузій; МДД для дітей (незалежно від віку) - 10 мл (1000 мг).

- **Магнею сульфат (Magnesium sulfate)** (див. п. 10.5.5. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: при отруєнні солями важких металів, тетраетилсвинцем, розчинними солями барію (антидот).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при інтоксикації ртуттю, миш'яком, тетраетилсвинцем вводити в/в по 5-10 мл розведеного у 2,5-5 разів 25 % р-ну магнею сульфату; при отруєнні розчинними солями барію вводити 4-8 мл в/в або промити шлунок 1 % р-ном магнею сульфату; для ліквідації дефіциту магнею у новонароджених призначати по 0,5-0,8 мл/кг 1 р/добу протягом 5-8 днів. Порошок для р-ну для р/ос застосування: отруєння розчинними солями барію дорослим - внутрішньо 20-25 г порошку, розчиненого у 200 мл води.

- **Менадіон (Menadione)** (див. п. 13.7.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: кровотечі та гіпропротромбінемії, зумовлені передозуванням феніліну, неодикумарину, інших антикоагулянтів - антагоністів вітаміну К.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять в/м; дорослим разова доза - 10 мг, максимальна разова доза - 15 мг; МДД - 30 мг; тривалість лікування - 3-4 дні, після 4-денної перерви курс у разі необхідності повторюють. Дітям до 1 року - 2-5 мг/добу, 1-2 років - 6 мг/добу, 3-4 років - 8 мг/добу, 5-9 років - 10 мг/добу, 10-18 років - 15 мг/добу; дозу розподіляють на 2 введення.

- **Метіонін (Methionine)** **

Фармакотерапевтична група: V03AB26 - антидоти.

Основна фармакотерапевтична дія: незамінна амінокислота, бере участь у процесах переметилування; проявляє ліпотропну дію, сприяє синтезу холіну, фосфоліпідів; бере участь у синтезі адреналіну, креатину; активує дію гормонів, вітамінів, ферментів; має детоксикуючі властивості завдяки здатності метилувати токсичні продукти; знижує концентрацію холестерину в крові і збільшує вміст фосфоліпідів.

Показання для застосування ЛЗ: лікування та профілактика захворювань і токсичних уражень печінки: токсичний гепатит, алкогольна гепатопатія, цироз печінки, отруєння препаратами миш'яку, хлороформом, бензолом та гепатотоксичними речовинами; в основі комбінованої терапії при хр. алкоголізмі, ЦД, для лікування дистрофії, що розвивається при білковій недостатності після дизентерії та інфекційних захворювань, атеросклерозу, при тяжких хірургічних операціях, опіках.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим по 500-1500 мг 3-4 р/добу; дітям разові дози: у віці 3-6 років - 250 мг, віком від 7 років - 500 мг; кратність прийому - 3-4 р/добу; застосовувати за 30 хв. -1 год. до їди; курс лікування - 10-30 днів або по 10 днів з 10-денними перервами між цими курсами.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота, блювання, АР.

Протипоказання до застосування ЛЗ: г. вірусні гепатити, печінкова енцефалопатія, важка печінкова недостатність, гіперчутливість до препарату.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МЕТІОНІН	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., в/о у бл.	250мг	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МЕТІОНІН	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., в/о у бл. в пач.	250мг	№10x5	33,60	

- **Налоксон (Naloxone)** * (див. п. 5.7.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЛІКУВАННІ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ")

Показання для застосування ЛЗ: передозування опіоїдів; для усунення пригнічення дихального центру, спричиненого опіоїдами; для відновлення дихання у новонароджених після введення породіллі опіоїдних анальгетиків^{БНФ, ВООЗ}; як діагностичний засіб у хворих з підозрою на опіоїдну залежність.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: гостре передозування опіатів: дорослим початкова доза - 0,4-2 мг в/в; якщо не настає відновлення дихання, введення слід повторити ч/з 2-3 хв.^{БНФ}; можна вводити в/м (початкова доза - 0,4-2 мг), якщо в/в введення неможливе; дітям: рекомендована початкова доза - 0,1 мг/кг маси тіла в/в; якщо бажаного ефекту не досягнуто, додатково у вигляді ін'єкції вводити 0,1 мг/кг маси тіла; залежно від стану пацієнта може бути показана в/в інфузія; якщо в/в введення неможливе, вводять в/м у початковій дозі 0,01 мг/маси тіла, розподілений на кілька введень. Відновлення дихання у новонароджених, матері яких отримували опіоїди: звичайна доза - 0,01 мг/кг маси тіла в/в; якщо при застосуванні цієї дози дихальна функція не відновлюється, введення можна повторити ч/з 2-3 хв.^{БНФ}; при неможливості в/в введення препарат вводять в/м у початковій дозі 0,01 мг/кг маси тіла.

- **Натрію бікарбонат (Sodium bicarbonate)** * (див. п. 7.9.2.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: некомпенсований метаболічний ацидоз^{БНФ, ВООЗ} при інтоксикаціях різної етіології, у тому числі медикаментозній (барбітуратами, саліцилатами), інфекційних захворюваннях, ЦД, під час наркозу і в післяопераційному періоді, при реанімаційних заходах, пов'язаних із зупинкою серця, поширених та/або глибоких опіках, шоку, діабетичній комі, тривалій діареї, нестримному блюванні, г.масивних крововтратах, тяжкому ураженні печінки та нирок, тривалих пропасних станах, тяжкій гіпоксії новонароджених; абсолютним показанням є зниження рН крові нижче 7,2 (норма 7,37-7,42).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: 4,2 % р-н: в/в крапл. зі швидкістю 1,5 ммоль/кг/год новонародженим в дозі 1-2 мл/кг за 1 раз під контролем показників кислотно-лужного та водно-електролітного балансу; при коригуванні метаболічних ацидозів дозування визначається залежно від показників газів крові за формулою: $\text{об'єм } 0,5\text{-молярного буферованого гідрокарбонату натрію } 4,2\% \text{ у мл} = \text{дефіцит баз } (-\text{BE}) \times \text{кг маси тіла хворого} \times 0,3 \times 2$ (фактор 0,3 відповідає частці позаклітинної рідини порівняно з загальною рідиною). МДД для дорослих - 300 мл (при підвищеній масі тіла-400 мл), МДД для дітей - від 100 до 200 мл залежно від маси тіла. 8,4% р-н: в/в крапл. без розведення або розведеним в ін. інфузійних р-нах, середня доза для дорослих становить від 2 до 5 ммоль/кг (2 - 5 мл/кг), вводять протягом 4 - 8 год., для дітей доза становить 1 ммоль/кг (1 мл/кг) при повільному введенні, або вводять 8,4 % р-н, розведений 1:1 з 5 % р-ном глюкози; при зупинці серця первинна доза для дорослих становить 1 ммоль/кг, після чого - 0,5 ммоль/кг кожні 10 хв.

- **Натрію тіосульфат (Sodium thiosulfate) *** (див. п. 5.7.5. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЛІКУВАННІ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ")

Показання для застосування ЛЗ: отруєння сполуками миш'яку, ртуті, свинцю, синильною к-тою та її солями^{БНФ, ВООЗ}, йодом, бромом та їх солями.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при отруєннях сполуками миш'яку, ртуті, свинцю, йодом, бромом та їх солями призначати в/в болюсно у дозі 1,5-3 г (5-10 мл р-ну для ін'єкцій 300 мг/мл); при отруєннях синильною к-тою та її солями вводять в/в повільно у дозі 15 г (50 мл р-ну для ін'єкцій 300 мг/мл); призначати протягом усього токсикогенного періоду (від появи перших клінічних симптомів отруєння до повної елімінації токсину з організму).

- **Неостигмін (Neostigmine) *** (див. п. 6.6.1. розділу "НЕВРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: усунення залишкових явищ після блокади нервово-м'язової передачі недеполяризуючими міорелаксантами^{БНФ, ВООЗ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: як антидот при передозуванні міорелаксантами (після попереднього введення атропіну сульфату^{БНФ} у дозі 0,6-1,2 мг в/в, до збільшення частоти пульсу до 80 уд/хв)^{ВООЗ}; призначати в/в повільно у дозі 0,5-2 мг ч/з 0,5-2 хв.; у разі необхідності ін'єкції повторити (у т. ч. атропіну у разі брадикардії) загальною дозою не більше 5-6 мг (10-12 мл) протягом 20-30 хв.; під час процедури забезпечити штучну вентиляцію легенів; дітям як антидот при передозуванні міорелаксантами^{БНФ, ВООЗ} (після попереднього введення атропіну сульфату у дозі 0,02-0,03 мг/кг маси тіла в/в, до збільшення частоти пульсу до 80 уд/хв); призначати в/в повільно у дозі 0,05-0,07 мг/кг маси тіла протягом 1 хв.; максимальна рекомендована доза для дітей становить 2,5 мг.

- **Пеніциламін (Penicillamine) *** (див. п. 8.7.1.7. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: отруєння свинцем^{ВООЗ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим - 1-1,5 г на добу за кілька прийомів до зниження рівня свинцю в сечі до 0,5 мг/добу^{ВООЗ}; пацієнтам літнього віку - 20 мг/кг маси за кілька прийомів до зниження рівня свинцю в сечі до 0,5 мг/добу; дітям лікарський засіб слід застосовувати, якщо концентрація свинцю в крові становить менше 45 мг/дл; загальна добова доза - від 15 до 20 мг/кг за 2-3 прийоми.

- **Піридоксин (Pyridoxine)**^{ГІМД} (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")

Показання для застосування ЛЗ: попереджує або зменшує токсичні ефекти (особливо поліневрити) при лікуванні протитуберкульозними препаратами^{БНФ, ВООЗ, ГІМД}; лікування піридоксинзалежних судом.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при застосуванні препаратів групи ізоніазиду призначають у добовій дозі 5-10 мг (0,1-0,2 мл) протягом усього курсу лікування ізоніазидом; при передозуванні препаратів групи ізоніазиду: на кожен 1 г передозованого препарату вводять в/в 1 г (20 мл) піридоксину зі швидкістю 0,5 г/хв.; при передозуванні ізоніазиду понад 10 г піридоксин вводять в/в в дозі 4 г (80 мл), а потім в/м - по 1 г (20 мл) препарату кожні 30 хв.; МДД - 70-350 мг/кг; при піридоксинзалежному синдромі, включаючи піридоксинзалежні судоми: в/в або в/м у дозі 50-500 мг (1-10 мл) на добу; в/в вводять зі швидкістю 50 мг/хв.; курс лікування - 3-4 тижні. Дітям при піридоксинзалежних судамах призначають в/м або в/в струминно у дозі 50-100 мг (1-2 мл) на добу зі швидкістю 50 мг/хв.; при передозуванні препаратів групи ізоніазиду на кожен 1 г передозованого препарату вводять в/в 1 г (20 мл) піридоксину; якщо доза ізоніазиду невідома, піридоксин вводять із розрахунку 70 мг/кг маси тіла; максимальна доза - 5 г (100 мл).

- **Протамін (Protamine) ***

Фармакотерапевтична група: V03AB14 - антидоти.

Основна фармакотерапевтична дія: активна діюча речовина препарату має гемостатичну дію; нейтралізує дію гепарину, зменшує його антикоагуляційні властивості; утворює з гепарином стабільні комплекси, при цьому гепарин втрачає здатність гальмувати згортання крові; комплексоутворення зумовлене великою кількістю катіонних груп (за рахунок аргініну), які зв'язуються з аніонними центрами гепарину; ефективний при деяких видах гемомагій, пов'язаних із гепаринподібними порушеннями згортання крові.

Показання для застосування ЛЗ: для нейтралізації надлишкової небажаної антикоагуляційної дії гепарину^{ВООЗ, БНФ}; при передозуванні, перед та після операцій на тлі терапії гепарином, після операцій на серці і кровоносних судинах із застосуванням екстракорпорального кровообігу, при проведенні гемодіалізу із застосуванням гепарину.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати у вигляді дуже повільних в/в^{ВООЗ} або п/ш ін'єкцій; потрібна кількість протаміну залежить від рівня гепарину, що циркулює в крові; з огляду на короткий період напіврозпаду гепарину, доза протаміну, потрібна для його нейтралізації, знижується відповідно до часу, який пройшов з моменту введення гепарину; при болюсних ін'єкціях гепарину доза протаміну залежить від часу, який минув з моменту ін'єкції гепарину. Дози протаміну, що застосовуються залежно від часу, який минув з моменту ін'єкції гепарину: 15-30 хв. - дози протаміну сульфату у перерахуванні на 100 МО (1 мг) гепарину 100-150 МО (1-1,5 мг); 30-60 хв. - 50-75 МО (0,5-0,75 мг); більш ніж 2 год. - 25-37,5 МО (0,25-0,375 мг); у поодиноких випадках, коли

потрібне лікування кровотечі, спричиненої гепарином, доза протаміну має становити 50 % від останньої введеної дози гепарину (у МО). Якщо пацієнту в/в краплинно вводити гепарин, необхідно припинити інфузію і ввести 2500-3000 МО (25-30 мг) протаміну сульфату шляхом повільної в/в ін'єкції; при п/ш ін'єкціях гепарину доза препарату - 100-150 МО (1-1,5 мг) на кожні 100 МО (1 мг) гепарину; перші 2500-5000 МО (25-50 мг) протаміну сульфату вводити в/в струминно повільно, а дозу, що залишилась, - в/в крапельно протягом 8-16 год. Протаміну сульфат можна застосовувати для інактивації гепарину після екстракорпорального діалізу, залежно від необхідної дози; у випадку застосування екстракорпорального кровообігу при оперативному втручанні доза становить 150 МО (1,5 мг) на кожні 100 МО (1мг) гепарину; якщо рівень гепарину невідомий, рекомендується розпочинати введення протаміну сульфату у дозі не більш ніж 1 мл у вигляді 1000 МО (10 мг/мл) для повільної в/в ін'єкції.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР, в т.ч. анафілактичні та анафілактоїдні р-ції, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, рідко шоківі стани; вазодилатація, лівошлуночкова СН або загальна СН із легеневою гіпертензією; набряк легень; бронхоспазм, некардіогенний набряк легень; тромбоцитопенія, лейкопенія; при занадто швидкому в/в введенні можуть виникнути нудота, блювання, припливи, брадикардія, диспное, тяжка гіпотензія або гіпертензія. Факторами ризику АР можуть бути алергія на рибу, вазектомія, лікування протамін-цинк інсуліном або протаміном для інактивації гепарину.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин, ідіопатична та вроджена гіпергепаринемія (у таких випадках протаміну сульфат неефективний та може навіть посилити кровоточивість); виражена артеріальна гіпотензія, тромбоцитопенія, недостатність кори надниркових залоз, гіповолемія.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ПРОТАМІНУ СУЛЬФАТ	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна	р-н д/ін'єк. у фл. по 10мл	1000 МО/мл	№1	240,00	
	ПРОТАМІНУ СУЛЬФАТ	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна	р-н д/ін'єк. у фл. по 5мл	1000 МО/мл	№5	850,00	

• **Сугамадекс (Sugammadex)**

Фармакотерапевтична група: V03AB35 - антидоти.

Основна фармакотерапевтична дія: модифікований гамма-циклодекстрин, що селективно зв'язує міорелаксанти; формує у плазмі крові комплекс із нейром'язовими блокуючими агентами рокуронієм і верокуронієм, зменшуючи кількість нейром'язового блокатора, що призводить до реверсії нейром'язової блокади, спричиненої рокуронієм або верокуронієм; сугамадекс можна застосовувати в різні моменти часу після введення рокуронію або верокуронію.

Показання для застосування ЛЗ: реверсія нейром'язової блокади, спричиненої рокуронієм або верокуронієм ^{БНФ}; рекомендується для застосування дітям і підліткам у віці від 2 до 17 років лише для стандартної реверсії блокади, спричиненої рокуронієм.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в у вигляді одноразової болюсної ін'єкції, яку зробити швидко, протягом 10 с; рекомендована доза залежить від рівня нейром'язової блокади, яка повинна бути реверсована, і не залежить від режиму анестезії; дорослим: *стандартна* реверсія нейром'язової блокади - рекомендована доза при відновленні, що досягає 1-2 посттетанічних скорочень при блокаді, спричиненій рокуронієм або верокуронієм, становить 4,0 мг/кг маси тіла; середній час відновлення відношення T_4/T_1 до 0,9 - близько 3 хв.; рекомендована доза при виникненні *спонтанного* відновлення повторної появи T_2 при блокаді становить 2 мг/кг маси тіла, середній час відновлення відношення T_4/T_1 до 0,9 - близько 2 хв. При необхідності негайної реверсії нейром'язової блокади, спричиненої рокуронієм, рекомендована доза сугамадексу - 16 мг/кг маси тіла ^{БНФ}; при застосуванні 16 мг/кг сугамадексу ч/з 3 хв після болюсної дози 1,2 мг/кг рокуронію броміду, середній час відновлення відношення T_4/T_1 до 0,9 становить близько 1,5 хв.; повторне введення сугамадексу в дозі 4 мг/кг рекомендується у виняткових ситуаціях поновлення нейром'язової блокади в післяопераційний період після початкової дози 2 мг/кг або 4 мг/кг. ^{БНФ}

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості від ізольованих шкірних р-цій до серйозних системних р-цій (анафілаксія, анафілактичний шок); приливи жару, кропив'янка, еритематозне висипання, гіпотензія, тахікардія, набряк язика, набряк глотки, бронхоспазм і легеневі обструктивні ускладнення; ускладнення при анестезії, що вказують на відновлення нейром'язової ф-ції, включають рухи кінцівок або тіла, кашель під час процедури анестезії або під час самої операції, гримаси або смоктання ендотрахеальної трубки; виражена брадикардія і брадикардія із зупинкою серця спостерігалися впродовж декількох хвилин після введення сугамадексу.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активної речовини або до будь-якого компонента препарату.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БРАЙДАН®	Н.В.Органон (виробництво за повним циклом, включаючи дозвіл на випуск серії)/Патеон Мануфакчурінг Сервісез Ел. Ел. Сі. (виробництво нерозфасованої продукції, первинне	р-н д/ін'єк., у фл. по 2мл, 5мл	100 мг/мл	№10		відсутня у реєстрі ОБЦ

		пакування, контроль серії в первинному пакуванні та під час випробувань стабільності), Нідерланди/США				
--	--	---	--	--	--	--

- **Кислота фолієва (Folic acid) *** (див. п. 13.1.2.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: анемії та лейкопенії, обумовлені іонізуючою радіацією, хімічними речовинами, у т.ч. ліками^{БНФ}; тривале лікування антагоністами фолієвої к-ти (метотрексат,^{БНФ} сульфаметоксазол/триметоприм), протисудомними препаратами (фенітоїн, примідон, фенобарбітал); поліневрити та полінейропатії, у т.ч. алкогольної етіології.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при мегалобластній анемії призначати по 5 мг/добу протягом 4 міс.; пацієнтам із захворюванням спру, макроцитарною анемією, мальабсорбцією, із запальними захворюваннями кишечника, при целіакії - по 5-15 мг на добу.

2. КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

- 2.1. β -адреноблокатори**
 - 2.1.1. Селективні (β_1) – адреноблокатори
 - 2.1.2. Неселективні β -адреноблокатори
 - 2.1.3. Комбіновані α - и β -адреноблокатори
- 2.2. Селективні інгібітори I f каналів**
- 2.3. Антагоністи кальцію (блокатори кальцієвих каналів)**
 - 2.3.1. Дигідропіридин
 - 2.3.2. Бензодіазепіни
 - 2.3.3. Фенілалкіламіни
 - 2.3.4. Дифенілалкіламіни
- 2.4. Інгібітори ангіотензинперетворюючого фермента (АПФ)**
- 2.5. Блокатори рецепторів ангіотензину II**
 - 2.5.1. Похідні біфенілтетразолу
 - 2.5.2. Похідні небіфенілтетразолу
 - 2.5.3. Похідні негетероциклічних сполук
- 2.6. Антигіпертензивні лікарські засоби центральної дії**
 - 2.6.1. Агоністи центральних α -адренорецепторів
 - 2.6.2. Агоністи імідазолінових рецепторів
 - 2.6.3. Антиадренергічні засоби, гангліоблокатори
- 2.7. Вазодилататори**
 - 2.7.1. Вінцеводилатуючі засоби міотропної дії
- 2.8. α –адреноблокатори**
 - 2.8.1. Селективні α_1 -адреноблокатори
- 2.9. Діуретики**
 - 2.9.1. Петльові діуретики
 - 2.9.2. Тіазидові та тіазидоподібні діуретики
 - 2.9.3. Інгібітори карбоангідрази
 - 2.9.4. Антагоністи альдостеронових рецепторів
 - 2.9.5. Осмодіуретики
- 2.10. Нітрати**
- 2.11. Похідні сиднонімінів**
- 2.12. Серцеві глікозиди**
- 2.13. Адреноміметичні лікарські засоби**
 - 2.13.1. α -, β -адреноміметики
 - 2.13.2. β_2 -адреноміметики
 - 2.13.3. Інші кардіологічні лікарські засоби
 - 2.13.3.1. Простагландини
 - 2.13.3.2. Лікарські засоби метаболічної дії
 - 2.13.3.3. Інші кардіотонічні засоби
- 2.14. Антиаритмічні лікарські засоби**
 - 2.14.1. Антиаритмічні засоби I класу
 - 2.14.1.1. Клас I A
 - 2.14.1.2. Клас I B
 - 2.14.1.3. Клас I C
 - 2.14.2. Антиаритмічні лікарські засоби II класу
 - 2.14.2.1. β -адреноблокатори
 - 2.14.3. Антиаритмічні лікарські засоби III класу

- 2.14.4. Антиаритмічні лікарські засоби IV класу
 - 2.14.4.1. Антагоністи кальцієвих каналів
 - 2.15. Лікарські засоби, які впливають на згортання крові та функцію тромбоцитів
 - 2.15.1. Антикоагулянти прямої дії
 - 2.15.1.1. Нефракціонований стандартний гепарин
 - 2.15.1.2. Низькомолекулярні фракціоновані гепарини
 - 2.15.1.3. Інші антитромботичні засоби
 - 2.15.2. Антикоагулянти непрямої дії
 - 2.15.2.1. Похідні кумаринів
 - 2.15.2.1.1. Похідні монокумаринів
 - 2.15.2.1.2. Похідні індандіону
 - 2.15.3. Антиагреганти
 - 2.15.3.1. Препарати ацетилсаліцилової кислоти
 - 2.15.3.2. Похідні тієнопіридину
 - 2.15.3.3. Блокатори глікопротеїнових IIb/IIIa рецепторів тромбоцитів
 - 2.15.3.4. Інші інгібітори агрегації тромбоцитів
 - 2.15.4. Фібринолітики
 - 2.16. Гіполіпідемічні лікарські засоби
 - 2.16.1. Інгібітори редуктази 3-гідрокси-3-метілглутарил-коензим А (ГМГ-КоА) або статини
 - 2.16.2. Похідні фіброєвої кислоти (фібрати)
 - 2.16.3. Інші засоби
 - 2.17. Засоби, що підвищують стійкість міокарда до гіпоксії
 - 2.17.1. Енергозабезпечувальні засоби
 - 2.18. Засоби, що регулюють кровообіг головного мозку
 - 2.18.1. Антитромботичні засоби
 - 2.18.1.1. Антиагреганти
 - 2.18.1.2. Антикоагулянти (прямої дії) нефракціоновані, стандартні та низькомолекулярні фракціоновані гепарини
 - 2.18.1.3. Фібринолітичні засоби
 - 2.18.1.4. Інгібітори фібринолізу
 - 2.18.2. Міотропні вазодилататори
 - 2.18.2.1. Міотропні вазодилататори прямої дії
 - 2.19. Лікарські засоби, які нормалізують метаболічні процеси у стінці судин
 - 2.19.1. Антиоксидантні засоби
 - 2.19.1.1. Статини
 - 2.19.2. Ангіопротектори
 - 2.19.3. Антигіпоксанти засоби
 - 2.19.3.1. Ноотропні засоби, похідні ГАМК
 - 2.20. Антиадренергічні лікарські засоби
 - 2.20.1. Гангліоблокуючі засоби
 - 2.20.2. Прості препарати беладони
 - 2.21. Анальгетики
 - 2.21.1. Опіюїди
 - 2.21.1.1. Природні алкалоїди опію
 - 2.21.1.2. Похідні фенілпіперидину
- 2.1. β-адреноблокатори**
- 2.1.1. Селективні (β1) – адреноблокатори**
- *Атенолол (Atenolol)* * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: C07AB03 - селективні блокатори β-адренорецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: належить до групи кардіоселективних β₁-адреноблокаторів; має антиангінальні, гіпотензивні та антиаритмічні ефекти; зменшує автоматизм синусового вузла, ЧСС, сповільнює AV- провідність, знижує скоротність міокарда та його потребу в кисні; при застосуванні в середніх терапевтичних дозах не спричиняє побічних явищ (бронхоспазм, СН тощо), характерних для неселективних β-адреноблокаторів.

Показання для застосування ЛЗ: АГ^{БНФ, ВООЗ, ПМД}; лікування і профілактика нападів стенокардії^{БНФ, ВООЗ} (хр. стабільна^{ПМД, БНФ} і нестабільна стенокардія^{БНФ, ВООЗ}, особливо у випадках поєднання з тахікардією та АГ); порушення серцевого ритму^{БНФ, ВООЗ} (аритмія, синусова тахікардія, профілактика надшлуночкової тахікардії, пароксизмальна суправентрикулярна тахікардія, мерехтіння і тріпотіння передсердь; вентрикулярні (шлуночкові аритмії), у т.ч. спричинені підвищеним фізичним навантаженням, прийомом симпатоміметичних засобів; профілактика шлуночкової тахікардії і мерехтіння шлуночків); ІМ^{БНФ, ВООЗ} (лікування і профілактика для зниження летальності і зменшення ризику повторного ІМ).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: ІМ: після в/в ведення, ч/з 12 год після ін'єкції, призначають 50 мг р/ос і 100 мг ще ч/з 12 год^{БНФ, ВООЗ}; суправентрикулярні (надшлуночкові) і вентрикулярні (шлуночкові) аритмії: 1-2 р/добу по 50-100 мг^{БНФ, ВООЗ}; МДД - 200 мг; хр. стабільна і нестабільна стенокардія: 100 мг 1 р/добу або 50 мг 2р/добу^{БНФ, ВООЗ}; АГ: розпочинають із 100 мг 1 р/добу, деяким пацієнтам достатньо 50 мг/добу, ефект спостерігається через 2 тижні, у разі неефективності застосовувати атенолол у поєднанні з діуретиками.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: брадикардія, артеріальна гіпотензія, порушення AV провідності (аж до зупинки серця) та прояви симптомів СН, відчуття холоду та парестезії у кінцівках, переміжна кульгавість; запаморочення, відчуття втомлюваності, головний біль, порушення сну, нічні кошмари, депресивні розлади настрою, галюцинації, психози, безсоння або сонливість, сплутаність свідомості; диспепсія, діарея, нудота, запор, гепатотоксичність, сухість у роті, порушення рівня трансаміназ, внутрішньопечінковий холестази; можливий розвиток гіпоглікемічного стану, особливо у хворих на ЦД на тлі гіпоглікемічної терапії; р-ції гіперчутливості, у т.ч. числі ангіоневротичний набряк, свербіж, почервоніння шкіри, екзантема, фотосенсибілізація, шкірні висипання (загострення псоріазу), уртикарні висипання, підвищення рівня антинуклеарних а/т, вовчаковий с-ром; випадки порушення лібідо та потенції, гінекомастія, імпотенція, утруднене сечовипускання; у хворих зі схильністю можливі прояви бронхіальної обструкції, бронхоспазм; пурпура, тромбоцитопенія, лейкопенія; сухість у роті, кон'юнктивіт або зменшення секреції слізних залоз, посилене потовиділення, порушення зору, м'язова слабкість, відчуття сухості в очах, алопеція, псоріазоподібні шкірні р-ції, с-м відміни; підвищення АТ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів лікарського засобу або до інших β-адренорецепторів, або до будь-яких компонентів препарату; г. СН; кардіогенний шок; AV блокада II і III ступенів; СССВ; СА блокада; синусова брадикардія (ЧСС менше 45 уд. за хв); артеріальна гіпотензія (сistolічний тиск менше 90 мм рт. ст.); БА; метаболічний ацидоз; тяжкі порушення периферичного кровообігу; одночасний прийом інгібіторів MAO (за винятком інгібіторів MAO-B); нелікована феохромоцитома; ниркова недостатність.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 75 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АТЕНОЛОЛ	ПАТ "Монфарм", Україна	табл. у бл.	0,05г	№10x2	0,45	
	АТЕНОЛОЛ - ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	50мг	№10		відсутня у реєстрі ОБЦ
	АТЕНОЛОЛ - ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	50мг	№10x2	1,06	
	АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	50мг, 100мг	№60, №90, №100		відсутня у реєстрі ОБЦ
	АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	50мг	№10x2	1,05	
	АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	100мг	№10x2	1,05	

• **Бетаксоллол (Betaxolol)** ^(ПМД)

Фармакотерапевтична група: C07AB05 - селективний блокатор β-адренорецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: кардіоселективна β-адреноблокуюча дія; відсутність часткової агоністичної активності (тобто не проявляє власної симпатоміметичної активності); слабкий мембраностабілізуючий ефект (подібно до хінідину або до місцевих анестетиків) у концентраціях, які перевищують рекомендовані терапевтичні дози.

Показання для застосування ЛЗ: АГ^{ПМД}, профілактика нападів стенокардії напруження.^{ПМД}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: звичайна доза - по 20 мг/добу при АГ та з метою профілактики нападів стенокардії напруження.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: астенія, безсоння; запаморочення, головний біль; біль у шлунку, діарея, нудота, блювання; похолодання кінцівок; брадикардія, іноді тяжка; імпотенція; дистальна

парестезія, летаргія; шкірні р-ції, включаючи псоріазоподібні висипання або загострення псоріазу, кропив'янка, свербіж, гіпергідроз; СН, зниження АТ, сповільнення AV провідності або посилення існуючої AV блокади; зупинка синусового вузла у схильних до цього пацієнтів; с-ром Рейно, погіршення переміжної кульгавості; бронхоспазм; погіршення зору, сухість очей; депресія, галюцинації, сплутаність свідомості, нічні кошмари; гіпоглікемія, гіперглікемія; поява антинуклеарних антитіл, яка тільки у виняткових випадках супроводжувалася клінічними проявами типу СЧВ, що минали після припинення лікування.

Протипоказання до застосування ЛЗ: тяжкі форми БА та ХОЗЛ; СН, яка не контролюється лікуванням; кардіогенний шок; AV-блокада II та III ступеня у хворих, які не мають водія ритму; стенокардія Принцметала (протипоказана монотерапія препаратом при ізольованій/типовій формі цього захворювання); дисфункція синусового вузла (включаючи СА блокаду); брадикардія (<45-50 уд/хв); тяжкі форми с-му Рейно та інших порушень периферичного кровообігу; нелікована феохромоцитома; артеріальна гіпотензія; гіперчутливість до бетаксолу; анафілактичні р-ції в анамнезі; метаболічний ацидоз; препарат протипоказаний для застосування у комбінації з флоктафеніном та сультопридом; не рекомендується у комбінації з аміодароном, дилтіаземом і верапамілом; у зв'язку з наявністю лактози протипоказаний пацієнтам із вродженою галактоземією, мальабсорбцією глюкози/галактози або с-мом дефіциту лактази.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 20 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БЕТАКОР	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., в криті п/о у бл.	20мг	№10x3	3,61	
II.	БЕТАК	Медокемі ЛТД (Центральний Завод), Кіпр	табл., в криті п/о у бл.	20мг	№10x3	5,04	30,26/€
	БЕТАК	Медокемі ЛТД (Центральний Завод), Кіпр	табл., в криті п/о у бл.	10мг	№10x3	7,06	30,26/€
	ЛОКРЕН®	САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА - ТУРЗ, Франція	табл., в криті п/о у бл.	20мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Бісопролол (Bisoprolol)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: С07AB07 - селективні блокатори β-адренорецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: високоселективний β₁-адреноблокатор; не має внутрішньої симпатоміметичної активності і клінічно виражених мембраностабілізуючих властивостей; має дуже низьку спорідненість із β₂-рецепторами гладкої мускулатури бронхів і судин, та із β₂-рецепторами, які беруть участь у метаболічній регуляції, т.ч. не впливає на опір дихальних шляхів і β₂-опосередковані метаболічні ефекти; не має вираженого негативного інотропного ефекту. При інтенсивній терапії у пацієнтів з ІХС без хр. СН зменшує серцевий викид та потребу міокарда в кисні завдяки зменшенню ЧСС та ударного об'єму; при тривалій терапії підвищений периферичний опір зменшується; також в основі антигіпертензивного ефекту лежить механізм зниження активності реніну в плазмі; пригнічує р-цію на симптоадренергічну активність, блокуючи кардіо-β₁-рецептори, що призводить до уповільнення серцебиття та зниження скорочувальної ф-ції міокарда, що знижує потребу міокарда в кисні; завдяки цьому досягається бажаний ефект у пацієнтів зі стенокардією та ІХС. Максимальний ефект настає ч/з 3-4 год. після перорального прийому; період напіввиведення з плазми - 10-12 год., що призводить до 24-годинної ефективності після одноразового прийому, максимальний антигіпертензивний ефект досягається ч/з 2 тижні прийому/

Показання для застосування ЛЗ: АГ^{ПМД, БНФ}, ІХС (стенокардія)^{ПМД, БНФ}, хр. СН^{БНФ}; із систолічною дисфункцією лівого шлуночка у комбінації з інгібіторами АПФ, діуретиками, у разі необхідності - серцевими глікозидами.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: АГ; ІХС (стенокардія) - лікування розпочинати поступово з низьких доз із подальшим підвищенням дози: 5 мг/добу^{БНФ}, у випадку помірної гіпертензії (діастолічний тиск до 105 мм рт.ст) - 2,5 мг; добова доза може бути підвищена до 10 мг/добу^{БНФ}, максимальна рекомендована доза 20 мг/добу^{БНФ}; лікування хр. СН розпочинається відповідно до поданої схеми титрування: 1,25 мг 1 р/добу протягом 1 тижня, підвищуючи до 2,5 мг 1 р/добу протягом наступного 1 тижня, підвищуючи до 3,75 мг 1 р/добу протягом наступного 1 тижня, підвищуючи до 5 мг 1 р/добу протягом наступних 4-х тижнів, підвищуючи до 7,5 мг 1 р/добу протягом наступних 4-х тижнів, підвищуючи до 10 мг 1 р/добу як підтримуюча терапія; максимальна рекомендована доза становить 10 мг 1 р/добу^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: брадикардія (у пацієнтів з хр. СН, з АГ або ІХС); ознаки погіршення СН (у пацієнтів з хр. СН, АГ або ІХС); порушення AV-провідності (у пацієнтів з АГ або ІХС); запаморочення, головний біль, сінкопе; зниження слюзовиділення; кон'юнктивіт; погіршення слуху; бронхоспазм у пацієнтів з БА в анамнезі та ХОЗЛ; алергічний риніт; нудота, блювання, діарея, запор; реакції гіперчутливості - свербіж, почервоніння, висипання; алопеція; погіршення стану хворих на псоріаз у вигляді псоріатичного висипання; м'язова слабкість, судоми; гепатит; відчуття холоду або оніміння в кінцівках, артеріальна гіпотензія (у пацієнтів з СН, АГ); порушення потенції; депресія, порушення сну; нічні кошмари, галюцинації; підвищення рівня тригліцеридів у крові, підвищення активності печінкових ферментів у плазмі крові (АСТ, АЛТ); астенія (у пацієнтів з хр.СН, АГ та ІХС), втомлюваність; ортостатична гіпотензія (у пацієнтів із хр.СН).

Протипоказання до застосування ЛЗ: г. СН або СН у стані декомпенсації, що потребує інотропної терапії; кардіогенний шок; AV-блокада II і III ст. (за винятком такої у пацієнтів зі штучним водієм ритму); CCCB; СА блокада; симптоматична брадикардія; симптоматична артеріальна гіпотензія; тяжка форма БА; пізні стадії порушення периферичного кровообігу або хвороби Рейно; феохромоцитома, що не лікувалася; метаболічний ацидоз; підвищена чутливість до бісопрололу або інших компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 10 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БІПРОЛОЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (виробництво за повним циклом)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофарм" (виробництво, пакування, випуск серій)/Товариство з обмеженою відповідал, Україна/Україна/Україна	табл. у бл. та конт.	5мг, 10мг	№10x6, №60, №90	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БІПРОЛОЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (виробництво за повним циклом)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофарм" (виробництво, пакування, випуск серій)/Товариство з обмеженою відповідал, Україна/Україна/Україна	табл. у бл. та конт.	5мг	№10x3	0,68	
	БІПРОЛОЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (виробництво за повним циклом)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофарм" (виробництво, пакування, випуск серій)/Товариство з обмеженою відповідал, Україна/Україна/Україна	табл. у бл. та конт.	10мг	№10x3	0,64	
	БІПРОЛОЛ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№10x3	2,50	
	БІПРОЛОЛ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№10x3	1,56	
	БІПРОЛОЛ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	1,48	
	БІСОПРОЛ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x5	0,51	
	БІСОПРОЛ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x2	1,00	
	БІСОПРОЛ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x3	4,27	
	БІСОПРОЛ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x5	0,51	
	БІСОПРОЛ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x2	0,95	
	БІСОПРОЛ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x3	3,03	
	БІСОПРОЛ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	2,5мг, 5мг, 10мг	№20, №30, №50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БІСОПРОЛ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	2,5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БІСОПРОЛ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	2,5мг	№10x2	3,60	
	БІСОПРОЛ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	2,5мг	№10x5	3,60	
	БІСОПРОЛОЛ - АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	5мг, 10мг	№10x3, №10x9	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БІСОПРОЛОЛ - АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x6	0,70	
	БІСОПРОЛОЛ - АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x2	1,80	
	БІСОПРОЛОЛ - АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x6	0,63	
	БІСОПРОЛОЛ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x2	1,30	

	- АСТРАФАРМ						
	БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг, 5мг, 10мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БІСОПРОЛОЛ-КВ	АТ "КІЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x3	0,65	
	БІСОПРОЛОЛ-КВ	АТ "КІЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x3	0,56	
II.	БІКАРД®	Лабораторіос Нормон С.А., Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№15x2	1,55	30,68/€
	БІКАРД®	Лабораторіос Нормон С.А., Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№15x2	1,18	30,68/€
	БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО	Ауробіндо Фарма Лімітед - Юніт III/Ауробіндо Фарма Лтд, Формулейшн Юніт XV, Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№14x2	1,64	27,12/\$
	БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО	Ауробіндо Фарма Лімітед - Юніт III/Ауробіндо Фарма Лтд, Формулейшн Юніт XV, Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№14x2	0,90	27,12/\$
	БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО	Ауробіндо Фарма Лімітед - Юніт III/Ауробіндо Фарма Лтд, Формулейшн Юніт XV, Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№14x2	0,59	27,12/\$
	БІСОПРОЛОЛ КРКА	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії)/ТАД Фарма ГмбХ (первинне та вторинне пакування, випуск серії, контроль серії)/Лабор ЛС СЕ & Ко. КГ (контроль мікробіологічної чистоти серії, Словенія/ Німеччина/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг, 5мг, 10мг	№10, №20, №28, №30, №50, №56, №60, №84, №90, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ®	Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом)/Лек С.А. (альтернативний виробник - виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Польща	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг	№15x2, №15x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ®	Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом)/Лек С.А. (альтернативний виробник - виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Польща	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№15x6	1,29	27,95/\$
	БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ®	Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом)/Лек С.А. (альтернативний виробник - виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Польща	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№10x3	1,32	27,95/\$
	БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ®	Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом)/Лек С.А. (альтернативний виробник - виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Польща	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№15x6	0,56	27,95/\$
	БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ®	Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом)/Лек С.А. (альтернативний виробник - виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Польща	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	1,07	27,95/\$

БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА	Меркле ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, дозвіл на випуск серії; первинна та вторинна упаковка, контроль серії), Німеччина	табл. у бл.	5мг	№10x3	1,69	26,30/\$
БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА	Меркле ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, дозвіл на випуск серії; первинна та вторинна упаковка, контроль серії), Німеччина	табл. у бл.	5мг	№10x5	1,69	26,30/\$
БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА	Меркле ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, дозвіл на випуск серії; первинна та вторинна упаковка, контроль серії), Німеччина	табл. у бл.	10мг	№10x3	1,10	26,30/\$
БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА	Меркле ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, дозвіл на випуск серії; первинна та вторинна упаковка, контроль серії), Німеччина	табл. у бл.	10мг	№10x5	1,10	26,30/\$
БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
БІСОСТАД	СТАДА Арцнайміттель АГ (випуск серії)/СТЕЛЛАФАРМ ДЖ.В. КО., ЛТД. – ПІДРОЗДІЛ 1 (виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування, контроль серій), Німеччина/В'єтнам	табл., вкриті п/о у бл. в кор. або саше	5мг, 10мг	№10x3, №10x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ДОРЕЗ®	Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг, 5мг, 10мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КОНКОР	Мерк КГаА, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№25x2	6,10	30,09/€
КОНКОР	Мерк КГаА, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№30x1	6,93	30,09/€
КОНКОР	Мерк КГаА, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№25x2	5,07	30,09/€
КОНКОР	Мерк КГаА, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№30x1	5,39	30,09/€
КОНКОР®	Мерк Хелскеа КГаА, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг	№30x1, №25x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КОРОНАЛ® 10	АТ "Санека Фармасьютикалз"/С.С. "Зентіва С.А.", Словацька Республіка/Румунія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№30, №60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КОРОНАЛ® 5	АТ "Санека Фармасьютикалз"/С.С. "Зентіва С.А.", Словацька Республіка/Румунія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№30, №60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РІВОКОР	Рівофарм СА, Швейцарія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг	№15x2, №15x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	

- **Есмолол (Esmolol)** ^[1МД] (див. п. 2.14.2.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Метопрололу тартрат (Metoprolol tartrate)** * ^[1МД] (див. п. 31.1.1.2. розділу "Формуляр первинної медичної допомоги")

Фармакотерапевтична група: С07АВ02 - селективні блокатори β-адренорецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: β-блокатор адренергічних рецепторів з відносною бета₁-селективністю («кардіоселективністю») без внутрішньої симпатоміметичної активності; специфічним шляхом блокує дію катехоламінів на рівні адренергічних β₁-рецепторів; зменшує потребу міокарда у кисні при навантаженні, що має позитивну дію при тривалому лікуванні стенокардії (зменшення частоти больових нападів); знижує систолічний АТ, особливо після напруження, і запобігає розвитку рефлекторної ортостатичної гіпотензії; зниження діастолічного АТ настає ч/з кілька тижнів регулярного застосування; знижує плазматичну активність реніну, інгібуючи β₂-рецептори може викликати збільшення тонуусу гладких м'язів. Не має β-стимулюючого ефекту та проявляє незначну мембраностабілізуючу активність; зменшує дію катехоламінів при фізичному та психоемоційному навантаженні, призводить до зменшення ЧСС, знижує серцевий викид та знижує підвищений

АТ; чинить менший скоротливий ефект на м'язи бронхів порівняно з впливом неселективних β -блокаторів. Ця властивість дозволяє проводити лікування метопрололом у комбінації зі стимуляторами бета₂-рецепторів у пацієнтів із БА або іншими вираженими обструктивними захворюваннями легень; впливає на вивільнення інсуліну та на вуглеводний обмін меншою мірою, ніж неселективні β -блокатори, і тому може застосовуватися у пацієнтів із ЦД; СС р-ції при гіпоглікемії менш виражені при застосуванні метопрололу, повернення рівнів цукру в крові до нормальних значень відбувається швидше, ніж при застосуванні неселективних блокаторів β -рецепторів. В/в терапія метопрололом при ІМ зменшує вираженість болю в грудній клітці та знижує частоту фібриляції та тріпотіння передсердь; раннє введення (впродовж 24 год. після появи перших симптомів) дає змогу обмежити розвиток та поширення зони ІМ. При пароксизмальній передсердній тахікардії та фібриляції/тріпотінні передсердь спостерігається зниження частоти скорочення шлуночків серця.

Показання для застосування ЛЗ: в/в: суправентрикулярна тахіаритмія; профілактика та лікування ішемії міокарда, тахіаритмії та болю, якщо підозрюється або діагностований ІМ; р/ос: АГ^{БНФ, ПМД}, стенокардія^{БНФ} (у т.ч. постінфарктна); аритмія (включаючи суправентрикулярну тахікардію); екстрене лікування ІМ та профілактика повторного інфаркту; гіперкінетичний кардіальний с-ром; профілактика мігрені^{БНФ}. У складі комплексної терапії при тиреотоксикозі.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в введення: суправентрикулярна тахіаритмія - на початковому етапі 5 мг (5 мл) в/в зі швидкістю 1-2 мг/хв; введення в такій дозі може повторюватися кожні 5 хв. до досягнення необхідного ефекту; зазвичай загальна доза 10-15 мг є достатньою; МДД - 20 мг; профілактика і лікування ішемії міокарда, тахіаритмія і біль у випадку підозрюваного або діагностованого ІМ: г. стан: в/в 5 мг, введення можна повторювати кожні 2 хв; максимальна доза 15 мг; ч/з 15 хв після останньої ін'єкції призначити внутрішньо 50 мг кожні 6 год. впродовж 48 год; р/ос: АГ - рекомендована доза становить 50-100 мг на добу^{БНФ} (1 раз/добу вранці або 2 рази-вранці та ввечері); якщо при цьому дозуванні терапевтичного ефекту не досягнуто, добову дозу можна збільшити до 200 мг, розподілених на два прийоми (вранці та ввечері), або комбінувати препарат з іншими антигіпертензивними препаратами; стенокардія (в т.ч. після інфаркту міокарда) - рекомендована доза 50-100 мг на добу (1 раз/добу вранці або 2 рази-вранці та ввечері), якщо ця доза не дає бажаного терапевтичного ефекту, її можна збільшити до 200 мг, розподілених на два прийоми (вранці та ввечері); у разі необхідності препарат можна комбінувати з іншими препаратами для лікування стенокардії. Аритмія (включаючи суправентрикулярну тахікардію) - рекомендована доза 100-200 мг/добу (дозу 100 мг приймають 1 раз вранці; дозу 200 мг - 100 мг вранці та 100 мг ввечері). При г. ІМ лікування починають якомога швидше після госпіталізації, початкова доза—5 мг метопрололу тартрату в/в, залежно від переносимості, наступні дози по 5 мг можна вводити в/в з інтервалом в 2 хв до досягнення загальної максимальної дози 15 мг метопрололу тартрату, якщо повна доза 15 мг, введена в/в, переноситься добре, ч/з 15 хвилин після останнього в/в введення 1 раз застосовують 50 мг перорально; у наступні 48 год. 50 мг застосовують перорально кожні 6 год.; для пацієнтів, які не переносили дозу більше 15 мг метопрололу тартрату в/в, подальшу пероральну терапію слід розпочинати з обережністю з 25 мг; підтримувальна доза - рекомендована доза становить 200 мг у два прийоми (вранці та ввечері); якщо спостерігається зниження ЧСС і/або АТ або інші ускладнення, які потребують лікування, застосування препарату слід припинити негайно; гіперкінетичний серцевий с-ром - рекомендована доза 50-100 мг на добу (приймати 1 раз вранці або розділити на два прийоми—вранці та ввечері); якщо ця доза не дає бажаного терапевтичного ефекту, її можна збільшити до 200 мг, розподілених на два прийоми (вранці та ввечері); попередження нападів мігрені - рекомендована добова доза 100-200 мг/добу (дозу 100 мг приймають один раз вранці; дозу 200 мг - 100 мг вранці та 100 мг ввечері).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: брадикардія, відчуття серцебиття; біль у грудній клітці, минущі загострення СН та стенокардії, кардіогенний шок у пацієнтів з г. ІМ, серцева блокада I-II ст.; подовження AV-провідності, порушення ритму серця; тромбоцитопенія, агранулоцитоз, лейкопенія; головний біль, запаморочення; парестезії; порушення зору, сухість та/або подразнення очей; кон'юнктивіт; дзвін у вухах; задишка при фізичному навантаженні; бронхоспазм у пацієнтів із БА або астматичними проблемами; риніт; загострення ниркової недостатності; біль у животі, нудота, блювання, діарея, запор, печія, здуття; порушення відчуття смаку; сухість у роті; АР на шкірі; загострення псоріазу, р-ції фотосенсибілізації, пітливість, випадіння волосся; м'язові судоми, біль у суглобах; периферійний холод у кінцівках; непритомність; гангрена у пацієнтів із тяжкими порушеннями з боку периферичних судин; підвищена втомлюваність; набряки, збільшення маси тіла; підвищення рівнів трансаміназ; гепатит; дисфункція лібідо зворотного характеру; депресія, нічні кошмари, порушення сну; погіршення пам'яті, перепади настрою; порушення смакових відчуттів; сплутаність свідомості, нервозність, неспокій, галюцинації; порушення здатності концентрації уваги; відхилення від норми з боку показників ф-ції печінки; при в/в введенні може у рідких випадках спричинити клінічно значуще падіння АТ; безсоння, сонливість, амнезія, погіршення існуючої AV-блокади, постуральні розлади (дуже рідко із синкопе), феномен Рейно, посилення симптомів перемижної кульгавості, висип (псоріатиформна кропив'янка, дистрофічні ураження шкіри), імпотенція/сексуальна дисфункція, прекардіальний біль, поява антинуклеарних антитіл (не пов'язаних із системним червоним вовчаком); р-ції у місці введення; ЦД, загострення ЦД, гіпоглікемія; зміна особистості, надмірні сновидіння; порушення слуху, тинітус; респіраторний дистрес-синдром; м'язова слабкість, м'язові спазми; моноартрит, поліартрит; хвороба Пейрони; зниження рівня ліпопротеїдів високої щільності, підвищення рівня тригліцеридів при нормальному рівні загального холестерину.

Протипоказання до застосування ЛЗ: кардіогенний шок; СССВ; AV-блокада II і III ступеня; синоатріальна блокада; пацієнти з нестабільною, некомпенсованою СН (набряк легенів, гіпоперфузія або артеріальна гіпотензія) і пацієнти, які отримують інотропну терапію, що триває або проводиться час від часу і спрямована на β -рецептори; симптоматична брадикардія; артеріальна гіпотензія; метопролол не слід призначати пацієнтам із підозрою на г. ІМ доти, доки ЧСС становить < 45 уд./хв, інтервал P-Q становить > 0,24 секунди або систолічний АТ становить < 100 мм рт.ст.; при суправентрикулярній тахіаритмії не слід призначати пацієнтам, у яких систолічний тиск крові становить нижче 110 мм рт.ст.; захворювання периферичних судин із загрозою розвитку гангрени; встановлена гіперчутливість до метопрололу тартрату або інших β -блокаторів та допоміжних речовин; нелікована феохромоцитома; метаболічний ацидоз; протипоказаний у випадках, коли г. ІМ ускладнюється серцевою блокадою I ступеня та/або тяжкою СН; бронхіальна гіперреактивність (бронхіальна астма), тяжка форма хр. обструктивних бронхолегеневих захворювань; супутня терапія інгібіторами моноаміноксидази А;

застосування метопрололу протипоказано хворим, яким проводиться в/в введення антагоністів кальцію типу верапамілу та дилтіазему або інших анти ритмічних препаратів (таких як дизопірамід).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,15 г., парентерально - 0,15 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МЕТОПРОЛОЛ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	25мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МЕТОПРОЛОЛ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	50мг	№10х3	0,98	
	МЕТОПРОЛОЛ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	100мг	№10х3	0,86	
	МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	0,05г; 0,1г	№10х5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	0,05г	№10х2	1,43	
	МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	0,1г	№10х2	1,09	
II.	БЕТАЛОК	Сенексі, Франція	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп.	1 мг/мл	№5	2765,28	24,33/\$
	ЕГІЛОК®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС (Виробник відповідальний за повний цикл виробництва, вторинне та первинне пакування, контроль серії та випуск серії), Угорщина	табл. у фл.	25мг, 50мг, 100мг	№30, №60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАРДОЛАКС	Мефар Ілач Сан. А.Ш., Туреччина	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	1 мг/мл	№10х1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КОРВІТОЛ® 100	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробник, що виконує виробництво препарату "in bulk", контроль серії; виробник, що виконує кінцеве пакування, контроль та випуск серії)/ Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (виробник, що виконує кінцеве пакування), Німеччина/Німеччина	табл. у бл.	100мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КОРВІТОЛ® 100	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробник, що виконує виробництво препарату "in bulk", контроль серії; виробник, що виконує кінцеве пакування, контроль та випуск серії)/ Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (виробник, що виконує кінцеве пакування), Німеччина/Німеччина	табл. у бл.	100мг	№10х5	3,21	29,36/€
	КОРВІТОЛ® 50	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробник, що виконує виробництво препарату "in bulk", контроль серії; виробник, що виконує кінцеве пакування, контроль та випуск серії)/ Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (виробник, що виконує кінцеве пакування), Німеччина/Німеччина	табл. у бл.	50мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КОРВІТОЛ® 50	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробник, що виконує виробництво препарату "in bulk", контроль серії; виробник, що виконує кінцеве пакування, контроль та випуск серії)/ Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (виробник, що виконує кінцеве пакування), Німеччина/Німеччина	табл. у бл.	50мг	№10х5	3,75	29,36/€

- **Метопрололу сукцинат (Metoprolol succinati)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: C07AB02 - селективні блокатори β -адренорецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: селективний блокатор β_1 -адренорецепторів, впливає на β_1 -рецептори серця у нижчих дозах, ніж потрібно для впливу на β_2 -рецептори периферичних судин та бронхів, селективність ϵ

дозозалежною, оскільки максимальна концентрація у плазмі крові при застосуванні лікарської форми з уповільненим вивільненням значно нижча ніж при прийомі такої ж самої дози у формі звичайної табл.; не має β-стимулюючого ефекту і виявляє незначний мембраностимулювальний ефект; блокатори β-рецепторів чинять негативний інотропний та хронотропний ефект, зменшує дію катехоламінів на серце при фізичному і психоемоційному навантаженні та призводить до зменшення ЧСС, серцевого викиду, а також знижує підвищений АТ; у стресових ситуаціях, що супроводжуються підвищеним вивільненням адреналіну з надниркових залоз, не перешкоджає нормальному фізіологічному розширенню судин, у терапевтичних дозах менше впливає на м'язи бронхів, ніж неселективні β-блокатори, меншою мірою впливає на вивільнення інсуліну і вуглеводний обмін, ніж неселективні β-блокатори, менше впливає на СС реакцію в умовах гіпоглікемії, і повернення рівня цукру в крові до нормальних значень відбувається швидше, ніж у разі застосування неселективних блокаторів β-рецепторів; при АГ суттєво знижує АТ протягом більше 24 год, як у положенні лежачи, так і в положенні стоячи, а також під час фізичного навантаження; на початку лікування спостерігається підвищення опору периферичних судин, проте при тривалому лікуванні зниження АТ може відбуватися шляхом зменшення загального периферичного опору судин на тлі незміненого серцевого викиду.

Показання для застосування ЛЗ: АГ^{ПМД}, стенокардія^{ПМД}, стабільна симптоматична хр. СН із порушенням систолічної функції лівого шлуночка; попередження серцевої смерті та повторного інфаркту після г. фази ІМ; серцеві аритмії, включаючи суправентрикулярну тахікардію; зниження частоти скорочення шлуночків при фібриляції передсердь та шлуночкових екстрасистол; функціональні порушення серцевої діяльності, що супроводжуються серцебиттям; профілактика мігрені.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: 1 р/добу, бажано зранку; АГ - 50-100 мг 1 р/добу, якщо доза 100 мг є недостатньою для досягнення терапевтичного ефекту, можна комбінувати з іншими антигіпертензивними ЛЗ; стенокардія - 100-200 мг 1 р/добу; стабільна СН, ІІ ФК - початкова доза у перші 2 тижні 25 мг 1 р/добу, після двох тижнів доза може бути збільшена до 50 мг 1 р/добу, і далі може подвоюватися кожні 2 тижні, цільова доза для тривалого лікування 200 мг 1 р/добу; стабільна СН, ІІІ-ІV ФК - початкова доза перші 2 тижні становить 12,5 мг, після 1-2 тижнів прийому 12,5 мг доза може бути збільшена до 25 мг 1 р/добу, через 2 тижні доза може бути збільшена до 50 мг 1 р/добу, пацієнтам, які добре переносять більш високі дози, можна подвоювати дозу кожні 2 тижні до досягнення МДД 200 мг; серцева аритмія - 100-200 мг 1р/добу; профілактичне лікування після ІМ - підтримуюча доза 200 мг 1 р/добу; функціональні порушення серцевої діяльності, що супроводжуються серцебиттям - 100 мг 1 р/добу; профілактика мігрені - 100-200 мг 1 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: Втомлюваність, запаморочення, головний біль; абдомінальний біль, нудота, блювання, діарея, запор; холодні кінцівки, брадикардія, відчуття серцебиття; задишка при фізичній активності; депресія, нічні кошмари, порушення сну; порушення пам'яті, сплутаність свідомості, галюцинації, нервозність, тривожність; ослаблення концентрації уваги; парестезії; порушення смаку; м'язові судоми; порушення зору, сухість та/або подразнення очей; симптоми, що нагадують кон'юнктивіт; відчуття шуму/дзвін у вухах; тимчасове погіршення симптомів СН, кардіогенний шок у пацієнтів з г.ІМ; подовження атріовентрикулярної провідності, серцева аритмія; гангрена у пацієнтів з тяжкими порушеннями периферичних судин; бронхоспазм у пацієнтів з БА або астматичними проблемами; риніт; сухість у роті; підвищення рівнів трансаміназ; гепатит; р-ції гіперчутливості шкіри; загострення псоріазу, фотосенсибілізація, гіпергідроз, випадання волосся; артралгія; оборотна дисфункція лібідо; біль у грудній клітці, набряки, збільшення маси тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: кардіогенний шок; СССВ (за умови відсутності постійного кардіостимулятора; AV-блокада ІІ та ІІІ ступеня; СН у стадії декомпенсації (набряк легень, с-м гіперперфузії або гіпотензії); тривала або періодична інотропна терапія агоністами β-рецепторів; симптоматична брадикардія або артеріальна гіпотензія; підозра на г. ІМ при ЧСС < 45 уд/хв., P-Q інтервалі > 0,24 с або систолічному АТ < 100 мм рт. ст.; серйозне захворювання периферичних судин із загрозою гангрени; підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату або до інших β-блокаторів.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,15 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
ІІ.	БЕТАЛОК ЗОК	АстраЗенека АБ, Швеція	табл., вкриті п/о з упов. вивіл. у фл.	50мг	№30	14,52	27,05/\$
	БЕТАЛОК ЗОК	АстраЗенека АБ, Швеція	табл., вкриті п/о з упов. вивіл. у фл.	100мг	№30	10,37	27,05/\$
	БЕТАЛОК ЗОК	АстраЗенека АБ, Швеція	табл., вкриті п/о з упов. вивіл. у фл.	25мг	№14x1	34,57	27,05/\$

• **Небіволол (Nebivolol)**^{ПМД}

Фармакотерапевтична група: С07AB12 - селективні блокатори β-адренорецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: антигіпертензивна, антиангінальна, антиаритмічна дія; являє собою рацемат, який складається з двох енантіомерів: D-небіволол та L-небіволол і поєднує дві фармакологічні властивості - конкурентного і селективного блокатора β-адренорецепторів та "м'якого" вазодилатора внаслідок метаболічної взаємодії з L-аргініном/оксидом азоту (NO); при одноразовому і повторному застосуванні знижується ЧСС у стані спокою і при навантаженні як в осіб з нормальним АТ, так і у хворих на АГ; у терапевтичних дозах α-адренергічний антагонізм не спостерігається; у пацієнтів з АГ знижується системний судинний опір; незважаючи на зниження ЧСС, зменшення серцевого викиду у стані спокою та при навантаженні обмежене ч/з збільшення ударного об'єму.

Показання для застосування ЛЗ: есенціальна АГ^{БНФ,ПМД}, хр.СН легкого ст. або помірного ст. тяжкості як доповнення до стандартних методів лікування хворих віком від 70 років.^{БНФ} Хронічна ІХС.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: АГ - доза 5 мг/добу^{БНФ} (приймати її завжди в один і той же час); антигіпертензивний ефект виявляється ч/з 1-2 тижні лікування, в окремих випадках оптимальна дія досягається лише ч/з 4 тижні; хр. СН - початкове титрування дози проводити за нижченаведеною схемою, витримуючи при цьому інтервали від 1 до 2 тижнів та орієнтуючись на переносимість дози пацієнтом: 1,25 мг/добу можна збільшити поступово до 5 мг/добу, а надалі - до 10 мг 1 р/добу. МДД - 10 мг^{БНФ}. Хр. ІХС починає з поступового підвищення дози до визначення підтримуючої оптимальної дози для кожного пацієнта; початкову дозу слід підвищувати кожні 1-2 тижні залежно від переносимості з 1,25 мг небівололу до 2,5 мг небівололу 1 р/добу, потім до 5 мг 1 р/добу, а потім 10 мг 1 р/добу. Максимальна рекомендована доза становить 10 мг небівололу 1 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: Головний біль, запаморочення, парестезії, задишка, запор, нудота, діарея, підвищена втомлюваність, набряки, нічні жахи, депресія, порушення зору, брадикардія, СН, уповільнення AV- провідності/AV-блокада, артеріальна гіпотензія, посилення переміжної кульгавості, бронхоспазм, диспепсія, метеоризм, блювання, свербіж, еритематозне висипання, імпотенція, ангіоневротичний набряк, гіперчутливість, синкопе, посилення псоріазу, кропив'янка; галюцинації, психози, сплутаність свідомості, похолодіння/ціаноз кінцівок, с-ром Рейно, сухість очей та окуло-мукокутанна токсичність за практополовим типом.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до інших компонентів препарату; печінкова недостатність або порушення ф-ції печінки; г. СН, кардіогенний шок або епізоди декомпенсації СН, що вимагають в/в введення діючих речовин із позитивним інотропним ефектом; CCCB, у т.ч. СА-блокада, AV-блокада II-III ст. (без штучного водія ритму); бронхоспазм та БА в анамнезі; нелікована феохромоцитома; метаболічний ацидоз; брадикардія (до початку лікування ЧСС менше 60 ударів/хв); артеріальна гіпотензія (сistolічний АТ менше 90 мм рт. ст.); тяжкі порушення периферичного кровообігу.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НЕБІАР®	ПАТ "Київмедпрепарат" (виробництво з продукції in bulk фірми-виробника АКТАВІС ЛТД, Мальта, фірми-виробника "Балканфарма-Дупніца" АД, Болгарія, контроль якості, випуск серії), Україна	табл. у бл.	5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НЕБІВАЛ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НЕБІВАЛ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x8	2,47	
	НЕБІВАЛ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x2	2,82	
	НЕБІВОЛОЛ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	5мг	№14x2	2,61	
II.	НЕБІВОЛОЛ САНДОЗ®	Салютас Фарма Гмбх (первинна та вторинна упаковка, контроль, дозвіл на випуск серії)/С. К. Сандоз С. Р. Л. (контроль)/Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С. (виробництво нерозфасованого продукту, первинна та вторинна упаковка, контроль)/Лек С. А. (первинна та , Німеччина/Румунія/Туреччина/Польща/Туреччина	табл. у бл.	5мг	№20, №30, №60, №90	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НЕБІВОЛОЛ СТАДА®	СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина	табл. у бл.	5мг	№7x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НЕБІВОЛОЛ-ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина	табл. у бл.	5мг	№20, №28, №30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НЕБІВОЛОЛ-ТЕВА	Балканфарма-Дупніца АТ (виробництво за повним циклом)/Актавіс ЛТД (виробництво за повним циклом), Болгарія/ Мальта	табл. у бл.	5мг	№20, №28, №30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НЕБІКАРД	Торрент Фармасьютикалс Лтд, Індія	табл. у бл.	5мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НЕБІКАРД	Торрент Фармасьютикалс Лтд, Індія	табл. у бл.	5мг	№10x5	7,31	24,38/\$
	НЕБІЛЕТ®	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробник,	табл. у бл.	5мг	№7x1	відсутня у	

	відповідальний за виробництво «in bulk» та контроль серій; виробник, відповідальний за виробництво "in bulk" (тільки грануляція), первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії), Німеччина					реєстрі ОБЦ	
НЕБИЛЕТ®	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробник, відповідальний за виробництво «in bulk» та контроль серій; виробник, відповідальний за виробництво "in bulk" (тільки грануляція), первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії), Німеччина	табл. у бл.	5мг	№14x2	6,00	31,70/€	
НЕБИЛЕТ®	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробник, відповідальний за виробництво «in bulk» та контроль серій; виробник, відповідальний за виробництво "in bulk" (тільки грануляція), первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії), Німеччина	табл. у бл.	5мг	№14x1	7,04	31,70/€	
НЕБИТЕНЗ	Актавіс Лтд/Балканфарма-Дупниця АД, Мальта/Болгарія	табл. у бл.	5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
НЕБИТРИКС	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія	табл. у бл.	5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		

Комбіновані препарати

- **Бісопролол + гідрохлортіазид (Bisoprolol + hydrochlorothiazide) ****

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	КОМБІСО	ПРО.МЕД.ЦС Прага а.с., Чеська Республіка	табл. у бл.	5мг/6,25мг; 10мг/6,25мг	№10x3, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Атенолол + ніфедипін + хлорталідон (Atenolol + nifedipine + chlortalidone) ^[ГМД]** (див. п. 31.1.3.8. розділу "Формуляр первинної медичної допомоги")

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ТОНОРМА®	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., в/о у конт. чар/уп.	100мг/10мг/2 5мг	№10x3	115,75	
	ТОНОРМА®	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., в/о у конт. чар/уп.	100мг/10мг/2 5мг	№10x1	37,65	

2.1.2. Неселективні β-адреноблокатори

- **Пропранолол (Propranolol) * ^[ГМД]**

Фармакотерапевтична група: C07AA05 - засоби, що впливають на СС систему. Неселективні блокатори β-адренорецепторів. Пропранолол.

Основна фармакотерапевтична дія: гіпотензивна, антиангінальна, антиаритмічна; блокує β₁- і β₂-адренорецептори, виявляє мембраностабілізуючу дію; пригнічує автоматизм СА-вузла, виникнення ектопічних ділянок у передсердях, АВ-вузлі і в шлуночках; знижує швидкість проведення збудження в АВ-з'єднанні по пучку Кента переважно у антероградному напрямку; сповільнює ЧСС та зменшує силу серцевих скорочень, потребу міокарда в кисні; знижує серцевий викид, АТ, секрецію реніну, нирковий кліренс і швидкість клубочкової фільтрації; пригнічує р-цію барорецепторів дуги аорти на зниження АТ; пригнічує ліполіз у жировій тканині, перешкоджаючи підвищенню рівня вільних жирних кислот (коефіцієнт атерогенності може збільшуватися); пригнічує глікогеноліз, секрецію глюкагону та інсуліну, перетворення тироксину в трийодтиронін; підвищує тонус мускулатури бронхів і скоротливість матки; підсилює секреторну та моторну активність ШКТ; у хворих на ІХС зменшує частоту нападів стенокардії, підвищує переносимість фізичних навантажень, знижує потребу у нітрогліцерині; виявляє кардіопротективну дію, ймовірно знижуючи ризик повторного ІМ та раптової смерті на 20-50%; після прийому одноразової дози пропранололу спостерігається зниження систолічного та діастолічного АТ у положенні як лежачи, так і стоячи; стійкий гіпотензивний ефект розвивається до кінця другого тижня лікування.

Показання для застосування ЛЗ: контроль есенціальної та ниркової гіпертензії ^[ГМД, БНФ], стенокардія ^{БНФ}, довготривала профілактична терапія після перенесеного ІМ ^{БНФ}, контроль більшості форм аритмій серця ^{БНФ}, профілактика мігрені ^{ВОЗ, БНФ}, есенціальний тремор, контроль збудження та тахікардії збудження ^{БНФ}, додаткова

терапія при тиреотоксикозі та тиреотоксичному кризі^{БНФ}; у складі комбінованої терапії - феохромоцитомі (тільки у поєднанні з α-адреноблокаторами)^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо за 10-30 хв. до їди, запиваючи достатньою кількістю рідини; дорослі: АГ: початкова доза 80 мг 2 р/добу; при необхідності дозу поступово підвищувати кожен тиждень; СтДД 160-320 мг^{БНФ}; стенокардія^{БНФ}, збудження, мігрень^{ВООЗ}, есенціальний тремор: початкова доза 40 мг 2-3 р/добу; при необхідності дозу поступово підвищувати на ту ж саме величину з інтервалом в 1 тиждень^{ВООЗ,БНФ} залежно від реакції хворого на лікування; зазвичай при стенокардії діапазон СтДД 80-320 мг^{БНФ}; адекватна реакція^{ВООЗ} на лікування збудження, мігрени^{ВООЗ} та есенціального тремору спостерігається при лікуванні у діапазоні доз 80-160 мг/добу^{ВООЗ}, стенокардії - 120-240 мг/добу; аритмії, тахікардія збудження, тиреотоксикоз: зазвичай дози становлять 10-40 мг 3-4 р/добу^{БНФ}; довготривала профілактична терапія після перенесеного ІМ: терапію розпочинати на 5-21 день після ІМ, початкова доза 40 мг 4 р/добу протягом 2-3 днів; після цього добову дозу можна підвищити до 80 мг 2 р/добу^{БНФ}; феохромоцитомі (тільки у комбінації з α-адреноблокатором): призначати по 60 мг/добу протягом 3 днів перед операцією; у неоперабельних випадках - 30 мг/добу; діти: аритмія, феохромоцитомі, тиреотоксикоз: дітям віком від 3 років у дозуванні 0,25-0,5 мг/кг 3-4 р/добу^{БНФ}; мігрень: діти віком від 3 до 12 років - 20 мг 2-3 р/добу^{БНФ}, віком від 12 років - дозування як для дорослих пацієнтів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: артеріальна гіпотензія, синусова брадикардія, АВ-блокада, розвиток/прогресування СН, порушення периферичного кровообігу, похолодання кінцівок, загострення переміжної кульгавості, с-ром Рейно; ортостатична гіпотензія, тромбоцитопенічна пурпура, лейкопенія, агранулоцитоз, астенія, запаморочення, головний біль, безсоння або сонливість, нічні кошмари, зниження швидкості психічних і рухових р-цій, депресія, занепокоєння, сплутаність свідомості або короткочасна амнезія, парестезії, судоми, психози, зміни настрою, порушення гостроти зору, зменшення секреції слізної рідини, сухість та болючість очей, кератокон'юнктивіт, нудота, блювання, болі в епігастральній ділянці, діарея або запор, тромбоз мезентеріальної артерії, ішемічний коліт, порушення ф-ції печінки (у т.ч. холестаза), фарингіт, кашель, задишка, респіраторний дистрес-с-м, бронхо- та ларингоспазм, гіпоглікемія, шкірні р-ції, свербіж, гарячка, алопеція, загострення псоріазу, артралгія, ослаблення лібідо, зниження потенції, хвороба Пейроні, міастенія гравіс, збільшення рівня антинуклеарних а/т.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату, кардіогенний шок, АВ-блокада II і III ст., СА-блокада, СССВ, синусова брадикардія (ЧСС менше 50 уд/хв), стенокардія Принцметала, артеріальна гіпотензія, неконтрольована СН, БА або бронхоспазм в анамнезі, тяжкі порушення периферичного кровообігу, метаболічний ацидоз (у т.ч. діабетичний ацидоз), після тривалого голодування, нелікована феохромоцитомі, ЦД, хр.захворювання печінки.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,16 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АНАПРИЛІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	10мг, 40мг	№50x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АНАПРИЛІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x5	18,28	
	АНАПРИЛІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у конт.	10мг	№50x1	18,28	
	АНАПРИЛІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	40мг	№10x5	5,96	
	АНАПРИЛІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у конт.	40мг	№50x1	5,96	

2.1.3. Комбіновані α- и β-адреноблокатори

• Карведилол (Carvedilol)^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: C07AG02 - засоби, які впливають на ССС; блокатори α- і β-адренорецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: неселективний β-адреноблокатор із судинорозширювальними властивостями і вторинною антиоксидантною активністю. Як судинорозширювальний засіб зменшує периферичний опір, а як β-адреноблокатор пригнічує ренін-ангіотензин-альдостеронову систему (РААС); знижує активність ренину у плазмі крові, тому під час його застосування затримка рідини в організмі є поодиноким явищем; як конкурентний блокатор β-адренорецепторів має негативний хроно-, дромо-, батмо- та інотропний вплив; уповільнює провідність в АВ вузлі; не має внутрішньої симпатоміметичної активності, чинить мембраностабілізуючу дію. При АГ його антигіпертензивний ефект не супроводжується підвищенням загального периферичного опору, як при застосуванні інших β-адреноблокаторів; незначною мірою знижує ЧСС, однак ниркова перфузія і їх ф-ція та периферичний кровообіг залишаються незмінними. Антигіпертензивний ефект розвивається швидко - ч/з 2-3 год. після одноразового застосування і триває 24 год.; при тривалому лікуванні максимальний ефект відзначається ч/з 3-4 тижні. При ІХС чинить антиішемічні та антиангінальні ефекти, які зберігаються при тривалому лікуванні; знижує перед- і післянавантаження на серце. Сприятливий ефект

карведилолу на гемодинаміку серця, фракцію викиду лівого шлуночка спостерігається при ішемічній формі СН; при СН зменшує кінцевий систолічний і кінцеводіастолічний об'єм, та периферичний і легеневий судинний опір. Фракція викиду і серцевий індекс при нормальній ф-ції серця не змінюються. При порушенні ф-ції лівого шлуночка альфа₁-адреноблокуюча дія карведилолу призводить до розширення артеріальних і, меншою мірою, венозних судин.

Показання для застосування ЛЗ: есенціальна АГ^{БНФ, ПМД}; ІХС: стабільна стенокардія^{БНФ, ПМД}; хр.СН помірного та тяжкого ступеня, як додаткове лікування^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Есенціальна гіпертензія: самостійно або в комбінації з іншими антигіпертензивними засобами, особливо діуретиками, максимальна рекомендована разова доза 25 мг, а МДД - 50 мг; для дорослих початкова рекомендована доза - 12,5 мг 1 р/добу, потім лікування продовжують по 25 мг 1 р/добу; при необхідності доза може бути поступово збільшена з інтервалом у 2 тижні; для літніх пацієнтів початкова рекомендована доза при АГ-12,5 мг 1 р/добу^{БНФ}, що також може бути достатнім і для тривалого лікування, при необхідності дозу можна збільшувати поступово з інтервалами у 2 тижні; ІХС (стабільна стенокардія): рекомендована початкова доза 12,5 мг 2 р/добу в перші 2 дні, лікування продовжують по 25 мг 2 р/добу^{БНФ}, за необхідності, доза може поступово збільшена з інтервалом у 2 тижні до рекомендованої МДД 100мг/добу, розділеної на два прийоми; для літніх пацієнтів рекомендована початкова доза 12,5 мг 2 р/добу в перші 2 дні, після цього по 25 мг 2 р/добу^{БНФ}, що є рекомендованою МДД. Хр.СН: початкова доза - 3,125 мг 2 р/добу протягом 2-х тижнів, при добрій переносимості дозу збільшують із інтервалами не менш 2-х тижнів, до 6,25 мг 2 р/добу, потім до 12,5 мг 2 р/добу, потім до 25 мг 2 р/добу; дозу варто збільшувати до максимальної, переносимої хворим (у пацієнтів з масою тіла менш 85 кг максимальна рекомендована доза - 25 мг 2 р/добу, при масі тіла понад 85 кг 50 мг 2 р/добу^{БНФ}; підвищення дози до 50 мг 2 р/добу повинно проводитися обережно; якщо карведілол був відмінений, лікування повинне знову починатися з дози 3,125 мг 2 р/добу з поступовим підвищенням як рекомендовано вище.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, запаморочення, підвищена втомлюваність; артеріальна гіпотензія; прогресування СН; брадикардія, периферичні набряки, набряк (генералізований, периферичний, набряк статевих органів та ніг), ортостатична гіпотензія, гіперволемія, АГ, втрата свідомості, прискорене серцебиття, АВ блокада, дисфункція лівого шлуночка після г.ІМ, стенокардія, набряк легенів; периферичні порушення кровообігу, переміжна кульгавість або феномен Рейно; бронхіт, пневмонія, інфекція ВДШ, БА, грипоподібні с-ми, бронхоспазм, нежить, чхання, пневмонія; нудота, діарея, блювання, абдомінальний біль, диспепсія, закріп, сухість у роті, мелена; інфекція сечовивідних шляхів; ГНН та порушення ф-ції нирок у пацієнтів із дифузною хворобою судин та/або нирковою недостатністю, розлади сечовипускання; нетримання сечі у жінок, гематурія, альбумінурія, глюкозурія, гіперурикемія; депресія, пригнічений настрій, порушення сну; анемія; астенія, біль, підвищення температури тіла; біль у кінцівках, артралгія, судоми, атрофія м'язів; пригнічення регуляції рівня глюкози у крові, гіперглікемія, гіпоглікемія, анорексія, збільшення/зниження маси тіла, гіперхолестеролемія, порушення контролю глюкози в крові у пацієнтів з уже існуючим ЦД, прояви латентного діабету, гіперкаліємія, гіпертригліцеридемія, гіпонатріємія, підвищення рівнів лужної фосфатази, креатиніну, сечовини, затримка рідини; тромбоцитопенія, лейкопенія, зменшення рівня протромбіну, анемія, р-ції у вигляді г.печінкової недостатності і порушення ф-ції печінки у хворих із генералізованим атеросклерозом; підвищення АЛТ, АСТ, гаммаглутамілтрансферази; парестезія, гіпестезія, вертиго, втрата свідомості; сухість очей, порушення зору, подразнення очей; АР, включаючи: алергічну екзантему, дерматит, підвищену пітливість, кропив'янку, свербіж; ураження шкіри, подібні до псоріазних та червоного плескатою лишая, псоріатичне ураження шкіри або погіршення вже існуючого стану, алопеція, підвищене потовиділення; анафілактичні р-ції; ангіоневротичний набряк; с-ром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, мультиморфна еритема; порушення ерекtilьної ф-ції.

Противпоказання до застосування ЛЗ: Гіперчутливість до діючої речовини або до інших компонентів; декомпенсована СН; СН IV класу за класифікацією NYHA, яка вимагає в/в введення іотропних засобів; АВ блокада II і III ст. (якщо не встановлений постійний водій ритму); супутнє в/в введення верапамілу, дилтіазему або інших антиаритмічних засобів (особливо антиаритмічних засобів класу I); виражена брадикардія (ЧСС <50 уд/хв); виражена артеріальна гіпотензія (сistolічний тиск нижче 85 мм рт.ст.); кардіогенний шок; ССС вузла (включаючи синоатріальну блокаду); декомпенсована СН, яка потребує в/в введення позитивних іотропних засобів та/або сечогінних засобів; легеневе серце, легенева гіпертензія; БА або обструктивні захворювання дихальних шляхів, що супроводжуються бронхоспазмом; феохромоцитома (при відсутності адекватного контролю α-блокаторами); стенокардія Принцметала; виражені порушення ф-ції печінки; супутнє застосування інгібіторів MAO (за винятком інгібіторів MAO-B); непереносимість галактози, недостатність лактази Лаппа або глюкозо-галактозна мальабсорбція; метаболічний ацидоз; період вагітності або годування груддю; дитячий вік.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 37,5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КАРВЕДИЛОЛ-КВ	АТ "КІЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	12,5мг	№10x3	2,40	
	КАРВЕДИЛОЛ-КВ	АТ "КІЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	25мг	№10x3	1,80	
	КОРВАЗАН®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№10x3	4,25	
	КОРВАЗАН®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	12,5мг	№10x3	4,79	

II.	КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО	Ауробіндо Фарма Лімітед - Юніт III, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	6,25мг	№10x3	3,22	26,95/\$
	КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО	Ауробіндо Фарма Лімітед - Юніт III, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	12,5мг	№10x3	2,02	26,95/\$
	КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО	Ауробіндо Фарма Лімітед - Юніт III, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№10x3	2,01	26,95/\$
	КАРВЕДИЛОЛ САНДОЗ®	Салютас Фарма ГмБХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, тестування, дозвіл на випуск серії)/Клоке Ферпакунг-Сервіс (первинне та вторинне пакування), Німеччина/Німеччина	табл. у бл.	12,5мг; 25мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАРВИДЕКС®	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Виробнича дільниця - II, Індія	табл., вкриті п/о у стрип.	6,25мг	№10x2	5,39	28,15/\$
	КАРВИДЕКС®	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Виробнича дільниця - II, Індія	табл., вкриті п/о у стрип.	12,5мг	№10x2	5,39	28,15/\$
	КАРВИДЕКС®	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Виробнича дільниця - II, Індія	табл., вкриті п/о у стрип.	25мг	№10x2	5,38	28,15/\$
	КАРВІУМ	Лабормед-Фарма С.А., Румунія	табл. у бл.	6,25мг	№15x2	3,22	27,04/€
	КАРВІУМ	Лабормед-Фарма С.А., Румунія	табл. у бл.	12,5мг	№10x3	2,95	27,04/€
	КАРВІУМ	Лабормед-Фарма С.А., Румунія	табл. у бл.	25мг	№10x3	2,95	27,04/€
	КАРДІОСТАД	СТАДА Арцнайміттель АГ (випуск серій)"/"Хемофарм" АД (виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування, контроль серій), Німеччина/Сербія	табл. у бл.	6,25мг; 12,5мг; 25мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КОРІОЛ®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	3,125мг, 6,25мг, 12,5мг, 25мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КОРІОЛ®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	3,125мг	№7x4	42,10	35,21/€
	КОРІОЛ®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	12,5мг	№7x4	16,82	35,21/€
	КОРІОЛ®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	25мг	№28	9,85	35,21/€
	КОРІОЛ®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	6,25мг	№7x4	29,58	35,21/€
	МЕДОКАРДИЛ	Медокемі ЛТД (Центральний Завод)/Медокемі ЛТД (Завод AZ), Кіпр/Кіпр	табл. у бл.	6,25мг, 25мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МЕДОКАРДИЛ	Медокемі ЛТД (Центральний Завод)/Медокемі ЛТД (Завод AZ), Кіпр/Кіпр	табл. у бл.	6,25мг	№10x3	19,97	30,26/€
	МЕДОКАРДИЛ	Медокемі ЛТД (Центральний Завод)/Медокемі ЛТД (Завод AZ), Кіпр/Кіпр	табл. у бл.	25мг	№10x3	6,66	30,26/€
	ТАЛЛІТОН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл. у фл. та бл.	6,25мг; 12,5мг;	№20, №30, №7x2, №14x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТАЛЛІТОН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл. у бл.	6,25мг	№7x4	5,21	26,38/\$
	ТАЛЛІТОН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл. у бл.	12,5мг	№14x2	4,69	26,38/\$
	ТАЛЛІТОН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл. у бл.	25мг	№14x2	3,12	26,38/\$

2.2. Селективні інгібітори I f каналів

- *Івабрадин (Ivabradin)*

Фармакотерапевтична група: С01ЕВ17 - кардіологічні засоби. Інші кардіологічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: виключно знижує ЧСС, діючи на водія ритму серця шляхом селективного та специфічного інгібування I_f-поточу, що контролює спонтанну діастолічну деполяризацію на рівні синусового вузла, регулюючи ЧСС; діє виключно на синусовий вузол та не впливає на внутрішньопередсердну, АВ і внутрішньошлуночкову провідність, скоротність міокарда й реполяризацію шлуночків; може взаємодіяти з I_h-поточком сітківки ока, які схожі за структурою з I_f-поточком синусового вузла серця, що лежить в основі розвитку

тимчасового порушення світлосприйняття внаслідок зменшення р-ції сітківки на яскраві світлові стимули; при появі тригерних обставин (раптова зміна освітлення) часткове інгібування івабрадином I_h-потіку може призвести до несподіваного виникнення у пацієнтів зорових феноменів; зорові феномени (фосфени) описують як тимчасове підвищення яскравості на обмеженій ділянці поля зору.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування хр. стабільної стенокардії у дорослих пацієнтів з ІХС, нормальним синусовим ритмом^{БНФ} та ЧСС ≥ 70 уд./хв; призначати: пацієнтам, які мають протипоказання чи обмеження до застосування β -адреноблокаторів; у комбінації з β -адреноблокаторами пацієнтам, стан яких є недостатньо контрольованим при застосуванні оптимальної дози β -адреноблокаторів; лікування хр. СН^{БНФ}; зниження ризику розвитку СС подій (СС смерті або госпіталізації з приводу погіршення СН) у дорослих пацієнтів із симптомною хр. СН, синусовим ритмом та ЧСС ≥ 70 уд./хв.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: перорально (2,5 мг, 5 мг або 7,5 мг) 2 р/добу; симптоматичне лікування хр. стабільної стенокардії^{БНФ}: у пацієнтів віком до 75 років початкова доза не повинна перевищувати 5 мг 2 р/добу^{БНФ}, якщо у пацієнтів, які приймають івабрадин по 2,5 або 5 мг 2р/добу, після 3-4 тижнів лікування тривають симптоми стабільної стенокардії, дозу івабрадину можна збільшити до наступної, за умови гарної переносимості початкової дози та якщо ЧСС у стані спокою залишається на рівні > 60 уд./хв^{БНФ}; підтримуюча доза не повинна перевищувати 7,5 мг 2 р/добу; у разі відсутності поліпшення симптомів стенокардії протягом 3 міс. після початку лікування прийом припинити; розглядати можливість припинення терапії у разі, якщо відповідь на симптоматичне лікування є незначною та відсутнє клінічно значуще зниження ЧСС у стані спокою протягом 3 місяців лікування; якщо ЧСС знижується < 50 уд./хв. у стані спокою або пацієнт відчуває симптоми, які є проявами брадикардії (запаморочення, слабкість, артеріальна гіпотензія), дозу необхідно поступово зменшити, включаючи можливість застосування найнижчої дози 2,5 мг 2 р/добу^{БНФ}; прийом припинити, якщо ЧСС залишається на рівні < 50 уд./хв. або с-ми брадикардії тривають, незважаючи на зменшення дози; лікування хр.СН: початкова доза 5 мг 2 р/добу; після 2-тижневого курсу лікування дозу можна підвищити до 7,5 мг 2 р/добу у разі, якщо ЧСС залишається на рівні > 60 уд./хв. у стані спокою^{БНФ}; або дозу необхідно знизити до 2,5 мг 2 р/добу, якщо ЧСС залишається на рівні < 50 уд./хв. у стані спокою або пацієнт відчуває симптоми, зумовлені брадикардією^{БНФ}; якщо ЧСС знаходиться в діапазоні 50-60 уд./хв., дозу 5 мг 2 р/добу залишають незмінною; якщо ЧСС знижується < 50 уд./хв. у спокої або пацієнт відчуває симптоми, зумовлені брадикардією, при застосуванні івабрадину по 7,5 або 5 мг 2 р/добу необхідно поступово знизити дозу до наступної меншої; якщо ЧСС є постійно > 60 уд./хв. у стані спокою, пацієнтам, які приймають івабрадин по 2,5 або 5 мг 2 р/добу, поступово підвищити дозу до наступної більшої; застосування необхідно припинити, якщо під час лікування ЧСС залишається < 50 уд./хв. або симптоми брадикардії тривають.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: еозинофілія; підвищення рівня сечової к-ти в плазмі крові; головний біль, зазвичай під час першого місяця лікування; запаморочення, непритомність, вірогідно пов'язані з брадикардією; зорові феномени (фосфени); розмитий зір; диплопія, порушення зору; вертиго; брадикардія; AV-блокада I ст. (на ЕКГ - подовження інтервалу PQ); шлуночкова екстрасистолія; фібриляція передсердь; пальпітація, надшлуночкова екстрасистолія; AV-блокада II та III ступеня; CCCB; неконтрольований кров'яний тиск; артеріальна гіпотензія, вірогідно пов'язана з брадикардією; диспное; нудота, запор, діарея, біль в абдомінальній ділянці; ангіоедема; висипання; еритема, свербіж, кропив'янка; м'язові спазми; астенія, втома, нездужання, вірогідно пов'язані з брадикардією; підвищення рівня креатиніну в плазмі крові; подовження інтервалу QT на ЕКГ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого компонента препарату; ЧСС у стані спокої < 70 уд./хв. до початку лікування; кардіогенний шок; г. ІМ., тяжка печінкова недостатність; CCCB, СА-блокада, нестабільна або г.СН; наявність у пацієнта штучного водія ритму, нестабільна стенокардія, AV-блокада III ст.; комбінація з інгібіторами СYP3A4 сильної дії: протигрибкові препарати похідні азолу (кетоконазол та інші), макролідні а/б (klarитроміцин, еритроміцин для р/ос застосування, джозаміцин, телітроміцин), інгібітори ВІЛ-протеази (нелфінавір, ратонавір) та нефазодон та помірної дії: верапаміл, дилтіазем; тяжка артеріальна гіпотензія (АТ $< 90/50$ мм. рт.ст.); вагітність, період годування груддю та жінки дітородного віку, які не застосовують належні заходи контрацепції.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 10 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БРАДІУМ®	АТ "Фармак" (виробництво з продукції in bulk фірми-виробника Дженефарм СА, Греція), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	5мг; 7,5мг	№14x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	БРАВАДИН®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг; 7,5мг	№14x4, №14x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БРАВАДИН®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№14x2	4,60	30,27/€
	БРАВАДИН®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне	табл., вкриті п/о у бл.	7,5мг	№14x2	3,99	30,27/€

	та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія					
ІВАБ-5®	Бафна Фармасьютикалс Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№14x2	відсутня у реєстрі OBLЦ	
ІВАБ-7,5®	Бафна Фармасьютикалс Лтд, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	7.5мг	№14x2	відсутня у реєстрі OBLЦ	
ІВАКАРД®	Х. Уріач і Компанья, С.А., Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№14x4	7,93	29,38/€
ІВАКАРД®	Х. Уріач і Компанья, С.А., Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	7.5мг	№14x4	5,29	29,38/€
КОРАКСАН® 5 МГ	Лабораторії Серв'є Індастрі/Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд, Франція/Ірландія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№14x2, №14x4	відсутня у реєстрі OBLЦ	
КОРАКСАН® 7,5 МГ	Лабораторії Серв'є Індастрі/Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд, Франція/Ірландія	табл., вкриті п/о у бл.	7,5мг	№14x2, №14x4	відсутня у реєстрі OBLЦ	
РАСНОМ	Гедеон Ріхтер Румунія А.Т., Румунія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг; 7,5мг	№14x2, №14x4	відсутня у реєстрі OBLЦ	

2.3. Антагоністи кальцію (блокатори кальцієвих каналів)

2.3.1. Дигідропіридин

- **Амлодипін (Amlodipine)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: C08CA01 - селективні антагоністи кальцію з переважним впливом на судини.

Основна фармакотерапевтична дія: антагоніст кальцію (похідне дигідропіридину), що блокує надходження іонів кальцію до міокарду та до клітин гладких м'язів; механізм гіпотензивної дії амлодипіну зумовлений безпосередньою розслаблюючою дією на гладкі м'язи судин, точний механізм антиангінального ефекту визначений недостатньо, однак нижчезазначені ефекти відіграють певну роль: розширює периферичні артерії і, т.ч. знижує периферичний опір (постнавантаження), оскільки серцевий ритм залишається стабільним, зниження навантаження на серце призводить до зниження споживання енергії та потреби міокарда в кисні; розширення головних коронарних артерій та коронарних артеріол (нормальних та ішемізованих), можливо, також відіграє роль у механізмі дії амлодипіну, таке розширення підвищує насиченість міокарда киснем у пацієнтів зі спазмом коронарної артерії (стенокардія Принцметала чи варіантна стенокардія); у пацієнтів з АГ застосування препарату 1 р/добу забезпечує клінічно значуще зниження АТ протягом 24 год. у положенні як лежачи, так і стоячи, ч/з повільний початок дії амлодипіну г. артеріальна гіпотензія зазвичай не спостерігається; у пацієнтів зі стенокардією при застосуванні однієї добової дози препарату підвищується загальний час фізичного навантаження, час до початку стенокардії і час до 1 мм депресії сегмента ST, знижує частоту нападів стенокардії та зменшує потребу у застосуванні нітрогліцерину.

Показання для застосування ЛЗ: АГ^{ПМД}, хр. стабільна стенокардія^{вооз, бнф, пмд}, вазоспастична стенокардія (стенокардія Принцметала).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при АГ та стенокардії звичайна початкова доза - 5 мг 1 р/добу; залежно від індивідуальної р-ції хворого, дозу можна збільшити до МДД, яка дорівнює 10 мг^{бнф, вооз}; пацієнтам зі стенокардією препарат можна застосовувати як монотерапію, чи у комбінації з іншими антиангінальними ЛЗ при резистентності до нітратів та/або адекватних доз β-блокаторів; діти віком від 6 років з АГ: рекомендована початкова доза для цієї категорії пацієнтів становить 2,5 мг 1 р/добу, якщо необхідний рівень АТ не буде досягнутий протягом 4 тижнів, дозу можна збільшити до 5 мг на добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сонливість, запаморочення, головний біль, пал্পітація, припливи крові, біль у черевній порожнині, нудота, набряки гомілок, набряки та втомлюваність; лейкоцитопенія, тромбоцитопенія; АР; гіперглікемія; безсоння, зміни настрою (включаючи тривожність), депресія; сплутаність свідомості; тремор, дисгевзія, синкопе, гіпестезія, парестезія; гіпертонус, периферична нейропатія; порушення зору (включаючи диплопію); дзвін у вухах; посилене серцебиття; ІМ, аритмія (включаючи брадикардію, шлуночкову та мерехтіння передсердь); припливи; артеріальна гіпотензія; васкуліт; диспное, риніт; кашель; біль у животі, нудота; блювання, диспепсія, порушення перистальтики кишечника (включаючи запор та діарею), сухість у роті; панкреатит, гастрит, гіперплазія ясен; гепатити, жовтяниця, підвищення рівня печінкових ферментів (найчастіше асоціювалося із холестаазом); алопеція, пурпура, зміна забарвлення шкіри, підвищене потовиділення, свербіж, висип, екзантема; ангіоневротичний набряк, мультиформна еритема, кропив'янка, ексфолиативний дерматит, с-м Стівенса Джонсона, набряк Квінке, фоточутливість, токсичний епідермальний некроліз; набрякання гомілок; артралгія, міалгія, судоми м'язів, біль у спині; порушення сечовиділення, ніктурія, підвищена частота сечовипускання; імпотенція, гінекомастія; набряк, стомленість; біль за грудниною, астенія, біль, нездужання; збільшення або зменшення маси тіла; випадки розвитку екстрапірамідного с-му.

Протипоказання до застосування ЛЗ: відома підвищена чутливість до дигідропіридинів, амлодипіну чи до будь-якого іншого компонента препарату; артеріальна гіпотензія тяжкого ступеня; шок (включаючи кардіогенний шок); обструкція вивідного тракту лівого шлуночка (стеноз аорти тяжкого ступеня); гемодинамічно нестабільна СН після г. ІМ.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АЛАДИН®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x3	0,21	
	АЛАДИН®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x5	0,21	
	АЛАДИН®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x3	0,20	
	АЛАДИН®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x5	0,20	
	АЛАДИН®-ФАРМАК	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	5мг, 10мг	№20, №60, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЛАДИН®-ФАРМАК	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x5	0,20	
	АЛАДИН®-ФАРМАК	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x3	2,23	
	АЛАДИН®-ФАРМАК	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x5	0,20	
	АЛАДИН®-ФАРМАК	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x3	2,00	
	АМЛОДИПІН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x6	0,31	
	АМЛОДИПІН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x9	0,31	
	АМЛОДИПІН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x100	0,47	
	АМЛОДИПІН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x3	0,51	
	АМЛОДИПІН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x6	0,31	
	АМЛОДИПІН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x9	0,31	
	АМЛОДИПІН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x90	0,41	
	АМЛОДИПІН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x3	0,44	
	АМЛОДИПІН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x3	0,23	
	АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	5мг, 10мг	№60, №90, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x3	0,63	
	АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x2	0,75	
	АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x3	0,42	
	АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x2	0,43	
	АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	5мг	№10x2	0,44	
	АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	10мг	№10x2	0,44	
	АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x3	1,11	
	АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x3	1,48	
	АМЛОДИПІН-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" (повний цикл виробництва)/ПрАТ "Технолог" (виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль серій), Україна/Україна	табл. у бл.	5мг	№10x3	0,33	
	АМЛОДИПІН-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" (повний цикл виробництва)/ПрАТ "Технолог" (виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль	табл. у бл.	10мг	№10x3	0,25	

		серій), Україна/Україна					
	АМЛОДИПІН-ФАРМАК	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	5мг, 10мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМЛОДИПІН-ФАРМАК	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x2	0,43	
	АМЛОДИПІН-ФАРМАК	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x2	0,25	
	АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x2	0,36	
	АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x3	0,36	
	СЕМЛОПІН®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. у бл.	2,5мг; 5мг	№14x4, №14x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СЕМЛОПІН®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. у бл.	2,5мг	№14x2	1,69	
	СЕМЛОПІН®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. у бл.	5мг	№14x2	0,96	
II.	АГЕН® 10	ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка	табл. у бл.	10мг	№10x3, №15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АГЕН® 5	ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка	табл. у бл.	5мг	№10x3, №15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМЛОГЕН 10	Алкем Лабораторіз Лтд, Індія	табл. у бл.	10мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМЛОГЕН 5	Алкем Лабораторіз Лтд, Індія	табл. у бл.	5мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМЛОДИЛ БОСНАЛЕК®	Босналек д.д., Боснія і Герцеговина	капс. тверді у бл.	5мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМЛОДИПІН ЄВРО	Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	табл. у конт. чар/уп.	5мг, 10мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМЛОДИПІН ЄВРО	Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	табл. у конт. чар/уп.	5мг	№10x3	0,57	23,96/\$
	АМЛОДИПІН ЄВРО	Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	табл. у конт. чар/уп.	10мг	№10x3	0,63	23,96/\$
	АМЛОДИПІН КРКА	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинну та вторинну упаковку, контроль та випуск серії), Словенія	табл. у бл.	5мг, 10мг	№10x3, №10x9	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМЛОДИПІН САНДОЗ®	Лек фармацевтична компанія д.д. (виробництво за повним циклом, первинне і вторинне пакування)/Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С. (виробництво in bulk)/Сандоз Груп Саглік Урунлері Ілакларі Сан. ве Тік. А.С./С.К. Сандоз С.Р.Л. (контроль серії), Словенія/ Туреччина/Туреччина/Румунія	табл. у бл.	5мг, 10мг	№15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМЛОДИПІН-ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина	табл. у бл.	5мг	№10x3	0,49	26,30/\$
	АМЛОДИПІН-ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина	табл. у бл.	10мг	№10x3	0,38	26,30/\$
	АМЛОЦИМ 10 МГ	Юнікем Лабораторіз Лімітед (виробництво нерозфасованої продукції, контроль якості)/Асіно Фарма АГ (первинна та вторинна упаковка, відповідальний за випуск серії), Індія/Швейцарія	табл. у бл.	10мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	

АМЛОЦИМ 10 МГ	Юнікем Лабораторіз Лімітед (виробництво нерозфасованої продукції, контроль якості)/Асіно Фарма АГ (первинна та вторинна упаковка, відповідальний за випуск серії), Індія/Швейцарія	табл. у бл.	10мг	№10x3	0,83	31,63/€
АМЛОЦИМ 5 МГ	Юнікем Лабораторіз Лімітед (виробництво нерозфасованої продукції, контроль якості)/Асіно Фарма АГ (первинна та вторинна упаковка, відповідальний за випуск серії), Індія/Швейцарія	табл. у бл.	5мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
АМЛОЦИМ 5 МГ	Юнікем Лабораторіз Лімітед (виробництво нерозфасованої продукції, контроль якості)/Асіно Фарма АГ (первинна та вторинна упаковка, відповідальний за випуск серії), Індія/Швейцарія	табл. у бл.	5мг	№10x3	0,83	31,63/€
ЕМЛОДИН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл. у бл.	2,5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЕМЛОДИН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл. у бл.	5мг	№10x3	0,86	27,74/\$
ЕМЛОДИН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл. у бл.	10мг	№10x3	0,86	27,74/\$
ЕСЛО 2,5	Емкур Фармасьютікалс Лтд., Індія	табл. у бл.	2,5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЕСЛО 5	Емкур Фармасьютікалс Лтд., Індія	табл. у бл.	5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НОРВАСК®	Р-Фарм Джермані ГмбХ (виробник, відповідальний за виробництво препарату in bulk, пакування, контроль якості та випуск серії)/Пфайзер Фармасьютікалз ЛЛС (виробник, відповідальний за виробництво препарату in bulk)/Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ (виробн, Німеччина /США/ Німеччина	табл. у бл.	5мг	№10x3	4,25	26,00/\$
НОРВАСК®	Р-Фарм Джермані ГмбХ (виробник, відповідальний за виробництво препарату in bulk, пакування, контроль якості та випуск серії)/Пфайзер Фармасьютікалз ЛЛС (виробник, відповідальний за виробництво препарату in bulk)/Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ (виробн, Німеччина /США/ Німеччина	табл. у бл.	5мг	№10x6	4,25	26,00/\$
НОРВАСК®	Р-Фарм Джермані ГмбХ (виробник, відповідальний за виробництво препарату in bulk, пакування, контроль якості та випуск серії)/Пфайзер Фармасьютікалз ЛЛС (виробник, відповідальний за виробництво препарату in bulk)/Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ (виробн, Німеччина /США/ Німеччина	табл. у бл.	10мг	№10x3	3,51	26,00/\$
НОРВАСК®	Р-Фарм Джермані ГмбХ (виробник, відповідальний за виробництво препарату in bulk, пакування, контроль якості та	табл. у бл.	10мг	№10x6	3,51	26,00/\$

		випуск серії)/Пфайзер Фармасьютикалз ЛЛС (виробник, відповідальний за виробництво препарату in bulk)/Пфайзер Менюфекчуриг Дойчленд ГмбХ (виробн, Німеччина /США/ Німеччина					
	НОРМОДИПІН	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл. у бл.	5мг, 10мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СТАМЛО	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Виробнича дільниця - II, Індія	табл. у бл. або стрип.	5мг, 10мг	№10х2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СТАМЛО	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Виробнича дільниця - II, Індія	табл. у бл. або стрип.	5мг	№10х3	0,72	26,64/\$
	СТАМЛО	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Виробнича дільниця - II, Індія	табл. у бл. або стрип.	10мг	№10х3	0,72	26,64/\$

• **Лерканідипін (Lercanidipine)**^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: C08CA13 - селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини. Похідні дигідропіридину.

Основна фармакотерапевтична дія: антагоніст кальцію дигідропіридинової групи, що пригнічує трансмембранний потік кальцію у кардіоміоцити та гладком'язові клітини судин; механізм його дії обумовлений прямою релаксуючою дією на м'язи судин, внаслідок чого знижується загальний периферичний опір судин; незважаючи на короткий період напіввиведення лерканідипіну, він має пролонговану антигіпертензивну дію за рахунок високого коефіцієнта мембранного розподілу і позбавлений негативної інотропної дії завдяки його високій судинній селективності; оскільки вазодилатація, спричинена лерканідипіном, відбувається поступово, то г. гіпотензія з рефлекторною тахікардією у хворих на АГ спостерігається рідко.

Показання для застосування ЛЗ: есенціальна АГ^{ГМД} легкого або помірного ступеня тяжкості.^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза для дорослих становить 10 мг 1 р/добу, не менше, ніж за 15 хв до їди, доза може бути підвищена до 20 мг, залежно від індивідуальної чутливості пацієнта; максимальна антигіпертензивна дія розвивається протягом 2 тижнів лікування^{БНФ}; дозування встановлюється поступово, оскільки максимальна антигіпертензивна дія може проявитися ч/з 2 тижні після початку лікування; можна приймати одночасно із інгібіторами АПФ, діуретичними засобами, β-адреноблокаторами.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, запаморочення, периферичні набряки, тахікардія, посилене серцебиття і припливи, гіперчутливість, сонливість, стенокардія, непритомність, нудота, біль в епігастрії, діарея, диспепсія, блювання, помутніння перитонеального ексудату; висип, свербіж, набряк; міалгія, поліурія, астенія, втомлюваність, гіперплазія ясен, збільшення кількості трансаміназ печінки в сироватці крові, артеріальна гіпотензія, збільшення частоти сечовипускання, біль у грудях, в окремих випадках прекордіальний біль, стенокардія, збільшення частоти, тривалості, тяжкості нападів, ізольовані випадки ІМ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини чи інших дигідропіридинів або до будь-якого компонента препарату; жінкам репродуктивного віку, якщо вони не застосовують контрацепцію; обструкція вивідного відділу лівого шлуночка; нелікована застійна СН; нестабільна стенокардія, нещодавній (протягом 1 місяця) ІМ; тяжка печінкова недостатність; тяжка ниркова недостатність (кліренс креатиніну < 30 мл/хв), включаючи пацієнтів на гемодіалізі; одночасне застосування з інгібіторами СYP 3A4, циклоспорином, грейпфрутом, грейпфрутовим соком.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 10 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АЛВОТЕНС	Торрент Фармасьютикалс Лтд. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль якості (тестування))/С.К. Лабормед-Фарма С.А. (вторинне пакування, контроль якості (тестування), відповідає за випуск серії), Індія/Румунія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг	№10х3, №10х6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЗАНІДІП®	Рекордати Індастріа Хіміка е Фармасевтіка С.п.А., Італія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг	№14, №28, №56, №98	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛЕРКАМЕН® 10	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво in bulk; пакування, контроль та випуск серії), Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№7, №14, №90	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛЕРКАМЕН® 10	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво in bulk; пакування, контроль та випуск серії), Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№15х4	4,01	31,65/€
	ЛЕРКАМЕН® 10	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво in bulk; пакування, контроль та випуск серії), Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№14х2	4,75	31,65/€

	bulk; пакування, контроль та випуск серії), Німеччина	п/о у бл.				
ЛЕРКАМЕН® 20	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво препарату "in bulk" та контроль серії, кінцеве пакування, контроль та випуск серії), Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№7, №14, №56, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛЕРКАМЕН® 20	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво препарату "in bulk" та контроль серії, кінцеве пакування, контроль та випуск серії), Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x6	3,28	31,96/€
ЛЕРКАМЕН® 20	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво препарату "in bulk" та контроль серії, кінцеве пакування, контроль та випуск серії), Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№14x2	3,88	31,96/€
ЛЕРКАНІДИПІН-ТЕВА	Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд., Ізраїль	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг	№7x4, №10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛЕРКАНІДИПІН-ТЕВА	Балканфарма-Дупниця АТ, Болгарія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг	№14x2, №14x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛЕРКАНОСТ	Балканфарма-Дупниця АТ, Болгарія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ТОРИДИП 10	Торрент Фармасьютікалс Лтд, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ТОРИДИП 20	Торрент Фармасьютікалс Лтд, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Ніфедипін (Nifedipine)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: C08CA05 - селективні антагоністи кальцію з переважним впливом на судини; похідні дигідропіридину.

Основна фармакотерапевтична дія: антагоніст кальцію, що пригнічує потік іонів кальцію у клітини міокарда, гладких м'язів коронарних артерій та периферичних капілярів; розширює коронарні артерії та зменшує їх м'язовий тонус, зменшує загальний периферичний опір судин (постнавантаження), розвантажуючи серце; зменшує потребу в кисні; нормалізація АТ відбувається ч/з розширення системних артерій та артеріол, та завдяки зменшенню загального периферичного опору судин; на початковому етапі лікування частота серцебиття та обсяг серця можуть зрости ч/з активацію рефлексу барорецепторів; при довгостроковому лікуванні ніфедипіном частота серцебиття та обсяг серця повертаються до передтерапевтичних значень.

Показання для застосування ЛЗ: лікування АГ ^{ГБНФ} (крап.: з метою лікування гіпертензивних кризів); хр. стабільна стенокардія; вазоспастична стенокардія; профілактика стабільної стенокардії напруги - як монотерапія або в комбінації з β-блокаторами (вазоспастична та стабільна стенокардія напруги).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: режим дозування слід визначати індивідуально; звичайна початкова та підтримуюча доза становить 30 мг 1 р/добу; залежно від тяжкості захворювання та індивідуальної р-ції пацієнта дозу ніфедипіну можна поступово збільшити до 60 мг 1 р/добу; тривалість лікування визначає лікар; супутнє застосування препарату з інгібіторами або індукторами системи цитохрому P450 3A4 може зумовити необхідність адаптувати дозу ніфедипіну або відмінити прийом препарату; терапію слід припинити поступово, особливо у випадках прийому препарату у високих дозах; при раптовому і значному підвищенні АТ початкова разова доза для дорослих 3-5 крап. (2-3,35 мг), для осіб літнього віку - не більше 3 крап. (2 мг) під язик або накапати на шматочок сухаря чи на цукор, якомога довше тримаючи в роті, при недостатній ефективності дозу поступово можна підвищувати до клінічно значущого ефекту, надалі у випадках підвищення АТ необхідно орієнтуватися саме на цю дозу, при необхідності (підвищення АТ до 190/100 мм рт. ст. - 220/110 мм рт. ст.) разову дозу можна поступово підвищити в окремих випадках до 10-15 крап. (6,7-10 мг) з урахуванням індивідуальних змін показників АТ у хворого; табл. пролонг. дії: звичайна початкова доза 10 мг кожні 12 год.; у разі необхідності доза може бути збільшена відповідно до р-ції організму на лікування до 40 мг кожні 12 год. або до МДД - 80 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: вазодилатація, припливи; головний біль; АР, алергічний набряк (включаючи набряк гортані), набряк обличчя, свербіж, кропив'янка, висипання; еритема, екзантема, хвороба Мітчела, підвищене потовиділення, фотодерматит, пурпура, токсичний епідермальний некроліз, ексфолювативний дерматит, алопеція; запаморочення, мігрень, вертиго, тремор; парестезія, дизестезія, гіпестезія, сонливість; тривожність, розлади сну, зміна настрою, нервозність, апатія; тахікардія, стенокардія, втрата свідомості, артеріальна, симптоматична чи ортостатична гіпотензія; ІМ, біль у грудях, еритромелалгія; носова кровотеча, закладеність носа, диспное, кашель, спастичний стан бронхіальних м'язів, задихка; запор, порушення функцій травного тракту (диспепсія, діарея, біль у животі, метеоризм, нудота, блювання, сухість у роті), гіперплазія ясен, недостатність гастроентерогагального сфінктера, відчуття переповненості шлунка, відрижка, відсутність апетиту, біль у ШКТ, безоар, дисфагія, виразка кишечника, кишкова непрохідність; підвищена втомлюваність, відчуття нездужання, гарячка, неспецифічний біль, м'язові судоми, набряк суглобів, міалгія, артралгія; анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія та тромботична мікроангіопатія, агранулоцитоз, тромбоцитопенічна пурпура; анафілактична/анафілактоїдна р-ція, ексфолювативний дерматит, поліморфна еритема; тимчасова зміна зорового сприйняття, порушення зору, біль в очах, надмірне сльозовиділення; транзиторне підвищення активності трансаміназ, жовтяниця, холестаза, гіперглікемія; тимчасове зниження ф-цій нирок у разі ниркової недостатності; підвищення частоти сечовипускання, поліурія, дизурія, ніктурія; еректильна дисфункція; оборотна гінекомастія, дзвін у вухах; набряк легень (у разі застосування вагітним як токолітичного засобу).

Протипоказання до застосування ЛЗ: індивідуальна гіперчутливість до ніфедипіну та допоміжних речовин, при кардіогенному шоці, у комбінації з рифампіцином (ч/з неможливість досягти ефективних рівнів ніфедипіну у плазмі внаслідок індукції ферментів), при аортальному та мітральному стенозі високого ступеня, нестабільній стенокардії, г. ІМ (протягом перших 4 тижнів), ілеостомі або колостомі; порфірія; вторинна профілактика ІМ; г.напад стенокардії; злякисна гіпертензія; період вагітності; обструкція ШКТ в анамнезі, обструкція стравоходу або звужений діаметр просвіту ШКТ, запалення кишечника або хвороба Крона та для крап: декомпенсована СН; артеріальна гіпотензія (систоличний АТ нижче 90 мм рт.ст.); шлуночкові тахікардії з розширеним комплексом QRS; CCCB; с-ром WPW, с-ром Лауна-Ганонга-Левайна (LGL); AV блокада II та III ст.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 30 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НІФЕДИПІН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	10мг	№10x5	0,88	
	НІФЕДИПІН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	20мг	№10x5	0,79	
	НІФЕДИПІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., в/о у конт. чар/уп.	10мг	№10x5	1,03	
	ФАРМАДИПІН®	АТ "Фармак", Україна	крап. орал. по 5мл, 25мл у фл.	20 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФАРМАДИПІН®	ПАТ "Фармак", Україна	крап. орал. по 5мл у фл.	20 мг/мл	№1	12,60	
	ФАРМАДИПІН®	ПАТ "Фармак", Україна	крап. орал. по 25мл у фл.	20 мг/мл	№1	3,30	
	ФЕНІГІДИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x5	1,11	
	ФЕНІГІДИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	крап. орал., р-н по 20мл у фл. з пр.-крап.	20 мг/мл	№1	2,07	
	ФЕНІГІДИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	крап. орал., р-н по 10мл у фл. з пр.-крап.	20 мг/мл	№1	3,06	
II.	КОРДИПІН XL	КРКА, д.д., Ново место (первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Сігфрід Фарма АГ (виробництво таблеток з модифікованим вивільненням)/ Сігфрід Мальта Лтд (виробництво таблеток з модифікованим вивільненням), Словенія/Швейцарія/Мальта	табл. з м/в у бл.	40мг	№10x2	3,00	30,27/€
	КОРДИПІН РЕТАРД	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій; відповідальний за первинне та вторинне пакування; відповідальний за контроль серій)/Марифарм д.о.о. (відповідальний за первинне та в, Словенія/Словенія	табл. прол. дії у бл.	20мг	№15x2	3,41	30,27/€
	КОРИНФАР®	ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія	табл. прол. дії у бл. та фл.	10мг	№10x3, №50, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КОРИНФАР® РЕТАРД	ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія	табл. прол. дії у бл. та фл.	20мг	№10x3, №50, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КОРИНФАР®	Меркле ГмБХ (дозвіл на випуск	табл. прол. дії	40мг	№20,	відсутня у	

УНО 40	серії)/Зігфрід Фарма АГ (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль серії)/Зігфрід Мальта Лтд. (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль серії)/Зігфрід Л, Німеччина/Швейцарія/Мальта/Швейцарія/Франція	у бл.			№50, №100	реєстрі ОБЦ
НІКАРДІЯ® РЕТАРД	Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	табл., в/о, прол. дії у бл.	20мг		№10x3, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ
НІФЕКАРД® XL	Лек Фармацевтична компанія д. д. (виробництво за повним циклом; первинне пакування, вторинне пакування, випуск серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	30мг, 60мг		№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ

● **Фелодипін (Felodipine)** ^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: С08СА02 - селективні блокатори кальцієвих каналів з переважною дією на судини. Похідні дигідропіридину.

Основна фармакотерапевтична дія: вазоселективний блокатор кальцієвих каналів, який знижує АТ шляхом зменшення периферичного судинного опору; пригнічує електричну та скоротливу активність гладких м'язів судин, впливаючи на кальцієві канали у клітинній мембрані; у терапевтичних дозах фелодипін вибірково впливає на гладкі м'язи артеріол, не здійснює безпосереднього впливу на скоротливість та провідність серця; не впливає на гладкі м'язи вен та адренергічні вазомоторні механізми, і, відповідно, прийом фелодипіну не пов'язаний з симптомами ортостатичної гіпотензії; має свій власний помірний натрійуретичний та діуретичний ефект, і, відповідно, не спричиняє затримку рідини в організмі; є ефективним при різних ступенях АГ; його можна використовувати в якості монотерапії або в комбінації з іншими антигіпертензивними препаратами, наприклад: β-блокаторами, діуретиками або інгібіторами АПФ для посилення антигіпертензивної дії; знижує систолічний та діастолічний АТ; зберігає свою антигіпертензивну ефективність у комбінації з НПЗЗ; проявляє антиангінальну та протишемічну дію завдяки впливу на баланс між споживанням і постачанням міокарда киснем; зменшує опір коронарних судин; кровотік ч/з коронарні судини і насичення міокарда киснем також підвищуються завдяки дилатації епікардіальних артерій та артеріол; ефективно попереджає утворення і розвиток спазму коронарних судин; зниження системного АТ, зумовлене фелодипіном, послаблює постнавантаження на лівий шлуночок і знижує потребу міокарда в кисні; поліпшує переносимість навантажень і зменшує частоту виникнення нападів у пацієнтів зі стабільною стенокардією напруги; пацієнтам зі стабільною стенокардією фелодипін можна призначати як монотерапію або в комбінації з блокаторами β-адренорецепторів.

Показання для застосування ЛЗ: АГ ^{ГМД, БНФ}, профілактичне лікування хр. стабільної стенокардії. ^{БНФ, ПМД}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: АГ - 5 мг 1 р/добу, за необхідності може ^{БНФ} бути зменшена до 2,5 мг/добу або збільшена до МДД - 10 мг/добу; СтДД - 5-10 мг/добу ^{БНФ}; при стенокардії режим дозування завжди визначається індивідуально, терапія починається з дози 5 мг 1 р/день, її можна збільшити до 10 мг 1 р/день, МДД становить 20 мг. ^{БНФ}

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості (кропив'янка та ангіоневротичний набряк); головний біль, порушення сну, сонливість, запаморочення, парестезія, неспокій, дратівливість, сплутаність свідомості, депресія; задишка, носова кровотеча; погіршення проявів стенокардії (особливо на початку лікування); переважно у пацієнтів із симптоматичною ІХС, синкопе, відчуття серцебиття, тахікардія, ІМ; припливи, периферичний набряк (ступінь набряку у ділянці щиколоток залежить від дози), артеріальна гіпотензія; сексуальна дисфункція; часте сечовипускання; нудота, гінгівіт, гіперплазія ясен, біль у черевній порожнині, блювання, періодонтит, діарея, запор, сухість у роті; підвищення рівнів печінкових ферментів, холестатичний гепатит; гіперемія, шкірний висип, свербіж, чутливість до світла, ангіоневротичний набряк, мультиформна еритема, вузлова еритема, лейкоцитокластичний васкуліт; артралгія, міалгія, м'язовий тремор; втомлюваність, підвищення t° тіла.

Противпоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до фелодипіну або до інших дигідропіридинів (теоретичний ризик перехресної реактивності) або до інших компонентів препарату; декомпенсована СН; нестабільна стенокардія; г. ІМ; динамічна обструкція виносного тракту лівого шлуночка; виражений аортальний/мітральний стеноз.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ФЕЛОДИП	Тева Чех Індастріз с.р.о. (контроль серії та дозвіл на випуск серії)/Клоке Фарма-Сервіс ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції)/Меркле ГмбХ (первинна та вторинна упаковка, контроль серії; дозвіл на	табл. з м/в у бл.	2,5мг; 5мг, 10мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	випуск серії), Чеська Республіка/Німеччина/Німеччина						
ФЕЛОДИП	Тева Чех Індастріз с.р.о. (контроль серії та дозвіл на випуск серії)/Клоке Фарма-Сервіс ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції)/Меркле ГмбХ (первинна та вторинна упаковка, контроль серії; дозвіл на випуск серії), Чеська Республіка/Німеччина/Німеччина	табл. з м/в у бл.	2,5мг	№10x3	6,64	25,85/\$	
ФЕЛОДИП	Тева Чех Індастріз с.р.о. (контроль серії та дозвіл на випуск серії)/Клоке Фарма-Сервіс ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції)/Меркле ГмбХ (первинна та вторинна упаковка, контроль серії; дозвіл на випуск серії), Чеська Республіка /Німеччина/Німеччина	табл. з м/в у бл.	5мг	№10x3	4,50	25,85/\$	
ФЕЛОДИП	Тева Чех Індастріз с.р.о. (контроль серії та дозвіл на випуск серії)/Клоке Фарма-Сервіс ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції)/Меркле ГмбХ (первинна та вторинна упаковка, контроль серії; дозвіл на випуск серії), Чеська Республіка /Німеччина/Німеччина	табл. з м/в у бл.	10мг	№10x3	15,00	25,85/\$	

Комбіновані препарати

- **Амлодипін + Атенолол (Amlodipine + Atenolol)** ^[ПМД]

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II. ТЕНОЧЕК®	Іпка Лабораторізі Лімітед, Індія	табл. у бл.	5мг/50мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	

- **Амлодипін + Аторвастатин (Amlodipine + Atorvastatin)** ^[ПМД]

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I. АМЛОСТАТ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., в/о у бл.	2,5мг/10мг	№14, №56, №84	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АМЛОСТАТ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., в/о у бл.	2,5мг/10мг	№14x2	119,79	
II. КАДУЕТ 10/10	Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	10мг/10мг	№10x3	358,19	25,58/\$
КАДУЕТ 5/10	Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	5мг/10мг	№10x3	268,64	25,58/\$

- **Амлодипін + Валсартан (Amlodipine + Valsartan)** ^[ПМД]

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I. АМЛОСАРТАН	ПАТ "Фармак", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	5мг/80мг, 5мг/160мг, 10мг/160мг	№10x5, №10x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АМЛОСАРТАН	ПАТ "Фармак", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	5мг/80мг	№10x3	100,00	
АМЛОСАРТАН	ПАТ "Фармак", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг/160мг	№10x3	140,00	

	АМЛОСАРТАН	ПАТ "Фармак", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	5мг/160мг	№10х3	120,00	
	ДІФОРС 160	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	5мг/160мг	№10х1, №10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДІФОРС 80	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	5мг/80мг	№10х1, №10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДІФОРС XL	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг/160мг	№10х1, №10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КОМБІСАРТ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	5мг/160мг	№10х3	115,52	
	КОМБІСАРТ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг/160мг	№10х3	124,25	
II.	БІ-САКОРД	Балканфарма - Дупниця АД (виробництво, пакування, контроль якості та випуск серії)/Актавіс Лтд (виробництво, пакування та контроль якості), Болгарія /Мальта	табл., вкриті п/о у бл.	5мг/80мг, 5мг/160мг, 10мг/160мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАЗАР А	ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг/80мг, 5мг/160мг, 10мг/160мг	№14х1, №14х2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАЗАР А	Балканфарма-Дупниця АТ, Болгарія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг/80мг, 5мг/160мг, 10мг/160мг	№14, №28, №30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАЛЄМБІК 10	Алембік Фармас'ютікелс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	10 мг/160мг	№8х1	53,70	25,58/\$
	ВАЛЄМБІК 5	Алембік Фармас'ютікелс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг/160мг	№8х1	51,15	25,58/\$
	ВАЛОДІП	КРКА-Фарма д.о.о. (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії)/КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Хорватія/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг/80мг, 5мг/160мг, 10мг/160мг	№14, №56, №60, №90, №98, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАЛОДІП	КРКА-Фарма д.о.о. (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії)/КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Хорватія/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг/80мг	№28	86,97	35,21/€
	ВАЛОДІП	КРКА-Фарма д.о.о. (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії)/КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Хорватія/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг/80мг	№30	95,40	30,27/€
	ВАЛОДІП	КРКА-Фарма д.о.о. (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії)/КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Хорватія/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг/160мг	№28	130,63	35,21/€
	ВАЛОДІП	КРКА-Фарма д.о.о. (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії)/КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Хорватія/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг/160мг	№30	144,68	30,27/€

	"in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії)/КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Хорватія/Словенія					
ВАЛОДІП	КРКА-Фарма д.о.о. (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії)/КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Хорватія/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг/160мг	№28	105,63	35,21/€
ВАЛОДІП	КРКА-Фарма д.о.о. (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії)/КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Хорватія/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг/160мг	№30	131,96	30,27/€
ВАЛСАР-АМ	Ауробіндо Фарма Лімітед- Юніт VII, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг/160мг, 10мг/160мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ВАНАТЕКС А	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польща	табл., вкриті п/о у бл.	5мг/80мг, 10мг/160мг	№28, №98	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЕКСФОРЖ	Новартіс Фарма Штейн АГ/Новартіс Фармасьютика С. А., Швейцарія/Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг/80мг, 5мг/160мг, 10мг/160мг	№14x1, №14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Лізиноприл + амлодипін (Lisinopril + amlodipine)** ^[ПМД]

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КОМБІПРИЛ-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	10мг/5мг	№10x3	91,43	
II.	АМАПІН-Л	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл. у стрип.	5мг/5мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМЛІПІН	ЛАБОРАТОРІЯ БЕЙЛІ-КРЕАТ-ВЕРНУЙЄ, Франція	табл., вкриті п/о у бл.	5мг/5мг	№10x3	119,65	26,38/\$
	ЕКВАТОР	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл. у бл.	10мг/5мг, 20мг/5мг, 20мг/10мг	№10, №30, №60	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Периндоприл + амлодипін (Perindopril + amlodipine)** ^[ПМД]

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АМ-АЛІТЕР	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МІКРОХІМ", Україна	табл. у бл.	4мг/5мг	№10x3	85,00	
	АМ-АЛІТЕР	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МІКРОХІМ", Україна	табл. у бл.	4мг/10мг	№10x3	90,00	

	АМ-АЛІТЕР	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МІКРОХІМ", Україна	табл. у бл.	8мг/5мг	№10x3	108,00	
	АМ-АЛІТЕР	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МІКРОХІМ", Україна	табл. у бл.	8мг/10мг	№10x3	125,00	
	БІ-ПРЕНЕЛІЯ®	ПАТ "Київмедпрепарат" (пакування з in bulk фірми-виробника Адамед Фарма С.А., Польща), Україна	табл. у бл.	4мг/5мг, 8мг/10мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПЕРІНДОПРЕС® А	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	4мг/5мг	№10x3	69,67	
	ПЕРІНДОПРЕС® А	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	8мг/10мг	№10x3	107,18	
II.	АМЛЕССА	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	4мг/5мг, 4мг/10мг, 8мг/5мг, 8мг/10мг	№10x6, №10x9	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМЛЕССА	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	4мг/10мг	№10x3	111,69	30,27/€
	АМЛЕССА	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	8мг/5мг	№10x3	125,00	30,27/€
	АМЛЕССА	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	4мг/5мг	№10x3	91,71	30,27/€
	АМЛЕССА	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	8мг/10мг	№10x3	144,37	30,27/€
	АМЛОДИПІН-ПЕРІНДОПРИЛ-РІХТЕР	ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща", Польща	табл. у бл.	5мг/4мг, 5мг/8мг, 10мг/4мг, 10мг/8мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БІ-ПРЕСТАРИУМ® 10 МГ/10 МГ	Лабораторії Серв'є Індастрі/Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд/АНФАРМ Підприємство Фармацевтичне АТ, Франція/Ірландія/Польща	табл. у конт.	10мг/10мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БІ-ПРЕСТАРИУМ® 10 МГ/5 МГ	Лабораторії Серв'є Індастрі/Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд/АНФАРМ Підприємство Фармацевтичне АТ, Франція/Ірландія/Польща	табл. у конт.	10мг/5мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БІ-ПРЕСТАРИУМ® 5 МГ/10 МГ	Лабораторії Серв'є Індастрі/Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд/АНФАРМ Підприємство Фармацевтичне АТ, Франція/Ірландія/Польща	табл. у конт.	5мг/10мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БІ-ПРЕСТАРИУМ® 5 МГ/5 МГ	Лабораторії Серв'є Індастрі/Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд/АНФАРМ Підприємство Фармацевтичне АТ, Франція/Ірландія/Польща	табл. у конт.	5мг/5мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	Бі-Престаріум® N 14 мг/10 мг	Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд, Ірландія	табл. у конт.	14мг/10мг	№30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	Бі-Престаріум® N 3,5 мг/2,5 мг	Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд, Ірландія	табл. у конт.	3,5мг/2,5мг	№30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	Бі-Престаріум® N 7 мг/5 мг	Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд, Ірландія	табл. у конт.	7мг/5мг	№30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВІАКОРАМ® 14 МГ/10 МГ	Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд, Ірландія	табл. у конт.	14мг/10мг	№30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВІАКОРАМ® 3,5 МГ/2,5 МГ	Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд, Ірландія	табл. у конт.	3,5мг/2,5мг	№30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВІАКОРАМ® 7 МГ/5 МГ	Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд, Ірландія	табл. у конт.	7мг/5мг	№30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПЕРІНДОПРИЛ 4/АМЛОДИПІН 10 КРКА	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	4мг/10мг	№30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПЕРІНДОПРИЛ 4/АМЛОДИПІН 5 КРКА	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	4мг/5мг	№30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПЕРІНДОПРИЛ 8/АМЛОДИПІН	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	8мг/10мг	№30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	

10 КРКА						
ПЕРИНДОПРИЛ 8/АМЛОДИПІН 5 КРКА	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	8мг/5мг	№30, №90	відсутня у реєстрі ОВЦ	

2.3.2. Бензодіазепіни

- **Дилтіазем (Diltiazem)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: C08DB01 - селективні антагоністи кальцію з переважаючою дією на серце. Похідні бензотіазепіну.

Основна фармакотерапевтична дія: антагоніст кальцію, механізм дії полягає в обмеженні надходження іонів кальцію ч/з повільні кальцієві канали в клітину і, т.ч. зменшує вивільнення кальцію із запасів у саркоплазматичному ретикулумі; це призводить до зменшення кількості наявного внутрішньоклітинного кальцію зі зменшенням споживання кисню міокардом; підвищується здатність до фізичного навантаження і покращуються всі показники ішемії міокарда у пацієнтів зі стенокардією; виявляє розслаблюючий ефект на великі і малі коронарні артерії і зменшує спазм при вазоспастичній стенокардії (стенокардії Принцметала) та відповідь на катехоламіни, але мало впливає на периферичну судинну систему, тому не виникає рефлекторної тахікардії; викликає незначне зниження ЧСС, що супроводжується збільшенням серцевого викиду, поліпшенням перфузії міокарда і зменшенням роботи шлуночків. Антиангінальний ефект спостерігається вже після прийому початкової дози, тоді як антигіпертензивний ефект проявляється лише після приблизно 2 тижнів безперервного застосування препарату.

Показання для застосування ЛЗ: стабільна стенокардія напруження ^{ПМД, БНФ}, вазоспастична стенокардія (стенокардія Принцметала), АГ ^{БНФ, ПМД} як для монотерапії, так і в комплексі з іншими гіпотензивними засобами.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Дозу слід підбирати індивідуально для кожного пацієнта; дорослим по 60 мг ^{БНФ} -4 р/добу, МДД - 360 мг/добу ^{БНФ}. Табл.прол.дії: стенокардія та АГ: звичайна початкова доза становить 90 мг або 120 мг при застосуванні 2 р/добу. Відповіді пацієнтів на терапію можуть варіювати, потреби в дозі препарату можуть істотно відрізнятися між окремими пацієнтами; у деяких пацієнтів зі стенокардією виявилось корисним застосування вищих доз препарату до 480 мг/добу, особливо при нестабільній стенокардії; можуть бути необхідними дози 360 мг/добу для забезпечення адекватного контролю АТ у пацієнтів з АГ.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: Загальне нездужання, головний біль, запаморочення, набряк нижніх кінцівок; гіперемія, еритема, свербіж, запор, диспепсія, біль у шлунку, нудота, діарея, сухість у ротовій порожнині і горлі; АВ-блокада I ст., блокада ніжки пучка Гіса), посилене серцебиття (пальпатація), синусова брадикардія; підвищення рівнів креатинфосфокінази (КФК); лейкопенія, подовження часу кровотечі, тромбоцитопенія, гіперглікемія; нервозність, безсоння, сплутаність свідомості, амнезія, галюцинації, зміна особистості, порушення смаку і нюху; зміни настрою (в т.ч. депресія); порушення ходи, парестезія, сонливість, тремор, екстрапірамідний с-ром; брадикардія; АВ-блокада II-III ст., припинення активності синусового вузла, загострення с-мів стенокардії, артеріальна гіпотензія, тахікардія, аритмія, екстрасистоія, втрата свідомості, приливи; синоатріальна блокада, застійна СН, зупинка синусового вузла, зупинка серця (асистоія), ортостатична гіпотензія; васкуліт (в т.ч. лейкоцитокластичний васкуліт); блювання, анорексія, збільшення маси тіла, гінгівіт, гіперплазія ясен, збільшення рівнів печінкових ферментів (АСТ, АЛТ, ЛДГ, лужної фосфатази), гепатит; кропив'янка, червоний вовчак, петехія, АР шкіри, лімфаденопатія, еозинофілія, фоточутливість (в т.ч. ліхеноїдний кератоз в ділянках шкіри, відкритих для сонця), ангіоневротичний набряк, висипання, мультиформна еритема (в т.ч. с-ром Стівенса-Джонсона та токсичний епідермальний некроліз), пітливість, ексфолювативний дерматит, г. генералізований екзантематозний пустульоз, десквамативна еритема з підвищенням температури тіла або без неї; гінекомастія; слабкість, підвищена втомлюваність, астенія; амбліопія, подразнення очей; шум у вухах; біль у кістках і суглобах, міалгія; задишка, носова кровотеча, застій у носі; ніктурія, поліурія; сексуальні розлади; СН з набряком легень; бронхоспазм (у т.ч. загострення БА).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до дилтіазему або до допоміжних речовин, які входять до складу ЛЗ; кардіогенний шок на фоні ІМ або СН; тяжка артеріальна гіпотензія (систоличний АТ нижче 90 мм рт.ст.); декомпенсована СН; г. ІМ з ускладненим перебігом; шлуночкова аритмія та/або екстрасистоія; тріпотіння або фібриляція передсердь при с-мі Вольфа-Паркінсона-Уайта або с-мі Лауна-Ганога-Левіна без імплантованих кардіостимуляторів; порушення провідності у синусо-передсердному вузлі (СССВ); АВ блокада II або III ст., окрім випадків, коли у пацієнта імплантований функціонуючий шлуночковий водій ритму; тяжка брадикардія (ЧСС менше 55 уд/хв); недостатність лівого шлуночка із застійними легенями; супутнє застосування з інфузією дантролену; застосування у комбінації з івабрадином.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДИЛТІАЗЕМ	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл.	60мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	АЛДІЗЕМ	Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія	табл. у бл.	90мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДІАКОРДИН® 120 РЕТАРД	ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка	табл. прол. дії у бл.	120мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДІАКОРДИН® 60	ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка	табл. у бл.	60мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДІАКОРДИН® 90	ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка	табл. в/о, прол.	90мг	№10x3	відсутня у	

РЕТАРД	Республіка	дії у бл.		реєстри ОБЦ
--------	------------	-----------	--	-------------

2.3.3. Фенілалкіламіни

- **Верапаміл (Verapamil)** * [ГМД]

Фармакотерапевтична група: C08DA01 - Селективні блокатори кальцієвих каналів з прямими ефектами на серце, похідні фенілалкіламіну.

Основна фармакотерапевтична дія: блокує трансмембранний потік іонів кальцію у кардіоміоцити та клітини гладких м'язів судин; безпосередньо зменшує потребу міокарда у кисні за рахунок впливу на енергетично затратні процеси метаболізму у клітинах міокарда та непрямим чином впливає на зменшення постнавантаження; завдяки блокуванню кальцієвих каналів клітин гладкої мускулатури коронарних артерій приплив крові до міокарда посилюється, навіть у постстенотичних ділянках, та усувається спазм коронарних артерій; антигіпертензивна ефективність верапамілу зумовлена зменшенням опору периферичних судин без збільшення ЧСС як рефлекторної відповіді; небажаних змін фізіологічних величин тиску крові не спостерігається; чинить виражену антиаритмічну дію, особливо при надшлуночкової аритмії; затримує проведення імпульсу в АВ вузлі, внаслідок чого, залежно від типу аритмії, відновлюється синусовий ритм та/або частота скорочень шлуночків нормалізується; нормальний рівень ЧСС не змінюється або незначною мірою знижується.

Показання для застосування ЛЗ: ІХС, включаючи стабільну стенокардію напруження; нестабільну стенокардію (прогресуюча стенокардія, стенокардія спокою); вазоспастичну стенокардію (варіантна стенокардія, стенокардія Принцметала); постінфарктну стенокардію у пацієнтів без СН, якщо не показані β-адреноблокатори^{БНФ, ВООЗ}; аритмії: пароксизмальна надшлуночкова тахікардія; тріпотіння/мерехтіння передсердь зі швидкою АВ-провідністю (за винятком с-му WPW^{БНФ}; АГ^{ГМД}. Гіпертонічний криз; у педіатричній практиці - при пароксизмальній надшлуночкової тахікардії (р-н д/ін'єк.).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дози визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта; в/в введення: слід здійснювати під контролем ЕКГ та АТ. Рекомендовані дози для дорослих та підлітків з масою тіла понад 50 кг: початкова доза 5 мг; у разі необхідності ч/з 5-10 хв. ввести ще 5 мг^{БНФ}; якщо необхідно, можливе подальше краплинне введення 5-10 мг верапамілу; середня добова доза при в/в введенні не повинна перевищувати 100 мг. Діти: 0-1 рік - лікування призначати тільки за життєвими показаннями, якщо немає альтернативного лікування; новонароджені 0,75-1мг верапамілу, що відповідає 0,3-0,4 мл р-ну д/ін'єк.; діти грудного віку 0,75-2 мг; 1-5 років 2-3 мг; 6-14 років - 2-5 мг. Табл.: дорослі та підлітки з масою тіла більше 50 кг: ІХС, пароксизмальна надшлуночкова тахікардія, тріпотіння/мерехтіння передсердь - рекомендована добова доза 120-480 мг, розділених на 3-4 прийоми; МДД - 480 мг. АГ - рекомендована добова доза 120-360 мг, розділених на 3 прийоми; діти старшого дошкільного віку до 6 років тільки при порушеннях серцевого ритму: рекомендована доза - у межах 80-120 мг/добу, розділених на 2-3 прийоми; діти 6-14 років тільки при порушеннях серцевого ритму: рекомендована доза - в межах 80-360 мг на добу, розділених на 2-4 прийоми. Табл. прол. дії: ІХС - рекомендована доза 240-480 мг/добу^{БНФ}, розділених на 2 прийоми; АГ - рекомендована доза 240-480 мг/добу, розділена на 2 прийоми^{БНФ}; пароксизмальна надшлуночкова тахікардія, тріпотіння/мерехтіння передсердь - рекомендована доза 240-480 мг/добу, розділена на 2 прийоми.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, запаморочення; шлунково-кишкові розлади: нудота, запор та біль у животі; брадикардія, тахікардія, відчуття серцебиття, зниження АТ, гіперемія, периферичний набряк та втомлюваність; гіперчутливість; гіперкаліємія; сонливість; дзвін у вухах; вертиго; АВ-блокада I, II або III ст., СН, зупинка синусового вузла, синусова брадикардія, асистолія, стенокардія, аж до розвитку ІМ (особливо у хворих зі стенозом коронарних артерій); бронхоспазм, диспное; блювання, дискомфорт у животі, кишкова непрохідність, гіперплазія ясен (гінгівіт та кровотеча); гіпергідроз; ангіоневротичний набряк, с-м Стівенса-Джонсона, мультиформна еритема, макулопапульозний висип, алопеція, кропив'янка, відчуття свербіж, свербіж, пурпура, міалгія, артралгія, м'язова слабкість; НН; еректильна дисфункція, гінекомастія, галакторея; периферичний набряк; підвищення рівнів печінкових ферментів та рівня пролактину в сироватці крові. парестезія, тремор; екстрапірамідальні розлади, параліч (тетрапарез), епілептичні напади; агранулоцитоз, транзиторна втрата зору на тлі максимальної концентрації ЛЗ у плазмі крові, набряк легенів, безсимптомна тромбоцитопенія. У хворих з кардіостимулятором не виключено підвищення кроко-сенсорного порога.

Протипоказання до застосування ЛЗ: відома гіперчутливість до верапамілу або до будь-якого іншого компонента препарату; кардіогенний шок; г. ІМ з ускладненнями (брадикардія, артеріальна гіпотензія, СН); II і III ст. АВ-блокади (крім пацієнтів з функціонуючим штучним водієм ритму) та синоатріальної блокади; СССР (крім пацієнтів з функціонуючим штучним водієм ритму); СН зі зниженням фракції викиду < 35 % та/або тиском заклинювання легеневої артерії вище 20 мм рт. ст. (крім випадків, коли ці стани вторинні щодо надшлуночкової тахікардії, яка піддається терапії верапамілом); мерехтіння/тріпотіння передсердь при наявності додаткових провідних шляхів (WPW-с-м та LGL-с-м); під час лікування верапамілом не застосовувати одночасно в/в β-адреноблокатори (за винятком інтенсивної терапії); брадикардія з ЧСС < 50 уд/хв, артеріальна гіпотензія з рівнем АТ < 90 мм рт. ст.; у разі г. коронарної недостатності в/в введення ЛЗ має бути ретельно обґрунтованим (необхідно виключити можливість ІМ), за станом пацієнта треба пильно наглядати; застосування у комбінації з івабрадином.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,24 г., парентерально - 0,24 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., в криті п/о у конт. чар/уп.	80мг	№10x5	2,64	
	ВЕРАПАМІЛ-	ПрАТ "Фармацевтична фірма	табл., в криті	40мг	№10x2	4,12	

ДАРНИЦЯ	"Дарниця", Україна	п/о у конт. чар/уп.				
ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 2мл у конт. чар/уп.	2,5 мг/мл	№10x1, №5x2	219,65	
ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	80мг	№10x5	1,59	
ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Тов, Україна/Україна/Україна	табл. у бл.	40мг	№10x2	4,04	
ВЕРАТАРД 180	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	капс. прол. дії у бл.	180мг	№10x3	4,56	
II. ІЗОПТИН®	Аббві Дойчланд ГмБХ і Ко. КГ (виробництво, пакування, контроль якості та випуск серії)/Фамар А.В.Е. Антоусса Планта (виробництво, пакування, контроль якості та випуск серії), Німеччина/Греція	табл., вкриті п/о у бл.	80мг	№20x5, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ІЗОПТИН® SR	Аббві Дойчланд ГмБХ і Ко. КГ (виробництво, пакування, контроль якості та випуск серії)/Фамар А.В.Е. Антоусса Планта (виробництво, пакування, контроль якості та випуск серії), Німеччина/Греція	табл., прол. дії у бл.	240мг	№15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛЕКОПТИН®	Лек фармацевтична компанія д.д. (виробництво in bulk, пакування, випуск серії), Словенія	табл., в/о у бл. в кор.	40мг, 80мг	№25x2, №10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

2.4. Інгібітори ангіотензинперетворюючого фермента (АПФ)

• Еналаприл (Enalapril) * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: С09АА02 - інгібітори АПФ, монокомпонентні.

Основна фармакотерапевтична дія: сіль малеїнової к-ти еналаприлу, похідної двох амінокислот, L-аланіну та L-проліну; ангіотензинперетворювальний фермент, що каталізує конверсію ангіотензину I у пресорну субстанцію ангіотензин II; еналаприл гідролізується до еналаприлату, який пригнічує АПФ; пригнічення АПФ спричиняє зниження рівня в плазмі крові ангіотензину II, що призводить до збільшення активності реніну плазми і зменшення секреції альдостерону; також може блокувати розщеплення брадикініну, сильного вазодепресорного пептиду. Механізм, завдяки якому знижується АТ, передусім пов'язують з пригніченням активності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи; може виявляти антигіпертензивний ефект навіть у пацієнтів з низькореніною гіпертензією; ефективне пригнічення активності АПФ звичайно досягається ч/з 2 - 4 год. після перорального прийому разової дози еналаприлу; початок антигіпертензивної активності звичайно спостерігається ч/з 1 год., а пікове зниження АТ досягається ч/з 4 - 6 год. після прийому препарату; у разі застосування у рекомендованих дозах антигіпертензивний та гемодинамічний ефекти зберігаються протягом 24 год.; у пацієнтів з есенціальною гіпертензією зниження АТ супроводжується зменшенням периферичного опору артерій зі збільшенням серцевого викиду і незначним прискоренням серцевого ритму або без такого; збільшується нирковий кровотік; у пацієнтів з хворобою нирок, у т.ч. хворих на ЦД, після застосування еналаприлу зменшується альбумінурія; може знижувати або попередити розвиток тіазид-індукованої гіпокаліємії; знижує тиск у кінцевих легеневих капілярах, покращує переносимість фізичного навантаження та зменшує тяжкість СН; у пацієнтів з легкою та помірною СН сповільнює прогресування дилатації міокарда та СН.

Показання для застосування ЛЗ: р/ос: АГ^{БНФ, ВООЗ, ПМД}; клінічно виражена СН^{БНФ, ВООЗ}; профілактика клінічно вираженої СН у пацієнтів з безсимптомною дисфункцією лівого шлуночка (фракція викиду $\leq 35\%$)^{БНФ, ВООЗ}; в/в: АГ, гіпертензивний криз, в/в показаний для лікування АГ у випадках, коли р/ос лікування неможливе.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос: при АГ легкого ступеня початкова доза 5-10 мг 1 р/добу^{БНФ}; підтримуюча доза 20 мг/добу, МДД - 40 мг/добу^{БНФ}; СН/безсимптомна дисфункція лівого шлуночка: початкова доза 2,5 мг, у разі відсутності ефекту або після відповідної корекції симптоматичної гіпотензії, дозу поступово підвищувати до звичайної підтримуючої дози 20 мг^{БНФ}, яку призначають одноразово або розділяють на 2 прийоми^{БНФ}

залежно від того, що краще переносить пацієнт; добір дози рекомендовано здійснювати впродовж 2-4 тижнів; МДД - 40 мг/добу у 2 прийоми^{БНФ}; р-н д/ін'єкції вводити в/в струминно повільно, протягом щонайменше 5 хв, його можна вводити розведеним у 50 мл 5 % глюкози, 0,9 % р-ні натрію хлориду (фізіологічний р-н) чи 5 % глюкози у лактаті Рінгера, рекомендована доза для лікування АГ та гіпертонічних кризів 1,25 мг (1 ампл.) кожні 6 год, при переході від лікування еналаприлом до лікування еналаприлатом звичайна доза 1 ампл. (1,25 мг) кожні 6 год, лікування еналаприлатом триває 48 год, після цього пацієнта перевести на терапію табл. еналаприлу; при переході від парентерального лікування еналаприлатом до р/ос лікування еналаприлом рекомендована початкова доза 5 мг 1 р/добу для пацієнтів, яким вже вводили в/в 1,25 мг еналаприлату кожні 6 год, при необхідності дозу можна збільшити; для пацієнтів, які спочатку лікувались 1/2 звичайної дози еналаприлату (0,625 мг), рекомендована доза при переході до р/ос лікування 2,5 мг/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анемія (включаючи апластичну та гемолітичну); нейтропенія, зниження гемоглобіну, зниження гематокриту, тромбоцитопенія, агранулоцитоз, пригнічення кісткового мозку, панцитопенія, лімфаденопатія, аутоімунні хвороби; с-м порушення секреції антидіуретичного гормону; гіпоглікемія; депресія, головний біль; сплутаність свідомості, сонливість, безсоння, нервозність, парестезії, вертимо; розлади сну, аномальні сновидіння; затуманений зір; запаморочення; гіпотензія (включаючи ортостатичну гіпотензію), синкопе, біль за грудниною, порушення ритму, стенокардія, тахікардія; ортостатична гіпотензія, прискорене серцебиття, ІМ чи інсульт, внаслідок надмірного зниження тиску у пацієнтів з високим ризиком; феномен Рейно; кашель; задишка; ринорея, біль у горлі та захриплість, бронхоспазм/астма, легеневі інфільтрати, риніт, алергічний альвеоліт/еозинофільна пневмонія, фарингіт; нудота; діарея, абдомінальний біль, зміна смаку; кишкова непрохідність, панкреатит, блювання, диспепсія, запор, анорексія, подразнення шлунка, сухість у роті, пептичні виразки; стоматит/афтозні виразки, глосит; ангіоневротичний набряк кишечника; печінкова недостатність, гепатит гепатоцелюлярний чи холестатичний, гепатит, некроз, холестаза (включаючи жовтяницю); висипання, гіперчутливість/ангіоневротичний набряк обличчя, кінцівок, губ, язика, голосової щілини та/або гортані; підвищене потовиділення, свербіж, кропив'янка, алопеція; множинна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, ексфолиативний дерматит, токсичний епідермальний некроліз, пемфігус, еритродермія; гарячка, серозит, васкуліт, міалгія/міозит, артралгія/артрит, позитивний тест на антинуклеарні а/т, підвищення ШОЕ, еозинофілія і лейкоцитоз; висипи, фотосенсибілізація та інші р-ції з боку шкіри; порушення ф-ції нирок, НН, протеїнурія; олігурія; імпотенція; гінекомастія; астенія; втома; м'язові судоми, припливи, дзвін у вухах, відчуття дискомфорту; гіперкаліємія, підвищення креатиніну в сироватці крові; підвищення сечовини у крові, гіпонатріємія; підвищення ферментів печінки, підвищення білірубіну в сироватці крові; артеріальна гіпотензія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до еналаприлу, до будь-якої допоміжної речовини чи до будь-якого іншого інгібітору АПФ; наявність в анамнезі ангіоневротичного набряку, пов'язаного із застосуванням інгібіторів АПФ; спадковий або ідіопатичний ангіоневротичний набряк; вагітні або жінки, які планують завагітніти; не слід застосовувати з препаратами, що містять аліскірен, пацієнтам з ЦД або з порушенням ф-ції нирок (ШКФ < 60 мл/хв/1,73 м²).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 10 мг., парентерально - 10 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	ЕНАЛАПРИЛ	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x2	0,39	
	ЕНАЛАПРИЛ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	табл. у бл.	0,01г	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕНАЛАПРИЛ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	табл. у бл.	0,01г	№10x9	0,26	
	ЕНАЛАПРИЛ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	табл. у бл.	0,01г	№10x5	0,28	
	ЕНАЛАПРИЛ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	табл. у бл.	0,01г	№10x2	0,46	
	ЕНАЛАПРИЛ	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	табл. у бл.	0,01г	№10x2	0,42	
	ЕНАЛАПРИЛ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x2	0,47	
	ЕНАЛАПРИЛ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	20мг	№10x2	0,31	
	ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	10мг, 20мг	№10x6, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x9	0,53	
	ЕНАЛАПРИЛ-	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x2	1,30	

АСТРАФАРМ							
ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	20мг	№10x9	0,34		
ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	20мг	№10x2	0,43		
ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	10мг	№10x2	0,39		
ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	10мг, 20мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	10мг	№20x1	0,60		
ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	20мг	№20x1	0,40		
ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл. у бл.	5мг	№10x3	0,83		
ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл. у бл.	5мг	№10x2	0,91		
ЕНАЛОЗИД® МОНО	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	5мг, 10мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЕНАЛОЗИД® МОНО	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x2	0,80		
ЕНАЛОЗИД® МОНО	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x2	0,53		
II. БЕРЛІПРИЛ® 10	Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (виробництво "in bulk", пакування, контроль та випуск серій)/БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk" та контроль серій, пакування, контроль та випуск серій), Німеччина/Німеччина	табл. у бл.	10мг	№10x3	1,48	29,36/€	
БЕРЛІПРИЛ® 20	Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (пакування)/БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", пакування, контроль та випуск серій), Німеччина/Німеччина	табл. у бл.	20мг	№10x3	1,13	29,36/€	
БЕРЛІПРИЛ® 5	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (Виробник, що виконує виробництво препарату in bulk, випуск та контроль серії, кінцеве пакування)/Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (Виробник, що виконує виробництво препарату in bulk та контроль серії, кінцеве	табл. у бл.	5мг	№10x3	1,98	29,36/€	

	пакування)/Клоке Ферпакунгс-Сервіс Гмб, Німеччина /Німеччина/Німеччина						
ЕНАЛАПРИЛ КРКА	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	2,5мг, 5мг, 10мг, 20мг	№20, №60, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЕНАЛАПРИЛ-ТЕВА	ТОВ Тева Оперейшнз Поланд, Польща	табл. у бл.	2,5мг, 5мг, 10мг, 20мг	№10x3, №10x6, №10x9	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЕНАЛАПРИЛ-ТЕВА	ТОВ Тева Оперейшнз Поланд, Польща	табл. у бл.	5мг	№10x3	1,25	26,30/\$	
ЕНАЛАПРИЛ-ТЕВА	ТОВ Тева Оперейшнз Поланд, Польща	табл. у бл.	10мг	№10x3	0,99	26,30/\$	
ЕНАЛАПРИЛ-ТЕВА	ТОВ Тева Оперейшнз Поланд, Польща	табл. у бл.	20мг	№10x3	0,72	26,30/\$	
ЕНАП®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	5мг	№10x2	3,01	35,35/€	
ЕНАП®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	10мг	№10x9	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЕНАП®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	10мг	№10x6	1,98	35,35/€	
ЕНАП®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	10мг	№10x2	2,19	35,35/€	
ЕНАП®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	20мг	№10x2	1,74	35,35/€	
ЕНАП®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю))/НЛЗОХ (Національні лабораторія за здоров'є, околе ін храно) (контроль серії (тільки фізичні та хім, Словенія/Словенія	табл. у бл.	2,5мг	№10x2	4,28	32,39/€	
ЕНАП®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	р-н д/ін'ек. в амп. по 1мл у кор.	1,25 мг/мл	№5	466,45	32,39/€	
РЕНІТЕК®	Мерк Шарп і Доум Б.В. (пакування, випуск серії)/Мерк Шарп і Доум Лімітед (виробник нерозфасованої продукції, контроль якості), Нідерланди/Велика Британія	табл. у бл.	10мг, 20мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ		

● **Каптоприл (Captopril)** * [ГЛМД]

Фармакотерапевтична група: С09АА01 - засоби, що діють на ренін-ангіотензинову систему. Інгібітори АПФ.

Основна фармакотерапевтична дія: Блокуючи перетворення ангіотензину I в ангіотензин II, чинить судинорозширювальну дію, завдяки якій зменшує загальний периферичний судинний опір (постнавантаження), тиск «заклинювання» у легеневих капілярах (переднавантаження) та опір у легеневих судинах; підвищує хвилинний об'єм серця та толерантність до навантаження; при тривалому застосуванні зменшує вираженість гіпертрофії міокарда лівого шлуночка, запобігає прогресуванню СН та уповільнює розвиток дилатації лівого шлуночка; знижує тонус виносних артерій клубочків нирок, тим самим покращуючи внутрішньоклубочкову гемодинаміку, та перешкоджає розвитку діабетичної нефропатії; позитивні ефекти інгібіторів АПФ виявляються головним чином результатом пригнічення ренін-ангіотензин-альдостеронової с-ми плазми; ренін - це ендогенний фермент, який синтезують нирки і який поступає у загальний кровообіг, де він перетворює ангіотензиноген в ангіотензин-I, відносно неактивний декапептид; потім ангіотензин-I перетворюється за допомогою АПФ, пептидилдіпептидази, в ангіотензин-II; ангіотензин-II - це потужний вазоконстриктор, відповідальний за звуження артеріальних судин та підвищення тиску крові, а також за стимуляцію надниркових залоз продукувати альдостерон; пригнічення АПФ призводить до зниження ангіотензину-II у плазмі крові, що призводить до зменшення вазопресорної активності та до зниження продукування альдостерону; хоча зниження останнього є невеликим, може відбутися незначне збільшення концентрацій калію у сироватці крові, паралельно з втратою натрію та рідини; відміна негативного оборотного зв'язку ангіотензину-II з продукуванням реніну призводить до збільшення активності реніну у плазмі крові; іншою функцією перетворювального ферменту є деградація потужного вазодепресивного кінінпептидбракідініну до неактивних метаболітів; тому пригнічення АПФ призводить до збільшення активності циркулюючої у загальному кровообігу та локальної калікреїн-кінін-системи, яка бере участь у розширенні периферичних судин шляхом активації простагландинової системи; можливо, цей механізм залучений до гіпотензивного ефекту інгібіторів АПФ та відповідає за певні побічні реакції. При АГ

спричиняє зниження тиску крові у положенні лежачи та стоячи, без стимулювання будь-якого компенсаторного підвищення ЧСС, без затримки води та натрію.

Показання для застосування ЛЗ: АГ^{БНФ, ГМД}; СН^{БНФ}, призначають для лікування ХСН зі зниженням систолічної функції шлуночків, та у комбінації з діуретиками і, при необхідності, з дигіталісом і β-блокаторами; діабетичної нефропатії^{БНФ} у хворих на ЦД I типу, що проявляється макропротеїнурією; ІМ: для короткотривалого (4 тижні) лікування протягом 24 год після перенесеного ІМ^{БНФ} пацієнтам зі стабільним станом; для довготривалої профілактики симптоматичної СН показаний пацієнтам із клінічно стабільним станом з безсимптомною дисфункцією лівого шлуночка (фракція викиду ≤ 40 %).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл. приймають регулярно в один і той же час кожного дня; АГ - рекомендована початкова доза - 25-50 мг щоденно за 2 прийоми, дози підбирають залежно від ступеня зниження АТ, що спостерігається ч/з 2-4 тижні лікування (достатньою є доза 100-150 мг/добу за 2 прийоми)^{БНФ}; каптоприл можна застосовувати окремо або з іншими антигіпертензивними препаратами, особливо з тіазидними діуретиками; режим дозування 1 р/добу можна застосовувати, коли додається такий супутній антигіпертензивний препарат як тіазидний діуретик; пацієнтам із підвищеною активністю ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (гіповолемією, реноваскулярною гіпертензією, декомпенсованою СН) терапію бажано розпочинати з одноразової дози 6,25 мг чи 12,5 мг; початок такого лікування слід проводити під ретельним медичним контролем з подальшим застосуванням препарату 2 р/добу; дозування можна поступово збільшувати до 50 мг чи 100 мг на добу за 1 чи 2 прийоми; СН - початкова доза 6,25-12,5 мг 2-3 р/добу, дози підбираються залежно від стану пацієнта і його потреб щонайменше через 2 тижні лікування (достатньою є доза 75-150 мг/добу), МДД - 150 мг (за 2 прийоми)^{БНФ}; ІМ: короткотривале лікування: призначення препарату у перші 24 год після ІМ слід проводити за такою схемою: початкова доза становить 6,25 мг, ч/з 2 год призначити 12,5 мг і ч/з 12 год прийняти ще 25 мг каптоприлу; з наступного дня протягом 4 тижнів каптоприл слід приймати у дозі 100 мг/добу, розподілений на 2 прийоми; наприкінці 4-тижневого лікування слід зробити повторну оцінку стану пацієнта для прийняття рішення щодо лікування на етапі після перенесеного ІМ; довготривале лікування: якщо застосування каптоприлу не розпочато протягом перших 24 год стадії г. ІМ, рекомендується розпочинати лікування у період між 3-ім та 16-им днями після інфаркту з моменту, коли забезпечено необхідні умови лікування (стабільна гемодинаміка та лікування будь-якої залишкової ішемії); лікування слід розпочинати у лікарні під суворим контролем (зокрема, АТ) до моменту досягнення дози 75 мг/добу; початкова доза препарату повинна бути низькою, зокрема, якщо у пацієнта нормальний або низький тиск на початку терапії; лікування слід розпочинати з дози 6,25 мг, потім перейти на дозу 12,5 мг 3 р/добу протягом 2-х днів, потім - на дозу 25 мг 3 р/добу при відсутності побічних гемодинамічних реакцій; рекомендована доза для ефективного кардіозахисту протягом довготривалого лікування становить 75-150 мг щоденно, яку слід розподілити на 2 чи 3 прийоми; у разі симптоматичної гіпотензії, як і при СН, дозу діуретиків та/або інших судинорозширювальних препаратів можна зменшити для досягнення стабільної дози каптоприлу; у разі необхідності дозу каптоприлу можна регулювати залежно від клінічної реакції пацієнта; каптоприл можна застосовувати у комбінації з іншими видами лікування ІМ, наприклад з тромболітичними препаратами, β-блокаторами та ацетилсаліциловою к-тою; діабетична нефропатія у пацієнтів, хворих на ЦД I типу: слід застосовувати у дозі 75-100 мг/добу за 2 прийоми, при необхідності - комбінувати з іншими антигіпертензивними препаратами; порушення функції нирок - при кліренсі креатиніну >40 мл/хв/1,73 м² початкова добова доза 25-50 мг, МДД - 150 мг; кліренс креатиніну 21-40 мл/хв/1,73 м² початкова добова доза 25 мг, МДД - 100 мг; кліренс креатиніну 10-20 мл/хв/1,73 м² початкова добова доза 12,5 мг, МДД - 75 мг; кліренс креатиніну < 10 мл/хв/1,73 м² початкова добова доза 6,25 мг, МДД - 37,5 мг^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нейтропенія/агранулоцитоз, панцитопенія (зокрема у пацієнтів з порушенням ф-цій нирок), анемія (включаючи апластичну чи гемолітичну), тромбоцитопенія, лімфаденопатія, еозинофілія; аутоімунні захворювання та/або позитивні антинуклеарні антитіла; анорексія; гіперкаліємія, ацидоз, гіпоглікемія; розлади сну; сплутаність свідомості, депресія; смакові порушення, запаморочення; сонливість, головний біль та парестезія; цереброваскулярні явища, атаксія, включаючи інсульт та втрату свідомості; затуманення зору; тахікардія, тахіаритмія, стенокардія, прискорене серцебиття; зупинка серця, кардіогенний шок; артеріальна гіпотензія, с-м Рейно, припливи, блідість обличчя; сухий, подразнюючий (непродуктивний) кашель та задишка; сухий кашель зазвичай проходить ч/з кілька тижнів після припинення лікування каптоприлом; бронхоспазм, риніт, алергічний альвеоліт/еозинофільна пневмонія; нудота, блювання, подразнення шлунка, абдомінальний біль, діарея, закрп, сухість у ротовій порожнині; стоматит/поява афтозних виразок; глосит, пептична виразка, панкреатит; порушення ф-цій печінки; холестаза, включаючи жовтяницю; гепатит, включаючи некроз; підвищений рівень ферментів печінки та підвищені рівні білірубіну; порушення ф-цій печінки зазвичай проходять після припинення лікування каптоприлом; свербіж з/без висипання, свербіж та алопеція; ангіоневротичний набряк; кропив'янка, с-м Стівенса-Джонсона, поліморфна еритема, фоточутлива еритродермія, пемфігоїдні реакції та ексфоліативний дерматит; міалгія, артралгія; порушення ф-цій нирок, включаючи ниркову недостатність, поліурію, олігурію та часте сечовипускання; нефротичний с-м; імпотенція, гінекомастія; біль у грудях, підвищена втомлюваність, слабкість; пропасниця; протеїнурія, еозинофілія, гіперкаліємія, гіпонатріємія, підвищені рівні сечовини, креатиніну та білірубіну в сироватці крові, зниження рівня гемоглобіну в крові, зниження рівня гематокриту, лейкопенія, тромбоцитопенія, підвищений титр антинуклеарних антитіл, підвищення осідання еритроцитів; ангіоневротичний набряк обличчя, повік, язика, периферичні набряки траплялися приблизно у одного на 1000 пацієнтів; інтерстиціальний ангіонабряк спостерігався у пацієнтів, які лікувалися інгібіторами АПФ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до каптоприлу, до будь-якої з допоміжних речовин ЛЗ або до інших інгібіторів АПФ; набряк Квінке (в т.ч. в анамнезі, після застосування інгібіторів АПФ, вроджений (ідіопатичний) ангіоневротичний набряк; звуження устя аорти або мітрального стенозу, наявність інших перешкод відтоку крові з лівого шлуночка серця; гіпертрофічна кардіоміопатія з низьким серцевим викидом; первинний гіперальдостеронізм; гіперкаліємія; тяжкі порушення ф-ції нирок; двобічне звуження ниркових артерій або звуження артерії єдиної нирки; стан після пересадження нирки; порфірія; вагітність або жінки, які планують завагітніти; період годування груддю; непереносимість галактози, дефіцит лактази, с-ром глюкозо-галактозної

мальабсорбції; одночасне застосування з препаратами, що містять аліскірен, пацієнтам, хворим на ЦД, або пацієнтам з нирковою недостатністю (швидкість клубочкової фільтрації < 60 мл/хв/1,73 м²).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 50 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КАПТОПРИЛ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	25мг	№10x2	3,05	
	КАПТОПРИЛ	ТОВ "Тернофарм", Україна	табл. у бл.	0,025г	№10x2	3,88	
	КАПТОПРИЛ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	25мг	№10x2	4,00	
II.	КАПТОПРИЛ	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	12,5мг	№10x2	9,81	30,27/€
	КАПТОПРИЛ	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	25мг	№10x2	7,05	30,27/€
	КАПТОПРИЛ	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	50мг	№10x2	5,29	30,27/€

● **Квінаприл (Quinapril)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: С09АА06 - Засоби, що діють на ССС. Інгібітори АПФ.

Основна фармакотерапевтична дія: гіпотензивна, кардіопротективна дія; пригнічення АПФ призводить до зменшення утворення ангіотензину II, який чинить судинозвужувальну дію в тканинах і плазмі крові, а це спричиняє зменшення секреції альдостерону та, як наслідок, підвищення концентрації калію в сироватці крові; підвищення активності реніну у плазмі крові є наслідком припинення негативного зворотного зв'язку між ангіотензином II та секрецією реніну; оскільки АПФ також метаболізує молекулу брадикініну (вазодилатуючий пептид), пригнічення АПФ призводить до підвищення активності циркулюючих і локальних калікреїн-кінінових систем (та, як наслідок, активації простагландинової системи), можливо, цей механізм відіграє роль у реалізації гіпотензивної дії інгібіторів АПФ та розвитку певних побічних реакцій; ще одним ефектом, механізм якого поки що нез'ясований, є збільшення чутливості до інсуліну.

Показання для застосування ЛЗ: есенціальна АГ ^{ПМД, БНФ}, СН ^{БНФ} - як допоміжний ЛЗ у комбінації з діуретиками, особливо при тяжкій СН - у комбінації з препаратами наперстянки.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: есенціальна гіпертензія: початкова доза 10 мг/добу ^{БНФ}; якщо ця доза не призводить до нормалізації АТ, доза може бути збільшена на 20 мг/добу, цю дозу можна прийняти як одноразову або розділити на 2 прийоми (вранці та ввечері) ^{БНФ}; збільшувати дозу протягом 3 тижнів небажано; підтримуюча доза становить 10 мг/добу, МДД не повинна перевищувати 20 мг 2 р/добу (40 мг); СН ^{БНФ}: застосовувати як доповнення до терапії діуретиками та/або серцевими глікозидами; рекомендована початкова доза 2,5 мг вранці та ввечері ^{БНФ}; дозування можливо збільшувати тільки поступово, залежно від індивідуальної р-ції пацієнта на лікування; підтримуюча доза 10-20 мг/добу, МДД не повинна перевищувати 20 мг 2 р/добу ^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анафілактоїдні р-ції; біль у грудях, підвищена втомлюваність, астения; жар, генералізований набряк, периферичний набряк; стенокардія, відчуття серцебиття, тахікардія, набряк, ІМ; серцеві аритмії, церебральний інсульт; артеріальна гіпотензія, ортостатична гіпотензія; нудота, блювання, діарея, диспепсія, біль у животі (у верхніх відділах), фарингіт, порушення травлення; сухість у роті або горлі, метеоризм, панкреатит (іноді летальний), запор, анорексія; зміна смаку, глосит; ілеус, інтестинальний ангіоневротичний набряк; тромбоцитопенія; нейтропенія, агранулоцитоз, гемолітична анемія; головний біль, млявість, знесилення, безсоння, парестезія, підвищена стомлюваність, запаморочення; депресія, нервозність, сонливість, порушення сну, відчуття поколювання, порушення рівноваги, сплутаність свідомості, мінуща втрата смаку; синкопе; алергічні шкірні р-ції, такі як екзантема; алопеція, підвищене потовиділення, пемфігус, свербіж, висипання, ангіоневротичний набряк губ, обличчя та/або кінцівок, кропив'янка та фоточутливість; мультиформна еритема; псоріазоподібні зміни з боку шкіри, припливи, діафорез, оніхолізіс, посилення симптомів с-му Рейно; с-м Стівенса-Джонсона, ексфолиативний дерматит, епідермальний некроліз; порушення ф-ції нирок; інфекція сечовивідних шляхів, протеїнурія; ГНН; імпотенція; еректильна дисфункція; амбліопія; затуманений зір; дзвін у вухах, вертиго; біль у спині, міалгія; кашель, подразнюючий кашель, задишка, риніт; синусит, інфекція ВДШ, бронхіт, еозинофільний пневмоніт; спрага; бронхоспазм; гепатит; холестатична жовтяниця або порушення ф-ції печінки; зниження концентрації Hb, гематокриту, кількості лейкоцитів або тромбоцитів, підвищення концентрацій сечовини або креатиніну у сироватці крові; підвищення концентрації калію, зниження концентрації натрію в сироватці крові; може розвиватися анемія, еозінофілія, панцитопенія, особливо у пацієнтів із порушенням ф-ції нирок, колагенозом або супутньою терапією алопуринолом, прокаїнамідом або певними ЛЗ, які пригнічують захисні р-ції організму; гемоліз, підвищення концентрацій білірубіну та печінкових ферментів; у пацієнтів із вродженим дефіцитом глюкозо-6-фосфат дегідрогенази спостерігалися окремі випадки гемолітичної анемії; гіперкаліємія.

Противопоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-яких компонентів препарату; наявність в анамнезі ангіоневротичного набряку або іншої ангіоедеми (як результат попереднього лікування інгібіторами АПФ); білатеральний стеноз ниркових артерій або стеноз артерії єдиної нирки; стан після трансплантації нирки; гемодинамічно значущий стеноз аортального або мітрального клапана чи гіпертрофічна кардіоміопатія; первинний гіперальдостеронізм; вагітність; годування груддю; не застосовувати препарати, що містять аліскірен разом з квінаприлом пацієнтам із ЦД або нирковою недостатністю (GFR < 60 мл/хв/1,73 м²); під час терапії препаратом протипоказане проведення діалізу або гемофільтрації з використанням полі(акрилонітрил, натрій-2-метилалісульфонат)-високопроникних мембран (наприклад, «AN69»), оскільки існує ризик розвитку р-цій гіперчутливості (анафілактоїдних р-цій), включаючи загрозливий для життя шок, під час проведення діалізу або

гемофільтрації; у разі необхідності проведення невідкладного діалізу або гемофільтрації, слід спочатку замінити ЛЗ на препарат, який не є інгібітором АПФ, або слід використати альтернативні мембрани для діалізу; під час аферезу ліпопротеїнів низької щільності (у випадку гіперхолестеринемії тяжкого ст.) із застосуванням декстрансульфату та супутнього застосування інгібітору АПФ спостерігалися загрозові для життя р-ції гіперчутливості; інколи загрозові для життя р-ції гіперчутливості (зниження АТ, задишка, блювання, алергічні шкірні р-ції) можуть виникати під час лікування, спрямованого на зменшення або усунення тенденції до розвитку алергічних р-цій (десенсибілізуюча терапія) на токсини комах (такі як жало бджоли чи оси), і супутнього застосування інгібітору АПФ; у разі необхідності проведення аферезу ліпопротеїнів низької щільності (ЛНЩ) або десенсибілізуючої терапії щодо токсинів комах ЛЗ слід тимчасово замінити іншими ЛЗ, призначеними для лікування АГ або СН.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АККУПРО®	Пфайзер Менюфектуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина	табл., в криті п/о у бл.	5мг, 10мг, 20мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Лізиноприл (Lisinopril)**^{ПМД}

Фармакотерапевтична група: С09АА03 - інгібітори АПФ.

Основна фармакотерапевтична дія: інгібітор пептидилдипептидази; пригнічує АПФ, що призводить до зниження концентрації ангіотензину II, т.ч. зумовлює зменшення судинозвужувальної активності та зменшення секреції альдостерону. Останнє зниження може призвести до підвищення концентрації калію в сироватці крові; знижує АТ навіть у пацієнтів з АГ з низьким рівнем реніну; зменшує альбумінурію за рахунок змін гістології та гемодинаміки гломерулярного апарату нирок; відіграє позитивну роль у відновленні ф-ції ушкодженого ендотелію у хворих із гіперглікемією.

Показання для застосування ЛЗ: есенціальна гіпертензія^{ПМД}; СН (симптоматичне лікування); г. ІМ (короткотривале лікування (6 тижнів) гемодинамічно стабільних пацієнтів не пізніше ніж ч/з 24 год після г. ІМ)); лікування початкової нефропатії у пацієнтів, хворих на ЦД II типу з АГ.^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: есенціальна АГ: можна застосовувати як монотерапію, а також у комбінації з іншими антигіпертензивними засобами, початкова доза - 10 мг/добу, підтримувальна доза - 20 мг/добу^{БНФ}; у пацієнтів із реноваскулярною гіпертензією починати під медичним контролем з дози 2,5-5 мг/добу; МДД - 80 мг^{БНФ}; при збільшенні дози враховувати, що для повного прояву гіпотензивного ефекту потрібно 2-4 тижні; СН - початкова доза 2,5 мг; терапевтичну дозу призначають, залежно від індивідуальної р-ції пацієнта на терапію; збільшення дози не раніше ніж ч/з 2 тижні; збільшувати дозу не більше як на 10 мг з інтервалом не менше 2 тижнів до МДД 35 мг/добу, рекомендовано призначати як додаткову терапію до лікування діуретиками та, за наявності показань, з дигіталісом або β-блокаторами^{БНФ}; г. ІМ при стабільному гемодинамічному стані призначати додатково до нітратів та звичайного стандартного лікування ІМ; лікування починати протягом 24 год після появи симптомів ІМ; починати протягом 24 год після виникнення симптомів г. ІМ за умови, якщо систолічний тиск не нижче 100 мм рт. ст., початкова доза 5 мг, наступна ч/з 24 год - 5 мг, ч/з 48 год та в подальшому - 10 мг/добу^{БНФ}; для хворих на ЦД II типу з АГ добова доза 10 мг 1 р/добу, її можна збільшити до 20 мг 1 р/добу для досягнення стійкого АТ нижче 90 мм рт. ст.^{БНФ}

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: запаморочення, головний біль; ортостатичні порушення (включаючи артеріальну гіпотензію); кашель; діарея, блювання; порушення ф-ції нирок; зміна настрою, порушення сну, галюцинації; парестезії, вертиго, порушення смакових відчуттів; ІМ можливий як ускладнення надмірної гіпотензії у пацієнтів з високим ризиком, тахікардія; порушення мозкового кровообігу; феномен Рейно; риніт; висипання, свербіж; нудота, біль у ділянці живота, розлад шлунка; імпотенція; втомлюваність, астенія; збільшення рівня сечовини, креатиніну в сироватці крові, збільшення активності ферментів печінки, гіперкаліємія; с-ром неадекватної секреції АДГ, зменшення гематокриту, зниження рівня гемоглобіну, збільшення рівня сироваткового білірубину, гіпонатріємія, гіпоглікемія; сплутаність свідомості; паросмія, сухість у роті; кропив'янка, алопеція, псоріаз, гіперчутливість (ангіоневротичний набряк обличчя, кінцівок, губ, язика, голосової щілини, гортані); уремія, олігурія/анурія, ГНН; гінекомастія; пригнічення діяльності кісткового мозку, анемія, тромбоцитопенія, лейкопенія, нейтропенія, агранулоцитоз, гемолітична анемія, лімфаденопатія; бронхоспазм, синусит, алергічний альвеоліт, еозинофільна пневмонія; панкреатит, гепатит, жовтяниця, печінкова недостатність; підвищене потовиділення, пухирчатка, токсичний епідермальний некроліз, с-ром Стівенса - Джонсона, поліморфна еритема, псевдолімфома шкіри.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої або допоміжних речовин препарату; ангіоневротичний набряк в анамнезі, пов'язаний з попереднім лікуванням іншими інгібіторами АПФ; спадковий або ідіопатичний ангіоневротичний набряк; стеноз аорти або мітрального клапана або гіпертрофічна кардіоміопатія з порушенням гемодинаміки; первинний гіперальдостеронізм; стеноз ниркової артерії (білатеральний або односторонній); кардіогенний шок; стан із нестабільною гемодинамікою після г. ІМ; вагітні або жінки, які планують завагітніти; застосування пацієнтам, які знаходяться на ГД з використанням високопроточних мембран (наприклад AN 69); рівень креатиніну в сироватці крові > 220 мкмоль/л; одночасне застосування препарату з препаратами, що містять аліскірен пацієнтам з ЦД або нирковою недостатністю (швидкість клубочкової фільтрації <60 мл/хв/1,73 м²).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 10 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	ЛІЗИНОПРИЛ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	5мг, 10мг, 20мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛІЗИНОПРИЛ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x2	1,20	
	ЛІЗИНОПРИЛ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x3	0,80	
	ЛІЗИНОПРИЛ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x2	1,40	
	ЛІЗИНОПРИЛ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	20мг	№10x2	1,09	
	ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	5мг, 10мг, 20мг	№10, №30, №60, №90, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x2	0,95	
	ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x3	1,27	
	ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x2	1,45	
	ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	20мг	№10x2	1,15	
ЛІПРИЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (виробництво за повним циклом)/Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОФАРМ" (виробництво, пакування, випуск серій)/Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна /Україна/Україна	табл. у конт.	5мг, 10мг, 20мг	№60, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЛІПРИЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (виробництво за повним циклом)/Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОФАРМ" (виробництво, пакування, випуск серій)/Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна /Україна/Україна	табл. у бл.	10мг	№10x3	1,14		
ЛІПРИЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (виробництво за повним циклом)/Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОФАРМ" (виробництво, пакування, випуск серій)/Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна/Україна/Україна	табл. у бл.	5мг	№10x3	1,32		
ЛІПРИЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (виробництво за повним циклом)/Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОФАРМ" (виробництво, пакування, випуск	табл. у бл.	20мг	№10x3	0,94		

		серій)/Товариство з обмеженою відповідаль, Україна /Україна/Україна					
II.	АУРОЛАЙЗА	Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт III), Індія	табл. у бл.	5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АУРОЛАЙЗА	Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт III), Індія	табл. у бл.	10мг	№10x3	1,67	25,52/\$
	АУРОЛАЙЗА	Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт III), Індія	табл. у бл.	20мг	№10x3	1,33	25,52/\$
	ВІТОПРИЛ	СТАДА Арцнайміттель АГ (випуск серій, первинне та вторинне пакування, контроль/випробування серій)/СТАДА В'єтнам Джоінт Венчур Ко. Лтд (виробництво, первинне та вторинне пакування), Німеччина/В'єтнам	табл. у бл.	2,5мг, 5мг, 10мг, 20мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДАПРИЛ	Медокемі ЛТД (Центральний Завод), Кіпр	табл. у бл.	5мг, 10мг, 20мг	№10x3, №10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДИРОТОН®	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл. у бл.	5мг, 10мг, 20мг	№14, №28, №56	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ІРУМЕД	Белупо, ліки та косметика, д.д., Хорватія	табл. у бл.	5мг, 10мг, 20мг	№30x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛІЗИ САНДОЗ®	Салютас Фарма ГмбХ (виробництво за повним циклом)/Лек Фармацевтична компанія д.д. (виробництво in bulk, тестування), Німеччина/Словенія	табл. у бл.	5мг, 10мг, 20мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛІЗИНОПРИЛ КРКА	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за випуск серії)/КРКА-ФАРМА д.о.о.(відповідальний за виробництво "in bulk", первинну та вторинну упаковку, контроль та випуск серії), Словенія/Хорватія	табл. у бл.	5мг, 10мг, 20мг	№14, №20, №28, №56, №60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛІЗИНОПРИЛ КРКА	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за випуск серії)/КРКА-ФАРМА д.о.о.(відповідальний за виробництво "in bulk", первинну та вторинну упаковку, контроль та випуск серії), Словенія/Хорватія	табл. у бл.	5мг	№10x3	2,12	31,12/€
	ЛІЗИНОПРИЛ КРКА	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за контроль та випуск серії; відповідальний за виробництво "in bulk", первинну та вторинну упаковку контроль серії), Словенія	табл. у бл.	10мг	№10x3	1,99	31,12/€
	ЛІЗИНОПРИЛ КРКА	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за випуск серії; відповідальний за виробництво "in bulk", первинну та вторинну упаковку контроль серії), Словенія	табл. у бл.	20мг	№10x3	2,82	30,09/€
	ЛІЗИНОПРИЛ ЛЮПІН	Люпін Лімітед, Індія	табл. у бл.	5мг, 10мг, 20мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛІЗИНОПРИЛ ЛЮПІН	Люпін Лімітед, Індія	табл. у бл.	5мг	№15x2	0,70	26,33/\$
	ЛІЗИНОПРИЛ ЛЮПІН	Люпін Лімітед, Індія	табл. у бл.	10мг	№15x2	0,57	26,33/\$
	ЛІЗИНОПРИЛ ЛЮПІН	Люпін Лімітед, Індія	табл. у бл.	20мг	№15x2	0,57	26,33/\$

ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА	Меркле ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, дозвіл на випуск серії; первинна та вторинна упаковка, контроль якості), Німеччина	табл. у бл.	5мг, 10мг, 20мг	№10х3, №10х6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина	табл. у бл.	2,5мг, 5мг, 10мг, 20мг	№10х3, №10х5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛІНОТОР®	Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія	табл. у бл.	5мг, 10мг, 20мг	№14х2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК®	Босналек д.д., Боснія і Герцеговина	табл. у бл.	5мг	№20х1	3,90	26,39/€
ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК®	Босналек д.д., Боснія і Герцеговина	табл. у бл.	10мг	№10х2	2,25	26,39/€
ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК®	Босналек д.д., Боснія і Герцеговина	табл. у бл.	20мг	№10х2	1,63	26,39/€
СКОПРИЛ®	Алкалоїд АД-Скоп'є, Республіка Македонія	табл. у бл.	10мг, 20мг	№10х2, №10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Периндоприл (Perindopril)** ^[ГПМД]

Фармакотерапевтична група: С09АА04 - інгібітори АПФ.

Основна фармакотерапевтична дія: інгібітор ферменту, який перетворює ангіотензин I в ангіотензин II; інгібування АПФ призводить до зменшення концентрації ангіотензину II у плазмі крові, що підвищує активність реніну у плазмі крові та знижує секрецію альдостерону і призводить до підвищення активності циркулюючої та місцевої калікреїн-кінінової системи (призводить до активації системи простагландинів); цей механізм дії зумовлює зниження АТ і частково відповідає за появу деяких побічних ефектів (кашлю); зменшує опір периферичних судин, що призводить до зниження АТ при всіх ступенях АГ; внаслідок цього збільшується периферичний кровотік без впливу на ЧСС; збільшується і нирковий кровотік, тоді як швидкість клубочкової фільтрації (ШКР) зазвичай не змінюється; АТ знижується швидко; максимальний антигіпертензивний ефект розвивається ч/з 4-6 год. після однократного прийому та зберігається щонайменше 24 год.; у пацієнтів, які відповіли на лікування, нормалізація АТ відбувається протягом місяця та зберігається без тахіфілаксії; зменшує гіпертрофію лівого шлуночка, покращує еластичність великих артерій та зменшує співвідношення товщини стінки до просвіту судини для малих артерій, полегшує роботу серця шляхом зменшення перед- та післянавантаження на серце.

Показання для застосування ЛЗ: АГ ^{ГПМД}; СН ^{БНФ}; запобігання виникненню повторного інсульту у пацієнтів з цереброваскулярними захворюваннями; запобігання СС ускладненням у пацієнтів з документовано підтвердженою стабільною ІХС ^{БНФ, ГПМД}; довготривале лікування зменшує ризик виникнення ІМ та СН.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл. приймати 1р/добу вранці перед їжею; АГ - рекомендована початкова доза становить 4 або 5 мг/добу ^{БНФ}; пацієнтам з високою активністю ренін-ангіотензин-альдостеронової системи рекомендується розпочинати лікування з дози 2 або 2,5 мг/добу; дозу можна підвищити до 8 мг або 10 мг 1 р/добу ч/з 1 міс.; пацієнтам з АГ, яким не можна припинити застосування діуретиків, лікування розпочинати з дози 2 мг або 2,5 мг; пацієнтам літнього віку лікування розпочинати з дози 2 або 2,5 мг ^{БНФ}, яка може бути підвищена до 4-5 мг ч/з 1 міс. лікування, а потім, у разі необхідності, до 8 або 10 мг з урахуванням ф-ції нирок ; СН - лікування рекомендовано розпочинати під ретельним медичним наглядом та з початкової дози 2-2,5 мг ^{БНФ} яку приймають вранці., ч/з 2 тижні за умови доброї переносимості дозу підвищують до 4-5 мг 1 р/день ^{БНФ}; запобігання виникненню повторного інсульту у пацієнтів з цереброваскулярними захворюваннями - початкова доза 2-2,5 мг 1 р/добу вранці, після 2 тижнів лікування дозу збільшують до 4-5 мг 1 р/добу вранці ^{БНФ}; якщо після 2 тижнів лікування 4-5 мг/добу пацієнт потребує додаткового контролю АТ, можна призначити індапамід; запобігання СС ускладненням у пацієнтів з документально підтвердженою стабільною ІХС - лікування розпочинають з 4-5 мг/добу, ч/з 2 тижні за умови доброї переносимості та з урахуванням ф-ції нирок дозу підвищують до 8 або 10 мг; пацієнтам літнього віку розпочинати з дози 2-2,5 мг 1 р/добу вранці; ч/з тиждень дозу підвищують до 4-5 мг; ч/з 2 тижні з урахуванням ф-ції нирок дозу підвищують до 8 або 10 мг ^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: еозинofilія, агранулоцитоз або панцитопенія, зниження рівня Нb та гематокриту, лейкопенія/нейтропенія, гемолітична анемія у пацієнтів з уродженою недостатністю глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, тромбоцитопенія, гіпоглікемія, гіперкаліємія, яка зникає після відміни препарату, гіпонатріємія, зміни настрою, порушення сну, запаморочення, головний біль, парестезія, вертиго, сонливість, непритомність, сплутаність свідомості, порушення зору, дзвін у вухах, пальпітація, тахікардія, стенокардія, аритмія, ІМ та інсульт може виникати внаслідок надмірного зниження АТ у пацієнтів з високим ризиком, гіпотензія, васкуліт, кашель, задишка, бронхоспазм, еозинофільна пневмонія, риніт, біль у животі, запор, діарея, спотворення смаку (дисгевзія), диспепсія, нудота, блювання, сухість у роті, панкреатит, цитолітичний або холестатичний гепатит, свербіж, шкірні висипання, кропив'янка, ангіоневротичний набряк обличчя, кінцівок, губ, слизових оболонок, язика, голосової щілини та/або гортані, р-ції фоточутливості, пемфігоїд, гіпергідроз, мультиморфна еритема, судоми м'язів, артралгія, міалгія, ниркова недостатність, ГНН, ерекційна дисфункція, астенія, біль у грудній клітці, нездужання, периферичні набряки, гіпертермія, підвищення рівня сечовини, креатиніну, білірубіну, рівня печінкових ферментів у крові; феномен Рейно; посилення с-мів псоріазу; падіння.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого іншого інгібітору АПФ; ангіоневротичний набряк в анамнезі після застосування інгібітору АПФ; ідіопатичний або спадковий ангіоневротичний набряк; одночасне призначення з препаратами, що містять діючу речовину аліскірен, пацієнтам, хворим на ЦД, або з нирковою недостатністю (швидкість клубочкової фільтрації < 60 мл/хв/1,73 м²), вагітність або період планування жінками вагітності; екстракорпоральне лікування призводить до контакту крові з негативно зарядженими поверхнями; значний двобічний стеноз ниркових артерій або стеноз артерії єдиної функціонуючої нирки; одночасне застосування з сакубітрілом/валсартаном.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 4 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АЛІТЕР	ТОВ НВФ "МІКРОХІМ" (юридична адреса та лабораторія фізико-хімічного аналізу та контролю виробництва; виробнича дільниця (всі стадії виробничого процесу)), Україна	табл. у бл.	4мг	№10х3	2,33	
	АЛІТЕР	ТОВ НВФ "МІКРОХІМ" (юридична адреса та лабораторія фізико-хімічного аналізу та контролю виробництва; виробнича дільниця (всі стадії виробничого процесу)), Україна	табл. у бл.	8мг	№10х3	1,62	
	ПЕРІНДОПРЕС®	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	8мг	№10х3	1,51	
	ПЕРІНДОПРЕС®	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	4мг	№10х3	2,27	
	ПРЕНЕЛІЯ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	4мг, 8мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	ЕРУПНІЛ	Гленмарк Фармасьютікалз Лтд., Індія	табл. у бл.	2мг, 4мг, 8мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПЕРІНДОПРИЛ КРКА	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	4мг, 8мг	№10х3, №10х9	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПЕРІНДОПРИЛ-РІХТЕР	ВАТ "Гедеон Ріхтер" (випуск серії)/ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща" (контроль якості, дозвіл на випуск серії, виробництво нерозфасованого продукту, первинна упаковка, вторинна упаковка), Угорщина/ Польща	табл. у бл.	4мг, 8мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПЕРІНДОПРИЛ-ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина	табл., вкриті пл/о у конт.	2,5мг, 5мг, 10мг	№30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПЕРИСТАР	Люпін Лімітед, Індія	табл. у бл.	4мг, 8мг	№30х1, №15х2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПРЕНЕСА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії), Словенія	табл. у бл.	2мг, 4мг, 8мг	№30, №60, №90	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПРЕНЕСА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії), Словенія	табл. у бл.	4мг	№10х9	2,24	30,27/€
	ПРЕНЕСА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії), Словенія	табл. у бл.	4мг	№10х3	2,88	30,27/€
	ПРЕНЕСА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії), Словенія	табл. у бл.	8мг	№10х9	1,58	30,27/€
	ПРЕНЕСА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії), Словенія	табл. у бл.	8мг	№10х3	2,17	27,55/€
ПРЕНЕСА® ОРО ТАБ	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та	табл., що дисперг. у	4мг, 8мг	№28, №30, №50, №56,	відсутня у реєстрі ОВЦ		

		вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	бл.		№60, №84, №90, №100	
ПРЕСТАРИУМ® 10 мг	Лабораторії Серв'є Індастрі/Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд, Франція/Ірландія		табл., вкриті п/о у конт.	10мг	№14, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ
ПРЕСТАРИУМ® 2,5 мг	Лабораторії Серв'є Індастрі/Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд, Франція/Ірландія		табл., вкриті п/о у конт.	2,5мг	№14, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ
ПРЕСТАРИУМ® 5 мг	Лабораторії Серв'є Індастрі/Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд, Франція/Ірландія		табл., вкриті п/о у конт.	5мг	№14, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ
ПРОМЕПРИЛ®	ПРО.МЕД.ЦС Прага а.с. (всі стадії виробництва, контроль якості та випуск серії)/ХБМ Фарма с.р.о. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості), Чеська Республіка/ Словацька Республіка		табл. у бл.	4мг, 8мг	№30, №60, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ
ХІТЕН	Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія		табл. у бл.	4мг, 8мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ

• **Раміприл (Ramipril)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: С09АА05 - інгібітори АПФ. Інгібітори АПФ монокомпонентні.

Основна фармакотерапевтична дія: раміприлат, активний метаболіт раміприлу, є інгібітором АПФ; у плазмі крові та тканинах цей фермент каталізує перетворення ангіотензину I на ангіотензин II та розщеплення активного вазодилататора брадикініну; зменшення утворення ангіотензину II і пригнічення розщеплення брадикініну призводять до розширення судин; раміприлат спричиняє зменшення секреції альдостерону; прийом раміприлу призводить до значного зниження периферичного артеріального опору; як правило, значних змін ниркового плазматому або швидкості клубочкової фільтрації не відбувається. При АГ призводить до зниження АТ як в горизонтальному, так і у вертикальному положенні хворого, що не супроводжується компенсаторним підвищенням ЧСС; антигіпертензивний ефект настає ч/з 1-2 год після перорального прийому разової дози препарату; максимальний ефект після перорального прийому разової дози ч/з 3-6 год. і зберігається протягом 24 год.; при тривалому лікуванні максимальний антигіпертензивний ефект розвивається ч/з 3-4 тижні., антигіпертензивний ефект зберігається протягом 2 років; виявляє сприятливий вплив на серцеву гемодинаміку (зниження тиску наповнення лівого і правого шлуночків, загального периферичного судинного опору, підвищення серцевого викиду і покращення серцевого індексу), зменшує нейроендокринну активацію; зменшує частоту виникнення ІМ, серцево-судинної смерті та інсульту як окремо, так і у комбінації.

Показання для застосування ЛЗ: АГ^{БНФ, ПМД}; лікування СН^{БНФ}, яка супроводжується клінічними проявами; профілактика СС захворювань: зниження СС захворюваності та смертності у пацієнтів з вираженим СС захворюванням атеротромботичного генезу (наявність в анамнезі ІХС або інсульту чи захворювання периферичних судин); діабетом, які мають щонайменше один фактор СС ризику; лікування захворювання нирок^{БНФ}: початкова клубочкова діабетична нефропатія, про яку свідчить наявність мікроальбумінурії; виражена клубочкова діабетична нефропатія, про яку свідчить наявність макропротеїнурії, у пацієнтів, які мають щонайменше один фактор СС ризику; виражена клубочкова недіабетична нефропатія, про яку свідчить наявність макропротеїнурії ≥ 3 г/на добу. **Вторинна профілактика після перенесеного г. ІМ^{БНФ}:** зменшення смертності під час г. стадії ІМ у пацієнтів з клінічними ознаками СН за умови початку лікування більш ніж ч/з 48 год. після виникнення г. ІМ.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: АГ^{БНФ}: дозу підбирати індивідуально (залежно від особливостей стану пацієнта) та результатів контрольних вимірювань АТ, можна застосовувати у вигляді монотерапії або у комбінації з іншими класами антигіпертензивних ЛЗ; лікування розпочинати поступово, рекомендована початкова доза 2,5 мг/добу, у пацієнтів зі значною активацією ренін-ангіотензин-альдостеронової системи після прийому початкової дози може виникати значне зниження АТ, для таких пацієнтів рекомендована початкова доза 1,25 мг, а їх лікування потрібно розпочинати під медичним наглядом; дозу можна подвоювати кожні 2-4 тижні до досягнення цільового рівня АТ, МДД-10 мг^{БНФ}, приймають 1 р/добу; профілактика СС захворювань: рекомендована початкова доза 2,5 мг 1 р/добу, залежно від переносимості дозу поступово збільшувати, подвоїти дозу через 1-2 тижні лікування, а потім - ще через 2-3 тижні - збільшити її до цільової підтримуючої дози 10 мг 1 р/добу^{БНФ}; лікування захворювання нирок (нефропатія)^{БНФ}: у пацієнтів з діабетом та мікроальбумінурією- рекомендована початкова доза 1,25 мг 1 р/добу, залежно від переносимості, при подальшому лікуванні дозу збільшують, ч/з 2 тижні лікування разову добу дозу подвоїти до 2,5 мг, а потім до 5 мг ще ч/з 2 тижні лікування^{БНФ}; у пацієнтів з діабетом та щонайменше одним фактором СС ризику: рекомендована початкова доза 2,5 мг 1 р/добу, залежно від індивідуальної переносимості при подальшому лікуванні дозу збільшують; ч/з 1-2 тижні лікування добу дозу подвоїти до 5 мг, а потім до 10 мг ще ч/з 2-3 тижні лікування; у пацієнтів з недіабетичною нефропатією рекомендована початкова доза 1,25 мг 1 р/добу, залежно від переносимості, при подальшому лікуванні дозу збільшують, ч/з 2 тижні лікування разову добу дозу подвоїти до 2,5 мг, а потім до 5 мг ще ч/з 2 тижні лікування^{БНФ}; СН^{БНФ} із клінічними проявами: для пацієнтів, стан яких стабілізувався після лікування діуретиками, рекомендована початкова доза 1,25 мг/добу, дозу титрують шляхом її подвоєння ч/з кожні 1-2 тижні до досягнення МДД 10 мг^{БНФ}, бажано розподілити дозу на 2 прийоми; **вторинна профілактика після перенесеного г. ІМ** при наявності СН: ч/з 48 год після виникнення ІМ пацієнтам, стан яких є клінічно та гемодинамічно стабільним, початкова доза 2,5 мг 2 р/добу впродовж 3 днів, якщо початкова доза 2,5 мг переноситься погано, тоді застосовувати дозу 1,25 мг 2 р/добу впродовж 2 днів з подальшим підвищенням до 2,5 мг та 5 мг 2 р/добу, якщо дозу не можна підвищити до 2,5 мг 2 р/добу, лікування відмінити; у подальшому добу дозу підвищують шляхом

її подвоєння з інтервалом у 1-3 дні до досягнення цільової підтримуючої дози 5 мг 2 р/добу, коли це можливо, підтримуючу добову дозу розподіляють на 2 прийоми; якщо дозу не можна підвищити до 2,5 мг 2 р/добу, лікування відмінити ^{БНФ}; якщо прийнято рішення про лікування пацієнтів із тяжкою (IV ФК за класифікацією NYHA) СН одразу після ІМ цим ЛЗ, розпочинати терапію з дози 1,25 мг 1 р/добу і будь-яке її збільшення проводити з надзвичайною обережністю.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: постійний кашель, р-ції, спричинені артеріальною гіпотензією, синкопе; гіперкаліємія, головний біль, запаморочення; непродуктивний подразнювальний кашель, бронхіт, синусит, задишка, пірексія; запальні явища у ШКТ, розлади травлення, дискомфорт у животі, диспепсія, діарея, нудота, блювання; висипання, зокрема макулопапульозні; м'язові спазми, міалгія; підвищення рівня калію у крові; артеріальна гіпотензія, ортостатичне зниження АТ, синкопе; біль у грудях, втомлюваність; ішемія міокарда, включаючи стенокардію або ІМ; тахікардія; аритмія; серцебиття; периферичні набряки; еозинфілія; вертиго, парестезія, агевзія, дисгевзія; порушення зору; бронхоспазм, у т.ч. загострення БА; закладеність носа; панкреатит, підвищення рівня ферментів підшлункової залози, ангіоневротичний набряк тонкого кишечника, гастрит, запор, сухість у роті; порушення ф-ції нирок, включаючи ГНН; збільшення сечоутворення, погіршення перебігу фонові протеїнурії, підвищення рівня сечовини та креатиніну у крові; ангіоневротичний набряк; у дуже виняткових випадках - обструкція дихальних шляхів; свербіж, гіпергідроз; артралгія; анорексія, зниження апетиту; відчуття припливів; пірексія; підвищення рівня печінкових ферментів і/або кон'югованого білірубіну; транзиторна еректильна імпотенція, зниження лібідо; зниження настрою, тривожність, нервовість, неспокій, порушення сну, включаючи сонливість; нейтропенія або агранулоцитоз, зменшення кількості еритроцитів, тромбоцитів, зниження рівня гемоглобіну; тремор, порушення рівноваги; кон'юнктивіт; порушення слуху, шум/дзвін у вухах; глосит; ексфолювативний дерматит, кропив'янка, оніхолізіс; стеноз судин, гіперперфузія, васкуліт; астения; холестатична жовтяниця, ураження печінкових клітин; сплутана свідомість; р-ція фоточутливості; недостатність кісткового мозку, панцитопенія, гемолітична анемія; церебральна ішемія, у т.ч. ішемічний інсульт і транзиторна ішемічна атака; порушення психомоторних функцій; відчуття печіння; паросмія; афтозний стоматит; токсичний епідермальний некроліз, с-ром Стівенса – Джонсона, мультиформна еритема, пемфігус, загострення перебігу псоріазу, псоріатичний дерматит, пемфігоїдна або ліхеноїдна екзантема або енантема, алопеція; с-ром неналежної секреції антидіуретичного гормону; зниження рівня натрію у крові; феномен Рейно; анафілактичні та анафілактоїдні р-ції, підвищення рівня антинуклеарних антитіл; г. печінкова недостатність, холестатичний або цитолітичний гепатит; гінекомастія; порушення уваги.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин, що входять до складу препарату, чи до інших інгібіторів АПФ; наявність в анамнезі ангіоневротичного набряку (спадкового, ідіопатичного або раніше перенесеного на тлі застосування інгібіторів АПФ або антагоністів рецепторів ангіотензину II); значний двосторонній стеноз ниркових артерій або стеноз ниркової артерії при наявності єдиної функціонуючої нирки; вагітні або жінки, які планують завагітніти; не слід застосовувати пацієнтам з артеріальною гіпотензією або гемодинамічно нестабільними станами; не слід застосовувати разом з препаратами, що містять аліскірен, пацієнтам з ЦД або помірною чи тяжкою нирковою недостатністю (ШКФ < 60 мл/хв); необхідно уникати одночасного застосування інгібіторів АПФ та екстракорпоральних методів лікування, які призводять до контакту крові з негативно зарядженими поверхнями; одночасне застосування інгібіторів АПФ з сакубітрілом/валсартаном.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 2,5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	РАМІЗЕС	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	2,5мг, 5мг, 10мг	№10х1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РАМІЗЕС	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	2,5мг	№10х3	2,67	
	РАМІЗЕС	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	5мг	№10х3	1,67	
	РАМІЗЕС	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	10мг	№10х3	1,29	
II.	АМПРИЛ®	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії), Словенія	табл. у бл.	1,25мг, 2,5мг, 5мг, 10мг	№10, №14, №28, №56, №60, №84, №90, №98	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМПРИЛ®	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії), Словенія	табл. у бл.	1,25мг	№10х3	6,21	30,27/€
	АМПРИЛ®	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії), Словенія	табл. у бл.	2,5мг	№10х3	4,68	30,27/€
	АМПРИЛ®	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in	табл. у бл.	5мг	№10х3	2,84	30,27/€

	bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії), Словенія					
АМПРИЛ®	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії), Словенія	табл. у бл.	10мг	№10x3	2,04	30,27/€
АНГІРАМ	Ауробіндо Фарма Лімітед - Юніт III/Ауробіндо Фарма Лтд, Формулейшн Юніт XV, Індія/Індія	табл. у бл.	2,5мг, 5мг, 10мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
БРЮМІПРИЛ	БРЮФАРМЕКСПОРТ с.п.р.л. (відповідальний за випуск серії)/ФАРМАЛАБОР-Продутос Фармасьютікос, С.А. (виробництво), Бельгія/Португалія	капс. у бл.	2,5мг, 5мг, 10мг	№7x8	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КАРДИПРИЛ 10	Фламінго Фармасьютікалс Лтд./Артура Фармасьютікалс Пвт. Лтд., Індія/Індія	капс. у бл.	10мг	№10x3	1,17	28,14/\$
КАРДИПРИЛ 2,5	Фламінго Фармасьютікалс Лтд./Артура Фармасьютікалс Пвт. Лтд., Індія/Індія	капс. у бл.	2,5мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КАРДИПРИЛ 2,5	Фламінго Фармасьютікалс Лтд./Артура Фармасьютікалс Пвт. Лтд., Індія/Індія	капс. у бл.	2,5мг	№10x3	6,00	28,14/\$
КАРДИПРИЛ 5	Фламінго Фармасьютікалс Лтд./Артура Фармасьютікалс Пвт. Лтд., Індія/Індія	капс. у бл.	5мг	№10x3	1,83	28,14/\$
ЛАЦЕРАН	Сан Фармасьютікал Індастріз Лімітед, Індія	табл. у бл.	2,5мг, 5мг, 10мг	№14, №28	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПОЛАПРИЛ	Фармацевтичний завод "Польфарма" С.А., Польща	капс. тверді у бл.	2,5мг, 5мг, 10мг	№14x1, №14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПОЛАПРИЛ	Фармацевтичний завод "Польфарма" С.А., Польща	капс. тверді у бл.	5мг	№14x2	2,01	25,02/\$
ПОЛАПРИЛ	Фармацевтичний завод "Польфарма" С.А., Польща	капс. тверді у бл.	10мг	№14x2	1,41	25,02/\$
РАМАГ	Актавіс Лтд (повний цикл виробництва)/Балканфарма - Дупниця АД (повний цикл виробництва), Мальта/Болгарія	табл. у бл.	5мг, 10мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РАМІ САНДОЗ®	Лек С. А. (виробництво за повним циклом; пакування, випуск серії), Польща	табл. у бл.	2,5мг, 5мг, 10мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РАМІМЕД	Актавіс ЛТД (виробництво за повним циклом)/Медокемі ЛТД (Центральний Завод) (виробництво нерозфасованого продукту, контроль якості, дозвіл на випуск серії) /Медокемі ЛТД (Завод AZ) (первинне та вторинне пакування), Мальта/Кіпр/Кіпр	табл. у бл.	2,5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РАМІМЕД	Актавіс ЛТД (виробництво за повним циклом)/Медокемі ЛТД (Центральний Завод) (виробництво нерозфасованого продукту, контроль якості, дозвіл на випуск серії) /Медокемі ЛТД (Завод AZ) (первинне та вторинне пакування), Мальта/Кіпр/Кіпр	табл. у бл.	5мг	№10x3	1,71	30,26/€
РАМІМЕД	Актавіс ЛТД (виробництво за повним циклом)/Медокемі ЛТД (Центральний Завод) (виробництво нерозфасованого продукту, контроль	табл. у бл.	10мг	№10x3	1,24	30,26/€

	якості, дозвіл на випуск серії) /Медокемі ЛТД (Завод AZ) (первинне та вторинне пакування), Мальта/Кіпр/Кіпр						
РАМІПРИЛ АЙКОР®	Актавіс Лтд, Мальта	табл. у бл.	5мг, 10мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ		
РАМІПРИЛ-ТЕВА	Меркле ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, дозвіл на випуск серії; первинна та вторинна упаковка, контроль якості, Німеччина	табл. у бл.	2,5мг, 5мг, 10мг	№10x3, №10x6	відсутня у реєстрі ОВЦ		
РАМКОР - 2,5	Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія	капс. у бл.	2,5мг	№14x2	3,57	25,89/\$	
РАМКОР - 5	Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія	капс. у бл.	5мг	№14x2	2,32	25,89/\$	
РАМКОР-10	Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія	капс. у бл.	10мг	№14x2	1,34	25,89/\$	
ТОПРИЛ	ТОРРЕНТ ФАРМАСЬЮТІКАЛС ЛТД., Індія	капс. у бл.	2,5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ТОПРИЛ	ТОРРЕНТ ФАРМАСЬЮТІКАЛС ЛТД., Індія	капс. у бл.	5мг	№10x3	2,28	22,75/\$	
ТРИТАЦЕ®	САНОФІ С.П.А, Італія	табл. у бл.	5мг, 10мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ХАРТИЛ®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС (відповідальний за повний цикл виробництва, включаючи випуск серії)/Актавіс ЛТД (відповідальний за повний цикл виробництва, включаючи випуск серії), Угорщина/Мальта	табл. у бл.	2,5мг, 5мг, 10мг	№7x2, №7x4	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ХАРТИЛ®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС (відповідальний за повний цикл виробництва, включаючи випуск серії)/Актавіс ЛТД (відповідальний за повний цикл виробництва, включаючи випуск серії), Угорщина/Мальта	табл. у бл.	5мг	№7x4	2,32	27,69/\$	
ХАРТИЛ®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС (відповідальний за повний цикл виробництва, включаючи випуск серії)/Актавіс ЛТД (відповідальний за повний цикл виробництва, включаючи випуск серії), Угорщина/Мальта	табл. у бл.	10мг	№7x4	1,83	27,69/\$	

Комбіновані препарати

- **Еналаприл + гідрохлортіазид (Enalapril + hydrochlorothiazide)** ^[ПМД]

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕНАЛАПРИЛ Н-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (виробництво з продукції in bulk виробника ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна), Україна	табл. у бл.	10мг/25мг	№20x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕНАЛАПРИЛ-НЛ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	10мг/12,5мг	№30x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕНАЛАПРИЛ-НЛ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	10мг/12,5мг	№20x1	66,30	
	ЕНАЛАПРИЛ-Н-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	10мг/25мг	№30x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕНАЛАПРИЛ-Н-	Товариство з обмеженою	табл. у бл.	10мг/25мг	№20x1	85,84	

	ЗДОРОВ'Я	відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна						
	ЕНАЛОЗИД® 12,5	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	10мг/12,5мг	№10x2	48,00		
	ЕНАЛОЗИД® 12,5	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	10мг/12,5мг	№10x3	60,00		
	ЕНАЛОЗИД® 25	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	10мг/25мг	№10x2	55,00		
	ЕНАЛОЗИД® 25	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	10мг/25мг	№10x3	65,00		
	ЕНАЛОЗИД® ФОРТЕ	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	20мг/12,5мг	№10x3	37,00		
	ЕНАЛОЗИД® ФОРТЕ	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	20мг/12,5мг	№10x2	55,00		
II.	БЕРЛІПРИЛ® ПЛЮС 10/25	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", контроль серій, кінцеве пакування, контроль та випуск серії), Німеччина	табл. у бл.	10мг/25мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ		
	БЕРЛІПРИЛ® ПЛЮС 10/25	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", контроль серій, кінцеве пакування, контроль та випуск серії), Німеччина	табл. у бл.	10мг/25мг	№10x3	74,69	33,19/€	
	ЕНАЛАПРИЛ 10/ ГІДРОХЛОРОТІА ЗИД 12,5 КРКА	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	10мг/12,5мг	№10x2, №10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ		
	ЕНАЛАПРИЛ 10/ ГІДРОХЛОРОТІА ЗИД 25 КРКА	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	10мг/25мг	№10x2, №10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ		
	ЕНАЛАПРИЛ 20/ ГІДРОХЛОРОТІА ЗИД 12,5 КРКА	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	20мг/12,5мг	№10x2, №10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ		
	ЕНАЛАПРИЛ Н- ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина	табл. у бл.	10мг/25мг	№20, №30, №50, №60, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ		
	ЕНАП® - НЛ	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/НЛЗОХ (Національні лабораторія за здоров'є, околє ін храно) (контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю)), Словенія/Словенія	табл. у бл.	10мг/12,5мг	№10x9	відсутня у реєстрі ОБЦ		
	ЕНАП® - НЛ	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/НЛЗОХ (Національні лабораторія за здоров'є, околє ін храно) (контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю)), Словенія/Словенія	табл. у бл.	10мг/12,5мг	№10x6	165,43	35,35/€	
	ЕНАП® - НЛ	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/НЛЗОХ (Національні лабораторія за здоров'є, околє ін храно) (контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю)), Словенія/Словенія	табл. у бл.	10мг/12,5мг	№10x2	63,98	35,35/€	
	ЕНАП® 20 НЛ	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	20мг/12,5мг	№10x3, №10x6, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ		
	ЕНАП® 20 НЛ	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	20мг/12,5мг	№10x2	92,01	30,27/€	
		ЕНАП®-Н	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне	табл. у бл.	10мг/25мг	№10x9	відсутня у реєстрі ОБЦ	

		та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/НЛЗОХ (Національні лабораторія за здоров'я, окремі ін харно) (контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю)), Словенія/Словенія					
ЕНАП®-Н	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/НЛЗОХ (Національні лабораторія за здоров'я, окремі ін харно) (контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю)), Словенія/Словенія	табл. у бл.	10мг/25мг	№10x6	169,68	35,35/€	
ЕНАП®-Н	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/НЛЗОХ (Національні лабораторія за здоров'я, окремі ін харно) (контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю)), Словенія/Словенія	табл. у бл.	10мг/25мг	№10x2	65,75	35,35/€	
ЕНАПРІЛ-Н	Дженом Біотек Pvt. Лтд., Індія	табл. у стрип.	5мг/12,5мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ		
КО-РЕНІТЕК®	Мерк Шарп і Доум Б.В. (первинна та вторинна упаковка, контроль якості, дозвіл на випуск серії)/Мерк Шарп і Доум Лімітед (виробник нерозфасованої продукції, тестування), Нідерланди/Велика Британія	табл. у бл.	20мг/12,5мг	№14x2	99,14	25,48/\$	

• **Еналаприл + Індапамід (Enalapril + Indapamide)** ^[ПМД]

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕНЗИКС®	"Хемофарм" АД, Сербія	комбі-уп.: табл.+табл., вкриті п/о у бл.	10мг/2,5мг	№(5+5)х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕНЗИКС® ДУО	"Хемофарм" АД, Сербія	комбі-уп.: табл.+табл., вкриті п/о у бл.	10мг/2,5мг	№(10+5)х3	47,28	28,83/€
	ЕНЗИКС® ДУО ФОРТЕ	"Хемофарм" АД, Сербія	комбі-уп.: табл. табл., вкриті п/о у бл.	20мг/2,5мг	№(10+5)х3	59,96	28,83/€

• **Еналаприл + Нітрендіпін (Enalapril + Nitrendipine)** ^[ПМД]

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕНЕАС	Феррер Інтернаціональ, С.А., Іспанія	табл. у бл.	10мг/20мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Каптоприл + гідрохлортіазид (Captopril + hydrochlorothiazide)** ^[ПМД]

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КАПОТІАЗИД®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	50мг/12,5мг	№10x2	41,73	
	КАПТОПРЕС 12,5 - ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	50мг/12,5мг	№10x2	43,51	
	КАПТОПРЕС-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	50мг/25мг	№10x2	47,25	
	НОРМОПРЕС	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	50мг/25мг	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НОРМОПРЕС	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл. в пач.	50мг/25мг	№10x2	17,34	

• **Лізиноприл + гідрохлортіазид (Lisinopril + hydrochlorothiazide)** ^[ПМД]

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЛІЗИНОПРИЛ-Н	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	10мг/12,5мг , 20мг/12,5мг	№10, №20, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛІЗОПРЕС 10	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	10мг/12,5мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛІЗОПРЕС 10	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	10мг/12,5мг	№10x3	52,25	
	ЛІЗОПРЕС 20	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	20мг/12,5мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛІЗОПРЕС 20	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	20мг/12,5мг	№10x3	71,50	
	ЛІПРАЗІД 10	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (виробництво за повним циклом)/Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОФАРМ" (виробництво, пакування, випуск серій)/Товариство з обмеженою відповідал, Україна/ Україна/Україна	табл. у конт.	10мг/12,5мг	№60, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛІПРАЗІД 10	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (виробництво за повним циклом)/Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОФАРМ" (виробництво, пакування, випуск серій)/Товариство з обмеженою відповідал, Україна/ Україна/Україна	табл. у бл.	10мг/12,5мг	№10x3	62,30	
	ЛІПРАЗІД 20	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (виробництво за повним циклом)/Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОФАРМ" (виробництво, пакування, випуск	табл. у конт.	20мг/12,5мг	№60, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	

		серій)/Товариство з обмеженою відповідаль, Україна/ Україна/Україна					
	ЛІПРАЗІД 20	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (виробництво за повним циклом)/Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОФАРМ" (виробництво, пакування, випуск серій)/Товариство з обмеженою відповідаль, Україна/ Україна/Україна	табл. у бл.	20мг/12,5мг	№10x3	82,20	
	СТАТОРЕМ®-Н	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. у бл.	20мг/12,5мг	№14x2, №14x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	ІРУЗІД	Белупо, ліки та косметика, д.д., Хорватія	табл. у бл.	20мг/12,5мг , 20мг/25мг	№30x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КО-ДИРОТОН®	ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща" (контроль якості та випуск серії; виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка, вторинна упаковка)/ВАТ "Гедеон Ріхтер" (випуску серії), Польща/Угорщина	табл. у бл.	10мг/12,5мг , 20мг/12,5мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛІЗИНОПРИЛ 10 НЛ КРКА	КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за контроль та випуск серії; виробник, відповідальний за виробництво "in bulk", первинну та вторинну упаковку), Словенія	табл. у бл.	10мг/12,5мг	№14, №20, №28, №56, №60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛІЗИНОПРИЛ 10 НЛ КРКА	КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за контроль та випуск серії; виробник, відповідальний за виробництво "in bulk", первинну та вторинну упаковку), Словенія	табл. у бл.	10мг/12,5мг	№10x3	96,53	32,18/€
	ЛІЗИНОПРИЛ 20 НЛ КРКА	КРКА-ФАРМА д.о.о. (виробник, відповідальний за контроль та випуск серії; виробник, відповідальний за виробництво "in bulk", первинну та вторинну упаковку), Хорватія	табл. у бл.	20мг/12,5мг	№14, №20, №28, №56, №60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛІЗИНОПРИЛ 20 НЛ КРКА	КРКА-ФАРМА д.о.о. (виробник, відповідальний за контроль та випуск серії; виробник, відповідальний за виробництво "in bulk", первинну та вторинну упаковку), Хорватія	табл. у бл.	20мг/12,5мг	№10x3	122,28	32,18/€
	ЛІЗОРЕТИК™ – 10	Іпка Лабораторізі Лімітед, Індія	табл. у бл.	10мг/12,5мг	№14x2	129,95	25,90/\$
	ЛІЗОРЕТИК™ – 20	Іпка Лабораторізі Лімітед, Індія	табл. у бл.	20мг/12,5мг	№14x2	207,92	25,90/\$
	ЛІЗОТІАЗИД-ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина	табл. у бл.	10мг/12,5мг , 20мг/12,5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК® Н 10	Босналек д.д., Боснія і Герцеговина	табл. у бл.	10мг/12,5мг	№10x2	55,00	26,39/€
	ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК® Н 20	Босналек д.д., Боснія і Герцеговина	табл. у бл.	20мг/12,5мг	№10x2	77,00	26,39/€
	СКОПРИЛ ПЛЮС®	АЛКАЛОЇД АД Скоп'є, Республіка Македонія	табл. у бл.	20мг/12,5мг	№10x3	79,40	24,81/€

● **Раміприл + гідрохлортіазид (Ramipril + hydrochlorothiazide)**^(ПМД)

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	РАМІЗЕС® КОМ	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	2,5мг/12,5мг, 5мг/12,5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РАМІЗЕС® КОМ	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	5мг/25мг	№10x3	85,00	
	РАМІЗЕС® КОМ	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	10мг/25мг	№10x3	120,00	
	РАМІЗЕС® КОМ	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	10мг/12,5мг	№10x3	160,00	
II.	АМПРИЛ® HD	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	5мг/25мг	№60, №90, №14, №28, №56, №84, №98	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМПРИЛ® HD	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	5мг/25мг	№10x3	201,88	30,27/€
	АМПРИЛ® HL	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	2,5мг/12,5мг	№60, №90, №14, №28, №56, №84, №98	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМПРИЛ® HL	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	2,5мг/12,5мг	№10x3	132,57	30,27/€
	ЛАЦЕРАН НСТ	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	табл. у бл.	2,5мг/12,5мг, 5мг/25мг	№7, №10, №21	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РАМАГ Н	Актавіс Лтд, Мальта	табл. у бл.	2,5мг/12,5мг, 5мг/25мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РАМАЗІД Н	Актавіс ЛТД, Мальта	табл. у бл.	2,5мг/12,5мг, 5мг/12,5мг, 5мг/25мг	№10x3, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РАМІ САНДОЗ® КОМПОЗИТУМ	Салютас Фарма ГмбХ (Виробництво за повним циклом)/Лек С. А. (виробництво нерозфасованого продукту, дозвіл на випуск серії; первинна та вторинна упаковка), Німеччина/Польща	табл. у бл.	5мг/25мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РАМІМЕД КОМБІ	Актавіс ЛТД (виробництво за повним циклом)/Медокемі ЛТД (Центральний Завод) (виробництво нерозфасованого продукту, контроль якості, дозвіл на випуск серії)/Медокемі ЛТД (Завод AZ) (первинне та вторинне пакування), Мальта/Кіпр/Кіпр	табл. у бл.	2,5мг/12,5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РАМІМЕД КОМБІ	Актавіс ЛТД (виробництво за повним циклом)/Медокемі ЛТД (Центральний Завод) (виробництво нерозфасованого продукту, контроль якості, дозвіл на випуск серії)/Медокемі ЛТД (Завод AZ) (первинне та вторинне пакування), Мальта/Кіпр/Кіпр	табл. у бл.	5мг/25мг	№10x3	136,15	30,26/€
	ТРИТАЦЕ ПЛЮС® 10 мг/12,5 мг	САНОФІ С.П.А., Італія	табл. у бл.	10мг/12,5мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТРИТАЦЕ	САНОФІ С.П.А., Італія	табл. у бл.	5мг/12,5мг	№14x2	відсутня у	

ПЛЮС® 5 МГ/12,5 МГ						реєстрі ОБЦ	
ХАРТИЛ®-Н	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС (відповідальні за повний цикл виробництва)/Альфамед Фарбіл Арцнайміттель ГмбХ (відповідальні за повний цикл виробництва), Угорщина/Німеччина	табл. у бл.	2,5мг/12,5мг	№14x2	153,23	28,12/\$	
ХАРТИЛ®-Н	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС (відповідальні за повний цикл виробництва)/Альфамед Фарбіл Арцнайміттель ГмбХ (відповідальні за повний цикл виробництва), Угорщина/Німеччина	табл. у бл.	5мг/25мг	№14x2	197,38	28,12/\$	

- **Периндоприл + Індапамід (Perindopril + Indapamide)** ^[ПМД] (див. п. 31.1.3.8. розділу "Формуляр первинної медичної допомоги")

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ІН-АЛІТЕР	ТОВАРИСТВО З ОМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МІКРОХІМ" (юридична адреса та лабораторія фізико-хімічного аналізу та контролю виробництва; зберігання готової продукції, матеріалів; виробнича дільниця (всі стадії виробничого процесу); Україна	табл. у бл.	2мг/0,625мг	№10x3	95,00	
	ІН-АЛІТЕР	ТОВАРИСТВО З ОМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МІКРОХІМ" (юридична адреса та лабораторія фізико-хімічного аналізу та контролю виробництва; зберігання готової продукції, матеріалів; виробнича дільниця (всі стадії виробничого процесу); Україна	табл. у бл.	4мг/1,25мг	№10x3	117,00	
	ІН-АЛІТЕР	ТОВАРИСТВО З ОМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МІКРОХІМ" (юридична адреса та лабораторія фізико-хімічного аналізу та контролю виробництва; зберігання готової продукції, матеріалів; виробнича дільниця (всі стадії виробничого процесу); Україна	табл. у бл.	8мг/2,5мг	№10x3	121,00	
	КО-ПРЕНЕЛІЯ®	ПАТ "Київмедпрепарат" (виробництво з продукції in bulk фірми-виробника Атлантік Фарма - Продусьйос Фармасьютікас, С.А., Португалія), Україна	табл. у бл.	4мг/1,25мг, 8мг/2,5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	ЕРУПНІЛ ПЛЮС	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія	табл. у бл.	2мг/0,625мг, 4мг/1,25мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КО-ПРЕНЕСА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	табл. у бл.	2мг/0,625мг, 4мг/1,25мг, 8мг/2,5мг	№60, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КО-ПРЕНЕСА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	табл. у бл.	2мг/0,625мг	№30	117,60	35,21/€

КО-ПРЕНЕСА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	табл. у бл.	4мг/1,25мг	№30	159,50	35,21/€
КО-ПРЕНЕСА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	табл. у бл.	4мг/1,25мг	№90	340,50	30,27/€
КО-ПРЕНЕСА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	табл. у бл.	8мг/2,5мг	№30	136,12	30,27/€
КО-ПРЕНЕСА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	табл. у бл.	8мг/2,5мг	№90	353,50	30,27/€
НОЛІПРЕЛ® 2,0 мг/0,625 мг	Лабораторії Серв'є Індастрі (виробництво, контроль якості, пакування та випуск серії)/Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд (виробництво, контроль якості, пакування та випуск серії), Франція/Ірландія	табл. у бл.	2мг/0,625мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НОЛІПРЕЛ® АРГІНІН	Лабораторії Серв'є Індастрі/Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд, Франція/Ірландія	табл., вкриті п/о у конт.	2,5мг/0,625мг	№14, №30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НОЛІПРЕЛ® АРГІНІН ФОРТЕ	Лабораторії Серв'є Індастрі/Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд, Франція/Ірландія	табл., вкриті п/о у конт.	5мг/1,25мг	№14, №30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НОЛІПРЕЛ® БІ-ФОРТЕ	Лабораторії Серв'є Індастрі/Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд, Франція/Ірландія	табл., вкриті п/о у конт.	10мг/2,5мг	№30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПЕРИНДОПРИЛ 2/ ІНДАПАМІД 0,625 КРКА	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинну та вторинну упаковку, контроль та випуск серії), Словенія	табл. у бл.	2мг/0,625мг	№30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПЕРИНДОПРИЛ 4/ ІНДАПАМІД 1,25 КРКА	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	табл. у бл.	4мг/1,25мг	№30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПЕРИНДОПРИЛ 8/ ІНДАПАМІД 2,5 КРКА	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	табл. у бл.	8мг/2,5мг	№30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПЕРИНДОПРИЛ /ІНДАПАМІД ФОРТЕ-ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина	табл., вкриті п/о у конт.	5мг/1,25мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПЕРИНДОПРИЛ /ІНДАПАМІД-ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина	табл., вкриті п/о у конт.	2,5мг/0,625мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПРЕСТАРІУМ® АРГІНІН КОМБІ	Лабораторії Серв'є Індастрі/Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд, Франція/Ірландія	табл., вкриті п/о у конт.	5мг/1,25мг	№14, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПРИЛАМІД	Лек фармацевтична компанія д.д. (виробництво "in bulk", пакування, контроль та випуск серії), Словенія	табл. у бл.	4мг/1,25мг	№20, №30, №60	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Периндоприл + амлодипін (Perindopril + amlodipine)** ^[ГМД] (див. п. 2.3.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Трандолаприл + Верапаміл (Trandolapril + Verapamil)** ^[ГМД]

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ТАРКА®	Аббві Дойчланд ГмбХ і Ко. КГ,	табл. з м/в,	2мг/180мг,	№14x2	відсутня у	

	Німеччина	вкриті п/о у бл.	4мг/240мг	реєстрі ОВЦ
--	-----------	------------------	-----------	-------------

- **Лізиноприл + амлодипін (Lisinopril + amlodipine)** ^[ПМД] (див. п. 2.3.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

2.5. Блокатори рецепторів ангіотензину II

2.5.1. Похідні біфенілтетразолу

- **Кандесартан (Candesartan)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: C09CA06 - антагоністи рецепторів ангіотензину II.

Основна фармакотерапевтична дія: є антагоністом рецепторів ангіотензину (АРА) II, селективним щодо рецепторів АТ₁, з міцним зв'язуванням і повільним від'єднанням від рецептора; антигіпертензивна дія відбувається за рахунок зменшення системного периферичного опору без рефлексорного підвищення ЧСС; посилює нирковий кровотік і не впливає або підвищує швидкість клубочкової фільтрації за рахунок зменшення ниркового судинного опору і фракції фільтрації; знижує летальність і кількість госпіталізацій з приводу СН, полегшує симптоми у пацієнтів із систолічною дисфункцією лівого шлуночка; у пацієнтів з ХСН і зниженою систолічною ф-цією лівого шлуночка (фракція викиду лівого шлуночка, ФВЛШ ≤40) знижує системний судинний опір і тиск заклинювання легеневих капілярів, підвищує активність реніну у плазмі крові і концентрацію ангіотензину II, а також знижує рівні альдостерону; після застосування разової дози початок антигіпертензивного ефекту спостерігається протягом 2 год.; при тривалому лікуванні основне зменшення АТ при застосуванні будь-якої дози зазвичай досягається протягом 4 тижнів і зберігається впродовж довгострокового лікування.

Показання для застосування ЛЗ: есенціальна гіпертензія ^{БНФ, ПМД} у дорослих; лікування дорослих пацієнтів із СН та порушенням систолічної функції лівого шлуночка ^{БНФ} (зниження ФВЛШ ≤ 40%) як додаткова терапія до інгібіторів АПФ або при їх непереносимості ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при АГ: початкова доза та звичайна підтримуюча доза 8 мг 1 р/добу, у деяких пацієнтів з недостатнім контролем АТ дозу можна збільшити до 16 мг 1 р/добу та максимум до 32 мг 1 р/добу ^{БНФ}, терапія вимагає корекції відповідно до р-ції АТ; СН: початкова доза 4 мг 1 р/добу, збільшення до цільової дози 32 мг 1 р/добу (МДД) або найвищої переносимої дози відбувається за рахунок подвоєння дози з проміжками не менше 2-х тижнів ^{БНФ}, приймати 1 р/добу незалежно від прийому їжі.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції дихальних шляхів; лейкопенія, нейтропенія та агранулоцитоз; гіперкаліємія, гіпонатріємія; запаморочення/вертиго, головний біль; нудота; підвищення рівня печінкових ферментів, порушення печінкової ф-ції або гепатит; ангіоневротичний набряк, висипання, кропив'янка, свербіж; біль у спині, артралгія, міалгія; погіршення ф-ції нирок, включаючи ГНН у чутливих пацієнтів; кашель; гіпотензія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату або до будь-якої з допоміжних речовин; тяжка печінкова недостатність та/або холестаза; пацієнтам із ЦД або порушенням ф-ції нирок (ШКФ < 60 мл/хв/1,73м²), одночасне застосування з аліскіреном.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 8 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КАСАРК®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	32мг	№10x3	1,24	
	КАСАРК®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	16мг	№10x3	1,98	
	КАСАРК®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	8мг	№10x9	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КАСАРК®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	8мг	№10x3	2,97	
II.	АТАКАНД	АстраЗенека АБ (виробництво "in bulk")/АстраЗенека ГмбХ (первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії), Швеція/Німеччина	табл. у бл.	8мг, 16мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КАНДЕКОР®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	4мг, 8мг, 16мг, 32мг	№14, №28, №56, №84, №98, №30, №60, №90	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КАНДЕСАР	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	табл. у бл.	4мг, 8мг, 16мг, 32мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КАНТАБ	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл. у бл.	8мг, 16мг, 32мг	№28, №56, №84, №98	відсутня у реєстрі ОВЦ	

- **Лозартан (Losartan)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: C09CA01 - прості препарати антагоністів рецепторів ангіотензину II.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний антагоніст рецепторів ангіотензину II, потужного вазоконстриктора - активного гормона ренін-ангіотензинової системи і одного з найважливіших факторів патолофізіології АГ. Селективно зв'язується з рецептором АТ₁, лозартан та його фармакологічно активний метаболіт - карбоксильна кислота (Е-3174) - блокують усі фізіологічно вагомі впливи ангіотензину II, незалежно від джерела або шляху його синтезу; лозартан не блокує ангіотензинперетворювальний фермент (АПФ, кіназу II), який сприяє

розпаду брадикініну, внаслідок цього не відбувається посилення небажаних ефектів, опосередкованих брадикініном (тенденції до появи набряків); при застосуванні лозартану спостерігається пригнічення негативної зворотньої р-ції на секрецію реніну, що призводить до підвищення активності реніну у плазмі крові. Застосування лозартану зменшує загальну кількість летальних випадків із серцево-судинних причин, інсульту та ІМ у хворих з АГ з гіпертрофією лівого шлуночка, забезпечує захист нирок у хворих на ЦД II типу з протеїнурією.

Показання для застосування ЛЗ: лікування есенціальної гіпертензії^{ТМД} у дорослих, а також у дітей віком від 6 років; захворювання нирок у дорослих пацієнтів з АГ та ЦД II типу^{БНФ} з протеїнурією $\geq 0,5$ г/добу - як частина антигіпертензивної терапії; хр. СН^{БНФ} (у пацієнтів віком від 60 років), коли застосування інгібіторів АПФ вважається неможливим з причини несумісності, особливо при кашлі, або протипоказане^{БНФ}; пацієнтів із СН, стан яких стабілізувався при застосуванні інгібітору АПФ, не слід переводити на лікування лозартаном; у пацієнта фракція викиду лівого шлуночка повинна становити ≤ 40 %, стан має бути клінічно стабільним, також пацієнтові слід дотримуватися встановленого режиму лікування щодо хр. СН; зниження ризику розвитку інсульту у дорослих пацієнтів з АГ і гіпертрофією лівого шлуночка^{БНФ}, що документально підтверджено за допомогою ЕКГ.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо, незалежно від прийому їжі, 1 р/добу; при АГ початкова і підтримуюча доза 50 мг^{БНФ}; максимальний гіпотензивний ефект досягається ч/з 3-6 тижнів після початку лікування; при необхідності добова доза може бути збільшена до 100 мг^{БНФ} (вранці); початкова доза при СН 12,5 мг 1 р/добу; дозу збільшують в половину кожні 7 днів (тобто 12,5 мг/добу; 25 мг/добу; 50 мг/добу) до середньої підтримуючої дози 50 мг/добу^{БНФ}; зниження ризику розвитку інсульту у пацієнтів з АГ і гіпертрофією лівого шлуночка, підтвердженою на ЕКГ: початкова доза 50 мг 1 р/добу, залежно від змін рівня АТ до лікування додати гідрохлоротіазид у низькій дозі та/або збільшити дозу до 100 мг 1 р/добу; пацієнти з гіпертензією та ЦД II типу^{БНФ} (протеїнурія $\geq 0,5$ г/добу) - початкова доза 50 мг 1 р/добу, дозу можна збільшити до 100 мг 1 р/добу^{БНФ} залежно від того, якими є показники АТ ч/з 1 міс після початку лікування; для дітей, які можуть ковтати табл., і в яких маса тіла більше 20 кг та менше 50 кг, рекомендована доза 25 мг 1 р/добу; у виняткових випадках дозу можна збільшити до максимальної - 50 мг 1 р/добу; дозу коригувати залежно від впливу на рівень АТ; у пацієнтів з масою тіла понад 50 кг разова доза 50 мг 1 р/добу; у виняткових випадках дозу можна збільшити до максимальної - 100 мг 1 р/добу; враховувати можливість призначення у початковій дозі 25 мг для пацієнтів віком старше 75 років.^{БНФ}

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: запаморочення, вертиго; сонливість, головний біль, безсоння, м'язові судоми; пальпітація, стенокардія, тахікардія; симптоматична гіпотензія, дозозалежний ортостатичний ефект, висип; абдомінальний біль, диспепсія, запор; кашель, нежить, синусит, фарингіт, інфекція ВДШ; астенія, слабкість, набряки; гіперкаліємія (рівень калію у сироватці крові $> 5,5$ ммоль/л), підвищення рівня АлАТ; парестезія; синкопе, фібриляція передсердь, інсульт; діарея, нудота, блювання; кропив'янка, свербіж; підвищення рівня сечовини крові, креатиніну у сироватці крові; гіпоглікемія; анемія; біль у спині; тромбоцитопенія; дзвін у вухах; грипоподібні симптоми; р-ції гіперчутливості (анафілактичні р-ції, ангіоневротичний набряк, включаючи набряк гортані та голосової щілини, що призводить до обструкції дихальних шляхів та/або набряки обличчя, губ, глотки і/або язика); васкуліт, включаючи пурпуру Шенляйн-Геноха; мігрень, дисгевзія; панкреатит, блювання; недомагання; гепатит, порушення ф-ції печінки; фоточутливість, еритродермія; міалгія, артралгія, рабдоміоліз; еректильна дисфункція/імпотенція; інфекції сечовивідних шляхів; ниркова недостатність; депресія; гіпонатріємія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до лозартану або до будь-якого іншого компонента препарату; вагітні або жінки, які планують завагітніти; тяжкі порушення функції печінки; одночасне застосування з аліскіреном пацієнтам з ЦД або порушенням функції нирок (ШКФ < 60 мл/хв/1,73м²); дитячий вік до 6 років.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 50 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КЛОСАРТ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	25мг, 50мг, 100мг	№14, №28, №84	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛОСАРТ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№14x2	2,77	
	КЛОСАРТ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№14x6	0,87	
	КЛОСАРТ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№14x2	1,53	
	КЛОСАРТ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x10	0,74	
	КЛОСАРТ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x9	0,74	
	КЛОСАРТ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x3	0,83	
II.	АНГІЗАР	Мікро Лабс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АНГІЗАР	Мікро Лабс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10x3	2,15	26,86/\$
	ЛОЗАП®	АТ "Санека Фармасьютикалз" (виробництво ГЛЗ, первинне та	табл., в/о у бл.	50мг, 100мг	№30, №60, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	вторинне пакування, контроль та випуск серій)/ТОВ "Зентіва" (виробництво ГЛЗ, первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій), Словацька Республіка/Чеська Республіка						
ЛОЗАРТАН КРКА	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серій та випуск серій)/Лабена д.о.о. (контроль серії), Словенія/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг, 100мг	№10x3, №10x9	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЛОЗАРТАН-ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	12,5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЛОЗАРТАН-ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№10x3	1,86	27,71/\$	
ЛОЗАРТАН-ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10x9	0,86	27,71/\$	
ЛОЗАРТАН-ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10x3	1,63	26,30/\$	
ЛОЗАРТАН-ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x3	0,94	26,30/\$	
ЛОРИСТА®	КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії)/ТАД Фарма ГмбХ (виробник, відповідальний за первинне та вторинне пакування та випуск серії)/Лабена д.о.о (виробник, відпов, Словенія/ Німеччина/Словенія/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	12,5мг, 25мг, 50мг, 100мг	№14, №28, №30, №56, №60, №84, №90, №98	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЛОРИСТА®	КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії)/ТАД Фарма ГмбХ (виробник, відповідальний за первинне та вторинне пакування та випуск серії)/Лабена д.о.о (виробник, відпов, Словенія/ Німеччина/Словенія/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10x9	3,65	35,35/€	
ЛОРИСТА®	КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії)/ТАД Фарма ГмбХ (виробник, відповідальний за первинне та вторинне пакування та випуск серії)/Лабена д.о.о (виробник, відпов, Словенія/ Німеччина/Словенія/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10x6	3,83	35,35/€	
ЛОРИСТА®	КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії)/ТАД Фарма ГмбХ (виробник, відповідальний за первинне та вторинне пакування та випуск серії)/Лабена д.о.о (виробник, відпов, Словенія/ Німеччина/Словенія/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10x3	5,77	35,35/€	
ЛОРИСТА®	КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x3	2,97	35,35/€	

	серії)/ТАД Фарма ГмбХ (виробник, відповідальний за первинне та вторинне пакування та випуск серії)/Лабена д.о.о (виробник, відпов, Словенія/ Німеччина/Словенія/Німеччина						
ЛОСАРТАН КСАНТІС	Ципла Лтд (виробництво ГЛФ, первинна та вторинна упаковка)/БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦЯ АТ (контроль серії, випуск серії), Індія/Болгарія	табл., вкриті п/о у бл.	12,5мг, 25мг, 50мг, 100мг	№10х3, №10х10	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЛОТАР®	Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг, 100мг	№10х3, №15х2	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ПРЕСАРТАН® - 100	Іпка Лабораторіс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ПРЕСАРТАН® - 100	Іпка Лабораторіс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№14х2	1,62	25,89/\$	
ПРЕСАРТАН® -50	Іпка Лабораторіс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10х3, №14х2	відсутня у реєстрі ОБЦ		
СЕНТОР®	ВАТ "Гедеон Ріхтер"/ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща", Угорщина/Польща	табл., вкриті п/о у бл.	50мг, 100мг	№10х1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
СЕНТОР®	ВАТ "Гедеон Ріхтер"/ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща", Угорщина/Польща	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10х3	1,89	28,03/\$	
СЕНТОР®	ВАТ "Гедеон Ріхтер"/ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща", Угорщина/Польща	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10х3	1,89	28,03/\$	
ТРОСАН	Ауробіндо Фарма Лімітед - Юніт ІІІ, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ТРОСАН	Ауробіндо Фарма Лімітед - Юніт ІІІ, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10х3	0,79	26,95/\$	
ТРОСАН	Ауробіндо Фарма Лімітед - Юніт ІІІ, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10х3	0,79	26,95/\$	

• **Олмесартан (Olmесartan medoxomil)**^{ПМД}

Фармакотерапевтична група: С09СА08 - блокатори рецепторів ангіотензину ІІ.

Основна фармакотерапевтична дія: антигіпертензивна дія; є сильніючим р/ос активним селективним антагоністом рецепторів (тип АТ₁) ангіотензину ІІ; вважається, що він гальмує всі дії ангіотензину ІІ, які опосередковані рецептором АТ₁, незалежно від джерела і шляху синтезу ангіотензину ІІ; селективний антагонізм рецепторів АТ₁ ангіотензину ІІ призводить до підвищення рівня реніну в плазмі крові та концентрації ангіотензину І і ІІ, а також до деякого зменшення концентрації альдостерону у плазмі крові; одноразовий добовий прийом забезпечує ефективне і м'яке зниження АТ протягом 24 год.; при безперервному лікуванні максимальне зниження АТ досягається ч/з 8 тижнів після початку терапії.

Показання для застосування ЛЗ: есенціальна АГ^{БНФ, ПМД}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована початкова доза - 10 мг 1 р/добу; якщо зменшення АТ недостатнє, дозу збільшують до добової дози - 20 мг^{БНФ}, при виникненні потреби в додатковому зниженні АТ, дозу можна збільшити до 40 мг 1 р/добу (МДД)^{БНФ}, або додати до лікування гідрохлоротіазид; максимальний антигіпертензивний ефект досягається ч/з 8 тижнів від початку терапії, значний ефект зниження АТ спостерігається вже ч/з 2 тижні лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тромбоцитопенія; анафілактична р-ція; гіпертригліцеридемія; гіперурикемія; гіперкаліємія; запоморочення; головний біль; вертіго; стенокардія; артеріальна гіпотензія; бронхіт, фарингіт; кашель, риніт; гастроентерит, діарея; абдомінальний біль, нудота, диспепсія, блювання, спру-подібна ентеропатія; екзантема; алергічний дерматит; кропив'янка; висипання; свербіж; ангіоневротичний набряк; артрит; біль у спині; біль у кістках; міалгія; м'язові судоми; гематурія; інфекція сечовивідних шляхів; ГНН; порушення ф-ції нирок; біль у грудній клітці; периферичний набряк; грипозні с-ми; підвищена втомлюваність; набряк обличчя; астенія; загальне нездужання; летаргічний стан; підвищення рівня ферментів печінки; підвищення у крові рівня сечовини, креатинфосфокінази, креатиніну.

Противпоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до одного з компонентів препарату; вагітні або жінки, які планують завагітніти; обструкція жовчовивідних шляхів; дитячий вік; одночасне застосування олмесартану із препаратами, що містять аліскірен, протипоказане пацієнтам, хворим на ЦД та ниркову недостатність (ШКФ < 60 мл/хв/1,73 м²).

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
-------------------	-----------------	---------------	-----------	----------------------	----------------	-----------------------------

II.	ОЛЕМБІК- 40	Алембiк Фармас'ютикелс Лімітед, Індія	табл. вкриті п/о у бл.	40мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ
	ОЛЕМБІК-20	Алембiк Фармас'ютикелс Лімітед, Індія	табл. вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ
	ОЛІМЕСТРА®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг, 40мг	№28, №30, №56, №60	відсутня у реєстрі ОВЦ

• **Ірбесартан (Irbesartan)**^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: C09CA04 - антагоністи рецепторів ангіотензину II (не комбіновані).

Основна фармакотерапевтична дія: антигіпертензивна дія; потужний, активний при р/ос прийомі, селективний антагоніст рецепторів ангіотензину II (типу AT₁), може блокувати всі ефекти ангіотензину II, опосередковані рецептором AT₁, незалежно від джерела або способу синтезу ангіотензину II; селективний антагонізм рецепторів ангіотензину II (AT₁) обумовлює підвищення рівнів реніну і ангіотензину II в плазмі крові, а також зменшення концентрації альдостерону в плазмі крові; на рівні калію в сироватці крові у разі його застосування в рекомендованих дозах не виявляє значущого впливу; не інгібує АПФ (кініназу II) - фермент, який каталізує утворення ангіотензину II і деградацію брадикініну до неактивних метаболітів; активний без метаболічної активації; знижує АТ, мінімально змінюючи ЧСС; максимальне зменшення АТ відбувається протягом 3-6 год після прийому засобу, і ефект зменшення АТ зберігається протягом принаймні 24 год.

Показання для застосування ЛЗ: есенціальна АГ^{БНФ, ГМД}; лікування хр. захворювання нирок у дорослих пацієнтів з АГ і ЦД 2 типу як складова схеми антигіпертензивної терапії.^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: звичайна початкова та підтримуюча доза 150 мг 1 р/добу^{БНФ} незалежно від прийому їжі; можлива початкова терапія в дозі 75 мг, наприклад для пацієнтів, які знаходяться на ГД, або для пацієнтів старше 75 років^{БНФ}; для пацієнтів, у яких АТ недостатньо контролюється дозою 150 мг 1 р/добу, доза може бути підвищена до 300 мг, або можна паралельно призначити інший гіпотензивний препарат; додаткове застосування такого діуретика, як гідрохлоротіазид, має адитивний ефект; у пацієнтів, хворих на АГ та ЦД 2 типу, терапія ірбесартаном повинна розпочинатися з дози 150 мг 1 р/добу і титруватися до дози 300 мг 1 р/добу^{БНФ}, яка при лікуванні хр. захворювання нирок є бажаною підтримувальною дозою.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості, такі як ангіоневротичний набряк, висипання, кропивниця; тромбоцитопенія; гіперкаліємія; запаморочення, ортостатичне запаморочення; вертиго, головний біль; шум у вухах; тахікардія; ортостатична гіпотензія; гіперемія; кашель; нудота/блювання, діарея, диспепсія/печія, дисгевзія; жовтяниця; гепатит, порушення ф-ції печінки; лейкоцитокластичний васкуліт; біль у м'язах і кістках; артралгія, міалгія (у деяких випадках асоційована з підвищеними рівнями креатинінінази в плазмі крові), м'язові спазми; порушення ф-ції нирок, включаючи випадки ниркової недостатності у пацієнтів з підвищеним ризиком цього ускладнення; порушення сексуальної ф-ції; підвищена втомлюваність, біль у грудній клітці.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин; вагітним та жінкам, які планують завагітніти; одночасне застосування з препаратами, що містять аліскірен, протипоказане пацієнтам з ЦД або нирковою дисфункцією (швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) < 60 мл/хв/1,73 м²).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,15 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ІРБЕТАН	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	300мг	№10x2	2,83	
II.	АПРОВЕЛЬ®	САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА, Франція	табл., в/о у бл.	150мг, 300мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ІСТАР	Люпін Лімітед, Індія	табл., в/о у бл.	75мг, 150мг, 300мг	№14, №20, №28, №30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КОНВЕРІУМ	Медокемі ЛТД (Центральний Завод), Кіпр	табл. у бл.	150мг, 300мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КОНВЕРІУМ	Медокемі ЛТД (Центральний Завод), Кіпр	табл. у бл.	150мг	№10x3	3,07	30,69/€
	КОНВЕРІУМ	Медокемі ЛТД (Центральний Завод), Кіпр	табл. у бл.	300мг	№10x3	2,56	30,69/€
	РОТАЗАР	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	75мг, 150мг, 300мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФІРМАСТА®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	75мг, 150мг, 300мг	№14, №28, №56, №98	відсутня у реєстрі ОВЦ	

2.5.2. Похідні небіфенілтетразолу

• **Епросартан (Eprosartan)**^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: C09CA02 - прості препарати антагоністів ангіотензину II.

Основна фармакотерапевтична дія: антигіпертензивна дія; потужний, непептидний, активний при р/ос прийомі, небіфенільний тетразолний антагоніст рецепторів ангіотензину II, який селективно зв'язується з AT₁-

рецепторами; перешкоджає впливу ангіотензину II на АТ, нирковий кровотік і виділення альдостерону; у хворих з АГ зниження АТ відбувається як після одноразового прийому однієї дози препарату, так і після розподілу цієї дози на два окремих прийоми, і підтримується надалі без коливань АТ протягом 24 год; припинення лікування епросартаном не викликає різкого підвищення АТ (с-му відміни); у хворих з АГ зниження АТ після прийому епросартану не супроводжується зміною ЧСС; препарат не впливає на рівень у плазмі крові глюкози, тригліцеридів, холестерину та ліпопротеїнів низької щільності; не зменшує рівень клубочкової фільтрації у хворих з есенціальною АГ і у хворих з нирковою недостатністю різного ступеня; посилює натрійурез у здорових осіб на низькосольовій дієті; у хворих з есенціальною АГ і у хворих з нирковою недостатністю різного ступеня він не викликає затримки натрію або погіршення ф-ції нирок; не викликає ефектів, пов'язаних зі збільшенням концентрації брадикініну.

Показання для застосування ЛЗ: есенціальна гіпертензія^{БНФ, ПМД}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза для дорослих становить 600 мг 1 р/добу^{БНФ} вранці; у більшості хворих максимальне зниження АТ досягається ч/з 2-3 тижні лікування; може застосовуватися самостійно або в комбінації з іншими антигіпертензивними засобами (тіазидними діуретиками або блокаторами кальцієвих каналів); у хворих з помірною або тяжкою нирковою недостатністю (кліренс креатиніну < 60 мл/хв.) добова доза не повинна перевищувати 600 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль; гіперчутливість; запаморочення; артеріальна гіпотензія; риніт; алергічні шкірні реакції (включаючи висипання, свербіж); ангіоневротичний набряк; нудота, блювання, діарея; астенія; порушення ф-ції нирок, у т.ч. ниркова недостатність, у пацієнтів групи ризику (наприклад, зі стенозом ниркової артерії), артралгія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: відома гіперчутливість до активної речовини або до будь-якого неактивного компонента препарату; вагітність або планування вагітності; двосторонні реноваскулярні захворювання зі значними порушеннями гемодинаміки або тяжкий стеноз ниркової артерії єдиної функціонуючої нирки; одночасне застосування ЛЗ з препаратами, що містять аліскірен, пацієнтам з ЦД або порушенням ф-ції нирок (швидкість клубочкової фільтрації < 60 мл/хв/1,73 м²).

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ТЕВЕТЕН®	Майлан Лабораторіз САС, Франція	табл., вкриті п/о у бл.	600мг	№14x1, №14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Телмісартан (Telmisartan)**^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: C09CA07 - прості препарати антагоністів ангіотензину II.

Основна фармакотерапевтична дія: є специфічним та ефективним антагоністом рецепторів ангіотензину II (тип АТ₁) для р/ос застосування; з дуже високою спорідненістю заміщує ангіотензин II у місцях його зв'язування з різновидом АТ₁-рецепторів, що відповідають за активність ангіотензину II; не виявляє будь-якого часткового агоністичного впливу на АТ₁-рецептор; селективно зв'язується з АТ₁-рецептором; зв'язування є довготривалим; не має спорідненості з іншими рецепторами, включаючи АТ₂ та інші, менш вивчені АТ-рецептори; функціональна роль цих рецепторів не з'ясована, як і ефект їх можливої стимуляції ангіотензином II, рівні якого підвищуються телмісартаном; зменшує рівні альдостерону у плазмі крові; не знижує рівень реніну у плазмі крові та не блокує іонні канали; не інгібує ангіотензинперетворюючий ензим (кініназа II), ензим, що також розкладає брадикінін; тому не слід очікувати потенціювання брадикінінсупроводжуваних побічних ефектів; у дозі 80 мг майже повністю гальмує підвищення АТ, спричинене ангіотензином II; блокуючий ефект зберігається протягом 24 год і залишається відчутним до 48 год.

Показання для застосування ЛЗ: есенціальна гіпертензія^{БНФ, ПМД}; профілактика СС захворювань: з вираженими проявами атеротромботичного СС захворювання (ІХС, інсульт або ураження периферичних артерій в анамнезі); або ЦД II типу із діагностованим ураженням органів-мішеней^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Лікування АГ- рекомендована доза 40 мг/добу, в окремих пацієнтів антигіпертензивний ефект може бути досягнутий при щодобовій дозі 20 мг^{БНФ}; у випадках, коли бажаний АТ не досягається, дозу можна підвищити до 80 мг 1 р/добу^{БНФ}; альтернативно можна використати в комбінації з тіазидними діуретиками, такими як гідрохлортіазид, що має адитивний ефект зниження АТ; максимальний гіпотензивний ефект настає ч/з 4-8 тижнів від початку лікування; профілактика СС захворювань - рекомендована доза 80 мг 1 р/добу^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекційні захворювання сечових шляхів (включаючи цистит), інфекції ВДШ (включаючи фарингіт і синусит); анемія; еозинофілія, тромбоцитопенія; анафілактична р-ція, гіперчутливість; гіперкаліємія; гіпоглікемія (у хворих на діабет); безсоння, депресія; занепокоєність; синкопе; сонливість; порушення зору; вертиго; брадикардія; тахікардія; артеріальна гіпотензія, ортостатична гіпотензія; диспное, кашель; інтерстиціальна хвороба легень; абдомінальний біль, діарея, диспепсія, метеоризм, блювання; сухість у роті, дискомфорт у ділянці шлунка, дисгевзія; порушення ф-ції печінки/печінкові розлади; свербіж, посилене потовиділення, висипання; ангіоневротичний набряк (у т.ч. з летальним наслідком), екзема, еритема, кропив'янка, медикаментозний дерматит, токсичний дерматит; біль у спині (ішіас), судоми м'язів, міалгія; артралгія, біль у кінцівках, біль у сухожиллі (симптоми, подібні до тендиніту); порушення ф-ції нирок, включаючи ГНН; біль у грудях, астенія; симптоми, подібні до грипу; підвищення креатиніну в крові; зниження рівня гемоглобіну, підвищення сечової к-ти в крові, підвищення печінкових ензимів, підвищення рівня КФК у крові; сепсис, у т.ч. з летальним наслідком.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючих речовин або будь-якої допоміжної речовини препарату; обструктивні захворювання жовчних протоків; тяжкі порушення ф-ції печінки; одночасне застосування телмісартану та аліскірену пацієнтам з ЦД або порушеннями ф-ції нирок (ШКФ < 60 мл/хв/1,73 м²); вагітність або планування вагітності; період годування груддю; дитячий вік (до 18 років).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 40 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ХІПОТЕЛ	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. у бл.	20мг, 40мг, 80мг	№28, №30, №56, №84	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ХІПОТЕЛ	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. у бл.	40мг	№14x2	3,06	
	ХІПОТЕЛ	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. у бл.	80мг	№14x2	1,92	
II.	МІКАРДИС®	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмБХ і Ко. КГ/Берінгер Інгельхайм Еллас А.Е., Німеччина/Греція	табл. у бл.	80мг	№7x2, №7x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕЛМІЛАКС	ЛАБОРАТОРІО ДР. Ф. ЕЧЕВАРНЕ, АНАЛІСІС, С.А. (альтернативна дільниця для проведення аналітичних випробувань)/ЛАБОРАТОРІОС ЛІКОНСА, С.А. (повний цикл виробництва, випуск серії), Іспанія/Іспанія	табл. у бл.	20мг, 40мг, 80мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕЛМІНОРМ-80	Іпка Лабораторізі Лтд., Індія	табл. у бл.	80мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕЛМІСАРТАН-ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА (первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серій)/Тевафарм Індія Пвт. Лтд. (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка), Угорщина/Індія	табл. у бл.	80мг	№7x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕЛМІСТА	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/КРКА, Польща Сп.з.о.о. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія/Польща	табл. у бл.	20мг, 40мг, 80мг	№14, №28, №30, №56, №60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕЛМІСТА	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/КРКА, Польща Сп.з.о.о. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія/Польща	табл. у бл.	40мг	№7x4	3,19	30,27/€
	ТЕЛМІСТА	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/КРКА, Польща Сп.з.о.о. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія/Польща	табл. у бл.	80мг	№7x4	2,00	30,27/€
	ТЕЛНОР	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл. у бл.	20мг, 40мг, 80мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕЛПРЕС	ЛАБОРАТОРІОС ЛІКОНСА, С.А. (повний цикл виробництва, випуск серії)/ЛАБОРАТОРІО ДР. Ф. ЕЧЕВАРНЕ, АНАЛІСІС, С.А. (контроль якості), Іспанія/Іспанія	табл. у бл.	20мг, 40мг, 80мг	№14x2, №14x7	відсутня у реєстрі ОБЦ	

ТЕЛСАРТАН	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Виробнича дільниця - II, Індія	табл. у бл.	40мг, 80мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ
ТСАРТ 40	Алкем Лабораторіс Лтд, Індія	табл. у бл.	40мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ
ТСАРТ 80	Алкем Лабораторіс Лтд, Індія	табл. у бл.	80мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ

2.5.3. Похідні негетероциклічних сполук

- **Валсартан (Valsartan)** ^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: С09СА03 - прості препарати антагоністів ангіотензину II.

Основна фармакотерапевтична дія: антигіпертензивна дія; активний, специфічний антагоніст рецепторів ангіотензину II; діє вибірково на рецептори підтипу АТ₁; не пригнічує АПФ, відомий також під назвою кінінази II; призводить до зниження АТ без впливу на частоту пульсу; максимальний терапевтичний ефект розвивається ч/з 4 тижні від початку лікування і зберігається при тривалій терапії; при застосуванні з гідрохлортиазидом досягається достовірне додаткове зниження АТ; раптова відміна не супроводжується розвитком с-му відміни; при тривалому застосуванні у хворих із АГ не мав істотного впливу на рівень загального холестерину, сечової к-ти, а при дослідженнях натщесерце - на концентрацію тригліцеридів і глюкози в сироватці крові; призводить до зменшення випадків госпіталізації з приводу СН, уповільнення прогресування СН, збільшення фракції викиду, а також зменшення ознак і симптомів СН та покращення якості життя в порівнянні з плацебо.

Показання для застосування ЛЗ: АГ ^{ГМД}, постінфарктний стан (лікування клінічно стабільних дорослих пацієнтів із симптоматичною СН або безсимптомною систолічною дисфункцією лівого шлуночка ^{БНФ} після нещодавно (12 год-10 діб) перенесеного ІМ); лікування симптоматичної СН у дорослих пацієнтів, коли не можна застосовувати інгібітори АПФ, або як допоміжна терапія з інгібіторами АПФ, коли не можна застосовувати β-блокатори ^{БНФ}; лікування АГ у дітей віком від 6 до 18 років.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: АГ - рекомендована доза для дорослих 80 мг, можна підвищити до 160 мг 1 р/добу ^{БНФ}; антигіпертензивний ефект досягається протягом 2 тижнів, а максимальний ефект очевидний ч/з 4 тижні; у пацієнтів з неконтрольованим АТ добова доза може бути підвищена до максимальної - 320 мг ^{БНФ}, можливе додаткове призначення діуретиків; можна призначати також сумісно з іншими антигіпертензивними засобами; СН - рекомендована початкова доза 40 мг 2 р/добу; підвищення дози від 80 мг і 160 мг 2 р/добу ^{БНФ} слід здійснювати з інтервалами не менше 2-х тижнів до найвищої дози від переносимості пацієнтом; МДД - 320 мг, розподілена на декілька прийомів; стан після перенесеного ІМ - лікування може бути розпочате вже ч/з 12 год після ІМ; після початкової дози 20 мг 2 р/добу, дозу збільшувати до 40 мг, 80 мг і 160 мг 2 р/добу протягом наступних декількох тижнів; планова максимальна доза - 160 мг 2 р/добу ^{БНФ}; рекомендується, щоб пацієнти досягали рівня дози 80 мг 2 р/добу протягом 2 тижнів після початку лікування, і щоб планова максимальна доза була досягнута протягом 3 місяців; дитяча АГ - початкова доза 40 мг 1 р/добу для дітей з масою тіла менше 35 кг та 80 мг 1 р/добу для дітей з масою тіла 35 кг або більше; маса тіла від ≥ 18 кг до < 35 кг - максимальна доза 80 мг, від ≥ 35 кг до < 80 кг - максимальна доза 160 мг, від ≥ 80 кг до ≤ 160 кг - максимальна доза 320 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: зниження гемоглобіну, зниження гематокриту, нейтропенія, тромбоцитопенія; підвищена чутливість, включаючи сироваткову хворобу, екзантема; підвищення калію у сироватці крові, гіпонатріємія, синкопе; СН, порушення серцевого ритму, ортостатична гіпотензія; вертиго; васкуліт; кашель; біль у животі, блювання; підвищення показників ф-ції печінки (підвищення рівня білірубину у сироватці крові); ангіоневротичний набряк, висипання, свербіж; бульозний дерматит; міалгія; ниркова недостатність і порушення ф-ції нирок, ГНН, підвищення рівня креатиніну у сироватці крові, підвищення рівня сечовини крові; підвищена втомлюваність; артралгія, астенія, біль у спині, діарея, запаморочення, головний біль, безсоння, зниження лібідо, нудота, набряки, фарингіт, риніт, синусит, інфекції ВДШ, вірусні інфекції; ускладнення розвитку плода.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до валсартану чи до будь-якої допоміжної речовини; вагітні або жінки, які планують завагітніти; одночасне застосування антагоністів рецептора ангіотензину, або інгібіторів АПФ з аліскіреном пацієнтам з ЦД або порушенням ф-ції нирок (швидкість гломерулярної фільтрації (ШГФ) < 60 мл/хв/1,73 м²).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 80 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АДЕНІЗ	ТОВ НВФ "МІКРОХІМ" (юридична адреса та лабораторія фізико-хімічного аналізу та контролю виробництва; лабораторія біологічного аналізу; виробнича дільниця), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	80мг, 160мг	№10x3, №10x9	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДЮКОР СОЛО 160	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	160мг	№10, №30, №40, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДЮКОР СОЛО 80	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	80мг	№10, №30, №40, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	ВАЗАР	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА (первинне, вторинне пакування, дозвіл на випуск серії)/Тева Чех	табл., вкриті п/о у бл.	80мг, 160мг	№14x2, №14x7	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	Індастріз с.р.о. (виробництво нерозфасованої продукції, контроль якості), Угорщина/еська Республіка						
ВАЗАР	Актавіс ЛТД/Балканфарма-Дупниця АТ, Мальта/Болгарія	табл., вкриті п/о у бл.	40мг, 80мг, 160мг, 320мг	№10x3, №10x9	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ВАЛЕЗА®	АЛКАЛОЇД АД Скоп'є (вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Люпін Лімітед (виробництво нерозфасованого продукту, первинне пакування), Республіка Македонія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	40мг, 80мг, 160мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ВАЛМІСАР 160	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у фл. та бл.	160мг	№10, №30, №90	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ВАЛМІСАР 320	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у фл. та бл.	320мг	№10, №30, №90	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ВАЛМІСАР 40	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у фл. та бл.	40мг	№10, №30	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ВАЛМІСАР 80	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у фл. та бл.	80мг	№10, №30, №90	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ВАЛСАР	Ауробіндо Фарма Лімітед – Юніт VII, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	80мг	№7x4	2,50	25,52/\$	
ВАЛСАР	Ауробіндо Фарма Лімітед – Юніт VII, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	160мг	№7x4	1,61	25,52/\$	
ВАЛСАРТАН	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл. та конт.	40мг, 80мг, 160мг, 320мг	№10, №30	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ВАЛСАРТАН КРКА	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне, вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Кемілаб д.о.о. (контроль серії), Словенія/ловенія	табл., вкриті п/о у бл.	80мг, 160мг, 320мг	№14x2, №14x6	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ВАЛСАРТАН САНДОЗ®	Новартіс Фармацевтика С.А. (виробництво "in bulk", пакування, тестування)/Лек фармацевтична компанія д.д. (випуск серії)/Солвіас АГ (тестування), Іспанія/Словенія/Швейцарія	табл., вкриті п/о у бл.	80мг, 160мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ВАЛСАРТАН-ТЕВА	Актавіс ЛТД/Балканфарма-Дупниця АТ, Мальта/Болгарія	табл., вкриті п/о у бл.	40мг, 80мг, 160мг, 320мг	№10x3, №10x9	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ВАЛЬСАКОР®	КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; виробник, відповідальний за контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю))/Кемілаб д.о.о. (виробник, відповідальний, Словенія/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	40мг, 80мг, 160мг, 320мг	№28, №30, №56, №60	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ВАЛЬСАКОР®	КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; виробник, відповідальний за контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю))/Кемілаб д.о.о. (виробник, відповідальний, Словенія/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	80мг	№84	3,40	30,33/€	
ВАЛЬСАКОР®	КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне	табл., вкриті п/о у бл.	80мг	№28	3,78	30,33/€	

		пакування, контроль та випуск серії; виробник, відповідальний за контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю))/Кемілаб д.о.о. (виробник, відповідальний, Словенія/Словенія					
ВАЛЬСАКОР®	КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; виробник, відповідальний за контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю))/Кемілаб д.о.о. (виробник, відповідальний, Словенія/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	160мг	№84	2,06	30,33/€	
ВАЛЬСАКОР®	КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; виробник, відповідальний за контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю))/Кемілаб д.о.о. (виробник, відповідальний, Словенія/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	160мг	№28	2,45	30,33/€	
ВАЛЬСАКОР®	КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; виробник, відповідальний за контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю))/Кемілаб д.о.о. (виробник, відповідальний, Словенія/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	320мг	№28	2,36	30,33/€	
ВАНАТЕКС	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С. А., Польща	табл., вкриті п/о у бл.	80мг	№14x2	3,75	25,02/\$	
ВАНАТЕКС	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польща	табл., вкриті п/о у бл.	160мг	№14x2	2,99	25,02/\$	
ДЮВАН®	Новартіс Фарма Штейн АГ/Новартіс Фармасьютика С. А., Швейцарія/Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	80мг, 160мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ДЮВАН®	Новартіс Фарма Штейн АГ/Новартіс Фармасьютика С. А., Швейцарія/Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	80мг	№14x1	27,96	26,47/\$	
ДЮВАН®	Новартіс Фарма Штейн АГ/Новартіс Фармасьютика С. А., Швейцарія/Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	160мг	№14x1	18,32	26,47/\$	
ДЮОСТАР	Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія	табл., вкриті п/о у бл.	80мг, 160мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
КАРДОПАН-САНОВЕЛЬ	Сановель Іляч Санаі ве Тиджарет А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	80мг, 160мг, 320мг	№14x2, №14x7	відсутня у реєстрі ОБЦ		
САКОРД	Балканфарма-Дупниця АД, Болгарія	табл., вкриті п/о у бл.	80мг, 160мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
САРТОКАД-В	Джубілант Дженерікс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	40мг, 80мг, 160мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		

Комбіновані препарати

- **Валсартан + гідрохлортіазид (Valsartan + hydrochlorothiazide)** (ГПМД)

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АДЕНІЗ-Н	ТОВ Науково-виробнича фірма "МІКРОХІМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл. та бан.	80мг/12,5мг, 160мг/12,5мг, 160мг/25мг,	№30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	

				320мг/12,5мг, 320мг/25мг			
	ДІОКОР 160	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	160мг/12,5мг	№10, №30, №40, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДІОКОР 80	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	80мг/12,5мг	№10, №30, №40, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТІАРА ДУО	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., вкриті п/о у конт. чар/уп.	80мг/12,5мг, 160мг/12,5мг, 160мг/25мг	№7x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТІАРА ДУО	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., вкриті п/о у конт. чар/уп.	160мг/25мг	№7x4	97,53	
	ТІАРА ДУО	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., вкриті п/о у конт. чар/уп.	160мг/12,5мг	№7x4	75,04	
	ТІАРА ДУО	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., вкриті п/о у конт. чар/уп.	80мг/12,5мг	№7x4	65,38	
II.	ВАЗАР Н	Актавіс ЛТД/Балканфарма- Дупниця АТ, Мальта/Болгарія	табл., вкриті п/о у бл.	80мг/12,5мг, 160мг/12,5мг, 160мг/25мг, 320мг/12,5мг, 320мг/25мг	№10x3, №10x9	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАЛСАР-Н	Ауробіндо Фарма Лімітед - Юніт VII, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	160мг/25мг	№7x4	120,00	25,52/\$
	ВАЛСАР-Н	Ауробіндо Фарма Лімітед - Юніт VII, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	80мг/12,5мг	№7x4	80,00	25,52/\$
	ВАЛСАРТАН 160/ГІДРОХЛОП ОТІАЗИД 12,5 КРКА	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; контроль серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	160мг/12,5мг	№14x2, №14x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАЛСАРТАН 160/ГІДРОХЛОП ОТІАЗИД 25 КРКА	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; контроль серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	160мг/25мг	№14x2, №14x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАЛСАРТАН 320/ГІДРОХЛОП ОТІАЗИД 12,5 КРКА	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; контроль серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	320мг/12,5мг	№14x2, №14x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАЛСАРТАН 320/ГІДРОХЛОП ОТІАЗИД 25 КРКА	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; контроль серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	320мг/25мг	№14x2, №14x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАЛСАРТАН 80/ГІДРОХЛОП ОТІАЗИД 12,5 КРКА	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; контроль серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	80мг/12,5мг	№14x2, №14x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАЛСАРТАН Н- ТЕВА	Актавіс ЛТД/Балканфарма- Дупниця АТ, Мальта/Болгарія	табл., вкриті п/о у бл.	80мг/12,5мг, 160мг/12,5мг, 160мг/25мг, 320мг/12,5мг, 320мг/25мг	№10x3, №10x9	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАЛСАРТАН САНДОЗ® КОМПОЗИТУМ	Новартис Фарма С.п.А. (виробництво "in bulk", пакування)/Лек Фармацевтична компанія д.д. (випуск серії, тестування)/С.К. Сандоз С.Р.Л. (випуск серії, тестування), Італія/Словенія/Румунія	табл., вкриті п/о у бл.	80мг/12,5мг, 160мг/12,5мг, 160мг/25мг	№14x1, №14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

ВАЛЬСАКОР® Н 160	КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; виробник, відповідальний за контроль серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	160мг/12,5мг	№30, №56, №60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ВАЛЬСАКОР® Н 160	КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; виробник, відповідальний за контроль серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	160мг/12,5мг	№14x2	161,05	30,33/€
ВАЛЬСАКОР® Н 160	КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; виробник, відповідальний за контроль серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	160мг/12,5мг	№14x6	405,21	30,33/€
ВАЛЬСАКОР® Н 80	КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; виробник, відповідальний за контроль серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	80мг/12,5мг	№30, №56, №60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ВАЛЬСАКОР® Н 80	КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; виробник, відповідальний за контроль серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	80мг/12,5мг	№14x2	125,26	30,33/€
ВАЛЬСАКОР® Н 80	КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; виробник, відповідальний за контроль серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	80мг/12,5мг	№14x6	308,76	30,33/€
ВАЛЬСАКОР® Н 320	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	320мг/12,5мг	№14, №30, №56, №60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ВАЛЬСАКОР® Н 320	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	320мг/12,5мг	№14x2	284,80	30,33/€
ВАЛЬСАКОР® HD 160	КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; виробник, відповідальний за контроль серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	160мг/25мг	№30, №56, №60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ВАЛЬСАКОР® HD 160	КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; виробник, відповідальний за контроль серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	160мг/25мг	№14x2	180,47	30,33/€

ВАЛЬСАКОР® HD 160	КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; виробник, відповідальний за контроль серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	160мг/25мг	№14x6	436,45	30,33/€
ВАЛЬСАКОР® HD 320	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	320мг/25мг	№14, №30, №56, №60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ВАЛЬСАКОР® HD 320	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	320мг/25мг	№14x2	280,56	30,33/€
ВАНАТЕКС КОМБІ	Фармацевтичний Завод "ПОЛЬФАРМА" С. А., Польща	табл., вкриті п/о у бл.	160мг/12,5мг	№14x2	187,66	25,02/\$
ВАНАТЕКС КОМБІ	Фармацевтичний Завод "ПОЛЬФАРМА" С. А., Польща	табл., вкриті п/о у бл.	80мг/12,5мг	№14x2	145,12	25,02/\$
ВАНАТЕКС КОМБІ	Фармацевтичний Завод "ПОЛЬФАРМА" С. А., Польща	табл., вкриті п/о у бл.	160мг/25мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КО-ДИОВАН®	Новартіс Фарма Штейн АГ/Новартіс Фарма С.п.А./Міфарм С.п.А. (первинне та вторинне пакування), Швейцарія/Італія/Італія	табл., вкриті п/о у бл.	80мг/12,5мг, 160мг/12,5мг, 160мг/25мг, 320мг/12,5мг, 320мг/25мг	№14x1, №14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
САКОРД Н	Балканфарма-Дупница АД, Болгарія	табл., вкриті п/о у бл.	80мг/12,5мг, 160мг/12,5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Кандесартан + гідрохлортіазид (Candesartan + hydrochlorothiazide)** ^[ПМД]

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АТАКАНД ПЛЮС	АстраЗенека АБ (виробник "in bulk")/АстраЗенека ГмбХ (виробник, відповідальний за пакування та випуск серії), Швеція/Німеччина	табл. у бл.	16мг/12,5 мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАНДЕКОР® Н 16	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль, випуск серії), Словенія	табл. у бл.	16мг/12,5 мг	№14, №28, №30, №56, №60, №84, №90, №98	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАНДЕКОР® Н 32	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль, випуск серії), Словенія	табл. у бл.	32мг/12,5 мг	№14, №28, №30, №56, №60, №84, №90, №98	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАНДЕКОР® Н 8	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль, випуск серії), Словенія	табл. у бл.	8мг/12,5мг	№14, №28, №30, №56, №60, №84, №90, №98	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАНДЕКОР® HD 32	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль, випуск серії), Словенія	табл. у бл.	32мг/25мг	№14, №28, №30, №56, №60, №84, №90, №98	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАСАРК® Н	Евертоджен Лайф Саснсиз Лімітед, Індія	табл. у бл	16мг/12,5 мг	№10, №30, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАСАРК® HD	Евертоджен Лайф Саснсиз	табл. у бл	32мг/25мг	№10, №30,	відсутня у	

	Лімітед, Індія		№100	реєстрі ОБЦ
--	----------------	--	------	-------------

- **Телмісартан + гідрохлортіазид (Telmisartan + hydrochlorothiazide)** ^(ПМД)

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ІЗІКАРД® Н	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед, Індія	табл. у бл.	40мг/12,5мг, 80мг/12,5мг, 80мг/25мг	№7х2, №7х4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МІКАРДИСПЛЮС®	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмБХ і Ко. КГ (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості та випуск серії)/Берінгер Інгельхайм Еллас А.Е. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості та випуск серії), Німеччина/Греція	табл. у бл.	40мг/12,5мг, 80мг/12,5мг	№7х4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕЛМІЛАКС ПЛЮС	Лабораторію Др. Ф. Ечеварне, Аналісіс, С.А. (альтернативна дільниця для проведення аналітичних випробувань)/ЛАБОРАТОРІОС ЛІКОНСА, С.А. (виробник, що здійснює повний цикл виробництва і відповідає за випуск серії), Іспанія/Іспанія	табл. у бл.	40мг/12,5мг, 80мг/12,5мг, 80мг/25мг	№14х2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕЛМІСТА Н 40	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	40мг/12,5мг	№14, №30, №56, №60, №84, №90, 98, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕЛМІСТА Н 40	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	40мг/12,5мг	№7х4	106,54	30,27/€
	ТЕЛМІСТА Н 80	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	80мг/12,5мг	№14, №30, №56, №60, №84, №90, 98, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕЛМІСТА Н 80	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	80мг/12,5мг	№7х4	121,37	30,27/€
	ТЕЛМІСТА НD 80	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	80мг/25мг	№14, №30, №56, №60, №84, №90, 98, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕЛМІСТА НD 80	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	80мг/25мг	№7х4	132,87	30,27/€
	ТЕЛПРЕС ПЛЮС	ЛАБОРАТОРІОС ЛІКОНСА, С.А. (повний цикл виробництва, випуск серії)/ЛАБОРАТОРІО ДР. Ф. ЕЧЕВАРНЕ, АНАЛІСІС, С.А. (контроль якості), Іспанія/Іспанія	табл. у бл.	40мг/12,5мг, 80мг/12,5мг, 80мг/25мг	№14х2, №14х7	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕЛСАРТАН - Н	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Індія	табл. у бл.	40мг/12,5мг, 80мг/12,5мг	№7х2, №7х4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕЛСІ Н	МСН Лабораторіс Пвт. Лтд, Індія	табл. у бл.	40мг/12,5мг	№10х3	135,00	27,93/\$

2.6. Антигіпертензивні лікарські засоби центральної дії

2.6.1. Агоністи центральних α-адренорецепторів

- **Клонідин (Clonidine)** ^(ПМД)

Фармакотерапевтична група: С02АС01 - антигіпертензивні засоби. Антиадренергічні засоби з центральним механізмом дії. Агоністи імідазолінових рецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: Механізм дії обумовлений стимуляцією центральних постсинаптичних α₂-адренорецепторів, що призводить до гальмування симпатичної імпульсації з ЦНС та пригнічення вивільнення норадреналіну з нервових закінчень; знижує активність реніну плазми, екскрецію альдостерону, клубочкову фільтрацію та екскрецію натрію; знижує загальний периферичний опір судин, зменшується ЧСС, зменшується

серцевий викид, виразно знижується систолічний та діастолічний АТ; можливе підвищення опору мозкових судин, зменшення церебрального кровообігу; виразна гіпотензивна дія проявляється незалежно від початкового рівня АТ, як у хворих на АГ, так і в нормотензивних і гіпотензивних пацієнтів; послаблює соматовегетативні прояви опіятної та алкогольної абстиненції; чинить також седативну та анальгезуючу дію; знижує внутрішньоочний тиск за рахунок зменшення секреції та поліпшення відтоку водянистої вологи ока; тривале застосування супроводжується затримкою рідини в організмі.

Показання для застосування ЛЗ: гіпертонічний криз (за винятком гіпертонічного кризу при феохромоцитомі); рідко - лікування АГ^{БНФ, ПМД} (у складі комплексної терапії), абстинентний с-м при опіоїдній наркозалежності (у складі комплексної терапії).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Табл. призначати всередину, незалежно від прийому їжі; дозу підбирати суворо індивідуально; відміну препарату завжди проводити поступово впродовж 1–2 тижнів. АГ: початкова доза зазвичай становить 0,075 мг 2–3 р/добу; у разі необхідності дозу слід поступово збільшити до середньої добової дози - 0,9 мг (6 табл.); зазвичай ефективна терапевтична доза становить 0,15 мг (1 табл.) 2–3 р/добу; максимальна разова доза - 0,3 мг (2 табл.), МДД - 1,5 мг (10 табл.). Гіпертонічний криз: призначати по 0,15–0,3 мг (1–2 табл.) сублінгвальної (за відсутності вираженої сухості у роті). Абстинентний с-ром: призначати в умовах стаціонару по 0,15–0,3 мг (1–2 табл.) 3 р/добу з інтервалом 6–8 год. впродовж 5–7 діб; при розвитку побічних ефектів разові дози поступово зменшувати протягом 2–3 діб, після чого, у разі необхідності, препарат відмінити. Р-н д/ін'єкц.: застосовують тільки дорослим в умовах стаціонару в/в, в/м або п/ш; при в/в введенні розводять 0,5–1,5 мл (0,05–0,15 мг) 0,01 % р-ну клонідину в 10–20 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду і вводять струминно повільно - протягом 3–5 хв. під суворим контролем за АТ; у тяжких випадках і тільки в умовах стаціонару можливі 3–4 введення на добу; в/м та п/ш вводять 0,5–1,5 мл (0,05–0,15 мг) нерозведеного р-ну клонідину; вища разова доза - 0,15 мг, МДД - 0,6 мг (розподілена на 4 введення).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сухість у роті, зниження апетиту/анорексія, нудота, блювання, запори, зниження шлункової секреції, абдомінальний біль, псевдообструкція товстого кишечника, біль у слинних залозах, у т.ч. навколоушній залозі, паротит; помірні транзиторні порушення функціональних тестів печінки, гепатит; брадикардія/тахікардія, застійна СН, набряки, зміни ЕКГ (блокада синусового вузла, вузлова брадикардія, високий ступінь AV-блокади, аритмії), ортостатична гіпотензія/колапс, пальпітація, с-ром Рейно, синкопе; астенія, втомлюваність, слабкість, головний біль; розлади сну, сонливість/безсоння, запаморочення, седація, тимчасові стани сплутаності свідомості, порушення сприйняття, зниження швидкості психічних та фізичних р-цій, тривожність, збудження, нервозність, депресія, яскраві та/або кошмарні сновидіння, делірій, галюцинації (зорові, слухові), парестезії, тремор; блідість/гіперемія шкіри, р-ції гіперчутливості, свербіж, висипання, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, алопеція; гінекомастія; транзиторне підвищення рівня глюкози, КФК в сироватці крові, затримка іонів натрію та води, що проявляється набряками нижніх кінцівок, збільшенням ваги; періодичні судоми литкових м'язів, міалгії, артралгії; закладеність носа, сухість слизової оболонки носа, порушення дихання; розлади акомодациї, нечіткість зору, зменшення слезовиділення, сухість очей, відчуття печіння в очах; утруднення та затримка сечовипускання, ніктурія, зниження потенції та/або лібідо, еректильна дисфункція; тромбоцитопенія; гарячка, нездужання, при раптовій відміні - с-ром відміни (різке підвищення АТ); слабопозитивна проба Кумбса, підвищення чутливості до алкоголю, при сублінгвальному застосуванні (при гіпертонічному кризі) - набряк слизових оболонок, утруднення дихання.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до клонідину або до будь-якого з допоміжних компонентів препарату; артеріальна гіпотензія, кардіогенний шок, порушення AV-провідності (AV блокада II і III ст.), виражена брадикардія, с-м слабкості синусного вузла, тяжка ІХС, нещодавній ІМ, порушення мозкового кровообігу, виражений атеросклероз судин головного мозку, тяжкі порушення периферичного кровообігу, облітеруючі захворювання периферичних артерій (у т.ч. с-м Рейно), депресивні стани (у т.ч. в анамнезі), одночасне застосування трициклічних антидепресантів, прийом алкоголю, етанолу; дитячий вік до 18 років; виражені порушення ф-кції нирок (у т.ч. ХНН); період вагітності або годування груддю.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,45 мг., парентерально - 0,45 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	КЛОФЕЛІН	ТОВ "Агрофарм", Україна	табл. у бл.	0,15мг	№10x5	1,08	
	КЛОФЕЛІН ІС	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. у бл.	0,1мг; 0,15мг; 0,3мг	№10x3		відсутня у реєстрі ОБЦ
	КЛОФЕЛІН ІС	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. у бл.	0,15мг	№10x5	1,33	
	КЛОФЕЛІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп. в пач.	0,15мг	№10x5	1,70	
	КЛОФЕЛІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл. у кор. та без	0,15мг	№10x3, №30		відсутня у реєстрі ОБЦ
	КЛОФЕЛІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю	табл. у бл. у кор.	0,15мг	№30x1	1,82	

		"Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна					
	КЛОФЕЛІН-3Н	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	р-н д/ін'ек. в амп. по 1мл у бл.	0,1 мг/мл	№5x2	60,34	
	КЛОФЕЛІН-3Н	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	р-н д/ін'ек. в амп. по 1мл у кор.	0,1 мг/мл	№10	60,34	
	КЛОФЕЛІН-3Н	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	табл. у бл.	0,15мг	№10x3, №10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Метилдопа (Methyldopa) **** (див. п. 12.3.8.5.1. розділу "УРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ, СЕКСОПАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: С02АВ01 - Антиадренергічні засоби з центральним механізмом дії.

Основна фармакотерапевтична дія: гіпотензивний лікарський засіб з центральним механізмом дії; потрапляючи у ЦНС, препарат чинить гіпотензивну дію завдяки своїм активним метаболітам (альфа-метил-епінефрину та альфа-метил-норепінефрину); стимулюючи альфа₂-адренорецептори нейронів стовбура мозку, він знижує тонус симпатичної нервової системи; помірно знижує рівень реніну у плазмі крові і загальний периферичний опір судин; пригнічуючи фермент допа-декарбоксілазу, зменшує синтез норадреналіну, допаміну, серотоніну і тканинну концентрацію норадреналіну та адреналіну; не чинить прямого впливу на ф-цію серця; хвилинний об'єм крові змінює мало; не спричиняє рефлекторну тахікардію, підвищує швидкість клубочкової фільтрації та нирковий кровообіг, та фракцію фільтрації; дещо зменшує ЧСС; ефективно знижує АТ у положенні лежачи на спині та у положенні стоячи, рідко спричиняє ортостатичну гіпотензію.

Показання для застосування ЛЗ: Артеріальна гіпертензія.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Зазвичай початкова доза для дорослих 250 мг 1 р/добу (перед сном) протягом перших 2 днів; потім добову дозу можна поступово збільшувати на 250 мг ч/з кожні 2 дні до досягнення адекватного зниження АТ; підтримуюча доза препарату зазвичай становить 500 мг - 2 г на добу, яку слід розподіляти на 2-4 прийоми. МДД не повинна перевищувати 3 г; якщо на тлі прийому препарату у дозі 2 г/добу відзначається недостатньо ефективно зниження АТ, рекомендується комбінувати з іншими антигіпертензивними засобами; толерантність до препарату може розвиватися, як правило, між другим і третім місяцем терапії; призначення додатково сечогінного засобу або збільшення дози метилдопи відновить ефективний контроль АТ; відміна метилдопи супроводжується оборотним підвищенням АТ, яке спостерігається, як правило, у межах 48 год.; препарат можна призначати пацієнтам, які вже отримують терапію іншими антигіпертензивними препаратами, за умови поступової відміни цих лікарських засобів, у таких випадках початкова доза метилдопи не повинна перевищувати 500 мг на добу; збільшення дози повинно відбуватися при необхідності, з інтервалом не менше 2 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: седація (зазвичай транзиторна), головний біль, парестезії, запаморочення, занепокоєння, депресія, психоз (помірний і тимчасовий), нічні кошмари, зниження лібідо, імпотенція; паркінсонізм, хореоатетоз, цереброваскулярна недостатність (може супроводжуватися гіпотензією), периферичний лицевий параліч (параліч Белла); зниження розумової активності, с-ром каротидного синусу, психічні розлади; загострення стенокардії, застійна СН, синусова брадикардія, гіперчутливість синусу сонної артерії, ортостатична гіпотензія; периферичні набряки, збільшення маси тіла, міокардит, перикардит, АВ блокада; панкреатит, коліт, блювання, діарея, сіалоденіт, запалення або забарвлення язика у чорний колір, нудота, блювання, запор, здуття живота, метеоризм, сухість у роті, глосодінія; жовтяниця, гепатит, холестаза, зміни показників ф-ції печінки, некротичний гепатит; пригнічення ф-ції кісткового мозку, лейкопенія, гранулоцитопенія, тромбоцитопенія, гемолітична анемія, еозинфілія, позитивний тест на антинуклеарні антитіла, клітини червоного вовчака, ревматоїдний фактор, позитивний тест Кумбса; васкуліт, пропасниця, спричинена препаратом, еозинфілія; гіперпролактинемія, гінекомастія, галакторея, аменорея, збільшення грудей; почервоніння; токсичний епідермальний некроліз, екзема або висип, схожий на лишай, ангіоневротичний набряк, кропив'янка; артралгія, опухання суглобів, м'язовий біль, міалгія; закладеність носа; позитивні показники тестів на антинуклеарні антитіла, LE-клітини та ревматоїдний фактор, підвищена активність печінкових трансаміназ, підвищення концентрації сечовини в крові; імпотенція, порушення сім'явиверження, сіалоденіт, збільшення грудей, гінекомастія, аменорея, розлад лактації, психічні розлади, включаючи кошмари, зворотні м'які психози або депресію, зниження лібідо.

Протипоказання до застосування ЛЗ: Гіперчутливість до компонентів лікарського засобу; порушення ф-ції печінки, пов'язані з попередньою терапією метилдопою; г.порушення ф-ції печінки (включаючи г.гепатит та активний цироз печінки); сумісне застосування з інгібіторами МАО; депресія; феохромоцитома; порфірія.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДОПЕГІТ®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл. .у фл. в кор.	250мг	№50x1	9,99	24,33/\$

2.6.2. Агоністи імідазолінових рецепторів

- **Моксонідин (Moxonidine)** ^(ГМД)

Фармакотерапевтична група: C02AC05 - антигіпертензивні ЛЗ. Агоністи імідазолінових рецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: є ефективним антигіпертензивним агентом; наявні експериментальні дані свідчать про те, що ЦНС є місцем антигіпертензивної дії моксонідину; є селективним агоністом імідазолінових рецепторів; ці імідазолін-чутливі рецептори сконцентровані у ростральному відділі вентролатеральної частини довгастого мозку - ділянці, яка вважається центром регуляції периферичної симпатичної нервової системи; стимуляція імідазолінових рецепторів сприяє зниженню активності симпатичної нервової системи і знижує АТ; моксонідин відрізняється від інших симпатолітичних антигіпертензивних засобів відносно низькою спорідненістю з відомими α_2 -адренорецепторами порівняно з імідазоліновими рецепторами; завдяки цьому седативний ефект і сухість у роті при застосуванні моксонідину виникають рідко; застосування моксонідину призводить до зменшення периферичного судинного опору з подальшим зниженням АТ.

Показання для застосування ЛЗ: АГ^{БНФ, ГМД}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для дорослих звичайна початкова доза - 0,2 мг 1 р/добу, а МДД - 0,6 мг, у два прийоми; максимальна разова доза - 0,4 мг^{БНФ}; дозу підбирати індивідуально; для пацієнтів з помірною або тяжкою нирковою недостатністю початкова доза становить 0,2 мг/добу, при необхідності та у разі доброї переносимості препарату дозу можна підвищити до 0,4 мг/добу для пацієнтів з помірною нирковою недостатністю і до 0,3 мг/добу для пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю; для хворих, які знаходяться на ГД, початкова доза становить 0,2 мг/добу, при необхідності та у разі доброї переносимості препарату дозу можна підвищити до 0,4 мг/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, запаморочення/вертиго, сонливість; непритомність; безсоння; брадикардія, гіпотензія; дзвін у вухах; сухість у роті; діарея, нудота, блювання, диспепсія; висипання, свербіж; ангіоневротичний набряк; біль у спині; біль у шиї; знервованість; астенія; набряк.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату або до будь-якого компонента препарату; СССВ; брадикардія в спокої нижче 50 уд./хв; АВ-блокада II та III ступеня; СН.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,3 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	МОКСОГАМА®	Ценексі САС (виробництво in-bulk)/Артезан Фарма ГмбХ і Ко. КГ (первинне та вторинне пакування, випуск серії), Франція/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	0,2мг; 0,3мг; 0,4мг	№25x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МОКСОГАМА®	Ценексі САС (виробництво in-bulk)/Артезан Фарма ГмбХ і Ко. КГ (первинне та вторинне пакування, випуск серії), Франція/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	0,2мг	№10x3	9,85	31,21/€
	МОКСОГАМА®	Ценексі САС (виробництво in-bulk)/Артезан Фарма ГмбХ і Ко. КГ (первинне та вторинне пакування, випуск серії), Франція/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	0,3мг	№10x3	7,87	31,21/€
	МОКСОГАМА®	Ценексі САС (виробництво in-bulk)/Артезан Фарма ГмбХ і Ко. КГ (первинне та вторинне пакування, випуск серії), Франція/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	0,4мг	№10x3	7,08	31,21/€
	МОКСОНІДИН КСАНТІС	Санека Фармасьютикалз АТ, Словачка Республіка	табл., вкриті п/о у бл.	0,2мг; 0,3мг; 0,4мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МОКСОНІДИН ФТ	ТОВ "Фармтехнологія", Республіка Білорусь	табл., вкриті п/о у бл.	0,2мг; 0,3мг; 0,4мг	№10x2, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФІЗІОТЕНС®	Майлан Лабораторіс САС (виробництво за повним циклом), Франція	табл., вкриті п/о у бл.	0,2мг; 0,3мг; 0,4мг	№14, №28, №98	відсутня у реєстрі ОБЦ	

2.6.3. Антиадренергічні засоби, гангліоблокатори

- **Гексаметоній (Hexamethonium)** ^(ГМД)

Фармакотерапевтична група: C02BC - антиадренергічні засоби, гангліоблокатори.

Основна фармакотерапевтична дія: антигіпертензивна дія; має гангліоблокуючий ефект тривалої дії; механізм дії зумовлений блокуванням вегетативних (симпатичних та парасимпатичних) гангліїв, що призводить до гальмування передачі нервового збудження з прегангліонарних на постгангліонарні волокна, дилатації артеріальних і венозних судин, зменшення загального периферичного опору судин і дуже швидкого різкого зниження АТ; гемодинамічний (вазодилатуючий) ефект супроводжується зменшенням тиску в легеневій артерії, депонуванням крові в розширених венах черевної порожнини і кінцівок, зменшенням тиску венозного повернення до серця; впливає на каротидні клубочки і хромафіну тканину надниркових залоз, що сприяє послабленню рефлекторних пресорних впливів; перериваючи проведення нервових імпульсів ч/з вегетативні нервові вузли,

змінює ф-ції органів, які забезпечені вегетативною інервациєю; спричиняє зниження АТ, моторики ШКТ, тонуус сечового міхура, секретії екзокринних залоз, порушує акомодацию, розширює бронхи, збільшує ЧСС.

Показання для застосування ЛЗ: спазми периферичних судин (ендартеріїт, переміжна кульгавість), гіпертонічний криз (у т. ч. ускладнений лівошлуночковою недостатністю), для контрольованої артеріальної гіпотензії^{ПМД}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають в/м, в/в або п/ш; режим дозування індивідуальний, у зв'язку з великою індивідуальною варіабельністю реакцій хворих; контрольована гіпотензія - вводять в/в 1-1,5 мл (25-37,5 мг) протягом 2 хв; гіпертонічний криз - для купірування вводять в/м або п/ш по 0,5-1 мл (12,5-25 мг); при необхідності можна проводити повторні ін'єкції (3-4 р/добу); спазми периферичних судин - вводять в/м або п/ш по 0,25-0,5 мл (6,25-12,5 мг) за 1 год до їди 2-4 р/добу; лікування проводять курсами по 2-4-6 тижнів з перервами в 1-3 тижні; максимальні дози для дорослих при в/м та п/ш введенні: разова - 3 мл (75 мг), МДД - 12 мл (300 мг); оскільки ефект при повторних введеннях поступово знижується, лікування починають із найменших доз, а потім дози поступово збільшують; дітям у невідкладній педіатрії вводять в/м або в/в - в/в вводять повільно (протягом 6-8 хв), р-нивши в 10-20 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду або глюкози; одноразові дози для дітей: до 2 років - 0,04-0,08 мл/кг (1-2 мг/кг), 2-4 роки - 0,02-0,08 мл/кг (0,5-2 мг/кг), від 5 років - 0,02 мл/кг (0,5 мг/кг).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: прискорення пульсу, тахікардія, біль у ділянці серця; слабкість, запаморочення, розширення зіниць, розлади акомодациї, короткочасне зниження пам'яті, дизартрія, пригнічення дихання; сухість у роті, дисфагія, запор; атонія кишечника і парез жовчного міхура; атонія сечового міхура, порушення сечовипускання із застоєм сечі, що сприяє розвитку циститу; ортостатична гіпотензія (аж до розвитку колапсу), ін'єкції судин склер.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату, артеріальна гіпотензія, гіповолемія і шок, феохромоцитома, ІМ в г. стадії, ішемічний інсульт (до 2 міс.), тромбози (у т. ч. мозкових артерій), закритокутова глаукома, печінкова і/або ниркова недостатність, дегенеративні зміни ЦНС.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БЕНЗОГЕКСОНІЙ -ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. в ампл. по 1мл у бл.	25 мг/мл	№5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БЕНЗОГЕКСОНІЙ -ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. в ампл. по 1мл у кор.	25 мг/мл	№10	280,51	
	БЕНЗОГЕКСОНІЙ -ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. в ампл. по 1мл у бл.	25 мг/мл	№10x1	281,81	

2.7. Вазодилататори

2.7.1. Вінцеводилатуючі засоби міотропної дії

- **Бендазол (Bendazol)** ** [ПМД] [тільки табл.]

Фармакотерапевтична група: C04AX - периферичні вазодилататори.

Основна фармакотерапевтична дія: вазодилатуючий і спазмолітичний засіб; має гіпотензивну, судинорозширювальну дію, стимулює ф-цію спинного мозку, має помірний імуностимулюючий ефект; чинить безпосередню спазмолітичну дію на гладенькі м'язи кровоносних судин і внутрішніх органів; спричиняє нетривалий (2-3 год.) і помірний гіпотензивний ефект, спричиняє нетривале розширення мозкових судин при хр. гіпоксії мозку, зумовленій місцевим порушенням кровообігу (склероз церебральних артерій); полегшує синаптичну передачу у спинному мозку; стимулює продукування антитіл, підсилює фагоцитарну активність лейкоцитів, макрофагів, поліпшує синтез інтерферону, але імуномодельючий ефект його розвивається повільно.

Показання для застосування ЛЗ: як додатковий засіб при спазмах кровоносних судин (гіпертонічні кризи, загострення АГ^{ПМД}) і гладких м'язів внутрішніх органів (спазми пілоруса шлунка, кишечника); при АГ як додаткова терапія; захворювання нервової системи - залишкові явища поліомієліту, периферичний параліч лицьового нерва, поліневрити, с-м млявого паралічу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим і дітям старше 12 років призначають в/в, в/м чи п/ш; для купірування гіпертонічних кризів вводять в/в чи в/м 3-5 мл 1 % р-ну (30-50 мг); при значному підвищенні АТ - в/м по 2-3 мл 1 % р-ну (20-30 мг) 2-3 р/добу; курс лікування призначається індивідуально, у середньому - 8-14 днів; внутрішньо (за 2 год до або ч/з 2 год після їди) по 20-40 мг 2-3 р/добу, максимальні дози для дорослих становлять: разова - 40 мг, МДД - 120 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: запаморочення, головний біль, відчуття серцебиття, біль у ділянці серця, погіршення показників ЕКГ у зв'язку зі зменшенням серцевого викиду, зниження АТ, сухий кашель, нежить, утруднене дихання, нудота, печіння у горлі, свербіж, гіперемія, висипання, кропив'янка, відчуття жару, підвищене потовиділення, почервоніння обличчя, р-ції гіперчутливості, локальна болючість у місці введення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; захворювання, що протікають зі зниженням м'язового тонуус, судомним с-мом, тяжкою СН; гіпотензія; хр. нефрит з набряками і порушенням азотовидільної ф-ції нирок; виразка шлунку і ДПК, яка кровоточить; дитячий вік до 12 років; ЦД.

Визначена добова доза (DDD): перорально/парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БЕНДАЗОЛ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	р-н д/ін'єк. в ампл. по 1мл, 5мл у бл.	10 мг/мл	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БЕНДАЗОЛ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	р-н д/ін'єк. в ампл. по 1мл у бл.	10 мг/мл	№5x2	28,00	
	БЕНДАЗОЛ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	р-н д/ін'єк. в ампл. по 1мл у пач.	10 мг/мл	№100	280,00	
	БЕНДАЗОЛ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	р-н д/ін'єк. в ампл. по 5мл у бл.	10 мг/мл	№5x2	60,00	
	БЕНДАЗОЛ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	р-н д/ін'єк. в ампл. по 5мл у пач.	10 мг/мл	№100	600,00	
	ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. в ампл. по 1мл у конт. чар/уп. або кор.	10 мг/мл	№5x2, №10	32,05	
	ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. в ампл. по 5мл у конт. чар/уп.	10 мг/мл	№5x2	73,06	
	ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп. у пач. та без	20мг	№10x1, №10	10,84	

- **Дипіридамо́л (Dipyridamole)** (див. п. 13.8.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Папаверин (Papaverine)**

Фармакотерапевтична група: А03AD01 - засоби, що застосовуються при функціональних розладах травної системи. Папаверин та його похідні.

Основна фармакотерапевтична дія: міотропний, спазмолітичний засіб; інгібітор ферменту фосфодіестерази, що спричиняє внутрішньоклітинне накопичення циклічного 3',5'-аденозинмонофосфату (цАМФ) і зниження вмісту Са; накопичення цАМФ призводить до порушення скоротливості гладеньких м'язів та їхнього розслаблення при спастичних станах; дія препарату на ЦНС виражена слабо, лише у підвищених дозах він проявляє деякий седативний ефект; знижує тонус, зменшує скорочувальну діяльність гладеньких м'язів і спричиняє у зв'язку з цим судинорозширювальну та спазмолітичну дію.

Показання для застосування ЛЗ: спазми гладких м'язів органів черевної порожнини (пілороспазм, с-м подразненого кишечника, холецистит, напади жовчокам'яної хвороби); спазми сечовивідних шляхів, ниркова колика; спазм судин головного мозку; спазми периферичних судин (ендартеріїт).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають п/ш, в/м та в/в; дорослим та дітям від 14 років препарат вводять по 0,5-2 мл (10-40 мг 2% р-ну); найефективніше в/в введення, яке проводять повільно, попередньо розвівши 1 мл 2% р-ну препарату (20 мг) у 10-20 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду; для пацієнтів літнього віку разова доза на початку лікування не має перевищувати 10 мг (0,5 мл 2% р-ну); максимальні дози для дорослих при в/в введенні: разова - 20 мг (1 мл 2 % р-ну), МДД - 120 мг (6 мл 2 % р-ну); при п/ш або в/м введенні: разова - 100 мг (5 мл 2 % р-ну), МДД - 300 мг (15 мл 2 % р-ну); дітям від 1 до 14 років застосовують 2-3 р/добу у разовій дозі 0,7-1 мг/кг маси тіла; МДД для дітей становить (незалежно від способу введення): у віці 1-2 роки - 20 мг (1 мл 2 % р-ну), 3-4 роки - 30 мг (1,5 мл 2 % р-ну), 5-6 років - 40 мг (2 мл 2 % р-ну), 7-9 років - 60 мг (3 мл 2 % р-ну), 10-14 років - 100 мг (5 мл 2 % р-ну); призначають дітям внутрішньо 3-4 р/добу, дози залежать від віку дитини: від 6 міс до 1 року - по 2,5-5 мг (¹/₄-¹/₂ табл.) на прийом, МДД - 10 мг (1 табл.); 1-2 роки - по 2,5-5 мг (¹/₄-¹/₂ табл.) на прийом, МДД - 20 мг (2 табл.); 3-4 роки - по 5-10 мг (¹/₂-1 табл.) на прийом, МДД - 30 мг (3 табл.); 5-6 років - по 10 мг (1 табл.) на прийом, МДД - 40 мг (4 табл.); 7-9 років - по 15 мг (1¹/₂ табл.) на прийом, МДД - 60 мг (6 табл.); 10-14 років - по 15-20 мг (1¹/₂-2 табл.) на прийом, МДД - 80 мг (8 табл.). Дітям віком до 3 років разову дозу препарату розтовкти, змішати з 1 ч. л. кип'яченої охолодженої води.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сонливість, підвищена пітливість, головний біль, слабкість, запаморочення; припливи, нездужання, підвищене потовиділення; порушення зору, диплопія; нудота, запор, діарея, анорексія, сухість у ротовій порожнині; жовтяниця, порушення ф-ції печінки, підвищення активності печінкових трансаміназ; аритмії, тахікардія, артеріальна гіпотензія, часткова або повна АВ блокада, асистолія, шлуночкова екстрасистолія, фібриляція шлуночків, тріпотіння шлуночків, колапс; еозинофілія; апное; р-ції гіперчутливості, у т.ч. з боку органів дихання, анафілактичний шок, свербіж, висипання на шкірі, кропив'янка, гіперемія шкіри верхньої частини тулуба, обличчя та рук; р-ції у місці введення, включаючи тромбоз у місці введення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату, артеріальна гіпотензія, порушення АВ провідності, коматозний стан, пригнічення дихання, одночасне застосування інгібіторів моноаміноксидази, глаукома, печінкова недостатність, бронхообструктивний с-м, вік від 75 років (ризик гіпертермії); супозиторії не застосовувати дітям.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,1 г., перорально - дитяча добова доза - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	ПАПАВЕРИН	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 2мл у пач.	20 мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПАПАВЕРИН	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 2мл у кор.	20 мг/мл	№100	11,75	
	ПАПАВЕРИН	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 2мл у бл.	20 мг/мл	№5x2	11,90	
	ПАПАВЕРИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 2мл у конт. чар/уп.	20 мг/мл	№5x2	12,97	
	ПАПАВЕРИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 2мл у бл.	20 мг/мл	№5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПАПАВЕРИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 2мл у бл.	20 мг/мл	№10x1	16,37	
	ПАПАВЕРИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 2мл у кор.	20 мг/мл	№10	16,37	
	ПАПАВЕРИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл. в кор.	10мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПАПАВЕРИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	10мг	№10	28,20	
	ПАПАВЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 2мл у бл.	20 мг/мл	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПАПАВЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 2мл у пач.	20 мг/мл	№10	13,65	

2.8. α –адреноблокатори

2.8.1. Селективні α1-адреноблокатори

- **Доксазозин (Doxazosin)** ^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: C02CA04 - антигіпертензивні засоби. Антиадренергічні засоби з периферичним механізмом дії. Блокатори α-адренорецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: потужний та селективний антагоніст постсинаптичних α₁-адренорецепторів; блокування яких призводить до зниження системного АТ; не спричиняє небажаних метаболічних ефектів і його можна застосовувати пацієнтам із ЦД, подагрою або інсулінорезистентністю; також можна призначати пацієнтам із БА, гіпертрофією лівого шлуночка та пацієнтам літнього віку; застосування доксазозину сприяє зменшенню гіпертрофії лівого шлуночка, пригнічує агрегацію тромбоцитів та підсилює активність тканинного активатора плазміногену; підвищує чутливість до інсуліну у тих пацієнтів, у яких така чутливість є порушеною; спричиняє помірне зниження концентрації загального холестерину, ліпопротеїдів низької щільності та тригліцеридів у плазмі крові, а отже може бути особливо корисний пацієнтам, хворим на АГ та гіперліпідемію; застосування доксазозину пацієнтам, хворим на симптомну доброякісну гіперплазію передміхурової залози (ДГПЗ), призводить до значного покращення уродинаміки та зменшення с-мів; вважається, що ефект препарату при ДГПЗ досягається за рахунок селективної блокади α₁-адренорецепторів, розташованих у м'язовій стромі та капсулі передміхурової залози, а також у шийці сечового міхура.

Показання для застосування ЛЗ: ДГБНФ, ГМД (як монотерапія або у комбінації з іншими ЛЗ, такими як тіазидні діуретики, β-блокатори, антагоністи кальцію або з інгібіторами АПФ); для лікування обструкції сечовивідних

шляхів, а також симптомів, пов'язаних із доброякісною гіперплазією передміхурової залози^{БНФ}, пацієнтам із доброякісною гіперплазією передміхурової залози як при наявності АГ, так і при нормальному рівні АТ.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: АГ - починати терапію з 1 мг 1 р/добу; цей режим використовується протягом 1-2 тижнів з метою звести до мінімуму ризик розвитку ортостатичної артеріальної гіпотензії та/або синкопе; ч/з 1-2 тижні доза може бути збільшена до 2 мг 1 р/добу; якщо необхідно, щоденна доза може бути послідовно збільшена ч/з такі ж самі інтервали до 4 мг, 8 мг та 16 мг^{БНФ}; у більшості пацієнтів відповідь на терапію спостерігається при застосуванні препарату у дозі 4 мг або нижчій; доброякісна гіперплазія передміхурової залози - початкова доза 1 мг 1 р/добу, щоб звести до мінімуму ризик розвитку ортостатичної артеріальної гіпотензії та/або синкопе, залежно від індивідуальних особливостей уродинаміки пацієнта та симптомів доброякісної гіперплазії передміхурової залози, дозу можна підвищити до 2 мг, потім до 4 мг і до максимальної рекомендованої дози - 8 мг, рекомендований інтервал підбору дози складає 1-2 тижні, звичайна рекомендована доза 2-4 мг/добу.^{БНФ}

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції дихальних шляхів, інфекції сечовивідних шляхів, лейкопенія, тромбоцитопенія, АР, подагра, підвищення апетиту, відсутність апетиту, збудження, депресія, тривожність, безсоння, нервозність, сонливість, запаморочення, головний біль, інсульт, гіпестезія, синкопе, тремор, ортостатичне запаморочення, парестезія, нечіткість зору, інтраопераційний синдром атонічної райдужної оболонки, вертиго, шум у вухах, посилене серцебиття, тахікардія, стенокардія, ІМ, брадикардія, серцеві аритмії, артеріальна гіпотензія, ортостатична артеріальна гіпотензія, припливи, бронхіт, кашель, задишка, риніт, носова кровотеча, бронхоспазм, біль у животі, диспепсія, сухість у роті, нудота, закріп, метеоризм, блювання, гастроентерит, діарея, відхилення від норми показників функції печінки, холестаза, гепатит, жовтяниця, свербіж, висипання на шкірі, кропив'янка, алопеція, пурпура, біль у спині, міалгія, артралгія, м'язові спазми, м'язова слабкість, цистит, нетримання сечі, дизурія, часте сечовипускання, гематурія, поліурія, підвищений діурез, розлади сечовипускання, ніктурія, імпотенція, гінекомастія, пріапізъм, ретроградна еякуляція, астенія, біль у грудній клітці, грипоподібні симптоми, периферичні набряки, біль у тілі, набряк обличчя, підвищена втомлюваність, загальне нездужання, збільшення маси тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до похідних хіназоліну (празозину, теразозину, доксазозину) або до будь-якої з допоміжних речовин препарату; із випадками ортостатичної гіпотензії в анамнезі; із доброякісною гіперплазією передміхурової залози та супутньою обструкцією верхніх сечовивідних шляхів, хр. інфекціями сечовивідних шляхів та наявністю каменів у сечовому міхурі; у період годування груддю; з артеріальною гіпотензією (стосується тільки пацієнтів із доброякісною гіперплазією передміхурової залози); у якості монотерапії протипоказаний пацієнтам із переповненням сечового міхура або анурією із прогресуючою нирковою недостатністю або без неї.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 4 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДОКСАЗОЗИН	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою , Україна/Україна/Україна	табл. у конт.	1мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДОКСАЗОЗИН	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою , Україна/Україна/Україна	табл. у бл. або бан.	1мг	№10x3, №30	13,86	
	ДОКСАЗОЗИН	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою , Україна/Україна/Україна	табл. у бл.	2мг	№10x2	12,63	
	ДОКСАЗОЗИН	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю	табл. у бл.	4мг	№10x2	9,52	

		"ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою , Україна/ Україна/Україна						
	ДОКСАЗОЗИН -КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	2мг, 4мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
II.	ЗОКСОН® 2	ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка	табл. у бл.	2мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
	ЗОКСОН® 4	ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка	табл. у бл.	4мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
	КАМІРЕН	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво, пакування, випуск серії та контроль якості готового лікарського засобу)/Марифарм д.о.о. (відповідальний за первинне та вторинне пакування), Словенія/Словенія	табл. у бл.	1мг, 2мг, 4мг	№10x2, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
	КАМІРЕН XL	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; відповідальний за контроль серій), Словенія	табл., вкриті п/о, з м/в у бл.	4мг	№10, №30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ		
	КАРДУРА®	Р-Фарм Джермані ГмбХ (виробництво препарату in bulk, контроль якості при випуску, пакування, випуск серії)/Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ (виробництво препарату in bulk, контроль якості при випуску, пакування, випуск серії), Німеччина/Німеччина	табл. у бл.	1мг	№10x3	46,84	25,58/\$	
	КАРДУРА®	Р-Фарм Джермані ГмбХ (виробництво препарату in bulk, контроль якості при випуску, пакування, випуск серії)/Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ (виробництво препарату in bulk, контроль якості при випуску, пакування, випуск серії), Німеччина/Німеччина	табл. у бл.	2мг	№10x3	28,13	25,58/\$	
	КАРДУРА®	Р-Фарм Джермані ГмбХ (виробництво препарату in bulk, контроль якості при випуску, пакування, випуск серії)/Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ (виробництво препарату in bulk, контроль якості при випуску, пакування, випуск серії), Німеччина/Німеччина	табл. у бл.	4мг	№10x3	17,57	25,58/\$	
	МАГУРОЛ	Медокемі ЛТД (Центральний Завод), Кіпр	табл. у бл.	4мг	№10x2	9,43	31,43/€	

• **Урапідил (Urapidil)** ^{[1][МД]}

Фармакотерапевтична група: С02СА06 - гіпотензивні засоби. Блокатори α -адренорецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: має центральний та периферичний механізми дії; на периферії - переважно блокує постсинаптичні α -1-адренорецептори, таким чином, блокує судинозвужувальну дію катехоламінів; на центральному рівні модулює активність центру регуляції кровообігу, що запобігає рефлекторному збільшенню тонуусу симпатичної нервової системи чи зниженню симпатичного тонуусу; призводить до зниження систолічного та діастолічного тиску шляхом зниження периферичного опору; ЧСС залишається практично незмінною; серцевий викид не змінюється; зниження серцевого викиду виникає внаслідок збільшення постнавантаження.

Показання для застосування ЛЗ: гіпертензивний криз; рефрактерна, тяжка або дуже тяжка ступінь АГ; контрольоване зниження АТ при його збільшенні під час/або після хірургічної операції; АГ ^{[1][МД]}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при гіпертензивному кризі, тяжкій формі АГ, рефрактерній гіпертензії: в/в: 10-50 мг повільно під контролем АТ; зниження АТ спостерігається протягом 5 хв після ін'єкції; залежно від клінічного ефекту можливе повторне в/в введення; для підтримання АТ на рівні, досягнутому за допомогою ін'єкцій, препарат вводять шляхом інфузій: в/в краплинна інфузія: 250 мг урапідилу (50 мл) додають до 500 мл 0,9 % р-ну

натрію хлориду для інфузій або 5 % чи 10 % р-ну глюкози для інфузій. В/в інфузія за допомогою перфузатора: 100 мг урапідилу (20 мл) набирають у перфузатор і розводять до об'єму 50 мл 0,9 % р-ном натрію хлориду для інфузій або 5 % чи 10 % р-ном глюкози для інфузій, максимально допустиме співвідношення - 4 мг/1 мл р-ну для інфузій; швидкість крап. введення залежить від індивідуальної реакції АТ, рекомендована максимальна початкова швидкість - 2 мг/хв, підтримуюча доза - в середньому 9 мг/год, тобто 250 мг препарату у 500 мл р-ну для інфузій (1 мг = 44 краплі = 2,2 мл); кероване зниження АТ при його збільшенні під час/або після хірургічної операції: в/в ін'єкція 25 мг урапідилу (5 мл препарату), якщо зниження АТ ч/з 2 хв, то стабілізація АТ за допомогою інфузії, спочатку швидкість введення - до 6 мг за 1-2 хв, потім її зменшують, якщо ч/з 2 хв АТ не змінюється, то в/в ін'єкція 25 мг урапідилу (5 мл препарату), якщо зниження АТ ч/з 2 хв, то стабілізація АТ за допомогою інфузії, якщо ч/з 2 хв АТ не змінюється, то повільне в/в введення препарату (50 мг) (= 10 мл р-ну для ін'єкцій); препарат вводять в/в пацієнтам, які знаходяться у положенні лежачи на спині; дозу можна вводити шляхом однієї або декількох ін'єкцій або повільної в/в інфузії; ін'єкції можна комбінувати з подальшою повільною інфузією; починати регулярне лікування пероральними гіпотензивними засобами можна під час курсу невідкладної парентеральної терапії урапідилом; капс. з пролонгованою дією: для поступового зниження АТ рекомендована доза по 30 мг 2 р/добу; для швидкого зниження АТ рекомендована доза по 60 мг 2 р/добу; дозування призначають індивідуально; загальну кількість від 60 мг до 180 мг на день розділити на 2 окремих дозування; капс. приймати зранку та ввечері, під час їди та ковтати цілими, запиваючи невеликою кількістю рідини, лікування АГ вимагає регулярного медичного моніторингу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: серцебиття, тахікардія, брадикардія, відчуття тиску або болі за грудиною (с-ми, аналогічні стенокардії), утруднене дихання, аритмії, ортостатична дисрегуляція (зниження АТ при зміні положення тіла), нудота, блювання, діарея, сухість у роті; втомлюваність, астенія, запаморочення, головний біль, занепокоєння, пріапізм, закладеність носа, посилене потовиділення, симптоми шкірних АР (свербіж, висипи, екзантема), набряк Квінке; тромбоцитопенія, ангіоневротичний набряк, кропив'янка; зміни у місці введення; транзиторне збільшення печінкових ферментів; розлади сну; позиви до сечовипускання, нетримання сечі.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату; аортальний стеноз, артеріовенозний шунт (за винятком гемодинамічно неактивного шунта для діалізу); вагітність та лактація.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,12 г., парентерально - 50 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕБРАНТИЛ	Такеда ГмбХ, місце виробництва Оранієнбург, Німеччина	капс. прол. дії тверді у фл.	30мг, 60мг	№50, №100	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕБРАНТИЛ	Такеда ГмбХ, місце виробництва Оранієнбург, Німеччина	капс. прол. дії тверді у фл.	60мг	№50	8,40	29,38/€
	ЕБРАНТИЛ	ЕЙДЖЕС ГмбХ ІМЕД (контроль якості («Стерильність»))/Такеда Австрія ГмбХ (виробництво за повним циклом), Австрія/Австрія	р-н д/ін'єк. в амп. по 5мл, 10мл у кор.	5 мг/мл	№10, №50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕБРАНТИЛ	ЕЙДЖЕС ГмбХ ІМЕД (контроль якості («Стерильність»))/Такеда Австрія ГмбХ (виробництво за повним циклом), Австрія/Австрія	р-н д/ін'єк. в амп. по 5мл у кор.	5 мг/мл	№5	120,06	29,76/€
	ЕБРАНТИЛ	ЕЙДЖЕС ГмбХ ІМЕД (контроль якості («Стерильність»))/Такеда Австрія ГмбХ (виробництво за повним циклом), Австрія/Австрія	р-н д/ін'єк. в амп. по 10мл у кор.	5 мг/мл	№5	81,96	29,76/€
	ТАХИБЕН®	ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ (Відповідальний за випуск серії)/СЕНЕКСІ (Виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості), Австрія/Франція	р-н д/ін'єк. в амп. по 5мл у кор.	5 мг/мл	№5	100,01	29,24/€
	ТАХИБЕН®	ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ (Відповідальний за випуск серії)/СЕНЕКСІ (Виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості), Австрія/Франція	р-н д/ін'єк. в амп. по 10мл у кор.	5 мг/мл	№5	70,01	29,24/€
	ТАХИБЕН®	ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ (відповідальний за випуск серії)/СЕНЕКСІ (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості), Австрія/Франція	конц. д/р-ну д/інфуз. в амп. по 20мл	5 мг/мл	№5	102,98	24,31/€

2.9. Діуретики

2.9.1. Петльові діуретики

• **Торасемід (Torasemide)** [ПМД]

Фармакотерапевтична група: C03CA04 - сечогінні препарати. Високоактивні діуретики. Прості препарати сульфамідів.

Основна фармакотерапевтична дія: механізм діуретичної дії зумовлений пригніченням ренальної абсорбції іонів натрію та хлору у висхідній частині петлі Генле; діуретичний ефект в основному пов'язаний із рівнем екскреції компонента з сечею, а не з концентрацією у крові; прискорює виведення з сечею натрію, хлору та води, але суттєво не впливає на рівень гломерулярної фільтрації, нирковий плазмотік, кислотно-лужний баланс; у випадку СН зменшує прояви захворювання та покращує функціонування міокарду за рахунок зменшення пре- та постнавантаження, знижує АТ за рахунок зниження загального периферичного опору судин; цей вплив пояснюється нормалізацією порушеного електричного балансу судин чином за рахунок зменшення підвищеної активності вільних іонів кальцію у клітинах м'язів артеріальних судин, що було виявлено у хворих, які страждають на АГ, знижує підвищену сприйнятливості судин до ендогенних вазопресорних речовин, катехоламінів. діуретичний ефект швидко досягає свого максимуму впродовж перших 2-3 год. після в/в та перорального застосування відповідно і залишається постійним впродовж майже 12 год. Після перорального застосування антигіпертензивна дія торасеміду розвивається поступово, починаючи з першого тижня після початку лікування; максимум антигіпертензивної дії досягається не пізніше ніж ч/з 12 тижнів.

Показання для застосування ЛЗ: лікування набряків^{БНФ} і профілактика рецидивів набряків та/або випотів, спричинених застоєм СН, захворюваннями нирок або печінки; лікування есенціальної гіпертензії^{БНФ, ПМД} у вигляді монотерапії або у комплексній терапії з іншими гіпотензивними засобами; лікування набряків та/або випотів, спричинених СН, якщо необхідне в/в застосування ЛЗ (набряк легень внаслідок г.СН).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл. по 10мг: лікування розпочати із застосування добової дози 5 мг^{БНФ}, що дорівнює ½ табл. препарату по 10 мг; ця доза вважається підтримуючою; якщо добова доза 5 мг є недостатньою, то застосовувати добову дозу 10 мг, яку призначати щоденно; залежно від тяжкості стану пацієнта добова доза може бути збільшена до 20 мг^{БНФ}; табл. по 5 мг: есенціальна гіпертензія: лікування розпочати із застосування ½ табл. на добу, що еквівалентно 2,5 мг^{БНФ} торасеміду; зниження АТ відбувається поступово, вже впродовж першого тижня лікування, та досягає максимального значення не пізніше 12 тижнів; якщо нормалізація АТ при щоденному застосуванні ½ табл. не відбувається ч/з 12 тижнів лікування, то добова доза може бути підвищена до 1 табл., що еквівалентно 5 мг^{БНФ} торасеміду; не слід перевищувати добову дозу, що дорівнює 1 табл., оскільки при цьому не очікується подальшого зниження АТ; набряки та/або випоти на фоні СН: терапію розпочинати з дози 5 мг на добу, у разі відсутності необхідної сечогінної дії дозу слід збільшити до 20-40 мг/добу до досягнення необхідного ефекту; у разі набряку, пов'язаного з цирозом печінки, торасемід сумісно застосовують з препаратами-антагоністами альдостерону або калійзберігаючими діуретиками, даних щодо одноразового прийому доз понад 40 мг на добу немає. Р-н д/ ін'єкц.: набряки та/або випоти, спричинені СН - лікування розпочати із застосування разової дози 10 мг торасеміду на добу, якщо ефект недостатній, то разову дозу можна збільшити до 20 мг торасеміду; якщо ефект і в цьому випадку буде недостатній, можна застосувати короткочасну (впродовж не більше 3 діб) терапію із введенням добової дози 40 мг торасеміду; при г.набряку легень - лікування треба починати з в/в введення разової дози 20 мг торасеміду; залежно від ефекту цю дозу можна повторити з інтервалом у 30 хв.; забороняється перевищувати максимальну добову дозу 100 мг торасеміду.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: запаморочення, головний біль, сонливість; діарея, біль у животі, метеоризм, втрата апетиту, запор, панкреатит; збільшення частоти сечовиділення, поліурія, ніктурія; гіперхолестеринемія, гіперліпідемія, полідипсія, невідкладні позиви до сечовипускання; судоми нижніх кінцівок; екстрасистолія, відчуття серцебиття, тахікардія, почервоніння обличчя, ксеростомія; носові кровотечі; астенія, спрага, слабкість, втомлюваність, підвищена активність, нервозність; підвищення рівня тромбоцитів; посилення метаболічного алкалозу, тригліцеридемія, гіпонатріємія; кардіальна та церебральна ішемія, аритмія, стенокардія, г.ІМ, тромбоемболічні ускладнення; підвищення рівня креатиніну та сечовини у сироватці крові; при позивах до сечовипускання (наприклад, при гіпертрофії передміхурової залози) підвищене утворення сечі може призвести до її затримки та надмірного розтягування сечового міхура; підвищення рівня печінкових ферментів (гамма-глутаміл-транспептидази у крові); шкірні р-ції (свербіж, екзантема, фотосенсибілізація), тяжкі шкірні р-ції; тромбоцитопенія, лейкопенія; нудота, блювання, гіперглікемія, гіперурикемія, гіпокаліємія, гіповолемія, артеріальна гіпотензія, імпотенція, тромбоз шунта, синкопе; сплутаність свідомості, парестезія кінцівок, розлади зору, шум у вухах, втрата слуху. Після в/в застосування - гострі, потенційно небезпечні для життя р-ції гіперчутливості (анафілактичний шок).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до торасеміду, похідних сульфонілсечовини або до будь-якого з компонентів препарату; ниркова недостатність, яка супроводжується анурією, ниркова недостатність з прогресуючою азотемією або після прийому препаратів, що викликають ураження нирок; порушенням сечовипускання, печінкова кома або прекома, артеріальна гіпотензія, гіповолемія, гіпонатріємія, гіпокаліємія, г. порушення сечовипускання внаслідок гіпертрофії передміхурової залози, період годування груддю; табл: рідкісна спадкова непереносимість галактози, лактазна недостатність або порушення всмоктування глюкози-галактози.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 15 мг., парентерально - 15 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДІУТОР®	Приватне акціонерне товариство "Лекхім – Харків" (відповідальний за виробництво та контроль/випробування серії, не включаючи випуск серії)/ТОВ НВФ "МІКРОХІМ" (відповідальний за	р-н д/ін'єк. по 4мл в амп. у касеті	5 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	контроль/випробування серії, включаючи випуск серії; відповідальний за виробни, Україна/Україна					
ТОРАДІВ	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x9	5,21	
ТОРАДІВ	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x3	6,07	
ТОРАДІВ	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (весь виробничий процес ГЛЗ, з урахуванням випуску серії)/ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" (весь виробничий процес ГЛЗ, за винятком випуску серії), Україна/Україна	р-н д/ін'єк., у фл. по 4мл в конт. чар/уп.	5 мг/мл	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ТОРАДІВ	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (весь виробничий процес ГЛЗ, з урахуванням випуску серії)/ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" (весь виробничий процес ГЛЗ, за винятком випуску серії), Україна/Україна	р-н д/ін'єк., в амп. по 4мл у бл.	5 мг/мл	№5x1	33,42	
ТОРАДІВ	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (весь виробничий процес ГЛЗ, з урахуванням випуску серії)/ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" (весь виробничий процес ГЛЗ, за винятком випуску серії), Україна/Україна	р-н д/ін'єк., в амп. по 4мл у пач.	5 мг/мл	№5	33,42	
ТОРАРЕН	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x1, №10x8	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ТОРАРЕН	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x3	3,78	
ТОРАСЕМІД	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл, 4мл в амп. у бл. та пач.	5 мг/мл	№5x1, №5x2, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ТОРАСЕМІД	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 4мл в амп. у бл.	5 мг/мл	№5x1	26,25	
ТОРАСЕМІД	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 4мл в амп. у пач.	5 мг/мл	№100	26,25	
ТОРАСЕМІД	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x3	4,31	
ТОРАСЕМІД-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 4мл в амп. у конт. чар/уп.	20мг/4мл	№5x1	23,13	
ТОРАСЕМІД-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	5мг	№10x3	8,71	
ТОРАСЕМІД-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	10мг	№10x10	3,54	
ТОРАСЕМІД-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	10мг	№10x3	4,43	
ТОРАСЕМІД-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (повний цикл виробництва та випуск серії)/ Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії циклу виробництва крім випуску серії), Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 4мл у фл. в конт. чар/уп.	5 мг/мл	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ТОРАСЕМІД-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (повний цикл виробництва та випуск серії)/ Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії циклу	р-н д/ін'єк. по 4мл в амп. у бл.	5 мг/мл	№5x1	31,66	

		виробництва крім випуску серії), Україна/Україна					
	ТОРАСЕМІД- ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (повний цикл виробництва та випуск серії)/ Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії циклу виробництва крім випуску серії), Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 4мл в амп. у пач.	5 мг/мл	№5	31,66	
	ТОРСИД®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТОРСИД®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x1	13,80	
	ТОРСИД®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТОРСИД®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x9	5,00	
	ТОРСИД®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x3	7,00	
	ТОРСИД®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл, 4мл в амп. у пач. та бл.	5 мг/мл	№5, №5x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТОРСИД®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 4мл в амп. у бл.	5 мг/мл	№5x1	26,25	
II.	БРИТОМАР	Феррер Інтернаціональ, С.А., Іспанія	табл. прол. дії у бл.	5мг	№15x2	12,22	30,24/€
	БРИТОМАР	Феррер Інтернаціональ, С.А., Іспанія	табл. прол. дії у бл.	10мг	№15x2	7,49	30,24/€
	ТОРАСЕМІД САНДОЗ®	Салютас Фарма ГмБХ (виробництво за повним циклом)/Лек С.А. (виробництво за повним циклом; первинне та вторинне пакування, випуск серії), Німеччина/Польща	табл. у бл.	5мг, 10мг, 20мг, 50мг, 100мг, 200мг	№10x2, №10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТОРАСЕМІД- ТЕВА	ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія	табл. у бл.	5мг, 10мг	№10x2, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТОРІКАРД	Гетеро Лабз Лімітед/Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Індія/Індія	табл. у бл.	5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТОРІКАРД	Гетеро Лабз Лімітед/Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Індія/Індія	табл. у бл.	10мг	№10x3	4,64	
	ТОР-ЛУП	Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт III), Індія	табл. у бл.	10мг	№10x3	5,00	25,52/\$
	ТРИГРИМ	Фармацевтичний завод "Польфарма" С.А., Польща	табл. у бл.	10мг	№10x3	5,44	25,02/\$
	ТРИФАС® 10	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво таблеток in bulk; контроль серії; кінцеве пакування, контроль та випуск серії), Німеччина	табл. у бл.	10мг	№10x10	4,36	26,41/€
	ТРИФАС® 10	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво таблеток in bulk; контроль серії; кінцеве пакування, контроль та випуск серії), Німеччина	табл. у бл.	10мг	№10x5	4,75	26,41/€
	ТРИФАС® 10	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво таблеток in bulk; контроль серії; кінцеве пакування, контроль та випуск серії), Німеччина	табл. у бл.	10мг	№10x3	5,28	26,41/€
	ТРИФАС® 10 АМПУЛИ	А. Менаріні Мануфактурінг, Логістікс енд Сервісес С.р.Л., Італія	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у кор.	10мг/2мл	№5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТРИФАС® 20 АМПУЛИ	А. Менаріні Мануфактурінг, Логістікс енд Сервісес С.р.Л., Італія	р-н д/ін'єк. по 4мл в амп. у кор.	20мг/4мл	№5	19,13	26,41/€
	ТРИФАС® COR	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво таблеток in bulk; контроль серії; кінцеве пакування, контроль та випуск серії), Німеччина	табл. у бл.	5мг	№10x3	10,23	26,93/€

• **Фуросемід (Furosemide)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: C03CA01 - високоактивні діуретики. Препарати сульфамідів.

Основна фармакотерапевтична дія: петльовий діуретик швидкої дії, що має відносно сильний та короточасний діуретичний ефект; блокує Na+K+2Cl-котранспортер, розташований у базальних мембранах клітин товстого сегмента висхідної частини петлі Генле: ефективність салуретичної дії фуросеміду, т.ч., залежить від того, чи потрапляє ЛЗ до каналців у місцях просвітів шляхом аніоно-транспортного механізму; діуретичний ефект виникає у результаті інгібування реабсорбції натрію хлориду у цьому сегменті петлі Генле; внаслідок цього фракційна екскреція натрію може досягати 35 % гломерулярної фільтрації натрію; вторинні ефекти збільшеної екскреції натрію полягають у підвищеному виведенні сечі (завдяки осмотично зв'язаній воді) та у збільшеній дистальній каналцевої секреції калію; підвищується екскреція іонів кальцію та магнію; спричинює дозозалежну стимуляцію системи ренін-ангіотензин-альдостерон; при СН призводить до г. зменшення серцевого переднавантаження (шляхом звуження емкісних венозних судин); цей ранній судинний ефект є простагландинопосередкованим та припускає адекватну ф-цію нирок з активацією системи ренін-ангіотензин і неушкодженим синтезом простагландинів; окрім цього, завдяки натрійуретичному ефекту знижує реактивність судин відносно катехоламінів, яка збільшена у хворих з АГ; антигіпертензивна ефективність пояснюється збільшеною екскрецією натрію, зниженим об'ємом крові та зменшеною відповіддю гладеньких м'язів судин на стимуляцію вазоконстрикторами або судинозвужувальними засобами. Початок діуретичного ефекту спостерігається протягом 1 год. після перорального прийому; безперервна інфузія фуросеміду є більш ефективною, ніж повторні болюсні ін'єкції; окрім певної болюсної дози лікарського засобу, не спостерігається значного збільшення ефекту.

Показання для застосування ЛЗ: набряки^{БНФ, ВОЗ} при хр. застійній СН (якщо необхідне лікування із застосуванням діуретиків), при г. застійній СН, при нефротичному с-мі (якщо необхідне лікування із застосуванням діуретиків), при захворюваннях печінки (у разі необхідності - для доповнення лікування із застосуванням антагоністів альдостерону), при хр. нирковій недостатності; г. ниркова недостатність, у т.ч. у вагітних або під час пологів; АГ^{БНФ, ПМД}; гіпертензивний криз (як підтримуючий засіб)^{ПМД}, підтримка форсованого діурезу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для дорослих МДД 1500 мг^{БНФ}, для дітей доза для парентерального введення 1 мг/кг маси тіла, але МДД не вище 20 мг, для р/ос прийому 2 мг/кг маси тіла, але МДД не вище 40 мг; набряки при хр.застійній СН - початкова доза ЛЗ для р/ос прийому 20-50 мг/добу, на 2-3 прийоми; набряки при нефротичному с-мі - початкова доза р/ос 40-80 мг/добу; набряки при г. застійній СН - початкова доза 20-40 мг у вигляді болюсної ін'єкції, можна регулювати дозу відповідно до терапевтичної відповіді пацієнта; при г.нирковій недостатності - початкова доза 40 мг у вигляді в/в ін'єкції, якщо призначення даної дози не призводить до бажаного збільшення виведення рідини, можна призначати у вигляді безперервної в/в інфузії, розпочинаючи з введення від 50 мг до 100 мг/1 год; набряки при захворюваннях печінки - як доповнення до терапії антагоністами альдостерону у тих випадках, коли застосування лише антагоністів альдостерону є недостатнім, дозу обережно титрувати, щоб забезпечити поступову початкову втрату рідини, в/в початкова разова доза 20-40 мг, початкова добова р/ос доза 20-80 мг; гіпертензивний криз - початкова доза 20-40 мг у вигляді в/в болюсної ін'єкції; підтримка форсованого діурезу у випадку отруєння - початкова доза 20-40 мг в/в; в/в призначати у вигляді повільної ін'єкції або інфузії зі швидкістю не більше 4 мг/хв; пацієнтам із вираженими порушеннями ф-ції печінки (креатинін сироватки крові > 5 мг/дл) вводити інфузію зі швидкістю не більше 2,5 мг/хв; у вигляді в/м ін'єкції обмежувати лише винятковими випадками, коли недоцільний прийом внутрішньо та в/в введення. Набряки при ХНН: слід обережно титрувати дозу для забезпечення поступової початкової втрати рідини; для дорослих пацієнтів - застосування такої дози, що призводить до денного зменшення маси тіла приблизно на 2 кг (приблизно 280 ммоль Na⁺), рекомендована початкова добова доза для перорального прийому 40-80 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: порушення електролітного балансу (в т.ч. з клінічними проявами), зневоднення і гіповолемія, особливо у пацієнтів літнього віку; підвищення рівнів креатиніну, тригліцеридів у крові; гіпонатріємія, гіпохлоремія, гіпокаліємія; підвищення рівнів, сечової к-ти у крові; напади подагри, зниження толерантності до глюкози, перебіг ЦД може перейти із латентної форми у маніфестну, гіпокальціємія, гіпомангіємія, підвищення рівня сечовини у крові, метаболічний алкалоз, псевдо-с-м Барттера, гіпотензія, в т.ч. ортостатична гіпотензія, васкуліт, тромбоз, збільшення об'єму сечі, тубуло-інтерстиційний нефрит; підвищення рівнів натрію, хлору в сечі; затримка сечі (у пацієнтів з частковою обструкцією відтоку сечі); нефрокальциноз/нефролітіаз у недоношених немовлят; ниркова недостатність, нудота, блювання, діарея, г. панкреатит, холеста, підвищення рівнів трансаміназ, порушення слуху, глухота, дзвін у вухах, запаморочення, втрата свідомості, головний біль; свербіж, кропив'янка, висипання, бульозний дерматит, мультиформна еритема, пемфігоїд, ексфолиативний дерматит, пурпура, р-ція фоточутливості, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, г. генералізований екзантематозний пустульоз і DRESS-с-м (медикаментозне висипання з еозинофілією і системною симптоматикою), важкі анафілактичні або анафілактоїдні р-кції (зокрема такі, що супроводжуються шоком), парестезія, печінкова енцефалопатія у пацієнтів з гепатоцелюлярною недостатністю, гемоконцентрація, тромбоцитопенія, лейкопенія, еозинофілія, агранулоцитоз, апластична анемія або гемолітична анемія, підвищений ризик незарощення артеріальної протоки, при призначенні недоношеним немовлятам протягом перших тижнів життя, підвищення т^о тіла, місцеві р-ції, біль після в/м ін'єкції; загострення або активація системного червоного вовчачка; рабдоміоліз, часто на фоні важкої гіпокаліємії.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до фуросеміду або до інших компонентів, що входять до складу препарату, у пацієнтів з алергією на сульфонаміди (на сульфонамідні а/б або сульфанілсечовину) може виявитися перехресна чутливість до фуросеміду; гіповолемія або зневоднення організму; ниркова недостатність у вигляді анурії, в яких не спостерігається терапевтична відповідь на фуросемід; ниркова недостатність внаслідок отруєння нефротоксичними або гепатотоксичними препаратами; тяжка гіпокаліємія; тяжка гіпонатріємія; прекоматозний та коматозний стани, що асоціюються з печінковою енцефалопатією; не слід призначати у період вагітності, годування груддю.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 40 мг., парентерально - 40 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ФУРОСЕМІД	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	40мг	№10x5	0,22	
	ФУРОСЕМІД	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"/Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофарм", Україна/Україна	табл. у бл.	40мг	№10x5	0,15	
	ФУРОСЕМІД	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у бл.	10 мг/мл	№10x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФУРОСЕМІД	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у пач.	10 мг/мл	№10	5,39	
	ФУРОСЕМІД	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою , Україна	табл. у бл.	40мг	№10x5	0,19	
	ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	40мг	№10x5	0,13	
ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у конт. чар/уп.	10 мг/мл	№10x1, №5x2	4,17		
II.	ЛАЗИКС®	Санofi Індія Лімітед, Індія	табл. у стрип.	40мг	№15x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛАЗИКС® НЕО	С.С. "Зентіва С.А.", Румунія	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у кор.	10 мг/мл	№10	13,88	27,08/\$
	ФУРОСЕМІД СОФАРМА	АТ "Софарма", Болгарія	табл. у бл.	40мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

2.9.2. Тіазидові та тіазидоподібні діуретики

- **Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) *** [ПМД]

Фармакотерапевтична група: С03АА03 - тіазидні діуретики.

Основна фармакотерапевтична дія: головним механізмом дії є блокування реабсорбції іонів натрію та хлору у дистальних ниркових каналах, унаслідок цього зростає екскреція іонів натрію, хлору, що призводить до збільшення виведення води і надалі - калію та магнію; за рахунок діуретичного ефекту знижується об'єм плазми крові, посилюється активність реніну плазми та виведення альдостерону, в результаті чого посилюється виведення калію та бікарбонатів з сечею і зменшується рівень калію в сироватці крові; ренін-альдостероновий зв'язок опосередкований ангіотензином II, тому при одночасному введенні антагоністів рецептору ангіотензину II може спостерігатися зворотний вплив на зумовлене тіазидними діуретиками виведення калію; чинить слабкий інгібуєчий вплив на карбоангідазу; за рахунок цього він помірно посилює виведення бікарбонатів, не зумовлюючи істотних змін рН сечі.

Показання для застосування ЛЗ: АГ^{ПМД} (як монотерапія або у комбінації з іншими антигіпертензивними ЛЗ)^{вооз}, набряковий с-м^{вооз} при ССЗ, хворобах печінки та нирок; передменструальні набряки^{вооз}, набряки^{вооз}, спричинені прийомом ліків (ГК); симптоматичне лікування зменшення поліурії (парадоксальним чином), головним чином при нецукровому діабеті^{вооз} ниркового походження; зниження гіперкальціурії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для лікування набряків початкова доза 25^{вооз}-100 мг (залежно від клінічної ефективності) 1 р/добу або ч/з день, залежно від терапевтичного ефекту дозу можна зменшити до підтримувальної - 25-50 мг 1 р/добу; при вираженому набряковому с-ромі може бути необхідною початкова доза 200 мг; як антигіпертензивний засіб призначають у початковій добовій дозі 25^{вооз}-100 мг на 1 прийом у вигляді монотерапії або у комбінації з іншими гіпотензивними ЛЗ, в окремих випадках ефективно застосування у

початковій дозі 12,5 мг^{вооз}, при необхідності дозу підвищують, МДД -100 мг, гіпотензивна дія проявляється протягом 3-4 днів, для досягнення оптимального ефекту може знадобитися до 3-4 тижнів, після закінчення лікування гіпотензивний ефект зберігається близько 1 тижня; при передменструальному набряку звичайна доза 25 мг/добу, її застосовувати у період від початку прояву симптомів до початку менструації; при нецукровому діабеті для зменшення поліурії звичайна добова доза 50^{вооз}-150 мг (у кілька прийомів); для дітей віком від 2 до 12 років середня добова доза - 1-2 мг/кг маси тіла або 30-60 мг/м² одноразово (37,5-100 мг на добу).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: лейкоцитопенія, агранулоцитоз, тромбоцитопенія, гемолітична анемія, апластична анемія, гіпокаліємія, гіпонатріємія, гіпомагніємія, гіперкальціємія, гіперглікемія, глюкозурія, гіперурикемія, при застосуванні високих доз можливе підвищення рівнів ліпідів крові, аритмія, ортостатична артеріальна гіпотензія, запаморочення, головний біль, судороги, парестезія, сплутаність свідомості, в'ялість, нервозність, зміни настрою, транзиторне порушення зору, ксантопісія, вторинна г. закритокутова глаукома та/або г.короткозорість; сухість у роті, відчуття спраги, відсутність апетиту, нудота, блювання, запалення слинних залоз, запор, жовтяниця (жовтяниця, зумовлена внутрішньопечінковим холестазом), панкреатит, холецистит, ниркова недостатність, інтерстиційний нефрит, м'язові спазми та біль, гіпохлоремічний алкалоз, що може індукувати печінкову енцефалопатію або печінкову кому; гіперурикемія, що може провокувати подагричні напади у пацієнтів з асимптомним перебігом захворювання; зниження глюкозотолерантності, що може зумовити маніфестацію латентного ЦД, васкуліт, некротизуючий ангіт, респіраторний дистрес, у т.ч. пневмоніт та набряк легень, анафілактичні р-ції, шок, фоточутливість, кропив'янка, пурпура, токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона, статеві розлади, виснаження.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин препарату, гіперчутливість до інших сульфаніламідів, анурія, тяжка ниркова (кліренс креатиніну < 30 мл/хв) або печінкова недостатність, резистентна до лікування гіпокаліємія чи гіперкальціємія, рефрактерна гіпонатріємія, симптомна гіперурикемія (подагра).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 25 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГІДРОХЛОРТІАЗИД	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"/Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофарм" (виробництво, пакування, випуск серій)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Натур+" (контроль серій, Україна/Україна/Україна	табл. у бл.	25мг	№20		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ГІДРОХЛОРТІАЗИД	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"/Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофарм" (виробництво, пакування, випуск серій)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Натур+" (контроль серій, Україна/Україна/Україна	табл. у бл. в пач.	25мг	№10x2	1,07	
II.	ГІПОТІАЗИД®	ХІНОІН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд., Угорщина	табл. у бл.	25мг, 100мг	№20x1		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ГІПОТІАЗИД®	ХІНОІН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд. Підприємство 2 (підприємство Вершедьхаз), Угорщина	табл. у бл.	25мг, 100мг	№20x1		відсутня у реєстрі ОБЦ

• **Індапамід (Indapamide)**^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: C03BA11 - нетіазидні діуретики з помірною діуретичною активністю. Сульфонаміди, прості.

Основна фармакотерапевтична дія: сульфонамідний діуретик, який фармакологічно споріднений із тіазидними діуретиками; інгібує реабсорбцію натрію в кортикальному сегменті нирок; це підвищує екскрецію натрію та хлоридів у сечу і меншою мірою - екскрецію калію та магнію, підвищуючи т.ч. діурез; діє на рівні нирок і судин.

Показання для застосування ЛЗ: есенціальна АГ у дорослих^{БНФ, ПМД}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначається дорослим 1 табл. по 2,5 мг вранці^{БНФ} або табл., в/о, прол. дії по 1,5 мг 1 р/добу бажано вранці^{БНФ} (табл. ковтати цілою, не розжовуючи, запиваючи водою), застосування більш високих доз препарату не призводить до збільшення антигіпертензивного ефекту, але діуретичний ефект зростає.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: агранулоцитоз; апластична анемія; гемолітична анемія; лейкопенія; тромбоцитопенія; гіперкальціємія; зниження рівня калію з виникненням гіпокаліємії, зокрема серйозної, у певних категорій пацієнтів високого ризику; гіпонатріємія; запаморочення (вертиго); втомлюваність; головний біль; парестезія; непритомність; міопія; розмитість зору; порушення зору; аритмія; пароксизмальна шлуночкова тахікардія типу «пірует» (torsades de pointes), що може призвести до летального наслідку; артеріальна гіпотензія; блювання; нудота; запор; сухість у роті; панкреатит; порушення ф-ції печінки; при печінковій недостатності можливе виникнення печінкової енцефалопатії; гепатит; р-ції гіперчутливості; макулопапульозні висипання; пурпура; ангіоневротичний набряк; кропив'янка; токсичний епідермальний некроліз; с-м Стівенса-Джонсона; можливе загострення існуючого г. системного червоного вовчачка; р-ції фоточутливості; ниркова недостатність; подовження інтервалу Q-T на електрокардіограмі; підвищення рівня глюкози крові; підвищення рівня сечової к-ти в крові; підвищення рівня печінкових ферментів.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до сульфонамідів або до будь-яких допоміжних речовин; тяжка ниркова недостатність; тяжке порушення ф-ції печінки, печінкова енцефалопатія; гіпокаліємія.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 2,5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ІНДАПАМІД-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл., в/о у бл.	2,5мг	№30x1	2,00	
	ІНДОПРЕС	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№10x3	1,65	
	ІПАМІД	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№10x3	1,61	
II.	АРИФОН®	Лабораторії Серв'є Індастрі, Франція	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№30x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АРИФОН® РЕТАРД	Лабораторії Серв'є Індастрі (відповідальний за виробництво, контроль якості, пакування та випуск серії)/АНФАРМ Підприємство Фармацевтичне АТ (відповідальний за виробництво, контроль якості, пакування та випуск серії:)/Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд (відп, Франція/Польща/Ірландія	табл., вкриті п/о прол. дії у бл.	1,5мг	№30x1, №15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАЗОПАМІД	Лабормед-Фарма С.А., Румунія	табл. прол. дії, вкриті п/о у бл.	1,5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНДАБРЮ	БРЮФАРМЕКСПОРТ с.п.р.л. (відповідальний за випуск серії)/ФАРМАЛАБОР-Продутос Фармасьютікос, С.А. (виробництво), Бельгія/Португалія	табл. вкриті п/о у бл.	2,5мг	№15x1, №15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНДАП®	ПРО.МЕД.ЦС Прага а.с. (виробництво за повним циклом, випуск серії)/СВУС Фарма а.с. (первинне і вторинне пакування)/КООФАРМА с.р.о. (первинне і вторинне пакування), Чеська Республіка/Чеська Республіка	капс. у бл.	2,5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНДАП®	ПРО.МЕД.ЦС Прага а.с., Чеська Республіка	табл. у бл.	1,25мг; 2,5мг	№10x3, №10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНДАПАМІД	"Хемофарм" АД, Сербія	табл. вкриті п/о у бл.	2,5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНДАПАМІД-ТЕВА SR	Меркле ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, дозвіл на випуск серії; первинна та вторинна упаковка, контроль серії), Німеччина	табл. вкриті п/о у бл.	1,5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНДАПЕН	Фармацевтичний завод	табл. в/о у бл.	2,5мг	№10x2,	відсутня у	

	"ПОЛЬФАРМА" С.А., Польща			№10x6	реєстрі ОВЦ	
ІНДАПЕН	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польща	табл. в/о у бл.	2,5мг	№10x3	2,75	25,02/\$
ІНДАПЕН SR	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польща	табл. в/о з м/в у бл.	1,5мг	№28, №56, №60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ІНДАПЕН SR	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польща	табл. в/о з м/в у бл.	1,5мг	№15x2	4,59	25,02/\$
РАВЕЛ® SR	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. прол. дії, в криті п/о у бл.	1,5мг	№10x2, №10x9	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РАВЕЛ® SR	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. прол. дії, в криті п/о у бл.	1,5мг	№10x6	8,64	30,27/€
РАВЕЛ® SR	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. прол. дії, в криті п/о у бл.	1,5мг	№10x3	9,15	30,27/€
СОФТЕНЗИФ	АТ "Софарма" (Виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії), Болгарія	табл. прол. дії у бл.	1,5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	

2.9.3. Інгібітори карбоангідрази

- **Ацетазоламід (Acetazolamide) ***

Фармакотерапевтична група: S01EC01 - протиглаукомні препарати та міотичні засоби. Інгібітори карбоангідрази.

Основна фармакотерапевтична дія: діуретичний, протиглаукомний, протиепілептичний засіб; механізм дії зумовлений вибірковою пригніченням карбоангідрази - ферменту, що каталізує оборотну р-цію гідратації діоксиду вуглецю і подальшу дисоціацію вугільної к-ти; діуретичний ефект зумовлений пригніченням активності карбоангідрази у нирках (головним чином у проксимальних ниркових каналцях), що призводить до зниження реабсорбції бікарбонату, іонів натрію і калію, підсилення діурезу, підвищення рН сечі, збільшення реабсорбції аміаку; не впливає на екскрецію іонів хлору; у результаті пригнічення карбоангідрази циліарного тіла зменшує секрецію водянистої вологи і знижує ВОТ; пригнічення карбоангідрази у головному мозку призводить до накопичення CO₂ у мозку і гальмування надмірних пароксизмальних розрядів нейронів, що зумовлює протиепілептичну активність препарату; застосування препарату при підвищеному внутрішньочерепному тиску пов'язане з пригніченням карбоангідрази у судинних сплетіннях шлуночків головного мозку і зниженням продукування спинномозкової рідини.

Показання для застосування ЛЗ: лікування хр. відкритокутової глаукоми^{БНФ, ВООЗ}; вторинної глаукоми^{ВООЗ}; закритокутової глаукоми (для короткочасної передопераційної терапії та перед офтальмологічними процедурами, для зменшення ВОТ)^{БНФ, ВООЗ}; лікування набряків при СН; набряків, спричинених прийомом ЛЗ; лікування епілепсії^{БНФ} (у комбінації з іншими протисудомними засобами); petit mal (малі напади) у дітей, grand mal (великі напади) у дорослих, змішаної форми; лікування висотної хвороби (препарат скорочує час акліматизації, але його вплив на прояви цієї хвороби незначний).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування набряків при СН та набряків, спричинених застосуванням ЛЗ - початкова доза 250 мг/добу (1 табл.) вранці, найкращий діуретичний ефект спостерігається, якщо застосовувати ч/з день або ч/з 2 дні з одноденною перервою; при лікуванні СН призначають на фоні загальноприйнятої терапії (глікозиди наперстянки, низькосольова дієта та поповнення дефіциту калію); лікування висотної хвороби - рекомендована добова доза 500-1000 мг (2-4 табл.), розділена на кілька прийомів, у разі передбачуваного швидкого підйому на висоту (більше 500 м/добу) рекомендована доза 1000 мг (4 табл.), розділена на кілька прийомів, приймати за 24-48 год до підйому вгору, а в разі появи симптомів хвороби лікування продовжити ще 48 год. або більше необхідності; при відкритокутовій глаукомі 250 мг (1 табл.) 1-4 р/добу, доза понад 1000 мг (4 табл.) не підвищує терапевтичну ефективність; при вторинній глаукомі 250 мг (1 табл.) кожні 4 год; при г. нападах закритокутової глаукоми 250 мг (1 табл.) 4 р/добу; лікування епілепсії - дорослі та діти, 8-30 мг/кг маси тіла/добу, доза застосовується в 1-4 прийоми, оптимальна доза 250-1000 мг (1-4 табл.); при одночасному застосуванні з іншими протисудомними препаратами початкова доза першого має складати 250 мг (1 табл.) /добу, дозу при необхідності підвищують поступово, для дітей доза не має перевищувати 750 мг/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості, включаючи анафілактичні р-ції, анорексія, метаболічний ацидоз, порушення водно-електролітного балансу (у поєднанні з гіпонатріємією та гіпокаліємією); запаморочення, порушення смакових відчуттів, парестезії (відчуття повзання мурашок у кінцівках); втомлюваність; припливи, спрага, головний біль, дратівливість, зниження лібідо; нудота, блювання, діарея, мелена; порушення ф-ції печінки; сонливість, сплутаність свідомості, в'ялий параліч, судоми, атаксія; при тривалому застосуванні - дезорієнтація, порушення дотику та чутливості, загальна слабкість, периферичний параліч; відчуття волосся на язиці; депресія; оборотна міопія; шум у вухах, порушення слуху; блискавичний некроз печінки, гепатит, механічна жовтяниця; печінкова недостатність, печінкова коліка; мультиформна еритема, с-ром Стівенса-Джонсона, фотосенсибілізація, шкірний висип, с-ром Лайелла, кропив'янка; г. генералізований екзематозний пустульоз, свербіж, еритема; нефролітіаз, кристалурія, ниркова коліка, пошкодження нирки, поліурія, гематурія, ниркова недостатність, часте сечовипускання, глюкозурія; апластична анемія, тромбоцитопенія, агранулоцитоз, лейкопенія, тромбоцитопенічна пурпура, пригнічення кісткового мозку,

панцитопенія, при тривалому застосуванні - зменшення маси тіла, гемолітична анемія; гіпокальціємія, гарячка; гіпоглікемія, гіперглікемія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: індивідуальна гіперчутливість до компонентів препарату і сульфонамідів, порушення ф-ції печінки та нирок, ГНН, печінкова недостатність, цироз печінки (ризик розвитку енцефалопатії), сечокам'яна хвороба (при гіперкальціурії), гіперхлоремічний ацидоз, гіпокаліємія, гіпонатріємія, хр. декомпенсована закритокутова глаукома (для тривалої терапії), ЦД, уремія, недостатність надниркових залоз, хвороба Аддісона.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,75 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДІУРЕМІД	АТ "КІЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	250мг	№10x2	14,82	
II.	ДІАКАРБ	Фармацевтичний Завод "Польфарма" С. А. (виробництво готового лікарського засобу, первинне, вторинне пакування, контроль якості та випуск серії)/Медана Фарма Акціонерне Товариство (первинне, вторинне пакування, контроль якості та випуск серії), Польща/Польща	табл. у бл.	250мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

2.9.4. Антагоністи альдостеронових рецепторів

• Спіронолактон (Spironolactone) * [ГМД]

Фармакотерапевтична група: C03DA01 - калійзберігаючі діуретики. Антагоністи альдостерону.

Основна фармакотерапевтична дія: конкурентний антагоніст альдостерону, впливає на дистальні каналці нирок; шляхом блокади альдостерону пригнічує затримку води та Na + та сприяє утриманню K +, що не тільки підвищує екскрецію Na + та Cl-, а й знижує вміст K + і H + в екскрементах; у результаті його сечогінний ефект має також гіпотензивну дію.

Показання для застосування ЛЗ: застійна СН^{БНФ, ВООЗ}, коли у пацієнта не спостерігається відповідь на лікування іншими діуретиками або є необхідність у потенціюванні їх ефектів; лікування первинного гіперальдостеронізму; цироз печінки з асцитом та/або набряками; нефротичний с-м^{БНФ, ВООЗ}; есенціальна (резистентна) АГ^{БНФ, ГМД}, головним чином, при гіпокаліємії, в комбінації з іншими гіпотензивними засобами; гіпокаліємія, коли не можна застосовувати інше лікування; для профілактики гіпокаліємії у пацієнтів, які отримують серцеві глікозиди, у випадках, коли інші підходи розглядаються як недоцільні або невідповідні.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: набряки (застійна СН, нефротичний с-м): звичайна початкова доза для дорослих 100 мг/добу (може змінюватися в інтервалі 25-200 мг/добу)^{БНФ, ВООЗ}, розподілена на 1-2 прийоми; при призначенні вищих доз доцільно призначати в комбінації з діуретиками, що діють на проксимальному відділі ниркових каналців, у цьому випадку дозування препарату слід коригувати; цироз печінки, що супроводжується асцитом або набряками - якщо співвідношення Na⁺/K⁺ у сечі більше 1, початкова добова і МДД 100 мг, якщо це співвідношення менше 1, початкова добова доза 200 мг, МДД - 400 мг^{БНФ}, підтримуючу дозу визначати індивідуально; дітям призначають з розрахунку 1-3 мг/кг маси тіла одноразово або розподіляючи на 2 прийоми, дозу знижувати до 1-2 мг/кг у разі підтримуючої терапії у комбінації з іншими діуретиками; есенціальна гіпертензія - призначається в комбінації з іншими антигіпертензивними препаратами, початкова доза для дорослих 50-100 мг/добу і розподіляється на 1-2 прийоми; лікування продовжувати не менше 2 тижнів; гіпокаліємія: пацієнтам, яким недостатньо харчових добавок з K⁺ або інших методів калієзамісної терапії, приймати у добовій дозі 25-100 мг; первинний гіперальдостеронізм^{БНФ}: після встановлення діагнозу - 100-400 мг/добу в якості підготовки до операційного втручання; у пацієнтів, у яких операція не планується, можна використовувати в якості тривалої підтримуючої терапії у найменшій ефективній дозі^{БНФ}, яка визначається індивідуально, початкову дозу допустимо знижувати кожні 14 днів до досягнення мінімальної ефективної дози, у випадках тривалого застосування використовувати у комбінації з діуретиками інших груп для зменшення побічних ефектів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тромбоцитопенія, лейкопенія, агранулоцитоз, еозинофілія, гіперчутливість, гірсутизм, гіперкаліємія, гіпонатріємія, дегідратація, порфірія, гіперхлоремічний ацидоз, сплутаність свідомості, сонливість, головний біль, параліч, параплегія, атаксія, запаморочення, вертиго, летаргія, аритмії, васкуліт, небажана гіпотензія, зміна тембру голосу, нудота, блювання, гастрит, кишкові коліки; виразка, шлункова кровотеча, біль у животі, діарея, гепатит, порушення ф-ції печінки, висипання, свербіж, кропив'янка, алопеція, екзема, кільцеподібна еритема, вовчакоподібні ураження шкіри, гіпертрихоз, гіперемія, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, лікарська екзантема з еозинофілією та системними с-мами (DRESS), пемфігоїд, уртикарія, остеомаліяція, судоми м'язів нижніх кінцівок, ГНН, зниження лібідо, еректильна дисфункція, гінекомастія (у чоловіків), болючість молочної залози, збільшення молочної залози, менструальні порушення (у жінок, включаючи дозозалежну аменорею), безпліддя, доброякісні пухлини молочних залоз, аменорея, астенія, втома, підвищення вмісту сечовини та креатиніну сироватки крові; порушення зору; підвищення вмісту глікозильованого гемоглобіну.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин; анурія, ГНН, виражене порушення азотовидільної ф-ції нирок (швидкість клубочкової фільтрації <10 мл/хв.); гіперкаліємія; гіпонатріємія; хвороба Аддісона; вагітність або період годування груддю; тяжка ниркова недостатність, що супроводжується олігурією або анурією (кліренс креатиніну нижче 30 мл/хв на 1,73 м² поверхні тіла і/або креатинін сироватки крові вище 1,8 мг/дл); серцева недостатність, якщо швидкість клубочкової

фільтрації менше 30 мл/хв або сироваткова концентрація креатиніну більше 220 мкмоль/л; гіповолемія або зневоднення; одночасне застосування еплеренону або інших калійзберігаючих діуретиків; інгібітори АПФ або блокатори рецепторів АТ1 у комбінації.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 75 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	25мг	№10х3	3,89	
	СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	100мг	№10х3	2,08	
II.	ВЕРОШПІРОН	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	капс. у бл.	50мг, 100мг	№10х3	відсутня у реєстрі OBLЦ	
	ВЕРОШПІРОН	ВАТ "Гедеон Ріхтер"/ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща", Угорщина/Польща	табл. у бл.	25мг	№20х1	4,24	28,03/\$
	СПІЛАКТОН	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл., в криті п/о у бл.	25мг, 50мг, 100мг	№10х2	відсутня у реєстрі OBLЦ	
	СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ®	Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина	табл. у бл.	50мг, 100мг	№10х2, №10х6	відсутня у реєстрі OBLЦ	
	СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ®	Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина	табл. у бл.	50мг	№10х3	2,69	27,95/\$
	СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ®	Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина	табл. у бл.	100мг	№10х3	2,08	27,95/\$

• **Еплеренон (Eplerenone)**

Фармакотерапевтична група: C03DA04 - калійзберігаючі діуретики. Антагоністи альдостерону. Еплеренон

Основна фармакотерапевтична дія: має відносно селективність у зв'язуванні з рекомбінантними рецепторами людини до мінералокортикоїдів порівняно з його взаємодією з рекомбінантними рецепторами людини до глюкокортикоїдів, прогестерону та андрогенів; перешкоджає зв'язуванню рецепторів з альдостероном - важливим гормоном ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, що бере участь у регулюванні АТ та задіяна у патофізіологічних механізмах розвитку СС захворювань; призводить до стійкого підвищення рівня реніну в плазмі крові та рівня альдостерону в сироватці крові, при цьому не відбувається пригнічення дії еплеренону; знижує ризик летального наслідку з будь-яких причин (переважно за рахунок зниження летальності внаслідок порушень з боку ССС).

Показання для застосування ЛЗ: доповнення до стандартного лікування із застосуванням β-блокаторів з метою зниження ризику захворюваності та смертності, пов'язаних із СС захворюваннями, у стабільних пацієнтів з дисфункцією лівого шлуночка (фракція викиду лівого шлуночка ≤ 40 %) та клінічними ознаками СН після нещодавно перенесеного ІМ^{БНФ}; доповнення до стандартної оптимальної терапії з метою зниження ризику захворюваності та смертності, пов'язаної із СС захворюваннями, у дорослих пацієнтів із СН II класу (хр.) за класифікацією NYHA та дисфункцією лівого шлуночка (фракція викиду лівого шлуночка ≤ 30 %).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: СН після перенесеного ІМ - рекомендована підтримуюча доза - 50 мг 1 р/добу^{БНФ}; лікування розпочинати з дози 25 мг 1 р/добу, в подальшому доза підлягає титруванню до досягнення необхідної дози 50 мг 1 р/добу протягом 4 тижнів^{БНФ} з урахуванням рівня іонів калію у сироватці крові, лікування еплереноном зазвичай розпочинають ч/з 3-14 діб після г.ІМ; пацієнти з СН II класу (хр.) за класифікацією NYHA - розпочинати з дози 25 мг 1 р/добу та поступово підвищувати до цільової дози 50 мг 1 р/добу, бажано досягти цього рівня дози за 4 тижні, враховуючи рівень калію у сироватці крові, пацієнтам, у яких рівень калію у сироватці крові перевищує 5 ммоль/л, не розпочинати лікування еплереноном; корекція дози після початку лікування: концентрація калію у сироватці крові (ммоль/л) (кК⁺) < 5,0 ммоль/л - від 25 мг 1 р/2 дні до 25 мг 1 р/добу, з 25 мг 1 р/добу до 50 мг 1 р/добу; (кК⁺) - 5,5-5,9 ммоль/л - з 50 мг 1 р/добу до 25 мг 1 р/добу, з 25 мг 1 р/добу до 25 мг 1 р/2 дні, з 25 мг 1 р/2 дні до тимчасової відміни; (кК⁺) ≥ 6,0 - тимчасова відміна, після тимчасової відміни еплеренону ч/з підвищення рівня калію до ≥ 6 ммоль/л відновлення лікування можливе у дозі 25мг 1раз/2 дні після зниження концентрації калію нижче рівня 5 ммоль/л.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: пієлонефрит, інфекції, фарингіт; еозинофілія; гіпотиреоз; гіперкаліємія, гіперхолестеринемія; гіпонатріємія, зневоднення, гіпертригліцеридемія; безсоння; запаморочення; синкопе, головний біль; гірестезія; лівошлуночкова недостатність, фібриляція передсердь; тахікардія; гіпотензія; тромбоз артерій кінцівок, ортостатична гіпотензія; кашель; діарея, нудота, запор, блювання; здуття живота; висипання, свербіж; гіпергідроз, ангіоневротичний набряк; м'язові спазми, біль у спині; біль у кістково-м'язовій системі; порушення ф-ції нирок; холецистит; гінекомастія; астенія; нездужання; підвищення сечовини крові, підвищення рівня креатиніну; зниження кількості рецепторів епідермального фактора росту, підвищення рівня глюкози крові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до еплеренону або до будь-якої з допоміжних речовин, рівень калію в сироватці крові > 5 ммоль/л на момент початку лікування, ниркова недостатність тяжкого ступеня (розрахункова швидкість клубочкової фільтрації < 30 мл/хв/1,73 м²), печінкова недостатність тяжкого ступеня (клас С за класифікацією Чайлда-П'ю), лікування калійзберігаючими сечогінними препаратами, калієвмісними

добавками або потужними інгібіторами СУР3А4 (ітраконазолом, кетоконазолом, ритонавіром, нелфінавіром, кларитроміцином, телітроміцином та нефазодоном), одночасне застосування еплеренону у потрійній комбінації разом з інгібітором АПФ та блокатором рецепторів ангіотензину.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 50 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕПЛЕПРЕС	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№10x3	16,20	
	ЕПЛЕПРЕС	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10x3	12,99	
	ЕПЛЕТОР	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (фасування із форми "in bulk" фірми-виробника "Сінтон Хіспанія С.Л.", Іспанія), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№10x3	22,15	
	ЕПЛЕТОР	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (фасування із форми "in bulk" фірми-виробника "Сінтон Хіспанія С.Л.", Іспанія), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10x3	15,56	
	РЕНІАЛЬ®	ПАТ "Київмедпрепарат" (фасування з форми in bulk фірми-виробника Адамед Фарма С.А., Польща), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№10x3	21,33	
	РЕНІАЛЬ®	ПАТ "Київмедпрепарат" (фасування з форми in bulk фірми-виробника Адамед Фарма С.А., Польща), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10x3	14,00	
II.	ДЕКРИЗ	Адамед Фарма С.А., Польща	табл., вкриті п/о у бл.	25мг, 50мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕПЛЕРЕНОН СТАДА®	СТАДА Арцнайміттель АГ (випуск серій)/Лабораторіос Ліконса, С.А. (виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування, контроль серій), Німеччина/Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	25мг, 50мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕПЛЕРЕНОН-МБ	ЛАБОРАТОРІО ДР. Ф. ЕЧЕВАРНЕ, АНАЛІСІС, С.А. (альтернативна дільниця для проведення аналітичних випробувань)/ЛАБОРАТОРІОС ЛІКОНСА, С.А. (повний цикл виробництва і відповідає за випуск серій), Іспанія/Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	25мг, 50мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕПНОН 25	МСН Лабораторіс Прайвіт Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕПНОН 50	МСН Лабораторіс Прайвіт Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕСПІРО	Фармацевтичний завод "Польфарма" С.А., Польща	табл., вкриті п/о у бл.	25мг, 50мг	№10, №20, №28, №30, №50, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНСПРА®	Пфайзер Фармасютікалз ЛЛС (виробництво препарату in bulk, та контроль якості)/Фарева Амбуаз (випуск серії, пакування, маркування, контроль якості при випуску), США/Франція	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№10x3	37,90	23,69/\$
	ІНСПРА®	Пфайзер Фармасютікалз ЛЛС (виробництво препарату in bulk, та	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x3	22,11	23,69/\$

		контроль якості)/Фарева Амбуаз (випуск серії, пакування, маркування, контроль якості при випуску), США/Франція				
--	--	--	--	--	--	--

2.9.5. Осмодіуретики

- **Манітол (Mannitol)** * (див. п. 10.7. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

2.10. Нітрати

- **Ізосорбід динітрат (Isosorbide dinitrate)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: C01DA08 - вазодилататори, що застосовуються у кардіології.

Основна фармакотерапевтична дія: діє як донор оксиду азоту, який призводить до розслаблення гладких м'язів судин шляхом стимуляції гуанілатциклази і подальшого збільшення концентрації внутрішньоклітинного (цГМФ), т.ч., стимулюється (цГМФ)-залежна протеїнкіназа і внаслідок цього змінюється фосфорилування різних протеїнів у клітинах гладких м'язів, що призводить до зниження скорочуваності міозину; спричиняє розслаблення гладких м'язів судин, що призводить до їх вазодилатації; дія його поширюється на периферичні вени і артерії, що сприяє венозному депонуванню крові і зменшує венозне повернення до серця; т.ч. знижується шлуночковий кінцевий діастолічний тиск і об'єм (переднавантаження); дія на артерії, а при вищих дозах - на артеріоли, призводить до зниження системного судинного опору (постнавантаження), що зменшує роботу серця; вплив як на перед- так і на постнавантаження призводить до подальшого зменшення споживання серцем кисню; спричиняє перерозподіл кровотоку до субендокардіальних відділів серця, якщо коронарна циркуляція частково утруднена атеросклеротичними ураженнями; дилатація колатеральних артерій, спричинена нітратами поліпшує перфузію міокарда; розширює просвіт у місці ексцентричного стенозу, послаблює коронарний спазм; при застійній СН поліпшується гемодинаміка у спокої та при навантаженні; т.ч. збільшення подачі кисню при зменшенні потреби в ньому до серцевого м'яза зменшує площу ураження міокарда; розслабляє бронхіальні м'язи, м'язи ШКТ, жовчовивідних та сечовивідних шляхів

Показання для застосування ЛЗ: профілактика та довготривале лікування стенокардії^{ВООЗ, ПМД}, крім випадків, зумовлених гіпертрофічною обструктивною кардіоміопатією; симптоматичне лікування нестабільної стенокардії додатково до стандартної терапії, довготривала терапія вазоспастичної стенокардії (стенокардії Принцметала); г. лівошлуночкова СН^{БНФ} різної етіології (слабкість серцевого м'яза з порушенням функції лівого шлуночка); г. ІМ.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в терапію розпочинають з дози 1-2 мг/год; потім дозу доводять до індивідуальних потреб, максимальна доза 8-10 мг/год, пацієнтам із СН можуть знадобитися вищі дози - до 10 мг/год - 50 мг/год, для в/в введення застосовують тільки розведений препарат; спрей оромукозний: для припинення нападу стенокардії або перед фізичним чи емоційним навантаженням, що може спричинити напад, упорснуту аерозоль у ротову порожнину 1-3 рази з інтервалом між упорскуваннями 30 секунд; разову дозу (до 3 упорскувань) для припинення нападу стенокардії можна збільшувати лише за рекомендацією лікаря; при г. ІМ або г. СН починають з 1-3 упорскувань, у разі відсутності ефекту протягом 5 хв можна зробити ще одне упорскування; якщо і в наступні 10 хв поліпшення не спостерігається, можна повторити застосування аерозолу під ретельним контролем АТ; табл. прол. дії за відсутності інших рекомендацій застосовувати незалежно від прийому їжі по 20 мг 2 р/добу; другу/наступну дозу приймати не раніше, ніж ч/з 6-8 год після першої дози; при підвищеній потребі в нітропрепаратах денну дозу можна збільшити до 20 мг 3 р/добу з інтервалом 6 год; табл. прол. дії - по 40 мг 1 р/добу, другу/наступну дозу приймати не раніше, ніж ч/з 6-8 год після першої дози; при підвищеній потребі в нітропрепаратах денну дозу можна збільшити до 40 мг 2 р/добу; табл. прол. дії по 60 мг - по 1 табл. 1 р/добу; при підвищеній потребі в нітропрепаратах денну дозу можна збільшити до 1 табл. 2 р/добу; лікування розпочинати з найменших доз, поступово збільшуючи дозу до максимальної ефективної; тривалість курсу лікування визначається індивідуально; прийом препарату не можна різко припиняти.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль («нітратний» головний біль); запаморочення, сонливість, тахікардія, посилення симптомів стенокардії; ортостатична гіпотензія, судинний колапс (що інколи супроводжується брадиаритмією і втратою свідомості); нудота, блювання, печія; АР, висипання, припливи; ангіоневротичний набряк, с-ром Стівенса - Джонсона, набряк Квінке, свербіж, екссудативний дерматит; астенія, периферичний набряк (зазвичай у пацієнтів із лівошлуночковою недостатністю); крововилив у гіпофіз у пацієнтів з недиагностованою пухлиною гіпофіза; почервоніння язика у місці розприскування спрею; можливі тяжкі гіпотензивні реакції, що супроводжувалися нудотою, блюванням, відчуттям неспокою, блідістю та підвищеним потовиділенням; тимчасова гіпоксемія ч/з відносний перерозподіл кровотоку в альвеолярні зони з гіповентиляцією (у пацієнтів з ІХС це може призвести до гіпоксії міокарда); метгемоглобінемія, ізосорбід динітрат-індукована гемолітична анемія, розвиток толерантності до ізосорбіту динітрату, та перехресної толерантності по відношенню до інших нітратів.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; г. судинна недостатність (шок, судинний колапс); кардіогенний шок при неможливості корекції кінцевого діастолічного тиску лівого шлуночка за допомогою відповідних заходів; виражена артеріальна гіпотензія (сistolічний тиск нижче ніж 90 мм рт. ст.); гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія; констриктивний перикардит; тампонада серця; аортальний або мітральний стеноз; при вираженій анемії; при травмах голови; при геморагічному інсульті та інших захворюваннях, що супроводжуються крововиливом у мозок; при гіповолемії; закритокутова глаукома; тяжкі порушення ф-ції печінки та /або нирок; не можна застосовувати разом з інгібіторами фосфодіестерази (силденафіл, тадалафіл, варденафіл); під час терапії нітратами не можна застосовувати розчинний стимулятор гуанілатциклази - ріоцигуат; підвищений внутрішньочерепний тиск (у т.ч. при черепномозковій травмі, геморагічному інсульті), оскільки венодилатація може призвести до його подальшого підвищення; гіпертиреоз; гіпотермія.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 60 мг., перорально (аерозоль) - 20 мг., сублінгвально - 20 мг., парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДИКОР ЛОНГ	ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна	табл. прол. дії у бан.	20мг	№50	5,40	
	ДИКОР ЛОНГ	ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна	табл. прол. дії у бл.	20мг	№10x5	5,40	
	ДИКОР ЛОНГ	ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна	табл. прол. дії у бан.	40мг	№50	3,90	
	ДИКОР ЛОНГ	ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна	табл. прол. дії у бл.	40мг	№10x5	3,90	
	ДИКОР ЛОНГ	ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна	табл. прол. дії у бан.	60мг	№50	3,58	
	ДИКОР ЛОНГ	ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна	табл. прол. дії у бл.	60мг	№10x5	3,58	
	ІЗО-МІК®	ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна	спрей сублінг. у фл. по 15мл (300доз) з розпил.	1,25 мг/доза	№1	13,33	
	ІЗО-МІК®	ТОВ НВФ "Мікрохім" (відповідальний за випуск серії)/АТ "ФАРМАК", Україна/ Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл в амп. у бл.	1 мг/мл	№5x2	370,00	
	ІЗО-МІК®	ТОВ НВФ "Мікрохім" (відповідальний за випуск серії)/АТ "ФАРМАК", Україна/ Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл в амп. у касеті	1 мг/мл	№5x2	370,00	
	ІЗО-МІК® 10 мг	ТОВ НВФ "Мікрохім", Україна	табл. сублінг. у бан.	10мг	№50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІЗО-МІК® 20 мг	ТОВ НВФ "Мікрохім", Україна	табл. сублінг. у бан.	20мг	№50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІЗО-МІК® 5 мг	ТОВ НВФ "Мікрохім", Україна	табл. сублінг. у бан.	5мг	№50	1,00	
	НІТРОСОРБІД	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x4	2,55	
	НІТРОСОРБІД	ТОВ Науково-виробнича фірма "Мікрохім", Україна	табл. у бан.	10мг	№50	1,62	
НІТРОСОРБІД	ТОВ Науково-виробнича фірма "Мікрохім", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x5	1,62		
НІТРОСОРБІД	ПАТ "Монфарм", Україна	табл. у бл.	0,01г	№20x2	відсутня у реєстрі ОБЦ		
II.	ІЗОКЕТ®	Ейсіка Фармасьютикалз ГмбХ, Німеччина	спрей оромук. у фл. по 15мл (300доз)	1,25 мг/доза		16,81	28,75/€
	ІЗОКЕТ®	Евер Фарма Йена ГмбХ (виробництво "in bulk", первинне пакування)/Ейсіка Фармасьютикалз ГмбХ (вторинне пакування; контроль якості "in bulk", відповідальний за випуск серії), Німеччина/ Німеччина	р-н д/інфуз. в амп. по 10мл у пач.	1 мг/мл	№10	357,00	31,84/€
	КАРДИКЕТ® РЕТАРД	Ейсіка Фармасьютикалз ГмбХ (виробник нерозфасованої продукції та контроль якості; виробник відповідальний за контроль якості нерозфасованої продукції; первинне та вторинне	табл. прол. дії у бл.	20мг	№10x5	4,46	28,75/€

	пакування; виробник відповідальний за випуск серії), Німеччина						
КАРДИКЕТ® РЕТАРД	Ейсика Фармасьютикалз ГмБХ (виробник нерозфасованої продукції та контроль якості; виробник відповідальний за контроль якості нерозфасованої продукції; первинне та вторинне пакування; виробник відповідальний за випуск серії), Німеччина	табл. прол. дії у бл.	40мг	№10x5	3,22	28,75/€	
КАРДИКЕТ® РЕТАРД	Ейсика Фармасьютикалз ГмБХ (виробник нерозфасованої продукції та контроль якості; виробник відповідальний за контроль якості нерозфасованої продукції; первинне та вторинне пакування; виробник відповідальний за випуск серії), Німеччина	табл. прол. дії у бл.	60мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ		

• **Ізосорбиду мононітрам (Isosorbide mononitrate)** ^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: C01DA14 - вазодилататори, які застосовують в кардіології. Органічні нітрати.

Основна фармакотерапевтична дія: є метаболітом ізосорбиду динітрату, спричиняє релаксацію гладкої мускулатури судин та вазодилатацію; розширює одночасно периферичні вени та артерії, що призводить до збільшення ємності венозних судин та зменшення зворотного венозного відтоку до серця, до редукування шлуночкового кінцевого діастолічного тиску та переднавантаження; вплив на артеріальні судини призводить до зниження їх системного опору (постнавантаження), полегшуючи роботу серця; одночасний вплив на перед- та постнавантаження призводить до зменшення споживання кисню міокардом; спричиняє перерозподіл кровотоку до субендокардіальних шарів, коли вінцевий кровотік частково зменшується завдяки наявності атеросклеротичних бляшок; дилатація, спричинена нітратами, поліпшує перфузію постстенотичної ділянки міокарда; усуває ексцентричний коронарний стеноз, зменшуючи венозні спазми, поліпшують гемодинаміку у стані спокою та при навантаженні у пацієнтів із застійною СН, внаслідок зниження потреб у кисні та збільшення його доставки обмежується площа ушкодженого міокарда; розслаблює мускулатуру бронхів, м'язи ШКТ, біліарного та сечового трактів, включаючи сфінктери; ефект проявляється ч/з 20 хв. та триває протягом 8 год. Пригнічує агрегацію тромбоцитів, знижує внутрішньотромбоцитарний синтез тромбоксану; механізм дії нітратів здійснюється, найімовірніше, ч/з утворення оксиду азоту (NO) і циклічного гуанозинмонофосфату (цГМФ), який вважається медіатором релаксації.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика та довготривале лікування стенокардії. ^{БНФ, ГМД}, застійна СН.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дозу і кратність прийому встановлює лікар індивідуально залежно від стану пацієнта, його р-ції на препарат і переносимості; рекомендована доза - 40 мг 2 р/добу; для запобігання розвитку нітратної толерантності необхідно забезпечити 10-12 годинний безнітратний інтервал (зазвичай вночі), другу таблетку рекомендується приймати не раніше ніж ч/з 8 год. після прийому першої; при лікуванні стенокардії з частими нічними нападами слід застосовувати вранці та безпосередньо перед сном; МДД може досягати 120 мг за 3 прийоми; капс. призначають дорослим по 50-100 мг 1 р/добу (вранці), МДД 100 мг; лікування слід розпочинати з низької дози і поступово збільшувати до потрібного рівня.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, спровокований нітратами; запаморочення; сонливість, неухважність, слабкість, астения, рухове занепокоєння, синкопе, колапс із порушенням серцевого ритму та брадикардією; посилення симптомів стенокардії, брадиаритмія, ортостатична гіпотензія, рефлексорна тахікардія; гіперемія; непритомність (синкопи), циркуляторний колапс; нудота, блювання, діарея, диспепсія; АР шкіри, в т.ч. висип, свербіж, шум у вухах, дилатація судин шкіри з почервонінням, блідість та підвищення потовиділення, гіперемія шкіри обличчя, ангіоневротичний набряк, транзиторна гіпоксемія у пацієнтів з ІХС що може зумовити гіпоксію міокарда; ексфолювативний дерматит; виникнення толерантності до препарату, у т.ч. перехресної толерантності до інших органічних нітратів.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активної речовини або до будь-якого компонента препарату; г. циркуляторна недостатність, тяжка артеріальна гіпотензія (систолический тиск нижче 90 мм рт.ст.) або гіповолемія, колапс; кардіогенний шок, якщо не забезпечений достатньо високий кінцевий діастолічний тиск у лівому шлуночку шляхом застосування інтрааортальної контрпульсації або препаратів з позитивним інотропним ефектом; г. ІМ з низьким тиском наповнення лівого шлуночка; гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія, констриктивний перикардит, тампонада серця; виражена анемія; токсичний набряк легенів; нещодавно перенесена ЧМТ або крововилив у мозок, підвищений внутрішньочерепний тиск; глаукома; одночасне застосування з силденафілом та іншими інгібіторами фосфодієстерази; не можна застосовувати розчинний стимулятор гуанілатциклази - ріоцигуат.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 40 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МОНОНІТРОСИД	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (виробництво за повним циклом)/Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОФАРМ" (виробництво, пакування, випуск серій)/Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна/Україна/Україна	табл. у бл.	40мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МОНОНІТРОСИД	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (виробництво за повним циклом)/Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОФАРМ" (виробництво, пакування, випуск серій)/Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна/Україна/Україна	табл. у бл.	40мг	№10x4	1,27	
II.	ЕФОКС® ЛОНГ	Ейсіка Фармасьютикалз ГмБХ (виробник нерозфасованої продукції та контроль якості; виробник відповідальний за контроль якості нерозфасованої продукції; виробник відповідальний за випуск серії; первинне та вторинне пакування), Німеччина	капс. прол. дії у бл.	50мг	№10x3	4,25	28,75/€
	МОНОСАН®	ПРО.МЕД.ЦС Прага а.с. (виробництво за повним циклом)/ХБМ Фарма с.р.о. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості)/КООФАРМА с.р.о. (первинне та вторинне пакування), Чеська Республіка/Словацька Республіка/Чеська Республіка	табл. у бл.	20мг, 40мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)** * ** [ПМД] [тільки табл. сублінгвальні по 0,5 мг]

Фармакотерапевтична група: C01DA02 - вазодилататори, що застосовуються в кардіології. Органічні нітрати.

Основна фармакотерапевтична дія: антиангінальний препарат групи периферичних вазодилататорів з переважною дією на венозні судини; антиангінальна дія зумовлена нормалізуючим впливом на обмін електролітів та енергетику міокарда, механізм дії пов'язаний з вивільненням активної речовини оксиду азоту у гладкій мускулатурі судин, оксид азоту викликає активацію гуанілатциклази й підвищує рівень цГМФ, що і приводить до розслаблення гладком'язових клітин у стінках судин, під впливом препарату артеріоли і прекапілярні сфінктери розслаблюються в меншій мірою, ніж великі артерії і вени, антиангінальна дія пов'язана головним чином зі зменшенням потреби міокарда в кисні за рахунок зменшення переднавантаження та постнавантаження, сприяє розподілу коронарного кровообігу в ішемізованих ділянках міокарда, підвищує толерантність до фізичного навантаження у хворих на ІХС, стенокардію, при СН сприяє розвантаженню міокарда головним чином за рахунок зменшення переднавантаження, знижує тиск у малому колі кровообігу. Тиск у легневих капілярах знижується, що зумовлює призначення нітрогліцерину при ІМ з набряком легень, а також при СН; при ішемічній гіпокінезії окремих ділянок міокарда відновлюється його скоротливість; менингеальні судини розширюються, судини внутрішніх органів звужуються, знижується тиск у системі легеневої артерії внаслідок вазодилатації та системного ефекту нітрогліцерину; розслаблює гладенькі м'язи бронхів, жовчовивідних шляхів, ШКТ та сечовивідних шляхів.

Показання для застосування ЛЗ: сильний та тривалий біль ішемічного генезу у ділянці серця, асоційований з ІМ^{БНФ, вооз, ПМД} або нестабільною стенокардією^{БНФ, вооз}; недостатність насосної функції серця і набряк легень, асоційований з г.ІМ^{БНФ}; АГ, пов'язана з операцією на відкритому серці та іншими хірургічними втручаннями^{БНФ}; забезпечення контрольованої артеріальної гіпотензії^{ПМД} під час хірургічних втручань^{БНФ}; стенокардія (для купірування нападів стенокардії та короткочасної профілактики)^{БНФ, ПМД}; фізичне навантаження або емоційний стрес, які можуть спричинити напади стенокардії^{ПМД}; ад'ювантна терапія у випадках, які потребують невідкладної допомоги, при г. лівошлуночкової недостатності (серцева астма); зниження тиску при г.ІМ; запобігання спазмам коронарних судин, спричинених зондуванням серця, під час коронарографії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: режим дозування встановлює лікар індивідуально, залежно від клінічної відповіді та систолічного АТ; зазвичай слід застосовувати інфузійний р-н, що містить 100 мкг/мл нітрогліцерину; можна застосовувати більші концентрації, але не більше 400 мкг/мл; при в/в введенні спостерігаються виражений гемодинамічний ефект, застосовується тільки в стаціонарних умовах, постійно контролюючи функції ССС (систолічний АТ не має знижуватися більш ніж на 10-15 мм рт.ст. у нормотензивних пацієнтів, не більш ніж на 5 мм рт.ст. - у хворих на артеріальну гіпотензію або схильних до неї, ЧСС не має підвищуватися більш ніж на 5 уд/хв, якщо в цей же час чітко поліпшується клінічна картина; в/в інфузія може починатися зі швидкістю 10-20 мкг/хв; надалі швидкість можна збільшувати на 10-20 мкг/хв кожні 5-10 хв, залежно від реакції пацієнта; добрий терапевтичний ефект спостерігається при швидкості введення 50-100 мкг/хв; максимальна швидкість - 400 мкг/хв^{БНФ}; табл. при стенокардії слід приймати сублінгвально одразу після виникнення нападу, звичайна доза 0,5 мг, для багатьох хворих зі стабільною стенокардією ефективною є і менша доза - 0,3 мг або 0,4 мг; при відсутності

антиангінальної дії протягом перших 5 хв. необхідно прийняти ще 1 таблетку; у разі відсутності терапевтичного ефекту після прийому 2-3 табл. необхідно негайно викликати лікаря (вірогідність розвитку інфаркта міокарда)! нітрогліцерин діє протягом 30 хв., при частих нападах стенокардії доцільно призначати препарати пролонгованої дії; толерантність до сублінгвальних форм нітрогліцерину розвивається рідко, проте при її виникненні у деяких хворих дозу препарату слід поступово збільшувати, доводячи її до 1,0-1,5 мг (2-3 табл.); спрей сублінгвальний: під час нападу стенокардії потрібно ввести 1 дозу (1 вприскування = 400 мікрограм) під язик, якщо симптоми не зникають, введення дози можна повторити з інтервалом 5 хв., але не більше 3х доз; щоб запобігти виникненню нападів стенокардії при навантаженні або в інших передбачених ситуаціях - 1 доза (1 вприскування) (400 мікрограм) під язик незадовго до передбачуваного навантаження; при лікуванні негіпотензивних пацієнтів з г.лівошлуночковою недостатністю (артеріальний систолічний тиск > 100 мм рт. ст.) застосовують 400 мкг нітрогліцерину, тобто 1 дозу сублінгвально і повторюють введення ч/з 5-10 хв., загальна кількість вприскувань не повинна перевищувати більше 3х доз при ретельному контролі клінічного стану пацієнта, включаючи АТ; згодом пацієнта можна перевести на в/в терапію або на інший вазодилатор залежно від клінічного стану; перед коронарографією: з метою запобігання спазмам коронарних судин рекомендується доза 1-2 вприскування (0,4-0,8 мг). Зниження АТ при г. ІМ: рекомендована доза - 0,4-1,2 мг, тобто 1-3 вприскування при контролі кровообігу (артеріальний систолічний тиск повинен перевищувати 100 мм рт. ст.).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: «нітратний» головний біль, запаморочення, синкопе, церебральна ішемія; тахікардія, артеріальна гіпотензія (особливо ортостатична), брадикардія, ціаноз; нечіткість зору, психотичні р-ції, загальмованість, сонливість, дезорієнтація, нудота, блювання, сухість у роті, біль у животі, діарея, галітоз, астенія; почервоніння обличчя, АР шкіри, р-ції гіперчутливості, ексфоліативний дерматит, гіперемія шкірних покривів, зниження АТ та/або постуральну гіпотензію з вираженою рефлексорною тахікардією, запамороченням або слабкістю, посилення с-мів стенокардії (парадоксальна р-ція на нітратах), колапс, що супроводжується брадиаритмією і втратою свідомості; відчуття жару; ціаноз; блідість; метгемоглобінурія, шкірний висип, свербіж, алергічний дерматит, кропив'янка, анафілактичний шок, відчуття збудження, тривога, занепокоєння, помірне скороминуще відчуття печіння у горлі; порушення смаку (металевий присмак у роті); поступальна гіпотензія; припливи; серцебиття; гіпотермія; загострення глаукоми; порушення дихання; загострення ІХС внаслідок гіпоксії, повна блокада, асистолія, ангіоневротичний набряк; зміни в місці введення, локалізоване відчуття печіння, пухирці на язиці.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до нітрогліцерину та інших нітросполук; гіповолемія; виражена артеріальна гіпотензія (систолічний тиск <100 мм рт. ст., діастолічний АТ <60 мм рт. ст.); г.ІМ з локалізацією у правому шлуночку, г. ІМ з низьким тиском наповнення лівого шлуночка, брадикардія (менше 50 уд./хв); підвищений внутрішньочерепний тиск (внаслідок травми голови чи крововиливу в мозок); тампонада серця; гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія; констриктивний перикардит, аортальний і мітральний стеноз; церебральна ішемія; первинна легенева гіпертензія (оскільки гіперемія гіповентильованої альвеолярної області може призвести до гіпоксії); тяжка анемія; закритокутова глаукома, токсичний набряк легень; г. судинна недостатність (шок, судинний колапс); кардіогенний шок (якщо не проводяться заходи з підтримки кінцевого діастолічного тиску): одночасне застосування інгібітора фосфодієстерази типу 5 силденафілу, тадалафілу, варденафілу; оскільки силденафіл потенціює гіпотензивну дію нітратів (перерва між прийомами повинна становити не менше 48 год), одночасне застосування з ріоцигуатом та стимуляторами розчинної гуанілатциклази.

Визначена добова доза (DDD): сублінгвально 2,5 мг., сублінгвально (аерозоль) - 2,5мг, парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	НІТРОГЛІЦЕРИН	ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна	табл. сублінг. у бан.	0,5мг	№40	1,06	
	НІТРОГЛІЦЕРИН	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. по 2мл в амп. у бл.	10 мг/мл	№10x1, №5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НІТРОГЛІЦЕРИН	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. по 2мл в амп. у пач.	10 мг/мл	№10	195,09	
	НІТРОГЛІЦЕРИН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. сублінг. у конт.	0,5мг	№40	1,53	
	НІТРОГЛІЦЕРИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. сублінг. у бан. або	0,5мг	№40	1,80	

			конт.				
	НІТРОГРАНУЛОН Г	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. прол. дії у бл. та конт.	2,9мг; 5,2мг	№10, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НІТРОГРАНУЛОН Г	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. прол. дії у бл. в пач.	2,9мг	№10x5	1,21	
	НІТРОГРАНУЛОН Г	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. прол. дії у бл. та конт.	5,2мг	№10x5	1,15	
	НІТРОМАКС	ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна	табл. сублінг. у бан. в пач.	0,3мг; 0,4мг; 0,5мг	№50x4, №100x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НІТРО-МІК®	ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна	спрей сублінг. доз. по 15мл (300доз) у фл. з розпил.	0,4 мг/доза	№1	3,02	
	НІТРО-МІК®	ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл в амп.	1 мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	НІТРОГЛІЦЕРИН	ВАТ "Фармстандарт-Лексредства", Російська Федерація	табл. сублінг. в пробірці	0,5мг	№40	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НІТРОМІНТ®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	спрей сублінг. по 10г у бал. (180доз) з доз. прист.	0,4 мг/доза	№1	4,27	26,31/\$

2.11. Похідні сиднонімінів

- **Молсидомін (Molsidomine)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: C01DX12 - вазодилататори, що застосовуються в кардіології.

Основна фармакотерапевтична дія: є похідним сидноніміну; активний метаболіт молсидоміну - лінсидомін - поєднання, що знижує тонус гладеньких м'язів стінок судин та чинить антиангінальну дію; розслаблення гладеньких м'язів сприяє збільшенню об'єму вен та об'єму судинного русла, що призводить до зменшення венозного повернення, за рахунок чого зменшується тиск наповнення обох шлуночків; це зменшує навантаження на серце і покращує гемодинамічні умови у коронарному кровообігу; розширення артеріальних судин призводить до зниження периферичного опору, що зменшує навантаження на серце, зменшується напруга міокарда, і як наслідок, знижується потреба міокарда в кисні; зменшує спазм коронарних артерій і розширює їх великі гілки; антиагрегантна дія молсидоміну має клінічне значення при лікуванні ІХС. На відміну від нітратів, молсидомін не викликає тахіфілаксії.

Показання для застосування ЛЗ: ІХС ^{ПМД}: профілактика нападів стабільної і нестабільної стенокардії (особливо у пацієнтів літнього віку і при індивідуальній непереносимості нітратів); у складі комбінованого лікування хр. СН.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Дозування та частота прийому препарату встановлюються індивідуально для кожного пацієнта залежно від ступеня проявів та фази активності хвороби; зазвичай призначають 1-2 мг препарату 3-4 р/добу (3-8 мг молсидоміну на добу); при необхідності дозу можна збільшити до 4 мг препарату 3-4 р/добу (12-16 мг молсидоміну на добу); у випадку спонтанних нападів стенокардії останню дозу молсидоміну краще приймати перед сном; збільшення дози препарату слід робити поступово, щоб запобігти виникнення побічних р-цій у вигляді стійкого головного болю у деяких пацієнтів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, запаморочення, підвищена втомлюваність, сповільнена швидкість психомоторних та рухових р-цій (у більшості випадків на початку лікування), слабкість; нудота, втрата апетиту, діарея, блювання; тромбоцитопенія, недостатність кровообігу, виражене зниження АТ, ортостатична гіпотензія, до розвитку колапсу або шоку, тахікардія, почервоніння шкіри обличчя; р-ції гіперчутливості, включаючи АР, свербіж, висипи, бронхоспазм, астма, анафілактичний шок; кропив'янка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активної або до будь-якої з допоміжних речовин, глаукома (особливо закритокутова), г. ангінозний напад, г. ІМ, г. недостатність кровообігу, включаючи шок (в т.ч. кардіогенний), судинний колапс, виражена артеріальна гіпотензія (сistolічний тиск менше 100 мм рт. ст.), одночасне застосування інгібіторів фосфодіестерази 5 (ФДЕ 5) (силденафіл, варденафіл, тадалафіл) у зв'язку з високим ризиком розвитку артеріальної гіпотензії; токсичний набряк легень, зниження центрального венозного тиску; одночасне введення донорів оксиду азоту в будь-якій формі та стимуляторів розчинної гуанілатциклази (ріоцигуат) протипоказане ч/з ризик гіпотензії.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	СИДНОФАРМ	АТ "Софарма" (Виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка або виробництво за повним циклом)/АТ "ВІТАМІНИ" (Вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії),	табл. у бл.	2мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

		Болгарія/Україна					
	СИДОКАРД	АТ "КІЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	2мг	№10x3	72,00	
	СИДОКАРД	АТ "КІЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	4мг	№10x3	120,50	
II.	МОЛСІКОР	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польща	табл. у бл.	2мг	№30x1	23,01	31,09/€
	МОЛСІКОР	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польща	табл. у бл.	4мг	№30x1	31,09	31,09/€

2.12. Серцеві глікозиди

• Дигоксин (Digoxin) *

Фармакотерапевтична група: C01AA05 - кардіологічні препарати. Серцеві глікозиди. Глікозиди наперстянки.

Основна фармакотерапевтична дія: серцевий глікозид середньої тривалості дії; виявляє позитивну інотропну дію за допомогою утворення комплексу з Na^+K^+ -АТФази і порушення транспорту іонів натрію і калію через мембрани кардіоміоцитів, у результаті збільшується трансмембранний транспорт іонів кальцію і підсилюється їхнє вивільнення всередині кардіоміоцитів, і як наслідок - підвищується активність міофібрил, збільшує систолічний та ударний об'єми серця, подовжує ефективний рефрактерний період, уповільнює АВ-провідність та зменшує ЧСС переважно за рахунок підвищення тону парасимпатичної і зниження тону симпатичної частини вегетативної нервової системи; також проявляє помірний діуретичний ефект.

Показання для застосування ЛЗ: застійна СН^{БНФ, ВООЗ}, мерехтіння та тріпотіння передсердь^{БНФ, ВООЗ} (для регуляції ЧСС); суправентрикулярна пароксизмальна тахікардія^{БНФ, ВООЗ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим вводять в/в у дозі 0,25-0,5 мг (1-2 мл 0,025 % р-ну); вводять повільно у 10 мл 5 % р-ну глюкози або 0,9 % р-ну натрію хлориду; у перші дні лікування вводять 1-2 р/добу^{ВООЗ}, у наступні - 1 р/добу протягом 4-5 днів, після чого переходять на прийом р/ос у підтримуючих дозах; для крап. введення 1-2 мл 0,025 % р-ну розводять у 100 мл 5 % р-ну глюкози або 0,9 % р-ну натрію хлориду (вводять зі швидкістю 20-40 крап./хв); дорослим для швидкої дигіталізації внутрішньо призначати 0,5-1 мг^{БНФ, ВООЗ}, а потім кожні 6 год по 0,25-0,75 мг^{БНФ} протягом 2-3 днів; після поліпшення стану хворого переводять на підтримуючу дозу (0,125^{БНФ}-0,5 мг/добу за 1-2 прийоми); при повільній дигіталізації лікування одразу розпочинають з підтримуючої дози (0,125-0,5 мг/добу за 1-2 прийоми); насичення у цьому випадку настає приблизно ч/з 1 тиждень після початку терапії; МДД для дорослих становить 1,5 мг^{БНФ}; дітям віком від 2 років для швидкої дигіталізації застосовувати з розрахунку 0,03-0,06 мг/кг маси тіла на добу; для повільної дигіталізації - у дозі, яка становить ¼ дози для швидкого насичення; МДД насичення - 0,75-1,5 мг, МДД підтримуюча - 0,125-0,5 мг. Дітям доза насичення має бути введена за кілька прийомів: приблизно половина загальної дози дається як перша доза і далі - частки сумарної дози з інтервалом 4-8 год. з оцінкою клінічної відповіді перед кожною наступною дозою. Дози для дітей залежать від віку (мг/кг): недоношеним новонародженим - 0,02-0,03; доношеним новонародженим - 0,03-0,04; віком від 1 місяця до 2 років - 0,04-0,06; віком від 2 до 10 років - 0,03-0,04; віком від 10 років - 0,03.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: еозинофілія, тромбоцитопенія, агранулоцитоз, р-ції гіперчутливості, включаючи свербіж, гіперемію, висипання, у т. ч. еритематозне, папульозне, макулопапульозне, везикульозне; кропив'янку, набряк Квінке, гінекомастія у чоловіків при тривалому застосуванні, дезорієнтація, сплутаність свідомості, амнезія, депресія, г. психоз, марення, зорові і слухові галюцинації, судоми, головний біль, невралгія, підвищена втомлюваність, слабкість, запаморочення, сонливість, погані сновидіння, неспокій, нервозність, збудження, апатія, нечіткість зору, світлобоязнь, ефект ореолу, порушення зорового сприйняття (сприйняття навколишніх предметів у жовтому, у зеленому, червоному, синьому, коричневому або білому кольорі), порушення ритму та провідності (синусова брадикардія, СА блокада, монофокальна або мультифокальна екстрасистоля (особливо бігемінія, тригемінія), подовження інтервалу PR, депресія сегменту ST, АВ-блокада, пароксизмальна передсердна тахікардія, фібриляція шлуночків, шлуночкові аритмії), виникнення або посилення СН, анорексія, нудота, блювання, абдомінальний біль, діарея, порушення вісцерального кровообігу, ішемія та некроз кишечника.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату/інших серцевих глікозидів; інтоксикація препаратами наперстянки, що застосовувалися раніше; аритмії, спричинені глікозидною інтоксикацією, в анамнезі; виражена синусова брадикардія, АВ-блокада II-III ст., с-м Адамса-Стокса-Морганьї; с-м каротидного синуса; гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія; суправентрикулярні аритмії, асоційовані з додатковими АВ-шляхами провідності, у т. ч. с-м Вольфа-Паркінсона-Уайта; шлуночкова пароксизмальна тахікардія/фібриляція шлуночків; аневризма грудного відділу аорти; гіпертрофічний субаортальний стеноз; ізольований мітральний стеноз; ендокардит, міокардит, нестабільна стенокардія, г.ІМ, констриктивний перикардит, тампонада серця; гіперкальціємія, гіпокаліємія.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,25 мг., парентерально - 0,25 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДИГОКСИН	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії	табл. у бан., конт. та бл. в пач. та без	0,1мг	№50, №50x1, №25x2, №10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою, Україна/Україна/Україна					
ДИГОКСИН	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою, Україна/Україна/Україна	табл. у бан.	0,1мг	№50	0,98	
ДИГОКСИН	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у бл.	0,25мг	№10x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ДИГОКСИН	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у пач.	0,25мг	№10	6,97	
ДИГОКСИН	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл. у бл.	0,25мг	№20x2	0,25	
ДИГОКСИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл. в кор. та без	0,25мг	№10x5, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ДИГОКСИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл. в кор.	0,25мг	№50x1	0,22	

● **Строфантин (G-strophanthin)**

Фармакотерапевтична група: C01AC01 - кардіотонічні засоби. Серцеві глікозиди.

Основна фармакотерапевтична дія: серцевий глікозид, виділений із *strophanthus gratus*, це один із головних «полярних» серцевих глікозидів; чинить кардіотонічну дію, підвищує силу і швидкість скорочень міокарда (позитивний інотропний ефект), знижує ЧСС (негативний хронотропний ефект), зменшує AV провідність (негативний дромотропний ефект); при СН збільшує ударний і хвилинний об'єм серця, поліпшує спорожнення шлуночків, що призводить до покращання кровообігу; механізм дії полягає у частковому пригніченні натрій/калій-АТФ-ази в мембранах клітин міокарда, внаслідок чого зменшується повернення калію у кардіоцити та вихід із них натрію; стимулює виникнення ваготропного ефекту (брадикардії) за рахунок затримки проведення імпульсів ч/з провідну систему серця.

Показання для застосування ЛЗ: г. СН ; хр. СН IIb-III стадії (III-IV стадії за класифікацією NYHA), суправентрикулярна тахікардія, мерехтлива аритмія.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати дорослим в/в у дозі 1-2 мл (розчинити у 10-20 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду), вводити повільно впродовж 5-6 хв, 1 або 2 р/добу, краще вводити препарат в/в краплинно - для цього 1 мл препарату розчинити у 100 мл 5 % р-ну глюкози або 0,9 % р-ну натрію хлориду, краплинне введення зменшує вірогідність токсичних проявів, ч/з 1 год після в/в введення необхідно здійснювати ЕКГ-контроль, при виникненні частої, групової або політопної шлуночкової екстрасистолії введення препарату необхідно припинити, а наступну дозу зменшити у 2 рази, при необхідності разову дозу можна збільшити, для чого з інтервалом 0,5-2 год вводити додатково 0,1-0,15 мг (0,2-0,3 мл), при цьому максимальна разова доза не має перевищувати 0,25 мг, а добова - 1 мг (4 мл).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, запаморочення, сплутаність свідомості, підвищена втомлюваність, сонливість, порушення сну, психічні розлади (депресія, галюцинації, деліріозний психоз); порушення зору; зниження апетиту, нудота, блювання, діарея, у тяжких випадках - брижовий інфаркт; гінекомастія у чоловіків; тромбоцитопенічна пурпура, петехії, носові кровотечі; порушення ритму серця (брадиаритмія, шлуночкова тахікардія) та провідності (AV-блокада); анафілактичні р-ції, кропив'янка, АР; зміни в місці введення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату, глікозидна інтоксикація, констриктивний перикардит, г.ІМ, шлуночкова тахікардія, виражена брадикардія, AV-блокада II та III ступенів, СССВ, гіперкальціємія, гіпокаліємія, ізольований мітральний стеноз, гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія, перикардит, г. міокардит, ендокардит, виражений кардіосклероз, с-м каротидного синуса, аневризма грудного відділу аорти, с-м Вольфа-Паркінсона-Уайта; період вагітності та годування груддю.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,25 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	СТРОФАНТИН-Г	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у бл.	0,25 мг/мл	№5x2, №10x1		відсутня у реєстрі ОБЦ
	СТРОФАНТИН-Г	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у пач.	0,25 мг/мл	№10	2,73	
	СТРОФАНТИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у конт. чар/уп.	0,25 мг/мл	№5x2, №10x1	2,57	

2.13. Адреноміметичні лікарські засоби

2.13.1. α-, β-адреноміметики

- **Епінефрин (Epinephrine)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: C01CA24 - Неглікозидні кардіотонічні засоби. Адренергічні та допамінергічні препарати. Епінефрин.

Основна фармакотерапевтична дія: стимулює α- та β-адренорецептори різної локалізації; проявляє виражену дію на гладенькі м'язи внутрішніх органів, СС і дихальну систему, активує вуглеводний та ліпідний обмін; механізм дії зумовлений активацією аденілатциклази на внутрішній поверхні клітинної мембрани, підвищенням в/клітинної концентрації цАМФ і Ca²⁺; ефективність препарату залежить від дози: у дуже низьких дозах при швидкості введення менше 0,01 мг/кг/хв може знижувати АТ внаслідок розширення судин скелетної мускулатури; при швидкості введення 0,04-0,1 мг/кг/хв збільшує ЧСС і силу серцевих скорочень, ударний і хвилинний об'єм крові, знижує загальний периферичний опір судин; вище 0,2 мг/кг/хв - звужує судини, підвищує АТ (головним чином систолічний) і загальний периферичний судинний опір; пресорний ефект може спричинити короточасне рефлекторне уповільнення ЧСС; розслаблює гладкі м'язи бронхів; дози вище 0,3 мг/кг/хв знижують нирковий кровотік, кровопостачання внутрішніх органів, тонус і моторику ШКТ; підвищує провідність, збудливість і автоматизм міокарда; збільшує потребу міокарда в кисні; інгібує індуковане антигенами вивільнення гістаміну і лейкотрієнів, усуває спазм бронхіол, запобігає розвитку набряку їх слизової оболонки; спричиняє звуження судин, зниження швидкості всмоктування місцевоанестезуючих засобів, збільшує тривалість і знижує токсичний вплив місцевої анестезії; посилює виведення K⁺ із клітини і може призвести до гіпокаліємії; розширює зіниці, сприяє зниженню продукування в/очної рідини і ВОТ; спричиняє гіперглікемію і підвищує вміст у плазмі вільних жирних кислот; стимулює ЦНС, проявляє протиалергічну та протизапальну дію.

Показання для застосування ЛЗ: АР негайного типу: анафілактичний шок, що розвинувся при застосуванні ЛЗ, сироваток, переливанні крові, укусах комах або при контакті з алергенами; БА - купірування нападу; асистолія; зупинка серця; подовження дії місцевих анестетиків; АВ-блокада III ст., що г. розвинулась; артеріальна гіпотензія різного генезу (постгеморагічна, інтоксикаційна, інфекційна); гіпоглікемія внаслідок передозування інсуліну; при ідіопатичній чи обумовленій фізичним навантаженням анафілаксії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: п/ш, в/м, іноді в/в або в/в краплино, внутрішньосерцево (проведення реанімації при зупинці серця); дорослим: анафілактичний шок: вводити в/в повільно у дозі 0,5 мл, у розведеному вигляді (разову дозу розчиняють у 20 мл 40 % р-ну глюкози); надалі, у разі необхідності, продовжувати в/в краплинне введення зі швидкістю 1 мг/хв, для чого 1 мл р-ну адреналіну розчиняють у 400 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду або 5 % глюкози; якщо стан пацієнта дозволяє, більш доцільним є в/м або п/ш введення 0,3-0,5 мл в розведеному або нерозведеному вигляді; БА: вводити п/ш у дозі 0,3-0,5 мл, у розведеному або нерозведеному вигляді; при необхідності повторного введення цю дозу можна вводити через кожні 20 хв (до 3 разів); також можливим є в/в введення 0,3-0,5 мл в розведеному вигляді (разову дозу розчиняють у 20 мл 40 % р-ну глюкози); як судинозвужувальний засіб: вводити в/в краплино зі швидкістю 1 мг/хв (з можливим збільшенням до 2-10 мг/хв); асистолія: вводити внутрішньосерцево у дозі 0,5 мл у розведеному вигляді (разову дозу розчиняють у 10 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду); реанімаційні заходи (зупинка серця, АВ-блокада III ст., що г. розвинулась): вводити в/в повільно по 1 мл кожні 3-5 хв, у розведеному вигляді; дітям: асистолія у немовлят: вводити в/в повільно у дозі 10-30 мг/кг маси тіла кожні 3-5 хв; анафілактичний шок: вводять п/ш або в/м у дозі 10 мг/кг маси тіла (максимально - до 0,3 мг); при необхідності введення повторювати ч/з кожні 15 хв (до 3 разів); бронхоспазм: вводити п/ш у дозі 10 мг/кг маси тіла (максимально - до 0,3 мг); при необхідності введення повторювати кожні 15 хв (до 3-4 разів) чи кожні 4 год.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: стенокардія, брадикардія або тахікардія, відчуття серцебиття, задишка, стресова кардіоміопатія, летальна шлуночкова фібриляція, АГ, блідість, периферична ішемія; при високих дозах - шлуночкові аритмії; аритмія, біль у грудній клітці; зміни ЕКГ (включаючи зниження

амплітуди зубця Т); зниження або підвищення АТ (навіть при п/ш введенні у звичайних дозах унаслідок підвищення АТ можливий субарахноїдальний крововилив і геміплегія); ангіоневротичний набряк, бронхоспазм; головний біль, тремор, запаморочення, нервозність, м'язові посмикування, у пацієнтів з хворобою Паркінсона можливе підвищення ригідності та тремору; тривожний стан, психоневротичні розлади, психомоторне збудження, дезорієнтація, порушення пам'яті, агресивна чи панічна поведінка, розлади подібні до шизофренії, параноя, порушення сну; нудота, блювання, анорексія; утруднене і болісне сечовипускання (при гіперплазії передміхурової залози); гіпокаліємія, гіперглікемія; шкірне висипання, мультиформна еритема; біль або печіння у місці в/м ін'єкції; втома, підвищене потовиділення, порушення терморегуляції (відчуття холоду або жару), похолодіння кінцівок, при повторних ін'єкціях адреналіну може відзначатися некроз унаслідок судинозвужувальної дії препарату (включаючи некроз печінки або нирок); інфікування в місці ін'єкції, інфекції шкіри та м'яких тканин, включаючи некротизуючий фасциїт та міонекроз, спричинені *Clostridia*.

Протипоказання до застосування ЛЗ: індивідуальна гіперчутливість до компонентів ЛЗ; гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія; тяжкий аортальний стеноз; тахіаритмія; фібриляція шлуночків; феохромоцитом; закритокутова глаукома; шок (крім анафілактичного); загальна анестезія із застосуванням інгаляційних засобів: фторотану, циклопропану, хлороформу; II період пологів; застосування на ділянках пальців рук та ніг, носа, геніталій.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у конт. чар/уп.	1,8 мг/мл	№5x2, №10x1	1,62	
	АДРЕНАЛІН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у кор. та бл.	1,82 мг/мл	№5, №5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АДРЕНАЛІН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у бл.	1,82 мг/мл	№10x1	2,33	
	АДРЕНАЛІН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у кор.	1,82 мг/мл	№10	2,33	
II.	ЕПІПЕН	Мерідіан Медікал Текнолоджис, Інк. (виробник, відповідальний за виробництво нерозфасованої продукції (підготовка, асептична фільтрація, наповнення та укупорка); виробник, відповідальний за тестування та комплектацію)/МПФ Б.В. (Мануфактурінг Пекеджинг Фарм, США/Нідерланди/ Данія/Німеччина	р-н д/ін'єк. у ручці по 2мл (0,3 мг/доза) в тубі	1 мг/мл	№1	643,79	29,60/€
	ЕПІПЕН ЮНІОР	Мерідіан Медікал Текнолоджис, Інк. (виробник, відповідальний за виробництво нерозфасованої продукції (підготовка, асептична фільтрація, наповнення та укупорка); виробник, відповідальний за тестування та комплектацію)/МПФ Б.В. (Мануфактурінг Пекеджинг Фарм, США/Нідерланди/ Данія/Німеччина/Німеччина	р-н д/ін'єк. у ручці по 2мл (0,15мг/доза) в тубі	0,5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Норепінефрин (Norepinephrine)**

Фармакотерапевтична група: С01СА03 - неглікозидні кардіотонічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить дуже сильну дію на α -рецептори та більш помірний вплив на β -1 рецептори; норадреналін (норепінефрин) 1 мг/мл спричиняє генералізоване звуження кровоносних судин, за винятком коронарних судин, які він розширює опосередковано шляхом збільшення споживання кисню; у результаті цього відбувається збільшення сили (та при відсутності вагального гальмування) та частоти скорочення серцевого м'яза (міокарда); периферичний опір судин збільшується, а діастолічний і систолічний тиск зростає.

Показання для застосування ЛЗ: показаний для невідкладного (негайного) відновлення АТ у випадках г. гіпотензії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: початкова швидкість інфузії (в/в введення) повинна становити від 10 мл/год до 20 мл/год (від 0,16 мл/хв до 0,33 мл/хв); це еквівалентно від 0,8 мг/год до 1,6 мг/год норадреналіну тартрату (або від 0,4 мг/год до 0,8 мг/год норадреналіну основи); одразу ж після встановлення інфузії норадреналіну слід підібрати дозу відповідно до пресорного ефекту, що спостерігається; існує значне варіювання дози, необхідної для досягнення та підтримання нормального АТ у пацієнтів; основна мета полягає в тому, щоб встановити

низький нормальний систолічний АТ (100-120 мм рт.ст.) або досягти відповідного середнього АТ (більше 65-80 мм рт.ст. - залежно від стану пацієнта); якщо використовуються інші р-ни, слід ретельно виконати розрахунок дози перед тим, як розпочати лікування; лікування норадреналіном необхідно продовжувати до того часу, поки показана підтримка вазоактивним лікарським препаратом; пацієнт повинен перебувати під ретельним контролем і наглядом протягом усього періоду лікування норадреналіном; інфузію не можна припиняти раптово, її слід припиняти поступово, щоб уникнути різкого зниження АТ.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АГ, гіпоксія тканин; ішемічні ураження ч/з сильну судинозвужувальну дію можуть призвести в результаті до похолодання та блідості кінцівок і обличчя; тахікардія, брадикардія (можливо, як рефлекторний результат підвищення АТ), аритмія, серцебиття, збільшене скорочення серцевого м'яза (міокарда) в результаті β-адренергічного впливу на серце (інотроп і хронотроп), г. СН; тривожність (неспокій), порушення сну (безсоння), сплутаність (затьмарення) свідомості, головний біль, психотичний стан, слабкість, тремор, погіршення уваги та пильності, анорексія, нудота та блювання; затримка сечовипускання; дихальна недостатність або утруднене дихання, диспное (задишка); можливе подразнення та некроз у місці введення препарату; г. глаукома; дуже часто виникає у пацієнтів, які анатомічно схильні до закривання райдужно-рогівкового кута (кут передньої камери очного яблука); сильне звуження периферичних і вісцеральних судин; зниження ниркового кровотоку; зменшення сечовипускання; гіпоксія; збільшення рівнів лактата в сироватці крові; фотофобія, загрудинний біль, біль у гортані, посилене потовиділення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: використання концентрату норадреналіну 1 мг/мл для приготування інфузійного р-ну протипоказано для пацієнтів із відомою гіперчутливістю (АР) до норадреналіну або на будь-які допоміжні речовини; артеріальна гіпотензія ч/з недостатній об'єм крові (гіповолемія, зменшення ОЦК); використання пресорних амінів під час циклопропанової або галотанової анестезії може спричинити тяжку аритмію серця; ч/з можливий підвищений ризик фібриляції шлуночків норепінефрин слід застосовувати з обережністю пацієнтам, які отримують ці або будь-які інші сенсibiliзуючі препарати для серця або у яких спостерігається посилена гіпоксія або гіперкапнія.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 6 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	Н-ЕПІ	ПТ. Новелл Фармасьютикал Лабораторіз, Індонезія	р-н д/ін'єк. в амп. по 4мл	1 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НОРАДРЕНАЛІНУ ТАРТРАТ АГЕТАН 2 МГ/МЛ (БЕЗ СУЛЬФІТІВ)	Лабораторія Агетан, Франція	конц. д/р-ну д/інфуз. в амп. по 8мл у бл.	2 мг/мл	№5x2	72,93	32,22/€
	НОРАДРЕНАЛІНУ ТАРТРАТ АГЕТАН 2 МГ/МЛ (БЕЗ СУЛЬФІТІВ)	Лабораторія Агетан, Франція	конц. д/р-ну д/інфуз. в амп. по 4мл у бл.	2 мг/мл	№5x2	97,24	32,22/€

• **Допамін (Dopamine) ***

Фармакотерапевтична група: C01CA04 - неглікозидні кардіотонічні засоби. Адренергічні та допамінергічні препарати.

Основна фармакотерапевтична дія: попередник біосинтезу норадреналіну, має специфічний стимулюючий вплив на дофамінові рецептори, в більших дозах стимулює також α- і β-адренорецептори; підвищує загальний периферичний опір судин та систолічний АТ, посилює серцеві скорочення, збільшує серцевий викид; ЧСС змінюється відносно мало; підвищує потребу міокарда в кисні, але у зв'язку зі збільшенням коронарного кровотоку забезпечує підвищену доставку кисню; зменшує опір ниркових судин зі збільшенням у них кровотоку, збільшує клубочкову фільтрацію, екскрецію натрію; фармакологічні ефекти залежні від концентрації діючої речовини в крові; у низьких дозах (0,5-2 мг/кг/хв.) впливає в основному на дофамінові рецептори; розширює мезентеріальні, мозкові, коронарні судини, зменшує опір ниркових судин, збільшує клубочкову фільтрацію, збільшує діурез та виведення натрію з організму. В інтервалі середніх доз (2-10 мг/кг/хв.) стимулює β₁-адренорецептори, чим спричиняє позитивний інотропний ефект, збільшує хвилиний об'єм серця. У дозах 10 мг/кг/хв. і вищих більше впливає на α₁-адренорецептори, чим збільшує загальний периферичний опір судин, звужує ниркові судини, підвищує АТ, знижує діурез. Після припинення введення ефект триває не більше 5-10 хв.

Показання для застосування ЛЗ: стани шоку або стани, що загрожують виникненню шоку: СН, зумовлена г. ІМ (кардіогенний шок)^{БНФ, ВООЗ}; стан шоку після операцій; тяжкі інфекції (інфекційно-токсичний шок); р-ції гіперчутливості (анафілактичний шок); виражене зниження АТ (тяжка гіпотензія) будь-якого генезу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в тільки у вигляді інфузій; дозу кожному пацієнту слід ретельно підбирати шляхом титрування. до початку лікування необхідно відновити ОЦК. Дорослим пацієнтам, у яких може бути відповідь на помірне підтримання функціонування серця і кровообігу, можна проводити вливання дофаміну у початковій дозі 2,5 мг/кг маси тіла за хв.; у цьому випадку для тяжко хворих пацієнтів початкова доза має становити 5 мг/кг^{БНФ, ВООЗ}, і якщо необхідно, її можна потроху збільшувати (кожні 15-30 хв.) до 10 мг/кг маси тіла за хв.^{ВООЗ} до максимальної дози 20-50 мг/кг маси тіла за хв.; у більшості хворих вдається досягти задовільного стану при застосуванні доз дофаміну нижче 20 мг/кг маси тіла за хв., застосування препарату у дозі понад 20 мг/кг маси тіла за хв. може супроводжуватися скороченням ниркового кровотоку. У випадку погіршення серцевої недостатності дофамін слід застосовувати у вигляді інфузії в дозі не більш ніж 50 мг/кг маси тіла за хв., якщо є необхідність у застосуванні дози більшої, ніж 50 мг/кг маси тіла за хв., слід контролювати діурез.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: відчуття серцебиття, порушення серцевого ритму, у т.ч. тахікардія (шлуночкова, суправентрикулярна та синусова); головний біль; брадикардія, аритмії (екстрасистолія, шлуночкова екстрасистолія, шлуночкова аритмія), ектопічний серцевий ритм, аберантна шлуночкова провідність, порушення серцевої провідності, AV-блокади, розширення QRS-комплексу; за грудиною біль, ангінальні болі, ішемія міокарда, стенокардія, підвищення тиску в шлуночках, підвищення АТ, гіпотензія, спазм периферичних артерій, вазоконстрикція, кровотечі; нудота, блювання; у пацієнтів із ДН спостерігається збільшення гіпоксемії, що притаманна збільшеному кровообігу гіповентильованих альвеолярних ділянок (легеневий вбудований шунт); мідріаз; кровотечі зі ШКТ; поліурія; азотемія; підвищення рівня сечовини крові; неспокій, тривожність, відчуття страху, тремор, пілоерекція; р-ції гіперчутливості, гіперемія, свербіж, відчуття печіння шкіри, у хворих на БА - бронхоспазм, порушення свідомості, шок; р-ції у місці введення: при попаданні ЛЗ під шкіру - некрози шкіри, п/ш клітковини; периферична ішемічна гангрена у пацієнтів з уже існуючими судинними розладами; пацієнтам із закупоркою артеріальних судин в анамнезі (артеріосклероз, артеріальна емболія, хвороба Рейно, холодкові травми, такі як обмороження, діабетична мікроангіопатія або хвороба Вінівартера-Бюржера) слід ретельно контролювати будь-які зміни кольору або температури шкіри кінцівок.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до допаміну або до будь-якого іншого компонента препарату; феохромоцитома, закритокутова глаукома, гіпертиреоз, гіпертрофія передміхурової залози із с-ромом залишкової сечі, тахіаритмія, фібриляція шлуночків, а також стани, які супроводжуються механічним опором наповненню шлуночків; гіповолемія (перед початком лікування необхідно відкоригувати дефіцит ОЦК); уникати анестезії циклопропаном та галогенізованими вуглеводами.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,5 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	5 мг/мл	№5x2	94,18	
	ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	40 мг/мл	№5x2	77,67	
II.	ДОПАМІН АДМЕДА 200	Гаупт Фарма Вюльфінг ГмбХ, Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. в амп. по 10мл	200мг/10мл	№5	120,17	32,05/€

2.13.2. β2-адреноміметики

• Добутамін (Dobutamine)

Фармакотерапевтична група: C01CA07 - кардіологічні засоби. Адренергічні та допамінергічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: адреностимулююча дія; інотропний агент прямої дії, первинна активність якого зумовлена стимуляцією β1-адренорецепторів, а також α1-адренорецепторів серця; також викликає непрямий позитивний хронотропний ефект через розширення периферичних судин; викликає такі фармакологічні ефекти: посилює скорочення міокарда з підвищенням ударного об'єму крові і серцевого викиду; стимулює периферичні β2-адренорецептори і меншою мірою α2-адренорецептори і таким чином може викликати позитивний хронотропний ефект, викликає дозозалежні зміни гемодинаміки: збільшує серцевий викид, головним чином внаслідок підвищення ударного об'єму крові; збільшує ЧСС, особливо при застосуванні високих доз, зменшує тиск наповнення лівого шлуночка, системний судинний опір і при застосуванні високих доз також зменшує опір легневих судин; підвищує AV-провідність і автоматизм синусового вузла, тимчасово знижує агрегацію тромбоцитів, підвищує потребу міокарда в кисні, але збільшення хвилинного об'єму серця і в результаті цього підвищення коронарного кровотоку, як правило, компенсують ці ефекти і зумовлюють тенденцію до більш сприятливого кисневого балансу порівняно з іншими позитивними інотропними речовинами; не впливає на допамінергічні рецептори і (на відміну від, наприклад, дофаміну) на вивільнення ендогенного адреналіну; не має прямої дофамінергічної дії на перфузію нирок, може викликати появу аритмій.

Показання для застосування ЛЗ: СН з низьким серцевим викидом, пов'язаною з ІМ, кардіоміопатіями^{БНФ}, інфекційно-алергічним шоком, кардіогенним шоком та операціями на серці^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дозу підбирати індивідуально; швидкість і тривалість введення препарату залежать від р-ції хворого на лікування і появи побічних ефектів; у випадках безперервного введення протягом більше 72 год. може виникнути толерантність до препарату і у зв'язку з цим з'явиться необхідність збільшення дози; перед припиненням введення препарату зменшувати дозу рекомендується поступово. Більшість хворих реагує на дози від 2,5 до 10 мкг/кг/хв.^{БНФ}, в окремих випадках доза добутаміну може досягати 40 мкг/кг/хв.; у вигляді 50 мл р-ну для інфузій можна застосовувати нерозведеним при використанні постійних інфузійних насосів; якщо необхідно, препарат перед призначенням можна додатково розвести у 5 % р-ні глюкози, 0,9 % р-ні натрію хлориду або р-ні Рінгера з лактатом; можна призначати тільки у вигляді в/в інфузій; оскільки добутамін має короткий період напіввиведення в/в введення препарату повинно бути безперервним, після розведення вводять ч/з в/в голку або катетер, застосовуючи інфузійну систему для краплинного вливання або інший пристрій для вимірювання дози; щоб забезпечити точність дозування, високі концентрації добутаміну слід призначати тільки ч/з інфузійний насос. Дози для інфузійних насосів (1 ампула, яка містить 250 мг добутаміну у 50 мл р-ну для інфузій): при масі тіла хворого 70 кг, при низькому діапазоні дозування (2,5 мкг/кг на хв.), швидкість введення - 2,1 (0,035) мл/год (мл/хв); при середньому діапазоні дозування (5 мкг/кг на хв.) - 4,2 (0,07) мл/год (мл/хв); при високому діапазоні дозування (10 мкг/кг на хв.) - 8,4 (0,14) мл/год (мл/хв.) Дози для інфузійних систем (250 мг добутаміну на 500 мл розчинника): при масі тіла хворого 70 кг, при низькому діапазоні дозування (2,5 мкг/кг на хв.)

- швидкість введення 21 (7) мл/год (крапель/хв); при середньому (5 мкг/кг на хв.) - 42 (14) мл/год (крапель/хв.); при високому (10 мкг/кг на хв.) - 84 (28) мл/год (крапель/хв.). Якщо концентрація подвоюється, швидкість введення необхідно зменшити удвічі. Можна застосовувати для лікування дітей будь-якого віку, починати введення рекомендовано з дози 2,5-5 мкг/кг/хв, поступово підвищуючи її максимально до 15 мкг/кг/хв залежно від ефекту.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль; збільшення ЧСС; зменшення АТ, шлуночкові аритмії, дозозалежні шлуночкові екстрасистоли, шлуночкова тахікардія у хворих, схильних до мерехтіння передсердь; звуження судин, зокрема, у пацієнтів, які лікувалися бета-блокаторами; ангінальний біль, відчуття серцебиття; вентрикулярна тахікардія, вентрикулярна фібриляція; брадикардія, ішемія міокарда, ІМ, зупинка серця, стенокардія; зменшення тиску у легневих капілярах; р-ції гіперчутливості (висипання на шкірі, гарячка, бронхоспазм); зниження рівня калію у сироватці крові. Ехокардіографія з навантаженням добутамінном: за грудинний ангінальний дискомфорт, шлуночкові екстрасистоли з частотою до > 6 хв; суправентрикулярні екстрасистоли, вентрикулярна тахікардія; вентрикулярна фібриляція, ІМ, вторинне виникнення AV- блокади, коронарний спазм судин; декомпенсована артеріальна гіпертензія/гіпотензія, відчуття серцебиття; напруження кардіоміопатії; задихка, бронхоспазм; екзантема, геморагічні петехії, біль у грудях; гарячка, флебіти у місці введення; неспокій, нудота, головний біль, парестезії, тремор, посилення діурезу; відчуття серцебиття, міоклонічний спазм.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до добутаміну та інших компонентів препарату, механічний опір наповненню і/або звільненню шлуночка, наприклад, внаслідок тампонади серця, констриктивного перикардиту, гіпертрофічної обструктивної кардіоміопатії, тяжкої форми аортального стенозу; гіповолемічні стани; одночасне застосування інгібіторів МАО, ехокардіографія з навантаженням добутамінном: гіперчутливість до добутаміну в анамнезі; одночасне застосування МАО, при застосуванні атропіну необхідно враховувати протипоказання до його застосування; не можна застосовувати для діагностичного тестування ішемії міокарда у рамках ехокардіографічного дослідження у таких випадках: нещодавно перенесений ІМ (протягом 30 днів після ІМ); нестабільна стенокардія; стеноз головної лівої коронарної артерії; гемодинамічна виражена обструкція відтоку лівого шлуночка, у т.ч. числі гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія; гемодинамічне виражене ураження серцевого клапана; тяжка СН (NYHA III або IV ступеня); схильність до аритмії або задокументована в анамнезі клінічно існуюча або хр. аритмія, особливо рецидивуюча постійна шлуночкова тахікардія; суттєве порушення провідності; г. перикардит, міокардит або ендокардит; розшарування аорти; аортальна аневризма; слабе УЗ-зображення; неадекватне лікування або контроль підвищення АТ; обструкція шлуночкового заповнення (стенозуючий перикардит, перикардальна тампонада); гіповолемія.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,5 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДОБУТАМІН АДМЕДА	Гаупт Фарма Вюльфінг ГмБХ, Німеччина	р-н д/інфуз. по 50мл в амп. в кор.	250мг/50мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДОБУТАМІН АДМЕДА	Гаупт Фарма Вюльфінг ГмБХ, Німеччина	р-н д/інфуз. по 50мл в амп. в кор.	250мг/50мл	№1	453,30	32,85/€
	ДОБУТЕЛ	ПТ. Новелл Фармасьютікал Лаботоріс, Індонезія	р-н д/ін'єк., по 5мл у фл.	50 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

2.13.3. Інші кардіологічні лікарські засоби

2.13.3.1. Простагландини

- **Алпростадил (Alprostadii)**

Фармакотерапевтична група: C01EA01 - кардіологічні засоби. Простагландини.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний аналог простагландину E₁; ефект його комплексний і базується на сприянні мікроциркуляції та відкритті колатеральних судин; у системному та легневому колах кровообігу викликає вазодилатацію (на рівні артеріол та передкапілярних сфінктерів та/або також у м'язових артеріях), розслаблює гладкі м'язи кавернозних тіл, а у колі кровообігу плода підтримує відкритий стан артеріальної протоки; впливає на коагуляцію крові, діючи як антиадгезивна та антиагрегаційна речовина на тромбоцити; покращує реологічні властивості крові шляхом підвищення гнучкості еритроцитів і зниження агрегаційної здатності тромбоцитів; здійснює антиатерогенний ефект шляхом інгібування активації нейтрофілів і надлишкової проліферації клітин судинних стінок, та ч/з зниження синтезу холестерину та його відкладання в стінках судин, виявляє фібринолітичний ефект.

Показання для застосування ЛЗ: лікування хр. облітеруючих захворювань артерій III стадії у дорослих пацієнтів (за класифікацією Фонтейна), які не підлягають ревазуляризації або у яких ревазуляризація не мала успіху; хр. ішемія нижніх кінцівок на стадії болю у стані спокою та трофічних змін (стадії III та IV); критичні вроджені вади серця у новонароджених, пов'язані з незарощенням артеріальної протоки, при яких показана хірургічна реконструкція (з метою тимчасового забезпечення функціонування артеріальної протоки перед проведенням коригувальної операції).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі - для в/в терапії лікування хр. ішемії нижніх кінцівок, застосовують протягом декількох тижнів, рекомендована доза 50-200 мкг/добу, яку вводять 1 р/добу або у вигляді двох окремих доз протягом щонайменше двогодинної інфузії 200 - 500 мл р-ну препарату; у якості р-ників використовують ізотонічний р-н хлориду натрію (фізіологічний р-н), 5% або 10% р-н глюкози; такий р-н готувати безпосередньо перед початком інфузії у пацієнта; курс лікування повинен тривати принаймні 2 тижні; у випадку позитивного ефекту лікування проводити ще протягом 7-14 днів; проте курс лікування не повинен перевищувати 4 тижні; якщо протягом перших 2х тижнів лікування не досягається бажаний ефект, препарат відмінити. *Збереження*

прохідності артеріальної протоки: новонародженим алпростадил бажано застосовувати за допомогою безперервної в/в інфузії (як альтернативу, вводячи до артеріальної протоки ч/з пупкову артерію); рекомендована початкова доза - 0,01-0,05 мкг/кг/хв; у разі реєстрації терапевтичної відповіді, тобто ознак відкриття або повторного відкриття артеріальної протоки, дозу препарату слід знизити до мінімальної ефективної терапевтичної дози (зазвичай 0,01-0,02 мкг/кг/хв); у виняткових випадках, якщо початкова доза не є ефективною, дозу препарату можна підвищити до 0,1 мкг/кг/хв. Пор. д/р-ну для інфузій: дорослим - 1 р/добу 60 мкг алпростадилу (1 амп.), вміст якої розчинити у 50-250 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду; тривалість інфузії 2 год.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тромбоцитопенія, лейкоцитоз, анемія; АР (включаючи висипання, відчуття набряку, дискомфорту у суглобах, фебрильну р-цію, пітливість, озноб), анафілактичні або анафілактоїдні р-ції; головний біль, вертиго, ортостатична гіпотензія, парестезія кінцівки, на якій проводилася маніпуляція, сплутаність свідомості, церебральні судоми, інсульт; зниження систолічного АТ, тахікардія, стенокардія, СН, ІМ, артеріальна гіпотензія, ортостатична артеріальна гіпотензія, диспноє, набряк легень; підвищення рівня печінкових ферментів (трансаміназ), нудота, блювання, діарея, пітливість, гіперостоз, біль у суглобах, біль, еритема, подразнення, набряк, тромбоз, флебіт у місці введення, набряк кінцівки (в яку проводиться інфузія), відчуття потепління, відчуття припухлості, парестезія; озноб, втомлюваність, тремор, підвищення t° тіла, локалізована кровотеча; підвищення рівнів С-реактивного білка; оборотний гіперостоз довгих трубчастих кісток після застосування препарату більше 4 тижнів; гіпоглікемія, дратівливість, судоми, летаргія, брадикардія або тахікардія, фібриляція шлуночків серця, АВ-блокада II ст., суправентрикулярна тахікардія, ламкість судин, шок, кровотеча, гіперемія, від гіповентиляції до апное, брадипное, задишка, тахіпное, гіперкапнія, обструкція шлунка, гіпертрофія слизової оболонки шлунка, перитоніт, гіпербілірубінемія, екзостоз, гіперостоз, ригідність шиї, анурія, порушення ф-ції нирок, гематурія, лихоманка, транзиторна пірексія, розширення судин шкіри (гіперемія), гіпотермія, тахіфілаксія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: хр. ішемії нижніх кінцівок: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин; вагітність та/або період годування груддю; ІХС, г. або підгострий ІМ, перенесений ІМ протягом останніх 6 міс, недостатність або стеноз аортального чи мітрального клапанів, декомпенсована СН III та IV класу за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації (NYHA); аритмії зі значними гемодинамічними порушеннями; тяжке обструктивне бронхопультмональне захворювання, венооклюзивні захворювання легень, г. набряк легень або набряк легень в анамнезі у пацієнтів із СН; наявність легеневого інфільтрату, підтверджена за допомогою рентгенологічного обстеження або клінічно; г. печінкова недостатність (підвищений рівень трансаміназ або гамма-ГТ) або із задокументованою недостатністю печінки тяжкого ступеня (включаючи в анамнезі); тяжка ниркова дисфункція (олігоанурія) (ШКФ ≤ 29 мл/хв/1,73 м²); існуючий ризик геморагічних ускладнень (інсульт, виразка шлунка або ДПК, проліферативна ретинопатія з тенденцією до кровотеч/крововиливів, політравма і т.п.); артеріальна гіпотензія тяжкого ст.; загальні протипоказання проти інфузійної терапії (застійна СН, набряк легень чи мозку та гіпергідратація). Збереження прохідності артеріальної протоки: респіраторний дистрес-синдром; спонтанно стійке незарощення артеріальної протоки.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АЛПРОСТАН®	ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка	конц. д/р-ну д/інфуз. по 0,2мл в амп. у бл.	0,1мг/0,2мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАЗАПРОСТАН®	Ейсика Фармасьютикалз ГмбХ (контроль якості нерозфасованої продукції та відповідальний за випуск серії, вторинне пакування)/ІДТ Біологіка ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування, візуальний контроль, контроль стерильності/бактеріаль, Німеччина/Німеччина	пор. д/р-ну д/інфуз., в амп. по 5мл	20мкг, 60мкг	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАЗОСТЕНОН	АТ "Кевельт", Естонія	конц. д/приг. р-ну д/інфуз., по 1мл в амп.	20 мкг/мл	№5, №20	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАЗОСТЕНОН	АТ "Кевельт", Естонія	конц. д/приг. р-ну д/інфуз., по 1мл в амп.	20 мкг/мл	№10	4851,80	30,32/€
	ВАП 20	БЕГ Хеалф Кер ГмбХ (виробник, відповідальний за виробництво нерозфасованої продукції, первинного та вторинного пакування)/Дрем Фарма ГмбХ (виробник, відповідальний за	конц. д/приг. р-ну д/інфуз., по 1мл в амп.	20 мкг/мл	№5	10748,85	28,37/€

		випуск серії), Німеччина/Австрія					
ВАП 20		БЕГ Хеалф Кер ГмбХ (виробник, відповідальний за виробництво нерозфасованої продукції, первинного та вторинного пакування)/Дрем Фарма ГмбХ (виробник, відповідальний за випуск серії), Німеччина/Австрія	конц. д/приг. р-ну д/інфуз., по 1мл в амп.	20 мкг/мл	№10	8428,08	28,37/€

2.13.3.2. Лікарські засоби метаболічної дії

• Триметазидин (Trimetazidine)

Фармакотерапевтична група: C01EB15 - кардіологічні засоби.Триметазидин.

Основна фармакотерапевтична дія: завдяки збереженню енергетичного метаболізму у клітинах, які потерпають від гіпоксії або ішемії, триметазидин запобігає зменшенню рівня внутрішньоклітинного АТФ, забезпечуючи тим самим належне функціонування іонних насосів і трансмембранного натрієво-калієвого потоку при збереженні клітинного гомеостазу; гальмує β-окиснення жирних кислот, блокуючи довголанцюгову 3-кетואцил-КоА тіолазу, що підвищує окиснення глюкози; у клітинах в умовах ішемії процес отримання енергії шляхом окиснення глюкози потребує менше кисню порівняно з процесом отримання енергії шляхом β-окиснення жирних к-т; посилення процесу окиснення глюкози оптимізує енергетичні процеси у клітинах та відповідно підтримує достатній метаболізм енергії в умовах ішемії; у пацієнтів з ІХС діє як метаболічний агент, зберігаючи внутрішньоклітинні рівні високоенергійних фосфатів у міокарді; ефекти досягаються без супутніх гемодинамічних ефектів.

Показання для застосування ЛЗ: дорослим триметазидин показаний для симптоматичного лікування стабільної стенокардії за умови недостатньої ефективності або непереносимості антиангінальних препаратів першої лінії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: 1 табл. 35 мг триметазидину 2 р/добу під час їди, 1 табл. 20 мг триметазидину 3 р/добу під час їди, застосовують р/ос вранці та ввечері, капс: 80 мг 1 р/добу вранці під час сніданку; після 3 міс. лікування необхідно оцінити результати лікування та у разі відсутності ефекту триметазидин необхідно відмінити.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: запаморочення, головний біль; симптоми паркінсонізму (тремор, акінезія, гіпертонус м'язів, нестійкість ходи, с-м «неспокійних ніг» та інші рухові розлади, що мають відношення до вищезазначеного); розлади сну (безсоння, сонливість); пальпітація, екстрасистолія, тахікардія,вертиго, артеріальна гіпотензія, ортостатична гіпотензія, яка може бути асоційована з нездужанням, запамороченням або падінням, зокрема у пацієнтів, які застосовують антигіпертензивні засоби, почервоніння обличчя; біль в абдомінальній ділянці живота, діарея, диспепсія, нудота та блювання, запор; висип, свербіж, кропив'янка, г. генералізований екзантематозний пустульозний висип, ангіоневротичний набряк; астенія; агранулоцитоз, тромбоцитопенія, тромбоцитопенічна пурпура; гепатит.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої допоміжної речовини, хвороба Паркінсона, симптоми паркінсонізму, тремор, с-м «неспокійних ніг» та інші рухові розлади, що мають відношення до вищезазначеного, тяжка ниркова недостатність (кліренс креатиніну < 30 мл/хв).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 40 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КАРДАЗИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№30x1, №10x3		відсутня у реєстрі ОБЦ
	КАРДАЗИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№30x2	3,44	
	КАРДУКТАЛ	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	20мг	№10x3	1,86	
	КАРДУКТАЛ	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	20мг	№10x6	1,89	
	ТРИДУКТАН	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., в криті п/о з м/в у бл.	20мг	№30, №60, №90		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ТРИДУКТАН МВ	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., в криті	35мг	№20,		відсутня у

			п/о з м/в у бл.		№30, №60, №80	реєстрі ОБЦ	
	ТРИКАРД	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., в криті п/о у бл.	20мг	№10x3	2,57	
	ТРИМЕТАЗИДИН-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл., в/о у бл.	20мг	№30x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТРИМЕТАЗИДИН-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл., в/о у бл.	20мг	№30x2	3,00	
	ТРИМЕТАЗИДИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., в/о у конт. чар/уп.	20мг	№10x6	2,58	
II.	КАРВІДОН–MR	Мікро Лабс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о з м/в у бл.	35мг	№10x10	2,14	28,20/\$
	КАРМЕТАДИН	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл., в криті п/о з м/в у бл.	35мг	№30x2	2,34	28,67/\$
	ПРЕДИЗИН®	ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща" (контроль якості, дозвіл на випуск серії; виробництво нерозфасованого продукту, первинна упаковка, вторинна упаковка)/Гедеон Ріхтер Румунія А.Т. (контроль якості, дозвіл на випуск серії; виробництво нерозфасованого продукту, пер, Польща/Румунія/Угорщина	табл. прол. дії, вкриті п/о у бл.	35мг	№10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПРЕДУКТАЛ® MR	Лабораторії Серв'є Індастрі/АНФАРМ Підприємство Фармацевтичне АТ, Франція/Польща	табл., вкриті п/о, з м/в у бл.	35мг	№30x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПРЕДУКТАЛ® ОД 40 МГ	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС (Виробництво та контроль якості, пакування та випуск серії), Угорщина	капс. прол. дії тверді у бл.	40мг	№10x3, №10x9	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПРЕДУКТАЛ® ОД 80 МГ	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС (Виробництво та контроль якості, пакування та випуск серії), Угорщина	капс. прол. дії тверді у бл.	80мг	№10x3, №10x9	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТРАЙМЕТАКОР	Лабормед-Фарма С.А., Румунія	табл., в криті п/о з м/в у бл.	35мг	№10x3, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТРАЙМЕТАКОР	Лабормед-Фарма С.А., Румунія	табл., в криті п/о з м/в у бл.	35мг	№10x6	1,34	32,39/€
	ТРИМЕСТАР МВ	Людін Лімітед, Індія	табл. прол. дії у бл.	35мг	№30x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТРИМЕТАЗИДИН MR СЕРВ'Є	Лабораторії Серв'є Індастрі/АНФАРМ Підприємство Фармацевтичне АТ, Франція/Польща	табл., в криті п/о, з м/в у бл.	35мг	№30x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

Комбіновані препарати

- **Інозин + L-аргінін (Inosine + L-arginine)**

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КОРАРГІН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	100мг/100мг	№10x5, №10x90	відсутня у реєстрі ОБЦ	

2.13.3.3. Інші кардіотонічні засоби

- **Левосимендан (Levosimendan) ****

Фармакотерапевтична група: С01СХ08 - лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях ССС. Лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях серця. Неглікозидні кардіотонічні засоби. Інші кардіотонічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: посилює чутливість скорочувальних білків до кальцію, зв'язуючись із кардіотропоніном С кальціезалежним способом; збільшує силу скорочень, але не порушує вентрикулярної релаксації; відкриває АТФ-чутливі калієві канали у гладких м'язах судин, т.ч. стимулюючи вазодилатацію системних артерій, коронарних артерій та системних вен; у пацієнтів із СН позитивні інотропні та судинорозширювальні ефекти левосимендану призводять до збільшення скорочувальної сили міокарда та зменшення переднавантаження та постнавантаження без побічного впливу на діастолічну ф-цію; активує уражений міокард у пацієнтів після коронарної ангіопластики або тромболізу; збільшує хвилинний об'єм серця, ударний об'єм, фракцію викиду, ЧСС та знижує систолічний та діастолічний тиск, тиск у кінцевих капілярах

легенів, тиск у правому передсерді та периферичний судинний опір. Збільшує коронарний кровотік у пацієнтів, які одужують після коронарних хірургічних операцій, та поліпшує перфузію міокарда у пацієнтів із СН, без значного підвищення споживання кисню міокардом.

Показання для застосування ЛЗ: нетривале лікування г.декомпенсованої хр. СН тяжкого ст. при неефективності традиційної терапії і при станах, коли необхідна інотропна підтримка.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначений лише для застосування у спеціалізованих медичних закладах, де є необхідне обладнання для контролю та оцінки стану пацієнта та персонал має досвід застосування інотропних засобів; дозу та тривалість лікування визначають індивідуально, відповідно до клінічного стану пацієнта та відповіді на лікування; лікування необхідно розпочати з дози насичення 6–12 мкг/кг, яку вводять протягом не менш ніж 10 хвилин з подальшим безперервним введенням зі швидкістю 0,1 мкг/кг/хв.; зниження дози насичення до 6 мкг/кг рекомендовано пацієнтам із супутньою в/в терапією судинорозширювальними та/або інотропними засобами на початку інфузії; вищі дози насичення призведуть до сильнішої гемодинамічної відповіді, що може бути пов'язане з нетривалим збільшенням частоти побічних реакцій; клінічно виражена р-ція пацієнта на лікування оцінюється при введенні дози насичення або протягом 30–60 хв. від моменту корекції дози. Якщо клінічна відповідь пацієнта на введення вважається надмірною (гіпотензія, тахікардія), швидкість, із якою вводиться р-ин, можна зменшити до 0,05 мкг/кг/хв або припинити введення; якщо початкова доза добре переноситься і необхідно посилити гемодинамічний ефект, швидкість введення можна збільшити до 0,2 мкг/кг/хв. Рекомендована тривалість введення при г.декомпенсованій тяжкій хр. СН становить 24 год.; після припинення введення препарату не спостерігається жодних ознак розвитку звикання або феномену зворотного ефекту; гемодинамічні ефекти зберігаються щонайменше 24 год. і можуть спостерігатися до 9 днів після припинення 24-годинної інфузії.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпокаліємія; безсоння; головний біль; запаморочення; шлуночкова тахікардія, артеріальна гіпотензія; фібриляція передсердь, тахікардія, шлуночкова екстрасистолія, СН, ішемія міокарда, екстрасистолі; нудота, запор, діарея, блювання; р-ції гіперчутливості, р-ції у місці введення; зниження рівня гемоглобіну.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до левосимендану або до будь-якої з допоміжних речовин; тяжка артеріальна гіпотензія та тахікардія; значні механічні перешкоди, які впливають на наповнення шлуночків серця кров'ю та/або утруднюють відтік крові з них; тяжке порушення ф-ції нирок (кліренс креатиніну < 30 мл/хв); тяжке порушення ф-ції печінки; шлуночкова тахікардія типу «пірует» в анамнезі

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 11 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	СИМДАКС	Оріон Корпорейшн, Фінляндія	конц. д/пригот. р-ну для інф. по 5мл у фл.	2,5 мг/мл	№1	18090,64	32,37/€

2.14. Антиаритмічні лікарські засоби

2.14.1. Антиаритмічні засоби I класу

2.14.1.1. Клас I B

- **Лідокаїн (Lidocaine)** * (див. п. 10.2.2. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: C01BB01 - Засоби для лікування захворювань серцево-судинної системи. Антиаритмічні препарати Ib класу.

Основна фармакотерапевтична дія: Антиаритмічна активність препарату обумовлена пригніченням фази 4 (діастолічної деполаризації) у волоках Пуркінє, зменшенням автоматизму, пригніченням ектопічних осередків збудження; при цьому лідокаїн пригнічує електричну активність деполаризованих, аритмогенних ділянок, але мінімально впливає на електричну провідність нормальних тканин; на швидкість скорості деполаризації (фаза 0) не впливає або знижує незначно; збільшує проникність мембран для іонів калію, прискорює процес реполяризації клітинних мембран, скорочує тривалість потенціалу дії і ефективного рефрактерного періоду; при застосуванні в середніх терапевтичних дозах практично не змінює скоротливості міокарда, не уповільнює AV-провідність, не знижує значно АТ; при застосуванні вживанні як антиаритмічного засобу при в/в введенні дія розвивається ч/з 45-90 секунд, триває 10-20 хв.; при в/м введенні дія розвивається ч/з 5-15 хв., триває 60-90 хв.; має місцевоанестезуючу активність, обумовлену стабілізацією нейрональної мембрани, зниженням її проникності для іонів натрію, що перешкоджає виникненню потенціалу дії і проведенню імпульсів.

Показання для застосування ЛЗ: шлуночкові аритмії^{ВООЗ, БНФ} (екстрасистолія, тахікардія, тріпотіння, фібриляція), у тому числі в г.період ІМ^{БНФ}, при імплантації штучного водія ритму, глікозидній інтоксикації, наркозі.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають в/м, в/в струминно, в/в краплинно, перед застосуванням препарату обов'язкове проведення шкірної проби на підвищену чутливість до лідокаїну, про що свідчать набряк і почервоніння у місці ін'єкції; р-н лідокаїну 10 % вводять в/м у сидничний або дельтоподібний м'яз, дорослим у дозі 2-4 мкг/кг (максимальна разова доза - не більше 200 мг) з інтервалом 4-6 год, дітям в/м введення не рекомендується; для в/в струминного введення застосовують 10 % р-н лідокаїну, розведений до концентрації 20 мг/мл стерильним 0,9 % р-ном натрію хлориду або 5 % р-ном глюкози; для в/в краплинного введення застосовують р-н, що містить 2 мг лідокаїну в 1 мл; для цього 2 мл (1 ампл.) препарату розбавляють у 100 мл стерильного 0,9 % р-ну натрію хлориду або 5 % р-ну глюкози; загальна кількість р-ну, що вводиться дорослим в/в краплинно за добу, - не більше 1200 мл; в/в інфузію проводять під постійним ЕКГ-моніторингом; дорослим призначають при введенні дози навантаження (болюсної) в/в струминно 0,5-2 мг/кг протягом 3-4 хв; середня разова доза - 80 мг, максимальна разова доза - 100 мг; потім одразу переходять на краплинну інфузію зі швидкістю 0,02-0,055 мг/кг/хв (максимальна швидкість - 2 мг/хв) у 0,9 % р-ні натрію хлориду або у 5 % р-ні глюкози (до в/в краплинного введення переходять тільки після струминного); краплинну інфузію можна проводити

протягом 24-36 год (до поліпшення стану пацієнта); тривалість інфузії залежить від стану пацієнта і результатів застосування препарату; при введенні протягом більше ніж 24 год необхідно зменшити швидкість інфузії; при необхідності на тлі краплинної інфузії можна повторити в/в струминне введення лідокаїну у дозі 40 мг через 10 хв після першої дози навантаження; максимальна доза для дорослих при в/в введенні дози навантаження - 100 мг, при подальшій краплинній інфузії - 300 мг (4,5 мг/кг) за 1 год; пацієнтам літнього віку дозу знижують на 1/3; при ІМ до госпіталізації як разову профілактичну дозу вводять зазвичай 4 мг/кг маси тіла одноразово в/м (максимально - 200-300 мг (2-3 мл 10 % р-ну)); дітям віком від 12 років при аритміях призначають тільки при г. необхідності з особливою обережністю; препарат розчиняють так, як і для дорослих; вводять в/в струминно дозу навантаження 1 мг/кг протягом 5-10 хв, у разі необхідності можливе повторне введення ч/з 5 хв (сумарна доза не повинна перевищувати 3 мг/кг); для безперервної в/в інфузії (зазвичай після введення дози навантаження) - 0,02-0,03 мг/кг/хв; максимальна доза для дітей у разі повторного введення дози навантаження з інтервалом 5 хв - 3 мг/кг; при безперервній в/в інфузії (зазвичай після введення дози навантаження) - 0,05 мг/кг/хв. МДД для дітей - 4 мг/кг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: збудження ЦНС (при застосуванні у високих дозах), занепокоєння, головний біль, запаморочення, порушення сну, сплутаність свідомості, сонливість, втрата свідомості, кома, порушення чутливості, моторний блок; у пацієнтів із підвищеною чутливістю - ейфорія, тремор, тризм, руховий неспокій, парестезії, судоми; ністагм, оборотна сліпота, диплопія, мигтіння «мушок» перед очима, світлобоязнь, кон'юнктивіт; слухові порушення, шум у вухах, гіперакузія; при застосуванні у високих дозах - аритмія, брадикардія, уповільнення провідності серця, поперечна блокада серця, зупинка серцевої діяльності, периферична вазодилатація, колапс; тахікардія, підвищення/зниження АТ, біль у серці; нудота, блювання; задишка, риніт, пригнічення або зупинка дихання; рідко - шкірні висипання, кропив'янка, свербіж, генералізований ексфоліативний дерматит, ангіоневротичний набряк, анафілактичні р-ції (у т. ч. анафілактичний шок); відчуття жару, холоду або оніміння кінцівок, набряки, слабкість, злоякісна гіпертермія; місцево відчуття легкого печіння, що зникає зі зростанням анестезуючого ефекту (протягом 1 хв.), гіперемія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату/інших амідних місцевоанестезуючих засобів, наявність в анамнезі епілептиформних судом на лідокаїн, тяжка брадикардія, тяжка артеріальна гіпотензія, кардіогенний шок, тяжкі форми хр.СН (II-III ст.), с-ром ССВ, с-ром Вольфа-Паркінсона-Уайта, с-ром Адамса-Стокса, АВ блокада II і III ст., гіповолемія, тяжкі порушення ф-ції печінки/нирок, порфірія, міастенія.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЛІДОКАЇН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'ек., по 2мл в амп. у бл.	100 мг/мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛІДОКАЇН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'ек., по 2мл в амп. у кор. або бл.	100 мг/мл	№10, №10x1	73,17	

2.14.1.2. Клас І С

• Етацизин (Ethacizin)

Фармакотерапевтична група: С01ВС - антиаритмічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: антиаритмічний препарат ІС класу; має виражену і тривалу антиаритмічну дію; пригнічує швидкість наростання фронту потенціалу дії, не змінює потенціал спокою; впливає переважно на натрієві канали (як на зовнішній, так і на внутрішній поверхні клітинної мембрани), зменшує амплітуду і уповільнює процеси інактивації і реактивації швидкого натрієвого струму; блокує вхід іонів кальцію по повільних каналах; подовжує тривалість рефрактерних періодів передсердь і АВ вузла; уповільнює швидкість наростання потенціалу дії в передсердних і шлуночкових волокнах, волокнах Пуркінє і додаткових шляхах проведення збудження по АВ вузлу і пучку Кента; пригнічує синоатріальне проведення, особливо при с-мі ССВ, поширює комплекс QRS електрокардіограми; має негативну інотропну дію, виявляє місцевоанестезуючу і спазмолітичну активність; не змінює ЧСС при короткочасному прийманні і зменшує при тривалому застосуванні.

Показання для застосування ЛЗ: шлуночкова та надшлуночкова екстрасистолія; пароксизми мерехтіння і тріпотіння передсердь; шлуночкова і надшлуночкова тахікардія, у т.ч. і при с-мі передчасного збудження шлуночків.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають дорослим внутрішньо, незалежно від прийому їжі, починаючи з 50 мг 2-3 р/добу, за недостатнього ефекту дозу збільшують (під контролем ЕКГ) до 50 мг 4 р/добу (200 мг); після досягнення антиаритмічного ефекту проводять підтримуючу терапію в індивідуально підібраних дозах; деяким пацієнтам для досягнення стабільної антиаритмічної дії необхідно комбіноване лікування з β-адреноблокаторами.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР, зупинка синусового вузла, АВ-блокада, порушення внутрішньошлуночкової провідності, зниження швидкості міокарда, зменшення коронарного кровотоку, аритмія; аритмогенна дія, вірогідність якої найбільша після перенесеного ІМ і при інших видах серцевої патології, яка призводить до зниження швидкості міокарда і розвитку СН, проаритмогенний ефект з ризиком раптового летального наслідку; подовження інтервалу PQ, розширення зубця Р і комплексу QRS; запаморочення, розлади акомодатії (на початку лікування); головний біль, незначна сонливість; розлади рівноваги при ходьбі або різких поворотах голови; диплопія; нудота, біль в епігастральній ділянці.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату або допоміжних речовин; виражені порушення провідності (у т.ч. синоатріальна блокада, АВ блокада II-III ст. при відсутності штучного водія ритму), порушення внутрішньошлуночкової провідності; виражена гіпертрофія міокарда лівого шлуночка; наявність постінфарктного кардіосклерозу; кардіогенний шок; г. коронарний с-м; г. ІМ і період 3 місяці після г. ІМ; виражене розширення порожнини серця; зниження фракції викиду лівого шлуночка (дані ехокардіографії), зупинка

синусового вузла; виражена артеріальна гіпотензія; хр. СН III і IV класу; виражені порушення ф-ції печінки і/або нирок; порушення електролітного балансу (гіпокаліємії, гіперкаліємії, гіпомагніємії); одночасний прийом інгібіторів моноаміноксидази (МАО); одночасне застосування антиаритмічних засобів ІС (морацизин (етмозин), пропафенон, алапінін) і ІА класу (хінідин, прокаїнамід, дізопірамід, аймалін); порушення ритму серця у поєднанні з блокадами проведення за системою Гіса – волокна Пуркін'є; період вагітності годування груддю; вік пацієнта до 18 років.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕТАЦИЗИН	АТ "Олайнфарм", Латвія	табл., в/о у бл.	50мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Пропафенон (Propafenone)**

Фармакотерапевтична група: C01BC03 - препарати для лікування захворювань серця. Антиаритмічні препарати ІС класу.

Основна фармакотерапевтична дія: антиаритмічний засіб ІС класу; він чинить стабілізуючу дію на міокардіальні мембрани, зменшує швидкий вхідний струм, що проводиться іонами натрію, зі зменшенням швидкості деполаризації та подовжує час проведення імпульсу по передсердю, AV-вузлу та, головним чином, по провідній системі Гіса-Пуркін'є; проведення імпульсу по додаткових шляхах, як при с-ромі WPW, пригнічується завдяки пролонгації рефрактерного періоду або блокаді провідного шляху як в антеградному, так і переважно у ретроградному напрямку; разом з тим спонтанна збуджуваність знижується завдяки підвищенню порога міокардіальної чутливості, тоді як електрична збуджуваність міокарда знижується завдяки підвищенню порога вентрикулярної фібриляції; протиаритмічні ефекти: сповільнення швидкості зростання потенціалу дії, зниження збуджуваності, гомогенізація коефіцієнту провідності, пригнічення ектопічного автоматизму, зниження схильності міокарда до фібриляції.

Показання для застосування ЛЗ: Табл: профілактика та лікування вентрикулярних аритмій; пароксизмальних суправентрикулярних тахіаритмій, включаючи пароксизмальну форму тріпотіння/фібриляції передсердь^{БНФ} та пароксизмальні кругові тахікардії із залученням AV-вузла або додаткових провідних шляхів, при неефективності стандартної терапії або протипоказаннях для її проведення. Р-н: лікування суправентрикулярної тахіаритмії, в т.ч. тахікардії із залученням AV-вузла, суправентрикулярної тахікардії при с-ромі Вольфа-Паркінсона-Уайта (WPW), а також пароксизмальної форми тріпотіння/фібриляції передсердь; тяжкої симптоматичної вентрикулярної тахіаритмії^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл.: індивідуальну підтримуючу дозу визначати за умов кардіологічного спостереження, що включає моніторинг ЕКГ та контроль АТ, на початку лікування - по 150 мг 3 р/добу зі збільшенням дози зі щонайменше триденним інтервалом до 300 мг 2 р/добу; пацієнтам з меншою масою тіла необхідно відповідно зменшити дозу^{БНФ} та, у разі потреби, до МДД 300 мг 3 р/добу^{БНФ}, збільшувати дозу рекомендується поступово; р-н д/ін'єкцій вводять в/в поступово протягом 3-5 хв.; інтервал між ін'єкціями - не менше 90-120 хв.; індивідуальну підтримуючу дозу слід визначати за умов кардіологічного спостереження: моніторинг показників ЕКГ (комплекс QRS, інтервали PR і QTc), контроль АТ та показників системи кровообігу; лікування розпочинати із введення більш низької дози, бажаний терапевтичний ефект часто настає після введення дози 0,5 мг/кг маси тіла, звичайна терапевтична разова доза - 1 мг/кг маси тіла (при середній масі тіла 70 кг відповідає 20 мл); за необхідності разову дозу можна збільшити до 2 мг/кг (при середній масі тіла в 70 кг відповідає 40 мл); якщо буде зареєстровано розширення комплексу QRS або зміна ЧСС, пов'язані із подовженням інтервалу QT більш ніж на 20%, в/в введення препарату припинити; МДД - 560 мг (відповідає 160 мл).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: запаморочення, порушення серцевої провідності (включаючи СА, AV та інтравентрикулярну блокаду), відчуття серцебиття; тромбоцитопенія; агранулоцитоз, лейкопенія, гранулоцитопенія, анемія, гематоми, пурпура, збільшення часу кровотечі, АР, позитивний титр ANA; гіперчутливість (що може проявлятися холестазом, патологічними змінами крові та висипанням), зниження апетиту; тривожність, порушення сну; нічні кошмари; сплутаність свідомості, головний біль, дисгевзія, безсоння, сонливість; синкопе, атаксія, порушення мовлення, депресія, втрата пам'яті, оніміння, парестезії, психоз, манія, шум у вухах, відчуття незвичайного запаху; неспокій, екстрапірамідні с-ми, судоми, пропасниця, апное, кома, нечіткість зору; подразнення очей, вертиго; синусова брадикардія, брадикардія, тахікардія, тріпотіння передсердь, стенокардія, збільшення тривалості інтервалу QRS, передчасне скорочення шлуночків, набряк, міжшлуночкова блокада; вентрикулярна тахікардія, аритмія (підвищення ЧСС, тахікардія) або вентрикулярна фібриляція; AV-дисоціація, зупинка серця, припливи, відчуття жару, CCCB, синусова пауза або зупинка, надшлуночкова тахікардія, піруетна тахікардія (torsades de pointes); вентрикулярна фібриляція, СН, зниження ЧСС, артеріальна гіпотензія; ортостатична гіпотензія, диспное, біль у животі, блювання, нудота, діарея, закрп, сухість у роті, порушення смаку, диспесія, анорексія; здуття живота, метеоризм, гастроентерит; позиви до блювання, шлунково-кишкові порушення, порушення ф-ції печінки (підвищення рівня АСТ, АЛТ, ГГТ та ЛФ крові); гепатоцелюлярне ураження, холестаза, гепатит та жовтяниця, кропив'янка, свербіж, висипання, почервоніння шкіри, біль у суглобах; м'язові судоми, м'язова слабкість; люпус-подібний с-ром, еректильна дисфункція; зменшення кількості сперматозоїдів, нефротичний с-ром; ниркова недостатність, біль у грудній клітці, слабкість, втомлюваність, гарячка, підвищена пітливість; алопеція; підвищення рівня глюкози крові, біль; гіпонатріємія, порушення секреції АДГ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до пропафенону або до будь-якого іншого компонента препарату, сої, арахісу; виявлений с-м Бругада; випадок ІМ за останні 3 місяці; значне органічне захворювання серця, таке як: неконтрольована хр. СН (фракція викиду лівого шлуночка < 35 %); кардіогенний шок (якщо він не спричинений аритмією); тяжка симптоматична брадикардія; неконтрольовані електролітні порушення (наприклад порушення метаболізму калію); тяжкі обструктивні захворювання легенів; тяжка артеріальна гіпотензія; дисфункція синусового вузла, порушення передсердної провідності, AV-блокада II ст. або вище, блокада пучка

Гіса або дистальна блокада при відсутності штучного водія ритму; одночасне застосування з ритонавіром; міастенія гравіс; тяжка печінкова недостатність; передозування препаратів групи наперстянки.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ПРОПАНОРМ®	ПРО.МЕД.ЦС Прага а.с. (виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)/ХБМ Фарма с.р.о. (виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль якості), Чеська Республіка/ Словацька Республіка	табл., в/о у бл.	150мг, 300мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПРОПАНОРМ®	ПРО.МЕД.ЦС Прага а.с., Чеська Республіка	р-н д/ін'єк. по 10мл в амп. у конт.	3,5 мг/мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РИТМОНОРМ®	Аббві Дойчланд ГмбХ і Ко. КГ/Фамар Ліон, Німеччина/ Франція	табл., вкриті п/о у бл.	150мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

2.14.2. Антиаритмічні лікарські засоби II класу

2.14.2.1. β-адреноблокатори

- **Бісопролол (Bisoprolol)** *^[ГМД] (див. п. 2.1.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Есмолол (Esmolol)**^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: С07АВ09 - селективні блокатори β-адренорецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: β-селективний (кардіоселективний) блокатор адренергічних рецепторів без значної внутрішньої симпатоміметичної чи мембраностабілізуючої активності при застосуванні у терапевтичних дозах; має відомі гемодинамічні та електрофізіологічні властивості β-блокаторів: зниження ЧСС під час відпочинку та фізичних вправ; зниження підвищеної ЧСС, спричиненої ізопреналіном; збільшення часу відновлення СА-вузла; затримка АВ-провідності; пролонгація АВ-інтервалу при нормальному синусовому ритмі і під час стимуляції передсердя без затримки в тканині Гіса-Пуркінє; продовження часу PQ, індукція АВ-блокади II ступеня; пролонгація функціонального рефрактерного періоду передсердь і шлуночків; негативний інотропний ефект зі зниженням фракції викиду; зниження АТ.

Показання для застосування ЛЗ: надшлуночкова тахіаритмія, включаючи мерехтливу аритмію, тріпотіння передсердь і синусову тахікардію^{БНФ}; тахікардія і АГ у періопераційному періоді^{БНФ} і при некомпенсаторній синусовій тахікардії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дозу можна підібрати індивідуально шляхом титрування, при якому кожен наступний крок складається із навантажувальної дози та наступного введення підтримувальної дози; надшлуночкова тахіаритмія - ефективна доза від 50 до 200 мкг/кг/хв^{БНФ}, введення навантажувальної дози 500 мкг/кг/хв протягом 1 хв, далі - введення підтримуючої дози 50 мкг/кг/хв протягом 4 хв, після досягнення бажаного безпечного значення ЧСС (при зниженні АТ), навантажувальну інфузію припиняють і знижують базовий інтервал доз підтримуючої інфузії з 50 мкг/кг/хв до 25 мкг/кг/хв чи нижче; у разі необхідності можна збільшити інтервал між кроками титрування з 5 до 10 хв; при інтраопераційному лікуванні - під час анестезії, коли необхідний негайний контроль, болюсно вводять дозу 80 мг протягом 15-30 сек, а після цього вводять дозу 150 мкг/кг/хв, титрують швидкістю інфузії, як зазначено вище, до 300 мкг/кг/хв, після пробудження від анестезії вводять у дозі 500 мкг/кг/хв протягом 4 хв і далі у дозі 300 мкг/кг/хв; у післяопераційних ситуаціях, коли є достатньо часу для титрування, перед кожним етапом титрування вводять навантажувальну дозу 500 мкг/кг/хв протягом 1 хв для отримання швидкої дії, використовують кроки титрування 50, 100, 150, 200, 250 і 300 мкг/кг/хв протягом 4 хв, і зупиняються після досягнення бажаного терапевтичного ефекту; після досягнення бажаного контролю ЧСС і стабільності клінічного стану пацієнтів можливий перехід на альтернативні антиаритмічні препарати або антагоністи кальцію; щойно досягнуто бажаного терапевтичного ефекту чи кінцевої безпечної точки (зниження АТ), навантажувальну дозу виключають, а базову дозу знижують до 12,5-25 мкг/кг/хв, також можна збільшити інтервали між кроками титрування з 5 до 10 хв; якщо ЧСС чи АТ швидко досягають безпечної межі або переходять її, есмолол відмінити, а після повернення ЧСС чи АТ до прийняттого рівня лікування розпочинають знову з нижчої дози без введення навантажувальної дози.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості; анорексія; гіперкаліємія, метаболічний ацидоз; депресія, тривожність; аномальне мислення, дратівливість; запаморочення (запаморочення і пітливість у поєднанні з симптоматичною гіпотензією), сонливість, головний біль, парестезія, сплутаність свідомості, порушення уваги, збудження; синкопе, судоми, розлади мовлення, слабкість; порушення зору; гіпотензія; брадикардія, АВ-блокада, підвищення тиску в легеневій артерії, СН, шлуночкові екстрасистоли, вузловий ритм, стенокардія, периферична ішемія, блідість, припливи, біль у грудях; синусова пауза, асистолія, тромбофлебіт (у поєднанні з реакціями в місці ін'єкції та інфузії); прискорений ідіовентрикулярний ритм, спазм коронарних артерій, зупинка серця; диспное, набряк легень, бронхоспазм, дихання з присвистом, закладеність носа, хрипи; нудота, блювання; зміни смакових відчуттів, диспепсія, запор, сухість у роті і біль у животі; пітливість (запаморочення і пітливість у поєднанні з симптоматичною гіпотензією); знебарвлення шкіри та еритема (у поєднанні з реакціями в місці ін'єкції та інфузії); шкірні реакції внаслідок екстравазації (у поєднанні з реакціями в місці ін'єкції та інфузії); псоріаз (β-блокатори як клас лікарських засобів можуть спричинити розвиток псоріазу в деяких випадках або погіршувати його), ангіоневротичний набряк, кропив'янка; біль у кістках та м'язах (у тому числі міжлопатковий біль

і костохондрит); м'язова слабкість; затримка сечі; астения, втома, реакції у місці ін'єкції та інфузії, запалення та затвердіння у місці інфузії, гіпергідроз; озноб, гіпертермія, набряк та біль (у поєднанні з реакціями в місці ін'єкції та інфузії), печіння, еритема та екхімоз на ділянці введення; флебіт, тромбофлебіт та пухирці у місці інфузії, пухирі (у поєднанні з реакціями в місці ін'єкції та інфузії), некроз у місці ін'єкції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: тяжка синусова брадикардія (ЧСС менше 50 уд/хв); синдром дисфункції синусового вузла; порушення АВ і синоаурикулярної провідності; АВ-блокада 2 або 3 ступеня; кардіогенний шок; тяжка гіпотензія; декомпенсована СН; гіперчутливість до складових препарату або інших β-блокаторів (перехресна чутливість між β-блокаторами є можливою); одночасне в/в введення антагоністів кальцієвих каналів, коли серцеві ефекти іншого препарату ще наявні; одночасне або нещодавне в/в введення верапамілу (препарат не можна вводити протягом 48 год після припинення застосування верапамілу); феохромоцитома, за відсутності її лікування; легенева гіпертензія; г. напад астми; метаболічний ацидоз; дитячий вік (до 18 років).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 2,5 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БІБЛОК	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк., по 10мл у фл. у конт. чар/уп.	10 мг/мл	№5x1	3327,75	
	БІБЛОК	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз., по 50мл в конт. у вакуум. пакеті	10 мг/мл	№1	1055,50	
	БІБЛОК	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз., по 250мл в конт. у вакуум. пакеті	10 мг/мл	№1	471,25	

- **Метопрололу тартрат (Metoprolol tartrate) *** ^[ПМД] (див. п. 2.1.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Метопрололу сукцинат (Metoprolol succinati) *** ^[ПМД] (див. п. 2.1.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Пропранолол (Propranolol) *** ^[ПМД] (див. п. 2.1.2. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

2.14.3. Антиаритмічні лікарські засоби III класу

- **Аміодарон (Amiodarone) ***

Фармакотерапевтична група: C01BD01 - антиаритмічні препарати III класу.

Основна фармакотерапевтична дія: подовження третьої фази потенціалу дії кардіоміоцитів без впливу на його висоту або швидкість підйому, головним чином внаслідок інгібування калієвих каналів (клас III за класифікацією Vaughan Williams); при цьому жодних змін не відбувається в роботі натрієвого та кальцієвого каналу; сповільнення серцевого ритму шляхом зменшення автоматизму синусового вузла (цей ефект не блокується атропіном); неконкурентно блокує α- та β-адренорецептори; уповільнює синоатріальну, передсердну та вузлову провідність, що відбувається інтенсивніше при наявності високої ЧСС; не впливає на шлуночкову провідність; збільшує рефрактерний період та зменшує збудливість міокарда на передсердному, вузловому та шлуночковому рівні; уповільнює провідність та подовжує рефрактерний період додаткових передсердно-шлуночкових шляхів; зменшення споживання кисню ч/з помірне зменшення периферичного опору судин та зменшення ЧСС; збільшення коронарного кровотоку завдяки прямій дії на гладенькі м'язи судин міокарда та підтримання серцевого викиду на тлі зниженого АТ і периферичного опору судин та при відсутності негативних інотропних ефектів.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика рецидивів шлуночкової тахікардії, яка становить загрозу для життя хворого: лікування починають в умовах стаціонару при наявності постійного контролю за станом пацієнта; симптоматичної шлуночкової тахікардії (документально підтвердженої), яка призводить до непрацездатності; суправентрикулярної тахікардії ^{БНФ} (документально підтвердженої), що потребує лікування, та у тих випадках, коли інші ЛЗ не мають терапевтичного ефекту або протипоказані; фібриляції шлуночків ^{БНФ}; лікування суправентрикулярної тахікардії: уповільнення або зменшення фібриляції або тріпотіння передсердь; ІХС та/або порушення функції лівого шлуночка; тахікардія, пов'язана з с-мом WPW ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: звичайна рекомендована доза для дорослих по 200 мг 3 р/добу ^{БНФ} впродовж 8-10 днів; на початку лікування можуть застосовуватися вищі дози (4-5 табл./добу), які приймають впродовж нетривалого періоду часу та під ЕКГ контролем; підтримуюче лікування (застосовувати мінімально ефективну дозу) - залежно від реакції хворого підтримуюча доза для дорослих від 1 табл. кожні 2 дні до 2 табл./добу; в/в застосовувати лише тоді, коли є необхідне обладнання для моніторингу серцевої ф-ції, дефібриляції та кардіостимуляції; можна вводити тільки на ізотонічному (5%) р-ні глюкози; інфузія має вводитися ч/з центральний венозний доступ: навантажувальна доза для дорослих 5 мг/кг ^{БНФ} маси тіла хворого і вводиться тільки в р-ні глюкози від 20 хв до 2 год ^{БНФ} бажано за допомогою інфузомату і має бути введена повторно 2 або 3 рази за 24-годинний період; ефект лікарського засобу є короточасним, що робить необхідним продовжувати його введення шляхом інфузії: підтримуюча доза: 10-20 мг/кг/добу (в середньому 600-800 мг/добу, до 1,2 г/добу) в 250 мл р-ну глюкози протягом кількох днів; перехід на пероральну терапію (3 табл./добу) необхідно розпочати з першого дня інфузійної терапії; серцево-легенева реанімація у випадку фібриляції шлуночків, резистентної до електродефібриляції, у пацієнтів з зупинкою серця - початкова в/в доза 300 мг (або 5 мг/кг), розчинена у 20 мл 5 % р-ну глюкози, ін'єкцію проводити швидко, можливе додаткове в/в введення 150 мг аміодарону (або 2,5 мг/кг), якщо фібриляція шлуночків зберігається ^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: брадикардія, зупинка синусового вузла, пароксизмальна шлуночкова тахікардія типу «torsade de pointes», нудота, запальна р-ція, флебіт поверхневих вен, у разі введення безпосередньо в периферичну вену; р-ції у місці введення, біль, еритема, набряк, некроз, екстравазація, утворення інфільтрату, запалення, порушення пігментації, ураження печінки, помірне та ізольоване підвищення рівнів трансаміназ (у 1,5-3 рази вище норми); г. ураження печінки з підвищенням рівня трансаміназ у сироватці крові та/або з жовтяницею, включаючи печінкову недостатність, панкреатит/гострий панкреатит; р-ції гіперчутливості, анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк (набряк Квінке), підвищений рівень Т4, зменшений рівень Т3, гіпотиреоз (збільшення маси тіла, підвищена чутливість до холоду, апатія, сонливість), підвищення рівня ТТГ, гіпертиреоз (невелике безпричинне зменшення маси тіла, зниження ефективності антиангінальної та/або антиаритмічної терапії, психічні симптоми), зниження рівня ТТГ, доброякісна внутрішньочерепна гіпертензія (псевдопухлина головного мозку), головний біль, г. респіраторний дистрес-синдром, бронхоспазм та/або апное у разі тяжкої ДН, особливо у пацієнтів на БА, інтерстиціальний пневмоніт, надмірне потовиділення; кропив'янка, зниження АТ, судинний колапс, припливи жару, біль у спині, попереку; мікрвідкладення у рогівці, нейропатія зорового нерва (неврит зорового нерва), яка може прогресувати до повної сліпоты, зниження гостроти зору, фотосенсибілізація, пігментації шкіри синюшного або синюшно-сірого кольору, еритема на тлі променевої терапії, шкірні висипання, екзофоліативний дерматит, алопеція, екзема; с-ром неадекватної секреції антидіуретичного гормону, дифузна інтерстиціальна або альвеолярна пневмопатія, облітеруючий бронхіоліт з пневмонією склеротичного типу, сухий кашель, плеврит, легенева кровотеча, кровохаркання, тремор, екстрапірамідна симптоматика, порушення сну, нічні кошмари, сенсорна, моторна або змішана периферична нейропатія, міопатія, мозочкова атаксія, с-ром паркінсонізму, паросмія; доброякісна внутрішньочерепна гіпертензія, псевдоалкогольний гепатит, порушення провідності міокарда (СА-блокада, АВ-блокада різного ступеня), розлади травлення (нудота, блювання, дисгевзія), епідидиміт, васкуліт, ураження нирок з помірним підвищенням рівнів креатиніну, гемолітична та апластична анемія, тромбоцитопенія; гранульоми кісткового мозку; тяжкі, іноді летальні, шкірні р-ції: с-ром Лайелла, с-ром Стівенса-Джонсона; бульозний дерматит; DRESS с-ром (медикаментозне висипання з еозинофілією та системними симптомами); нейтропенія, агранулоцитоз; гіпонатріємія; червоний вовчак; сплутаність свідомості, марення, галюцинації; втрата лібідо.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до йоду, аміодарону або до інших компонентів препарату; синусова брадикардія, синоатріальна блокада серця при відсутності ендокардіального кардіостимулятора (штучного водія ритму); СССВ при відсутності ендокардіального кардіостимулятора (ризик зупинки синусового вузла); порушення АВ провідності високого ступеня при відсутності ендокардіального кардіостимулятора; гіпертиреоз; судинна недостатність (судинний колапс); тяжка артеріальна гіпотензія; дитячий вік до 3 років (через наявність у складі бензиллового спирту); II та III триместри вагітності; період годування груддю; біфасцикулярні та трифасцикулярні порушення провідності, окрім випадків, коли встановлено ендокардіальний кардіостимулятор, який функціонує постійно; в/в введення препарату протипоказане у разі артеріальної гіпотензії, тяжкої дихальної недостатності, кардіоміопатії або СН; одночасне застосування з препаратами, які можуть спричинити пароксизмальну тахікардію типу «torsades de pointes»: антиаритмічні препарати Іа класу (хінідин, гідрохінідин, дизопірамід); антиаритмічні препарати III класу (соталол, дофетилід, ібутилід); інші препарати, такі як сполуки миш'яку, бепридил, цизаприд, циталолам, есциталолам, дифеманіл, доласетрон для в/в введення, еритроміцин для в/в введення, мізоластин, моксифлоксацин, спіраміцин для в/в введення, вінкамін для в/в введення, тореміфен, деякі нейролептики; домперидон, дронедазон, левофлоксацин, меквітазин, пруклоприд, телапревір; кобіцистат. Ці протипоказання не стосуються застосування аміодарону для серцево-легеневої реанімації при зупинці серця, що виникла внаслідок фібриляції шлуночків та є резистентною до зовнішньої електроімпульсної терапії.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,2 г., парентерально - 0.2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	АМІДАРОН	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	200мг	№10x3	1,46	
	АМІОДАРОН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	табл. у бл.	0,2г	№10x3	1,90	
	АМІОДАРОН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	200мг	№10x3	1,83	
	АРИТМІЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	р-н д/ін'єк., по 3мл в амп. у касеті	50 мг/мл	№5x1	12,31	
	АРИТМІЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл. у бл.	200мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АРИТМІЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл. у бл.	200мг	№10x5	1,41	
	АРИТМІЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл. у бл.	200мг	№10x2	1,50	

	"Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна					
АРИТМІЛ КАРДІО	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (виробництво з продукції in bulk виробника ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна), Україна	табл. у бл.	200мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КАРДІУДАРОН - ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк., по 3мл в амп. у бл.	50 мг/мл	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КАРДІУДАРОН - ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк., по 3мл в амп. у кор. або бл.	50 мг/мл	№10, №5x2	15,48	
КАРДІУДАРОН - ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл. у бл.	200мг	№10x3	1,99	
II. АМІОКОРДИН®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії, контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю)), Словенія	табл. у бл.	200мг	№10x3	1,99	26,93/€
АМІОКОРДИН®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії, контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю)), Словенія	табл. у бл.	200мг	№10x6	1,99	26,93/€
АМІОКОРДИН®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю)), Словенія	р-н д/ін'єк., по 3мл в амп. у кор.	150мг/3мл	№5	24,83	30,33/€
КОРДАРОН®	Санофі Вінтроп Індастрія, Франція	р-н д/ін'єк., по 3мл в амп у полім. чарун.	50 мг/мл	№6	46,75	26,87/\$
КОРДАРОН®	ХІНОЇН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд., Угорщина	табл. у бл.	200мг	№10x3, №15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КОРДАРОН®	ХІНОЇН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд., Підприємство 2 (підприємство Верешедьхаз)/САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА, Угорщина/Франція	табл. у бл.	200мг	№10x3, №15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РІВОДАРОН	Рівофарм СА, Швейцарія	табл. у бл.	200мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РОТАРИТМІЛ	Рівофарм СА, Швейцарія	табл. у бл.	200мг	№10x3	2,40	26,95/\$

● **Соталол (Sotalol)**

Фармакотерапевтична група: С07АА07 - неселективні блокатори β-адренорецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: неселективний β-адреноблокатор, діє на β₁- і β₂-адренорецептори; має виражену антиаритмічну дію, механізм якої полягає у збільшенні тривалості потенціалу дії та рефрактерного періоду на всіх ділянках провідникової системи серця (III клас антиаритмічних препаратів); зменшує ЧСС та скоротливість міокарда, зменшує автоматизм синусного вузла, уповільнює атріовентрикулярну провідність. Блокуючи β₂-адренорецептори, підвищує тонус гладенької мускулатури бронхів, судин.

Показання для застосування ЛЗ: шлуночкової аритмії^{БНФ}: профілактика рецидивів шлуночкової тахіаритмії, що загрожує життю^{БНФ}; лікування симптоматичної нестійкої шлуночкової тахіаритмії; суправентрикулярні аритмії: профілактика пароксизмальної передсердної тахікардії, пароксизмальної фібриляції передсердь,

пароксизмальної AV вузлової реципрокної тахікардії, пароксизмальної AV-реципрокної тахікардії при наявності додаткових провідних шляхів, пароксизмальної суправентрикулярної тахікардії після операції; підтримка нормального синусового ритму після конверсії фібриляції або мерехтіння передсердь.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при лікуванні шлуночкових аритмій, що загрожують життю, розпочинати терапію, а також підвищувати дози в умовах стаціонару при наявності устаткування для моніторингу ЕКГ (інтервал QT)^{БНФ} та оцінки варіабельності серцевого ритму; початкова доза становить 80 мг на добу^{БНФ} у вигляді разової дози або за 2 прийоми (по 40 мг) з інтервалом 12 год; якщо ефективність терапії недостатня, добову дозу можна поступово збільшити з інтервалом не менше 3 днів для досягнення рівноважної концентрації соталолу у плазмі крові та здійснення контролю тривалості інтервалів QT за допомогою ЕКГ; для окремих пацієнтів може бути необхідна добова доза 160-320 мг, розподілена на 2 прийоми^{БНФ}; для профілактики суправентрикулярних аритмій рекомендується застосовувати дозу 320 мг/добу за 2 прийоми з інтервалом 12 год; для профілактики суправентрикулярної аритмії після операції на серці добова доза має становити 240 мг за 2 прийоми; окремим пацієнтам зі стійкою шлуночковою аритмією, що загрожує життю, може бути призначено 480-640 мг соталолу на добу^{БНФ}; однак призначення такої дози потребує ретельної оцінки співвідношення потенційних користі і ризику щодо можливості тяжких побічних р-цій (особливо проаритмогенних ефектів).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: підвищення чутливості до алергенів і тяжкість анафілактичних р-цій, гіпоглікемія (ознаки зниження цукру в крові (зокрема, тахікардія), гіперглікемія, гіпотиреоїдний стан, збільшення загального холестерину і тригліцеридів, зменшення холестерину ліпопротеїнів високої щільності, тривожність, сплутаність свідомості, зміна настрою, галюцинації, підвищена збудливість, депресія; порушення сну, запаморочення, сонливість, головний біль, дисомнія, парестезія, відчуття холоду в кінцівках, стомлюваність, слабкість, судоми, тремор, порушення зору; кон'юнктивіт; кератокон'юнктивіт, зменшення секреції сльозової рідини (особливо при використанні контактних лінз), сухість та біль в очах, запалення рогівки та кон'юнктиви, світлобоязнь, порушення слуху, біль у грудях, ортостатична гіпотензія, посилення симптомів СН (набряк щиколоток, стоп, задишка), брадикардія, відчуття серцебиття, відхилення на ЕКГ, порушення провідності міокарда, AV-блокада, синкопальний або пресинкопальний стани, проаритмогенні ефекти (зміни ритму або посилення аритмії, що може призвести до значного порушення серцевої діяльності з можливою зупинкою серця), ослаблення скорочувальної функції міокарда, прояви ангіоспазму (посилення порушення периферичного кровообігу, відчуття похолодання кінцівок, перемижна кульгавість, с-м Рейно), збільшення кількості нападів стенокардії і порушення периферичної перфузії, шлуночкова тахіаритмія (у тому числі torsade de pointes), риніт, утруднене дихання, бронхоспазм, ларингоспазм; диспное, алергічний бронхіт з фіброзом, порушення смаку, абдомінальний біль, нудота, блювання, діарея, диспепсія, метеоризм, ксеростомія; запор, сухість у роті, анорексія, порушення ф-ції печінки (сеча темного кольору, жовтушність склер або шкіри, холестаза), еритема, шкірні висипання, кропив'янка, свербіж, екзантема, посилене потовиділення, гіперемія шкіри; алопеція; псоріазоподібна екзантема, поява/прогресування симптомів псоріазу, м'язовий спазм або міастенія, біль у спині, артралгії, біль у м'язах, еректильна дисфункція, гарячка, втомлюваність, ціаноз кінцівок, астенія, с-м відміни, тромбоцитопенія, агранулоцитоз, лейкопенія, утворення антинуклеарних а/т, зміна активності ферментів, рівня білірубину.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до соталолу, сульфаніламідів або до інших компонентів препарату; СН IV ступеня за NYHA; г. та хр. СН II-III ступеня (у стадії декомпенсації); г. ІМ; с-м слабкості синусового вузла, включаючи синоатріальну блокаду, якщо у пацієнта немає функціонуючого кардіостимулятора; тяжка дисфункція синусового вузла; AV-блокада II-III ступеня (якщо у пацієнта немає функціонуючого кардіостимулятора); вроджений або набутий с-ром подовженого QT інтервалу або прийом препаратів, що сприяють подовженню QT інтервалу; шлуночкова тахікардія типу torsade de pointes або прийом препаратів, що сприяють розвитку цього захворювання; симптоматична синусова брадикардія ($\leq 45-50$ уд/хв); неконтрольована застійна СН, включаючи СН правого шлуночка після легеневої гіпертензії; кардіогенний шок; анестезія препаратами, що спричиняють депресію міокарда; гіпокаліємія; гіпомагніємія; нелікована феохромоцитома; артеріальна гіпотензія (за винятком такої, що виникає унаслідок аритмії); с-м Рейно та тяжкі порушення периферичного кровообігу; БА та ХОЗЛ; метаболічний ацидоз; ниркова недостатність (кліренс креатиніну < 10 мл/хв).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,16 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	СОРИТМІК	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	160мг	№10x2	5,01	
	СОРИТМІК	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	80мг	№10x2	7,39	
II.	СОТАЛОЛ САНДОЗ®	Салютас Фарма ГмБХ (виробництво за повним циклом), Німеччина	табл. у бл.	40мг, 80мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СОТАЛОЛ САНДОЗ®	Салютас Фарма ГмБХ (виробництво за повним циклом)/Лек С.А. (первинне і вторинне пакування, випуск серії), Німеччина/Польща	табл. у бл.	160мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

2.14.4. Антиаритмічні лікарські засоби IV класу

2.14.4.1. Антагоністи кальцієвих каналів

- **Верапаміл (Verapamil)** *^[ПМД] (див. п. 2.3.3. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

- *Дилтіазем (Diltiazem)* * (див. п. 2.3.2. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

2.15. Лікарські засоби, які впливають на згортання крові та функцію тромбоцитів

2.15.1. Антикоагулянти прямої дії

2.15.1.1. Нефракціонований стандартний гепарин

- *Гепарин (Heparin)* * ^[ПМД] (див. п. 13.8.1.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

2.15.1.2. Низькомолекулярні фракціоновані гепарини

- *Далтепарин (Dalteparin)* (див. п. 13.8.1.3. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- *Еноксапарин (Enoxaparin)* (див. п. 13.8.1.3. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- *Надропарин (Nadroparin)* (див. п. 13.8.1.3. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

2.15.1.3. Інші антитромботичні засоби

- *Дабігатрану етексилат (Dabigatran etexilate)*

Фармакотерапевтична група: B01AE07 - Антитромботичні агенти. Прямі інгібітори тромбіну.

Основна фармакотерапевтична дія: належить до низькомолекулярних проліків, які не проявляють фармакологічної активності; після перорального прийому дабігатрану етексилат швидко всмоктується і перетворюється на дабігатран шляхом каталізованого естеразою гідролізу в плазмі та печінці; є сильним конкурентним зворотнім прямим інгібітором тромбіну та головною активною речовиною в плазмі; оскільки тромбін (серин-протеаза) активує перетворення фібриногену у фібрин у системі згортання крові, то його пригнічення запобігає розвитку тромбу, дабігатран інгібує вільний тромбін, фібриноз'язаний тромбін та спричинену тромбіном агрегацію тромбоцитів; подовжує тромбіновий час (ТЧ), ЧЗК та АЧТЧ.

Показання для застосування ЛЗ: первинне запобігання венозним тромбоемболічним ускладненням у пацієнтів, які перенесли обширну ортопедичну операцію із заміни тазостегнового суглоба або колінного суглоба; запобігання інсульту та системній емболії у дорослих пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь (НФП) з одним або більше факторів ризику, таких як: перенесений інсульт або транзиторна ішемічна атака (ТІА), вік ≥ 75 років, СН (Нью-Йоркська Асоціація Кардіологів (НАК), клас $\geq II$), ЦД або АГ; лікування тромбозу глибоких вен (ТГВ) і легеневої емболії (ЛЕ) та запобігання рецидивуючому ТГВ і ЛЕ у дорослих.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: запобігання інсульту та системній емболії у дорослих пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь з одним або більше фактором ризику (запобігання НФП): рекомендована доза препарату становить 300 мг: по 1 капсулі 150 мг 2 р/добу; лікування тромбозу глибоких вен (ТГВ) і легеневої емболії (ЛЕ) та запобігання рецидивуючому ТГВ і ЛЕ у дорослих: рекомендована доза препарату - 300 мг: по 1 капсулі 150 мг 2 р/добу - після п'ятиденної терапії парентеральним антикоагулянтом. Тривалість лікування визначають індивідуально після ретельної оцінки користі/ризиків кровотечі; короткотривале лікування (не менше 3 міс.) повинно базуватися на тимчасових факторах ризику (нещодавня операція, травма, іммобілізація), довготривале лікування повинно базуватися на постійних факторах ризику або ідіопатичному ТГВ або ЛЕ. Рекомендовані дози та тривалість лікування для первинного запобігання венозному тромбоемболізму в ортопедичній хірургії: після хірургічної операції із заміни колінного суглоба та тазостегнового суглоба - початок лікування в день операції 1-4 години після завершення операції по 1 капсулі (по 110 мг); підтримуюча доза, починаючи з першого дня після операції 220 мг 1 р/добу - 2 капсули по 110 мг. Тривалість застосування підтримуючої дози 10 днів після хірургічної операції із заміни колінного суглоба; 28-35 днів - після хірургічної операції із заміни тазостегнового суглоба.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анемія, зниження рівня гемоглобіну, тромбоцитопенія, зниження гематокриту, нейтропенія, агранулоцитоз; гіперчутливість, висипання, свербіж, анафілактичні р-ції, ангіоневротичний набряк, кропив'янка, бронхоспазм; внутрішньочерепний крововилив, гематома, крововилив; носова кровотеча, кровохаркання; ШКК, абдомінальний біль, діарея, диспепсія, нудота, ректальна кровотеча, гемороїдальна кровотеча, шлунково-кишкова виразка, гастроєзофагіт, гастроєзофагеальна, рефлюксна хвороба, блювання, дисфагія; порушення ф-ції печінки, відхилення від норми тесту ф-ції печінки, підвищення рівня АЛАТ, підвищення рівня АСАТ, підвищення рівня печінкових ферментів, гіпербілірубінемія; крововилив на шкірі; гемартроз; сечостатева кровотеча, включаючи гематурію; крововилив у місці ін'єкції; крововилив у місці введення катетера; травматичний крововилив; крововилив у місці розрізу.

Противказання до застосування ЛЗ: відома гіперчутливість до дабігатрану або дабігатрану етексилату, або до будь-якого з інгредієнтів препарату; тяжкі порушення ф-ції нирок (кліренс креатиніну < 30 мл/хв); активні клінічно значущі кровотечі; пошкодження або стан, який розглядається як істотний фактор ризику значних кровотеч (поточна або нещодавня шлунково-кишкова виразка, наявність злоякісних пухлин з високим ризиком кровотечі, нещодавнє пошкодження головного або спинного мозку, хірургічна операція на спинному мозку або офтальмологічна хірургічна операція, нещодавня внутрішньомозкова кровотеча, відоме або підозрюване езофагеальне варикозне розширення судин, артеріовенозні мальформації, судинні аневризми або значні інтраспінальні або інтрацеребральні судинні патології); одночасне застосування будь-якого антикоагуляційного ЛЗ (нефракціонований гепарин (НФГ), низькомолекулярні гепарини (еноксапарин, далтепарин та ін.), похідні гепарину (фондапаринукс та ін.), пероральні антикоагулянти (варфарин, ривароксабан, апіксабан та ін.), за винятком випадків переходу із або на антикоагулянтну терапію або коли НФГ застосовують у дозах, необхідних для підтримання відкритого центрального венозного або артеріального катетера; порушення ф-ції печінки або захворювання печінки, що можуть впливати на виживання; одночасне застосування з наступними сильними інгібіторами Р-gp: системний кетоконазол, циклоспорин, ітраконазол та дронедазон; штучний клапан серця, що потребує терапії антикоагулянтами.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ПРАДАКСА®	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмБХ і Ко. КГ, Німеччина	капс. тверді у бл.	75мг, 110мг, 150мг	№10х1, №10х3, №10х6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПРАДАКСА®	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмБХ і Ко. КГ, Німеччина	капс. тверді у бл.	110мг	№10х6	82,09	31,03/€
	ПРАДАКСА®	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмБХ і Ко. КГ, Німеччина	капс. тверді у бл.	150мг	№10х6	60,20	31,03/€

• **Ривароксабан (Rivaroxaban)** (див. п. 13.8.1.5. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: V01AF01 - Антитромботичні засоби. Прямі інгібітори фактора Ха.

Основна фармакотерапевтична дія: високоселективний прямий інгібітор фактора Ха, має достатньо високу біодоступність при р/ос застосуванні; блокування активності фактору Ха перериває внутрішній та зовнішній шляхи коагуляційного каскаду, т.ч. пригнічується формування тромбіну та утворення тромба; безпосередньо не пригнічує активність тромбіну та не впливає на тромбоцити.

Показання для застосування ЛЗ: у комбінації з ацетилсаліциловою к-тою (АСК) або у комбінації з АСК та клопідогрелем^{БНФ} або тиклопідином для профілактики атеротромботичних явищ у дорослих пацієнтів після перенесеного г. коронарного синдрому (ГКС) з підвищеним рівнем серцевих біомаркерів^{БНФ}; профілактика інсульту та системної емболії у дорослих пацієнтів із неклапанною фібриляцією передсердь та одним чи кількома факторами ризику, такими як застійна СН, АГ, вік ≥ 75 років, ЦД, інсульт або транзиторна ішемічна атака в анамнезі; лікування тромбозу глибоких вен (ТГВ), тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА) і профілактика рецидивуючого ТГВ та ТЕЛА у дорослих^{БНФ}; у комбінації з ацетилсаліциловою кислотою (АСК) для профілактики атеротромботичних явищ у дорослих пацієнтів з ІХС або симптомним захворюванням периферичних артерій (ЗПА) з високим ризиком ішемічних явищ.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: пацієнтам, які перенесли г. коронарний с-ром, рекомендується призначати 2,5 мг р/ос по 1 табл. 2 р/добу^{БНФ}, пацієнти також повинні приймати ацетилсаліцилову к-ту у добовій дозі 75-100 мг чи ацетилсаліцилову к-ту у добовій дозі 75-100 мг разом із клопідогрелем у добовій дозі 75 мг або зі стандартною добовою дозою тиклопідину, необхідно регулярно проводити оцінку лікування у кожного окремого пацієнта, враховуючи співвідношення ризиків розвитку ішемічних порушень та кровотеч, зважаючи на обмежений досвід застосування препарату протягом періоду до 24 міс., рішення про тривалість лікування понад 12 міс. приймається в індивідуальному порядку, застосування розпочинати одразу після стабілізації стану, пов'язаного з г. коронарним с-ромом (включаючи ревааскуляризаційні процедури), не раніше ніж ч/з 24 год після госпіталізації, тоді як терапію парентеральними антикоагулянтами звичайно припиняють, приймають по 1 табл., що містить 2,5 мг препарату, 2 р/день незалежно від прийому їжі, у випадку пропуску прийому табл. пацієнту прийняти наступну дозу 2,5 мг відповідно до звичайного графіку прийому; профілактика інсульту та системної емболії - по 1 табл. 20 мг 1 р/добу^{БНФ}, ця доза також є МДД, лікування проводити протягом тривалого часу за умови, що користь від профілактики інсульту та системної емболії переважає ризик розвитку кровотеч, у випадку пропуску прийому табл. пацієнтові прийняти препарат негайно і наступного дня продовжити лікування по 1 табл./добу, як до пропуску прийому табл., не приймати подвійну дозу у той самий день, щоб компенсувати пропущену табл.; лікування ТГВ, ТЕЛА та профілактика рецидивів ТГВ і ТЕЛА - протягом перших 3 тижнів для лікування г. тромбозу глибоких вен і ТЕЛА рекомендується призначати по 1 табл. 15 мг 2 р/добу, після чого - по 20 мг 1 р/добу для тривалого лікування і профілактики рецидивуючого тромбозу глибоких вен та ТЕЛА^{БНФ}, тривалість лікування визначається індивідуально після ретельної оцінки користі від застосування та потенційного ризику розвитку кровотеч, рішення про короткострокову терапію (принаймні протягом 3 міс) приймається, виходячи з наявності транзиторних факторів ризику (нещодавно перенесена операція, травма), а стосовно довгострокової - на підставі стійких факторів ризику або ідіопатичного ТГВ чи ТЕЛА; коли показано подовження профілактики рецидивів ТГВ або ТЕЛА (після завершення терапії ТГВ і ТЕЛА тривалістю щонайменше 6 міс.), рекомендована доза становить 10 мг 1 р/добу; для пацієнтів з високим ризиком рецидиву ТГВ або ТЕЛА, з ускладненими супутніми захворюваннями, та пацієнтів, які перенесли рецидив ТГВ чи ТЕЛА на фоні застосування 10 мг 1 р/добу, з метою профілактики може бути доцільним застосування 20 мг 1 р/добу. *ІХС/захворювання периферичних артерій:* пацієнти, які приймають препарат 2,5 мг 2 р/добу, також повинні приймати АСК у добовій дозі 75-100 мг; у пацієнтів із г. тромботичним явищем або судинною процедурою та необхідністю проведення подвійної антиагрегантної терапії продовження застосування препарату у дозі 2,5 мг 2 р/добу слід оцінювати з урахуванням характеру явища чи процедури та режиму антиагрегантної терапії.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анемія, включаючи відповідні лабораторні параметри; запаморочення, головний біль, нездужання; очний крововилив; артеріальна гіпотензія, гематоми; носова кровотеча, кровохаркання; кровотечі з ясен, ШКК, біль у ШКТ та животі, диспепсія, нудота, запор, діарея, блювання; свербіж, висипання, екхімоз, шкірний та підшкірний крововиливи; біль у кінцівках; уrogenітальні кровотечі, постпроцедурна кровотеча, гемартроз, крововиливи у м'язи, компартмент-с-м внаслідок кровотечі; порушення ф-ції нирок (включаючи підвищення КлКр та сечовини в крові); гарячка, набряк, загальне погіршення самопочуття, втомлюваність, астенія; підвищення рівнів трансаміназ; тромбоцитоз, тромбоцитопенія; АР, алергічний дерматит, кропив'янка; мозкові та внутрішньочерепні крововиливи, синкопальний стан; тахікардія; сухість у роті, порушення ф-ції печінки, жовтяниця, підвищення рівнів білірубину, лужної фосфатази крові, лактатдегідрогенази (ЛДГ), ліпази, амілази, гамма-глутаміл-трансферази (ГГТ), кон'югованого білірубину (за супутнього підвищення рівня АЛТ або без такого); НН/ГНН внаслідок кровотечі, що спричинила гіперфузію, судинна псевдоаневризма, погане самопочуття (включаючи нездужання), локалізований набряк; ангіоневротичний та алергічний набряк, анафілактичні р-ції, включаючи анафілактичний шок, печінкова недостатність, підвищення рівня трансаміназ, холестаза, гепатит (включаючи гепатоцелюлярне ураження); с-ром Стівенса-Джонсона/токсичний епідермальний некроліз, DRESS-с-ром.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до ривароксабану або до будь-яких допоміжних речовин препарату; клінічно значуща активна кровотеча; ушкодження або стани, що супроводжуються значним ризиком розвитку кровотеч; одночасне застосування з будь-якими іншими антикоагулянтами, зокрема з нефракціонованим гепарином, низькомолекулярними гепаринами, похідними гепарину, пероральними антикоагулянтами, окрім випадків переходу з або на терапію ривароксабаном; захворювання печінки, які асоціюються з коагулопатією та клінічно значущим ризиком розвитку кровотечі, у т.ч. цироз печінки класу В та С (за класифікацією Чайлда-П'ю); діти віком до 18 років; період вагітності та годування груддю; супутня терапія ГКС з використанням антиагрегантних засобів у пацієнтів з інсультом або транзиторною ішемічною атакою (ТІА) в анамнезі; супутня терапія ІХС/ЗПА з використанням АСК у пацієнтів із геморагічним або лакунарним інсультом в анамнезі або з будь-яким інсультом, перенесеним протягом останнього місяця.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 20 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	КСАРЕЛТО®	Байер АГ, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 15мг, 20мг	№5, №10, №28, №42	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КСАРЕЛТО®	Байер АГ, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x10	141,00	31,55/€
	КСАРЕЛТО®	Байер АГ, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	15мг	№14x1	89,05	31,55/€
	КСАРЕЛТО®	Байер АГ, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x10	52,90	31,55/€
	КСАРЕЛТО®	Байер АГ (для всього виробничого процесу)/Байер Хелскер Мануфактурінг С.Р.Л. (для всього виробничого процесу)/Штегеманн Лонферпакунг & Логістішер Сервіс е.К. (для вторинного пакування), Німеччина/Італія/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№14x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КСАРЕЛТО®	Байер АГ (для всього виробничого процесу)/Байер Хелскер Мануфактурінг С.Р.Л. (для всього виробничого процесу)/Штегеманн Лонферпакунг & Логістішер Сервіс е.К. (для вторинного пакування), Німеччина/Італія/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№14x4	200,00	35,65/€

- **Фондапаринукс (Fondaparinux) **** (див. п. 12.3.2.3. розділу "УРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ, СЕКСОПАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ", п. 13.8.1.4. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

2.15.2. Антикоагулянти непрямої дії

2.15.2.1. Похідні кумаринів

2.15.2.1.1. Похідні монокумаринів

- **Варфарин (Warfarin) *** (див. п. 13.8.1.1. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

2.15.2.1.2. Похідні індандіону

- **Феніндіон (Phenindione)** (див. п. 13.8.1.1. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

2.15.3. Антиагреганти

2.15.3.1. Препарати ацетилсаліцилової кислоти

- **Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid) * **** [ПМД] [окрім табл., вкриті п/о 75мг, 150мг №50, №100; табл. 100мг №50, №100; пор. д/р-ну д/ін'єк. 1г; табл. 325мг №120]

Фармакотерапевтична група: B01AC06 - Антитромботичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: пригнічує агрегацію тромбоцитів шляхом блокування синтезу тромбоксану А₂; механізм її дії полягає у необоротній інактивації ферменту циклооксигенази (ЦОГ-1); зазначений інгібуючий ефект особливо виражений для тромбоцитів, оскільки вони не здатні до ресинтезу вказаного ферменту; виявляє й інші інгібуючі впливи на тромбоцити, завдяки яким її застосовують при багатьох васкулярних захворюваннях; належить до групи нестероїдних протизапальних лікарських засобів (НПЗЗ) з анальгетичними, жарознижувальними і протизапальними властивостями; перорально у більш високих дозах ацетилсаліцилову к-ту застосовують для полегшення болю та при легких фібрильних станах (застуда, грип, для зниження температури і послаблення болю в суглобах і м'язах, при г. та хр. запальних захворюваннях (РА, остеоартрит та анкілозуючий спондиліт).

Показання для застосування ЛЗ: для зниження ризику смерті у пацієнтів з підозрою на г. ІМ^{вооз}, бнф, пмд, захворюваності і смерті у пацієнтів, які перенесли ІМ^{вооз}, бнф; транзиторних ішемічних атак (ТІА) та інсульту^{пмд} у пацієнтів з ТІА; захворюваності і смерті при стабільній^{пмд} і нестабільній стенокардії; ІМ у пацієнтів з високим ризиком розвитку СС ускладнень (ЦД^{пмд}, контрольована АГ) та особам із багатофакторним ризиком СС

захворювань (гіперліпідемія, ожиріння, тютюнопаління, літній вік та ін.); для профілактики тромбозів і емболій після операцій на судинах (черезшкірна транслюмінарна катетерна ангіопластика (PTCA), ендартеректомія сонної артерії, аортокоронарне шунтування (CABG), артеріовенозне шунтування)^{БНФ}; тромбозів глибоких вен і емболій легень після довготривалої іммобілізації (після хірургічних операцій); для вторинної профілактики інсульту^{БНФ, ПМД}, г. та хр. ІХС; первинна профілактика тромбозів, СС захворювань (г. коронарний с-ром у пацієнтів віком від 50 років, у яких присутні фактори ризику розвитку захворювань ССС: АГ, гіперхолестеринемія, ЦД, ожиріння (індекс маси тіла > 30), спадковий анамнез (ІМ у пацієнтів віком до 55 років принаймні у одного з батьків або брата чи сестри).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для зниження ризику смерті в пацієнтів із підозрою на г. ІМ та в пацієнтів, які перенесли ІМ застосовують 100 мг/добу^{БООЗ} -300 мг/добу; упродовж 30 днів після ІМ продовжують приймати підтримуючу дозу 100-300 мг/добу, ч/з 30 днів розглянути питання про подальшу профілактику рецидиву ІМ; для вторинної профілактики інсульту застосовують 100 мг/добу^{БООЗ} -300 мг/добу; для зниження ризику ТІА та інсульту в пацієнтів з ТІА застосовують 100-300 мг/добу; для зниження ризику розвитку захворювання і смерті у пацієнтів зі стабільною і нестабільною стенокардією - 100-300 мг/добу; для профілактики тромбозів і емболій після операцій на судинах (черезшкірна транслюмінарна катетерна ангіопластика, ендартеректомія сонної артерії, аортокоронарне шунтування, артеріовенозне шунтування) застосовують 100-200 мг/добу або 300 мг ч/з день; для профілактики тромбозів глибоких вен і емболій легень після довготривалого стану іммобілізації (після хірургічних операцій) - 100-200 мг/добу або 300 мг/добу ч/з день; для профілактики ІМ в пацієнтів із високим ризиком розвитку СС ускладнень (ЦД, контрольована АГ) та особам з багатофакторним ризиком СС захворювань (гіперліпідемія, ожиріння, тютюнопаління, літній вік) застосовують 100 мг/добу або 300 мг/добу ч/з день; г. та хр. ІХС - рекомендована початкова доза - 150 мг/добу, підтримувальна доза - 75 мг/добу^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: мікрокровотечі, шлункові симптоми, біль в епігастральній ділянці та абдомінальний біль; запалення ШКТ, диспепсія, нудота, блювання, діарея; ерозивно-виразкові ураження ШКТ; ризик кровотеч (періопераційних, гематом, носових, урогенітальних, кровотечі з ясен); ШКК, шлунково-кишкові виразки, подовження часу кровотечі; тромбоцитопенія, агранулоцитоз, панцитопенія, лейкопенія, апластична анемія, залізодефіцитної анемії; головний біль, запаморочення, тиніт, порушення зору, порушення слуху, сплутаність свідомості; печінкова дисфункція (підвищення рівня трансаміназ); шкірні р-ції (висипання, набряк, свербіж, еритематозні/екзематозні шкірні р-ції, кропив'янка), р-ції гіперчутливості (риніт, закладеність носа, бронхоспазм, астматичний стан, астма; ангіоневротичний набряк, зниження АТ до стану шоку; серцево-дихальна недостатність); шкірні р-ції тяжкого ступеня, включаючи ексудативну мультиформну еритему, с-ром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз; гіпогікемія, залізодефіцитна анемія, порушення кислотно-лужної рівноваги; порушення ф-ції нирок, ГНН; с-ром Рея; у пацієнтів з тяжкими формами недостатності глюкозо-6-фосфатдегідрогенази - гемоліз та гемолітична анемія; геморагічний інсульт, особливо у пацієнтів з неконтрольованою АГ та/або у разі одночасного застосування антикоагулянтів.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до ацетилсаліцилової к-ти, інших саліцилатів або до будь-якого компонента препарату; астма в анамнезі, спричинена застосуванням саліцилатів або речовин з подібною дією, особливо НПЗЗ; набряк Квінке, спричинені застосуванням саліцилатів або речовин з подібною дією, особливо НПЗЗ, в анамнезі, г. пептичні виразки, геморагічний діатез; ниркова недостатність тяжкого ступеня, печінкова недостатність тяжкого ступеня, СН тяжкого ступеня, комбінація з метотрексатом у дозуванні 15 мг/тиждень або більше, III триместр вагітності; дитячий вік.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1 табл. (незалежно від сили)

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	АСПЕНОРМ	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	табл. в /о, к/р у бл.	100мг	№10х10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АСПЕНОРМ	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	табл. в /о, к/р у бл.	100мг	№10х2	1,83	
	АСПЕНОРМ	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	табл. в /о, к/р у бл.	300мг	№10х2	4,00	
	АСПІКАРД КАРДІО	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk виробника ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна), Україна	табл. в/о, к/р у бл.	100мг, 300мг	№10х2, №10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЦЕКОР КАРДІО	ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна	табл. к/р у бл. у бан.	100мг	№100	1,05	
	АЦЕКОР КАРДІО	ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна	табл. к/р у бл. у бл.	100мг	№25х4	1,05	
	АЦЕКОР КАРДІО	ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна	табл. к/р у бл. у бан.	100мг	№50	1,50	
	АЦЕКОР КАРДІО	ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна	табл. к/р у бл. у бл.	100мг	№10х5	1,50	
	КАРДІСЕЙВ®	АТ "Фармак", Україна	табл., в криті	150мг	№10х5	0,84	

			п/о у бл.				
КАРДІСЕЙВ®	АТ "Фармак", Україна	табл., в криті п/о у бл.	150мг	№10x3	1,00		
КАРДІСЕЙВ®	АТ "Фармак", Україна	табл., в криті п/о у бл.	75мг	№10x3	0,80		
КАРДІСЕЙВ®	АТ "Фармак", Україна	табл., в криті п/о у бл.	75мг	№10x5	0,96		
ЛОСПИРИН®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. в криті к/р об. у стрип.	75мг	№10x10, №30x1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЛОСПИРИН®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. в криті к/р об. у стрип.	75мг	№30x4	0,70		
ЛОСПИРИН®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. в криті к/р об. у стрип.	75мг	№10x3	1,07		
МАГНІКОР	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., в криті п/о у бл.	75мг	№10x10	0,63		
МАГНІКОР	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., в криті п/о у бл.	75мг	№10x3	0,90		
МАГНІКОР	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., в криті п/о у бл.	150мг	№10x10	0,76		
МАГНІКОР	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., в криті п/о у бл.	150мг	№10x3	0,99		
ТРОМБОЛІК-КАРДІО	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. к/р у бл.	100мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ТРОМБОЛІК-КАРДІО	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. к/р у бл.	100мг	№10x2	2,36		
II.	АКАРД	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польща	табл. к/р у бл.	75мг, 150мг	№10x3, №20x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АКАРД	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польща	табл. к/р у бл.	75мг	№20x5	0,85	25,02/\$
	АКАРД	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польща	табл. к/р у бл.	75мг	№10x5	1,20	25,02/\$
	АКАРД	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польща	табл. к/р у бл.	150мг	№10x5	1,28	25,02/\$
	АСК-ТЕВА	Балканфарма-Дупниця АТ, Болгарія	табл. к/р у бл. та конт.	75мг, 100мг	№10x3, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АСПЕКАРД	АТ "Софарма" (виробництво нефасованої продукції, первинне, вторинне пакування, випробування контролю якості)/ТОВ "Бріз" (вторинне пакування, випуск серії), Болгарія/Латвія	табл. у бл.	100мг	№10x10, №10x12	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АСПІРИН КАРДІО®	Байер АГ (виробництво "in bulk", контроль якості)/Байер Біттерфельд ГмбХ (виробництво "in bulk", контроль якості, первинне, вторинне пакування та випуск серії), Німеччина/Німеччина	табл., вкриті к/р об. у бл.	100мг	№14x4	1,71	29,96/€
	АСПІРИН КАРДІО®	Байер АГ (виробництво "in bulk", контроль якості)/Байер Біттерфельд ГмбХ (виробництво "in bulk", контроль якості, первинне, вторинне пакування та випуск серії), Німеччина/Німеччина	табл., вкриті к/р об. у бл.	100мг	№14x2	2,06	29,96/€
	АСПІРИН КАРДІО®	Байер АГ/Байер Біттерфельд ГмбХ, Німеччина/Німеччина	табл., вкриті к/р об. у бл.	300мг	№14x2	3,09	29,96/€
	АЦЕТИЛКА-ТЕВА КАРДІО	Балканфарма-Дупниця АТ, Болгарія	табл. к/р у бл. та конт.	75мг, 100мг	№10x3, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	

ГОДАСАЛ®	Др. Пфлегер Арцнайміттель ГмбХ, Німеччина	табл. у бл.	100мг	№20, №50, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КАРДІОМАГНІЛ	Такеда ГмбХ, місце виробництва Оранієнбург (виробництво за повним циклом)/Такеда Фарма А/С (виробництво нерозфасованої продукції), Німеччина/Данія	табл., в криті п/о у фл.	75мг	№30, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КАРДІОМАГНІЛ ФОРТЕ	Такеда ГмбХ, місце виробництва Оранієнбург (виробництво за повним циклом)/Такеда Фарма А/С (виробництво нерозфасованої продукції), Німеччина/Данія	табл., в криті п/о у фл.	150мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КАРДІОМАГНІЛ ФОРТЕ	Такеда ГмбХ, місце виробництва Оранієнбург (виробництво за повним циклом)/Такеда Фарма А/С (виробництво нерозфасованої продукції), Німеччина/Данія	табл., в криті п/о у фл.	150мг	№100	0,94	32,18/€
ТРОМБО АСС 100 МГ	Г.Л. Фарма ГмбХ (виробник, відповідальний за випуск продукту), Австрія	табл., в криті п/о к/р у бл.	100мг	№20x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ТРОМБО АСС 100 МГ	Г.Л. Фарма ГмбХ (виробник, відповідальний за випуск продукту), Австрія	табл., в криті п/о к/р у бл.	100мг	№10x3	2,17	
ТРОМБО АСС 50 МГ	Г.Л. Фарма ГмбХ (виробник, відповідальний за випуск продукту), Австрія	табл., в криті п/о к/р у бл.	50мг	№10x3, №20x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ТРОМБО АСС 75 МГ	Г.Л. Фарма ГмбХ (виробник, відповідальний за випуск продукту), Австрія	табл., в криті п/о к/р у бл.	75мг	№20x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ТРОМБО АСС 75 МГ	Г.Л. Фарма ГмбХ (виробник, відповідальний за випуск продукту), Австрія	табл., в криті п/о к/р у бл.	75мг	№10x3	1,67	

2.15.3.2. Похідні тієнопіридину

- **Клопідогрель (Clopidogrel)** * [ПМД] (див. п. 13.8.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Тиклопідин (Ticlopidine)** (див. п. 13.8.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

2.15.3.3. Блокатори глікопротеїнових ІІв/ІІІа рецепторів тромбоцитів

- **Ептіфібатид (Eptifibatide)** (див. п. 13.8.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

2.15.3.4. Інші інгібітори агрегації тромбоцитів

- **Ілопрост (Iloprost)**

Фармакотерапевтична група: В01АС11 - Антитромботичні засоби. Антиагреганти.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний аналог простацикліну, дія якого полягає у інгібуванні агрегації, адгезії та р-ції вивільнення тромбоцитів; дилатації артеріол і венул; підвищенні щільності капілярів і зменшенні підвищеної судинної проникності у системі мікроциркуляції, що спричинена такими медіаторами, як серотонін чи гістамін; підвищенні ендогенної фібринолітичної активності; інгібуванні адгезії лейкоцитів після ушкодження ендотелію та накопичення лейкоцитів у пошкодженій тканині, а також зниженні вивільнення вільних кисневих радикалів. Фармакологічні ефекти після інгаляції: пряма вазодилатація легеневої артерії з подальшим значним позитивним ефектом відносно легеневого артеріального тиску, судинної легеневої резистентності та серцевого викиду, а також змішаного насичення киснем венозної крові; вазодилаторний ефект ілопросту при введенні його інгаляційно є нетривалим (1-2 год.).

Показання для застосування ЛЗ: прогресуючий облітеруючий тромбангіт (хвороба Бюргера) при тяжкому порушенні перфузії у разі відсутності показань до реваскуляризації; лікування дорослих пацієнтів з первинною легеневою гіпертензією ^{БНФ} NYHA III для покращення толерантності до фізичного навантаження та послаблення симптомів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: щоденно у вигляді 6-год в/в інфузії із швидкістю 0,5-2,0 нг/кг/хв (залежить від індивідуальної переносимості); визначати ЧСС і АТ на початку інфузії та після кожного збільшення дози; протягом перших 2-3 днів визначають індивідуальну переносимість - лікування починають зі швидкості введення 0,5 нг/кг/хв протягом 30 хв; після цього дозу поступово збільшують на 0,5 нг/кг/хв ч/з кожні 30 хв до досягнення швидкості введення 2,0 нг/кг/хв; у випадку виникнення таких побічних явищ, як головний біль, нудота або небажане зниження АТ, швидкість інфузії зменшувати доки не буде підібрана добре переносима доза; при розвитку побічних р-цій важкого ступеню інфузію припинити; лікування відновлюють зазвичай через 4 тижні, застосовуючи дози, які хворий добре переносив у перші 2-3 дні попереднього курсу лікування; тривалість лікування - до 4 тижнів; лікування дорослих пацієнтів з первинною легеневою гіпертензією NYHA III розпочинати з низької дози - 2,5 мкг для першої інгаляції (відповідає дозі, що доставляється ч/з трубку інгалятора), за

нормальної переносимості дозування можна підвищити до 5 мг^{БНФ} та підтримувати на цьому рівні, у випадку поганої переносимості 5 мг зменшити дозу до 2,5 мг^{БНФ}; для кожної процедури інгаляції слід використовувати вміст однієї ампули (2 мл) препарату 10 мг/мл; дозу, що відповідає процедурі інгаляції, слід застосовувати 6-9 р/день залежно від потреб та переносимості кожного конкретного пацієнта^{БНФ}, тривалість лікування залежить від клінічного статусу і визначається лікарем, при погіршенні стану пацієнта під час терапії препаратом розглянути питання про в/в введення простацикліну.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тромбоцитопенія; АР; втрата апетиту; апатія, сплутаність свідомості; занепокоєння, депресія, галюцинації; головний біль; запаморочення, вертиго, парестезія, відчуття серцебиття, гіперестезія, відчуття печіння, занепокоєння, збудження, загальмованість, ступор; епілептичний напад, втрата свідомості, тремор, мігрень; порушення гостроти зору, подразнення та біль в очах; вестибулярні порушення; тахікардія; брадикардія, стенокардія; ІМ, СН, аритмія, екстрасистолія; припливи; артеріальна гіпотензія, синкопальний стан; підвищення АТ; цереброваскулярні події, церебральна ішемія, тромбоемболія легеневої артерії, тромбоз глибоких вен; біль у грудній клітці, диспное; астма, бронхоспазм, набряк легень; кашель; нудота, блювання, подразнення ротової порожнини та язика, подразнення горла; діарея, абдомінальний дискомфорт або біль; геморагічна діарея, ректальна кровотеча, диспепсія, тенезми, запор, відрижка, дисфагія, сухість у роті/дисгевзія (розлади відчуття смаку); проктит; жовтяниця; пітливість; свербіж; біль у щелепі/тризм, міалгія/ артралгія; тетанія, м'язові судоми, підвищення м'язового тону, периферичні набряки; біль у нирках, хворобливі спазми у сечостатевоїх органах, зміна лабораторних показників при аналізі сечі, дизурія, захворювання сечовивідних шляхів; біль, гарячка, підвищення t° тіла, відчуття жару, астенія, відчуття нездужання, озноб, підвищена втомлюваність, спрага, р-ції у місці введення (еритема, біль, флебіти).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого іншого компонента препарату, вагітність, годування груддю, патологічні стани, при яких дія препарату на тромбоцити може підвищити ризик кровотечі (активна пептична виразка, травма, внутрішньочерепний крововилив), тяжка ІХС або нестабільна стенокардія, ІМ протягом останніх 6 міс, г. або хр. застійна СН II-IV ст. (за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації), тяжкі порушення серцевого ритму, підозра на застійні явища в легенях; ампутацію, що показана у невідкладному порядку (наприклад при інфікованій гангрені), не слід відкладати на користь спроби лікування препаратом; цереброваскулярні захворювання (у т.ч. транзиторна ішемічна атака, інсульт) упродовж останніх 3 міс, легенева гіпертензія внаслідок венозної оклюзії; не пов'язані з легеневою гіпертензією спадкові або набуті вади клапанів з вираженими порушеннями ф-ції міокарда.

Визначена добова доза (DDD): інгаляційно (розчин) - 0,15 мг., парентерально - 50 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ВЕНТАВІС	Берлімед, С.А., Іспанія	р-н д/інгал. по 2мл в амп. у пач.	10 мг/мл	№30	4406,25	31,55/€
	ІЛОМЕДІН	Берлімед, С.А., Іспанія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 1мл в амп. у кор.	20 мг/мл	№5	1161,88	29,15/€

• **Тикагрелор (Ticagrelor)** ^[ГІМД]

Фармакотерапевтична група: В01AC24 - антитромботичний засіб. Інгібітори агрегації тромбоцитів, окрім гепарину.

Основна фармакотерапевтична дія: є селективним і оборотно зв'язуючим антагоністом P2Y₁₂-рецепторів АДФ, здатний запобігати АДФ-опосередкованій активації та агрегації тромбоцитів; не запобігає зв'язуванню АДФ, але будучи зв'язаним з рецептором P2Y₁₂, перешкоджає АДФ-індукованій передачі сигналів; оскільки тромбоцити беруть участь в ініціації та/або розвитку тромботичних ускладнень атеросклерозу, пригнічення ф-ції тромбоцитів, як було показано, зменшує ризик серцево-судинних подій (смерть, ІМ або інсульт).

Показання для застосування ЛЗ: одночасно з ацетилсаліциловою к-тою для попередження атеротромботичних подій у дорослих пацієнтів з г.коронарним синдромом (ГКС) ^{БНФ, ГІМД} або ІМ в анамнезі та високим ризиком розвитку атеротромботичних подій.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: ГКС: р/ос, незалежно від прийому їжі; розпочинати із разової навантажувальної дози 180 мг та надалі приймати по 90 мг 2р/добу; МДД 180 мг; рекомендована тривалість лікування 12 міс. ^{БНФ} за відсутності клінічних показань для передчасного припинення лікування; за наявності клінічних показань, лікування може продовжуватись понад 12 міс.; рекомендована доза для пацієнтів з ІМ в анамнезі, перенесеним не менш як рік тому, та високим ризиком розвитку атеротромботичних подій за необхідності тривалого лікування становить 60 мг 2 р/добу; для пацієнтів з ГКС з високим ризиком атеротромботичних подій лікування можна починати без перерви - як продовження терапії після первинного лікування препаратом у дозі 90 мг або іншим інгібітором рецепторів АДФ, яке тривало один рік.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: Кровотечі на фоні, порушення згортання крові, гіперурикемія, диспное, подагра/подагричний артрит, запаморочення, синкопе, головний біль; системне запаморочення (вертиго); гіпотензія; кровотечі з органів дихання ШКК, нудота, диспепсія, запор; крововиливи у підшкірну клітковину або у шкіру, висипання, свербіж; кровотечі з сечовивідних шляхів; підвищений рівень креатиніну в крові; кровотеча після проведення процедури, травматична кровотеча; кровотечі з пухлини; гіперчутливість, в т.ч.ангіоневротичний набряк; затьмарення свідомості; внутрішньочерепний крововилив; крововилив в око; вушна кровотеча; ретроперитонеальна кровотеча; крововиливи у м'язи; кровотечі у репродуктивній системі.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або будь-якої з допоміжних речовин; активна патологічна кровотеча; внутрішньочерепний крововилив в анамнезі; порушення функції печінки помірного

та тяжкого ступеня; одночасне застосування тикагрелору з потужними інгібіторами СYP3A4 (наприклад кетоконазолом, кларитроміцином, нефазодоном, ритонавіром та атазанавіром) протипоказане, оскільки їх одночасне застосування може призвести до значного збільшення експозиції тикагрелору; вагітність та період годування груддю; дитячий вік.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,18 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БРИЛІНТА	АстраЗенека АБ, Швеція	табл., вкриті п/о у бл.	90мг	№14x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БРИЛІНТА	АстраЗенека АБ, Швеція	табл., вкриті п/о у бл.	90мг	№14x4	65,71	26,48/\$
	БРИЛІНТА	АстраЗенека АБ, Швеція	табл., вкриті п/о у бл.	60мг	№14x4	98,56	26,48/\$

2.15.4. Фібринолітики

- **Альтеплазе (Alteplase)** (див. п. 13.8.3. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Стрептокіназа (Streptokinase)** * (див. п. 13.8.3. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Тенектеплаза (Tenecteplase)** (див. п. 13.8.3. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

2.16. Гіполіпідемічні лікарські засоби

2.16.1. Інгібітори редуктази 3-гідрокси-3-метилглутарил-коензим А (ГМГ-КоА) або статини

- **Аторвастатин (Atorvastatin)**^{ГПМД}

Фармакотерапевтична група: С10АА05 - препарати, що знижують рівень холестерину і тригліцеридів у сироватці крові. Інгібітори ГМГ-КоА-редуктази.

Основна фармакотерапевтична дія: інгібітор 3-гідрокси-3-метилглутарил-кофермент А (ГМГ-КоА) редуктази, що каталізує перетворення ГМГ-КоА в мевалонат - ранній етап біосинтезу холестерину; є селективним конкурентним інгібітором ГМГ-КоА-редуктази, ферменту, від якого залежить швидкість перетворення 3-гідрокси-3-метилглутарил-коферменту А в мевалонат, речовину-попередник стеролів, у т.ч.холестерину; знижує рівень холестерину та ліпопротеїнів у плазмі та зменшує продукування ЛПНЩ та кількість цих частинок; головним місцем дії аторвастатину є печінка, яка відіграє головну роль у синтезі холестерину та кліренсі ЛПНЩ; доза препарату, на відміну від системної концентрації препарату, краще корелює зі зменшенням рівня холестерину ЛПНЩ.

Показання для застосування ЛЗ: запобігання СС захворюванням: для дорослих пацієнтів без клінічно вираженої ІХС, але з декількома факторами ризику розвитку ІХС, такими як вік, тютюнопаління, АГ^{ГПМД}, низький рівень ЛПВЩ або наявність ранньої ІХС у сімейному анамнезі, для: зменшення ризику виникнення ІМ; зменшення ризику виникнення інсульту; зменшення ризику проведення процедур реваасуляризації та стенокардії; для пацієнтів з ЦД II типу та без клінічно вираженої ІХС, але з кількома факторами ризику розвитку ІХС, такими як ретинопатія, альбумінурія, тютюнопаління або АГ, для: зменшення ризику виникнення ІМ; зменшення ризику виникнення інсульту; для пацієнтів з клінічно вираженою ІХС для: зменшення ризику виникнення нелетального ІМ; зменшення ризику виникнення летального та нелетального інсульту; зменшення ризику проведення процедур реваасуляризації; зменшення ризику госпіталізації у зв'язку із застійною СН; зменшення ризику виникнення стенокардії^{ГПМД}; гіперліпідемія: як доповнення до дієти, щоб зменшити підвищені рівні загального холестерину, холестерину ЛПНЩ, аполіпопротеїну В та тригліцеридів, а також для підвищення рівня холестерину ЛПВЩ у пацієнтів з первинною гіперхолестеринемією^{БНФ} (гетерозиготною сімейною та несімейною) та змішаною дисліпідемією (типи Іа та Іb за класифікацією Фредріксона); як доповнення до дієти для лікування пацієнтів з підвищеними рівнями тригліцеридів у сироватці крові (тип IV за класифікацією Фредріксона); для лікування пацієнтів з первинною дисбеталіпопротеїнемією (тип III за класифікацією Фредріксона), у випадках, коли дотримання дієти є недостатньо ефективним; для зменшення загального холестерину та холестерину ЛПНЩ у пацієнтів з гомозиготною сімейною гіперхолестеринемією^{БНФ} доповнення до інших гіполіпідемічних методів лікування (наприклад аферез ЛПНЩ), або якщо такі методи лікування недоступні; як доповнення до дієти для зменшення рівня загального холестерину, холестерину ЛПНЩ і аполіпопротеїну В у дітей віком від 10 до 17 років з гетерозиготною сімейною гіперхолестеринемією^{БНФ}, якщо після відповідної дієтотерапії результати аналізів такі: а) холестерин ЛПНЩ залишається ≥ 190 мг/дл або б) холестерин ЛПНЩ ≥ 160 мг/дл та: у сімейному анамнезі наявні ранні СС захворювання або два або більше інших факторів ризику розвитку СС захворювань присутні у пацієнта дитячого віку.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: гіперліпідемія^{БНФ} і змішана дисліпідемія - рекомендована початкова доза $10^{БНФ}$ або 20 мг 1 р/добу, для пацієнтів, які потребують значного зниження рівня холестерину ЛПНЩ (більш ніж на 45 %), терапія може бути розпочата із дозування 40 мг 1 р/добу, дозовий діапазон знаходиться у межах від 10 мг до 80 мг 1 р/добу^{БНФ}, можна приймати разовою дозою у будь-які год та незалежно від прийому їжі, початкова та підтримуючі дози підбирати індивідуально залежно від мети лікування та відповіді, після початку лікування та/або після титрування дози проаналізувати рівні ліпідів протягом періоду від 2 до 4 тижнів та відповідним чином відкоригувати дозу; гетерозиготна сімейна гіперхолестеринемія у пацієнтів дитячого віку^{БНФ} (віком 10-17 років) - рекомендована початкова доза 10 мг/добу^{БНФ}; МДД - 20 мг/добу, дози підбирати індивідуально відповідно до мети лікування, коригування дози проводити з інтервалом 4 тижні або більше; гомозиготна сімейна

гіперхолестеринемія: від 10 до 80 мг/добу^{БНФ}, використовувати в якості доповнення до інших гіполіпідемічних методів лікування (наприклад аферез ЛПНЩ), або якщо гіполіпідемічні методи лікування недоступні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: відчуття нездужання, пірексія; шлунково-кишковий дискомфорт, відрижка, метеоризм, гепатит, холестаза; м'язово-скелетний біль, підвищена втомлюваність м'язів, біль у шиї, набрякання суглобів, тендінопатія (іноді ускладнена розривом сухожилля); підвищення трансаміназ, відхилення від норми функціональних проб печінки, підвищення рівня ЛФ в крові, підвищення активності КФК, гіперглікемія; кошмарні сновидіння; носова кровотеча; кропив'янка; нечіткість зору, порушення, затуманення зору; шум у вухах; лейкоцитозурія; гінекомастія, головний біль; запаморочення, парестезія, гіпестезія, дисгевзія, амнезія; периферичні нейропатії, запор; панкреатит, блювання, біль у суглобах, біль у спині; міопатія, міозит, рабдоміоліз, астенія, біль у грудях, периферичні набряки, стомлюваність, гіпоглікемія, збільшення маси тіла, анорексія, печінкова недостатність, шкірні висипання, свербіж, алопеція; ангіоневротичний набряк, бульозний дерматит (у т.ч. мультиформна еритема), с-м Стівенса-Джонсона та токсичний епідермальний некроліз, біль у горлі та гортані, АР; анафілаксія, тромбоцитопенія, біль у животі, кропив'янка, артралгія, нездужання; ЦД, інсульт.

Протипоказання до застосування ЛЗ: активне захворювання печінки, яке може включати стійке підвищення рівнів печінкових трансаміназ невідомої етіології, гіперчутливість до будь-якого з компонентів ЛЗ; вагітність; лактація.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 20 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АТОРВАКОР®	ПАТ "Фармак", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x6	5,00	
	АТОРВАКОР®	ПАТ "Фармак", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	6,67	
	АТОРВАКОР®	ПАТ "Фармак", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x4	3,63	
	АТОРВАКОР®	ПАТ "Фармак", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	3,67	
	АТОРВАКОР®	ПАТ "Фармак", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	40мг	№10x3	3,00	
	АТОРВАКОР®	ПАТ "Фармак", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	80мг	№6x5	2,29	
	ВАЗОКЛІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., в/о у конт. чар/уп.	10мг, 20мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАЗОКЛІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., в/о у конт. чар/уп.	10мг	№14x2	4,46	
	ВАЗОКЛІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., в/о у конт. чар/уп.	20мг	№14x2	2,74	
	ЕТСЕТ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., в/о у бл.	10мг, 20мг, 40мг, 80мг	№14x4, №14x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕТСЕТ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., в/о у бл.	10мг	№14x6	3,95	
	ЕТСЕТ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., в/о у бл.	10мг	№14x2	4,56	
	ЕТСЕТ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., в/о у бл.	20мг	№14x6	2,58	
	ЕТСЕТ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., в/о у бл.	20мг	№14x2	3,12	
	ЕТСЕТ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., в/о у бл.	40мг	№14x2	2,23	
	ЕТСЕТ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., в/о у бл.	80мг	№14x2	1,89	
	ЛІВОСТОП	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x7	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛІВОСТОП	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	4,50	
	ЛІВОСТОП	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x7	2,70	
	ЛІВОСТОП	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	3,10	
ЛІВОСТОП	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	40мг	№10x3	2,83		
II.	АСТИН	Мікро Лабс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	6,10	26,86/\$
	АСТИН	Мікро Лабс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	3,71	26,86/\$

		у бл.					
АТОКОР	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд (Виробнича дільниця - VI), Індія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
АТОКОР 40	Апотекс Інк. (виробництво нерозфасованого продукту, дозвіл на випуск серії; виробництво за повним циклом), Канада	табл., вкриті п/о у бл. та бан.	40мг	№30, №60, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ		
АТОРВАСТАТИН 10 АНАНТА	Фламінго Фармасьютикалс Лтд./Артура Фармасьютикалз Пвт. Лтд., Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	3,47	28,11/\$	
АТОРВАСТАТИН 20 АНАНТА	Фламінго Фармасьютикалс Лтд./Артура Фармасьютикалз Пвт. Лтд., Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	2,06	28,11/\$	
АТОРВАСТАТИН КРКА	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/Кемілаб д.о.о. (контроль серії), Словенія/ Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг, 30мг, 40мг, 60мг, 80мг	№10x3, №10x9	відсутня у реєстрі ОБЦ		
АТОРВАСТАТИН-ТЕВА	Тева Фарма С.Л.У., Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг, 40мг, 80мг	№30, №60, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ		
АТОРВАСТЕРОЛ	Фармацевтичний завод "Польфарма" С.А. (виробництво, первинне та вторинне пакування; відповідальний за випуск серії)/БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦЯ АТ (виробництво, первинне та вторинне пакування; відповідальний за випуск серії)/Фармацевтична і Хімічна Індустрія, Польща/ Болгарія/Сербія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	8,51	25,02/\$	
АТОРВАСТЕРОЛ	Фармацевтичний завод "Польфарма" С.А. (виробництво, первинне та вторинне пакування; відповідальний за випуск серії)/БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦЯ АТ (виробництво, первинне та вторинне пакування; відповідальний за випуск серії)/Фармацевтична і Хімічна Індустрія, Польща/ Болгарія/Сербія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	5,00	25,02/\$	
АТОРВАСТЕРОЛ	Фармацевтичний завод "Польфарма" С.А. (виробництво, первинне та вторинне пакування; відповідальний за випуск серії)/БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦЯ АТ (виробництво, первинне та вторинне пакування; відповідальний за випуск серії)/Фармацевтична і Хімічна Індустрія, Польща/ Болгарія/Сербія	табл., вкриті п/о у бл.	40мг	№10x3	4,25	25,02/\$	
АТОРИС®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/Кемілаб д.о.о. (контроль серії), Словенія/ Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	10,15	32,39/€	
АТОРИС®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/Кемілаб д.о.о. (контроль серії), Словенія/ Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x9	9,77	32,39/€	
АТОРИС®	КРКА, д.д., Ново место	табл., вкриті п/о	20мг	№10x9	5,95	32,39/€	

	(виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/Кемілаб д.о.о. (контроль серії), Словенія/ Словенія	у бл.				
АТОРИС®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/Кемілаб д.о.о. (контроль серії), Словенія/ Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	6,77	32,39/€
АТОРИС®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/Кемілаб д.о.о. (контроль серії), Словенія/ Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	40мг	№10x9	3,78	32,39/€
АТОРИС®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/Кемілаб д.о.о. (контроль серії), Словенія/ Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	40мг	№10x3	6,14	32,39/€
АТОРИС®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/Кемілаб д.о.о. (контроль серії), Словенія/ Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	30мг, 40мг, 60мг, 80мг	№10, №30, №60, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
АТОРИС®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/Кемілаб д.о.о. (контроль серії), Словенія/ Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	30мг	№10x3	1,90	30,27/€
ЕСКОЛАН-САНОВЕЛЬ	Сановель Іляч Санаі ве Тиджарет А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг, 40мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛІМІСТИН 10	Марксанс Фарма Лтд./Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛІМІСТИН 10	Марксанс Фарма Лтд./Копран Лімітед/Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Індія/Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛІМІСТИН 20	Марксанс Фарма Лтд./Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛІМІСТИН 20	Марксанс Фарма Лтд./Копран Лімітед/Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Індія/Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	3,09	28,11/\$
ЛІМІСТИН 40	Марксанс Фарма Лтд./Копран Лімітед/Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Індія/Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	40мг	№10x3	2,11	28,14/\$
ЛІПОДЕМІН	Актавіс Лтд, Мальта	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг, 40мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛІПРИМАР®	Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ (виробництво in bulk, первинна та вторинна упаковка, контроль якості та випуск серії)/Пфайзер Фармасьютікалз ЛЛС (виробництво in bulk, контроль якості), Німеччина/США	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	11,39	25,64/\$
ЛІПРИМАР®	Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ (виробництво in bulk, первинна та вторинна	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x10	7,95	25,64/\$

	упаковка, контроль якості та випуск серії)/Пфайзер Фармасютікалз ЛЛС (виробництво in bulk, контроль якості), Німеччина/США						
ЛІПРИМАР®	Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ (виробництво in bulk, первинна та вторинна упаковка, контроль якості та випуск серії)/Пфайзер Фармасютікалз ЛЛС (виробництво in bulk, контроль якості), Німеччина/США	табл., вкриті п/о у бл.	40мг	№10x3	7,27	25,64/\$	
ЛІПРИМАР®	Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ (первинна та вторинна упаковка, контроль якості та випуск серії)/Пфайзер Фармасютікалз ЛЛС (виробництво in bulk, контроль якості), Німеччина/США	табл., вкриті п/о у бл.	80мг	№10x3	5,56	25,64/\$	
ЛІПРИМАР®	Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ (виробництво in bulk, первинна та вторинна упаковка, контроль якості та випуск серії)/Пфайзер Фармасютікалз ЛЛС (виробництво in bulk, контроль якості), Німеччина/США	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x10	10,26	25,64/\$	
ЛІПРИМАР®	Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ (виробництво in bulk, первинна та вторинна упаковка, контроль якості та випуск серії)/Пфайзер Фармасютікалз ЛЛС (виробництво in bulk, контроль якості), Німеччина/США	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	10,26	25,64/\$	
МОДЛІП 10	Торрент Фармасьютікалс Лтд, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
МОДЛІП 20	Торрент Фармасьютікалс Лтд, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
МОДЛІП 40	Торрент Фармасьютікалс Лтд, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	40мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
МОДЛІП 80	Торрент Фармасьютікалс Лтд, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	80мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
СТОРВАС	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг	№10x3, №10x9	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ТОЛЕВАС®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл., в/о у бл.	10мг, 20мг, 40мг, 80мг	№30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ТОЛЕВАС®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл., в/о у бл.	10мг	№15x2	7,80	25,99/\$	
ТОРВАКАРД® КРИСТАЛ	ТОВ "Зентіва" (всі етапи виробництва, первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій ГЛЗ)/ДІТА виробничий кооператив інвалідів (вторинне пакування), Чеська Республіка/Чеська Республіка	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг, 40мг	№30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ТОРЗАКС®	Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг, 40мг, 80мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ТУЛІП®	Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг, 40мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		

• **Розувастатин (Rosuvastatin)** ^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: С10АА07 - гіполіпемічні засоби. Інгібітори ГМГ-КоА редуктази.

Основна фармакотерапевтична дія: це селективний та конкурентний інгібітор ГМГ-КоА-редуктази, ферменту, що визначає швидкість р-ції та перетворює 3-гідрокси-3-метилглутарил кофермент А на мевалонат, попередник холестерину; основним місцем дії розувастатину є печінка, орган-мішень для зменшення рівнів холестерину; збільшує кількість рецепторів ЛПНЩ на поверхні клітин печінки, посилюючи захоплення та катаболізм ЛПНЩ, та

пригнічує печінковий синтез ЛПДНЩ, таким чином, зменшуючи загальну кількість частинок ЛПДНЩ та ЛПНЩ; знижує підвищений рівень холестерину ЛПНЩ, загального холестерину та тригліцеридів і підвищує рівні холестерину ЛПВЩ; зменшує рівні апоВ, ХС-нелПВЩ, ХС-ЛПДНЩ, ТГ-ЛПДНЩ та підвищує рівень апоА-I; зменшує співвідношення ХС-ЛПНЩ/ХС-ЛПВЩ, загального ХС/ХС-ЛПВЩ, ХС-нелПВЩ/ХС-ЛПВЩ та апоВ/апоА-I.

Показання для застосування ЛЗ: лікування гіперхолестеринемії - дорослим, підліткам та дітям віком від 10 років із первинною гіперхолестеринемією (типу ІІа, в тому числі із гетерозиготною сімейною гіперхолестеринемією)^{БНФ}

або змішаною дисліпідемією (типу ІІb)^{БНФ} як доповнення до дієти, коли дотримання дієти та застосування інших немедикаментозних засобів (наприклад фізичних вправ, зниження маси тіла) є недостатнім; при гомозиготній сімейній гіперхолестеринемії^{БНФ} як доповнення до дієти та інших ліпідознижуючих засобів лікування (наприклад аферезу ЛПНЩ) або у випадках, коли таке лікування є недоречним; профілактика СС порушень - запобігання значним СС порушенням у пацієнтів, яким, за оцінками, загрожує високий ризик першого випадку СС порушення^{БНФ}, як доповнення до корекції інших факторів ризику.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Лікування гіперхолестеринемії: рекомендована початкова доза^{БНФ} для пацієнтів, які починають лікування препаратом або яких переводять з прийому інших інгібіторів ГМГ-КоА редуктази, повинна становити 5 або 10 мг/добу^{БНФ}; за необхідності, дозу можна збільшувати до наступної не раніше, ніж ч/з 4 тижні^{БНФ}; остаточно титрувати дозу до максимальної дози 40 мг варто лише пацієнтам із тяжкою гіперхолестеринемією та високим ризиком СС порушень (зокрема у хворих із сімейною гіперхолестеринемією), у яких не вдалося досягти мети лікування при застосуванні дози 20 мг і які перебуватимуть під регулярним наглядом; під час ініціації прийому лікарського засобу у дозі 40 мг рекомендований нагляд спеціалістів. Профілактика серцево-судинних подій: зниження ризику серцево-судинних подій лікарський засіб застосовувати у дозі 20 мг на добу; рекомендована початкова доза для пацієнтів віком > 70 років становить 5 мг. Рекомендована початкова доза для пацієнтів із факторами ризику розвитку міопатії становить 5 мг; доза 40 мг протипоказана деяким із таких пацієнтів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: Головний біль, запаморочення; ЦД; запор, нудота, абдомінальний біль; міалгія; астенія; свербіж, висип, кропив'янка; тромбоцитопенія; р-ції гіперчутливості, в т.ч. ангіоневротичний набряк; панкреатит. підвищення рівня печінкових трансаміназ; міопатія (в т.ч. міозит), рабдоміоліз, вовчакоподібний с-ром, розрив м'язів; поліневропатія, втрата пам'яті; жовтяниця, гепатит; артралгія; гематурія; гінекомастія; депресія; периферична невропатія, розлади сну (в т.ч. безсоння та нічні кошмари); кашель, задишка; діарея; с-ром Стівенса-Джонсона; порушення з боку сухожиль, інколи ускладнені розривами, імуноопосередкована некротизуюча міопатія; набряк.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до розувастатину або будь-якої із допоміжних речовин препарату; активне захворювання печінки, в тому числі стійкими підвищеннями сироваткових трансаміназ невідомої етіології та будь-якими підвищеннями трансаміназ у сироватці, що втричі перевищують верхню межу норми (ВМН); тяжке порушення функції нирок (кліренсом креатиніну <30 мл/хв); міопатія; пацієнтам, які одночасно отримують циклоспорин; в період вагітності та годування груддю, а також жінкам, репродуктивного віку, які не застосовують належні засоби контрацепції; доза 40 мг протипоказана пацієнтам зі схильністю до міопатії/рабдоміолізу; до факторів такого ризику належать: помірне порушення функції нирок (кліренс креатиніну <60 мл/хв); гіпотиреоз; наявність в особистому або родинному анамнезі спадкових м'язових захворювань; наявність в анамнезі мітоксичності на фоні застосування інших інгібіторів ГМГ-КоА- редуктази або фібратів; зловживання алкоголем; ситуації, що можуть призвести до підвищення концентрації препарату в плазмі крові; належність до монголоїдної раси; супутнє застосування фібратів.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 10 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕВОЙД	ПАТ "Фармак" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника ТОВ Біофарм, Польща), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 20мг, 40мг	№30, №60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕВОЙД	ПАТ "Фармак" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника ТОВ Біофарм, Польща), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№60	2,83	
	ЕВОЙД	ПАТ "Фармак" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника ТОВ Біофарм, Польща), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№30	3,33	
	ЕВОЙД	ПАТ "Фармак" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника ТОВ Біофарм, Польща), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№30	2,42	
	КЛІВАС 10	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КЛІВАС 20	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	

	ОЗАЛЕКС®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 40мг	№14х6, №14х2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОЗАЛЕКС®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№14х2	2,97	
	ОЗАЛЕКС®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№14х2	2,02	
	ПРЕВЕНТОР	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., вкриті п/о у конт. чар/уп.	10мг	№10х9	2,39	
	ПРЕВЕНТОР	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., вкриті п/о у конт. чар/уп.	10мг	№10х3	2,62	
	ПРЕВЕНТОР	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., вкриті п/о у конт. чар/уп.	20мг	№10х9	1,80	
	ПРЕВЕНТОР	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., вкриті п/о у конт. чар/уп.	20мг	№10х3	2,08	
	РОЗУВАСТАТИН ІС	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№10х3	4,67	
	РОЗУВАСТАТИН ІС	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10х3	3,00	
	РОЗУВАСТАТИН ІС	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10х3	2,45	
	РОЗУВАСТАТИН ІС	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	40мг	№10х3	1,82	
II.	ГЛЕНРАЗ	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг, 20мг, 40мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КРЕСТОР	АйПіЕр Фармасьютикалс Інк. (виробник лікарського засобу « in bulk»)/АстраЗенека ЮК Лімітед (виробник, відповідальний за пакування, контроль та випуск серії), Пуерто-Ріко, США/Велика Британія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№14х2	13,50	27,05/\$
	КРЕСТОР	АйПіЕр Фармасьютикалс Інк. (виробник лікарського засобу « in bulk»)/АстраЗенека ЮК Лімітед (виробник, відповідальний за пакування, контроль та випуск серії), Пуерто-Ріко, США/Велика Британія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№14х2	10,13	27,05/\$
	КРЕСТОР	АйПіЕр Фармасьютикалс Інк. (виробник лікарського засобу « in bulk»)/АстраЗенека ЮК Лімітед (виробник, відповідальний за пакування, контроль та випуск серії), Пуерто-Ріко, США/Велика Британія	табл., вкриті п/о у бл.	40мг	№7х4	6,15	27,05/\$
	КРЕСТОР	АйПіЕр Фармасьютикалс Інк. (виробник лікарського засобу « in bulk»)/АстраЗенека ЮК Лімітед (виробник, відповідальний за пакування, контроль та випуск серії), Пуерто-Ріко, США/Велика Британія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№14х2	13,54	27,05/\$
	МЕРТЕНІЛ	ВАТ "Гедеон Ріхтер" (виробництво, контроль якості та	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг, 20мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	випуск серії), Угорщина					
РЕДИСТАТИН	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Виробнича ділянка - II, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг, 40мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РЕДИСТАТИН	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Виробнича ділянка - II, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	2,18	27,79/\$
РОВАМЕД	Медокемі ЛТД (Центральний Завод) (виробництво нерозфасованого продукту, дозвіл на випуск серії)/Медокемі ЛТД (Завод AZ) (виробництво нерозфасованого продукту, контроль якості, первинне та вторинне пакування, дозвіл на випуск серії), Кіпр/Кіпр	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг, 20мг, 40мг	№10x3, №10x6, №10x9	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РОВАМЕД	Медокемі ЛТД (Центральний Завод) (виробництво нерозфасованого продукту, дозвіл на випуск серії)/Медокемі ЛТД (Завод AZ) (виробництво нерозфасованого продукту, контроль якості, первинне та вторинне пакування, дозвіл на випуск серії), Кіпр/Кіпр	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	3,03	30,26/€
РОВАМЕД	Медокемі ЛТД (Центральний Завод) (виробництво нерозфасованого продукту, дозвіл на випуск серії)/Медокемі ЛТД (Завод AZ) (виробництво нерозфасованого продукту, контроль якості, первинне та вторинне пакування, дозвіл на випуск серії), Кіпр/Кіпр	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	2,52	30,26/€
РОЗАВ 10	МСН Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	3,73	27,93/\$
РОЗАВ 20	МСН Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	2,57	27,93/\$
РОЗАРТ	Актавіс ЛТД, Мальта	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг, 20мг, 40мг	№10x3, №10x9	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РОЗВАТОР	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	табл., в/о у бл.	10мг, 20мг	№7x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РОЗУВАСІН	Апотекс Інк., Канада	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг, 20мг, 40мг	№10x3, №10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РОЗУВАСТАТИН	Біофарм Лтд (виробництво готової лікарської форми, первинне та вторинне пакування, контроль серії, випуск серії)/Фітофарм Кленка С.А. (мікробіологічний контроль), Польща/Польща	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РОЗУВАСТАТИН КРКА	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	15мг, 30мг	№30, №60, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РОЗУВАСТАТИН КСАНТІС	Лабораторіос ЛІКОНСА, С.А. (виробник, відповідальний за виробництво готової лікарської форми, контроль серії, первинне та вторинне пакування, випуск серії)/ЛАБОРАТОРІО ДР. Ф. ЕЧЕВАРНЕ, АНАЛІСІС, С.А. (виробник, відповідальний за мікробіологічний контроль, Іспанія/Іспанія/Іспанія/Іспанія)	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг, 20мг, 40мг	№10x3, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РОЗУВАСТАТИН САНДОЗ®	Лек Фармацевтична компанія д.д. (виробництво in bulk, тестування, пакування, випуск серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг, 20мг	№28, №30, №60, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	

РОЗУВАСТАТИН ФТ	ТОВ "Фармтехнологія", Республіка Білорусь	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг, 20мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РОЗУВАСТАТИН-ТЕВА	Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд., Ізраїль	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг, 20мг, 40мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РОЗУКАРД® 10	ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка	табл. в/о у бл.	10мг	№30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РОЗУКАРД® 20	ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка	табл. в/о у бл.	20мг	№30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РОЗУКАРД® 40	ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка	табл. в/о у бл.	40мг	№30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РОЗУЛІП®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг, 20мг, 40мг	№14, №28, №56	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РОЗУЛІП®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№7x4	5,68	26,00/\$
РОЗУЛІП®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№7x4	4,46	26,00/\$
РОЗУСТАТ	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл. та фл.	5мг, 10мг, 20мг, 40мг	№30, №60, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РОЗУФАСТ	Бафна Фармасьютікалс Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	3,52	28,12/\$
РОЗУФАСТ	Бафна Фармасьютікалс Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	2,54	28,12/\$
РОКСЕРА®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг, 15мг, 20мг, 30мг, 40мг	№10, №14, №20, №28, №56, №60, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РОКСЕРА®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№10x9	4,43	35,21/€
РОКСЕРА®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№10x3	6,06	35,21/€
РОКСЕРА®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x9	3,20	35,21/€
РОКСЕРА®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	3,78	35,21/€
РОКСЕРА®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x9	2,41	35,21/€
РОКСЕРА®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10xε3	2,93	35,21/€
РОКСЕРА®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	40мг	№10x3	2,01	35,21/€
РОКСЕРА®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	15мг	№10x9	1,84	35,21/€
РОКСЕРА®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	15мг	№10x3	2,15	35,21/€
РОКСЕРА®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	30мг	№10x9	1,35	35,21/€
РОКСЕРА®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	30мг	№10x3	1,64	35,21/€
РОМАЗИК	Фармацевтичний Завод "Польфарма" С. А., Польща	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 40мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РОМАЗИК	Фармацевтичний Завод "Польфарма" С. А., Польща	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	3,29	25,02/\$
РОМАЗИК	Фармацевтичний Завод "Польфарма" С. А., Польща	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	2,67	25,02/\$
РОМЕСТІН® 10	Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	2,81	28,11/\$
РОМЕСТІН® 20	Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	2,01	28,11/\$
РОМЕСТІН® 5	Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

РОСУМАК	АЛКАЛОЇД АД Скоп'є, Республіка Північна Македонія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг, 20мг, 40мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РОФАСТ	Ауробіндо Фарма Лімітед – Юніт VII, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10х3	4,00	25,52/\$
РОФАСТ	Ауробіндо Фарма Лімітед – Юніт VII, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10х3	2,34	25,52/\$
ХОЛПРЕСТ	Майлан Лабораторіз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг, 20мг, 40мг	№14, №28, №56, №84, №98	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Симвастатин (Simvastatin)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: С10АА01 - гіполіпідемічні засоби. Інгібітор ГМГ-КоА редуктази.

Основна фармакотерапевтична дія: є неактивним лактоном, гідролізується в печінці з утворенням відповідного β-гідроксикислотного похідного, що має високу інгібуючу активність щодо ГМГ-КоА-редуктази (3-гідрокси-3-метилглутарил-КоА-редуктази) - ферменту, що каталізує перетворення ГМГ-КоА в мевалонат, початкову та найбільш значущу стадію біосинтезу холестерину; знижує нормальні та підвищені рівні холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ); ЛПНЩ утворюється з ліпопротеїну дуже низької щільності (ЛПДНЩ) та катаболізується головним чином рецепторами з високою спорідненістю до ЛПНЩ; механізм ЛПНЩ-знижувального ефекту може складатись як зі зниження концентрації ХС ЛПДНЩ, так і зі стимуляції рецепторів ЛПНЩ, призводячи до зменшеного продукування та збільшеного катаболізму холестерину ЛПНЩ; рівні аполіпопротеїну В також значно падають під час лікування симвастатином; крім того, помітно збільшує ХС ЛПВЩ та знижує рівень тригліцеридів у плазмі; в результаті цих змін знижується співвідношення загального ХС до ХС ЛПВЩ та ХС ЛПНЩ до ХС ЛПВЩ.

Показання для застосування ЛЗ: гіперхолестеринемія: лікування первинної гіперхолестеринемії^{БНФ, ВООЗ} або змішаної дисліпідемії^{БНФ, ВООЗ}, як доповнення до дієти, коли відповідь на дієту та інші немедикаментозні засоби лікування (фізичні вправи, зниження маси тіла) є недостатньою; лікування гомозиготної сімейної гіперхолестеринемії^{БНФ, ВООЗ}, як доповнення до дієти та іншого ліпідознижувального лікування (аферезу ліпідів низької щільності) або якщо такі методи лікування не є прийнятними; СС профілактика: зниження СС смертності та захворюваності у пацієнтів з явною атеросклеротичною СС хворобою або ЦД^{БНФ, ВООЗ, ПМД}, з нормальними або підвищеними рівнями холестерину, як додаткова терапія для корекції інших факторів ризику та до іншої кардіопротективної терапії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: 5-80 мг р/ос 1 р/добу ввечері, підбір дози здійснювати з інтервалами не менше ніж 4 тижні до МДД 80 мг, що приймається 1 р/добу ввечері, доза 80 мг рекомендується тільки для пацієнтів з тяжкою гіперхолестеринемією та високим ризиком СС ускладнень, які не досягли цілей лікування нижчими дозами, та коли очікується, що користь переважатиме потенційні ризики; гіперхолестеринемія - призначити стандартну холестеринознижувальну дієту, якої він повинен дотримуватися протягом усього курсу лікування, початкова доза 10-20 мг/добу^{БНФ} одноразово ввечері, для пацієнтів, яким необхідне значне (більше як на 45 %) зниження рівня ХС-ЛПНЩ, початкова доза може становити 20-40 мг 1 р/добу ввечері; гомозиготна сімейна гіперхолестеринемія - початкова доза 40 мг/добу^{БНФ} одноразово ввечері, застосовувати як доповнення до іншого ліпідознижувального лікування (аферез у ЛПНЩ) або якщо таке лікування не є прийнятним; СС профілактика - звичайна доза для пацієнтів з високим ризиком розвитку ІХС (у поєднанні з гіперліпідемією або без неї) 20-40 мг/добу^{БНФ, ВООЗ} одноразово ввечері; медикаментозну терапію можна почати одночасно із дієтою та фізкультурою; супутня терапія - ефективна як монотерапія, а також у комбінації із секвестрантами жовчних кислот, дозу приймати або за > 2 год до, або через > 4 год після прийому секвестранту жовчних кислот, для пацієнтів, які приймають одночасно з фібратами, крім гемфіброзилу, або з фенофібратом, доза не повинна перевищувати 10 мг/день, для пацієнтів, які одночасно приймають аміодарон, амлодипін, верапаміл, дилтіазем, ЛЗ, що містять елбасвір або гразопревір, добова доза не повинна перевищувати 20 мг^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анемія, безсоння, депресія, головний біль, парестезія, запаморочення, периферична невропатія, порушення пам'яті, інтерстиціальна хвороба легенів, закрел, абдомінальний біль, метеоризм, диспепсія, діарея, нудота, блювання, панкреатит, гепатит/жовтяниця, летальна та нелетальна печінкова недостатність, висип, ліхеноїдний висип, свербіж, алопеція, міопатія (включаючи міозит), рабдоміоліз з або без г. ниркової недостатності, міалгія, м'язові спазми, тендінопатія, ускладнена розривом, гінекомастія, затуманений зір, порушення зору; еректильна дисфункція, астенія, с-м гіперчутливості (ангіоневротичний набряк, вовчакоподібний с-ром, ревматична поліміалгія, судоми, поліміозити, дерматоміозит, васкуліт, тромбоцитопенія, еозинофілія, підвищена ШОЕ, артрит та артралгія, кропив'янка, анафілаксія, світлочутливість, гарячка, припливи, диспное та слабкість), підвищення рівнів сироваткових трансаміназ (АЛТ, АСТ і гамаглутамілтрансептидази); підвищення рівня ЛФ; підвищення рівнів сироваткової КФК, підвищення НbA1c та рівнів глюкози сироватки в стані натще, порушення когнітивної ф-ції (втрата пам'яті, забудькуватість, порушення пам'яті, сплутаність свідомості), імуноопосередкована некротизуюча міопатія (ІОНМ), аутоімунна міопатія, розлади сну, включаючи нічні кошмари; статева дисфункція; ЦД.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до симвастатину або будь-якої складової препарату; захворювання печінки в активній фазі або незрозумілі та стійкі підвищення рівнів трансаміназ сироватки; вагітність і період годування груддю; супутній прийом потужних інгібіторів СYP3A4 (ЛЗ, що збільшує АUC приблизно в 5 разів або більше, таких як ітраконазол, кетоконазол, посаконазол, вориконазол, інгібітори ВІЛ-протеази (нелфінавір), боцепревір, телапревір, еритроміцин, кларитроміцин, телітроміцин, нефазодон і лікарських засобів, які містять кобіцистат; супутній прийом гемфіброзилу, циклоспорину або даназолу; з гомозиготною сімейною гіперхолестеринемією, які отримують ломітапід і симвастатин в дозах більше 40 мг.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 30 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	7,93	
	ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	5,99	
	ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	40мг	№10x3	3,90	
II.	АЛЛЕСТА®	Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг, 40мг	№28, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАЗИЛІП®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій, контроль серій)/Марифарм д.о.о. (первинне та вторинне пакування)/ Лабена д.о.о (контроль серій), Словенія/Словенія/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг, 40мг	№7x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАЗИЛІП®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій, контроль серій)/Марифарм д.о.о. (первинне та вторинне пакування)/ Лабена д.о.о (контроль серій), Словенія/Словенія/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№7x4	18,41	35,35/€
	ВАЗИЛІП®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій, контроль серій)/Марифарм д.о.о. (первинне та вторинне пакування)/ Лабена д.о.о (контроль серій), Словенія/Словенія/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№7x12	2,12	30,95/€
	ВАЗИЛІП®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій, контроль серій)/Марифарм д.о.о. (первинне та вторинне пакування)/ Лабена д.о.о (контроль серій), Словенія/Словенія/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№7x4	2,12	30,95/€
	ВАЗИЛІП®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій, контроль серій)/Марифарм д.о.о. (первинне та вторинне пакування)/ Лабена д.о.о (контроль серій), Словенія/Словенія/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	40мг	№7x12	2,12	30,95/€

	та випуск серій; контроль серій)/Лабена д.о.о (контроль серій), Словенія/Словенія						
ВАЗИЛІП®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій; контроль серій)/Лабена д.о.о (контроль серій), Словенія/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	40мг	№7x4	2,12	30,95/€	
ЗОКОР®	Мерк Шарп і Доум Б.В. (пакування, випуск серії)/Мерк Шарп і Доум Лімітед (виробник нерозфасованої продукції, контроль якості), Нідерланди/Велика Британія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ЗОКОР® ФОРТЕ	Мерк Шарп і Доум Б.В. (пакування, випуск серії)/Мерк Шарп і Доум Лімітед (виробник нерозфасованої продукції, контроль якості), Нідерланди/Велика Британія	табл., вкриті п/о у бл.	40мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОВЦ		
КАРДАК	Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт III), Індія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	1,99	23,37/\$	
КАРДАК	Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт III), Індія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	1,73	26,95/\$	
КАРДАК	Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт III), Індія	табл., вкриті п/о у бл.	40мг	№10x3	2,08	26,95/\$	
СИМВАСТАТ	"Хемофарм" АД, Сербія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ		
СИМВАСТАТИН 10 АНАНТА	Марксанс Фарма Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОВЦ		
СИМВАСТАТИН 20 АНАНТА	Марксанс Фарма Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№14x2	2,43	28,14/\$	
СИМВАСТАТИН 40 АНАНТА	Марксанс Фарма Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	40мг	№14x2	1,66	28,14/\$	
СИМВАСТАТИН САНДОЗ®	Сандоз Груп Саглік Урунлері Ілакларі Сан. ве Тік. А.С. (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, тестування, дозвіл на випуск серій)/Салютас Фарма ГмбХ (первинне та вторинне пакування, тестування, дозвіл на випуск серій)/С.К. , Туреччина/ Німеччина/ Румунія/Польща/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг, 40мг	№10x3, №10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ		
СИМВАСТАТИН-ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	20мг, 40мг, 80мг	№10x3, №10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ		
СИМВАСТЕРОЛ	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польща	табл., вкриті п/о у бл.	20мг, 40мг	№28	відсутня у реєстрі ОВЦ		

Комбіновані препарати

• Аторвастатин + еземібі (Atorvastatin + ezetimibe) **

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	СТАТЕЗІ 10/10	Мепро Фармасьютикалс Приват Лімітед, Індія	табл., в/о у бл.	10мг/10мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	

2.16.2. Похідні фіброєвої кислоти (фібрати)

• Фенофібрат (Fenofibrate)

Фармакотерапевтична група: С10АВ05 - гіполіпідемічні засоби. Препарати, що знижують рівень холестерину і тригліцеридів у сироватці крові.

Основна фармакотерапевтична дія: є похідною речовиною фіброєвої кислоти, ліпідомодифікуючі ефекти якої у людини опосередковані активацією рецептора, що активується проліфератором пероксисом типу α (PPAR α); ч/з активацію PPAR α фенофібрат посилює ліполіз та виведення з плазми атерогенних часточок, багатих на

тригліцериди, шляхом активації ліпопротеїналіпази та зменшення утворення апопротеїну СIII; активація PPAR α також викликає підвищення синтезу апопротеїнів AI та AII; вищезазначені ефекти фенофібрату на ліпопротеїни призводять до зменшення фракції ліпопротеїнів дуже низької та низької щільності (ЛПДНЩ та ЛПНЩ), що містять апопротеїн В, та збільшення фракції ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), що містять апопротеїни AI та AII; крім того, шляхом модуляції синтезу та катаболізму фракцій ЛПДНЩ фенофібрат посилює кліренс ЛПНЩ та зменшує кількість дрібних щільних ЛПНЩ, рівень яких підвищений у осіб із атерогенним ліпопротеїновим фенотипом, що часто зустрічається у пацієнтів із ризиком розвитку ІХС.

Показання для застосування ЛЗ: як доповнення до дієти та інших немедикаментозних методів лікування (фізичних вправ, зниження маси тіла) при таких станах: тяжка гіпертригліцеридемія^{БНФ}, у тому числі з низьким рівнем холестерину ліпопротеїнів високої щільності; змішана гіперліпідемія^{БНФ} у випадках, коли застосування статинів протипоказане або є непереносимість статинів; змішана гіперліпідемія у пацієнтів з високим СС ризиком на додаток до терапії статинами, коли рівень тригліцеридів та холестерину ліпопротеїнів високої щільності адекватно не контролюється; діабетична ретинопатія: показаний для зменшення прогресування діабетичної ретинопатії у пацієнтів з ЦД 2 типу та існуючою діабетичною ретинопатією.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза 1 табл. (145 мг), 1 р/добу; пацієнтам, які приймають 1 капс., що містить 200 мг фенофібрату, або 1 табл., що містить 160 мг фенофібрату, можна замінити їх на 1 табл. 145 мг без додаткового підбору дози; якщо пацієнту потрібно застосовувати фенофібрат при двох показаннях (гіперліпідемія та діабетична ретинопатія), приймати лише 1 табл. 145 мг/добу; дієтотерапію, розпочату до призначення препарату, необхідно продовжити; під час лікування гіперліпідемії ефективність лікування потрібно контролювати шляхом визначення рівнів ліпідів у сироватці крові, якщо ч/з кілька місяців не досягається адекватна відповідь на лікування, розглядати додаткові або інші терапевтичні заходи.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: зниження рівня гемоглобіну; зниження кількості білих клітин крові; гіперчутливість; головний біль; тромбоемболії (легенева емболія, тромбоз глибоких вен); біль у животі, нудота, блювання, діарея, метеоризм; панкреатит; підвищення рівня трансаміназ; жовчнокам'яна хвороба; гепатит; шкірні р-ції гіперчутливості (висип, свербіж, кропив'янка); алопеція; р-ції фоточутливості; м'язові розлади (міалгія, міозит, м'язові спазми та слабкість); статева дисфункція; підвищений рівень гомоцистеїну в крові; підвищений рівень креатиніну в крові; підвищений рівень сечовини в крові; інтерстиціальна хвороба легень; рабдоміоліз; жовтяниця, ускладнення жовчнокам'яної хвороби (холецистит, холангіт, жовчна колика); тяжкі шкірні р-ції (мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз); стомлюваність.

Протипоказання до застосування ЛЗ: печінкова недостатність (включаючи біліарний цироз печінки та нез'ясовані персистуючі порушення ф-ції печінки), встановлені захворювання жовчного міхура, тяжкі хр. захворювання нирок, хр. або г. панкреатит, крім випадків г. панкреатиту, спричиненого тяжкою гіпертригліцеридемією, встановлена фотоалергія або фототоксичні р-ції у період лікування фібратами або кетопрофеном, гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої допоміжної речовини, не застосовувати пацієнтам з алергією на арахіс, арахісову олію або соєвий лецитин, або подібні продукти ч/з ризик виникнення р-цій гіперчутливості.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ТРАЙКОР® 145 мг	Рецифарм Фонтен (пакування, випуск та контроль серій)/Ірландські Лабораторії Фурньє Лімітед (виробництво in bulk), Франція/Ірландія	табл., вкриті п/о у бл.	145мг	№10x2, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

2.16.3. Інші засоби

З гіполіпідемічною метою можливе застосування комбінованих ЛЗ, до складу яких входять ненасичені жирні кислоти (наприклад, ефіри омега-3 поліненасичених жирних кислот).

2.17. Засоби, що підвищують стійкість міокарда до гіпоксії

2.17.1. Енергозабезпечувальні засоби

- **Триметазидин (Trimetazidine)** (див. п. 2.13.3.2. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

2.18. Засоби, що регулюють кровообіг головного мозку

2.18.1. Антитромботичні засоби

2.18.1.1. Антиагреганти

- **Дипіридабол (Dipyridamole)** (див. п. 13.8.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)** * ** [ПМД] [окрім табл., вкриті п/о 75 мг, 150 мг № 50, № 100; табл. 100 мг № 50, № 100; пор. д/р-ну д/л/н'єк. 1,0 г; табл. 325 мг № 120] (див. п. 2.15.3.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

- **Клопідогрель (Clopidogrel)** * [ПМД] (див. п. 13.8.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Тиклопідин (Ticlopidine)** (див. п. 13.8.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

2.18.1.2. Антикоагулянти (прямої дії) нефракціоновані, стандартні та низькомолекулярні фракціоновані гепарини

- **Гепарин (Heparin)** * [ПМД] (див. п. 13.8.1.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Еноксапарин (Enoxaparin)** (див. п. 13.8.1.3. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

- **Далтепарин (Dalteparin)** (див. п. 13.8.1.3. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Альтеплазе (Alteplase)** (див. п. 13.8.3. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Тенектеплаза (Tenecteplase)** (див. п. 13.8.3. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Стрептокіназа (Streptokinase)** * (див. п. 13.8.3. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

2.18.1.4. Інгібітори фібринолізу

- **Кислота амінокапронова (Aminocaproic acid)** (див. п. 13.7.4.1. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

2.18.2. Міотропні вазодилататори

2.18.2.1. Міотропні вазодилататори прямої дії

- **Папаверин (Papaverine)** (див. п. 2.7.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Бендазол (Bendazol)** ** [ПМД] [тільки табл.] (див. п. 2.7.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

2.19. Лікарські засоби, які нормалізують метаболічні процеси у стінці судин

2.19.1. Антиоксидантні засоби

2.19.1.1. Статини

(див. п. 2.16.1. розділу «КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»)

2.19.2. Ангіопротектори

- **Етамзилат (Etamsylate)** (див. п. 13.7.3. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

2.19.3. Антигіпоксанти засоби

2.19.3.1. Ноотропні засоби, похідні ГАМК

- **Натрію оксубутират (Sodium oxybate)** (див. п. 10.1.2.2. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

2.20. Антиадренергічні лікарські засоби

2.20.1. Гангліоблокуючі засоби

- **Гексаметоній (Hexamethonium)** [ПМД] (див. п. 2.6.3. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

2.20.2. Прості препарати беладоїни

- **Атропін (Atropine)** * (див. п. 3.3.3. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

2.21. Анальгетики

2.21.1. Опіоїди

2.21.1.1. Природні алкалоїди опію

- **Морфін (Morphine)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: N02AA01 - анальгетики. Опіоїди. Природні алкалоїди опію.

Основна фармакотерапевтична дія: природний алкалоїд, має виражений анальгетичний та седативний ефект (сподійний та анксиолітичний), чинить потужну центральну дію; виражена анальгетична дія пов'язана з агоністичною дією на різні підвиди опіоїдних рецепторів ЦНС в корі головного мозку, таламусі, сітчастій структурі, лімбіко-гіпоталамусній системі, періакведуктальній сірій речовині та желатинозній субстанції; викликає супраспінальну анальгезію, ейфорію та лікарську залежність; міоз, пригнічення дихання і уповільнює рух кишечника; спінальну анальгезію, міоз та седативний ефект; діючи на ЦНС, значно зменшує гострі та хронічні болі, знижує психомоторне збудження, викликає загальну релаксацію й ейфорію; зменшує об'єм і частоту видиху, знижує чутливість дихального центру до вуглекислого газу; міоз з'являється в результаті збудливої дії морфіну, викликаної активацією μ - і κ -рецепторів окулomotorних нервів; значно звужені зіниці є типовим проявом передозування морфіну; активує рецептори гладкої мускулатури шлунка і кишечника, підвищує їх тонус і зменшує перистальтику, т.ч. подовжується евакуація зі шлунка, знижує секрецію шлунка, жовчі та підшлункової залози, уповільнений пасаж води викликає реабсорбцію води і збільшує в'язкість калу; ч/з судинорозширювальну дію зменшує венозний відтік, тому його застосування доцільно при лікуванні СН та набряку легень; при збільшенні спазму жовчного міхура і тонусу сфінктера Одді збільшується тиск жовчі; спазми уретрального сфінктера можуть викликати затримку сечі; тривале застосування викликає звикання, яке в основному стосується гнітучої дії морфіну, а не його міотичної або викликаючої запор дії. Пригнічує кашльовий рефлекс прямою дією на кашльовий центр довгастого мозку; призводить до вивільнення гістаміну з подальшою периферичною вазодилатацією або без неї, що спричиняє свербіж, приплив крові до обличчя, почервоніння очей, пітливість і/або ортостатичну гіпотензію; впливає на гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковозалозну та гіпоталамо-гіпофізарно-статеву системи, можливе підвищення в сироватці крові пролактину, зниження в плазмі крові рівня кортизолу, естрогену та тестостерону в поєднанні з низькими або нормальними рівнями АКТГ, ЛГ або ФСГ.

Показання для застосування ЛЗ: більшій с-м сильної інтенсивності^{ПМД} або біль, який не купірується анальгетиками з меншою силою дії у т.ч. при злоякісних новоутвореннях^{ВООЗ, БНФ}, ІМ^{ВООЗ, БНФ, ПМД}, тяжких травмах, підготовці до операції та у післяопераційному періоді^{БНФ}; як протикашльовий засіб при пораненні грудної клітки і в разі кровотечі в легенях, коли напади кашлю стають небезпечними для життя, також при кашлі, який важко

купірується, при раку легенів в заключній стадії; в разі диспное, пов'язаного з пошкодженням лівого шлуночка серця та набряком легенів; премедикація перед анестезією.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують в/в, в/м або п/ш; при набряку вводять тільки в/м; дорослі: при г. болю п/ш або в/м зазвичай вводять 10 мг морфіну гідрохлориду^{БНФ}; при необхідності ін'єкцію можна повторити кожні 4–6 год; для купірування післяопераційного болю п/ш або в/м вводять 10 мг морфіну гідрохлориду кожні 2–4 год (за потребою); при хр. болях п/ш або в/м вводять 5–20 мг^{БНФ} кожні 4 год; при ІМ^{БНФ} повільно (2 мг/хв) в/в вводять 10 мг морфіну гідрохлориду, при необхідності далі застосовують 5–10 мг^{БНФ}; для премедикації п/ш або в/м вводять до 10 мг морфіну гідрохлориду за 60–90 хв. до операції^{БНФ}; максимальна разова доза морфіну гідрохлориду для дорослих становить 20 мг, МДД – 50 мг; пацієнтам літнього віку та ослабленим пацієнтам при ІМ вводять ½ дози; діти: початкові дози дітям при г. болях: у віці до 1 місяця доза становить 0,15 мг/кг маси тіла; у віці від 1 до 12 місяців – до 0,2 мг/кг маси тіла; у віці від 1 до 12 років – до 0,2 мг/кг маси тіла; надалі дози коригуються залежно від відповідної реакції пацієнта; для купірування післяопераційного болю у дітей: у віці до 1 місяця доза становить 0,15 мг/кг маси тіла; у віці від 1 до 12 місяців – до 0,2 мг/кг маси тіла; у віці від 1 до 12 років – до 0,2 мг/кг маси тіла; дози коригуються залежно від відповідної реакції пацієнта; для премедикації – в/м 0,15 мг/кг маси тіла; *табл.:* режим дозування встановлюють індивідуально; початкова доза препарату залежить від ступеня болю та особливостей попереднього прийому пацієнтом анагетиків; застосовувати у встановленій лікарем дозі кожні 4 год; у разі посилення болю або розвитку толерантності до морфіну необхідно збільшити дозу, використовуючи дозування 5 мг та 10 мг, пацієнтам, які переходять від парентерального застосування морфіну до р/ос, необхідно підвищити дозу, щоб компенсувати зменшення анагетичного ефекту, пов'язаного із р/ос способом застосування морфіну, зазвичай необхідність такого збільшення дози становить 100 %; для таких пацієнтів потрібна індивідуальна корекція дози; для дорослих та дітей віком від 12 років, які не застосовували опіоїди, початкові дози морфіну становлять 5-10 мг кожні 4 год^{БНФ}; для пацієнтів з болем, який не контролюється більш слабкими опіоїдами, початкова доза морфіну звичайно становить 10 мг кожні 4 год; дітям віком 3-5 років призначають по 5 мг кожні 4 год, віком 6-12 років - по 5-10 мг кожні 4 год; добова доза морфіну може бути збільшена до 200 мг за умови контролю побічних р-цій та можливості надання невідкладної спеціалізованої допомоги; у разі неможливості контролювання болю встановленою титруванням дозою та необхідності застосування добової дози, яка перевищує 200 мг (зазвичай при хр. болю онкологічної етіології), необхідний постійний ретельний контроль стану пацієнта; у разі післяопераційного болю пацієнтам з масою тіла до 70 кг призначають по 5 мг кожні 4 год, пацієнтам з масою тіла від 70 кг - по 10 мг кожні 4 год, р/ос форми морфіну застосовують з обережністю протягом перших 24 год після операції з огляду на динаміку відновлення функцій кишечнику; *р-н р/ос:* дорослі: рекомендована доза для дорослих становить 10-20 мг (5-10 мл) кожні 4 год; МДД - 120 мг над добу; діти: 13-18 років: рекомендована доза 5-20 мг (2,5-10 мл) кожні 4 год; МДД - 120 мг на добу; 6-12 років - рекомендована доза 5-10 мг (2,5-5 мл) кожні 4 год; МДД - 60 мг на добу; 1-5 років - рекомендована доза 5 мг (2,5 мл) кожні 4 год; МДД - 30 мг на добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: брадикардія чи тахікардія, порушення серцевого ритму, ортостатична гіпотензія, пальпітація, почервоніння обличчя, АГ, пригнічення дихання та кашльового рефлексу, бронхоспазм, набряк легенів, седативна або збуджувальна дія (особливо у пацієнтів літнього віку), делірій, галюцинації, підвищення внутрішньочерепного тиску з імовірністю подальшого порушення мозкового кровообігу, міоклонус, гіпотермія, пітливість, головний біль, запаморочення, мимовільні скорочення м'язів, судоми, парестезія, непритомність, гіпералгезія; порушення зору (розпливчатість), міоз; вертиго, розвиток ейфорії і м'язова ригідність, нудота, блювання, запори, сухість у роті, абдомінальний біль, анорексія, диспепсія, кишкова непрохідність, розлад сприйняття смаку, біліарний біль, загострення панкреатиту; астеничні стани, слабкість, спазм жовчних шляхів з подальшим зростанням рівня жовчних ферментів, порушення відтоку сечі або погіршення цього стану при аденомі передміхурової залози і стенозі уретри, аменорея, зниження лібідо, еректильна дисфункція, АР (висипання, свербіж, кропив'янка, анафілактичний шок та ангіоневротичний набряк), сплутаність свідомості, безсоння, сонливість, ажитація, ейфорія, зміни настрою, наркотична залежність, дисфорія, розлади мислення, периферичний набряк, розвиток толерантності до препарату, абстинентний с-м; анафілактоїдні р-ції; залежність; алодинія, гіпералгезія, гіпергідроз.

Протипоказання до застосування ЛЗ: індивідуальна гіперчутливість до морфіну і/або інших компонентів препарату, порушення дихання внаслідок пригнічення дихального центру (у т.ч. на тлі г. алкогольної або наркотичної інтоксикації), бронхоспазм, БА; гострі/тяжкі захворювання печінки, тяжка печінкова недостатність, ЧМТ, внутрішньочерепна гіпертензія, інсульт, порушення моторики травного тракту (паралітична кишкова непрохідність, уповільнене спорожнення шлунка, у т.ч. після оперативних втручань), біль у животі неясної етіології, г. алкогольна інтоксикація, делірій, одночасне лікування інгібіторами MAO та 14-добовий період після їхньої відміни, гарячка, епілептичний статус, кахексія, г. пригнічення дихання, г. діарея, викликана отруєнням, пухлина мозку, загальне сильне виснаження, коронарна хвороба серця, мікседема, недостатність надниркових залоз (хвороба Аддісона), феохромоцитома, тяжкі захворювання нирок, жовчна коліка, порфірія, не можна призначати безпосередньо після операції на жовчовивідних шляхах, та в разі викликаной токсинами діареї, кома.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МОРФІН-3Н	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	табл. у бл.	5мг, 10мг	№10, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	1%	№5, №10, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	МОРФІНУ СУЛЬФАТ	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. у бл.	0,005г; 0,01г	№10, №50, №140	відсутня у реєстрі ОБЦ
II.	МОРФІН КАЛЦЕКС	ХБМ Фарма с.р.о. (всі стадії виробничого процесу, крім випуску серії)/АТ "Гріндекс" (виробник, який відповідає за контроль серії/випробування)/АТ "Калцекс" (виробник, який відповідає за випуск серії), Словаччина/ Латвія/Латвія	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у конт. чар/уп.	10 мг/мл	№5, №10, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ
	МОРФІН КАЛЦЕКС	АТ "Гріндекс" (виробник, який відповідає за контроль серії/випробування)/АТ "Калцекс" (виробник, який відповідає за випуск серії)/ХБМ Фарма с.р.о. (всі стадії виробничого процесу, крім випуску серії), Латвія/ Латвія/Словаччина	р-н д/ін'єк. по 1мл, 5мл, 10мл в амп. у конт. чар/уп.	20 мг/мл	№5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ
	ОРАМОРОФ	Л.Молтені і К. деї Фллі Алітті Сосіета ді Езерчиціо С.п.А., Італія	р-н орал. по 100мл у фл.	2 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ

2.21.1.2. Похідні фенілпіперидину

- **Фентаніл (Fentanyl)** (див. п. 10.3.2. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

3. ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

- 3.1. Лікарські засоби для корекції кислотоутворюючої функції шлунка**
 - 3.1.1. Антациди
 - 3.1.2. Антагоністи H₂-рецепторів
 - 3.1.3. Інгібітори «протонного насоса»
 - 3.1.4. Інші засоби для лікування кислотозалежних захворювань
- 3.2. Лікарські засоби, що застосовуються для ерадикації *Helicobacter pylori***
 - 3.2.1. Антибактеріальні засоби, що застосовуються для ерадикації *Helicobacter pylori*
- 3.3. Спазмолітичні засоби**
 - 3.3.1. Синтетичні антихолінергічні засоби
 - 3.3.2. Папаверин та його похідні
 - 3.3.3. Препарати красавки (беладони) та її похідних
- 3.4. Антифлатуленти**
- 3.5. Стимулятори перистальтики**
- 3.6. Протиблювотні засоби та лікарські засоби, що усувають нудоту. Антагоністи серотонінових рецепторів**
- 3.7. Гепатопротектори**
 - 3.7.1. Препарати жовчних кислот
 - 3.7.2. Препарати розторопші плямистої
 - 3.7.3. Препарати амінокислот
 - 3.7.4. Комбіновані лікарські засоби
- 3.8. Протівірусні лікарські засоби**
 - 3.8.1. Інтерферони
 - 3.8.2. Аналоги нуклеозидів
- 3.9. Лікарські засоби, що застосовуються для лікування хвороби Коновалова-Вільсона**
- 3.10. Жовчогінні засоби**
 - 3.10.1. Лікарські засоби, що мають холекінетичну дію
 - 3.10.2. Інші жовчогінні лікарські засоби
- 3.11. Проносні засоби**
 - 3.11.1. Контактні проносні засоби
 - 3.11.2. Осмотичні проносні засоби
- 3.12. Антидіарейні лікарські засоби**
 - 3.12.1. Протимікробні засоби, що застосовуються при кишкових інфекціях
 - 3.12.2. Ентеросорбенти
 - 3.12.2.1. Препарати активованого вугілля
 - 3.12.2.2. Інші ентеросорбенти
 - 3.12.3. Засоби, що пригнічують перистальтику
- 3.13. Засоби, що застосовуються при захворюваннях кишечника**
 - 3.13.1. Препарати 5-аміносаліцилової кислоти
 - 3.13.2. Кортикостероїди локальної дії
 - 3.13.3. Інгібітори фактору некрозу пухлини альфа

3.14. Пробиотики, пребіотики

3.14.1. Пробиотики

3.14.2. Пребіотики

3.15. Засоби, що застосовуються при ожирінні (виключаючи дієтичні продукти)

3.15.1. Лікарські засоби з периферичним механізмом дії, що застосовуються при ожирінні

3.16. Засоби замісної терапії, що застосовуються при розладах травлення, включаючи ферменти

3.16.1. Препарати ферментів

3.17. Засоби, що підвищують апетит

3.18. Інші засоби, що впливають на систему травлення і метаболічні процеси

3.18.1. Розчини амінокислот

3.1. Лікарські засоби для корекції кислотоутворюючої функції шлунка

3.1.1. Антациди

- **Алюмінію фосфат (Aluminium phosphate)****

Фармакотерапевтична група: A02AB03 - препарати для лікування кислотозалежних захворювань. Антациди.

Основна фармакотерапевтична дія: кислотонейтралізуюча, обволікаюча, адсорбуюча дії; знижує протеолітичну активність пепсину, зв'язує жовчні кислоти та лізолецитин; завдяки буферним властивостям нейтралізує тільки надлишок соляної кислоти, зберігає фізіологічні умови травлення та не призводить до вторинної гіперсекреції шлункового соку; антацидна дія проявляється швидко; міцели алюмінію фосфату мають більшу контактну поверхню, обволікають слизову оболонку однорідним шаром, захищають її від дії агресивних факторів та сприяють регенерації; цитопротекторна дія обумовлена також здатністю активувати синтез простагландинів, які стимулюють секрецію слизу та бікарбонатів у слизовій оболонці шлунка; не призводить до порушень електролітного балансу, не спричиняє розвитку алкалозу та утворення каменів сечовивідних шляхів.

Показання для застосування ЛЗ: препарат застосовують як монотерапія, так і в складі комплексної терапії при: виразковій хворобі шлунка та ДПК; г. гастриті, хр. гастриті з нормальною або підвищеною секреторною функцією шлунка; грижі стравохідного отвору діафрагми, ГЕРХ (у т.ч. при рефлюкс-езофагіті), дуоденогастральному рефлюксі; функціональній диспепсії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі приймають всередину 1 або 2 пакети 2-3 р/добу в чистому вигляді або попередньо розвівши у 1/2 склянки води; МДД - 6 пакетів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: запор, діарея, в осіб з підвищеною чутливістю до компонентів препарату можлива АР.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату, сильний біль в животі неуточненого ґенезу, звичний запор, хр. діарея, хвороба Альцгеймера.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ФОСФАЛЮГЕЛЬ	Фарматис, Франція	гель орал. по 20г у пак.	12,38г/пак. (20%)	№20	164,20	31,49/€

- **Гідротальцит (Hydrotalcite)****

Фармакотерапевтична група: A02AD04 - антациди. Комбінації та комплекси речовин алюмінію, кальцію та магнію.

Основна фармакотерапевтична дія: окрім нейтралізації кислоти шлункового соку, посилює захисні механізми та захищає слизову мембрану від агресивних факторів; покращує загоєння уражених слизових оболонок шлунку та ДПК; виражена нейтралізуюча дія базується на його специфічній просторовій сітчастій структурі; швидко нейтралізує надлишок кислоти шлункового соку та має довготривалий ефект; іони магнію та алюмінію вивільняються з кристалічної структури поступово, в залежності від кількості кислоти в шлунку, та коригують кислотність на рівні між рН 3 та 5 без надмірного злужування вмісту шлунку.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування захворювань, пов'язаних з надмірною кислотністю шлункового соку: відрижка та печія, запалення слизової оболонки шлунка (гастрит) внаслідок стресу, невідповідної дієти, надмірного споживання алкоголю або прийому НПЗЗ, виразкова хвороба шлунку та ДПК, рефлюкс-езофагіт.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл. жувальні не слід ковтати цілими, потрібно добре розжувати; рекомендована доза для дорослих 1-2 табл. 3-4 р/добу, ч/з 1 год після прийому їжі та перед сном, або безпосередньо при виникненні показань для застосування; рекомендована доза для дітей віком від 6 до 12 років

становить половину дози для дорослих (½ чи 1 табл.) 3-4 р/добу, зазвичай ч/з 1 год після прийому їжі та перед сном, або безпосередньо при виникненні показань для застосування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: м'які випорожнення, підвищена частота випорожнень, блювання, діарея, АР, знижені рівні фосфору в сироватці крові, гіпермагніємія, інтоксикація алюмінієм з остеомалациєю та енцефалопатією.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активної чи до будь-якої допоміжної речовини, тяжкі порушення функції нирок, гіпофосфатемія, міастенія гравіс.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	РУТАЦИД	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинну упаковку, вторинну упаковку, контроль та випуск серії), Словенія	табл. жув. у бл.	500мг	№10x2, №10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	

3.1.2. Антагоністи H₂-рецепторів

- **Ранітидин (Ranitidine)** * [ПМД] [крім табл. по 75 мг]

Фармакотерапевтична група: A02BA02 - засоби для лікування пептичної виразки та GERX. Антагоністи H₂-гістамінових рецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: противиразковий засіб, антагоніст H₂-гістамінових рецепторів; механізм дії зумовлений конкурентним інгібуванням H₂-гістамінових рецепторів мембран парієтальних клітин слизової оболонки шлунка; знижує базальну і стимульовану секрецію соляної кислоти, зменшуючи об'єм шлункового соку, спричиненого подразненням барорецепторів (розтягнення шлунка), харчовим навантаженням, дією гормонів і біогенних стимуляторів (гастрин, гістамін, пентагастрин, кофеїн); зменшує кількість соляної кислоти у шлунковому соку, не впливає на концентрацію гастрину у плазмі крові, а також продукування слизу, характеризується тривалою дією, не впливає на ферментативну систему цитохрому P450 печінки.

Показання для застосування ЛЗ: пептична виразка шлунка та ДПК^{ВООЗ, БНФ, ПМД}, не асоційована з H. pylori (у фазі загострення), включаючи виразку, асоційовану з прийомом НПЗЗ^{БНФ, ПМД}; функціональна диспепсія^{БНФ, ПМД}; хр. гастрит з підвищеною кислотоутворювальною функцією шлунка у стадії загострення; GERX (для полегшення с-мів) або рефлюкс-езофагіт^{ВООЗ, БНФ, ПМД}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим та дітям віком старше 12 років; внутрішньо, не розжовуючи, запиваючи невеликою кількістю води, незалежно від прийому їжі; пептична виразка шлунка та ДПК, не асоційована з H. pylori (у фазі загострення): по 150 мг 2 р/добу (зранку та ввечері) або 300 мг на ніч^{ВООЗ, БНФ} протягом 4 тижнів, при виразках, що не зарубцювалися, продовжити лікування протягом наступних 4 тижнів; пептична виразка шлунка і ДПК, асоційована з прийомом НПЗЗ: по 150 мг 2 р/добу вранці та ввечері або 300 мг на ніч^{БНФ} на період терапії НПЗЗ (8-12 тижнів); функціональна диспепсія: по 150 мг 2 р/добу або 300 мг 1 р/добу^{БНФ} протягом 2-3 тижнів; хр. гастрит з підвищеною кислотоутворювальною ф-цією шлунка у стадії загострення: по 150 мг 2 р/добу або 300 мг 1 р/добу протягом 2-4 тижнів; GERX^{БНФ}: для полегшення с-мів по 150 мг 2 р/добу^{БНФ} протягом 2 тижнів; при необхідності курс лікування продовжувати; при загостренні та для довготривалого лікування по 150 мг 2 р/добу або 300 мг 1 р/добу на ніч протягом 8 тижнів; при необхідності продовжити до 12 тижнів; при вираженій нирковій недостатності (кліренс креатиніну - менше 50 мл/хв): добова доза 150 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: лейкопенія, оборотна тромбоцитопенія, агранулоцитоз або панцитопенія, іноді з гіпоплазією або аплазією кісткового мозку, нейтропенія, імунна гемолітична та апластична анемія (зазвичай оборотні); реакції гіперчутливості, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, гарячка, анафілактичний шок, бронхоспазм, мультиформна ексудативна еритема, ексфолиативний дерматит, с-м Стівенса-Джонсона, с-м Лайелла, гіпертермія; підвищена втомлюваність, оборотна сплутаність свідомості, сонливість, збудження, безсоння, емоційна лабільність, занепокоєність, стан розгубленості, тривожності і неспокою, депресія, нервозність, галюцинації, шум у вухах, дратівливість, дезорієнтація (ці прояви спостерігаються переважно у тяжкохворих або пацієнтів літнього віку); головний біль (іноді сильний), запаморочення і оборотні мимовільні рухові розлади; нечіткість зорового сприйняття, порушення акомодатії; артеріальна гіпотензія, брадикардія, тахікардія, асистолія, атріовентрикулярна блокада, васкуліт, біль у грудях, аритмія, екстрасистолія, зниження АТ; сухість у роті, нудота, блювання, метеоризм, запор, діарея, біль у животі, гострий панкреатит, зниження апетиту; скороминущі та оборотні зміни показників функції печінки, гепатоцелюлярний, холестатичний чи змішаний гепатит, жовтяниця; гіперемія, свербіж, шкірні висипання, мультиформна еритема, алопеція, сухість шкіри; артралгія, міалгія; г. інтерстиціальний нефрит, порушення функції нирок, підвищення рівня креатиніну у плазмі крові; гіперпролактинемія, галакторея, гінекомастія, аменорея, зниження потенції (оборотне) і/або лібідо.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до ранітидину та до ін. компонентів препарату; наявність злоякісних захворювань шлунка, цироз печінки з портосистемною енцефалопатією в анамнезі, печінкова недостатність, виражена ниркова недостатність (кліренс креатиніну < 50 мл/хв).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.

I.	РАНІТИДИН	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о, у бл.	150мг	№20x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РАНІТИДИН	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о, у бл.	150мг	№10x2	2,23	
	РАНІТИДИН	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о, у бл.	150мг	№10x1	2,49	
	РАНІТИДИН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о, у бл.	150мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РАНІТИДИН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о, у бл.	150мг	№10x3	1,87	
	РАНІТИДИН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о, у бл.	150мг	№10x2	1,96	
	РАНІТИДИН	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., в/о у стрип.	150мг	№10x10	0,79	
	РАНІТИДИН	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., в/о у стрип.	150мг	№10x2	0,87	
I.	РАНІТИДИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., вкриті п/о у конт. чар/уп.	150мг	№10x2	1,75	
	РАНІТИДИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., вкриті п/о у конт. чар/уп.	150мг	№10x1	1,85	
	РАНІТИДИН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о, у бл.	300мг	№10x1	1,91	
I.	РАНІТИДИН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о, у бл.	300мг	№10x2	2,16	
II.	ГІСТАК	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	табл., в/о у стрип.	150мг	№10x2, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РАНІТИДИН ЄВРО	Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	табл., вкриті п/о, у стрип.	150мг, 300мг	№10x2, №10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РАНІТИДИН ЄВРО	Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	табл., вкриті п/о, у стрип.	150мг	№10x10	2,21	27,60/\$
	РАНІТИДИН ЄВРО	Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	табл., вкриті п/о, у стрип.	300мг	№10x2	1,80	27,60/\$
	РИНИТ®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл., в/о, у стрип.	150мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РИНИТ®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл., в/о, у стрип.	150мг	№10x10	1,14	27,00/\$

● **Фамотидин (Famotidine)** ^[ГІМД]

Фармакотерапевтична група: А02ВА03 - засоби для лікування пептичної виразки та гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби. Антагоністи H₂-рецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: є конкурентним інгібітором H₂-гістамінових рецепторів; основною дією є інгібування шлункової секреції; знижує концентрацію кислоти, та об'єм шлункової секреції, в той час як

вироблення пепсину залишається пропорційним до об'єму виділеного шлункового соку; інгібує базальну і нічну секрецію шлунка, та секрецію, що стимулюється введенням пентагаstrину, бетазолу, кофеїну, інсуліну та фізіологічним вагальним рефлексом; тривалість інгібування секреції при застосуванні доз 20 мг та 40 мг становить від 10 до 12 год; одноразовий р/ос прийом доз у вечірній час забезпечує інгібування базальної та нічної секреції к-ти; практично не впливає на рівень гастрину натщесерце або після прийому їжі; не чинить впливу на спорожнювання шлунка, екзокринну функцію підшлункової залози, кровотік у печінці та портальній системі, на ферментну систему цитохрому Р450 печінки; антиандрогенного впливу п-ту не відзначається, рівень сироваткових гормонів після лікування не змінювався.

Показання для застосування ЛЗ: доброякісна виразка шлунка, пептична виразка ДПК^{БНФ, ПМД} (лікування та профілактика рецидивів), стани гіперсекреції, такі як с-м Золлінгера-Еллісона, лікування GERX (рефлюкс-езофагіт)^{БНФ, ПМД}, профілактика розвитку симптомів та ерозій або виразкоутворення, асоційованих із GERX^{ПМД}; запобігання аспірації кислого шлункового вмісту (с-му Мендельсона) при проведенні загальної анестезії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н для ін'єкцій вводити тільки в/в, тільки в стаціонарі і тільки хворим, що не можуть приймати ліки р/ос; як тільки з'явиться можливість, треба перейти на прийом табл.; звичайна доза для дорослих - по 20 мг 2 р/добу (кожні 12 год.); при с-мі Золлінгера-Еллісона початкова доза 20 мг в/в, кожні 6 год., надалі доза залежить від секреції соляної к-ти та клінічного стану хворого; при загальній анестезії для попередження аспірації шлункового соку перед проведенням анестезії дорослим вводять в/в 20 мг ранком у день операції або не менше ніж за 2 год. до початку операції; початкова в/в доза для дорослих не повинна перевищувати 20 мг, тривалість введення не менше 2 хв., у вигляді інфузії вводити 15-30 хв.; табл.: виразка шлунка та ДПК (доброякісна) рекомендована доза 40 мг 1 р/добу перед сном; тривалість лікування - 4-8 тижнів^{БНФ}; з метою профілактики рецидивів виразки ДПК застосовують 20 мг 1 р/добу на ніч протягом 1-4 тижнів; GERX: по 20-40 мг 2 р/добу (1 табл. вранці та 1 ввечері) протягом 6-12 тижнів; у випадках, коли GERX супроводжується ерозивним запаленням стравоходу або виразкою, рекомендована доза 40 мг 2 р/добу протягом 6-12 тижнів^{БНФ}; з метою профілактики (підтримуюче лікування) приймати 20 мг 2 р/добу; с-м Золлінгера-Еллісона: початкова доза 20 мг кожні 6 год. у пацієнтів, які раніше не застосовували антисекреторну терапію, потім дозу необхідно відкоригувати залежно від стану хворого.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: агранулоцитоз, лейкопенія, панцитопенія, тромбоцитопенія, нейтропенія; реакції гіперчутливості, анафілаксія, ангіоневротичний набряк, кропив'янка; анорексія; оборотні психічні розлади, депресія, галюцинації, збудження, тривожність, сплутаність свідомості, безсоння, сонливість, зниження лібідо; головний біль, запаморочення, дисгевзія, судоми та великі епілептичні напади, парестезія, порушення балансу; дзвін у вухах; запалення (подразнення) кон'юнктиви, набряк очей; аритмія, атріовентрикулярна блокада, брадикардія, прискорене серцебиття, тахікардія, відчуття серцебиття, зниження АТ; бронхоспазм, інтерстиціальна пневмонія (іноді з летальним кінцем); відчуття дискомфорту в животі, нудота, блювання, сухість у роті, діарея, запор, метеоризм, біль у животі, біль у шлунку, г. панкреатит; холестатична жовтяниця, гепатит, підвищення активності ферментів печінки; акне, алопеція, сухість шкіри, випадіння волосся, токсичний епідермальний некроліз (іноді з летальним кінцем), висипання, свербіж, тяжкі шкірні реакції (с-м Стівенса-Джонсона, ексфолювативний дерматит, еритема), ксеродерма; артралгія, м'язові спазми, м'язові судоми, міалгія; гінекомастія, імпотенція; стомлюваність, незначне підвищення температури, відчуття стиснення у грудях, гарячка легкого ступеня; відхилення від норми рівня печінкових ферментів.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату, інших антагоністів Н₂-гістамінових рецепторів; вагітність, годування груддю; дитячий вік (ч/з відсутність необхідного клінічного досвіду).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 40 мг., парентерально - 40 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ФАМАТЕЛ-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., в/о у бл. в кор. та без	40мг	№10, №10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФАМАТЕЛ-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., в/о у бл. в кор.	40мг	№10x1	1,88	
	ФАМОТИДИН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	20мг	№10x2	0,88	
	ФАМОТИДИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., в/о у конт. чар/уп.	20мг	№10x2	1,10	
	ФАМОТИДИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., в/о у бл.	20мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	ФАМОТИДИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., в/о у бл.	20мг	№20x1	1,07	
	ФАМОТИДИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., в/о у бл.	20мг	№10x1	1,22	
	ФАМОТИДИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'ек. у фл. в конт. чар/уп.	20мг	№5x1	114,05	
II.	КВАМАТЕЛ®	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	ліоф. д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч.	20мг	№5	113,72	27,60/\$
	КВАМАТЕЛ®	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	20мг, 40мг	№14x2, №14x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

3.1.3. Інгібітори «протонного насоса»

- **Омепразол (Omeprazole)** * [ПМД] [крім капс. по 10 мг; порошок д/орал. сусп. в саше по 20 мг]

Фармакотерапевтична група: A02BC01 - засоби для лікування пептичної виразки та гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби. Інгібітори протонної помпи.

Основна фармакотерапевтична дія: специфічний інгібітор протонної помпи парієтальних клітин; суміш рацематів двох активних енантіомерів, знижує виділення кислоти за допомогою механізму дії на мішені – протонні помпи пристінкових клітин; є слабкою основою, що зосереджується і перетворюється на активну форму у кислому середовищі внутрішньоклітинних каналців парієтальних клітин, де пригнічує фермент H^+/K^+ -АТФазу - кислотний насос; цей вплив на кінцевий етап утворення кислоти є дозозалежним і забезпечує високоефективне пригнічення як базальної, так і стимульованої секреції кислоти, незалежно від природи подразника.

Показання для застосування ЛЗ: лікування та профілактика рецидивів виразки шлунка та ДПК^{БНФ}; доброякісна виразка шлунка і виразка ДПК^{БНФ, ПМД}, у т.ч. пов'язана з прийомом НПЗЗ^{БНФ}; ерадикація *H. pylori* при пептичній виразці (у складі комбінованої терапії з АБЗ)^{ВООЗ, БНФ, ПМД}; ГЕРХ^{БНФ, ПМД}; рефлюкс-езофагіт; с-м Золлінгера-Еллісона^{БНФ}; лікування печії, спричиненої підвищеною кислотністю шлункового соку (гіперацидністю); диспептичний синдром, пов'язаний з підвищеною кислотністю шлункового соку, що проявляється печією, кислотною відрижкою, болем в епігастральній ділянці; діти віком від 1 року та масою тіла понад 10 кг: лікування рефлюкс-езофагіту; симптоматичне лікування печії та кислотної регургітації при ГЕРХ; діти віком від 4 років: у комбінації з а/б лікування виразки ДПК, спричиненої *H. pylori*.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо перед або під час вживання їжі, не розжовуючи, запиваючи невеликою кількістю рідини; лікування та профілактика виразки ДПК та доброякісної виразки шлунка, у тому числі пов'язаних із прийомом НПЗЗ: 20 мг 1 р/добу^{БНФ} протягом 2 тижнів, якщо не відбувається повного загоєння після початкового курсу, рекомендується подальше лікування протягом 2 тижнів; у тяжких або рецидивуючих випадках рекомендується 40 мг/добу^{БНФ} протягом 4 тижнів; для профілактики рецидиву виразки ДПК у пацієнтів із негативним результатом тесту на *H. pylori*: 20 мг/добу, деяким пацієнтам може вистачити добової дози 10 мг, у випадку недостатньої терапії дозу можна підвищити до 40 мг; лікування виразки шлунка: 20 мг 1 р/добу^{БНФ} протягом 4 тижнів, при необхідності можна продовжити подальше лікування протягом 4 тижнів, у тяжких або рецидивуючих випадках рекомендується 40 мг/добу протягом 8 тижнів; для профілактики рецидиву у пацієнтів із виразкою шлунка та недостатньою реакцією у відповідь на лікування рекомендована доза становить 20 мг 1 р/добу, при необхідності дозу можна збільшити до 40 мг 1 р/добу; лікування виразок шлунка та ДПК, пов'язаних із застосуванням НПЗЗ: 20 мг 1 р/добу протягом 4 тижнів, за необхідності можна продовжити лікування протягом 4 тижнів; профілактика виразок шлунка та ДПК, пов'язаних із застосуванням НПЗЗ, у пацієнтів, які мають підвищений ризик (вік > 60, наявність у минулому виразок шлунка та ДПК, кровотечі у верхньому відділі ШКТ): 20 мг 1 р/добу; ерадикація *H. pylori* при пептичній виразці^{БНФ}: при виборі а/б слід враховувати індивідуальну переносимість препарату та дотримуватися відповідностей національним, регіональним і місцевим особливостям та настановам щодо лікування - омепразолу 20 мг^{БНФ} + кларитроміцину 500 мг + амоксициліну 1000 мг 2 р/добу^{БНФ} протягом 1 тижня; омепразолу 20 мг^{БНФ} + кларитроміцину 250 мг (або 500 мг) + метронідазолу 400 мг (при необхідності 500 мг або тинідазолу 500 мг) 2 р/добу^{БНФ} протягом 1 тижня; омепразолу 40 мг 1 р/добу + амоксициліну 500 мг + метронідазолу 400 мг (при необхідності 500 мг або тинідазолу 500 мг) 3 р/добу протягом 1 тижня; лікування ГЕРХ^{БНФ}, у т.ч. рефлюкс-езофагіту: 20 мг 1 р/добу протягом 4 тижнів^{БНФ}, якщо не відбувається повного одужання після початкового курсу, рекомендовано подальше лікування протягом 4 тижнів; для пацієнтів з тяжким езофагітом - 40 мг/на добу протягом 8 тижнів; для довготривалого лікування ГЕРХ 10 мг 1 р/добу, при необхідності дозу можна підвищити до 20-40 мг 1 р/добу; лікування симптомів ГЕРХ: 20 мг/добу (може бути достатньо 10 мг/добу), дозу слід коригувати в індивідуальному порядку, якщо не досягається бажаний результат після 4 тижнів лікування, пацієнта слід додатково обстежити; лікування с-му Золлінгера-Еллісона^{БНФ}: підбір дози слід проводити індивідуально з урахуванням реакції організму, лікування триває до зникнення клінічних проявів хвороби; рекомендована початкова доза 60 мг 1 р/добу^{БНФ}, підтримуюча доза 20-120 мг/добу, добову дозу вище 80 мг слід розподілити та застосовувати за 2 прийоми^{БНФ}; діти віком від 1 року та масою тіла > 10 кг: лікування рефлюкс-езофагіту, симптоматичне лікування печії та кислотної регургітації при ГЕРХ: 10 мг 1 р/добу, при необхідності дозу можна підвищити до 20 мг 1 р/добу; з масою тіла > 20 кг: 20 мг 1 р/добу, при необхідності дозу

можна підвищити до 40 мг 1 р/добу; тривалість лікування становить 4-8 тижнів; симптоматичне лікування печії та кислотної регургітації при GERX: тривалість лікування - 2-4 тижні, якщо не досягається бажаний результат після 2-4 тижнів, пацієнта слід додатково обстежити; діти віком від 4 років: лікування виразки ДПК, спричиненої *H. pylori* - вибір відповідної комбінаційної терапії повинен проходити відповідно до офіційних національних, регіональних та місцевих особливостей бактеріальної резистентності, слід враховувати тривалість лікування (від 7 до 14 днів) та відповідне застосування а/б, лікування повинно проводитися під наглядом лікаря, при масі тіла 15-30 кг: омепразол 10 мг + амоксицилін 25 мг/кг маси тіла + кларитроміцин 7,5 мг/кг маси тіла, 2 р/добу протягом 1 тижня, при масі тіла 31-40 кг: омепразол 20 мг + амоксицилін 750 мг + кларитроміцин 7,5 мг/кг маси тіла, 2 р/добу протягом 1 тижня; при масі тіла > 40 кг: омепразол 20 мг + амоксицилін 1000 мг + кларитроміцин 500 мг, 2 р/добу протягом 1 тижня; ліофілізат д/р-ну д/інф. або порошок д/р-ну д/ін'єк. (альтернатива р/ос терапії, коли та є неприйнятною): 40 мг 1 р/добу в/в; пацієнтам із с-м Золлінгера-Еллісона: початкова доза 60 мг/добу в/в, може виникнути потреба у більш високих добових дозах, тому дозу слід підбирати індивідуально; якщо доза перевищує 60 мг/добу, її слід розділити порівну на дві частини та приймати 2 р/добу; вводити в/в у вигляді інфузії протягом 20-30 хв, у вигляді в/в ін'єкції протягом 5 хв; порошок д/орал. сусп.: застосовувати внутрішньо за 1 год до прийому їжі; вміст саше розчинити у 30 мл води (2 ст. ложки); не слід змішувати з іншими рідинами або з їжею; рекомендована доза для дорослих та дітей віком від 12 років - 1 саше 1 р/добу; при резистентності до лікування і частій печії слід проконсультуватися з лікарем; для лікування диспептичного синдрому з підвищеною кислотністю шлункового соку: дорослі та діти від 12 років - звичайна рекомендована доза становить 10-20 мг 1 р/добу протягом 2-4 тижнів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, абдомінальний біль, запор, діарея, метеоризм, нудота/блювання; тромбоцитопенія, лейкопенія, агранулоцитоз і панцитопенія, нейтропенія, анемія, лейкоцитоз та гемолітична анемія; реакції підвищеної чутливості, зокрема гарячка, ангіоневротичний набряк, анафілактична реакція/шок; гіпонатріємія, гіпомагніємія, гіпокаліємія; тяжка гіпомагніємія, що може призвести до гіпокальціємії; загальна слабкість, безсоння, збудження, тривожність, оборотна сплутаність свідомості, незначна дезорієнтація, депресія, агресія, нервозність, тремор, апатія, галюцинації, геміфаціальна дизестезія; запаморочення, втрата свідомості, парестезія, сонливість, порушення смаку/сну; нечіткість зору, порушення зору, подразнення ока, синдром «сухих очей», необоротне порушення зору у тяжкохворих пацієнтів; атрофія, неврит та передня ішемічна нейропатія зорового нерва; двоїння в очах; дзвін/шум у вухах, вертиго; бронхоспазм, носова кровотеча, біль у глотці; регургітація кислим вмістом шлунка, сухість у роті, стоматит, кандидоз ШКТ, відсутність апетиту, мікроскопічний коліт; поліпи фундальних залоз (доброякісні), карциноїди шлунка та ДПК у пацієнтів із синдромом Золлінгера-Еллісона, панкреатит (інколи з летальним наслідком), зміна забарвлення калу, атрофія слизової оболонки язика, підвищення рівня/активності печінкових ферментів, гепатит (печінковоклітинний, холестатичний або змішаний) з/без жовтяниці, печінкова недостатність, енцефалопатія у пацієнтів з існуючим захворюванням печінки, тяжке порушення функції печінки, незначне або виражене підвищення рівнів функціональних показників печінки (АЛТ, АСТ, γ -глутамілтранспептидази, лужної фосфатази та білірубіну), некроз печінки (інколи фатальний); дерматит, гіперемія, свербіж, висипання (в т.ч. бульозні), кропив'янка, алопеція, світлочутливість (фоточутливість), мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, пурпура та/або петехії (інколи з повторною появою після оновлення прийому препарату), запалення шкіри, сухість шкіри, гіпергідроз, підгострий шкірний червоний вовчак; перелом стегна, зап'ястя або хребта, артралгія, міалгія, м'язова слабкість, м'язові спазми, біль у нижніх кінцівках, підвищений ризик виникнення переломів при тривалому застосуванні; інтерстиціальний нефрит, потемніння сечі, ниркова недостатність, інфекція СВШ, мікропурія, часте сечовипускання, підвищення рівня креатиніну у сироватці крові, протеїнурія, гематурія, глюкозурія, біль у сід'яниках; гінекомастія; дискомфорт, нездужання, периферичні набряки, посилене потовиділення, гіпертермія, біль, підвищена втомлюваність, загальне нездужання, набряки у животі; біль у грудях або стенокардія, тахікардія, брадикардія, сильне серцебиття, підвищений артеріальний тиск, імпотенція; метаболічний алкалоз, тетанія, судоми.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до омепразолу, заміщених бензімідазолів або до будь-якої допоміжної речовини; не слід застосовувати одночасно з нелфінавіром, атазанавіром; спадкова непереносимість галактози, дефіцит лактази або с-м мальабсорбції глюкози та галактози; метаболічний алкалоз.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 20 мг., парентерально - 20 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ОМЕПРАЗОЛ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	капс. у бл.	20мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОМЕПРАЗОЛ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	капс. у бл.	20мг	№10x3	1,65	
	ОМЕПРАЗОЛ	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	40мг	№1	84,61	
	ОМЕПРАЗОЛ	ПАТ "Фармак", Україна	капс. у бл.	20мг	№10x1	1,50	
	ОМЕПРАЗОЛ	ПАТ "Фармак", Україна	капс. у бл.	20мг	№10x3	1,57	
	ОМЕПРАЗОЛ-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	капс. у бл.	20мг	№10x3	1,87	
	ОМЕПРАЗОЛ-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	капс. у бл.	20мг	№10x1	2,20	

	ОМЕПРАЗОЛ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	капс. у конт. чар/уп.	20мг	№10x1	1,57	
	ОМЕПРАЗОЛ-ФАРМАК	АТ "Фармак" (виробництво з продукції in bulk фірми-виробника Лабораторіос Нормон С.А., Іспанія), Україна	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	40мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	ДІАПРАЗОЛ	НАПРОД ЛАЙФ САЄНСЕС ПВТ. ЛТД., Індія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	40мг	№1	81,38	27,13/\$
	ДІАПРАЗОЛ 40	Реюнг Фармасьютикал Ко., Лтд., Китайська Народна Республіка	пор. д/приг. р-ну д/ін'єк. у фл.	40мг	№1	74,38	24,80/\$
	ЛОСЕПРАЗОЛ®	ПРО.МЕД.ЦС Прага а.с., Чеська Республіка	капс. у бл.	20мг	№7x2, №7x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОМЕЗ ІНСТА	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд (Виробнича дільниця - VI), Індія	пор. д/орал. сусп. в саше по 5,9г у кор.	20мг	№5, №10, №20, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОМЕЗ®	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Виробнича дільниця - II, Індія	капс. у стрип. або бл.	20мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОМЕЗ®	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Індія	капс. у бл.	10мг, 40мг	№10, №30, №28	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОМЕЗ®	НАПРОД ЛАЙФ САЄНСЕС ПВТ.ЛТД, Індія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	40мг	№1	60,00	27,69/\$
	ОМЕНАКС®	ДЕМО С.А. Фармасьютикал Індастрі, Греція	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	40мг	№1	71,59	27,27/\$
	ОМЕПРАЗОЛ	НАПРОД ЛАЙФ САЄНСЕС ПВТ.ЛТД, Індія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	40мг	№1	45,00	24,89/\$
	ОМЕПРАЗОЛ	Лабораторіос Ліконса, С.А. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Атдіс Фарма, С.Л. (ділянка для альтернативного вторинного пакування)/Лабораторіо Ечеварне, С.А. (ділянка для альтернативного контролю за показником МБЧ)/Ман, Іспанія/Іспанія	капс. тверді к/р у бл.	20мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОМЕПРАЗОЛ	Відкрите акціонерне товариство «Борисовський завод медичних препаратів», цех № 4, Республіка Білорусь	капс. у бл.	20мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОМЕПРАЗОЛ 20 АНАНТА	Фламінго Фармасьютикалс Лтд., Індія	капс. у бл.	20мг	№10x10	1,44	24,85/\$
	ОМЕПРАЗОЛ АНАНТА	Артура Фармасьютикалз Пвт. Лтд., Індія	капс. з м/в у бл.	20мг	№10x10	1,63	28,14/\$
	ОМЕПРАЗОЛ КРКА	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	капс. у бл. або фл.	20мг	№14, №28	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОМЕПРАЗОЛ - ТЕВА	Тева Фарма С.Л.У., Іспанія	капс. г/р тверді у бл.	20мг, 40мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОМЕПРАЗОЛ-ВОКАТЕ	АНФАРМ ХЕЛЛАС С.А., Греція	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	40мг	№1	88,43	24,77\$
ОМЕПУЛ	НАПРОД ЛАЙФ САЄНСЕС ПВТ. ЛТД, Індія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	40мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ОМЗОЛ	Софарімекс – Індустрія Кіміка е Фармасьютіка, С.А., Португалія	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	40мг	№1, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ		

● **Пантопразол (Pantoprazole)** ^[ПІМД] [крім табл. гастрорезист. по 20 мг]

Фармакотерапевтична група: A02BC02 - препарати для лікування кислотозалежних захворювань. Інгібітори протонної помпи. Пантопразол

Основна фармакотерапевтична дія: заміщений бензімідазол, який інгібує секрецію соляної кислоти у шлунку шляхом специфічної блокади протонних помп парієтальних клітин; перетворюється на свою активну форму - циклічний сульфенамід - у кислому середовищі, а саме - у парієтальних клітинах шлунка, де він інгібує фермент H⁺/K⁺-АТФазу, тобто кінцеву фазу утворення соляної кислоти у шлунку; пригнічення є дозозалежним і впливає на базальну та стимульовану секрецію шлункового соку; у більшості пацієнтів звільнення від печії та симптомів кислотного рефлюксу досягається протягом 2 тижнів; лікування пантопразолом зменшує рівень кислотності

шлункового соку, що пропорційно спричиняє збільшення виділення гастрину; збільшення рівня гастрину є оборотним, оскільки пантопразол зв'язує фермент внутрішньоклітинно нижче рівня мембранних рецепторів, він може інгібувати секрецію соляної кислоти незалежно від стимуляції іншими сполуками (ацетилхолін, гістамін, гастрин); цей ефект не залежить від способу введення препарату - р/ос або в/в.

Показання для застосування ЛЗ: рефлюкс-езофагіт; симптоматичне лікування ГЕРХ^{БНФ}, ПМД; ерадикація *H. pylori* у пацієнтів з виразками шлунка та ДПК, спричиненими цим м/о^{БНФ}, у комбінації з певними а/б; виразка ДПК; виразка шлунка^{БНФ}, ПМД; с-м Золлінгера-Еллісона та інші гіперсекреторні патологічні стани^{БНФ}; профілактика утворення виразки шлунка та ДПК, спричиненої прийомом НПЗЗ у пацієнтів групи ризику, які повинні застосовувати НПЗЗ протягом тривалого часу^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим та дітям від 12 років призначають по 20-40 мг/добу^{БНФ} за 1 год до їди цілими, не розжовувати та не подрібнювати, запивати водою; при ерозивних і виразкових формах ГЕРХ можливо збільшення дози до 80 мг; тривалість терапії індивідуальна залежно від показань: при виразці ДПК - 2-4 тижні, при виразці шлунка, ГЕРХ - 4-8 тижнів^{БНФ}; у складі комбінованої ерадикаційної антихелікобактерної терапії - по 40 мг 2 р/добу^{БНФ}; тривалість курсу ерадикаційної терапії - 7-14 днів; в/в введення лише у випадку, коли застосування р/ос не можливе; виразка шлунка, виразка ДПК та рефлюкс-езофагіт: 1 фл. (40 мг)/ добу в/в; тривале лікування с-му Золлінгера-Еллісона^{БНФ} та інших патологічних станів гіперсекреції - початкова добова доза 80 мг/добу^{БНФ}, за необхідності дозу можна титрувати, збільшуючи або зменшуючи, залежно від показників секреції к-ти в шлунку; при дозах, що перевищують 80 мг/добу, їх необхідно поділити на 2 введення; можливе тимчасове збільшення дози більше 160 мг, але тривалість застосування повинна обмежуватися тільки періодом, який необхідний для адекватного контролю секреції к-ти

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: агранулоцитоз; лейкопенія, тромбоцитопенія, панцитопенія; реакції гіперчутливості (включаючи анафілактичні реакції, анафілактичний шок); гіперліпідемія і підвищення рівня ліпідів (тригліцериди, холестерол, зміни маси тіла); гіпонатріємія, гіпомагніємія, гіпокальціємія, гіпокаліємія; розлади сну; депресія (в тому числі загострення); дезорієнтація (в тому числі загострення); галюцинації, сплутаність свідомості (особливо у пацієнтів зі схильністю до таких розладів, а також загострення цих симптомів у разі їх передіснування); головний біль, запаморочення; розлади смаку; парестезія; порушення зору/затуманення зору; поліпи з фундальних залоз (доброякісні), діарея, нудота, блювання, здуття живота, запор, сухість у роті, абдомінальний біль і дискомфорт; підвищення рівня печінкових ферментів (трансаміназ, g-ГТ); підвищення рівня білірубину; ураження гепатоцитів, жовтяниця, гепатоцелюлярна недостатність; шкірні висипання, екзантема, свербіж; кропив'янка, ангіоневротичний набряк; с-м Стівенса-Джонсона, с-м Лайелла, мультиформна еритема, фоточутливість, підгострий шкірний червоний вовчак; переломи стегна, зап'ястя, хребта; артралгія, міалгія; спазм м'язів; інтерстиціальний нефрит (з можливим розвитком ниркової недостатності); гінекомастія; тромбоз флебіт у місці введення; астенія, втома, нездужання; підвищення t° тіла, периферичні набряки.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активної речовини, похідних бензімідазолу та будь-якого компонента препарату.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 40 мг., парентерально - 40 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЗОЛОПЕНТ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. в/о, к/р у бл.	40мг	№10x3	4,54	
	ЗОЛОПЕНТ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. в/о, к/р у бл.	40мг	№14x1	4,91	
	ЗОЛОПЕНТ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. в/о, к/р у бл.	20мг	№14x1	7,05	
	ПАНТОПРАЗОЛ-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	40мг	№5	91,11	
	ПАНТОПРАЗОЛ-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	40мг	№1	97,19	
II.	ЕСПА-ПРАЗОЛ	Адванс Фарма ГмбХ (виробництво за повним циклом)/еспарма Фарма Сервісез ГмбХ (первинне пакування, вторинне пакування), Німеччина	табл. г/р у бл.	20мг, 40мг	№14x1, №14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕСПА-ПРАЗОЛ®	Адванс Фарма ГмбХ (виробництво за повним циклом)/еспарма Фарма Сервісез ГмбХ (первинне пакування, вторинне пакування), Німеччина	табл. г/р у бл.	20мг, 40мг	№14x1, №14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КОНТРОЛОК®	Такеда ГмбХ, місце виробництва Оранієнбург	табл. г/р у бл.	20мг	№14x1	32,97	29,08/€

	(виробництво за повним циклом)/Адванс Фарма ГмбХ (нанесення покриття на ядра таблеток), Німеччина						
КОНТРОЛОК®	Такеда ГмбХ (виробництво за повним циклом)/Патеон Італія С.П.А. (виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування, контроль якості)/Вассербургер Арцнайміттельверк ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування)/Хікма Фармасьютіка (Німеччина/Італія/Португалія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	40мг	№1	138,11	29,08/€	
КОНТРОЛОК®	Такеда ГмбХ, місце виробництва Оранієнбург (виробництво за повним циклом)/Адванс Фарма ГмбХ (нанесення покриття на ядра таблеток), Німеччина	табл. г/р у бл.	40мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ		
КОНТРОЛОК®	Такеда ГмбХ, місце виробництва Оранієнбург (виробництво за повним циклом)/Адванс Фарма ГмбХ (нанесення покриття на ядра таблеток), Німеччина	табл. г/р у бл.	40мг	№14x1	21,10	29,08/€	
НОЛЬПАЗА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/Лаурус Лабс Пвт. Лтд. (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування)/Кемійській інститут (контроль серії), Індія/Словенія	табл. г/р у бл.	20мг, 40мг	№14x4	відсутня у реєстрі ОБЦ		
НОЛЬПАЗА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/Лаурус Лабс Пвт. Лтд. (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування)/Кемійській інститут (контроль серії), Індія/Словенія	табл. г/р у бл.	20мг	№14x2	7,63	30,27/€	
НОЛЬПАЗА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/Лаурус Лабс Пвт. Лтд. (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування)/Кемійській інститут (контроль серії), Індія/Словенія	табл. г/р у бл.	20мг	№14x1	8,78	30,27/€	
НОЛЬПАЗА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/Лаурус Лабс Пвт. Лтд. (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування)/Кемійській інститут (контроль серії), Індія/Словенія	табл. г/р у бл.	40мг	№14x2	6,02	30,27/€	
НОЛЬПАЗА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/Лаурус Лабс Пвт. Лтд. (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування)/Кемійській інститут (контроль серії), Індія/Словенія	табл. г/р у бл.	40мг	№14x1	7,11	30,27/€	

	Лтд. (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування)/Кемійській інститут (контроль серії), Індія/Словенія					
НОЛЬПАЗА®	Валдефарм (виробництво нерозфасованої продукції "bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії)/Софарімекс-Індастріа Квіміка е Фармацевтіка, С.А. (виробництво нерозфасованої продукції "bulk", первинне пакування)/КРКА, д.д., Ново место (вторинне па, Франція/Португалія/Словенія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	40мг	№5, №10, №20	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НОЛЬПАЗА®	Валдефарм (виробництво нерозфасованої продукції "bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії)/Софарімекс-Індастріа Квіміка е Фармацевтіка, С.А. (виробництво нерозфасованої продукції "bulk", первинне пакування)/КРКА, д.д., Ново место (вторинне па, Франція/Португалія/Словенія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	40мг	№1	88,99	30,27/€
НОЛЬПАЗА® КОНТРОЛ	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/ТАД Фарма ГмбХ (первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/Лаурус Лабс Пвт. Лтд. (виробництво «in bulk», первинне та вторин, Словенія/Німеччина/Індія	табл. г/р у бл.	20мг	№7x1, №7x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НОЛЬПАЗА® КОНТРОЛ	КРКА, д.д., Ново место/ТАД Фарма ГмбХ, Словенія/Німеччина	табл. г/р у бл.	20мг	№7x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НОЛЬПАЗА® КОНТРОЛ	КРКА, д.д., Ново место/ТАД Фарма ГмбХ, Словенія/Німеччина	табл. г/р у бл.	20мг	№7x2	11,20	30,27/€
ПАНГАСТРО®	Лек фармацевтична компанія д.д. (виробництво "in bulk", упаковка, тестування, випуск серії)/Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С. (виробництво "in bulk", упаковка, тестування) /С.К. Сандоз С.Р.Л. (тестування), Словенія/Туреччина/Румунія	табл. г/р у бл.	20мг, 40мг	№14, №28	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПАНГАСТРО®	Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	40мг	№1, №5, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПАНОЦИД	ЛАБОРАТОРІО РЕЙГ ХОФРЕ, С.А., Іспанія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	40мг	№1, №5, №20	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПАНОЦИД 40	Фламінго Фармасьютикалс Лтд., Індія	табл. в/о, к/р у бл.	40мг	№10x3	4,17	21,76/\$
ПАНОЦИД 40	Фламінго Фармасьютикалс Лтд., Індія	табл. в/о, к/р у бл.	40мг	№10x1	5,11	21,76/\$
ПАНТАМАК	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл. в/о, к/р у бл.	40мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПАНТАСАН	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд., Індія	пор. ліоф. д/приг. р-ну д/ін'єк. у фл.	40мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПАНТЕКС	СТЕРИЛ-ДЖЕН ЛАЙФ	пор. ліоф.	40мг	№1, №10	відсутня у	

	САЙЄНСИЗ (П) ЛТД, Індія	д/приг. р-ну д/ін'єк. у фл.				реєстрі ОВЦ	
ПАНТОЗОЛ	Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	табл. вкриті к/р об. у бл.	40мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ПАНТОЗОЛ	Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	табл. вкриті к/р об. у бл.	40мг	№10x3	3,00	27,60/\$	
ПАНТОКАР®	Мікро Лабс Лімітед, Індія	табл. в/о, к/р у бл.	40мг	№10x3	4,03	28,54/\$	
ПАНТОНЕКС ДР-20	Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія	табл. з м/в у бл.	20мг	№10x3	6,67	25,89/\$	
ПАНТОНЕКС ДР-40	Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія	табл. з м/в у бл.	40мг	№10x3	5,00	25,89/\$	
ПАНТОПРАЗ	ІММАКУЛ ЛАЙФСАЙЄНСИЗ ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД, Індія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у скл. фл.	40мг	№1	96,82	24,20/\$	
ПАНТОПРАЗ 40	Реюнг Фармасьютикал Ко., Лтд., Китайська Народна Республіка	пор. д/приг. р-ну д/ін'єк. у фл.	40мг	№1	105,62	26,41/\$	
ПАНТОПРАЗОЛ	Джубілант Дженераікс Лімітед, Індія	табл. к/р у бл.	20мг, 40мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ПАНТОПРАЗОЛ АЙКОР®	Балканфарма Дупніца АД, Болгарія	табл. к/р у бл.	20мг, 40мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ПАНТОПРАЗОЛ-ГЕТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл. г/р у бл.	20мг, 40мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ПАНТОПРАЗОЛ-ГЕТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл. г/р у бл.	40мг	№10x3	5,00	26,76/\$	
ПАНТОПРАЗОЛ-ТЕВА	Тева Фарма С.Л.У., Іспанія	табл. г/р у бл.	40мг	№14, №28, №30	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ПАНТОПРАЗОЛ-ТЕВА	Софарімекс - Індустрія Кіміка е Фармачеутіка, С.А. (виробництво за повним циклом)/ВАЛЬДЕФАРМ - ВАЛЬ-ДЕ-РЕЙ (виробництво за повним циклом), Португалія/Франція	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	40мг	№1, №5, №10, №20	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ПАНТОР 20	Торрент Фармасьютікалс Лтд, Індія	табл. в/о, к/р у бл.	20мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ПАНТОР 40	Торрент Фармасьютікалс Лтд, Індія	табл. в/о, к/р у бл.	40мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ПАНТРАЛІС®	Джубілант Дженераікс Лтд., Індія	табл. к/р у бл.	40мг	№7x2, №7x4	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ПРОКСІУМ®	Лабораторіос Нормон С.А., Іспанія	табл. в/о, к/р у бл.	40мг	№8x4	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ПРОКСІУМ®	Лабораторіос Нормон С.А., Іспанія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	40мг	№1	62,47	27,64/€	
ПРОТЕРА	Лабораторіо Рейг Хофре, СА, Іспанія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	40мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ПУЛЬЦЕТ®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл. в/о, к/р у бл.	40мг	№4x1	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ПУЛЬЦЕТ®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл. в/о, к/р у бл.	40мг	№14x2	7,81	26,02/\$	
ПУЛЬЦЕТ®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл. в/о, к/р у бл.	40мг	№14x1	8,74	26,02/\$	
ТЕКТА КОНТРОЛ®	Такеда ГмбХ, місце виробництва Оранієнбург, Німеччина (виробництво за повним циклом)/Адванс Фарма ГмбХ, Німеччина (нанесення покриття на ядра таблеток), Німеччина/Німеччина	табл. г/р у бл.	20мг	№7x1, №14x1	відсутня у реєстрі ОВЦ		

ТОПРАЗ	Ауробіндо Фарма Лімітед - Юніт VII, Індія	табл. г/р у бл.	20мг, 40мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТОПРАЗ	Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	40мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
УЛСЕПАН	Біофарма Ілач Сан. ве Тідж. А.Ш./УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл. к/р у бл.	40мг	№7x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
УЛСЕПАН	Біофарма Ілач Сан. ве Тідж. А.Ш./УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл. к/р у бл.	40мг	№7x4	5,34	24,60/\$
УЛСЕПАН	Мефар Ілач Сан. А.Ш., Туреччина	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	40мг	№1	81,28	28,12/\$

• **Лансопразол (Lansoprazole)**^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: A02BC03 - засоби для лікування пептичної виразки і гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби. Інгібітори протонної помпи.

Основна фармакотерапевтична дія: пригнічує активність H^+/K^+ -АТФ-ази протонної помпи у парієтальних клітинах слизової оболонки шлунка; у такий спосіб лансопразол пригнічує кінцеву стадію утворення кислоти шлункового соку, зменшує кількість і кислотність шлункового соку, внаслідок чого знижується шкідливий вплив шлункового соку на слизову оболонку.

Показання для застосування ЛЗ: ГЕРХ^{БНФ, ПМД}; с-м Золлінгера-Еллісона; ерадикація *H. pylori* (у комбінації з а/б); доброякісна пептична виразка шлунка та ДПК, у т.ч. пов'язана із застосуванням НПЗЗ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо, дорослим: 30 мг 1 р/добу за 30-40 хв до прийому їжі, капсули приймати не розжовуючи, запиваючи 150-200 мл води; МДД 60 мг, при порушенні функції печінки МДД 30 мг, виразка ДПК: 30 мг 1 р/добу протягом^{БНФ} 2-4 тижнів^{БНФ}, лікування виразок, спричинених прийомом НПЗП^{БНФ} - 30 мг 1 р/добу^{БНФ}, 4-8 тижнів; доброякісна пептична виразка шлунка: 30 мг 1 р/добу протягом 8 тижнів^{БНФ}, ГЕРХ^{БНФ}: при середній та тяжкій формах - 30 мг 1 р/добу протягом 4 тижнів^{БНФ}, якщо ерозивний езофагіт не виліковується протягом 4 тижнів, тривалість лікування може бути вдвічі довшою, для довготривалої профілактики рецидиву ерозивного езофагіту 30 мг 1 р/добу (до 12 місяців); ерадикація *H. pylori*: 30 мг 2 р/добу^{БНФ} (перед сніданком та перед вечерею), необхідно приймати препарат разом з а/б^{БНФ} за затвердженими схемами протягом 1-2 тижнів; с-м Золлінгера-Еллісона^{БНФ}: рекомендована початкова доза 60 мг 1 р/добу^{БНФ} перед сніданком, якщо пацієнт приймає дози понад 120 мг - слід приймати першу половину добової дози перед сніданком, а другу половину - перед вечерею, лікування триває до зникнення клінічних показань.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: діарея, нудота, біль у животі; головний біль; стенокардія, цереброваскулярні зміни, АГ, артеріальна гіпотензія, ІМ, відчуття серцебиття, шок (циркулярна недостатність), вазодилатація; анорексія, кардіоспазм, холелітіаз, запор, блювання, гепатотоксичність, жовтяниця, гепатит, кандидоз слизових оболонок травного тракту, сухість у роті/спрага, диспепсія, дисфагія, відрижка, езофагеальний стеноз, езофагеальна виразка, езофагіт, зміна кольору калу, метеоризм, поліпи шлунка, гастроентерит, коліт, шлунково-кишкові кровотечі, блювання з домішками крові, підвищення або зниження апетиту, підвищена саливація, мелена, ректальні кровотечі, стоматит, смакові розлади, глосит, панкреатит, тенезми, виразковий коліт; гіпомагніємія; ЦД, зоб, гіперглікемія/гіпоглікемія; анемія (у т.ч. апластична та гемолітична анемія), гемоліз, агранулоцитоз, лейкопенія, нейтропенія, панцитопенія, тромбоцитопенія, еозинofilія, тромбоцитна та тромбоцитопенічна пурпура; артрит/артралгія, м'язово-скелетний біль, міалгія; ажитація, амнезія, підвищена збудливість, апатія, депресія, запаморочення/синкопе, вертиго, галюцинації, геміплегія, ворожість, страх, зниження лібідо, нервозність, безсоння, сонливість, тремор, парестезії, порушення мислення, сплутаність свідомості; задишка, кашель, фарингіт, риніт, інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів (бронхіт, пневмонія), астма, носова кровотеча, легенева кровотеча, гикавка; ангіоневротичний набряк, мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса - Джонсона, поліморфна еритема, акне, гіперемія обличчя, алопеція, свербіж, висипання, кропив'янка, пурпура, петехії, гіпергідроз, світлочутливість; затуманення зору, біль в очах, дефекти полів зору, шум у вухах, глухота, середній отит, зміни смаку, розлади мовлення; інтерстиціальний нефрит, що може призвести до ниркової недостатності, формування каменів у нирках, затримка сечі, глюкозурія, гематурія, альбумінурія, порушення менструального циклу, збільшення молочних залоз/гінекомастія, болочість молочних залоз, імпотенція; найчастішими побічними р-ціями у пацієнтів, які отримують потрібну терапію (лансопразол/кларитроміцин/амоксицилін) протягом 14 днів, є діарея, головний біль, зміни смаку; підвищення рівня АСТ, АЛТ, лужної фосфатази, креатиніну, глобулінів, гаммаглутамілтранспептидази, порушення співвідношення альбумінів і глобулінів; підвищення/зниження рівня лейкоцитів, зміни кількості еритроцитів, білірубінемія, еозинofilія, гіперліпідемія, підвищення/зниження рівня електролітів, підвищення/зниження холестерину, зниження гемоглобіну, підвищення рівня калію, сечовини, підвищення рівня глюкокортикоїдів, підвищення рівня ліпопротеїдів низької щільності, підвищення/зниження рівня тромбоцитів, підвищення рівня гастрину, позитивний тест на приховану кров; у сечі - альбумінурія, глюкозурія, гематурія, поява солей; анафілактоїдні реакції, анафілактичний шок, астенія, підвищена втомлюваність, кандидоз, біль у грудях (не завжди специфічний), набряки, гарячка, грипоподібний с-м, неприємний запах з рота, інфекції (не завжди специфічні), слабкість.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до лансопразолу чи до будь-якого ін. компонента препарату; одночасне застосування з атазанавіром; злаякісні новоутворення ШКТ

Визначена добова доза (DDD): перорально - 30 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЛАНЦЕРОЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	капс. у бл.	30мг	№10x1	4,30	
II.	ЛАНЗА	Дженом Біотек Pvt. Лтд., Індія	капс. у бл.	30мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛАНЗОПТОЛ	КРКА, д.д., Ново место (Вир-к, відпов. за вир-во "in bulk", перв. та втор. Пак., контроль та випуск серії)/НЛЗОХ (Національні лабораторія за здоров'я, околе ін храно), Словенія	капс. к/р тверді у бл.	30мг	№7x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Рабепразол (Rabeprazole)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: A02BC04 - Препарати, що впливають на травний тракт і обмін речовин. Препарати для лікування захворювань, пов'язаних з порушенням кислотності. Противиразкові препарати і препарати для лікування гастроєзофагеального рефлюксу. Інгібітори протонної помпи. Рабепразол

Основна фармакотерапевтична дія: противиразкова, антисекреторна, гастропротекторна дія; пригнічує секрецію шлункової кислоти шляхом специфічного пригнічення ферменту H⁺/K⁺-АТФази на секреторній поверхні парієтальних клітин шлунка; ефект є дозозалежним та призводить до інгібування як базального, так і стимульованого виділення кислоти, незалежно від подразника

Показання для застосування ЛЗ: табл.: активна пептична виразка ДПК^{БНФ, ПМД}; активна доброякісна виразка шлунка^{БНФ, ПМД}; ерозивна або виразкова гастроєзофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ)^{БНФ, ПМД}; довготривале лікування ГЕРХ (підтримуюча терапія ГЕРХ)^{ПМД}; симптоматичне лікування ГЕРХ^{БНФ, ПМД} від помірного до дуже важкого ступеня; с-м Золлінгера-Еллісона^{БНФ}; у комбінації з відповідними АБ терапевтичними схемами для ерадикації *H. pylori*^{БНФ} у пацієнтів з пептичною виразкою шлунка та ДПК; ліофілізат д/р-ну д/ін'єкцій (коли застосування р/ос форми неможливе): загострення пептичної виразки шлунка чи ДПК з кровотечею та важкими ерозіями, короткочасне лікування ГЕРХ з ерозіями та виразками, профілактика аспірації кислим вмістом шлунка, с-м Золлінгера-Еллісона.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при активній пептичній виразці шлунка та ДПК, ГЕРХ по 20 мг 1 р/добу^{БНФ} вранці; тривалість курсу лікування при пептичній виразці ДПК 4-8 тижнів, при виразці шлунка - 6-12 тижнів, при ГЕРХ - 4-8 тижнів^{БНФ}; підтримуюча терапія при ГЕРХ: 10 або 20 мг 1 р/добу^{БНФ} залежно від клінічної відповіді пацієнта; симптоматичне лікування ГЕРХ від помірного до дуже важкого ступеня: 10 мг 1р/добу, після зникнення симптомів хвороби можливе використання режиму "за вимогою" в тому ж дозуванні за потреби, якщо за 4 тижні застосування симптоми хвороби не зникають, провести додаткове обстеження пацієнта; для ерадикації *H. pylori*^{БНФ} застосовують у складі комплексної терапії з відповідними а/б по 20 мг 2 р/добу^{БНФ} 7 днів; при с-мі Золлінгера-Еллісона початкова доза 60 мг/добу^{БНФ}, за необхідності дозу підвищують до 120 мг/добу^{БНФ}, можна застосовувати разову дозу до 100 мг/добу, при необхідності прийому 120 мг/добу дозу ділити на 2 прийоми по 60 мг, тривалість лікування залежить від клінічної необхідності; в/в призначення (лише, коли р/ос застосування неможливе): 20 мг 1 р/добу, р-н вводити у вигляді ін'єкції (розчинник стерильна вода для ін'єкцій 5 мл) повільно протягом 5-15 хв чи у вигляді інфузії (розчинник стерильна вода для ін'єкцій 5 мл+р-н натрію хлориду 0,9%) протягом 15-30 хв, користати не пізніше ніж через 4 години після приготування розчину

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції; анемія, еозинофілія, еритроцитопенія, лімфопенія, нейтропенія, лейкопенія, тромбоцитопенія, лейкоцитоз; гіперчутливість (включаючи кропив'янку, артеріальну гіпотензію, диспное); анорексія; гіпонатріємія, гіпомагніємія; безсоння; збудження, знервованість; депресія; сплутаність свідомості; головний біль, запаморочення; сонливість, слабкість у кінцівках, оніміння кінцівок, гіпестезія, зниження сили стиснення, порушення мови, дезорієнтація; делірій, кома; розлади зору; збільшення внутрішньоочного тиску; периферичні набряки, АГ, пальпітація; кашель, фарингіт, риніт; бронхіт, синусит, глосит; діарея, блювання, нудота, біль у животі, запор, метеоризм, доброякісний фунгіцидний поліп, відчуття переповнення та тяжкості у шлунку, кандидоз; диспсія, висип та сухість у роті, відрижка; гастрит, стоматит, порушення смаку, мікроскопічний коліт; ентерит, езофагіт, хейліт, печія, геморої; гепатит (в т.ч. фульмінантний), жовтяниця, печінкова енцефалопатія; висип, еритема, свербіж, пітливість, бульозні реакції; набряк обличчя, мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз (ТЕН), с-м Стівенса-Джонсона; підгострий шкірний червоний вовчак, гострі системні алергічні реакції, що зазвичай зникають після припинення лікування; неспецифічний біль, біль у спині; міалгія, судоми ніг, артралгія, перелом шийки стегна, зап'ястка або хребта; інфекції сечовивідних шляхів; інтерстиціальний нефрит; гінекомастія, посилення ерекції; астенія/слабкість, гриппоподібний с-м, нездужання; біль у грудях, озноб, гарячка, жар, пірексія, спрага, алопеція, посилення потовиділення, зміни у місці введення; збільшення рівня печінкових ферментів (АЛТ, АСТ), ЛДГ, гамма-глутамілтрансферази, лужної фосфатази, загального білірубину; збільшення маси тіла, протеїнурія; збільшення рівня загального холестерину, тригліцеридів, азоту сечовини, підвищення рівня ТСГ, КФК, сечової кислоти, глюкози в сечі, гіперамоніємія; шок та анафілактоїдні реакції; панцитопенія, агранулоцитоз та гемолітична анемія; порушення функції печінки; інтерстиціальна пневмонія; г. ниркова недостатність; рабдоміоліз; ангіоневротичний набряк, бронхіальний спазм.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату, заміщених бензimidазолів; не застосовувати разом з атазанавіром; період вагітності та годування груддю; дитячий вік; печінкова, ниркова або дихальна недостатність

Визначена добова доза (DDD): перорально - 20 мг., парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	РАБЕПРАЗОЛ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл. вкриті п/о, к/р у бл.	10мг, 20МГ	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	РАБЕПРАЗОЛ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл. вкриті п/о, к/р у бл.	10мг	№10x2	9,78	
	РАБЕПРАЗОЛ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл. вкриті п/о, к/р у бл.	20мг	№10x2	6,81	
II.	БАРОЛ 10	Інвентіа Хелскеа Пвт Лтд, Індія	капс. к/р у стрип.	10мг	№10x3, №14x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БАРОЛ 20	Інвентіа Хелскеа Пвт Лтд, Індія	капс. к/р у стрип.	20мг	№14x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БАРОЛ 20	Інвентіа Хелскеа Пвт Лтд, Індія	капс. к/р у стрип.	20мг	№10x3	5,24	26,44/\$
	ВЕЛОЗ	Торрент Фармасьютикалс Лтд, Індія	табл. в/о, к/р у стрип.	20мг	№10x2, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ГЕЕРДІН	Мепро Фармасьютикалс Приват Лімітед, Індія	табл., вкриті к/р об. у бл.	10мг, 20мг	№7x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ГЕЕРДІН	Гуфік Лайфсаїнсис Приват Лімітед, Індія	ліоф. д/р-ну д/ін'ек. у фл. по 10мл	20мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЗУЛЬБЕКС®	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серій та випуск серій), Словенія	табл., к/р у бл.	10мг, 20мг	№14, №28, №56	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПАРІЄТ®	Бушу Фармасьютикалз Лтд. (виробництво нерозфасованого продукту)/Сілаг АГ (первинна та вторинна упаковка, випуск серії), Японія/Швейцарія	табл., к/р у бл.	10мг, 20мг	№7x1, №14x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПАРІЄТ®	Бушу Фармасьютикалз Лтд. (виробництво нерозфасованого продукту)/Сілаг АГ (первинна та вторинна упаковка, випуск серії), Японія/Швейцарія	табл., к/р у бл.	20мг	№14x1	30,67	24,65/\$
ПАРІЄТ®	Бушу Фармасьютикалз Лтд. (виробництво нерозфасованого продукту)/Сілаг АГ (первинна та вторинна упаковка, випуск серії), Японія/Швейцарія	табл., к/р у бл.	10мг	№14x1	46,23	24,65/\$	

РАБЕЛОК	Каділа Фармасьютикалз Лімітед, Індія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	20мг	№1	160,00	26,42/\$
РАБІДЖЕМ 20	Тулп Лаб Пвт. Лтд., Індія	табл. вкриті к/р об. у стрип.	20мг	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РАБІМАК	Маклеодс Фармасьютикалз Лімітед, Індія	табл. в/о, к/р у бл.	10мг, 20мг	№15x1, №15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РАБІМАК	Маклеодс Фармасьютикалз Лімітед, Індія	табл. в/о, к/р у стрип.	20мг	№7x2	5,29	27,02/\$
РАБІМАК	Маклеодс Фармасьютикалз Лімітед, Індія	табл. в/о, к/р у стрип.	10мг	№7x2	6,38	27,02/\$

● **Езомепразол (Esomeprazole)**^{ПМД}

Фармакотерапевтична група: A02BC05 - засоби для лікування пептичної виразки та гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби. Інгібітори протонної помпи.

Основна фармакотерапевтична дія: є S-ізомером омепразолу, що пригнічує секрецію кислоти шлункового соку завдяки специфічному, направленому механізму дії; є специфічним інгібітором кислотної помпи парієтальних клітин; і R-, і S-ізомери омепразолу мають подібну фармакологічну активність; являє собою слабку основу, що концентрується та перетворюється на активну форму у сильно кислому середовищі секреторних каналців парієтальних клітин, де інгібує фермент H⁺K⁺-АТФ-азу - кислотну помпу - та пригнічує як базальну, так і стимульовану секрецію кислоти.

Показання для застосування ЛЗ: табл.: ГЕРХ^{БНФ, ПМД}: лікування ерозивного рефлюкс-езофагіту; довготривале лікування пацієнтів з вилікованим езофагітом з метою запобігання рецидиву; симптоматичне лікування ГЕРХ; у комбінації з а/б для ерадикації Н. pylori^{БНФ, ПМД}: лікування виразки ДПК, пов'язаної з Н. pylori^{ПМД}; запобігання рецидиву пептичних виразок у пацієнтів з виразками, спричиненими Н. pylori; лікування та профілактика виразок, спричинених тривалим застосуванням НПЗЗ^{БНФ}: загоєння виразок шлунка, спричинених терапією НПЗЗ; профілактика виразок шлунка та ДПК у пацієнтів групи ризику у зв'язку з прийомом НПЗЗ; лікування с-му Золлінгера-Еллісона^{БНФ}; тривале лікування після в/в застосування п-ту для профілактики рецидиву кровотечі з пептичних виразок; порошок для приготування р-ну: дорослі: антисекреторна терапія, коли неможливо застосовувати р/ос: ГЕРХ у пацієнтів з езофагітом та/або тяжкими симптомами рефлюксу; лікування виразок шлунка, пов'язаних з терапією НПЗЗ; попередження виразок шлунка та ДПК, пов'язаних з терапією НПЗЗ, у пацієнтів, які входять до групи ризику; короткотривале підтримання гемостазу та профілактика повторної кровотечі у пацієнтів після ендоскопічного лікування^{БНФ} г. кровотечі виразки шлунка або ДПК; діти та підлітки віком від 1 до 18 років: антисекреторна терапія, у випадках, коли неможливо застосовувати р/ос (ГЕРХ) у пацієнтів з ерозивним рефлюксивним езофагітом та/або тяжкими симптомами рефлюксу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі та діти старше 12 років та масою тіла більше 40 кг: лікування ерозивного рефлюкс-езофагіту - 40 мг 1 р/добу протягом 4 тижнів, пацієнтам з невилікованим езофагітом або стійкими симптомами рекомендується додатково застосовувати препарат протягом 4 тижнів; тривала профілактика рецидивів у пацієнтів із вилікованим езофагітом - 20 мг 1 р/добу^{БНФ}; симптоматичне лікування рефлюкс-езофагіту - 20 мг 1 р/добу пацієнтам без езофагіту^{БНФ}; ерадикація Н. pylori, пов'язаної з виразкою ДПК - 20 мг езомепразолу^{БНФ} з 1 г (діти вагою 30-40 кг - 750 мг) амоксициліну та 500 мг (діти вагою 30-40 кг - 7,5 мг/кг маси тіла) кларитроміцину 2 р/добу^{БНФ} протягом 7 днів; лікування виразок шлунка, асоційованих із лікуванням НПЗЗ - рекомендована доза 20 мг 1 р/добу, тривалість лікування - 4-8 тижнів^{БНФ}; профілактика виразок шлунка та ДПК, асоційованих з лікуванням НПЗЗ у пацієнтів групи ризику - рекомендована доза 20 мг 1 р/добу^{БНФ}; лікування с-му Золлінгера-Еллісона: 40 мг 2 р/добу, якщо доза перевищує 80 мг /добу, її потрібно розділити на 2 прийоми^{БНФ}; тривале лікування після в/в застосування п-ту для профілактики рецидиву кровотечі з пептичних виразок - 40 мг 1 р/добу протягом 4 тижнів після в/в застосування; р-н: при неможливості р/ос прийому, можна вводити парентерально у дозі 20-40 мг/добу; при рефлюксивному езофагіті 40 мг/добу, для симптоматичного лікування ГЕРХ 20 мг/добу, при лікуванні виразок шлунка, зумовлених застосуванням НПЗЗ - 20 мг/добу, для запобігання виразкам шлунка та ДПК, зумовленим терапією НПЗЗ, пацієнтам групи ризику - 20 мг/добу; короткотривале підтримання гемостазу та профілактика повторної кровотечі у пацієнтів після ендоскопічного лікування г. кровотечі внаслідок виразки шлунка чи ДПК - 80 мг у вигляді болюсної інфузії тривалістю 30 хв, продовжують введення шляхом тривалої в/в інфузії зі шв. 8 мг/год впродовж 72 годин; ін'єкції: 40 мг - 5 мл відновленого р-ну (8 мг/мл) вводити в/в не менше 3 хв; 20 мг - 2,5 мл або половину відновленого р-ну (8 мг/мл) в/в не менше 3 хв; 10 мг - 1,25 мл відновленого р-ну (8 мг/мл) вводити в/в не менше 3 хв; інфузії: 40 мг - відновлений р-н вводити у вигляді в/в інфузії 10-30 хв, 20 мг - половину відновленого р-ну вводити у вигляді в/в інфузії 10-30 хв, 10 мг - чверть відновленого р-ну вводити у вигляді в/в інфузії 10-30 хв, болюсна доза 80 мг - відновлений р-н вводять у вигляді в/в інфузії протягом 30 хв, 8 мг/год - відновлений р-н вводять у вигляді тривалої в/в інфузії протягом 71,5 год (розрахована швидкість інфузії 8 мг/год).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: лейкопенія, тромбоцитопенія; агранулоцитоз, панцитопенія; реакції гіперчутливості (гарячка), ангіоневротичний набряк та анафілактичні реакції/шок; периферичний набряк; гіпонатріємія; гіпомагніємія; тяжка гіпомагніємія може корелювати із гіпокальціємією; гіпомагніємія може бути пов'язана з гіпокаліємією; безсоння; збудження, сплутаність свідомості, депресія; агресія, галюцинації; головний біль; запаморочення, парестезія, сонливість; порушення смаку; нечіткий зір; вертиго; бронхоспазм; біль у животі, запор, діарея, метеоризм, нудота/блювання; залозисті поліпи дна шлунка (доброякісні); сухість у роті; стоматит, шлунково-кишковий кандидоз; мікроскопічний коліт; збільшення рівня печінкових ферментів; гепатит із жовтяницею чи без неї; печінкова недостатність, енцефалопатія у пацієнтів із попередньо наявною хворобою печінки; реакції у місці введення; дерматит, свербіж, висип, кропив'янка; алопеція, фоточутливість; тяжкі шкірні реакції, поліморфна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз; підгострий шкірний червоний вовчак; переломи стегна, зап'ястя або хребта; артралгія, міалгія; м'язова слабкість; інтерстиціальний

нефрит; у деяких пацієнтів повідомлялося про ниркову недостатність; гінекомастія; нездужання, посилене потовиділення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до езомепразолу, до заміщених бензimidазолів або до будь-якої із допоміжних речовин; разом з атазанавіром, нелфінавіром; дитячий вік: до 12 років - табл., до 1 року - парентерально.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 30 мг., парентерально - 30 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕЗОМЕПРАЗОЛ-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'ек. та інфуз. у фл. в конт. чар/уп.	40мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕЗОМЕПРАЗОЛ-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'ек. та інфуз. у фл. в пач.	40мг	№1	135,91	
	ЕЗОНЕКСА®	АТ "Фармак" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника Лабораторіос Нормон С.А., Іспанія), Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'ек. та інфуз. у фл. по 10мл	40мг	№1	112,50	
	ЕЗОНЕКСА®	ПАТ "Фармак" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника Лабораторіос Нормон С.А., Іспанія), Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'ек. та інфуз. у фл. по 10мл	40мг	№5, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕЗОНЕКСА®	ПАТ "Фармак" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника Балканфарма Дупниця АТ, Болгарія), Україна	табл. к/р у бл.	20мг, 40мг	№7x1, №7x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕЗОНЕКСА®	ПАТ "Фармак" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника Балканфарма Дупниця АТ, Болгарія), Україна	табл. к/р у бл.	20мг	№7x2	7,50	
	ЕЗОНЕКСА®	АТ "Фармак" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника Балканфарма Дупниця АТ, Болгарія), Україна	табл. к/р у бл.	20мг, 40мг	№7x1, №7x2, №7x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕЗОНЕКСА®	ПАТ "Фармак" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника Балканфарма Дупниця АТ, Болгарія), Україна	табл. к/р у бл.	40мг	№7x2	5,89	
II.	ДЕСПАЗОЛ	Напрод Лайф Саєнсес Pvt. Ltd., Індія	ліоф. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	40мг	№1	152,25	27,05/\$
	ЕЗОЛОНГ®	Софарімекс – Індустрія Кіміка е Фармасьютіка, С.А., Португалія	пор. д/р-ну д/ін'ек. або інфуз. у фл.	40мг	№1, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕЗОЛОНГ®-20	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№7x1, №7x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕЗОЛОНГ®-40	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	40мг	№7x1, №7x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕЗОМАПС	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл. г/р у бл.	20мг, 40мг	№7x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕЗОМЕПРАЗОЛ-МБ	ІММАКУЛ ЛАЙФСАЙЄНСИЗ ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД, Індія	ліоф. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	40мг	№1	94,60	25,74/\$
	ЕЗОМЕР	ЛАМП САН ПРОСПЕРО С.П.А. (випуск серії, первинне та вторинне пакування)/ВАЛФАРМА ІНТЕРНЕШИНАЛ С.П.А. (приготування продукту in bulk), Італія/Італія	табл. г/р у бл.	40мг	№7x2, №7x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕЗОРМА	Іммакул Лайфсайєнсиз Приват Лімітед, Індія	пор. д/р-ну д/ін'ек. та	40мг	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	

		інфуз. у фл.				
ЕЗОРМА	Іммакул Лайфсайєнсиз Приват Лімітед, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. та інфуз. у фл.	40мг	№1	116,30	27,26/\$
ЕМАНЕРА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	капс. к/р у бл.	20мг, 40мг	№7x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЕМАНЕРА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	капс. к/р у бл.	20мг	№7x2	14,61	30,27/€
ЕМАНЕРА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	капс. к/р у бл.	20мг	№7x1	16,15	30,27/€
ЕМАНЕРА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	капс. к/р у бл.	40мг	№7x2	10,59	30,27/€
ЕМАНЕРА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	капс. к/р у бл.	40мг	№7x1	11,61	30,27/€
ЕСОЗОЛ	СТЕРИЛ-ДЖЕН ЛАЙФ САЙЄНСИЗ (П) ЛТД, Індія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. та інфуз. у фл.	40мг	№1, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЕСОМ	Аспіро Фарма Лімітед, Індія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. та інфуз. у фл.	40мг	№1	174,10	26,76/\$
ЗЕРЦИМ	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл. г/р у бл.	20мг, 40мг	№7x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НЕКСІУМ	АстраЗенека АБ, Швеція	пор. д/р-ну д/ін'єк. та інфуз. у фл.	40мг	№10	84,50	26,60/\$
НЕКСІУМ	АстраЗенека АБ, Швеція	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№7x1	29,91	26,79/\$
НЕКСІУМ	АстраЗенека АБ, Швеція	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№7x2	31,01	26,79/\$
НЕКСІУМ	АстраЗенека АБ, Швеція	табл., вкриті п/о у бл.	40мг	№7x2	19,29	26,79/\$
НЕКСПРО-20	Торрент Фармасьютикалс Лтд, Індія	табл. в/о, к/р у бл.	20мг	№10x2, №7x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НЕКСПРО-40	Торрент Фармасьютикалс Лтд, Індія	табл. в/о, к/р у бл.	40мг	№10x2, №7x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПЕМОЗАР	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	табл. г/р у бл. та фл.	20мг, 40мг	№7x2, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПЕМОЗАР	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд., Індія	пор. ліоф. д/р-ну д/ін'єк. та інфуз. у фл.	40мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПОМПЕЗО	Мефар Ілач Сан. А.Ш., Туреччина	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	40мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Деклансопразол (Dexlansoprazole)**

Фармакотерапевтична група: A02B C06 - Інгібітори протонної помпи.

Основна фармакотерапевтична дія: Належить до класу антисекреторних сполук, які є заміщеними бензimidазолами, що пригнічують секрецію к-ти шл. соку за рахунок специфічного пригнічення активності (H⁺, K⁺)-АТФази на секреторній поверхні парієтальних клітин шлунка.

Показання для застосування ЛЗ: лікування всіх стадій ерозивного езофагіту у пацієнтів віком 12 років та старше впродовж періоду до 8 тижнів; підтримує лікування ерозивного езофагіту та полегшення печії у пацієнтів віком 12 років та старше впродовж періоду до 6 міс.в у дорослих пацієнтів та 16 тижнів у пацієнтів віком від 12 до 17 років; лікування печії, асоційованої з симптоматичною неерозивною гастроєзофагеальною рефлюксною хворобою, у пацієнтів віком 12 років та старше протягом 4 тижнів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймати незалежно від прийому їжі; пацієнти віком 12 років та старше: лікування ерозивного езофагіту - 60 мг 1 р/день до 8 тижнів; підтримує лікування ерозивного езофагіту та полегшення печії - 30 мг 1 р/день не перевищувати термін 6 міс. у дорослих пацієнтів та 16 тижнів - у пацієнтів

віком від 12 до 17 років; лікування печії, асоційованої з симптоматичною неерозивною гастроєзофагеальною рефлюксною хворобою - 30 мг 1 р/день 4 тижні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: В-клітинна лімфома, діарея, асоційована з *Clostridium difficile*, шкірний та системний червоний вовчак; лімфаденопатія, аутоімунна гемолітична анемія, ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура, підвищення рівня нейтрофілів, зниження середньої концентрації гемоглобіну в еритроцитах, анемія, нейтропенія; стенокардія, аритмія, брадикардія, біль у грудях, набряки, інфаркт міокарда, серцебиття, тахікардія; біль у вухах, шум у вухах, вертиго, глухота, слухові галюцинації; нечіткість зору, подразнення очей, набряк очей; дисфонія, набряк ротової порожнини, панкреатит; дискомфорт у ділянці живота, біль у животі, дискомфорт у ділянці заднього проходу, стравохід Барретта, безоар, аномальні шуми кишкового тракту, неприємний запах з рота, мікроскопічний коліт, поліпи товстої кишки, запори, сухість у роті, дуоденіт, диспепсія, дисфагія, ентерит, відрижка, езофагіт, поліп шлунка, гастрит, поліпи фундальних залоз, нудота, блювання, метеоризм, гастроентерит, розлади у роботі шлунка та дванадцятипалої кишки, ГЕРХ, виразка та перфорація виразки шлунка та кишкового тракту, блювання кров'ю, гематохезія, геморой, порушення евакуації їжі зі шлунка, синдром подразненої товстої кишки, слизисті випорожнення, гострий холецистит, виразки слизової оболонки ротової порожнини, болісні випорожнення, проктит, парестезія ротової порожнини, кровотеча з прямої кишки, позиви до блювання, тенезми; печінкова колика, жовчнокам'яна хвороба, гепатомегалія, гепатит, спричинений введенням лікарського засобу; астения, біль у грудях, озноб, болісні відчуття, запалення, запалення слизової оболонки, утворення вузлуватого потовщення, біль, гарячка, набряк обличчя; анафілактичний шок, анафілаксія, ексфоліативний дерматит, синдром Стівенса – Джонсона, токсичний епідермальний некроліз (може бути летальним), реакції гіперчутливості; тонзиліт, фолікуліт, інфекції ВДШ, інфекції *Candida*, грип, назофарингіт, орофарингеальний біль, оральний герпес, фарингіт, синусит, вірусні інфекції, інфекції зовнішніх статевих органів та піхви, оперізувальний герпес; падіння, переломи кісток, розтягнення зв'язок суглоба, больові відчуття при застосуванні, фоточутливість; підвищення рівнів АЛП, АСТ, ЛФ, підвищення/зниження рівнів білірубіну, підвищення рівнів креатиніну, гастрину, глюкози, калію у крові, відхилення результатів печінкових проб, зниження рівня тромбоцитів, збільшення рівня загального білка, збільшення маси тіла; зміни апетиту, дегідратація, гіперкальціємія, гіпокаліємія, гіпомангіємія, гіпонатріємія, дефіцит ціанкобаламіну, гіпомангіємія гіперліпідемія, ожиріння за центральним типом, цукровий діабет, зоб, гіпотиреоз; артралгія, артрит, спазми, скелетно-м'язовий біль, міалгія, бурсит; зміни смаку, судоми, запаморочення, головний біль, мігрень, порушення пам'яті, парестезія, психомоторна гіперактивність, тремор, невралгія трійчастого нерва, порушення мозкового кровообігу, транзиторна ішемічна атака; порушення сну, занепокоєння, депресія, безсоння, зміни лібідо; дизурія, невідкладні позиви до сечовипускання, гострий інтерстиціальний нефрит, гостра ниркова недостатність; дисменорея, болісні відчуття під час статевого акту, гіперменорея, розлади менструального циклу; набряк глотки, біль у горлі, аспірація, астма, бронхіт, кашель, задишка, носова кровотеча, гикавка, гіпервентиляція, застійні явища у дихальній системі; акне, дерматит, еритема, свербіж, ураження шкіри, кропив'янка, генералізовані висипання, лейкоцитокластичний васкуліт; тромбоз глибоких вен, припливи жару, гіпертензія, синдром неспокійних ніг, млявість.

Протипоказання до застосування ЛЗ: Підвищена чутливість до активної речовини та будь-якого компонента препарату, одночасне застосування з препаратами, що містять рилпівірін.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДЕКСІЛАНТ®	Такеда Фармасьютикал Компані Лімітед (виробництво нерозфасованої продукції)/Такеда Ірландія Лтд (виробництво нерозфасованої продукції)/Делфарм Новара С.р.л. (первинне та вторинне пакування, дозвіл на випуск серії), Японія/Ірландія/Італія	капс. з м/в тверді у бл.	30мг, 60мг	№14x1, №14x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	

3.1.4. Інші засоби для лікування кислотозалежних захворювань

- **Сукральфат (Sucralfate)** ^[ГПМД]

Фармакотерапевтична група: A02BX02 - засоби для лікування пептичної виразки та гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби.

Основна фармакотерапевтична дія: аніонний сульфатований дисахарид, що складається з сульфата сахарози та алюмінію гідроксиду; прискорює загоєння виразок та попереджає їх рецидив не чинить системної дії; зв'язується з білками некротичної тканини у місці виразки, утворюючи захисне покриття, що знижує дії пепсину, шлункового соку і жовчних солей на уражені тканини; знижує активність пепсину до 30 %; прискорює лікування виразки ДПК і виразки шлунка, лікуючи незначні і помірні запалення стравоходу; запобігає рецидивам виразки ДПК та утворенню виразок, що розвиваються внаслідок стресу, а також поглинання фосфатів зі ШКТ.

Показання для застосування ЛЗ: у складі комплексного лікування пептичних виразок шлунка та ДПК ^{БНФ, ПМД} та профілактики рецидиву, ГЕРХ; для зниження гіперфосфатемії у пацієнтів з уремією, які перебувають на діалізі; ушкодження слизової оболонки ШКТ, зумовленого стресом (стресові виразки ^{БНФ}) або застосуванням НПЗЗ (профілактика і лікування).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо дорослим та дітям віком від 14 років: приймати натщесерце за півгодини або за 1 год до їди; пептичні виразки шлунка чи ДПК ^{БНФ}: по 1 табл. 4 р/добу - 1 табл. перед кожним основним прийомом їжі (сніданок, обід, вечеря) та 1 табл. безпосередньо перед сном або по 2 табл. 2 р/добу; зазвичай тривалість лікування 4-6 тижнів, у разі необхідності лікування можна продовжити, але не довше 12

тижнів^{БНФ} (до того часу, коли аналізи підтвердять загоєння виразки); ГЕРХ: по 1 табл. 4 р/добу - 1 табл. перед кожним основним прийомом їжі (сніданок, обід, вечеря) та 1 табл. безпосередньо перед сном, курс лікування до 12 тижнів; гіперфосфатемія: по 1 табл. 4 р/добу - по 1 табл. перед кожним основним прийомом їжі (сніданок, обід, вечеря) та 1 табл. безпосередньо перед сном; щоденна доза може бути зменшена; **профілактика стресових виразок:** по 1 табл. 6 р/добу; МДД - 8 г (8 табл.)^{БНФ}; **профілактика рецидиву Н. рylori-негативної виразки ДПК:** по 1 табл. 2 р/добу, приймати протягом 4-8 тижнів після загоєння виразки.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: вертиго, запаморочення, сонливість, ↑ рівня алюмінію в тканинах, енцефалопатія; запор, діарея, нудота, блювання, метеоризм, сухість у роті, безоар; висип, кропив'янка, свербіж; біль у нижній частині спини; ↓ вмісту фосфору в організмі, гіперкальціурія, остеомаліяція, деменція, мікроцитарна анемія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до сукральфату або інших компонентів препарату, тяжка ниркова недостатність, хвороба Альцгеймера, звичний запор, хр. діарея, тяжкий біль у животі неуточненого генезу, гіпофосфатемія.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ВЕНТЕР	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	1г	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Вісмуту субцитрат (Bismuth subcitrate) **** [ПМД]

Фармакотерапевтична група: A02BX05 - засоби для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.

Основна фармакотерапевтична дія: Має гастропротекторну дію; у кислому середовищі шлунка утворює на поверхні виразок і ерозій захисну плівку, що сприяє їх рубцюванню і захищає від впливу шлункового соку; збільшує синтез простагландину E2, стимулює утворення слизу і бікарбонатів, призводить до накопичення епідермального фактора росту в зоні дефекту, знижує активність пепсину і пепсиногену; має антимікробну, бактерицидну активність щодо Н. Рylori.

Показання для застосування ЛЗ: виразкова хвороба шлунка і ДПК^{ПМД}, гастрит, у тому числі спричинені Н. рylori (у складі схем протихелікобактерної терапії)^{ПМД}, хр. гастрит, гастродуоденіт в фазі загострення, в тому числі спричинений Н. рylori.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим і дітям від 14 років: по 1 табл./капс. 4 р/добу за 30 хв до їди та на ніч або по 2 табл./капс. 2 р/добу; дітям від 8 до 14 років: по 1 табл./капс. 2 р/добу за 30 хв до їди; дітям від 4 до 8 років: 8 мг/кг/добу; добове дозування розподіляти на 2 прийоми, але не більше 2 табл./капс. на добу; тривалість курсу лікування - 4-8 тижнів, протягом наступних 8 тижнів не приймати препарати, які містять вісмут; при наявності Н. рylori використовувати у схемах лікування: при квадротерапії - 120 мг 4 р/добу з тетрацикліном 500 мг 4 р/добу, метронідазолом 500 мг 3 р/добу та інгібітором протонної помпи (омепразолом, ланзапрозолем, рабепразолом, пантопрозолем або езомепразолом) у стандартній терапевтичній дозі 2 р/добу; тривалість комбінованої терапії - 10-14 днів; для поліпшення регенерації виразкового дефекту можливе подальше лікування: по 1 капс. 4 р/добу за 30 хв до сніданку, обіду і вечері, 4-й раз - перед сном; загальна тривалість терапії - до 6 тижнів (максимум - 8 тижнів).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: випорожнення чорного кольору, нудота, блювання, запор, діарея; шкірні алергічні реакції легкого ступеня - висипання, свербіж; анафілактична реакція.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; тяжка ниркова недостатність.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,48 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ВІС-НОЛ®	ПАТ "Фармак", Україна	капс. у бл.	120мг	№10x10	10,80	
	ВІС-НОЛ®	ПАТ "Фармак", Україна	капс. у бл.	120мг	№10x3	12,00	
	ГАСТРО-НОРМ®	ПАТ "Галичфарм"/ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	120мг	№10x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГАСТРО-НОРМ®	ПАТ "Галичфарм"/ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	120мг	№10x10	8,00	
II.	ДЕ-НОЛ®	Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нідерланди	табл., вкриті п/о у бл.	120мг	№8x14	14,59	30,50/€
	ДЕ-НОЛ®	Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нідерланди	табл., вкриті п/о у бл.	120мг	№8x7	15,91	30,50/€
	УЛЬКАВІС®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	120мг	№14x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	УЛЬКАВІС®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне	табл., вкриті п/о у бл.	120мг	№14x2	12,80	30,27/€

		та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія					
УЛЬКАВИС®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	120мг	№14x8	9,50	30,27/€	

- **Подорожник великий (Plantago major)** ** (див. п. 3.17. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

3.2. Лікарські засоби, що застосовуються для ерадикації

Helicobacter pylori

3.2.1. Антибактеріальні засоби, що застосовуються для ерадикації

Helicobacter pylori

З метою ерадикації *H. Pylori* рекомендовано застосовувати препарати антибактеріальної дії. Інформацію стосовно препаратів, що містять метронідазол, тетрациклін, левофлоксацин див. п.17.2.9. розділу «ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ».

- **Метронідазол (Metronidazole)** * [ГМД] (див. п. 17.2.9., п. 17.6.3., п. 17.6.5. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Тетрациклін (Tetracyclin)** [ГМД] (див. п. 17.2.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

3.3. Спазмолітичні засоби

3.3.1. Синтетичні антихолінергічні засоби

- **Мебеверин (Mebeverine)** [ГМД] [крім табл. по 135 мг]

Фармакотерапевтична група: А03АА04 - засоби, що застосовуються при функціональних шлунково-кишкових розладах. Синтетичні антихолінергічні засоби, естерифіковані третинні аміни.

Основна фармакотерапевтична дія: міотропний спазмолітик, що діє на гладкі м'язи ШКТ; знімає спазми без пригнічення нормальної моторики кишечника; типових антихолінергічних побічних ефектів немає.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування абдомінального болю і спазмів, здуття, кишкових розладів і відчуття дискомфорту в ділянці кишечника при с-мі подразненого кишечника^{БНФ}; лікування шлунково-кишкових спазмів^{БНФ} вторинного генезу, спричинених органічними захворюваннями.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим - по 1 табл. 3 р/добу приблизно за 20 хв до їди^{БНФ} або по 1 капс. 2 р/добу^{БНФ}; якщо симптоми зберігаються протягом більше 2 тижнів, слід проконсультуватися з лікарем; запивати достатньою кількістю води (не менше 100 мл).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР у вигляді кропив'янки, ангіоневротичного набряку, набряку обличчя і шкірних висипань; гіперчутливість (анафілактичні реакції).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активної речовини або до будь-якої допоміжної речовини.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АСПАЗМІН	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	капс. з м/в, тверді у бл.	200мг	№10x3	6,60	
	МЕВЕРИН®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	капс. у бл.	200мг	№10x3	6,60	
	СПАРК®	ПАТ "Фармак", Україна	капс. прол. дії, тверді у бл.	200мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СПАРК®	ПАТ "Фармак", Україна	капс. прол. дії, тверді у бл.	200мг	№10x3	5,50	
II.	ДУСПАТАЛІН®	Майлан Лабораторіс САС, Франція	табл., в/о у бл.	135мг	№15x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДУСПАТАЛІН®	Майлан Лабораторіс САС, Франція	капс. прол. дії, тверді у бл.	200мг	№10x3, №15x1, №15x2, №15x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МЕБСІН РЕТАРД®	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед, Індія	капс. у бл.	200мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	

- **Отилонію бромід (Otilonium bromide)**

Фармакотерапевтична група: А03АВ06 - засоби, що застосовуються при функціональних розладах з боку травного тракту. Синтетичні антихолінергічні засоби, четвертинні амонійні сполуки.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить спазмолітичну дію на гладку мускулатуру дистального відділу ШКТ (ободова та пряма кишка) шляхом зміни току іонів Ca^{2+} між клітинним та позаклітинним простором, зменшуючи тригерний фактор скорочувальної активності; інгібує відкриття кальцієвих каналів L-типу та проникнення іонів Ca^{2+} у гладку мускулатуру кишечника; додатковий фармакодинамічний ефект досягається шляхом інгібування тахікінінових та мускаринових рецепторів.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування синдрому подразненого кишечника (СПК) і спазмів дистальних відділів кишечника (ободової та прямої кишки), що супроводжуються болем, полегшення абдомінального болю, здуття живота та порушення перистальтики у пацієнтів віком від 18 років, зумовлених спазмом гладкої мускулатури дистальних відділів кишечника.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована разова доза 40 мг, рекомендована добова доза 80-120 мг (1 табл. 2-3 р/добу); тривалість лікування індивідуальна; ковтати цілими та запивати склянкою води, приймати за 20 хв до їди.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сухість у роті, нудота, біль у верхній частині живота, реакції гіперчутливості (свербіж, еритема, кропив'янка, ангіоневротичний набряк), головний біль, запаморочення, слабкість, астенія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої або до будь-якої з допоміжних речовин.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	СПАЗМОМЕН®	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk"; пакування, контроль та випуск серій)/А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л., Німеччина/Італія	табл., вкриті п/о у бл.	40мг	№15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СПАЗМОМЕН®	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk"; пакування, контроль та випуск серій)/А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л., Німеччина/Італія	табл., вкриті п/о у бл.	40мг	№10x3	98,77	28,22/€

● **Прифінію бромід (Prifinium bromide) ****

Фармакотерапевтична група: А03АВ18 - засоби, що застосовуються при функціональних шлунково-кишкових розладах. Синтетичні антихолінергічні засоби, четвертинні амонійні сполуки.

Основна фармакотерапевтична дія: вибірково блокує периферичні м-холінорецептори слизової оболонки ШКТ, жовчовивідних і сечовивідних шляхів та матки; не проникає крізь ГЕБ; вибірково блокуючи м-холінорецептори, робить їх нечутливими до ацетилхоліну, який утворюється на закінченнях постгангліонарних парасимпатичних нервів; наслідком цього є зниження тону мускулатури стравоходу, кишечника, жовчного міхура, жовчних протоків, сечовивідних шляхів та матки, а також зниження секреції соляної кислоти, пепсину, зменшення зовнішньосекреторної активності підшлункової залози; не має негативного впливу на функцію печінки, нирок, кровотворної тканини.

Показання для застосування ЛЗ: біль, пов'язаний зі спазмами та гіперперистальтикою ШКТ - гастрит, виразка шлунка та ДПК, ентерит, коліт, після гастроектомії та при синдромі подразненого кишечника; біль, пов'язаний зі спазмами та дискінезією жовчовивідних протоків - холецистит, ЖКХ, панкреатит; біль при спазмах сечового тракту: камені у сечовому тракті, тенезми сечового міхура, цистит, пієліт; перед проведенням ендоскопії шлунка та шлунково-кишкової рентгенографії, при блюванні; дисменорея.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дітям віком до 3 місяців - по 1 мл кожні 6-8 год; 3-6 місяців - по 1-2 мл кожні 6-8 год; 6-12 місяців - по 2 мл кожні 6-8 год; 1-2 роки - по 5 мл кожні 6-8 год; 2-6 років - по 5-10 мл кожні 6-8 год; тривалість курсу лікування лікар визначає індивідуально; табл.: діти віком 6-12 р. - 15-30 мг 2-3 р/добу; дітям від 12 р. та дорослим - 30-60 мг 3 р/добу; при гострому різкому болю дорослим можна призначати 90 мг за 1 прийом.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР, у тому числі шкірні висипання, свербіж, гіперемія, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, почервоніння шкіри; нудота, блювання, запор, сухість у роті; затримка сечовипускання; порушення акомодатії, затуманення зору; головний біль, запаморочення, слабкість, тремор; припливи, тахікардія, підвищення АТ, відчуття серцебиття.

Протипоказання до застосування ЛЗ: глаукома: симптоми можуть посилюватися у зв'язку з підвищенням внутрішньоочного тиску; розлади сечовипускання, що спричинені гіпертрофією простати: симптоми можуть посилюватися, оскільки вони зумовлені розслабленням детрузора та скороченням м'язів сфінктера сечового міхура; серйозні захворювання серця: симптоми можуть посилюватися, оскільки прискорюється серцевий ритм; паралітична кишка непрохідність: симптоми можуть посилюватися, оскільки перистальтика ШКТ сповільнюється; підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	РІАБАЛ	Зе Араб Фармасьютікал Менуфекчурінг Ко. Лтд., Йорданія	сироп по 60мл у фл. з піпет.-доз.	7,5мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

РІАБАЛ	Зе Араб Фармасьютикал Менуфекчурінг Ко. Лтд., Йорданія	табл., вкриті п/о у бл.	30мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ
--------	--	-------------------------	------	-------	------------------------

• **Пінаверію бромід (Pinaverium bromide)**

Фармакотерапевтична група: A03AX04 - препарати, які застосовують при функціональних шлунково-кишкових розладах.

Основна фармакотерапевтична дія: спазмолітичний засіб, який діє селективно на ШКТ; як кальцієвий антагоніст він інгібує проникнення кальцію в клітини гладкої мускулатури кишечника; не має виражених антихолінергічних ефектів; не впливає на ССС.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування болю, тимчасових кишкових розладів і кишкового дискомфорту, пов'язаних із функціональними порушеннями кишечника; симптоматичне лікування болю при дисфункції жовчовивідних шляхів; підготовка до рентгенологічного дослідження кишечника з використанням барію.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос дорослі по 1 табл. 3 р/добу або 2 табл. 2 р/добу; за необхідності доза може бути збільшена до 2 табл. 3 р/добу; для підготовки до рентгенологічного дослідження кишечника з барієм приймати по 2 табл. 2 р/добу протягом 3 днів перед обстеженням

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперчутливість; абдомінальний біль, запор, печія, здуття, сухість у роті, диспепсія, діарея, нудота, блювання та дисфагія, ураження стравоходу при застосуванні препарату без дотримання відповідних рекомендацій; шкірні реакції, висипання, свербіж, кропив'янка та еритема, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок; астенія; головний біль, сонливість, запаморочення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активної р-ни чи допоміжних компонентів препарату

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,15 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДИЦЕТЕЛ®	Майлан Лабораторіз САС, Франція	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№20x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДИЦЕТЕЛ®	Майлан Лабораторіз САС, Франція	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№20x2	43,07	26,64/\$

• **Платифілін (Platyphylline)**

Фармакотерапевтична група: A03AX - засоби, що застосовуються при функціональних розладах травної системи. Інші засоби, що застосовуються при функціональних розладах кишечника.

Основна фармакотерапевтична дія: блокує М-холінорецептори, унаслідок чого порушується передача нервових імпульсів із закінчень постгангліонарних холінергічних волокон на клітини ефекторних органів, що іннервуються; виявляє прямий релаксуючий вплив на гладкі м'язи; блокує також Н-холінорецептори вегетативних гангліїв (значно слабкіше); має антихолінергічний дозозалежний ефект: у менших дозах інгібує секрецію слинних і бронхіальних залоз, потовиділення, акомодацию очей, спричиняє розширення зіниці, підвищення частоти серцевих скорочень; у великих дозах - знижує скоротливу активність травного тракту (включаючи жовчовивідні шляхи і жовчний міхур) і сечовивідних шляхів, пригнічує шлункову секрецію, пригнічує судиноруховий центр і блокує симпатичні ганглії, внаслідок чого розширюються судини і знижується артеріальний тиск (головним чином при внутрішньовенному введенні); холіноблокуюча дія більшою мірою виявляється на тлі підвищеного тону парасимпатичної частини нервової системи або дії М-холіностимуляторів; зменшуючи вплив блукаючого нерва, поліпшує провідність серця, підвищує збудливість міокарда, збільшує серцевий викид; спричиняє розширення дрібних судин шкіри; спричиняє розслаблення гладкої мускулатури матки, сечового міхура і сечовивідних шляхів; діючи спазмолітично, усуває больовий синдром; розслабляє гладку мускулатуру бронхів при її спазмуванні, спричиненому підвищенням тону блукаючого нерва або холіностимуляторами; збільшує об'єм дихання, пригнічує секрецію бронхіальних залоз; при парентеральному введенні спричиняє розширення зіниці внаслідок розслаблення кругового м'яза райдужної оболонки, одночасно підвищується внутрішньоочний тиск і настає параліч акомодатії (розслаблення війкового м'яза циліарного тіла); збуджує головний мозок (більшою мірою спинний мозок) і дихальний центр, проникає крізь гематоенцефалічний бар'єр

Показання для застосування ЛЗ: у складі комплексної терапії: гастродуоденіт, функціональна диспепсія, пілороспазм, холецистит, холелітіаз, кишкова коліка, ниркова коліка, жовчна коліка; БА (для попередження бронхоспазму), бронхорея; альгодисменорея; спазм церебральних артерій; ангіотрофоневроз.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим і дітям віком від 15 років п/ш: для купірування спастичного болю, тривалого нападу БА, церебральних і периферичних ангіоспазмів - по 1-2 мл р-ну 1-2 р/добу; при курсовому лікуванні п/ш вводять 1-2 мл р-ну 1-2 р/добу протягом 10-15-20 днів; максимальні дози для дорослих: разова - 10 мг, добова - 30 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сухість у роті, відчуття спраги, порушення смакових відчуттів, дисфагія, зменшення моторики кишечника аж до атонії, зменшення тону жовчовивідних шляхів і жовчного міхура; утруднення і затримка сечовипускання; тахікардія, аритмія (включаючи екстрасистолію), почервоніння обличчя, припливи, зниження АТ; головний біль, запаморочення, дизартрія, збудження ЦНС, безсоння, тривога, амнестичний с-м; мідріаз, фотофобія, параліч акомодатії, підвищення внутрішньоочного тиску; зменшення секреторної активності і тону бронхів, що призводить до утворення в'язкого мокротиння, яке важко відкашлюється; шкірні висипання, кропив'янка, екзофіліативний дерматит, зменшення потовиділення, сухість шкіри; анафілактичні реакції (включаючи анафілактичний шок).

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до компонентів препарату; захворювання ССС, при яких збільшення частоти СС може бути небезпечним: миготлива аритмія, тахікардія, хр. СН, ІХС, мітральний

стеноз, тяжка АГ; г. кровотеча; тиреотоксикоз; гіпертермічний с-м; захворювання ШКТ, що супроводжуються непрохідністю: ахалазія стравоходу, стеноз ворота, атонія кишечника; глаукома; печінкова і ниркова недостатність; міастенія; затримка сечі або схильність до неї; пошкодження мозку.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у конт. чар/уп.	2 мг/мл	№5x2	62,53	
	ПЛАТИФІЛІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у бл.	2 мг/мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПЛАТИФІЛІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1 мл у бл. або кор.	2 мг/мл	№10x1, №10	84,59	

3.3.2. Папаверин та його похідні

- **Папаверин (Papaverine)** ** [ГМД] (див. п. 2.7.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: спазм гладеньких м'язів: органів черевної порожнини (холецистит, пілороспазм, спастичний коліт, ниркова коліка, синдром подразненого кишечника, напади жовчокам'яної хвороби, спазми сечовивідних шляхів); периферичних судин (ендартеріїт); судин головного мозку

Спосіб застосування та дози ЛЗ: супозиторії (вводити глибоко у задній прохід після очищувальної клізми або природного випорожнення кишечника): дорослим застосовувати по 1 супозиторію 2-3 р/добу; тривалість застосування залежить від ступеня тяжкості та перебігу захворювання і визначається лікарем індивідуально

Визначена добова доза (DDD): ректально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ПАПАВЕРИН	Фарміна Лтд, Польща	супоз. у бл.	20мг	№5x2	47,31	28,33/€

- **Дротаверин (Drotaverine)** ** [ГМД] [тільки таблетки, супозиторії] (див. п. 12.1.2.3. розділу "УРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ, СЕКСОПАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: A03AD02 - засоби, які застосовуються при функціональних шлунково-кишкових розладах.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить спазмолітичну дію на гладку мускулатуру шляхом пригнічення дії ферменту фосфодіестерази IV (ФДЕ IV), що спричиняє збільшення концентрації цАМФ і, завдяки інактивації легкого ланцюжка кінази міозину (MLCK), призводить до розслаблення гладкого м'яза; ефективний при спазмах гладкої мускулатури як нервового, так і м'язового походження; діє на гладку мускулатуру шлунково-кишкової, біліарної, сечостатевої та судинної систем незалежно від типу їхньої автономної іннервації; посилює кровообіг у тканинах завдяки своїй здатності розширювати судини.

Показання для застосування ЛЗ: злікувальною метою при: спазмах гладкої мускулатури, пов'язаних із захворюваннями біліарного тракту: холецистолітіаз, холангіолітіаз, холецистит, перихолецистит, холангіт, папіліт; спазмах гладкої мускулатури при захворюваннях сечового тракту: нефролітіазі, уретеролітіазі, пієліті, циститі, тенезмах сечового міхура; як допоміжне лікування при: спазмах гладкої мускулатури ШКТ: виразкова хвороба шлунка та ДПК^{ГМД}, гастрит, кардіо- та/або пілороспазм, ентерит, коліт, спастичний коліт із запором і с-м подразненого кишечника, що супроводжується метеоризмом; головний біль напруження; при гінекологічних захворюваннях (дисменорея).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл: дорослі: середня доза 120-240 мг/добу за 2-3 прийоми; дітям: 6-12 років - МДД 80 мг (за 2 прийоми); старше 12 років - МДД 160 мг (за 2-4 прийоми); р-н для ін'єкц.: середня добова доза для дорослих 40-240 мг (за 1-3 окремих введення) в/м; при г. коліках у дорослих хворих із каменями у сечових або жовчних шляхах - 40-80 мг в/в; супозиторії ректальні: для дорослих і дітей віком від 12 років - по 1 супозиторію 2 р/добу; тривалість лікування лікар визначає індивідуально.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР: ангіоневротичний набряк, кропив'янка, висипання, свербіж, гіперемія шкіри, пропасниця, озноб, підвищення t° тіла, слабкість, анафілактичний шок та бронхоспазм (ін'єкц.); прискорене серцебиття, артеріальна гіпотензія; головний біль, запаморочення, безсоння; нудота, запор, блювання; місцеві реакції у місці введення ін'єкції.

Противіказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату (особливо до метабісульфіту натрію); підвищена чутливість до натрію дисульфідату; тяжка печінкова, ниркова або СН (с-м малого серцевого викиду).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,1 г., парентерально - 0,1 г., ректально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДРОТАВЕРИН	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою , Україна/ Україна	табл. у бл. в кор. та без	40мг	№10x1, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДРОТАВЕРИН	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою , Україна/ Україна	табл. у бл. в кор.	40мг	№10x2	2,96	
	ДРОТАВЕРИН	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	табл. у бл.	0,04г	№10x2	2,75	
	ДРОТАВЕРИН	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	табл. у бл.	0,04г	№10x1	3,00	
	ДРОТАВЕРИН	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	р-н д/ін'ек. в амп. по 2мл у касеті	20 мг/мл	№5x2, №5x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДРОТАВЕРИН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	40мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДРОТАВЕРИН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	40мг	№10x1	2,20	
	ДРОТАВЕРИН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	40мг	№10x3	2,40	
	ДРОТАВЕРИН ФОРТЕ	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	табл. у бл.	80мг	№20x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДРОТАВЕРИН ФОРТЕ	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	табл. у бл.	80мг	№10x2	2,19	
	ДРОТАВЕРИН ФОРТЕ	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	табл. у бл.	80мг	№10x1	2,31	
	ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	40мг	№10x3	2,64	
	ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	40мг	№10x2	2,72	

ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'ек. по 2мл в амп. у конт. чар/уп.	20 мг/мл	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ
ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'ек. по 2мл в амп. у конт. чар/уп.	20 мг/мл	№5x1	11,74
ДРОТАВЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл.	40мг	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ
ДРОТАВЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл. в пач.	40мг	№10x2	2,56
НО-Х-ША®	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	супоз. рект. у бл.	0,04г	№5x2	65,00
НО-Х-ША®	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	табл. у бл.	0,04г	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ
НО-Х-ША®	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	табл. у бл.	0,04г	№10x3	2,51
НО-Х-ША®	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'ек. по 2мл в амп. у пач.	20 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ
НО-Х-ША®	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'ек. по 2мл в амп. у пач.	20 мг/мл	№100	9,25
НО-Х-ША®	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'ек. по 2мл в амп. у бл.	20 мг/мл	№5x1	9,35
НО-Х-ША® ФОРТЕ	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	табл. у бл.	0,08г	№10x3	1,87
НОХШАВЕРИН "ОЗ"	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	р-н д/ін'ек. по 2мл в амп. у бл.	20 мг/мл	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ
НОХШАВЕРИН "ОЗ"	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	р-н д/ін'ек. по 2 мл в амп. у пач.	20 мг/мл	№5	9,00
II. НІСПАЗМ ФОРТЕ®	мібе ГмбХ Арцнайміттель, Німеччина	табл. вкриті п/о у бл.	80мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ
НО-ШПА®	ХІНОЇН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд. Підприємство 2 (підприємство Верешедьхаз)/Санофі – Авентіс Сп. з о.о., Угорщина/Польща	табл. у бл., конт. та фл.	40мг	№12x1, №24x1, №60, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ
НО-ШПА®	ХІНОЇН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд., Підприємство №3 (Підприємство в Чаніквельдь), Угорщина	р-н д/ін'ек. в амп. по 2мл у піддоні	20 мг/мл	№5x5	відсутня у реєстрі ОБЦ
НО-ШПА® КОМФОРТ	ХІНОЇН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд. Підприємство 2 (підприємство Верешедьхаз), Угорщина	табл. вкриті п/о у бл.	40мг	№24x1	відсутня у реєстрі ОБЦ
НО-ШПА® ФОРТЕ	ХІНОЇН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд. Підприємство 2 (підприємство Верешедьхаз)/Санофі-Авентіс Сп. з о.о., Угорщина/Польща	табл. у бл.	80мг	№24x1	відсутня у реєстрі ОБЦ

3.3.3. Препарати красавки (беладони) та її похідних

- **Атропін (Atropine) ***

Фармакотерапевтична група: A03BA01 - Засоби для лікування функціональних гастроінтестинальних розладів. Алкалоїди красавки (беладони), третичні аміни. Атропін

Основна фармакотерапевтична дія: вибіркова блокада М-холінорецепторів (меншою мірою впливає на Н-холінорецептори), внаслідок чого останні стають нечутливими до ацетилхоліну, що утворюється у ділянці закінчень постгангліонарних парасимпатичних нейронів; здатність атропіну зв'язуватися з холінорецепторами пояснюється присутністю у його молекулі фрагмента, який надає йому спорідненості з молекулою ендogenous лінганду - ацетилхоліну; зменшує секрецію слинних, бронхіальних, шлункових і потових залоз, підвищує в'язкість бронхіального секрету, пригнічує активність війок миготливого епітелію бронхів, знижуючи тим самим мукоциліарне транспортування, пришвидшує скорочення серця, підвищує АВ-провідність, знижує тонус гладком'язових органів, зменшує кількість і загальну кислотність шлункового соку (особливо при переважанні холінергічної регуляції секреції), знижує базальну та нічну секрецію шлункового соку, меншою мірою знижує стимульовану секрецію, виражено розширює зіницю (при цьому можливе підвищення внутрішньоочного тиску); проникаючи крізь гематоенцефалічний бар'єр (ГЕБ), атропін у терапевтичних дозах збуджує дихальний центр.

Показання для застосування ЛЗ: як симптоматичний засіб при виразковій хворобі шлунка та ДПК, пілороспазмі, г. панкреатиті, жовчокам'яній хворобі, холециститі, спазмах кишечника, сечовивідних шляхів, БА, брадикардії^{BOO3}, внаслідок підвищення тону блукаючого нерва, для зменшення секреції слинних^{BOO3}, шлункових, бронхіальних, іноді - потових залоз, для проведення рентгенологічного дослідження травного тракту (зменшення тону і рухової активності органів); ЛЗ показаний для застосування перед наркозом і операцією та під час хірургічної операції як засіб, що запобігає бронхо- і ларингоспазмам, зменшує секрецію залоз, рефлексорні реакції і побічні ефекти, зумовлені збудженням блукаючого нерва; як специфічний антидот при отруєннях холіноміметичними сполуками та антихоліностеразними (у тому числі фосфорорганічними) речовинами^{BOO3}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять п/ш, в/м, в/в; для дітей вища разова доза залежно від віку становить: віком до 6 місяців - 0,02 мг; від 6 місяців до 1 року - 0,05 мг; від 1 до 2 років - 0,2 мг; від 3 до 4 років - 0,25 мг; від 5 до 6 років - 0,3 мг; від 7 до 9 років - 0,4 мг; від 10 до 14 років - 0,5 мг; при вступному наркозі^{BOO3} з метою зменшення ризику пригнічення вагусом ЧСС і зменшення секреції слинних і бронхіальних залоз - 0,3-0,6 мг п/ш або в/м за 30-60 хв до анестезії^{BOO3}; у комбінації з морфіном (10 мг морфіну сульфату) - за 1 год до анестезії; при отруєнні антихоліностеразними препаратами - по 2 мг в/м кожні 20-30 хв до виникнення почервоніння і сухості шкіри, розширення зіниць і появи тахікардії, нормалізації дихання; при помірному і тяжкому отруєнні - вводити протягом 2-х днів (до появи ознак «переатропінізації»); вищі дози для дорослих п/ш: разова - 1 мг, добова - 3 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сухість у роті, відчуття спраги, порушення смакових відчуттів, дисфагія, утруднення спілкування, зменшення моторики кишечника аж до атонії, запори, рефлюкс, зменшення тону сечовивідних шляхів та жовчного міхура, пригнічення шлункової секреції, нудота, блювання, відчуття здуття; утруднення та затримка сечовипускання; транзитрна брадикардія, тахікардія, серцебиття та аритмія, включаючи екстрасистолію, аритмія передсердь, фібриляція шлуночків, ішемія міокарда, гіпертонічний криз, почервоніння обличчя, відчуття припливів; головний біль, неспокій, атаксія, запаморочення, нервозність, порушення координації, порушення свідомості та/або галюцинації, гіпертермія, психічні порушення, судоми, сонливість, безсоння; розширення зіниць, фотофобія, параліч акомодатії, підвищення внутрішньоочного тиску, порушення зору; зменшення секреторної активності та тону бронхів, що призводить до утворення в'язкого мокротиння, що тяжко відкашлюється; реакції гіперчутливості, шкірні висипання, кропив'янка, екзfolіативний дерматит; анафілактичні реакції, анафілактичний шок; зменшення потовиділення, сухість шкіри, дизартрія, зміни у місці введення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату; захворювання ССС, при яких збільшення ЧСС може бути небажаним: миготлива аритмія, тахікардія, хр. СН, ІХС, мітральний стеноз, тяжка АГ; г. кровотеча; тиреотоксикоз; гіпертермічний с-м; захворювання травного тракту, що супроводжуються непрохідністю (ахалазія стравоходу, стеноз воротаря, атонія кишечника); глаукома; печінкова і ниркова недостатність; міастенія *gravis*; затримка сечі або схильність до неї; ураження мозку.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 1,5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АТРОПІН-ДАРНИЦЯ®	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у конт. чар/уп.	1 мг/мл	№5x2	5,78	
	АТРОПІНУ СУЛЬФАТ	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у кор. та бл.	1 мг/мл	№10, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АТРОПІНУ СУЛЬФАТ	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у бл.	1 мг/мл	№10x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АТРОПІНУ	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС"	р-н д/ін'єк. в	1 мг/мл	№10	6,45	

СУЛЬФАТ	(контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	амп. по 1 мл у пач.				
---------	---	---------------------	--	--	--	--

- **Бутилскополамін (Butylscopolamine)** [окрім табл., екритих ц/о по 10 мг, супозиторіє]

Фармакотерапевтична група: A03BB01 - засоби для лікування функціональних розладів травного тракту. Напівсинтетичні алкалоїди красавки (беладони), четвертинні амонійні сполуки.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить спазмолітичну дію на гладкі м'язи ШКТ, жовчних шляхів і сечостатевого тракту; як похідна речовина четвертинної амонієвої сполуки, не потрапляє у ЦНС, тому антихолінергічні побічні ефекти з боку ЦНС не виникають; периферичні антихолінергічні ефекти обумовлюються гангліоблокуючою дією у судинній стінці, а також антимускариновою активністю.

Показання для застосування ЛЗ: спазм ШКТ від легкого до помірного ступеня, сечостатевого тракту та симптомів с-му подразненого кишечника.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо: дорослі та діти віком від 12 років - по 2 табл. 4 р/добу; для полегшення симптомів с-му подразненого кишечника: початкова доза 1 табл. 3 р/добу, потім можна підвищити до 2 табл. 4 р/добу; діти віком від 6 до 12 років: по 1 табл. 3 р/добу; табл. запивати достатньою кількістю рідини; супоз.: вводить у пряму кишку після її очищення по 1-2 супоз. 3-5 р/добу, разова доза 10-20 мг, МДД 100 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тахікардія; порушення акомодатії особливо у пацієнтів з гіперметропією, гострий напад глаукоми; сухість у роті, нудота, блювання, запор; затримка сечі, дизурія; дисгідроз, сухість шкіри; запаморочення, зниження АТ, припливи; анафілактичний шок, у тому числі з летальним наслідком, анафілактичні реакції, диспное, шкірні реакції (наприклад кропив'янка, висипання, еритема, свербіж та інші прояви гіперчутливості); стомленість.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до гіосцину бутилброміду або будь-якого іншого компонента препарату; міастенія гравіс, мегаколон, вузькокутова глаукома, затримка сечі з субвезикальною обструкцією (доброякісна гіперплазія простати), тахіаритмія і тахікардія, механічні стенози ШКТ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БУСКОПАН®	Дельфарм Реймс, Франція	табл., в криті ц/о у бл.	10мг	№20x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БУСКОПАН®	Берінгер Інгельхайм Еспана, СА, Іспанія	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл в кор.	20 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

3.4. Антифлатуленти

- **Симетикон (silicones) ****

Фармакотерапевтична група: A03AX13 -засоби, що застосовуються при функціональних шлунково-кишкових розладах. Силікони.

Основна фармакотерапевтична дія: стабільний полідиметилсилоксан, що має поверхнево активні властивості; змінює поверхневий натяг пухирців газу, які знаходяться в харчовій каші та в слизу ШКТ, внаслідок чого вони розпадаються; гази, що при цьому вивільняються, можуть потім всмоктуватися стінкою кишечника, а також виводитися назовні; дія симетикону має фізичний характер; він не вступає в хімічні реакції, у фармакологічному і фізіологічному відношеннях інертний.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування при скаргах з боку шлунково-кишкового тракту, спричинених підвищенням накопиченням газів, наприклад, при метеоризмі^{БНФ} (біль у животі, здуття), в тому числі в післяопераційний період; коліки у немовлят; як допоміжний засіб для діагностичних досліджень органів черевної порожнини (рентгенологічне та/або УЗД) та підготовка до гастродуоденоскопії; в якості піногасника при інтоксикаціях поверхнево-активними речовинами (пральні порошки або миючі засоби).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: капс. 120 мг - дорослі: рекомендована доза не більше 4 капс./добу (по 1 капс. після кожного основного прийому їжі), запиваючи склянкою води, тривалість лікування становить не більше 10 днів; капс. 40 мг - діти старше 6 років, підлітки та дорослі приймають по 2 м'які капс. (80 мг) 3-4 р/добу, під час або після їди, а за необхідності - перед сном; тривалість лікування залежить від наявності скарг; за необхідності, можна приймати протягом тривалого часу; для підготовки до рентгенологічних та/або ультразвукових досліджень - по 2 м'які капс. 3 р/добу (240 мг) за добу до дослідження та 2 м'які капс. (80 мг) у день проведення дослідження, вранці; для лікування дітей молодше 6 років застосовують препарат у вигляді емульсії 100 мг/мл - немовлята: 5-10 крап. на пляшку при кожному годуванні або 5-10 крап. перед кожним годуванням груддю (дають дитині за допомогою ч. л.); діти 1-6 років - по 10 крап. 3-5 р/добу; діти 6-14 років - по 10-20 крап. 3-5 р/добу; діти від 14 років та дорослі - по 20 крап. 3-5 р/добу; для підготовки до рентгенологічного або ультразвукового дослідження дорослим - по 1 мл після їди 3 р/добу перед проведенням дослідження та 1 мл вранці в день обстеження; як додаток до суспензії контрастних речовин додають дорослим - від 2 до 4 мл на 1 літр суспензії для проведення подвійного контрастування; для підготовки до гастродуоденофіброскопії - дорослим: 2-3 мл перед проведенням дослідження, за необхідності можна додати ще декілька мл під час дослідження через інструментальний канал ендоскопа; як антидот при отруєннях миючими речовинами залежно від тяжкості отруєння: діти приймають 1-4 мл одноразово, а дорослі 4-8 мл одноразово; суспензія орально/емульсія 40 мг/мл: при порушеннях ШКТ (газоутворення) дітям віком до 1 року - по 0,5-1мл (25крап.) додавати у пляшку з дитячим харчуванням при кожному годуванні або давати ч. л. перед або після годування груддю; діти 1-6 років - по 1мл (25крап.) під час або після їжі кожні 4-6 год.; діти 6-14 років - по 1-2мл (25-50крап.) під час або після їжі кожні 4-6 год.; діти від 14р та

дорослі - по 2мл (50крап.) під час або після їжі кожні 4-6 год.; підготовка до діагностичних досліджень черевної порожнини: діти - по 1мл 3р/добу до проведення дослідження і 1мл вранці в день проведення дослідження; дорослі - по 2мл (50крап.) 3р/добу за добу до проведення дослідження і 2мл (50крап.) вранці в день проведення дослідження; підготовка до гастродуоденоскопії: дорослі - 4-8мл (100-200крап.) одноразово перед процедурою (за необхідності ввести кілька мл під час процедури); як добавка до суспензії контрастних речовин: 4-8мл (100-200крап.) на 1л суспензії контрастної речовини; як піногасник при інтоксикаціях поверхнево-активними речовинами: діти - 2,5-10мл (від 65крап.); дорослі - 10-20мл (від 1/3 до 2/3 вмісту фл.); табл. дорослим та дітям віком від 12 років, прийом препарату не залежить від прийому їжі: симптоматичне лікування при скаргах з боку ШКТ: по 1 табл. 3 р/добу; при проведенні діагностичних досліджень органів черевної порожнини: по 1 табл. 3 р/добу за день до дослідження і ще 1 табл. - вранці в день його проведення; як піногасник при інтоксикаціях поверхнево-активними речовинами (пральними порошками або іншими миючими засобами): дозування залежить від тяжкості інтоксикації; мінімальна рекомендована доза - 3 табл.; тривалість курсу лікування встановлюється індивідуально.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: алергічні прояви/алергічні реакції (можливо уповільнені), можлива поява шкірних реакцій гіперчутливості, включаючи свербіж, шкірний висип, кропив'янку, гіперемію; реакції підвищеної чутливості, набряк обличчя, набряк язика, утруднене дихання; нудота, блювання, запор

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини симетикону, метилпарабену (Е 218), жовтий захід FCF (Е 110) або до інших компонентів препарату; повна кишкова непрохідність, обструктивні захворювання ШКТ.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0.5 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АФЛЕТИН	АТ "КІЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	капс. м'які у бл.	125мг	№20x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АФЛЕТИН	АТ "КІЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	капс. м'які у бл.	125мг	№10x2	7,23	
	КОЛІГАЗ-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	капс. м'які у бл.	125мг	№10, №20, №30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КОЛІГАЗ-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл., в/о у бл.	125мг	№7x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КОЛІГАЗ-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл., в/о у бл.	125мг	№7x2	13,41	
	КОЛІГАЗ-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. жув. у бл.	125мг	№7x2	13,27	
	КОЛІГАЗ-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. жув. у бл.	125мг	№7x1	15,25	
	КОЛІГАЗ-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	крап. орал., емул. по 30мл у фл.	40 мг/мл	№1	54,34	
	КОЛІКІД®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., в/о у бл.	125мг	№7x2, №15x1, №15x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КОЛІКІД®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., в/о у бл.	125мг	№15x2	8,48	
	КОЛІКІД®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	сусп. орал. по 30мл у бан. з мірн. ложк.	40 мг/мл	№1	40,78	
	СИМЕТИКОН	ТОВ "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна), Україна	табл., в/о у бл.	125мг	№7x1, №7x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СИМЕТИКОН	ТОВ "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна), Україна	крап. орал. по 30мл у фл.	40 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	БОБОТИК	МЕДАНА ФАРМА Акціонерне Товариство, Польща	крап. орал., емул. по 30мл у фл.-крап.	66,66 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕСПІКОЛ БЕБІ	Індоко Ремедіс Лімітед, Індія	крап. орал. по 15мл, 30мл у	40 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

		фл. з піпет.				
ЕСПУМІЗАН®	Каталент Німеччина Ебербах ГмбХ (виробництво м'яких капсул "in bulk" та контроль серії)/Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (пакування)/БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (пакування, контроль серії, випуск серії)/С.Ц. СВІСКАПС РОМАНІЯ С.Р.Л. (виробництво м'яких капсул "in bulk")/Свісс, Німеччина/ Румунія	капс. м'які у бл.	40мг	№25x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЕСПУМІЗАН®	Каталент Німеччина Ебербах ГмбХ (виробництво м'яких капсул "in bulk" та контроль серії)/Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (пакування)/БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (пакування, контроль серії, випуск серії)/С.Ц. СВІСКАПС РОМАНІЯ С.Р.Л. (виробництво м'яких капсул "in bulk")/Свісс, Німеччина/Румунія	капс. м'які у бл.	40мг	№25x2	28,63	29,36/€
ЕСПУМІЗАН®	Каталент Німеччина Ебербах ГмбХ (виробництво м'яких капсул "in bulk" та контроль серії)/Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (пакування)/БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (пакування, контроль серії, випуск серії)/С.Ц. СВІСКАПС РОМАНІЯ С.Р.Л. (виробництво м'яких капсул "in bulk")/Свісс, Німеччина/ Румунія	капс. м'які у бл.	40мг	№25x1	32,30	29,36/€
ЕСПУМІЗАН® L	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	крап. орал., емул. по 50мл у фл. з крап.	40 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЕСПУМІЗАН® L	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	крап. орал., емул. по 30мл у фл. з крап.	40 мг/мл	№1	39,55	31,64/€
ЕСПУМІЗАН® БЕБІ	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	крап. орал., емул. по 50мл у фл. з насад. д/дозув.	100 мг/мл	№1	14,54	26,93/€
ЕСПУМІЗАН® БЕБІ	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	крап. орал., емул. по 30мл у фл. з насад. д/дозув.	100 мг/мл	№1	16,16	26,93/€
ІНФАКОЛ	Пурна Фармасьютікалз НВ, Бельгія	сусп. орал. по 50мл, 75мл, 100мл у фл. з крап.	40 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КУПЛАТОН	Оріон Корпорейшн/Квінта - Аналітіка с.р.о. (альтернативний вир-к, що здійснює контроль якості (тільки Кількісний вміст та Ідентифікація)), Фінляндія/ Чеська Республіка	крап. орал., по 30мл у фл.	300 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МОТИЛІГАС	Каталент Франсе Бенайм СА (вир-во, контроль готового продукту, випуск серії)/Каталент Джермані Шорндорф ГмбХ (перв. та втор. Пак.), Франція/Німеччина	капс. м'які у бл.	120мг	№10x2, №10x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	

3.5. Стимулятори перистальтики

- **Метоклопрамід (Metoclopramide) ***

Фармакотерапевтична група: А03FA01 - стимулятори перистальтики (пропульсанти).

Основна фармакотерапевтична дія: є центральним допаміновим антагоністом, який також проявляє периферичну холінергічну активність; має два основних ефекти: протиблювальний і ефект прискорення випорожнення шлунка та проходження крізь тонку кишку; протиблювальний ефект спричинений дією на центральну точку стовбурової частини мозку (хеморецептори - активуюча зона блювального центру), імовірно, через гальмування допамінергічних нейронів; посилення перистальтики також частково контролюється вищими центрами, але також частково може бути задіяний механізм периферичної дії разом із активацією постгангліонарних холінергічних рецепторів і, можливо, пригніченням допамінергічних рецепторів шлунка та тонкої кишки; через гіпоталамус і парасимпатичну нервову систему регулює та координує рухову активність верхнього відділу ШКТ; підвищує тонус шлунка та кишечника, прискорює випорожнення шлунка, зменшує гастростаз, перешкоджає пілоричному та езофагеальному рефлюксу, стимулює перистальтику кишечника; нормалізує виділення жовчі, зменшує спазм сфінктера Одді, не змінює його тонус, усуває дискінезію жовчного міхура.

Показання для застосування ЛЗ: дорослим: запобігання нудоти і блювання, спричинених радіотерапією^{БНФ}, відстроченої нудоти і блювання, спричинених хіміотерапією^{БНФ}, а також для симптоматичного лікування нудоти і блювання^{ВООЗ, БНФ}, включаючи пов'язані з г. мігренню^{БНФ} (у комбінації з р/ос анальгетиками для покращення їх всмоктування) запобігання післяопераційної нудоти та блювання; дітям застосовувати тільки як препарат II лінії для запобігання відстроченої нудоти і блювання, спричинених хіміотерапією, і як препарат II лінії для лікування наявної післяопераційної нудоти і блювання.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/м або повільно в/в (болюсно не менше 3-х хв); МДД для дорослих і дітей складає 0,5 мг/кг маси тіла; у дорослих звичайна терапевтична доза 10 мг до 3 р/добу^{ВООЗ, БНФ}, у дітей - 0,1-0,15 мг/кг маси тіла до 3 р/добу; табл.: приймати перед їдою, не розжовуючи, запиваючи достатньою кількістю рідини; дорослі: 10 мг до 3 р/добу^{ВООЗ, БНФ}, МДД 30 мг або 0,5 мг/кг маси тіла^{БНФ}; діти^{ВООЗ}: для запобігання відстроченої нудоти і блювання, спричинених хіміотерапією 0,1-0,15 мг/кг маси тіла до 3 р/добу, якщо необхідно продовжити застосування препарату, слід дотримуватись не менш ніж 6-год. інтервалів; МДД 0,5 мг/кг маси тіла^{ВООЗ}; максимальна тривалість застосування для лікування встановленої післяопераційної нудоти і блювання становить 48 год; максимальна тривалість застосування для запобігання відстроченої нудоти і блювання, спричинених хіміотерапією, становить 5 діб.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: реакції гіперчутливості, анафілактичні реакції (включаючи анафілактичний шок, особливо при застосуванні в/в); метгемоглобінемія, яка може бути пов'язана з дефіцитом NADH-цитохром-b5-редуктази, особливо у немовлят, сульфгемоглобінемія, яка пов'язана, головним чином, із супутнім застосуванням високих доз препаратів, що вивільняють сірку; брадикардія, особливо при в/в застосуванні, зупинка серця протягом короткого часу після ін'єкції, яка може бути наслідком брадикардії, атріовентрикулярна блокада, блокада синусового вузла, особливо при в/в застосуванні, пролонгація QT-інтервалу, шлуночкова тахікардія типу «пірует», артеріальна гіпотензія, шок, синкопе при в/в введенні, г. АГ у пацієнтів з феохромоцитомою, тимчасове підвищення АТ; аменорея, гіперпролактинемія, галакторея, гінекомастія, порушення менструального циклу; нудота, сухість у роті, запор, діарея; злоякісний нейролептичний с-м (характерні симптоми: жар, ригідність м'язів, втрата свідомості, коливання АТ, судоми) переважно у пацієнтів із епілепсією, головний біль, запаморочення, сонливість, пригнічений рівень свідомості; екстрапірамідні розлади, які можуть виникнути навіть після застосування однієї дози переважно у дітей та підлітків та/або при перевищенні рекомендованої дози, дискінетичний с-м (мимовільні спазматичні рухи, зокрема в області голови, шиї та плечей, тонічний блефароспазм, спазм лицевих і жувальних м'язів, відхилення язика, спазм глоткових м'язів і м'язів язика, неправильне тримання голови і шиї, перенапруження хребта, спазматичне згинання рук, спазматичне розгинання ніг); паркінсонізм (тремор, ригідність, акінезія); г. дистонія(включаючи порушення зору та окулогірний криз); пізня дискінезія (може бути постійною під час або після тривалого лікування, особливо у пацієнтів літнього віку); акатізія; дискінезія; висипання, кропив'янка, гіперемія та свербіж шкіри, ангіоневротичний набряк; депресія, галюцинації, сплутаність свідомості, тривожність, неспокій; підвищення рівня ензимів печінки; астенія, підвищена втомлюваність.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; шлунково-кишкова кровотеча; механічна кишкова непрохідність; шлунково-кишкова перфорація; підтверджена або запідозрена феохромоцитомою, через ризик тяжких нападів АГ; пізня дискінезія, зумовлена нейролептиками або метоклопрамідом, в анамнезі; епілепсія (підвищення частоти та інтенсивності нападів); хвороба Паркінсона; супутнє застосування з леводопою чи допамінергічними агоністами; встановлена метгемоглобінемія при застосуванні метоклопраміду або дефіциті НАДН-цитохром-b5-редуктази в анамнезі; пролактинзалежні пухлини; підвищена судомна готовність (екстрапірамідні рухові розлади); діти віком до 1 року через ризик розвитку екстрапірамідних порушень; хворі на БА з підвищеною чутливістю до сульфату.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 30 мг., парентерально - 30 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 2мл у конт. чар/уп.	5 мг/мл	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 2мл у конт. чар/уп.	5 мг/мл	№5x2	13,92	
	МЕТОКЛОПРАМІД-	ПрАТ "Фармацевтична	табл. у конт.	10мг	№10x5	2,75	

	ДАРНИЦЯ	фірма "Дарниця", Україна	чар/уп.			
	МЕТОКЛОПРАМІД-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 2мл у бл.	5 мг/мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ
	МЕТОКЛОПРАМІД-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 2мл у кор. або бл.	5 мг/мл	№10, №10x1	17,15
	МЕТОКЛОПРАМІД-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ
	МЕТОКЛОПРАМІД-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x5	3,88
	МЕТОКЛОПРАМІД У ГІДРОХЛОРИД	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 2мл у касеті	5 мг/мл	№5x2	10,87
II.	ЦЕРУКАЛ®	ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія	табл. у фл.	10мг	№50	відсутня у реєстрі ОБЦ
	ЦЕРУКАЛ®	Меркле ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії; контроль серії);, Німеччина	р-н д/ін'єк. в амп. по 2мл у кор.	10мг/2мл	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ

● **Домперидон (Domperidone)** ** [ГІМД] [окрім сусп. орал., табл., прол. дії по 30 ме]

Фармакотерапевтична група: A03FA03 - стимулятори перистальтики

Основна фармакотерапевтична дія: антагоніст дофаміну, прокінетик, що має протиблювотні властивості; практично не проникає через гематоенцефалічний бар'єр, тому екстрапірамідні побічні явища спостерігалися лише в поодиноких випадках, особливо у дорослих; протиблювотна дія, зумовлена поєднанням периферичної (гастрокінетичної) дії та антагонізму до рецепторів дофаміну у тригерній зоні хеморецепторів, яка знаходиться поза гематоенцефалічним бар'єром; підвищує тонус в нижньому відділі стравоходу, покращує антродуоденальну моторику і прискорює випорожнення шлунка; не впливає на шлункову секрецію.

Показання для застосування ЛЗ: полегшення симптомів нудоти та блювання^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для полегшення симптомів нудоти та блювання: дорослі і діти віком від 12 років масою тіла не менше 35 кг у формі табл., вкритих п/о - 1 табл. (10 мг) 3 р/добу^{БНФ}; МДД 3 табл. (30мг)^{БНФ}; у формі сусп. орал. - по 10 мл суспензії (10 мг) до 3 р/добу, МДД - 30 мл сусп. (30мг), максимальна тривалість лікування не довше 1 тижня; приймати перед прийомом їжі^{БНФ}

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР: анафілаксія, анафілактичний шок, гіперчутливість; підвищення рівня пролактину; нервозність, роздратованість, збудження, депресія, тривожність, зниження або відсутність лібідо; безсоння, запаморочення, спрага, судоми, млявість, головний біль, сонливість, акатизія, екстрапірамідні розлади, синдром неспокійних ніг; окулогірни кризи; набряк, відчуття серцебиття, порушення частоти та ритму серцевих скорочень, подовження інтервалу QT (частота невідома), серйозні шлуночкові аритмії (в т.ч. типу «torsade de pointes»), раптова серцева смерть; гастроінтестинальні розлади, включаючи абдомінальний біль, регургітацію, зміну апетиту, нудоту, печію, запор; сухість у роті, короточасні кишкові спазми, діарея; свербіж, висипання, кропив'янка, ангіоневротичний набряк; галакторея, збільшення молочних залоз/гінекомастія, чутливість молочних залоз, виділення з молочних залоз, аменорея, набряк молочних залоз, біль у ділянці молочних залоз, порушення лактації, нерегулярний менструальний цикл; біль у ногах; затримка сечі, дизурія, часте сечовипускання; астенія; кон'юнктивіт, стоматит; підвищення рівня АЛТ, АСТ і холестерину, відхилення від норми показників функціональних тестів печінки.

Противпоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату, пролактин-секреторна пухлина гіпофіза (пролактиномою); тяжкі або помірні порушення функції печінки та/або нирок; печінкова недостатність; хворі з відомим подовженням інтервалів серцевої провідності, зокрема QTс, хворі зі значними порушеннями балансу електролітів або з фоновими хворобами серця (застійна СН); шлунково-кишкова кровотеча, механічна непрохідність або перфорація; одночасне застосування кетоконазолу, еритроміцину або інших сильнодіючих інгібіторів СYP3A4, лікарських засобів, які подовжують інтервал QT (флуконазол, ітраконазол, посаконазол, ритонавір, саквінавір, теллапревір, вориконазол, кларитроміцин, аміодарон, телітроміцин) за виключенням апоморфіну

Визначена добова доза (DDD): перорально - 30 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДОМІДОН®	ПАТ "Фармак", Україна	табл., в/о у бл.	10мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДОМІДОН®	ПАТ "Фармак", Україна	табл., в/о у бл.	10мг	№10x3	6,00	
	ДОМПЕРИДОН-СТОМА	АТ "Стома", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДОМРИД®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., в/о у бл.	10мг	№10x3	7,34	
	ДОМРИД®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., в/о у бл.	10мг	№10x1	7,64	
	ДОМРИД®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	сусп. орал. по 100мл у фл.	1 мг/мл	№1	23,68	
	ДОМРИД®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	сусп. орал. по 60мл у фл.	1 мг/мл	№1	30,43	
	ДОМРИД® SR	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., прол. дії у бл.	30мг	№10x3	4,57	
	ДОМРИД® SR	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., прол. дії у бл.	30мг	№10x1	6,10	
	МОТОРИКС	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	5,52	
МОТОРИКС	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x1	6,02		
II.	ДОПРОКІН	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл. у бл.	10мг	№10x2, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МОТИЛІУМ®	Янссен-Сілаг, Франція	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x1, №10x3, №30x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МОТИНОРМ	Медлей Фармасьютикалс Лтд., Індія	табл. у бл.	10мг	№10x3, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МОТОРИКУМ	Медокемі ЛТД (Центральний завод)/Медокемі ЛТД (Завод AZ), Кіпр/Кіпр	табл. у бл.	10мг	№10x2	13,62	30,26/€
	НАУСИЛІУМ	Фламінго Фармасьютикалс Лтд., Індія	табл. у бл.	10мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Ітоприду гідрохлорид (Itopride hydrochloride)** ^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: А03FA07- стимулятори перистальтики

Основна фармакотерапевтична дія: активує пропульсивну моторику ШКТ завдяки антагонізму з допаміновими D₂-рецепторами та інгібуючій активності ацетилхолінестерази; активує вивільнення ацетилхоліну та інгібує його розпад; також чинить протиблювотну дію завдяки взаємодії з D₂-рецепторами, локалізованими в хеморецепторній тригерній зоні; дія ітоприду гідрохлориду є високоспецифічною відносно верхніх відділів ШКТ; не впливає на рівень гастрину в сироватці крові

Показання для застосування ЛЗ: купірування шлунково-кишкових симптомів функціональної невиразкової диспепсії (хр. гастриту), таких як здуття живота, відчуття швидкого насичення, біль та дискомфорт у верхній частині живота, анорексія, печія ^[ГМД], нудота та блювання.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим - по 1 табл. (50 мг) 3 р/добу до прийому їжі; середня добова доза 150 мг; тривалість лікування може становити до 8 тижнів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль у животі, діарея; підвищене слиновиділення; запаморочення, головний біль; висипання; підвищений рівень амінотрансферази, знижене число білих кров'яних тілець; лейкопенія, тромбоцитопенія; гіперчутливість, включаючи анафілактоїдну реакцію; підвищений рівень пролактину в крові; тремор; запор, нудота; жовтяниця; еритема і свербіж; гінекомастія; підвищення рівнів АСТ, АЛТ, ГГТ, лужної фосфатази, білірубину в крові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до ітоприду гідрохлориду та інших компонентів препарату; стани, при яких підвищення скорочувальної активності ШКТ може бути шкідливим, наприклад при шлунково-кишковій кровотечі, механічній обструкції або перфорації.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МОТОПРИД	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10x1, №10x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	МОТОПРИД	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10x2	97,50	
II.	ГАНАТОН®	Майлан ЕПД Г.К., Катзияма Планта, Японія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10x4		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ІТОМЕД®	ПРО.МЕД.ЦС Прага а.с. (вир-во за повним циклом)/ХБМ Фарма с.р.о. (вир-во, перв. і втор. пак.)/КООФАРМА с.р.о. (перв. і втор. Пак.), Чеська Республіка/Словацька Республіка	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№20x2, №20x5		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ІТОПРИД КСАНТІС	Санека Фармасьютикалз АТ, Словацька Республіка	табл. у бл.	50мг	№10, №40, №100		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ПРАЙМЕР	Мепро Фармасьютикалс Приват Лімітед, Індія	табл., в/о у бл.	50мг	№10x1		відсутня у реєстрі ОБЦ

• **Мосаприд (Mosapride)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: А03FA - стимулятори перистальтики (пропульсанти).

Основна фармакотерапевтична дія: є прокінетичним агентом верхнього відділу ШКТ, що вибірково діє як агоніст 5-HT₄ рецепторів; є селективним агоністом 5-HT₄ рецепторів, стимулює рухомість верхнього відділу травного тракту, не проявляє властивостей антагоніста рецептора допаміну D₂; збільшує випорожнення шлунка, підвищує перистальтику шлунка та ДПК, але не підвищує перистальтику нижніх відділів травного тракту; його можна застосовувати як противблювальний засіб.

Показання для застосування ЛЗ: лікування ГЕРХ ^[ПМД], а також усунення диспептичних симптомів ШКТ (печія, нудота), пов'язаних із захворюваннями гастроудоденальної зони.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: звичайна доза: 5 мг 3 р/добу до або після їди; табл. швидко розчиняється у роті, у разі необхідності її можна запити водою; МДД - 40 мг; курс лікування визначається індивідуально.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: діарея, запор, нудота, сухість у роті, абдомінальний біль, блювання; загальна слабкість, головний біль, безсоння, запаморочення, порушення свідомості; відчуття серцебиття, тахікардія; АР, включаючи шкірні висипання, кропив'янка; еозинофілія, збільшення рівня тригліцеридів, АСТ, АЛТ, гаммаглутамілтрансферази.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин, що входять до складу препарату; випадки, коли стимуляція моторної діяльності ШКТ може бути небезпечною (при шлунково-кишковій кровотечі, механічній непрохідності або перфорації).

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	МОСІД МТ	Торрент Фармасьютикалс Лтд, Індія	табл. у стрип.	5мг	№10x3	146,29	24,38/\$

3.6. Протиблювотні засоби та лікарські засоби, що усувають нудоту.

Антагоністи серотонінових рецепторів

• **Ондансетрон (Ondansetron)** * (див. п. 19.5. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")

Фармакотерапевтична група: А04АА01 - протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту. Антагоністи 5HT₃-рецепторів серотоніну.

Основна фармакотерапевтична дія: сильнодіючий високоселективний антагоніст 5HT₃ (серотонінових) рецепторів; попереджує або усуває нудоту і блювання, що спричиняються цитотоксичною хіміотерапією та/або променевою терапією, а також післяопераційні нудоту і блювання; можливо блокує виникнення блювального рефлексу, виявляючи антагоністичну дію відносно 5HT₃-рецепторів, які локалізуються у нейронах як периферичної, так і ЦНС; не зменшує психомоторної активності пацієнта і не чинить седативного ефекту.

Показання для застосування ЛЗ: нудота і блювання, спричинені цитотоксичною хіміотерапією та променевою терапією; профілактика та лікування післяопераційних нудоти і блювання ^[БНФ].

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н д/ін'єк.: нудота і блювання, спричинені хіміотерапією та променевою терапією: в/в або в/м 8 мг у вигляді повільної ін'єкції безпосередньо перед лікуванням, для профілактики відстроченого або тривалого блювання після перших 24 год рекомендується р/ос або ректальне застосування; при необхідності дозу можна збільшувати (але не більше 16 мг одноразово), застосовувати лише у вигляді в/в інфузії на 50-100 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду або іншого відповідного р-ника; для високоеметогенної хіміотерапії 8 мг вводиться шляхом повільної в/в (не менш ніж 30 секунд) або в/м ін'єкції безпосередньо перед хіміотерапією з подальшим дворазовим в/в або в/м введенням 8 мг через 2 та 4 год або постійною інфузією 1 мг/год протягом 24 год; ефективність може бути підвищена додатковим одноразовим в/в введенням дексаметазону натрію фосфату у дозі 20 мг перед хіміотерапією; діти та підлітки (від 6 місяців до 17 років): дозу розрахувати за площею поверхні тіла або маси тіла дитини - вводиться безпосередньо перед хіміотерапією шляхом разової в/в ін'єкції у дозі 5 мг/м² або 0,15 мг/кг, не більше 8 мг; через 12 год можна приймати р/ос ще 5 днів, не перевищувати дозу для дорослих; післяопераційні нудота і блювання: дорослим 4 мг одноразово в/м або в/в повільно під час введення в наркоз ^[БНФ] або після операції; внутрішньо по 16 мг за 1 год до початку проведення анестезії ^[БНФ]; МДД 32 мг; діти та підлітки (від 1 місяця до 17 років) - 0,1 мг/кг (максимально - до 4 мг) в/в повільно (не менше 30 секунд) до, під час, після введення у наркоз або після операції; р/ос: помірна еметогенна хіміотерапія та променева терапія: дорослим по 8 мг за 1-2 год до проведення лікування з наступним прийомом

ще 8 мг^{БНФ} кожні 8-12 год^{БНФ}; для профілактики пізньої або тривалої нудоти та блювання після перших 24 год продовжити застосування по 8 мг кожні 12 год протягом 5 днів; при частковому опроміненні високими дозами абдомінальної ділянки - по 8 мг кожні 8 год; препарат приймають протягом усього курсу хіміо- та променевої терапії, а також 1-2 дні (при необхідності 3-5 днів) після її закінчення; високоеметогенна хіміотерапія: дорослим внутрішньо 24 мг^{БНФ} (одночасно з дексаметазону фосфатом) за 1-2 год до початку хіміотерапії^{БНФ}, для профілактики пізнього блювання рекомендується після перших 24 год приймати по 8 мг 2 р/добу протягом усього курсу хіміотерапії, а також 5 днів після її закінчення.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: реакції гіперчутливості негайного типу (ларингоспазм, судинний набряк), інколи тяжкі, аж до анафілаксії; головний біль; судоми, рухові порушення (включаючи екстрапірамідні реакції, такі як окулогирний криз, дистонічні реакції і дискінезія без стійких клінічних наслідків); запаморочення переважно під час швидкого в/в введення препарату; скороминущі зорові розлади (помутніння в очах), головним чином під час в/в введення; мінуща сліпота, головним чином під час в/в застосування; аритмії, біль та дискомфорт у грудях, біль в області серця (з депресією сегмента ST або без неї), брадикардія; подовження інтервалу QT (включаючи тремтіння/мерехтіння шлуночків (*Torsade de Pointes*)); відчуття тепла або припливів; артеріальна гіпер- та гіпотензія; гикавка, кашель; запор, діарея, сухість у роті; безсимптомне підвищення показників функції печінки, недостатність функції печінки; токсичні висипання, в тому числі токсичний епідермальний некроліз; місцеві реакції у ділянці в/в введення; біль та дискомфорт у грудях, екстрастиолої, тахікардія, включаючи шлуночкову та надшлуночкову тахікардію, фібриляцію передсердь, відчуття серцебиття, синкопе, зміни ЕКГ; анафілактичні реакції, ангіоневротичний набряк, бронхоспазм, анафілактичний шок, свербіж, шкірні висипання, кропив'янка; порушення ходи, хорея, міоклонус, невгамовність, відчуття печіння, протрузія язика, диплопія, пригнічення ЦНС, парестезія; підвищення t° тіла, біль, почервоніння, печіння в місці введення; гіпокаліємія; слабкість, непритомність.

Протипоказання до застосування ЛЗ: застосування разом з апоморфіну гідрохлоридом, оскільки спостерігалися випадки сильної артеріальної гіпотензії та втрати свідомості під час сумісного застосування; гіперчутливість до будь-якого компонента препарату; тяжкі порушення ф-ції печінки (табл.); хірургічні операції на черевній порожнині (табл.).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 16 мг., парентерально - 16 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕМЕСЕТРОН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл, 4мл в амп. у бл.	2 мг/мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕМЕСЕТРОН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 4мл в амп. у бл.	2 мг/мл	№5x1	34,85	
	ЕМЕСЕТРОН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 4мл в амп. у кор.	2 мг/мл	№5	34,85	
	ЕМЕСЕТРОН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у кор.	2 мг/мл	№5	36,68	
	ЕМЕСЕТРОН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у бл.	2 мг/мл	№5x1	36,68	
	ЕМЕСЕТРОН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	4мг	№10x1	33,34	
	ЕМЕСЕТРОН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	8мг	№10x1	34,68	
	ЕМЕТОН	ТОВ "НІКО" (контроль, випуск серії)/ ДЕМО СА ФАРМАСЬЮТІКАЛ ІНДАСТРІ (нерозфас. прод., перв., втор. уп., контроль), Україна/ Греція	р-н д/ін'єк. по 4мл в амп. у пач.	2 мг/мл	№5	86,00	
	ЕМЕТОН	ТОВ "НІКО" (контроль, випуск серії)/ ДЕМО СА	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у	2 мг/мл	№5	98,40	

		ФАРМАСЬЮТИКАЛ ІНДАСТРІ (нерозфас. прод., перв., втор. уп., контроль), Україна/ Греція	пач.				
	ОНДАНСЕТРОН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	4мг	№10x1	30,80	
	ОНДАНСЕТРОН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	8мг	№10x1	25,20	
	ОНДАНСЕТРОН	ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл, 4мл в амп. у пач.	2 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОНДАНСЕТРОН	ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 4мл в амп. у бл.	2 мг/мл	№5x1	28,40	
	ОНДАНСЕТРОН	ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 4мл в амп. у пач.	2 мг/мл	№100	28,40	
	ОНДАНСЕТРОН	ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у бл.	2 мг/мл	№5x1	31,20	
	ОНДАНСЕТРОН	ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у пач.	2 мг/мл	№100	31,20	
	ОНДАНСЕТРОН	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	4мг	№10x1	25,91	
	ОНДАНСЕТРОН	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	8мг	№10x1	23,08	
	ОНДАНСЕТРОН	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	р-н д/ін'єк. по 4мл в амп. у касеті	2 мг/мл	№5x1	28,11	
	ОНДАНСЕТРОН	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у касеті	2 мг/мл	№5x1	30,93	
	ЮНОРМ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 8мл у фл. з розч.	2 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЮНОРМ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 4мл у фл. з розч.	2 мг/мл	№1	113,20	
	ЮНОРМ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 4мл в амп. у конт. чар/уп.	2 мг/мл	№5x1	66,22	
	ЮНОРМ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у конт. чар/уп.	2 мг/мл	№5x1	77,28	
	ЮНОРМ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	сироп по 50мл у фл. з мірн. прист.	4мг/5мл	№1	79,03	
II.	АУРОДАНС	Ауробіндо Фарма Лімітед - Юніт IV, Індія	р-н д/ін'єк. по 2мл, 4мл в амп. у кор.	2 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВОМІКАЙНД	Манкайнд Фарма Лімітед, Індія	р-н д/ін'єк. по 2мл, 4мл в амп. у бл.	2 мг/мл	№4x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВОМІКАЙНД-МД 4	Манкайнд Фарма Лімітед, Юніт-II, Індія	табл., що дисперг. у бл.	4мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВОМІКАЙНД-МД 8	Манкайнд Фарма Лімітед, Юніт-II, Індія	табл., що дисперг. у бл.	8мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЗЕТРОН	РАФАРМ С.А., Греція	сироп, по 50мл у фл. з мірн. лож.	4мг/5мл	№1	140,46	28,48/€
	ЗЕТРОН	РАФАРМ С.А., Греція	р-н д/ін'єк. по 4мл в амп. у	2 мг/мл	№5	93,64	28,48/€

		кор.					
ЗОФЕТРОН	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у бл.	8мг	№5x2	27,09	27,09/\$	
ЗОФРАН™	ГлаксоСмітКляйн Мануфактуринг С.п.А., Італія	р-н д/ін'єк. по 4мл в амп. у бл.	2 мг/мл	№5x1	48,40	26,20/\$	
ЗОФРАН™	ГлаксоСмітКляйн Мануфактуринг С.п.А., Італія	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у бл.	2 мг/мл	№5x1	60,99	26,20/\$	
ОНДАНСЕТ	Хелп С.А., Греція	р-н д/ін'єк. по 4мл в амп. у пач.	2 мг/мл	№5	130,82	26,16/\$	
ОНДАНСЕТ	Хелп С.А., Греція	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у пач.	2 мг/мл	№5	177,90	26,16/\$	
ОСЕТРОН®	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд (Виробнича дільниця - VI), Індія	р-н д/ін'єк. по 4мл в амп. у бл.	2 мг/мл	№5x1	103,65	26,39/\$	
ОСЕТРОН®	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд (Виробнича дільниця - VI), Індія	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у бл.	2 мг/мл	№5x1	115,62	26,39/\$	

• **Тропісетрон (Tropisetron) (див. п. 19.5. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")**

Фармакотерапевтична група: А04АА03 - протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту

Основна фармакотерапевтична дія: сильнодіючий і високоселективний конкурентний антагоніст 5-НТ₃-рецепторів - підкласу рецепторів серотоніну, розміщених на периферичних нейронах і в ЦНС; хірургічні втручання і лікування із застосуванням певних препаратів, у тому числі деяких хіміотерапевтичних засобів, можуть сприяти виділенню серотоніну (5-НТ) з ентерохромафіноподібних клітин, розміщених у слизовій оболонці травного тракту; це ініціює блювальний рефлекс і супутнє відчуття нудоти; селективно блокує збудження пресинаптичних 5-НТ₃-рецепторів периферичних нейронів, які беруть участь у виникненні блювального рефлексу, а також може чинити додаткову пряму дію на 5-НТ₃-рецептори, розміщені в ЦНС і опосередковують вплив блюкаючого нерва на *area postrema*; вважається, що цей вплив лежить в основі механізму протиблювальної дії тропісетрону

Показання для застосування ЛЗ: запобігання нудоті і блюванню, що виникають внаслідок протипухлинної хіміотерапії; усунення нудоти і блювання, що виникають у післяопераційний період; запобігання нудоті і блюванню, що виникають після гінекологічних інтраабдомінальних хірургічних втручань; з метою досягнення оптимальної величини співвідношення «ефект/ризик» застосування препарату слід призначати пацієнткам, в анамнезі яких є відомості щодо розвитку післяопераційної нудоти і блювання.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: запобігання нудоті і блюванню, що виникають внаслідок протипухлинної хіміотерапії: дітям віком від 2 років рекомендована доза препарату - 0,2 мг/кг (0,2 мл/кг); МДД - 5 мг; у перший день, за короткий проміжок часу до застосування протипухлинної хіміотерапії, рекомендується в/в вводити препарат: у вигляді інфузії (після розведення такими загальноживаними р-нами для інфузій як р-н натрію хлориду 0,9 %, р-н Рінгера, р-н глюкози 5 %), або у вигляді повільної ін'єкції (не менше 1 хв); потім, з 2-го по 6-й день, препарат призначати внутрішньо у вигляді р-ну; одразу ж після розведення апельсиновим соком відповідної кількості тропісетрону, що міститься в ампулі, приймати зранку, за 1 год до вживання їжі; дорослим рекомендується у вигляді 6-денного курсу по 5 мг/добу; у перший день призначати в/в за короткий проміжок часу до застосування протипухлинної хіміотерапії: у вигляді інфузії (після попереднього розведення), або у вигляді повільної ін'єкції (не менше 1 хв); потім, з 2-го по 6-й день, препарат призначати внутрішньо у вигляді капсул; якщо застосування одного тропісетрону чинить недостатню протиблювальну дію, лікувальний ефект препарату можна посилити призначенням дексаметазону; усунення і запобігання нудоті і блюванню, що виникають у післяопераційний період; дорослі: рекомендується в/в вводити у дозі 2 мг одноразово: у вигляді інфузії (після попереднього розведення у 40 мл р-ну) або у вигляді повільної ін'єкції (не менше 30 секунд); для запобігання нудоті і блюванню, що виникають у післяопераційному періоді, препарат слід застосовувати незадовго до введення наркозу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперчутливість; анафілактичні реакції/шок; головний біль, сонливість, запаморочення, непритомність; зупинка серця та кровообігу; артеріальна гіпотензія або гіпертензія, припливи; колапс; диспное, дискомфорт у грудній клітці, задишка; бронхоспазм; запор, діарея, абдомінальний біль; анорексія; генералізована кропив'янка; висипання, еритема; підвищена втомлюваність.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до тропісетрону, до інших антагоністів 5-НТ₃-рецепторів або до будь-яких інших компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ТРОПІСЕТРОН	АТ "БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк./інф. по 2мл, 5мл в амп. у пач.	1 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТРОПІСЕТРОН	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-	р-н д/ін'єк./інф. по	1 мг/мл	№5	відсутня у	

	БІОЛІК", Україна	2мл в амп. у пач.			реєстрі ОБЦ
ТРОПІСЕТРОН	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк./інф. по 5мл в амп. у пач.	1 мг/мл	№5	62,40

3.7. Гепатопротектори

3.7.1. Препарати жовчних кислот

- **Кислота урсодеооксихолева (Ursodeoxycholic acid)**

Фармакотерапевтична група: A05AA02 - засоби, що застосовують для лікування печінки та жовчовивідних шляхів. Засоби, що застосовують при біліарній патології A05B - засоби, що застосовують у разі захворювань печінки, ліпотропні речовини

Основна фармакотерапевтична дія: знижує насиченість жовчі холестерином, пригнічуючи його поглинання у кишечнику і знижуючи секрецію холестерину в жовчі; можливо, завдяки дисперсії холестерину та утворенню рідких кристалів відбувається поступове розчинення жовчних каменів; ефект обумовлений відносною заміною ліпофільних, подібних до детергентів токсичних жовчних кислот гідрофільною цитопротекторною нетоксичною урсодеооксихолевою кислотою, покращенням секреторної здатності гепатоцитів та імунорегуляторними процесами.

Показання для застосування ЛЗ: розчинення^{БНФ} рентгеннегативних холестеринових жовчних каменів^{БНФ} розміром не більше 15 мм у діаметрі у хворих з функціонуючим жовчним міхуром, незважаючи на присутність у ньому жовчного(их) каменя(нів); симптоматичне лікування первинного біліарного цирозу (ПБЦ)^{БНФ} за умови відсутності декомпенсованого цирозу печінки; лікування гепатобіліарних розладів при муковісцидозі дітям віком від 6 (у формі суспензії від 1 місяця) до 18 років; лікування біліарного рефлюкс-гастриту.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для розчинення холестеринових жовчних каменів: приблизно 10 мг/кг маси тіла, що еквівалентно: до 60 кг - 2 капс. (1 табл.), 61-80 кг - 3 капс. (1 ½ табл.), 81-100 кг - 4 капс. (2 табл.), понад 100 кг - 5 капс. (2 ½ табл.); тривалість лікування 6-24 місяці; якщо зменшення розмірів жовчних каменів не спостерігається після 12 місяців прийому, продовжувати терапію не слід; для лікування гастриту з рефлюксом жовчі: 1 капс. 1 р/день з деякою кількістю рідини увечері перед сном, приймати протягом 10-14 днів; для симптоматичного лікування первинного біліарного цирозу (ПБЦ)^{БНФ}: добова доза залежить від маси тіла та варіює від 3 до 7 капс. (1½ до 3½ табл.) (14 ± 2 мг урсодеооксихолевої кислоти/кг маси тіла)^{БНФ}; у перші 3 місяці лікування табл./капс. приймати, розподіливши їх протягом дня, при покращенні показників функції печінки добову дозу можна приймати 1 р/добу, увечері; застосування препарату при первинному біліарному цирозі може бути необмеженим у часі; лікування гепатобіліарних розладів при муковісцидозі: дітям від 1 місяця до 18 років 20 мг/кг/добу, розподілити на 2-3 прийоми з подальшим збільшенням дози до 30 мг/кг/добу у разі потреби, разові дози для дітей з масою тіла до 10 кг потрібно набирати шприцом.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: діарея, АР, висипання, кропив'янка, абдомінальний біль у правому підребер'ї; кальцифікація жовчних каменів, декомпенсація цирозу печінки.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до будь-якої речовини, що входить до складу лікарського засобу; г. запалення жовчного міхура або жовчних проток; непрохідність жовчних проток (закупорка загальної жовчної протоки або протоки міхура); часті епізоди печінкових колік; рентгеноконтрастні кальцифіковані камені жовчного міхура; порушення скоротності жовчного міхура; невдалий результат портоентеростомії або відсутність адекватного жовчного відтоку у дітей з атрезією жовчних проток; цироз печінки у стадії декомпенсації.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,75 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	УКРЛІВ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. у бл.	250мг	№10x10	25,58	
	УКРЛІВ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. у бл.	250мг	№10x3	27,72	
	УКРЛІВ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. у бл.	500мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	УКРЛІВ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. у бл.	500мг	№10x10	24,30	
	УКРЛІВ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	сусп. орал. по 40мл у бан. з мірн. ложк.	250мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	УКРЛІВ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	сусп. орал. по 200мл у фл. з мірн. ложк.	250мг/5мл	№1	35,47	
	УКРЛІВ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	сусп. орал. по 30мл у фл. з мірн. ложк.	250мг/5мл	№1	66,70	
	УРСОМАКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	капс. у бл.	250мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	УРСОМАКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	капс. у бл.	250мг	№10x10	35,99	
	УРСОМАКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	капс. у бл.	250мг	№10x5	38,62	

	УРСОХОЛ®	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	капс. у конт. чар/уп.	250мг	№10x5	25,31	
	УРСОХОЛ®	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	капс. у конт. чар/уп.	250мг	№10x10	25,33	
II.	ГЕПАУРСОЛ	ШАРОН БІО-МЕДСИН ЛІМІТЕД, Індія	капс. у бл.	250 мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГРИНТЕРОЛ®	АТ "Гріндекс", Латвія	капс. тверді у бл.	250мг	№10x10	24,97	26,85/€
	ГРИНТЕРОЛ®	АТ "Гріндекс", Латвія	капс. тверді у бл.	250мг	№10x5	26,10	26,85/€
	ПМС-УРСОДІОЛ	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у фл.	250мг, 500мг	№100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПМС-УРСОДІОЛ	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у бл.	250мг	№10x5	27,91	25,14/\$
	ПМС-УРСОДІОЛ	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у бл.	500мг	№10x5	24,14	25,14/\$
	УРСОДЕКС	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	150мг, 300мг	№10x1, №10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	УРСОЛІВ	Мега Лайфсайенсіс Паблік Компані Лімітед, Таїланд	капс. у бл.	250мг	№10x5	28,73	26,77/\$
	УРСОЛІЗИН	Мітім С.р.л., Італія	капс. у бл.	150мг, 300мг	№10x2, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	УРСОЛІЗИН	Мітім С.р.л., Італія	капс. у бл.	300мг	№10x10	17,89	31,89/€
	УРСОНОСТ	Франція Фармасьютічі Індустрія Фармако Біолоджіка С.р.л./ТОВ "МАРІФАРМ", Італія/Словенія	капс. у бл.	150мг, 300мг	№10x2, №10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	УРСОСАН® ФОРТЕ	ПРО.МЕД.ЦС Прага а.с., Чеська Республіка	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10, №20, №30, №50, №60, №90, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	УРСОФАЛЬК	Др. Фальк Фарма ГмбХ (відповідальний за випуск серій кінцевого продукту та альтернативне вторинне пакування)/Віфор СА Цвайнідерлассунг Медіхеми Еттінген (виробник дозованої форми, первинне та вторинне пакування), Німеччина/Швейцарія	сусп. орал. по 250мл у скл. пл. в кор.	250мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	УРСОФАЛЬК	Др. Фальк Фарма ГмбХ (відпов. за випуск серій кінцевого прод. та альтернат. втор. пак.)/Л озан Фарма ГмбХ (виробники дозованої форми, перв. та втор.пак., контр. якості; вир-к, відпов. за перв., втор.пак., Німеччина	капс. у бл.	250мг	№10, №50, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	УРСОФАЛЬК	Др. Фальк Фарма ГмбХ (відпов. за випуск серій кінцевого прод. та альтернат. втор. пак.)/Лозан Фарма ГмбХ (вир-к доз. форми, перв. та втор. пак.), Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№25, №50, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ХОЛУДЕКСАН	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	капс. тверді у бл.	300мг	№50, №60, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ХОЛУДЕКСАН	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	капс. тверді у бл.	300мг	№10x2	29,91	24,60/\$

3.7.2. Препарати розторопші плямистої

- **Силімарин (Silymarin)** ** [окрім пор. д/р-ну д/інф. по 350 мг]

Фармакотерапевтична група: А05ВА03 - препарати, що застосовують при захворюваннях печінки, ліпотропні речовини. Гепатотропні (гепатопротекторні) препарати.

Основна фармакотерапевтична дія: гепатопротекторна, антитоксична, антиоксидантна, регенеруюча, дезінтоксикаційна дія; клінічна дія проявляється у покращанні загального стану хворих із захворюваннями

печінки, зменшенні суб'єктивних скарг (таких як слабкість, відчуття важкості у правому підребер'ї, втрата апетиту, шкірний свербіж, блювання); покращуються лабораторні показники: знижується активність трансаміназ, гамма-глутамілтрансферази, лужної фосфатази та рівня білірубину у плазмі крові; тривале застосування достовірно збільшує відсоток виживаності хворих на цироз печінки.

Показання для застосування ЛЗ: токсичні ураження печінки: для підтримуючого лікування у пацієнтів з хронічними запальними захворюваннями печінки або цирозом печінки

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим та дітям від 12 років приймати по 1-2 табл./капс. 3 р/добу до їди; у випадку уражень печінки легкого і середнього ступеня приймати по 1 капс. 1-2 р/добу; при тяжких формах захворювання дозу можна подвоїти до 2-4 табл. Зр/добу; табл./капс. ковтати цілими, не розжовуючи, запиваючи достатньою кількістю рідини; середня тривалість лікування - 3 місяці

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: діарея у результаті посиленої функції печінки і жовчного міхура, нудота, диспепсія, блювання, зменшення апетиту, метеоризм, печія; АР (можливо уповільненого типу), реакції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання, свербіж, анафілактичний шок, кропив'янка; посилення існуючих вестибулярних порушень; задишка; посилення діурезу; посилення алопеції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини, до інших компонентів препарату або до будь-якої з допоміжних речовин; гострі отруєння різної етіології.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	ДАРСІЛ®	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., в/о у конт. чар/уп.	22,5мг	№10x10	128,06	
	ДАРСІЛ®	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., в/о у конт. чар/уп.	22,5мг	№10x3	38,49	
	ДАРСІЛ®	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., в/о у конт. чар/уп.	22,5мг	№10x5	64,07	
	СИЛІБОР 35	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "Фармекс Груп" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна	табл., вкриті п/о у бл. в кор. та без	35мг	№10x8, №20x1, №20		відсутня у реєстрі ОБЦ
	СИЛІБОР 35	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "Фармекс Груп" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	35мг	№25	28,60	
	СИЛІБОР 35	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "Фармекс Груп" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна	табл., вкриті п/о у бл. в кор.	35мг	№25x1	28,60	
	СИЛІБОР 35	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "Фармекс Груп" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна	табл., вкриті п/о у бл. в кор.	35мг	№10x3	56,30	
	СИЛІБОР МАКС	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна	капс. у бл.	140мг	№10x4		відсутня у реєстрі ОБЦ
	СИЛІБОР МАКС	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна	капс. у бл.	140мг	№10x2	138,44	
	СИЛІБОР ФОРТЕ	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості,	капс. у бл.	70мг	№10x4		відсутня у реєстрі ОБЦ

		випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна					
	СИЛІБОР ФОРТЕ	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна	капс. у бл.	70мг	№10x2	75,41	
	ТРИОСИЛ®	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	табл., в/о у бл.	22,5мг	№10x3, №10x5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТРИОСИЛ®	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	табл., в/о у бл.	22,5мг	№10x10	129,71	
II.	ГЕПАРЕТЕ	К.О. БІОФАРМ С.А., Румунія	табл. у бл.	35мг	№20x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КАРСИЛ®	АТ "Софарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії), Болгарія	табл., в/о у бл.	22,5 мг	№10x8	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КАРСИЛ® ФОРТЕ	АТ "Софарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка; дозвіл на випуск серії), Болгарія	капс. тверді у бл.	90мг	№6x5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛЕГАЛОН® 140	МАДАУС ГмбХ, Німеччина	капс. у бл.	140мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛЕГАЛОН® 140	МАДАУС ГмбХ, Німеччина	капс. у бл.	140мг	№10x3	153,64	30,92/€
	ЛЕГАЛОН® 140	МАДАУС ГмбХ, Німеччина	капс. у бл.	140мг	№10x6	279,16	30,92/€
	ЛЕГАЛОН® 70	МАДАУС ГмбХ, Німеччина	капс. у бл.	70мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛЕГАЛОН® 70	МАДАУС ГмбХ, Німеччина	капс. у бл.	70мг	№10x3	108,81	30,92/€
	ЛЕГАЛОН® 70	МАДАУС ГмбХ, Німеччина	капс. у бл.	70мг	№10x6	195,37	30,92/€

3.7.3. Препарати амінокислот

• **Орнітин (Ornithine)** ** [тільки грануляти]

Фармакотерапевтична група: А05ВА - засоби, що застосовуються при захворюваннях печінки, ліпотропні засоби. Гепатотропні препарати.

Основна фармакотерапевтична дія: гепатопротекторна.

Показання для застосування ЛЗ: лікування супутніх захворювань і ускладнень, спричинених порушенням детоксикаційної функції печінки (наприклад, при цирозі печінки) із симптомами латентної або вираженої печінкової енцефалопатії; симптоматичне лікування латентної та вираженої печінкової енцефалопатії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вміст 1-2 пакетиків р-ниту у склянці води, приймати всередину до 3 р/добу під час або після прийому їжі; тривалість лікування визначає лікар залежно від клінічного стану хворого; конц. д/інфуз. р-ну застосовують в/в; якщо не призначено інакше, можливе введення до 4-х амп. (40 мл)/добу; для хворих з порушеннями свідомості (кома або прекома) до 8 амп. (80 мл) протягом 24 год, залежно від тяжкості стану (не р-няти більше 6 амп. у 500 мл інфузійного р-ну), максимальна швидкість введення 5 г/год(що відповідає вмісту 1 амп.).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анафілактичні реакції, реакції гіперчутливості, включаючи ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок, чхання, сльозотеча; нудота, блювання, біль у шлунку, метеоризм, діарея, запор; біль у суглобах та м'язах; шкірні висипи, почервоніння, свербіж, кропив'янка; запаморочення; при застосуванні у великих дозах можливе підвищення рівня сечової кислоти у плазмі крові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до L-орнітин-L-аспартату чи будь-якого компонента препарату; тяжкі порушення функції нирок (НН - рівень креатиніну в сироватці вище 3 мг/100 мл).

Визначена добова доза (DDD): перорально/парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЕПАТОКС	ХОЛОПАК Ферпакунгстехнік ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль)/ТОВ "ФАРМАСЕЛ" (контроль, випуск	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл в амп. у пач.	500 мг/мл	№10	1650,00	

		серії), Німеччина/Україна					
	ГЕПТОР-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. у фл. по 10мл у фл. в конт. чар/уп.	500 мг/мл	№5x1	496,21	
	ГЕПТОР-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. у фл. по 10мл у фл. в конт. чар/уп.	500 мг/мл	№5x2	980,90	
	ГЕПТОР-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, крім випуску серії), Україна/Україна	гранулят по 5г у пак. в кор.	3г/5г	№30	879,45	
	ЛАРНАМІН	ПАТ "Фармак", Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. в амп. по 10мл у пач. та бл.	500 мг/мл	№5, №10, №5x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛАРНАМІН	ПАТ "Фармак", Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. в амп. по 10мл у бл.	500 мг/мл	№5x2	750,00	
	ЛАРНАМІН®	ПАТ "Фармак", Україна	гран. д/орал. р-ну по 5г у саше в пач.	3г/5г	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛАРНАМІН®	ПАТ "Фармак", Україна	гран. д/орал. р-ну по 5г у саше в пач.	3г/5г	№30	792,00	
II.	ГЕПА-МЕРЦ	Мерц Фарма ГмБХ і Ко. КГаА (виробник, відповідальний за випуск серії кінцевого продукту)/Б. Браун Мелсунген АГ (продукція in bulk, первинне та вторинне пакування), Німеччина/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл в амп. у кор.	5г/10мл	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ГЕПА-МЕРЦ	Мерц Фарма ГмБХ і Ко. КГаА (первинне та вторинне пакування, виробник відповідальний за випуск серій кінцевого продукту)/Клоке Фарма-Сервіс ГмБХ (продукція in bulk, первинне та вторинне пакування)/Ацино Фарма АГ (продукція in bulk), Німеччина/Німеччина/Швейцарія	гранулят по 5г у пак.	3г/5г	№30, №50, №100	відсутня у реєстрі ОВЦ	

3.7.4. Комбіновані лікарські засоби

- **Екстракт рутки лікарської + Екстракт плодів розторопші плямистої (*Fumaria officinalis* + *Silybum marianum*)****

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ГЕПАБЕНЕ	Меркле ГмБХ (виробництво нерозфасованого продукту, дозвіл на випуск серії; первинна та вторинна упаковка, контроль якості), Німеччина	капс. тверді у бл.	275,1мг/50мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	

3.8. Протівірусні лікарські засоби

3.8.1. Інтерферони

- **Інтерферон альфа-2b (*Interferon alfa-2b*)** (див. п. 19.3.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Пегінтерферон альфа-2a (*Peginterferon alfa-2a*)** (див. п. 18.1.2.1.1. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")
- **Пегінтерферон альфа-2b (*Peginterferon alfa-2b*)** (див. п. 18.1.2.1.1. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")

3.8.2. Аналоги нуклеозидів

- **Рибавірин (Ribavirin)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: J05AP01 - протівірусні засоби прямої дії; протівірусні засоби для лікування вірусного гепатиту С; J05AB04 - протівірусні засоби прямої дії; нуклеозиди і нуклеотиди, за винятком інгібіторів зворотної транскриптази.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний аналог нуклеозиду, який проявляє активність *in vitro* щодо деяких РНК- і ДНК-вірусів; механізм дії, за яким рибавірин чинить дію щодо вірусу гепатиту С, невідомий; у пацієнтів з хр. гепатитом С зниження рівня РНК вірусу гепатиту С при відповіді на терапію препаратом пегінтерферон α -2а у дозі 180 мкг відбувається у дві фази; перша фаза відзначається через 24-36 год після першої ін'єкції препарату, друга фаза відбувається протягом наступних 4-16 тижнів у пацієнтів зі стійкою вірусологічною відповіддю; не здійснює значного впливу на кінетику вірусу протягом перших 4-6 тижнів у пацієнтів, які отримують комбіновану терапію рибавірином і пегільованим інтерфероном α -2а або інтерфероном α ; комбінація рибавірину з пегінтерфероном альфа-2b або інтерфероном альфа-2b у клінічних випробуваннях призвела до підвищення рівня відповіді на лікування порівняно з монотерапією пегінтерфероном альфа-2b або інтерфероном альфа-2b; монотерапія не впливає на елімінацію вірусу гепатиту (РНК ВГС) або на покращення гістології печінки після 6-12 місяців лікування та протягом 6 наступних місяців спостереження.

Показання для застосування ЛЗ: лікування ХГС у комбінації з іншими лікарськими засобами^{БНФ, ПМД}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: не застосовувати як єдиний терапевтичний засіб лікування, він неефективний в якості монотерапії гепатиту С; приймають внутрішньо, з їжею, щоденно, в 2 прийоми (вранці та ввечері); може бути застосований в комбінації як з пегінтерфероном α -2b, так і з інтерфероном α -2b; вибір режиму комбінованої терапії проводиться індивідуально, з урахуванням очікуваної ефективності та безпеки обраної комбінації; доза залежить від маси тіла пацієнта; добові дози дози рибавірину в комбінації з пегінтерфероном α -2b^{БНФ}: при масі тіла пацієнта до 65 кг - 800 мг (по 400 мг 2 р/добу)^{БНФ}, при масі тіла 65^{БНФ} - 80 кг - 1 000 мг (400 мг + 600 мг)^{БНФ}, при масі тіла 81 - 105 кг - 1 200 мг (600 мг + 600 мг)^{БНФ}, при масі тіла > 105 кг - 1 400 мг (600 мг + 800 мг)^{БНФ}; тривалість лікування (прогнозування розвитку стійкої вірусологічної відповіді): у пацієнтів, інфікованих ВГС генотипу 1, які не досягли вірусологічної відповіді на 12-му тижні лікування, ймовірність розвитку стійкої вірусологічної відповіді дуже низька, генотип 1: пацієнтам, які продемонстрували вірусологічну відповідь на 12-му тижні лікування, терапію продовжувати наступні 9 місяців (у цілому 48 тижнів), генотип 2 чи 3: рекомендована тривалість лікування всіх пацієнтів 24 тижні, із супутньою ВІЛ-інфекцією - протягом 48 тижнів, генотип 4: пацієнти, інфіковані вірусом генотипу 4, важче піддаються лікуванню; добові дози дози рибавірину в комбінації з інтерфероном α -2а - при масі тіла менше 75 кг - 1 000 мг (400 мг + 600 мг), при масі тіла більше 75 кг - 1200 мг (600 мг + 600 мг); рекомендована тривалість лікування щонайменше 6 місяців; генотип 1: лікування продовжують протягом наступних 6 місяців (у цілому 1 рік) у тих хворих, в яких в кінці перших 6 місяців лікування відбулася елімінація РНК ВГС із сироватки крові; будь-який інший генотип: рішення про продовження терапії до 1 року у пацієнтів з негативним HCV-РНК після 6 місяців лікування повинно ґрунтуватися на інших прогностичних факторах (вік пацієнта > 40 років, чоловіча стать, наявність фіброзу); дозування для дітей, маса тіла яких не менше 47 кг і які можуть ковтати капсули: 15 мг/кг/добу у комбінації з інтерфероном α -2b (в дозі 3 млн МО/м² 3 р/тиждень) чи пегінтерфероном α -2b (у дозі 60 мкг/м² на тиждень); добові дози рибавірину для дітей - при масі тіла 47-49 кг - 600 мг (200 мг + 400 мг), при масі тіла 50-65 кг - 800 мг (400 мг + 400 мг), при масі тіла > 65 кг - відповідає дозуванню для дорослих; тривалість лікування дітей та підлітків; генотип 1 - 1 рік, хворим, які не досягли вірусологічної відповіді на 12-му тижні, лікування слід відмінити; генотип 2 чи 3 - рекомендована тривалість лікування всіх пацієнтів становить 24 тижні; генотип 4 - 1 рік, лікування відмінити у випадку, якщо через 12 тижнів лікування рівень РНК-ВГС зменшився на < 2 log₁₀ порівняно з початковим показником або якщо через 24 тижні лікування все ще виявляється РНК-ВГС; при виникненні серйозних небажаних явищ або відхилень у лабораторних показниках під час терапії рибавірином і пегінтерфероном α -2b чи інтерфероном α -2b, скоригувати дозу кожного препарату до зникнення небажаних явищ.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперлактацидемія/лактоацидоз, грип, пневмонія, синусит, емоційна лабільність, апатія, дзвін у вухах, набута ліподистрофія і хроматурія, вірусна/бактеріальна/грибкова інфекція, аскаридоз, ентеробіоз, оперізувальний лишай, целюліт, інфекції ВДШ/НДШ, бронхіт, фарингіт (в т.ч. стрептококовий), кандидоз порожнини рота, простий/оральний герпес, сепсис; інфекції сечостатевої системи, інфекції шкіри; ендокардит, зовнішній/середній отит, невизначене новоутворення, анемія, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія, лімфаденопатія; панцитопенія; апластична/гемолітична анемія, лімфопенія; справжня еритроцитарна аплазія, саркоїдоз, тиреоїдит; системний червоний вовчак, РА; ідіопатична або тромботична тромбоцитопенічна пурпура; медикаментозна гіперчутливість; відторгнення трансплантата печінки і нирок, хвороба Фогта-Коянагі-Харада, гіпотиреоз, гіпертиреоз, вірилізм, гіперглікемія, гіперурикемія, гіпокальціємія, гіпертригліцеридемія; ЦД, посилення/зниження апетиту, анорексія; дегідратація, депресія, неспокій, безсоння; ажитація, сомнамбулізм, зміна настрою, емоційні розлади/лабільність, страх, тривога, агресивність, нервозність, незвична поведінка/сни, плаксивість, порушення сну, нічні кошмари, зниження лібідо; суїцидальні думки, спроба самогубства, галюцинації, гнів; суїцид, психічні розлади, психоз, сплутаність свідомості, схильність до афекту; манія, біполярні розлади, гоміцидальні ідеї, напад паніки, зміна розумового статусу/поведінки; головний біль, запаморочення, порушення концентрації уваги; порушення пам'яті, амнезія, синкопальні стани, слабкість, мігрень, гіпестезія, гіперестезія, парестезія, тремор, порушення смакових відчуттів, сухість у роті, дисгевзія, атаки, нічні кошмари, сонливість; нейропатія, периферична нейропатія; кома, судоми, гіперкінезія, параліч лицевого нерва, церебральна ішемія, енцефалопатія, полінейропатія, мононейропатія, невралгія, летаргія, психомоторна гіперактивність; порушення гостроти зору, звуження поля зору, запальні захворювання очей, порушення з боку слізних залоз, ксерофтальмія; крововилив у сітківку, ексудати сітківки, геморагія у кон'юнктиві, кератит; оптична нейропатія, набряк диска зорового нерва, неврит зорового нерва, ураження/оклюзія судин сітківки, ретинопатія, макулярний набряк, виразка рогівки, кон'юнктивіт, подразнення/біль/сухість/свербіж очей; втрата/погіршення/нечіткість зору, біль у очному яблуці, фотофобія; серозне відшарування сітківки, вертиго, біль у вусі; втрата/ослаблення слуху, шум у вухах; тахікардія, пальпітація,

периферичні набряки; погіршення серцевої функції та/або погіршення існуючої патології серця, ІМ, кардіоміопатія, ІХС, застійна СН, стенокардія, суправентрикулярна тахікардія, аритмія, фібриляція передсердь, перикардит, перикардальний випіт, припливи, блідість; артеріальна гіпотензія, АГ, серцевий шум; крововилив у головний мозок, васкуліт, периферична ішемія; диспное (задишка), тахіпное, кашель, дисфонія; задишка при фізичному навантаженні, носова кровотеча, порушення дихання, застій у дихальних шляхах/синусах, назофарингіт, набряки пазух, закладеність носа, подразнення/дискомфорт у носі, риніт, ринорея, чхання, тяжке дихання, посилення секреції ВДШ, біль у горлі/глотці; свистяче дихання; пневмоніт, інтерстиційний пневмоніт (включаючи летальні випадки), легеневий інфільтрат, емболія легеневої артерії, діарея, нудота, біль у животі; блювання, диспепсія, дисфагія, звиразкування слизової оболонки ротової порожнини, кровоточивість ясен, хейлоз, глосит, гінгівіт, стоматит, виразковий/афтозний стоматит, стоматологічні порушення, біль у роті, метеоризм, запор, сухість слизової оболонки ротової порожнини, фаринголарингеальний біль; біль у правому верхньому квадранті живота, гастроєзофагеальний рефлюкс, шлунково-кишкова кровотеча/розлад, хейліт, гінгівіт; пептична виразка, панкреатит, гастроентерит, ішемічний коліт, виразковий коліт, ректальне порушення, пігментація язика, зубні порушення/біль, абсцес зуба, дискомфорт у шлунку, порушення функції печінки; печінкова недостатність, холангіт, жирова дистрофія печінки, гепатомегалія, жовтяниця, гіпербілірубінемія, гепатотоксичність (в т. ч. летальна), цитолітичний гепатит, алопеція, дерматит, свербіж, сухість/ексфоціація/зміна кольору шкіри, синець, пігментація, атопічний дерматит; висипання, псоріаз, кропив'янка, екзема, акне, фурункул, шкірні реакції, реакції фотосенсибілізації, макулопапульозний/еритематозний висип, нічні потіння, гіпергідроз; токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона, ангіоневротичний набряк, набряк обличчя, еритема, бронхоспазм, анафілаксія, мультиформна еритема, міалгії, артралгії; біль у спині, артрит, м'язова слабкість, біль в кістках/кінцівках, біль в шиї, кістково-м'язовий біль, м'язові судоми, контрактура м'яза; міозит; рабдоміоліз, ниркова недостатність, нефротичний с-м, порушення ф-ції нирок, порушення (часте) сечовипускання, поліурія, енурез, нетримання сечі, патологічні зміни кольору сечі, протеїнурія, простатит, імпотенція, еректильна/статева дисфункція, біль у тестикулах/грудях, аменорея, менорагія, порушення менструального циклу, дисменорея, порушення з боку яєчників, вагінальні порушення, вагініт, лихоманка, озноб, біль, астенія, втома, подразливість/дратівливість; біль/дискомфорт в грудній клітці, грипоподібний с-м, нездужання, відчуття холоду, загальмованість, спрага, зниження маси тіла, затримка росту у дітей, збільшення рівня сечової кислоти і непрямого білірубіну, асоційованих з гемолізом, підвищення активності АЛТ, порушення з боку шкіри/нігтів, синець, патологічні зміни структури волосся, незвичне самопочуття, збільшення рівня ТСГ/тироглобуліну/амілази/ліпази/гамма-глутамілтрансферази/молочної кислоти у крові, наявність антитиреоїдних антитіл; передозування речовини, гостра подагра, набряк, біль обличчя, мітохондріальна токсичність, зниження кількості лімфоцитів CD4.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до рибавіріну та до інших компонентів препарату; вагітність (лікування препаратом може бути розпочате лише після отримання негативного тесту на вагітність безпосередньо перед початком лікування) і період годування груддю; чоловіки, жінки яких є вагітними; тяжка патологія серця в анамнезі, у тому числі нестабільна та неконтрольована патологія серця протягом попередніх 6 місяців; тяжкі порушення функції печінки (ступінь В або С за класифікацією Чайлда-П'ю) чи декомпенсований цироз печінки; гемоглобінопатії (таласемія, серповидноклітинна анемія); лікування пегінтерфероном α -2b протипоказане пацієнтам з ко-інфекцією ВІЛ-ВГС з цирозом за шкалою Чайлда-П'ю \geq 6 балів; тяжкі виснажливі захворювання; хр. ниркова недостатність або кліренс креатиніну $<$ 50 мл/хв та/або пацієнти, яким проводять гемодіаліз; дітям та підліткам при наявності анамнестичних або клінічних даних про тяжкий психічний розлад, особливо депресію, суїцидальні думки або спробу самогубства; аутоімунний гепатит або інші аутоімунні захворювання в анамнезі (у зв'язку з комбінацією з пегінтерфероном α -2b або інтерфероном α -2b).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ВІРОРІБ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	капс. у бл. та стрип.	200мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛІВЕЛ®	ТОВ "АСТРАФАРМ" (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості)/ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (випуск серії), Україна/Україна	капс. у бл.	200мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛІВЕЛ®	ТОВ "АСТРАФАРМ" (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості)/ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (випуск серії), Україна/Україна	капс. у бл.	200мг	№10x5	23,37	
	МАКСВІРИН®	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	капс. тверді у бл.	200мг	№10x3, №10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РИБАВІРИН-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	капс. у бл.	200мг	№10x6	20,00	
	РИБАВІРИН-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	капс. у бл.	200мг	№10x3	23,33	

II.	ГЕПАВІРИН	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у фл.	200мг	№30, №140	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КОПЕГУС®	Патеон Інк. (виробництво нерозфасованої продукції)/Іверс-Лі АГ (пакування)/Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд (пакування, випуск серії)/Рош Фарма АГ (випробування контролю якості), Канада/Швейцарія /Швейцарія/Німеччина	табл., вкриті п/о у фл.	200мг	№168	32,87	24,51/\$

- **Ламівудин (Lamivudine) *** (див. п. 17.5.3.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: хр. ВГВ на тлі реплікації ВГВ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим рекомендованою дозою є 100 мг^{БНФ} (або 20 мл) 1 р/день^{БНФ}; приймати незалежно від вживання їжі; у пацієнтів з помірним та тяжким порушенням функцій нирок, із кліренсом креатиніну менше 50 мл/хв дозу слід зменшити^{ВОЗ}; дітям до 18 років не рекомендується.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0.3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЗЕФФІКС™	Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед/ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А., Велика Британія/Польща	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№14x2	111,35	26,67/\$

3.9. Лікарські засоби, що застосовуються для лікування хвороби Коновалова-Вільсона

- **Пеніциламін (Penicillamine) *** (див. п. 8.7.1.7. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: хвороба Вільсона^{БНФ} (гепатолентикулярна дегенерація).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: хв. Вільсона: дорослим - 1,5-2 г/добу за кілька прийомів, після досягнення ремісії хвороби дозу можна зменшити до 0,75 г-1,0 г/добу^{БНФ}, пацієнтам із негативним балансом міді застосовувати мінімальну ефективну дозу, дозу 2 г/добу не слід застосовувати довше, ніж протягом 1 року^{БНФ}, пацієнтам літнього віку - 20 мг/кг маси тіла/добу за кілька прийомів^{БНФ}, дозу підібрати так, щоб досягти ремісії хвороби і утримати негативний баланс міді, дітям - 20 мг/кг маси тіла/добу за 2-3 прийоми за 1 год до прийому їжі^{БНФ}, для дітей віком від 12 років доза ЛЗ становить 0,75 - 1 г/добу; мінімальна доза – 500 мг/добу

3.10. Жовчогінні засоби

3.10.1. Лікарські засоби, що мають холекінетичну дію

- **Магнію сульфат (Magnesium sulfate) *** (див. п. 3.11.2. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

3.10.2. Інші жовчогінні лікарські засоби

Комбіновані препарати

- **Екстракт рутки лікарської + екстракт плодів розторопші плямистої (Fumaria officinalis + Silybum marianum) **** (див. п. 3.7.4. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

3.11. Проносні засоби

3.11.1. Контактні проносні засоби

- **Бісакодил (Bisacodyl) ****

Фармакотерапевтична група: А06АВ02 - контактні проносні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: проносна; стимулює перистальтику товстої кишки шляхом подразнюючої дії на слизову оболонку або прямої стимуляції нервових закінчень у підслизовому та слизовому нервових сплетіннях; надає послаблювальний ефект, який проявляється розм'якшенням або розрідженням калових мас; механізм проносної дії зумовлений збільшенням проникнення води в порожнину кишечника та зменшенням її абсорбції, а також прискоренням перистальтики кишечника; при прийомі вдень проносна дія настає зазвичай через 6-10 год, при прийомі перед сном – через 8-12 год.

Показання для застосування ЛЗ: короткотривале симптоматичне лікування запорів^{БНФ} різної етіології: звичні та хр. запори у лежачих хворих і пацієнтів літнього віку, перед діагностичними процедурами^{БНФ}, хірургічними та акушерськими втручаннями, а також у перед- та післяопераційний період; клінічна необхідність полегшення дефекації при геморої, анальних фістулах та тріщинах.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішню препарат приймають перед сном, незалежно від часу вживання їжі^{БНФ}; для короткочасного лікування запорів, клінічної необхідності полегшення дефекації при геморої, анальних фістулах та тріщинах: дорослі та діти віком від 10 років: 1-2 табл. (5-10 мг) 1 р/добу^{БНФ}; діти віком від 4^{БНФ} до 10

років: 1 табл. (5 мг) 1 р/добу^{БНФ}; для підготовки до діагностичних процедур і перед оперативними втручаннями (під наглядом лікаря): дорослі та діти віком від 10 років: 2-4 табл. (10-20 мг) одноразово ввечері; діти віком від 4 до 10 років: 1 табл. (5 мг) ввечері; не рекомендується застосовувати препарат більше 7 днів, щоденне застосування препарату небажане; у лікарській формі супозиторії^{БНФ}: лише дорослим^{БНФ} рекомендовано 1 супозиторій (10 мг) 1 р/добу, вранці^{БНФ}; лікування триває не більше 7 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперчутливість, алергічні реакції (у тому числі анафілактичні реакції, ангіоневротичний набряк); спастичний біль у животі, спазми у животі, абдомінальні коліки, метеоризм; нудота; діарея (в т.ч. хронічна) з домішками крові, яка може призвести до зневоднення організму та порушення електролітного балансу, гематохезія (кров у калі), дегідратація, аноректальний/абдомінальний дискомфорт, блювання; абдомінальний дискомфорт; функціональна атонія ободової кишки, коліт; запаморочення, синкопе (в тому числі дефекаційне); гіпокаліємія; слабкість м'язів, судоми, порушення координації, артеріальна гіпотензія, ортостатична гіпотензія; гіпокаліємія, вторинний гіперальдостеронізм, СКХ, меланоз товстого кишечника; пошкодження ниркових каналців, метаболічний алкалоз та м'язова слабкість в результаті гіпокаліємії.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до бісакодилу та/або до будь-якої допоміжної речовини препарату; г. проктит (в т.ч. виразковий з пошкодженням слизової оболонки), г. геморой, спастичний запор, кишкова непрохідність, анальні тріщини; кровотеча зі ШКТ, маткові кровотечі; с-м г. живота, перитоніт, апендицит та інші запальні процеси в черевній порожнині, защемлена грижа; біль у животі, нудота та блювання невідомої етіології, коліт, хв. Крона; порушення водно-електролітного балансу; тяжка дегідратація.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 10 мг., ректально - 10 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БІСАКОДИЛ	ПрАТ"Лекхім - Харків", Україна	супоз. рект. у бл.	0,01г	№5x2	1,40	
	БІСАКОДИЛ	ПАТ "Монфарм", Україна	супоз. рект. у стрип.	0,01г	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БІСАКОДИЛ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. в/о, к/р у конт. чар/уп.	5мг	№10x3	1,38	
	БІСАКОДИЛ-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	супоз. рект. в пач.	10мг	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БІСАКОДИЛ-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	супоз. рект. у стрип.	10мг	№5x2	1,11	
II.	БІСАКОДИЛ ГРІНДЕКС	АТ "Гріндекс", Латвія	табл. в/о, к/р у бл.	5мг	№10x4	1,24	31,84/€

● **Рицинова олія (Castor oil) ****

Фармакотерапевтична група: А06АВ05 - проносні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: при застосуванні внутрішньо гідролізується ліпазою у тонкому кишечнику з утворенням рицинолевої кислоти, яка спричиняє подразнення рецепторів кишечника та рефлекторно посилює його перистальтику; проносний ефект настає звичайно через 5-6 год; також спричиняє рефлекторне скорочення міометрія.

Показання для застосування ЛЗ: запори.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати внутрішньо; для дорослих та дітей віком від 12 років - 15-30 г на прийом; якщо препарат застосовувати для очищення кишечника перед діагностичними процедурами, то доцільно вжити його за 6 год до проведення процедури.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота, блювання, діарея, біль у животі, порушення водно-електролітного балансу; після спорожнення кишечника можливий запор; при тривалому застосуванні - порушення травлення, ентероколіт, розвиток звикання, атонія кишечника; можливі АР.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; отруєння жиророзчинними речовинами (фосфором, бензолом, фенолом); виразкова хвороба шлунка та ДПК, виразковий коліт; отруєння жиророзчинними протигельмінтними засобами, екстрактом папороті чоловічої; г. запальні процеси у черевній порожнині (апендицит, перитоніт); маткові кровотечі; хахексія; період вагітності; літній вік; дитячий вік до 12 років; недиагностований біль у ділянці живота; обструкція жовчовивідних протоків; тяжка дегідратація.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	РИЦИНОВА ОЛІЯ	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	олія у фл.	30г	№1	10,02	
	РИЦИНОВА ОЛІЯ	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	олія у фл.	50г	№1	18,30	
	РИЦИНОВА ОЛІЯ	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	олія у фл.	100г	№1	23,57	
	РИЦИНОВА ОЛІЯ	АТ "Лубнифарм", Україна	олія у фл.	50мл	№1	14,45	

РИЦИНОВА ОЛІЯ	АТ "Лубнифарм", Україна	олія у фл.	100мл	№1	22,07	
РИЦИНОВА ОЛІЯ	АТ "Лубнифарм", Україна	олія у фл.	30мл	№1	9,74	
РИЦИНОВА ОЛІЯ	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	олія у фл.	30г	№1	12,63	
РИЦИНОВА ОЛІЯ	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	олія у фл.	100г	№1	29,82	
РИЦИНОВА ОЛІЯ	ПАТ "Галичфарм", Україна	олія у фл.	50мл	№1	17,20	

● **Глікозиди сени (*Senna glycosides*)** * **

Фармакотерапевтична група: А06АВ06 - контактні проносні засоби. Глікозиди сени.

Основна фармакотерапевтична дія: діє на моторику товстого кишечника; дія зумовлена антраглікозидами (в основному сенозидами А та В) і пов'язана із впливом на рухливість товстої кишки: гальмування стаціонарних і стимуляція пропульсивних скорочень, внаслідок цього досягається прискорене проходження кишкового тракту і скорочення часу контактування хімусу з кишковою стінкою, зменшується резорбція рідини; завдяки стимулюванню активної хлоридної секреції виділяються вода і електроліти.

Показання для застосування ЛЗ: запори^{БНФ, ВООЗ}, обумовлені атонією кишечника різної етіології.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймають внутрішньо, розжовуючи та запиваючи достатньою кількістю рідини, зазвичай перед сном; дорослим та дітям від 12 років по 1 кубіку 1 р/добу; МДД - 1 кубик; слід приймати найменшу ефективну дозу препарату, необхідну для відновлення нормальної функції ШКТ; призначений для короткотривалого застосування

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анорексія, скарги на спастичний біль у животі, діарею; метеоризм, псевдомеланоз кишечника, порушення травлення, зміна кольору сечі (червона або коричнева залежно від показника рН, що не має клінічного значення); при тривалому застосуванні/зловживанні - протеїнурія, гематурія, гіперальдостеронізм, гіпокальціємія; тривале застосування проносних засобів може призвести до втрати електролітів, головним чином калію, що може спричинити порушення серцевої діяльності, особливо при одночасному застосуванні з серцевими глікозидами, діуретиками і гормонами кори надниркових залоз; підвищена втомлюваність, м'язова слабкість, судоми, АР (включаючи свербіж, кропив'янку, локальну або генералізовану екзантему).

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена індивідуальна чутливість до діючої речовини та/або до інших компонентів препарату; нудота, блювання; г. запальні захворювання ШКТ (хвороба Крона, виразковий коліт, апендицит); кишковий стеноз та атонія; кровотечі ШКТ; тяжка дегідратація організму, що супроводжується втратою води та електролітів; метрорагії; геморой; перитоніт; пептична виразка шлунка і ДПК; защемлена грижа; органічні ураження печінки; кишкова непрохідність (ілеус); біль у ділянці живота незвичного походження, цистит, тріщини прямої кишки, спастичний коліт, панкреатит, гепатит, нефрит, дивертикуліт.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	СЕНАДЕКСИН	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл.	70мг	№10	11,16	
	СЕНАДЕКСИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл. в кор.	70мг	№10x1, №10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СЕНАДЕКСИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	70мг	№10	14,83	
	СЕНАДЕКСИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл. в кор.	70мг	№10x2	29,67	
	СЕНАДЕКСИН-ФОРТЕ	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл. у пач.	140мг	№10x10	131,71	
	СЕНАДЕКСИН-ФОРТЕ	ПАТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл. в пач. та без	140мг	№10, №10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	РЕГУЛАКС®	Кревель Мойзельбах ГмбХ, Німеччина	кубики фрукт.	0,71г/0,3г	№1x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СЕНАДЕ®	Медітеб Спешиалітіз Пвт. Лтд, Індія	табл. у бл.	13,5мг	№20x25	відсутня у реєстрі ОВЦ	

● **Натрію пікосульфат (*Sodium picosulfate*)** **

Фармакотерапевтична група: А06АВ08 - контактні проносні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: є проносним засобом місцевої дії триарилметанової групи; після бактеріального розщеплення у товстій кишці стимулює її слизову оболонку, прискорюючи перистальтику, сприяє кумуляції води та електролітів у просвіті товстої кишки; результатом цього є стимуляція дефекації, зменшення часу транзиту і пом'якшення калу, діє у товстій кишці і стимулює у ній безпосередньо процес евакуації калу, є

неефективним для впливу на травлення чи всмоктування калорій або основних поживних речовин у тонкому кишечнику.

Показання для застосування ЛЗ: запори^{БНФ} або випадки, що потребують полегшення дефекації.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: крап. приймають внутрішньо одноразово, ввечері; ефект настає через 10-12 год; дорослим: 10-18 крап. (5-10 мг)^{БНФ}, дітям віком від 4 років (тільки за призначенням лікаря): 5-9 крап. (2,5-5 мг); рекомендовано почати з найнижчої дози; доза може бути скоригована до максимальної рекомендованої дози для регулярної дефекації; МДД - 18 крап. (для дорослих) або 9 крап. (для дітей віком від 4 років і вище); табл.: дорослим - по 1 табл. (7,5 мг) 1 р/добу, приймати на ніч, випорожнення кишечника відбувається через 10-12 годин після застосування, не перевищувати МДД - 7,5 мг

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: шкірні реакції (ангіоневротичний набряк, медикаментозна токсикодермія, висип, свербіж); алергічні реакції/реакції гіперчутливості; запаморочення; синкопе; діарея; спазми/коліки у животі, абдомінальна біль, дискомфорт у животі; блювання, нудота; тривале та надмірне застосування препарату може призвести до втрати рідини, калію та інших електролітів; це, може призвести до м'язової слабкості і порушення серцевої функції, особливо при одночасному застосуванні препарату з діуретиками або КС.

Противпоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини, інших триарилметанів або до будь-якої з допоміжних речовин препарату; динамічна або механічна кишкова непрохідність, тяжкі захворювання органів черевної порожнини з больовим синдромом та/або з підвищенням температури тіла (апендицит), що можуть супроводжуватись нудотою та блюванням; г. запальні захворювання кишечника; тяжка дегідратація; рідкісна спадкова непереносимість будь-якої з допоміжних речовин препарату, дитячий вік до 4 років, рідкісна спадкова непереносимість фруктози.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕНТЕРОЛАКС	АТ "Стома", Україна	табл. у бл.	7,5мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПІКОЛАКС®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x1	2,30	
	ПІКОЛАКС®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	7,5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПІКОЛАКС®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	7,5мг	№10x1	3,80	
	ПІКОЛАКС®	ПАТ "Фармак", Україна	крап. орал. у фл. по 30мл	7,5 мг/мл	№1	2,33	
	ПІКОЛАКС®	ПАТ "Фармак", Україна	крап. орал. у фл. по 15мл	7,5 мг/мл	№1	2,44	
	ПІКОНОРМ®	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	крап. орал., р-н по 15мл, 30мл у фл. з крап.	7,5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПІКОНОРМ®	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	крап. орал., р-н по 10мл у фл. з крап.	7,5 мг/мл	№1	1,97	
	СЛАБІЛАКС- ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	7,5мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СЛАБІЛАКС- ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	7,5мг	№10x1	2,44	
СЛАБІЛАКС- ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	крап. орал. у фл. по 30мл	7,5 мг/мл	№1	1,49		
СЛАБІЛАКС- ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	крап. орал. у фл. по 15мл	7,5 мг/мл	№1	1,90		
II.	ГУТТАЛАКС® ПІКОСУЛЬФАТ	Іstituto de Анжелі С.р.л., Італія	крап. у фл. по 15мл, 30мл	7,5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	РЕГУЛАКС® ПІКОСУЛЬФАТ КРАПЛІ	Кревель Мойзельбах ГмБХ, Німеччина	крап. орал., р-н по 20мл у фл.- крап.	7,5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

3.11.2. Осмотичні проносні засоби

- **Магнію сульфат (Magnesium sulfate)****

Фармакотерапевтична група: А06AD04 - осмотичні проносні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: прийом внутрішньо призводить до проносного ефекту; має також жовчогінну та сечогінну дії; проносний ефект зумовлений зміною осмотичного тиску, затримкою всмоктування води з кишечника, розрідженням і збільшенням об'єму кишкового вмісту, подразненням ентерорецепторів, що сприяє полегшенню акту дефекації.

Показання для застосування ЛЗ: запори; як антидот при отруєнні солями барію.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: як проносний засіб препарат призначають внутрішньо (на ніч або натщесерце за 30 хв до їди) 1 р/добу дорослим - по 10-30 г в 1/2 склянки води; дітям віком від 12 років - по 10 г в 1/2 склянки води, дітям віком 6-12 років - від 5 до 10 г (тобто від половини до цілого об'єму р-ну приготованого із розрахунку

10 г на 1/2 склянки води); при хр. запорі застосовувати у клізмах: вміст 1 пакета (10 г) розчинити у 500 мл води; при отруєнні р-ними солями барію: дорослим внутрішньо 20-25 г порошку, розчиненого у 200 мл води

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: переривання вагітності, загострення запальних процесів у ШКТ, нудота, блювання, АР; у разі тривалого застосування можливе порушення водно-сольового обміну, порушення харчування організму, атонія товстого кишечника.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена індивідуальна чутливість, кишкова непрохідність, г. запальні захворювання ШКТ, ЖКХ, обструкції жовчовивідних шляхів, г. пропасні стани, артеріальна гіпотензія, стани, пов'язані з дефіцитом кальцію та пригніченням дихального центру, тяжка форма ниркової недостатності; вагітність

Визначена добова доза (DDD): перорально - 7 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	пор. у пак. та конт.	25г, 10г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	пор. у пак.	25г	№1	3,05	
	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	ТОВ "Исток-Плюс", Україна	пор. д/р-ну д/орал. застос. у конт. або саше	25г	№1	2,94	

- **Лактулоза (Lactulose)** * ** [окрім сиropу по 650 мг/мл]

Фармакотерапевтична група: А06AD11 - осмотичні проносні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: у товстій кишці лактулоза розщеплюється кишковими бактеріями до низькомолекулярних органічних кислот; ці кислоти знижують рН у просвіті товстої кишки і через осмотичний ефект збільшують об'єм кишкового вмісту; це стимулює перистальтику товстої кишки та нормалізує консистенцію калових мас; запор коригується, і відновлюється фізіологічний ритм кишечника; при печінковій енцефалопатії (або печінковій комі і прекомі) дія препарату зумовлена пригніченням росту протеолітичних бактерій за рахунок збільшення кількості ацидофільних бактерій (наприклад лактобактерій), зв'язуванням аміаку в іонній формі завдяки підкисленню вмісту кишечника, очищенням товстого кишечника за рахунок низького рН, а також осмотичного ефекту, зміною бактеріального метаболізму азоту шляхом стимуляції утилізації бактеріями аміаку для синтезу бактеріальних білків; як пребіотик посилює ріст корисних для організму бактерій, таких як біфідобактерії і лактобактерії, тоді як ріст потенційно патогенних бактерій, таких як клостридії та кишкова паличка, може пригнічуватися; це може призводити до більш сприятливого балансу кишкової флори.

Показання для застосування ЛЗ: запор^{БНФ}: регуляція фізіологічного ритму кишечника; стани, що потребують полегшення дефекації (геморой, після операцій на товстому кишечнику та аноректальній зоні); печінкова енцефалопатія^{БНФ}: лікування і профілактика печінкової коми і прекоми.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дозу підбирають індивідуально; як проносне, при лікуванні запору, залежно від віку застосовують дорослим та дітям старше 14 років у ^{БНФ} початковій дозі ^{БНФ} - 15-45 мл, підтримуючій дозі - 15-30 мл^{БНФ}; діти 7-14 років - у початковій дозі - 15 мл, підтримуючій дозі - 10-15 мл; діти 1-6 років - у початковій дозі - 5-10 мл, підтримуючій дозі - 5-10 мл; діти до 1 року - у початковій дозі - до 5 мл, підтримуючій дозі - до 5 мл; доза може бути знижена вже після 2-3 днів прийому, залежно від потреб хворого; клінічний ефект спостерігається через декілька днів; при лікуванні печінкової енцефалопатії^{БНФ}, печінкової коми і прекоми (лише для дорослих) препарат призначають у початковій дозі по 30^{БНФ}-45 мл^{БНФ} 3-4 р/добу^{БНФ}, доза може бути скоригована до підтримуючої дози для досягнення м'якого випорожнення від 2 до 3 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: у перші дні прийому - метеоризм, який минає через кілька днів; біль у животі та діарея; нудота і блювання; при тривалому прийомі підвищених доз - електролітний дисбаланс.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активної речовини чи ін. компонентів препарату; галактоземія, шлунково-кишкова непрохідність, перфорація травного тракту або ризик перфорації травного тракту (наприклад г. запальні захворювання кишечника, виразковий коліт, хвороба Крона).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 6,7 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БІОФЛОРАКС	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (фасування із "in bulk" фірми "Fresenius Kabi Austria GmbH", Австрія), Україна	сироп по 200мл у фл.	670 мг/мл	№1	5,89	
	БІОФЛОРАКС	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (фасування із "in bulk" фірми "Fresenius	сироп по 100мл у фл.	670 мг/мл	№1	7,97	

	Kabi Austria GmbH", Австрія), Україна						
ЛАКТУВІТ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	сіроп у фл. полім. по 100мл, 200мл з мірн. пристр.; по 2мл, 5мл, у однодоз. конт.	3,335г/5мл	№10		відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛАКТУВІТ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	сіроп по 200мл, у полім. фл.	3,335г/5мл	№1	5,21		
ЛАКТУВІТ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	сіроп по 100мл у полім. фл.	3,335г/5мл	№1	6,45		
ЛАКТУЛОЗА	ПрАТ "Технолог" (фасування із форми in bulk фірми-виробника Фрезеніус Кабі Австрія ГмБХ, Австрія), Україна	сіроп по 200мл у бан. з мір. стакн.	670 мг/мл	№1	4,50		
ЛАКТУЛОЗА	ПрАТ "Технолог" (фасування із форми in bulk фірми-виробника Фрезеніус Кабі Австрія ГмБХ, Австрія), Україна	сіроп по 100мл, у бан. з мір. стакн.	670 мг/мл	№1	6,00		
ЛАКТУЛОЗА	ТОВ "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk виробника Фрезеніус Кабі Австрія ГмБХ, Австрія), Україна	сіроп по 100мл, 200мл у фл. полім.	670 мг/мл	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛАКТУНОРМ®	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" (виробництво з продукції in bulk виробника Фрезеніус Кабі Австрія ГмБХ, Австрія), Україна	сіроп по 500мл у фл. з мірн. стак.	670 мг/мл	№1	3,54		
ЛАКТУНОРМ®	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" (виробництво з продукції in bulk виробника Фрезеніус Кабі Австрія ГмБХ, Австрія), Україна	сіроп по 100мл у фл. з мірн. стак.	670 мг/мл	№1	3,85		
ЛАКТУНОРМ®	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" (виробництво з продукції in bulk виробника Фрезеніус Кабі Австрія ГмБХ, Австрія), Україна	сіроп по 200мл у фл. з мірн. стак.	670 мг/мл	№1	4,55		
НОРМОЛАКТ	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод" (фасування із форми "in bulk" фірми-виробника "Fresenius Kabi Austria GmbH", Австрія), Україна	сіроп по 200мл у фл. полім. з мірн. ложк.	670 мг/мл	№1	4,70		
НОРМОЛАКТ	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод" (фасування із форми "in bulk" фірми-виробника "Fresenius Kabi Austria GmbH", Австрія), Україна	сіроп по 100мл у бан. полім. з мірн. ложк.	670 мг/мл	№1	6,17		
НОРМОЛАКТ	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод" (фасування із форми "in bulk" фірми-виробника "Fresenius Kabi Austria GmbH", Австрія), Україна	сіроп по 100мл у фл. полім. з мірн. ложк.	670 мг/мл	№1	6,17		
НОРМОЛАКТ ФОРТЕ	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (виробництво з продукції in bulk фірми Фрезеніус Кабі Австрія ГмБХ, Австрія), Україна	сіроп по 100мл, 200мл у фл.	670 мг/мл	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ	

II.	ДУФАЛАК®	Абботт Біолоджікалз Б.В., Нідерланди	сироп по 200мл, 300мл, 500мл, 1000мл у п/е фл.; по 15мл у пак.	667 мг/мл	№1, №10, №20, №50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДУФАЛАК® ФРУТ	Абботт Біолоджікалз Б.В., Нідерланди	р-н орал. по 200мл, 500мл у пл. з мірн. стак.	667 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МЕДУЛАК	АВС Фармачеутічі С.п.А, Італія	сироп по 500мл у фл.	667,0 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МЕДУЛАК	АВС Фармачеутічі С.п.А, Італія	сироп по 180мл у фл.	667,0 мг/мл	№1	6,56	26,38/\$
	НОРМАЗЕ	Л. Молтені і К. деі Ф.ллі Алітті Сосіета ді Езерчіціо С.п.А. (вир-во за повним циклом)/ Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ (вир-во ін балк, перв. та втор. пак., контр. серії), Італія/Австрія	сироп по 200мл у фл.	10г/15мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПОРТАЛАК	Белупо, ліки та косметика, д.д., Хорватія	сироп по 500мл у фл. з мірн. стак.	667 мг/мл	№1	3,81	26,80/€
	ПОРТАЛАК	Белупо, ліки та косметика, д.д., Хорватія	сироп по 250мл у фл. з мірн. стак.	667 мг/мл	№1	5,04	26,80/€

● **Макрогол (Macrogol)** ** [окрім пор. д/орал. р-ну по 64 г/пак.]

Фармакотерапевтична група: А06AD15 - проносні засоби. Осмотичні проносні засоби. Макрогол

Основна фармакотерапевтична дія: за рахунок утворення водневих зв'язків з молекулами води макрогол утримує її в кишечнику, що збільшує вміст рідини у порожнині кишечника, що поліпшує процес випорожнення.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування запорів у дорослих і дітей віком від 8 років.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для р/ос застосування; лікування має на меті відновлення моторики товстого кишечника за умови дотримання відповідної культури харчування (дієти); дорослим і дітям від 8 років - по 1-2 пакетики (10-20 г) на добу, бажано вранці, в один прийом під час їди, попередньо розчинивши у склянці води; щоденна доза визначається відповідно до клінічного ефекту і може становити від 1 пакетика через день (особливо для дітей) до 2 пакетиків на день; тривалість лікування для дітей не має перевищувати 3 місяців.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль у животі, здуття живота, діарея (може викликати болісні відчуття в періанальній ділянці), нудота; блювання, г. позиви на випорожнення, мимовільне випорожнення кишечника; порушення водно-електролітного балансу (гіпонатріємія, гіпокаліємія) та/або зневоднення, особливо у пацієнтів літнього віку; гіперчутливість (анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк, бронхоспазм, набряк обличчя, кропив'янка, висип, свербіж, еритема); діти: біль у животі, діарея (може викликати болісні відчуття в періанальній ділянці), блювання, здуття живота, нудота; гіперчутливість (анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк, кропив'янка, висип, свербіж).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до макро голу або до інших компонентів препарату; тяжкі запальні захворювання товстої кишки (такі як виразковий коліт, хвороба Крона) або токсичний мегаколон; кишкова непрохідність або підозра на кишкову непрохідність, або симптоматичні стенози; перфорація ШКТ або її загроза; біль у животі невизначеного походження.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 10 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДІАГНОЛ®	ПАТ "Фармак", Україна	пор. д/орал. р-ну по 73,69г у пак.	64 г/пак	№4	8,79	
	ЛЕГКОЛАКС	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/орал. р-ну в пак.-саше	4 г/пак.	№4, №20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛЕГКОЛАКС	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/орал. р-ну в пак.-саше	4 г/пак.	№10	20,25	
	ЛЕГКОЛАКС	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/орал. р-ну в пак.-саше	10 г/пак.	№20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛЕГКОЛАКС	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/орал. р-ну в пак.-саше	10 г/пак.	№10	11,70	
	ЛЕГКОЛАКС	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/орал. р-ну в пак.-саше	10 г/пак.	№4	12,50	
II.	КАСЕНЛАКС	Касен Рекордаті, С.Л.,	пор. д/орал. р-ну у	10 г/пак.	№10, №20	відсутня у	

	Іспанія	саше			реєстрі ОБЦ
ФОРЛАКС	БОФУР ІПСЕН ІНДУСТРІ, Франція	пор. д/приг. р-ну д/перор. застос. по 4,0668г, 10,167г в пак.	4г/пак., 10г/пак.	№10, №20	відсутня у реєстрі ОБЦ

Комбіновані препарати

- **Калію хлорид + Натрію хлорид + Натрію бікарбонат + Макрогол (Potassium chloride + Sodium chloride + Sodium bicarbonate + Macrogol) ****

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕНДОФАЛЬК	Др. Фальк Фарма ГмбХ (ви-к, відпов. за випуск серій кінцевого продукту та альтернативне втор. пак.)/ Лозан Фарма ГмбХ (вир-к дозованої форми, перв. і втор. пак.)/ Клоке Фарма-Сервіс ГмбХ (вир-к дозов. форми, Німеччина/Італія	пор. д/орал. р-ну по 55,318г у пак.	0,185г/1,4г/0,715г/52,5г	№6	відсутня у реєстрі ОБЦ	

3.12. Антидіарейні лікарські засоби

3.12.1. Протимікробні засоби, що застосовуються при кишкових інфекціях

- **Ністатин (Nystatin) *** (див. п. 17.4.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: лікування захворювань травного тракту, викликаних грибками роду *Candida* (*Candida albicans*); кандидоз нижніх відділів кишечника, профілактика грибкових уражень у до- та післяопераційний період при хірургічних втручаннях на нижніх відділах кишечника.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл.: внутрішньо, за 40-60 хв до прийому їжі, не розжовуючи; разові дози приймати через рівні проміжки часу; дорослим і дітям від 6 років призначати у дозі 500000 ОД (1 табл.) 3-4 р/добу; МДД для дорослих та дітей від 13 років - 4000000 ОД (8 табл.), у тяжких випадках - 6000000 ОД (12 табл.); МДД для дітей віком від 6 років - 2000000 ОД (4 табл.); курс лікування - 10-14 днів (залежно від тяжкості захворювання та чутливості до препарату); при хронічних рецидивуючих кандидозах проводити повторні курси терапії з перервами у 2-3 тижні між ними; супоз.: дорослим і дітям від 13 років призначати по 500000 ОД 2 р/добу або по 250000 ОД 4 р/добу, МДД - 1000000 ОД, тривалість застосування становить 10-14 днів.

- **Натаміцин (Natamycin)** (див. п. 17.4.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: грибкові захворювання кишечника.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для лікування кандидозу кишечника дорослим призначають по 1 табл. 4 р/добу; зазвичай терапія триває 1 тиждень; дітям старше 3 років призначають по 1 табл. 2 р/добу; через особливості фармакодинамічних та фармакокінетичних властивостей натаміцину рекомендована однакова доза для дітей всіх вікових категорій; зазвичай тривалість лікування становить 1 тиждень.

- **Ніфуроксазид (Nifuroxazide)** (див. п. 17.2.12. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Рифаксимін (Rifaximin)**

Фармакотерапевтична група: А07АА11 - Засоби, що застосовуються при кишкових інфекціях. Антибіотики. Рифаксимін.

Основна фармакотерапевтична дія: а/б ШСД, напівсинтетичне похідне рифаміцину SV; необоротно зв'язує β-субодиниці ДНК-залежної РНК-полімерази бактерій та інгібує синтез бактеріальних РНК і білків; це зумовлює його бактерицидну дію по відношенню до чутливих бактерій; має широкий спектр антимікробної дії щодо Gr+ та Gr-аеробних та анаеробних бактерій, що спричиняють кишкові інфекції; поширеність резистентності серед бактерій, виділених у пацієнтів з діареєю мандрівників, дуже низька; не має здатності абсорбуватися; завдяки дуже низькій абсорбції зі ШКТ рифаксимін у поліморфній формі α діє місцево у просвіті кишечника і клінічно не ефективний проти інвазивних патогенів, навіть у разі чутливості цих бактерій до нього в умовах *in vitro*.

Показання для застосування ЛЗ: шлунково-кишкові інфекції, спричинені бактеріями, чутливими до рифаксиміну, такі як гострі шлунково-кишкові інфекції та діарея мандрівників; синдром надмірного росту бактерій у тонкій кишці; печінкова енцефалопатія; дивертикулярна хвороба кишечника (дивертикуліт) у стадії загострення та хронічне запалення кишечника; профілактика інфекційних ускладнень при колоректальних хірургічних втручаннях.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі і діти віком від 12 років: від 1 табл. 3 р/добу до 2 табл. 2-3 р/добу (добова доза 600-1200 мг). Тривалість лікування не повинна перевищувати 7 днів і залежить від клінічної відповіді на лікування. Повторний курс лікування можна проводити з перервою тривалістю 20-40 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кандидоз, герпесна інфекція, назофарингіт, фарингіт, інфекції верхніх дихальних шляхів, клостридіальна інфекція; лімфоцитоз, моноцитоз, нейтропенія; тромбоцитопенія; зниження апетиту, дегідратація; аномальний сон, депресивний настрій, безсоння, знервованість; запаморочення, головний біль; гіпестезія, мігрень, парестезія, головний біль у ділянці придаткових пазух носа, сонливість; переднепритомний стан; диплопія; біль у вухах, вертиго; прискорене серцевиття; підвищення артеріального тиску, припливи; кашель, сухість у горлі, задишка, закладеність носа, орофарингеальний біль, ринорея; абдомінальний біль, запор, раптові позиви до дефекації, діарея, метеоризм, відчуття розтягнення у черевній порожнині, нудота, блювання, ректальні тенезми; біль у верхній частині черевної

порожнини, асцит, сухість губ, диспепсія, розлади шлунково-кишкової скоротності, тверді випорожнення, випорожнення з кров'ю або слизом, розлади смакових відчуттів; підвищення рівня АСТ, відхилення у лабораторних параметрах печінкової функції; анафілактичні реакції, реакції гіперчутливості, висипання, кропив'янка та екзантема, сонячні опіки (мається на увазі не світлочутливість, а саме сонячні опіки), ангіоневротичний набряк, ексфоліативний дерматит, дерматит, екзема, еритема, прурит, пурпура; біль у спині, м'язовий спазм, м'язова слабкість, міалгія, біль у шиї; кров у сечі, глікозурія, полакіурія, поліурія, протеїнурія; поліменорея; підвищення температури, астеничні стани, застуда, холодний піт, гіпергідроз, грипоподібний синдром, периферичний набряк, біль і відчуття дискомфорту; відхилення у значенні МНО.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до рифаксиміну, інших похідних рифаміцину або до будь-яких допоміжних речовин препарату; реакції гіперчутливості включають ексфоліативний дерматит, ангіоневротичний набряк та анафілаксію; непрохідність кишечника; тяжкі виразкові ураження кишечника.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АЛЬФА НОРМІКС	Альфасігма С.п.А., Італія	табл., вкриті п/о у бл.	200мг	№12x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Фталілсульфатіазол (Phthalylsulfathiazole) ****

Фармакотерапевтична група: А07АВ02 - протимікробні засоби, що застосовуються при кишкових інфекціях. Сульфаніламідні

Основна фармакотерапевтична дія: сульфаніламідний ЛЗ; має бактеріостатичний ефект, механізм якого зумовлений порушенням синтезу в м/о їх ростових факторів фолієвої та дигідрофолієвої кислот

Показання для застосування ЛЗ: г. дизентерія (шигельоз), хр. дизентерія у фазі загострення, коліт, ентероколіт, гастроентерит; для запобігання інфекційним ускладненням при проведенні операцій на кишечнику.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують дорослим та дітям віком від 3 років внутрішньо; дорослі та діти від 12 років при г. формі дизентерії: на 1-2 день - по 1 г 6 р/добу (кожні 4 год), на 3-4 день - по 1 г 4 р/добу (кожні 6 год), на 5-6 день - по 1 г 3 р/добу (кожні 8 год); курсова доза 25-30 г; через 5-6 днів після першого курсу лікування проводять другий курс: 1-2 день - по 1 г через 4 год (вночі - через 8 год), усього 5 г/добу; 3-4 день - по 1 г через 4 год (вночі - не призначають), усього 4 г/добу; 5 день - по 1 г через 4 год (вночі - не призначають), усього 3 г/добу; загальна доза на 2 курс - 21 г; при легкому перебігу хвороби курсову дозу можна зменшити до 18 г; МД для дорослих: разова - 2 г, добова - 7 г; при лікуванні інших захворювань дорослим препарат призначають у перші 2-3 дні по 1-2 г кожні 4-6 год, у наступні 2-3 дні - по 0,5 -1 г; діти від 3 до 7 років - по 500 мг на прийом 4 р/добу; діти від 7 до 12 років - 500-750 мг на прийом 4 р/добу; курс лікування - до 7 днів; при лікуванні інших захворювань препарат застосовують у 1-й день з розрахунку 100 мг/кг/добу, приймають у рівних дозах кожні 4 год з перервою на ніч, у наступні дні застосовують по 250-500 мг кожні 6-8 год, курс лікування - до 7 днів; якщо дитина не може проковтнути табл., її подрібнюють і розводять у невеликій кількості кип'яченої охолодженої води.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР, в т.ч. гарячка, висипання, свербіж; агранулоцитоз, апластична анемія; гіповітаміноз вітамінів групи В (тіамін, рибофлавін, нікотинова кислота тощо) внаслідок пригнічення кишкової мікрофлори.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до фталілсульфатіазолу, інших компонентів препарату, сульфаніламідів, базедова хвороба, захворювання крові, г. гепатит.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 9 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ФТАЛАЗОЛ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл. в пач.	500мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФТАЛАЗОЛ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	500мг	№10	21,24	
	ФТАЛАЗОЛ	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл.	500мг	№10	25,02	
	ФТАЛАЗОЛ	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	табл. у бл. в пач.	0,5г	№10x1, №10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФТАЛАЗОЛ	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	табл. у бл.	0,5г	№10	11,88	
	ФТАЛАЗОЛ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	500мг	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФТАЛАЗОЛ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп. в пач.	500мг	№10x1	37,84	
	ФТАЛАЗОЛ-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії вироб., контроль якості), Україна	табл. у бл. в кор.	500мг	№10x1, №10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	

ФТАЛАЗОЛ-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна	табл. у бл.	500мг	№10	26,14	
-------------------	---	-------------	-------	-----	-------	--

Комбіновані препарати

- *Тиліхінол + тиліхінолу лаурилсульфат + тилброхінол (Thylichinol + thylichinoli laurilsulfatici + thylbrochinol)*

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ІНТЕТРИКС	БОФУР ІПСЕН ІНДУСТРІ, Франція	капс. у бл.	50мг/50мг/200мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

3.12.2. Ентеросорбенти

3.12.2.1. Препарати активованого вугілля

- *Вугілля медичне активоване (Medicinal charcoal) * ** (див. п. 10.8.1. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")*
- *Діосмектум (Diosmectite) ***

Фармакотерапевтична група: А07ВС05 - протидіарейні препарати, що застосовуються при інфекційно-запальних захворюваннях кишечника. Ентеросорбенти.

Основна фармакотерапевтична дія: це подвійний силікат алюмінію та магнію; завдяки стереометричній структурі та високій пластичній в'язкості має високу обволікаючу здатність щодо слизової оболонки травного тракту; шляхом взаємодії з глікопротеїнами слизової оболонки збільшує резистентність слизу до подразників; впливаючи на бар'єрну функцію слизової оболонки травної системи та завдяки високій здатності до зв'язування зі слизовою оболонкою захищає слизову оболонку травного тракту; є радіопрозорим, не забарвлює кал та у звичайних дозах не впливає на фізіологічний час проходження через кишечник.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування г. діареї у дітей та немовлят віком від 1 місяця (у комплексній терапії з р-ном для р/ос регідрації) та у дорослих; симптоматичне лікування хр. діареї; симптоматичне лікування болю, пов'язаного з езофагогастроуденальними та кишковими захворюваннями; короткострокове лікування г. діареї у дорослих і дітей віком від 15 років, додатково до дієти.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: г. діарея: для дітей: від 1 місяця до 1 року - 2 пакетики на день протягом 3 днів, потім 1 пакетик на день; від 1 року - 4 пакетики на день протягом 3 днів, потім 2 пакетики на добу; для дорослих: в середньому 3 пакетики на добу, доза препарату може бути подвоєна на початку лікування; інші показання: діти від 1 місяця до 1 року: 1 пакетик на добу; діти від 1 до 2 років: від 1-2 пакетики на добу; діти віком від 2 років: 2-3 пакетики на добу; дорослі: у середньому 3 пакетики на добу; вміст пакетика необхідно змішати до утворення суспензії безпосередньо перед використанням; рекомендується приймати: після їди при езофагітах, між прийомами їжі при інших показаннях; сусп. Оральна - р/ос дорослим і дітям віком від 15 років 1 пакетик (діосмектит, 3 г) з подальшим прийомом ще 1 пакетика після кожного несформованого калу; проте не більше ніж 6 пакетиків/добу, максимальна тривалість лікування становить 3 дні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: запори, метеоризм, блювання, кропив'янка, висип, свербіж та ангіоневротичний набряк.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; кишкова непрохідність.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 9 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АПСОРБІН	АТ "Фармак", Україна	пор. д/орал. сусп. по 3,76г у саше	3г	№10, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДІОСМЕКТИТ-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	пор. д/орал. сусп. по 3,76г у саше	3г	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДІОСМЕКТИТ-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	пор. д/орал. сусп. по 3,76г у саше	3г	№10	80,68	
	ЕНТЕРОСМЕКТИТ	ТОВ "Тернофарм", Україна	пор. д/орал. сусп. по 3,76г у саше	3г	№10, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СОРБІПЛЮС	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/орал. сусп. по 3,76г у саше	3г	№10, №20, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	СМЕКТА® АПЕЛЬСИН-ВАНІЛЬ	БОФУР ІПСЕН ІНДУСТРІ, Франція	пор. д/орал. сусп. по 3,76г у пак.	3г	№10, №12, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СМЕКТА® ВАНІЛЬ	БОФУР ІПСЕН ІНДУСТРІ, Франція	пор. д/орал. сусп. по 3,76г у пак.	3г	№10, №12, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СМЕКТА® ПОЛУНИЦЯ	БОФУР ІПСЕН ІНДУСТРІ, Франція	пор. д/орал. сусп. по 3,76г у пак.	3г	№12	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СМЕКТАЛІЯ®	Фарматіс – Естре-Сен-Дені (вир-во, перв. та втор. пак.,	сусп. орал. по 10,27г у пак.	3г	№12	відсутня у реєстрі ОБЦ	

		контр. якості, випуск серії, зберігання)/ Бофур Іпсен Індустрі – Дрьо (контр. якості, випуск серії, зберігання), Франція				
--	--	--	--	--	--	--

3.12.2.2. Інші ентеросорбенти

- **Гідрогель метилкремнієвої кислоти (Methylsiliconic acid hydrogel) ****

Фармакотерапевтична група: А07ВС - ентеросорбенти.

Основна фармакотерапевтична дія: інертна кремній-органічна сполука; при застосуванні проявляє сорбційну дію; ефективно адсорбує середньомолекулярні токсичні речовини екзо- та ендogenous походження, продукти незавершеного метаболізму, інкорпоровані радіонукліди та природним шляхом виводить їх з організму; усуває прояви токсикозу, покращує функцію кишечника, печінки, нирок, нормалізує показники крові та сечі.

Показання для застосування ЛЗ: дезінтоксикація організму при хр. нирковій недостатності, спричиненій піелонефритом, полікістозом нирок, нефролітіазом; при токсичному гепатиті, ВГА, ВГВ, холециститі, цирозі печінки та холестазі різної етіології; при ентероколітах, колітах, діареї, гастритах зі зниженою кислотністю, при отруєнні алкоголем і наркотичними засобами; при алергічних і шкірних захворюваннях (діатези, нейродерміти); при опіковій хворобі; гнійно-септичних процесах; токсикозах першої половини вагітності, у комплексній терапії дисбіозу кишечника.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо 2-3 р/добу за 1,5-2 год до або через 2 год після їди або прийому медикаментів, запиваючи достатньою кількістю води; для дорослих та дітей старше 14 років разова доза препарату становить 15 г (1 ст. л.), МДД - 45 г; для дітей з народження до 3 років разова доза препарату становить 5 г (1 ч. л.), МДД - 10 г; віком від 3 до 5 років разова доза - 5 г, МДД - 15 г; від 5-14 років разова доза - 10 г (1 десертна л.), МДД - 30 г; курс лікування - від 7 до 14 діб; при тяжких формах захворювань протягом перших 3 діб застосовують подвійну разову дозу, а при хр. перебігу хвороби (хр. ниркова недостатність) можливе більш тривале застосування препарату.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: диспептичні явища: при перших прийомах - короточасний запор (для його запобігання людям, схильним до запору, в перші два дні застосування препарату рекомендується очищувальна клізма на ніч або застосування послаблюючих засобів); можливі прояви індивідуальної непереносимості компонентів ЛЗ; реакції гіперчутливості.

Протипоказання до застосування ЛЗ: г. кишкова непрохідність, підвищена чутливість/індивідуальна непереносимість компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	ЕНТЕРОСГЕЛЬ	ПрАТ "ЕОФ "КРЕОМА-ФАРМ", Україна	паста д/перор. застос. по 15г у пак.	70г/100г	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕНТЕРОСГЕЛЬ	ПрАТ "ЕОФ "КРЕОМА-ФАРМ", Україна	паста д/перор. застос. по 270г у конт.	70г/100г	№1	128,40	
	ЕНТЕРОСГЕЛЬ	ПрАТ "ЕОФ "КРЕОМА-ФАРМ", Україна	паста д/перор. застос. по 15г у пак.	70г/100г	№15	129,47	
	ЕНТЕРОСГЕЛЬ	ПрАТ "ЕОФ "КРЕОМА-ФАРМ", Україна	паста д/перор. застос. по 405г у конт.	70г/100г	№1	176,55	
	ЕНТЕРОСГЕЛЬ	ПрАТ "ЕОФ "КРЕОМА-ФАРМ", Україна	паста д/перор. застос. по 135г у конт.	70г/100г	№1	66,34	
	ЕНТЕРОСГЕЛЬ 3 СОЛОДКИМ СМАКОМ	ПрАТ "ЕОФ "КРЕОМА-ФАРМ", Україна	паста д/перор. застос. по 135г, 270г, 405г у конт.; по 15г у пак.	69,9г/100г	№1, №10, №20	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СОРБЕНТОГЕЛЬ	ТОВ "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з пакування in bulk ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна), Україна	гель орал. по 270г у конт.	0,7 г/г	№1	132,38	
	СОРБЕНТОГЕЛЬ	ТОВ "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з пакування in bulk ТОВ "Фармацевтична компанія	гель орал. по 135г у конт.	0,7 г/г	№1	75,35	

	"Здоров'я", Україна), Україна					
СОРБЕНТОГЕЛЬ	ТОВ "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна), Україна	гель орал. по 405г у конт.	0,7 г/г	№1	182,99	
СОРБЕНТОГЕЛЬ	ТОВ "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я», Україна), Україна	гель орал. по 100г у тубі; по 15г у саше	0,7 г/г	№1, №5, №10, №20	відсутня у реєстрі ОБЦ	
СОРБЕНТОГЕЛЬ	ТОВ "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я», Україна), Україна	гель орал. по 200г у тубі	0,7 г/г	№1	92,70	
СОРБЕНТОГЕЛЬ БЕБІ	ТОВ "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна), Україна	гель орал. по 50г у тубі; по 5г, 10г у саше	0,7 г/г	№1, №5, №10, №20	відсутня у реєстрі ОБЦ	
СОРБЕНТОМАКС	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	гель орал. по 135г, 270г, 405г у конт.	0,7 г/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

3.12.3. Засоби, що пригнічують перистальтику

- **Лоперамід (Loperamide)** * ** [окрім табл. по 0,002 з № 500, № 1000]

Фармакотерапевтична група: А07DA03 - препарати, що пригнічують перистальтику.

Основна фармакотерапевтична дія: зв'язується з опіатними рецепторами кишкової стінки, зменшуючи пропульсивну перистальтику, збільшуючи час проходження вмісту кишечника через травний тракт та покращуючи всмоктування води та електролітів; підвищує тонус анального сфінктера, що допомагає зменшити нетримання калових мас та позиви до дефекації.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування г. діареї^{БНФ} у дорослих та дітей віком від 12 років; симптоматичне лікування г. епізодів діареї, зумовленої с-мом подразненого кишечника, у дорослих віком від 18 років після встановлення первинного діагнозу лікарем.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим та дітям старше 12 років - г. діарея початкова доза - 2 капс./табл. (4 мг) для дорослих^{БНФ}; у подальшому 1 капс./табл. (2 мг) після кожного наступного рідкого випорожнення^{БНФ}, якщо протягом 48 год не спостерігається клінічного поліпшення, прийом препарату слід припинити; звичайна доза 3-4 капс. (6-8 мг) на добу, МДД при г. діареї 6 капс./табл. (12 мг); симптоматичне лікування г. нападів діареї, зумовленої с-мом подразненого кишечника, у дорослих віком від 18 років після встановлення первинного діагнозу лікарем: початкова доза 2 капс./табл. (4 мг); у подальшому приймають по 1 капс./табл. (2 мг) після кожного випадку рідких випорожнень або згідно з попередніми рекомендаціями лікаря, МДД 6 капс./табл. (12 мг)

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: запаморочення, головний біль; запор, сухість у роті, метеоризм, нудота, блювання, абдомінальний біль та дискомфорт, диспепсія; реакції підвищеної чутливості, анафілактичні реакції (включаючи анафілактичний шок) та анафілактоїдні реакції; підвищена втомлюваність, сонливість, пригнічення свідомості, порушення координації, втрата свідомості, гіпертонія, ступор; міоз; здуття живота, мегаколон (включаючи токсичний мегаколон), кишкова непрохідність (включаючи паралітичну кишкову непрохідність), відчуття розтягнення живота; шкірний висип, кропив'янка, свербіж, ангіоневротичний набряк, бульозі висипання, включаючи с-м Стівенса-Джонсона, мультиформну еритему, токсичний епідермальний некроліз; затримка сечі.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість будь-якого з компонентів препарату; дитячий вік до 12 років; пацієнтам з г. дизентерією, що характеризується наявністю крові у випорожненнях та підвищеною t° тіла, г. виразковим колітом або псевдомембранозним колітом, пов'язаним із застосуванням а/б широкого спектра дії, бактеріальним ентероколітом, спричиненим м/о родин Salmonella, Shigella, Campylobacter; не слід застосовувати, якщо треба уникнути пригнічення перистальтики через можливий ризик виникнення значних ускладнень, включаючи кишкову непрохідність, мегаколон та токсичний мегаколон; необхідно негайно припинити прийом препарату, якщо розвивається запор, здуття живота або кишкова непрохідність.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 10 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	ЛОПЕРАМІД	ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна	табл. у бл.	0,002г	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛОПЕРАМІД	ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна	табл. у бл.	0,002г	№10x100	3,20	
	ЛОПЕРАМІД	ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна	табл. у бл.	0,002г	№10x50	3,20	
	ЛОПЕРАМІД	ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна	табл. у бл.	0,002г	№10x2	3,25	

	ЛОПЕРАМІД	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	2мг	№10x2	2,65	
	ЛОПЕРАМІД-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	2мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛОПЕРАМІД-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	2мг	№10x2	3,77	
	ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	капс. у бл. в кор.	2мг	№10x2	3,47	
	ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	капс. у бл.	2мг	№10	4,00	
	ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	капс. у бл. в кор.	2мг	№10x1	4,09	
	ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД "ОЗ"	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії) Україна	табл. у бл.	2мг	№10	2,60	
	ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД "ОЗ"	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії) Україна	табл. у бл. пач.	2мг	№10x2	2,79	
	ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД "ОЗ"	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії) Україна	табл. у бл. пач.	2мг	№10x3	2,79	
	ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД "ОЗ"	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії) Україна	табл. у бл. пач.	2мг	№10x1	3,15	
II.	ІМОДІУМ®	Янссен-Сілаг, Франція	капс. у бл.	2мг	№6x1, №20x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІМОДІУМ® ЕКСПРЕС	Каталент ЮК Свіндон Зидіс Лімітед/Янссен Сілаг - Вал де Рюй (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії), В.Британія/Франція	табл., що дисперг. у бл.	2мг	№6x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІМОДІУМ® ЕКСПРЕС	Каталент ЮК Свіндон Зидіс Лімітед/ЯНССЕН-СІЛАГ (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії), Велика Британія/Франція	табл., що дисперг. у бл.	2мг	№6x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛОПЕДІУМ®	Салютас Фарма ГмбХ (виробництво in bulk, пакування, випуск серії)/Лек С.А. (пакування, випуск серії), Німеччина/Польща	капс. тверді у бл.	2мг	№6x1, №10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛОПЕРАМІД ГРІНДЕКС	АТ "Гріндекс", Латвія	капс. тверді у бл.	2мг	№10x1	17,87	31,63/€
	СТОПЕРАН	ТОВ ЮС Фармація (виробник відповідальний за упаковку, контроль та випуск серії готового продукту)/СвіссКо Сервісез АГ (виробник відповідальний за виробництво, контроль та випуск продукту in bulk)/Страйдс Фарма Сайенс Лімітед (виробник відповідальний за ви, Польща/Швейцарія/Індія	капс. тверді у бл.	2мг	№4x1, №8x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

3.13. Засоби, що застосовуються при захворюваннях кишечника

3.13.1. Препарати 5-аміносаліцилової кислоти

- **Сульфасалазин (Sulfasalazine)** (див. п. 8.1. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: A07EC01 - протизапальні засоби, що застосовуються при захворюваннях кишечника. Кислота аміносаліцилова та подібні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: механізм дії сульфасалазину та його метаболітів, 5-аміносаліцилової кислоти та сульфапірину, все ще досліджується, але може бути пов'язаним із протизапальними та/або імуномодулюючими властивостями, що спостерігалися у тварин та в умовах *in vitro*, з його спорідненістю до сполучної тканини та/або з досягненням відносно високої концентрації у серозних рідинах, печінці та стінці кишечника, що було продемонстровано у радіоавтографічних дослідженнях на тваринах; клінічні дослідження при виразковому коліті, що включали введення сульфасалазину, сульфапіридину і 5-аміносаліцилової кислоти ректально, показали, що основна терапевтична дія може бути зумовлена молекулою 5-аміносаліцилової кислоти.

Показання для застосування ЛЗ: виразковий коліт^{БНФ, ВООЗ} від легкого до середнього ступеня тяжкості та як допоміжна терапія при виразковому коліті тяжкого ступеня; подовження періоду ремісії між г. атаками виразкового коліту;

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати внутрішньо; *виразковий коліт* - початкова терапія: дорослі - 3-4 г/добу у рівно поділених дозах з інтервалами між прийомами не більше 8 год; можна розпочати терапію нижчими дозами, 1-2 г/добу, для зменшення можливої непереносимості з боку ШКТ; діти віком від 6 років: 40-60 мг/кг маси тіла протягом кожного 24-год періоду, розділена на 3-6 прийомів; підтримуюча терапія: дорослі - 2 г/добу^{БНФ, ВООЗ}; діти віком від 6 років: 30 мг/кг маси тіла протягом кожного 24-год періоду, розподілена на 4 прийоми; препарат не рекомендований дітям, для яких разова доза, розрахована виходячи з їх маси тіла, становить менше 1 табл. (500 мг)

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, підвищення температури тіла, диспепсія, біль у животі, нудота, блювання, діарея, розлади шлунка, стоматит, нейтропенічний ентероколіт, загострення виразкового коліту, зниження/втрата апетиту, недостатність фолатів, лейкопенія, гемолітична анемія, анемія з тільцями Гейнца, псевдомононуклеоз, ціаноз, макроцитоз, підвищення показників аналізу функції печінки (СГОТ/АСТ, СГПТ/АЛТ, ГГТ, ЛДГ, лужна фосфатаза, білірубін), кропив'янка, еритема, реверсивна олігоспермія; реакція гіперчутливості, висип на шкірі з еозинофілією і системними симптомами (DRESS), свербіж, нефрит, с-м сироваткової хвороби, інтерстиційне захворювання легень, пневмоніт з/без еозинофілії, васкуліт, фіброзуючий альвеоліт, плеврит, перикардит з/без тампонади, алергічний міокардит, вузликівий поліартеріїт, вовчакоподібний синдром, гепатит і некроз печінки з/без імунних комплексів, фульмінантний гепатит, що може призвести до трансплантації печінки, анафілаксія, набряк обличчя; агранулоцитоз, панцитопенія, тромбоцитопенія, мегалобластна (макроцитарна) анемія, апластична анемія, пурпура, гіпопротромбінемія, метгемоглобінемія, вроджена нейтропенія і мієлодиспластичний с-м; панкреатит, печінкова недостатність, кров'яниста діарея, порушення абсорбції фолієвої к-ти, дигоксину; підвищення ензимів печінки, індукція аутоантитіл, кашель, диспное, орофарингеальний біль, жовтяниця, холестатична жовтяниця, цироз, холестатичний гепатит, холестази і можливе гепатоцелюлярне пошкодження, включаючи некроз печінки і ПН; ангіоневротичний набряк, екзантема, токсична пустулодерма, червоний плоский лишай, с-м Гужеро-Шегрена, ексфолиативний дерматит, фоточутливість, с-м Стівенса-Джонсона, епідермальний некроліз (с-м Лайєлла) з пошкодженням рогівки, г. віспоподібний параспоріаз (с-м Муха-Габермана), рабдоміоліз, артралгія, періорбітальний набряк, ін'єкція кон'юнктиви і білкової оболонки ока, алопеція, висипання; блідість; нефротичний с-м, нефролітаз, протеїнурія, гематурія, кристалурія, токсична нефропатія з олігурією та анурією, інфекції сечовивідних шляхів, гемолітико-уремічний синдром, інтерстиціальний нефрит, зміна кольору сечі та зміна кольору шкіри; збільшення зобу, гіпоглікемія, діурез; запаморочення, розлади відчуття смаку, поперечний мієліт, поперечне ураження заднього канатика спинного мозку, синдром кінського хвоста, синдром Гійєна-Барє, пригнічення психічних функцій, втрата слуху, розлади відчуття запаху, атаксія, сонливість, шум у вухах, судоми, безсоння, галюцинації, депресія, периферична невропатія, асептичний менінгіт, псевдомембранозний коліт, енцефалопатія; синдром подібний до с-му Кавасакі, що включає зміни ф-ції печінки; 10% рівень пригнічення імуноглобуліну

Противпоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до сульфасалазину, його метаболітів, сульфонамідів або саліцилатів; кишкова непрохідність або обструкція сечовивідних шляхів; порфірія, оскільки повідомлялося про утворення сульфонамідами осаду при г. атаці; ураження нирок тяжкого ступеня (швидкість клубочкової фільтрації < 30 мл/хв/1,73м²) та/або ураження печінки тяжкого ступеня; пацієнтам, в анамнезі яких є напади астми тяжкого ступеня, кропив'янка, риніт або інші АР, спричинені ацетилсаліциловою кислотою або іншими НПЗЗ, у таких пацієнтів були зареєстровані анафілактичні реакції з летальним наслідком.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	САЛАЗОПІРИН ЕН-ТАБС	Реціфарм Уппсала АБ, Швеція	табл., в/о, к/р у фл.	500мг	№100	16,76	25,39/\$
	СУЛЬФАСАЛАЗИН	КРКА, д.д., Ново место (вир-во готового ЛЗ, перв. та втор. уп., контр. та випуск серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x5	27,31	30,27/€
	СУЛЬФАСАЛАЗИН-ЕН	КРКА, д.д., Ново место (вир-во готового ЛЗ, перв. та втор. уп., контр. та випуск серії), Словенія	табл. к/р у бл.	500мг	№10x5	27,89	30,27/€

- **Месалазин (Mesalazine)**

Фармакотерапевтична група: A07EC02 - протизапальні засоби, що застосовуються при захворюваннях кишечника.

Основна фармакотерапевтична дія: механізм протизапальної дії невідомий; результати досліджень *in vitro* свідчать, що певну роль може мати інгібування ліпооксигенази; було також продемонстровано вплив на концентрацію простагландинів у слизовій оболонці кишечника; може зв'язувати вільні радикали; при р/ос прийомі діє переважним чином локально на слизову оболонку кишок і на підслизову тканину з боку порожнини кишок; отже, важливо, що месалазин є доступним у зонах запалення.

Показання для застосування ЛЗ: ненеспецифічний виразковий коліт від легкого до помірного ступеня тяжкості, хвороба Крона, лікування загострень^{БНФ} та профілактика рецидивів виразкового коліту^{БНФ}, обмеженого прямою кишкою, виразковий проктосигмоїдит та лівобічний коліт, виразковий проктит, як додаткова терапія до перорального лікування тяжких форм генералізованого виразкового коліту, що вражає пряму кишку або ректосигмоїдний відділ товстої кишки.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: виразковий коліт: у фазі загострення дорослим доза підбирається індивідуально та становить табл. пролонг. дії - до 4 г/добу; табл. кишковорозчинні, гранули - 1,5-3 г/добу (в деяких випадках до 4г/добу, залежно від тяжкості захворювання), розділена на кілька прийомів; супоз. - по 500 мг 3 р/добу; суспензія ректальна - 1 клізма (4000 мг/60 г) 1 р/добу, перед сном; діти: доза підбирається індивідуально та становить 30-50 мг месалазину/кг/добу^{БНФ}, розділена на кілька прийомів; МДД - 75 мг/кг/добу, поділена на кілька прийомів; загальна ДД не повинна перевищувати максимальну дозу для дорослих; підтримуюча терапія для дорослих: табл. пролонг. дії - 2 г 1р/добу; табл. кишковорозчинні, гранули - 1,5 г-2 г 1 р/добу (для пацієнтів з групи ↑ ризику рецидиву - 3 г 1 р/добу, вранці); супоз. - по 250 мг 3 р/добу^{БНФ}, по 500 мг 2 р/добу; діти: доза підбирається індивідуально, починаючи з 15-30 мг/кг/добу, розділена на кілька прийомів, загальна доза не більше 2 г/добу; дітям з масою тіла менше 40 кг рекомендується приймати половину дози для дорослих, дітям з масою тіла понад 40 кг - звичайну дозу для дорослих; хвороба Крона у фазі загострення та підтримуюча терапія, дози для дорослих: табл. пролонг. дії - до 4 г/добу за кілька прийомів; табл. кишковорозчинні - 1,5-4,5 г/добу за кілька прийомів; гранули - 2-4 г/добу за кілька прийомів; діти: фаза загострення: доза підбирається індивідуально, починаючи з 30-50 мг/кг/добу, розділена на кілька прийомів; МДД - 75 мг/кг/добу поділена на декілька прийомів, загальна ДД не повинна перевищувати максимальну дозу для дорослих; підтримуюча терапія: доза підбирається індивідуально, починаючи з 15-30 мг/кг/добу розподілена на кілька прийомів, загальна доза не більше 4 г/добу; дітям з масою тіла менше 40 кг рекомендується приймати половину дози для дорослих, дітям з масою тіла понад 40 кг - звичайну дозу для дорослих; виразковий проктит - призначають ректально дорослим по 1г 1-2 р/добу, виразковий проктосигмоїдит та лівобічний коліт - 1 клізма (1000 мг/100 мл) 1 р/добу, перед сном.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: еозинофілія; змінені показники крові (апластична анемія, агранулоцитоз, панцитопенія, нейтропенія, лейкопенія, тромбоцитопенія), анемія, гранулоцитопенія, метгемоглобінемія, пригнічення діяльності кісткового мозку, захворювання крові, дискразія крові; реакції гіперчутливості, алергічна екзантема, анафілактична р-я, DRESS-синдром, алергічні висипання, медикаментозна гарячка, еритематозний висип, панколіт, набряк Квінке, вовчакоподібний с-м, алергічний дерматит, мультиформна еритема, синдром Стівенса-Джонсона; парестезія; головний біль, вестибулярні реакції, запаморочення; периферична нейропатія, доброякісна внутрішньочерепна гіпертензія (у дітей у пубертатному періоді); міокардит, перикардит; алергічні та фіброзні зміни з боку легень (у т. ч. задишка (диспное), задуха, кашель, бронхоспазм, альвеоліт, легенева еозинофілія, інфільтрація легеневої тканини, пневмоніт, пневмоперикардит, плеврит), пневмонія, інтерстиціальне захворювання легень, еозинофільна пневмонія, захворювання органів дихання; абдомінальний біль, діарея, метеоризм, нудота, блювання, диспепсія, біль у шлунку; посилення симптомів коліту, загострення хвороби Крона, г. панкреатит, підвищений рівень амілази; порушення функції печінки (підвищення рівня печінкових ферментів, показників холестази, білірубіну), гепатит, холестатичний гепатит, ПН, цироз, гепатоксичність; висипання на шкірі; кропив'янка; місцеві реакції, свербіж, ректальний дискомфорт та позиви до дефекації (супоз.); оборотна алопеція, реакції фотосенсибілізації; міалгія, артралгія, судоми; порушення функції нирок, у тому числі г. і хр. інтерстиціальний нефрит і ниркова недостатність, нефротичний с-м, ниркова недостатність, що іноді нормалізується після відміни препарату, нефролітіаз, знебарвлення сечі; олігоспермія (оборотна), ↑ рівня креатиніну у плазмі крові, ↓ маси тіла, ↓ кліренсу креатиніну, ↑ ШОЕ, ↑ концентрації ліпази, ↑ азоту сечовини крові; анальний дискомфорт, біль у прямій кишці, тенезми, подразнення; втома, астенія; ↑ т-ри тіла, біль у грудях, непереносимість месалазину.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до месалазину, до будь-якого з компонентів препарату або до саліцилатів; тяжкі порушення функції нирок або печінки; виразкова хвороба шлунка або ДПК в стадії загострення; геморагічний діатез, дитячий вік до 2-х років (супоз. по 500 мг)

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1,5 г., ректально - 1,5 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АСАКОЛ®	Хаупт Фарма Вюльфінг ГмбХ (вирво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка)/ Тілотс Фарма АГ (виробник, відповідальний за випуск серій), Німеччина/ Швейцарія	табл. в/о, к/р у бл.	400мг	№10x10	38,26	25,70/С НФ
	АСАКОЛ®	Хаупт Фарма Вюльфінг ГмбХ (вирво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка)/	табл. в/о, к/р у бл.	800мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	Тілотс Фарма АГ (виробник, відповідальний за випуск серій), Німеччина/ Швейцарія					
АСАКОЛ®	Хаупт Фарма Вюльфінг ГмбХ (вир-во нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка)/ Тілотс Фарма АГ (виробник, відповідальний за випуск серій), Німеччина/ Швейцарія	табл. в/о, к/р у бл.	800мг	№10x6	37,78	25,70/С HF
АСАКОЛ®	Тілотс Фарма АГ (виробник, відповідальний за випуск серій)/ Хаупт Фарма Вюльфінг ГмбХ (виробник, відповідальний за дозовану форму та пакування), Швейцарія/Німеччина	супоз. рект. у бл.	500мг	№5x4	146,86	25,70/С HF
МЕСАКОЛ	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд, Індія	табл. в/о, к/р у стрипі	400мг	№10, №30, №50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПЕНТАСА	Феррінг Інтернешнл Сентер СА (виробництво)/ Феррінг ГмбХ (відповідальний за випуск серії), Швейцарія/Німеччина	супоз. рект. у бл.	1000мг	№7x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПЕНТАСА	Феррінг Інтернешнл Сентер СА (виробництво)/Феррінг ГмбХ (відповідальний за випуск серії), Швейцарія/Німеччина	супоз. рект. у бл. з гігієн. напальч.	1000мг	№7x4	74,04	32,91/€
ПЕНТАСА	Феррінг Інтернешнл Сентер СА (виробництво)/Феррінг ГмбХ (відповідальний за випуск серії), Швейцарія/Німеччина	табл. прол. дії у бл.	500мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПЕНТАСА	Феррінг Інтернешнл Сентер СА (виробництво)/Феррінг ГмбХ (відповідальний за випуск серії), Швейцарія/Німеччина	табл. прол. дії у бл.	500мг	№10x5	47,39	32,91/€
ПЕНТАСА	Феррінг Інтернешнл Сентер СА (відповідальний за виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості)/Феррінг ГмбХ (відповідальний за випуск серії), Швейцарія/Німеччина	гран. прол. дії у пак.	1г	№50, №100, №150	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПЕНТАСА	Феррінг Інтернешнл Сентер СА (відповідальний за виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості)/ Феррінг ГмбХ (відповідальний за випуск серії), Швейцарія/Німеччина	гран. прол. дії у пак.	2г	№60	28,79	32,90/€
ПЕНТАСА	Феррінг-Лечива а.с., Чеська Республіка	супс. рект. у фл. по 100 мл	1г/100мл	№5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПЕНТАСА	Феррінг-Лечива а.с., Чеська Республіка	супс. рект. у фл. по 100 мл	1г/100мл	№7	141,00	32,90/€
САЛОФАЛЬК	Др. Фальк Фарма ГмбХ (відпов. за випуск серій кінцевого продукту та альтернативне втор. пак.)/ Лозан Фарма ГмбХ (виробники дозов. форми, перв. та втор. пак.)/ Фарбіл Фарма ГмбХ (вир-ки дозов. форми, перв. та втор. пак., Німеччина	гран. г/р., прол. дії у пак. "Грану-Стикс"	500мг, 1000мг	№50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
САЛОФАЛЬК	Др. Фальк Фарма ГмбХ (відпов. за випуск серій кінцевого продукту, альтернативне вторинне пакування)/Лозан Фарма ГмбХ (Ноєнбург сайт) (вир-к дозованої форми, перв., втор. пакування та контроль якості)/Фарбіл Фарма ГмбХ (вир-к дозов. ф, Німеччина	гран. г/р., прол. дії у пак. "Грану-Стикс";	1,5г; 3г	№35; №50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
САЛОФАЛЬК	Др. Фальк Фарма ГмбХ (відпов. за	супс. рект. по	4г/60г	№7	відсутня у реєстрі	

	випуск серій кінц. род., альтерна. втор. пак.)/ Віфор СА Цвайнідерлассунг Медіхеми Еттінген (вир-к доз. Ф., перв. та втор. пак.), Німеччина/Швейцарія	60г у клізмі в бл.			ОВЦ
САЛОФАЛЬК	Др. Фальк Фарма ГмБХ (відпов. за випуск серій кінц. род., альтерна. втор. пак.)/ Віфор СА Цвайнідерлассунг Медіхеми Еттінген (вир-к доз. Ф., перв. та втор. пак.), Німеччина/Швейцарія	супоз. рект. у стрип.	250мг, 500мг, 1000мг	№5x2, №5x6	відсутня у реєстрі ОВЦ
САЛОФАЛЬК	Др. Фальк Фарма ГмБХ (відпов. за випуск серій кінц. Прод. та альтернат. втор. пак.)/ Лозан Фарма ГмБХ (вир-к, відпов. за вир-во доз. ф., перв., втор. пак. та контр. якості), Німеччина	табл., в/о к/р у бл.	250мг, 500мг	№10x5, №10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ

3.13.2. Кортикостероїди локальної дії

- **Будесонід (Budesonide)**

Фармакотерапевтична група: А07ЕА06 - протизапальні засоби, що застосовуються при захворюваннях кишечника. Кортикостероїди місцевої дії.

Основна фармакотерапевтична дія: глюкокортикоїд з високою локальною протизапальною дією; в дозах, клінічно еквівалентних дозам системних глюкокортикоїдів, спричиняє значно менше пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи і має менший вплив на маркери запалення; виявляє дозозалежний вплив на рівень кортизолу у плазмі, який при рекомендованій дозі 3 x 3 мг будесоніду/день є, вірогідно, нижчим, ніж рівноеквівалентні дози системних глюкокортикоїдів.

Показання для застосування ЛЗ: хвороба Крона легкого або помірного ступеня тяжкості з локалізацією у клубовій кишці (частині тонкого кишечника) та/або висхідній ободовій кишці (частині товстого кишечника), колагенозний коліт^{БНФ}; аутоімунний гепатит; піна ректал.: активний виразковий коліт, обмежений прямою і сигмовидною кишкою^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: хвороба Крона^{БНФ}: дорослим по 1 капс. (3 мг) 3 р/добу (вранці, вдень і увечері) або 3 капс. 1 р вранці; бажаний ефект досягається через 2-4 тижні^{БНФ}; тривалість лікування зазвичай становить 8 тижнів; прийом не можна припиняти одразу, а лише поступово знижуючи дозу, протягом першого тижня дозу слід знизити до 2 капс./добу (вранці та увечері), протягом другого тижня потрібно приймати лише 1 капс. вранці, після цього лікування можна припинити^{БНФ}; капс. слід приймати перед їдою, ковтаючи їх цілими та запиваючи достатньою кількістю рідини; колагенозний коліт: дорослим (старше 18 років) 3 капс. (9 мг) 1 р/добу вранці перед сніданком; аутоімунний гепатит: дорослим для індукції ремісії (тобто для нормалізації підвищеного рівня печінкових ферментів) рекомендована денна доза 1 капс. 3 р/день (вранці, вдень і ввечері, що еквівалентно загальній денній дозі 9 мг будесоніду), підтримання ремісії - після досягнення ремісії по 1 капс. 2 р/день (вранці і ввечері, що еквівалентно загальній денній дозі 6 мг будесоніду), якщо на тлі цього лікування спостерігається підвищення рівня трансаміназ АЛТ та/або АСТ, дозування слід збільшити до 3 капс./день, як для індукції ремісії (еквівалентно загальній денній дозі 9 мг будесоніду), у пацієнтів, які переносять азатиоприн, будесонід слід комбінувати з цим препаратом з метою підтримання ремісії; після досягнення ремісії лікування аутоімунного гепатиту слід продовжувати протягом як мінімум 24 місяців; хвороба Крона та колагенозний коліт: тривалість лікування становить 8 тижнів, повний ефект зазвичай досягається після 2-4 тижнів прийому; ректальну піну можна застосовувати зранку або ввечері, **1 р(2 мг будесоніду)/добу**, перед застосуванням ректальної піни бажано проводити очищення кишечника; оптимальний термін застосування 6-8 тижнів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: набряк ніг, с-м Кушинга; ідіопатична внутрішньочерепна гіпертензія, включаючи набряк оптичного диску зорового нерву у підлітків; псевдопухлина мозку з набряком оптичного диска у підлітків; біль у суглобах, м'язовий біль, слабкість та посмикування, остеопороз, алергічна екзантема, червоні стрії, петехії, екхімоз, стероїдне акне, уповільнення загоєння ран, контактний дерматит, асептичний некроз кісток (стегнової і голівки плечової кісток), глаукома, катаракта, нечіткий зір, депресія, дратівливість, ейфорія, різні психіатричні ефекти або порушення поведінки, психомоторна гіперактивність, тривожність, агресія, відчуття втоми, нездужання, слабкість, запаморочення, дискомфорт у ділянці шлунка, диспепсія, виразка шлунка та ДПК, панкреатит, запор, блювання, нудота, відчуття печіння в прямій кишці і біль, місяцеподібне обличчя, абдомінальне ожиріння, зниження глюкозотолерантності, ЦД, затримка натрію, що супроводжується набряками, підвищення екскреції калію, бездіяльність та/або атрофія кори надниркових залоз, затримка росту у дітей, порушення секреції статевих гормонів (наприклад аменорея, гірсутизм, імпотенція), АГ, підвищення ризику тромбозів, васкуліт (с-м відміни після тривалої терапії), головний біль, збільшення ризику інфекцій; підвищення апетиту, збільшення швидкості осідання еритроцитів, лейкоцитоз, біль у животі, метеоризм, парестезія в ділянці живота, анальна тріщина, афтозний стоматит, часті позиви до дефекації, ректальна кровотеча, підвищення рівня трансаміназ (GOT, GPT), збільшення показників холестази (GGT, AP), підвищення рівня амілаз, зміни показників кортизолу, інфекції сечовивідних шляхів, порушення нюху, безсоння, збільшена пітливість, астения, збільшення маси тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату або його компонентів; цироз печінки.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БУДЕНОФАЛЬК	Др. Фальк Фарма ГмбХ (відповідальний за випуск серій кінцевого продукту та альтернативне вторинне пакування)/Лозан Фарма ГмбХ (виробник дозованої форми, первинне та вторинне пакування), Німеччина	капс. тверді з к/р гран. у бл.	3мг	№10x5, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БУДЕНОФАЛЬК	Др. Фальк Фарма ГмбХ (відпов. за випуск серій кінцевого продукту та альтернативне вторинне пакування)/Аерозоль-Сервіс АГ (виробник дозованої форми, первинне та вторинне пакування, контроль якості), Німеччина/Швейцарія	піна рект. у бал. по 1,2г з дозат.	2 мг/доза	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

3.13.3. Інгібітори фактора некрозу пухлини альфа

- **Адалімумаб (Adalimumab)** (див. п. 8.6.1. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: хвороба Крона^{БНФ} середнього та високого ступеня активності у дорослих пацієнтів^{БНФ}, які не відповідали на повний курс терапії ГК та/або імуносупресантами, або при наявності непереносимості чи медичних протипоказань до таких видів терапії; виразковий коліт^{БНФ} середнього та високого ступеня активності у дорослих пацієнтів^{БНФ}, які не відповідали на традиційну терапію, включаючи терапію ГК та/або 6-меркаптопурином або азатиоприном, або при наявності непереносимості чи медичних протипоказань до таких видів терапії; в педіатрії: хвороба Крона середнього та високого ступеня активності у дітей віком від 6 років^{БНФ}, які не відповідали на традиційну терапію, включаючи первинну нутритивну терапію, терапію ГК та/або імуномодуляторами, або при наявності непереносимості чи медичних протипоказань до таких видів терапії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: хвороба Крона^{БНФ}: для індукції ремісії початкова доза для дорослих 80 мг на тижні 0 (день 1), з наступним ↓ дози до 40 мг на тижні 2 (день 15), п/ш^{БНФ}; щоб отримати більш швидку клінічну відповідь, спочатку застосовувати 160 мг на тижні 0 (доза може бути введена у вигляді 4-х ін'єкцій в один день або як 2 ін'єкції по 40 мг протягом 2-х днів поспіль), на тижні 2 застосовувати дозу 80 мг п/ш^{БНФ}, але ризик виникнення ПР ↑; підтримуюче лікування - 40 мг 1 р/2 тижні, п/ш; якщо пацієнт припинив терапію і знову з'явилися ознаки та симптоми захворювання, терапію можна розпочати знову, протягом підтримуючої терапії доза ГК може бути ↓; при ↓ клінічної відповіді деякі пацієнти можуть потребувати ↑ частоти введення до 40 мг 1 р/тиждень, п/ш; пацієнтам, у яких не досягнуто клінічної відповіді на 4-й тиждень лікування, продовжити підтримуючу терапію до 12-го тижня, переглянути необхідність продовження терапії у пацієнтів, у яких в межах цього терміну не спостерігається клінічної відповіді; хвороба Крона у дітей 6-17 років: маса тіла менше 40 кг: індукційна доза - 40 мг на тижні 0 (день 1), з наступним ↓ дози до 20 мг на тижні 2 (день 15), п/ш; якщо необхідно отримати більш швидку клінічну відповідь, можна застосовувати дозу 80 мг на тижні 0 (доза може бути введена у вигляді 2-х ін'єкцій в один день) та 40 мг на тижні 2, п/ш, проте ризик виникнення ПР ↑; підтримуюче лікування починаючи з 4-го тижня терапії - 20 мг 1 р/2 тижні, п/ш^{БНФ}; при ↓ клінічної відповіді деякі пацієнти можуть потребувати ↑ частоти введення до 40 мг 1 р/тиждень, п/ш; діти з масою тіла 40 кг та більше: індукційна доза - 80 мг на тижні 0 (день 1), з наступним ↓ дози до 40 мг на тижні 2 (день 15), п/ш; якщо необхідно отримати більш швидку клінічну відповідь, можна застосовувати дозу 160 мг на тижні 0 (доза може бути введена у вигляді 4-х ін'єкцій в один день або по 2 ін'єкції в день протягом 2-х днів поспіль) та 80 мг на тижні 2, п/ш, у такому випадку ризик виникнення ПР ↑; підтримуюче лікування - 40 мг 1 р/2 тижні, п/ш^{БНФ}; при ↓ клінічної відповіді деякі пацієнти можуть потребувати ↑ частоти введення до 40 мг 1 р/тиждень, п/ш; переглянути необхідність продовження терапії у пацієнтів, у яких протягом 12 тижнів не спостерігається клінічної відповіді; не застосовується за цим показанням у дітей віком до 6 років^{БНФ}; виразковий коліт: початкова доза для індукції ремісії у дорослих пацієнтів з виразковим колітом^{БНФ} середнього або тяжкого ступеня активності - 160 мг на тижні 0 (доза може бути введена у вигляді 4-х ін'єкцій в один день або по 2 ін'єкції в день протягом 2-х днів поспіль) та 80 мг через 2 тижні (день 15) п/ш; після індукційної терапії рекомендована доза 40 мг 1 р/2 тижні п/ш^{БНФ}; протягом підтримуючої терапії доза ГК може бути ↓; при ↓ клінічної відповіді деякі пацієнти можуть потребувати ↑ частоти введення до 40 мг 1 р/тиждень; клінічна відповідь має бути досягнута протягом 2-8 тижнів лікування, терапію можна продовжувати тільки для тих пацієнтів, які досягли клінічну відповідь протягом перших 8-ми тижнів лікування.

- **Інфліксимаб (Infliximab)** (див. п. 18.2.4. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: хвороба Крона^{БНФ} в активній формі (середньої тяжкості та тяжка) у дорослих пацієнтів при відсутності відповіді, непереносимості або медичних протипоказаннях до проведення повного та відповідного курсу терапії із застосуванням ГК та/або імунодепресантів; хвороба Крона в активній формі з утворенням фістул у дорослих пацієнтів при відсутності відповіді на повний та відповідний курс стандартної терапії (включаючи а/б, дренаж та терапію імунодепресантами); хвороба Крона в тяжкій активній формі у дітей від 6 до 17 років, за відсутності відповіді, непереносимості чи медичних протипоказаннях до проведення терапії стандартними препаратами, включаючи ГК, імуномодулятори та первинну дієту, застосування проводилося лише у комбінації зі стандартною імуносупресивною терапією; виразковий коліт в активній формі^{БНФ} середнього та тяжкого ступеня у дорослих пацієнтів при відсутності відповіді, непереносимості або медичних протипоказаннях

до проведення терапії стандартними препаратами, включаючи ГК, 6-меркаптопурин (6-МР) або азатіоприн (АЗА); виразковий коліт в активній формі тяжкого ступеня у дітей віком від 6 до 17 р. при відсутності відповіді, непереносимості або медичних протипоказаннях до проведення терапії стандартними препаратами, включаючи ГК, 6-меркаптопурин (6-МР) або азатіоприн (АЗА).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: активна форма хвороби Крона^{БНФ} від середнього до тяжкого ступеня: призначати шляхом в/в інфузії 5 мг/кг, після чого ч/з 2 тижні проводять повторну інфузію у тій же дозі^{БНФ}; у випадку відсутності відповіді після другої дози не проводити наступне лікування препаратом; у пацієнтів з наявністю відповіді альтернативними стратегіями продовження лікування є: підтримуюче лікування - додаткова інфузія 5 мг/кг^{БНФ} на 6 тижні після початкового прийому, після чого - проведення інфузій кожні 8 тижнів^{БНФ} або повторний прийом - інфузія 5 мг/кг при виникненні рецидивів захворювання; хвороба Крона в активній формі з утворенням фістул^{БНФ}: введення 5 мг/кг в/в інфузії, потім - на 2-му^{БНФ} та 6-му тижні; якщо після введення цих 3 доз немає позитивного клінічного ефекту, терапію припиняють; тактика продовження лікування: додаткові інфузії 5 мг/кг кожні 8 тижнів або повторне призначення препарату; виразковий коліт^{БНФ}: 5 мг/кг за схемою введення на 2-му^{БНФ} та 6-му тижні після першої інфузії і у подальшому з інтервалом 8 тижнів^{БНФ}.

3.14. Пробіотики, пребіотики

3.14.1. Пробіотики

- **Сахароміцети буларді (Saccharomyces boulardii) ****

Фармакотерапевтична група: А07FA02 - антидіарейні мікробні препарати. Сахароміцети буларді.

Основна фармакотерапевтична дія: нормалізує мікрофлору кишечника, має виражену етіопатогенетичну антидіарейну дію; під час проходження через ШКТ Saccharomyces boulardii чинять біологічну захисну дію відносно нормальної кишкової мікрофлори; головні механізми дії Saccharomyces boulardii: прямий антагонізм (антимікробна дія), що зумовлена здатністю Saccharomyces boulardii пригнічувати ріст патогенних та умовно-патогенних м/о та грибів, що порушують біоценоз кишечника, таких як: Clostridium difficile, Clostridium pneumoniae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida krusei, Candida pseudotropicalis, Candida albicans, Salmonella typhi, Salmonella enteritidis, Escherichia coli, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Klebsiella, Proteus, Vibrio cholerae, а також, Entamoeba histolytica, Lamblia; Enterovirus, Rotavirus; антиоксидантна дія зумовлена продукуванням протеаз, що розщиплюють токсин та рецептор ентероцита, з яким зв'язується токсин (особливо відносно цитотоксину А, Clostridium difficile); антисекреторна дія зумовлена зниженням цАМФ в ентероцитах, що призводить до зменшення секреції води та натрію у просвіт кишечника; підсилення неспецифічного імунного захисту за рахунок підвищення продукції ІgА та секреторних компонентів інших Іg; ферментативна дія зумовлена підвищенням активності дисахаридаз тонкого кишечника (лактази, сахарази, мальтази); трофічний ефект відносно слизової оболонки тонкої кишки за рахунок визволення сперміну та спермідину; генетично зумовлена стійкість Saccharomyces boulardii до а/б обгрунтовує можливість їх одночасного застосування з а/б для захисту нормального біоценозу ШКТ.

Показання для застосування ЛЗ: г. та хр. бактеріальна діарея, г. вірусна діарея, діарея мандрівника, профілактика та лікування колітів і діареї, пов'язаних із прийомом а/б, дисбіоз кишечника, с-м подразненого кишечника, псевдомембранозний коліт та захворювання, зумовлені Clostridium difficile, діарея, пов'язана з довгостроковим ентеральним харчуванням.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим та дітям старшим 6 років - по 1-2 капс. чи пакетику 1-2 р/добу; МДД - 4 капс.; для дітей до 6 років рекомендований прийом препарату у вигляді порошку для р/ос застосування; новонародженим: не більше 1 пакетика на добу під наглядом лікаря, дітям до 6 років: 1 пакетик 1-2 р/добу; тривалість лікування при г. діареї - 3-5 днів; лікування дисбіозу, хр. діарейного с-му, с-му подразненого кишечника - 10-14 днів; профілактика та лікування антибіотик-асоційованої діареї та псевдомембранозного коліту - призначається разом з а/б з першого дня застосування до кінця лікування а/б; діарея мандрівника: початок застосування - за 5 днів до прибуття по 1 капс./день (або по 1 пакетик/добу) протягом усієї подорожі; закінчення застосування - в день прибуття з країни здійснення подорожі; застосовувати щоранку натще, максимальний термін застосування - 30 днів; вміст пакетика змішати з молоком або водою; капсули запивати водою.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: можливі реакції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання, свербіж, екзантему, кропив'янку, анафілактичні реакції, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок, запор з невизначеною частотою, метеоризм, дискомфорт в епігастрії; у дуже рідких випадках можливий ризик фунгемії у госпіталізованих пацієнтів з центральним або периферійним венозним катетером.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого компонента препарату; пацієнтам зі встановленим центральним або периферійним венозним катетером; пацієнтам, які перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії; імунокомпрометованим пацієнтам, таким як: ВІЛ-інфіковані, онкологічні хворі, з трансплантованим органом, які отримують хіміо- та/або променевою терапією та/або тривало високі дози кортикостероїдів.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕНТЕРОЛ 250	БІОКОДЕКС, Франція	пор. д/орал. застос. у пак.	250мг	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕНТЕРОЛ 250	БІОКОДЕКС, Франція	капс. у скл. пл. та бл.	250мг	№10, №20, №30, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НОРМАГУТ	Ардейфарм ГмбХ, Німеччина	капс. у бл.	250мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НОРМАГУТ	Ардейфарм ГмбХ, Німеччина	капс. у бл.	250мг	№10x1	49,98	26,77/\$

3.14.2. Пребіотики

- **Лактулоза (Lactulose) * **** (див. п. 3.11.2. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Комбіновані препарати

- **Продукти життєдіяльності Escherichia coli + enterococcus faecalis + lactobacillus acidophilus + lactobacillus helveticus (Escherichia coli + enterococcus faecalis + lactobacillus acidophilus + lactobacillus helveticus) ****

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ХІЛАК ФОРТЕ	Меркле ГмбХ (випуск серії; виробництво in bulk; первинне та вторинне пакування, контроль якості), Німеччина	крап. орал., р-н по 30мл, 100мл у фл. з проб.-крап.	4087-24,9481г; 4086-12,4741г; 4149-12,4741г; 4183-49,8960г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

3.15. Засоби, що застосовуються при ожирінні (виключаючи дієтичні продукти)

3.15.1. Лікарські засоби з периферичним механізмом дії, що застосовуються при ожирінні

- **Орлістам (Orlistat)** [окрім капс. по 60 мг]

Фармакотерапевтична група: A08AB01 - засоби з периферичним механізмом дії, що застосовуються при ожирінні.

Основна фармакотерапевтична дія: потужний і специфічний інгібітор шлунково-кишкових ліпаз тривалої дії; терапевтична дія препарату здійснюється у просвіті шлунка і тонкого кишечника та зумовлена формуванням ковалентного зв'язку з активною сериною ділянкою шлункової і панкреатичної ліпаз; інактивований фермент при цьому втрачає здатність гідролізувати жири їжі, що надходять у формі тригліцеридів, до вільних жирних кислот і моногліцеридів, що всмоктуються.

Показання для застосування ЛЗ: терапія у поєднанні з помірно гіпокалорійною дієтою з низьким вмістом жирів у пацієнтів із зайвою масою тіла (індекс маси тіла (ІМТ) ≥ 28 кг/м²); лікування слід припинити через 12 тижнів у випадку відсутності зниження маси тіла щонайменше на 5 % порівняно з початковою масою тіла

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим призначають по 1 капс. (60 мг) 3 р/добу або по 1 капс. (120 мг) 3 р/добу з водою безпосередньо перед прийомом їжі; препарат приймають під час кожного основного прийому їжі або не пізніше, ніж через 1 год після їжі^{БНФ}; у випадку якщо прийом їжі пропускають, або якщо їжа не містить жиру, то прийом препарату можна пропустити; збільшення дози вище за рекомендовану не посилює терапевтичний ефект.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль; інфекції верхніх дихальних шляхів; інфекції нижніх дихальних шляхів; абдомінальний біль/дискомфорт, жирні виділення з прямої кишки, виділення газів з кишечника (метеоризм) з деякою кількістю випорожнень, імперативні позиви до дефекації, стеаторея, метеоризм, рідкі випорожнення, маслянисті виділення, почастищення дефекації; біль чи дискомфорт у прямій кишці, м'які випорожнення, нетримання калу, здуття живота, ураження зубів, ураження ясен; інфекції сечовивідних шляхів; гіполікемія; грип; слабкість; дисменорея; тривожний стан; підвищення активності печінкових трансаміназ і лужної фосфатази, при одночасному призначенні орлістату та антикоагулянтів зареєстровані випадки зниження протромбіну, підвищення міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) та незбалансованість лікування антикоагулянтами (препаратами для розрідження крові), які призводять до зміни параметрів гемостазу; ректальна кровотеча, дивертикуліт, панкреатит; бульозне висипання (включаючи пухирці, що можуть лопатись); реакції гіперчутливості, включаючи свербіж, висипи, кропив'янку, ангіоневротичний набряк, бронхоспазм та анафілаксію; холелітаз, гепатит, що може бути серйозним; повідомлялося про окремі летальні наслідки або випадки, що вимагали трансплантації печінки; оксалатна нефропатія, що може призвести до ниркової недостатності; набряк губ, язика, горла, обличчя.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активної речовини або до будь-яких інших компонентів препарату, с-м хр. мальабсорбції (порушення всмоктування поживних речовин), холестаза (стан, при якому зменшується або припиняється потік жовчі), одночасне лікування циклоспорином, варфарином та іншими антикоагулянтними засобами; період годування груддю.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АЛАЙ®	ГлаксоСмітКлайн ЛЛС (вир-во; перв. пак.)/ Фамар А.В.Е. - Авлон Планта 48-й км Нац. шосе Афіни-Ламія (втор. пак.; випуск серії)/ Фамар А.В.Е. - Авлон Планта 49-й км (контр./випроб. серії), США/ Греція	капс. тверді у фл.	60мг	№42, №84	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОРЛІП®	Джи Ем Фармасьютикалс, Грузія	капс. тверді у	120мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

3.16. Засоби замісної терапії, що застосовуються при розладах травлення, включаючи ферменти

3.16.1. Препарати ферментів

- **Солізим (Solizym) ****

Фармакотерапевтична група: A09AA -засоби, що впливають на травну систему і метаболізм. Препарати ферментів.

Основна фармакотерапевтична дія: Ферментний препарат мікробного походження; поповнює дефіцит панкреатичної ліпази, яка гідролізує рослинні та тваринні жири (до гліцерину та жирних кислот), сприяючи більш повному всмоктуванню харчових речовин у тонкому кишечнику; стійкий до протеази та інгібіторів ферментів підшлункової залози, не вимагає її активації жовчаними кислотами, володіє широкою субстратною специфічністю; діє у порожнині кишечника, беручи участь у процесі порожнинного травлення (гідроліз жирів); у терапевтичних дозах не впливає на евакуаторну здатність травного тракту; дія препарату проявляється у зникненні або зменшенні больового синдрому, метеоризму, розладу випорожнення; появі позитивних зрушень у копрологічних дослідженнях (значно зменшується вміст нейтрального жиру та жирних кислот у калі); ліпаза покращує функцію підшлункової залози.

Показання для застосування ЛЗ: хр. панкреатит з порушенням зовнішньосекреторної функції підшлункової залози та зниженням активності панкреатичної ліпази; порушення травлення, які протікають на тлі зниження зовнішньосекреторної функції підшлункової залози; після вживання жирної їжі, яка важко перетравлюється.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл. застосовувати внутрішньо під час їди або безпосередньо після неї; ковтати цілими, не розжовуючи, з невеликою кількістю рідини; дозування і тривалість застосування визначає лікар індивідуально залежно від характеру і перебігу захворювання, функціонального стану підшлункової залози, ступеня порушення процесу травлення та складу їжі; разова лікувальна доза 20000 - 40000 ЛО (1-2 табл.) 3-4 р/добу, добова доза 120000-160000 ЛО (6-8 табл.), МДД - 8 табл., тривалість курсу лікування 2-4 тижні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР, свербіж, кропив'янка; можлива поява або посилення нудоти, виникнення діарейного с-му.

Протипоказання до застосування ЛЗ: г. панкреатит, гіперчутливість до компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	СОЛІЗИМ ФОРТЕ	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. в/о, к/р у бл.	3000 F.I.P. Од	№10x2	36,26	
	СОЛІЗИМ®	АТ "ВІТАМІНИ", Україна	табл. в/о, к/р у бл.	20000 ЛО	№10x2, №10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СОЛІЗИМ®	ПАТ "Вітаміни", Україна	табл. в/о, к/р у бл.	20000 ЛО	№10x2, №10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Панкреатин (Pancreatin) * ** [ПМД]**

Фармакотерапевтична група: A09AA02 - засоби, що поліпшують травлення, включаючи ферменти. Поліферментні препарати.

Основна фармакотерапевтична дія: має ліполітичну, амілолітичну та протеолітичну активність, що забезпечує розщеплення жирів, вуглеводів та білків; продукти панкреатичного травлення після цього всмоктуються або одразу, або після подальшого гідролізу кишковими ферментами; препарат компенсує недостатність зовнішньосекреторної функції підшлункової залози і сприяє покращенню процесу травлення.

Показання для застосування ЛЗ: екзокринна недостатність підшлункової залози у дорослих і дітей, яка спричинена різними захворюваннями, в тому числі: муковісцидоз, хр. панкреатит^{ПМД}, панкреатектомія, панкреатомія, операції з накладенням шлунково-кишкового анастомозу (наприклад гастроентеростомія за Більротом II), с-м Швахмана-Даймонда, стан після атаки г. панкреатиту та відновлення ентерального або р/ос харчування; підготовка до рентгенологічного дослідження і УЗД органів черевної порожнини (дегазація кишечника); функціональне прискорення проходження їжі через кишечник, розлади кишечника, одночасне вживання важкоперетравлюваної рослинної, жирної та незвичної їжі.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дозування залежить від ступеня тяжкості захворювання та складу їжі; приймати під час або одразу після вживання їжі; при муковісцидозі: початкова доза для дітей віком до 4-х років становить 1000 Од ліпази/кг маси тіла під час кожного прийому їжі і для дітей віком від 4-х років - 500 Од ліпази/кг маси тіла під час кожного прийому їжі, підтримуюча доза для більшості пацієнтів не повинна перевищувати 10000 Од ліпази/кг/добу або 4000 Од ліпази на грам спожитого жиру; при інших видах екзокринної недостатності підшлункової залози: дозу слід підбирати індивідуально, залежно від ступеня порушення травлення і жирового складу їжі; під час основних прийомів їжі (сніданку, обіду чи вечері) необхідними є дози від 25000 до 80000 Од ліпази, а при додатковому легкому харчуванні між основними прийомами - половина індивідуальної дози; доза препарату може бути змінена і встановлюється лікарем індивідуально, тривалість застосування встановлює лікар в індивідуальному порядку; добова доза ліпази не повинна перевищувати 15 000-20 000 Од/кг маси тіла.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль у животі; нудота, блювання, запор, здуття живота, діарея, розлади шлунка/ШКТ, розвиток непрохідності кишечника, зміни характеру випорожнень, анорексія, стоматит, диспепсія (пірозис, печія); звуження ілеоцекального відділу кишечника і товстої кишки (фіброзуюча колонопатія); гіперчутливість (анафілактичні реакції), алергічні реакції негайного типу - шкірні висипання, чхання, сльозотеча, бронхоспазм; кропив'янка, свербіж, еритема, нездужання, шлунково-кишкова гіперчутливість.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого іншого компонента препарату, свинини/білків свині (алергія на свинину); г. панкреатит або загострення хр. панкреатиту; кишкова непрохідність.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КРЕАЗИМ 10000	ПрАТ "Технолог", Україна	капс. тверді, к/р у бл.	10000ОД/8000ОД/6000ОД Ph.Eur	№10x2	115,16	
	КРЕАЗИМ 20000	ПрАТ "Технолог", Україна	капс. тверді, к/р у бл.	20000ОД/16000ОД/12000ОД Ph.Eur	№10x2	234,88	
	ПАНКРЕАЗИМ	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. к/р у бл.	8000ОД/5600ОД/3700ОД Ph. Eur	№10x2	35,00	
	ПАНКРЕАЗИМ	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. к/р у бл.	8000ОД/5600ОД/3700ОД Ph. Eur	№10x5	75,00	
	ПАНКРЕАЗИМ 10000	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. г/р у бл.	10000ОД/7500ОД/4000ОД Ph.Eur	№10x2	37,06	
	ПАНКРЕАЗИМ 10000	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. г/р у бл.	10000ОД/7500ОД/4000ОД Ph.Eur	№10x5	83,15	
	ПАНКРЕАТИН	АТ "ВІТАМІНИ", Україна	табл. в/о, к/р у бл.	250мг	№10, №20, №50, №60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПАНКРЕАТИН	ПАТ "Вітаміни", Україна	табл. в/о, к/р у бл.	250мг	№10, №20, №50, №60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПАНКРЕАТИН 8000	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. г/р у бл.	8000ОД/5600ОД/3700ОД Ph. Eur.	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПАНКРЕАТИН 8000	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. г/р у бл.	8000ОД/5600ОД/3700ОД Ph. Eur.	№10x5	53,20	
	ПАНКРЕАТИН 8000	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. г/р у бл.	8000ОД/5600ОД/3700ОД Ph. Eur.	№10x90	846,00	
	ПАНКРЕАТИН 8000	ТОВ "Тернофарм", Україна	табл. в/о, к/р у бл.	0,24г	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПАНКРЕАТИН 8000	ТОВ "Тернофарм", Україна	табл. в/о, к/р у бл.	0,24г	№10x5	79,67	
	ПАНКРЕАТИН ДЛЯ ДІТЕЙ	АТ "ВІТАМІНИ", Україна	табл. в/о, к/р у бл.	750ОД/1000ОД/750ОД Ph. Eur	№10x2, №10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПАНКРЕАТИН ДЛЯ ДІТЕЙ	ПАТ "Вітаміни", Україна	табл. в/о, к/р у бл.	750ОД/1000ОД/750ОД Ph. Eur	№10x2, №10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПАНКРЕАТИН ФОРТЕ	АТ "Вітаміни", Україна	табл. в/о, к/р у бл.	4500xОД/6000xОД/3000xОД Ph. Eur	№10x2, №10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПАНКРЕАТИН ФОРТЕ	ПАТ "Вітаміни", Україна	табл. в/о, к/р у бл.	4500xОД/6000xОД/3000xОД Ph. Eur	№10x2, №10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПАНКРЕАТИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. в/о, к/р у бл.	192мг	№10x2, №10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПАНКРЕАТИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. в/о, к/р у бл.	192мг	№10x1	12,68	

ПАНКРЕАТИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. в/о, к/р у бл.	192мг	№20x1	22,33	
ПАНКРЕАТИН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ 14000	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва. контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна /Україна	табл. в/о, к/р у бл.	384мг	№10x5	111,24	
ПАНКРЕАТИН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ 14000	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва. контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/ Україна	табл. в/о, к/р у бл.	384мг	№10x1	29,61	
ПАНКРЕАТИН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ 14000	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва. контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/ Україна	табл. в/о, к/р у бл.	384мг	№10x2	52,39	
II. ЕНЗИСТАЛ П	Торрент Фармасьютікалс Лтд, Індія	табл. в/о, к/р у бл.	89,36мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЕРМІТАЛЬ 10 000	Нордмарк Арцнайміттель ГмбХ та Ко. КГ, Німеччина	капс. г/р тверді у пл.	10000 ОД	№20, №50, №100	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЕРМІТАЛЬ 25 000	Нордмарк Арцнайміттель ГмбХ та Ко. КГ, Німеччина	капс. г/р тверді у пл.	25000 ОД	№20, №50, №100	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЕРМІТАЛЬ 36 000	Нордмарк Арцнайміттель ГмбХ та Ко. КГ, Німеччина	капс. г/р тверді у пл.	36000 ОД	№20, №50, №100	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КРЕОН® 10000	Абботт Лабораторіз ГмбХ, Німеччина	капс. тверді з г/р гран. у фл. та бл.	150мг	№20, №50, №100, №10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КРЕОН® 10000	Абботт Лабораторіз ГмбХ, Німеччина	капс. тверді з г/р гран. у бл.		150мг	№10x2	133,57
КРЕОН® 25000	Абботт Лабораторіз ГмбХ, Німеччина	капс. тверді з г/р гран. у фл. та бл.	300мг	№20, №50, №10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КРЕОН® 25000	Абботт Лабораторіз ГмбХ, Німеччина	капс. тверді з г/р гран. у фл.	300мг	№100	1335,69	26,71/\$
КРЕОН® 40000	Абботт Лабораторіз ГмбХ, Німеччина	капс. тверді з г/р гран. у фл. та бл.	400мг	№20, №50, №100, №10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КРЕОН®ЧИК	Абботт Лабораторіз ГмбХ,	гран. г/р у скл.	60,12мг/100м	№1	відсутня у	

	Німеччина	пл. по 20г	г		реєстрі ОБЦ	
МЕЗИМ® КАПСУЛИ 10000	Адер Фармасьютіклс СРЛ (виробництво "in bulk", контроль серій)/Аванс Фарма ГмбХ (кінцеве пакування)/Артезан Фарма ГмбХ & Ко. КГ (кінцеве пакування)/БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (контроль та випуск серій), Італія/Німеччина/Німеччина/Німеччина	капс. тверді з к/р міні-табл. у бан.	153,5мг	№20, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МЕЗИМ® КАПСУЛИ 25000	Адер Фармасьютіклс СРЛ (виробництво "in bulk", контроль серій)/Аванс Фарма ГмбХ (кінцеве пакування)/Артезан Фарма ГмбХ & Ко. КГ (кінцеве пакування)/БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (контроль та випуск серій), Італія/Німеччина/Німеччина/Німеччина	капс. тверді з к/р міні-табл. у бан.	356,1мг	№20, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МЕЗИМ® ФОРТЕ 10000	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво in bulk; контроль серій; пакування; контроль та випуск серій)/Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (виробництво "in bulk", пакування, контроль серій), Німеччина/ Німеччина	табл. к/р у бл.	80-111,111мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МЕЗИМ® ФОРТЕ 10000	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво in bulk; контроль серій; пакування; контроль та випуск серій)/Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (виробництво "in bulk", пакування, контроль серій), Німеччина/ Німеччина	табл. к/р у бл.	80-111,111мг	№10x1	40,79	31,37/€
МЕЗИМ® ФОРТЕ 10000	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво in bulk; контроль серій; пакування; контроль та випуск серій)/Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (виробництво "in bulk", пакування, контроль серій), Німеччина/ Німеччина	табл. к/р у бл.	80-111,111мг	№10x2	80,00	31,37/€
МЕЗИМ® ФОРТЕ 20000	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво таблеток "in bulk" та контроль серій; пакування, контроль та випуск серій), Німеччина	табл. к/р у бл.	160-222,22мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МЕЗИМ® ФОРТЕ 20000	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво таблеток "in bulk" та контроль серій; пакування, контроль та випуск серій), Німеччина	табл. к/р у бл.	160-222,22мг	№10x2	142,37	31,64/€
ПАНЗИНОРМ® 10000	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	капс. у бл.	106,213-136,307мг	№7x8	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПАНЗИНОРМ® 10000	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	капс. у бл.	106,213-136,307мг	№7x3	132,82	30,33/€
ПАНЗИНОРМ® 10000	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	капс. у бл.	106,213-136,307мг	№7x12	425,23	30,33/€
ПАНЗИНОРМ® ФОРТЕ 20 000	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., в криті п/о у бл.	269,12-279,44мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПАНЗИНОРМ® ФОРТЕ 20 000	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., в криті п/о у бл.	269,12-279,44мг	№10x3	172,52	30,27/€

ПАНЗИНОРМ® ФОРТЕ 20 000	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., в криті п/о у бл.	269,12- 279,44мг	№10x1	71,13	30,27/€
----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------	-------	-------	---------

3.17. Засоби, що підвищують апетит

- **Подорожник великий (*Plantago major*) ****

Фармакотерапевтична група: A02X - засоби, що впливають на систему травлення та метаболізм. Засоби для лікування кислотозалежних захворювань.

Основна фармакотерапевтична дія: засіб рослинного походження, біологічно активні речовини якого посилюють секрецію шлункового соку, підвищують кислотність.

Показання для застосування ЛЗ: шлунково-кишкові захворювання (гастрити зі зниженою кислотністю, виразкова хвороба шлунка та ДПК, ентерити, ентероколіти) у складі комплексної терапії

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо, за 10-15 хв до їди у теплому вигляді; *листя* дорослим - по ½ склянки; дітям 1-3 роки - по 1 ч. л., дітям 3-5 років - по 1 десертній ложці, дітям 5-10 років - по 1 ст. л., дітям 10-14 років - по 1 склянки 3 р/добу; *фільтр-пакети* дорослим - по 5 склянки 4 р/добу, дітям 1-3 роки - по 1 десертній ложці, дітям 3-5 років - по 2 десертні ложки, дітям 5-10 років - по 2 ст. л., дітям 10-14 років - по 1/3-1/2 склянки 3 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР (гіперемія, шкірні висипання, свербіж, набряк шкіри), печія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату, гіперацидний гастрит, виразкова хвороба шлунка з підвищеною кислотністю, рефлюкс-езофагіт.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ПЛАНТАГЛЮЦИД-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	гран. д/орал. р-ну по 2г у спарен. пак.	1г/2г	№2, №2x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПЛАНТАГЛЮЦИД-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	гран. д/орал. р-ну по 2г у спарен. пак.	1г/2г	№25 (2x12)+1	323,26	

3.18. Інші засоби, що впливають на систему травлення і метаболічні процеси

3.18.1. Розчини амінокислот

- **Адеметіонін (*Ademetionine*)**

Фармакотерапевтична група: A16AA02 - засоби, що впливають на систему травлення і процеси метаболізму. Амінокислоти та їх похідні.

Основна фармакотерапевтична дія: натуральна амінокислота, що діє як коензим та донор метильної групи у реакціях трансметилування, який є необхідним метаболічним процесом при будівництві подвійного фосфоліпідного шару у мембранах клітин та сприяє текучості мембран та є ключовим в утворенні нейромедіаторів ЦНС, включаючи катехоламіни (допамін, норадреналін, адреналін), серотонін, мелатонін та гістамін; здатний проникати через гематоенцефалічний бар'єр; є попередником в утворенні фізіологічних сульфурованих сполук (цистеїну, таурину, глутатіону, коензиму А та ін.) у реакціях транссульфування.

Показання для застосування ЛЗ: внутрішньопечінковий холестаза у дорослих, у тому числі у хворих на хр. гепатит різної етіології та цироз печінки; внутрішньопечінковий холестаза у вагітних; депресивні с-ми.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: розпочинають з парентерального введення з подальшим застосуванням у формі табл., або одразу з табл.; добову дозу табл. можна розподілити на 2-3 прийоми; початкова терапія: в/в або в/м: 5-12 мг/кг/добу; звичайна початкова доза 400 (500) мг/добу, МДД 1000 мг, тривалість початкової парентеральної терапії становить 15-20 днів при депресивних синдромах та 2 тижні при лікуванні захворювань печінки; р/ос: табл. ковтати цілими між прийомами їжі, 10-25 мг/кг/добу; звичайна початкова доза 800 мг/добу, МДД 1600 мг; підтримуюча терапія: 800-1600 мг/добу; тривалість терапії залежить від тяжкості та перебігу захворювання; ліофілізований порошок розчинити у спеціальному р-нику, що додається, безпосередньо перед застосуванням; в/в введення проводити дуже повільно.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль у животі, діарея, нудота; сухість у роті, диспепсія, метеоризм, шлунково-кишковий біль, шлунково-кишкова кровотеча, шлунково-кишкові розлади, блювання; здуття живота, езофагіт; астения, набряк, гіпертермія, озноб, реакції у місці введення, некроз у місці введення; нездужання; гіперчутливість, анафілактоїдні реакції або анафілактичні реакції (наприклад гіперемія, диспное, бронхоспазм, біль у спині, дискомфорт у грудній клітці, зміни АТ (гіпотензія, гіпертензія) або частоти пульсу (тахікардія, брадикардія)); інфекції СВШ; артралгія, м'язові судоми; головний біль; запаморочення, парестезії, дисгевзія; тривожність, безсоння; ажитація, сплутаність свідомості; набряк гортані; свербіж; гіпергідроз, ангіоневротичний набряк, алергічні шкірні реакції (висипання, кропив'янка, еритема); припливи, гіпотензія, флєбіт.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої або до будь-якої допоміжної речовини, генетичні дефекти, що впливають на метіоніновий цикл та/або спричиняють гомоцистинурію та/або гіпергомоцистеїнемію (наприклад недостатність цистатіонін-бета-синтази, дефект метаболізму вітаміну B₁₂).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЕПАМЕТИН	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. в конт. чар/уп.	400мг	№1x1, №1x5, №5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЕПАМЕТІОН®	ПАТ "Київмедпрепарат" (виробник ліофілізату, відповідальний за випуск серії готового лікарського засобу)/ПАТ "Галичфарм" (виробник розчинника), Україна/Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. в конт. чар/уп.	400мг	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЕП-АРТ®	ПАТ "Фармак", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в бл. з розч.	400мг	№5x1	640,00	
	РЕХОЛ	ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна	табл. к/р у бл.	400мг	№8x3, №10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РЕХОЛ	ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна	табл. к/р у бл.	400мг	№8x1	280,00	
II.	АДЕЦИКЛОЛ	Біомедіка Фоскама Груп С.п.А., Італія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. в конт. чар/уп.	400мг/5мл	№5x1	629,09	33,64/€
	ГЕПСАМ	ЛАБОРАТОРІО ІТАЛІАНО БІОКІМІКО ФАРМАСЬЮТІКО ЛІЗАФАРМА С.П.А. (Виробник, відповідальний за контроль якості, первинне та вторинне пакування, дозвіл на випуск серії готового лікарського засобу та виробництво розчинника за повним циклом)/С.Ч.Ф. С.Н.Ч. ДІ ДЖОВ, Італія/Італія/Італія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	500мг	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЕПТРАЛ®	Аббві С.р.л., Італія	табл. к/р у бл.	400мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЕПТРАЛ®	Аббві С.р.л., Італія	табл. к/р у бл.	500мг	№10x2	1017,60	26,50/\$
	ГЕПТРАЛ®	Фамар Легль (виробництво, первинне пакування та контроль якості порошка ліофілізованого; вторинне пакування, контроль якості та випуск серій готового лікарського засобу)/Фамар А.В.Е. Алімос Планта 63, вул. Аг. Дімітріу (виробництво, первинне пакування, кон, Франція/Греція/Італія	пор. ліоф. д/приг. р-ну д/ін'єк. у скл. фл. з розч. в конт. чар/уп.	400мг	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЕПТРАЛ®	Фамар А.В.Е. Алімос Планта 63, вул. Аг. Дімітріу (виробництво, первинне пакування, контроль якості та випуск серій розчинника in bulk)/Фамар Легль (виробництво, первинне пакування та контроль якості порошка ліофілізованого; вторинне пакування, контроль яко, Греція/Франція/Італія	пор. ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. в конт. чар/уп.	500мг	№5x1	943,40	26,50\$

4. ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ

4.1. Бронходилататори

4.1.1. Адреностимулятори

4.1.1.1. Селективні β_2 -агоністи

4.1.1.1.1. β_2 -агоністи короткої дії

4.1.1.1.2. β_2 -агоністи пролонгованої дії

4.1.2. М-холіноблокатори

4.1.2.1. М-холіноблокатори короткої дії

4.1.2.2. М-холіноблокатори пролонгованої дії

4.1.2.3. Комбіновані лікарські засоби

4.1.3. Ксантини

4.1.3.1. Теофілін

4.1.3.2. Доксофілін

4.2. Глюкокортикостероїди

4.2.1. Інгаляційні глюкокортикостероїди

4.2.2. Системні глюкокортикостероїди

4.2.3. Комбіновані лікарські засоби

4.3. Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів

4.3.1. Моноклональні антитіла

4.3.1.1. Моноклональні антитіла, що зв'язують імуноглобулін Е

4.3.1.2. Перерахунок дози омалізумабу, визначення дози для дорослих і дітей від 6 років

4.3.2. Інші засоби

4.4. Стабілізатори мембран опасистих клітин та блокатори лейкотрієнових рецепторів

4.4.1. Стабілізатори мембран гладких клітин

4.4.2. Антагоністи лейкотрієнових рецепторів

4.5. Стимулятори дихання

4.5.1. Дихальні analeптики

4.6. Муколітичні засоби

4.6.1. Муколітичні засоби прямої дії, або власне муколітики

4.6.1.1. Неферментні муколітики

4.6.1.2. Ферментні муколітики

4.6.2. Муколітики непрямої дії

4.6.2.1. Секретолітики

4.6.2.2. Мукорегулятори

4.6.2.3. Стимулятори сурфактанту

4.6.3. Легеневі сурфактанти

4.6.4. Експекторанти

4.6.4.1. Експекторанти рефлекторної дії

4.6.4.2. Мукокінетики

4.6.4.3. Мукогідратанти

4.6.4.4. Стимулятори бронхіальних залоз

4.6.5. Комбіновані засоби та інші

4.7. Протикашльові лікарські засоби

4.7.1. Ненаркотичні протикашльові засоби

4.7.2. Комбіновані протикашльові засоби

4.8. Антибіотики

4.9. Антисептичні засоби

4.1. Бронходилататори

Бронходилататори застосовуються в лікуванні бронхообструктивних захворювань як для симптоматичного лікування (зняття або зменшення г. симптомів), так і з метою досягнення та підтримки тривалої бронходилатації в базисній терапії в якості контролюючих медикаментів. До бронходилататорів відносяться:

- адреностимулятори (селективні β_2 -агоністи короткої та пролонгованої дії та неселективні b-агоністи),
- м-холінолітики (короткої та пролонгованої дії),
- ксантини (теофілін, доксофілін, амінофілін),
- комбіновані препарати (селективні β_2 -агоністи короткої дії + М-холінолітик короткої дії).

Вибір між інгаляційними бронхолітиками залежить від клінічної форми бронхообструктивного захворювання, ступеня тяжкості перебігу захворювання, індивідуальної відповіді на них щодо зменшення симптомів, супутньої патології, виникнення побічних ефектів.

Якщо немає протипоказань в якості симптоматичної терапії, перевагу мають селективні β_2 -агоністи короткої дії (сальбутамол, фенотерол): вони мають швидкий початок бронхолітичного ефекту (ч/з 5-7 хв), який є дозозалежним і триває на протязі 4-6 год. Застосування неселективного β -адреностимулятора, орципреналіну, по можливості, краще уникати, зважаючи на наявність виражених побічних проявів. Адреналін, стимулятор α - і β -адренорецепторів, використовують для невідкладної терапії АР негайного типу.

Інший бронхолітик короткої дії - інгаляційний м-холінолітик іпратропію бромід - викликає дещо меншу бронходилатацію, характеризується дозозалежним ефектом з більш повільним початком і дещо більшою тривалістю дії, ніж β_2 -агоністи короткої дії.

Комбінація бронхолітичних засобів короткої дії з різними механізмами дії (β_2 -агоністів і холінолітиків) дає можливість збільшити ступінь бронходилатації, отримати більш виражене і більш тривале покращення ОФВ1 та зменшення гіпервентиляції легень, ніж при застосуванні кожного з бронхолітиків окремо. При цьому зменшується вірогідність розвитку побічних ефектів, тахіфілаксії при довготривалому лікуванні β_2 -агоністами.

Бронхолітики пролонгованої дії застосовуються в базисній терапії БА та ХОЗЛ, при БА – лише в комплексі із ІКС, при ХОЗЛ – можливо в монотерапії. Пролонгованої дії інгаляційні β_2 -агоністи (сальметерол, формотерол) спричиняють більш сильний і стійкий бронхолітичний ефект, мають деяку протизапальну дію; тривалість їх дії – 12 год і більше (початок дії формотеролу такий же швидкий, як у бронхолітиків короткої дії).

Пролонгованої дії холінолітик (тіотропіум) діє протягом 24 год і більше, спричиняє стабільний, значно сильніший ефект, ніж іпратропіум, має протизапальну дію, характеризується високою безпечністю та хорошою переносимістю хворими.

Теофіліни є бронхолітиками другого вибору. Вони мають менше виражену бронхолітичну дію, потенційно токсичні, характеризуються варіабельним метаболізмом при певних станах, супутніх захворюваннях і одночасному призначенні разом з іншими медикаментами. З метою підвищення ефективності лікування ці ЛЗ можуть додаватись до попередньо призначених бронхолітиків першого вибору (β_2 -агоністів і/або холінолітиків) при тяжкому перебігу БА та ХОЗЛ, або призначатись у якості альтернативи при неможливості проведення інгаляційної бронхолітичної терапії.

Пролонговані теофіліни в низьких дозах, що додаються до низьких доз ІКС (при середній тяжкості персистоючої БА), або до високих доз ІКС (при тяжкій персистоючій БА) можуть покращувати контроль над захворюванням.

Крім можливої додаткової бронходилатації, теофіліни мають деяку протизапальну дію при довготривалій терапії БА та ХОЗЛ низькими дозами, підвищують силу дихальних м'язів, відновлюють знижену чутливість хворих ХОЗЛ в умовах оксидантного стресу до ГКС.

Бронходилататори застосовуються в лікуванні бронхообструктивних захворювань як для симптоматичного лікування (зняття або зменшення г. симптомів), так і з метою досягнення та підтримки тривалої бронходилатації в базисній терапії в якості контролюючих медикаментів. До бронходилататорів відносяться:

- адреностимулятори (селективні β_2 -агоністи короткої та пролонгованої дії та неселективні b-агоністи),
- м-холінолітики (короткої та пролонгованої дії),
- ксантини (теофілін, доксофілін, амінофілін),
- комбіновані препарати (селективні β_2 -агоністи короткої дії + М-холінолітик короткої дії).

Вибір між інгаляційними бронхолітиками залежить від клінічної форми бронхообструктивного захворювання, ступеня тяжкості перебігу захворювання, індивідуальної відповіді на них щодо зменшення симптомів, супутньої патології, виникнення побічних ефектів.

Якщо немає протипоказань в якості симптоматичної терапії, перевагу мають селективні β_2 -агоністи короткої дії (сальбутамол, фенотерол): вони мають швидкий початок бронхолітичного ефекту (ч/з 5-7 хв), який є дозозалежним і триває на протязі 4-6 год. Застосування неселективного β -адреностимулятора, орципреналіну, по можливості, краще уникати, зважаючи на наявність виражених побічних проявів. Адреналін, стимулятор α - і β -адренорецепторів, використовують для невідкладної терапії АР негайного типу.

Інший бронхолітик короткої дії - інгаляційний м-холінолітик іпратропію бромід - викликає дещо меншу бронходилатацію, характеризується дозозалежним ефектом з більш повільним початком і дещо більшою тривалістю дії, ніж β_2 -агоністи короткої дії.

Комбінація бронхолітичних засобів короткої дії з різними механізмами дії (β_2 -агоністів і холінолітиків) дає можливість збільшити ступінь бронходилатації, отримати більш виражене і більш тривале покращення ОФВ1 та зменшення гіпервентиляції легень, ніж при застосуванні кожного з бронхолітиків окремо. При цьому зменшується вірогідність розвитку побічних ефектів, тахіфілаксії при довготривалому лікуванні β_2 -агоністами.

Бронхолітики пролонгованої дії застосовуються в базисній терапії БА та ХОЗЛ, при БА – лише в комплексі із ІКС, при ХОЗЛ – можливо в монотерапії. Пролонгованої дії інгаляційні β_2 -агоністи (сальметерол, формотерол) спричиняють більш сильний і стійкий бронхолітичний ефект, мають деяку протизапальну дію; тривалість їх дії – 12 год і більше (початок дії формотеролу такий же швидкий, як у бронхолітиків короткої дії).

Пролонгованої дії холінолітик (тіотропіум) діє протягом 24 год і більше, спричиняє стабільний, значно сильніший ефект, ніж іпратропіум, має протизапальну дію, характеризується високою безпечністю та хорошою переносимістю хворими.

Теофіліни є бронхолітиками другого вибору. Вони мають менше виражену бронхолітичну дію, потенційно токсичні, характеризуються варіабельним метаболізмом при певних станах, супутніх захворюваннях і одночасному призначенні разом з іншими медикаментами. З метою підвищення ефективності лікування ці ЛЗ можуть додаватися до попередньо призначених бронхолітиків першого вибору (β_2 -агоністів і/або холінолітиків) при тяжкому перебігу БА та ХОЗЛ, або призначатись у якості альтернативи при неможливості проведення інгаляційної бронхолітичної терапії.

Пролонговані теофіліни в низьких дозах, що додаються до низьких доз ІКС (при середній тяжкості персистоючої БА), або до високих доз ІКС (при тяжкій персистоючій БА) можуть покращувати контроль над захворюванням.

Крім можливої додаткової бронходилатації, теофіліни мають деяку протизапальну дію при довготривалій терапії БА та ХОЗЛ низькими дозами, підвищують силу дихальних м'язів, відновлюють знижену чутливість хворих ХОЗЛ в умовах оксидантного стресу до ГКС.

4.1.1. Адреностимулятори

4.1.1.1. Селективні β_2 -агоністи

Селективні β_2 -агоністи (селективні агоністи β_2 -адренорецепторів, селективні β_2 -стимулятори) поділяються на β_2 -агоністи короткої та пролонгованої дії.

При БА β_2 -агоністи короткої дії застосовуються при потребі, у разі необхідності (за наявності симптомів). При контрольованому перебігу БА не рекомендується їх застосування більше 8 вдохів на добу.

При легкій інтермітуючій БА рекомендується також профілактичний прийом інгаляційних β_2 -агоністів короткої дії перед фізичним навантаженням або перед ймовірним впливом алергену (ступінь доказовості А). При загостреннях БА – легкому та середньої тяжкості на амбулаторному етапі β_2 -агоністи короткої дії призначаються 2 – 4 інгаляції кожні 20 хв протягом першої год. Потім їх доза змінюється в залежності від тяжкості загострення. При легких загостреннях та добрій відповіді на початкову терапію - продовжити інгаляції 2 – 4 вдихи кожні 3 – 4 год протягом 24–48 год, при помірному загостренні, при неповній відповіді на початкову терапію - продовжити прийом – 6 – 10 вдохів кожні 1 – 2 год, додати препарати інших груп. При поганій відповіді - продовжити прийом - до 10 вдохів (краще ч/з спейсер) або повну дозу ч/з небулайзер з інтервалами менше 1 год.

Якщо у пацієнта ПОШвид збільшується до $\geq 80\%$ від належних або індивідуально кращих, і утримується на такому рівні протягом 3 – 4 год, додаткове лікування непотрібне.

На госпітальному етапі - інгаляційні β_2 -агоністи короткої дії застосовують постійно протягом 1 год (рекомендовано ч/з небулайзер).

При ХОЗЛ β_2 -агоністи короткої дії застосовуються як в якості симптоматичної терапії (ступінь доказовості А), так і призначаються регулярно у якості базисної терапії для попередження або зменшення персистуючих симптомів.

При загостренні в амбулаторних умовах – рекомендується збільшення дози β_2 -агоністів короткої дії (ступінь доказовості А). При лікуванні загострення в умовах стаціонару β_2 -агоністи короткої дії мають перевагу перед іншими бронхолітиками (ступінь доказовості А). Рекомендується збільшити дозу та/або частоту застосування, комбінувати β_2 -агоністи короткої дії з холінолітиками, використовувати спейсери або небулайзери.

Інгаляційні β_2 -агоністи пролонгованої дії застосовуються в базисній бронхолітичній та протизапальній терапії БА в комплексі з ІКС (але не замість них і не в монотерапії), починаючи із III ступеня (ступінь доказовості А), як в окремих пристроях доставки, так і в комбінаціях із ІКС в одному пристрої доставки.

При використанні β_2 -агоністів пролонгованої дії необхідно притримуватись наступних рекомендацій:

- β_2 -агоністи пролонгованої дії призначаються у тих випадках, коли регулярне застосування ІКС в добових дозах, рекомендованих відповідно тяжкості перебігу БА (дивись п.2), недостатнє для адекватного контролю БА; перш ніж вирішувати питання щодо збільшення дози ІКС, рекомендовано до низьких доз ІКС додавати β_2 -агоністи пролонгованої дії з подальшим моніторингом стану хворого;
- не розпочинати лікування β_2 -агоністами пролонгованої дії при загостренні БА;
- припинити прийом β_2 -агоністів пролонгованої дії, якщо немає покращення стану хворого;
- переглянути прийом β_2 -агоністів пролонгованої дії при досягненні адекватного контролю БА.

Якщо контроль БА підтримується протягом ≥ 3 місяців при застосуванні комбінації низьких доз ІКС + β_2 -агоніст пролонгованої дії, прийом β_2 -агоністу пролонгованої дії можна відмінити (ступінь доказовості D).

При ХОЗЛ β_2 -агоністи пролонгованої дії застосовуються регулярно у якості базисної терапії (мають перевагу перед базисним застосуванням β_2 -агоністів короткої дії) починаючи з II стадії.

β_2 -агоністи з обережністю застосовують при гіпертіреозидизмі, подовженні QT-інтервалу на ЕКГ, АТГ. При вагітності, якщо є потреба в призначенні високих доз, застосовується лише інгаляційний шлях введення.

Парентеральні β_2 -агоністи можуть впливати на міометрій та можуть викликати кардіальні проблеми. При ЦД виникає ризик розвитку кетоацидозу (особливо при в/в введенні).

Побічні дія β_2 -агоністів – тремор, знервованість, головний біль, судоми, серцебиття. Інші побічні явища - тахікардія, аритмії, периферична вазодилатація, ішемія міокарду, порушення сну. Є дані щодо виникнення парадоксального бронхоспазму, ангіоедеми, кропив'янки, гіпотензії, колапсу. Застосування високих доз може призвести до гіпокаліємії.

4.1.1.1.1. β_2 -агоністи короткої дії

- **Сальбутамол (Salbutamol)** * [ГМД]

Фармакотерапевтична група: R03AC02 - засоби для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів. Адренергічні препарати для інгаляційного застосування. Селективні агоністи бета₂-адренорецепторів. Сальбутамол.

Основна фармакотерапевтична дія: є селективним агоністом бета₂-адренорецепторів; у терапевтичних дозах діє на бета-2-адренорецептори гладкої мускулатури бронхів, забезпечуючи швидку (протягом 5 хв) та короткодійчу (4-6 год) бронходилатацію у хворих з оборотною обструкцією дихальних шляхів.

Показання для застосування ЛЗ: аерозоль/інгал. під тиском: короткотривале (від 4 до 6 год) розширення бронхів зі швидким початком (приблизно протягом 5 хв) при обструкції дихальних шляхів ^{БНФ}; купірування нападів ядухи ^{ГМД, БНФ, ВООЗ} при захворюваннях, що супроводжуються обструкцією дихальних шляхів ^{БНФ}, таких як БА ^{ГМД, БНФ, ВООЗ}; профілактика приступів бронхоспазму, пов'язаних з дією алергену ^{ГМД} або спричинених фізичним навантаженням; у комплексній терапії хворих на БА ^{ГМД, ВООЗ, БНФ}; р-н д/інгал.: лікування дорослих та дітей віком від 4 років, для швидкого купірування г. нападів БА ^{ВООЗ, БНФ}, а також для лікування хворих із хр. обструктивним бронхітом, які не реагують на традиційну терапію.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н д/інгал.: застосовувати за допомогою небулайзера, не можна вводити ін'єкційно чи ковтати, дорослі та діти від 4 років - початкова інгаляційна доза сальбутамолу 2,5 мг; може бути збільшена до 5 мг; повторювати інгаляцію можна до 4 р/день ^{ВООЗ, БНФ}; для лікування дорослих пацієнтів із тяжкою обструкцією дихальних шляхів дози можуть бути збільшені до 40 мг/добу, однак таке лікування проводити у стаціонарних умовах під ретельним наглядом лікаря; дітям віком від 18 місяців до 4 років застосовувати ін. ЛФ; аерозоль/інгал. під тиском: дорослі (включаючи літніх пацієнтів) та діти від 12 років - для купірування загострення симптомів астми ^{ВООЗ, БНФ} включаючи г. бронхоспазм ^{ВООЗ}, можна застосовувати 1 інгаляцію (100 мкг ^{ВООЗ, БНФ}) як мінімальну стартову дозу, у разі необхідності дозу можна збільшити до 200 мкг ^{ВООЗ, БНФ} (2 інгаляції); профілактично за 10-15 хв до фіз.навантаження або очікуваного контакту з алергенами застосовують 200 мкг ^{ВООЗ, БНФ} (2 інгаляції), при тривалій підтримуючій терапії застосовувати 200 мкг (2 інгаляції) 4 р/добу ^{БНФ}; діти від 4 до 12 р.: для купірування г. бронхоспазму - 1 інгаляція (100 мкг), у разі необхідності дозу збільшити до 200 мкг (2 інгаляції) ^{ВООЗ, БНФ}, профілактично за 10-15 хв до фізичного навантаження або очікуваного контакту з алергенами застосовують 100 мкг (1 інгаляція), за необхідності дозу можна збільшити до 200 мкг (2 інгаляції), при тривалій підтримуючій терапії застосовувати 200 мкг (2 інгаляції) 4 р/добу ^{ВООЗ, БНФ}; ДД сальбутамолу не більше 800 мкг (8 інгаляцій).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості, ангіоневротичний набряк, кропив'янка, бронхоспазм, артеріальна гіпотензія, колапс; гіпокаліємія, лактоацидоз; тремор, головний біль; гіперактивність; тахікардія; посилене серцебиття; порушення серцевого ритму, включаючи фібриляцію передсердь, суправентрикулярну тахікардію та екстрасистолю, ішемія міокарда; периферична вазодилатація; парадоксальний бронхоспазм, подразнення слизових оболонок порожнини рота і глотки; м'язові судоми.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість в анамнезі до будь-якого компонента препарату; не використовувати для припинення неускладнених передчасних пологів чи загрози викидню лікарської форми сальбутамолу, які не призначені для внутрішньовенного введення.

Визначена добова доза (DDD): інгаляційно (аерозоль) - 0,8 мг., інгаляційно (р-н) - 10 мг., парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НЕБУТАМОЛ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інгал. по 2,5 мл в конт. однодоз. у пак.	1мг/мл	№10x1, №10x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НЕБУТАМОЛ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інгал. по 2 мл у конт. однодоз. у пак.	1мг/мл	№10x4	22,16	
	НЕБУТАМОЛ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інгал. по 2 мл у конт. однодоз. у пак.	1мг/мл	№10x1	26,10	
	САЛЬБУТАМОЛ	ТОВ "Мультіспрей", Україна	інгал. під тиском (сусп.) по 200 доз у бал. з доз. клап.	100мкг/доза	№1	1,92	
	САЛЬБУТАМОЛ-НЕО	ТОВ "Мікрофарм", Україна	інгал. під тиском по 200 доз у конт.	100 мкг/дозу	№1	3,23	
II.	АСТАЛІН	Ципла Лтд. (Юніт II), Індія	аер.(сусп.) д/інг. по 200 доз	100 мкг/дозу	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

ВЕНТОЛІН™ ЕВОХАЛЕР™	Глаксо Веллком С.А./ГлаксоВеллком Продакшн, Іспанія/ Франція	аер. д/інгал., доз., по 200 доз у бал.	100мкг/дозу	№1	2,56	27,20/\$
ВЕНТОЛІН™ НЕБУЛИ	Аспен Бад Олдесло ГмБХ, Німеччина	р-н д/інгал. по 2,5 мл у небулі в пак.	2,5мг/2,5мл	№10x4	34,30	27,20/\$
САЛЬБУТАМОЛ	ГлаксоВеллком Продакшн, Франція	інгал. під тиском по 200 доз у бал. з доз. клап.	100мкг/дозу	№1	2,20	26,59/\$
САЛЬБУТАМОЛ -ІНТЕЛІ	Лабораторіо Альдо- Юніон, С.Л., Іспанія	інгал. під тиском (сусп.) по 200 доз у бал. з адапт.	100мкг/дозу	№1	2,50	30,47/€

● **Фенотерол (Fenoterol)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: R03AC04 - засоби, що застосовуються при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів. Селективні агоністи β₂-адренорецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: бронходилататор, починає діяти за кілька хвилин, тривалість дії до 8 годин; у вищих дозах препарат стимулює β₁-адренорецептори; розслабляє гладку мускулатуру бронхів і судин, ефект є дозозалежним; впливає на поперечно-смугасті м'язи; пригнічує вивільнення медіаторів з опасистих клітин; в дозі 0,6 мг покращує мукоциліарний кліренс; має позитивний інотропний та хронотропний (прямий та/або рефлекторний) вплив на серце; має такі метаболічні ефекти: ліполіз, глікогеноліз, гіперглікемія та гіпокаліємія; подовжує інтервал QTc; може розслабляти мускулатуру матки.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування г.нападів астми ^[ПМД] та інших станів з оборотним звуженням повітряних шляхів (хр. обструктивного бронхіту ^[ПМД]), профілактика астми, індукованої фізичним навантаженням; симптоматичне лікування БА алергічного і неалергічного походження та/або інших станів з оборотною обструкцією повітряних шляхів, таких як хр. обструктивний бронхіт з емфіземою та без емфіземи.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дозу підбирати залежно від природи і тяжкості захворювання; для дорослих та дітей від 6 років: купірування г. нападу БА та нападу задишки рекомендована інгаляція дози 100 мкг/200 мкг (1 інгаляція); загалом при г. нападі задишки достатньо 1 інгаляції для швидкого полегшення дихання, якщо протягом 5 хв немає покращення, можна зробити другу інгаляцію; якщо немає ефекту після проведення 2 інгаляцій, може виникнути необхідність застосування додаткових інгаляцій; наступні інгаляції проводити з інтервалом 5 годин, але не більше 8 доз (200 мкг/дозу)/добу; для довготривалого лікування рекомендована доза – 1-2 інгаляції 3-4 р/добу; час та дозу кожного застосування препарату визначати за частотою та тяжкістю задишки (згідно із симптоматикою); лікування має супроводжуватися протизапальною терапією, особливо при БА; між інгаляціями повинен бути інтервал щонайменше 3 год; МДД не більше 4 інгаляцій, а максимальна разова доза - не більше 4 інгаляцій; для специфічної профілактики астми, індукованої фізичним навантаженням, або коли очікується контакт з алергеном, застосовують 1-2 інгаляції, якщо можливо, за 10-15 хв до передбачуваного інциденту, але не більше 8 доз (1600 мкг, 800 мкг)/добу; дітям віком 4-6 років: купірування г. нападу БА та нападу задишки - 1 інгаляція (100 мкг); для довготривалого лікування або профілактики нападу застосовувати 100 мкг (1 інгаляція) 4 р/добу; час та дозу кожного застосування препарату слід визначати за частотою та тяжкістю задишки (згідно із симптоматикою), лікування повинно супроводжуватися протизапальною терапією, особливо при БА, між інгаляціями має бути інтервал щонайменше 3 год; МДД не більше 4 інгаляцій, а максимальна разова доза не повинна перевищувати 2 інгаляції; для специфічної профілактики астми, індукованої фізичним навантаженням, або коли очікується контакт з алергеном, застосовують 100 мкг (1 інгаляція), якщо можливо за 10-15 хв до передбачуваного інциденту, але не більше 4 доз (400 мкг)/добу, разова доза не більше 2 інгаляцій(200 мкг).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперчутливість; свербіж, висипання, пурпура, тромбоцитопенія, набряк обличчя, гіпокаліємія; гіперглікемія, підвищення в крові рівнів інсуліну, ВЖК, гліцеролу та кетонових тіл; психічні порушення (підвищена збудливість, гіперактивна поведінка, розлади сну, галюцинації), збудження; знервованість, тремор, запаморочення; головний біль, вертикулярна екстрасистоля, тахікардія, відчуття серцебиття, ішемія міокарда, кашель; парадоксальний бронхоспазм; місцеве подразнення, нудота; блювання, печія, гіпергідроз; кропив'янка, шкірні р-ції; м'язовий спазм; м'язова слабкість, міалгія; порушення сечовипускання, підвищення АТ, зниження АТ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія, тахіаритмія; гіперчутливість до фенотеролу гідроброміду або до допоміжних речовин дозованого аерозолу.

Визначена добова доза (DDD): інгаляційно (аерозоль) - 0,6 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БЕРОВЕНТ-МФ	ТОВ "Мікрофарм", Україна	аер. д/інгал., доз. 300 доз у бал.	100 мкг/дозу, 200 мкг/дозу	№1		відсутня у реєстрі ОВЦ
	БРОНХОТЕРОЛ	ТОВ "Мультиспрей", Україна	аер. доз., 200 доз у бал.	100 мкг/дозу	№1		відсутня у реєстрі ОВЦ
II.	БЕРОТЕК® Н	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмБХ і Ко. КГ, Німеччина	аер. доз., 200 доз у бал.	100мкг/дозу	№1	7,09	29,52/€

4.1.1.1.2. b2-агоністи пролонгованої дії

● **Формотерол (Formoterol)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: R03AC13 - адренергічні препарати для інгаляційного застосування. Селективні агоністи β₂-адренорецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: селективний агоніст β_2 -адренорецепторів; пацієнтів зі зворотною обструкцією дихальних шляхів чинить бронхорозширювальну дію (протягом 1-3 хв), яка триває протягом 12 год після інгаляції; у терапевтичних дозах вплив на ССС мінімальний і виникає лише в окремих випадках; формотерол інгібує вивільнення гістамінів і лейкотрієнів з пасивно сенсibilізованої легені людини; ефективно попереджає бронхоспазм, спричинений алергенами, фізичним навантаженням, холодним повітрям, гістаміном чи метахоліном.

Показання для застосування ЛЗ: лікування та профілактика бронхоспазму у хворих на БА^{БНФ, ПМД}; профілактика бронхоспазму, спричиненого алергенами, холодним повітрям, фізичним навантаженням; профілактика та лікування порушень бронхіальної прохідності у хворих на ХОЗЛ^{БНФ, ПМД}, у т.ч. з хр. бронхітом та емфіземою; лікування БА у пацієнтів, які використовують інгаляційні кортикостероїди або які потребують лікування β_2 -агоністами тривалої дії; для зменшення симптомів обструкції дихальних шляхів у пацієнтів з ХОЗЛ, які потребують лікування β_2 -агоністами тривалої дії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим (в т.ч. літнім пацієнтам та дітям від 12 років) при БА та ХОЗЛ: 12-24мкг 2р/добу^{БНФ}; МДД підтримуюча 48 мкг (4 капс.)/добу; додатково до підтримуючої дози можна призначити 1-2 дози (капс.)/добу; ХОЗЛ: регулярна підтримуюча терапія - 1 капс./інгаляція (12 мкг) 2 р/добу; для профілактики бронхоспазму, спричиненого фізичними вправами чи впливом відомих алергенів, якого не можна уникнути: дорослим по 1 капс. для інгаляцій (12 мкг) за 15 хв. перед вправами чи впливом алергенів; пацієнтам із тяжкою БА можуть знадобитися 2 капс. для інгаляцій (24 мкг); дітям старше 6 років: по 1 капс. для інгаляцій (12 мкг) за 15 хв перед навантаженням чи впливом алергенів; 1 капс. для інгаляції (12 мкг) 2 р/добу, при БА, МДД 24 мкг/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тяжке загострення БА; тремор, спазми м'язів, міалгія, судоми; відчуття серцебиття, тахікардія, аритмія (фібриляція передсердь, надшлуночкова тахікардія, суправентрикулярна тахікардія, екстрасистолія, стенокардія, подовжений інтервал QT, зміни АТ); головний біль, збудження, запаморочення, відчуття тривоги, неспокій, порушення сну, відчуття страху, нервозність, занепокоєння, безсоння; погіршення клінічного стану, сухість у роті; тяжка артеріальна гіпотензія, реакції гіперчутливості, ангіоневротичний набряк, бронхоспазм, тяжка гіпотонія, кропив'янка, екзантема, свербіж, висипання, периферичні набряки, алергічні реакції; гіпокаліємія, гіперкаліємія, гіперглікемія; кашель, підвищення АТ, включаючи гіпертензію; зміна смакових відчуттів, нудота, подразнення глотки, подразнення слизової оболонки очей, рота та горла, парадоксальний бронхоспазм, набряк повік; підвищення рівнів інсуліну, ВЖК, гліцерину, кетонових тіл у крові; посилене/прискорене серцебиття; погіршення клінічного стану

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до формотеролу, лактози моногідрату, будь-яких компонентів препарату чи інших β_2 -адренергічних стимуляторів; тахіаритмія, АВ блокада третього ступеня, ідіопатичний підклапанний аортальний стеноз, гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія, тиреотоксикоз; пацієнти з підозрюваним чи відомим подовженням інтервалу QT (QTc > 0,44 сек).

Визначена добова доза (DDD): інгаляційно (порошок) - 24 мкг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЗАФІРОН	АТ "Адамед Фарма" (вир-к, відпов. за випуск серії, вир-к перв. та втор. Пак.)/ Лабораторіос Ліконса, С.А. (вир-к "in bulk" та контроль серії), Польща/Іспанія	капс. з пор. д/інгал. у бл. з інгалят.	12мкг	№10x12	13,33	26,67/\$
	ЗАФІРОН	АТ "Адамед Фарма" (вир-к, відпов. за випуск серії, вир-к перв. та втор. Пак.)/ Лабораторіос Ліконса, С.А. (вир-к "in bulk" та контроль серії), Польща/Іспанія	капс. з пор. д/інгал. у бл. з інгалят.	12мкг	№10x6	13,33	26,67/\$
	ФОРАТЕК	Ципла Лтд. (Юніт II), Індія	аероз. (сусп.) д/інгал. по 120 доз у конт.	12 мкг/дозу	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФОРМОТЕРОЛ ІЗІХЕЙЛЕР	Оріон Корпорейшн, Фінляндія	пор. д/інгал., по 120 доз в інгал. в лам.пак. в карт. кор.	12мкг/дозу	№1	4,69	32,37/€
	ФОРМОТЕРОЛ ІЗІХЕЙЛЕР	Оріон Корпорейшн, Фінляндія	пор. д/інгал., по 120 доз в інгал. з захисн. ковп., з захисн. ковп. та конт. д/інгал.	12мкг/дозу	№1	5,23	32,37/€
	ФОРТІКС	ЛАБОРАТОРІОС ЛІКОНСА,	пор. д/інгал.,	12мкг	№10x6	12,54	32,72/€

		С.А., Іспанія	тверд. капс. у бл. з інгал.				
ФОРТУЛІН	МЕДА Менюфекчеринг ГмбХ (вир-во, пакування, контроль та випуск серії)/Рош-Дельта ГмбХ енд Ко. КГ (альтернативне місце вторинного пакування)/МақДермот Лабораторіз Т/А Майлан Дублін Респіреторі (альтернативне місце вторинного пакування та випуск серії, Німеччина/Ірландія	пор. д/інгал., по 60 доз у картр. в конт. в уп.	12мкг/дозу	№1	11,42	26,59/€	
ФОРТУЛІН	МЕДА Менюфекчеринг ГмбХ (вир-во, пакування, контроль та випуск серії)/Рош-Дельта ГмбХ енд Ко. КГ (альтернативне місце вторинного пакування)/МақДермот Лабораторіз Т/А Майлан Дублін Респіреторі (альтернативне місце вторинного пакування та випуск серії, Німеччина/Ірландія	пор. д/інгал., по 60 доз у картр. в конт. з інгал. в уп.	12мкг/дозу	№1	18,83	26,59/€	

● **Сальметерол (Salmeterol)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: R03AC12 - протиастматичні засоби. Адренергічні препарати для інгаляційного застосування. Селективні агоністи b2-адренорецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: селективний агоніст b2-адренорецепторів пролонгованої дії (12 год); є більш ефективним засобом для попередження гістамініндукованого бронхоспазму та викликає більш тривалу (не менше 12 год) бронходилатацію, ніж агоністи b2-адренорецепторів короткої дії; сильний і довготривалий інгібітор вивільнення з опасистих клітин гістаміну, лейкотрієнів та простагландину D₂; пригнічує ранню та пізню стадію AP; після введення однієї дози пригнічення пізньої стадії триває до 30 год, коли бронходилатаційний ефект вже відсутній; одноразове застосування зменшує гіперреактивність бронхів; має додаткову, не бронходилатаційну активність, однак повне клінічне значення цього не до кінця вивчене; механізм цієї активності відмінний від протизапального ефекту ГК, застосування яких не слід припиняти або зменшувати дозу при застосуванні сальметеролу.

Показання для застосування ЛЗ: регулярне симптоматичне додаткове лікування оборотної обструкції дихальних шляхів при БА, включаючи пацієнтів із нічними нападами астми ^{БНФ, ПМД}, симптоми хвороби у яких недостатньо контролюються застосуванням інгаляційних кортикостероїдів; лікування ХОЗЛ ^{БНФ}; попередження нападів астми, спровокованих фізичним навантаженням.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначений винятково для інгаляційного застосування; для досягнення повного терапевтичного ефекту при лікуванні оборотної обструкції дихальних шляхів необхідно регулярно застосування препарату; при астмі дорослим та дітям від 12 років - 2 інгаляції (2 x 25 мкг) 2 р/добу ^{БНФ}, при тяжкій обструкції дихальних шляхів дозу можна збільшити до 4 інгаляцій (4 x 25 мкг) 2 р/добу; дітям від 4 років - 2 інгаляції (2 x 25 мкг) 2 р/добу; недостатність клінічних даних застосування для лікування дітей до 4 років не дозволяє призначати препарат хворим цієї вікової групи; при ХОЗЛ: дорослим по 2 інгаляції (2 x 25 мкг сальметеролу) 2 р/добу ^{БНФ}, дітям препарат при цьому показання не призначається ^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: реакції гіперчутливості, висипання; анафілактична р-ція, включаючи набряк та ангіоневротичний набряк, бронхоспазм та анафілактичний шок; гіпокаліємія, гіперглікемія; нервозність; безсоння; тремор і головний біль; запаморочення; прискорене серцебиття; тахікардія; порушення серцевого ритму, включаючи передсердну фібриляцію, суправентрикулярну тахікардію та екстрасистолію; подразнення ротоглотки та парадоксальний бронхоспазм; нудота; судоми м'язів; артралгія; неспецифічний біль у грудях.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого компонента препарату

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	СЕРОБІД®	Ципла Лтд. (Юніт II), Індія	інгал. під тиском, сусп. доз. по 120 доз у бал.	25 мкг/дозу	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

● **Індакатерол (Indacaterol)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: R03AC18 - адренергічні препарати для інгаляційного застосування. Селективні агоністи β₂-адренорецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: фармакологічні ефекти зумовлені стимуляцією внутрішньоклітинної аденіліциклази, ферменту, що каталізує перетворення АТФ у циклічний-3',5'-аденозинмонофосфат (циклічний монофосфат); підвищений рівень циклічного АМФ призводить до розслаблення гладких м'язів бронхів; після інгаляції діє місцево в легенях як бронходилататор.

Показання для застосування ЛЗ: підтримуюча бронходилатативна терапія обструкції дихальних шляхів у дорослих пацієнтів із хр. обструктивним захворюванням легенів (ХОЗЛ)^{БНФ, ПМД}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати дорослим; рекомендована доза - інгаляція вмісту 1 капс. 150 мкг за допомогою інгалятора 1 р/добу, дозу можна збільшувати тільки за рекомендацією лікаря; інгаляція вмісту 1 капс. 300 мкг 1 р/добу за допомогою інгалятора - для пацієнтів із тяжкою формою ХОЗЛ. МДД- 300 мкг^{БНФ}; застосовувати в один і той самий час кожного дня, при пропуску дози наступну потрібно приймати в той самий час наступного дня.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: назофарингіт; інфекції ВДШ, синусит, підвищена чутливість; запаморочення, тремор; ЦД, гіперглікемія; головний біль, парестезія; ІХС, фібриляція передсердь, відчуття серцебиття, тахікардія, кашель, орофарингеальний біль, включаючи подразнення у горлі, ринорея, парадоксальний бронхоспазм, свербіж/висипання, м'язовий спазм, міалгія, кістково-м'язовий біль, біль у грудній клітці, периферичні набряки.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини, лактози або іншої допоміжної речовини.

Визначена добова доза (DDD): інгаляційно (порошок) - 0,15 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ОНБРЕЗ БРИЗХАЙЛЕР	Новартіс Фарма Штейн АГ (вир-во за повним циклом)/Фарманалітика СА (контроль якості (за винятком тесту мікробіологічна чистота))/Новартіс Фармасьютика С.А. (вир-во за повним циклом), Швейцарія/Швейцарія/Іспанія	пор. д/інгал., твер. капс. у бл. з інгал.	150мкг	№10x3	23,90	26,03/\$
	ОНБРЕЗ БРИЗХАЙЛЕР	Новартіс Фарма Штейн АГ (вир-во за повним циклом)/Фарманалітика СА (контроль якості (за винятком тесту мікробіологічна чистота))/Новартіс Фармасьютика С.А. (контроль якості за показниками: "Опис вмісту", "Оболонка"; первинне та вторинне пакування, ви, Швейцарія/Іспанія	пор. д/інгал., твер. капс. у бл. з інгал.	150мкг, 300мкг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ОНБРЕЗ БРИЗХАЙЛЕР	Новартіс Фарма Штейн АГ (вир-во за повним циклом)/Фарманалітика СА (контроль якості (за винятком тесту мікробіологічна чистота))/Новартіс Фармасьютика С.А. (вир-во за повним циклом), Швейцарія/Іспанія	пор. д/інгал., твер. капс. у бл. з інгал.	300мкг	№10x3	12,48	26,03/\$

4.1.2. М-холіноблокатори

Бронхолітичний ефект іпратропію броміду менш виражений, ніж у β2-агоністів, початок дії більш повільний, дія більш тривала (бронхолітичний ефект триває до 8 год) (ступінь доказовості А). Тривалість дії пролонгованого М-холінолітика тіотропіуму броміду – більше 24 год (ступінь доказовості А).

Чутливість М-холінорецепторів бронхів не зменшується з віком, що дозволяє застосовувати М-холіноблокатори у хворих ХОЗЛ літнього й старечого віку. У М-холіноблокаторів відсутня кардіотоксична дія, що уможливує їхнє застосування в пацієнтів з порушеннями діяльності ССС. На відміну від β2-агоністів, холіноблокатори не викликають вазодилатації й зниження рО₂. М-холіноблокатори зменшують секрецію залоз слизової оболонки носа й бронхіальних залоз, однак мукоциліарий кліренс не пригнічується інгаляційними М-холіноблокаторами. До М-холіноблокаторів не виникає тахіфілаксії при повторному застосуванні, їх можна застосовувати тривалий термін без зменшення ефективності. Холінолітики короткої дії при БА на всіх ступенях застосовується в якості симптоматичної терапії при потребі при неможливості або неефективності застосування β2-агоністів. При середньої тяжкості і тяжких загостреннях БА додаються до β2-агоністів і спричиняють додатковий бронхолітичний ефект, призначати краще ч/з спейсер великого об'єму або небулайзер.

М-холінолітики – основні ліки в лікуванні ХОЗЛ. Інгаляційне призначення М-холіноблокаторів рекомендується при всіх ступенях тяжкості ХОЗЛ. При легкому ХОЗЛ застосовуються М-холіноблокатори короткої дії при потребі, при ХОЗЛ середньої тяжкості та тяжкому М-холіноблокатори застосовують постійно; при цьому можливо збільшення дози препаратів короткої дії, застосування їх при потребі та планово в базисній терапії, починаючи із II стадії.

Застосування М-холіноблокаторів тривалої дії (тіотропію бромід) показане починаючи із II стадії захворювання. Постійний прийом М-холіноблокаторів тривалої дії поліпшує функцію легенів, зменшує задишку, поліпшує якість життя, знижує частоту й тривалість загострень ХОЗЛ.

Тривале застосування М-холіноблокаторів поліпшує якість сну у хворих ХОЗЛ і зменшує кількість загострень захворювання.

4.1.2.1. М-холіноблокатори короткої дії

4.1.2.2. М-холіноблокатори пролонгованої дії

• Глікопіронію бромід (*Glycopyrronium bromide*)

Фармакотерапевтична група: R03BB06 - Інші лікарські засоби, що застосовуються при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів. Інші інгаляційні препарати для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів. Антихолінергічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: є антагоністом мускаринових рецепторів (антихолінергічна дія) тривалої дії, що застосовується у вигляді інгаляції 1 р/добу як підтримувальна бронхолітична терапія при ХОЗЛ; парасимпатичні нерви є основним бронхоконстрикторним невральним шляхом у дихальних шляхах, а холінергічний тонус - ключовим зворотним компонентом обструкції дихальних шляхів при ХОЗЛ; блокує бронхоконстрикторну дію ацетилхоліну на клітини гладкої мускулатури дихальних шляхів, тим самим розширюючи дихальні шляхи; є антагоністом мускаринових рецепторів з високою спорідненістю до цих трьох підтипів рецепторів.

Показання для застосування ЛЗ: підтримувальна бронходилатаційна терапія для полегшення симптомів у пацієнтів з ХОЗЛ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: інгаляція вмісту однієї капс. 50 мкг за допомогою інгалятора, що додається 1 р/добу^{БНФ}; рекомендується застосовувати 1 р/добу в один і той же час кожного дня; якщо прийом дози пропущено, наступну дозу прийняти якомога швидше; пацієнти повинні знати, що не можна приймати більше однієї дози на добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: назофарингіт, риніт, синусит, цистит; гіперчутливість, ангіоневротичний набряк; гіперглікемія; безсоння; головний біль, гіпестезія; фібриляція передсердь, прискорене серцебиття; закладеність носу, продуктивний кашель, подразнення горла, носова кровотеча; дисфонія, парадоксальний бронхоспазм; сухість у роті, гастроентерит; диспепсія, карієс зубів; висипання, свербіж; біль у кінцівках, скелетно-м'язовий біль у грудях; інфекція сечостатевої системи; дизурія, затримка сечі; доброякісна гіперплазія передміхурової залози, стомлюваність, астенія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини, до лактози або до будь-якої з допоміжних речовин.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	СИБРІ БРИЗХАЙЛЕР	Новартіс Фарма Штейн АГ (вир-во, контроль якості (за винятком визначення Продуктів розкладу 542-07 методом ВЕЖХ-MS, маса високодисперсних часток методом імпактора Next Generation, однорідність доставленої дози методом ВЕЖХ), вторинне пакування, випус, Швейцарія/Іспанія	пор. д/інгал., тверді капс. у бл. з інгал	50 мкг	№10, №12, №30, №90, №150	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• Тіотропію бромід (*Tiotropium bromide*)

Фармакотерапевтична група: R03BB04 - засоби для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів, інгаляційні засоби. Антихолінергічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: є специфічним антагоністом мускаринових рецепторів тривалої дії; має подібну спорідненість з усіма підтипами мускаринових рецепторів від M1 до M5; у дихальних шляхах інгібіція M3-рецепторів спричиняє розслаблення гладкої мускулатури; бронхопротективний ефект дозозалежний та триває більше 24 год; тривалість ефекту зумовлена дуже повільним вивільненням із M3-рецепторів; при інгаляційному застосуванні він демонструє прийнятний терапевтичний діапазон до появи системних антихолінергічних ефектів.

Показання для застосування ЛЗ: підтримуюча бронхолітична терапія для полегшення симптомів при ХОЗЛ^{БНФ}; додаткова підтримуюча бронхолітична терапія дорослих та дітей від 6 років з тяжкою астмою, які перенесли одне чи більше тяжких загострень астми протягом попереднього року.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: порошок д/інгаляцій: рекомендована доза 1 інгаляція вмісту 1 капс./день^{БНФ} за допомогою інгаляційного пристрою; р-н д/інгаляцій: 5 мкг - дві інгаляції (два вдихи) аерозолі за допомогою інгаляційного пристрою 1р/добу^{БНФ}; інгаляції робити в один і той же час доби; не перевищувати рекомендовану дозу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: зневоднення; запаморочення, порушення сну, безсоння, головний біль, порушення смакових відчуттів; нечіткість зору, глаукома, підвищення ВОТ; фібриляція передсердь, суправентрикулярна тахікардія, тахікардія, відчуття серцебиття; кашель, дисфонія, фарингіт, бронхоспазм, носові кровотечі, ларингіт, синусит; сухість у роті, гастроєзофагеальна рефлюксна хвороба, орофарингіальний кандидоз, запор, непрохідність кишечника, що включає паралітичну непрохідність кишечника, дисфагія, гінгівіт, глосит, стоматит, нудота, карієс зубів; висип, ангіоневротичний набряк, гіперчутливість (включаючи АР негайного типу), анафілактична реакція, свербіж, кропив'янка, сухість шкіри, інфекції шкіри та утворення виразок; набряк суглобів; затримка сечі, розлади сечовипускання, дизурія, ІСШ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: відома гіперчутливість до тіотропію броміду, атропіну або його похідних (до іпратропію або окситропію) або до інших компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): інгаляційно (порошок) - 10 мкг., інгаляційно (р-н) - 5 мкг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	СПІРИВА®	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина	пор. д/інгал., тверді капс. у бл. з пристр. Хенді Хейлер® або без	18мкг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СПІРИВА®	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина	пор. д/інгал., тверді капс. у бл. з пристр. Хенді Хейлер®	18мкг	№10x3	23,25	31,39/€
	СПІРИВА® РЕСПІМАТ®	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина	р-н д/інгал. (60 інгал.) у картр. з інгал. РеспімаТ®	2,5мкг/інгал.	№1	46,55	31,03/€

4.1.2.3. Комбіновані лікарські засоби

Використання β-адреностимуляторів (сальбутамолу та фенотеролу) у комбінації з М-холіноблокаторами короткої дії (іпратропію броміду) дозволяє підсилити бронхорозширюючу дію й істотно зменшити сумарну дозу β-адреностимуляторів і тим самим знизити ризик побічної дії останніх. Переваги цієї комбінації: вплив на дві патогенетичні ланки бронхообструкції й швидка бронхолітична дія. Для цієї мети існують зручні комбінації препаратів в одному інгаляторі.

При БА застосовується при неможливості застосування або неефективності β2-агоністів.

При с-мі стомлення дихальної мускулатури найкращий ефект досягається при використанні небулайзерів.

При стабільному ХОЗЛ приводить до більш вираженого й тривалого збільшення ОФВ₁, ніж при використанні кожного препарату окремо, і не викликає ознак тахіфілаксії протягом лікування 90 днів і більше.

- **Іпратропію бромід + Фенотерол (Ipratropium bromide + Fenoterol)**^[лімд]

Визначена добова доза (DDD): інгаляційно (аерозоль) - 6 доз (для 20мкг/50мкг), інгаляційно (р-н) - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ІПРАДУАЛ	ТОВ "Мультиспрей", Україна	р-н д/інгал., по 20 мл у фл. з крап.	250мкг/500мкг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ІПРАДУАЛ	ТОВ "Мультиспрей", Україна	аер. доз. по 200 доз у бал. з доз. клап.	20мкг/50мкг/доза	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФРІВЕЙ® КОМБІ	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/інгал., по 20 мл у фл.	0,5мг/0,25мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФРІВЕЙ® КОМБІ	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/інгал., по 25 мл у фл.	0,5мг/0,25мг/мл	№1	160,00	
II.	БЕРОДУАЛ®	Іstituto де Анжелі С.р.л., Італія	р-н д/інгал., по 40 мл у фл. з крап.	250мкг/500мкг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БЕРОДУАЛ®	Іstituto де Анжелі С.р.л., Італія	р-н д/інгал., по 20 мл у фл. з крап.	250мкг/500мкг/мл	№1	209,46	31,03/€
	БЕРОДУАЛ® Н	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина	аер. доз. по 200 доз у бал. з доз. клап.	20мкг/50мкг/мл	№1	5,97	31,83/€

- **Умеклідініуму бромід + вилантерол (Umeclidinium bromide + vilanterol)**

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АНОРО™ ЕЛЛІПТА™	Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Велика Британія	пор. д/інгал., доз., по 30 доз у інгал. в лотку	55 мкг/22 мкг/дозу	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

4.1.3. Ксантини

4.1.3.1. Теофілін

Препарати теофіліну застосовуються при БА як бронхолітики другого вибору в якості симптоматичної терапії (короткої дії), пролонгованої дії теофіліни в комбінації із ІКС – в якості базисної терапії на III – IV ступенях БА (при неможливості або неефективності пролонгованої дії β2-агоністів), при тяжких загостреннях БА в умовах стаціонару показано парентеральне введення.

При ХОЗЛ теофіліни призначаються при недостатній ефективності холінолітиків і β-адреностимуляторів. Хоча вони виявляють менш виражену бронходилатуючу дію, але їх прийом може призводити до зменшення легеневої гіпертензії, підвищення діурезу, стимуляція ЦНС, посилення роботи дихальних м'язів, що може бути корисними у

деяких хворих. Можуть спричиняти додатковий ефект при призначенні з малими дозами β 2-агоністів, але при такій комбінації зростає ризик побічних ефектів, зокрема гіпокаліємії.

При використанні препаратів теофіліну (короткої й пролонгованої дії) рекомендоване визначення концентрації теофіліну в крові на початку лікування, кожні 6—12 міс, а також після зміни доз і препаратів.

Метаболізм у пацієнтів, які палять, більш інтенсивний, ніж у пацієнтів, які не палять, що проявляється у зменшенні $T_{1/2}$ до 4 – 5 год і потребує призначення препарату в більш високих дозах.

● **Теофілін (Theophylline)** *^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: R03DA04 - засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів. Ксантини. Теофілін.

Основна фармакотерапевтична дія: бронхолітичний, спазмолітичний засіб групи метилксантинів; механізм дії зумовлений здатністю блокувати аденозинові рецептори, неселективно інгібувати фосфодієстеразу та підвищувати концентрацію цАМФ у тканинах, пригнічувати транспортування іонів кальцію Ca^{2+} «повільні» канали клітинних мембран і зменшувати його вихід із внутрішньоклітинних депо; гальмує вивільнення з опасистих клітин медіаторів запалення, підвищує мукоциліарний кліренс, стимулює скорочення діафрагми та поліпшує функцію дихальних і міжреберних м'язів; проявляє виразний бронхолітичний ефект, зумовлений безпосереднім розслабленням гладкої мускулатури бронхів; нормалізує дихальну функцію, сприяє насиченню крові киснем і зниженню концентрації вуглекислоти; стимулює центр дихання; посилює вентиляцію легенів в умовах гіпокаліємії; гальмує агрегацію тромбоцитів (інгібує фактор активації тромбоцитів і простагландину E_2), підвищує стійкість еритроцитів до деформації (поліпшує реологічні властивості крові), зменшує тромбоутворення та нормалізує мікроциркуляцію; проявляє стимулювальний вплив на ЦНС і діяльність серця, підвищує силу та частоту серцевих скорочень, збільшує коронарний кровотік та потребу міокарда в кисні; знижує тиск у малому колі кровообігу; підвищує нирковий кровотік, проявляє помірний діуретичний ефект розширює позапечінкові жовчні шляхи.

Показання для застосування ЛЗ: ХОЗЛ^{БНФ}, БА^{БНФ}, емфізема легень, с-м центрального нічного апное, бронхообструктивний с-м^{БНФ} при БА^{БНФ}, бронхіті, емфіземі легень, порушеннях з боку дихального центру (нічне пароксизмальне апное), «легеневе серце»; легенева гіпертензія

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н вводять в/в; якщо пацієнт приймає препарати теофіліну р/ос, дозу для парентерального введення знижують; при введенні пацієнт знаходиться в положенні лежачи; лікар контролює АТ, ЧСС, частоту дихання та загальний стан хворого; в/в струминно вводять повільно (протягом не менше 5 хв), в/в краплинно - зі швидкістю 30-50 крап./хв; дозу розраховують у міліграмах, враховуючи, що 1 мл містить 20 мг теофіліну; дорослим в/в струминно вводять у добовій дозі 10 мг/кг маси тіла (600-800 мг), розподілених на 3 введення; при кахексії та в осіб з початковою низькою масою тіла добову дозу зменшують до 400-500 мг, під час першого введення вводять не більше 200-250 мг; при появі прискорення серцебиття, запаморочення, нудоти швидкість введення знижують або переходять на краплинне введення; дітям віком старше 14 років: в/в краплинно в дозі 2-3 мг/кг маси тіла; МДД для дітей віком старше 14 років - 3 мг/кг маси тіла; МДД, які можна застосовувати без контролю концентрації теофіліну у плазмі: діти віком 3-9 років - 24 мг/кг маси тіла, 9-12 років - 20 мг/кг маси тіла, 12-16 років - 18 мг/кг маси тіла, пацієнти старше 16 років - 13 мг/кг маси тіла (або 900 мг); тривалість лікування залежить від тяжкості та перебігу захворювання і чутливості до терапії, але не повинна перевищувати 14 діб; табл. застосовують р/ос за 30-60 хв до їди або ч/з 2 год. після їди; дорослі та діти віком від 12 років з масою тіла більше 45 кг: початкова доза 300 мг/добу; ч/з 3 дні у разі відсутності серйозних побічних дій дозу можна збільшити до 450 мг/добу, ще ч/з 3 дні, за необхідності, дозу можна збільшити до 600 мг/добу; дітям від 6 до 12 років з масою тіла 20-45 кг ДД становить 150 мг, ч/з 3 дні лікування ДД можна підвищити до 300 мг, ще ч/з 3 дні застосування, за необхідності ДД можна підвищити до 450-600 мг; пацієнтам літнього віку із СС захворюваннями та/або порушеннями ф-ції печінки і нирок: добова доза 8 мг/кг маси тіла; дозування підбирається індивідуально, табл. приймають 2 р/добу; загальна доза не має перевищувати 24 мг/кг маси тіла для дітей і 13 мг/кг для дорослих; капс.: доза для дорослих і дітей з масою тіла понад 40 кг становить 350 мг 2 р/добу^{БНФ}; звичайна доза для дітей від 6 років з масою тіла понад 20 кг 10-15 мг/кг/добу, у разі можливості - у 2 прийоми (застосовують капс. 200 мг^{БНФ}), підлітків та дорослих дуже худорлявої статури - 200 мг 2 р/добу; пацієнтам з нічною астмою або с-м центрального нічного апное можна приймати разову дозу на ніч; приймати після їжі з великою кількістю води, капс. ковтати цілими, не розжовуючи.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: запаморочення, головний біль, підвищена збудливість, дратівливість, неспокій, тривога, збудження, безсоння, занепокоєння, марення, порушення сну, тремор, судоми, слутаність/втрата свідомості, галюцинації, пресинкопальний стан, г. енцефалопатія, епілептиформні напади, делірій; біль у животі, біль шлунку, подразнення шлунка, нудота, блювання, анорексія, гастроезофагеальний рефлюкс, печія, загострення виразкової хвороби, випадкова діарея, атонія кишечника, зниження апетиту, стимуляція секреції кислоти шлункового соку, крововиливи травного тракту; порушення функції печінки, жовтяниця; гіпокаліємія/гіперкаліємія, гіперкальціємія, гіперурикемія, гіперглікемія, метаболічний ацидоз, порушення кислотно-лужної рівноваги та збільшення рівня креатиніну крові, рабдоміоліз, м'язові спазми; біль у грудній клітці, аритмія, порушення серцевого ритму (тахіаритмія), прискорене серцебиття, відчуття серцебиття (пальпітація), тахікардія, різке зниження АТ, шок, кардіалгія, збільшення частоти нападів стенокардії, екстрасистолія (шлуночкова, надшлуночкова), СН, колапс (при швидкому в/в введенні); збільшення діурезу, затримка сечі у чоловіків літнього віку; алергічні реакції, гіперчутливість, анафілактичні та анафілактоїдні реакції, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок, шкірні висипання, свербіж шкіри, кропив'янка, ексфолювативний дерматит, бронхоспазм; еритема, набряк; реакції у місці введення - гіперемія, біль, ущільнення; підвищення t° тіла, озноб, відчуття жару та гіперемія обличчя, підвищена пітливість, слабкість, задишка; підвищення частоти дихання; аплазія еритроцитів; електролітний дисбаланс

Противоказання до застосування ЛЗ: підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату, а також до інших похідних ксантину (кофеїн, пентоксифілін, теобромін), г. СН, некомпенсована ХСН, стенокардія, г. ІМ, г. порушення серцевого ритму (г. тахіаритмія), пароксизмальна тахікардія, екстрасистолія, виражена артеріальна гіпер- та гіпотензія, розповсюджений атеросклероз судин, набряк легенів, геморагічний інсульт, крововилив у сітківку ока, кровотеча в анамнезі, виразкова хвороба шлунка та ДПК (у ст. загострення), тяжкі порушення функцій печінки та/або нирок, ГЕРХ, епілепсія, глаукома, підвищена судомна готовність, неконтрольований гіпотиреоз,

гіпертиреоз, тиреотоксикоз, тяжка печінкова та/або ниркова недостатність, порфірія, сепсис; дітям протипоказане одночасне застосування теофіліну з ефедрином.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,4 г., парентерально - 0,4 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕУФІЛІН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 10 мл в амп. у конт. чар/уп.	20мг/мл	№5x2	6,61	
	ЕУФІЛІН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 5 мл в амп. у конт. чар/уп.	20мг/мл	№5x2	9,24	
	ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 5 мл в амп. конт. чар/уп.	20мг/мл	№5x2, №10	12,20	
	ЕУФІЛІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 5 мл в амп. в кор. або бл.	20мг/мл	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕУФІЛІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 5 мл в амп. в кор. або бл.	20мг/мл	№10	17,22	
	ЕУФІЛІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 5 мл в амп. в кор. або бл.	20мг/мл	№5x2	17,22	
	ЕУФІЛІН-Н 200	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 5 мл, 10 мл в амп. у пач. та бл.	2%	№5, №10, №5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕУФІЛІН-Н 200	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у пач.	2%	№5x2	11,60	
	НЕОФІЛІН	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. прол. дії у конт. чар/уп.	100мг	№10x5	1,90	
	НЕОФІЛІН	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. прол. дії у конт. чар/уп.	300мг	№10x5	0,99	
	ТЕОПЕК	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл. прол. дії у бл.	300мг	№10x5	0,97	
ТЕОТАРД	ПАТ "Вітаміни" (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії)/АТ "Софарма" (вир-во нерозфасованої продукції, первинна упаковка або вир-во за повним циклом), Україна/Болгарія	табл. прол. дії у бл.	300 мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ		
II.	ТЕОТАРД	КРКА, д.д., Ново место (вир-во (пеллет та капсулювання), первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій)/Темлер Ірландія Лтд. (вир-во (пеллет та капсулювання) та контроль серій)/Свіс Капс ГмбХ (первинне та вторинне пакування), Словенія/Ірландія/Німеччина	табл. прол. дії у бл.	200мг	№10x4	6,13	35,35/€

4.1.3.2. Доксофілін

- **Доксофілін (Doxofylline)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: R03DA11 - Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів. Ксантини. Доксофілін.

Основна фармакотерапевтична дія: діє безпосередньо на гладенькі м'язи бронхів та легеневи судин, що призводить до бронходилатації; діє як бронходилататор, легеневий вазодилататор та міорелаксант бронхіальних м'язів; активність може бути опосередкована, принаймні частково, шляхом інгібування фосфодіестерази, що супроводжується підвищенням внутрішньоклітинного вмісту цАМФ, яке спричиняє зменшення скоротливої активності гладкої мускулатури; при більш високих концентраціях може уповільнювати виведення гістаміну з клітин.

Показання для застосування ЛЗ: БА, захворювання легень з бронхіальним спастичним компонентом (ХОЗЛ) ^[ПМД].

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дози встановлюються лікарем індивідуально залежно від віку, маси тіла та особливостей метаболізму хворого; середня добова доза для дорослих та дітей віком від 12 років 800-1200 мг (1 табл. 2-3 р/добу); дітям від 6 до 12 років - по ½ табл. 2-3 р/добу (12-18 мг/кг/добу).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота, блювання, біль в епігастральній ділянці, шлунково-стравохідний рефлюкс; діарея, диспепсія; дратівливість, головний біль, безсоння, запаморочення, тремор, судоми; екстрасистолія, відчуття серцебиття; тахікардія, аритмія; тахіпноє; гіперглікемія, альбумінурія; р-ції гіперчутливості, включаючи анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до доксофіліну або до інших похідних ксантину; г. ІМ; артеріальна гіпотензія.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АЕРОФІЛІН®	Ей. Бі. Сі. ФАРМАСЬЮТИЦИ С.П.А., Італія	табл. у бл.	400 мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	

4.2. Глюкокортикостероїди

ГКС застосовуються як в якості базисної протизапальної терапії бронхообструктивних захворювань, так і в якості симптоматичного лікування при загостреннях (парентеральні ГКС). В лікуванні бронхообструктивних захворювань застосовуються місцево (ІКС) і системно (див. розділ «Ендокринологія. Лікарські засоби»). Перевагу мають інгаляційні форми завдяки високому терапевтичному індексу - ефективність/безпечність, показані як протизапальні контролюючі засоби у хворих персистоючою БА всіх ступенів тяжкості.

Інгаляційні глюкокортикостероїди

ІКС пригнічують запалення дихальних шляхів, знижують підвищену бронхіальну гіперреактивність, покращують легеневу функцію, упереджують, контролюють симптоми, зменшують частоту і тяжкість загострень, покращують якість життя хворих БА, знижують смертність при БА. ІКС показані для базисного лікування БА, якщо: потреба в β-адреностимуляторах короткої дії виникає частіше 2-х разів на тиждень; є нічні пробудження із-за БА частіше 1 разу на тиждень; за останні 2 роки було ≥ 2 загострень БА, що потребували введення системних ГКС або бронхолітиків ч/з небулайзер. Регулярне застосування ІКС зменшує ризик виникнення загострень.

При регулярному застосуванні для досягнення найкращого ефекту, симптоми БА звичайно стають менш вираженими до 3—7 дня лікування. Планове застосування ІКС на протязі місяця або дещо довше значно зменшує запалення дихальних шляхів (бронхіальна гіперреактивність знижується значно повільніше). При палінні (в даний час або в анамнезі) ефективність ІКС знижується (необхідно призначати більш високі дози).

Встановлені приблизно рівні по силі дії дози різних ІКС, що застосовуються за допомогою різних інгаляційних систем доставки. Легенева депозиція (ефективність, безпечність) ІКС залежать не тільки від хімічної речовини (спорідненості з ГК рецепторами, ліпофільності, кон'югації з протеїнами, тощо), але і від інгаляційної системи доставки. ІКС у безфреонових аерозольних інгаляторах (HFA), в яких діюча речовина знаходиться в формі р-ну (беклазон еко), майже вдвічі більш потужні, ніж ті, що містять суспензію. ІКС у вигляді сухого порошку також мають більш високу легеневу депозицію, ніж звичайні фреонвмісні дозовані інгалятори, а застосування препаратів у формі порошку із засобами доставки, що активуються вдихом, особливо зручно, якщо пацієнт не може використовувати аерозольні інгалятори (якщо є проблеми з координацією рухів, патологія суглобів, тощо).

ІКС призначають при персистоючій БА усіх ступенів тяжкості. При легкій БА призначають низькі добові дози ІКС (200-500 мкг беклометазону, 200-400 мкг будесоніду, 100-250 мкг флютиказону, 200-400 мкг мометазону фуurato), при середньої тяжкості БА - низькі дози ІКС в комбінації з інгаляційними β2-агоністами пролонгованої дії, як в окремих доставкових пристроях, так і в фіксованій комбінації, або середні (> 500-1000 мкг беклометазону, > 400-800 мкг будесоніду, > 250-500 мкг флютиказону, > 400-800 мкг мометазону фуurato) - високі (>1000 - 2000мкг беклометазону, >800 -1600 мкг будесоніду, >500 -1000 мкг флютиказону, >800 -1200 мкг мометазону фуurato) добові дози ІКС, при тяжкому перебігу - ІКС у середніх - високих добових дозах в комбінації з інгаляційними β2-агоністами пролонгованої дії, можливо в одній лікарській формі (дивись табл.1).

Високі дози ІКС призначають при недостатній ефективності стандартної інгаляційної терапії та тривале їх застосування рекомендується, якщо є достовірна перевага над більш низькими дозами. Не рекомендується перебільшувати рекомендовані високі дози. Якщо є потреба в призначенні ще більших доз, це треба робити під пильним наглядом спеціаліста. Застосування високих доз може мінімізувати потребу в оральних ГКС. Однак слід пам'ятати, що в цьому випадку можливе пригнічення функції кори надниркової залоз, збільшується ризик розвитку побічних проявів.

При тривалому застосуванні ІКС у високих дозах можливий розвиток глаукоми й катаракти. Враховуючи можливість побічних ефектів, ІКС потрібно застосовувати в мінімальних ефективних дозах.

Якщо симптоми БА контрольовані протягом 3 місяців, дозу ІКС поступово знижують: якщо БА контролюється середніми-високими дозами ІКС – 50 % зниження дози з 3-х місячним інтервалом (ступінь доказовості В), при

контролі БА на низьких дозах – перейти на однократне добове дозування (ступінь доказовості А), попередивши пацієнта, що при загостренні або зниженні ПОШвид потрібно повернутися до колишньої дози.

Інгаляцію ІКС, особливо великих доз, краще проводити з аерозольних інгаляторів з використанням спейсерів великого об'єму, що значно збільшує легеневу депозицію, зменшує орофарингеальну, чим зменшується кількість і вираженість побічних проявів (орофарингеального кандидозу, тощо).

Побічні прояви терапії ІКС: високі дози, при довготривалому застосуванні можуть викликати адренальну супресію, такі пацієнти потребують "прикриття стероїдами" в стресових ситуаціях (напр., оперативне втручання). У дітей високі дози можуть викликати адреналові кризи. Застосування надмірних доз треба уникати.

Застосування високих доз ІКС асоціюється із інфекціями НДШ, в тому числі і пневмонією, у хворих ХОЗЛ похилого віку.

При тривалому застосуванні високих доз ризик розвитку глаукоми, катаракти; осиплість голосу, орофарингеальний кандидоз. Вкрай рідко – висипання, ангіоедема, парадоксальний бронхоспазм, депресія, порушення сну, зміни поведінки (гіперактивність, роздратованість).

Ризик розвитку орофарингеального кандидозу можна зменшити застосовуючи спейсер, після кожної інгаляції рекомендовано полоскати ротову порожнину, при розвитку кандидозу – антифунгіальні засоби (див. розділ «Антимікробні та антигельмінтні засоби») на тлі продовження терапії ІКС.

ГК системної дії (орально) можуть призначатися при загостреннях БА коротким курсом, починаючи з високих доз (40 – 50 мг/добу) декілька днів. Пацієнти, в кого погіршення наступило швидко, зазвичай швидко відповідають на таку терапію. При легких загостреннях прийом СКС може бути різко припинений, але в кого контроль БА поза загостреннями був частковий, неповний, зменшення дози має бути поступовим.

ГК можуть застосовуватися в якості базисної контролюючої терапії у деяких хворих тяжкою БА, яка не контролюється іншими терапевтичними опціями, однак їх використання має бути обмеженим вважаючи на ризик розвитку значних побічних ефектів такої терапії.

З метою досягнення астма-контролю бажане використання мінімальних ефективних доз системних глюкокортикостероїдів, а при можливості рекомендується зменшити їх дозу чи цілком припинити їх прийом, перейшовши на високі дози інгаляційних глюкокортикостероїдів (2000 мкг/добу), комбінацію останніх і пролонгованої дії бронхолітиків.

Переключення пацієнта після тривалого лікування системними ГК на ІКС необхідно робити в період ремісії, поступово знижуючи дозу.

При ХОЗЛ при проведенні базисної терапії перевага віддається ІКС, а не ОКС. У пацієнтів III, IV стадій захворювання (тяжкий, дуже тяжкий перебіг) з постбронходилататорним ОФВ1 < 50 % належних та анамнезом частих загострень додатково до бронхолітиків призначається регулярне базисне лікування інгаляційними ГКС (беклометазон, будесонід, флутиказон, мометазон) в помірних та високих дозах.

Довготривале призначення ОКС в базисній терапії ХОЗЛ не рекомендується, зважаючи на відсутність наявної вигоди, небажані системні наслідки і побічну дію такої терапії (стероїдна міопатія, м'язева слабкість, зниження функціональних можливостей, легенева недостатність).

Однак, інгаляційні ГКС призначаються в довготривалій базисній терапії ХОЗЛ (у хворих III, IV стадій захворювання, при ОФВ1 < 50 % належних, частих (3 та більше за останні три роки) загостреннях). При цьому зменшується частота тяжких загострень, кількість госпіталізацій, покращується загальний стан здоров'я та якість життя хворих, знижується смертність обумовлена всіма причинами при ХОЗЛ.

4.2.1. Інгаляційні глюкокортикостероїди

- **Беклометазон (Beclometasone)** * ^[ПМД] (див. п. 16.2.1.1.5. розділу "ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: R03BA01 - препарати для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів, що застосовуються інгаляційно. Глюкокортикостероїди.

Основна фармакотерапевтична дія: попередник активної речовини зі слабкою спорідненістю з глюкокортикостероїдними рецепторами; гідролізується естеразами з утворенням беклометазону-17-монопропіонату, який має високу місцеву протизапальну активність.

Показання для застосування ЛЗ: астма тяжкого ступеня у дорослих, а також лікування хворих, які потребують застосування системних стероїдів для адекватного контролю симптомів БА.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лише для перорального інгаляційного застосування; для одержання оптимальних результатів застосувати регулярно; початкова доза має відповідати тяжкості захворювання; встановити найнижчу дозу, при якій забезпечується ефективний контроль астми; дорослі (у т.ч. хворі літнього віку) та діти віком від 12 років - 1000 мкг/добу, дозу можна збільшити до 2000 мкг/добу, після стабілізації стану пацієнта дозу можна зменшити; загальну ДД можна призначати у 2, 3 або 4 прийоми.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кандидоз ротової порожнини та глотки; реакції гіперчутливості, включаючи: шкірні висипання, кропив'янку, свербіж, еритему, агіоневротичний набряк; респіраторні симптоми (диспное та/або бронхоспазм з посиленням свистячого дихання, кашель) та анафілактоїдні/анафілактичні р-ції; с-м Кушинга, кушингоїдні ознаки, пригнічення ф-ції надниркових залоз (системний вплив), затримка росту у дітей та підлітків; катаракта, глаукома (системний вплив); хрипота та подразнення горла; парадоксальний бронхоспазм; зменшення мінеральної щільності кісток (системний вплив); відчуття неспокою, розлади сну, депресія, агресія, зміни поведінки, включаючи гіперактивність та збудженість (головним чином у дітей); порушення чіткості зору.

Противпоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого компонента препарату

Визначена добова доза (DDD): інгаляційно (аерозоль) - 0,8 мг.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.

II.	БЕКЛАЗОН-ЕКО	Нортон (Ватерфорд) Лімітед Т/А АЙВЕКС Фармасьютикалз Ірландія Т/А Тева Фармасьютикалз Ірландія, Ірландія	аер. д/інгал. по 200 доз у бал. з інгал. прист.	100мкг/дозу	№1	7,02	26,30/\$
	БЕКЛАЗОН-ЕКО	Нортон (Ватерфорд) Лімітед Т/А АЙВЕКС Фармасьютикалз Ірландія Т/А Тева Фармасьютикалз Ірландія, Ірландія	аер. д/інгал. по 200 доз у бал. з інгал. прист.	250 мкг/дозу	№1	3,56	26,30/\$
	БЕКЛОФОРТ™ ЕВОХАЛЕР™	Глаксо Веллком Продакшн, Франція	аер. д/інгал. по 200 доз у бал. з доз. клап.	250мкг/дозу	№1	2,66	26,59/\$
	ГЛЕНБЕКАР	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія	аер. д/інгал. по 200 доз у конт.	50мкг/дозу, 100мкг/дозу, 200мкг/дозу, 250мкг/дозу	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

● **Будесонід (Budesonide)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: R03BA02 - засоби, що застосовуються для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів. Глюкокортикоїди.

Основна фармакотерапевтична дія: ГК із сильною місцевою протизапальною дією; основне значення мають такі протизапальні ефекти, як пригнічене вивільнення медіаторів запалення та інгібування цитокін-опосередкованої імунної р-ції; протизапальна дія зумовлює зменшення бронхіальної обструкції як на ранньому, так і на пізньому етапі АР; будесонід знижує активність гістаміну та метахоліну в дихальних шляхах у гіперреактивних пацієнтів.

Показання для застосування ЛЗ: персистуюча БА^{БНФ, ПМД}, при якій показане лікування інгаляційними ГК; помірна або тяжка форма ХОЗЛ; суспензія для розпилення: БА у пацієнтів, для яких застосування інгаляторів з розпиленням лікарських речовин стиснутим повітрям або у вигляді лікарської форми сухого порошку є неефективним або недоцільним; немовлятам (віком від 6 міс.) і дітям, хворим на круп (ускладнення г. вірусної інфекції ВДШ, що також відома як вірусний ларинготрахеобронхіт або підзв'язковий ларингіт), що є показанням для госпіталізації.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: БА^{ПМД БНФ}: на початку інгаляційної терапії кортикостероїдами для лікування періодів загострення тяжкої астми або при зниженні дози, або при відміні р/ос кортикостероїдів дозування: діти 5-7 років: 100-400 мкг /добу, розподілені на 2-4 інгаляції, добу дозу можна застосовувати одноразово; діти від 7 років: 100-800 мкг/добу, розподілені на 2-4 інгаляції, при застосуванні добових доз до 400 мкг включно всю дозу можна застосовувати одноразово; дорослі: звичайні дози - 200-800 мкг/добу, розподілені на 2-4 інгаляції. У тяжких випадках можуть потребуватися добові дози до 1600 мкг включно. При застосуванні добових доз до 400 мкг включно всю дозу можна застосовувати одноразово^{БНФ}, підтримуюча доза має бути якомога нижчою. ХОЗЛ: рекомендована доза становить 400 мкг 2 р/добу, для пацієнтів, які мають позитивну відповідь на лікування протягом перших 3-6 міс. терапії, застосовувати протягом тривалого часу. Сусп.д/розп.: БА^{БНФ}: дорослі (в тому числі пацієнти літнього віку) та діти від 12 років: зазвичай 1-2 мг 2р/добу, у дуже тяжких випадках дозу можна в подальшому підвищити; діти від 6 міс. до 12 років: 0,5-1 мг 2р/добу. Підтримуюча доза повинна підбиратись індивідуально і дорівнювати найнижчій дозі, при якій у пацієнта відсутні симптоми захворювання; дорослі (в тому числі пацієнти літнього віку) і діти від 12 років: 0,5-1 мг 2 р/добу; діти від 6 міс. до 12 р.: 0,25-0,5 мг 2р/добу. Круп: звичайна доза - 2 мг розпиленого будесоніду. Цю дозу застосовують за один прийом або двічі по 1 мг з інтервалом 30 хв. Введення препарату можна повторювати кожні 12 год, усього максимум до 36 год або до клінічного покращення.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кандидозні інфекції ротової порожнини та горла, пневмонія (у пацієнтів з ХОЗЛ), р-ції підвищеної чутливості негайного та відстроченого типу, у тому числі висип, контактний дерматит, кропив'янка, ангіоневротичний набряк та анафілактична р-ція, ознаки та симптоми, що вказують на системний вплив з боку кортикостероїдів, включаючи пригнічення ф-ції надниркових залоз і уповільнення росту, глаукома, катаракта, неспокій, нервозність, депресія, занепокоєння, зміни у поведінці, порушення сну, тривожність, тремор, психомоторна гіперактивність, агресія (переважно у дітей), кашель, хрипота, подразнення у горлі, дисфонія, бронхоспазм, утворення синців, остеопороз (при довготривалому застосуванні), спазм м'язів.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до будесоніду або до будь-якого іншого компонента препарату.

Визначена добова доза (DDD): інгаляційно (порошок) - 0,8 мг., інгаляційно (аерозоль) - 0,8 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БЕНОДИЛ	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. (вир-во, пакування, контроль серії та випуск серії)/ Дженетик С.п.А. (вторинне пакування та випуск серії), Польща/Італія	сусп. д/розп. по 2 мл у поліет. конт.	0,25мг/1 мл	№5x4	29,48	26,67/\$
	БЕНОДИЛ	Фармацевтичний завод	сусп. д/розп.	0,5мг/1 мл	№5x4	17,26	26,67/\$

	"ПОЛЬФАРМА" С.А. (вир-во, пакування, контроль серії та випуск серії)/ Дженетик С.п.А. (вторинне пакування та випуск серії), Польща/Італія	по 2 мл у поліет. конт.				
БУДЕСОНІД ІЗІХЕЙЛЕР	Оріон Корпорейшн, Фінляндія	пор. д/інгал. по 200доз в інгал. у пак.	200мкг/доза	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
БУДЕСОНІД ІЗІХЕЙЛЕР	Оріон Корпорейшн, Фінляндія	пор. д/інгал. по 200доз з інгал. у пак. та захисн. конт. д/інгал.	200мкг/доза	№1	5,04	32,37/€
БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІ	ЛАБОРАТОРІО АЛЬДО-ЮНІОН, С.Л., Іспанія	інгал. під тиском, сусп. по 200 доз в бал. з адапт.	50мкг/доза	№1	16,78	26,22/\$
БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІ	ЛАБОРАТОРІО АЛЬДО-ЮНІОН, С.Л., Іспанія	інгал. під тиском, сусп. по 200 доз в бал. з адапт.	200мкг/доза	№1	6,03	26,22/\$
БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІ НЕБ	ГЕНЕТИК С.П.А., Італія	сусп. д/розп. по 2 мл в однодоз. конт.	0,25мг/мл	№5x4	39,43	29,87/€
БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІ НЕБ	ГЕНЕТИК С.П.А., Італія	сусп. д/розп. по 2 мл в однодоз. конт.	0,50мг/мл	№5x4	23,30	29,87/€
БУДІКСОН НЕБ	"Генетик" С.П.А. (вир-во та пакування, контроль якості)/АТ "Адамед Фарма" (вир-к відповідальний за випуск серії), Італія/Польща	сусп. д/розп. по 2 мл в конт.	0,125мг/мл, 0,25мг/мл, 0,5мг/мл	№5x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	
НОВОПУЛЬМОН Е НОВОЛАЙЗЕР®	МЕДА Фарма ГмбХ енд Ко. КГ (випуск серії)/ МЕДА Меньюфекчеринг ГмбХ (вир-во, пакування, контроль серії)/ Рош-Дельта ГмбХ (альтернативне місце втор. Пак.)/ МакДермот Лабораторі Т/А Майлан Дублін Респіреторі (альтернативне місце втор. пак., Німеччина/Ірландія)	пор. д/інгал. дозов., по 200 доз у карт. в конт. з інгал. або без	200 мкг/дозу	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПУЛЬМІКОРТ	АстраЗенека АБ, Швеція	сусп. д/розп. по 2 мл у конт. в конв.	0,25мг/мл	№5x4	48,00	27,20/\$
ПУЛЬМІКОРТ	АстраЗенека АБ, Швеція	сусп. д/розп. по 2 мл у конт. в конв.	0,5мг/мл	№5x4	22,61	27,20/\$
ПУЛЬМІКОРТ ТУРБУХАЛЕР	АстраЗенека АБ, Швеція	пор. д/інгал. по 200 доз в інгал. у кор.	100мкг/доза	№1	8,34	27,20/\$
ПУЛЬМІКОРТ ТУРБУХАЛЕР	АстраЗенека АБ, Швеція	пор. д/інгал. по 100 доз в інгал. у кор.	200мкг/доза	№1	8,34	27,20/\$

- **Флютиказон (Fluticasone)** ^[ПМД] (див. п. 9.1.2. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ", п. 16.2.1.1.5. розділу "ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: R03BA05 - протиастматичні засоби для інгаляційного застосування. Глюкокортикоїди.

Основна фармакотерапевтична дія: при інгаляційному введенні має виражену глюкокортикоїдну протизапальну дію на легені, що виявляється у зменшенні симптоматики, частоти нападів БА та інтенсивності ПР порівняно із системним застосуванням КС

Показання для застосування ЛЗ: БА^{БНФ, ПМД} - профілактичне лікування^{БНФ}, легкий перебіг БА (пацієнти, що потребують періодичного симптоматичного лікування бронходилататорами на регулярній основі); помірний перебіг БА (пацієнти, що потребують регулярного протиастматичного лікування, та пацієнти з нестабільною астмою або з погіршенням стану на фоні існуючої профілактичної терапії або терапії тільки бронходилататорами); тяжкий перебіг БА (пацієнти з тяжкою хр. астмою та пацієнти, залежні від системних КС для адекватного контролю симптомів); діти - профілактичне протиастматичне лікування, у тому числі у разі, коли не досягнуто контролю за симптомами БА на тлі вже проведеного лікування ін. протиастматичними препаратами

Спосіб застосування та дози ЛЗ: аерозоль - препарат призначений лише для інгаляційного застосування ч/з рот; початкова доза повинна відповідати ступеню тяжкості захворювання; дозування може бути підвищено до досягнення контролю або зменшено до мінімальної ефективної дози, яка дає змогу встановити ефективний контроль за захворюванням; дорослі та діти віком від 16 років: 100-1000 мкг 2 р/добу, по 2 інгаляції 2 р/добу; для пацієнтів з легкою астмою типова початкова доза - 100 мкг 2 р/добу; при помірній астмі середньої тяжкості та тяжкій персистуючій астмі початкова доза може становити від 250 до 500 мкг 2 р/добу; у разі потреби можна призначати дози більше 1000 мкг 2 р/добу; типова початкова доза для дітей віком від 4 років: 50-100 мкг 2 р/добу; у багатьох дітей астма добре контролюється при застосуванні доз по 50-100 мкг 2 р/добу; дітям, для яких ця доза є недостатньою, покращання може бути досягнуто шляхом збільшення дози до 200 мкг 2 р/добу; максимальна доза для дітей - 200 мкг 2 р/добу; дозування зменшити до мінімальної ефективної дози, яка дає змогу встановити ефективний контроль за захворюванням; небулі - препарат призначений лише для інгаляційного застосування; початкова доза повинна відповідати ступеню тяжкості захворювання; дозування може бути підвищено до досягнення контролю або зменшено до мінімальної ефективної дози, яка дає змогу встановити ефективний контроль за захворюванням; дорослі та діти віком від 16 років: 0,5-2 мг 2 р/добу; діти і підлітки віком 4-16 років: 1 мг 2 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кандидоз порожнини рота та глотки; езофагеальний кандидоз, пневмонія (у пацієнтів з ХОЗЛ), р-ції гіперчутливості - шкірні реакції гіперчутливості, ангіоневротичний набряк (головним чином обличчя та ротоглотки), респіраторні симптоми (задишка та/або бронхоспазм), анафілактична р-ція; порушення чіткості зору; с-м Кушинга, кушингоїдні ознаки, пригнічення надниркових залоз, затримка росту у дітей та підлітків, зменшення мінералізації кісток, катаракта, глаукома; відчуття неспокою, розлади сну, зміни поведінки, включаючи гіперактивність та збудженість (головним чином у дітей), захриплість голосу; парадоксальний бронхоспазм; гіперглікемія, диспепсія, артралгія, депресія, агресія (головним чином у дітей), синці, носові кровотечі.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): інгаляційно (аерозоль) - 0,6 мг., інгаляційно (суспензія) - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НЕБУФЛЮЗОН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	сусп. д/інгал. по 2 мл у конт. однодоз. в пак.	1,0мг/мл	№10	295,91	
II.	ФЛІКСОТИД™ ЕВОХАЛЕР™	Глаксо Веллком С.А./ГлаксоВеллком Продакшн, Іспанія/Франція	аероз. д/інгал., по 60, 120 доз у бал. з доз. клап.	50мкг/дозу, 125мкг/дозу	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФЛІКСОТИД™ НЕБУЛИ™	ГлаксоСмітКляйн Австралія Пту Лтд., Австралія	сусп. д/інгал. по 2 мл у небулі у пак.	0,5мг/2 мл, 2мг/2 мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФЛУТІКСОН	АТ "Адамед Фарма" (вир-к, що відповідає за первинне та вторинне пакування; вир-к, що відповідає за контроль та випуск серії)/АТ СМБ Текнолоджи (вир-к in bulk, контроль серії), Польща/Бельгія	пор. д/інгал., тверді капс. у бл. з інгал.	125мкг, 250мкг	№10x12	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФЛУТІКСОН	АТ "Адамед Фарма" (вир-к, що відповідає за первинне та вторинне пакування; вир-к, що відповідає за контроль та випуск серії)/АТ СМБ Текнолоджи (вир-к in bulk, контроль серії), Польща/Бельгія	пор. д/інгал., тверді капс. у бл. з інгал.	125мкг	№10x6	26,67	26,67/\$
	ФЛУТІКСОН	АТ "Адамед Фарма" (вир-к, що відповідає за первинне та вторинне пакування; вир-к, що відповідає за контроль та випуск серії)/АТ СМБ Текнолоджи (вир-к in bulk, контроль серії), Польща/Бельгія	пор. д/інгал., тверді капс. у бл. з інгал.	250мкг	№10x6	15,68	26,67/\$

	серії)/АТ СМБ Текнолоджи (вир-к in bulk, контроль серії), Польща/Бельгія					
--	--	--	--	--	--	--

- **Мометазон (Mometasone)** (див. п. 9.1.2. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ", п. 16.2.1.1.5. розділу "ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: R03BA07 - засоби, що застосовуються для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів інгаляційно. Глюкокортикостероїди.

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна терапія БА; має місцеву протизапальну дію; механізм протиалергічних та протизапальних ефектів полягає в його здатності знижувати вивільнення медіаторів запалення; суттєво інгібує вивільнення лейкотрієнів з лейкоцитів у пацієнтів, що страждають на алергію, інгібує синтез та вивільнення інтерлейкінів 1, 5, 6, а також фактора некрозу пухлини альфа (IL-1, IL-5, IL-6 та TNF α); він є також сильним інгібітором продукування LT (лейкотрієнів), а крім того - дуже сильним інгібітором продукування Th2-цитокінів, інтерлейкінів 4, 5 (IL-4, IL-5) CD4+ Т-клітинами людини; в дослідженнях in vitro продемонстрував спорідненість та здатність до зв'язування з рецепторами ГК людини в 12 разів більшу за дексаметазон, в 7 разів більшу за триамцинолон у ацетонід, в 5 разів більшу за будесонід та в 1,5 рази більшу за флутиказон; в дозах від 200 до 800 мкг/добу покращує ф-ції зовнішнього дихання за показниками пікової швидкості видиху та ОФВ1, знижує потребу в застосуванні інгаляційних β_2 -агоністів; покращання ф-ції дихання спостерігається вже ч/з 24 год після початку терапії, однак максимальний ефект досягається ч/з 1-2 тижні; при багаторазовому введенні - протягом 4 тижнів у дозах від 200 мкг 2 р/добу до 1200 мкг щодня не було виявлено ознак клінічно значущого пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи (НРА) при будь-якому рівні доз, а помітний рівень системної активності спостерігався лише при дозі 1600 мкг/добу; при використанні доз до 800 мкг/добу ознак пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи не виявлено.

Показання для застосування ЛЗ: систематичне лікування для контролю персистуючої БА^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: інгаляційно для систематичного лікування дорослих та дітей з 12 років; рекомендовані дози залежать від тяжкості захворювання; БА легкого та середнього ступеня тяжкості - рекомендована початкова доза 400 мкг 1 р/добу (інгаляцію проводить ввечері); у деяких пацієнтів, що раніше отримували високі інгаляційні дози ГК, більш ефективний контроль захворювання досягається, коли добова доза 400 мкг поділена на 2 інгаляції (по 200 мкг 2 р/добу)^{БНФ}; ефективна підтримуюча доза може бути знижена до 200 мкг 1 р/добу з прийомом увечері; доза має визначатися індивідуально і поступово знижуватися до найменшої дози, що забезпечує адекватний контроль перебігу БА; тяжка форма БА - початкова рекомендована доза 400 мкг 2 р/добу, що є максимальною рекомендованою дозою^{БНФ}, після досягнення ефективного контролю симптомів БА поступово знижувати дозу до мінімально ефективної.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кандидоз порожнини рота, фарингіт, дисфонія та головний біль; сухість у роті та горлі, диспепсія, збільшення маси тіла, прискорене серцебиття, інфекція ВДШ, дисменорея, біль у м'язах та кістках, біль у спині; поодинокі випадки глаукоми, підвищення ВТ, розвиток катаракти; реакції підвищеної чутливості (висипи, свербіж, ангіоневротичний набряк, анафілактична реакція); загострення БА, включаючи кашель, задишку, дихання зі свистом, бронхоспазм; психомоторна гіперактивність, розлади сну, страх, депресія, агресія, нечіткість зору.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини або до допоміжної речовини (лактоза безводна, що містить залишкову кількість молочних білків).

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АСМАНЕКС®	МСД Інтернешнл ГмБХ (філія Сінгапур) (виробник in bulk, первинне пакування)/Шерінг-Плау Лабо Н.В. (контроль якості, вторинне пакування, випуск серії), Сінгапур/Бельгія	пор. д/інгал., дозов., по 30, 60 доз в інгал. Твистхейлер®	200мкг/доз у, 400мкг/доз у	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

4.2.2. Системні глюкокортикостероїди

Глюкокортикостероїди оральних та парентеральних лікарських форм – див. п.7.4.1. розділу «ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»

4.2.3. Комбіновані лікарські засоби

Комбіновані препарати (ІКС+пролонгованої дії β_2 -агоністи) застосовуються при БА починаючи з III ступеня. Переваги таких комбінацій – компліментарна дія на молекулярному рівні, більш легке та глибоке проникнення в дихальні шляхи, контроль БА досягається на більш низьких дозах ІКС, впевненість в тому, що пролонгованої дії β_2 -агоністи не застосовуються в монотерапії, більш зручні в користуванні (один інгалятор, а не два, що значно підвищує комплаєнс).

- **Сальметерол + Флутиказон (Salmeterol + Fluticasone)** [ПМД]

Визначена добова доза (DDD): інгаляційно (порошок) - 2 дози, інгаляційно (аерозоль) - 4 дози

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АІРТЕК	Гленмарк	аер. д/інгал., по	25/50	№1	2,64	24,05/\$

	Фармасьютикалз Лтд., Індія	120 доз в конт. з доз. клап. та розпил.	мкг/дозу			
AIPTEK	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія	аер. д/інгал., по 120 доз в конт. з доз. клап. та розпил.	25/125 мкг/дозу	№1	3,52	24,05/\$
AIPTEK	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія	аер. д/інгал., по 120 доз в конт. з доз. клап. та розпил.	25/250 мкг/дозу	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
САЛМЕРІКС	ЦЕЛОН ФАРМА С.А. (випуск нерозфасованої продукції, первинна упаковка та дозвіл на випуск серії; вторинна упаковка та дозвіл на випуск серії), Польща	пор. д/інгал., по 60 доз у інгал.	50мкг/500мк г/дозу	№1	21,23	26,00/\$
САЛМЕРІКС	ЦЕЛОН ФАРМА С.А. (випуск нерозфасованої продукції, первинна упаковка та дозвіл на випуск серії; вторинна упаковка та дозвіл на випуск серії), Польща	пор. д/інгал., по 60 доз у інгал.	50мкг/250мк г/дозу	№1	15,25	26,00/\$
САЛМЕРІКС	ЦЕЛОН ФАРМА С.А. (випуск нерозфасованої продукції, первинна упаковка та дозвіл на випуск серії; вторинна упаковка та дозвіл на випуск серії), Польща	пор. д/інгал., по 60 доз у інгал.	50мкг/100мк г/дозу	№1	11,87	26,00/\$
СЕРЕТИД™ ДИСКУС™	Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед/Глаксо Веллком Продакшн, Велика Британія/Франція	пор. д/інгал., по 60 доз у дискусі	50 мкг/100 мкг/дозу, 50 мкг/250 мкг/дозу, 50 мкг/500 мкг/дозу	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™	Глаксо Веллком Продакшн, Франція	аер. д/інгал., по 120 доз у бал. з доз. клап.	25мкг/50 мкг/дозу, 25мкг/125 мкг/дозу, 25мкг/250 мкг/дозу	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
СЕРОФЛО-125	Ципла Лтд. (Юніт II), Індія	аер. д/інгал., по 120 доз у бал.	25 мкг/125 мкг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
СЕРОФЛО-250	Ципла Лтд. (Юніт II), Індія	аер. д/інгал., по 120 доз у бал.	25 мкг/250 мкг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
СЕРОФЛО-50	Ципла Лтд. (Юніт II), Індія	аер. д/інгал., по 120 доз у бал.	25 мкг/50 мкг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
СІРДУПЛА	ЗМ Хелс Кеа Лімітед, Велика Британія	інгал. під тиском, сусп., 120 доз в інгал.	25мкг/125 мкг/дозу, 25мкг/250 мкг/дозу	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

● **Будесонід + Формотерол (Budesonide + Formoterol)** * [ПМД]

Визначена добова доза (DDD): інгалаційно (порошок) - 80мкг/4,5мкг – 4 дози, 160мкг/4,5мкг – 4 дози, 320мкг/9мкг – 2 дози

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БУФОМІКС ІЗІХЕЙЛЕР	Оріон Корпорейшн, Фінляндія	пор. д/інгал., по 60, 120 доз в інгал. з захисн. конт. д/інгал. або без	160мкг/4,5м кг/доза	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БУФОМІКС	Оріон Корпорейшн,	пор. д/інгал., по	160мкг/4,5м	№1	13,76	32,37/€

ІЗІХЕЙЛЕР	Фінляндія	120доз в інгал. з захист. конт. д/інгал	кг/доза			
СИМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР	АстраЗенека АБ, Швеція	пор. д/інгал., доз., 60 доз в інгал. у кор.	80мкг/4,5мкг /доза	№1	27,39	26,79/\$
СИМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР	АстраЗенека АБ, Швеція	пор. д/інгал., доз., 60 доз в інгал. у кор.	160мкг/4,5м кг/доза	№1	35,79	26,30/\$
СИМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР	АстраЗенека АБ, Швеція	пор. д/інгал., доз., 60 доз в інгал. у кор.	320мкг/9,0м кг/доза	№1	36,37	27,05/\$
ФОРАКОРТ® 200	Медіспрей Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	аероз. д/інгал., доз., 120 доз в конт. з доз. клап.	200 мкг/6 мкг/дозу	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

4.3. Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів

4.3.1. Моноклональні антитіла

4.3.1.1. Моноклональні антитіла, що зв'язують імуноглобулін Е

- **Омалізумаб (Omalizumab)** ^(ГМД)

Фармакотерапевтична група: R03DX05 - засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів.

Основна фармакотерапевтична дія: є гуманізованим моноклональним а/т, що походить з рекомбінантної молекули ДНК, яке селективно зв'язується з імуноглобуліном Е людини (IgE); попереджає його зв'язування з FcεRI-рецептором, зменшуючи тим самим кількість вільного IgE, що здатний ініціювати каскад АР; лікування пацієнтів з atopічною БА призводить до суттєвого зниження кількості FcεRI - рецепторів на поверхні базофілів; рівні вільного IgE у сироватці знижуються пропорційно дозі вже ч/з год після першої ін'єкції і знаходяться на постійному рівні в період між введеннями послідовних доз.

Показання для застосування ЛЗ: тільки для пацієнтів із встановленою IgE-опосередкованою (алергічною) астмою; дорослі та діти віком від 12 років: як додаткова терапія для досягнення кращого контролю астми у пацієнтів із тяжкою персистою алергічною астмою ^{БНФ, ГМД}, у яких позитивний шкірний тест in vitro на реактивність до постійно присутнього в повітрі алергену, у яких ослаблена функція легень (ОФВ₁ (об'єм форсованого видиху) < 80 %), а також часті прояви симптомів удень або пробудження в нічний час, і які мають документальні підтвердження багаторазових тяжких загострень астми, незважаючи на застосування високих добових доз інгаляційних кортикостероїдів з додаванням інгаляційних β₂-агоністів тривалої дії; діти віком від 6 до 12 років: як додаткова терапія для досягнення кращого контролю астми у пацієнтів із тяжкою персистою алергічною астмою ^{ГМД}, у яких позитивний шкірний тест in vitro на реактивність до постійно присутнього в повітрі алергену, а також часті прояви симптомів удень або пробудження в нічний час, і які мають документальні підтвердження багаторазових тяжких загострень астми, незважаючи на застосування високих добових доз інгаляційних кортикостероїдів з додаванням інгаляційних β₂-агоністів тривалої дії; в дозуванні 150 мг: як додаткова терапія при хр. спонтанній кропив'янці ^{БНФ} у дорослих та підлітків (від 12 років) із неадекватною відповіддю на лікування Н1- антигістамінними препаратами.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: доза і частота введення визначається концентрацією IgE (МО/мл), що встановлюється перед початком лікування, та масою тіла пацієнта ^{БНФ}; до початку застосування для призначення дози у пацієнта потрібно визначити рівень IgE за допомогою кількісного аналізу загального IgE з використанням будь-якої промислової сироватки, залежно від показників рекомендована доза становить 75-600 мг, дозу можна поділити на 1-4 введення; менша ймовірність позитивного ефекту відзначалась у пацієнтів з рівнем IgE нижче 76 МО/мл; максимальна рекомендована доза - 600 мг омалізумабу кожні два тижні; хр. спонтанна кропив'янка - дозування 150 мг: рекомендована доза 300 мг у вигляді п/ш ін'єкцій кожні 4 тижні ^{БНФ}, періодично переоцінювати потребу у подальшому продовженні прийому препарату, дані стосовно довготривалого лікування понад 6 місяців за цим показанням обмежені.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: фарингіт, синусит, інфекції ВДШ, паразитарні інвазії, ідіопатична тромбоцитопенія, включаючи тяжкі випадки, анафілактична р-ція, інші серйозні алергічні стани, розвиток а/т до препарату, сироваткова хвороба, що може включати гарячку і лімфаденопатію, головний біль, синкопе, парестезія, сонливість, запаморочення, постуральна гіпотензія, припливи крові, алергічний бронхоспазм, кашель, набряк гортані, алергічний гранулематозний васкуліт (с-м Чарга-Стросс), біль у верхній частині живота, ознаки або симптоми диспепсії, діарея, нудота, фоточутливість, кропив'янка, висипання, свербіж, ангіоневротичний набряк, алопеція, артралгія, міалгія, набряклість суглобів, пірексія, р-ції в місці ін'єкції, (припухлість, еритема, біль, свербіж), грипоподібне захворювання, набряклість верхніх кінцівок, збільшення маси тіла, стомлюваність.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого іншого компонента ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 16 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	КСОЛАР	Новартіс Фарма Штейн АГ, Швейцарія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	75мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

КСОЛАР	Новартіс Фарма Штейн АГ, Швейцарія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	150мг	№1	1174,4 0	27,84/\$
--------	---------------------------------------	---------------------------------------	-------	----	-------------	----------

4.3.1.2. Перерахунок дози омалізумабу, визначення дози для дорослих і дітей від 6 років

ПЕРЕРАХУНОК ДОЗИ НА КІЛЬКІСТЬ ФЛАКОНІВ, КІЛЬКІСТЬ ІН'ЄКЦІЙ І ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ ІН'ЄКЦІЇ ОМАЛІЗУМАБУ НА КОЖНЕ ВВЕДЕННЯ

ТАБЛИЦЯ 1

ДОЗА (МГ)	КІЛЬКІСТЬ ФЛАКОНІВ		КІЛЬКІСТЬ ІН'ЄКЦІЙ	ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ ІН'ЄКЦІЇ (МЛ)
	75 МГ ^А	150 МГ ^В		
75	1 ^С	0	1	0,6
150	0	1	1	1,2
225	1 ^С	1	2	1,8
300	0	2	2	2,4
375	1 ^С	2	3	3,0
450	0	3	3	3,6
525	1 ^С	3	4	4,2
600	0	4	4	4,8

^А 0,6 мл = МАКСИМАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ, ЩО ВИЛУЧАЄТЬСЯ З ОДНОГО ФЛАКОНА (75 МГ ОМАЛІЗУМАБУ);

^В 1,2 мл = МАКСИМАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ, ЩО ВИЛУЧАЄТЬСЯ З ОДНОГО ФЛАКОНА (150 МГ ОМАЛІЗУМАБУ);

^С АБО ВИКОРИСТАННЯ 0,6 МЛ З ФЛАКОНА 150 МГ.

ВВЕДЕННЯ КОЖНІ 4 ТИЖНІ. ДОЗИ ОМАЛІЗУМАБУ (МГ НА ДОЗУ), ЯКІ ВВОДЯТЬ ШЛЯХОМ П/Ш ІН'ЄКЦІЇ КОЖНІ 4 ТИЖНІ

ТАБЛИЦЯ 2

ВИХІДНИЙ РІВЕНЬ ІGE (МО/МЛ)	МАСА ТІЛА (КГ)									
	>20-25	>25-30	>30-40	>40-50	>50-60	>60-70	>70-80	>80-90	>90-125	>125-150
≥30-100	75	75	75	150	150	150	150	150	300	300
>100-200	150	150	150	300	300	300	300	300	450	600
>200-300	150	150	225	300	300	450	450	450	600	
>300-400	225	225	300	450	450	600	600	600		
>400-500	225	300	450	450	600	600				
>500-600	300	300	450	600	600					
>600-700	300		450	600						
>700-800										
>800-900										
>900-1000										
>1000-1100										

ВВЕДЕННЯ КОЖНІ 2 ТИЖНІ,
ДИВ. ТАБЛИЦЮ 3

ВВЕДЕННЯ КОЖНІ 2 ТИЖНІ. ДОЗИ ОМАЛІЗУМАБУ (МГ НА ДОЗУ), ЯКІ ВВОДЯТЬ ШЛЯХОМ П/Ш ІН'ЄКЦІЇ КОЖНІ 2 ТИЖНІ

ТАБЛИЦЯ 3

ВИХІДНИЙ РІВЕНЬ ІGE (МО/МЛ)	МАСА ТІЛА (КГ)									
	>20-25	>25-30	>30-40	>40-50	>50-60	>60-70	>70-80	>80-90	>90-125	>125-150
≥ 30-100										
>100-200										
>200-300										375
>300-400									450	525
>400-500							375	375	525	600
>500-600						375	450	450	600	
>600-700		225			375	450	450	525		
>700-800	225	225	300	375	450	450	525	600		
>800-900	225	225	300	375	450	525	600			
>900-1000	225	300	375	450	525	600				
>1000-1100	225	300	375	450	600					
>1100-1200	300	300	450	525	600					
>1200-1300	300	375	450	525						
>1300-1500	300	375	525	600						

4.3.2. Інші засоби

- **Рофлуміласт (Roflumilast)**

Фармакотерапевтична група: R03DX07 - засоби, що застосовують при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів. Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів.

Основна фармакотерапевтична дія: інгібітор ФДЕ4, дія якого спрямована на лікування системних і легеневих запальних процесів, пов'язаних із ХОЗЛ, дія рофлуміласту спрямована на ФДЕ4А, 4В і 4D, тип рецепторів з аналогічним потенціалом у наномольному діапазоні, даний механізм дії і селективність також стосуються N-оксиду рофлуміласту, котрий є основним активним метаболітом рофлуміласту; інгібування ФДЕ4 призводить до збільшення в/клітинного рівня основного цАМФ і послаблення зв'язаної з ХОЗЛ дисфункції лейкоцитів, клітин гладких м'язів легеневих судин та дихальних шляхів, ендотеліальних і епітеліальних клітин дихальних шляхів, а також фібробластів

Показання для застосування ЛЗ: для підтримуючої терапії при хр. обструктивному захворюванні легень (ХОЗЛ) тяжкого ступеня^{БНФ} (ОФВ₁ після застосування бронходилататора менше 50 % від належного), що пов'язане з хр. бронхітом у дорослих^{БНФ} та частими загостреннями ХОЗЛ в анамнезі^{БНФ}; як додатковий засіб при бронходилатуючій терапії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза для дорослих 1 табл. (500 мкг) 1 р/добу^{БНФ}; р/ос, не розжовуючи, запиваючи водою, в один і той же час, незалежно від прийому їжі; для досягнення терапевтичного ефекту застосовувати протягом декількох тижнів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: діарея, зменшення маси тіла, зниження апетиту, нудота, біль у животі, головний біль; гіперчутливість, ангіоедема; гінекомастія; неспокій, підвищена збудливість, панічні атаки, депресія, суїцидальні думки та суїцидальна поведінка (в т.ч. самогубство), безсоння, тривожність, тремор, вертиго, запаморочення, дисгевзія; посилене серцебиття; інфекції дихальних шляхів (за винятком пневмонії); гастрит, блювання, ГЕРХ, диспепсія, кров'янисті випорожнення, запор, підвищення рівня γ-глутамілтрансферази та АСТ; висип, кропив'янка, м'язові спазми і слабкість, міалгія, біль у спині; підвищення рівня КФК в крові; нездужання, астенія, втомлюваність.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до рофлуміласту або інших компонентів препарату; печінкова недостатність помірного або важкого ступеня (ступінь В або С за шкалою Чайлда-П'ю).

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДАКСАС®	Такеда ГмбХ, Німеччина	табл. вкриті п/о у бл.	500 мкг	№10x3, №10x9	відсутня у реєстрі ОВЦ	

4.4. Стабілізатори мембран опасистих клітин та блокатори лейкотрієнових рецепторів

4.4.1. Стабілізатори мембран гладких клітин

Основним показанням до призначення стабілізаторів мембран гладких клітин (кромогліциєва кислота та її аналоги, кетотифен) є попередження бронхообструкції, яка розвивається при БА, при цьому неефективні для зняття загострення БА. Стабілізатори мембран гладких клітин застосовують для попередження симптомів БА, викликаних фізичним навантаженням; інгаляцію проводять за 30 хв до передбачуваного навантаження. Стабілізатори мембран гладких клітин добре поєднуються з іншими препаратами, при регулярних інгаляціях знижують частоту загострень БА, а також дозволяють зменшити дози бронходилататорів і системних ГК. Стабілізатори мембран гладких клітин більш ефективні у дітей старше 4 років, ніж у дорослих. На початку лікування препарати звичайно застосовують 3–4 р/добу, при досягненні оптимального терапевтичного ефекту можливий перехід на підтримуючу дозу, що підбирається індивідуально. Якщо інгаляція порошку препарату викликає бронхоспазм, рекомендується профілактично (за кілька хв) зробити інгаляцію β₂-агоніста. Профілактичний ефект розвивається поступово, напротязі 2–12 тижнів. Стабілізатори мембран гладких клітин перешкоджають відкриттю кальцієвих каналів та входу кальцію в гладких клітини. Вони пригнічують кальційзалежну дегрануляцію клітин і вихід із них гістаміна, фактора, що активує тромбоцити, лейкотрієни, в т.ч. повільно реагуючу субстанцію анафілаксії, лімфокіни та інші біологічно активні речовини, які індуюють запальні та АР. Стабілізація мембран гладких клітин обумовлена блокадою фосфодіестерази і накопиченням в них цАМФ. Важливим аспектом протиалергічного впливу стабілізаторів мембран гладких клітин являється підвищення чутливості адренорецепторів до катехоламінів. Окрім того, препарати блокують хлорні канали і попереджують, таким чином, деполяризацію парасимпатичних закінчень в бронхах. Вони перешкоджають клітинній інфільтрації слизової оболонки бронхів і гальмують розвиток реакції гіперчутливості уповільненої дії. Деякі з препаратів цієї групи (кетотифен та ін.) володіють здатністю блокувати H₁-рецептори (антигістамінна дія). Стабілізатори мембран гладких клітин усувають набряк слизової оболонки бронхів і попереджують (але не знімають) підвищення тону гладких м'язів.

- **Кетотифен (Ketotifen)** (див. п. 18.3.2. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: R06AX17 - антигістамінні препарати для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить мембраностабілізуючу, протиалергічну, протигістамінну дію; механізм дії зумовлений пригніченням вивільнення опасистими клітинами та базофілами гістаміну, лейкотрієнів, пригніченням сенсibiliзації еозинофільних гранулоцитів цитокінами, блокуючи їх міграцію у вогнища запалення; стримує розвиток гіперреактивності дихальних шляхів, зумовленої активацією тромбоцитів під впливом фактора активації тромбоцитів (ФАТ) або алергенів; інгібує фосфодіестеразу, підвищує рівень цАМФ у клітинах; зумовлює неконкурентну блокаду H₁-гістамінових рецепторів; ефективно попереджає бронхоспазм, зменшує потребу у застосуванні кортикостероїдів, бронходилататорів; бронхолітичної дії не чинить; терапевтичний ефект препарату розвивається повільно, протягом 1-2 місяців.

Показання для застосування ЛЗ: профілактичне лікування БА, особливо атопічної; симптоматичне лікування алергічних станів, включаючи алергічний риніт і кон'юнктивіт

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо, під час їжі, запиваючи водою, дорослим і дітям понад 3 роки по 1 табл. (1 мг) 2 р/день (вранці і ввечері); при необхідності добову дозу підвищують до 4 мг (по 2 мг 2 р/добу)^{БНФ}; сироп: дітям у віці від 6 міс. до 3 років - 0,25 мл (0,05 мг)/кг 2 р/добу (вранці та ввечері під час вживання їжі); дітям старшим 3 років - по 5 мл/1 мг (1 мірна л.) 2 р/добу (вранці та ввечері під час вживання їжі); лікування має тривати не менше 2-3 місяців; припиняти лікування слід поступово протягом 2-4 тижнів, у цей період може виникнути рецидив симптомів БА

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сонливість; сухість у роті, біль у шлунку, запор, нудота, блювання, диспептичні розлади; запаморочення, седативний ефект, судоми; симптоми стимуляції ЦНС - психомоторне збудження, дратівливість, безсоння, занепокоєння, неспокій, нервозність, дезорієнтація; збільшення маси тіла (зумовлене підвищенням апетиту); цистит; тяжкі шкірні реакції, мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, шкірні висипання; зростання рівня печінкових ферментів, гепатит, дизурія, тромбоцитопенія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до кетотифену чи ін. компонентів п-ту; одночасне застосування з р/ос протидіабетичними засобами.

4.4.2. Антагоністи лейкотрієнових рецепторів

Антагоністи лейкотрієнових рецепторів (монтелукаст, зафірлукаст) — новий клас протиастматичних препаратів, місце й роль яких остаточно не визначені. У дихальних шляхах вони блокують дію лейкотрієнів, зокрема попереджаючи надлишкове утворення секрету в бронхах, набряк слизової оболонки, послабляючи гіперреактивність бронхів і бронхоспазм. Монтелукаст приєднується до терапії хворих на БА легкого та середнього ступенів тяжкості при неадекватному їх лікуванні інгаляційними кортикостероїдами та β_2 -адренорецепторами короткої дії. Також, для попередження алерген-індукованого бронхоспазму. Зафірлукаст використовується також з профілактичною метою, може попереджувати розвиток БА.

При цьому антагоністи лейкотрієнових рецепторів неефективні для зняття приступів БА, не застосовуються при загостренні БА. Немає необхідності у зменшенні дози або у відміні кортикостероїдної терапії.

• **Монтелукаст (Montelukast)**^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: R03DC03 - засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів. Блокатори лейкотрієнових рецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: є активною сполукою, яка з високою вибірковістю і хімічною спорідненістю зв'язується з CysLT1-рецепторами, пригнічує бронхоспазм; спричиняє бронходилатацію протягом 2 год після р/ос застосування; пригнічує як на ранню, так і на пізню фази бронхоконстрикції, спричиненої антигенною стимуляцією; зменшує число еозинофілів у дихальних шляхах (за вимірами мокротиння), периферичної крові у дорослих пацієнтів та дітей, покращує клінічний контроль астми.

Показання для застосування ЛЗ: як додаткове лікування БА^{БНФ, ГМД} легкого й середнього ступеню тяжкості, що недостатньо контролюється інгаляційними ГКС і агоністами β -адренорецепторів короткої дії; полегшення симптомів сезонного та цілорічного алергічного риніту, профілактика астми, домінуючим компонентом якої є бронхоспазм^{БНФ}, індукований фізичним навантаженням.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл.: по 1 табл. 1 р/добу ввечері дорослим та дітям віком від 15 років^{БНФ} незалежно від прийому їжі; табл. жувальні: дітям від 2 до 5 років по 1 жувал. табл. 4 мг та дітям від 6 до 14 років по 1 жувал. табл. 5 мг 1 р/добу ввечері^{БНФ} за 1 год до або ч/з 2 год після прийому їжі.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, безсоння, пальпітація, астения/втома, нездужання, набряк, млявість, пірексія, інфекції ВДШ, легенева еозинофілія, носова кровотеча, артралгія, міалгія, м'язові судоми, абдомінальний біль, діарея, нудота, блювання, диспептичні явища, сухість у роті, спрага, реакції гіперчутливості (в т.ч. анафілаксія), висип, гематома, кровив'янка, свербіж, ангіоневротичний набряк, вузликова еритема, мультиформна еритема, тенденція до посилення кровоточивості, тромбоцитопенія, еозинофілія інфільтрація печінки, підвищення рівнів АЛТ, АСТ, гепатит (включаючи холестатичне, гепатоцелюлярне та змішане ураження печінки), с-м Чарга-Стросса, порушення сну, нічні кошмари, сомнамбулізм, тривожність, ажитація, включаючи агресивну поведінку або ворожість, депресія, психомоторна гіперактивність (включаючи дратівливість, неспокій, тремор), порушення уваги, погіршення пам'яті, тік, галюцинації, дезорієнтація, суїцидальні думки та поведінка (суїцидальність), obsесивно-компульсивні розлади, дисфемія, запаморочення, парестезія/гіпестезія, енурез у дітей.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість; табл. 10 мг - дитячий вік до 15 років; табл. жувальні - дитячий вік до 2 років (4 мг), до 6 років (5 мг).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 10 мг., перорально - дитяча добова доза не визначена, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МОНТЕЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (фасування із форми "in bulk" виробів Саніко Н.В., Бельгія; Сінтон Хіспанія С.Л., Іспанія), Україна	табл. вкриті п/о у бл.	10мг	№7x2		відсутня у реєстрі ОВЦ
	МОНТЕЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (фасування із форми "in bulk" виробів Саніко Н.В., Бельгія; Сінтон	табл. вкриті п/о у бл.	10мг	№7x4	6,65	

	Хіспанія С.Л., Іспанія), Україна						
МОНТЕЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (фасування із форми "in bulk" виробів Саніко Н.В., Бельгія; Сінтон Хіспанія С.Л., Іспанія), Україна	табл. жув. у бл.	4мг, 5мг	№7x2	відсутня у реєстрі ОВЦ		
МОНТЕЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (фасування із форми "in bulk" виробів Саніко Н.В., Бельгія; Сінтон Хіспанія С.Л., Іспанія), Україна	табл. жув. у бл.	5мг	№7x4	150,41		
МОНТЕЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (фасування із форми "in bulk" виробів Саніко Н.В., Бельгія; Сінтон Хіспанія С.Л., Іспанія), Україна	табл. жув. у бл.	4мг	№7x4	157,30		
II. АСТАТОР 10	ТОРРЕНТ ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛТД., Індія	табл. у бл.	10 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ		
АСТАТОР 4	ТОРРЕНТ ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛТД., Індія	табл. жув. у бл.	4 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ		
АСТАТОР 5	ТОРРЕНТ ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛТД., Індія	табл. жув. у бл.	5 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ГЛЕМОНТ	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія	табл. вкриті п/о у бл. та конт.	10 мг	№10x3, №30	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ГЛЕМОНТ ТАБЛЕТКИ ЖУВАЛЬНІ	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія	табл. жувал. у бл. та конт.	4мг, 5мг	№10x3, №30	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ЕМКАСТ 10	МСН Лабораторіс Прайвіт Лімітед, Індія	табл. вкриті п/о у бл.	10 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ЕМКАСТ 5	МСН Лабораторіс Прайвіт Лімітед, Індія	табл. жув. у бл.	5 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ		
КЛАСТ	НОБЕЛ ІПАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл. в/о у бл.	10мг	№14x6	відсутня у реєстрі ОВЦ		
КЛАСТ	НОБЕЛ ІПАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл. в/о у бл.	10мг	№14x2	7,00	26,72/\$	
ЛУКАСТ®	Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія	табл. вкриті п/о у бл.	10 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ЛУКАСТ®	Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія	табл. жув. у бл.	4мг, 5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ		
МІЛУКАНТ	АТ "Адамед Фарма" (вир-к "in bulk", первинна та вторинна упаковка, контроль якості та дозвіл на випуск серії), Польща	табл. жув. у бл.	4мг	№7x4	160,00	26,67/\$	
МІЛУКАНТ	АТ "Адамед Фарма" (вир-к "in bulk", первинна та вторинна упаковка, контроль якості та дозвіл на випуск серії), Польща	табл. жув. у бл.	5мг	№7x4	160,00	26,67/\$	
МІЛУКАНТ	АТ "Адамед Фарма" (вир-к "in bulk", первинна та вторинна упаковка, контроль якості та дозвіл на випуск серії), Польща	табл. вкриті п/о у бл.	10мг	№7x4	7,05	26,67/\$	
М-КАСТ	Ауробіндо Фарма Лімітед - Юніт VII, Індія	табл. жув. у бл.	4мг, 5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ		
МОНКАСТА®	КРКА, д.д., Ново место/КРКА Польща Сп.з.о.о. (вир-во «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії та	табл. вкриті п/о у бл.	10 мг	№7x2, №7x4, №7x8	відсутня у реєстрі ОВЦ		

	випуск серії), Словенія/Польща					
МОНКАСТА®	КРКА, д.д., Ново место/КРКА Польща Сп.з.о.о. (вир-во «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії), Словенія/Польща	табл. жув. у бл.	4мг, 5мг	№7x2, №7x4, №7x8	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МОНТЕГЕН	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл. вкриті п/о у бл.	10 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА	ТОВ Тева Оперейшнз Поланд, Польща	табл. жув. у бл.	4мг, 5мг	№7x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА	ТОВ Тева Оперейшнз Поланд, Польща	табл. вкриті п/о у бл.	10 мг	№7x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МОНТЕМАК 10	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл. вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	5,41	26,99/\$
МОНТЕМАК 4	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл. жув. у бл.	4 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МОНТЕМАК 5	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл. жув. у бл.	5 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МОНТИД	Ципла Лтд. (Юніт IV), Індія	табл. жув. у бл.	4мг, 5мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МОНТИД	Ципла Лтд. (Юніт IV), Індія	табл. вкриті п/о у бл.	10 мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МОНТУЛАР®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл. вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	6,67	23,98/\$
МОРАЛ 10	МСН Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	табл. вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	5,12	25,58/\$
МОРАЛ 4	МСН Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	табл. жув. у бл.	4мг	№10x3	71,60	25,58/\$
МОРАЛ 5	МСН Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	таб. жув.убл	5мг	№10x3	76,72	25,58/\$
СИНГЛОН®	ВАТ "Гедеон Ріхтер"(випуск серії)/ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща" (контроль якості, дозвіл на випуск серії, вир-во нерозфасованого продукту, первинна упаковка, вторинна упаковка), Угорщина/Польща	табл. вкриті п/о у бл.	10 мг	№7x2, №7x4, №7x8	відсутня у реєстрі ОВЦ	
СИНГЛОН®	ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща" (контроль якості, дозвіл на випуск серії, вир-во нерозфасованого продукту, первинна упаковка, вторинна упаковка)/ВАТ "Гедеон Ріхтер" (випуск серії), Польща/Угорщина	табл. жув. у бл.	4мг, 5мг	№7x2, №7x4, №7x8	відсутня у реєстрі ОВЦ	
СИНГУЛЯР®	Мерк Шарп і Доум Лімітед (вир-во за повним циклом)/Мерк Шарп і Доум Б.В. (первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії), Велика Британія/Нідерланди	табл. жув. у бл.	4мг, 5 мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
СИНГУЛЯР®	Мерк Шарп і Доум Б.В. (первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії)/Мерк Шарп і Доум Лімітед (вир-во за повним циклом), Нідерланди/ Велика Британія	табл. вкриті п/о у бл.	10мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	

4.5. Стимулятори дихання

Мають обмежене застосування при ДН у хворих ХОЗЛ. Вони ефективні тільки при в/в введенні і мають короточасну дію. Стимулятори дихання застосовують обмежено, при наявності протипоказань до ШВЛ або неможливості її проведення. При важкій ДН препарати можуть і погіршити стан хворого. Вони мають вузький спектр терапевтичного застосування, їх слід застосовувати тільки під спостереженням лікаря в стаціонарі.

4.5.1. Дихальні аналептики

Аналептики – речовини, які стимулюють активність дихального і судинорухового центрів, відновлюють функцію ЦНС.

Аналептики діють майже на всіх рівнях ЦНС. Але кожний окремий препарат характеризується більш вираженою тропністю відносно окремих відділів ЦНС. Так, наприклад, одні препарати впливають переважно на центри довгастого мозку (бемегрид, кордіамін, коразол), інші – на спинний мозок (стрихнін).

Збільшення дози аналептиків приводить до генералізації процесів збудження, які супроводжуються підсиленням рефлекторної збудливості. У великих дозах аналептики викликають судом. Судоми, які пов'язані із збудженням переважно стовбурової частини головного мозку, носять клонічний характер (бемегрид, коразол, нікетамід), а при дії на спинний мозок розвиваються судоми тетанічного характеру (стрихнін).

Класифікація аналептиків:

1. Аналептики, які діють переважно на центри довгастого мозку - камфора, нікетамід, сульфокамфокаїн, бемегрид – аналептики прямої дії.
2. Аналептики, які діють ч/з синокаротидні зони, збуджуючи їх – дихальні аналептики - цитітон, лобеліну гідрохлорид – аналептики рефлекторної дії.
3. Аналептики, які діють переважно на спинний мозок - стрихнін.
4. Аналептики, які діють на стовбурову частину і кору головного мозку - етимізол.

На даний час в Україні зареєстрований і використовується нікетамід та сульфокамфокаїн – аналептики прямої дії.

- **Нікетамід (Nikethamide)**

Фармакотерапевтична група: R07AB02 - дихальні аналептики. Нікетамід.

Основна фармакотерапевтична дія: аналептик змішаного типу дії, механізм дії якого складається з двох компонентів: центрального і периферичного - центральний пов'язаний з безпосереднім впливом на судиноруховий центр довгастого мозку, що призводить до його збудження та опосередкованого підвищення системного АТ (особливо при первинному пригніченні рухового центру); периферичний компонент пов'язаний із збудженням хеморецепторів каротидного синусу, що приводить до збільшення частоти та глибини дихальних рухів; не виявляє прямого стимулюючого впливу на серце та судинозвужувального ефекту.

Показання для застосування ЛЗ: колапс, асфіксія (в тому числі новонароджених), шоківі стани при оперативних втручаннях та у післяопераційний період, г. і хр. порушення кровообігу, зниження тону судин і пригнічення дихання при інфекційних захворюваннях та у період одужання, отруєння снодійними і анагетичними засобами (у складі комплексної терапії).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають п/ш, в/м, в/в (повільно); для в/в введення разову дозу розводять у 10 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду; вводять за 1-3 хв; дорослим і дітям віком від 14 років призначають по 1-2 мл 1-3 р/добу; вищі дози для дорослих п/ш: разова - 2 мл, добова - 6 мл; вища разова доза п/ш і в/в при отруєннях для дорослих - 5 мл; дітям призначають п/ш, залежно від віку, такі разові дози: до 1 року - 0,1 мл; від 1 до 4 років - 0,15 - 0,25 мл; 5-6 років - 0,3 мл; 7-9 років - 0,5 мл; 10-14 років - 0,75 мл; вводити 1-3 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: неспокій, підвищена дратівливість, тривожність, м'язові посмикування, які починаються з кругових м'язів рота, тремор, ригідність м'язів; пастозність або почервоніння обличчя, свербіж та/або лущення шкіри, реакції гіперчутливості, в т.ч. кропив'янка, ангіоневротичний набряк, генералізовані папульозні висипання; нудота, блювання; аритмії, АГ, тахікардія; гіпертермія, підвищена пітливість; інфільтрація, болючість, гіперемія, відчуття печіння шкіри, свербіж у місці введення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена індивідуальна чутливість до препарату; схильність до судом, епілепсія; епілептичні напади в анамнезі, порфірія, гіпертермія у дітей; вагітність, період лактації.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,5 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КОРДІАМІН®-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у кор.	250мг/мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КОРДІАМІН®-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у конт. чар/уп.	250мг/мл	№5x2	5,62	
	КОРДІАМІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 2 мл в амп. у бл. чи кор.	250мг/мл	№5x2, №10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КОРДІАМІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 2 мл в амп. у бл. чи кор.	250мг/мл	№10	7,39	

4.6. Муколітичні засоби

Мукоактивні засоби впливають на бронхіальну секрецію і широко використовуються для покращання відходження мокрот шляхом зменшення її в'язкості. Для захворювань органів дихання з порушенням секреції притаманне зниження вмісту кислих гідрофільних сіаломуцинів - зменшення водного компоненту, і підвищення вмісту нейтральних гідрофобних факомуцинів, що відштовхують воду. Секрет стає в'язким та густим. В інших випадках, бактеріальні ферменти і лізосомальні протеази вторинно змінюють склад сіаломуцинів, внаслідок чого вони втрачають здатність формувати волокнисті структури. Секрет стає рідким і може стікати по бронхіальній стінці внаслідок втрати еластичності. Тому вибір мукоактивної терапії залежить від клінічної ситуації. При сухому кашлі показані препарати, що стимулюють секрецію, при непродуктивному вологому кашлі – препарати, що розріджують мокротиння, при продуктивному вологому кашлі – мукорегулятори.

Муколітичні засоби розділяються:

- Муколітичні засоби прямої дії, або власне муколітики
 - Неферментні муколітики

- Ферментні муколітики
- Муколітики непрямої дії
 - Секретолітики
 - Мукорегулятори
 - Стимулятори сурфактанту
- Легеневі сурфактанти
- Експекторанти
 - Рефлекторної дії
 - Мукокінетики
 - Мукогідратанти
 - Стимулятори бронхіальних залоз
- Комбіновані препарати та інші

4.6.1. Муколітичні засоби прямої дії, або власне муколітики

4.6.1.1. Неферментні муколітики

Похідні цистеїну з вільною тіоловою групою (ацетилцистеїн). Механізм дії – розрив дисульфідних зв'язків мукополісахаридів мокротиння, стимуляція функції слизосекретуючих клітин, збільшення синтезу глутатіону, що обумовлює детоксикаційні та антиоксидантні властивості. Препарати мають відхаркуючу, секретомоторну, муколітичну, протикашльову дію, стимулюють синтез сурфактанту. Дія тіолітиків не залежить від вихідного стану секрету, тому вони можуть зробити секрет надмірно рідким. Протипоказані при рідкому мокротинні, "вологих легенях". Треба обережно використовувати ці засоби у пацієнтів з тяжкою бронхіальною обструкцією та нейро-м'язевою патологією.

- **Ацетилцистеїн (Acetylcysteine)** * [ПМД] [окрім табл., пор. д/орал. р-ну, табл. шип., р-ну орал., гран. д/орал. р-ну]

Фармакотерапевтична група: R05CB01 - муколітичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить муколітичну дію; розриває дисульфідні зв'язки кислих мукополісахаридів мокротиння, що призводить до деполяризації мукопротеїдів і зменшення в'язкості слизу; знижує індуковану гіперплазію мукоцитів, підвищує вироблення сурфактанта за рахунок стимуляції пневмоцитів типу II, стимулює активність мукоциліарного апарату, що сприяє поліпшенню мукоциліарного кліренсу; зберігає активність і при наявності гнійного секрету (слизу); має антиоксидантні властивості, обумовлені наявністю вільної тіолової (-SH) нуклеофільної групи, яка легко взаємодіє з електрофільними групами окисних радикалів і в результаті нейтралізує їх.

Показання для застосування ЛЗ: лікування г. та хр. захворювань бронхолегеневої системи^{ПМД}, що супроводжуються підвищеним утворенням мокротиння; передозування парацетамолом^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл./табл. шипучі: дорослі та діти старше 12 років: 600 мг розчиняють у 1/3 склянки води та приймають 1 р/добу^{БНФ}; при розчиненні користуватися скляним посудом, уникати контакту з металевими та гумовими поверхнями; не вводити у цей р-н інші препарати; гранули: дорослим та дітям від 12 років по 400-600 мг/добу^{БНФ} (10-15 мл/добу), розподілені на 1-3 прийоми залежно від клінічних умов; дітям залежно від віку: 2-6 років по 200-400 мг/добу, розподілені на 1-3 прийоми; 6-12 років: 400-600 мг/добу розподілені на 1-3 прийоми; гранули розчиняють в 1/3 склянки води; передозування парацетамолом - 140 мг/кг у перші 10 годин після прийому токсичної р-ни, далі з розрахунку 70 мг/кг кожні 4 години 1-3 дні, р-н прийняти без зволікання відразу ж після приготування; р-н д/ін'єкцій: шляхом інгаляційного введення дорослим по 1 амп. 1-2 р/добу за призначенням лікаря протягом 5-10 днів, дітям від 6 років - до 1 амп. 1-2 р/добу за призначенням лікаря протягом 5-10 днів; ендобронхіальне введення: дорослим та дітям від 6 років - до 1 амп. 1-2 р/добу; в/м введення дорослим - по 1 амп. 300 мг 1-2 р/добу вводити глибоко в/м; в/в дорослим по 1 амп. 300 мг 1-2 р/добу вводити повільно краплинно у 0,9 % р-ні натрію хлориду або 5 % р-ні глюкози; тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально, залежно від характеру захворювання.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота, блювання, діарея, диспепсія, печія, абдомінальний біль, стоматити, неприємний запах з рота; висипання, кропив'янка, свербіж, почервоніння, екзема, р-ції гіперчутливості, анафілактичні/анафілактоїдні р-ції, анафілактичний шок, набряк Квінке, гіпертермія, набряк обличчя; бронхоспазм, диспноє; бронхіальна обструкція, ринорея, дзвін у вухах, головний біль; тахікардія, зниження АТ; геморагії, анемія; с-м Стівенса-Джонсона, с-м Лайелла, випадки зниження агрегації тромбоцитів, подовження протромбінового часу.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до ацетилцистеїну або до будь-якої з допоміжних речовин, виразкова хвороба шлунка і ДПК в стадії загострення; кровохаркання, легенева кровотеча; захворювання печінки, нирок, надниркових залоз.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,5 г., парентерально - не визначена, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АСТРАЦЕ	ТОВ "Астрафарм", Україна	пор. д/орал. р-ну по 3 г у саше	200мг	№10	13,75	
	АЦЕТАЛ	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії вир-ва, контроль якості), Україна/ Україна	табл. у бл.	200мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

АЦЕТАЛ	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії вир-ва, контроль якості), Україна/ Україна	табл. у бл.	200мг	№10x2	5,52	
АЦЕТАЛ	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	600мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АЦЕТАЛ	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	600мг	№10x1	6,40	
АЦЕТАЛ С	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	пор. д/орал. р-ну у пак., спар. пак.	100мг/3 г, 200мг/3 г, 600мг/3 г	№2x5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АЦЕТАЛ С	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	пор. д/орал. р-ну у пак., спар. пак.	100мг/3 г	№10	29,36	
АЦЕТАЛ С	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	пор. д/орал. р-ну у пак., спар. пак.	200мг/3 г	№10	15,87	
АЦЕТАЛ С	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	пор. д/орал. р-ну у пак., спар. пак.	600мг/3 г	№10	6,40	
АЦЕТАЛ СОЛЮБЛ	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. шипучі у стрипі	200мг, 600мг	№2x5, №2x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АЦЕТИЛЦИСТЕЇ Н	ТОВ "Фармацевтична фірма "Вертекс" (вир-во з продукції in bulk вир-ка ТОВ компанія "Здоров'я", Україна), Україна	табл. у бл.	200мг, 600мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АЦЕТИЛЦИСТЕЇ Н-АСТРАФАРМ	ТОВ "Астрафарм", Україна	пор. д/орал. р-ну по 3 г у саше	200мг	№10	10,00	
АЦ-ФС	ТОВ "Фарма Старт", Україна	таб. вкриті п/о у бл.	200 мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ІНГАМІСТ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єкц. в амп. по 3 мл в конт. чар. уп.	100мг/мл	№5x2	134,69	
РАПІРА® 100	ПАТ "Фармак", Україна	пор. д/орал. р-ну по 0,5 г у саше	100мг	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РАПІРА® 100	ПАТ "Фармак", Україна	пор. д/орал. р-ну по 0,5 г у саше	100мг	№20	20,50	
РАПІРА® 200	ПАТ "Фармак", Україна	пор. д/орал. р-ну по 1 г у саше	200мг	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РАПІРА® 200	ПАТ "Фармак", Україна	пор. д/орал. р-ну по 1 г у саше	200мг	№20	10,88	
РАПІРА® 600	ПАТ "Фармак", Україна	пор. д/орал. р-ну по 3 г у саше	600мг	№6	відсутня у реєстрі ОВЦ	

	РАПІРА® 600	ПАТ "Фармак", Україна	пор. д/орал. р- ну по 3 г у саше	600мг	№10	7,92	
II.	АСИБРОКС	ФармаЕстіка Мануфактурінг (ФармаЕстіка Мануфактурінг ТОВ), Естонія	табл. шип. у пеналі та стрип.	200мг, 600мг	№24, №2x5, №2x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АСИБРОКС	ФармаЕстіка Мануфактурінг, Естонія	табл. шип. у пеналі та стрип.	200мг	№24	11,49	26,95/\$
	АСИБРОКС	ФармаЕстіка Мануфактурінг, Естонія	табл. шип. у пеналі та стрип.	600мг	№12	8,87	26,95/\$
	АЦЕСТАД	СТАДА Арцнайміттель АГ (випуск серій)/ Меркле ГмбХ (вир-во нерозфас. п-ту, перв. та втор. пакування, контр. серій), Німеччина	табл. шип. у тубі	200мг, 600мг	№10, №20, №25x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АЦЕЦЕКС®	ТОВ "Фармтехнологія", Республіка Білорусь	пор. д/орал. р- ну по 3 г у пак.	100мг, 200мг	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АЦЦ®	Фарма Вернігероде ГмбХ (вир-во "bulk", первинне та вторинне пакування, тестування)/ Салютас Фарма ГмбХ (випуск серії), Німеччина /Німеччина	р-н орал. по 100 мл, 200 мл у фл. з мірн. ковп. та/або мірн. шпр.	20 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АЦЦ® 100	Салютас Фарма ГмбХ (тестування, пакування, випуск серії)/Ліндофарм ГмбХ (вир-во in bulk, тестування, пакування)/ Замбон Свіццерланд Лтд (вир-во in bulk, тестування, пакування), Німеччина/Німеччина/ Швейцарія	пор. д/орал. р- ну по 3 г у пак.	100 мг	№20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АЦЦ® 100	Салютас Фарма ГмбХ (випуск серії)/Хермес Фарма Гес.м.б.Х. (вир-к in bulk, пакування)/Хермес Арцнайміттель ГмбХ (альтернативний вир-к in bulk, пакування), Німеччина/ Австрія/Німеччина	табл. шипучі у тубі	100 мг	№20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АЦЦ® 200	Салютас Фарма ГмбХ (тестування, пакування, випуск серії)/Ліндофарм ГмбХ (вир-во in bulk, тестування, пакування)/ Замбон Свіццерланд Лтд (вир-во in bulk, тестування, пакування), Німеччина/Німеччина/ Швейцарія	пор. д/орал. р- ну по 3 г у пак.	200 мг	№20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АЦЦ® 200	Салютас Фарма ГмбХ (випуск серії) /Хермес Фарма Гес.м.б.Х. (вир-к in bulk, пакування)/ Хермес Арцнайміттель ГмбХ(альтернативний вир-к in bulk, пакування), Німеччина/Австрія/Німеччина	табл. шипучі у тубі чи саше	200 мг	№20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АЦЦ® АКТИВ	ХЕРМЕС Фарма Гес.м.б.Х. (вир-во "in bulk", первинне та вторинне пакування, тестування) / Салютас Фарма ГмбХ (відповідальний за випуск серії), Австрія/Німеччина	порош. орал. у саше	600 мг	№10, №20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АЦЦ® ГАРЯЧИЙ НАПІЙ МЕД ЛИМОН	Салютас Фарма ГмбХ (випуск серії)/Ліндофарм ГмбХ (вир-к in bulk, тестування, пакування)/ Замбон Свіцзеланд Лтд (вир-к in bulk, тестування, пакування), Німеччина/Німеччина/ Швейцарія	пор. д/орал. р- ну по 3 г в пак.	200мг, 600мг	№6, №20	відсутня у реєстрі ОВЦ	

АЦЦ® ЛОНГ	Салютас Фарма ГмбХ/ Хермес Арцнайміттель ГмбХ, Німеччина	табл. шипучі у тубі	600 мг	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АЦЦ® ЛОНГ ЛИМОН	Салютас Фарма ГмбХ (випуск серії)/Хермес Арцнайміттель ГмбХ (вир-во in bulk, пакування, тестування), Німеччина	табл. шипучі у саше	600 мг	№6, №10, №20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ДВАЦЕ 200	Е-Фарма Тренто С.п.А., Італія	табл. шипучі у тубі	200 мг	№20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ДВАЦЕ ЛОНГ	Е-Фарма Тренто С.п.А., Італія	табл. шипучі у тубі	600 мг	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЕВКАБАЛ® 200 САШЕ	Ліндофарм ГмбХ, Німеччина	пор. д/орал. р-ну по 3 г у саше	200мг	№50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЕВКАБАЛ® 200 САШЕ	Ліндофарм ГмбХ, Німеччина	пор. д/орал. р-ну по 3 г у саше	200мг	№20	28,75	29,56/€
ЕВКАБАЛ® 600 САШЕ	Ліндофарм ГмбХ, Німеччина	пор. д/орал. р-ну по 3 г у саше	600мг	№50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЕВКАБАЛ® 600 САШЕ	Ліндофарм ГмбХ, Німеччина	пор. д/орал. р-ну по 3 г у саше	600мг	№10	16,67	29,56/€
ЕВКАБАЛ® 600 САШЕ	Ліндофарм ГмбХ, Німеччина	пор. д/орал. р-ну по 3 г у саше	600мг	№20	16,67	29,56/€
МУЛЬТИГРИП БРОНХО	Білім Ілач Сан. ве Тід. А.Ш., Туреччина	пор. д/орал. р-ну по 3 г у саше	600 мг	№2, №10, №20, №30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
САНОРИН-БРОНХО	Санека Фармасьютікалз АТ, Словацька Республіка	табл. шипучі у тубі	200мг, 600мг	№6, №10, №20, №30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ФЛУІМУЦИЛ	Замбон Свіццерланд Лтд., Швейцарія	табл. шипучі у бл.	600 мг	№2x5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ФЛУІМУЦИЛ	Замбон Свіццерланд Лтд., Швейцарія	гран. д/орал. р-ну по 1 г у пак.	200 мг	№20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ФЛУІМУЦИЛ	Замбон С.П.А., Італія	р-н д/ін'ек. по 3 мл в амп. у піддоні	100 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОВЦ	

4.6.1.2. Ферментні муколітики

Протеолітичні ферменти наразі рідко використовуються внаслідок ризику розвитку кровотеч, деструкції міжальвеолярних перетинок. Трипсин зараз не застосовується. Хімотрипсин використовується переважно при гнійно-некротичних процесах.

- **Хімотрипсин (*Chymotrypsin*)**

Фармакотерапевтична група: D03B - засоби для лікування ран і виразкових уражень. Ферменти.

Основна фармакотерапевтична дія: протеолітична дія; протеолітичний фермент, який отримують із підшлункових залоз великої рогатої худоби, гідролізує переважно зв'язки, утворені залишками тирозину, фенілаланіну та іншими ароматичними амінокислотами; розщеплює пептидні зв'язки в молекулах білка та продуктів його розпаду; виявляє протизапальну дію, оскільки фактори запалення являють собою білки або високомолекулярні пептиди (брадикінін, серотонін, некротичні продукти та ін.); лізує некротизовані тканини, не впливаючи на життєздатні клітини, внаслідок наявності в них специфічних антиферментів.

Показання для застосування ЛЗ: захворювання органів дихання, які супроводжуються накопиченням густого в'язкого мокротиння - трахеїти, бронхіти, бронхоектатична хвороба, пневмонія, абсцеси легенів, ателектаз, БА з підвищеною секрецією; в хірургії і травматології - профілактика ускладнень після операції на легенях, опіки і пролежні, тромбофлебіт, гнійні рани; в оториноларингології - при гнійних синуситах, г. і підгострих ларинготрахеїтах і бронхітах з густим в'язким мокротинням, після трахеотомії для полегшення видалення густого в'язкого ексудату, при г. і підгострих гнійних середніх отитах і евстахіїтах з в'язким ексудатом; в офтальмології - при великих тромбозах центральної вени сітківки, г. непрохідності центральної артерії сітківки, помутнінні скловидного тіла травматичного і запального походження, екстракції катаракти.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при захворюваннях органів дихання (трахеїти, бронхіти, бронхоектатична хвороба, пневмонія, абсцеси легенів, ателектаз, БА з підвищеною секрецією) застосовують в/м дорослим по 5-10 мг 1 р/добу 10-12 днів; у подальшому, ч/з 7-10 днів, курс лікування можна повторити; при хр. тривалих процесах лікування можна повторити 3-4 рази; можна застосовувати при ексудативних плевритах, емпіємах - внутрішньоплеврально; у хірургічній практиці - з метою профілактики післяопераційних ускладнень (операція на легенях) в/м дорослим по 5-10 мг 1 р/добу, починаючи за 5-10 днів перед операцією і продовжуючи протягом 3-4 дні після неї; у післяопераційному періоді (при ателектазі, який виник, або на початковій стадії пневмонії) - в/м дорослим по 5-10 мг одноразово (в 1-3 мл 0,25% р-ну новокаїну), комбінувати введення в/м з вагосимпатичною блокадою на боці ураження за Вишневським і застосуванням у вигляді аерозольних інгаляцій у 5 % водному р-ні в кількості 3-4 мл; при гемотораксах, емпіємах - щоденно внутрішньоплеврально по 20-30 мг (розводять у 5-10 мл р-ну натрію хлориду 0,9 % або 0,25 % новокаїну); у фтизіохірургії призначають з тією ж метою і в таких самих дозах на фоні специфічної антибактеріальної терапії; при хр. фіброзно-кавернозному туберкульозі легенів, ускладненому бронхітом, курс передопераційної підготовки триваліший (по 10-12 днів), іноді повторюється до максимальної санації бронхіального дерева; у загальній хірургії при лікуванні опіків і пролежнів після видалення некротичних тканин, які вільно видаляються, 20 мг розводять у 20 мл 0,25 % р-ну новокаїну у тонкою голкою декількома уколами вводять під струп, перед введенням зробити насічки на струпі і під час наступної перев'язки лізовані некротичні тканини видалити механічно; при тромбофлебітах призначають в/м дорослим по 5-10 мг одноразово щоденно 7-10 днів, у випадку неефективності першого курсу лікування повторні курси недоцільні; для лікування гнійних ран в/м введення поєднують із місцевим лікуванням рани тампонами, змоченими у 5 % р-ні (на 0,9 % р-ні натрію хлориду); в офтальмології: при екстракції катаракти у розведенні 1:5000 вводиться у задню камеру ока з наступним промиванням передньої камери р-ном натрію хлориду 0,9 % ч/з 4 хв. після введення препарату; при лікуванні тромбозів центральної вени сітківки, г. непрохідності центральної артерії сітківки застосовують у вигляді 5 % р-ну, приготовленого на 1 % р-ні новокаїну, вводять підкон'юнктивально по 0,2 мл 1-2 р/тиждень; в оториноларингології: при синуситах вводять у гайморову порожнину 5-10 мг у 3-5 мл р-ну натрію хлориду 0,9 % після її проколу і промивання; при отитах закапують у вухо по 0,5-1 мл 0,1 % р-ну хімотрипсину (готується на 0,9 % р-ні натрію хлориду); при мікроопераціях на вусі, метою яких є відновлення або поліпшення слуху (тимпанопластика, стапедектомія), для розм'якшення фіброзних утворень у середньому вусі під час операції вводять у порожнину 0,1 % р-н хімотрипсину; одночасно з місцевим застосуванням вводять в/м дорослим по 5 мг 1-2 р/добу, розводять в 1-2 мл 0,25-0,5% р-ну новокаїну або 0,9 % р-ну натрію хлориду.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: подразнення слизової оболонки ВДШ, охриплість; тахікардія; подразнення та набряк кон'юнктиви; реакції (більш та гіперемія) у місці ін'єкції; реакції гіперчутливості, в т.ч. гіпертермія, свербіж, висипання, гіперемія шкіри, кропив'янка, анафілактичний шок, утруднення дихання, запаморочення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: декомпенсація серцевої діяльності, емфізема легенів з ДН, декомпенсовані форми туберкульозу легенів, г. дистрофія і цироз печінки, інфекційний гепатит, панкреатити, нефрити, геморагічний діатез; не вводити у центри запалення, рани та порожнини, що кровоточать; не наносити на поверхні виявлених злякисних новоутворень; підвищена чутливість до ЛЗ або продуктів протеолізу.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ХИМОТРИПСИН КРИСТАЛІЧНИЙ	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	ліофіл. д/р-ну д/ін'єк. у фл. та амп. в бл.	0,01 г	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Дорназа альфа (Dornase alfa (desoxyribonuclease))**

Фармакотерапевтична група: R05CB13 - муколітичні засоби. Дорназа альфа (дезоксирибонуклеаза).

Основна фармакотерапевтична дія: рекомбінантна людська ДНаза (дорназа альфа) - генно-інженерний варіант природного ферменту людини, що розщеплює позаклітинну ДНК; гнійний секрет в дихальних шляхах містить дуже високі концентрації позаклітинної ДНК - в'язкого поліаніону, який вивільняється з лейкоцитів, що руйнуються, та накопичується у відповідь на інфекцію; in vitro дорназа альфа гідролізує ДНК в мокроті і суттєво зменшує в'язкість мокроті при муковісцидозі.

Показання для застосування ЛЗ: терапія пацієнтів віком від 5 років з муковісцидозом з показником форсованої життєвої ємності легень (ФЖЄЛ) більше 40 % від прогнозованої з метою покращення функції легень^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н в амп. призначений тільки для разового інгаляційного застосування; 2,5 мг дорнази альфа (відповідає вмісту 1 амп. - 2,5 мл нерозведеного р-ну, 2500 ОД); застосовують 1 р/добу, інгаляційно, без розведення, за допомогою небулайзерної системи; у деяких хворих віком від 21 року кращого ефекту лікування можна досягти при застосуванні добової дози препарату 2 р/добу^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кон'юнктивіт; дисфонія, задишка, фарингіт, ларингіт, риніт (неінфекційної етіології); диспепсія; висипання, кропив'янка; болі в грудній клітці (плевральні/некардіальні), гарячка; зниження показників функції дихання.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до дорнази α або до будь-якого з компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): інгаляційно (р-н) - 2,5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ПУЛЬМОЗИМ®	Дженентек Інк. (вир-во нерозфас. продукції) /Кетелент Фарма Солюшнз ЛЛС (перв. пак.)/ Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд (втор. пак., випуск серії)/ Рош Фарма АГ (випроб. Контр. якості)/ Рош Діагностикс ГмбХ (випроб. Контр. якості), США/Швейцарія/Німеччина	р-н д/інгал. по 2,5 мл. в амп. у конт.	2,5 мг/2,5 мл	№6x1	464,79	26,22/\$

4.6.2. Муколітики непрямої дії

4.6.2.1. Секретолітики

Бромгексин – алкалоїд вазіцину. Муколітичний ефект пов'язаний з деполімеризацією мукопротеїнових і мукополісахаридних волокон. Препарат має секретолітичний, секретомоторний і протикашльовий ефекти. Бромгексин має самостійну протикашльову дію. При печенковій недостатності необхідно корегувати дози бромгексину.

- **Бромгексин (Bromhexine)** ** [ПМД]

Фармакотерапевтична група: R05CB02 - засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Муколітичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить секретолітичну (муколітичну) та секретомоторну дію у ділянці бронхіального тракту, в результаті чого збільшується бронхіальна секреція, знижується в'язкість слизу (мокротиння) та стимулюється активність миготливого епітелію, що сприяє просуванню слизу (мокротиння) по дихальних шляхах.

Показання для застосування ЛЗ: секретолітична терапія при г. та хр. захворюваннях бронхів та легень^{ПМД}, що супроводжуються порушенням утворення і просування мокротиння.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н оральний: діти віком до 6 років - 1 мірна ложка 3 р/добу (12 мг/добу); діти від 6 до 14 років та хворі з масою тіла < 50 кг - 2 мірні ложки 3 р/добу (24 мг/добу); дорослі та діти віком старше 14 років: 2-4 мірні ложки 3 р/добу (24-48 мг/добу); під час застосування вживати достатню кількість рідини; тривалість лікування залежить від показань і перебігу захворювання та встановлюється в індивідуальному порядку; не застосовувати більше 4-5 днів без консультації лікаря; сироп: дітям віком від 2 до 6 років - 1 ч. л. 3 р/добу (12 мг/добу); дітям 6-14 років та хворі з масою тіла < 50 кг - 2 ч. л. 3 р/добу (24 мг/добу); дорослим та дітям старше 14 років - 2-4 ч. л. 3 р/добу (24-48 мг/добу); під час застосування вживати достатню кількість рідини; табл. в/о: приймати після їди та запивати великою кількістю рідини, дорослим та дітям віком від 14 років: по 1-2 табл. 3 р/добу (24-48 мг/добу), дітям віком від 6 до 14 років, а також пацієнти з масою тіла < 50 кг: по 1 табл. 3 р/добу (24 мг/добу); тривалість лікування визначається індивідуально, залежно від показань та динаміки розвитку захворювання, але не довше 4-5 днів без відповідної рекомендації лікаря.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гарячка, озноб, р-ції гіперчутливості (свербіж, висипання, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, бронхоспазм, що призводить до респіраторного дистресу, дихальні розлади), анафілактичні реакції, включаючи анафілактичний шок, тяжкі шкірні реакції (включаючи мультиформну еритему, с-м Стівенса-Джонсона/токсичний епідермальний некроліз та гострий генералізований екзантематозний пустульоз), нудота, біль у шлунку, блювання, діарея, загострення виразки шлунку або ДПК, запаморочення, головний біль, мінусе підвищення показника АСТ у сироватці крові, підвищене потовиділення

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини та до будь-якої допоміжної речовини; виразка шлунку або ДПК, виразкова хвороба в анамнезі, спадкова непереносимість фруктози, галактози, дефіцит лактази Лаппа, синдром глюкозо-галактозної мальабсорбції чи спадкова недостатність сахарози-ізомальтази; табл. 8 мг - дітям до 6 років.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 24 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БРОМГЕКСИН	ПАТ "Монфарм", Україна	табл. у бл.	8 мг	№20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БРОМГЕКСИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	8мг	№10	0,86	
	БРОМГЕКСИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	8мг	№10x5	0,98	
	БРОМГЕКСИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	8мг	№20	1,11	
	БРОМГЕКСИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл. в кор. або без	8мг	№10x2, №20x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БРОМГЕКСИН-	Товариство з обмеженою	табл. у бл. в	8мг	№10x5	1,30	

	ЗДОРОВ'Я	відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	кор. або без				
	БРОМГЕКСИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл. в кор. або без	8мг	№20	1,41	
II.	БРОМГЕКСИН 4 БЕРЛІН-ХЕМІ	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	розч. орал. 60 мл, 100 мл у фл. з мірн. лож.	4 мг/5 мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БРОМГЕКСИН 8 БЕРЛІН-ХЕМІ	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (вир-во нерозфасованого продукту, контроль серії; пакування, контроль та випуск серії)/ Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (пакування)/ Драгенофарм Апотекер Пюшл ГмбХ (вир-во нерозфасованого продукту, контроль серії)/СВІСС КАПС ГмбХ (пакуванн, Німеччина /Німеччина/Німеччина/Німеччина	табл. в/о у бл.	8мг	№25x1	2,11	29,36/€
	БРОМГЕКСИН ГРІНДЕКС	АТ "Гріндекс", Латвія	сироп по 100 мл у фл.	4 мг/5 мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

4.6.2.2. Мукорегулятори

Мукорегулятори – препарати на основі карбоцистеїну. Карбоцистеїн активує сіалову трансферазу – фермент келихоподібних клітин, нормалізує баланс кислих та нейтральних глікопротеїнів мокротиння, збільшує частоту рухів війок епітелію, регулює утворення секрету залозистими клітинами. Мукорегуляторний ефект – покращує регенерацію, відновлення структури слизової оболонки, зменшує кількість гіперплазованих келихоподібних клітин. Активує секрецію ІgА, збільшує кількість сульфгідрильних груп, має протизапальну дію. Не провокує бронхоспазм. Препарат володіє післядією – нормалізація в'язкості та еластичності секрету зберігається протягом 8-13 днів після завершення 4-денного курсу лікування.

• **Карбоцистеїн (Carbocysteine) ****

Фармакотерапевтична група: R05CB03 - засоби, які застосовують при кашлі та застудних захворюваннях. Муколітичні засоби. Карбоцистеїн.

Основна фармакотерапевтична дія: муколітична дія; впливає на гелеву фазу слизу дихальних шляхів: шляхом розриву дисульфідних містків глікопротеїнів спричиняє розрідження надмірно в'язкого секрету бронхів, що сприяє виведенню мокротиння; мукорегуляторний ефект карбоцистеїну пов'язаний з активацією сіалової трансферази - ферменту келихоподібних клітин слизової оболонки бронхів; нормалізує кількісне співвідношення кислих та нейтральних сіаломуцинів бронхіального секрету, відновлює його в'язкість та еластичність; активізує діяльність миготливого епітелію і покращує мукоциліарний кліренс; сприяє регенерації слизової оболонки дихальних шляхів, нормалізує її структуру, зменшує гіперплазію келихоподібних клітин і, як наслідок, зменшує продукування слизу; відновлює секрецію імунологічно активного ІgА (специфічний захист) і кількість сульфгідрильних груп компонентів слизу (неспецифічний захист); має протизапальний ефект за рахунок кінінінгібуючої активності сіаломуцинів, що веде до зменшення набряку і бронхообструкції.

Показання для застосування ЛЗ: лікування симптомів порушень бронхіальної секреції та виведення мокротиння БНФ, особливо при г. бронхолегеневих захворюваннях (г. бронхіт); загострення хр. захворювань дихальної системи.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати внутрішньо; 1 доз. стак., наповнений сиропом 2 % до відмітки 1 мл, містить 20 мг карбоцистеїну; 1 доз. стак., наповнений сиропом 5 % до відмітки 1 мл, містить 50 мг карбоцистеїну; діти віком від 2 до 5 років: по 200 мг/добу, в 2 приймання (по 1 доз. стак. (5 мл) 2 р/добу); діти від 5 років до 15 років: 300 мг/добу, у 3 приймання (тобто по 1 доз. стак. (5 мл) 3 р/добу); дорослі та діти віком від 15 років: 2250 мг/добу, у 3 приймання (тобто по 1 доз. стак. (15 мл) 3 р/добу); максимальна разова доза для дітей 100 мг, лікування не >5 днів; р-н оральний: разова доза - саше 10 мл містить 750 мг карбоцистеїну; дорослим та дітям віком від 15 років - 1 саше 3 р/день; тривалість лікування не > 5 днів для дітей та не > 8-10 днів для дорослих.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: розлади травлення, біль у шлунку, нудота, блювання, діарея; АР, такі як - ангіоневротичний набряк, кропив'янка, свербіж та еритематозні шкірні висипання (можливо віддалені у часі), існує ризик розвитку порушення бронхіальної провідності у дітей віком до 2-х років.

Протипоказання до застосування ЛЗ: дитячий вік до 2-х років; гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату; пептична виразка шлунка та ДПК у період загострення; І триместр вагітності.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1,5 г., перорально - дитяча добова доза не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АМКЕСОЛ® УНО	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	сироп 100 мл у бан. скл. та полім.	20мг/мл, 50мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛАНГЕС	Спільне українсько-іспанське	р-н орал. по 200мл	50мг/мл	№1	19,05	

	підприємство "Сперко Україна", Україна	у конт. з мірн. стак.				
ЛАНГЕС	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна	р-н орал. по 60мл у конт. з доз. шпр.	50мг/мл	№1	35,82	
ЛАНГЕС	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"/ ЛАБОРАТОРІОС АЛКАЛА ФАРМА, С.Л., Україна /Іспанія	р-н орал. по 60 мл у конт. з доз. шпр., по 200 мл у конт. з мірн. стак., по 15 мл у пак.	50мг/мл	№1, №12	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МУКОЛІК	ПрАТ "Технолог", Україна	сироп 125 мл у бан. з мірн. лож.	20мг/мл	№1	98,00	
МУКОЛІК	ПрАТ "Технолог", Україна	сироп 125 мл у бан. з мірн. лож.	50мг/мл	№1	98,00	
II. БРОНЛЕС	АЛКАЛОЇД АД Скоп'є, Республіка Македонія	капс. тверді у бл.	375 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ФЛЮДІТЕК	Іннотера Шузі (вир-к відповідальний за контроль та випуск серії)/ Юнітер Ліквід Мануфекчурінг (вир-к відповідальний за виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль серії), Франція	сироп 125 мл у фл. з доз. стак.	20мг/мл, 50мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ФЛЮДІТЕК	Іннотера Шузі (вир-к відпов. за випуск серії)/ Юнітер Ліквід Мануфекчурінг (вир-к відпов. за "in bulk", перв. та втор. пак., контр. серії)/ Юнітер Девелоппман Бордо (вир-к відпов. за контр. серії (додатковий)), Франція	р-н орал. по 10 мл у саше	750 мг/10 мл	№15	відсутня у реєстрі ОВЦ	

4.6.2.3. Стимулятори сурфактанту

- **Амброксол (Ambroxol)** [окрім табл., сиропу, табл. прол. дії, капс. прол. дії, крап. орал., р-ну орал., пастил., р-ну д/інгал. та перор. застос., табл. шпуглич]

Фармакотерапевтична група: R05CB06 - засоби, що застосовуються при кашлю і застудних захворюваннях. Муколітичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: збільшує секрецію залоз дихальних шляхів; підвищує утворення серозного компонента бронхіального секрету; посилює виділення легеневого сурфактанта і стимулює циліарну активність, внаслідок чого полегшується відділення слизу та його виведення (мукоциліарний кліренс); чинить секретолітичну, секретомоторну дію у бронхіальному тракті; підвищує концентрації а/б у бронхолегеневому секреті та у мокроті; здійснює місцевий анестезуючий ефект, так як блокує натрієві канали; значно зменшує вивільнення цитокінів мононуклеарних і поліморфнонуклеарних клітин крові та тканин.

Показання для застосування ЛЗ: секретолітична терапія при г. і хр. бронхопальмональних захворюваннях, що пов'язані з порушенням бронхіальної секреції та ослабленням просування слизу; для підсилення вироблення легеневого сурфактанта у недоношених дітей та новонароджених з с-мом дихальної недостатності (р-н д/інфузій).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: сироп 30 мг/5 мл - дорослим та дітям старше 12 р.: по 5 мл 3 р/добу (90 мг/добу), протягом перших 2-3 днів і потім 5 мл 2 р/добу (60 мг/добу), за необхідності 10 мл 2 р/добу (120 мг/добу); дітям 6-12 р. - по 2,5 мл 2-3 р/добу (30-45 мг/добу); дітям 2-5 р. - по 1,25 мл 3 р/добу (22,5 мг/добу); дітям до 2 р. - по 1,25 мл 2р/добу (15 мг/добу); не застосовувати довше 4-5 днів без консультації лікаря; табл.: дорослим та дітям від 12 р. внутрішньо по 1 табл. 3р/добу (90 мг/добу) перші 2-3 дні застосування, далі - 1 табл. 2 р/добу (60 мг/добу), за необхідності - 2 табл. 2 р/добу (120 мг/добу); діти 6-12 р. - по 1/2 табл. 2-3 р/добу (30-45 мг/добу); табл. ковтати цілими, запиваючи достатньою кількістю рідини (вода, чай, фруктовий сок); не застосовувати довше 4-5 днів без консультації лікаря; капс.: дорослим по 1 капс. (75 мг) 1 р/добу, капс. ковтати цілими, запиваючи достатньою кількістю рідини (вода, чай, фруктовий сок); не застосовувати довше 4-5 днів без консультації лікаря; р-н для інфузій: 30 мг/кг/добу, розподілені на 4 одиночні дози; р-н вводити в/в, повільно, протягом не менше 5 хв, за допомогою помпового пристрою д/інфузій, тривалість лікування 5 днів; р-н для інгаляцій та р/ос застосування: 1 мл р-ну - 25 кр., *інгаляції*: дорослі та діти від 6 р. - по 1-2 інгаляції по 2-3 мл р-ну на добу; діти до 6 р. - по 1-2 інгаляції по 2 мл р-ну на добу, можна використовувати у всіх сучасних інгаляційних приладах (за винятком парових інгаляторів), розводити у пропорції 1 : 1 з фізіологічним р-ном для забезпечення оптимального зволоження повітря, що вивільнюється апаратом; *р/ос застосування*: дорослі та діти старше 12 р. - по 4 мл 3 р/добу (90 мг/ добу) протягом перших 2-3 днів, потім по 2 мл 3 р/добу (45 мг/ добу) (дозування по 4 мл 3 р/добу може бути продовжене після консультації з лікарем); діти 6-12 р. - по 2 мл 2-3 р/добу (30 - 45 мг/добу); діти 2-6 р. - по 1 мл (25 крап.) 3 р/добу (22,5 мг/добу); діти до 2 р.: по 1 мл (25 крап.) 2 р/добу (15 мг/добу); р-н для р/ос застосування можна розводити у воді, чаї, фруктовому соці, молоці; тривалість лікування залежить від особливостей перебігу захворювання (не рекомендується без призначення лікаря понад 4-5 днів); при г.

захворюваннях проконсультуватися з лікарем, якщо с-ми не зникають та/або посилюються, незважаючи на лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: реакції гіперчутливості, біль у животі, зниження чутливості у ротовій порожнині і глотці, сухість у роті та горлі; запор, диспепсії, нудоти, блювання, діарея; слинотеча, дисгевсія; ринорея, диспное (як реакція гіперчутливості), бронхоспазм, еритема, висип, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, анафілактичні р-ції (включаючи анафілактичний шок), свербіж, лихоманка, р-ції з боку слизових оболонок, серйозні шкірні ПР (мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, гострий генералізований екзантематозний пустульоз), гарячка, розлади сечовипускання, підвищення т-ри тіла, озноб.

Протипоказання до застосування ЛЗ: відома гіперчутливість до амброксолу г/х або ін. компонентів препарату; дітям до 6 р. (табл. 30 мг.); дітям та підліткам (капс.); дітям до 2 р. без призначення лікаря (сироп).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,12 г., парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена у реєстрі ОБЦ., перорально - дитяча добова доза не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена у реєстрі ОБ

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АБРОЛ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. у бл.	30мг	№10x2	5,72	
	АБРОЛ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	сироп по 100 мл у фл. п/е або скл. з мірн. склян.	15мг/5мл	№1	17,05	
	АБРОЛ®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	сироп по 100 мл у фл. п/е або скл. з мірн. склян.	30мг/5мл	№1	11,20	
	АБРОЛ® SR	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. прол. дії у бл.	75мг	№10x1	10,08	
	АБРОЛ® SR	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. прол. дії у бл.	75мг	№10x2	6,63	
	АМБРОКСОЛ	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії вир-ва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії вир-ва, контр. якості, випуск серії), Україна	табл. у бл.	30мг	№10x2	3,00	
	АМБРОКСОЛ	ТОВ "Тернофарм", Україна	сироп по 100мл у бан. з мірн.лож.	15мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМБРОКСОЛ	ТОВ "Тернофарм", Україна	сироп по 100мл у фл. з мірн.лож.	15мг/5мл	№1	16,01	
	АМБРОКСОЛ	ТОВ "Тернофарм", Україна	табл. у бл.	30мг	№10x2	2,35	
	АМБРОКСОЛ	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	сироп по 100мл у бан. полім.	15мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМБРОКСОЛ	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	сироп по 100мл у бан. скл.	15мг/5мл	№1	11,60	
	АМБРОКСОЛ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	30мг	№10x2	2,25	
	АМБРОКСОЛ	ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна	табл. у бл.	0,03г	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМБРОКСОЛ	ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна	табл. у бл.	0,03г	№10x100	2,52	
	АМБРОКСОЛ	ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна	табл. у бл.	0,03г	№10x2	2,52	
	АМБРОКСОЛ	ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна	табл. у бл.	0,03г	№10x50	2,52	
	АМБРОКСОЛ	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	сироп по 100 мл у фл. або бан. з доз. склян.	15 мг/5 мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМБРОКСОЛ 15	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	сироп по 50 мл, 120 мл у бан. і фл. полім. та скл. з доз. ложк.	15мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМБРОКСОЛ	ПАТ "Науково-виробничий центр	сироп по 100	15мг/5мл	№1	30,02	

15	"Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	мл у бан. і фл. полім. з доз. ложк.				
АМБРОКСОЛ 15	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	сироп по 100 мл у бан. і фл. скл. з доз. ложк.	15мг/5мл	№1	30,02	
АМБРОКСОЛ 30	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	сироп по 50 мл, 120 мл у бан. і фл. полім. та скл. з доз. ложк.	30мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АМБРОКСОЛ 30	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	сироп по 100 мл у бан. і фл. полім. з доз. ложк.	30мг/5мл	№1	6,70	
АМБРОКСОЛ 30	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	сироп по 100 мл у бан. і фл. скл. з доз. ложк.	30мг/5мл	№1	6,70	
АМБРОКСОЛ ЕКСТРА	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	30мг	№10x2	4,80	
АМБРОКСОЛ-ВІШФА	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	сироп по 100 мл у фл. або бан. з доз. склян.	15мг/5мл	№1	12,76	
АМБРОКСОЛ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	30мг	№10x2	2,43	
АМБРОКСОЛ-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/інгал. та перор. застос. у фл. по 100 мл з мірн. стак	15мг/2мл	№1	12,94	
АМБРОКСОЛ-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/інгал. та перор. застос. у фл. по 50 мл з мірн. стак	15мг/2мл	№1	16,27	
АМБРОКСОЛ-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії вир-ва, ко, Україна	сироп по 2,5мл, 5мл, 10мл у саше	15мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АМБРОКСОЛ-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії вир-ва, ко, Україна	сироп по 100мл у фл. з мірн. ложк.	15мг/5мл	№1	14,87	
АМБРОКСОЛ-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контр. якості, випуск серії)/ ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії вир-ва, ко, Україна	по 5 мл, у саше у карт.кор.	15мг/5мл	№20	17,22	
АМБРОКСОЛ-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контр. якості, випуск серії)/ ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії вир-ва, ко, Україна	сироп по 5мл у саше	30мг/5мл	№20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АМБРОКСОЛ-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контр. якості, випуск серії)/ ТОВ "Харківське фармацевтичне під-	сироп по 100мл у фл. з мірн. ложк.	30мг/5мл	№1	8,56	

	во "Здоров'я народу" (всі стадії вир-ва, ко, Україна					
АМБРОКСОЛ-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	30мг	№10x2	1,22	
АМБРОКСОЛУ ГІДРОХЛОРИД	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (вир-во за повним циклом)/ ТОВ "АГРОФАРМ" (вир-во, пакування, випуск серій),Україна	табл. у бл.	30мг	№10x2	2,31	
АМБРОКСОЛУ ГІДРОХЛОРИД	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	табл. у бл.	30мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АМБРОКСОЛУ ГІДРОХЛОРИД	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	табл. у бл.	30мг	№20x1	1,43	
АМБРОТАРД 75	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	капс. прол. дії у бл.	75мг	№10x1	8,07	
ЛАЗОЛЕКС	ТОВ "НІКО" (контроль, випуск серії)/ ДЕМО СА ФАРМАСЬЮТІКАЛ ІНДАСТРІ (нерозфасований продукт, первинна упаковка, вторинна упаковка, контроль), Україна/ Греція	р-н д/ін'єк. по 2 мл в амп. у пач.	7,5мг/мл	№5	125,00	
МУКОЛВАН	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контроль якості, випуск серії), Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у бл.	7,5мг/мл	№5x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МУКОЛВАН	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контроль якості, випуск серії), Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у пач.	7,5мг/мл	№5	68,04	
МУКОСОЛ	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/інфуз. по 2мл в амп. у пач.	7,5мг/мл	№5, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МУКОСОЛ	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/інфуз. по 2мл в амп. у бл.	7,5мг/мл	№5x2	107,80	
МУКОСОЛ	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/інфуз. по 2мл в амп. у бл.	7,5мг/мл	№5x1	54,60	
ПЕКТОЛВАН® А ЗІ СМАКОМ ЛІСОВИХ ЯГІД	ПАТ "Фармак", Україна	сироп по 100 мл у фл. з доз. шпр.	15мг/5мл	№1	18,00	
ПЕКТОЛВАН® А ЗІ СМАКОМ ПОЛУНИЦІ	ПАТ "Фармак", Україна	сироп по 100 мл у фл. з доз. лож.	30мг/5мл	№1	12,00	
II. АМБРОКСОЛ	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл. у бл.	30 мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АМБРОКСОЛ-ТЕВА	Меркле ГмБХ (вир-во нерозфасованого продукту, дозвіл на випуск серії; первинна та вторинна упаковка, контроль якості), Німеччина	табл. у бл.	30 мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АМБРОКСОЛ-ТЕВА	Меркле ГмБХ (первинна та втор. уп., контр. серії; дозвіл на випуск серії)/ Ацино Фарма АГ (вир-во нерозфас. прод. та контр. серії)/ Унтерзухунгсінститут Хеппелер (контр. серії), Німеччина /Швейцарія	капс. прол. дії тверді у бл.	75 мг	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АМБРОКСОЛ-ТЕВА	Меркле ГмБХ (дозвіл на випуск серії; вир-во нерозфас. прод.,	сироп по 100 мл у фл. з мірн.	15 мг/5 мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

	перв. та втор. уп., контроль якості), Німеччина	стак.					
АМБРОКСОЛ-ТЕВА	Меркле ГмбХ (вир-во нерозфас. продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль серії; дозвіл на випуск серії), Німеччина	р-н орал. по 40 мл, 100 мл у фл. з доз. склян.	7,5 мг/мл	№1		відсутня у реєстрі ОВЦ	
АМБРОЛІТИН®	АТ "Софарма" (вир-во нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка; дозвіл на випуск серії), Болгарія	сироп по 100 мл у фл. з мірн. стак.	15 мг/5 мл	№1		відсутня у реєстрі ОВЦ	
АМБРОСАН®	ПРО.МЕД.ЦС Прага а.с., Чеська Республіка	табл. у бл.	30 мг	№10x2		відсутня у реєстрі ОВЦ	
АМБРОХЕМ	"Хемофарм" АД, Вршац, відділ виробнича дільниця Шабац (вир-к готового ЛЗ, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості)/ "Хемофарм" АД (вир-к, відповідальний за випуск серії), Сербія/ Сербія	сироп по 100 мл у пл. з мірн. ложк.	15 мг/5 мл	№1		відсутня у реєстрі ОВЦ	
БРОНХОВАЛ®	Салютас Фарма ГмбХ (вторинне пакування, випуск серії)/ Ліхтенхельдт ГмбХ, Фармацойтіше Фабрік (вир-во in bulk, пакування), Німеччина	сироп по 100 мл у фл. з мірн. ложк.	15 мг/5 мл	№1		відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛАЗОЛВАН®	Берінгер Інгельхайм Еллас А.Е., Греція	табл. у бл.	30 мг	№10x2, №10x5		відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛАЗОЛВАН®	Берінгер Інгельхайм Еспана, СА, Іспанія	р-н д/інфуз. по 2 мл в амп. у кор.	15 мг/2 мл	№10		відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛАЗОЛВАН®	Іstituto de Анжелі С.р.л., Італія	р-н д/інгал. та перор. застос. по 100 мл у фл.-крап. з мірн. ковп.	15 мг/2 мл	№1		відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛАЗОЛВАН® 3 ПОЛУНИЧНО-ВЕРШКОВИМ СМАКОМ	Дельфарм Реймс/ Берінгер Інгельхайм Еспана, СА, Франція/ Іспанія	сироп по 100 мл, 200 мл у фл. з мірн. ковп.	30 мг/5 мл	№1		відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛАЗОЛВАН® 3І СМАКОМ ЛІСОВИХ ЯГІД	Берінгер Інгельхайм Еспана, С.А./ Дельфарм Реймс, Іспанія/ Франція	сироп по 100 мл, 200 мл у скл. фл. з мірн. ковп.	15 мг/5 мл	№1		відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛАЗОЛВАН® МАКС	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко. КГ (вир-во, контроль якості, пакування, маркування, випуск серії)/ Дельфарм Реймс (пакування, маркування, випуск серії), Німеччина/ Франція	капс. прол. дії у бл.	75 мг	№10x1, №10x2, №10x5		відсутня у реєстрі ОВЦ	
РЕСПИКС® СПРЕЙ	Франція Фармасьютічі Індустрія Фармако Біолоджіка С.р.л./ Ай Ті Сі Фарма С.р.л., Італія	р-н орал. по 13 мл у фл. з доз. пристр.	10 мг/0,2 мл	№1		відсутня у реєстрі ОВЦ	
ФЛАВАМЕД® МАКС ТАБЛЕТКИ ШИПУЧІ	Гермес Арцнайміттель ГмбХ (вир-к, що виконує вир-во "in bulk", пак., контроль якості)/ БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (вир-к, що виконує випуск серії), Німеччина	табл. шипучі у тубі	60 мг	№10x1		відсутня у реєстрі ОВЦ	
ФЛАВАМЕД® РОЗЧИН ВІД КАШЛЮ	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	р-н орал. по 60мл у фл. з мірн. ложк.	15мг/5мл	№1		відсутня у реєстрі ОВЦ	
ФЛАВАМЕД® РОЗЧИН ВІД КАШЛЮ	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	р-н орал. по 100мл у фл. з мірн. ложк.	15мг/5мл	№1		27,09	28,22/€
ФЛАВАМЕД® ТАБЛЕТКИ ВІД КАШЛЮ	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (вир-во "in bulk", пак., контр. та випуск серії) /Менаріні-Фон Хейден	табл. у бл.	30мг	№10x1		відсутня у реєстрі ОВЦ	

	ГмбХ (вир-во "in bulk", пакування та контроль серій), Німеччина					
ФЛАВАМЕД® ТАБЛЕТКИ ВІД КАШЛЮ	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (вир-во "in bulk", пак., контр. та випуск серій) /Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (вир-во "in bulk", пакування та контроль серій), Німеччина	табл. у бл.	30мг	№10x5	7,68	28,22/€
ФЛАВАМЕД® ТАБЛЕТКИ ВІД КАШЛЮ	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (вир-во "in bulk", пак., контр. та випуск серій) /Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (вир-во "in bulk", пакування та контроль серій), Німеччина	табл. у бл.	30мг	№10x2	9,03	28,22/€
ФЛАВАМЕД® ФОРТЕ	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (вир-во "in bulk", пакування, контроль та випуск серій), Німеччина	р-н орал. по 100 мл у фл. з мірн. ложк.	30мг/5мл	№1	13,55	28,22/€

4.6.3. Легеневі сурфактанти

Легеневі сурфактанти застосовуються для ведення пацієнтів з респіраторним дистрес с-мом у незрілих новонароджених, а також у дорослих з респіраторним дистрес с-мом.

- **Природні фосфоліпіди (Natural phospholipids) **** (див. п. 14.15. розділу "НЕОНАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

4.6.4. Експекторанти

4.6.4.1. Експекторанти рефлексорної дії

Препарати рефлексорної дії збільшують гідратацію слизу, подразнюють рецептори шлунку, збуджують блювотний центр, підсилюють секрецію слинних та бронхіальних залоз, підсилюють моторику бронхіальної мускулатури, підвищують активність миготливого епітелію. Необхідність частого (кожні 2-4 год) прийому малих доз цих препаратів обумовлена нетривалою дією, появою нудоти та блювання при збільшенні дози.

Застосовують при г. процесах, при яких немає виражених структурних змін в келихоподібних клітинах і вільчастому епітелії.

Ця група препаратів представлена гвайфенезином, ердостеїном, а також алтеєм, термопсисом, тим'яном (чабрець), солодкою, натрію бензоатом, терпінгідратом, корінням іпекакуани, синюхи, дев'ясила, травою м'яти, листям подорожника, евкаліпта, мати-й-мачухи, фіалки, багульника, душиці, анісу, бруньками сосни та ефірними оліями.

- **Ердостеїн (Erdosteine)**

Фармакотерапевтична група: R05CB15 - засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби, за винятком комбінованих препаратів, які містять протикашльові засоби. Муколітичні засоби. Ердостеїн

Основна фармакотерапевтична дія: муколітичний засіб, активні метаболіти якого зменшують еластичність та в'язкість слизу, що допомагає очищенню дихальних шляхів від секрету та підвищує ефективність мукоциліарного механізму у видаленні слизу та слизово-гнійних виділень з верхніх та нижніх дихальних шляхів; знижує адгезивну здатність грампозитивних та грамнегативних бактерій до епітелію дихальних шляхів, внаслідок чого може зменшуватися бактеріальна колонізація дихальних шляхів та знижуватися ризик бактеріальної суперінфекції; діє як акцептор вільних радикалів кисню, запобігає їхньому утворенню локально та значущо зменшує рівень 8-ізопростану як маркера перекисного окислення ліпідів; перешкоджає інгібуванню альфа-1-антитрипсину тютюновим димом, запобігаючи таким чином ураженням, що спричиняються смогом або тютюнопалінням; збільшує концентрацію IgA в дихальних шляхах у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) та запобігає інгібуванню гранулоцитів, спричиненому тютюнопалінням; дія проявляється ч/з 3-4 дні від початку терапії; не містить вільних SH-радикалів, тому має дуже незначний вплив на ШКТ.

Показання для застосування ЛЗ: зменшення в'язкості та полегшення відхаркування бронхіального секрету при лікуванні г. і хр. захворювань верхніх та нижніх дихальних шляхів: бронхіт^{БНФ}, риніт, синусит, ларингофарингіт, загострення хр. бронхіту^{БНФ}, ХОЗЛ, гіперсекреторна БА, бронхоектатична хвороба

Спосіб застосування та дози ЛЗ: капс.: дорослим по 1 капс. (300 мг) 2 р/день^{БНФ}; порошок д/орал. сусп.: дітям дозу визначають відповідно до маси тіла і віку дитини: 15-20 кг (3-6 років) 2,5 мл 2 р/добу, 21-30 кг (7-12 років) 5 мл 2 р/добу, понад 30 кг (понад 12 років) 5 мл 3 р/добу; доза для дорослих 10 мл 2 р/добу; порошок збовтати з водою до повного переходу порошку в однорідну суспензію, перед кожним застосуванням суспензію збовтувати

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: відчуття печії та болю в шлунку, нудота, блювання, діарея, смакові розлади (агевзія, дизгевзія), неочікувана гіперпірексія, кропив'янка, еритема, екзема, набряк Квінке, головний біль, задишка

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин, або до речовин, що містять вільні SH-групи; припинити застосування препарату в таких випадках: при розладах з боку печінки (при збільшенні рівнів лужної фосфатази або трансаміназ у сироватці крові тощо), у тому числі при цирозі печінки; при нирковій недостатності (КлКр < 25 мл/хв); при гомоцистинурії (цей лікарський засіб є джерелом гомоцистеїну, на сьогодні немає доступних даних щодо застосування ердостеїну у разі вроджених порушень метаболізму амінокислот, особливо у пацієнтів, які вимушені дотримуватися безметіонінової дієти) та при недостатності ферменту цистатіонін-синтетази, оскільки можливий вплив на метаболізм метіоніну; при виразковій хворобі в активній фазі; при фенілкетонурії

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,6 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕРМУЦИН®	ЕДМОНД ФАРМА С.Р.Л., (вир-во нерозфасованої продукції, контроль та випуск серій)/ЛАМП САН ПРОСПЕРО СПА, (первинне та вторинне пакування), Італія/Італія	капс. тверді у бл.	300мг	№10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕРМУЦИН®	ЕДМОНД ФАРМА С.Р.Л., (вир-во нерозфасованої продукції, контроль та випуск серій)/ЛАМП САН ПРОСПЕРО СПА, (первинне та вторинне пакування), Італія/Італія	капс. тверді у бл.	300мг	№10x2	21,00	29,56/€
	ЕРМУЦИН®	ЗЕТА ФАРМАЦЕУТИЦІ С.П.А., Італія	пор. д/орал. сусп. у фл.	175 мг/5 мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МУЦИТУС	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	капс. у стрипі	150мг, 300мг	№6x2, №6x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Алтея лікарська (Althaea officinalis) ****

Фармакотерапевтична група: R05CA05 - засоби, що застосовують при кашлі і застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: відхаркувальний засіб прямої дії; полісахариди всмоктуються у кров, частково виділяються бронхіальними залозами і чинять на слизову оболонку ВДШ обволікаючу, пом'якшуючу і протизапальну дію, помірну протикашльову дію, зменшує кількість нападів кашлю та їх інтенсивність, дещо збільшує виділення рідкої складової бронхіального секрету і нормалізує її реологічні властивості (в'язкість, еластичність, адгезивність); підсилює перистальтичні рухи бронхіол і моторну функцію миготливого епітелію бронхів, спричиняючи цитопротекторний і протизапальний ефекти, сприяє виведенню мокротиння та регенерації тканин.

Показання для застосування ЛЗ: у складі комплексного лікування запальних захворювань органів дихання; кашель при г. та хр. захворюваннях дихальних шляхів, що супроводжуються утворенням густого та в'язкого бронхіального секрету та/або порушенням його відхаркування: бронхіти, ларингіти, трахеїти, трахеобронхіти, пневмонії, бронхоектатична хвороба, БА, коклюш.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо до їди дорослим і дітям старше 14 років по 1 ст. л. (15 мл) сиропу 4-6 р/добу; дітям віком 6-14 років призначають по 1 десертній ложці (10 мл) сиропу 4-6 р/добу; дітям 2-6 років по 1 чайній ложці (5 мл) 4-6 р/добу, необхідну кількість сиропу розводять у невеликій кількості кип'яченої води (10-15 мл, або 2-3 чайні ложки); табл.: дорослим і дітям віком від 14 років - по 1 табл. 4-6 р/добу до їди; діти 7-14 років по 1 табл. 3-4 р/добу; діти 2-7 років по ½ табл. 3-4 р/добу; курс лікування - від 7 днів до 14 днів залежно від форми захворювання.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: можливі АР (у т.ч. висипання, свербіж, кропив'янка; можливо уповільнені), посилене слиновиділення, подразнення слизової оболонки шлунка. **Побічні реакції.** Можливі алергічні реакції, посилене слиновиділення, подразнення слизової оболонки шлунка. У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування і звернутися до лікаря. **Побічні реакції.** Лікарський засіб може спричинити алергічні реакції (можливо уповільнені). У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування і звернутися до лікаря.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до компонентів препарату, ЦД.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АЛТЕЇ КОРЕНЯ СИРОП	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	сироп по 100 мл у фл. скл. або полім.	0,15г	№1	39,01	
	АЛТЕЇ КОРЕНЯ СИРОП	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	сироп по 200 мл у фл. скл. або полім.	0,15г	№1	65,22	
	АЛТЕЙКА	ТОВ "Тернофарм", Україна	табл. жув. у бл.	0,12г	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЛТЕЙКА	ТОВ "Тернофарм", Україна	табл. жув. у бл.	0,12г	№10x2	36,49	
	АЛТЕЙКА ГАЛИЧФАРМ	ПАТ "Галичфарм", Україна	сироп по 100 мл, 200 мл у фл. скл. або полім. та бан. з	7,5мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

		мірн. лож.				
АЛТЕЙКА ГАЛИЧФАРМ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. жув. у бл.	100мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АЛТЕЙКА ГАЛИЧФАРМ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. жув. у бл.	100мг	№10x2	32,64	
АЛТЕЙКА- ТЕРНОФАРМ	ТОВ "Тернофарм", Україна	сироп по 100мл у фл. з мірн. ложк. або стак.	7,5мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АЛТЕЙКА- ТЕРНОФАРМ	ТОВ "Тернофарм", Україна	сироп по 200мл у фл. з мірн. ложк. або стак.	7,5мг/5мл	№1	80,04	
АЛТЕМІКС	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контроль якості, випуск серії)/ Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії вир-ва, ко, Україна/ Україна	сироп по 100 мл у фл. з мірн. ложк.	25мг/5мл	№1	41,67	
МУКАЛІТАН	ТОВ "Тернофарм", Україна	табл. у конт.	0,05г	№30	34,13	
МУКАЛТИН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії вир-ва, контроль якості, випуск серії)/ Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контроль якості, випуск серії), Україна/ Україна	табл. у бан. конт. та бл.	50мг	№10, №30, №100	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МУКАЛТИН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії вир-ва, контроль якості, випуск серії)/ Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контроль якості, випуск серії), Україна/ Україна	табл. у конт. безчар/уп.	50мг	№10x1	14,53	
МУКАЛТИН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії вир-ва, контроль якості, випуск серії)/ Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контроль якості, випуск серії), Україна/ Україна	табл. у бан.	50мг	№30	37,17	
МУКАЛТИН®	ПАТ "Галичфарм", Україна	табл. у стрип., конт. та бл.	50 мг	№10x1, №1 0x3, №30x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МУКАЛТИН®	ПАТ "Галичфарм", Україна	сироп по 100 мл, 200 мл у фл. скл. або полім. та бан. з мірн. ложк.	7,5мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МУКАЛТИН® ФОРТЕ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. жув. у бл.	100 мг	№10x2, №10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	

4.6.4.2. Мукокінетики

Мукокінетики представлені леткими бальзамами, що містять природні пінеми, терпени, фенольні похідні і входять до складу комбінованих засобів. Дія обумовлена неспецифічним подразненням слизової оболонки, гіперосмолярністю, збільшенням трансепітеліальної секреції води. Мукокінетики призначають при продуктивному

кашлі з метою покращання відходження та полегшення відкашлювання мокротиння. Призначення мукокінетиків при сухому кашлі може призвести до його посилення.

4.6.4.3. Мукогідратанти

Мукогідратанти сприяють гідратації секрету. Це такі засоби як зволожувальні інгаляції, лужне пиття, гіпертонічний р-н натрію хлориду.

4.6.4.4. Стимулятори бронхіальних залоз

Стимулятори бронхіальних залоз представлені препаратами резорбтивної дії. Це натрію та калію йодид, хлорид амонію, сода. Названі речовини виділяються бронхами, збільшують бронхіальну секрецію, розріджують мокротиння, покращують функцію миготливого епітелію. Застосовуються обмежено ч/з побічну дію – блювоту, за цінністю незначно перевищують плацебо.

4.6.5. Комбіновані засоби та інші

Комбіновані муколітичні засоби представлені широким різномаяттям препаратів. Крім поєднань декількох мукоактивних компонентів вони можуть містити бронхолітики, деконгестанти, антигістамінні, протикашльові, жарознижуючі, антисептичні компоненти рослинного, мінерального або хімічного походження. Інші засоби, що регулюють бронхіальну секрецію, представлені різноманітними гомеопатичними, антигомтоксичними препаратами та фітотерапевтичними зборами. Перелік таких комбінованих ЛЗ подається за торговою назвою.

4.7. Протикашльові лікарські засоби

Кашель – частий симптом у клінічній практиці, він турбує пацієнтів не тільки з пульмонологічною патологією, але і при гастроєзофагеальних розладах, с-мі постназального стікання тощо. В зв'язку з тим, що кашель є важливим захисним актом, який необхідний для евакуації мокротиння з трахеобронхіального дерева, застосування протикашльових засобів повинно бути виваженим. Не слід пригнічувати кашель у пацієнтів з бронхіальною гіперсекрецією, ретенція слизу може бути загрозливою у пацієнтів з хр. бронхітом та бронхоектазами. Як правило, протикашльові засоби показані у випадках, коли нічний кашель порушує сон та відпочинок хворого, або якщо денні напади сухого кашлю виснажують пацієнта, а також як симптоматична терапія у пацієнтів з онкопатологією.

Протикашльові препарати розділяються:

- Наркотичні протикашльові засоби;
- Ненаркотичні протикашльові засоби;
- Комбіновані протикашльові засоби.

4.7.1. Ненаркотичні протикашльові засоби

Ненаркотичні протикашльові засоби здійснюють протикашльову дію ч/з вибірковий вплив на рівні кашльових нервових центрів, не пригнічують дихального центру, не чинять снодійного впливу. Також ці препарати виявляють місцевоанестезуючу дію: знижують збудливість периферичних сенсорних рецепторів.

- **Бутамірам (Butamirate)****

Фармакотерапевтична група: R05DB13 - засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Кашльові супресанти

Основна фармакотерапевтична дія: неопіатний протикашльовий засіб з центральною дією; спричиняє неспецифічний антихолінергічний та бронхоспазмолітичний ефекти, що покращує дихальну функцію, не спричиняє ефекту звикання або залежності.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування кашлю (в тому числі сухого) різного походження

Спосіб застосування та дози ЛЗ: крап. - разова доза залежить від віку дитини і становить: дітям від 2 місяців до 1 року - по 10 крап. (2,5 мг) 4 р/добу, МДД - 40 крап. (10 мг); від 1 до 3 років - по 15 крап. (3,75 мг) 4 р/добу, МДД - 60 крап. (15 мг); від 3 до 6 років - по 25 крап. (6,25 мг) 4 р/добу, МДД - 100 крап. (25 мг); сироп - дітям від 3 до 6 років - по 5 мл (7,5 мг) 3 р/добу, МДД - 15 мл (22,5 мг); від 6 до 12 років - по 10 мл (15 мг) 3 р/добу, МДД - 30 мл (45 мг); підлітки старше 12 років - по 15 мл (22,5 мг) 3 р/добу, МДД - 45 мл (67,5 мг), дорослим - по 15 мл (22,5 мг) 4 р/добу, МДД - 60 мл (90 мг); застосовують до прийому їжі; максимальний курс лікування не повинен перевищувати 1 тижд.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сонливість, нудота, діарея, висипання на шкірі, кропив'янка, свербіж, анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активної або допоміжних речовин препарату; генетична непереносимість фруктози (краплі)

Визначена добова доза (DDD): перорально - 25 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГРИПОЦИТРОН-БРОНХО	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	крап. орал, р-н по 20мл у фл.-крап.	5 мг/мл	№1		відсутня у реєстрі ОВЦ
	ГРИПОЦИТРОН-БРОНХО	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії вир-ва, ко, Україна	сироп по 15 мл у саше	1,5мг/мл	№20		відсутня у реєстрі ОВЦ
	ГРИПОЦИТРОН-	ТОВ "Фармацевтична компанія	сироп по	1,5мг/мл	№1	12,72	

	БРОНХО	"Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії вир-ва, ко, Україна	200мл у фл. з мірн. ложк.				
	ГРИПОЦИТРОН-БРОНХО	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії вир-ва, ко, Україна	сироп по 100мл у фл. з мірн. ложк.	1,5мг/мл	№1	20,00	
	ГРИПОЦИТРОН-БРОНХО	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії вир-ва, ко, Україна	сироп по 5 мл у саше	1,5мг/мл	№20	20,99	
	ГРИПОЦИТРОН-БРОНХО	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (фасування із форми "in bulk" вир-ва ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна), Україна	сироп по 100 мл, 200 мл у фл. з доз. прист.	1,5 мг/мл	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
	КРАПЛІ ВІД КАШЛЮ ПУЛЬМО	ТОВ "Фармацевтична фірма "Вертекс", Україна (вир-во з продукції in bulk ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна), Україна	крап. орал. р-н по 20 мл у фл.-крап.	5 мг/мл	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
	СИРОП ВІД КАШЛЮ ПУЛЬМО	ТОВ "Фармацевтична фірма "Вертекс" (вир-во з продукції in bulk ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна), Україна	сироп по 100 мл у фл. з мірн. ложк.	1,5 мг/мл	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
II.	СИНЕКОД	ГСК Консьюмер Хелскер С.А., Швейцарія	сироп 100 мл, 200 мл у фл. з мірн. склян.	1,5 мг/мл	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
	СИНЕКОД	ГСК Консьюмер Хелскер С.А. (вир-во за повним циклом)/ ДОППЕЛЬ ФАРМАЦЕУТИЦІ С.Р.Л. (вир-во за повним циклом), Швейцарія/ Італія	крап. орал. д/дітей по 20 мл у фл.-крап.	5 мг/мл	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ

● **Глауцин (Glaucine) ****

Фармакотерапевтична група: R05DB - протикашльові засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: протикашльовий засіб центральної дії; алкалоїд з рослини *Glaucium flavum* (Мачок жовтий), який пригнічує центр кашлю; на відміну від кодеїну не впливає на центр дихання і не спричиняє медикаментозну залежність; не впливає на моторику кишечника, виявляє незначну спазмолітичну дію, має симпатолітичну дію та може знизити АТ; має деяку протизапальну дію.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування сухого кашлю різної етіології при інфекційно-запальних захворюваннях ВДШ, включаючи г. і хр. бронхіт, грип.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо після їди; разова доза для дорослих 40 мг, 2-3 р/добу; у більш тяжких випадках разову дозу можна збільшити до 80 мг; МДД не повинна перевищувати 200 мг; разова доза для дітей старше 4 років - 10 мг, 2-3 р/добу; МДД не має перевищувати 40 мг; для пацієнтів із захворюваннями нирок та печінки необхідно зменшити дозу препарату або збільшити інтервал між прийомами; тривалість лікування не повинна перевищувати 5 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: при застосуванні високих разових доз (приблизно 80 мг) може виникнути запаморочення, головний біль, сонливість, слабкість і швидка втомлюваність, нудота і блювання, зниження АТ; АР у вигляді свербежу або висипань.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої або до будь-якої з допоміжних речовин препарату; артеріальна гіпотензія, г. ІМ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БРОНХОЛІТИН	АТ "Софарма" (Вир-во	табл.,	10мг, 40мг	№20x1		відсутня у реєстрі ОБЦ

ТАБ	нерозфас. прод., перв. уп. або вир-во за повним циклом)/ ПАТ "Вітаміни" (Втор. упаковка, дозвіл на випуск серії), Болгарія/Україна	в/о у бл.			
-----	--	-----------	--	--	--

• **Леводропропізин (Levodropropizine)**

Фармакотерапевтична група: R05DB27 - протикашльові засоби за винятком комбінованих препаратів, які містять експекторанти.

Основна фармакотерапевтична дія: протикашльовий засіб переважно периферичної дії, що сприяє зменшенню частоти і інтенсивності кашлю, має бронхолітичний ефект; пригнічує чутливість рецепторів бронхіального дерева; діє на рівні нервових рецепторів шляхом інгібування проведення нервового імпульсу по С-волоконках; пригнічує вивільнення нейропептидів (субстанція Р та інші), а також гістаміну, завдяки чому досягається суттєвий бронхолітичний ефект.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування сухого непродуктивного кашлю при фарингіті, ларингіті, трахеїті, трахеобронхіті, грипі, БА, емфіземі легень, хр. обструктивному бронхіті, при алергічних та інфекційно-запальних захворюваннях дихальних шляхів, а також при пухлинах легень.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати р/ос за 1 год до або ч/з 2 год після їжі; дорослим і дітям старше 12 років по 60 мг (10 мл сиропу) 3 р/добу з проміжками не менше 6 год; дітям віком від 2 до 12 р. застосовувати у дозі 1 мг/кг маси тіла 3 р/добу, загальна добова доза - 3 мг/кг маси тіла; для зручності можна застосовувати такі приблизні дози: дітям з масою тіла 10-20 кг застосовувати по 3 мл до 3 р/добу; дітям з масою тіла 20-30 кг застосовувати по 5 мл до 3р/добу; тривалість курсу лікування - до 7 діб.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота, блювання, диспепсія, печія, відчуття дискомфорту у шлунку, біль у животі, діарея, втомлюваність, астенія, сонливість, запаморочення, головний біль, порушення свідомості, зомління, парестезії, прискорене серцебиття, тахікардія, кардіопатія, шкірні висипання, свербіж, індивідуальна непереносимість до будь-якого компонента препарату, у тому числі і до барвника понсо 4R, можливі АР.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату; наявність або надмірне виділення мокротиння, зниження мукоциліарної функції (с-м Картагенера, циліарна дискінезія); тяжкі порушення функції печінки та нирок.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	РАПІТУС	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	сироп по 120 мл у фл.	30 мг/5 мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Преноксдіазин (Prenoxidiazine) ****

Фармакотерапевтична група: R05DB18 - протикашльові засоби, за виключенням комбінованих препаратів, які містять експекторанти.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить протикашльову дію за рахунок: локальної анестезуючої дії: знижує збудливість периферичних сенсорних (кашльових) рецепторів; бронхолітичної дії: пригнічує барорецептори, які беруть участь у кашльовому рефлексі; незначного зниження активності дихального центру, але не викликає пригнічення дихання; полегшує дихання та впливає на кількість мокротиння; протикашльовий ефект триває понад 3-4 години

Показання для застосування ЛЗ: г. або хр. кашель, головним чином непродуктивний, будь-якого походження (при бронхіті, трахеїті, плевриті, пневмонії, при СН), медикаментозна підготовка до бронхоскопічного або бронхографічного обстеження; підходить для ослаблення кашлю, який супроводжує захворювання з порушенням дихання та аерації, тому що не втручається у діяльність респіраторного центру.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл. приймати цілими, не розжовуючи та не подрібнюючи, інакше може викликати тимчасове оніміння, нечутливість слизової оболонки рота; середня доза для дорослих - 1 табл. (100 мг) 3 - 4 р/добу, у більш складних випадках доза може бути збільшена до 2 табл. (200 мг) 3 - 4 р/добу або до 3 табл. (300 мг) 3 р/добу; максимальна разова доза для дорослих 3 табл., МДД - 9 табл. (900 мг); діти від 3 до 14 років - середня доза для дітей у залежності від віку та маси тіла, відповідно нижча: від ¼ до ½ табл. 3-4 р/добу (від 3 до 4 разів по 25 або 50 мг); для дітей віком від 3 до 6 років або з масою тіла від 10 до 20 кг: ½ табл. 3 р/добу (3 рази по 50 мг); для дітей віком від 6 до 14 років чи з масою тіла більше 20 кг: ½ табл. 3-4 р/добу (від 3 до 4 разів по 50 мг); максимальна разова доза для дітей ½ табл., МДД - 2 табл. (200 мг); при підготовці до бронхоскопії: 0,9 - 3,8 мг/кг маси тіла призначають у комбінації з 0,5-1 мг атропіну за 1 год до початку проведення процедури.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сухість у роті та горлі, гастралгія, запори, АР, бронхоспазм

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до препарату; захворювання, що супроводжуються значною бронхіальною секрецією, післяопераційні стани (після інгалаційної анестезії).

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЛІБЕКСИН®	ХІНОЇН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд. Підприємство 2 (підприємство Верешедьхаз), Угорщина	табл. у бл.	100 мг	№20x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

4.7.2. Комбіновані протикашльові засоби

Комбіновані засоби представлені широким різноманіттям препаратів. Крім протикашльового компоненту вони можуть містити бронхолітики, деконгестанти, антигістамінні, протикашльові, жарознижуючі, антисептичні компоненти рослинного, мінерального або хімічного походження.

4.8. Антибіотики

(див. також розділ «ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ»)

При інфекційних загостреннях бронхообструктивних захворювань при призначенні антибактеріальної терапії перевагу надавати а/б, що мають високу активність *in vitro* проти основних ймовірних збудників загострення та низький рівень (до 10%) набутої резистентності цих збудників в популяції, утворюють високу концентрацію в слизовій оболонці бронхів і бронхіальному секреті, а також у яких доведена висока клінічна ефективність та безпечність за результатами контрольованих досліджень.

При виборі антибактеріальної терапії орієнтуватися на такі критерії як вік пацієнта, частота загострень впродовж останнього року, наявність супутньої патології та рівень показника ОФВ1.

У хворих до 65 років, з частотою загострення ХОЗЛ менше 4 разів на рік, за відсутності супутніх захворювань і ОФВ1 більше 50 % від належного значення основними збудниками є *H. influenzae*, *S. pneumoniae*, *M. catarrhalis* і атипові м/о. У якості а/б вибору рекомендують амінопеніцилін або макролід, або респіраторний фторхінолон для перорального прийому, який призначається при нефективності β-лактамів і макролідів, або алергії до них.

У пацієнтів старше 65 років, з частотою загострення ХОЗЛ 4 і більше протягом року, з наявністю супутніх захворювань і ОФВ1 в межах 30–50 % від належних значень основними збудниками є *H. influenzae*, представники сімейства *Enterobacteriaceae*, а також *S. pneumoniae*. Тому у якості препаратів вибору повинні застосовуватися захищений амінопеніцилін, або цефалоспорин II покоління, або респіраторний фторхінолон для перорального прийому.

При ОФВ1 менше 30 % від належного значення, частих курсах антибактеріальної терапії (більше 4 разів у рік) і необхідності в постійному прийомі кортикостероїдів причиною загострення ХОЗЛ може бути *P. aeruginosae*. Рекомендується парентеральне застосування фторхінолону II покоління (ципрофлоксацин) або респіраторного фторхінолону левофлоксацину у високій дозі, або β-лактаму з антисиньогнійною активністю в комбінації з аміноглікозидом.

• **Тобраміцин (Tobramycin)**

Фармакотерапевтична група: J01GB01 - АБЗ для системного застосування. Аміноглікозиди

Основна фармакотерапевтична дія: аміноглікозидний а/б, що продукується м/о *Streptomyces tenebrarius*; порушує синтез білків м/о, що призводить до зміни проникності його клітинних мембран, прогресуючого руйнування клітинної оболонки та кінцевої загибелі бактерій; чинить бактерицидну дію у концентраціях, рівних або незначно вищих за інгібуючу концентрацію.

Показання для застосування ЛЗ: тривале лікування хр. інфекції легень, спричиненої бактерією *Pseudomonas aeruginosa*, у дорослих та дітей віком від 6 років з муковісцидозом (кістозним фіброзом)^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н д/інгал.: доза для дорослих і дітей віком від 6 р: 300 мг (1 амп.) 2р/добу (вранці та ввечері) впродовж 28 днів, з інтервалом між прийомами доз у межах 12 год, після 28 днів лікування слід зробити перерву у прийомі препарату впродовж наступних 28 днів, дотримуватися почергових 28-денних циклів активного лікування з подальшою відміною прийому препарату; порошок д/інгал.: доза однакова для всіх пацієнтів незалежно від віку або маси тіла; рекомендоване дозування - 112 мг (4 капс.) /добу, за два прийоми, протягом 28 днів; застосовується послідовними циклами: по 28 днів лікування з інтервалом 28 днів без лікування^{БНФ}; дві дози (по 4 капс. кожна) інгалювати з максимально можливим інтервалом 12 год., але не менше 6 год.; лікування повинне тривати на циклічній основі протягом такого періоду часу, поки включення препарату в схему лікування приносить клінічну користь пацієнтові.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кровохаркання; носова кровотеча, риніт, астма; диспное, дисфонія, продуктивний кашель, кашель, свистяче дихання, хрипи, дискомфорт у ділянці грудної клітки, закладеність носа, бронхоспазм, афонія, зміна кольору слини; втрата слуху та шум у вухах; орофарингеальний біль; блювання, діарея, подразнення у горлі, нудота, дисгевзія, виразки в роті; кістково-м'язовий біль у ділянці грудної клітки; гарячка, біль; мікоз, кандидоз ротової порожнини, головний біль, запаморочення, гіпакузія, нейросенсорна глухота, зниження об'єму форсованого видиху, утруднене дихання, біль у глотці, підвищене слиновиділення, глотит, абдомінальний біль у верхній ділянці, висипання, свербіж, кропив'янка; астения, сухість слизової дихальних шляхів, підвищений рівень трансаміназ, безбарвне мокротиння, інфекції ДШ, міалгія, поліпи у носовій порожнині та запалення середнього вуха; ларингіт, фарингіт, лімфаденопатія, підвищена чутливість, анорексія, сонливість, хвороби вуха, вушний біль, гіпервентиляція, гіпоксія, синусит, біль у спині, слабкість, зниження/погіршення легеневої функції; нездужання.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до тобраміцину і будь-якого аміноглікозидного а/б або до будь-якої з допоміжних речовин; одночасне лікування сильнодіючими діуретиками, наприклад фуросемідом або етакриновою кислотою, які чинять ототоксичну дію.

Визначена добова доза (DDD): інгаляційно (р-н) - 0,3 г., парентерально - 0,24 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БРАМІТОБ	К'езі Фармацеутиці С.п.А. (вторинне пакування, контроль якості та випуск серії)/ Генетік С.п.А. (вир-во за повним циклом)/ Холопак Ферпакунгстехнік ГмбХ (вир-к продукції <i>in-bulk</i> , первинне та вторинне пакування та контроль якості), Італія/ Італія /Німеччина	р-н д/інгал. по 4 мл в амп. у стрипі в кор.	300мг/4мл	№16, №28, №56	відсутня у реєстрі ОБЦ	

ЗОТЕОН ПОДХАЙЛЕР	Новартіс Фармасьютикалс Корпорейшн (вир-во, первинне та вторинне пакування)/ Конафарма АГ (первинне та вторинне пакування (альтернативний завод))/ Новартіс Фарма ГмбХ (випуск серії), Сполучені Штати Америки/ Швейцарія/ Німеччина	пор. д/інгал. тверді капс. у бл. з інгал.	28 мг	№(8x7)x4, №(8x7)x8	відсутня у реєстрі ОВЦ
---------------------	--	---	-------	-----------------------	------------------------

4.9. Антисептичні засоби

- **Декаметоксин (Decamethoxin) **** (див. п. 9.1.4. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: абсцес легенів, бронхоектатична хвороба, кістозна гіпоплазія легенів, ускладнена нагноюванням, хр. бронхіт у фазі загострення.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при абсцесі легенів, бронхоектатичній хворобі, кістозній гіпоплазії легень, ускладнених нагноюванням, хронічному бронхіті у фазі загострення декаметоксин вводять ендобронхіально: ч/з мікротрахеостому по 25 - 50 мл 1-2 р/добу, ч/з трансназальний катетер по 5-10 мл 1 р/добу; методом ультразвукових інгаляцій по 5 - 10 мл 1-2 р/добу; за допомогою лаважу трахеобронхіального дерева в об'ємі 100 мл; тривалість лікування - 2 - 4 тижні.

5. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЛІКУВАННІ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ

- 5.1. Засоби, що застосовуються переважно у лікуванні шизофренії та інших психотичних розладів**
 - 5.1.1. Антагоністи дофамінових 2 (D2) рецепторів**
 - 5.1.2. Антагоністи дофамінових та серотонінових (D2, 5HT2A) рецепторів**
 - 5.1.3. Парціальні антагоністи дофамінових (D2) рецепторів**
- 5.2. Засоби, що застосовуються у лікуванні біполярного афективного розладу та манії**
 - 5.2.1. Мультиmodalьні стабілізатори настрою**
 - 5.2.2. Модулятори потенціал-залежних натрієвих каналів**
 - 5.2.3. Антагоністи потенціал-залежних натрієвих каналів**
- 5.3. Засоби, що застосовуються у лікуванні тривожних розладів**
 - 5.3.1. Позитивні алостеричні модулятори ГАМК-рецепторів (GABA-A)**
 - 5.3.2. Структурні аналоги ГАМК (GABA)**
 - 5.3.3. Парціальні агоністи серотонінових 1A (5HT1A) рецепторів**
 - 5.3.4. Блокатори гістамінових 1 (H1) рецепторів**
 - 5.3.5. Мультиmodalьні протитривожні засоби**
- 5.4. Засоби, що застосовуються у лікуванні порушень сну**
 - 5.4.1. Позитивні алостеричні модулятори ГАМК-A (GABA-A) рецепторів**
- 5.5. Засоби, що застосовуються переважно у лікуванні депресивних розладів**
 - 5.5.1. Неселективні інгібітори зворотного нейронального захоплення моноамінів (серотоніну та норадреналіну) (SERT, NET)**
 - 5.5.2. Селективні інгібітори зворотного нейронального захоплення серотоніну (SERT)**
 - 5.5.3. Селективні інгібітори зворотного нейронального захоплення серотоніну та норадреналіну (SERT, NET)**
 - 5.5.4. Мелатонінергічні мультиmodalьні засоби (Mel1, Mel2), інгібітори серотонінових 2C (5HT2C) рецепторів**
 - 5.5.5. Серотонінергічні мультиmodalьні засоби (SERT, 5HT1A, 5HT3)**
 - 5.5.6. Норадренергічні мультиmodalьні засоби (α 2, NET)**
 - 5.5.7. Антагоністи серотонінових та норадреналінових рецепторів (5HT2A, 5HT2C, 5HT3, α 2)**
 - 5.5.8. Антагоністи серотонінових рецепторів, інгібітори зворотного захоплення серотоніну (5HT2A, SERT)**
- 5.6. Засоби, що застосовуються у лікуванні деменції**
 - 5.6.1. Ацетилхолінові мультиmodalьні засоби, інгібітори ацетилхолінестерази (AChE)**
 - 5.6.2. Антагоністи глутаматергічних NMDA рецепторів (NMDAR)**
- 5.7. Засоби, що застосовуються у лікуванні розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин**
 - 5.7.1. Інгібітори альдегіддегідрогенази (ALDH)**
 - 5.7.2. Антагоністи опіюїдних рецепторів**
 - 5.7.3. Парціальні агоністи опіюїдних рецепторів**
 - 5.7.4. Агоністи опіюїдних рецепторів**
 - 5.7.5. Антидоти**
 - 5.7.6. Агоністи нікотинінових ацетилхолінових рецепторів (nAChR)**

5.7.7. Парціальні агоністи нікотинних ацетилхолінових рецепторів (nAChR)

5.1. Засоби, що застосовуються переважно у лікуванні шизофренії та інших психотичних розладів

5.1.1. Антагоністи дофамінових 2 (D2) рецепторів

- **Галоперидол (Haloperidol) ***

Фармакотерапевтична група: N05AD01 - антипсихотичні засоби, похідні бутирофенону.

Основна фармакотерапевтична дія: антипсихотичний препарат; належить до групи похідних бутирофенону; потужний антагоніст центральних рецепторів дофаміну 2 типу, проявляє низьку альфа-1 адреноблокувальну активність, не має антистамінної або антихолінергічної активності.

Показання для застосування ЛЗ: дорослим, табл. по 1,5мг та 5мг: шизофренія та шизоафективний розлад ^{вооз}; с-м Жилья де ла Туретта ^{БНФ} і тяжкі тики у пацієнтів з тяжкими порушеннями при неефективності педагогічної терапії, психотерапії та інших лікарських засобів; табл. 1,5мг: невідкладна терапія делірію у разі неефективності нефармакологічних методів; лікування маніакальних епізодів помірного та важкого ступеня, пов'язаних з біполярним розладом I типу; лікування стійкої агресії і психотичних симптомів у пацієнтів з помірною та важкою деменцією типу Альцгеймера і судинною деменцією, при неефективності нефармакологічних методів і при наявності ризику заподіяння шкоди собі чи іншим ^{БНФ}; лікування хореї Гентінгтона легкого та помірного ступеня, коли інші лікарські засоби неефективні або погано переносяться; табл. 5мг: інші психози (особливо параноїдальні); манія і гіпоманія ^{вооз, БНФ}; психічні розлади та розлади поведінки (депресія, гіперактивність, схильність до самоскалічення у розумово відсталих пацієнтів та пацієнтів з органічними ураженнями головного мозку) ^{БНФ}; додатковий засіб для короткострокового лікування психомоторного збудження, хвилювання, насильницької чи небезпечно імпульсивної поведінки ^{вооз, БНФ}; неприборкана гикавка; занепокоєння і збудження у пацієнтів літнього віку; р-н д/ін'єк. по 5мг: швидке купірування важкого г. психомоторного збудження, пов'язаного з психотичним розладом або маніакальними епізодами біполярного розладу I типу, у разі неефективності р/ос терапії; невідкладна терапія делірію у разі неефективності нефармакологічних методів; лікування хореї Гентінгтона легкого та помірного ступеня тяжкості, коли інші засоби неефективні або погано переносяться, а р/ос терапія не підходить; профілактика післяопераційної нудоти і блювання у пацієнтів з помірним і високим ризиком, як монотерапія або у складі комбінованої терапії, коли інші засоби неефективні або погано переносяться; комбінована терапія післяопераційної нудоти і блювання, коли інші засоби неефективні або погано переносяться ^{БНФ}; р-н д/ін'єк. по 50мг: підтримувальна терапія шизофренії і шизоафективних розладів у дорослих пацієнтів ^{вооз, БНФ}, стан яких стабілізувався на фоні прийому р/ос галоперидолу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують р/ос та в/м; дозування для всіх показань встановлюється індивідуально з урахуванням віку пацієнта, тяжкості симптомів і попередньої відповіді на нейролептики; табл. 1,5 мг: лікування шизофренії або шизоафективного розладу: р/ос, 2–10 мг/добу; корекцію дози можна проводити кожні 1–7 днів; МДД - 20 мг, але ризики переважають клінічні переваги терапії в більш високих дозах; невідкладна терапія делірію при неефективності нефармакологічних методів: р/ос, 1–10 мг/добу, лікування починати з мінімальної можливої дози, якщо порушення зберігається, дозу збільшувати з інтервалом від 2 до 4 год. до досягнення МДД - 10 мг; лікування маніакальних епізодів помірного та важкого ступеня, пов'язаних з біполярним розладом I типу: р/ос, 2–10 мг/добу, корекцію дози можна проводити кожні 1–3 дні, МДД - 15 мг; лікування г. психомоторного збудження, пов'язаного з психотичним розладом або маніакальними епізодами біполярного розладу I типу: р/ос, 5–10 мг, повторити прийом через 12 год. при необхідності, МДД - 20 мг; лікування стійкої агресії і психотичних симптомів у пацієнтів з помірною та важкою деменцією типу Альцгеймера і судинною деменцією, при неефективності нефармакологічних методів і при наявності ризику заподіяння шкоди собі чи іншим: р/ос, 0,5–5 мг/добу, корекцію дози можна проводити кожні 1–3 дні, доцільність продовження лікування оцінювати не рідше, ніж кожні 6 тижн.; лікування тиків, включаючи с-м Туретта, у пацієнтів з тяжкими порушеннями при неефективності педагогічної терапії, психотерапії та інших ЛЗ: р/ос, 0,5–5 мг/добу, корекцію дози можна проводити кожні 1–7 днів, доцільність продовження лікування оцінювати кожні 6–12 міс.; лікування хореї Гентінгтона легкого та помірного ступеня, коли інші лікарські засоби неефективні або погано переносяться: р/ос, 2–10 мг/добу, корекцію дози можна проводити кожні 1–3 дні; табл. 5 мг: як нейролептик для лікування шизофренії, психозу, манії та гіпоманії та інших розладів у пацієнтів з органічними ураженнями головного мозку: г. фаза - від 2 до 20мг/добу, хр. фаза - 1–3мг за 3 прийоми ^{БНФ}; купірування психомоторного збудження при наявності розладів мислення або поведінки (агресія, гіперактивність, самоскалічення) у розумово відсталих пацієнтів та у пацієнтів з органічним ураженням головного мозку, насильницькою чи небезпечно імпульсивною поведінкою, синдромом Жилья де ла Туретта з тяжкими тиками, неприборканою гикавкою: г. фаза - при помірній симптоматиці по 1,5–3мг 2-3 р/добу ^{БНФ}, при тяжкій симптоматиці/резистентні пацієнти: 3–5мг 2-3 р/добу; хр. фаза - 0,5–1мг 3 р/добу, для підтримання відповіді дозу можна збільшити до 2–3 мг 3 р/добу; після досягнення задовільного контролю симптомів дозу поступово зменшити до мінімальної ефективно підтримувальної дози – 5–10мг/добу, уникати швидкого зниження дози; занепокоєння і збудження у пацієнтів літнього віку: розпочинати з половини початкової дози для дорослих, у разі необхідності титрувати дозу до досягнення ефекту; при переході з в/м галоперидолу на р/ос прийом, почати приймати в тій самій дозі (коефіцієнт перерахунку дози 1:1) з подальшим корегуванням дози відповідно до клінічної відповіді; р-н д/ін'єкц. по 5мг призначати дорослим у мінімальній клінічно ефективній дозі; швидке купірування важкого г. психомоторного збудження, пов'язаного з психотичним розладом або маніакальними епізодами біполярного розладу I типу, у разі неефективності р/ос терапії: в/м, 5мг, можна повторювати щогодини до досягнення контролю симптомів, у більшості пацієнтів достатній ефект досягається при дозі до 15мг/добу; МДД - 20мг; невідкладна терапія делірію у разі неефективності нефармакологічних методів: в/м, 1-10мг, лікування починати з мінімальної можливої дози, якщо порушення зберігається, дозу збільшувати з інтервалом 2-4 год. до досягнення МДД - 10мг; лікування хореї Гентінгтона легкого та помірного ступеня тяжкості, коли інші засоби неефективні або погано переносяться, а р/ос

терапія не підходить: в/м, 2–5мг, можна повторювати щогодини до досягнення контролю симптомів або до досягнення МДД - 10мг; профілактика післяопераційної нудоти і блювання у пацієнтів з помірним і високим ризиком (як монотерапія або у складі комбінованої терапії, коли інші лікарські засоби неефективні або погано переносяться): в/м, 1–2 мг при індукції або за 30 хв до закінчення анестезії; комбінована терапія післяопераційної нудоти і блювання, коли інші засоби неефективні або погано переносяться: в/м, 1–2 мг^{БНФ}; р-н д/ін'єкц. по 50мг: початкову дозу галоперидолу деканоату встановлювати виходячи з кратного збільшення добової дози р/ос галоперидолу; перехід від р/ос галоперидолу вводити галоперидол деканоат в 10–15-кратній добовій дозі р/ос галоперидолу, що становитиме 25-150мг; продовження лікування: збільшувати дозу галоперидолу деканоату на 50мг 1 р/4 тижн. до досягнення оптимального терапевтичного ефекту; найбільш ефективна доза - 50-200мг, при необхідності введення доз вище 200мг 1 р/4 тижн. оцінити індивідуальне співвідношення користі/ризик, не можна перевищувати максимальну дозу 300мг 1 р/4 тижн.; інтервал між ін'єк. - 4 тижн.; при додатковому застосуванні в іншій лікарській формі - сумарна загальна доза не повинна перевищувати 20мг/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: лейкопенія; гіперчутливість; гіперпролактинемія; ажитація, безсоння, психотичні розлади, депресія, сплутаність свідомості, втрата/зниження лібідо, неспокій; екстрапірамідні розлади, гіперкінезія, головний біль, пізня дискінезія, акатизія, брадикінезія, дискінезія, дистонія, гіпокінезія, гіпертонія, запаморочення, сонливість, тремор, судоми, паркінсонізм, седація, мимовільні скорочення м'язів, злоякісний нейролептичний с-м, моторна дисфункція, ністагм; окулологічний криз, порушення зору, розпливчатість зору; тахікардія; артеріальна чи ортостатична гіпотензія; задишка, бронхоспазм; блювання, нудота, запор, сухість у роті, підвищене слиновиділення; відхилення від норми функціональних проб печінки, гепатит, жовтяниця; висип, р-ція фоточутливості, кропив'янка, свербіж, гіпергідроз; кривошия, ригідність м'язів, спазми м'язів, скутість опорно-рухового апарату, тризм, посипування м'язів; затримка сечі; еректильна дисфункція, аменорея, галакторея, дисменорея, біль у молочних залозах, дискомфорт у молочних залозах, менорагія, порушення менструального циклу, сексуальна дисфункція; гіпертермія, набряк, порушення ходи, збільшення/ зменшення маси тіла; подовження інтервалу QT на ЕКГ; частота невідома - агранулоцитоз, нейтропенія, панцитопенія, тромбоцитопенія; анафілактичні р-ції; порушення секреції антидіуретичного гормону; гіпоглікемія; акінезія, ригідність за типом «зубчастого колеса», маскоподібне обличчя; фібриляція шлуночків, тахікардія типу «пірует», шлуночкова тахікардія, екстрасистолія; набряк гортані, ларингоспазм; г. печінкова недостатність, холестаза; ангіоневротичний набряк, ексфолиативний дерматит, лейкоцито-кластичний васкуліт; рабдоміоліз; с-м відміни у новонароджених; пріапізм, гінекомастія; раптова смерть, набряк обличчя, гіпотермія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до галоперидолу або до допоміжних реч-н ЛЗ; кома; пригнічення ЦНС; хвороба Паркінсона; деменція з тільцями Леві; прогресуючий супрануклеарний параліч; подовжений інтервал QTс або вроджений с-м подовженого інтервалу QT; нещодавно перенесений г. ІМ, декомпенсована СН, шлуночкова аритмія або поліморфна шлуночкова тахікардія типу «пірует» в анамнезі; некомпенсована гіпокаліємія; одночасне застосування ЛЗ, що спричиняють подовження інтервалу QT.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 8 мг., перорально - 8 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	ГАЛОПРИЛ	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	табл. у бл. у кор.	1,5мг	№100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГАЛОПРИЛ	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	табл. у бл. у кор.	1,5мг	№50	4,38	
	ГАЛОПРИЛ	ТОВ "Харківське фармацевтичне п-во "Здоров'я народу" (всі стадії вир-ва, контр. якості, випуск серії)/ ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, ко, Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у кор. та бл.	5 мг/мл	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГАЛОПРИЛ	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, ко, Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у кор. та бл.	5 мг/мл	№10	20,19	
	ГАЛОПРИЛ	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у кор. та бл.	5 мг/мл	№5x2	20,19	

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	КЛОПІКСОЛ	Х. Лундбек А/С (виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування, випуск серій)/Еурофінс Біофарма Продакт Тестінг Денмарк А/С (випробування за показником "мікробіологічна чистота"), Данія/Данія	табл., вкриті п/о у конт.	2мг	№100	24,78	29,27/€
	КЛОПІКСОЛ	Х. Лундбек А/С (вир-во нерозфас. прод., перв. та втор. пак., випуск серій)/Еурофінс Біофарма Продакт Тестінг Денмарк А/С (випробування за показником "мікробіолог. чистота" Данія	табл., вкриті п/о у конт.	10мг	№100	7,70	29,27/€
	КЛОПІКСОЛ ДЕПО	Х. Лундбек А/С (вир-во нерозфас. прод., перв. та втор. пак., випуск серій)/Еурофінс Біофарма Продакт Тестінг Денмарк А/С (випробування за показником "мікробіологічна чистота" (тест на ендотоксини))/Ей. Джей. Ваксінс А/С, Данія	р-н д/ін'ек., .по 1мл в амп. у кор.	200 мг/мл	№10	8,11	29,27/€
	КЛОПІКСОЛ-АКУФАЗ	Х. Лундбек А/С (вир-во нерозфас. прод., перв. та втор. пак., випуск серій)/Еурофінс Біофарма Продакт Тестінг Денмарк А/С (випробування за показником "мікробіологічна чистота" (тест на ендотоксини))/Ей. Джей. Ваксінс А/С, Данія	р-н д/ін'ек., .по 1мл в амп. у кор.	50 мг/мл	№10	43,54	29,27/€

• **Левомепромазин (Levomepromazine)**

Фармакотерапевтична група: N05AA02 - антипсихотичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: нейролептик фенотіазинового ряду, аналог хлорпромазину з більш вираженою пригнічувальною дією на психомоторну активність; блокує допамінові рецептори у таламусі, гіпоталамусі, ретикулярній і лімбічній системах, пригнічує сенсорну систему, зменшує рухову активність і виявляє виражений седативний ефект; чинить антагоністичну дію й на інші нейромедіаторні системи (норадреналіну, серотоніну, гістаміну, ацетилхоліну); виявляє протиблювальну, антигістамінну, антиадренергічну та антихолінергічну дію; екстрапірамідні побічні ефекти менш виражені, ніж у нейролептиків; потужний антагоніст α -адренорецепторів, але холіноблокуюча дія не значна; збільшує больовий поріг (аналгетична активність подібна до морфіну) і виявляє амнестичні ефекти; ад'ювантний засіб при інтенсивному хр. і г. болю.

Показання для застосування ЛЗ: г. психотичні стани, що супроводжуються психомоторним збудженням та сильною тривою: г. напади шизофренії^{БНФ}, інші тяжкі психотичні стани; ад'ювантна терапія при хр. психозах: хр. шизофренія, хр. галюцинаторні психози.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос, в/м чи в/в; початкова р/ос доза - 25-50 мг/добу^{БНФ}, дозу збільшують до 150-250 мг/добу за 2-3 прийоми на добу, максимальну частину добової дози приймати перед сном, МДД - 250 мг; парентеральне введення показане у випадках, коли р/ос застосування неможливе; при в/в застосуванні р-н розвести і вводити повільно у вигляді крап. інфузії (50-100 мг левомепромазину в 250 мл 0,9 % р-ні натрію хлориду або 5 % р-ну глюкози); лежачим хворим^{БНФ} - 75-100 мг/добу^{БНФ} (за 2-3 прийоми^{БНФ}) під контролем АТ та ЧСС. При в/м застосуванні вводити глибоко у м'яз; максимальний аналгетичний ефект після в/м введення розвивається протягом 20-40 хв і триває майже 4 год.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: постуральна гіпотензія, слабкість, запаморочення, непритомність, тахікардія, с-м Адамса-Стокса, подовження інтервалу QT (проаритмогенний ефект, аритмія torsades de pointes); злюкисний нейролептичний с-м; серцеві напади, що можуть призводити до раптової смерті; панцитопенія, агранулоцитоз, лейкопенія, еозинофілія, тромбоцитопенія; венозна тромбоемболія (вкл. емболію

легень і тромбоз глибоких вен); гіперглікемія, с-м відміни у новонароджених; дезорієнтація, сплутаність свідомості, зорові галюцинації, нерозбірливе мовлення, екстрапірамідні с-ми (дискінезія, дистонія, паркінсонізм, опістотонус, гіперрефлексія), епілептичні напади, підвищення внутрішньочерепного тиску, реактивація психотичних симптомів, кататонія; галакторея, порушення менструального циклу, зменшення маси тіла; аденома гіпофіза; знебарвлення сечі, утруднення сечовипускання, хаотичне скорочення матки; пріапізм; сухість у роті, абдомінальний дискомфорт, нудота, блювання, запор, розвиток паралітичної кишкової непрохідності, ураження печінки (жовтяниця, холестааз); некротизуючий ентероколіт, що може бути летальним; фоточутливість, еритема, кропив'янка, пігментація, ексфолиативний дерматит; помутніння кришталіка та рогівки, пігментна ретинопатія; набряк гортані, периферичний набряк, анафілактоїдні р-ції, астма; гіпертермія, аритмія, непереносимість глюкози, недостатність вітамінів, тепловий удар у гарячих і вологих приміщеннях.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до фенотіазинів або до будь-якого іншого компонента ЛЗ; одночасне лікування іншими антигіпертензивними ЛЗ, інгібіторами MAO або з депресантами ЦНС (алкоголь, засоби для загальної анестезії, снодійні засоби); закритокутова глаукома; затримка сечі; хвороба Паркінсона, розсіяний склероз; астенічний бульбарний параліч (myasthenia gravis), геміплегія; тяжка кардіоміопатія (циркуляторна недостатність); тяжка ниркова або печінкова недостатність; клінічно значуща гіпотензія; захворювання органів кровотворення; порфірія; вагітність (I триместр) та годування груддю; дитячий вік до 12 років.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0.3 г., парентерально - 0.1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ТИЗЕРЦИН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл., вкриті п/о у фл.	25мг	№50	28,16	27,16/\$
	ТИЗЕРЦИН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	р-н д/ін'єк., по 1мл в амп. у конт. чар/уп.	25 мг/мл	№5x2	48,89	27,16/\$

• Сульпірид (Sulpiride)

Фармакотерапевтична група: N05AL01 - антипсихотичні ЛЗ.

Основна фармакотерапевтична дія: впливає на допамінергічну нервову передачу в головному мозку як допаміноміметик, чинить активуючу дію у низьких дозах; у більш високих дозах також зменшує продуктивну симптоматику.

Показання для застосування ЛЗ: табл. по 200мг, р-н для ін'єкц.: короткотривале лікування г. та хр. психічних розладів (шизофренія^{БНФ}, хр. делірій нешизофренічного характеру: параноїдальний делірій, хр. галюцинаторний психоз); табл. 50мг, 100мг та капс.50 мг: короткотривале симптоматичне лікування тривожних станів у дорослих, коли звичайні терапевтичні заходи не дали результатів; серйозні поведінкові розлади (ажитація, самопошкодження, стереотипія) у дітей віком від 6 років, особливо у пацієнтів з аутичними с-ми.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос та в/м; табл. (по 50мг, 100мг) та капс.: дорослим при короткотривалому симптоматичному лікуванні тривожних станів, коли звичайні терапевтичні заходи не дали результатів: добова доза - 50-150мг протягом не більше 4 тижнів; дітям від 6 років, при серйозних поведінкових розладах (збудження, самопошкодження, стереотипія), особливо у пацієнтах з аутичними с-ми: 5мг/кг/добу (дозу можна збільшити до 10мг/кг/добу); табл. (по 200мг): призначати мінімальну ефективну дозу; добова доза в табл. 200-1000мг; р-н д/ін'єк.: якщо клінічний стан пацієнта дозволяє, лікування розпочинати з низької дози, після чого поступово титрувати дози, добова доза 400-800мг протягом 2 тижнів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: лейкопенія, гіперпролактинемія; безсоння, заспокійливий ефект, сонливість, паркінсонізм, тремор, гіпертонус, гіпокінезія, гіперсалівація, акінетичні симптоми з/без гіпертонусу, гіперкінетична-гіпертонічна, збудлива рухова активність, акатизія, дискінезія, дистонія, окулогірний криз, судоми, збентеженість, шлуночкові аритмії (пароксизмальна шлуночкова тахікардія типу «пірует»), фібриляція шлуночків, зупинка серця, ортостатична артеріальна гіпотензія, венозна тромбоемболія (емболія легеневої артерії, тромбоз глибоких вен), підвищення АТ; гіперсекреція слини; збільшення активності ферментів печінки, макулопапулярний висип, галакторея, аменорея, імпотенція, фригідність; збільшення маси тіла; нейтропенія, агранулоцитоз, анафілактичні реакції, кропив'янка, анафілактичний шок, сплутаність свідомості, зловісний нейролептичний с-м, подовження QT-інтервалу, раптова смерть, с-м відміни у новонароджених, гінекомастія, гіпонатріємія, с-м недостатньої секреції антидіуретичного гормону, аспіраційна пневмонія (переважно у разі одночасного застосування сульпіриду з іншими препаратами, що пригнічують ЦНС), запор, гепатоцелюлярне, холестатичне або змішане ураження печінки, збільшення маси тіла, задишка, гіпотензія,

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до сульпіриду або будь-якої з допоміжних речовин ЛЗ; пролактинзалежні пухлини (пролактинсекретуюча аденома гіпофіза - пролактинома та рак молочної залози); відомий або підозрюваний діагноз феохромоцитомі; г. порфірія; комбінації з неантипаркінсонічними агоністами допаміну (каберголін, ротиготин і кинаголід), комбінації з леводопою або антипаркінсонічними лікарськими засобами (включаючи ропінол), комбінації з мехітазином, циталопрамом та есциталопрамом, гідроксизиним, домперидоном та піперазином.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,8 г., парентерально - 0,8 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	СУЛЬПІРИД-ЗН	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство"	табл. у бл.	200мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

		"Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна					
	СУЛЬПІРИД-ЗН	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл. у бл.	200мг	№10x1	40,69	
	СУЛЬПІРИД-ЗН	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	табл. у бл.	50мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СУЛЬПІРИД-ЗН	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	табл. у бл.	50мг	№10x3	45,34	
	СУЛЬПІРИД-ЗН	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна	р-н д/ін'ек. по 2мл в амп. у бл.	50 мг/мл	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СУЛЬПІРИД-ЗН	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна	р-н д/ін'ек. по 2мл в амп. у бл.	50 мг/мл	№5x2	135,19	
	СУЛЬПІРИД-ЗН	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна	р-н д/ін'ек. по 2мл в амп. у кор.	50 мг/мл	№10	135,19	
II.	БЕТАМАКС	АТ "Гріндекс", Латвія	табл., вкриті п/о у конт.	50мг	№30	51,62	35,04/€
	БЕТАМАКС	АТ "Гріндекс", Латвія	табл., вкриті п/о у конт.	100мг	№30	34,76	35,04/€
	БЕТАМАКС	АТ "Гріндекс", Латвія	табл., вкриті п/о у конт.	200мг	№30	23,16	35,04/€
	БЕТАМАКС	АТ "Гріндекс", Латвія	табл. у бл. в пач.	200мг	№10x3	21,05	26,85/€
	БЕТАМАКС	АТ "Гріндекс", Латвія	табл. у бл. в пач.	50мг	№10x3	50,84	34,51/€
	БЕТАМАКС	АТ "Гріндекс", Латвія	табл. у бл. в пач.	100мг	№10x3	31,58	26,85/€
	ЕГЛОНІЛ®	ДЕЛЬФАРМ ДІЖОН, Франція	табл. у бл. в кор.	200мг	№12x1	40,61	27,17/\$
	ЕГЛОНІЛ®	ДЕЛЬФАРМ ДІЖОН, Франція	капс. у бл.	50мг	№15x2,	відсутня у реєстрі	

					№30x1	ОВЦ
ЕГЛОНІЛ®	ДЕЛЬФАРМ ДІЖОН, Франція	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у конт. чар. в кор.	100мг/2мл	№6	212,32	27,17/\$
РЕСТФУЛ	БРОС ЛТД, Греція	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у бл. в кор.	100мг/2мл	№6x5	153,38	28,33/€
РЕСТФУЛ	БРОС ЛТД, Греція	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у бл. в кор.	100мг/2мл	№6x1	163,96	28,33/€
СУЛЬПІРИД	ТОВ Тева Оперейшнз Поланд, Польща	капс. тверді .у бл.	50мг, 100мг	№12x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
СУЛЬПІРИД	ТОВ Тева Оперейшнз Поланд, Польща	табл. у бл.	200мг	№12x1, №15x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Тіорідазин (Thioridazine)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: N05AC02 - антипсихотичні засоби; піперидинові похідні фенотіазину.

Основна фармакотерапевтична дія: нейролептик; піперидинове похідне фенотіазину; чинить слабку антипсихотичну, антиаутичну та слабку антидепресивну дію; не чинить активізуючої дії; впливає на ЦНС та периферичну НС; чинить пригнічуючу дію на стовбур мозку, меншою мірою - на кору мозку; периферично чинить α-адренолітичну, антигістамінну та холінолітичну дію; не спричиняє противоблювальної дії, спричиняє менше екстрапірамідних порушень, ніж інші нейролептики; не пригнічує внутрішню моторну активність.

Показання для застосування ЛЗ: психічні та емоційні порушення, що супроводжуються страхом, тривожністю, збудженням; у психіатричній практиці - г. та підгостра шизофренія, органічні психози, психомоторне збудження, маніакально-депресивні стани ^[ПМД], неврози, с-м алкогольної абстиненції, психічні розлади поведінки дітей, збуджений стан у пацієнтів літнього віку.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Добову дозу розподіляти на 2-4 прийоми та встановлювати в індивідуальному порядку; дорослі та підлітки: психічні та емоційні розлади (шизофренія, маніакальні психози та подібні стани) - 150 - 600 мг/добу; для г. шизофренії початкова доза - 200 мг; у резистентних пацієнтів під контролем лікаря підвищувати дозу до 800 мг/добу протягом курсу лікування, але не більше 4 тижнів; добова доза в амбулаторних умовах при психозах - 50 - 300 мг, при депресіях та при призначенні пацієнтам літнього віку - 25 - 200 мг, при алкогольній абстиненції - 100-200 мг, при тяжких порушеннях психіки непсихотичного характеру - 25 - 150 мг; як седативний засіб та транквілізатор дорослим у добовій дозі 10 - 75 мг; звичайні дози для застосування у педіатрії: дітям віком 5 - 12 років - 0,25 - 3 мг/кг/добу, розподілені на 2 - 4 прийоми; тяжкі розлади: по 25 мг 2 - 3 р/добу; МДД - 300 мг; при дозуванні не кратному 25 мг застосовувати у відповідних лікарських формах та дозуваннях.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сонливість, загальмованість; псевдопаркінсонізм, сплутаність свідомості, гіперактивність, летаргія, психотичні р-ції, емоційна неврівноваженість, головний біль, безсоння, емоційні порушення, порушення терморегуляції, зниження судомного порогу, непритомність, затуманення зору, закладеність носа, блідість, міоз, позіхання, емоційне збудження, порушення зору; галакторея, збільшення молочних залоз, набряки; артеріальна гіпотензія, тахікардія, відчуття серцебиття, подовження інтервалу QT, аритмії за типом torsade de pointes, інші зміни ЕКГ (подовження інтервалу QT, депресія або інверсія зубця Т, роздвоєння зубця Т чи U), поліморфна шлуночкова тахікардія і раптовий летальний наслідок; гіпосалівація, підвищення апетиту, диспепсія, збільшення маси тіла, гіпертрофія сосочків язика, сухість у роті, нудота, блювання, діарея, запор, анорексія, паралітична кишкова непрохідність; шкірні висипання, еритема, кропив'янка, екзофоліативний та контактний дерматит, меланоз шкіри, р-ції фоточутливості; агранулоцитоз, лейкопенія, еозинofilія, тромбоцитопенія, апластична анемія, панцитопенія, гранулоцитопенія; АР, гарячка, набряк гортані, ангіоневротичний набряк, бронхоспастичний с-м, закладеність носа, астма, шкірні АР; холестатична жовтяниця, застій жовчі; акатизія, ажитація, рухове збудження, дистонічні р-ції, тризми, кривошия, опістотонус, окулогірні кризи, тремор, ригідність м'язів; акінезія, пізня дискінезія; злоякісний нейролептичний с-м (гіперпірексія, ригідність м'язів, порушення мислення, свідомості, вегетативні розлади); порушення менструального циклу, зміни лібідо, гінекомастія, лактація, збільшення маси тіла, набряки, хибні позитивні тести на вагітність; затримка сечовипускання, нетримання сечі, зниження лібідо, порушення еякуляції, дисменорея, гіперпролактинемія, гінекомастія, парадоксальна ішурія, дизурія, пріапізм; гіперпірексія, рідкісні випадки набряку слинних залоз; парадоксальна реакція, поведінкові розлади, що включають збудження, дивні сні, посилення психозу, порушення свідомості внаслідок токсичного впливу, прогресуюча пігментація зони шкіри чи кон'юнктиви з чи без зміни кольору склери і рогівки, непрозорість передньої поверхні кришталика ока, системний червоний вовчак.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до похідних фенотіазину або до будь-якого компонента ЛЗ; клінічно важливі порушення серця (СН, стенокардія, кардіоміопатія або дисфункція лівого шлуночка) - с-м подовженого інтервалу QTс, сімейний анамнез с-му подовженого інтервалу QTс; конкурентне використання ЛЗ, які здатні подовжувати інтервал QTс; шлуночкова аритмія, у т.ч. в анамнезі, брадикардія, СА або AV блокада провідності II або III ступеня, незкоригована гіпокаліємія або гіпомангіємія; серцева аритмія в анамнезі, тяжка артеріальна гіпотензія, феохромоцитома, порфірія, захворювання крові (гіпо- та апластичні процеси), одночасне застосування з флуоксетином, пароксетином, пропранололом, піндололом, флувоксаміном, генетичні порушення, що призводять до зниження рівня активності P450 2D6; тяжка фоточутливість, тяжкі

депресивні стани, коматозні стани будь-якої етіології, деменція, ЧМТ, прогресуючі системні захворювання головного і спинного мозку.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	СОНАПАКС® 10 МГ	Фармзавод Єльффа А.Т., Польща	табл., в/о у бл.	10мг	№30x2	119,00	
	СОНАПАКС® 25 МГ	Фармзавод Єльффа А.Т., Польща	табл., в/о у бл.	25мг	№20x3	81,00	

• **Трифлуоперазин (Trifluoperazine)**

Фармакотерапевтична група: N05AB06 - антипсихотичні засоби; піперазинові похідні фенотіазину.

Основна фармакотерапевтична дія: антипсихотичний засіб (нейролептик), піперазинове похідне фенотіазину, має антипсихотичну, седативну, протиблювотну, каталептичну, гіпотензивну, гіпотермічну та слабку холіноблокуючу дію, спрямовану проти гикавки; антипсихотична дія пов'язана із блокадою D2-дофамінових рецепторів мезолімбічної та мезокортикальної систем, блокадою α-адренорецепторів у ЦНС, підвищенням вивільнення гормонів гіпоталамусу та гіпофізу; седативна дія розвивається внаслідок блокади адренорецепторів ретикулярної формації стовбура головного мозку; протиблювотна дія пов'язана із блокадою периферичних і центральних D2-дофамінових рецепторів, блокадою закінчень блукаючого нерва в ШКТ; гіпотермічна дія розвивається за рахунок блокади дофамінових рецепторів гіпоталамусу; седативна дія та вплив на ВНС виражене слабше, ніж в інших похідних фенотіазину, екстрапірамідна та протиблювотна дія - сильніше.

Показання для застосування ЛЗ: психотичні розлади, шизофренія^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/м та внутрішньо р/ос; початкова доза для парентерального введення для дорослих - 1-2 мг; повторно через 4-6 год; добова доза - 6 мг^{БНФ}, у виняткових випадках - 10 мг; термін лікування не має перевищувати 12 тижнів; р/ос разова доза для дорослих на початку лікування - 5 мг^{БНФ}, поступово збільшують на 5 мг на прийом, до добової дози 30-80 мг (в окремих випадках - до 100-120 мг); добову дозу ділять на 2-4 прийоми; після досягнення ефекту оптимальні дози призначають протягом 1-3 міс., а потім повільно зменшують до 5-20 мг/добу; останні дози надалі застосовують як підтримуючі; МДД для дорослих - 100-120 мг; терміни р/ос лікування становлять 3-9 міс. і більше.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: парез акомодатії, ретинопатія, помутніння кристалика та рогівки, порушення зорового сприйняття, кон'юнктивіт, сухість у роті, гіперсалівація, анорексія, булімія, нудота, блювання, діарея, запор, гастралгія, парез кишечника, трим, протрузія язика, холестатична жовтяниця, гепатотоксичність, гепатит, зниження потенції, порушення еякуляції, пріапізм, затримка сечі, олігурія, порушення сечовиділення, гіпо- або гіперглікемія, глюкозурія, порушення менструального циклу (дисменорея, аменорея), гінекомастія, збільшення маси тіла, галакторея, біль у грудях, порушення лібідо, гіперпролактинемія, головний біль, сонливість, запаморочення, млявість, безсоння, акатизія, дистонічні екстрапірамідні реакції, псевдопаркінсонізм, пізня дискінезія, пізня дисамнезія, злоякісний нейролептичний с-м, явища психічної індіферентності, запізніла реакція на зовнішні подразники, акінетико-ригідні явища, гіперкінези, тремор, вегетативні порушення, пізня дискінезія лицьових м'язів, дистонія, порушення терморегуляції, підвищена втомлюваність, порушення свідомості, ригідність м'язів, судоми, тахікардія, зниження АТ (ортостатична гіпотензія), порушення ритму серця, зміни ЕКГ (подовження інтервалу QT, згладжування зубця Т), напади стенокардії, шлуночкова аритмія на зразок torsades de pointes, зупинка серця, тромбоцитопенія, агранулоцитоз, анемія (гемолітична, апластична), панцитопенія, лейкопенія, тромбоцитопенічна пурпура, еозинофілія, АР, включаючи висипання, кропив'янку, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок, фотодермія, почервоніння шкіри, депігментація шкіри, ексфоліативний дерматит, міастенія, слабкість, набряки, хибно-позитивні тести на вагітність, фенілкетонурія, гіпотермія, нічні жахи, депресія, гіперхолестеринемія, гіперпірексія, набряк мозку, генералізовані та парціальні судоми, подовження дії на ЦНС опіатів, анальгетиків, антигістамінних, барбітуратів, алкоголю, атропіну, тепла, фосфорорганічних інсектицидів, закладеність носа, адинамічна кишкова непрохідність, атонія кишечника, міоз, мідріаз, реактивація психотичних процесів, кататонічноподібні стани, порушення функції печінки, жовтяниця, біліарний стаз, іррегулярні менструації, свербіж, екзема, астма, епінефриновий ефект, збільшення апетиту, вовчакоподібний с-м, пігментація шкіри, епітеліальна кератопатія, лентикулярні та корнеальні відкладення, раптовий летальний наслідок, асфіксія, реакції у місці введення, включаючи біль і подразнення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до компонентів ЛЗ, інших ЛЗ фенотіазинового ряду, декомпенсована СН, виражена артеріальна гіпотензія, депресія ЦНС, кома будь-якої етіології, прогресуючі системні захворювання головного та спинного мозку, стенокардія, рак молочної залози, закритокутова глаукома, функціональна ниркова та печінкова недостатність, пошкодження печінки, виразкова хвороба шлунка та ДПК у період загострення, епілепсія, хв. Паркінсона, порушення механізму центральної регуляції дихання (особливо у дітей), с-м Рейє, кахексія, феохромоцитома, пролактинзалежна пухлина, мікседема, гіперплазія передміхурової залози, патологічні зміни крові, пов'язані з порушенням кровотворення, період вагітності або годування груддю, табл.: вік від 60 років.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 8 мг., перорально - 20 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ТРИФТАЗИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'ек. по 1мл в амп. у конт. чар/уп.	2 мг/мл	№5x2	22,28	
	ТРИФТАЗИН-	Товариство з обмеженою	табл., вкриті	5мг	№10x5,		відсутня у реєстрі

ЗДОРОВ'Я	відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	п/о у бл. в кор. та без		№50x1	ОВЦ
ТРИФТАЗИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№50	7,94

• **Флюпентиксол (Flupentixol)**^{ПМД}

Фармакотерапевтична група: N05AF01 - психолептичні засоби, антипсихотичні засоби, похідні тіоксантену, флюпентиксол.

Основна фармакотерапевтична дія: нейролептик з групи тіоксантену; суміш двох геометричних ізомерів, активного циз(Z)-флюпентиксолу і транс(E)-флюпентиксолу; циз(Z)-флюпентиксол має високу спорідненість з обома дофаміновими D₁ і D₂-рецепторами; має високу спорідненість з α₁-адренорецепторами і 5HT₂-рецепторами; не має спорідненості з холінергічними мускариновими рецепторами; виявляє слабкі антигістамінергічні властивості і не чинить блокуючої дії на α₂-адренорецептори; має широкий спектр активності, що залежить від дози: у низьких дозах (1-2 мг/день) спричиняє антидепресивний, анксиолітичний та активуючий ефект, у середніх дозах (3-25 мг/день) - призначають для лікування г. і хр. психозів; має розгальмовуючі (антиаутистичні і активуючі) властивості, підвищує настрої.

Показання для застосування ЛЗ: депресія^{БНФ}, які супроводжуються тривожністю, астеною та втратою ініціативи; хр. невротичні розлади, що супроводжуються тривожністю, депресією та бездіяльністю; психосоматичні розлади з астеничними реакціями; шизофренія та інші психози^{БНФ} особливо з такими симптомами, як галюцинації, марення та порушення мислення, ускладнені апатією, анергією, пригніченим настроєм та усамітненням.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос: для лікування дорослих з депресіями, хр. невротичними та психосоматичними розладами - спочатку 1 мг/добу як разова доза вранці або по 0,5 мг 2 р/добу; ч/з тиждень дозу підвищити до 2 мг/добу, якщо клінічна реакція є недостатньою; щоденну дозу, більшу за 2 мг, окремими дозами, максимум до 3 мг; для лікування шизофренії та інших психотичних розладів дози визначаються індивідуально, відповідно до стану пацієнта - спочатку 3 - 15 мг/добу, за 2 або 3 прийоми, підвищуючи при необхідності до 40 мг/добу; підтримуюча доза - 5 - 20 мг/добу, одноразово вранці щодня; в/м введення: при підтримуючому лікуванні діапазон дозувань - 20-40 мг (1- 2 мл) кожні 2-4 тижні; при переході з лікування р/ос на підтримуюче в/м лікування керуватись схемою: р/ос добова доза (мг) x 4 = доза(мг) в/м кожні 2 тижні, р/ос добова доза (мг) x 8 = добова доза (мг) в/м кожні 4 тижні; продовжувати приймати р/ос флюпентиксол 1-й тижд. після першої ін'єкц., але у зменшеній дозі; наступні дози та інтервали між ін'єкціями встановлювати відповідно до реакції пацієнта.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тахікардія, посилене серцебиття, подовження інтервалу QT на ЕКГ, тромбоцитопенія, нейтропенія, лейкопенія, агранулоцитоз, сонливість, акатизія, гіперкінезія, гіпокінезія, тремор, дистонія, запаморочення, головний біль, погіршення здатності до концентрації уваги, дискінезія, паркінсонізм, розлади мовлення, судоми, пізня дискінезія, злоякісний нейролептичний с-м, порушення акомодатії, зору, рухи очей, задишка, сухість у роті, гіперсекреція слини, запор, блювання, диспепсія, діарея, абдомінальний біль, нудота, метеоризм, розлади сечовипускання, затримка сечі, с - м відміни у новонароджених, гіпергідроз, свербіж, висипання, реакції фоточутливості, дерматит, міалгія, м'язова ригідність, гіперпролактинемія, посилений апетит, збільшення маси тіла, знижений апетит, гіперглікемія, порушення толерантності до глюкози, артеріальна гіпотензія, припливи, венозний тромбоемболізм, астения, підвищена втомлюваність, гіперчутливість, анафілактична реакція, порушення функціональних тестів, жовтяниця, відсутність еякуляції, еректильна дисфункція, гінекомастія, галакторея, аменорея, безсоння, депресія, нервозність, збудження, зниження лібідо, сплутаність свідомості, суїцидальні думки та поведінка, розвиток екстрапірамідних симптомів, особливо у початковій фазі терапії.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату, важка депресія, що вимагає електрошокової терапії або госпіталізації; стани емоційної схвильованості або гіперактивності, в тому числі манія, циркуляторний колапс, пригнічення ЦНС будь-якого походження (наприклад, внаслідок дії алкоголю, барбітуратної або опіоїдної інтоксикації), кома; не рекомендований до застосування у легко збудливих пацієнтів та у пацієнтів у стані нервового збудження.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 6 мг., парентерально (депо) - 4 мг

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ФЛЮАНКСОЛ	Х. Лундбек А/С (вир-во нерозфас. прод., перв. та втор. пак., випуск серій)/Еурофінс Біофарма Продакт Тестінг Денмарк А/С (випроб. за показником «мікробіологічна чистота»), Данія	табл., вкриті п/о у конт.	0,5мг	№100	27,47	29,27/€
	ФЛЮАНКСОЛ	Х. Лундбек А/С (вир-во нерозфас. прод., перв. та втор. пак., випуск серій)/Еурофінс Біофарма Продакт Тестінг Денмарк А/С (випроб. за показником	табл., вкриті п/о у конт.	1мг	№100	11,82	29,27/€

		«мікробіологічна чистота»), Данія					
	ФЛЮАНКСОЛ ДЕПО	Х. Лундбек А/С (вир-во нерозфас. прод., перв. та втор. пак., випуск серій)/Еурофінс Біофарма Продакт Тестінг Денмарк А/С (випроб. за показником «Мікробіологічна чистота» (тест на ендотоксини)/Ей. Джей. Ваксінс А/С Данія	р-н д/ін'єк., по 1 л в амп. у кор.	20 мг/мл	№10	13,09	29,27/€

● **Флуфеназин (Fluphenazine) ****

Фармакотерапевтична група: N05AB02 - Антипсихотичні засоби. Фенотіазини з піперазиною структурою.

Основна фармакотерапевтична дія: потужний фенотіазинний нейролептик, що належить до групи класичних нейролептиків. Флуфеназин є блокаторм церебральних допамінових D₂ та D₁ рецепторів. Як і інші нейролептики, але меншою мірою, флуфеназин також блокує серотонінові 5HT₂ та 5HT₁ рецептори, адренергічні альфа-1 рецептори, гістамінові H₁ рецептори та холінергічні мускаринові рецептори, тому антихолінергічний та седативний ефекти виражені меншою мірою, ніж у деяких інших класичних нейролептиків; блокада допамінових рецепторів відбувається у всіх трьох допамінових системах, нігостріарній, мезолімбичній та тубероінфундибулярній, тому, крім клінічної ефективності, також можливі різні небажані ефекти, зокрема екстрапірамідні р-ції та збільшення секреції пролактину; цей парентеральний фенотіазинний препарат пролонгованої дії, має подовжену тривалість дії; важливою перевагою лікарської форми препарату є надійність лікування пацієнтів, що дуже важливо для амбулаторного лікування, так як психічні хворі часто приймають ліки нерегулярно чи навіть відмовляються їх приймати.

Показання для застосування ЛЗ: Довготривала підтримуюча терапія хр. форм шизофренії; профілактика загострень шизофренії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Найбільш ефективну дозу і частоту прийому потрібно визначити індивідуально; пацієнтам, які раніше отримували підтримуючу терапію похідними фенотіазину у формі депо звичайна початкова доза становить від 12,5 до 25 мг препарату; наступні дози і інтервали між введеннями визначають індивідуально; інтервал між окремими ін'єкціями зазвичай становить від 15 до 35 днів; якщо потрібні дози, що перевищують 50 мг, їх поступово збільшують на 12,5 мг; разова доза не повинна перевищувати 100 мг. Пацієнти, які раніше не лікувались фенотіазинами, повинні спочатку проходити терапію ін'єкційними препаратами короткотривалої дії або пероральними формами фенотіазинів; коли буде визначено, що пацієнти добре переносять фенотіазини, їх можна перевести на прийом препарату пролонгованої дії без попереднього лікування ін'єкційними препаратами короткотривалої дії; початкову дозу 12,5 мг препарату вводять в/м; якщо немає ніяких серйозних побічних наслідків, то ч/з 5 - 10 днів можна призначити наступну дозу 25 мг; потім дозу регулюють індивідуально. Якщо пацієнт вже приймав фенотіазини, їх можна замінити на препарат пролонгованої дії; спочатку застосовують початкову в/м дозу 12,5 мг для перевірки переносимості препарату, і потім дозу регулюють індивідуально.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: лейкопенія, агранулоцитоз, тромбоцитопенія, еозинфілія, панцитопенія; екстрапірамідні розлади (псевдопаркінсонізм, дистонія, акатизія, окулогірни кризи, опістотонус, гіперфлексія), пізня дискінезія (мимовільні рухи язика, обличчя, рота, губ, тулуба та кінцівок); головний біль; злоякісний нейролептичний с-ром з гіпертермією, ригідність м'язів, акінезія, зниження АТ, ступор та кома; затуманення зору, глаукома; потемніння кришталіка або рогової оболонки ока; нудота, втрата апетиту, слиновиділення, сухість у роті, запор, кишкова непрохідність; поліурія, параліч сечового міхура; енурез, порушення сечовиділення, нетримання сечі; гінекомастія, анормальна лактація, розлади лібідо з імпотенцією, нерегулярна менструація, помилково позитивний тест на вагітність; тахікардія; подовження інтервалу QT та зубця Т, вентрикулярні аритмії (вентрикулярна тахікардія, вентрикулярна фібриляція); аритмія, фібриляція; зупинка серця, аритмія типу «torsades de pointes»; помірна гіпертензія, коливання АТ; венозна тромбоемболія, включаючи випадки легеневої емболії та емболії глибоких вен; закладеність носа; астма, набряк гортані, ангіоневротичний набряк; потовиділення; пігментація шкіри, фоточутливість, алергічний дерматит, кропив'янка, себорей, еритема, екзема, ексфолювативний дерматит; холестатична жовтяниця; сонливість, летаргія; нервозність, ажитація або аномальні думки, депресивний стан, підвищення схильності до суїциду; підвищення апетиту, збільшення маси тіла; с-ром відміни від препарату у новонароджених; екстрапірамідні симптоми у новонароджених; пріапізм, розлади еякуляції; порушення терморегуляції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: Гіперчутливість до флуфеназину чи до будь-якої допоміжної речовини препарату; явні або підозрювані субкортикальні церебральні розлади; серйозні розлади свідомості, тяжкий церебральний атеросклероз, феохромоцитома, тяжка ниркова або печінкова недостатність, СН, підвищена чутливість до інших фенотіазинів; г. інтоксикація інгібіторами ЦНС (спиртне, антидепресанти, нейролептики, заспокійливі, снодійні засоби, транквілізатори, наркотики); дитячий вік до 12 років.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 1 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	МОДИТЕН ДЕПО	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	р-н д/ін'єк., по 1мл в амп. у бл.	25 мг/мл	№5x1	5,18	30,27/€

● **Хлорпромазин (Chlorpromazine) * [ПМД]**

Фармакотерапевтична група: N05AA01 - антипсихотичні ЛЗ; похідні фенотіазину з аліфатичною структурою.

Основна фармакотерапевтична дія: проявляє виражену антипсихотичну, седативну та протиблювальну дію; послаблює або повністю усуває марення та галюцинації, купірує психомоторне збудження, зменшує афективні р-ції, тривожність, неспокій, знижує рухову активність; механізм антипсихотичної дії пов'язаний з блокадою

постсинаптичних допамінергічних рецепторів у мезолімбічних структурах головного мозку; проявляє блокуючу дію на α -адренорецептори та пригнічує вивільнення гормонів гіпофіза та гіпоталамуса; внаслідок блокади дофамінергічних рецепторів збільшується секреція гіпофізом пролактину; протиблювальна дія зумовлена пригніченням або блокадою допамінових D_2 -рецепторів у хеморецепторній тригерній зоні мозочка, периферичне - блокадою блукаючого нерва у травній системі; седативна дія зумовлена блокадою центральних адренорецепторів; проявляє помірну або слабку дію на екстрапірамідні структури. Помірно знижує вираженість запальної р-ції, зменшує проникність судин, знижує активність кінинів і гіалуронідази, зменшує АТ, спричиняє тахікардію; має виражені каталептогенні властивості; проявляє гіпотермічну дію.

Показання для застосування ЛЗ: хр. параноїдні та галюцинаторно-параноїдні стани, стани психомоторного збудження у хворих на шизофренію^{ВООЗ, БНФ} (галюцинаторно-маревний, гебефренічний, кататонічний с-ми), алкогольний психоз, маніакальне збудження у хворих на маніакально-депресивний психоз, психічні розлади у хворих на епілепсію, ажитована депресія у хворих на пресенільний, маніакально-депресивний психоз^{ВООЗ, БНФ}, а також при інших захворюваннях, що супроводжуються збудженням, напруженням; невротичні захворювання, що супроводжуються підвищенням м'язового тону; стійкий біль, у т. ч. каузальгії (у поєднанні з анальгетиками), порушення сну стійкого характеру (у поєднанні зі снодійними засобами та транквілізаторами); хвороба Мен'єра, блювання у вагітних, лікування та профілактика блювання при лікуванні протипухлинними засобами та при променевої терапії^{БНФ}; дерматозний свербіж; у складі літичних сумішей в анестезіології.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: ЛЗ призначати в/м та в/в; дози та схеми лікування лікар встановлює індивідуально залежно від показань і стану пацієнта; при в/м введенні вища разова доза становить 150 мг, МДД - 600 мг; зазвичай в/м слід вводити 1-5 мл р-ну не більше 3 разів на добу; курс лікування - кілька місяців, у високих дозах - до 1,5 місяців, потім слід переходити на лікування підтримуючими дозами, поступово знижуючи дозу на 25-75 мг на добу; при г. психічному збудженні вводити в/м 100-150 мг (4-6 мл р-ну) або в/в 25-50 мг (1-2 мл р-ну ЛЗ розводити у 20 мл 5 % або 40 % р-ну глюкози), у разі необхідності 100 мг (4 мл р-ну ЛЗ - у 40 мл р-ну глюкози); вводити повільно; при в/в введенні вища разова доза - 100 мг, МДД - 250 мг; при в/м та в/в введенні дітям віком від 1 року разова доза 250-500 мкг/кг^{ВООЗ, БНФ} маси тіла; дітям віком від 5 років (маса тіла <23 кг) - 40 мг на добу, 5-12 років (маса тіла - 23-46 кг) - 75 мг на добу^{ВООЗ}; ослабленим пацієнтам і хворим літнього віку призначати до 300 мг на добу в/м або до 150 мг на добу - в/в. Табл.: дози слід підбирати шляхом збільшення, починаючи з мінімальної; при лікуванні психічних захворювань у дорослих і дітей віком від 12 років початкова доза становить 50-100 мг/добу, розподілена на 1-2 прийоми; далі дозу можна поступово підвищувати (з урахуванням переносимості) на 50 мг кожні 3-4 дні до 300-600 мг/добу, розподіляючи її на 3-4 прийоми; курс лікування - від 3 тижнів до 2-4 місяців; в окремих випадках добова доза може бути підвищена до 700 мг-1 г (особливо для пацієнтів із хр. перебігом хвороби і психомоторним збудженням), у цьому випадку добову дозу слід розподіляти на 4 прийоми (вранці, вдень, увечері і вночі); тривалість лікування великими дозами препарату не має перевищувати 1-1,5 міс., при недостатньому ефекті доцільно перейти на лікування іншими препаратами; максимальна разова доза - 300 мг, МДД - 1,5 г. **Затяжна гикавка:** призначати у дозі 50 мг 3-4 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: при тривалому застосуванні можливий розвиток нейролептичного синдрому; паркінсонізм, акатизія, психічна індиферентність та ін. зміни психіки, запізнена р-ція на зовнішні подразнення, нечіткість зору; дистонічні екстрапірамідні реакції, пізня дискінезія, нейролептична депресія, порушення терморегуляції, злюкисний нейролептичний синдром; судоми, безсоння, збудження, делірій, сонливість, нічні кошмари, депресія; можливі артеріальна гіпотензія (особливо при в/в введенні), тахікардія; зміни на ЕКГ (подовження інтервалу QT, депресія ST-сегменту, зміни зубців T і U, аритмія); шлуночкова тахікардія, фібриляція шлуночків, тахікардія типу torsade de pointes, зупинка серця; венозна емболія, легенева емболія (іноді летальна), тромбоз глибоких вен, дозозалежна постуральна гіпотензія; холестатична жовтяниця, нудота, блювання; сухість у роті, закріп; пошкодження печінки, ішемічний коліт, паралітичний ілеус, кишкова перфорація, шлунково-кишковий некроз, кишкова непрохідність, некротичний коліт; лейкопенія, агранулоцитоз, гематологічні зміни, еозинофілія; утруднення сечовивідання, пріапізм, затримка сечі; порушення менструального циклу, імпотенція, гінекомастія, збільшення маси тіла; галакторея, гіперпролактинемія, гіперглікемія, порушення толерантності до глюкози, гіперхолестеринемія; аменорея, нефізіологічна секреція АДГ; позитивний тест на антинуклеарні антитіла; р-ції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання, свербіж, бронхоспазм, кропив'янку, ангіоневротичний набряк, мультиформну еритему, екзофіативний дерматит, системний червоний вовчак та ін. АР; при потрапленні р-нів на слизові оболонки, на шкіру та під шкіру - подразнення тканин: реакції в місці введення, включаючи появу болючих інфільтратів, ушкодження ендотелію та ін.; пігментація шкіри, фотосенсибілізація; для запобігання цим явищам р-н ЛЗ розводити розчинами новокаїну, глюкози, 0,9 % р-ну натрію хлориду; при тривалому застосуванні у високих дозах можливе відкладення хлорпромазину у передніх структурах ока (рогівці та кришталику), що може прискорити процеси природного старіння кришталика, міоз; закладеність носа; раптова смерть на тлі прийому препарату.

Протипоказання до застосування ЛЗ: Гіперчутливість до хлорпромазину та до ін. компонентів ЛЗ; ураження печінки (цироз, гепатит, гемолітична жовтяниця, жовчокам'яна хвороба), нирок (нефрит, г. пієліт, амілоїдоз нирок, сечокам'яна хвороба), захворювання кровотворних органів, прогресуючі системні захворювання головного та спинного мозку (повільні нейроінфекції, розсіяний склероз), декомпенсована СН, тяжкі СС захворювання, виразка шлунка та ДПК у період загострення, декомпенсовані вади серця, виражена артеріальна гіпотензія, інсульт, тромбоемболічна хвороба, виражена міокардіодистрофія, ревмокардит на пізніх стадіях, мікседема, пізня стадія бронхоектатичної хвороби, закритокутова глаукома, затримка сечі, зумовлена гіперплазією передміхурової залози, виражене пригнічення ЦНС, коматозний стан, травми мозку, гострий період ЧМТ; гіпотиреоз, феохромоцитом, міастенія, агранулоцитоз в анамнезі, період годування груддю; г. інфекційні захворювання; одночасне застосування з барбітуратами, алкоголем, наркотиками, допамінергічними антипаркінсонічними засобами, циталопрамом, есциталопрамом.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,1 г., перорально - 0,3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АМІНАЗИН	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контроль якості)/ ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії вир-ва, контроль якості., Україна	р-н д/ін'єк., по 2мл в амп. по у кор. та бл.	25 мг/мл	№10, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМІНАЗИН	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контроль якості)/ ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії вир-ва, контроль якості., Україна	р-н д/ін'єк., по 2мл в амп. по у бл.	25 мг/мл	№10x1	9,76	
	АМІНАЗИН	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у кор.	25 мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМІНАЗИН	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у конт. чар/пп.	25 мг/мл	№10x1	7,34	
	АМІНАЗИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл., вкриті п/о у бл. в кор. та без	50мг, 100мг	№10x2, №20x1, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМІНАЗИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл., вкриті п/о у бл. в кор.	100мг	№10x1	25,89	
	АМІНАЗИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл., вкриті п/о у бл. в кор.	50мг	№10x1	32,86	
	АМІНАЗИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл., в/о у бл. в кор. та без	25мг	№10x2, №20	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМІНАЗИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл., в/о у бл. в кор.	25мг	№20x1	46,78	
	ХЛОПРОМАЗИНУ ГІДРОХЛОРИД	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії вир-ва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контроль якості), Україна	р-н д/ін'єк., по 2мл в амп. у кор. та бл.	25 мг/мл	№10, №5x2, №10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Хлорпромаксен (Chlorprothixene)** ^{[1][2][3][4]}

Фармакотерапевтична група: N05AF03 - психолептичні засоби; антипсихотичні засоби; похідні тіоксантену.

Основна фармакотерапевтична дія: нейролептик із групи тіоксантену; має високу спорідненість з 5-HT₂ рецепторами і α₁-адреноцепторами; подібний до високодозових фенотіазинів, левомепромазину, хлорпромазину, тіоридазину та атипічного нейролептика клозапіну; має високу гістамінну (H₁) афінність, що дорівнює афінності дифенгідраміну; виявляє високу афінність до холінергічних мускаринових рецепторів; седативний нейролептик із широким діапазоном показань; послаблює або усуває тривогу, нав'язливі стани, психомоторне збудження, неспокій, нервозність і безсоння, а також галюцинації, манії та інші психотичні с-ми; у низьких дозах чинить антидепресивну дію, що робить його прийнятним для лікування психічних розладів, що супроводжуються с-мом неспокою-тривоги-депресії; психосоматичних розладів; не спричиняє звикання, залежності та розвитку толерантності; посилює дію анагетиків, має власний анагезуючий ефект, протисвербіжні та протиблювотні властивості; не спричиняє звикання, залежності та розвитку толерантності; посилює дію анагетиків, має власний анагезуючий ефект, протисвербіжні та протиблювотні властивості.

Показання для застосування ЛЗ: Шизофренія та інші психози з психомоторним неспокоєм, ажитацією та тривожним розладом.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Дозування підбирати індивідуально; початкова доза повинна бути низькою 50-100 мг/добу потім дозу слід збільшувати відносно швидко, до досягнення оптимального терапевтичного ефекту. Звичайна оптимальна доза становить 300 мг/добу в окремих випадках може бути збільшена за потребою до 1200

мг/добу.. Підтримуюча доза звичайно становить 100-200 мг/добу; через сильну седативну дію слід приймати менші дози протягом дня, а більш високі дози ввечері.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тахікардія, посилене серцебиття, подовження інтервалу QT на ЕКГ; тромбоцитопенія, нейтропенія, лейкопенія, агранулоцитоз; сонливість, запаморочення, дистонія, головний біль, пізня дискінезія, паркінсонізм, судоми, акатизія, злоякісний нейролептичний с-м; порушення акомодатії зору, рухи очей; задишка; сухість у роті, гіперсекреція слини, запор, диспепсія, нудота, блювання, діарея, розлади сечовипускання, затримка сечі; гіпергідроз, висипання, свербіж, реакції фоточутливості, дерматит; міалгія, м'язова ригідність; гіперпролактинемія, посилений/ чи знижений апетит, збільшення/ чи зменшення маси тіла, гіперглікемія, порушення толерантності до глюкози; артеріальна гіпотензія, припливи, венозний тромбоемболізм; астенія, втома, гіперчутливість, анафілактична реакція; порушення печінкових функціональних тестів, жовтяниця; відсутність еякуляції, еректильна дисфункція, гінекомастія, галакторея, аменорея; безсоння, тривожність, нервозність, зниження лібідо; частота невідома - с-м відміни у новонароджених.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого компонента ЛЗ або ЛЗ групи тіоксантену; циркуляторний колапс, пригнічення ЦНС будь-якого походження (алкогольна, барбітуратна чи опіоїдна інтоксикація), кома; пацієнти із анамнезом клінічно значних СС розладів (брадикардія <50 уд/хв, нещодавній г. ІМ, некомпенсована СН, серцева гіпертрофія, аритмії, якщо призначені антиаритмічні ЛЗ класів ІА та ІІІ), пацієнти із анамнезом шлуночкових аритмій або Torsade de Pointes; пацієнти із некоригованою гіпокаліємією та гіпомагніємією; пацієнти зі спадковим с-мом подовженого інтервалу QT або встановленим набутим подовженим інтервалом QT (QTс більше 450 мсек у чоловіків і 470 мсек у жінок), сумісне застосування з ЛЗ, які значно подовжують інтервал QT.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ТРУКСАЛ	Х. Лундбек А/С (вир-во нерозфас.прод., перв. та втор. пак., випуск серій)/ Еурофінс Біофарма Продакт Тестінг Денмарк А/С (випроб. за показником "мікробіологічна чистота"), Данія	табл., вкриті п/о у конт.	25мг	№100	31,83	29,27/€
	ТРУКСАЛ	Х. Лундбек А/С (вир-во нерозфас.прод., перв. та втор. пак., випуск серій)/ Еурофінс Біофарма Продакт Тестінг Денмарк А/С (випроб. за показником "мікробіологічна чистота"), Данія	табл., вкриті п/о у конт.	50мг	№50	31,41	29,27/€

5.1.2. Антагоністи дофамінових та серотонінових (D2, 5HT2A) рецепторів

• Амісульприд (Amisulpride)

Фармакотерапевтична група: N05AL05 - антипсихотичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: антипсихотичний ЛЗ, належить до класу заміщених бензамідів; селективно і превалююче споріднений з рецепторами D₂ і D₃ лімбічної системи; не має спорідненості з рецепторами серотоніну, гістаміну, з адренергічними і холінергічними рецепторами; блокує переважно дофамінергічні нейрони мезолімбічної системи порівняно з такими ж нейронами стріатної системи, ця специфічна спорідненість пояснює перевагу антипсихотичних ефектів амісульприду над його екстрапірамідними ефектами; у низьких дозах переважно блокує пресинаптичні дофамінергічні D₂ і D₃-рецептори, що пояснює його дію на негативні симптоми шизофренії.

Показання для застосування ЛЗ: лікування шизофренії^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос; якщо добова доза не перевищує 400мг - приймати 1 р/добу; дозу понад 400мг розподілити на 2 прийоми; г. психотичні епізоди: початкова доза 400 - 800 мг/добу, МДД - не більше 1200 мг^{БНФ}; підтримуючу дозу встановити індивідуально, на рівні мінімально ефективних доз; переважно негативні епізоди: 50-300 мг/добу^{БНФ}, оптимальна доза - 100 мг/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: екстрапірамідні симптоми (тремор, ригідність, гіпертонус, посилена салівація, акатизія, гіпокінезія, дискінезія), г. дистонія (спастична кривошия, окулогірний криз, тризм); сонливість або безсоння, тривожність, ажитація, фригідність; пізня дискінезія, судоми; запор, нудота, блювання, сухість у роті; гіперглікемія; артеріальна гіпотензія, брадикардія, підвищення АТ; збільшення маси тіла; підвищення рівнів ензимів печінки (трансаміназ), підвищення рівня пролактину (клінічні симптоми: галакторея, аменорея, гінекомастія, біль у грудях, порушення ерекції); АР; частота невідома: подовження інтервалу QT, шлуночкові аритмії (torsades de pointes) і шлуночкова тахікардія, які можуть призвести до фібриляції шлуночків і зупинки серця; злоякісний нейролептичний с-м; лейкопенія, нейтропенія та агранулоцитоз; гіпертригліцеридемія, гіперхолестеринемія, гіпонатріємія, с-м неадекватної секреції антидіуретичного гормону ; сплутаність свідомості; венозна тромбоемболія (емболія легеневої артерії ,іноді летальної, тромбоз глибоких вен); ангіоневротичний набряк, кропив'янка; злоякісний нейролептичний синдром, який може призводити до смерті; с-м відміни у новонароджених; нечіткість зору, гепатоцелюлярне ураження; остеопенія, остеопороз; затримка сечі; р-ція фоточутливості; с-м відміни у новонароджених; закладеність носа, аспіраційна пневмонія; доброякісна пухлина гіпофіза, така як пролактинома; частота невідома: синдром неспокійних ніг.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до амісульприду або до іншого компонента ЛЗ; діагностована або підозрювана феохромоцитома; діагностовані або підозрювані пролактинзалежні пухлини (пролактинома гіпофіза та рак грудної залози); одночасне застосування із леводопою; комбінація з ЛЗ, які можуть спричинити torsade de pointes; одночасне застосування з мехітазином, циталопрамом, есциталопрамом, неантипаркінсонічними агоністами допаміну (каберголіном, хінаголідом); дитячий вік до 15 років; годування груддю.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,4 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	СОЛЕРОН 100	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	100мг	№10x1, №10x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СОЛЕРОН 100	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	100мг	№10x3	51,92	
	СОЛЕРОН 200	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	200мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СОЛЕРОН 200	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	200мг	№10x6	34,87	
	СОЛЕРОН 200	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	200мг	№10x3	40,69	
II.	АКТИПРОЛ	Медокемі ЛТД (Центральний Завод) (вир-во за повним циклом)/Медокемі ЛТД (Завод AZ) (перв. та втор. пак.), Кіпр	табл. у бл.	100мг, 200мг	№10x6, №10x9	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АКТИПРОЛ	Медокемі ЛТД (Центральний Завод) (вир-во за повним циклом)/Медокемі ЛТД (Завод AZ) (перв. та втор. пак.), Кіпр	табл. у бл.	100мг	№10x3	44,38	30,26/€
	АКТИПРОЛ	Медокемі ЛТД (Центральний Завод) (вир-во за повним циклом)/Медокемі ЛТД (Завод AZ) (перв. та втор. пак.), Кіпр	табл. у бл.	200мг	№10x3	37,32	30,26/€
	СОЛЕКС®	Рівофарм СА, Швейцарія	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СОЛЕКС®	Рівофарм СА, Швейцарія	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x3	49,33	30,43/€
	СОЛЕКС®	Рівофарм СА, Швейцарія	табл., вкриті п/о у бл.	200мг	№10x3	37,00	30,43/€
	СОЛІАН®	Юнітер Ліквід Мануфекчурінг, Франція	р-н д/пер. застос. по 60мл у фл. зі шпр. д/дозув.	100 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Зипразидон (Ziprasidone)**

Фармакотерапевтична група: N05AE04 - антипсихотичні засоби; похідні індолу.

Основна фармакотерапевтична дія: має високу спорідненість з дофаміновими рецепторами типу 2 (D₂), значну спорідненість із серотоніновими рецепторами типу 2_A (5HT_{2A}), блокує серотонінові рецептори типу 2_A та дофамінові рецептори типу D₂; взаємодіє із серотоніновими 5HT_{2C}-, 5HT_{1D}- та 5HT_{1A}-рецепторами, його спорідненість з цими рецепторами така ж сама або перевищує спорідненість із дофаміновими D₂-рецепторами; має помірну спорідненість із нейрональними системами транспорту серотоніну або норадреналіну, помірну спорідненість з гістаміновими H₁-рецепторами та альфа₁-адренорецепторами, виявляє незначну спорідненість із мускариновими M₁-холінорецепторами; виявляє властивості антагоніста відносно серотонінових 2_A (5HT_{2A})- та дофамінових 2 (D₂)-рецепторів, це передбачає, що антипсихотичний ефект ЛЗ частково опосередкований поєднанням цих антагоністичних впливів; потужний антагоніст 5HT_{2C}- та 5HT_{1D}-рецепторів й потужний агоніст 5HT_{1A}-рецепторів та інгібітор зворотного нейронального захоплення норадреналіну та серотоніну.

Показання для застосування ЛЗ: лікування шизофренії у дорослих; лікування маніакальних або змішаних епізодів середнього ступеня тяжкості у пацієнтів з біполярним розладом (профілактика епізодів біполярного розладу не встановлювалася).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим р/ос; невідкладне лікування шизофренії та біполярної манії: рекомендована початкова доза - 40 мг 2 р/добу; добову дозу може бути підвищена до 80 мг 2 р/день, за наявності показань, МДД призначати не раніше 3-го дня лікування, МДД - не вище 160 мг; підтримуюча терапія шизофренії: у мінімальній ефективній дозі - 20 мг 2 р/день.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперчутливість, анафілактична р-ція; риніт; лімфопенія, підвищена кількість еозинофілів; гіперпролактинемія; підвищення апетиту, гіпокальціємія; безсоння, манія, збудження, відчуття тривоги, неспокій; панічні атаки, нічні жахи, нервозність, симптоми депресії, зниження лібідо, гіпоманія, брадифренія, аноргазмія, сплоснений афект; сонливість, головний біль, дистонія, екстрапірамідні розлади, паркінсонізм, пізня дискінезія, дискінезія, гіпертонус, акатизія, тремор, запаморочення, седативний ефект, синкопе, великі судомні напади, атаксія, акінезія, с-м неспокійних ніг, порушення ходи, слинотеча, парестезія, гіпестезія, дизартрія, порушення уваги, гіперсомнія, летаргія, злоякісний нейролептичний с-м, серотоніновий с-м, параліч лицьового нерва, парез; затьмарення/ порушення зору, спазм погляду, фотофобія,

сухість очей, амбліопія, свербіж очей; вертиго, дзвін/ біль у вухах; тахікардія, прискорене серцебиття, шлуночкова тахікардія типу torsade de pointes; АГ, гіпертонічний криз, ортостатична гіпотензія, артеріальна гіпотензія; систолічна/ діастолічна гіпертензія, нестабільний АТ; відчуття стиснення у горлі, диспное, біль у ротоглотці, ларингоспазм, гикавка; блювання, діарея, нудота, запор, надмірна секреція слини, сухість у роті, диспепсія, дисфагія, гастрит, ГЕРХ, дискомфорт у животі, розлад з боку язика, метеоризм, рідкі випорожнення; висипання, кропив'янка, макулопапульозні висипання, акне, алопеція, р-ція на ЛЗ, що супроводжується еозинofilією та системними проявами (DRESS), псоріаз, ангіоневротичний набряк, алергічний дерматит, набряк обличчя, еритема, папульозні висипання, подразнення шкіри; ригідність м'язів; кривошия, судоми м'язів, біль у кінцівках, дискомфорт з боку опорно-рухового апарату, скутість суглобів; тризм; нетримання сечі, дизурія, затримка сечі, енурез; с-м відміни ЛЗ в новонародженого; порушення статевої функції у чоловіків, галакторея, гінекомастія, аменорея, пріапізм, посилення ерекції, еректильна дисфункція; пірексія, біль, астенія, підвищена стомлюваність, дискомфорт у ділянці грудної клітки, відчуття спраги, відчуття жару; зменшення/ збільшення маси тіла; подовження інтервалу QT на електрокардіограмі, відхилення від норми результатів функціональних проб печінки; підвищення рівня ЛДГ; частота невідома - венозна емболія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до зипразидону або до будь-якої з допоміжних речовин; встановлене подовження інтервалу Q-T; с-м вродженого подовження інтервалу QT; нещодавно перенесений г. ІМ; декомпенсована СН; аритмії, при застосуванні антиаритмічних ЛЗ класів ІА та ІІІ; одночасне застосування ЛЗ, що подовжують інтервал QT (антиаритмічні ЛЗ класів ІА та ІІІ, триоксид миш'яку, галофантрин, левометадилу ацетат, мезоридазин, тіоридазин, пімозид, спарфлоксацин, гатифлоксацин, моксифлоксацин, доласетрону мезилат, мефлоксін, сертиндол або цизаприд), дофетилід, соталол, хінідин, хлорпромазин, дроперидол, пентамідин, пробукол або такролімус.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 80 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЗЕЛДОКС®	Р-Фарм Джермані ГмбХ (вир-во, пакування, маркування, контроль якості, випуск серії)/ Пфайзер Ірландія Фармасьютікалз (вир-во та контроль якості)/ Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ (Пакування (перв. та втор.), маркування, контроль якості, Німеччина/Ірландія	капс. тверді у бл. в кор	40мг, 80мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЗЕЛДОКС®	Р-Фарм Джермані ГмбХ (вир-во, пакування, маркування, контроль якості, випуск серії)/ Пфайзер Ірландія Фармасьютікалз (вир-во та контроль якості)/ Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ (Пакування (перв. та втор.), маркування, контроль якості, Німеччина/Ірландія	капс. тверді у бл. в кор	40мг	№14х2	67,52	25,32/\$
	ЗЕЛДОКС®	Р-Фарм Джермані ГмбХ (вир-во, пакування, маркування, контроль якості, випуск серії)/ Пфайзер Ірландія Фармасьютікалз (вир-во та контроль якості)/ Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ (Пакування (перв. та втор.), маркування, контроль якості, Німеччина/Ірландія	капс. тверді у бл. в кор	80мг	№14х2	64,48	25,32/\$
	ЗЕЛДОКС®	Р-Фарм Джермані ГмбХ (вир-во, пакування, маркування, контроль якості, випуск серії)/ Пфайзер Ірландія Фармасьютікалз (вир-во та контроль якості)/ Пфайзер	капс. тверді у бл. в кор	20мг	№14х2, №10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

		Менюфекчуринг Дойчленд ГмБХ (Пакування (перв. та втор.), маркування, контроль якості, Німеччина/Ірландія			
--	--	--	--	--	--

• **Кветіапін (Quetiapine)** ^[ГІМД]

Фармакотерапевтична група: N05AH04 - засоби, що діють на нервову систему. Антипсихотичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: атипичний антипсихотичний ЛЗ, що взаємодіє з великою кількістю нейротрансмітерних рецепторів; проявляє високе споріднення до (5HT₂) рецепторів серотоніну та допамінових D₁- та D₂-рецепторів, що сприяє клінічним антипсихотичним ефектам та низькій схильності до екстрапірамідних побічних симптомів порівняно з типовими антипсихотичними ЛЗ; не має спорідненості із переносником норадреналіну, має низьку спорідненість із серотоніновими 5HT_{1A}-рецепторами; інгібування норкветіапіном та часткова агоністична дія на 5HT_{1A}-рецептори сприяє терапевтичній ефективності у якості антидепресанта; має низьку спорідненість або не має спорідненості до мускаринових рецепторів; блокує дію допамінових агоністів, які вимірюються або поведінково або електрофізіологічно, та підвищує концентрації допамінових метаболітів, нейрохімічний індекс пригнічення D₂ - рецепторів.

Показання для застосування ЛЗ: шизофренія^{БНФ}; маніакальні епізоди, пов'язані з біполярними розладами^{БНФ}; табл. пролонг. дії: помірні і тяжкі маніакальні епізоди при біполярному розладі; тяжкі депресивні епізоди при біполярному розладі^{БНФ}; профілактика рецидиву захворювання у пацієнтів з біполярним розладом, у пацієнтів з маніакальними або депресивними епізодами, при яких лікування кветіапіном є ефективним^{БНФ}; додаткова терапія при тяжких депресивних епізодах у пацієнтів з тяжким депресивним розладом, у яких зафіксовано субоптимальну відповідь на монотерапію антидепресантами.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос; лікування шизофренії^{БНФ} - 1-й день - 50 мг, 2-й день - 100 мг, 3-й день - 200 мг, 4-й день - 300 мг^{БНФ}, починаючи з 4-го дня, доза повинна титруватися до звичайно ефективного дозування в межах 300-450 мг/добу^{БНФ}; лікування маніакальних епізодів, пов'язаних з біполярними розладами^{БНФ} - добова доза для перших 4-х днів лікування становить 1-й день - 100 мг, 2-й день - 200 мг, 3-й день - 300 мг, 4-й день - 400 мг^{БНФ}; подальше збільшення дози відбувається не більше ніж на 200 мг щодня, аж до збільшення добової дози до 800 мг^{БНФ}; табл. пролонгованої дії: застосовують 1 р/день, лікування шизофренії та маніакальних епізодів від помірного до важкого ступеня при біполярному розладі^{БНФ}: добова доза на початку терапії становить 1-й день - 300 мг, 2-й день - 600 мг, рекомендована добова доза - 600 мг; якщо клінічно обґрунтовано, дозу можна підвищити до 800 мг/добу^{БНФ}; дозу коригувати в рамках діапазону ефективних доз - від 400 мг до 800 мг/добу - залежно від клінічної відповіді і переносимості; для лікування депресивних епізодів при біполярному розладі: добова доза на початку терапії становить 1-й день - 50 мг, 2-й день - 100 мг, 3-й день - 200 мг, 4-й день - 300 мг; рекомендована добова доза - 300 мг^{БНФ}; для профілактики рецидиву захворювання при біполярному розладі^{БНФ}: пацієнти, у яких була відповідь на застосування кветіапіну у формі табл. пролонг. при невідкладному лікуванні біполярного розладу, повинні продовжувати лікування в межах діапазону доз від 300 мг до 800 мг/добу^{БНФ}, застосовувати найнижчі ефективні дози; для супутнього лікування депресивних епізодів при важкому депресивному розладі: добова доза на початку терапії становить 1-й день та 2-й день - 50 мг, 3-й та 4-й день - 150 мг, застосовувати найнижчі ефективні дози починаючи з 50 мг/добу, потреба у збільшенні дози зі 150 до 300 мг/добу повинна ґрунтуватись на оцінці стану окремого пацієнта.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: зниження рівня Нв, лейкопенія, зменшення кількості нейтрофілів, підвищення рівня еозинофілів, тромбоцитопенія, анемія, агранулоцитоз; гіперчутливість (у т.ч. АР шкіри), анафілактична р-ція; гіперпролактинемія, зниження загального Т₄, вільного Т₄, загального Т₃, підвищення ТТГ, зниження вільного Т₃, гіпотиреозидизм, неадекватна секреція антидіуретичного гормону; підвищення рівнів тригліцеридів у сироватці крові, загального холестерину (ЛПНЩ), зниження холестерину ЛПВЩ, підвищення маси тіла, посилення апетиту, підвищення рівня глюкози у крові до рівнів гіперглікемії, гіпонатріємія, ЦД, метаболічний с-м; незвичайні сні та нічні кошмари, суїцидальні думки та поведінка, сомнамбулізм та пов'язані з цим явища (розмови уві сні, розлади харчової поведінки у сні); запаморочення, сонливість, головний біль, екстрапірамідні с-ми, дизартрія, судоми, с-м неспокійних ніг, тардитивна дискінезія, непритомність; тахікардія, пальпітація, пролонгація інтервалу QT, брадикардія; нечіткість зору; ортостатична гіпотензія, венозна тромбоемболія; інсульт; затримка сечовипускання; диспное, риніт; сухість у роті, запор, диспепсія, блювання, дисфагія, панкреатит, кишкова непрохідність/ілеус; підвищення рівня АЛТ, АСТ у сироватці крові, рівнів гамма-ГТ, жовтяниця, гепатит; ангіоневротичний набряк, с-м Стівенса-Джонсона; рабдоміоліз; сексуальна дисфункція, приапізм, галакторея, набряки молочних залоз, порушення менструального циклу; с-ми відміни, легка астения, периферичний набряк, дратівливість, пірексія, злоякісний нейролептичний с-м, гіпотермія; підвищення рівня КФК у крові; частота невідома - нейтропенія, токсичний епідермальний некроліз, мультиформна еритема, с-м відміни ЛЗ у новонароджених, неонатальна абстиненція.

Противпоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого компонента ЛЗ; одночасне застосування інгібіторів цитохрому Р450 3А4 (інгібітори ВІЛ-протеази, азольні протигрибкові ЛЗ, еритроміцин, кларитроміцин і нефазодон).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,4 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КВЕТИРОН 100	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КВЕТИРОН 100	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x6	29,12	
	КВЕТИРОН 100	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x3	30,70	

		п/о у бл.				
КВЕТИРОН 200	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	200мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КВЕТИРОН 200	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	200мг	№10x6	24,19	
КВЕТИРОН 200	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	200мг	№10x3	25,15	
КВЕТИРОН 25	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№30x1	66,79	
II. КВЕНТІАКС®	КРКА, д.д., Ново место (вир-во "in bulk", перв. та втор.пакув., контроль серії та випуск серії)/КРКА-ФАРМА д.о.о. (вир-во "in bulk", перв. та втор.пакув., контроль серії та випуск серії)/Лабена д.о.о. (контроль серії), Словенія/Хорватія	табл., вкриті п/о у бл.	25мг, 100мг, 200мг, 300мг	№10x3, №10x9	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КВЕНТІАКС®	КРКА, д.д., Ново место (вир-во "in bulk", перв. та втор.пакув., контроль серії та випуск серії)/КРКА-ФАРМА д.о.о. (вир-во "in bulk", перв. та втор.пакув., контроль серії та випуск серії)/Лабена д.о.о. (контроль серії), Словенія/Хорватія	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x3	20,07	30,11/€
КВЕНТІАКС®	КРКА, д.д., Ново место (вир-во "in bulk", перв. та втор.пакув., контроль серії та випуск серії)/КРКА-ФАРМА д.о.о. (вир-во "in bulk", перв. та втор.пакув., контроль серії та випуск серії)/Лабена д.о.о. (контроль серії), Словенія/Хорватія	табл., вкриті п/о у бл.	200мг	№10x3	18,06	30,11/€
КВЕНТІАКС®	КРКА, д.д., Ново место (вир-во "in bulk", перв. та втор.пакув., контроль серії та випуск серії)/КРКА-ФАРМА д.о.о. (вир-во "in bulk", перв. та втор.пакув., контроль серії та випуск серії)/Лабена д.о.о. (контроль серії), Словенія/Хорватія	табл., вкриті п/о у бл.	300мг	№10x3	9,23	30,11/€
КВЕНТІАКС® SR	КРКА, д.д., Ново место (вир-во "in bulk", перв. та втор.пакув., контроль серії та випуск серії), Словенія	табл. прол. дії у бл.	50мг, 150мг, 200мг, 300мг, 400мг	№10x6, №10x9	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КВЕТИКСОЛ	Актавіс Лтд., Мальта	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№10x3	74,67	30,42/€
КВЕТИКСОЛ	Актавіс Лтд., Мальта	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x3	30,67	30,42/€
КВЕТИКСОЛ	Актавіс Лтд., Мальта	табл., вкриті п/о у бл.	200мг	№10x3	23,33	30,42/€
КВЕТИПІН	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у бл.	25мг	№10x3	54,70	26,44/\$
КВЕТИПІН	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у бл.	100мг	№10x3	33,84	26,44/\$
КВЕТИПІН	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у бл.	200мг	№10x3	19,33	26,12/\$
КВЕТИПІН	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у фл.	300мг	№10x3	10,15	26,44/\$
КЕТИЛЕПТ®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл., вкриті п/о, у фл. та бл.	25мг, 100мг, 200мг	№30, №60; №10x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КЕТИЛЕПТ®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл., вкриті п/о, у бл.	25мг	№10x3	67,29	26,45/\$

КЕТИЛЕПТ®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл., вкриті п/о, у бл.	100мг	№10x3	47,61	26,45/\$
КЕТИЛЕПТ®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл., вкриті п/о, у бл.	200мг	№10x3	38,09	26,45/\$
КЕТИЛЕПТ® РЕТАРД	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС (випуск серії)/ Фарматен С.А. (повний цикл вир-ва, включаючи випуск серії)/Фарматен Інтернешнл С.А. (повний цикл вир-ва, включаючи випуск серії), Угорщина/Греція/Греція	табл. в/о, прол. дії у бл.	50мг	№10x6	67,50	25,31/\$
КЕТИЛЕПТ® РЕТАРД	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС (випуск серії)/ Фарматен С.А. (повний цикл вир-ва, включаючи випуск серії)/Фарматен Інтернешнл С.А. (повний цикл вир-ва, включаючи випуск серії), Угорщина/Греція/Греція	табл. в/о, прол. дії у бл.	150мг	№10x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КЕТИЛЕПТ® РЕТАРД	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС (випуск серії)/ Фарматен С.А. (повний цикл вир-ва, включаючи випуск серії)/Фарматен Інтернешнл С.А. (повний цикл вир-ва, включаючи випуск серії), Угорщина/Греція/Греція	табл. в/о, прол. дії у бл.	200мг	№10x6	16,87	25,31/\$
КЕТИЛЕПТ® РЕТАРД	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС (випуск серії)/ Фарматен С.А. (повний цикл вир-ва, включаючи випуск серії)/Фарматен Інтернешнл С.А. (повний цикл вир-ва, включаючи випуск серії), Угорщина/Греція/Греція	табл. в/о, прол. дії у бл.	300мг	№10x6	14,06	25,31/\$
КЕТИЛЕПТ® РЕТАРД	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС (випуск серії)/ Фарматен С.А. (повний цикл вир-ва, включаючи випуск серії)/Фарматен Інтернешнл С.А. (повний цикл вир-ва, включаючи випуск серії), Угорщина/Греція/Греція	табл. в/о, прол. дії у бл.	400мг	№10x6	12,66	25,31/\$
КЮ-ПІН 100	Алкем Лабораторіз Лтд, Індія	табл., вкриті п/о у бл	100мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КЮ-ПІН 200	Алкем Лабораторіз Лтд, Індія	табл., вкриті п/о у бл	200мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КЮ-ПІН 25	Алкем Лабораторіз Лтд, Індія	табл., вкриті п/о у бл	25мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КЮ-ПІН 300	Алкем Лабораторіз Лтд, Індія	табл., вкриті п/о у бл	300мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
СЕРОКВЕЛЬ XR	АстраЗенека ЮК Лімітед (виробник, відпов. за пакування та випуск серії)/АстраЗенека Фармасьютикалс ЛП (виробник "in bulk"), Велика Британія/США	табл. в/о, прол. дії у бл.	50мг	№10x6	93,15	23,06/\$
СЕРОКВЕЛЬ XR	АстраЗенека ЮК Лімітед (виробник, відпов. за пакування та випуск серії)/АстраЗенека Фармасьютикалс ЛП (виробник "in bulk"), Велика Британія/США	табл. в/о, прол. дії у бл.	200мг	№10x6	46,36	23,06/\$
СЕРОКВЕЛЬ XR	АстраЗенека ЮК Лімітед (виробник, відпов. за пакування та випуск серії)/АстраЗенека Фармасьютикалс ЛП (виробник "in bulk"), Велика Британія/США	табл. в/о, прол. дії у бл.	300мг	№10x6	44,15	23,06/\$

СЕРОКВЕЛЬ XR	АстраЗенека ЮК Лімітед (виробник, відпов. за пакування та випуск серії)/АстраЗенека Фармасьютикалс ЛП (виробник "in bulk"), Велика Британія/США	табл. в/о, прол. дії у бл.	400мг	№10x6	50,79	23,06/\$
--------------	---	----------------------------	-------	-------	-------	----------

● **Клозапін (Clozapine)**

Фармакотерапевтична група: N05AH02 - антипсихотичні препарати.

Основна фармакотерапевтична дія: відрізняється від традиційних нейролептиків; не індукує каталепсію та не пригнічує стереотипну поведінку, спричинену введенням апоморфіну або амфетаміну; чинить тільки слабку блокуючу дію на допамінові D₁-, D₂-, D₃- і D₅-рецептори, але виявляє високу ефективність стосовно D₄-рецепторів, а також чинить анти-α-адренергічну, антихолінергічну, антигістамінну дію та пригнічує р-цію активації; проявляє антисеротонінергічні властивості; клінічно виявляє швидкий і виражений седативний ефект і чинить сильну антипсихотичну дію (у пацієнтів з шизофренією, резистентних до лікування іншими ЛЗ); тяжкі екстрапірамідні реакції (г. дистонія), паркінсоноподібні побічні ефекти і акатизія, виникають рідко.

Показання для застосування ЛЗ: стійка до терапії шизофренія у разі резистентності (стан, коли попереднє лікування зі стандартними нейролептиками при відповідному дозуванні та протягом достатнього періоду часу не призвели до адекватного клінічного поліпшення) або непереносимості до терапії стандартними нейролептиками (стан, коли відбуваються тяжкі некеровані небажані ефекти неврологічного характеру, які роблять неможливою ефективну нейролептичну терапію із застосуванням стандартних нейролептиків)^{БНФ}; ризик рецидиву суїцидальних спроб у пацієнтів з шизофренією або шизоафективним розладом; психотичні розлади протягом терапії хвороби Паркінсона^{БНФ} (якщо стандартна терапія виявилася неефективною).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати мінімальну ефективну дозу; стійка до терапії шизофренія, ризик рецидиву суїцидальних спроб: 1-й день - 12,5 мг (1-2 р/день), 2-й день - 25 - 50 мг/день; за умови доброї переносимості, доза може бути збільшена на 25-50 мг/добу до досягнення дози 300 мг/добу протягом 2-3 тижнів; за необхідності, добову дозу можна збільшити до 50-100 мг з інтервалами 2 р/тиждень або щотижнево^{БНФ}; настання антипсихотичного ефекту можна очікувати при дозі 300-450 мг/добу за кілька прийомів; у деяких пацієнтів адекватними можуть виявитися менші добові дози, а інші можуть потребувати до 600 мг/добу; МДД - 900 мг/добу^{БНФ}, з максимальним індивідуальним приростом 100 мг; збільшення кількості небажаних р-цій можливе при дозуванні вище 450 мг/добу; після досягнення максимального терапевтичного ефекту багато пацієнтів може перейти на застосування низьких підтримуючих доз, поступово знижувати дозу, лікування проводити протягом не менше 6 міс.; у випадку запланованого припинення лікування поступово знижують дози протягом 1-2 тижнів; психотичні розлади протягом терапії хвороби Паркінсона: початкова доза не вище 12,5 мг/добу, прийнята як разова доза ввечері; подальші збільшення дози повинні бути на 12,5 мг^{БНФ}, з максимальним збільшенням у 2 р/тиждень до 50 мг, дози, яка не повинна бути досягнута до кінця 2 тижня; загальну добову дозу приймати одноразово ввечері; середня ефективна доза - 25-37,5 мг/добу^{БНФ}; якщо лікування протягом одного тижня у дозі 50 мг/добу не забезпечує задовільної терапевтичної відповіді, дозу збільшувати на 12,5 мг/тиждень; дозу 50 мг/день перевищувати тільки у виняткових ситуаціях, а МДД не повинна перевищувати 100 мг^{БНФ}, у випадку запланованого припинення лікування рекомендується поступове зниження дози на 12,5 мг, принаймні за 1-2 тижнів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: зниження загальної кількості лейкоцитів, нейтропенія, лейкопенія, еозинofilія, агранулоцитоз, лімфопенія, тромбоцитопенія, тромбоцитоз, анемія; збільшення маси тіла, порушення толерантності до глюкози, ЦД, тяжка гіперглікемія, кетоацидоз, гіперосмолярна кома, гіперхолестеринемія, гіпертригліцеридемія; дизартрія, дисфемія, занепокоєння, збудження, obsесивно-компульсивні розлади; сонливість, седативний ефект, запаморочення; головний біль, тремор, ригідність м'язів, акатизія, екстрапірамідні симптоми, епілептичні напади, судоми, міоклонічні посмикування, сплутаність свідомості, делірії; зміни показників ЕЕГ, міоклонічні судоми, генералізовані напади, екстрапірамідні симптоми; пізня дискінезія, злоякісний нейролептичний с-м (ригідність, гіпертермія, зміни з боку психіки та лабільність вегетативної нервової системи); затьмарення зору; тахікардія, зупинка серця, зміни ЕКГ, аритмія, перикардит, кардіоміопатія та міокардит (з/без еозинofilії), кардіоміопатії; АГ, ортостатична гіпотензія, синкопе, тромбоемболія, колапс кровообігу; аспірація їжі (потрапляння в дихальні шляхи) при ковтанні (внаслідок дисфагії), пригнічення або зупинки дихання, пневмонія, інфекції НДШ; запор, гіперсалівація, нудота, блювання, анорексія, сухість у роті, здуття живота, біль в животі, дисфагія, збільшення слинної залози, непрохідність кишечника, паралітична кишкова непрохідність, затримка калу; ішемія кишечника, некротичний коліт, некроз кишечника, аж до летальних випадків, підвищення печінкових ферментів, гепатит, холестатична жовтяниця, панкреатит, фульмінантний некроз печінки; шкірні р-ції; нетримання сечі, затримка сечі, інтерстиціальний нефрит, порушення ф-ції нирок, ниркова недостатність; пріапіз, імпотенція, зміни еякуляції, дисменорея, стомленість, підвищення t° тіла, порушення регуляції потовиділення та t° тіла; підвищення рівня КФК, гіпонатріємія; сепсис, шкірні р-ції, що супроводжується еозинofilією і системними проявами (DRESS-синдромом); набряк Квінке, лейкоцитокластичний васкуліт, псевдофеохроміоцитом, ожиріння, холінергічний с-м; плевротонус (с-м «Пізанської вежі»), ІМ, стенокардія, пальпітація, фібриляція передсердь, недостатність мітрального клапану при кардіоміопатії, зв'язаної з клозапіном, бронхоспазм, закладеність носа, діарея; дискомфорт у животі/печія/диспепсія, коліт, печінковий стеатоз/ чи некроз, гепатотоксичність, гепатофіброз, цироз печінки; порушення ф-ції нирок (печінкова недостатність, необхідність трансплантації печінки та смерть), порушення пігментації, м'язова слабкість/ чи спазми, міальгія, системний червоний вовчак, нічний енурез; ниркова недостатність, ретроградна еякуляція.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до клозапіну або до будь-якого іншого компонента ЛЗ; неможливість регулярно контролювати показники крові у пацієнта; токсична або ідіосинкратична гранулоцитопенія/агранулоцитоз в анамнезі (за винятком розвитку гранулоцитопенії або агранулоцитозу внаслідок хіміотерапії, перенесеної раніше); агранулоцитоз в анамнезі, індукований клозапіном; порушення функції кісткового мозку; епілепсія, що не піддається контролю; алкогольний або інші токсичні психози,

медикаментозні інтоксикації, коматозні стани; судинний колапс та/або пригнічення ЦНС будь-якої етіології; тяжкі порушення з боку нирок або серця (міокардит); г. захворювання печінки, що супроводжуються нудотою, втратою апетиту або жовтяницею, прогресуючі захворювання печінки, печінкова недостатність; паралітична непрохідність кишечника; одночасне застосування з ЛЗ, що спричиняють виникнення агранулоцитозу та депо-нейролептиками.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АЗАЛЕПТОЛ	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. у бл. та конт.	25мг, 100мг	№10x5, №50x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЗАЛЕПТОЛ	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. у конт.	25мг	№50x1	9,60	
	АЗАЛЕПТОЛ	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. у бл.	100мг	№10x5	6,00	
	АЗАПІН	АТ "КІЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	100мг	№10x5	2,85	
	АЗАПІН	АТ "КІЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	25мг	№10x5	5,15	

● **Оланзапін (Olanzapin)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: N05AH03 - антипсихотичні ЛЗ.

Основна фармакотерапевтична дія: антипсихотик, антиманіакальний ЛЗ, що стабілізує настрій, із широким спектром фармакологічної дії, зумовленої впливом на різні рецептори; виявляє спорідненість із серотоніновими рецепторами (5 T_{2A/2C}, 5 HT₃, 5 HT₆), допаміновими рецепторами (D₁, D₂, D₃, D₄, D₅), мускариновими рецепторами (M₁-M₅), адренергічним рецептором α₁ і гістаміновим H₁-рецептором; виявляє антагонізм до серотонінових 5HT_{2A}, допамінових і холінергічних рецепторів; селективно зменшує збудливість мезолімбічних (A10) допамінергічних нейронів, виявляючи незначний вплив на стріарні (A9) шляхи, пов'язані з моторною функцією; гальмує умовний рефлекс уникнення, що свідчить про антипсихотичну активність при прийомі в дозах, менших, ніж дози, що спричиняють каталепсію.

Показання для застосування ЛЗ: лікування шизофренії^{БНФ}; підтримання досягнутого клінічного ефекту під час тривалої терапії у пацієнтів, у яких спостерігалася відповідь на початкову терапію; лікування маніакальних епізодів^{БНФ} помірного та важкого ступеня; профілактика повторних нападів у пацієнтів з біполярними розладами^{БНФ}, у яких було отримано позитивну відповідь при лікуванні оланзапіном манії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим р/ос; шизофренія: початкова доза - 10 мг 1р/день^{БНФ}; маніакальні епізоди: початкова доза як монотерапії - 15 мг/добу^{БНФ}, при комбінованому лікуванні - 10 мг/добу; профілактика повторних нападів у пацієнтів з біполярними розладами: початкова доза - 10 мг/добу^{БНФ}, пацієнти, які отримували оланзапін для лікування маніакальних епізодів, продовжують отримувати оланзапін у тому ж дозуванні і для профілактики повторних нападів; лікування шизофренії, маніакальних епізодів та попередження рецидивів біполярного розладу: щоденна доза залежить від клінічного статусу 5-20 мг/добу^{БНФ}, збільшення рекомендованої початкової дози проводять з інтервалами не менше 24 год. лише після клінічного обстеження; відмінити поступово.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: еозинофілія, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія; АР; збільшення маси тіла, підвищення рівня холестерину, підвищення рівня глюкози, підвищення рівня тригліцеридів, глюкозурія, підвищення апетиту, розвиток або загострення діабету, рідко пов'язаного з кетоацидозом або комою, включаючи деякі летальні випадки; гіпотермія; сонливість, запаморочення, акатизія, паркінсонізм, дискінезія, амнезія, епілептичні напади, що були в анамнезі або були наявні фактори ризику; нейролептичний зловісний синдром; дистонія (включно з окулярним симптомом); пізня дискінезія; синдром відміни⁷, седація (у тому числі гіперсомнія, млявість, сонливість); брадикардія, пролонгація інтервалу QT_c, вентрикулярна тахікардія/фібриляція, раптова смерть; ортостатична гіпотензія, тромбоемболія (включаючи емболію легеневої артерії та глибокий венозний тромбоз); легкі, короткотривалі антихолінергічні ефекти, включаючи запори та сухість у роті, панкреатит; транзиторні, асимптоматичні підйоми рівня печінкових трансаміназ АЛТ та АСТ, периферичні набряки, гепатити (включаючи гепатоцелюлярне, холестатичне або змішане ушкодження печінки); р-ції світлочутливості, алопеція, медикаментозна реакція з еозинофілією та системними симптомами (DRESS); артралгія, рабдоміоліз; нетримання сечі; затримка сечі, утруднене сечовипускання; еректильна дисфункція у чоловіків; зниження лібідо у жінок та чоловіків, аменорея; збільшення грудей; галакторея у жінок; гінекомастія/збільшення грудей у чоловіків, пріапізм; с-м відміни у новонароджених; астенія, втомлюваність, набряки, пірексія; підвищення рівня пролактину в плазмі, підвищення рівня креатинфосфокінази, підвищення загального білірубину, підвищення рівня алкалінфосфатази, підвищення рівня гамма-глутамілтрансферази, підвищення рівня сечової к-ти.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до оланзапіну або до будь-якої з допоміжних речовин ЛЗ; відомий ризик закритокутової глаукоми.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 10 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АДАЖИО®	ПАТ "Фармак" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника)	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№7x4	23,57	

		Апотекс Інк, Канада), Україна					
	АДАЖИО®	ПАТ "Фармак" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника Апотекс Інк, Канада), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№7x4	19,64	
II.	ЕГОЛАНЗА	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 75мг, 10мг, 15мг, 20мг	№7x4, №7x8	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕГОЛАНЗА	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№7x4	34,12	25,14/\$
	ЕГОЛАНЗА	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№7x4	30,53	25,14/\$
	ЗАПАСТА®	КРКА, д.д., Ново место/КРКА, Польща Сп.з.о.о., Словенія/Польща	табл. у бл.	2,5мг, 5мг, 7,5мг, 10мг, 15мг, 20мг	№7x4, №7x8	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЗАПАСТА®	КРКА, д.д., Ново место/КРКА, Польща Сп.з.о.о., Словенія/Польща	табл. у бл.	5мг	№7x4	21,85	30,11/€
	ЗАПАСТА®	КРКА, д.д., Ново место/КРКА, Польща Сп.з.о.о., Словенія/Польща	табл. у бл.	10мг	№7x4	21,38	30,11/€
	ЗАПАСТА® Q-TAB®	КРКА, д.д., Ново место/КРКА, Польща Сп.з.о.о., Словенія/Польща	табл., що дисп. у бл.	5мг, 7,5мг, 10мг, 15мг, 20мг	№7x4, №7x8	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЗОЛАФРЕН	АТ "Адамед Фарма" (контроль якості, дозвіл на випуск серії; виробник "in bulk", первинного та вторинного пакування), Польща	табл., в/о, у бл. в кор.	5мг	№30x1	19,56	26,67/\$
	ЗОЛАФРЕН	АТ "Адамед Фарма" (контроль якості, дозвіл на випуск серії; виробник "in bulk", первинного та вторинного пакування), Польща	табл., в/о, у бл. в кор.	10мг	№30x1	14,18	26,67/\$
	ОЛАНЗАПІН	Джубілант Дженерікс Лімітед, Індія	табл., що дисп. у бл.	5мг, 10мг, 15мг, 20мг	№10x1; №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ОЛФРЕКС	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПАРНАСАН®	ВАТ "Гедеон Ріхтер" (випуск серії)/ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща" (контроль якості, дозвіл на випуск серії; виробництво нерозфасованого продукту, первинна упаковка, вторинна упаковка), Угорщина/Польща	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	

● **Паліперидон (Paliperidone)**

Фармакотерапевтична група: N05AX13 - антипсихотичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: селективний блокуючий агент ефектів моноамінів; сильно зв'язується з серотоніновими 5-HT₂ та дофаміновими D₂-рецепторами; блокує α₁-, α₂-адренергічні рецептори та H₁-гістамінові рецептори; фармакологічна активність (+) та (-)-енантіомерів паліперидону кількісно і якісно однакова; не зв'язується з холінергічними рецепторами; спричиняє меншу каталепсію та зниження моторних функцій меншою мірою, ніж традиційні нейролептики; переважний центральний антагонізм до серотоніну зменшує схильність паліперидону до екстрапірамідних симптомів.

Показання для застосування ЛЗ: табл.: лікування шизофренії у дорослих та дітей віком від 15 років; лікування шизоафективних розладів у дорослих^{БНФ}; суспенз. д/ін'ек. прол. дії: підтримуюча терапія симптомів шизофренії у дорослих, стан яких стабілізовано паліперидоном або рисперидоном^{БНФ}; у окремих випадках дорослим пацієнтам з шизофренією, які раніше ефективно лікувалися паліперидоном або рисперидоном можна застосовувати без

попередньої стабілізації р/ос препаратами даної групи, якщо психотичні симптоми хворого варіюють від легкого до помірного ступеня і якщо показано лікування ін'єкц. лікарськими формами пролонгованої дії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовується р/ос та глибоко в/м; р/ос: лікування шизофренії: у дорослих рекомендована доза складає 6 мг 1 р/добу, вранці, титрування дози на початку терапії не потрібне; терапевтичний ефект може спостерігатися у межах рекомендованого діапазону 3-12 мг 1 р/добу; коригувати дозу при наявності показань після ретельної повторної оцінки стану пацієнта; якщо показане підвищення дози, рекомендується збільшення на 3 мг/день з інтервалом не менше 5 днів^{БНФ}; у дітей віком від 15 років початкова доза складає 3 мг 1 р/добу, вранці; діти з масою тіла <51 кг: рекомендована МДД - 6 мг; діти з масою тіла ≥51 кг: рекомендована МДД - 12 мг; якщо показане підвищення дози збільшення проводять на 3 мг/день з інтервалом не менше 5 днів; шизоафективні розлади: у дорослих рекомендована доза - 6 мг 1 р/добу, вранці, титрування дози на початку терапії не потрібне; терапевтичний ефект може спостерігатися у межах рекомендованого діапазону 6-12 мг 1 р/добу, коригувати дозу при наявності показань після ретельної повторної оцінки стану пацієнта, якщо показане підвищення дози, рекомендується збільшення на 3 мг/день з інтервалом не менше 4 днів; безпеку та ефективність застосування паліперидону для лікування шизоафективних розладів у дітей віком до 17 років не встановлено та не вивчалися; підтримуюча терапія симптомів шизофренії у дорослих, стан яких стабілізовано паліперидоном або рисперидоном: глибоко в/м - 150 мг (день 1), через 1 тиждень - 100мг (день 8), третю дозу вводять через місяць після другої початкової дози, у подальшому щомісячна підтримуюча доза - 75 мг; дозу можна збільшити або зменшити в діапазоні 25-150 мг залежно від індивідуальної переносимості та/або ефективності^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: бронхіт, інфекції ВДШ, синусит, інфекції сечовивідних шляхів, грип, пневмонія, інфекції дихальних шляхів, цистит, запалення вуха, тонзиліт, очні інфекції, оніхомікоз, запалення підшкірної клітковини, акародерматит, акародерматит; зниження кількості лейкоцитів, тромбоцитопенія, анемія, зниження гематокриту, агранулоцитоз, нейтропенія, збільшення кількості еозинофілів; анафілактичні р-ції, гіперчутливість; гіперпролактинемія, с-м неадекватної секреції антидіуретичного гормону (СНС АДГ)с, наявність глюкози в сечі; збільшення маси тіла/ окружності талії, підвищення апетиту, зниження маси тіла/ апетиту, ЦД, гіперглікемія, анорексія, підвищення рівня тригліцеридів/ холестерину у крові, водна інтоксикація, діабетичний кетоацидоз, гіпоглікемія, полідипсія; безсоння, манія, ажитація, депресія, тривожність, розлади сну, сплутаність свідомості, кататонія, сомнамбулізм, зниження лібідо, аноргазмія, знервованість, розлади харчової поведінки, пов'язані зі сном, нічні жахи, притуплений афект; паркінсонізм, акатизія, седація/сонливість, головний біль, дистонія, запаморочення, дискінезія, тремор, пізня дискінезія, судороги, синкопе, психомоторна гіперактивність, постуральне запаморочення, порушення уваги, дизартрія, дисгевзія, гіпестезія, парестезія, злоякісний нейролептичний с-м, церебральна ішемія, відсутність відповіді на стимуляцію, втрата свідомості, пригнічення свідомості, діабетична кома, порушення рівноваги, порушення координації рухів, ритмічне похитування голови; розмитість зору, фотофобія, кон'юнктивіт, сухість очей, глаукома, порушення руху очних яблук, ротаторний ністагм, підвищене слюзовиділення, гіперемія очей; вертиго, шум/ біль у вухах; AV-блокада, порушення провідності, подовження інтервалу QT чи відхилення на ЕКГ, брадикардія, тахікардія, синусова аритмія, відчуття серцебиття, фібриляція передсердь, с-м постуральної ортостатичної тахікардії; ортостатична гіпотензія, гіпертензія, гіпотензія, легенева емболія, венозний тромбоз, ішемія, припливи; фаринголарингеальний біль, кашель, закладеність носа, диспное, свистяче дихання, носова кровотеча, с-м нічного апное, гіпервентиляція, аспіраційна пневмонія, погіршення прохідності дихальних шляхів, дисфонія; біль/ відчуття дискомфорту у животі, блювання, нудота, запор, діарея, диспепсія, сухість у роті, зубний біль, набряк язика, гастроентерит, дисфагія, метеоризм, панкреатит, обструкція кишечника, кишкова непрохідність, нетримання калу, фекалома, хейліт; підвищення рівня трансаміназ, гамма-глутаміл-трансферази, печінкових ферментів, жовтяниця; свербіж, висипання, кропив'янка, алопеція, екзема, акне, ангіоневротичний набряк, висипання медикаментозного походження, гіперкератоз, сухість чи зміна кольору шкіри, еритема, себорейний дерматит, лупа; м'язово-скелетний біль, біль у спині, артралгія, підвищення рівня КФК в крові, спазми м'язів, скутість/ набрякання суглобів, м'язова слабкість, біль у шії, рабдоміоліз, порушення постави; нетримання/ затримка сечі, полакіурія, дизурія, с-м відміни препарату у новонароджених; аменорея, еректильна дисфункція, порушення еякуляції/ менструального циклу у жінок, галакторея, сексуальна дисфункція, біль/ відчуття дискомфорту у молочних залозах; пріапізм, затримка менструації, гінекомастія, нагрудання/ збільшення молочних залоз, виділення з сосків, вагінальні виділення; лихоманка, астенія, слабкість, набряк обличчя, набряки, озноб, підвищення/ зниження t тіла, порушення ходи, спрага, біль в ділянці грудної клітки, дискомфорт у грудях, нездужання; гіпотермія, с-м відміни препарату, ущільнення тканин; падіння; частота невідома: гіперінсулінемія, легенева застій.

Противпоказання до застосування ЛЗ: гіпергіперчутливість до паліперидону, до рисперидону або до будь-якого з допоміжних компонентів ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 6 мг., парентерально (депо) - 2,5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ІНВЕГА®	Янссен-Сілаг С.п.А. (первинна і вторинна упаковка, випуск серії)/Алза Корпорейшн (виробництво лікарського засобу)/Янссен-Сілаг Мануфекчуринг ЛЛС (виробництво лікарського засобу), Італія/США/США	табл. прол. дії, в/о у бл	3мг, 9мг	№7x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	

ИНВЕГА®	Янссен-Сілаг С.п.А. (первинна і вторинна упаковка, випуск серії)/Алза Корпорейшн (виробництво лікарського засобу)/Янссен-Сілаг Мануфекчуринг ЛЛС (виробництво лікарського засобу), Італія/США/США	табл. прол. дії, в/о у бл	6мг	№7x4	100,15	28,18/\$
КСЕПЛІОН®	Янссен Фармацевтика НВ/Сілаг АГ, Бельгія/Швейцарія	сусп. д/ін'єк. прол. дії по 1,5мл у шпр. з 2голк.	100 мг/мл	№1	210,34	26,50/\$
КСЕПЛІОН®	Янссен Фармацевтика НВ/Сілаг АГ, Бельгія/Швейцарія	сусп. д/ін'єк. прол. дії по 1мл у шпр. з 2голк.	100 мг/мл	№1	235,09	26,50/\$
КСЕПЛІОН®	Янссен Фармацевтика НВ/Сілаг АГ, Бельгія/Швейцарія	сусп. д/ін'єк. прол. дії по 0,75мл у шпр. з 2голк.	100 мг/мл	№1	252,41	26,50/\$
КСЕПЛІОН®	Янссен Фармацевтика НВ/Сілаг АГ, Бельгія/Швейцарія	сусп. д/ін'єк. прол. дії по 0,5мл у шпр. з 2голк.	100 мг/мл	№1	269,74	26,50/\$

• **Рисперидон (Risperidone)** * [ГМД]

Фармакотерапевтична група: N05AX08 - антипсихотичні ЛЗ.

Основна фармакотерапевтична дія: селективний моноамінергічний антагоніст з унікальними властивостями; виявляє високу афінність до серотонінергічних 5-HT₂ і дофамінергічних D₂-рецепторів; зв'язується з α₁-адренергічними рецепторами та з меншою афінністю - з H₁-гістамінергічними та α₂-адренергічними рецепторами; не виявляє афінності до холінергічних рецепторів, не спричиняє значного пригнічення моторної активності і меншою мірою індукує катаlepsію порівняно з класичними нейролептиками; збалансований центральний антагонізм до серотоніну та дофаміну зменшує схильність до екстрапірамідних побічних ефектів і розширює терапевтичний вплив ЛЗ з охопленням негативних та афективних симптомів шизофренії.

Показання для застосування ЛЗ: лікування шизофренії та інших психічних розладів^{БНФ}, у т. ч. підтримуюча терапія, у пацієнтів, у яких спостерігалася відповідь на терапію, з метою запобігання рецидиву хвороби; лікування маніакальних епізодів при біполярних розладах^{БНФ} (допоміжна терапія у комбінації з нормотиміками як початкове лікування або як монотерапія на період тривалістю до 12 тижнів); короточасне лікування вираженої агресії або тяжких психічних симптомів у пацієнтів з деменцією при існуванні загрози заподіяння шкоди собі чи іншим^{БНФ}; симптоматичне лікування зухвалих опозиційних розладів або інших розладів соціальної поведінки у дітей, підлітків та дорослих з розумовим розвитком нижче середнього або розумовою відсталістю, які мають прояви деструктивної поведінки (імпульсивність, аутоагресія); симптоматичне лікування аутичних розладів у дітей віком від 5 років, у яких симптоми варіюють від гіперактивності до роздратованості (включаючи агресію, завдання собі тілесних ушкоджень, тривожність та патологічні циклічні дії)^{ГМД}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос: шизофренія: дорослим, 1-2 р/добу, розпочинати прийом з 2 мг/добу (день 1-й), дозу можна збільшити до 4 мг (день 2-й), рекомендована доза - 4-6 мг/добу; МДД - 10 мг; дози вище 16 мг - не застосовують^{БНФ}; у разі необхідності додаткової седації можна одночасно застосовувати бензодіазепін; маніакальні епізоди при біполярних розладах: дорослим рекомендована початкова доза - 2 мг/добу, дозу можна індивідуально збільшити додаванням 1 мг/добу не частіше, ніж ч/з кожні 24 год^{БНФ}; рекомендований діапазон доз - 2-6 мг/добу, дітям від 10 років рекомендована початкова доза - 0,5 мг 1 р/добу, дозу можна індивідуально збільшувати, додаючи 0,5-1 мг/добу не частіше, ніж ч/з кожні 24 год. до досягнення рекомендованої дози 2,5 мг/добу, рекомендований діапазон доз - 0,5-6 мг/добу; МДД - 6 мг/добу; короточасна терапія вираженої агресії або тяжких психічних симптомів у пацієнтів з деменцією: рекомендована початкова доза - 0,25 мг 2 р/добу, за необхідності дозу збільшити на 0,25 мг 2 р/добу не частіше, ніж через добу, оптимальна доза - 0,5 мг 2 р/добу, для деяких пацієнтів ефективну дозу збільшити до 1 мг 2 р/добу^{БНФ}, після досягнення оптимальної дози розглянути можливість прийому добової дози 1 р/день; симптоматичне лікування розладів соціальної поведінки або агресивної поведінки: дорослим пацієнтам та дітям від 5 років з масою тіла ≥50 кг рекомендована початкова доза - 0,5 мг 1 р/добу, у разі необхідності дозу коригують додаванням 0,5 мг 1 р/добу не частіше, ніж ч/з день; оптимальна доза для більшості пацієнтів - 1 мг 1 р/добу, однак для деяких пацієнтів для досягнення позитивного ефекту достатньо не більше 0,5 мг 1 р/добу, тоді як інші можуть потребувати 1,5 мг 1 р/добу. ; з масою тіла < 50 кг початкова доза - 0,25 мг 1 р/добу; при необхідності дозу коригують додаванням 0,25 мг 1 р/добу не частіше, ніж ч/з день, оптимальна доза для більшості пацієнтів - 0,5 мг 1 р/добу^{БНФ}; однак для деяких пацієнтів достатньо не більше ніж 0,25 мг 1 р/добу для досягнення позитивного ефекту, тоді як інші можуть потребувати 0,75 мг 1 р/добу; аутизм у дітей віком від 5 років: з масою тіла <50 кг - рекомендована початкова доза - 0,25 мг 1 р/добу, з 4-го дня дозу можна збільшити на 0,25 мг, підтримувати дозу 0,5 мг та на 14-й день провести оцінку клінічної відповіді. збільшення дози на 0,25 мг з інтервалом у 2 тижні можна розглядати лише для пацієнтів із недостатньою клінічною відповіддю; з масою тіла ≥50 кг - 0,5 мг 1 р/добу, з 4-го дня дозу можна збільшити на 0,5 мг, підтримувати дозу 1 мг та на 14-й день провести оцінку клінічної відповіді, збільшення дози на 0,5 мг з інтервалом у 2 тижні можна розглядати лише для пацієнтів із недостатньою клінічною відповіддю.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: пневмонія, бронхіт, інфекції ВДШ, синусит, інфекції сечовивідних шляхів, інфекції вуха, грип, інфекції дихальних шляхів, цистит, очні інфекції, тонзиліт, оніхомікоз, запалення підшкірної клітковини, локалізована інфекція, вірусні інфекції, акародерматит, інфекція, нейтропенія, зниження кількості лейкоцитів, тромбоцитопенія, анемія, зниження рівня гематокриту, збільшення кількості еозинофілів, агранулоцитоз, гіперчутливість, анафілактична реакція, анафілактична реакція, порушення секреції антидіуретичного гормону, присутність глюкози в сечі, збільшення маси тіла, збільшення апетиту, зниження апетиту, ЦД, гіперглікемія, полідипсія, зниження маси тіла, анорексія, підвищення рівня холестерину в крові, інтоксикація, гіпоглікемія, гіперінсулінемія, збільшення рівня тригліцеридів у крові, діабетичний кетоацидоз, безсоння, розлади сну, ажитація, депресія, тривога, манія, сплутаність свідомості, зниження лібідо, нервозність, жадливі сновидіння, притуплений афект, аноргазмія, седативний ефект, сонливість, паркінсонізм, головний біль, акатизія, дистонія, запаморочення, дискінезія, тремор, пізня дискінезія, церебральна ішемія, відсутність реакції на подразники, втрата свідомості, пригнічений стан свідомості, судоми, синкопе, психомоторна гіперактивність, розлади рівноваги, порушення координації, постуральне запаморочення, порушення уваги, дизартрія, дисгевзія, гіпестезія, парестезія, злоякісний нейролептичний с-м, цереброваскулярний розлад, діабетична кома, ритмічне похитування голови, нечіткість зору, кон'юнктивіт, фотофобія, сухість очей, посилене сльозовиділення, гіперемія очей, глаукома, розлади рухів очей, ротаторний ністагм, кірка по краю повіки, с-м атонічної райдужки (інтраопераційний), вертиго, шум або дзвін у вухах, біль у вухах, тахікардія, фібриляція передсердь, АВ-блокада, розлади провідності, подовження інтервалу QT на ЕКГ, брадикардія, відхилення на ЕКГ, пальпітація, синусова аритмія, с-м постуральної ортостатичної тахікардії, АГ, артеріальна гіпотензія, ортостатична гіпотензія, припливи, легенева емболія, тромбоз вен, задишка, біль у глотці та гортані, кашель, носова кровотеча, закладеність носа, аспіраційна пневмонія, легеневий застій, погіршення прохідності дихальних шляхів, хрипи, свистяче дихання, дисфонія, розлад дихання, с-м нічного апное, гіпервентиляція, : абдомінальний біль, абдомінальний дискомфорт, блювання, нудота, запор, діарея, диспепсія, сухість у роті, зубний біль, нетримання калу, каловий екскремент, гастроентерит, дисфагія, метеоризм, панкреатит, ШКТ, набряк язика, хейліт, непрохідність кишечника, підвищення рівня трансаміназ, підвищення рівня гамма-глутамілтрансферази, підвищення рівня печінкових ферментів, жовтяниця, висипання, еритема, кропив'янка, свербіж, алопеція, гіперкератоз, екзема, сухість шкіри, зміна кольору шкіри, акне, себореїтний дерматит, захворювання шкіри, ушкодження шкіри, медикаментозні висипання, лупа, ангіоневротичний набряк, м'язові спазми, м'язово-скелетний біль, біль у спині, артралгія, підвищення рівня креатинфосфокінази крові, порушення постави, скутість суглобів, набряк суглобів, м'язова слабкість, біль у шиї, рабдоміоліз, нетримання сечі, полакіурія, затримка сечовиділення, дизурія, екстрапірамідні симптоми та/або с-м відміни препарату у новонародженим, ерекційна дисфункція, порушення еякуляції, аменорея, порушення менструального циклу, гінекомастія, галакторея, сексуальна дисфункція, біль у молочних залозах, відчуття дискомфорту в молочних залозах, піхвові виділення, пріапізм, затримка менструації, нагубання молочних залоз, збільшення молочних залоз, виділення з молочних залоз, набряк, гарячка, біль у грудній клітці, астенія, підвищена втомлюваність, біль, набряк обличчя, озноб, підвищення t° тіла, порушення ходи, спрага, дискомфорт у грудній клітці, нездужання, гарячка, незвичні відчуття, дискомфорт, гіпотермія, зниження t° тіла, відчуття холоду у кінцівках, с-м відміни препарату, ущільнення, падіння, біль після хірургічних втручань, с-м постуральної ортостатичної тахікардії, шлуночкова аритмія, фібриляція шлуночків, шлуночкова тахікардія, раптова смерть, зупинка серця, тріпотіння-мерехтіння, розвиток венозної тромбоемболії, в тому числі легеневої емболії та тромбозу глибоких вен.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до рисперидону або до будь-якої допоміжної речовини ЛЗ; деменція та симптоми хвороби Паркінсона (ригідність, брадикінезія та паркінсонічні порушення постави); деменція та підозра на деменцію з тільцями Леві (окрім симптомів деменції щонайменше два з таких симптомів: паркінсонізм, візуальні галюцинації, хиткість ходи).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НЕЙРИСПІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	1мг, 2мг, 4мг	№10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НЕЙРИСПІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з	табл., вкриті п/о у бл.	1мг	№10x2	22,60	

		обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна					
	НЕЙРИСПІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	2мг	№10x2	22,22	
	НЕЙРИСПІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	4мг	№10x2	20,46	
II.	ЕРІДОН®	Дар Аль Дава Девелопмент енд Інвестмент Ко. лтд. (виробництво, пакування та контроль якості лікарського засобу)/Шанель Медікал (контроль якості та випуск серії)/Компліт Лабораторі Солушнз (контроль якості (мікробіологічний контроль)), Йорданія/Ірландія/Ірландія	р-н орал., по 30мл у фл. з доз. піпет.	1 мг/мл	№1	50,67	32,40/€
	ЕРІДОН®	Дексель Лтд. (виробництво, пакування, випробування контролю якості та випуск серії)/ТОВ Інститут харчової мікробіології та споживчих товарів (випробування контролю якості (мікробіологічний контроль)), Ізраїль/Ізраїль	табл., вкриті п/о у бл.	2мг	№10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕРІДОН®	Дексель Лтд. (виробництво, пакування, випробування контролю якості та випуск серії)/ТОВ Інститут харчової мікробіології та споживчих товарів (випробування контролю якості (мікробіологічний контроль)), Ізраїль/Ізраїль	табл., вкриті п/о у бл.	2мг	№10x3	8,43	24,80/\$
	ЕРІДОН®	Дексель Лтд. (виробництво, пакування, випробування контролю	табл., вкриті п/о у бл.	4мг	№10x6	8,04	27,53/\$

	якості та випуск серії)/ТОВ Інститут харчової мікробіології та споживчих товарів (випробування контолю якості (мікробіологічний контроль)), Ізраїль/Ізраїль					
ЕРІДОН®	Дексель Лтд./ТОВ Інститут харчової мікробіології та споживчих товарів (випробування контолю якості (мікробіологічний контроль)), Ізраїль/Ізраїль	табл., вкриті п/о у бл.	4мг	№10x3	7,73	24,80/\$
РИСПАКСОЛ®	АТ "Гріндекс", Латвія	табл., вкриті п/о у бл.	2мг	№10x6	2,25	26,85/€
РИСПАКСОЛ®	АТ "Гріндекс", Латвія	табл., вкриті п/о у бл.	2мг	№10x2	21,03	35,04/€
РИСПАКСОЛ®	АТ "Гріндекс", Латвія	табл., вкриті п/о у бл.	4мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РИСПАКСОЛ®	АТ "Гріндекс", Латвія	табл., вкриті п/о у бл.	4мг	№10x6	5,73	26,85/€
РИСПЕРИДОН САНДОЗ®	Сандоз ГмбХ - ТехОпс (виробництво in bulk, випуск серії)/С.К. Сандоз С.Р.Л. (випуск серії, контроль/випробування серії)/Сандоз Фармасьютикалз ГмбХ дільниця Герлінген (первинне та вторинне пакування)/Саніко НВ (первинне та вторинне пакування)/Лек фармацевт, Австрія/Румунія/Німеччина /Бельгія/Словенія/Банглад еш/Франція/Швеція/Греція	табл., вкриті п/о у бл.	1мг	№10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РИСПЕРОН®	БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦЯ АД, Болгарія	табл., вкриті п/о у бл.	2мг, 4мг	№10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РИСПЕРОН®	БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦЯ АД, Болгарія	табл., вкриті п/о у бл.	4мг	№10x3	11,67	30,43/€
РИСПЕРОН®	БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦЯ АД, Болгарія	табл., вкриті п/о у бл.	2мг	№10x3	19,17	30,43/€
РИСПЕТРИЛ	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у фл.	1мг	№60	21,90	27,60/\$
РИСПЕТРИЛ	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у фл.	4мг	№60	7,90	27,60/\$
РИСПЕТРИЛ	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у бл.	2мг	№10x2	16,93	27,60/\$
РИСПЕТРИЛ	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у фл.	2мг	№60	8,35	27,60/\$
РИСПЕТРИЛ	Фармасайнс Інк., Канада	р-н орал. по 30мл у фл. з дозат.	1 мг/мл	№1	63,22	27,09/\$
РИСПОЛЕПТ КОНСТА®	Сілаг АГ (виробництво та первинна упаковка розчинника, вторинна упаковка та випуск серії)/Алкермес Інк. (виробництво та первинна упаковка порошку), Швейцарія/США	пор. з розч. д/сусп. д/ін'єк. прол. дії (компл.: 1фл. з пор., 1шпр. з розч., 1безголк. прист. West/Medimop д/пригот. сусп. та 2голк. (25мм та 51мм) для в/м ін'єк.	25мг	№1	380,04	24,25/\$
РИСПОЛЕПТ КОНСТА®	Сілаг АГ (виробництво та первинна упаковка розчинника, вторинна упаковка та випуск	пор. з розч. д/сусп. д/ін'єк. прол. дії (компл.: 1фл. з	37,5мг	№1	371,42	24,25/\$

	серії)/Алкермес Інк. (виробництво та первинна упаковка порошку), Швейцарія/США	пор., 1шпр. з розч., 1безголк. прист. West/Medimop д/пригот. сусп. та 2голк. (25мм та 51мм) для в/м ін'єк.				
РИСПОЛЕПТ®	Янссен-Сілаг С.п.А., Італія	табл., в/о у бл.	2мг	№10x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПОЛЕПТ®	Янссен-Сілаг С.п.А., Італія	табл., в/о у бл.	2мг	№10x2	26,68	24,25/\$
РИСПОЛЕПТ®	Янссен Фармацевтика НВ, Бельгія	р-н орал-, по 100мл у фл. з піпет.-дозат.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПОЛЕПТ®	Янссен Фармацевтика НВ, Бельгія	р-н орал-, по 30мл у фл. з піпет.-дозат.	1 мг/мл	№1	73,41	24,25/\$
РИССЕТ®	Меркле ГмбХ (дільниця, яка відповідає за виробництво нерозфасованої продукції, первинну та вторинну упаковку; дільниця, яка відповідає за дозвіл на випуск серії)/Трансфарм Логістик ГмбХ (дільниця, яка відповідає за вторинну упаковку), Німеччина/Німеччина	р-н орал., по 30мл, 100мл у фл. з адапт. і доз. прист.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РІЛЕПТИД®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл., в/о у бл.	1мг, 2мг, 3мг, 4мг	№10x1, №10x2, №10x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РІЛЕПТИД®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл., в/о у бл.	2мг	№10x2	8,22	26,31/\$
ТОРЕНДО®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	1мг, 2мг, 3мг, 4мг	№10x2, №10x3, №10x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТОРЕНДО®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	2мг	№10x6	4,89	30,11/€
ТОРЕНДО®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	2мг	№10x2	6,40	30,11/€
ТОРЕНДО®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	4мг	№10x6	5,94	29,43/€
ТОРЕНДО®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	4мг	№10x3	6,04	29,43/€

• **Сертиндол (Sertindol)**

Фармакотерапевтична група: N05AE03 - селективні антипсихотичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: нейрофармакологічний профіль антипсихотичної дії зумовлений селективною блокадою мезолімбічних дофамінергічних нейронів та збалансованим інгібіторним впливом на центральні дофамінові D2 та серотонінові 5HT2-рецептори і на α_1 -адренергічні рецептори; рівень пролактину у пацієнтів, які приймають сертиндол, залишається у межах норми протягом короткого та довготривалого (1 рік) курсу лікування; не впливає на м-холінорецептори та гістамінові H1-рецептори.

Показання для застосування ЛЗ: шизофренія; призначають тільки тим пацієнтам, лікування яких хоча б одним з інших антипсихотичних ЛЗ супроводжувалось реакціями непереносимості ЛЗ; не застосовують у невідкладних ситуаціях для швидкого полегшення симптомів загострення у пацієнтів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос 1 р/добу; для седативної дії одночасно призначається бензодіазепін; початкова доза - 4 мг/добу; дозу підвищувати на 4 мг через кожні 4-5 діб, до досягнення оптимальної добової підтримуючої дози 12-20 мг; початкова доза 8 мг або прискорене підвищення дози збільшують ризик постуральної гіпотензії; підтримуюча доза - залежно від ефекту, індивідуально доза може бути підвищена до 20 мг/добу; у виняткових випадках МДД - 24 мг; пацієнти, які мали перерву у прийомі сертиндолу менш ніж 1 тиждень, не потребують повторного титрування дози, а їхня підтримуюча доза може бути відновлена; тривалість лікування визначається індивідуально для кожного хворого залежно від перебігу захворювання і стану пацієнта.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: риніт/закладений ніс; порушення еякуляції (знижений еякуляторний об'єм; відсутність/ порушення еякуляції); запаморочення; сухість у роті, збільшення маси тіла, диспное; парестезії та пролонгація інтервалу QT; гіперпролактинемія; гіперглікемія; запаморочення, парестезії; синкопе, судоми, рухові розлади (пізня дискінезія), злоякісний нейролептичний с-м; периферичний набряк,

постуральна гіпотензія; аритмія на зразок (torsade de pointes); галакторея; поява еритроцитів або лейкоцитів у сечі; невідомі: венозний тромбоемболізм (емболія легеневої артерії, тромбоз глибоких вен), зумовлений антипсихотичними ЛЗ, с-м відміни у новонароджених.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до сертиндолу або будь-якого компоненту ЛЗ; встановлена некоригована гіпокаліємія або гіпомагніємія; клінічно значущі СС захворювання (застійна СН, кардіогіпертрофія, аритмії або брадикардія (< 50 уд/хв)) в анамнезі; с-м спадкового подовженого інтервалу QT або сімейний анамнез цієї хвороби; надбаний пролонгований інтервал QT (QTс понад 450 мсек у чоловіків та 470 мсек у жінок); ураження печінки тяжкого ступеня; пацієнтам, які отримують ЛЗ, що значно подовжують інтервал QT (антиаритмічні ЛЗ Іа та ІІІ класу - хінідин, аміодарон, соталол, дофетилід; антипсихотичні ЛЗ - тіоридазин, макроліди - еритроміцин; антигістамінні ЛЗ - терфенадин, астемізол; хінолонові а/б - гатифлоксацин, моксифлоксацин та ін.); та інші ЛЗ (цисаприд, літій); пацієнтам, які отримують ЛЗ, що здатні потужно пригнічувати ензими печінкового цитохрому Р450 3А («азольні» протигрибкові засоби системної дії - кетоконазол, ітраконазол; деякі а/б-макроліди - еритроміцин, кларитроміцин; інгібітори НІV-протеази - індинавір; деякі блокатори кальцієвих каналів - дилтіазем, верапаміл та ін.); пацієнтам, які отримують ЛЗ, що здатні потужно пригнічувати ензими СYP3А - циметидин.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 16 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	СЕРДОЛЕКТ	Х. Лундбек А/С (вир-во нерозфас. прод., перв. та втор. пакув., випуск серій)/ Еурофінс Біофарма Продакт Тестінг Денмарк А/С (випроб. за показн. "Мікробіологічна чистота"), Данія	табл., в/о у бл.	4мг	№10x3	92,70	28,01/€
	СЕРДОЛЕКТ	Х. Лундбек А/С (вир-во нерозфас. прод., перв. та втор. пакув., випуск серій)/ Еурофінс Біофарма Продакт Тестінг Денмарк А/С (випроб. за показн. "Мікробіологічна чистота"), Данія	табл., в/о у бл.	12мг	№14x2	92,69	28,01/€

5.1.3. Парціальні агоністи дофамінових (D2) рецепторів

- **Арипіпразол (Aripiprazole)**

Фармакотерапевтична група: N05AX12 - антипсихотичні засоби (нейролептики).

Основна фармакотерапевтична дія: терапевтична дія при шизофренії зумовлена сполученням часткової агоністичної активності відносно D₂-дофамінових і 5HT_{1а}-серотонінових рецепторів і антагоністичною активністю відносно 5HT₂- рецепторів; має високу аффіність до D₂- і D₃-дофамінових рецепторів, 5HT_{1а}- і 5HT_{2а}-серотонінових рецепторів та помірну аффіність до D₄-дофамінових, 5HT_{2с}- і 5HT₇-серотонінових рецепторів, α₁-адренорецепторів та Н₁-гістамінових рецепторів; характеризується помірною аффіністю до ділянок зворотнього захоплення серотоніну та відсутністю аффіності до мускаринових рецепторів; виявляє антагонізм відносно дофамінергічної гіперактивності та агонізм відносно дофамінергічної гіпоактивності.

Показання для застосування ЛЗ: лікування шизофренії у дорослих; лікування помірних і тяжких маніакальних епізодів при біполярному розладі І типу, а також для запобігання нових маніакальних епізодів у дорослих, які раніше перенесли маніакальні епізоди та відповідали на лікування арипіпразолом^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос; шизофренія: початкова доза - 10-15 мг 1 р/день; підтримуюча доза - 15 мг/добу^{БНФ}; ефективний у діапазоні доз від 10 до 30 мг/добу; МДД - 30 мг^{БНФ}; маніакальні епізоди при біполярному розладі І типу: початкова доза - 15 мг/добу, МДД - 30 мг^{БНФ}; запобігання новим маніакальними епізодами при біполярному розладі І типу: у пацієнтів, які отримували арипіпразол як монотерапію або при комбінованій терапії, лікування продовжувати у тій самій дозі, коригування добової дози, в т.ч. зниження дози, розглядати на основі клінічного стану.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія, АР (наприклад анафілактичні реакції; ангіоневротичний набряк, включно з набряком язика; набряк язика, набряк обличчя, свербіж або кропив'янка), діабетична гіперосмолярна кома, діабетичний кетоацидоз, гіпонатріємія, анорексія, зниження маси тіла, збільшення маси тіла, спроби суїциду, суїцидальне мислення і завершене самогубство, патологічна пристрасть до азартних ігор, розлади імпульсного контролю, компульсивне переїдання, непереборний потяг до покупок, періоманія, агресивність, збудження, нервозність, злоякісний нейролептичний с-м (ЗНС), великий судомний напад, серотоніновий с-м, порушення мовлення, окулогічний криз, раптовий летальний наслідок, піруетна шлуночкова тахікардія, подовження інтервалу QT, шлуночкова аритмія, зупинка серцевої діяльності, брадикардія, тахікардія, гіперпролактинемія, ЦД, гіперглікемія, безсоння, неспокій, збудження, депресія, безсоння, неспокій, збудження, депресія, гіперсексуальність, акатизія, екстрапірамідні порушення, тремор, головний біль, седативний ефект, сонливість, запаморочення, пізня дискінезія, дистонія, розмитість поля зору, диплопія, ортостатична гіпотензія, венозна тромбоемболія (включаючи легенеvu емболію та тромбоз глибоких вен), гіпертензія, синкопе, гикавка, аспіраційна пневмонія, ларингоспазм, ротоглотковий спазм, запор, диспепсія, нудота, надмірне слиновиділення, блювання, панкреатит, дисфагія, діарея, дискомфорт у ділянці ШКТ, печінкова недостатність, гепатит, жовтяниця, підвищення рівня аланінамінотрансферази (АЛТ), підвищення рівня аспартатамінотрансферази (АСТ), підвищення рівня гамма-глутамілтрансферази (ГГТ), підвищення рівня ЛФ, висип, реакції фоточутливості, алопеція, посилене потовиділення, рабдоміоліз, міалгія, ригідність м'язів, нетримання сечі, затримка сечовипускання, с-м відміни препарату у новонароджених, пріапізм, втома, порушення температурної регуляції (наприклад гіпотермія, пірекісія), біль у грудній клітці, периферичний набряк, підвищення

рівня глюкози крові, підвищення рівня глікозильованого Hb, коливання рівня глюкози крові, підвищення рівня креатинфосфокінази.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до арипіпрозолу або до будь-якого іншого компонента, що входить до складу ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 15 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АРЕЛІЯ®	ПАТ "Київмедпрепарат" (виробництво з форми in bulk фірми-виробника "Ронтіс Хеллас Медікал енд Фармасьютікал Продактс С.А.", Греція), Україна	табл. що дисп. у бл.	10мг, 15мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АРИПРАЗОЛ®	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	10мг, 15мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АРИПРАЗОЛ®	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x6	10,15	
	АРИПРАЗОЛ®	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x3	10,90	
	АРИПРАЗОЛ®	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	15мг	№10x3	10,07	
	АРИПРАЗОЛ®	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	15мг	№10x6	9,39	
	ФРЕЙМ®	ПАТ "Фармак" (виробництво з продукції in bulk фірми-виробника Ронтіс Хеллас Медікал енд Фармасьютікал Продактс С.А., Греція), Україна	табл. у бл.	5мг, 30мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФРЕЙМ®	ПАТ "Фармак" (виробництво з продукції in bulk фірми-виробника Ронтіс Хеллас Медікал енд Фармасьютікал Продактс С.А., Греція), Україна	табл. у бл.	10мг	№10x3	11,00	
	ФРЕЙМ®	ПАТ "Фармак" (виробництво з продукції in bulk фірми-виробника Ронтіс Хеллас Медікал енд Фармасьютікал Продактс С.А., Греція), Україна	табл. у бл.	15мг	№10x3	9,67	
II.	АБІЗОЛ	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл. у бл.	5мг	№14x2	12,64	26,52/\$
	АБІЗОЛ	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл. у бл.	10мг	№14x2	10,98	26,52/\$
	АБІЗОЛ	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл. у бл.	15мг, 30мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМДОАЛ®	ВАТ "Геден Ріхтер", Угорщина	табл. у бл.	10мг, 15мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АРИП МТ	Торрент Фармасьютікалс Лтд, Індія	табл. у бл.	10мг	№30	10,25	23,60/\$
	АРИП МТ	Торрент Фармасьютікалс Лтд, Індія	табл. у стрип. та бл.	10мг, 15мг	№10x3, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АРИПІПРАЗОЛ ТЕДЕК	Тедек-Мейджі Фарма, С.А., Іспанія	табл. у бл.	5мг, 10мг	№7x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АРИТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл. у конт.	5мг, 10мг	№1	відсутня у	

						реєстрі ОБЦ	
АРІЛЕНТАЛ	Актавіс Лтд. (виробництво та випуск серії), Мальта	табл., у бл.	10мг	№7x4	12,59	30,43/€	
АРІЛЕНТАЛ	Актавіс Лтд. (виробництво та випуск серії), Мальта	табл., у бл.	15мг	№7x4	10,54	30,43/€	
АРИПРАДЕКС	АТ "Лабораторіос НОРМОН", Іспанія	табл. у бл.	10мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЗИЛАКСЕРА®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. бл.	5мг, 10мг, 15мг, 30мг	№10x3, №10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЗИЛАКСЕРА®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. бл.	5мг	№10x3	13,55	30,11/€	
ЗИЛАКСЕРА®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. бл.	10мг	№10x3	9,03	30,11/€	
ЗИЛАКСЕРА®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. бл.	15мг	№10x3	7,53	30,11/€	
ЗІКАЛОП	Медокемі ЛТД (Завод AZ) (первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Чжецзян Хуахай Фармасьютікал Ко. Лтд. Сюньцяо-Сайт (виробництво готового продукту in bulk), Кіпр/Китай	табл. у бл.	5мг, 10мг, 15мг, 30мг8	№10x3, №10x6, №10x9	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЗІКАЛОП	Медокемі ЛТД (Завод AZ) (первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Чжецзян Хуахай Фармасьютікал Ко. Лтд. Сюньцяо-Сайт (виробництво готового продукту in bulk), Кіпр/Китай	табл. у бл.	10мг	№10x3	10,14	30,26/€	
ЗІКАЛОП	Медокемі ЛТД (Завод AZ) (первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Чжецзян Хуахай Фармасьютікал Ко. Лтд. Сюньцяо-Сайт (виробництво готового продукту in bulk), Кіпр/Китай	табл. у бл.	15мг	№10x3	9,08	30,26/€	
МІНТЕГРА	Ронтіс Хеллас Медікал енд Фармасьютікал Продактс С.А., Греція	табл. що дисп. у бл.	10мг, 15мг, 30мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
МІРІУМ	Сінтон Хіспанія С.Л. (всі стадії виробничого процесу)/Джі І Фармасьютікалс, Лтд (альтернативна виробнича дільниця, на якій проводиться первинне та вторинне пакування)/Квінта-Аналітика с.р.о (альтернативна виробнича дільниця, на якій здійснюється контроль, Іспанія/Болгарія/Чеська Республіка/Німеччина/Чеська Республіка	табл. у бл.	5мг, 10мг, 15мг, 30мг	№10, №14, №28, №30, №49, №50, №56, №98, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ		
МІРІУМ	Сінтон Хіспанія С.Л. (всі стадії виробничого процесу)/Джі І Фармасьютікалс, Лтд (альтернативна виробнича дільниця, на якій	табл. у бл.	15мг	№7x4	9,59	26,85/€	

		проводиться первинне та вторинне пакування)/Квінта-Аналітика с.р.о (альтернативна виробнича дільниця, на якій здійснюється контроль, Іспанія/Болгарія/Чеська Республіка/Німеччина/Чеська Республіка					
ПІПЗОЛ 10	Алемб'юк Фармас'ютікелс Лімітед, Індія	табл. у бл.	10мг	№10x1	12,60	27,93/\$	
ПІПЗОЛ 15	Алемб'юк Фармас'ютікелс Лімітед, Індія	табл. у бл.	15мг	№10x1	9,30	27,93/\$	
ПІПЗОЛ 30	Алемб'юк Фармас'ютікелс Лімітед, Індія	табл. у бл.	30мг	№10x1	5,85	27,93/\$	
ПІПЗОЛ 5	Алемб'юк Фармас'ютікелс Лімітед, Індія	табл. у бл.	5мг	№10x1	22,50	27,93/\$	

5.2. Засоби, що застосовуються у лікуванні біполярного афективного розладу та манії

5.2.1. Мультиמודальні стабілізатори настрою

- **Літій (Lithium)** * [ГМД]

Фармакотерапевтична група: N05AN01 - психолептичні, антипсихотичні засоби; препарати літію.

Основна фармакотерапевтична дія: іони літію змінюють транспорт іонів натрію у нейронах, збільшують в/клітинне дезамінування норадреналіну, збільшують чутливість нейронів до дії дофаміну; має виражений нормотимічний ефект.

Показання для застосування ЛЗ: лікування та профілактика рецидиву маніакальної фази біполярного афективного розладу^{ВООЗ, БНФ}; профілактика депресії з уніполярними афективними розладами^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим: початкова^{ВООЗ} та підтримуюча доза - 300 мг (1 капс.) 2 р/добу^{ВООЗ} (вранці та ввечері); при недостатності терапевтичного ефекту початкову дозу поступово збільшувати, але не вище МДД - 2,1 г (7 капс.); після досягнення терапевтичного ефекту дозу знизити до підтримуючої - 300 мг (1 капс.) 2 р/добу; тривалість курсу лікування залежить від перебігу захворювання; максимально допустима концентрація літію в сироватці крові - 1,6 ммоль/л; під час лікування постійно контролювати концентрацію літію в сироватці крові^{ВООЗ, БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: відчуття загального нездужання; запаморочення, головний біль, сонливість, дезорієнтація, м'язовий тремор, дрібний тремор рук, вертиго, дизартрія, атаксія, нерозбірлива мова, порушення свідомості (у т.ч. сплутаність свідомості, ступор, кома), аномальні рефлекси (у т.ч. гіперактивність глибоких сухожильних рефлексів), судоми, міоклонус, доброякісна внутрішньочерепна гіпертензія, екстрапірамідні симптоми (у т.ч. атетоз, паркінсонізм), периферична сенсомоторна нейропатія, ністагм, міастенія гравіс, порушення пам'яті, енцефалопатія, злоякісний нейролептичний с-м, серотоніновий с-м, нетримання сечі та калу; помірні когнітивні порушення; подовження інтервалу QT (пов'язані з розвитком шлуночкової тахікардії або аритмії типу torsade de pointes), аритмія, брадикардія, дисфункція синусового вузла, зміни на ЕКГ (оборотне сплюснення/інверсія Т-хвилі, АВ-блокада, кардіоміопатія), артеріальна гіпотензія, периферичний циркуляторний колапс, набряки, с-м Рейно; карієс, гастрит, нудота, блювання, діарея, дискомфорт/біль у животі, сухість у роті, гіперсекреція слини, анорексія, дисгевзія; полідипсія та/або поліурія, нефрогенний нецукровий діабет, гістологічні зміни у нирках з інтерстиціальним фіброзом та порушенням функції нирок, нефротичний с-м; алопеція, акне/акнеподібні висипи, загострення або розвиток псоріазу, свербіж, алергічні висипи, гіперкератоз, фолікуліт, шкірні виразки; порушення функції щитовидної залози (в т.ч. еутиреоїдний зоб та/або гіпотиреоз, гіпертиреоз, тиреотоксикоз, гіперпаратиреоз, аденома паращитовидної залози); гіперкальціємія, гіпермагніємія; м'язова слабкість, артралгія, міалгія; статеві дисфункції; підвищення титру антинуклеарних а/т, алергічний васкуліт; скотома, зорові розлади, у т.ч. нечіткість зору; лейкоцитоз/лейкопенія, анемія; зниження/збільшення маси тіла, гіперглікемія.

Противпоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до літію чи компонентів ЛЗ; тяжкі СС захворювання з явищами декомпенсації та порушеннями провідності міокарда, с-м Бругада (у т.ч. в сімейному анамнезі); дисфункція щитовидної залози; гіпонатріємія (у т.ч. при низьконатрієвій дієті, зневодненні, хворобі Аддісона); тяжкі порушення функції нирок, ниркова недостатність.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЛЮТАЛІТ	ПАТ"Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	капс. у бл.	300мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЛЮТАЛІТ	ПАТ "Науково-виробничий центр	капс. у бл.	300мг	№10x2	58,10	

	"Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна					
--	--	--	--	--	--	--

5.2.2. Модулятори потенціал-залежних натрієвих каналів

- **Кислота вальпроєва (Valproic acid) **** (див. п. 6.2.2.5. розділу "НЕВРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

5.2.3. Антагоністи потенціал-залежних натрієвих каналів

- **Ламотриджин (Lamotrigine) **** (див. п. 6.2.2.6. розділу "НЕВРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

5.3. Засоби, що застосовуються у лікуванні тривожних розладів

5.3.1. Позитивні алостеричні модулятори ГАМК-рецепторів (GABA-A)

- **Гідазепам (Hydazepam)**

Фармакотерапевтична група: N05BA24 - психолептичні засоби; анксиолітики; похідні бензодіазепіну.

Основна фармакотерапевтична дія: похідне бенздіазепіну; має анксиолітичну та активуючу дію з антидепресантною дією; денний транквілізатор; відрізняється від інших бензодіазепінів вираженим активуючим ефектом, слабо вираженою міорелаксантною дією; не чинить снодійної дії, не прискорює стомлювання в процесі оперантної діяльності.

Показання для застосування ЛЗ: денний транквілізатор при невротичних, психопатичних астеніях, при станах, які супроводжуються тривогою, страхом (у т.ч. перед хірургічними втручаннями та болісними діагностичними обстеженнями), підвищеною дратівливістю, порушенням сну, при емоційній лабільності; купірування абстинентного с-му при алкоголізмі, в якості підтримуючої терапії під час ремісії при хр. алкоголізмі, при логоневрозах, мігрені.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос та сублінгвально по 20-50мг 3 р/добу, при необхідності, підвищують дозу до 200 мг/добу до отримання терапевтичного ефекту; курсова доза - 100мг/добу; застосування МДД (150-200мг) може супроводжуватись підвищеною денною сонливістю, відчуттям м'язової слабкості; для лікування станів з астенічними, депресивними, фобічними та іпохондричними розладами - 60-120мг/добу; при лікуванні хворих на невротичний, неврозоподібний, психопатичний, психопатоподібний стани середня добова доза - 60-200мг, при мігрені - 40-60мг; для купірування алкогольної абстиненції початкова доза - 50мг, середня добова доза - 150мг; МДД - 500мг; тривалість курсу терапії становить від кількох днів до 1-4міс.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, сонливість, млявість, зниження швидкості р-цій, зниження уваги та працездатності, загальна слабкість, запаморочення; нудота; артеріальна гіпотензія; м'язова слабкість; висипи, свербіж, гіперемія шкіри, кропив'янка; АР, у т.ч. ангіоневротичний набряк; атаксія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого з компонентів ЛЗ; виражена тяжка міастенія, значні порушення ф-цій печінки (цироз, хвороба Боткіна) та нирок.

Визначена добова доза (DDD): перорально/сублінгвально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГІДАЗЕПАМ IC®	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. у бл.	0,02г	№10x2	93,50	
	ГІДАЗЕПАМ IC®	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. у бл.	0,05г	№10x1	113,00	
	ГІДАЗЕПАМ IC®	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. сублінг. у бл.	0,02г	№10x2	104,00	
	ГІДАЗЕПАМ IC®	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. сублінг. у бл.	0,05г	№10x1	124,00	

- **Діазепам (Diazepam) * [ПМД]**

Фармакотерапевтична група: N05BA01 - анксиолітики, похідні бензодіазепіну.

Основна фармакотерапевтична дія: посилює ГАМК-ергічний (ГАМК - гамма-аміномасляна кислота) блок на синаптичному рівні, у лімбічній системі, субкортикальних структурах, таламусі та гіпоталамусі; ГАМК є головним нейротрансмітером ЦНС; алостерична частина ГАМК_A-рецептора є місцем зв'язку депресантів ЦНС; має анксиолітичну, протисудомну, седативну, снодійну, міорелаксуючу дію; внаслідок приєднання до ГАМК_A-рецептора зростає чутливість до ГАМК; канали іона хлору рецепторного комплексу довше перебувають у стані активації, більша кількість іонів хлору проникає в нейрон, посилюючи ступінь гіперполяризації клітинної мембрани та блокуючи проведення сигналу.

Показання для застосування ЛЗ: табл.: дорослим для лікування тривожних розладів; безсоння (тільки при тяжких розладах, пацієнтам, які мають критичні патологічні стани)^{ВООЗ, БНФ}; усунення м'язових спазмів, асоційованих зі спазмами церебральної етіології; у складі комплексного лікування епілепсії^{ВООЗ, БНФ, ПМД}; премедикація при незначних хірургічних втручаннях^{ВООЗ, БНФ}; р-н д/ін'ек.: Г. тривожно-фобічні/ тривожно-депресивні стани^{БНФ}, у т.ч. алкогольні психози з явищами абстиненції^{ВООЗ, БНФ}; делірій; епілептичний статус^{БНФ}, правець, м'язові спазми при нейродегенеративних захворюваннях^{БНФ}, у т.ч. при травмах хребта, люмбаго,

шийному радикуліті; премедикація в анестезіології при оперативних втручаннях/ чи складних діагностичних процедурах^{ВООЗ, БНФ}; еклампсія при вагітності.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дозу визначати індивідуально; застосовують внутрішньо р/ос, розпочинати з мінімальної ефективної дози, що відповідає певному показанню; призначати в/в струйно повільно (не > 1 мл/хв) або краплинно, або в/м глибоко; разова доза, частота та тривалість застосування встановлюються індивідуально з урахуванням правила «мінімальної достатності»; внутрішньо р/ос: тривожні стани^{ВООЗ, БНФ}: звичайна доза для дорослих - 5 мг, МДД - 30 мг^{ВООЗ, БНФ}, при лікуванні станів тривожності тривалість курсу не повинна перевищувати 8-12 тижнів, включаючи період поступового зниження дози; безсоння, пов'язане з тривожністю: 5-15 мг перед сном^{ВООЗ, БНФ}, не продовжувати лікування у повній дозі довше 4 тижнів; спастичні стани м'язів: м'язові спазми - 5-15 мг/добу, розподілених на дози по 5 мг 1-3 р/добу, спазми церебральної етіології^{БНФ} - 5-60 мг/добу^{БНФ} у кілька прийомів; премедикація: 5^{ВООЗ, БНФ} -20 мг; парентерально (в/в або в/м): г. тривожно-фобічні/ тривожно-депресивні стани: в/в, в/м^{БНФ} 5-10 мг^{БНФ} (1-2 мл) у разі необхідності ввести повторно в такій самій дозі через 3-4 год.^{БНФ}; алкогольний делірій: в/в, початкова доза становить 10 мг^{БНФ} (2 мл), потім 5-10 мг (1-2 мл) через кожні 3-4 год. до зникнення г. симптомів^{БНФ}, можливе підтримуюче крап. в/в введення зі швидкістю 2,5-5 мг/год, вища разова доза - 30 мг, МДД - 70 мг; епілептичний статус: в/в повільно, дорослим по^{ВООЗ, БНФ} 5-10 мг^{ВООЗ, БНФ} (1-2 мл), за необхідності вводити повторно через кожні 10-15 хв. до досягнення загальної дози 30 мг (6 мл), дітям віком до 5 років по 0,2^{ВООЗ} -0,5 мг/кг (0,04-0,1 мл/кг), при необхідності повторювати введення ч/з 10-15 хв; дітям віком від 5 років по 1 мг/кг (0,2 мл/кг), при необхідності повторювати через 5-15 хв., вища разова доза дітям до 5 років - не вище 5 мг, від 5 років - 10 мг^{БНФ}; м'язові спазми при нейродегенеративних захворюваннях, у т. ч. при травмах хребта: дорослим призначати по 10-20 мг (2-4 мл), дітям віком до 5 років - 1-2 мг (0,2-0,4 мл), дітям віком від 5 років - 5-10 мг (1-2 мл), вища разова доза дітям віком до 5 років не вище 5 мг, від 5 років - 10 мг; правець: початкова доза для дорослих 10 мг (2 мл) зі швидкістю введення 5-15 мг/год; м'язові спазми периферичного походження (люмбаго, шийний радикуліт): дорослим по 10-20 мг (2-4 мл) в/м 1-2 рази до усунення г. симптомів з переходом на застосування табл.; премедикація в анестезіології при оперативних втручаннях/ чи складних діагностичних процедурах: дорослим по 10-20 мг (2-4 мл) в/м увечері напередодні операції, 5-10 мг (1-2 мл) в/м або в/в повільно за 30-60 хв до операції або безпосередньо перед операцією, після операції в/м по 5-10 мг (1-2 мл); для досягнення короточасного наркотичного сну при терапевтичних і хірургічних втручаннях (малі хірургічні операції, вивихи, переломи, діагностичні заходи) дорослим - в/в повільно по 10-30 мг (2-6 мл), дітям - 1-2 мг/кг (0,2-0,4 мл/кг), дозу встановлювати індивідуально: починати введення з 5 мг, потім додатково по 2,5 мг, спостерігаючи після кожного введення протягом 30 сек. за р-цією пацієнта, при виникненні птозу введення припинити.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: брадикардія, бронхоспазм, ларингоспазм, анафілактичний шок, реакції підвищеної чутливості, у т. ч. анафілактичні реакції, біль у грудній клітці, артеріальна гіпотензія, недостатність кровообігу, СН, включаючи зупинку серця, головний біль і запаморочення, дезорієнтація, втрата свідомості, тремор, погіршення настрою, гнів, атаксія, дизартрія, порушення мовлення; зі збільшенням терапевтичної дози препарату підвищується ризик виникнення антероградної амнезії, амнестичні ефекти можуть супроводжуватись аномальною поведінкою, неспокій, збудження, дратівливість, агресивність, марення, ворожість, нічні кошмари, галюцинації, психози, безсоння, підвищення м'язового тону, зміни поведінки та інші несприятливі поведінкові ефекти (переважно у дітей та в осіб літнього віку; у разі їх появи необхідно негайно припинити застосування ЛЗ), сплутаність свідомості, емоційна бідність, зниження уваги, депресія, погіршення настрою, зміни лібідо, антероградна амнезія, довготривале застосування препарату (навіть у терапевтичних дозах) може призвести до розвитку фізичної залежності: припинення терапії може спричинити с-м відміни або феномен рикшету, порушення морфологічного складу крові (лейкоцитопенія, гранулоцитопенія), нейтропенія, свербіж, кропив'янка, нечіткість зору, диплопія, вертиго, нудота, втрата апетиту, блювання, відчуття сухості в роті або гіперсаливація, запор, коліки та інші шлунково-кишкові розлади, затримка сечі, нетримання сечі, шкірні реакції, жовтяниця, порушення функцій печінки, у пацієнтів із захворюваннями ДШ (хр. бронхіт) можуть посилитися порушення дихання (утруднене дихання); пригнічення дихання, включаючи дихальну недостатність, підвищений ризик падінь і переломів у пацієнтів літнього віку, біль у суглобах, м'язові спазми, напади судом, зміна лібідо, підвищення потовиділення, порушення серцевого ритму; збільшення рівнів трансаміназ, лужної фосфатази в крові; при в/в введенні можливі гикавка, при швидкому в/в - подразнення судинної стінки і розвиток тромбофлебиту; в/м введення може спричинити підвищення активності креатинфосфокінази, біль, почервоніння та спорадичну чутливість у місці введення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до бензодіазепінів чи до інших похідних бензодіазепіну або до будь-якого компонента ЛЗ, г. закритокутова глаукома, г. дихальна недостатність, пригнічення дихання, с - м нічного апное, тяжка печінкова та ниркова недостатність, фобія або obsесивні розлади, хр. психоз, міастенія gravis, залежність від алкоголю, наркотичних засобів (за винятком г. випадків припинення застосування алкоголю) або інших засобів, що пригнічують ЦНС, отруєння психотропними речовинами або ЛЗ, не можна застосовувати у вигляді монотерапії для лікування депресії або тривоги, пов'язаної з депресією, оскільки це може призвести до суїциду, не призначають для первинного лікування психічних захворювань, I триместр вагітності, період годування груддю, виражена хр. гіперкапінія, тяжка псевдопаралітична міастенія, шок, кома, г. порфірія, не застосовувати новонародженим і недоношеним дітям (р-н д/ін'єкц.).

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДІАЗЕПАМ-ЗН	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу",	табл. у бл.	5мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	

	Україна				
СИБАЗОН	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ
СИБАЗОН	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	р-н д/ін`ек., по 2мл в амп. у бл.	5 мг/мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ
СИБАЗОН® ІС	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. у бл.	0,005г, 0,01г	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ
II. ДИАЗЕПЕКС®	АТ "Гріндекс", Латвія	табл. у бл.	5мг	№10, №20, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ
ДИАЗЕПЕКС®	АТ "Гріндекс" (виробник, який відповідає за випуск серії, включаючи контроль серії/випробування)/ХБМ Фарма с.р.о. (всі стадії виробничого процесу, крім випуску серії), Латвія/Словаччина	р-н д/ін`ек., по 2мл в амп. у чар/уп.	5 мг/мл	№5x2, №5x66	відсутня у реєстрі ОБЦ

● **Феназепам (Phenazepam)**

Фармакотерапевтична група: N05BA - анксиолітики, похідні бензодіазепіну.

Основна фармакотерапевтична дія: транквілізатор з групи похідних бенздіазепіну, чинить анксиолітичну, протисудомну, міорелаксуючу та снодійну дії; екзогенний ліганд специфічних бензодіазепінових рецепторів ЦНС; механізм дії пов'язаний із зменшенням збудливості підкоркових центрів головного мозку та гальмуванням їхньої взаємодії з корою мозку.

Показання для застосування ЛЗ: невротичні, невротоподібні, психопатичні, психопатоподібні стани, іпохондрично-синестопатичний с-м, вегетативні дисфункції, що супроводжуються підвищеною роздратованістю, почуттям тривоги, страху, психомоторним збудженням, емоційною лабільністю, розладами сну та іншими проявами; як анксиолітичний засіб у складі комплексної терапії при абстинентному с-мі, тиках, гіперкінезах.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос; лікування невротичних, психопатичних, невротоподібних та психопатоподібних станів, іпохондрично-синестопатичного с-му, вегетативних дисфункцій, які супроводжуються підвищеною роздратованістю, почуттям тривоги, страху, психомоторного збудження, емоційною лабільністю: середня добова доза - 0,5-1мг 2-3 р/добу, ч/з 2 - 4 дні дозу можна збільшити до 4-6мг/добу, ранкова та денна доза - 0,5-1мг, на ніч - решта від встановленої добової дози; при значно вираженій ажитації, страхі, тривозі: початкова доза - 3 мг/добу, дозу підвищують швидко до 4 - 6мг/добу до отримання терапевтичного ефекту; при розладах сну: 0,5 мг за 20-30 хв. до сну; у складі комплексної терапії при тиках, гіперкінезах: разова доза - 0,5-3мг 1-2 р/добу; при абстинентному с-мі - 2,5-5мг/добу; МДД - 10мг (тільки в умовах стаціонарного лікування); тривалість курсу лікування - до 2 міс. та визначається лікарем індивідуально.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: зниження здатності до концентрації уваги, дезорієнтація в часі та просторі, сплутаність свідомості, зниження пам'яті, ейфорія, депресія, емоційна бідність, пригніченість настрою, парадоксальні реакції (почуття неспокою, страху, тривоги, гніву, емоційне збудження, психомоторне збудження, ажитація, напади агресії, дратівливості, марення, галюцинації, психози, втрата пам'яті, безсоння, кошмарні сновидіння, розлади поведінки, м'язовий спазм, суїцидальні думки); сонливість, підвищена втомлюваність, запаморочення, атаксія, нестійкість ходи, уповільнення психічних та рухових реакцій, головний біль, м'язова слабкість, порушення рівноваги та ходи, порушення мовлення, тремор, порушення координації рухів, дистонічні екстрапірамідні реакції (неконтрольовані рухи, у т. ч. очей), астенія, дизартрія, епілептичні напади (у пацієнтів з епілепсією); порушення зору (мідріаз, диплопія, розфокусований зір); незначна артеріальна гіпотензія, тахікардія; лейкопенія, нейтропенія, агранулоцитоз (озноб, гіпертермія, біль у горлі, підвищена втомлюваність або слабкість), анемія, тромбоцитопенія; зниження апетиту, сухість у роті або слинотеча, печія, нудота, блювання, запор, діарея; порушення функції печінки, підвищення активності печінкових трансаміназ і ЛФ, жовтяниця; порушення сечовипускання (нетримання сечі, затримка сечовипускання); дисменорея, порушення менструального циклу, зниження або підвищення лібідо; АР, у т. ч. висипання на шкірі, свербіж, гіперемія шкіри, ангіоневротичний набряк; зниження маси тіла; підвищений ризик падінь і переломів; переддепресивні стани; розвиток толерантності, психічної та фізичної залежності; с-м відміни.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до бензодіазепінів або до будь-якого з компонентів ЛЗ; тяжкі респіраторні захворювання (ДН, г. легенева недостатність, тяжке ХОЗЛ, БА), с-м нічного апное, міастенія гравіс, г. закритокутова глаукома або схильність до її розвитку, тяжкі порушення функції печінки та/або нирок, астенія, кахексія, тяжка депресія, шоківий стан, г. отруєння алкоголем, іншими транквілізаторами, нейролептиками, снодійними та наркотичними засобами; період вагітності або годування груддю; дитячий вік (до 18 років); вживання алкоголю під час лікування.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ФЕНАЗЕПАМ® ІС	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. у бл.	0,0005г, 0,001г, 0,0025г	№10x2, №10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

5.3.2. Структурні аналоги ГАМК (GABA)

- **Прегабалін (Pregabalin) **** (див. п. 6.2.2.6. розділу "НЕВРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

5.3.3. Парціальні агоністи серотонінових 1A (5HT_{1A}) рецепторів

- **Буспірон (Buspirone)**

Фармакотерапевтична група: N05BE01 - засоби, що впливають на нервову систему; анксиолітики.

Основна фармакотерапевтична дія: анксиолітична дія; проявляє високу спорідненість із пресинаптичними 5-HT_{1A} рецепторами, частковий агоніст постсинаптичних 5-HT_{1A} рецепторів у ЦНС; має властивості, типові для анксиолітиків та антидепресантів; не проявляє значної активності щодо бензодіазепінових рецепторів і не впливає на зв'язування ГАМК; не чинить протисудомної та міорелаксуючої дії, не спричиняє звикання, не розвиває симптоми відміни.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування тривожних станів^{БНФ} з домінуючими симптомами: тривожністю^{БНФ}, внутрішнім неспокоєм, станом напруження.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: початкова доза - 5мг 2-3 р/добу^{БНФ}; для досягнення максимального терапевтичного ефекту добову дозу поступово підвищують до 20-30мг^{БНФ}; максимальна разова доза - не вище 30мг; МДД - 60мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: пропасниця; неспецифічний біль у грудях, тимчасова непритомність, артеріальна гіпотензія та/або АГ, тахікардія/відчуття серцебиття, порушення мозкового кровообігу, СН, ІМ, кардіоміопатія, брадикардія, цереброваскулярні порушення; зміни показників крові (еозинофілія, лейкопенія, тромбопенія); нічні жахи, сонливість, безсоння, запаморочення, нервозність, зниження концентрації уваги, емоційне збудження, дратівливість, ворожість, сплутаність свідомості, депресія, деперсоналізація, дискомфорт, патологічно підвищене сприйняття звичайних звуків, ейфорія, гіперкінезія, неспокій, втрата інтересу, порушення асоціативного сприйняття, галюцинації, суїцидальні думки, епілептичні напади, дисфорія, страх; різка зміна настрою, клаустрофобія, ступор, нерозбірливе мовлення, мінущі проблеми з пам'яттю, серотонінів с-м, психоз; оніміння, парестезії (поколювання, відчуття болю), порушення координації, тремор, епілептичні напади, дисгевзія, дизосмія, подовження часу реакції, спонтанні рухи, загальмованість, екстрапірамідні симптоми (рання та пізня дискінезія, порушення тону, гарячка, паркінсонізм, акатизія, шум у голові); помутніння зору, почервоніння/свербіж у ділянці очей, кон'юнктивіт, фотофобія, відчуття тиску на очі, біль в очах, звужене поле зору, підвищення ВТ; шум у вухах, ураження внутрішнього вуха; запалення горла, закладеність носа; надмірно прискорене дихання, задишка, стиснення у ділянці серця, гіпервентиляція, відчуття нестачі повітря, носова кровотеча, відчуття печіння язика; нудота, ксеростомія, біль в епігастральній ділянці, діарея, метеоризм, відсутність/підвищення апетиту, гіперсалівація, с-м подразнення товстого кишечника, кровотеча з прямої кишки, запор, блювання; часте сечовипускання, затримка сечовипускання, дизурія, енурез, нічне сечовипускання; набряк, кропив'янка, гіперемія, виникнення гематом, облісіння, сухість шкіри, екзема, набряк обличчя, пухирчатка, припливи, уразливість шкіри, висипання на шкірі, свербіж; АР, екхімоз, акне, витончення нігтів; спазм та ригідність м'язів, міалгія, артралгія, міастенія; галакторея, гінекомастія, дисфункція щитовидної залози; анорексія, головний біль, астенія, гарячка, дзвін у голові, нездужання, підвищена втомлюваність, порушення нюху та смакових відчуттів, підвищене потовиділення, припливи, холодова гіперестезія, схильність до зловживання алкоголем, порушення коагуляції крові, втрата голосу, гикавка, глосалгія; збільшення печінкових ферментів; порушення менструального циклу, зниження/підвищення лібідо, аменорея, запалення сечостатевої системи, зниження еякуляції, імпотенція; підвищення рівня трансаміназ у сироватці крові; частота невідома - збільшення/зменшення маси тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до буспірону або до інших компонентів ЛЗ; г. застійна глаукома, міастенія gravis, тяжкі захворювання печінки, тяжка печінкова недостатність (протромбіновий час >18 сек.); тяжка ниркова недостатність (швидкість клубочкової фільтрації нижче 10 мл/хв), епілепсія, г. інтоксикація алкоголем, снодійними ЛЗ, анальгетиками та нейролептиками; супутнє лікування інгібіторами MAO і протягом 14 днів після відміни необоротного інгібітору MAO або протягом 1 дня після відміни оборотного інгібітору MAO.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 30 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БУСПІРОН САНДОЗ®	Салютас Фарма ГмБХ, Німеччина	табл. у бл.	5мг, 10мг	№10x2, №20x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СПІТОМІН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС (вир-к відпов. за повний цикл; вир-к відпов. за випуск серії), Угорщина	табл. у бл.	5мг	№10x6	21,06	26,00/\$
	СПІТОМІН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС (вир-к відпов. за повний цикл; вир-к відпов. за випуск серії), Угорщина	табл. у бл.	10мг	№10x6	19,89	26,00/\$

5.3.4. Блокатори гістамінових 1 (H₁) рецепторів

- **Гідроксизин (Hydroxyzine)**

Фармакотерапевтична група: N05BB01 - анксиолітики; похідні дифенілметану.

Основна фармакотерапевтична дія: похідне дифенілметану, хімічно не пов'язаний з фенотіазінами, резерпіном, мепробаматом або бензодіазепінами; не є депресантом кори головного мозку, але його дія може бути пов'язана з пригніченням активності у деяких ключових зонах субкортикальної ділянки ЦНС; виявляє антигістамінну та бронходилататорну дію; не підвищує секрецію шлунка або кислотність, має м'яку антисекреторну активність; ефективний у полегшенні свербіжу при різних формах кропив'янки, екземи і дерматиту; має анксиолітичний, спазмолітичний, симпатолітичний ефекти та м'яку анальгетичну дію.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування тривожних станів у дорослих; седативний засіб у період премедикації; симптоматична терапія свербежу ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос; слід застосовувати у мінімальній ефективній дозі і протягом найкоротшого періоду; симптоматичне лікування тривожних станів: дорослим 50-100 мг/добу 2-4 табл. по 25 мг ввечері перед сном у разі розвитку тривожного стану, безсоння; симптоматичне лікування алергічного свербежу: 25-100 мг на добу, тобто 1-4 табл. по 25 мг/добу ^{БНФ}. МДД - 100 мг для дорослих і дітей з масою тіла 40 кг або більше; Дітям: симптоматичне лікування алергічного свербежу: від 12 років (з масою тіла понад 40 кг): 25-100 мг/добу ^{БНФ}, тобто 1-4 таблетки по 25 мг/добу; від 9 до 12 років (з масою тіла 28-40 кг): 25-75 мг/добу, тобто 1-3 табл. по 25 мг/добу; від 7 до 9 років (з масою тіла 23-28 кг): 25-50 мг/добу, 1-2 табл. по 25 мг/добу; від 4 до 7 років (з масою тіла 17-23 кг): 25-37,5 мг/добу, тобто 1-1½ табл. по 25 мг/добу; від 3 до 4 років (з масою тіла 12,5-17 кг): 12,5-25 мг/добу, тобто ½-1 табл. по 25 мг/добу. Дозу розраховують за масою тіла у діапазоні від 1 мг/кг/добу до максимум 2 мг/кг/добу у розподілених дозах. Для дітей з масою тіла до 40 кг МДД становить 2 мг/кг/добу ^{БНФ}. Для дітей з масою тіла більше 40 кг МДД - 100 мг на добу. ^{БНФ}

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперчутливість, анафілактичний шок, збудження, сплутаність свідомості, дезорієнтація, галюцинації; сонливість, головний біль, седація, запаморочення, безсоння, тремор, судоми, дискінезія, втрата свідомості (синкопе); порушення акомодатії, нечіткий зір; тахікардія, подовження інтервалу QT, шлуночкова аритмія (напр., типу «пірует»); артеріальна гіпотензія; бронхоспазм; сухість у роті, нудота, запор, блювання; гепатит, зміни функціональних проб печінки; свербіж, еритематозні висипання, плямисто-папульозні висипання, кропив'янка, дерматит, с-м Стівенса - Джонсона, мультиформна еритема, гострий генералізований екзантематозний пустульоз, ангіоневротичний набряк, фіксована медикаментозна еритема, підвищена пітливість; затримка сечовиділення; підвищена втомлюваність, загальна слабкість, пропасниця.

Противпоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до гідроксизину або до будь-якої з допоміжних речовин препарату, цетиризину, інших похідних піперазину, амінофіліну або етилендіаміну; порфірія; подовження інтервалу QT; період вагітності або годування груддю; спадкова непереносимість галактози, дефіцит лактази Лаппа або мальабсорбція глюкози-галактози.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 75 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГІДРОКСИЗИН-ЗН	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, окрім випуску серії, контроль якості)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (випуск серії), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№10x1, №10x2		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ГІДРОКСИЗИН-ЗН	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, окрім випуску серії, контроль якості)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (випуск серії), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№10x3	5,72	
II.	АТАРАКС®	ЮСБ Фарма С.А. (виробництво за повним циклом)/Анабіотик НВ (додаткова виробнича дільниця, на якій здійснюється контроль серії)/СГС Лаб Сімон СА (додаткова виробнича дільниця, на якій здійснюється контроль серії), Бельгія/Бельгія/Бельгія	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№25x1		відсутня у реєстрі ОБЦ

5.3.5. Мультиמודальні протитривожні засоби

- **Мєбікар (Mebicar) ****

Фармакотерапевтична група: N06BX21 - психостимулятори, засоби, що застосовуються при синдромі дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ), та ноотропні засоби. Інші психостимулюючі та ноотропні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: за хімічною структурою близький до природних метаболітів організму: складається з двох метильованих фрагментів сечовини, що входить до складу біциклічної структури; має помірну транквілізуючу (анксиолітичну) активність; знімає або послаблює почуття неспокою, тривожність, страх, внутрішнє емоційне напруження та роздратування; транквілізуючий ефект не супроводжується міорелаксацією та порушенням координації рухів, тому відноситься до денних транквілізаторів; снодійного ефекту не виявляє, але посилює дію снодійних ЛЗ та поліпшує сон при його порушенні; чинить ноотропну дію, покращує когнітивні функції, підвищує увагу і розумову працездатність, не стимулюючи симптоматику продуктивних психопатологічних розладів (марення, паталогічна емоційна активність); має антиоксидантну активність, діє як мембраностабілізатор, адаптоген та церебропротектор при оксидантному стресі різного генезу; діє на активність структур лімбіко-ретикулярного комплексу (на емоціогенні зони гіпоталамуса, впливає на всі 4 основні нейромедіаторні системи - ГАМК-ергічну, холінергічну, серотонінергічну та адренергічну); не чинить периферичної адренонегативної дії; проявляє антагоністичну активність відносно збудження адренергічної і глутаматергічної систем та підсилює функціонування гальмівних серотонін- і ГАМК-ергічних механізмів мозку; має нормастенічні властивості; полегшує нікотинуву абстиненцію.

Показання для застосування ЛЗ: неврози та неврозоподібні стани, що супроводжуються роздратуванням, емоційною лабільністю, почуттям тривоги та страху; для поліпшення переносимості нейролептиків або транквілізаторів з метою усунення викликаних ними соматовегетативних та неврологічних побічних ефектів; кардіалгії різного генезу (не пов'язані з ІХС), у складі комплексної терапії нікотинуву залежності як засіб, що зменшує потяг до куріння.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос незалежно від прийому їжі; звичайна доза - 300-600 мг 2-3 р/добу; дозу можна збільшити; максимальна разова доза -- 3 г, МДД - 10 г; тривалість курсу лікування - від кількох днів до 2-3 міс.; лікування нікотинуву залежності: 600-900 мг 3 р/добу щоденно впродовж 5-6 тижнів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: зниження АТ; диспептичні розлади (у т.ч. нудота, блювання, діарея); бронхоспазм; АР (шкірні висипання, свербіж, кропив'янка, ангіоневротичний набряк); зниження t⁰, слабкість, запаморочення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: індивідуальна гіперчутливість до компонентів ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МЕБІКАР ІС	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. у бл.	0,3г	№10x2	145,00	
	МЕБІКАР ІС	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. у бл.	0,5г	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МЕБІКАР ІС	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. у бл.	0,5г	№10x2	214,00	
	ТРАНКВІЛАР® ІС	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. у бл.	0,3г	№10x2	135,00	

5.4. Засоби, що застосовуються у лікуванні порушень сну

5.4.1. Позитивні алостеричні модулятори ГАМК-А (GABA-A) рецепторів

- **Залеплон (Zaleplon)**

Фармакотерапевтична група: N05CF03 - снодійні та седативні ЛЗ.

Основна фармакотерапевтична дія: снодійний піразоло-піримідинового типу ЛЗ, за хімічною структурою відрізняється від бензодіазепінів та інших снодійних; взаємодіє з бензодіазепіновими рецепторами ГАМК_A, що міститься у нейронних структурах ЦНС; вибірково зв'язується з бензодіазепіновими рецепторами I типу.

Показання для застосування ЛЗ: тяжка форма порушення сну, що проявляється утрудненням засинання^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована добова доза для дорослих - 10 мг^{БНФ}; МДД - 10 мг; не можна приймати другу дозу в ту саму ніч; максимальна тривалість лікування - 2 тижні^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анорексія, астенія, зниження тактильної чутливості, погане самопочуття, фотосенсібілізація; амнезія, парестезії, сонливість, дезорієнтація, атаксія/ дискординація, апатія, деперсоналізація, депресія, запаморочення, галюцинації, загострення слуху, нюхові галюцинації, диплопія, незв'язне мовлення, порушення поля зору, депресія, психічні та парадоксальні р-ції, зниження концентрації, гіпестезія, амнезія; порушення зору, двоїння в очах; нудота; підвищення рівня трансаміназ печінки; альгодисменорея; анафілактичні та псевдоанафілактичні р-ції; р-ції підвищеної чутливості на світло; анорексія, астенія, погане самопочуття; деперсоналізація, галюцинації, депресія, розгубленість, апатія, сплутаність

свідомості; частота невідома: сомнамбулізм, ангіоневротичний набряк, гепатотоксичність (підвищена активність амінотрансфераз).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до залеплону та компонентів ЛЗ; період годування груддю; тяжка печінкова недостатність; тяжка ДН; тяжке порушення ф-цій нирок; с-м нічного апное; тяжка міастенія; дитячий вік.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 10 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	РОФЕН	Бафна Фармасьютикалс Лтд., Індія	капс. у бл.	10мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СЕЛОФЕН	АТ "Адамед Фарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинне і вторинне пакування; випуск серії), Польща	капс. у бл.	10мг	№10x2	7,29	26,67/\$
	СЕЛОФЕН	АТ "Адамед Фарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинне і вторинне пакування; випуск серії), Польща	капс. у бл.	10мг	№10x1	9,73	26,67/\$
	СЕЛОФЕН	Заклад Фармацевтичний Адамед Фарма С.А. (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування)/Паб'яницький фармацевтичний завод Польфа А.Т. (випуск серії), Польща/Польща	капс. у бл.	10мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Зопіклон (Zopiclone)**

Фармакотерапевтична група: N05CF01- снодійні та седативні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: належить до групи циклопіролонів та споріднений до фармацевтичного класу бензодіазепінів; міорелаксанти, анксиолітик, заспокійливий та снодійний агент, протисудомний засіб, амнестик (спричиняє порушення пам'яті); специфічний агоніст рецепторів, які належать до макромолекулярного рецепторного комплексу ГАМК-омега у ЦНС (BZ1 та BZ2 і модулюють відкриття каналів для іонів хлору); зменшує стадію I та збільшує стадію II сну, підтримує чи подовжує стадії глибокого сну (III та IV) та підтримує парадоксальний сон.

Показання для застосування ЛЗ: тяжкі розлади сну: ситуативне та тимчасове безсоння^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос; приймати у ліжку безпосередньо перед сном; для дорослих рекомендована доза 7,5 мг/добу^{БНФ}; лікування розпочинати з найнижчої ефективної дози; тривалість курсу лікування не повинна перевищувати 4 тижні^{БНФ}, включаючи період поступового припинення лікування; тривалість лікування: ситуативне безсоння - 2-5 діб; тимчасове безсоння - 2-3 тижні. Рекомендована доза 3,75 мг/добу для пацієнтам віком понад 65 років, з порушенням ф-ції печінки або з ХЛН.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: збудження, нічні кошмари, порушення свідомості, зміни лібідо, дратівливість, агресивність, прояви агресії, галюцинації; психотично-подібні симптоми, неадекватна поведінка, інші порушення поведінки; латентна депресія набуває маніфестного характеру; зниження швидкості р-ції, сонливість, дисгевзія, відчуття млості, головний біль, антероградна амнезія; задишка, шкірне висипання, свербіння, кропив'янка, астенія, ангіоневротичний набряк, анафілактичні р-ції; сухість у роті, нудота, диспепсія, блювання; підвищення рівнів трансаміназ та/або ЛФ, порушення ф-ції печінки; падіння; частота невідома: розлади поведінки, марення, випадки гніву, нервозність, сомнамбулізм, фізична/психологічна залежність від ЛЗ, с-м відміни або «рикошетна» симптоматика після відміни ЛЗ, сплутаність свідомості, безсоння, напруження, атаксія, парестезія, когнітивні розлади (порушення пам'яті, уваги, мовлення), пригнічення дихальної ф-ції, м'язова гіпотонія, астенія, диплопія; диспепсія, блювання; підвищення рівнів трансаміназ та/або лужної фосфатази в крові, що у виняткових випадках може призвести до клінічної картини порушення ф-ції печінки; рідко: падіння (особливо у пацієнтів літнього віку).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до зопіклону або до будь-якої з допоміжних речовин ЛЗ; тяжка ДН, с-м апное уві сні, тяжка г. або хр. печінкова недостатність (ризик виникнення енцефалопатії), міастенія, алергія на продукти з пшениці (окрім непереносимості пшениці при целиакії).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 7,5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЗОПІКЛОН	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл.	7,5мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЗОПІКЛОН	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл.	7,5мг	№10х2	3,60	
	ЗОПІКЛОН	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл.	7,5мг	№10х1	4,80	
	ЗОПІКЛОН-ЗН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фарма, Україна/Україна/Україна	табл., в/о у бл.	7,5мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЗОПІКЛОН-ЗН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фарма, Україна/Україна/Україна	табл., в/о у бл.	7,5мг	№10х2	2,96	
	ЗОПІКЛОН-ЗН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фарма, Україна/Україна/Україна	табл., в/о у бл.	7,5мг	№10х1	4,20	
	НОРМАСОН®	ТОВ "Астрафарм", Україна	табл. у бл.	7,5мг	№10х2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НОРМАСОН®	ТОВ "Астрафарм", Україна	табл. у бл.	7,5мг	№10х1	4,80	
	ПІКЛОН	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	7,5мг	№10х1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СОННАТ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	7,5мг	№10х3	4,43	
СОННАТ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	7,5мг	№10х1	5,45		

II.	ИМОВАН®	Санофі Вінтроп Індастрія, Франція	табл., в/о у бл.	7,5мг	№20x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СОМНОЛ®	АТ "Гріндекс", Латвія	табл., вкриті п/о у бл.	7,5мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СОНОВАН	Фармасайнс Інк., Канада	табл., вкриті п/о у бл.	7,5мг	№10x2	2,84	27,09/\$
	СОНОВАН	Фармасайнс Інк., Канада	табл., вкриті п/о у бл.	7,5мг	№10x1	3,25	27,09/\$

5.5. Засоби, що застосовуються переважно у лікуванні депресивних розладів

5.5.1. Неселективні інгібітори зворотного нейронального захоплення моноамінів (серотоніну та норадреналіну) (SERT, NET)

- **Амітриптилін (Amitriptyline)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: N06AA09 - антидепресанти; неселективні інгібітори зворотного захоплення моноамінів.

Основна фармакотерапевтична дія: третинний амін; трициклічний антидепресант, неселективний інгібітор зворотного нейронального захоплення моноамінів; рівною мірою активний інгібітор захоплення серотоніну і норадреналіну пресинаптичними нервовими закінченнями; має сильні антихолінергічні, антигістамінергічні і седативні властивості і потенціює також ефекти катехоламінів; підвищує патологічно знижений рівень настрою; застосовується для лікування депресій, що супроводжуються тривожністю, збудженням, занепокоєнням і порушеннями сну; анагетичний ефект не пов'язаний з антидепресантним.

Показання для застосування ЛЗ: табл.: тяжка депресія^{ВООЗ, БНФ, ПМД}, нейропатичний біль, профілактика хронічного головного болю напруги, профілактика мігрені; нічний енурез у дітей віком від 11 р. за умови відсутності органічної патології; р-н д/ін'єкцій - ендогенні депресії, включаючи депресивний епізод, рекурентний депресивний розлад; біполярний афективний розлад, поточний депресивний епізод.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують парентерально в/м, в/в повільно та р/ос; депресія^{ВООЗ, БНФ}: при тяжких депресіях - парентерально дорослим у дозі 25-40 мг 3-4 р/добу, курс лікування - 3-12 введень, після цього призначати р/ос у формі табл. для подальшого лікування; дорос.: початкова доза для р/ос застосування - 25 мг 2 р/добу^{ВООЗ, БНФ} з поступовим підвищенням на 25 мг кожного другого дня до 150 мг/добу^{ВООЗ, БНФ}; підтримуюча доза відповідає оптимальній терапевтичній; тривалість лікування - антидепресантний ефект розвивається протягом 2-4 тижнів; застосовувати до 6 міс після одужання з метою профілактики рецидиву; хр. больовий с-м: початкова доза - 25 мг увечері, МДД - 100 мг; нічний енурез: дітям з 11 років 25 - 50 мг н/добу за 1½-1 год до сну, тривалість терапії не більше 3 міс.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: пригнічення кісткового мозку, агранулоцитоз, лейкопенія, еозинфілія, тромбоцитопенія; зниження апетиту; стан сплутаності свідомості, зниження лібідо, гіпоманія, манія, тривожний стан, безсоння, страшні сновидіння, делірії, галюцинації, суїцидальні думки/поведінка; сонливість, тремор, запаморочення, головний біль, розлади уваги, дисгевзія, парестезії, атаксія, судоми; розлади акомодатії, мідріаз, збільшення ВТ; шум у вухах; посилене серцебиття, тахікардія, АВ-блокади, блокади ніжок провідної системи, порушення показників ЕКГ (подовження інтервалу QT, комплексу QRS), аритмія; ортостатична гіпотензія, АГ; сухість у роті, запор, нудота, діарея, блювання, набряк язика, збільшення слинних залоз, паралітична кишкова непрохідність; жовтяниця, порушення показників функціонального стану печінки, підвищення активності ЛФ, трансаміназ; гіпергідроз, висипання, уртикарії, набряк обличчя, алопеція, р-ції фотосенсибілізації; затримка сечі; еректильна дисфункція, гінекомастія; втома, пірексія; збільшення/зменшення маси тіла; р-н д/ін'єк. - зміни у місці введення.

Противпоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до амітриптиліну або до будь-якого з компонентів ЛЗ; нещодавно перенесений ІМ; блокади або порушення ритму серця, недостатність коронарних артерій; одночасне застосування з інгібіторами MAO; лікування із застосуванням амітриптиліну можна розпочинати через 14 днів після припинення прийому необоротних неселективних інгібіторів MAO та не менше ніж через 1 добу після припинення застосування ЛЗ оборотної дії моклобеміду і селегіліну; лікування із застосуванням ІMAO можна розпочинати через 14 днів після припинення прийому амітриптиліну; для р-ну для ін'єкцій - глаукома, гіпертрофія передміхурової залози, атонія сечового міхура.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 75 мг., парентерально - 75 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АМІТРИПТИЛІН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС"	табл., в/о у конт. та бл.	25мг	№25, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	

		(всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна					
	АМІТРИПТИЛІН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	табл., в/о у банк., конт. та бл.	25мг	№10x5	1,94	
	АМІТРИПТИЛІН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	табл., в/о у банк.	25мг	№25	2,14	
	АМІТРИПТИЛІН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	25мг	№10x100	1,17	
	АМІТРИПТИЛІН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	25мг	№10x5	1,47	
	АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИД	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	табл. у бл.	25мг	№10x5	1,67	
	АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИД	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	табл. у бл.	25мг	№25x1	2,38	
	АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИД-ЗН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	р-н д/ін'єк., по 2мл в амп. у бл.	10 мг/мл	№5x2		відсутня у реєстрі ОБЦ
	АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИД-ЗН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	р-н д/ін'єк., по 2мл в амп. у кор.	10 мг/мл	№10	51,98	
	АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИД-ОЗ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	р-н д/ін'єк., по 2мл в амп у пач.	10 мг/мл	№10	48,62	
II.	САРОТЕН	Х. Лундбек А/С (виробництво	табл., вкриті п/о у конт.	25мг	№100	5,65	30,21/€

		нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування, випуск серій)/Еурофінс Біофарма Продакт Тестінг Денмарк А/С (випробування за показником «Мікробіологічна чистота»), Данія/Данія				
--	--	---	--	--	--	--

• **Доксепін (Дохерін)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: N06AA12 - антидепресанти; неселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінів.

Основна фармакотерапевтична дія: трициклічний антидепресант; антидепресивна дія поєднується з анксиолітичною і седативною; виявляє антигістамінну, холінолітичну та α_1 -адреноблокуючу дії; гальмує зворотне захоплення біогенних амінів (норадреналіну та серотоніну) у синаптичних структурах; не спричиняє ейфорії, психомоторного збудження.

Показання для застосування ЛЗ: невротичні розлади із с-ми депресії ^{ПМД} або тривоги; органічні неврози, асоційовані з безсонням; депресивні та тривожні стани при алкоголізмі; депресія та тривожні стани ^{БНФ}, асоційовані із соматичними розладами та захворюваннями; депресія, що супроводжується страхом і тривогою на тлі психозів, включаючи інволюційну депресію та депресивну фазу біполярних розладів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо; дозу підбирають індивідуально залежно від тяжкості симптомів і терапевтичного ефекту; доза 30-300 мг/добу ^{БНФ}; дозу до 100 мг застосовують як окрему одноразову або розділену; дози, що перевищують 100 мг, застосовувати у 3 прийоми ^{БНФ}; максимальна разова доза - 100 мг (перед сном); при помірних або тяжких симптомах початкова доза - 75 мг щоденно ^{БНФ}; при тяжких формах захворювання добову дозу збільшують до 300 мг (у 3 прийоми); після досягнення задовільного терапевтичного ефекту дозу коригують до мінімальної підтримуючої; протитривожний ефект досягається раніше, ніж антидепресивний; антидепресивна дія проявляється через 2-3 тижні лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сонливість; головний біль, запаморочення, безсоння, нічні жахи, сплутаність свідомості, дезорієнтація, ажитація, оніміння або парестезії, тремор (зазвичай середньої тяжкості); під час застосування високих доз можуть виникнути екстрапірамідні симптоми, включаючи пізню дискінезію; галюцинації, атаксія (загалом якщо застосовують кілька препаратів, що діють на ЦНС), конвульсії; розлади зору; ортостатична гіпотензія, гіперемія обличчя; тахікардія, порушення ЕКГ (розширення комплексу QRS, подовження інтервалу PR); АР, шкірні висипання, набряк обличчя, підвищена фоточутливість, свербіж, кропив'янка; алопеція; еозинофілія та порушення ф-ції кісткового мозку з такими с-ми: агранулоцитоз, лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія; сухість слизових оболонок рота та носа, запор, нудота, блювання, диспепсія, порушення смакових відчуттів, діарея, анорексія, афтозний стоматит; порушення секреції антидіуретичного гормону, гінекомастія, збільшення грудних залоз, галакторея у жінок; підвищення/зниження лібідо, набряк яєчок, підвищення/зниження рівня глюкози в крові; затримка сечі (у чоловіків); жовтяниця; втомлюваність, слабкість, збільшення маси тіла, озноб, гіперпірексія при одночасному прийомі хлорпромазину.

Противпоказання до застосування ЛЗ: Гіперчутливість до доксепіну, трициклічних антидепресантів або до будь-якої з допоміжних речовин ЛЗ; маніакальний стан; тяжкі порушення з боку печінки; період годування груддю; глаукома; схильність до затримки сечі; одночасне застосування з інгібіторами MAO або застосування останніх протягом двох тижнів до початку терапії доксепіном.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДОКСЕПІН-ЗН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	капс. тверді у бл.	25мг	№10x3	17,90	
II.	ДОКСЕПІН	ТОВ Тева Оперейшенз Поланд, Польща	капс. у бл.	10мг, 25мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Іміпрамін (Imipramine)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: N06AA02 - антидепресанти; неселективні інгібітори зворотного захоплення моноамінів.

Основна фармакотерапевтична дія: механізм терапевтичної дії повністю не з'ясований; похідна дибензоазепіну, трициклічний антидепресант; інгібує зворотне захоплення норадреналіну та серотоніну у синапсах норадреналіну і серотоніну, нейронів, що вивільняються при стимуляції, полегшуючи тим самим норадренергічну і серотонінергічну передачу; пригнічує мускаринові та гістамінові (H_1) рецептори, проявляє антихолінергічну та помірну заспокійливу дію.

Показання для застосування ЛЗ: депресія будь-якого типу ^{БНФ} (з/без тривоги): велика депресія, депресивна фаза біполярних розладів, атипова депресія, депресивні стани та дистимія; панічні розлади; нічний енурез (у дітей віком від 6 років ^{БНФ}; як тимчасова допоміжна терапія за умови виключення органічної причини порушень).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос; добові дози і режим дозування встановлювати в індивідуальному порядку з урахуванням характеру і ступеня тяжкості захворювання; депресія^{БНФ}: внутрішньо р/ос, пацієнти 18-60 років, що перебувають на амбулаторному лікуванні - початкова доза - 25 мг 1-3 р/добу^{БНФ} з підвищенням її до 150-200 мг/добу^{БНФ} до кінця першого тижня лікування; підтримуюча доза - 50-100 мг/добу; пацієнти 18-60 років, що перебувають на стаціонарному лікуванні - початкова доза - 75 мг/добу з підвищенням її на 25 мг/добу до 200 мг/добу або (у виняткових випадках до 300 мг/добу^{БНФ}); панічні розлади: внутрішньо р/ос, розпочинати з найменшої дози, дозу поступово підвищувати до 75-100 мг/добу (у виняткових випадках - до 200 мг/добу); мінімальна тривалість лікування - 6 міс., дозу знижувати поступово; тимчасова допоміжна терапія з приводу нічного діурезу дітям віком від 6 років^{БНФ} за умови виключення органічної причини даного порушення: рекомендовані дози, діти 6-8 років (маса тіла 20-25 кг) - 25 мг/добу^{БНФ}, 9-12 років (маса тіла 25-35 кг) - 25-50 мг/добу, від 12 років (маса тіла більше 35 кг) - 50-75 мг/добу, МДД = не вище 2,5 мг/кг маси тіла; застосовувати мінімальну дозу вказаного діапазону; тривалість лікування у дітей не вище 3 міс., дозу знижувати поступово.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: підвищення рівня трансаміназ; синусова тахікардія і клінічно незначущі зміни ЕКГ (зубця Т та сегмента ST) у пацієнтів з нормальним станом серцевої ф-ції; аритмії, порушення провідності (розширення комплексу QRS і інтервалу PR, блокада ніжок пучка Гіса), прискорене серцебиття, серцева декомпенсація, ІМ; ортостатична гіпотензія, припливи крові, підвищення АТ, периферичні вазоспастичні р-ції, інсульт; агранулоцитоз, лейкопенія, тромбоцитопенія, пурпура, еозинофілія; тремор, парестезія, головний біль, запаморочення, епілептичні напади, екстрапірамідні с-ми, атаксія, міоклонія, розлади мовлення, зміни ЕЕГ; порушення координації; порушення координації, безсоння, нічні марення; порушення акомодатії, нечіткість зору, глаукома, мідріаз; шум у вухах; запор, сухість у роті, блювання, нудота, паралітична непрохідність кишечника, стоматит, потемніння язика, дискомфорт в епігастрії, діарея, біль у животі; порушення сечовипускання, затримка сечі; підвищена пітливість, шкірні АР (висипання, кропив'янка), набряк (місцевий або генералізований), світлочутливість, свербіж, петехії, випадання волосся; збільшення молочних залоз, галакторея, с-м неадекватної секреції антидіуретичного гормону (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion), підвищення або зниження рівня цукру в крові; збільшення або зменшення маси тіла, втрата апетиту, потемніння язика, зміни смаку; системні порушення та р-ції у місці введення (гіперпірексія, слабкість); системні анафілактичні р-ції, у т. ч. артеріальна гіпотензія, алергічний альвеоліт (пневмоніт) з еозинофілією або без неї; гепатит без жовтяниці, жовтяниця; деліріозна сплутаність свідомості (особливо у пацієнтів старечого віку з хворобою Паркінсона), дезорієнтація і галюцинації, коливання між депресією і гіпоманією або манією, ажитація, занепокоєння, підвищена тривожність, стомлюваність, розлади сну (сонливість чи безсоння), порушення лібідо і потенції, активація психотичних с-мів, агресивність, ілюзії; випадки суїцидальної спрямованості мислення і суїцидальної поведінки.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до іміпраміну чи будь-якої допоміжної речовини ЛЗ, до інших трициклічних антидепресантів бензодіазепінової групи; терапія інгібіторами МАО; нещодавно перенесений ІМ; порушення провідності; аритмія серця; маніакальний стан; тяжка ниркова і/або печінкова недостатність; затримка сечі; закритокутова глаукома (взъкокутова глаукома).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	МЕЛІПРАМІН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл., вкриті п/о у скл. фл.	25мг	№50	10,40	26,48/\$

• **Кломіпрамін (Clomipramine)*** ^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: N06AA04 - антидепресанти, неселективні інгібітори зворотного нейронального захоплення моноамінів.

Основна фармакотерапевтична дія: інгібує зворотне нейрональне захоплення норадреналіну і серотоніну (5-НТ), найважливішим є пригнічення зворотного захоплення серотоніну; властивий широкий спектр інших фармакологічних дій: α₁-адренолітична, антихолінергічна, антигістамінна та антисеротонінергічна (блокада 5-НТ-рецепторів); впливає на депресивний с-м та його типові прояви (психомоторна загальмованість, пригнічений настрій і тривожність); клінічний ефект відмічається через 2 - 3 тижні лікування; має специфічний вплив при обсесивно-компульсивних розладах; дія при хр. больових с-мах, зумовлених або не зумовлених соматичними захворюваннями, пов'язана з полегшенням передачі нервового імпульсу, опосередкованої серотоніном і норадреналіном.

Показання для застосування ЛЗ: дорослим, депресивні стани^{БНФ} різної етіології, з різною симптоматикою: ендогенні, реактивні, невротичні, органічні, замасковані, інволюційні форми депресії; депресія у хворих на шизофренію і психопатії; депресивні с-ми, що виникають у пацієнтів літнього віку; депресивні стани, зумовлені хр. больовим с-мом або хр. соматичними захворюваннями, депресивні порушення настрою реактивної, невротичної або психопатичної природи; обсесивно-компульсивні розлади; фобії^{ВООЗ, БНФ} і панічні розлади (напади)^{ВООЗ}, катаплексія, що супроводжує нарколепсію^{БНФ}; хр. больовий с-м (специфічний больовий с-м при раку, нейропатичний та ідіопатичний больові с-ми). Дітям табл.: обсесивно-компульсивні розлади, нічний енурез (тільки у пацієнтів віком від 6 років і за умови виключення органічних причин захворювання).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос, в/м та в/в краплинно; дозу підбирають індивідуально, з урахуванням стану пацієнта; внутрішньо р/ос: дорослі з депресією^{БНФ}, обсесивно-компульсивними с-ми і фобіями^{ВООЗ, БНФ}: початкова доза - 25 мг 2-3 р/добу; потім протягом 1-го тижня лікування дозу поступово підвищують на 25 мг через кожні кілька днів (залежно від переносимості) до досягнення добової дози 100-150 мг/день^{ВООЗ, БНФ}, МДД - 250 мг^{БНФ}, підтримуюча доза - 50-100 мг/день; панічні розлади, агорафобія: початкова доза - 10 мг/день, залежно від переносимості дозу підвищують до 25-100 мг/добу, іноді - до 150 мг, не припиняти лікування протягом 6 місяців, підтримуючу дозу протягом цього періоду повільно знижувати; катаплексія, що

супроводжує нарколепсію^{БНФ}: добова доза - 25-75 мг/день^{БНФ}; хр. больові с-ми: дозу підбирати індивідуально, з урахуванням супутнього прийому анагетичних ЛЗ; внутрішньо р/ос: підліткам з обсесивно-компульсивними с-ми: з обережністю підвищувати дозу, клінічні дані щодо короткострокової терапії у підлітків та дітей віком від 10 років обмежені, початкова доза - 25 мг/добу зі збільшенням в індивідуальному порядку до 3 мг/кг або 100 мг протягом перших 2 тижнів, дозу можна збільшити протягом наступних кількох тижнів до 3 мг/кг або 200 мг; парентеральну форму призначають лише дорослим, в/м: початкова доза 25-50 мг, потім щоденно підвищують дозу на 25 мг до досягнення добової дози 100-150 мг; після поліпшення стану, кількість ін'єк. поступово зменшують, замінюючи їх підтримуючою терапією, р/ос формами; в/в крап.: початкова доза 50-75 мг 1 р/день, тривалість інфузії - 1,5-3 год; якщо досягнуто чіткого покращання стану пацієнта, лікування за допомогою інфузій продовжувати ще протягом 3-5 днів, потім для підтримання досягнутого ефекту переходять на р/ос прийом 2 табл., що містять 25 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: запаморочення, транзиторна втомлюваність, занепокоєння, підвищення апетиту, розгубленість, дезорієнтація, галюцинації, відчуття тривоги, збудження, порушення сну, манакальний/гіпоманакальний стан, агресивність, порушення пам'яті, деперсоналізація, посилення депресії, порушення концентрації уваги, безсоння, нічні кошмари, позіхання, активація симптомів психозу; запаморочення, тремор, головний біль, міоклонус, делірій, порушення мовлення, парестезії, м'язова слабкість, підвищення тону м'язів, судоми, атаксія, зміни на електроенцефалограмі, гіперпірексія, екстрапірамідні симптоми (дискінезія), медикаментозна гарячка, нейролептичний злюкційний с-м; синусова тахікардія, відчуття серцебиття, клінічно незначущі зміни на ЕКГ (інтервалу ST/T зубця) у пацієнтів, які не мають захворювань серця, аритмії, підвищення АТ, порушення вн.серцевої провідності (розширення комплексу QRS, збільшення інтервалу QT, зміни інтервалу PQ, блокада ніжок пучка Гіса), двонаправлена шлуночкова тахікардія, ортостатична гіпотензія; сухість у роті, запор, нудота, блювання, дискомфорт у животі, діарея, зниження/втрата апетиту, дисгевзія; підвищення рівня трансаміназ у крові, гепатит з/без жовтяниці; алергічні дерматити (висипання, кропив'янка), фотосенсибілізація, свербіж; випадіння волосся; затримка сечі, затримка рідини в організмі; порушення лібідо/потенції, еректильна дисфункція, галакторея, збільшення грудних залоз; сухість у роті, підвищена пітливість, порушення сечовиділення, припливи, мідріаз, с-м неадекватної секреції антидіуретичного гормону; збільшення маси тіла; алергічний альвеоліт (пневмоніт) з/без еозинофілії, системні анафілактичні/анафілактоїдні реакції, включаючи артеріальну гіпотензію; лейкопенія, агранулоцитоз, тромбоцитопенія, еозинофілія, пурпура; порушення акомодатії, нечіткість зору, глаукома; дзвін у вухах; підвищений ризик переломів кісток; р-н д/ін'єк.: місцеві р-ції після в/в ін'єк. (тромбофлебіт, лімфангіт, відчуття жару, шкірні AP), набряки (місцеві/загальні); частота невідома - серотоніновий с-м, екстрапірамідні с-ми (акатизія, пізня дискінезія), рабдоміоліз.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до кломіпраміну або будь-яких інших інгредієнтів ЛЗ, перехресна підвищена чутливість до трициклічних антидепресантів групи дибензазепіну; комбінації з антиаритмічними ЛЗ (хінідин та пропafenон, які є потужними інгібіторами CYP2D6); одночасне застосування інгібіторів MAO (мокlobемід, лінезолід), а також період менше 14 днів до і після їх застосування; нещодавно перенесений ІМ; уроджений с-м подовженого інтервалу QT; г. інтоксикація депресантами ЦНС (снодійні, анагетичні або психотропні ЛЗ) або алкоголем; г. затримка сечі; г. делірій; нелікована закритокутова глаукома; гіпертофія простати з остаточною затримкою сечі; пілоростеноз; паралітична кишкова непрохідність.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АНАФРАНІЛ®	Новартіс Фарма С.п.А. (виробництво за повним циклом)/Міфарм С.п.А. (первинне та вторинне пакування), Італія/Італія	табл., в/о у бл.	25мг	№10x3	29,12	27,19/\$
	АНАФРАНІЛ®	Новартіс Фарма Штейн АГ, Швейцарія	р-н д/ін'єк., по 2мл в амп.	25мг/2мл	№10	відсутня у реєстрі OBC	
	КЛОФРАНІЛ	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд, Індія	табл., вкриті п/о у стрип.	25мг	№10x5	20,57	28,07/\$

5.5.2. Селективні інгібітори зворотного нейронального захоплення серотоніну (SERT)

• **Есциталопрам (Escitalopram)**^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: N06AB10 - антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну.

Основна фармакотерапевтична дія: антидепресант, селективний інгібітор зворотного захоплення серотоніну; має високу афінність до основного зв'язуючого і суміжного з ним алостеричного транспортеру серотоніну та не має або має слабку здатність зв'язуватися з низкою рецепторів, включаючи серотонінові 5-HT_{1A}, 5-HT₂-рецептори, дофамінові D₁- і D₂-рецептори, α₁, α₂, β-адренергічні рецептори, гістамінові H₁, мускаринові холінергічні, бензодіазепінові та опіатні рецептори; есциталопрам є S-енантіомером рацемічного циталопраму із власною лікувальною активністю.

Показання для застосування ЛЗ: лікування великих депресивних епізодів^{БНФ}, панічних розладів^{БНФ} з/без агарофобії, соціальних тривожних розладів^{БНФ} (соціальна фобія), генералізованих тривожних розладів^{БНФ}, обсесивно-компульсивних розладів^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим, внутрішньо р/ос; великий депресивний епізод, генералізовані тривожні розлади, обсесивно-компульсивні розлади, соціальні тривожні розлади^{БНФ} (соціальна фобія): звичайна доза - 10 мг 1 р/добу, доза може бути збільшена до МДД - 20 мг^{БНФ}, антидепресивний ефект настає через 2-4

тижні, після зникнення симптомів лікування продовжувати лікування ще протягом 6 міс.; панічні розлади^{БНФ} з/без агарофобії: початкова доза 5 мг/добу (протягом 1-го тижня), потім дозу збільшити до 10 мг, МДД - 20 мг^{БНФ}, максимальний ефект при лікуванні панічних розладів досягається через 3 міс., тривале лікування протягом 6 місяців попереджує рецидив і може призначатися індивідуально.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тромбоцитопенія; анафілактичні р-ції; порушення секреції антидіуретичного гормону; зниження/посилення апетиту, збільшення/зменшення маси тіла; гіпонатріємія, анорексія; тривога, неспокій, аномальні сни, зниження лібідо у чоловіків і жінок, аноргазмія у жінок; скреготіння зубами, збудження, нервозність, панічні напади, сплутаність свідомості; агресія, деперсоналізація, галюцинації; манія, суїцидальні думки, суїцидальна поведінка; безсоння, сонливість, запаморочення, парестезія, тремор; порушення смаку, порушення сну, непритомність; серотоніновий с-м; дискінезія, рухові розлади, судоми, психомоторний неспокій/акатизія; розширення зіниці, затуманення зору; дзвін у вухах; тахікардія; брадикардія; подовження інтервалу QT; ортостатична гіпотензія; синусити, позіхання; носова кровотеча; нудота; діарея, запор, блювання, сухість у роті; шлунково-кишкові кровотечі (в т. ч. ректальні); гепатит, зміни функціональних печінкових тестів; посилене потовиділення; висипи, облісіння, кропив'янка, свербіж; синці, набряки; артралгія, міалгія; галакторея, чоловіки: розлади еякуляції, пріапізм, імпотенція; жінки: метрорагія, менорагія; втома, пірексія, набряк.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до есциталопраму або до інших компонентів ЛЗ; одночасне лікування неселективними, незворотними інгібіторами MAO або пімозидом.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 10 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГІАЦИНТІЯ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	5,10	
	ДЕПРЕСАН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (усі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг, 20мг	№10x3, №10x6		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ДЕПРЕСАН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (усі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	6,46	
	ДЕПРЕСАН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (усі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	4,96	
	ЕСЦИТАМ 10	ТОВ "Фарма Старт", Україна (фасування та	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3, №10x6		відсутня у реєстрі ОБЦ

		пакування з форми in bulk фірми Сінтон Хіспанія, С.Л., Іспанія), Україна					
	ЕСЦИТАМ 20	ТОВ "Фарма Старт", Україна (фасування та пакування з форми in bulk фірми Сінтон Хіспанія, С.Л., Іспанія), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3, №10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕСЦИТАМ® АСІНО	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕСЦИТАМ® АСІНО	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x6	6,53	
	ЕСЦИТАМ® АСІНО	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	6,88	
	ЕСЦИТАМ® АСІНО	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x6	4,51	
	ЕСЦИТАМ® АСІНО	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	4,75	
II.	АСІТАЛОКС	Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт III), Індія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№7x4	5,36	25,52/\$
	АСІТАЛОКС	Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт III), Індія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№7x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕЗОПРАМ	Актавіс ЛТД/Балканфарма-Дупниця АТ, Мальта/Болгарія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕЛІЦЕЯ	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинну та вторинну упаковку, контроль та випуск серії, відповідальний за первинну та вторинну упаковку), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг, 20мг	№28, №56, №98, №30, №60, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕЛІЦЕЯ	КРКА, д.д., Ново место (виробництво або виробництво із напівпродукту, виробленого Дженефарм СА, первинне та вторинне пакування; контроль та випуск серії)/Дженефарм СА (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія/Греція	табл. що диспер. у бл.	5мг, 10мг, 20мг	№28, №84	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕПРАКАД	Джубілант Дженераікс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг, 15мг, 20мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕССОБЕЛ®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл., в/о у бл.	10мг, 20мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕСЦИТАЛОПРАМ ТЕДЕК	Тедек-Мейджі Фарма, С.А., Іспанія	табл. що диспер. у бл.	10мг, 20мг	№7x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕСЦИТАЛОПРАМ-ТЕВА	ТОВ Тева Оперейшнз Поланд, Польща	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 15мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕСЦИТАЛОПРАМ-ТЕВА	ТОВ Тева Оперейшнз Поланд, Польща	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№14x2	4,37	28,00/€
	ЕСЦИТАЛОПРАМ-ТЕВА	ТОВ Тева Оперейшнз Поланд, Польща	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№14x2	3,40	28,00/€
	МЕДОПРАМ	Медокемі ЛТД (Завод AZ)/Фармацевтіш Аналітіш Лабораторіум Дуівен Б.В., Кіпр/Нідерланди	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МЕДОПРАМ	Медокемі ЛТД (Завод	табл., вкриті п/о	10мг	№10x3	7,36	30,26/€

	AZ)/Фармацевтіш Аналітіш Лабораторіум Дуівен Б.В., Кіпр/Нідерланди	у бл.				
МЕДОПРАМ	Медокемі ЛТД (Завод AZ)/Фармацевтіш Аналітіш Лабораторіум Дуівен Б.В., Кіпр/Нідерланди	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	4,34	30,26/€
РЕЦІТА-10	Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№14x2	7,86	27,98/\$
РЕЦІТА-20	Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№14x2	7,86	27,98/\$
РЕЦІТА-5	Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№14x2	7,86	27,98/\$
ФЕЛІЗ С	Торрент Фармасьютікалс Лтд, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10, №30, №100	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦИПРАЛЕКС	Х. Лундбек А/С (виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування, випуск серій)/Еурофінс Біофарма Продакт Тестінг Денмарк А/С (випробування за показником «Мікробіологічна чистота»), Данія/Данія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№14x2	22,75	30,15/€
ЦИПРАМ®	Актавіс Лтд., Мальта	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	

● **Пароксетин (Paroxetine)** ^{ПМД}

Фармакотерапевтична група: N06AB05 - антидепресанти.

Основна фармакотерапевтична дія: потужний селективний інгібітор зворотного захоплення 5-гідрокситриптаміну (5-НТ, серотонін); антидепресивна дія та ефективність якого при лікуванні обсессивно-компульсивних і панічних розладів зумовлена специфічним гальмуванням захоплення 5-гідрокситриптаміну нейронами мозку; за своєю хімічною структурою відрізняється від трициклічних, тетрациклічних та інших антидепресантів; має низьку спорідненість з мускариновими холінергічними рецепторами; має незначну спорідненість з α_1 -, α_2 - і β -адренорецепторами, допаміновими (D2) 5-НТ₁-подібними, 5-НТ₂- та гістаміновими (H₁-) рецепторами; не впливає на психомоторну ф-цію і не посилює депресивну дію етанолу; не впливає на діяльність СС системи; не спричиняє клінічно значущих змін АТ, ЧСС і параметрів ЕКГ.

Показання для застосування ЛЗ: дорослі, великий депресивний розлад^{БНФ, ПМД}; лікування симптомів та профілактика рецидивів обсессивно-компульсивного розладу^{БНФ}; панічного розладу^{БНФ} з/без супутньої агорафобії; генералізованого тривожного розладу^{БНФ}; лікування соціальних фобій/соціально-тривожних станів^{БНФ}; посттравматичного стресового розладу^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос, приймати 1 р/добу- вранці під час їди, табл. слід ковтати не розжовуючи, табл. має лінію розлому, що дає змогу отримати у разі необхідності дозу 10 мг; дозу ретельно добирати індивідуально протягом перших 2-3 тижнів лікування, потім коригувати її залежно від клінічних проявів; великий депресивний розлад, соціально-тривожні розлади/ соціальні фобії, посттравматичний стресовий розлад, генералізований тривожний розлад^{БНФ}: рекомендована доза - 20 мг/добу^{БНФ}; дозу збільшувати поступово на 10мг/добу, МДД - 50мг/добу^{БНФ}; обсессивно-компульсивні розлади: початкова доза - 20мг/добу, потім щотижня збільшувати її на 10мг/добу, рекомендована доза - 40мг/добу, МДД - 60мг/добу^{БНФ}; панічний розлад: початкова доза - 10мг/добу, а потім щотижня збільшувати її на 10мг, рекомендована доза - 40мг/добу^{БНФ}, МДД - 60мг/добу; для зменшення ризику можливого посилення симптоматики панічного розладу рекомендується починати лікування з невисокої дози.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: підвищена кровоточивість, переважно шкіри та слизових оболонок (включаючи екхімози та гінекологічні кровотечі); тромбоцитопенія; тяжкі та потенційно летальні алергічні р-ції (включаючи анафілактоїдні р-ції та ангіоневротичний набряк); с-м, зумовлений недостатньою секрецією антидіуретичного гормону; збільшення рівня холестерину, зниження апетиту; змінені глікемічного профілю у пацієнтів з ЦД; гіпонатріємія у хворих літнього віку та інколи пов'язана із с-мом, зумовленим недостатньою секрецією антидіуретичного гормону; сонливість, безсоння, ажитація, аномальні сні (включаючи кошмарні сновидіння); сплутаність свідомості, галюцинації; маніакальні р-ції, неспокій, деперсоналізація, панічні атаки, акатизія; суїцидальні ідеї, суїцидальна поведінка та агресія (можуть бути також зумовлені основною хворобою); запаморочення, тремор, головний біль; екстрапірамідні розлади; судоми, акатизія, с-м неспокійних ніг; серотоніновий с-м (може включати ажитацію, сплутаність свідомості, діафорез, галюцинації, гіперрефлексію, міоклонус, тахікардію і тремор);екстрапірамідні розлади (орофациальна дистонія у пацієнтів з руховими порушеннями або у хворих, які лікуються нейролептиками); нечіткість зору; мідріаз; гостра глаукома; дзвін у вухах; синусова тахікардія, постуральна гіпотензія, транзиторне підвищення/зниження АТ; брадикардія; позіхання; нудота; запори, діарея, блювання, сухість у роті; шлунково-кишкові кровотечі; підвищення рівня печінкових ферментів; розлади з боку печінки (гепатити, інколи з жовтяницею та/або печінковою недостатністю); підвищене

потоваділення; шкірні висипання, свербіж; тяжкі шкірні побічні р-ції (включаючи поліморфну еритему, с-м Стівенса - Джонсона та токсичний епідермальний некроліз), кропив'янка, р-ції фоточутливості; затримка сечовиділення, нетримання сечі; статева дисфункція; гіперпролактинемія/галакторея, менструальні порушення (менорагії, метрорагії, аменореї, відстрочені та нерегулярні менструації); приапізм; артралгія, міалгія; астенія, збільшення маси тіла; периферичні набряки.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до пароксетину або до будь-якого іншого компонента ЛЗ; одночасне застосування з інгібіторами MAO (лінезолід і метилтіоніну хлориду (метиленового синього)) та раніше, ніж через 2 тижні після припинення лікування інгібіторами MAO; не призначати у поєднанні з тіоридазиним, оскільки пароксетин може підвищувати рівні тіоридазину в плазмі, застосування тіоридазину може призвести до подовження інтервалу QT та розвитку внаслідок цього тяжкої шлуночкової аритмії (torsades de pointes) та раптовим летальним наслідком; не призначати у комбінації з пімозидом.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 20 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ПАРОКСИН	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	10,13	
	ПАРОКСИН	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x6	10,20	
II.	ПАКСИЛ™	ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А., Польща	табл., в/о у бл.	20мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПАРОКСЕТИН	Медокемі ЛТД (Завод AZ), Кіпр	табл. у бл.	20мг	№10x3	12,86	30,26/€
	РЕКСЕТИН®	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Сертралін (Sertralin)** ^[ГПМД]

Фармакотерапевтична група: N06AB06 - антидепресанти; селективні інгібітори зворотного нейронального захоплення серотоніну.

Основна фармакотерапевтична дія: пригнічує зворотне захоплення серотоніну (5HT) у нейронах; виявляє слабкий ефект щодо зворотного захоплення у нейронах норадреналіну та допаміну; блокує захоплення серотоніну у тромбоцитах; призводить до пригнічення експресії норадреналінових і серотонінових рецепторів у мозку; не має суттєвої спорідненості з адренергічними (α -1, α -2, β), холінергічними, ГАМК, допамінергічними, гістамінергічними, серотонінергічними (5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2) або бензодіазепіновими рецепторами; не чинить седативної дії, не впливає на психомоторні функції пацієнта.

Показання для застосування ЛЗ: великі депресивні епізоди ^{БНФ}, запобігання рецидиву великих депресивних епізодів, панічні розлади ^{БНФ} з/без агорафобії, обсесивно-компульсивний розлад у дорослих та дітей 6-17 років ^{БНФ}, соціальний тривожний розлад ^{БНФ}, посттравматичний стресовий розлад ^{БНФ, ГПМД}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос; депресія та обсесивно-компульсивний розлад ^{БНФ}: початкова доза - 50 мг/добу ^{БНФ}; панічні розлади, посттравматичний стресовий розлад та соціальні тривожні розлади ^{БНФ}: початкова доза - 25 мг/добу, через 1 тиждень дозу підвищити до 50 мг 1 р/добу ^{БНФ}; дозу можна підвищувати, корекцію дози починати не раніше, ніж через 1 тижд. лікування, титраційна доза становить на 50 мг на тиждень; МДД - 200 мг/добу ^{БНФ}; корекцію дози проводити не частіше ніж 1 раз/тиждень ^{БНФ}; перші прояви клінічного ефекту спостерігаються протягом 7 днів лікування; для досягнення терапевтичної відповіді потрібен довший період, особливо при обсесивно-компульсивному розладі; дозування протягом довготривалої терапії утримувати на найнижчому ефективному рівні з наступним коригуванням залежно від терапевтичної відповіді; при тривалій терапії у пацієнтів з панічними розладами та обсесивно-компульсивними розладами проводити регулярну оцінку терапії; обсесивно-компульсивний розлад у дітей ^{БНФ} 13-17 років: початкова доза - 50 мг 1 р/добу; 6-12 років: початкова доза - 25 мг 1 р/добу, через 1 тижд. дозу можна збільшити до 50 мг 1 р/добу, якщо ефект від застосування дози 50 мг/добу не достатній дозу підвищувати зі збільшенням дози на 50 мг/добу за 1 раз протягом декількох тижнів; МДД - 200 мг/добу ^{БНФ}; при підвищенні дози понад 50 мг у педіатрії враховувати загалом нижчу масу тіла дітей порівняно з дорослими, не змінювати дозу частіше, ніж 1 р/тиждень.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: фарингіт, інфекції ВДШ, риніт, дивертикуліт, гастроентерит, середній отит; новоутворення; лімфаденопатія, лейкоцитопенія, тромбоцитопенія; анафілактична р-ція, АР, алергія; гіперпролактинемія, гіпотиреоїдизм, с-м неадекватної секреції антидіуретичного гормону; зниження/поширення апетиту, гіперхолестеринемія, гіпоглікемія, гіпонатріємія; ЦД та гіперглікемія; безсоння, депресія, дисперсоналізація, нічні жахи, відчуття тривоги, збудження, нервозність, зниження лібідо, бруксизм, галюцинації, ейфоричний настрій, апатія, патологічне мислення, конверсійний розлад, залежність від ліків, психотичний розлад, агресія, параноя, суїцидальне мислення/ поведінка; сомнамбулізм, передчасна еякуляція, паронірія; запаморочення, сонливість, головний біль, парестезії, тремор, гіпертонус, дисгевзія, порушення уваги, судоми, мимовільні м'язові скорочення, порушення координації рухів, гіперкінезія, амнезія, гіпестезія, порушення мовлення, постуральне запаморочення, мігрень, кома, хореоатетоз, дискінезія, гіперестезія, сенсорні порушення, рухові розлади (екстрапірамідальні симптоми, у т. ч. гіперкінезія, гіпертонус, дистонія, спазми щелепи або порушення ходи), синкопе; симптоми серотонінового с-му чи зловласного нейролептичного с-му, пов'язаних із супутнім прийомом серотонінергічних засобів, а саме: збудження, сплутаність свідомості, посилення потоваділення, діарея, підвищення температури тіла, АГ, ригідність та тахікардія, акатизія і психомоторне збудження, спазм церебральних судин (у т. ч. с-м скороминущої церебральної вазоконстрикції та с-м Колла -

Флемінга); порушення зору, глаукома, розлади сльозовиділення, скотома, диплопія, фотофобія, гіфема, мідріаз, розлади зору, зіниці різного розміру; дзвін у вухах, біль у вусі; відчуття серцебиття, тахікардія, ІМ, брадикардія, порушення серцевої діяльності, подовження інтервалу QTс, шлуночкова тахікардія типу «пірует»; припливи, АГ, гіперемія, периферична ішемія, патологічні геморагічні явища (носова кровотеча, шлунково-кишкова кровотеча чи гематурія); позіхання, бронхоспазм, диспное, носова кровотеча, ларингоспазм, гіпервентиляція, гіповентиляція, стридор, дистонія, гикавка, інтерстиціальне захворювання легенів; діарея, нудота, сухість у роті, біль у животі, блювання, запор, диспепсія, метеоризм, езофагіт, дисфагія, геморої, гіперсалівація, зміни язика, відрижка, мелена, гематохезія, стоматит, виразки на язиці, патологія з боку зубів, глосит, виразки на слизовій оболонці рота, панкреатит; порушення ф-ції печінки, печінкова недостатність, що рідко може призвести до летального наслідку; фульмінантний гепатит; некротичний гепатит; холестатична жовтяниця; висипання, гіпергідроз, періорбітальний набряк, пурпура, алопеція, холодний піт, сухість шкіри, кропив'янка, дерматит, бульозний дерматит, везикульозне висипання, патологічні зміни з боку текстури волосся, нетиповий запах шкіри, рідкісні випадки тяжких побічних р-цій з боку шкіри (с-м Стівенса - Джонсона та токсичний епідермальний некроліз), ангіоневротичний набряк, набряк обличчя, реакції фоточутливості, шкірні р-ції, свербіж; міалгія, остеоартрит, м'язова слабкість, біль у спині, посмикування м'язів, ураження кісток, артралгія, м'язові спазми; ніктурія, затримка сечі, поліурія, полакіурія, порушення сечовипускання, олігурія, нетримання сечі, утруднений початок сечовипускання; порушення еякуляції, статева дисфункція, ерекційна дисфункція, вагінальна кровотеча, статева дисфункція у жінок, менорагія, атрофічний вульвовагініт, баланопостит, виділення зі статевих органів, пріапізм, галакторея, гінекомастія, нерегулярний менструальний цикл; підвищена втомлюваність, біль у грудній клітці, загальне нездужання, озноб, пірексія, астенія, спрага, грижа, фіброз, зниження переносимості препарату, порушення ходи, невизначені явища, периферичний набряк.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до сертраліну або до будь-якої з допоміжних речовин ЛЗ; одночасне застосування з інгібіторами MAO незворотної дії (розпочинати терапію сертраліном не можна щонайменше протягом 14 днів після припинення курсу лікування інгібітором MAO незворотної дії, застосування сертраліну припинити щонайменше за 7 днів до початку терапії інгібітором MAO незворотної дії); одночасне застосування сертраліну та пімозиду.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 50 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕМОТОН	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна	капс. у конт.	50мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СЕРТРАЛОФТ 100	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл. в/о у бл.	100мг	№10x3	7,01	
	СЕРТРАЛОФТ 25	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл. в/о у бл.	25мг	№10x3	8,69	
	СЕРТРАЛОФТ 50	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з	табл. в/о у бл.	50мг	№10x3	8,54	

		обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна					
II.	АСЕНТРА®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг, 100мг	№7x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДЕБИТУМ - САНОВЕЛЬ	Сановель Іляч Санаі ве Тиджарет А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	25мг, 50мг, 100мг	№7x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕМОТОН	Атлантік Фарма – Продусоеш Фармасаеутікаш, С.А., Португалія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг, 100мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЗАЛОКС	Фармасайнс Інк., Канада	капс. у фл.	50мг	№250	4,00	27,25/\$
	ЗАЛОКС	Фармасайнс Інк., Канада	капс. у бл.	50мг	№10x3	5,90	27,25/\$
	ЗОЛОФТ®	Хаупт Фарма Латіна С.р.л. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)/Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмБХ (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії), Італія/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№14x2	14,30	28,54/\$
	СЕРЛІФТ	Сан Фармасьютікал Індастріз Лімітед, Індія	табл. в/о у бл.	50мг, 100мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СТИМУЛОТОН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл. в/о у бл.	50мг	№10x3	8,64	25,72/\$

● **Флувоксамін (Fluvoxamine)**^[ГІМД]

Фармакотерапевтична група: N06AB08 - антидепресанти; селективні інгібітори зворотного нейронального захоплення серотоніну.

Основна фармакотерапевтична дія: потужний інгібітор зворотного захоплення серотоніну; має мінімальну спорідненість з підтипами серотонінових рецепторів; має незначну здатність зв'язуватися з α-адренергічними, β-адренергічними, гістамінергічними, мускариновими, холінергічними або допамінергічними рецепторами; має високу спорідненість до сигма-1 рецепторів, щодо яких у терапевтичних дозах він діє як агоніст.

Показання для застосування ЛЗ: депресія^{БНФ}, обсессивно-компульсивні розлади^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: депресія у дорослих^{БНФ}: початкова доза - 50-100 мг 1 р/добу^{БНФ}, перед сном; збільшувати дозу поступово, доки не буде досягнуто клінічного ефекту; звичайна ефективна доза - 100 мг/добу^{БНФ}, її підбирати індивідуально, залежно від р-ції хворого; МДД - 300 мг; у разі призначення доз, що перевищують 150 мг, їх розподілити на декілька прийомів протягом доби^{БНФ}; після зникнення у хворого симптомів депресії лікування продовжувати ще протягом 6 міс.; рекомендована доза для попередження виникнення рецидиву депресії - 100 мг 1 р/добу; обсессивно-компульсивні розлади у дорослих^{БНФ}: початкова доза - 50 мг/добу^{БНФ} протягом 3-4 днів, потім дозу поступово підвищують, доки не буде досягнуто ефективної дози - 100-300 мг/добу; МДД - 300 мг^{БНФ}; дози до 150 мг призначають 1 р/добу, перед сном; у разі призначення доз, більших ніж 150 мг, їх розподілити на 2-3 прийоми протягом доби^{БНФ}; якщо терапевтичний ефект був досягнутий, лікування продовжувати далі в дозі, підбраній індивідуально; якщо протягом 10 тижнів лікування поліпшення не настає, доцільність подальшого призначення треба переглянути^{БНФ}; обсессивно-компульсивні розлади у дітей від 8 років і старше^{БНФ}: початкова доза - 25 мг/добу, дозу можна підвищувати на 25 мг кожні 4-7 днів^{БНФ}; ефективна добова доза - 50 - 200 мг, МДД - 200 мг; у разі прийому загальної добової дози, яка перевищує 50 мг, її розділити на 2 прийоми^{БНФ}; уникати різкої відміни.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперпролактинемія, неадекватна секреція антидіуретичного гормону; анорексія (втрата апетиту); гіпонатріємія, збільшення/ зменшення маси тіла; галюцинації, сплутаність свідомості, агресія; манія; суїцидальна ідеяція, суїцидальна поведінка; збудження, нервовість, тривога, безсоння, сонливість, тремор, головний біль, запаморочення; екстрапірамідні розлади, атаксія; судоми; серотоніновий с-м; явища, подібні до злоякісного нейролептичного с-му; акатизія/психомоторне збудження; парестезія; дисгевзія; глаукома, мідріаз; відчуття серцебиття/тахікардія; гіпотензія (ортостатична); кровотеча (включаючи шлунково-кишкову кровотечу, гінекологічну кровотечу, екімоз, пурпуру); біль у животі, запор, діарея, сухість у роті, диспепсія, нудота, блювання; порушення ф-ції печінки; гіпергідроз; шкірні р-ції гіперчутливості (включаючи висипання, свербіж, ангіоневротичний набряк); р-ція світлочутливості; артралгія, міалгія; переломи кісток; розлади сечовипускання (включаючи затримку сечі, нетримання сечі, полакіурію, ніктурию та енурез); порушена (пізня) еякуляція; галакторея; аноргазмія, менструальні розлади (аменорея, гіпоменорея, метрорагія та менорагія); астенія, загальне нездужання; с-м відміни у немовлят.

Противопоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до флувоксаміну малеату або до будь-якого з інших компонентів ЛЗ; одночасне застосування з тизанідином та інгібіторами MAO або рамелтеоном; лікування флувоксаміном розпочинати не раніше, ніж через 2 тижні після припинення прийому незворотних інгібіторів MAO, і наступного дня після відміни зворотних інгібіторів MAO (моклобеміду, лінезоліду); лікування будь-яким із ЛЗ

групи інгібіторів MAO можна починати не раніше, ніж через 1 тижд. після відміни флувоксаміну; не можна призначати одночасно з пімозидом та рамелтеоном.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДЕПРИВОКС®	СТАДА Арцнайміттель АГ (випуск серій)/Роттендорф Фарма ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, контроль серій, первинне та вторинне пакування)/МПФ Б.В. (Меньюфєкчурінг пекеджінг фармака) (первинне та вторинне пакування)/Лабор ЛС СЕ і Ко. КГ (контроль , Німеччина/Німеччина/Нідерланди/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	50мг, 100мг	№20, №50, №100	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФЕВАРИН®	Майлан Лабораторізі САС, Франція	табл., вкриті п/о у бл.	50мг, 100мг	№15, №30, №60	відсутня у реєстрі ОВЦ	

● **Флуоксетин (Fluoxetine)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: N06AB03 - антидепресанти; селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну.

Основна фармакотерапевтична дія: антидепресант, механізм дії якого обумовлений вибірковою пригніченням зворотного нейронального захоплення серотоніну в ЦНС, слабкий антагоніст мускаринових, гістамінових та α-адренорецепторів, на відміну від інших антидепресантів не знижує функціональну активність β-адренорецепторів, мало впливає на нейрональне захоплення норадреналіну та допаміну, сприяє поліпшенню настрою, усуває відчуття страху і напруження, дисфорію, має стимулювальний і аналігезивний ефекти, не чинить седативної і кардіотоксичної дії при прийманні у середніх терапевтичних дозах.

Показання для застосування ЛЗ: великі депресивні епізоди/розлади^{ВООЗ, БНФ}; нав'язливо-маніакальні розлади; obsесивно-компульсивний розлад, нервова булімія^{БНФ} (у складі комплексної психотерапії для зменшення неконтрольованого вживання їжі та з метою очищення кишечника).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос; дорослим; великі депресивні епізоди/розлади^{ВООЗ, БНФ}: початкова доза - 20мг/добу^{ВООЗ, БНФ}, курс лікування - щонайменше протягом 6 міс.; нав'язливо-маніакальні розлади: рекомендована доза - 20мг/добу, за необхідності ч/з 2 тижні дозу збільшують до 60мг/добу, якщо протягом 10 тижнів лікування відсутній клінічний ефект, терапію переглянути, якщо було отримано позитивний терапевтичний ефект продовжувати терапію індивідуально підбраною дозою, курс лікування - не більше 24 тижнів; obsесивно-компульсивний розлад: рекомендована доза - 20мг/добу, за необхідності ч/з 2 тижні дозу збільшують до 60мг/добу, якщо протягом 10 тижн. лікування не спостерігається покращення стану пацієнта, лікування переглянути; нервова булімія: добова доза - 20мг/добу (табл.), та 60мг/добу (капс.); курс лікування - не більше 3 міс.; МДД - 80 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: слабкість, включаючи астенію, відчуття тремтіння, озноб, втома, погане самопочуття, відчуття холоду, жару, аномальні відчуття, нейролептичний с-м, тромбоцитопенія, геморагічні прояви, підшкірні або слизові крововиливи, тенденції до виникнення синців, реакції гіперчутливості, включаючи ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок; анафілактоїдні реакції, сироваткова хвороба, недостатня секреція антидіуретичного гормону, зниження апетиту, включаючи анорексію, гіпонатріємія, головний біль, розлади уваги, запаморочення, дисгевзія, летаргія, сонливість, включаючи гіперсомнію, седацію, тремор, психомоторна гіперактивність, дискінезія, атаксія, порушення координації рухів, міоклонус, судоми, епілептичні напади, психомоторне збудження, порушення уваги, тривожність, дисфемія, порушення концентрації, акатизія, букоглотальний с-м, серотоніновий с-м, порушення пам'яті, включаючи ранкове пробудження, безсоння при засипанні, безсоння вночі, збудження, нервозність, занепокоєння, напруженість, зниження лібідо, включаючи втрату лібідо, порушення сну, включаючи патологічні сновидіння, нічні марення, безсоння, деперсоналізація, підвищений настрій, ейфоричний настрій, порушення мислення, порушення оргазму, включаючи аноргазмію, бруксизм, гіпоманія, манія, галюцинації, агітація, панічні атаки, суїцидальні думки і поведінка (можуть бути внаслідок основного захворювання), сплутаність свідомості, розлади мови, зміна смаку, затуменення зору, мідріаз, шум у вухах, відчуття серцебиття, шлунково-аритмія, включаючи *torsades de pointes*, подовження інтервалу QT, відчуття приливів, відчуття гарячих приливів, гіпотензія, васкуліт, вазодилатація, позіхання, задишка, фарингіт, дихальні розлади (запальні процеси чи різноманітні гістопатологічні зміни та/або фіброз, носова кровотеча, діарея, нудота, блювання, диспепсія, сухість у роті, дисфагія, біль у стравоході, шлунково-кишкова кровотеча, включаючи найчастіше кровотечу з ясен, блювання кров'ю, кров'янисті випорожнення, ректальні кровотечі, геморагічну діарею, мелену і шлункову кровотечу з виразки, ідіосинкратичний гепатит, висипання, включаючи еритему, ексфоліативні висипання, пітниця, еритематозні, фолікулярні, генералізовані, макулярні, макуло-папулярні, папулярні, кірподібні висипання, сверблячі висипання, везикулярні висипання, висипання навколо пупка, реакції фоточутливості, мультиформна еритема, що може прогресувати до с-му Стівенса -Джонсона або токсичного епідермального некролізу (с-м Лайєлла), свербіж, кропив'янка, пурпура,

алопеція, екхімоз, артралгія, посіпування м'язів, міалгія, часте сечовипускання, дизурія, затримка сечі, розлади сечовипускання, полакіурія, гінекологічна кровотеча, включаючи кровотечі з шийки матки, дисфункцію матки, маткову кровотечу, кровотечу з геніталіїв, менометрорагію, поліметрорагію, постменопаузальну кровотечу, вагінальну кровотечу; еректильна дисфункція, розлади еякуляції, включаючи недостатність еякуляції, дисфункцію еякуляції, передчасну еякуляцію, затримку еякуляції, ретроградну еякуляцію, сексуальна дисфункція, галакторея, гіперпролактинемія, пріапізм, зниження маси тіла, порушення показників функції печінки, повідомлялось про випадки суїцидальних думок та поведінки, підвищення ризику переломів кісток у пацієнтів, які отримують інгібітори зворотного захоплення серотоніну та антидепресантів, симптоми відміни помірного чи середнього ступеня тяжкості, але можуть бути і тяжкого ступеня тяжкості, тромбоцитопенія, нейтропенія, лейкопенія, анафілактичні реакції, сироваткова хвороба.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до флуоксетину або до будь-яких інших компонентів препарату; тяжка печінкова і ниркова недостатність, епілепсія, судомні стани в анамнезі, суїцидальні думки, глаукома, атонія сечового міхура, доброякісна гіперплазія передміхурової залози; одночасне застосування з інгібіторами моноаміноксидази (селективні, неселективні), включаючи лінезолід; протипоказаний у поєднанні із метопрололом, який застосовується при СН.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 20 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ФЛУКСЕН®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	капс. у бл.	20мг	№10x3	1,87	
	ФЛУКСЕН®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	капс. у бл.	20мг	№10x1	2,10	
	ФЛУОКСЕТИН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	табл., в/о у бл.	20мг	№10x2	2,62	
	ФЛУОКСЕТИН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	табл., в/о у бл.	20мг	№10x1	3,15	
II.	ПРОДЕП	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд, Індія	капс. у стрип.	20мг	№10x6	2,61	26,80/\$

● **Циталопрам (Citalopram)** ^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: N06AB04 - антидепресанти; селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну.

Основна фармакотерапевтична дія: потужний інгібітор зворотного захоплення серотоніну (5-HT), надзвичайно селективний інгібітор зворотного захоплення серотоніну, вплив на зворотне захоплення норадреналіну, допаміну або γ-аміномасляної к-ти відсутній або мінімальний; не має або має низьку спорідненість з іншими серіями рецепторів, включаючи серотонінові 5-HT_{1A}-, 5-HT₂-рецептори, дофамінові D₁- і D₂-рецептори, α₁-, α₂-, β-адренергічні рецептори, гістамінові H₁, мускаринові холінергічні, бензодіазепінові та опіатні рецептори, що пояснює меншу кількість побічних ефектів при застосуванні циталопраму.

Показання для застосування ЛЗ: лікування депресії ^{БНФ, ПМД} різної етіології та видів, профілактика рецидивів; панічних розладів ^{БНФ} з/без агорафобії; обсесивно-компульсивний розлад.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос; депресія ^{БНФ}: початкова доза для дорослих 20 мг 1 р/добу ^{БНФ}; залежно від індивідуальної чутливості пацієнта доза може бути збільшена, МДД - 40 мг/добу ^{БНФ}; антидепресивний ефект настає через 2 - 4 тижні; тривалість терапії - протягом 6 міс. після одужання для запобігання рецидиву, у пацієнтів із рекурентною (уніполярною) депресією підтримуюча терапія може тривати протягом декількох років для попередження нових епізодів; панічні розлади ^{БНФ}: початкова доза для дорослих - 10 мг 1 р/добу ^{БНФ}, протягом

1-го тижня з подальшим збільшенням дози до 20 мг 1 р/добу; МДД - 40 мг/добу^{БНФ}; низька початкова доза для зменшення імовірності появи парадоксальної тривожної реакції; максимальна ефективність циталопраму в лікуванні панічних розладів досягається приблизно після 3 міс. безперервного лікування і підтримується завдяки тривалому лікуванню; обсесивно-компульсивний розлад: початкова доза - 20 мг; залежно від індивідуальної чутливості пацієнта доза може бути збільшена до МДД - 40 мг/добу; терапевтичний ефект при лікуванні обсесивно-компульсивного розладу настає через 2 - 4 тижні та посилюється з часом.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тромбоцитопенія; гіперчутливість, анафілактичні р-ції; порушення секреції антидіуретичного гормону; зниження/посилення апетиту, зниження/збільшення маси тіла; гіпонатріємія; гіпокаліємія; тривожність, зниження лібідо, неспокій, нервозність, сплутаність свідомості, аноргамія (жінки), аномальні сновидіння; агресія, деперсоналізація, галюцинації, манія; панічні атаки, скреготіння зубами, неспокій, суїцидальні думки, суїцидальна поведінка; безсоння, сонливість; тремор, парестезія, запаморочення, порушення уваги; непритомність; судоми grand mal, дискінезія, порушення смаку; судоми, серотоніновий синдром, екстрапірамідні розлади, акатизія, рухові порушення; розширення зіниць; затуманення зору; дзвін у вухах; брадикардія, тахікардія; подовжений QT на ЕКГ, шлуночкові аритмії, у т.ч. torsade de pointes; кровотеча; постуральна гіпотензія; позіхання; носова кровотеча; сухість у роті, нудота; діарея, блювання, запор; шлунково-кишкові кровотечі в т.ч. ректальні; гепатит; аномальні показники ф-ції печінки; посилене потовиділення; свербіж; висипання на шкірі, кропив'янка, облісіння, пурпура, фоточутливість; синці, ангіоневротичний набряк; артралгія, міалгія; затримка сечовипускання; розлади еякуляції, відсутність еякуляції, імпотенція; менорагія у жінок; галакторея(чолов.), метрорагія у жінок; пріапізмі у чоловіків; втома; набряк; гіпертермія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до циталопраму або будь-якого компонента ЛЗ; сумісне застосування інгібіторів MAO (в т.ч. селегіліну у добовій дозі понад 10 мг) та перші два тижні після припинення їх застосування; лікування інгібіторів MAO повинно починатися не раніше як через 7 днів після припинення прийому циталопраму; одночасне застосування лінезоліду, пімозиду та ЛЗ, які пролонгують інтервал QT, якщо немає умов для проведення ретельного спостереження та моніторингу АТ; пацієнтам зі встановленим подовженим QT-інтервалом або вродженим с-мом подовженого QT; стани з ознаками, властивими серотоніновому с-му.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 20 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЦИПРАМІЛ	Х. Лундбек А/С (виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування, випуск серій)/Еурофінс Біофарма Продакт Тестінг Денмарк А/С (випробування за показником «Мікробіологічна чистота»), Данія/Данія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№14x2	21,15	29,27/€

5.5.3. Селективні інгібітори зворотного нейронального захоплення серотоніну та норадреналіну (SERT, NET)

- **Венлафаксин (Venlafaxine)**^(ПМД)

Фармакотерапевтична група: N06AX16 - антидепресанти.

Основна фармакотерапевтична дія: антидепресантний ефект пов'язаний з посиленням нейротрансмітерної активності ЦНС; венлафаксин та його основний метаболіт О-десметилвенлафаксин (ОДВ) є потужними селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну і норадреналіну та слабкими інгібіторами зворотного захоплення дофаміну; знижує бета-адренергічні р-ції; не пригнічує активність MAO; не має спорідненості з опіатними, бензодіазепіновими рецепторами.

Показання для застосування ЛЗ: лікування та профілактика великих депресивних епізодів^{БНФ}, пролонг. р/ос форми: генералізовані тривожні розлади, соціальні тривожні розлади^{БНФ} (соціальна фобія); лікування панічного нападу, з агорафобією або без неї.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос; депресія^{БНФ}: рекомендована початкова доза - 75мг/добу; при необхідності, після завершення 2-х тижнів дозу можна збільшити^{БНФ} до 150мг 1 р/добу, за потреби дозу можна підвищити до МДД - 375мг^{БНФ}; підвищення дози здійснювати кожні 2 тижн. або більш тривалий період часу, але не менше ніж через 4 дні; лікування епізоду депресії має тривати не менше 6 міс.; для підтримуючої терапії, а також терапії з метою профілактики рецидивів або нових епізодів депресії, використовуються дози, які виявилися ефективними при звичайному епізоді депресії; генералізовані тривожні розлади^{БНФ}, соціальна фобія: рекомендована добова доза - 75мг 1 р/добу, пацієнтам, які не відповідають на 75мг/добу, можна дозу підвищити до МДД - 225мг^{БНФ}; підвищення дози здійснювати кожні 2 тижні або більше, але не менше ніж через 4 дні; для підтримуючої терапії, терапії з метою профілактики рецидивів або нових епізодів депресії застосовують такі ж дози, які виявилися ефективними при звичайному епізоді депресії; панічний напад: доза пролонгованої дії 37,5 мг 1 р/добу протягом 7 днів, потім дозу слід збільшити до 75 мг 1 р/добу; пацієнтам, яким для досягнення клінічного покращення необхідні вищі дози порівняно з початковою 75 мг н/добу, дозу можна підвищити до МДД - 225 мг на добу; збільшення дози слід проводити з інтервалом у 2 тижні або більше.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: екхімоз, шлунково-кишкова кровотеча; кровотеча зі слизових оболонок, подовження часу кровотечі, тромбоцитопенія, дискразія (включаючи агранулоцитоз, апластичну анемію, нейтропенію, панцитопенію); анафілактичні р-ції; підвищення рівня пролактину в крові, с-м неадекватної секреції антидіуретичного гормону; підвищення рівня холестерину в крові, зменшення/збільшення маси тіла, гіпонатріємія, зниження апетиту; незвичні сновидіння, зниження лібідо, безсоння, нервова збудливість, седативний ефект, сплутаність свідомості, деперсоналізація, апатія, галюцинації, тривожне збудження, маніакальні р-ції, делірій (мариння), суїцидальні думки і суїцидальна поведінка (про випадки суїцидальних думок і суїцидальної поведінки повідомлялося під час терапії венлафаксином або одразу після припинення терапії), фобії, порушення мовлення (дизартрія), манія, гіпоманія, бруксизм, аномальні оргазми у жінок, апатія; головний біль, запаморочення (вертиго), гіпертонус м'язів, тремор, парестезії, ступор, позіхання, міоклонус, порушення рівноваги та координації (атаксія), акатизія, судоми, нейролептичний злоякісний с-м (НЗС), серотонінергічний с-м, екстрапірамідні р-ції (включаючи дистонію і дискінезію), пізня дискінезія; порушення акомодатії, мідріаз, порушення зору, закритокутова глаукома; дзвін у вухах; прискорене серцебиття, тахікардія, подовження інтервалу QT, фібриляція шлуночків, шлуночкова тахікардія (*torsades de pointes*), АГ, вазодилатація (переважно відчуття жару/припливи), ортостатична гіпотензія, синкопе, артеріальна гіпотензія, аритмії, кровотеча; позіхання, легенева еозинфілія, задишка (диспное); нудота, сухість у роті, зниження апетиту, анорексія, запор, блювання, порушення смаку, діарея, панкреатит, диспепсія, біль у животі; гепатит, відхилення від норми показників ф-ції печінки; потовиділення (включаючи нічне потіння), висип, алопеція, мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона, свербіж, кропив'янка, р-ції світлочутливості, папульозний висип, ангіоневротичний набряк; рабдоміоліз, артралгія, міалгія, м'язові спазми; порушення сечовипускання (утруднення), нетримання сечі (полакіурія), затримка сечі; патологічна еякуляція/оргазм у чоловіків, відсутність оргазму, розлади ерекції (імпотенція), порушення менструального циклу, пов'язані зі збільшенням нерегулярних кровотеч (менорагія, метрорагія), галакторея, зниження лібідо; гарячка, підвищення t°.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до венлафаксину або до будь-якого з компонентів ЛЗ; одночасне застосування з інгібіторами MAO (оборотними, необоротними, селективними та неселективними), а також період протягом 14 діб після введення необоротних інгібіторів MAO; після відміни венлафаксину чекати не менше 7 діб перед початком прийому інгібіторів MAO; тяжкий ступінь АГ (АТ 180/115 та вище до початку терапії); закритокутова глаукома; порушення сечовипускання у зв'язку з недостатнім відтоком сечі (захворювання передміхурової залози); тяжка печінкова або ниркова недостатність.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ВЕНЛАФАКСИН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. у бл.	75мг	№10x3	17,33	
	ВЕНЛАФАКСИН-3Н	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	табл. у бл.	37,5мг, 75мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВЕНЛАФАКСИН-3Н	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	табл. у бл.	37,5мг	№10x3	30,10	
	ВЕНЛАФАКСИН-3Н	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	табл. у бл.	75мг	№10x3	23,22	
II.	АЛВЕНТА®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	капс. прол. дії у бл.	37,5мг, 75мг, 150мг	№14, №28, №56	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВЕЛАКСИН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	капс. прол. дії у бл.	37,5мг, 75мг, 150мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВЕЛАКСИН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	капс. прол. дії у бл.	37,5мг	№14x2	37,88	26,00/\$
	ВЕЛАКСИН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	капс. прол. дії у бл.	75мг	№14x2	28,41	26,00/\$
	ВЕЛАКСИН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	капс. прол. дії у бл.	150мг	№14x2	21,45	26,00/\$
	ВЕНЛАКСОР®	АТ "Гріндекс", Латвія	табл. у бл.	37,5мг	№10x3	20,23	35,04/€
	ВЕНЛАКСОР®	АТ "Гріндекс", Латвія	табл. у бл.	75мг	№10x3	18,34	35,04/€
	ЛАФАКСИН® XR	Дексель Лтд., Ізраїль	табл. прол. дії у	75мг	№14x2	17,42	24,80/\$

			бл. з календ. шкал.				
ЛАФАКСИН® XR	Дексель Лтд., Ізраїль		табл. прол. дії у бл. з календ. шкал.	150мг	№14x2	13,69	24,80/\$
МЕДОФАКСИН	Ципла Лтд (виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування)/Медокемі ЛТД (Завод AZ) (первинне та вторинне пакування, контроль якості, дозвіл на випуск серії), Індія/Кіпр		капс. прол. дії у бл.	37,5мг, 75мг, 150мг	№10x3, №10x5	відсутня у реєстрі OBLЦ	

• **Дулоксетин (Duloxetine)** ^(ПМД)

Фармакотерапевтична група: N06AX21 - інші антидепресанти.

Основна фармакотерапевтична дія: комбінований інгібітор зворотного захоплення серотоніну і норепінефрину; незначною мірою інгібує захоплення допаміну, не має значної спорідненості з гістаміновими і допаміновими, холінергічними і адренергічними рецепторами; механізм дії зумовлений інгібуванням зворотного захоплення серотоніну і норепінефрину та посиленням серотонергічної і норадренергічної нейротрансмісії у ЦНС; чинить болезаспокійливу дію за рахунок повільнення передачі больових імпульсів у ЦНС.

Показання для застосування ЛЗ: великий депресивний розлад ^{БНФ}, діабетичний периферичний нейропатичний біль, генералізований тривожний розлад ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати р/ос; великий депресивний розлад, діабетичний периферичний нейропатичний біль: 60 мг 1 р/добу, МДД - 120 мг (розподілена на 2 прийоми) ^{БНФ}, терапевтичний ефект лікування виявляється протягом 2 міс.; генералізований тривожний розлад: початкова доза - 30 мг 1 р/добу ^{БНФ}, пацієнтам із недостатнім ефектом лікування дозу збільшити до 60 мг/добу, за умов недостатнього ефекту лікування розглядати підвищення дози до 90 або до МДД - 120 мг/добу ^{БНФ}, терапевтичний ефект лікування виявляється протягом 2-4 тижн.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ларингіт, гіпотиреоз, анафілактичні р-ції, гіперчутливість; зниження апетиту, гіперглікемія, дегідратація, гіпонатріємія, недостатність АДГ; безсоння, ажитація, зниження лібідю, тривожність, аномальні видіння та аномальний оргазм, розлади сну, бруксизм, дезорієнтація, апатія, суїцидальне мислення/ поведінка, манія, галюцинації, прояви агресії/ злості; головний біль, сонливість, запаморочення, тремор, парестезія, міоклонія, акатизія, нервозність, розлади уваги, летаргія, дискінезія, порушення смаку, с-м неспокійних ніг, поганий сон, серотоніновий с-м, судоми, психомоторне занепокоєння, екстрапірамідні розлади; розпливчасте зображення, мідріаз, розлади зору, сухість очей, глаукома; дзвін/ біль у вухах, запаморочення; серцебиття, тахікардія, суправентрикулярна аритмія, фібриляція найчастіше передсердна; припливи, АГ, підвищення АТ, ортостатична гіпотензія, втрата свідомості, відчуття холоду в кінцівках, гіпертонічний криз; позихання, орофарингеальний біль, відчуття стискання у горлі, носова кровотеча; нудота, сухість у роті, запор, діарея, блювання, диспепсія, метеоризм, біль у животі, кровотечі ШКТ, гастроентерит, відрижка, гастрит, стоматит, неприємний запах з рота, наявність крові у випорожненнях; підвищений рівень печінкових ензимів (АЛТ, АСТ, ЛФ), гепатит, г. ураження печінки, жовтяниця, печінкова недостатність; підвищене потовиділення, висипання, нічне потіння, контактний дерматит, кропив'янка, холодний піт, фотосенсибілізація, підвищена схильність до утворення синців, ангіоневротичний набряк, с-м Стівенса-Джонсона; кістково-м'язовий біль, м'язовий спазм, посмикування м'язів, відчуття скутості м'язів, тризм; дизурія, затримка сечі, утруднений початок сечовипускання, ніктурія, поліурія, зниження току сечі, аномальний запах сечі; еректильна дисфункція, порушення/ затримка еякуляції, менструальні розлади, статеві розлади, гінекологічні кровотечі, симптоми менопаузи, галакторея, гіперпролактинемія; стомлюваність, біль у грудях, падіння, погане самопочуття, відчуття холоду/жару/повзання мурашок, спрага, нездужання, порушення ходи; зниження/ збільшення маси тіла, підвищення рівня КФК, холестеролу в крові; с-м відміни.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до дулоксетину або до будь-яких допоміжних речовин ЛЗ; одночасне застосування з неселективними необоротними інгібіторами MAO та принаймні протягом 14 днів після припинення лікування інгібіторами MAO, інгібітори MAO не можна призначати принаймні протягом 5 днів після припинення лікування дулоксетином; нестабільна АГ (може спровокувати гіпертонічний криз); термінальна стадія ниркової недостатності (кліренс креатиніну <30 мл/хв); захворювання печінки (може спричинити печінкову недостатність); дитячий вік; одночасне застосування з флувоксаміном, ципрофлоксацином або еноксацином (сильні інгібітори CYP1A2), через підвищення концентрації дулоксетину у плазмі крові.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 60 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДЮЛОК®	ПАТ "Фармак" (пакування із in bulk фірми-виробника Лабораторіос Нормон, С.А., Іспанія), Україна	капс. к/р тверді у бл.	30мг, 60мг	№10x6	відсутня у реєстрі OBLЦ	
	ДЮЛОК®	ПАТ "Фармак" (пакування	капс. к/р тверді	30мг	№10x3	20,00	

		із in bulk фірми-виробника Лабораторіос Нормон, С.А., Іспанія), Україна	у бл.				
	ДЮЛОК®	ПАТ "Фармак" (пакування із in bulk фірми-виробника Лабораторіос Нормон, С.А., Іспанія), Україна	капс. к/р тверді у бл.	60мг	№10x3	13,33	
II.	ДЕПРАТАЛ	АТ "Адамед Фарма" (виробництво, первинне та вторинне пакування, випуск серії; виробництво "грануляту"), Польща	табл. к/р у бл.	30мг, 60мг	№7x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДЕПРАТАЛ	АТ "Адамед Фарма" (виробництво, первинне та вторинне пакування, випуск серії; виробництво "грануляту"), Польща	табл. к/р у бл.	30мг	№7x4	12,76	26,67/\$
	ДЕПРАТАЛ	АТ "Адамед Фарма" (виробництво, первинне та вторинне пакування, випуск серії; виробництво "грануляту"), Польща	табл. к/р у бл.	60мг	№7x4	8,98	26,67/\$
	ДЕПРАТАЛ	Заклад Фармацевтичний Адамед Фарма С.А. (виробництво "грануляту")/Паб'яницький фармацевтичний завод Польфа А.Т. (виробництво, первинне та вторинне пакування, випуск серії), Польща/Польща	табл. к/р у бл.	30мг, 60мг	№7x1, №7x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДЕПУЛОКСА	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	капс. г/р у бл.	30мг, 60мг	№7x4, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДЕФАКСТО 30	Алембік Фармас'ютікелс Лімітед, Індія	капс. з м/в тверді у бл.	30мг	№8x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДЕФАКСТО 60	Алембік Фармас'ютікелс Лімітед, Індія	капс. з м/в тверді у бл.	60мг	№8x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДУЛОКЕМ 30	Апкем Лабораторіз Лтд, Індія	капс. з м/в тверді у бл.	30мг	№14x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДУЛОКЕМ 60	Апкем Лабораторіз Лтд, Індія	капс. з м/в тверді у бл.	60мг	№14x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДУЛОКСЕНТА®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія (виробництво "in bulk", первинна упаковка, вторинна упаковка, контроль серії та випуск серії), Словенія	капс. к/р тверді у бл.	30мг, 60мг	№10x3, №10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДУЛОКСИН®	Лабораторіос Нормон, С.А., Іспанія	капс. к/р тверді у бл.	30мг, 60мг	№7x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДУЛОКСИН®	Лабораторіос Нормон, С.А., Іспанія	капс. к/р тверді у бл.	30мг	№7x4	14,31	27,32/€
	ДУЛОКСИН®	Лабораторіос Нормон, С.А., Іспанія	капс. к/р тверді у бл.	60мг	№7x4	11,42	27,32/€
	ДУЛОТ	Люпін Лімітед, Індія	капс. г/р тверді у бл.	30мг, 60мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДЮКСЕТ	НОБЕЛ ІПАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш. (повний цикл виробництва, відповідальний за випуск серії)/Улкар Кімія Санаї ве Тіджарет А.Ш. (виробництво проміжного продукту: пелет дулоксетину), Туреччина/Туреччина	капс. к/р у бл.	30мг	№14x2	20,00	26,52/\$
	ДЮКСЕТ	НОБЕЛ ІПАЧ САНАЇ ВЕ	капс. к/р у бл.	60мг	№14x2	13,21	26,52/\$

	ТІДЖАРЕТ А.Ш. (повний цикл виробництва, відповідальний за випуск серії)/Улкар Кімія Санаї ве Тіджарет А.Ш. (виробництво проміжного продукту: пелет дулоксетину), Туреччина/Туреччина						
НЕКСЕТИН	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш. (повний цикл виробництва, відповідальний за випуск серії)/Улкар Кімія Санаї ве Тіджарет А.Ш. (виробництво проміжного продукту: пелет дулоксетину), Туреччина/Туреччина	капс. к/р тверді у бл.	20мг, 40мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ		
РЕВІВАЛ	Медокемі ЛТД (Центральний Завод) (виробництво готового лікарського засобу, контроль якості, випуск серії)/Медокемі ЛТД (Завод AZ) (виробництво готового лікарського засобу, первинне та вторинне пакування), Кіпр/Кіпр	капс. г/р тверді у бл.	30мг, 60мг	№30, №60, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ		
СИМОДА	БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦЯ АД, Болгарія	капс. г/р тверді у бл.	30мг	№7x4	21,79	30,43/€	
СИМОДА	БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦЯ АД, Болгарія	капс. г/р тверді у бл.	60мг	№7x4	14,11	30,43/€	

5.5.4. Мелатонінергічні мультимодальні засоби (Me1, Me2), інгібітори серотонінових 2С (5HT2C) рецепторів

- **Агомелатин (Agomelatine)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: N06AX22 - психоаналептики, інші антидепресанти.

Основна фармакотерапевтична дія: мелатонінергічний агоніст MT₁- та MT₂-рецепторів і антагоніст 5-HT_{2c}-рецепторів; не впливає на захоплення моноамінів і не має спорідненості з α-, та β-адренергічними, гістамінергічними, холінергічними, допамінергічними, бензодіазепіновими рецепторами; ресинхронізує циркадні ритми: відновлює фазність сну, коливання t° тіла та секрецію мелатоніну; підвищує вивільнення допаміну та норадреналіну специфічно у фронтальних відділах кори головного мозку та не впливає на екстрацелюлярний рівень серотоніну.

Показання для застосування ЛЗ: великі депресивні епізоди ^{БНФ, ПМД} у дорослих.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос для дорослих: рекомендована доза 25мг 1 р/добу ^{БНФ}, перед сном; через 2 тижні, за необхідності, дозу можна збільшити до 50мг 1 р/добу ^{БНФ}, перед сном; збільшення дози до 50мг базується на оцінці показника користь/ризик для пацієнтів з проведенням печінкових тестів; пацієнтам з депресією лікуватися не менше 6 міс., до зникнення симптомів депресії; припинення лікування не потребує поступового зниження дозування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тривожність, незвичні сновидіння, суїцидальні думки/поведінка, ажитація та пов'язані з нею симптоми (дратівливість, неспокій), агресивність, жахливі сновидіння, манія/гіпоманія, сплутаність свідомості, галюцинації; головний біль, запаморочення, сонливість, безсоння, мігрень, парестезія, с-м неспокійних ніг, акатизія; нечіткість зору, дзвін у вухах, нудота, діарея, запор, біль в абдомінальній ділянці живота, блювання, підвищення рівнів АЛТ, АСТ, ЛФ, гамма-глутамілтрансферази, гепатит, печінкова недостатність, жовтяниця; гіпергідроз, екзема, свербіж, кропив'янка, еритематозні висипання, набряк обличчя, ангіоневротичний набряк, біль у спині, затримка сечовипускання, втома, збільшення/ зменшення маси тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до агомелатину чи до будь-якої допоміжної речовини ЛЗ; порушення функції печінки (цироз печінки або активна фаза захворювання печінки) або підвищення рівня трансаміназ більше, ніж у 3 рази від показників норми; застосування у комбінації сильнодіючими інгібіторами СYP1A2 інгібіторами (флувоксамін, ципрофлоксацин).

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
-------------------	-----------------	---------------	-----------	----------------------	----------------	-----------------------------

I.	АГНЕСТІ®	АТ "Фармак" (вторинне пакування, маркування, випуск серії з продукції in bulk фірми-виробника МЕДІС Інтернешнл а.с., завод (виробниче підприємство) у м. Болатіце, Чеська Республіка (відповідальний за контроль якості, первинне та вторинне пакування, випуск, Україна	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ
II.	МЕЛІТОР®	Лабораторії Серв'є Індастрі/Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд, Франція/Ірландія	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№14x1, №14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ

5.5.5. Серотонінергічні мультимодальні засоби (SERT, 5HT_{1A}, 5HT₃)

• *Вортіоксетин (Vortioxetine)*

Фармакотерапевтична група: N06AX26 - антидепресанти.

Основна фармакотерапевтична дія: має мультимодальну активність, яка є поєднанням двох фармакологічних механізмів: прямої модуляції активності рецепторів та інгібування транспортера серотоніну (5-HT); антагоніст 5-HT₃, 5-HT₇ і 5-HT_{1D} рецепторів, частковий агоніст 5-HT_{1B} рецепторів, агоніст 5-HT_{1A} рецепторів та інгібітор 5-HT транспортера, викликає модуляцію нейротрансмісії в декількох системах, в тому числі серотоніну, норадреналіну, дофаміну, гістаміну, ацетилхоліну, ГАМК та глутамату; має антидепресивну та анксіолітичну дію, а також поліпшення когнітивної ф-ції, навчання та пам'яті; не викликає сексуальної дисфункції.

Показання для застосування ЛЗ: лікування великого депресивного розладу у дорослих ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/о; початкова та підтримуюча дози - по 10 мг 1 р/добу ^{БНФ}; дозу можна збільшити до МДД - 20 мг ^{БНФ} або знизити мінімально до 5 мг/добу одноразово; після усунення симптомів депресії продовжувати лікування принаймні 6 міс. для зміцнення антидепресивного ефекту.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: Анафілактичні р-ції; гіпонатріємія; патологічні сновидіння; безсоння, збудження, агресія; запаморочення; серотоніновий с-м; мідріаз (що може потенціювати гостру закритокутову глаукому; гіперемія обличчя; кровотечі (включаючи контузії, підшкірні крововиливи, носові кровотечі, шлунково-кишкові або гінекологічні кровотечі); нудота, діарея, запор, блювання; свербіж, включаючи свербіж генералізований; пітливість у нічний час; набряк, кропив'янка, висипи.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до вортіоксетину або до будь-якої складової ЛЗ; одночасне застосування з неселективними інгібіторами MAO або селективними інгібіторами MAO-A.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 10 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БРІНТЕЛЛІКС	Х. Лундбек А/С (виробництво за повним циклом)/Елаяфарм (первинне та вторинне пакування)/Еурофінс Біофарма Продакт Тестінг Денмарк А/С (випробування за показником "мікробіологічна чистота"), Данія/Франція/Данія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№14x2		відсутня у реєстрі ОБЦ
	БРІНТЕЛЛІКС	Х. Лундбек А/С (виробництво за повним циклом)/Елаяфарм (первинне та вторинне пакування)/Еурофінс Біофарма Продакт Тестінг Денмарк А/С (випробування за показником "мікробіологічна чистота"), Данія/Франція/Данія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№14x2	24,88	29,27/€

5.5.6. Норадренергічні мультимодальні засоби (α2, NET)

• *Міансерин (Mianserin)* ^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: N06AX03 - антидепресанти.

Основна фармакотерапевтична дія: антидепресант; належить до групи піперазино-азепінових сполук і відрізняється від трициклічних антидепресантів; у хімічній структурі відсутній боковий ланцюжок, характерний для ТЦА, який відповідає за їх антихолінергічну активність; підвищує центральну норадренергічну нейротрансмісію шляхом α_2 -ауторецепторної блокади та пригнічення зворотного захоплення норадреналіну; зв'язується з серотоніновими рецепторами ЦНС; має анксиолітичну (протитривожну) дію; седативний ефект пов'язаний з впливом на α -1-адренорецептори і H_1 -гістамінові рецептори; при застосуванні в терапевтичних дозах практично не має антихолінергічної активності і, відповідно, впливу на СС систему; при передозуванні спричиняє менше кардіотоксичних ефектів порівняно з ТЦА; не виявляє взаємодії з симпатоміметичними і гіпотензивними, дія яких пов'язана з впливом на β -адренорецептори (бетанідин) чи α -адренорецептори (клонідин або метилдопа).

Показання для застосування ЛЗ: Депресивні стани^{БНФ} різного походження.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі, р/ос; дозу препарату визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта; рекомендована початкова доза - 30 мг/добу^{БНФ}; дозу поступово підвищувати кожні кілька днів для отримання оптимального клінічного ефекту; ефективна добова доза - 60-90 мг, МДД - 90 мг; добову дозу можна розділити на кілька прийомів або за 1 прийом на ніч^{БНФ}; позитивні результати виявляються протягом перших 2-4 тижнів терапії; якщо протягом наступних 2-4 тижнів не спостерігається позитивного ефекту, лікування припинити; після досягнутого клінічного покращення, для підтримки позитивного ефекту, лікування продовжувати протягом ще 4-6 міс.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: патологічні зміни крові, що можуть проявлятися у вигляді гранулоцитопенії або агранулоцитозу; збільшення маси тіла; гіпоманія; седативний ефект, що виникає на початку лікування і зменшується при продовженні лікування; судоми, гіперкінезія, нейролептичний злюкисний с-м; брадикардія після прийому початкової дози, подовжений інтервал QT на ЕКГ, шлункова тахікардія типу «Пірует», артеріальна гіпотензія; підвищення печінкових ферментів, жовтяниця, гепатит, відхилення від норми показників функції печінки; екзантема; артралгія; набряк.

Протипоказання до застосування ЛЗ: маніакальний стан; тяжке порушення функції печінки.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 60 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	MIACER®	Рівофарм СА, Швейцарія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10х2	51,00	30,43/€
	MIACER®	Рівофарм СА, Швейцарія	табл., вкриті п/о у бл.	30мг	№10х2	32,00	30,43/€
	MIACER®	Рівофарм СА, Швейцарія	табл., вкриті п/о у бл.	60мг	№10х2	14,80	25,63/€

5.5.7. Антагоністи серотонінових та норадреналінових рецепторів (5HT_{2A}, 5HT_{2C}, 5HT₃, α_2)

- **Міртазапін (Mirtazapine)** [ГМД]

Фармакотерапевтична група: N06AX11 - психоаналептики, антидепресанти.

Основна фармакотерапевтична дія: антагоніст α_2 -пресинаптичних рецепторів ЦНС, збільшує норадренергічну і серотонінергічну передачу; посилення серотонінергічної передачі здійснюється через 5-HT₁-рецептори, оскільки він блокує 5-HT₂- і 5-HT₃-рецептори; антидепресивна активність зумовлена дією обох його енантіомерів: S(+) енантіомер блокує α_2 - і 5-HT₂-рецептори, а R(-) енантіомер блокує 5-HT₃-рецептори; H_1 -антагонічна дія спричинює заспокійливу дію.

Показання для застосування ЛЗ: лікування глибокого депресивного епізоду^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос; початкова доза для дорослих - 15 або 30мг^{БНФ}; ефективна добова доза - 15-45мг; починає проявляти ефект через 1-2 тижн. лікування; при застосуванні адекватної дози позитивну відповідну реакцію на лікування очікувати через 2-4 тижн.; якщо через 2-4 тижн. відповідна реакція не спостерігається, лікування припинити.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: пригнічення кісткового мозку (гранулоцитопенія, агранулоцитоз, апластична анемія, тромбоцитопенія), еозинофілія; невідповідна секреція антидіуретичного гормону; збільшення маси тіла, підвищення апетиту, гіпонатріємія; порушення сну, сплутаність свідомості, неспокій, безсоння, нічні жахіття, манія, збудження, галюцинації; психомоторна напруженість, включаючи акатизію та гіперкінезію; агресія, суїцидальні думки/поведінка; сонливість, седативний стан, головний біль, летаргічний стан, запаморочення, тремор, парестезія, синдром неспокійних ніг, втрата свідомості, міоклонус, судоми (інсульт), серотоніновий синдром, пероральна парестезія, дизартрія; ортостатична гіпотензія, гіпотензія; сухість у роті, нудота, діарея, блювання, панкреатит, пероральна гіпестезія, набряк ротової порожнини, підвищене слиновиділення; підвищення активності трансаміназ у сироватці крові; екзантема, с-м Стівенса-Джонсона, бульозний дерматит, мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз; артралгія, міалгія, біль у спині; периферичний набряк, підвищена втомлюваність, сомнамбулізм. Діти: збільшення маси тіла, кропив'янка, гіпертригліцеридемія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до міртазапіну або до будь-якої допоміжної речовини ЛЗ; супутнє застосування міртазапіну з інгібіторами MAO; печінкова або ниркова недостатність; дитячий вік; період вагітності та годування груддю.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 30 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	МІРАЗЕП	Мікро Лабс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	30мг	№10x3	13,67	28,54/\$
	МІРЗАТЕН	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю))/НЛЗОХ (Національні лабораторія за здоров'я, окремі ін харано) (контроль серії (фізичні та хімічні ме, Словенія/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	30мг, 45мг	№30, №60, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МІРЗАТЕН Q-TAB®	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю))/НЛЗОХ (Національні лабораторія за здоров'я, окремі ін харано) (виробник, відповіда, Словенія/Словенія	табл., що диспер. у бл.	15мг, 30мг, 45мг	№30, №60, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МІРТАЗАПІН САНДОЗ®	Салютас Фарма ГмБХ, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	15мг, 30мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МІРТАСТАДІН	СТАДА Арцнайміттель АГ (випуск серій, контроль серій)/Хемофарм д.о.о. (виробництво нерозфасованого продукту, контроль серій)/"Хемофарм" АД (первинне та вторинне пакування), Німеччина/Боснія і Герцеговина/Сербія	табл., вкриті п/о у бл.	15мг, 30мг, 45мг	№10x2, №10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

5.5.8. Антагоністи серотонінових рецепторів, інгібітори зворотного захоплення серотоніну (5HT_{2A}, SERT)

- **Тразодону гідрохлорид (Trazodone)**

Фармакотерапевтична група: N06AX05 - Психоаналептики. Антидепресанти.

Основна фармакотерапевтична дія: триазолпіндинова похідна; інгібітор зворотного захоплення серотоніну та антагоніст 5-HT₂ рецепторів; ефективний для лікування депресивних станів, депресії, пов'язаної з тривожністю та порушенням сну та зі швидким початком дії; не протипоказаний при глаукомі та розладах з боку сечовивідної системи, не має екстрапірамідних ефектів, не потенціює адренергічну передачу; не має антихолінергічної активності, не чинить типових для трициклічних антидепресантів ефектів на ф-цію серця.

Показання для застосування ЛЗ: депресивні розлади з тривожністю^{БНФ, ПМД} або без тривожності.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим, р/ос: 75 - 150мг/день приймати одноразово ввечері перед сном^{БНФ}; дозу підвищувати до 300мг/день^{БНФ}; для стаціонарних пацієнтів дозу можна підвищити до 600мг/день, розділену на декілька прийомів^{БНФ}; доза може бути підвищена залежно від клінічного ефекту; рідко виникає потреба у прийнятті дози вище 300мг/день; тривалість лікування складає щонайменше 1 міс.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: дискразії крові (у т. ч. агранулоцитоз, тромбоцитопенія, еозинфілія, лейкопенія, анемія); АР; с-м неадекватної секреції антидіуретичного гормону; гіпонатріємія, зменшення маси тіла, відсутність/ збільшення апетиту; суїцидальна спрямованість мислення/ поведінка, стан сплутаності свідомості, безсоння, дезорієнтованість, манія, тривожність, нервозність, збудження, делірій, агресивна р-ція, галюцинації, нічні кошмари, зменшення лібідо, с-м відміни; серотоніновий с-м, судоми, злоякісний нейролептичний с-м, запаморочення, вертиго, головний біль, сонливість, неспокій, зниження концентрації уваги, тремор, нечіткість зору, порушення пам'яті, міоклонус, експресивна афазія, парестезія, дистонія, порушення смакових відчуттів; серцеві аритмії (у т. ч. поліморфна шлуночкова тахікардія torsade de pointes), посилене серцебиття, шлуночкові екстрасистоли, парні шлуночкові екстрасистоли, шлуночкова тахікардія), брадикардія, тахікардія, відхилення від норми даних ЕКГ (подовження інтервалу QT); ортостатична артеріальна гіпотензія, АГ, синкопе; закладеність носа, задишка; нудота, блювання, сухість у роті, запор, діарея, диспепсія, біль у шлунку,

гастроентерит, посилене слиновиділення, паралітична непрохідність кишечника; порушення ф-ції печінки (у т. ч. жовтяниця та гепатоцелюлярні ураження), внутрішньопечінковий холестаза; шкірні висипання, свербіж, гіпергідроз; біль у кінцівках, біль у спині, міалгія, артралгія; порушення сечовиведення; пріапізм; слабкість, набряк, грипозні симптоми, підвищена втомлюваність, біль у ділянці грудної клітки, підвищення t^0 тіла; підвищення рівня печінкових ферментів.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до тразодону або компонентів ЛЗ; алкогольна інтоксикація та інтоксикація снодійними ЛЗ; г. ІМ.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ТРИТТИКО	Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А., Італія	табл. прол. дії у бл.	75мг	№15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТРИТТИКО	Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А., Італія	табл. прол. дії у бл.	75мг	№10x3	34,93	27,67/€
	ТРИТТИКО	Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А., Італія	табл. прол. дії у бл.	150мг	№10x2	33,50	27,67/€
	ТРИТТИКО XR	Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А., Італія	табл., вкриті п/о прол. дії у бл.	150мг, 300мг	№10, №20, №30, №14, №28	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТРИТТИКО XR	Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А., Італія	табл., вкриті п/о прол. дії у бл.	300мг	№10x3	20,77	27,67/€

5.6. Засоби, що застосовуються у лікуванні деменції

5.6.1. Ацетилхолінові мультимодальні засоби, інгібітори ацетилхолінестерази (AChE)

- **Галантамін (Galantamine)**^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: N06DA04 - засоби, що застосовуються при деменції; інгібітори холінестерази.

Основна фармакотерапевтична дія: третинний алкалоїд, групи парасимпатоміметиків непрямої дії; селективний конкурент і зворотний інгібітор ферменту ацетилхолінестерази; спричиняє підвищення рівня ацетилхоліну в ЦНС; алостеричний ліганд найбільш розповсюджений у ЦНС нікотинових ацетилхолінових рецепторів субтипу $\alpha 4/ \beta 2$, прямим шляхом стимулює нікотинові рецептори; підвищує чутливість постсинаптичних рецепторів до ацетилхоліну; проникає крізь гематоенцефалічний бар'єр, полегшує проведення імпульсів у ЦНС і прискорює процеси збудження; підвищує активність холінергічної системи, покращує когнітивні ф-ції; має значно слабшу дію на мускаринові рецептори; покращує та полегшує проведення збудження у нервово-м'язових синапсах і відновлює нейром'язову провідність у випадках її блокади недеполяризуючими нервово-м'язовими блокаторами; підвищує тонус гладенької мускулатури, посилює секрецію травних та потових залоз, спричиняє міоз.

Показання для застосування ЛЗ: захворювання периферичної НС (полірадікулоневрит, радікулоневрит, неврит, поліневрит, поліневропатії); стани, пов'язані із пошкодженнями передніх рогів спинного мозку (після поліомієліту, мієліту, спінальної м'язової атрофії); церебральний параліч (стани після інсульту мозку, дитячого церебрального паралічу, після травм ЦНС); порушення нервово-м'язового синапсу (міастенія гравіс, м'язова дистрофія); показання тільки для табл. - слабко або помірно виражена деменція альцгеймерівського типу^{БНО}; тільки для р-ну д/ін'екц. - когнітивні порушення при різних захворюваннях ЦНС (травма, інтоксикація, множинний склероз, аутизм); для зняття дії недеполяризуючих нервово-м'язових блокаторів (міорелаксантів) і при лікуванні післяопераційних парезів тонкого кишечника та сечового міхура; іонофорез при неврологічних ураженнях периферичної НС, нічному нетриманні сечі; при отруєнні антихолінергічними ЛЗ.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос, п/ш, в/м та в/в; внутрішньо р/ос - хвороба Альцгеймера: початкова доза - 5 мг 2 р/добу протягом 4-х тижнів; підтримуюча доза - після 4-тижневого курсу дозу можна збільшити до 20 мг/добу, розділену на 2 прийоми (по 10 мг 2 р/добу), дозу збільшувати залежно від клінічної картини і індивідуальної р-ції пацієнта; порушення з боку периферичної та ЦНС, порушення нервово-м'язового синапсу: звичайна доза для дорослих - 10-40 мг/добу, розподілена на 2-4 прийоми; для дітей 6-8 років 5-10 мг/день; 9-11 років - 5-15 мг/день; 12-15 років - 5-25 мг/день, тривалість курсу лікування - від декількох тижнів до декількох років; парентерально - для нетривалого лікування та пацієнтів, для яких неможливе р/ос застосування; неврологічні показання: по 0,03-0,28 мг/кг, початкова доза для дорослих - 2,5 мг/добу, добову дозу збільшують через 3-4 дні на 2,5 мг, розподілену на 2-3 рівні дози, максимальна разова доза для дорослих - п/ш, 10 мг, МДД - 20 мг; дітям дозування встановлюють залежно від маси тіла, п/ш: 1-2 років - 0,25-1 мг (0,02-0,08 мг/кг); 3 років - 0,03-0,28 мг/кг; 3-5 років - 0,5-5 мг; 6-8 років - 0,75-7,5 мг; 9-11 років - 1-10 мг; 12-15 років - 1,25-12,5 мг; від 15 років - 1,25-15 мг, тривалість лікування залежить від особливостей і складності захворювання, найчастіше - 40-60 днів, курс можна повторювати 2-3 р. з інтервалом 1-2 міс.; зняття дії недеполяризуючих нейром'язових блокаторів (міорелаксантів) - в/в, лікування післяопераційних парезів тонкого кишечника та сечового міхура - п/ш, в/м, в/в,

при отруєнні антихолінергічними засобами - в/в: дорослим в дозі 10-20 мг/добу; дітям призначають в залежності від маси тіла: в/в, 1-2 років - 0,25-1 мг (0,03-0,08 мг/кг); від 3 років - 0,03-0,28 мг/кг або 3-5 років - 0,5-5 мг; 6-8 років - 0,75-7,5 мг; 9-11 років - 1-10 мг; 12-15 років - 1,25-12,5 мг; від 15 років - 1,25-15 мг; іонофорез при неврологічних ураженнях периферичної НС, нічному нетриманні сечі: 2,5-5 мг (при величині електричного струму від 1 до 2 mA) тривалістю 10 хв. протягом 10-15-денного періоду; тривалість курсу лікування - від декількох тижнів до декількох років і залежить від захворювання та індивідуальної переносимості лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: брадикардія; шлуночкові та надшлуночкові екстрасистоли, АВ-блокада I ступеня, синусова брадикардія, пальпітація, стенокардія, ортостатичний колапс, серцева недостатність, набряки, тріпотіння або мерехтіння передсердь, подовження інтервалу QT, ішемія або ІМ; АГ; артеріальна гіпотензія, приливи, динамічні порушення мозкового кровообігу, інсульт; запаморочення, сомнолентність, синкопе, тремор, головний біль, летаргія; парестезія, дисгевзія, гіперсомнія, судоми, безсоння, збудження, апраксія, афазія, апатія, підвищене лібідо, делірій; галюцинації, депресія; зорові та слухові галюцинації, параноїдальні реакції, агресія; затуманений зір, спазм акомодатії; шум у вухах; нудота, блювання; біль у животі, біль у верхній частині живота, діарея, диспепсія, шлунковий дискомфорт, кишковий дискомфорт; відчуття нудоти, здуття живота, гастрит, дисфагія, сухість у роті, посилене слиновиділення, дивертикуліт, ентерит, дуоденіт, перфорація слизової оболонки стравоходу, кровотечі з верхніх та нижніх відділів ШКТ; тахипное, бронхоспазм, збільшення назальної та бронхіальної секреції, носова кровотеча; гепатит; нетримання сечі, гематурія, часте сечовипускання, інфекції сечовивідних шляхів, затримка сечі, сечокам'яна хвороба, ниркова колька; зниження апетиту, анорексія; дегідратація, збільшення рівня ЛФ; гіпергідроз; м'язові спазми; м'язова слабкість; гіперчутливість, свербіж, висипання, кропив'янка, риніт, рідко г. реакції, в т.ч. анафілаксію з втратою свідомості; тромбоцитопенія, пурпура, анемія; астенія, стомлюваність, слабкість; зниження маси тіла; підвищення рівня ферментів печінки, гіпокаліємія, гіпоглікемія; падіння.

Протипоказання до застосування ЛЗ: Гіперчутливість до компонентів ЛЗ; бронхіальна астма; брадикардія; АВ-блокада; ІХС; тяжка СН (III-IV ступінь за NYHA); епілепсія; гіперкінези; механічна кишкова непрохідність; механічні порушення прохідності сечовивідних шляхів; тяжка ниркова недостатність (кліренс креатиніну нижче 10 мл/хв); тяжка печінкова недостатність (класифікація Чайльд-П'ю (*Child-Pugh*) > 9).

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	НІВАЛІН	АТ "Софарма", Болгарія	р-д д/ін'ек. по 1мл в амп. у бл.	1мг/мл, 2,5мг/мл, 5мг/мл	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НІВАЛІН	АТ "Софарма", Болгарія	табл. у бл.	5мг, 10мг	№10, №20	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Донепезил (Donepezil)**

Фармакотерапевтична група: N06DA02 - інгібітори холінерастери; засоби для застосування при деменції.

Основна фармакотерапевтична дія: селективний оборотний інгібітор ацетилхолінерастери, що є основним типом холінерастери у головному мозку; інгібує холінерастери у головному мозку, блокує розпад ацетилхоліну, що здійснює передачу нервового збудження у ЦНС; інгібує ацетилхолінерастери більше, ніж бутирилхолінерастери, що містяться у структурах, розміщених поза ЦНС.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування деменції Альцгеймерівського типу легкого та середнього ступеня тяжкості^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос; початкова доза - 5мг 1 р/добу^{БНФ}; лікування у дозі 5мг/добу продовжувати протягом 1 міс.; після клінічної оцінки ефективності дозу можна збільшити до 10мг 1 р/добу; МДД - 10мг^{БНФ}; підтримуючу терапію продовжувати, доки зберігається терапевтичний ефект.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: застуда, нежить; анорексія; галюцинації, збудження, агресивна поведінка, стан тривожності; синкопе, запаморочення, безсоння; епілептичні напади, судоми; екстрапірамідні симптоми; злоякісний нейролептичний с-м, нічні жахи, збудження, порушення сну; брадикардія; синоатріальна блокада, АВ-блокада; нудота, діарея; блювання, диспепсія, дискомфорт у шлунку, гіперсалівація; шлунково-кишкова кровотеча, виразки шлунка та дванадцяти-палої кишки (при сумісному прийомі з НПЗП); дисфункція печінки, в т. ч. гепатит; висипання, свербіж; судоми м'язів, рабдоміоліз; рабдоміоліз; нетримання сечі; головний біль, підвищена втомлюваність, біль; незначне підвищення сироваткової концентрації м'язової КФК; травматизм.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до донепезилу, похідних піперидину або інших компонентів ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 7,5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	СЕРВОНЕКС®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД/ТОВ "КУСУМ ФАРМ" (альтернативний виробник, що здійснює вторинне пакування, контроль якості)	табл., в/о у бл.	5мг, 10мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

		та випуск серії), Індія/Україна					
	СЕРВОНЕКС®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД/ТОВ "КУСУМ ФАРМ" (альтернативний виробник, що здійснює вторинне пакування, контроль якості та випуск серії), Індія/Україна	табл., в/о у бл.	5мг	№14x2	5,60	24,25/\$
	СЕРВОНЕКС®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД/ТОВ "КУСУМ ФАРМ" (альтернативний виробник, що здійснює вторинне пакування, контроль якості та випуск серії), Індія/Україна	табл., в/о у бл.	10мг	№14x2	4,11	24,25/\$
II.	АЛЗЕПІЛ	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл., в/о у бл.	5мг, 10мг	№14x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АЛЗЕПІЛ	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл., в/о у бл.	5мг	№14x2	9,33	21,50/\$
	АЛЗЕПІЛ	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл., в/о у бл.	10мг	№14x2	6,74	21,50/\$
	АЛЬМЕР	Актавіс ЛТД, Мальта	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АРИЗИЛ 10	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АРИЗИЛ 5	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДОЕНЗА- САНОВЕЛЬ	Сановель Іляч Санаі ве Тиджарет А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№14x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЯСНАЛ®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг	№14, №28, №56	відсутня у реєстрі ОВЦ	

5.6.2. Антагоністи глутаматергічних NMDA рецепторів (NMDAR)

• Мемантин (Memantine) ^[П] ^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: N06DX01 - засоби, що застосовуються при деменції.

Основна фармакотерапевтична дія: потенціалзалежний, середньої афінності неконкурентний антагоніст NMDA-рецепторів, модулює ефекти патологічно підвищених рівнів глутамату, який може призвести до дисфункції нейронів.

Показання для застосування ЛЗ: хвороба Альцгеймера від легкого ступеня тяжкості до тяжких форм ^{пмд бнф}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймати 1 р/добу кожного дня в один і той самий час; **МДД** - 20мг ^{бнф}; з метою зниження ризику появи негативних реакцій підтримуючу дозу визначають шляхом поступового збільшення дозування на 5мг/тиждень ^{бнф} протягом перших 3 тижнів: 1-й тижд. (1-7 день) приймати 5мг/добу ^{бнф}, 2-й тижд. (8-14 день) - 10мг/добу, 3-й тижд. (15-21 день) - 15мг/добу, розпочинаючи з 4-го тижня - 20мг/добу; рекомендована підтримуюча доза - 20мг/добу; регулярно оцінювати переносимість та дозування мемантину протягом 3-х місяців від початку лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: грибові захворювання; гіперчутливість; сонливість, сплутаність свідомості, галюцинації, психотичні реакції; запаморочення, порушення рівноваги, порушення ходи, судомні напади; СН; АГ, венозний тромбоз/тромбоемболізм, агранулоцитоз, лейкопенія (у тому числі нейтропенія), панцитопенія, тромбоцитопенія, тромбоцитарна тромбоцитопенічна пурпура.; задишка; запор, блювання, панкреатит; підвищення показників ф-ції печінки, гепатит; головний біль, підвищена втомлюваність; г.порушення ф-ції нирок (включаючи підвищення креатиніну і ниркову недостатність); алергічні реакції з боку шкіри, включаючи с-м Стівенса-Джонсона; з боку імунної системи: реакції підвищеної чутливості, алергічні реакції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого компонента ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 20 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДЕНІГМА®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД/ТОВ "КУСУМ ФАРМ" (альтернативний виробник, що здійснює вторинне пакування, контроль якості та випуск серії),	табл. в/о у бл.	5мг, 10мг	№14x1, №14x1x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	

	Індія/Україна						
ДЕНІГМА®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД/ТОВ "КУСУМ ФАРМ" (альтернативний виробник, що здійснює вторинне пакування, контроль якості та випуск серії), Індія/Україна	табл. в/о у бл.	10мг	№14x1x10	10,03	27,00/\$	
ДЕНІГМА®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	р-н д/орал. застос., по 100мл у фл. з мірн. ложк.	2 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
МЕМАТОН ІС	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
МЕМБРАЛ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
МЕМБРАЛ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x6	9,17		
МЕМОКС 10	ТОВ "Фарма Старт" (фасування та пакування з форми in bulk фірми Сінтон Хіспанія, С.Л., Іспанія), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	13,60		
МЕМОКС 10	ТОВ "Фарма Старт" (фасування та пакування з форми in bulk фірми Сінтон Хіспанія, С.Л., Іспанія), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x6	13,64		
МЕМОКС 20	ТОВ "Фарма Старт" (фасування та пакування з форми in bulk фірми Сінтон Хіспанія, С.Л., Іспанія), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	13,64		
II. АБІКСА	Х. Лундбек А/С, Данія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№14x2	73,37	28,01/€	
АДМЕНТА 10	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
АДМЕНТА 5	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
КОГНІМЕТ	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Індія	табл., вкриті п/о у конт.	10мг	№60	відсутня у реєстрі ОБЦ		
МАРУКСА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії)/ТАД Фарма ГмбХ (первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг	№14x2, №14x6	відсутня у реєстрі ОБЦ		
МЕКСІЯ 10	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№28, №50, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ		
МЕКСІЯ 10	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x5	12,00	26,52/\$	
МЕКСІЯ 20	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№14x2, №14x6	відсутня у реєстрі ОБЦ		
МЕМА	Сінтон Хіспанія, С.Л. (виробник, відповідальний за виробництво in bulk, пакування, контроль якості	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг	№10x3, №10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ		

	та випуск серії)/Роттендорф Фарма ГмбХ (виробник, відповідальний за пакування)/Джі І Фармасьютікалс, Лтд (виробник, відповідальний за пакування), Іспанія/Німеччина/Болгарія					
МЕМАМЕД	Медокемі ЛТД (Центральний Завод) (виробництво за повним циклом)/Медокемі ЛТД (Завод АЗ) (первинне та вторинне пакування готового лікарського засобу), Кіпр/Кіпр	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг	№10x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МЕМАМЕД	Медокемі ЛТД (Центральний Завод) (виробництво за повним циклом)/Медокемі ЛТД (Завод АЗ) (первинне та вторинне пакування готового лікарського засобу), Кіпр/Кіпр	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	9,64	32,13/€
МЕМАМЕД	Медокемі ЛТД (Центральний Завод) (виробництво за повним циклом)/Медокемі ЛТД (Завод АЗ) (первинне та вторинне пакування готового лікарського засобу), Кіпр/Кіпр	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x3	8,57	32,13/€
МЕМАНТИН-ТЕВА	Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд. (виробництво за повним циклом)/АТ Фармацевтичний завод ТЕВА (первинна та вторинна упаковка, контроль якості, випуск серії), Ізраїль/Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МЕМТЕК®	Дженефарм СА, Греція	табл., що диспер. у бл.	10мг	№15x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МІРВЕДОЛ	ВАТ "Гедеон Ріхтер" (випуск серії)/ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща" (контроль якості, дозвіл на випуск серії: виробництво нерозфасованого продукту, первинна упаковка, вторинна упаковка), Угорщина/Польща	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№15x2, №15x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	
НЕЙРОНТИН	Актавіс Лтд, Мальта	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПОЛЬМАТИН®	Фармацевтичний завод "Польфарма" С.А., Польща	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг	№14, №28, №56	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТИНГРЕКС®	АТ "Гріндекс", Латвія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x6	16,11	26,85/€
ТИНГРЕКС®	АТ "Гріндекс", Латвія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x9	16,11	26,85/€
ТИНГРЕКС®	АТ "Гріндекс", Латвія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№10x3	19,69	26,85/€

5.7. Засоби, що застосовуються у лікуванні розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин

5.7.1. Інгібітори альдегіддегідрогенази (ALDH)

• Дисульфірам (Disulfiram)

Фармакотерапевтична група: N07BB01 - засоби, що застосовуються при алкогольній залежності.

Основна фармакотерапевтична дія: сприяє накопиченню ацетальдегіду в крові після прийому алкоголю з розвитком характерних токсичних ефектів (нудота, блювання, гіперемія шкіри, відчуття жару обличчя та верхньої частини тулуба, біль у грудях, утруднення дихання, шум у голові, відчуття серцебиття, запаморочення, відчуття страху, озноб, зниження АТ).

Показання для застосування ЛЗ: ад'ювантна терапія для попередження рецидиву алкогольної залежності^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос; лікування розпочинати після утримання від вживання алкоголю принаймні протягом 24 годин у спеціалізованій установі лікарями з досвідом його застосування; табл. по 150 мг: дорослим 150-450 мг/добу 7-10 днів; через 7-10 днів проводять першу дисульфірам-алкогольну пробу, при слабкій реакції дозу алкоголю при проведенні наступних проб підвищують на 10-20 мл, максимальна доза - 100-120 мл, повторні проби здійснюють в умовах стаціонару через 1-2 дні, в амбулаторних умовах - через 3-5 днів; тривалість курсу лікування встановлює лікар індивідуально.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: периферичні нейропатії, неврити, у тому числі неврит зорового нерва, поліневрити, зазвичай нижніх кінцівок; психоневрологічні розлади (в т.ч. погіршення/втрата пам'яті, сплутаність свідомості, дезорієнтація, параноя), астенія; головний біль, сонливість, відчуття підвищеної втомлюваності (зазвичай на початку лікування). Інколи можуть розвиватися енцефалопатія, судоми/епілептиформні напади, кататонія, як правило, зворотні при припиненні лікування; психоневрологічні р-ції; металічний або часниковий присмак у роті, неприємний запах з рота (галітоз), неприємний запах у пацієнтів з колостомаю, втрата апетиту, гастралгія, нудота, блювання, діарея; підвищення рівня трансаміназ, білірубину, жовтяниця, гепатит (переважно цитолітичний), некроз печінки, печінкова недостатність, що іноді вимагали трансплантації печінки або призводили до летального наслідку; алергічні дерматити, свербіж, шкірні висипання, в т.ч. акнеподібні; мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона; зниження лібідо, потенції, ерекційна дисфункція; р-ції гіперчутливості.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до дисульфіраму або до будь-якого компонента ЛЗ та до тіурамових сполук; СС розлади; ЦД; епілепсія/епілептиформні с-ми (за винятком алкогольної епілепсії); психоневрологічні розлади (тяжкі розлади особистості, суїцидальний ризик, психози), тяжка ДН; печінкова та/або ниркова недостатність; вживання напоїв або застосування ЛЗ, що містять спирт, менш ніж за 24 год. до прийому дисульфіраму.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ТЕТУРАМ	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл. у бл.	150мг	№10x5	1,83	
	ТЕТУРАМ	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл. у бл.	150мг	№10x1	2,06	
II.	ЕСПЕРАЛЬ®	Софаримекс - Індустрія Кіміка е Фармачеутіка, С.А., Португалія	табл. у фл.	500мг	№20	відсутня у реєстрі ОБЦ	

5.7.2. Антагоністи опіоїдних рецепторів

• Налоксон (Naloxone) *^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: V03AB15 - антидоти.

Основна фармакотерапевтична дія: конкурентний антагоніст опіатних рецепторів; відноситься до групи «чистих» антагоністів опіатних рецепторів; блокує переважно μ -рецептори і витісняє наркотичні аналгетики з місць зв'язування, ліквідуючи симптоми передозування опіоїдів; усуває дію ендогенних опіатних пептидів і екзогенних опіоїдних аналгетиків; меншою мірою діє на інші опіатні рецептори; запобігає, послаблює або усуває ефекти опіоїдних аналгетиків, відновлює дихання, зменшує седативну дію та ейфорію, послаблює гіпотензивний ефект; усуває дію широкої групи наркотичних засобів: агоністів, агоністів-антагоністів опіатних рецепторів (морфіну, апоморфіну, героїну, кодеїну, дигідрокодеїну, промедолу, метадону, пентазоцину, фентанілу, бупренорфіну); усуває центральні і периферичні токсичні симптоми: пригнічення дихання, звуження зіниць, уповільнення випорожнення шлунка, дисфорію, кому та судоми, аналгетичний ефект наркотичних аналгетиків; усуває токсичну дію великих доз алкоголю; провокує с-м відміни у хворих з опіоїдною залежністю; не володіє анальгезуючою активністю, не викликає дисфорії і психоміметичних с-мів, розвитку звикання і формування лікарської залежності.

Показання для застосування ЛЗ: передозування опіоїдів^{ВООЗ, БНФ}; усунення пригнічення дихального центру^{ВООЗ, БНФ}, спричиненого опіоїдами; відновлення дихання у новонароджених після введення породіллі опіоїдних анальгетиків^{БНФ}; діагностичний засіб у хворих з підозрою на опіоїдну залежність.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в струминно, в/в краплинно та в/м; дозу встановлювати індивідуально для кожного пацієнта; усунення пригнічення дихального центру, спричиненого опіатами^{БНФ}: дорослим - в/в ін'єк. у дозі 0,1-0,2 мг (1,5 - 3 мкг/кг маси тіла)^{БНФ}; за необхідності додатково вводити 0,1 мг з інтервалом 2 хв.^{БНФ} до повного відновлення дихання і свідомості; діти - початкова доза - 0,01^{БНФ} - 0,02 мг/кг маси тіла в/в протягом 2 - 3 хв. до повного відновлення дихання і свідомості; додаткові дози призначати з інтервалом 1 - 2 год. залежно від р-ції пацієнта, дози і тривалості дії опіатів, що застосовуються; г. передозування опіатів^{ВООЗ, БНФ}: початкова доза для

дорослих - 0,4^{ВООЗ, БНФ} - 2 мг в/в^{ВООЗ}; якщо не настає відновлення дихання, введення повторити через 2 - 3 хв.^{ВООЗ}; можна також вводити в/м (початкова доза - 0,4-2 мг), якщо в/в введення неможливе; діти - в/в, початкова доза - 0,1 мг/кг маси тіла^{БНФ}; якщо бажаного ефекту не досягнуто, додатково у вигляді ін'єкц. вводять 0,1 мг/кг маси тіла; якщо в/в введення неможливе, вводять в/м у початковій дозі 0,01 мг/кг маси тіла, розділений на кілька введень; відновлення дихання у новонароджених, матері яких отримували опіоїди: звичайна доза - 0,01 мг/кг маси тіла в/в, якщо дихальна ф-ція не відновлюється, введення повторити через 2 - 3 хв., при неможливості в/в введення вводять в/м в початковій дозі 0,01 мг/кг маси тіла.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота, блювання, діарея, сухість у роті; аритмія, брадикардія, тахікардія, гіпотензія, АГ, фібриляція шлуночків, зупинка серця, асистолія; тремтіння, судоми, запаморочення, головний біль, напруженість, гіпервентиляція; зміни поведінки, включаючи насильницьку поведінку, нервозність, неспокій, збудження, дратівливість; риніт, задишка, шкірний висип, свербіж, кропив'янка, мультиформна еритема, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок; посилення пітливості, післяопераційний біль, зміни у місці введення; с-м «відміни».

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до налоксону або до інших компонентів ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НАЛОКСОН-ЗН	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, ко, Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	0,4 мг/мл	№10x1, №5x2		відсутня у реєстрі ОВЦ
	НАЛОКСОН-ЗН	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, ко, Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у кор.	0,4 мг/мл	№10	208,72	

5.7.3. Парціальні агоністи опіоїдних рецепторів

- **Бупренорфін (Buprenorphine) *** (див. п. 10.3.3. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: N07BC01 - засоби, що застосовуються при опіоїдній залежності.

Показання для застосування ЛЗ: замісна терапія опіоїдної залежності^{БНФ} у комплексі з медичною, соціальною та психологічною підтримкою, наданою спеціалістами.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос; для дорослих та дітей старше 16 років, які добровільно проходять лікування у спеціалізованому стаціонарі; початкова доза 0,8-4мг/добу^{БНФ}; додаткову дозу 2-4 мг можна застосовувати 1р/добу залежно від потреби конкретного пацієнта; на початку лікування першу дозу застосувати при появі симптомів абстиненції, але не раніше ніж через 6 год після останнього прийому опіоїдів; попередню дозу метадону зменшити до не менш ніж 30 мг/добу, інакше може розвинути с-м відміни, спричинений бупренорфіном; дозу збільшувати поступово, залежно від терапевтичного ефекту; середня підтримуюча доза - 8мг/добу; МДД - 24мг/добу; тривалість лікування не більше 28 днів.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БУПРЕН® ІС	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. сублінг. у бл.	0,008г	№10x1		відсутня у реєстрі ОВЦ
	БУПРЕН® ІС	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. сублінг. у бл.	0,002г	№10x1		відсутня у реєстрі ОВЦ
	БУПРЕНОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	табл. сублінг. у бл.	2мг	№10x1, №25x4		відсутня у реєстрі ОВЦ
	БУПРЕНОРФІНУ	Товариство з обмеженою	табл. сублінг. у	4мг	№10x1,		відсутня у

ГІДРОХЛОРИД	відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	бл.		№10x10	реєстрі ОБЦ
БУПРЕНОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	табл. сублінг. у бл.	8мг	№10x1, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ

5.7.4. Агоністи опіоїдних рецепторів

- **Метадон (Methadone) ***

Фармакотерапевтична група: N07BC02 - засоби, що застосовуються при опіоїдній залежності.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний засіб, виявляє седативну, анагетичну дію, подібну до морфіну; зв'язується з опіатними рецепторами, конкурентно заміщає короткодіючі наркотичні засоби (морфін, героїн); діє на ЦНС та органи, що мають гладку мускулатуру; проявляє детоксикаційний/ підтримуючий ефект при опіатній залежності; ознаки анагезії проявляються через 30-60 хв після прийому.

Показання для застосування ЛЗ: детоксикація при лікуванні опіатної залежності^{ВООЗ, БНФ} (героїнова залежність та від інших морфіноподібних наркотиків); підтримувальне лікування хворих на опіатну наркоманію; **больовий с-м**^{БНФ} від помірного до сильного, який не купірується ненаркотичними анальгетиками.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос у суспенз. та табл.; **наркотична (опіатна) залежність:** тривалість одного лікувального циклу детоксикації не перевищує 21 день, наступний цикл не починати раніше, ніж через 4 тижні після завершення попереднього; схеми дозування можуть змінюватися залежно від клінічної оцінки; на початковому етапі одноразова доза 20-30мг, для зниження дії симптомів відміни; можна призначати більшу дозу, якщо симптоми відміни не усунуто, якщо симптоми виникають знову, якщо пацієнти фізично залежні від великих доз; адекватним рівнем дозування вважається 40мг/добу щоденно; стабілізація триває 2-3 дні, потім кількість метадону поступово зменшувати; початкова доза становить 20мг та через 4 або 8 год. ще 20мг або 40мг одноразово; якщо ж до початку лікування ступінь толерантності до опіатів невелика, початкова доза може бути вповнину меншою; з появою симптомів абстиненції хворому можна дати ще 10мг, згодом дозу підбирати індивідуально у межах до 80мг/добу з урахуванням переносимості та потреби; у більшості випадків для дорослих достатньою є доза нижче 80мг/добу; **МДД - 120мг**^{ВООЗ, БНФ}; для вагітних жінок з опіатною залежністю підтримуючі дози метадону повинні бути щонайнижчими, що запобігають розвитку с-му відміни, зазвичай нижче 80мг/добу; на пізніших термінах може знадобитися підвищення дози на 10-20мг; **больовий с-м:** дозу підбирати залежно від вираженості больових відчуттів та реакції хворого; лікування і титрування дози метадону найбезпечніше з малої початкової дози з поступовою корекцією дози; для зняття сильного болю метадон не застосовувати хворим, які не приймали інших опіатних ЛЗ; дорослим призначати по 2,5-10мг через кожні 4 год. протягом перших 3-5 днів, дозу повільно титрувати до досягнення відповідного ефекту, далі застосовувати фіксовану дозу кожні 8-12 год. залежно від стану хворого та його відповіді на лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: запаморочення, відчуття порожнечі у голові, седативний ефект, посилене потовиділення, ортостатична гіпотензія, астенія, слабкість, припливи, розвиток толерантності, гіпотермія; аритмія, брадикардія, екстрасистолія, тахікардія, відчуття серцебиття, мерехтіння і тріпотіння шлуночків, фібриляція шлуночків, подовження інтервалу QT, аритмія типу *torsades de pointes* (особливо при прийомі високих доз метадону), кардіоміопатія, серцева недостатність, артеріальна гіпотензія, флебіт, синкопе, інверсія зубця Т; біль у животі, анорексія, спазми жовчних шляхів, жовчного міхура, дискінезія жовчних шляхів, запор, сухість у роті (ксеростомія), глосит; біль, збудженість, сплутаність свідомості, судомні напади, порушення орієнтації, дисфорія, ейфорія, безсоння, розлади зору, затуманення зору, сухість очей, вертиго, галюцинації, збудливість; в опіатних наркоманів із хронічним гепатитом описана тимчасова тромбоцитопенія; набряк легень, затримка рідини, набряк нижніх кінцівок, гіпокаліємія, гіпомагніємія, втрата або збільшення маси тіла; набряк легень, ускладнення перебігу бронхіальної астми; сухість у носі, пригнічення дихання (особливо при прийомі високих доз метадону); кропив'янка, висипання на шкірі, геморагічна кропив'янка; короста, свербіж, набряк; антидіуретичний ефект; дисменорея, аменорея; затримка сечі; проблеми, пов'язані з виділенням сечі; зниження лібідо і потенції, імпотенція, підвищення рівня пролактину при тривалому застосуванні, галакторея; с-м відміни: занепокоєння, підвищене слюзовиділення, ринорея, чхання, пітливість, відчуття холоду, тремор/тремтіння, «гусяча шкіра», позіханьня, міалгія, мідріаз, дратівливість, біль у всьому тілі, спині, суглобах, слабкість, шлункові коліки, порушення сну, безсоння, нудота, анорексія, блювання, діарея, підвищення артеріального тиску, підвищення частоти серцевих скорочень, зростання частоти дихання, підвищення температури тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до метадону гідрохлориду або до будь-якої з допоміжних речовин; наявність протипоказань щодо застосування опіоїдів: пригнічення дихання (при відсутності необхідного реанімаційного устаткування); період загоєння БА, накопичення в крові надлишку CO₂, обструктивні захворювання дихальних шляхів; наявність або підозра на кишкову непрохідність; виразковий коліт; діарея, асоційована з псевдомембранозним колітом, спричиненим цефалоспорином, лінкоміцином, кліндамицином, пеніцилінами; діарея, що розвинулася внаслідок отруєння (доки токсичні речовини не будуть виведені із травного тракту); внутрішньочерепна гіпертензія, ЧМТ; тяжка печінкова та ниркова недостатність, спазм жовчовивідних та сечовивідних шляхів, лікування наркоманів, залежних від слабких опіатів (петидин, кодеїн) та лікування пацієнтів, залежних від неопіоїдних ЛЗ; г. алкоголізм; одночасне застосування з інгібіторами моноаміноксидази (включаючи моклобемід) та протягом 2 тижнів після їх відміни.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МЕТАДОН-3Н	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	р-н орал. по 200мл, 1000мл у фл. з доз. пристр.	1мг/мл, 5мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МЕТАДОН-3Н	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	табл. у бл.	5мг, 10мг, 25мг, 40мг	№10x5, №10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МЕТАФІН® IC	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. у бл.	5мг, 10мг, 25мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	МЕТАДОНУ ГІДРОХЛОРИД МОЛТЕНІ	Л.Молтені і К. деї Ф.ллі Алітті Сосієта ді Езерчіціо С.п.А., Італія	р-н орал. у фл. по 5мл, 10мл, 20мл, 60мл, 100мл, 1000мл	1мг/мл, 5мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

5.7.5. Антидоти

- **Натрію тіосульфат (Sodium thiosulfate) ***

Фармакотерапевтична група: V03AB06 - антидоти.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить протитоксичну, протизапальну та десенсибілізуючу дію; є донатором іонів сірки; використовується як субстрат роданідною системою організму для синтезу нетоксичних тіосполук; є антидотом при отруєнні синільною к-тою та ціанідами, арсеном, свинцем, ртуттю, сполуками йоду і бромю; при отруєнні сполуками арсену, ртуті і свинцю утворює неотруйні сульфіти; при отруєнні ціанідами утворює менш отруйні роданідні сполуки.

Показання для застосування ЛЗ: отруєння сполуками арсену, ртуті, свинцю, синільною к-тою та її солями^{BOO3, БНФ}, йодом, бромом та їх солями.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при отруєннях сполуками арсену, ртуті, свинцю, йодом, бромом та їх солями: в/в болюсно по 1,5-3 г (5-10 мл 30 % розчину); при отруєннях синільною к-тою та її солями: в/в у дозі 15 г (50 мл 30 % розчину); призначати протягом усього токсикогенного періоду.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, запаморочення, порушення свідомості, дзвін у вухах, затуманення зору; анафілактичні р-ції, артралгія, гарячка; свербіж, висипання (у т. ч. макулопапульозні), кропив'янка, гіперемія, відчуття жару; зниження артеріального тиску аж до колапсу, тахікардія; задишка, утруднене дихання; нудота, блювання; р-ції у місці введення, загальна слабкість, посилення діурезу.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТ-БІОЛІК	АТ "БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк., по 5мл, 10мг в амп. у пач.	300 мг/мл	№5, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТ-БІОЛІК	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк., по 10мг в амп. у пач.	300 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТ-БІОЛІК	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк., по 5мл в амп. у пач.	300 мг/мл	№10	28,43	
	НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТ-БІОЛІК	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк., по 10мг в амп. у пач.	300 мг/мл	№10	31,86	
	НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	300 мг/мл	№5x2	63,53	

5.7.6. Агоністи нікотинних ацетилхолінових рецепторів (nAChR)

- **Нікотин (Nicotine) ****

Фармакотерапевтична група: N07BA01 - препарат для лікування нікотинової залежності..

Основна фармакотерапевтична дія: основний алкалоїд тютюнових продуктів;агоніст нікотинних рецепторів периферичної та ЦНС; чинить виражений вплив на ЦНС та СС систему; при споживанні у вигляді тютюнової продукції викликає звикання, а при припиненні його вживання спостерігаються потяг до паління та симптоми відміни; цей потяг та симптоми відміни включають потребу запалити, пригнічений настрій, безсоння, дратівливість, фрустрацію або гнів, тривожність, труднощі при концентрації, неспокій та підвищений апетит чи збільшення маси тіла.

Показання для застосування ЛЗ: лікування тютюнової залежності шляхом зменшення потреби в нікотині і послаблення симптомів відміни; полегшення процесу відмови від паління у разі наявності мотивації ^{БНФ} ; допомога курцям, які не можуть повністю відмовитись від нікотинової залежності, зменшити кількість випалених цигарок; льодян. бажано застосовувати у поєднанні з програмою психологічної підтримки.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: гумка жув...: гумку жув. 2 мг застосовувати як монотерапію або у комбінації із пластиром трансдерм.; гумка жув. 4 мг застосовується як монотерапія, не їсти або пити із гумкою жув. у роті, напої, що знижують рН ротової порожнини, можуть знижувати всмоктування нікотину у ротовій порожнині; для досягнення максимального всмоктування нікотину уникати споживання цих напоїв протягом 15 хв перед застосуванням гумки, для завзятих курців (тест на нікотинову залежність Fagerström ≥ 6 балів або тих, хто палить понад 20 цигарок на добу або випалює свою першу щоденну цигарку протягом 30 хв після пробудження) або пацієнтів, які не можуть відмовитися від паління за допомогою гумки жув. зі смаком свіжих фруктів 2 мг, рекомендується розпочинати з лікарської форми 4 мг, на початку лікування можна застосовувати по 1 подушечці кожні 2 год, зазвичай достатньо застосовувати 8-12 гумок жувальних на добу, не застосовувати більше 24 подушечок на добу (для дозування 4 мг) або більше 30 подушечок на добу (для дозування 2 мг); у разі повної відмови від паління застосовувати щонайменше протягом 3 міс., потім поступово знижувати кількість жувальної гумки, застосування ЛЗ припинити тоді, коли добове споживання гумки знизиться до 1-2 подушечок; льодяники: застосовувати щоразу, коли виникає бажання запалити; щодня вживати достатню кількість льодяників; більшість курців звичайно потребують 8-12 льодяників, але не перевищувати кількості 15 льодяників, тривалість лікування визначається індивідуально, але для зникнення звички до паління рекомендується лікування тривалістю 6 тижнів, після цього дозу нікотину поступово знижувати, загальну кількість вжитих за день льодяників, припинити, коли щоденне споживання зменшиться до 1-2 льодяників; вживати льодяники щоразу, коли є потреба запалити.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: порушення сну, включаючи незвичайні сновидіння, запаморочення, головний біль, відчуття печіння в місці нанесення, парестезії, оральна парестезія, оральна гіпестезія, припливи, гіпергідроз, втома, нездужання, порушення з боку очей, дисфонія, дисгезія, пальпітація, тахікардія, гіпертензія, задишки, припливи; оборотна фібриляція передсердь, біль у роті або горлі, подразнення горла, кашель, бронхоспазм, чхання, біль та дискомфорт у грудях, закладеність носа, задишка, дисфонія, відчуття стиснення у горлі, орофарингеальний біль, підвищення слиновиділення, явища дискомфорту, гикавка, нудота, блювання, печія, розлади травлення, біль у животі, відчуття сухості у роті, метеоризм, стоматит, диспепсія, діарея, дисфагія, відрижка, позиви до блювання, печіння, глосит, утворення пухирців і відлущування слизової оболонки ротової порожнини, оральна парестезія, оральна гіпестезія, позиви до блювання, відчуття сухості у горлі, дискомфорт у ШКТ, губний біль, нечіткість зору, підвищене слюзовиділення, еритема, кропив'янка, гіпергідроз, шкірний висип, свербіж, виразки на слизовій оболонці ротової порожнини і горла, біль у ділянці жувальних м'язів, втома; дискомфорт та біль у грудях, астения, нездужання; АР, у тому числі ангіоневротичний набряк, оральний біль, сухість у роті, стиснення горла, глосит, утворення пухирів на слизовій оболонці рота, стоматит, губний біль, анафілактичні реакції, реакції гіперчутливості, включаючи АР такі як висип та свербіж, біль у щелепі, напруження м'язів.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до нікотину або до інших компонентів ЛЗ; протипоказано застосування особам, які ніколи не палили, нещодавно перенесений ІМ (протягом останніх 3 міс.), нестабільна або прогресуюча стенокардія, стенокардія Принцметала, тяжкі аритмії серця, г. інсульт;

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	НИКОРЕТТЕ® ЗИМОВА М'ЯТА	МакНіл АБ, Швеція	гумка жув. лікув. у бл.	2мг, 4мг	№15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НИКОРЕТТЕ® ЗІ СМАКОМ СВІЖИХ ФРУКТІВ	МакНіл АБ, Швеція	гумка жув. лікув. у бл.	2мг, 4мг	№15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НИКОРЕТТЕ® ЗІ СМАКОМ СВІЖОЇ М'ЯТИ	МакНіл АБ, Швеція	гумка жув. лікув. у бл.	2мг, 4мг	№15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НИКОРЕТТЕ® КРИЖАНА М'ЯТА	МакНіл АБ, Швеція	льодян. прес. у фліп-уп.	2мг, 4мг	№20	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НИКОРЕТТЕ® СВІЖА М'ЯТА	МакНіл АБ, Швеція	спрей д/рот. порож. по 150доз у фл. та ПЕТ-фл.	13,6 мг/мл	№1, №2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

5.7.7. Парціальні агоністи нікотинних ацетилхолінових рецепторів (nAChR)

- **Цитизин (Cytisine) ****

Фармакотерапевтична група: N07BA04 - засоби, що застосовуються при нікотинній залежності.

Основна фармакотерапевтична дія: алкалоїд із рослини *Cytisus Laburnum*; має схожу з нікотином та лобеліном хімічну структуру; селективно та конкурентно зв'язується з рецепторами, має часткову агоністичну активність по відношенню до нікотинних ацетилхолінових рецепторів; високу афінність до підтипу $\alpha 4\beta 2$; запобігає зв'язуванню нікотину з $\alpha 4\beta 2$ -рецепторами і стимуляції центральної мезолімбічної дофамінової системи, пов'язаної з механізмами нікотинної залежності, завдяки здатності нікотину активувати ці рецептори.

Показання для застосування ЛЗ: при хр. нікотинізмі для відвикання від паління.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос, дорослим за схемою: по 1,5 мг (1 табл.) кожні 2 год., 9 мг - 6 табл./добу (1-3 день); поступово зменшувати кількість випалених сигарет; якщо результат незадовільний, лікування припиняється і може бути поновлене через 2-3 міс., при позитивному ефекті лікування продовжувати за схемою: по 1,5 мг (1 табл.) кожні 2,5 год., добова доза - 7,5 мг - 5 табл. (4-12 день); по 1,5 мг (1 табл.) кожні 3 год., добова доза - 6 мг - 4 табл. (13-16 день); по 1,5 мг (1 табл.) кожні 5 год., добова доза - 4,5 мг - 3 табл. (17-20 день); по 1,5 мг-3 мг (1-2 табл.) на добу (21-25 день).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: запаморочення, головний біль, безсоння; посилене потовиділення, зниження маси тіла; сонливість, підвищена дратівливість; тахікардія, пальпітації; підвищення АТ; диспное; зміна смакових відчуттів і апетиту, сухість у роті, біль у животі, нудота, запор, діарея, болі у верхній частині живота, диспесія, блювання; міалгії; біль у грудній клітці.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до цитизину або до будь-якої із допоміжних речовин, г. ІМ, нестабільна стенокардія, серцева аритмія, нещодавно перенесене церебро-васкулярне захворювання, атеросклероз; тяжка АГ; вагітність і годування груддю.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ТАБЕКС®	АТ "Софарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка або виробництво за повним циклом)/АТ "Вітаміни" (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії), Болгарія/Україна	табл., в/о у бл.	1,5мг	№20x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

6. НЕВРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

- 6.1. Лікарські засоби для лікування запальних хвороб центральної нервової системи**
 - 6.1.1. Антимікробні засоби**
- 6.2. Лікарські засоби для лікування епілепсії**
 - 6.2.1. Лікарські засоби для лікування епілептичного статусу**
 - 6.2.2. Лікарські засоби для лікування епілепсії**
 - 6.2.2.1. Барбітурати та їх похідні**
 - 6.2.2.2. Похідні гідантоїну**
 - 6.2.2.3. Похідні бензодіазепіну**
 - 6.2.2.4. Похідні карбоксаміду**
 - 6.2.2.5. Похідні жирних кислот**
 - 6.2.2.6. Інші лікарські засоби, що застосовуються у лікуванні епілепсії**
- 6.3. Лікарські засоби, що застосовуються у лікуванні паркінсонізму та інших екстрапірамідних і нейродегенеративних розладів**
 - 6.3.1. Дофамінергічні лікарські засоби**
 - 6.3.2. Агоністи допаміну**
 - 6.3.3. Антихолінергічні лікарські засоби**
 - 6.3.4. Лікарські засоби, що застосовуються при треморі, хореї, тиках та споріднених захворюваннях**
 - 6.3.5. Лікарські засоби, що застосовуються при боковому аміотрофічному склерозі**
- 6.4. Лікарські засоби для лікування больових синдромів та мігрені**
 - 6.4.1. Анальгетики**
 - 6.4.2. Нестероїдні протизапальні лікарські засоби**
 - 6.4.3. Інгібітори зворотнього захоплення серотоніну**
 - 6.4.4. Інші засоби для лікування гострої мігрені**
 - 6.4.4.1. Протиблювотні засоби**
 - 6.4.4.2. Антигістамінні засоби для системного застосування**
 - 6.4.4.3. Селективні агоністи серотоніну**
 - 6.4.5. Профілактика мігрені**
 - 6.4.6. Засоби для лікування нейропатичного болю.**
- 6.5. Лікарські засоби, які застосовуються для лікування розсіяного склерозу**
 - 6.5.1. Глюкокортикостероїди**
 - 6.5.2. Імуносупресори**
 - 6.5.3. Імуномодулюючі лікарські засоби**
 - 6.5.4. Міорелаксанти**
 - 6.5.5. Лікарські засоби, що застосовуються при вестибулярних порушеннях**
- 6.6. Засоби для лікування хвороб нервово-м'язового синапсу**
 - 6.6.1. Парасимпатоміметики**
 - 6.6.2. Неспецифічна терапія**
 - 6.6.2.1. Препарати калію**
 - 6.6.2.2. Антагоністи альдостерону**
 - 6.6.3. Імуномодулюючі лікарські засоби**
 - 6.6.3.1. Глюкокортикостероїди**
 - 6.6.3.2. Імуносупресори**
 - 6.6.4. Інші лікарські засоби, що застосовуються у лікуванні периферичної нервової системи**

6.6.4.1. Імуноглобулін людини нормальний

6.6.4.2. Кислота тіоктова

6.7. Лікарські засоби, що застосовуються при цереброваскулярних захворюваннях

6.7.1. Антитромботичні лікарські засоби

6.7.1.1. Інгібітори агрегації тромбоцитів

6.7.1.2. Фібринолітичні засоби

6.7.1.3. Група гепарину

6.7.1.3.1. Гепарини низької молекулярної маси

6.7.1.3.2. Непрямі антикоагулянти

6.7.2. Вазоактивні лікарські засоби

6.7.2.1. Периферичні вазодилататори

6.7.2.2. Розчини електролітів

6.7.3. Антигіпертензивні лікарські засоби

6.7.3.1. Інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту

6.7.3.2. Блокатори рецепторів ангіотензину II

6.7.3.3. Тіазидоподібні діуретики

6.7.3.4. Бета-адреноблокатори

6.7.3.5. Блокатори кальцієвих каналів

6.7.3.5.1. Селективні блокатори кальцієвих каналів

6.7.4. Гіполіпідемічні засоби

6.7.5. Ноотропні лікарські засоби, похідні ГАМК

6.1. Лікарські засоби для лікування запальних хвороб центральної нервової системи

6.1.1. Антимікробні засоби

(див. розділ 17 «ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ»)

6.2. Лікарські засоби для лікування епілепсії

6.2.1. Лікарські засоби для лікування епілептичного статусу

- **Діазепам (Diazepam)** * (див. п. 5.3.1. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЛІКУВАННІ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ")
- **Фенобарбітал (Phenobarbital)** * (див. п. 6.2.2.1. розділу "НЕВРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Пропофол (Propofol)** (див. п. 10.1.2.2. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Кислота вальпроєва (Valproic acid)** * [ПМД] (див. п. 6.2.2.5. розділу "НЕВРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

6.2.2. Лікарські засоби для лікування епілепсії

(див. розділ "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЛІКУВАННІ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ")

6.2.2.1. Барбітурати та їх похідні

- **Фенобарбітал (Phenobarbital)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: N03AA02 - протиепілептичні засоби. Барбітурати та їх похідні.

Основна фармакотерапевтична дія: похідне барбітурової к-ти; проявляє протисудомну дію, знижує збудження нейронів епілептичної локалізації, підвищує активність монооксигеназної ферментної системи, проявляє снодійний ефект, пригнічує активність рухових зон кори та підкірки головного мозку, підвищує вміст у ЦНС ендогенного гальмівного медіатора ГАМК, зменшує збудливу дію на ЦНС амінокислот (глутамату, аспартату).

Показання для застосування ЛЗ: епілепсія^{БНФ, ВООЗ}, хорея, спастичні паралічі, спазм периферичних артерій, еклампсія, гемолітична хвороба новонароджених.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймається перорально після їди; дози встановлюються залежно від стану пацієнта; **дорослі:** разові дози - від 50 до 200 мг, кратність прийому - 2 р/добу, з поступовим збільшенням дози; вища добова доза для дорослих - 500 мг; **діти:** до 6-ти місяців - разова доза 5 мг, добова доза 10 мг; від 6-ти місяців до 1-го року - разова доза 10 мг, добова доза 20 мг; 1-2 роки - разова доза 20 мг, добова доза 40 мг; 3-4 роки - разова доза 30 мг, добова доза 60 мг; 5-6 років - разова доза 40 мг, добова доза 80 мг; 7-9 років - разова доза 50 мг, добова доза 100 мг; 10-14 років - разова доза 75 мг, добова доза 150 мг; дітям до 3-х років необхідну кількість таблеток розтирають до порошкоподібного стану, розчиняють у невеликій кількості води та застосовують у вигляді суспензії; термін лікування залежить від перебігу захворювання.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості, включаючи ангіоневротичний набряк, шкірний висип (зокрема кропив'янка), свербіж; астенія, слабкість, атаксія, порушення координації рухів, гіперкінез (у дітей), ністагм, галюцинації, парадоксальне збудження, зниження концентрації уваги, підвищена втомлюваність, сповільненість р-цій, головний біль, когнітивні порушення, безсоння (переважно у дітей, людей

літнього віку), сонливість, запаморочення, сплутаність свідомості, депресія; нудота, блювання, запор, відчуття тяжкості в епігастральній ділянці, при тривалому застосуванні - порушення ф-ції печінки; тромбоцитопенія, агранулоцитоз, анемія, мегалобластна анемія; артеріальна гіпотензія, брадикардія; утруднене дихання; підвищена світлочутливість шкіри (фотосенсибілізація), поліморфна ексудативна еритема, с-м Стівенса – Джонсона, токсичний епідермальний некроліз (с-м Лаелла), ексфолиативний дерматит; при тривалому застосуванні існує ризик порушення остеогенезу та розвитку рахіту; були повідомлення про зниження мінеральної щільності кісткової тканини, остеопенію, остеопороз і переломи у пацієнтів, які отримували тривалу терапію фенобарбіталом; підвищення температури тіла, збільшення лімфатичних вузлів, лейкоцитоз, лімфоцитоз, лейкопенія, колапс; при тривалому застосуванні фенобарбіталу може розвинутися дефіцит фолатів, імпотенція, медикаментозна залежність, с-м відміни, який зазвичай може виникати при різкій відміні лікарського засобу та супроводжується кошмарними сновидіннями, нервозністю.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату; виражена артеріальна гіпотензія, гострий ІМ, тяжкі захворювання печінки, ураження нирок з порушенням їх ф-цій, ЦД, депресія, міастенія, порфірія; алкоголізм, медикаментозна та наркотична залежність (у тому числі в анамнезі); респіраторні захворювання із задишкою, обструктивним с-мом; період вагітності (І триместр) або годування груддю; категорично протипоказаний при депресивних розладах зі схильністю хворого до суїцидальної поведінки.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ФЕНОБАРБІТАЛ ІС	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. у бл.	5мг, 50мг, 100мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФЕНОБАРБІТАЛ-ЗН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	табл. у бл.	50мг, 100мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

6.2.2.2. Похідні гідантоїну

● Фенітоїн (Phenytoin) * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: N03AB02 - протисудомні засоби, похідні гідантоїну.

Основна фармакотерапевтична дія: основним місцем дії є моторна кора, де пригнічується судомна активність; здатний стабілізувати поріг збудливості, спричиненої надмірною стимуляцією або екологічними змінами, що здатні зменшити мембранний градієнт натрію (включає в себе зменшення посттетанічного потенціювання у синапсах, що запобігає поширенню епілептичного осередку на суміжні ділянки кори ГМ); знижує максимальну активність центрів мозкового ствола, відповідальних за тонічну фазу тоніко-клонічних судом (grand mal).

Показання для застосування ЛЗ: епілепсія, переважно великі судомні напади (grand mal); епілептичний статус з тоніко-клонічними судомами ^{вооз БНФ}; лікування і профілактика епілептичних нападів у нейрохірургії ^{БНФ}; у деяких випадках призначається для лікування порушень серцевого ритму, зумовлених органічними ураженнями ЦНС, передозуванням серцевих глікозидів; як ЛЗ другого ряду або в комбінації з карбамазепіном при невралгії трійчастого нерва.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо, під час або після їди (щоб уникнути подразнення слизової оболонки шлунка); **епілепсія** (парціальні і генералізовані тоніко-клонічні напади): разова доза для дорослих - 1/2-1 табл. (2-3 р/добу); для досягнення оптимального терапевтичного ефекту добову дозу можна доводити до 3-4 табл.; максимальна доза для дорослих: разова - 3 табл., МДД - 8 табл.; дітям віком від 5-ти до 8-ми років призначається по 1/2 табл. 2 р/добу, віком від 8-ми років - по 1/2-1 табл. 2 р/добу (із розрахунку 4-8 мг/кг/добу); **аритмії:** дорослим - по 1 табл. 4 р/добу (ефект виявляється на 3-5 добу), потім добову дозу зменшують до 3-х табл.; для швидкого досягнення терапевтичної концентрації (на 1-2 добу) - по 2 табл. 4 рази в першу добу, по 1 табл. 5 разів - на 2-3 добу і по 1 табл. 2-3 рази на добу - з 4-ї доби лікування; **невралгія трійчастого нерва:** по 1-3 табл. на добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: з боку нервової системи: запаморочення, мінуща знервованість, тремор, парестезії, атаксія, ністагм, порушення координації рухів, сплутаність свідомості, безсоння, сонливість, головний біль, дизартрія; моторні посмикування, тремтіння, сенсорна периферична полінейропатія у пацієнтів, які отримують довгострокову терапію фенітоїном; у поодиноких випадках - периферична невротія, дискінезія (включаючи хорею, дистонію); з боку ШКТ: нудота, блювання, токсичний гепатит, гіперплазія ясен, запор, ураження печінки; з боку системи кровотворення: рідко - тромбоцитопенія, лейкопенія, гранулоцитопенія, агранулоцитоз, панцитопенія (з/без пригнічення кісткового мозку), мегалобластна анемія, макроцитоз; можливий зв'язок між застосуванням лікарського засобу та розвитком лімфаденопатії, що включає доброякісну гіперплазію лімфатичних вузлів, псевдолімфому, лімфому і хворобу Ходжкіна; з боку кістково-м'язової системи: укрупнення рис обличчя, потовщення губ; при тривалому застосуванні - зниження мінеральної щільності кісткової тканини (остеопенія, остеопороз, остеомалія), переломи кісток; **алергічні реакції:** шкірний висип, гарячка; у поодиноких випадках - бульозний, пурпурний або ексфолиативний дерматит, системний червоний вовчак, синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз; DRESS-синдром, анафілаксія; дерматологічні прояви іноді супроводжуються скарлатиноподібними або кореподібними висипаннями; з боку імунної системи: у поодиноких випадках можливий розвиток синдрому гіперчутливості (може включати такі симптоми як еозинофілія, гарячка, дисфункція печінки, лімфаденопатія або висип), вузликовий періартеріїт, зміну рівнів імуноглобулінів; з боку печінки та гепатоцелюлярної системи: г. печінкова недостатність; інші: у поодиноких випадках - гіпертрихоз, хвороба Пейроні; зміна смакових відчуттів, включаючи

металічний присмак у роті; при виражених побічних явищах дозу поступово знижують або зовсім припиняють застосування ЛЗ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до фенітоїну або до інших компонентів ЛЗ, а також до гідантоїнових протисудомних засобів; серцева недостатність, синдром Адамса-Стокса, АВ-блокада II-III ступеня, синоатріальна блокада, синусова брадикардія; печінкова або ниркова недостатність, кахексія, порфірія; з *обережністю*: дітям з проявом рахіту, пацієнтам літнього віку, при ЦД, при хр. захворюваннях печінки і нирок, хр. алкоголізмі; одночасне застосування з делавірдином протипоказане через потенційну можливість втрати вірусологічної відповіді та можливого антагонізму делавірдину або нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДИФЕНІН®	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл. в пач.	117мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДИФЕНІН®	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл. в пач.	117мг	№10x6	3,25	
	ДИФЕНІН®	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	117мг	№10	4,07	

6.2.2.3. Похідні бензодіазепіну

- **Клоназепам (Clonazepam)** ^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: N03AE01 - протиепілептичні засоби; похідні бензодіазепіну.

Основна фармакотерапевтична дія: належить до групи похідних бензодіазепіну; механізм дії тісно пов'язаний із гальмівним ендogenousним нейромедіатором, гамма-аміномасляною кислотою (ГАМК) і рецептором, через який вона реалізує більшість ефектів у нервовій системі, так званий ГАМК-А; посилює гальмівний вплив ГАМК-ергічних нейронів кори головного мозку, гіпокампа, мозочка, стовбура та інших структур ЦНС; має сильну і тривалу протисудомну, анксиолітичну, заспокійливу, седативну та помірну снодійну і міорелаксантну дію; має позитивний ефект на генералізовану та фокальну форми епілепсії.

Показання для застосування ЛЗ: епілепсія у дітей ^{БНФ} грудного, дошкільного та шкільного віку (в основному типові та атипівні напади малої епілепсії та первинні або вторинні генералізовані тоніко-клонічні кризи ^{БНФ}); епілепсія у дорослих ^{БНФ} (в основному фокальні напади); с-м пароксизмального страху, стан страху при фобіях, напр., при агорафобії (не призначати дітям); стани психомоторного збудження на фоні реактивних психозів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовується р/ос, не розжовуючи та запиваючи невеликою кількістю рідини; дітям віком до 3 років необхідну кількість таблеток розтирати до порошокподібного стану, розчиняти у невеликій кількості води та застосовувати у вигляді суспензії; лікування розпочинати з низьких доз, збільшуючи їх поступово до одержання терапевтичного ефекту; епілепсія ^{БНФ}: дорослі - початкова доза 1 мг/добу ^{БНФ} розподіляється на 3 прийоми, дозу поступово збільшують на 0,5-1 мг кожні 3 дні до отримання оптимального ефекту; підтримуюча доза встановлюється індивідуально (зазвичай 4-8 мг/добу в 3-4 прийоми) та досягається протягом 2-4 тижнів ^{БНФ}; МДД - 20 мг; немовлята та діти віком 1-5 років - початкова доза 0,25 мг/добу ^{БНФ}; від 6 років - 0,5 мг/добу ^{БНФ}; дозу можна поступово підвищувати на 0,5 мг кожні 3 дні до одержання задовільного терапевтичного ефекту; підтримуюча доза для немовлят віком до 1 року - 0,5-1 мг/добу ^{БНФ}; для дітей 1-5 років - 1-3 мг/добу ^{БНФ}; для дітей 6-12 років - 3-6 мг/добу ^{БНФ}; МДД для дітей - 0,2 мг/кг маси тіла; пацієнтам літнього віку розпочинати з добової дози, що не перевищує 0,5 мг з досягненням підтримуючої дози на 2-4 тижні лікування; с-м пароксизмального страху: початкова доза для дорослих - 0,5 мг/добу (розділяють на 2 прийоми); середня добова доза становить 1 мг/добу, МДД - 4 мг, для зменшення сонливості протягом дня препарат можна приймати одноразово у добовій дозі перед сном.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: *психіатричні розлади та парадоксальні реакції*: антероградна амнезія (ризик зростає при підвищених дозах), амнестичні ефекти можуть бути пов'язані з неадекватною поведінкою, депресія (може спричинитися як лікуванням, так і бути ознакою основної хвороби), втрата лібідо, імпотенція; фізична і психологічна залежність; парадоксальні ефекти (агресивність, збудливість, нервозність, ворожість, тривожність, порушення сну, нічні кошмари, яскраві сни, дратівливість, ажитація, психічні розлади та поява нових типів нападів); з *боку нервової системи*: запаморочення, відчуття порожнечі або «легкості в голові», сонливість, підвищена втомлюваність, порушення координації рухів, м'язовий гіпотонус, м'язова слабкість, зниження концентрації уваги, порушення пам'яті, ослаблення здатності засвоювати інформацію, занепокоєння, головний біль, сплутаність свідомості і дезорієнтація; емоційна лабільність; дизартрія, атаксія, ністагм, судоми у хворих на порфірію; з *боку органів зору*: диплопія, ністагм; з *боку СС системи*: серцева недостатність, включаючи зупинку серця; з *боку системи крові та лімфатичної системи*: поодинокі випадки патологічних змін крові; з *боку дихальної системи, органів середостіння та грудної клітки*: у немовлят та маленьких дітей, особливо із психічними розладами, може виникати підвищене продукування слини або бронхіального секрету з слинотечею; симптоми катарального запалення ВДШ; з *боку травного тракту*: посилення секреції слини, зниження апетиту, біль у животі, запори, нудота, блювання, гастроінтестинальні симптоми; з *боку гепатобілярної системи*: аномальні значення функціональних тестів печінки; з *боку шкіри та підшкірної клітковини*: кропив'янка, свербіж, тимчасове випадання волосся, зміни пігментації шкіри; з *боку*

кістково-м'язової системи та сполучної тканини: м'язова слабкість, епізодична м'язова гіпотонія; м'язовий біль; з боку сечостатевої системи: нетримання сечі; часте сечовипускання, порушення менструального циклу, еректильна дисфункція, втрата лібідо; з боку ендокринної системи: оборотний розвиток передчасної появи вторинних статевих ознак у дітей (неповна рання статева зрілість); з боку імунної системи: АР, анафілаксія, ангіоневротичний набряк; загальні порушення; підвищений ризик падінь та переломів у пацієнтів літнього віку; тромбоцитопенія, дискразії крові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до бенздіазепінів або будь-яких інших компонентів ЛЗ; порушення дихання центрального походження та тяжкі стани дихальної недостатності незалежно від причини; синдром нічного апное, закритокутова глаукома, порушення свідомості, міастенія, тяжка печінкова або ниркова недостатність, зловживання алкоголем, медикаментозна або наркотична залежність.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КЛОНАЗЕПАМ ІС	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. у бл.	0,5мг; 1мг; 2мг	№10х3, №10х5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

6.2.2.4. Похідні карбоксаміду

- **Карбамазепін (Carbamazepine) ***

Фармакотерапевтична група: N03AF01 - протиепілептичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: точний механізм дії карбамазепіну невідомий; стабілізує мембрани надто збуджених нервових волокон, інгібує виникнення повторних нейрональних розрядів і знижує синаптичне проведення збуджувальних імпульсів, чим зменшує поширення судомних нападів; запобігає повторному утворенню натрійзалежних потенціалів дії у деполяризованих нейронах шляхом блокади натрієвих каналів; знижує вивільнення глутамату і стабілізує мембрани нейронів; імовірно пригнічує метаболізм допаміну і норадреналіну; при нецукровому діабеті чинить антидіуретичну дію, імовірно, зумовлену впливом на осморорецептори гіпоталамуса. Ефективний при парціальних нападах (простих і комплексних) із вторинною генералізацією та без неї; при генералізованих тоніко-клонічних судомних нападах, а також при комбінації вказаних типів нападів; при деяких неврологічних захворюваннях (больові напади при ідіопатичній і вторинній невралгії трійчастого нерва; нейрогенний біль при різних умовах у тому числі при спинній сухотці, посттравматичних парестезіях і постгерпетичній невралгії; підвищує поріг судомної готовності при синдромі алкогольної абстиненції і зменшує вираженість клінічних проявів синдрому, таких як збудливість, тремор, порушення ходи); при афективних порушеннях (г. маніакальні стани, біполярні маніакально-депресивні розлади). При епілепсії позитивно впливає на симптоми тривожності і депресії, а також знижує роздратованість та агресію. Позитивно впливає на показники, що характеризують увагу, здатність до навчання і запам'ятовування. При нецукровому діабеті центрального генезу зменшує діурез і відчуття спраги.

Показання для застосування ЛЗ: Епілепсія [складні або прості парціальні судомні напади ^{БНФ ВООЗ} (із втратою або без втрати свідомості) із вторинною генералізацією або без неї; генералізовані тоніко-клонічні судомні напади ^{БНФ ВООЗ}; змішані форми судомних нападів]. Як і у вигляді монотерапії, так і в складі комбінованої терапії. Г. маніакальні стани; підтримуюча терапія при біполярних афективних розладах ^{ВООЗ} з метою профілактики загострень ^{БНФ} або для ослаблення клінічних проявів загострення. С-м алкогольної абстиненції ^{БНФ}. Ідіопатична невралгія трійчастого нерва ^{БНФ ВООЗ} і невралгія трійчастого нерва при розсіяному склерозі (типова та атипова). Ідіопатична невралгія язикоглоткового нерва. Додатково для **табл. пролонгованорі дії:** діабетична нейропатія ^{БНФ} з больовим с-мом; нецукровий діабет центрального генезу; поліурія і полідипсія нейрогормональної природи.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування розпочинати з низьких доз, які слід добирати індивідуально залежно від клінічного стану пацієнта; пізніше дозу поступово підвищувати до моменту досягнення оптимальної підтримувальної дози. Добову дозу розподіляти на 2-3 прийоми; можна приймати під час, після їди або у проміжках між прийомами їжі разом з невеликою кількістю рідини. Перед початком лікування пацієнти, які потенційно є носіями HLA-A*3101 алелі за походженням, у разі можливості повинні пройти обстеження на наявність алелі; для осіб певних етнічних груп (китайці, тайці) перед початком лікування бажано проводити скринінг на HLA-B*1502. Табл. пролонгованої дії можна ділити навіпіл та/або розчиняти у воді. Суспензію перед застосуванням збовтувати; прийом починати із низьких доз та поступово збільшувати їх. При заміні табл. форми на суспензію застосовувати ту ж саму дозу, але її потрібно розділити на менші разові дози та відповідно збільшити кількість прийомів. У випадку зміни лікарської форми негайного вивільнення на табл. пролонгованої дії слід переконатися у тому, що у плазмі крові досягається відповідна концентрація карбамазепіну. МДД у виняткових випадках (для табл. пролонгованої дії) - 1600 мг/добу. За жодних обставин пацієнт не може самовільно припиняти лікування. Епілепсія. Для підбору оптимальної дози може виявитися корисним визначення рівня карбамазепіну у плазмі крові (терапевтичні рівні у діапазоні 4-12 мкг/мл, що відповідає 17-50 мкмоль/л). Рекомендована початкова доза 100-200 мг 1-2 р/добу; добова доза 800-1200 мг в 2-3 прийоми. Початкова доза для дітей - 100 мг/добу; дозу підвищувати поступово на 100 мг/тиждень; звичайна доза - 10-20 мг/кг/добу в кілька прийомів (діти до 1-го року - 100-200 мг/добу; діти 1-5 років - 200-400 мг/добу; діти 6-10 років - 400-600 мг/добу в 2-3 прийоми; діти 11-15 років - 600-1000 мг/добу в 3 прийоми; дітям від 15-ти років - дозування як у дорослих); МДД для дітей до 6-ти років - 35 мг/кг/добу, для дітей 6-15 років - 1000 мг/добу, для дітей від 15-ти років - 1200 мг/добу. Лікування припиняти поступово впродовж 1-2 років. Г. маніакальні стани та підтримуюча терапія при біполярних афективних розладах. Добова доза - 400-1600 мг (звичай 400-600 мг/добу) в 2-3 прийоми. При г. маніакальному стані рекомендується достатньо швидко підвищення дози, тоді як з метою забезпечення оптимальної толерантності у рамках підтримуючої терапії при біполярних розладах рекомендоване поступове підвищення малими дозами. Профілактика маніакально-депресивних психозів у пацієнтів, які не мають терапевтичної відповіді на лікування літєм. Початкова доза - 400 мг/добу в декілька прийомів; дозу слід повільно підвищувати

до такої, що дає змогу контролювати симптоми захворювання, або до досягнення дози 1600 мг/добу; зазвичай доза - 400-600 мг/добу в декілька прийомів. Синдром алкогольної абстиненції. Добова доза 600-800 мг (у тяжких випадках протягом перших кількох днів дозу можна підвищити до 1200 мг/добу з подальшим зменшенням) в 3-4 прийоми. Слід регулярно визначати концентрацію карбамазепіну в крові. Необхідне особливо ретельне медичне спостереження, оскільки може виникнути небажана реакція з боку центральної та периферичної нервової системи. Лікування повинно бути завершено з 7-го по 10-й день лікування, шляхом поступового зниження дози ЛЗ. При тяжких проявах лікування слід розпочинати комбінацією карбамазепіну із седативно-снодійними засобами. Ідіопатична невралгія трійчастого нерва і невралгія трійчастого нерва при розсіяному склерозі (типова та атипова). Ідіопатична невралгія язикоглоткового нерва. Початкова доза - 200-400 мг/добу (для пацієнтів літнього віку або для особливо чутливих пацієнтів - 200 мг/добу), яку повільно підвищують до зникнення больових відчуттів (зазвичай до дози 600-800 мг/добу в 3-4 прийоми). МДД - 1200 мг. Після зникнення больових відчуттів дозу поступово знижують до мінімальної підтримуючої. Нецукровий діабет центрального ґенезу. Поліурія і полідипсія нейрогормональної природи. Добова доза 600-900 мг; для дітей дозу зменшують відповідно до віку і маси тіла.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: AV-блокада; абдомінальний біль; АГ; агранулоцитоз; агресивність; аденопатія; ажитація; акне; активація психозу; алергічний дерматит; алопеція; анафілактична реакція; ангіоневротичний набряк; анемія; аномальні мимовільні рухи (наприклад тремор, «пурхаючий» тремор, дистонія, астеріксис, тик); аплазія кісткового мозку; апластична анемія; аритмія; артеріальна гіпотензія; артралгія; асептичний менінгіт; атаксія; блювання; брадикардія; брак мотивації; в'ялість; варієгатна порфірія; васкуліт; висип; вовчакоподібний с-м; втома; втрата апетиту; вугри; вузликова еритема; гінгівіт; галакторея; галюцинації (зорові або слухові); гарячка; гемолітична анемія; гепатит холестатичного, паренхіматозного (гепатоцелюлярного) або змішаного типів; гепатоспленомегалія; гінекомастія; гіперакузія; гіпергідратація; гіпоакузія; гіпогаммаглобулінемія; гіпокальціємія; гіпонатріємія; гірсутизм; глосит; головний біль; гострий генералізований екзантематозний пустульоз (AGEP); гранулематозний гепатит; дезорієнтація; депресія; дефіцит фолієвої кислоти; диплопія; дисгевзія; діарея; ексфолювативний дерматит; енцефалопатія (с-м порушення секреції антидіуретичного гормону, SIADH); еозинфілія; еректильна дисфункція; еритродермія; еритроцитарна аплазія; жовтяниця; загальна слабкість; загострення генералізованого червоного вовчака; загострення ІХС; загострення коронарної недостатності; занепокоєність; запаморочення; запор; застійна СН; затримка рідини, сечі; збільшення внутрішньоочного тиску, маси тіла; злоякісний нейролептичний с-м (NMS); зміна показників функції щитоподібної залози [зниження рівня L-тироксину (FT4, T4, T3) і підвищення рівня тиреостимулюючого гормону]; зміни настрою; зниження апетиту, мінеральної щільності кісткової тканини, осмолярності плазми крові, рівнів вітаміну В12, кальцію, 25-гідроксихолекальциферолу, статевого потягу; зорові порушення; імпотенція; інтерстиціальний нефрит; коліт; кон'юнктивіт; кропив'янка; лейкопенія; лейкоцитоз; летаргія; лімфаденопатія; ліхеноїдний кератоз; м'язова слабкість; міалгія; мегалобластна анемія; медикаментозне висипання з еозинфілією та системними симптомами (DRESS); міоклонія; мультиорганна гіперчутливість уповільненого типу; мультиформна еритема; набряк; неврологічні розлади; недостатність кісткового мозку; недостатність фолатів; нервово збудження; нерозбірливе мовлення; неспокій; ниркова недостатність; ністагм; нудота; ознаки, що нагадують лімфому; озноб; оніхомадез; орофациальна дискінезія; остеомалія; остеопенія; остеопороз; панкреатит; панципопенія; параліч; парез; парестезія; переломи; периферична еозинфілія; периферична нейропатія; печінкова недостатність; підвищена пітливість; підвищення рівнів гомоцистеїну, гамма-глутамілтрансферази, лужної фосфатази, пролактину, трансаміназ, холестерину (включаючи холестерин ЛПВЩ та тригліцеридів); підвищення частоти епілептичних нападів; погіршення перебігу ІХС; погане самопочуття; погіршення пам'яті, сприйняття; помутніння кришталіка; порушення акомодатії (наприклад затуманення зору), внутрішньосерцевої провідності, здатності до запліднення у чоловіків, кісткового метаболізму (зниження кальцію та 25-гідроксихолекальциферолу у плазмі крові), мислення, мовлення (наприклад дизартрія або нерозбірливе мовлення), пігментації шкіри, руху очей, смаку, сперматогенезу, сприйняття висоти звуку, функції нирок (наприклад альбумінурія, протеїнурія, гематурія, олігурія, дизурія, підвищення рівня сечовини в крові/азотемія), чоловічої фертильності, зору; порфірія г. (г. інтермітуюча порфірія та змішана порфірія) та негостра (пізня порфірія шкіри); посилене випадання волосся; пригнічення діяльності кісткового мозку; псевдолімфома; пурпура; різні форми гепатиту (холестатичний, гепатоцелюлярний, змішаний); реактивація вірусу герпесу людини VI типу; реакції гіперчутливості з боку легенів, що характеризуються гарячкою, задишкою, пневмонітом або пневмонією; ретикулоцитоз; ретинотоксичність; розлади слуху (наприклад дзвін у вухах, підвищення слухової чутливості, зниження слухової чутливості, порушення сприйняття висоти звуку); свербіж; седативний ефект; сексуальна дисфункція; симптоми церебральної артеріальної недостатності; с-м зникнення жовчних проток; с-м Стівенса-Джонсона; синкопе; системний червоний вовчак; сонливість; спазми м'язів; сплутаність свідомості; статева дисфункція; стоматит; судоми; суїцидальна поведінка або думки; сухість у роті; тинітус; токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайелла); тромбоемболія; тромбофлебіт; тромбоцитопенія; тубулоінтерстиціальний нефрит; фіброз легень; фобії; фоточутливість; хореоатетоз; циркуляторний колапс; часте сечовипускання; шкірні AP; шум у вухах.

Противпоказання до застосування ЛЗ: встановлена гіперчутливість до карбамазепіну та окскарбазепіну або до подібних у хімічному відношенні ЛЗ (таких як трициклічні антидепресанти), або до будь-якого іншого компонента ЛЗ; AV блокада; пригніченням кісткового мозку в анамнезі; печінкова порфірія (наприклад, г. інтермітуюча порфірія, змішана порфірія, пізня порфірія шкіри) в анамнезі; комбінація з інгібіторами MAO. Додатково для **табл. пролонгованої дії:** г. печінкова недостатність; одночасне застосування з вориконазолом, оскільки лікування може бути неефективним.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1 г.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.

I.	КАРБАМАЗЕПІН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. у конт.	200мг	№50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАРБАМАЗЕПІН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. у бл.	200мг	№10x5	4,93	
	КАРБАМАЗЕПІН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. у бл.	200мг	№10x2	6,55	
	КАРБАМАЗЕПІН-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	200мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАРБАМАЗЕПІН-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	200мг	№10x2	7,50	
	КАРБАМАЗЕПІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	200мг	№10x5	4,64	
	КАРБАМАЗЕПІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	200мг	№10x2	5,67	
	КАРБАМАЗЕПІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл. у бл.	200мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАРБАМАЗЕПІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл. у бл.	200мг	№20x1	7,25	
	КАРБАМАЗЕПІН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	400мг	№10x5	6,43	
	КАРБАМАЗЕПІН-ФС	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	200мг	№10x1, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАРБАМАЗЕПІН-ФС	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	200мг	№10x5	5,26	
	КАРБАМАЗЕПІН-ФС	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	200мг	№10x2	6,11	
	МЕЗАКАР®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД/ТОВ "КУСУМ ФАРМ" (альтернативний виробник, що здійснює вторинне пакування, контроль якості та випуск серії), Індія/Україна	табл. у бл.	200мг	№10x5	4,83	24,25/\$
МЕЗАКАР®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	сусп. орал., по 100мл у фл. з мірн. стак.	100мг/5мл	№1	37,73		
МЕЗАКАР® SR	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД/ТОВ "КУСУМ ФАРМ" (альтернативний виробник, що здійснює вторинне пакування, контроль якості та випуск серії), Індія/Україна	табл. прол. дії у бл.	400мг	№10x5	8,50	24,25/\$	
II.	ЗЕПТОЛ	Сан Фармасьютикал	табл. у стрип.	200мг	№10x10	7,51	28,07/\$

	Індастріз Лтд, Індія						
КАРБАЛЕКС 300 мг РЕТАРД	Г.Л. Фарма ГмБХ, Австрія	табл. прол. дії у бл.	300мг	№10x10	10,97		
КАРБАЛЕКС 600 МГ РЕТАРД	Г.Л. Фарма ГмБХ, Австрія	табл. прол. дії у бл.	600мг	№10x10	9,17		
ТЕГРЕТОЛ®	Новартіс Фарма С.п.А., Італія	табл. у бл.	200мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ФІНЛЕПСИН®	ТОВ Тева Оперейшнз Поланд, Польща	табл. у бл.	200мг	№10x5	42,38	24,82/\$	
ФІНЛЕПСИН® 200 РЕТАРД	ТОВ Тева Оперейшенз Поланд, Польща	табл. прол. дії у бл.	200мг	№10x10, №10x20	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ФІНЛЕПСИН® 200 РЕТАРД	ТОВ Тева Оперейшенз Поланд, Польща	табл. прол. дії у бл.	200мг	№10x5	51,36	27,12/\$	
ФІНЛЕПСИН® 400 РЕТАРД	ТОВ Тева Оперейшенз Поланд, Польща	табл. прол. дії у бл.	400мг	№10x10, №10x20	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ФІНЛЕПСИН® 400 РЕТАРД	ТОВ Тева Оперейшенз Поланд, Польща	табл. прол. дії у бл.	400мг	№10x5	31,51	27,12/\$	

6.2.2.5. Похідні жирних кислот

- **Кислота вальпроєва (Valproic acid)** * [ГМД]

Фармакотерапевтична група: N03AG01 - протиепілептичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: має протисудомні властивості щодо різних форм епілепсії у людей. Виявлено два механізми антиконвульсивної дії: (1) прямий фармакологічний ефект, що залежить від концентрації вальпроату у плазмі крові та тканинах ГМ; (2) непрямий - можливо, пов'язаний із метаболітами вальпроату, які залишаються в ГМ, або з модифікаціями нейромедіаторів, або з прямою дією на мембрану. Найімовірнішою є гіпотеза, що після введення вальпроату підвищується рівень гама-аміномасляної кислоти (ГАМК). Вальпроат скорочує тривалість проміжної фази сну та одночасно подовжує фазу повільного сну.

Показання для застосування ЛЗ: сироп: *дорослі та діти* - у вигляді монотерапії або в комбінації з іншими протиепілептичними препаратами для (1) генералізованої епілепсії^{ВООЗ, БНФ} при таких типах нападів: клонічні, тонічні, тоніко-клонічні, абсанси, міоклонічні, атонічні та с-м Леннокса-Гасто; (2) лікування фокальної епілепсії^{ВООЗ, БНФ}:

фокальні напади із вторинною генералізацією або без неї; *дити* - профілактика повторних нападів після одного або більше нападів, ускладнених фебрильних судом, коли переривчаста профілактика бензодіазепінами неефективна. **таблетки кишковорозчинні:** як монотерапія: (1) лікування первинної генералізованої епілепсії^{ВООЗ, БНФ}; клоніко-тонічних нападів з міоклонічними судомами або без них, абсансів, міоклонічних нападів, комбінованих тоніко-клонічних нападів та абсансів; (2) доброякісної парціальної епілепсії^{ВООЗ, БНФ}, зокрема роландичної епілепсії. Як монотерапія або у комбінації з іншими протиепілептичними препаратами: (1) вторинній генералізованій епілепсії^{ВООЗ, БНФ}; (2) простих або складних парціальних епілептичних нападах^{ВООЗ, БНФ}.

Якщо монотерапія не є достатньо ефективною, показане комбіноване застосування препарату з іншим протисудомним препаратом. **таблетки пролонгованої дії:** основним показанням до застосування препарату, бажано як монотерапії, є первинна генералізована епілепсія: малі епілептичні напади/абсансна епілепсія, масивні білатеральні міоклонічні судоми, великі напади епілепсії з міоклонією або без неї, фотосенситивні форми епілепсії; як монотерапія або в комбінації з іншими протиепілептичними засобами при: (1) вторинній генералізованій епілепсії, особливо синдромі Веста (судоми у дітей раннього віку) та с-мі Леннокса-Гасто; (2) парціальній епілепсії з простою або комплексною симптоматикою (психосенсорні форми, психомоторні форми); (3) епілепсії із вторинною генералізацією (для таблеток по 300 мг); (4) змішані форми епілепсії (генералізовані та парціальні). Лікування епізодів манії, асоційованих з біполярними афективними розладами, при наявності протипоказань до застосування або непереносимості літїю (для таблеток по 300 мг). Профілактика рецидивів дистимічних епізодів у дорослих пацієнтів з біполярними розладами, у яких при лікуванні епізодів манії є терапевтична відповідь на терапію вальпроатом. **ліофілізат для розчину для ін'єкцій:** для тимчасового лікування епілепсії у дорослих і дітей як заміна p/os застосування у разі тимчасової неможливості приймати лікарський засіб p/os.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: сироп: приймати бажано під час їди, розділивши добову дозу на 2 (для дітей віком до 1-го року) або 3 (для дітей віком від 1-го року) прийоми. Середня добова доза становить: для дітей до 12 років - 30 мг/кг; для дітей віком від 12 років та дорослих - 20-30 мг/кг. Дітям до 3-х років рекомендується застосовувати препарат винятково у вигляді монотерапії, якщо очікувана користь переважає ризики. **таблетки кишковорозчинні:** бажано приймати під час їди, табл. ковтати цілими. Рекомендована середня добова доза 20-30 мг/кг для дітей та дорослих; добові дози понад 35 мг/кг д/дітей та 30 мг/кг д/дорослих дуже рідко є необхідними при монотерапії ЛЗ. Монотерапію першої лінії розпочинати поступово: початкова добова доза 10 мг/кг з подальшим підвищенням на 5 мг/кг кожні 2-3 дні, щоб досягти оптимальної дози впродовж приблизно 1 тижня. Комбінація з іншими протиепілептичними ЛЗ. Дозу титрують поступово, впродовж приблизно 2-х тижнів до досягнення оптимальної дози, яка, як правило, є аналогічною дозу, що застосовується при монотерапії, або може бути дещо вищою; слід застосовувати початкову дозу 10 мг/кг, яку поступово збільшувати на 5 мг/кг кожні 2-3 дні. При додаванні до комбінованого лікування з іншими протиепілептичними ЛЗ їх дози зменшити принаймні на чверть з двох причин: внаслідок індукції ферментів ці ЛЗ збільшують швидкість метаболізму, а, отже, і кліренс вальпроєвої кислоти, а також через те, що вальпроєва кислота уповільнює метаболізм інших протиепілептичних засобів. Заміна інших протиепілептичних засобів вальпроатом натрію або заміна вальпроату натрію іншими протиепілептичними ЛЗ. Якщо планується замінити протиепілептичний ЛЗ, що застосовувався раніше, на вальпроат, то попередній засіб слід відмінити поступово; заміна повинна здійснюватися впродовж 2-4 тижнів, але

тривалість періоду, коли йде заміна, збільшується у випадку, якщо пацієнт вже давно хворіє на епілепсію, епілептичні напади належним чином не контролюються або попередня терапія проводилася впродовж тривалого періоду часу чи схема лікування включала фенобарбітал, примідон та/або фенітоїн. Початкова доза вальпроату натрію становить 5 мг/кг з подальшим підвищенням на 5 мг/кг кожні 4-5 днів, щоб досягти оптимальної дози впродовж приблизно 2-3 тижнів. Якщо здійснювати заміну вальпроату натрію іншим протиепілептичним засобом, то перехід слід здійснювати шляхом поступового зменшення дози одного ЛЗ та поступового збільшення дози іншого. Добові дози зменшувати поступово на 5-10 мг/кг/на добу кожні 2-3 дні. Добову дозу препарату розподіляти на 3-4 прийоми. Пацієнтам із добре контрольованою епілепсією можна приймати ЛЗ одноразово у добовій дозі 20-30 мг/кг. Якщо лікування ЛЗ необхідно тимчасово призупинити, добову дозу слід знижувати поступово на 5-10 мг/кг/на добу кожні 2-3 дні. **таблетки пролонгованої дії:** приймати на початку прийому їжі, запиваючи половиною склянки води, молока або іншого безалкогольного напою; добову дозу розділяти на 2 прийоми. Епілепсія. монотерапія першої лінії: добову дозу можна застосовувати за один прийом.; добові дози: д/дітей - 25мг/кг; д/підлітків - 20-25 мг/кг; д/дорослих - 20 мг/кг; для осіб літнього віку - 15-20 мг/кг. Лікування розпочинати поступово. Початкова добова доза становить 10-15 мг/кг, поступово підвищувати з інтервалом 2-3 дні, досягаючи рекомендованої добової дози приблизно ч/тиждень. При задовільній клінічній ефективності на цьому етапі слід дотримуватися цієї дози. При монотерапії, буває необхідним застосування добових доз, вищих за 25 мг/кг, д/осіб літнього віку, 30 мг/кг д/дорослих або підлітків чи 25 мг/кг д/дітей;можна продовжувати підвищувати дози, якщо не має терапевтичного ефекту. Добову дозу, яка перевищує 50 мг/кг, розділяти на 3 прийоми, при цьому необхідні додаткові клінічне спостереження і контроль показників біохімічного аналізу крові. У комбінації з іншими протиепілептичними ЛЗ. Розпочинати застосування вальпроату натрію, як і при монотерапії першої лінії. Середня добова доза ідентична дозі, рекомендованій для монотерапії; у деяких випадках ця доза може бути збільшена на 5-10 мг/кг. Заміна іншого протиепілептичного ЛЗ. Якщо планується поступово і повністю замінити попередній ЛЗ на вальпроат, його слід застосовувати згідно з рекомендаціями для монотерапії першої лінії. Дозу певних попередніх ЛЗ, особливо барбітуратів, одразу зменшити, після чого поступово знижувати їхню дозу до повної відміни. Відміна має тривати 2-8 тижнів. Епізоди манії у пацієнтів з біполярними розладами: рекомендована початкова доза 20 мг/кг/добу. Цю дозу збільшувати для досягнення бажаного клінічного ефекту, який досягається при концентрації вальпроату у плазмі крові від 45 до 125 мкг/мл. Рекомендована підтримуюча доза при лікуванні біполярного розладу 1000-2000 мг/добу. Слід коригувати дозу відповідно до індивідуальної клінічної відповіді. Ефективність і безпека препарату для дітей і підлітків не досліджувалися. Профілактика рецидивів епізодів манії, якими супроводжуються біполярні розлади. Доза для профілактики рецидивів відповідає найменшій ефективній дозі, яка дозволяє належним чином контролювати симптоми гострої манії у даного пацієнта. Не слід перевищувати МДД 3000 мг. Діти жіночої статі, підлітки жіночої статі, жінки репродуктивного віку та вагітні жінки. Лікування ЛЗ проводити під наглядом спеціаліста, який має досвід лікування епілепсії та призначати тільки в тому випадку, коли інші види терапії є неефективними або не переносяться пацієнтами; користь та ризик застосування ЛЗ необхідно ретельно переглядати при регулярному оцінюванні лікування. Як правило, препарат 300 мг призначають як монотерапію в найнижчій дозі, при якій спостерігається ефект лікування, та, якщо можливо, у вигляді лікарського ф-ми з пролонгованим вивільненням для уникнення високих пікових концентрацій в плазмі крові. **ліофілізат для розчину для ін'єкцій:** у разі неможливості прийому ЛЗ p/os через 4-6 год. після останнього прийому таблетованої ф-ми рекомендоване в/в введення натрію вальпроату: або у вигляді безперервної інфузії добової дози протягом 24 год., або розділивши добову дозу на 4 інфузії, тривалістю одна година кожна (доза становить 20-30 мг/кг/добу). При необхідності швидкого досягнення і підтримання ефективної концентрації у плазмі: в/в ін'єкція протягом 5 хв у дозі 15 мг/кг болюсно; потім - постійна інфузія зі швидкістю 1 мг/кг/год з поступовим коригуванням швидкості введення для забезпечення рівня вальпроату в крові приблизно 75 мг/л. Після чого швидкість введення змінюють залежно від клінічного перебігу. Після закінчення інфузії відновлення лікування p/os формою компенсує кількість виведеного засобу. При цьому або використовується призначене раніше дозування, або спочатку вводиться відкоригована доза.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: вроджені вади розвитку та порушення розвитку нервової системи; анемія, тромбоцитопенія, панцитопенія, лейкопенія, аплазія кісткового мозку або еритроцитарна аплазія, агранулоцитоз, макроцитарна анемія, макроцитоз; зниження рівня факторів коагуляції, патологічні результати тестів на коагуляцію, дефіцит біотину/ дефіцит біотинідази; тремор, екстрапірамідні розлади, ступор, сонливість, судоми, погіршення пам'яті, головний біль, ністагм, нудота, запаморочення, кома, енцефалопатія, летаргія, оборотний с-м паркінсонізму, атаксія, парестезія, оборотна деменція з атрофією ГМ, когнітивні розлади; глухота; плевральний випіт; нудота, блювання, захворювання ясен, стоматит, біль у епігастральній ділянці, діарея, панкреатит; порушення ф-ції нирок (для парентеральної форми), ниркова недостатність, енурез, нетримання сечі, тубулоінтерстиційний нефрит, оборотний с-м Фанконі (для парентеральної форми); транзиторна та/або дозозалежна алопеція, ураження нігтів та нігтьового ложа, гіперчутливість (для парентеральної форми), ангіоневротичний набряк, висипання, порушення росту волосся, місцевий некроз тканин (для парентеральної форми), токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона, мультиморфна еритема, с-м гіперчутливості до препарату або DRESS-синдром; с-м неадекватної секреції антидіуретичного гормону, гіперандрогенія, гіпотиреоз, гінекомастія (для парентеральної форми); збільшення маси тіла, гіпонатріємія, гіперамоніємія, ожиріння; мієлодиспластичний с-м; кровотеча, васкуліт (для парентеральної форми); нетяжкі периферичні набряки, гіпотермія; ураження печінки, підвищення рівня печінкових ферментів (для парентеральної форми); дисменорея, аменорея, вплив на сперматогенез, полікістозні яєчники; зниження мінеральної щільності кісткової тканини, остеопенія, остеопороз, переломи, системний червоний вовчак, рабдоміоліз; сплутаність свідомості, галюцинації агресія, збудження, порушення уваги, аномальна поведінка, психомоторна гіперактивність, труднощі з навчанням, підвищена настороженість (для парентеральної форми).

Протипоказання до застосування ЛЗ: вагітність, за винятком випадків коли інші методи лікування є неефективними; жінки репродуктивного віку, для яких не виконані умови Програми запобігання вагітності; гіперчутливість до вальпроату, дивальпроату, вальпроміду або до будь-якого з компонентів ЛЗ в анамнезі; г. або хр. гепатит; тяжкий гепатит в індивідуальному або сімейному анамнезі пацієнта; печінкова порфірія; комбінація з мефлохіном і препаратами звіробію; відомі мітохондріальні розлади, спричинені мутаціями в ядерному гені, що кодує мітохондріальний фермент полімеразау гамма; діти віком до 2-х років, у яких підозрюється наявність

розладу, пов'язаного з полімеразою гамма; порушення орнітинового циклу в анамнезі; недостатність ферментів циклу сечовини; непереносимість фруктози, с-м мальабсорбції глюкози та галактози, дефіцит сахарозо-ізомальтази - через наявність у складі препарату сахарози та сорбітолу (для сиропу).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1,5 г., парентерально - 1,5 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ВАЛЬПРОКОМ 300 ХРОНО	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о прол. дії у бл.	300мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ВАЛЬПРОКОМ 300 ХРОНО	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о прол. дії у бл.	300мг	№10x3	15,90	
	ВАЛЬПРОКОМ 300 ХРОНО	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о прол. дії у бл.	300мг	№10x10	16,33	
	ВАЛЬПРОКОМ 500 ХРОНО	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о прол. дії у бл.	500мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ВАЛЬПРОКОМ 500 ХРОНО	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о прол. дії у бл.	500мг	№10x3	21,16	
II.	ДЕПАКІН ХРОНО® 300 МГ	Санофі Вінтроп Індастрія, Франція	табл., в/о прол. дії в конт. у кор.	300мг	№50x2	40,98	27,79/\$
	ДЕПАКІН ХРОНО® 500 МГ	Санофі Вінтроп Індастрія, Франція	табл., в/о прол. дії в конт.	500мг	№30	34,52	24,87/\$
	ДЕПАКІН®	Юнітер Ліквід Мануфекчурінг, Франція	сироп по 150мл у фл. з доз. пристр.	57,64 мг/мл	№1	16,93	26,82/\$
	ДЕПАКІН® ЕНТЕРІК 300	Санофі Вінтроп Індастрія/САНОФІ-АВЕНТІС С.А., Франція/Іспанія	табл., в/о к/р у бл.	300мг	№10x10	20,18	26,79/\$
	ЕНКОРАТ ХРОНО	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд., Індія	табл., в/о прол. дії у стрип.	200мг	№10x3	19,12	23,97/\$
	ЕНКОРАТ ХРОНО	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд., Індія	табл., в/о прол. дії у стрип.	300мг, 500мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕНКОРАТ ХРОНО	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд., Індія	табл., в/о прол. дії у стрип.	300мг	№10x3	18,66	23,97/\$
	ЕНКОРАТ ХРОНО	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд., Індія	табл., в/о прол. дії у стрип.	500мг	№10x3	14,98	23,97/\$
	КОНВУЛЕКС	Г.Л. Фарма ГмБХ (виробництво, пакування, контроль якості; виробник, що відповідає за випуск серії), Австрія	р-н д/ін'ек. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	100 мг/мл	№5	660,60	
	КОНВУЛЕКС	Г.Л. Фарма ГмБХ, Австрія	сироп по 100мл у фл. зі шпр.-доз.	50 мг/мл	№1	36,57	
	КОНВУЛЕКС 300 МГ РЕТАРД	Г.Л. Фарма ГмБХ (виробництво, маркування, пакування, контроль якості; виробник, відповідальний за випуск серії), Австрія	табл., вкриті п/о прол. дії у конт.	300мг	№50	24,01	
	КОНВУЛЕКС 500 МГ РЕТАРД	Г.Л. Фарма ГмБХ (виробництво, маркування, пакування, контроль якості; виробник, відповідальний за випуск серії), Австрія	табл., вкриті п/о прол. дії у конт.	500мг	№50	23,85	
	ТЕРАВАС	Д-р Редді'с Лабораторіс Лімітед, Індія	табл. прол. дії у конт.	250мг, 500мг	№100	відсутня у реєстрі ОВЦ	

6.2.2.6. Інші лікарські засоби, що застосовуються у лікуванні епілепсії

- **Ламотриджин (Lamotrigine)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: N03AX09 - протиепілептичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: протисудомний препарат; блокує потенціалзалежні натрієві канали пресинаптичних мембран нейронів у фазі повільної інактивації та пригнічує надлишкове вивільнення глутамату (амінокислоти, яка відіграє значну роль у розвитку епілептичного нападу).

Показання для застосування ЛЗ: Епілепсія. Дорослі та діти віком від 12-ти років. Додаткова терапія або монотерапія парціальних та генералізованих нападів епілепсії, включаючи тоніко-клонічні напади; напади, пов'язані із с-м Леннокса-Гасто. ^{БНФ} Діти віком від 2-х до 12-ти років. Додаткова терапія парціальних та генералізованих нападів епілепсії, включаючи тоніко-клонічні напади та напади, асоційовані із синдромом Леннокса-Гасто. ^{БНФ} Монотерапія типових абсансів. ^{БНФ} Біполярний розлад. ^{БНФ} Дорослі (віком від 18-ти років). Запобігання депресивним станам у хворих із біполярним розладом I типу, які переважно страждають на депресивні стани.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл., слід ковтати цілими, не розжовуючи та не розламуючи; табл., що диспергуються, можна розжовувати, розчиняти у невеликій к-ті води або ковтати цілими, запиваючи невеликою кількістю води. Якщо розрахункова доза не є кратною цілим таблеткам, доза, що вводиться, повинна відповідати найближчій меншій кількості цілих таблеток. Для забезпечення підтримання терапевтичної дози необхідно контролювати масу тіла дитини та змінювати дозу в разі зміни маси тіла. **Повторний початок лікування:** лікарям слід оцінити необхідність збільшення дози до підтримуючої при поновленні прийому для пацієнтів, які з будь-якої причини припинили прийом ламотриджину. Чим більший проміжок часу після прийому попередньої дози, тим більше уваги слід приділяти збільшенню дози до підтримуючої. Якщо інтервал від моменту припинення прийому ламотриджину перевищує 5 періодів напіввиведення, слід підвищити дозу до підтримуючої за існуючою схемою. Не рекомендується поновлення прийому ЛЗ для пацієнтів, які припинили прийом ч/з висип, пов'язаний з попередньою терапією ламотриджином, за винятком випадків, коли потенційна користь від лікування явно переважає ризик. Епілепсія (2-12 років): монотерапія типових абсансів: 1-2 тижні - 0,3 мг/кг/добу (1 або 2 прийоми н/добу) ^{БНФ}; 3-4 тижні - 0,6 мг/кг/добу (1 або 2 прийоми н/добу) ^{БНФ}; звичайна підтримуюча доза - 1-15 мг/кг/добу (1 або 2 прийоми н/добу); для досягнення підтримуючої дози її слід збільшувати максимум на 0,6 мг/кг/добу кожні 1 або 2 тижні до досягнення оптимальної відповіді ^{БНФ}, максимальна підтримуюча доза - 200 мг/добу). Додаткова терапія із застосуванням вальпроату: 1-2 тижні - 0,15 мг/кг/добу (1 прийом на добу) ^{БНФ}; 3-4 тижні - 0,3 мг/кг/добу (1 прийом н/добу) ^{БНФ}; звичайна підтримуюча доза - 1-5 мг/кг/добу (1 або 2 прийоми н/добу); для досягнення підтримуючої дози її слід збільшувати максимум на 0,3 мг/кг/добу кожні 1 або 2 тижні до досягнення оптимальної відповіді, максимальна підтримуюча доза - 200 мг/добу) ^{БНФ}. Додаткова терапія без застосування вальпроату та із застосуванням індукторів глюкуронізації ламотриджину: 1-2 тижні - 0,6 мг/кг/добу (2 прийоми) ^{БНФ}; 3-4 тижні - 1,2 мг/кг/добу (2 прийоми) ^{БНФ}; звичайна підтримуюча доза - 5-15 мг/кг/добу (1 або 2 прийоми); для досягнення підтримуючої дози її слід збільшувати максимум на 1,2 мг/кг/добу кожні 1 або 2 тижні, максимальна підтримуюча доза - 400 мг/добу) ^{БНФ}. Додаткова терапія без застосування вальпроату та індукторів глюкуронізації ламотриджину: 1-2 тижні - 0,3 мг/кг/добу (один або два прийоми) ^{БНФ}; 3-4 тижні - 0,6 мг/кг/добу (1 або 2 прийоми) ^{БНФ}; звичайна підтримуюча доза - 1-10 мг/кг/добу (1 або 2 прийоми); для досягнення підтримуючої дози її слід збільшувати максимум на 0,6 мг/кг/добу кожні 1 або 2 тижні до досягнення оптимальної відповіді, максимальна підтримуюча доза - 200 мг/добу) ^{БНФ}. Пацієнтам, які приймають ЛЗ з невідомим впливом на фармакокінетику ламотриджину, слід застосовувати схему лікування, яка рекомендується для одночасного застосування ламотриджину та вальпроату. Епілепсія (дорослі та діти від 13-ти років): Монотерапія: 1-2 тижні - 25 мг/добу (один прийом) ^{БНФ}; 3-4 тижні - 50 мг/добу (1 прийом) ^{БНФ}; звичайна підтримуюча доза - 100-200 мг/добу (1 або 2 прийоми) ^{БНФ}; для досягнення підтримуючої дози її слід збільшувати максимум на 50-100 мг кожні 1 або 2 тижні до досягнення оптимальної відповіді ^{БНФ}; деяким пацієнтам була потрібна доза 500 мг/добу для досягнення бажаної відповіді). Додаткова терапія із застосуванням вальпроату: 1-2 тижні - 12,5 мг/добу (приймати по 25 мг ч/з день) ^{БНФ}; 3-4 тижні - 25 мг/добу (1 прийом) ^{БНФ}; звичайна підтримуюча доза - 100-200 мг/добу (1 або 2 прийоми); для досягнення підтримуючої дози її слід збільшувати максимум на 25-50 мг кожні 1 або 2 тижні до досягнення оптимальної відповіді) ^{БНФ}. Додаткова терапія без застосування вальпроату та із застосуванням індукторів глюкуронізації ламотриджину: 1-2 тижні - 50 мг/добу (1 прийом) ^{БНФ}; 3-4 тижні - 100 мг/добу (2 прийоми) ^{БНФ}; звичайна підтримуюча доза - 200-400 мг/добу (2 прийоми); для досягнення підтримуючої дози її слід збільшувати максимум на 100 мг кожні 1 або 2 тижні до досягнення оптимальної відповіді; деяким пацієнтам була потрібна доза 700 мг/добу для досягнення бажаної відповіді) ^{БНФ}. Додаткова терапія без застосування вальпроату та індукторів глюкуронізації ламотриджину: 1-2 тижні - 25 мг/добу (1 прийом) ^{БНФ}; 3-4 тижні - 50 мг/добу (1 прийом) ^{БНФ}; звичайна підтримуюча доза - 100-200 мг/добу (1 або 2 прийоми) ^{БНФ}; для досягнення підтримуючої дози її слід збільшувати максимум на 50-100 мг кожні 1 або 2 тижні). Пацієнтам, які приймають ЛЗ з невідомим впливом на фармакокінетику ламотриджину, застосовувати схему лікування для одночасного застосування ламотриджину та вальпроату. Ч/з ризик розвитку висипу не слід перевищувати початкову дозу та темп подальшого її збільшення. Біполярний розлад. Рекомендована схема збільшення дози до досягнення підтримуючої стабілізаційної добової дози при лікуванні біполярних розладів (віком від 18-ти років): монотерапія або додаткова терапія без застосування вальпроату та індукторів глюкуронізації ламотриджину: 1-2 тижні - 25 мг/добу (один прийом) ^{БНФ}; 3-4 тижні - 50 мг/добу (1 або 2 прийоми) ^{БНФ}; 5-й тиждень - 100 мг/добу (1 або 2 прийоми) ^{БНФ}; цільова стабілізаційна доза (6-й тиждень) - 200 мг/добу - звичайна цільова доза для отримання оптимальної відповіді (1 або 2 прийоми) ^{БНФ}. Додаткова терапія із застосуванням вальпроату: 1-2 тижні - 12,5 мг/добу (по 25 мг через день) ^{БНФ}; 3-4 тижні - 25 мг/добу (1 прийом) ^{БНФ}; 5-й тиждень - 50 мг/добу (1 або 2 прийоми) ^{БНФ}; цільова стабілізаційна доза (6-й тиждень) - 100 мг/добу - звичайна цільова доза для отримання оптимальної відповіді ^{БНФ} (1 або 2 прийоми) ^{БНФ}; можна застосовувати максимальну дозу 200 мг/добу залежно від клінічної відповіді ^{БНФ}). Додаткова терапія без застосування вальпроату та із застосуванням індукторів глюкуронізації ламотриджину: 1-2 тижні - 50 мг/добу (один прийом) ^{БНФ}; 3-4 тижні - 100 мг/добу (два прийоми) ^{БНФ}; 5-й тиждень - 200 мг/добу (2 прийоми); цільова стабілізаційна доза (6-й тиждень) - 300 мг/добу, у разі необхідності звичайна цільова доза 400 мг/добу збільшується на 7-му тижні для досягнення оптимальної відповіді (два прийоми). Пацієнтам, які приймають ЛЗ з невідомим впливом на фармакокінетику ламотриджину, слід застосовувати схему збільшення дози, яка рекомендується для одночасного застосування ламотриджину з вальпроатом.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: шкірні висипання, с-м Стівенса - Джонсона, токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайєлла), с-му гіперчутливості; гематологічні відхилення (нейтропенію, лейкопенію, анемію, тромбоцитопенію, панцитопенію, апластичну анемію та агранулоцитоз), лімфаденопатія; с-м гіперчутливості: (гарячка, лімфоденопатія, набряк обличчя, зміни крові та порушення ф-ції печінки, дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові та поліорганна недостатність); агресивність, дратівливість, тик, галюцинації та сплутаність свідомості; головний біль, збільшення частоти нападів, сонливість, безсоння, запаморочення, тремор, атаксія, ністагм; диплопія, завіса перед очима, кон'юнктивіт; нудота, блювання та діарея; підвищення показників функціональних печінкових тестів, порушення ф-ції печінки, печінкова недостатність; вовчакоподібні р-ції; стомлюваність; сухість у роті; біль, біль у спині; алопеція; нічні кошмари; асептичний менінгіт; тривожне збудження, порушення рівноваги, рухові розлади, загострення хвороби Паркінсона, екстрапірамідні ефекти, хореоатетоз.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до ламотриджину або іншого компонента препарату.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕПІЛЕПТАЛ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	25мг	№10x3	19,60	
	ЕПІЛЕПТАЛ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	50мг	№10x3	18,20	
	ЕПІЛЕПТАЛ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	100мг	№10x3	15,30	
	ЛАМОТРИН 100	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., що дисперг. у бл.	100мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛАМОТРИН 100	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., що дисперг. у бл.	100мг	№10x6	17,74	
	ЛАМОТРИН 100	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., що дисперг. у бл.	100мг	№10x3	18,32	
	ЛАМОТРИН 25	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	25мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛАМОТРИН 25	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	25мг	№10x6	22,11	
	ЛАМОТРИН 25	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	25мг	№10x3	23,87	
	ЛАМОТРИН 50	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	50мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛАМОТРИН 50	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	50мг	№10x6	20,29	
	ЛАМОТРИН 50	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	50мг	№10x3	23,12	
II.	ЛАМІКТАЛ™	ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А., Польща	табл., що дисперг. у фл.	5мг, 25мг	№30, №14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛАМІКТАЛ™	ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А., Польща	табл., що дисперг. у бл.	5мг	№14x2	109,07	27,22/\$
	ЛАМІКТАЛ™	ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А., Польща	табл., що дисперг. у бл.	50мг	№14x2	42,31	28,17/\$
	ЛАМІКТАЛ™	ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А., Польща	табл., що дисперг. у бл.	100мг	№14x2	35,52	26,61/\$
	ЛАМІКТАЛ™	ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А., Польща	табл. у бл.	25мг	№10x3	55,56	26,61/\$
	ЛАМІКТАЛ™	ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А., Польща	табл. у бл.	50мг	№10x3	52,97	27,22/\$
	ЛАМІКТАЛ™	ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А., Польща	табл. у бл.	100мг	№10x3	42,60	27,22/\$
	ЛАМІТОР	ТОРПЕНТ	табл. у бл.	25мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛТД., Індія						
ЛАМІТОР	ТОРРЕНТ ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛТД., Індія	табл. у бл.	50мг	№10x3	26,00	23,60/\$	
ЛАМІТОР	ТОРРЕНТ ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛТД., Індія	табл. у бл.	100мг	№10x3	20,80	23,60/\$	
ЛАМІТРИЛ	Фармасайнс Інк., Канада	табл. у фл.	25мг	№30	69,44	27,60/\$	
ЛАМІТРИЛ	Фармасайнс Інк., Канада	табл. у фл.	100мг	№60	31,05	27,60/\$	
ЛАМІТРИЛ	Фармасайнс Інк., Канада	табл. у фл.	150мг	№60	23,00	27,60/\$	
ЛамотриДекс	Дексель Лтд., Ізраїль	табл., що дисперг. у бл.	25мг	№10x3	30,19	26,22/\$	
ЛамотриДекс	Дексель Лтд., Ізраїль	табл., що дисперг. у бл.	50мг	№10x3	27,02	26,22/\$	
ЛамотриДекс	Дексель Лтд., Ізраїль	табл., що дисперг. у бл.	200мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЛамотриДекс	Дексель Лтд., Ізраїль	табл., що дисперг. у бл.	100мг	№10x3	22,79	26,22/\$	
ЛАМОТРИН®	Спесіфар С.А., Греція	табл. що дисперг. у бл.	25мг	№10x3	25,13	29,42/€	
ЛАМОТРИН®	Спесіфар С.А., Греція	табл. що дисперг. у бл.	50мг	№10x3	24,12	29,43/€	
ЛАМОТРИН®	Спесіфар С.А., Греція	табл. що дисперг. у бл.	100мг	№10x3	20,11	29,43/€	
ЛАНІСТОР	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл. у бл.	25мг, 50мг, 100мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЛАНІСТОР	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл. у бл.	25мг	№10x6	16,10	24,25/\$	
ЛАНІСТОР	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл. у бл.	50мг	№10x6	15,55	24,25/\$	
ЛАНІСТОР	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл. у бл.	100мг	№10x6	12,82	24,25/\$	
ЛАНРОЗ	Д-р Редді'с Лаботоріс Лімітед, Індія	табл. прол. дії у конт.	25мг, 50мг, 100мг, 200мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЛАТРИГІЛ	СТАДА Арцнайміттель АГ (випуск серій, контр./випроб. серій)/ СТАДА В'єтнам Джоїнт Венчур Ко. Лтд (вир-во нерозфас. продукту, перв. та втор. пак., контр./ випроб. серій)/ "Хемофарм" АД, Вршац, відділ виробнича дільниця Шаба, Німеччина/В'єтнам/Сербія	табл., що дисперг. у бл.	25мг, 50мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЛАТРИГІЛ	СТАДА Арцнайміттель АГ (випуск серій, контр./випроб. серій)/ СТАДА В'єтнам Джоїнт Венчур Ко. Лтд (вир-во нерозфас. продукту, перв. та втор. пак., контр./ випроб. серій)/ "Хемофарм" АД, Вршац, відділ виробнича	табл., що дисперг. у бл.	100мг	№10x3	36,21	31,74/€	

	дільниця Шаба, Німеччина/В'єтнам/Сербія					
--	--	--	--	--	--	--

• **Топірамат (Topiramate)**^(ПМД)

Фармакотерапевтична група: N03AX11 - протиепілептичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: належить до класу сульфатзаміщених моносахаридів; блокує натрієві канали і пригнічує виникнення повторних потенціалів дії на фоні тривалої деполяризації мембрани нейрона; підвищує частоту активації ГАБА_A-рецепторів g-амінобутиратом (ГАБА), а також збільшує здатність ГАБА індукувати потік іонів хлору в нейрони, що свідчить про властивість топірамату посилювати активність цього інгібіторного нейротрансмітера; не збільшує тривалості часу, коли іонні канали є відкритими, що відрізняє топірамат від барбітуратів, які модулюють ГАБА_A-рецептори; моделює бензодіазепін-нечутливий підтип ГАБА_A-рецепторів внаслідок суттєвих відмінностей у протиепілептичних властивостях топірамату і бензодіазепінів; перешкоджає здатності кайнату активувати підтип кайнат/АМПК (α-аміно-3-гідрокси-5-метилізоксазол-4-пропіонова кислота) глутаматних рецепторів, але не має явного впливу на активність N-метил-D-аспартату (NMDA) серед підтипу NMDA-рецепторів; ефекти топірамату є залежними від к-ції у плазмі крові в межах від 1 мкмоль до 200 мкмоль, з мінімальною активністю у межах від 1 мкмоль до 10 мкмоль; пригнічує активність деяких ізоферментів карбоангідрази.

Показання для застосування ЛЗ: як монотерапія для лікування дорослих та дітей віком від 6 років з парціальними нападами з або без вторинно генералізованих нападів та первинно генералізованих тоніко-клонічних нападів^{БНФ}; як додаткова терапія для лікування дорослих та дітей віком від 2-х років з парціальними нападами з або без вторинно генералізованих нападів або первинно генералізованих тоніко-клонічних нападів та лікування нападів, асоційованих із с-мом Леннокса-Гасто^{БНФ}; для профілактики нападів мігрені у дорослих^{БНФ}, після ретельної оцінки можливостей альтернативного лікування; не рекомендований для лікування г. станів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування розпочинати з низької дози; дозу та рівень її підвищення слід підбирати залежно від клінічної відповіді. Капсули можна ковтати цілими або обережно відкрити капсулу і висипати її вміст на невелику кількість (чайна ложка) м'якої їжі; ЛЗ/суміш слід негайно проковтнути не пережовуючи; не слід зберігати суміш вмісту капсули з їжею для подальшого застосування. Контроль концентрації топірамату у плазмі крові не є необхідним для оптимізації лікування. Препарат можна приймати незалежно від вживання їжі. Відміну ЛЗ слід здійснювати поступово за 2-8 тижн. з метою мінімізації можливості виникнення нападів або збільшення їх частоти. Монотерапія епілепсії. При відміні супутніх протиепілептичних препаратів з метою монотерапії топіраматом необхідно враховувати можливий вплив цього кроку на частоту нападів; рекомендується поступове зниження його дози на 1/3 кожні 2 тижні. При відміні препаратів, що є індукторами печінкових ферментів, концентрації топірамату в крові будуть зростати. У таких ситуаціях при наявності клінічних показань дозу ЛЗ можна знизити. Дорослі. Дозу слід титрувати в залежності від клінічної відповіді. Лікування розпочинати з прийому 25 мг на ніч протягом 1 тижня з подальшим збільшенням з тижневим або двотижневим інтервалом на 25 або 50 мг на добу (добову дозу застосовують у 2 прийоми)^{БНФ}. Рекомендований рівень початкової цільової дози у дорослих - 100-200 мг/добу, розподілених на 2 прийоми^{БНФ}. Максимальна рекомендована доза - 500 мг/добу^{БНФ}, розподілена на 2 прийоми. Діти (віком від 6 років). Дозу слід титрувати в залежності від клінічної відповіді. Лікування розпочинати з прийому 0,5-1 мг/кг на ніч протягом 1 тижня^{БНФ} з подальшим збільшенням з тижневим або двотижневим інтервалом на 0,5-1 мг/кг на добу (у 2 прийоми). Якщо дитина не переносить такий режим титрування дози, можна збільшити інтервали між підвищеннями дози або застосувати менш значне збільшення дози. Рекомендований рівень початкової цільової дози становить 100 мг/добу залежно від клінічної відповіді (це близько 2 мг/кг/добу для дітей віком 6-16 років). Додаткова терапія епілепсії (парціальні напади з наявністю або відсутністю вторинної генералізації, первинні генералізовані тоніко-клонічні напади чи напади, асоційовані з синдромом Леннокса-Гасто). Дорослі. Лікування розпочинати з прийому 25-50 мг на ніч протягом 1 тижня^{БНФ}. У подальшому дозу збільшують з тижневим або двотижневим інтервалом на 25-50 мг/добу у 2 прийоми^{БНФ}. Звичайна добова доза становить 200-400 мг/добу у 2 прийоми^{БНФ}. Діти (віком від 2 років). Рекомендована загальна добова доза становить близько 5-9 мг/кг/добу у 2 прийоми. Лікування слід розпочинати з прийому 25 мг (або менше, з розрахунку 1-3 мг/кг/добу) на ніч протягом 1 тижня з подальшим збільшенням з тижневим або двотижневим інтервалом на 1-3 мг/кг/добу у 2 прийоми до досягнення терапевтичного ефекту. Мігрень. Дорослі. Рекомендована загальна добова доза для профілактики нападів мігрені становить 100 мг у 2 прийоми^{БНФ}. Лікування слід розпочинати з прийому 25 мг ввечері протягом 1 тижня з подальшим збільшенням на 25 мг/добу з інтервалом 1 тиждень після кожного підвищення дози^{БНФ}. Якщо пацієнт не переносить такий режим титрування дози, можна збільшити інтервали між підвищеннями дози.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: агезія, агресія, акінезія, алергічний дерматит, алергічний набряк, алопеція, амбліопія, амнезія, ангідроз, анемія, аномальний результат тесту «тандем-хода», анорексія, аносмія, апатія, апраксія, артеріальна гіпотензія, артралгія, астенія, аура, афазія, афективна лабільність, байдужість, безсоння, біль при пальпації живота, біль у боці, біль у вухах, біль у животі, біль у порожнині рота, блефароспазм, блювання, брадикардія, брадифренія, великий епілептичний напад, вертиго, висипання, відволікання, відсутність реакції на подразники, відчуття «повзання мурашок», відчуття відчаю, відчуття дискомфорту в епігастрії, відчуття дискомфорту у вухах, відчуття дискомфорту у кінцівках, відчуття дискомфорту у шлунку, відчуття печіння, відчуття сп'яніння, відчуття спраги, відчуття тривожності, втрата лібідо, галюцинації, гастрит, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, гематурія, генералізований свербіж, гепатит, гіперемія, гіперестезія, гіперсекреція слини, гіперсомнія, гіпертермія, гіперхлоремічний ацидоз, гіперчутливість, гіпестезія, гіпестезія обличчя, гіпестезія слизової оболонки порожнини рота, гіпогевзія, гіпокаліємія, гіпокінезія, гіпоманія, гіпосмія, глаукома, глосодія, глухота, гостра міопія, грипоподібний стан, дезорієнтація, депресивний настрій, депресія, дефект поля зору, дизартрія, дизгевзія, дизграфія, дизестезія, дизурія, диплопія, дискінезія, дискомфорт у животі, диспенсія, диспное, диспное при фізичному навантаженні, дистонія, дисфазія, дисфемія, дисфонія, діарея, ейфорічний настрій, еозинофілія, епістаксис, ерекційна дисфункція, еритема, есенціальний тремор, закладеність носа, закріп, закритокутова глаукома, запаморочення, запах з рота, збільшення маси тіла, збільшення рівня печінкових ферментів, здуття живота, злість, зменшення маси тіла, змінене візуальне

сприйняття глибини, знебарвлення шкіри, знижена кількість лейкоцитів, зниження апетиту, зниження гостроти зору, зниження лібідо, зниження рівня бікарбонатів у крові, зорові галюцинації, інконтиненція, інтенційний тремор, інтрасомнічний розлад, кальциноз, камені в сечовивідних шляхах, кашель, когнітивні розлади, комплексні парціальні напади, конвульсії, короточасна сліпота, кровоточивість ясен, кропив'янка, лейкопенія, летаргія, лімфаденопатія, локалізована кропив'янка, м'язова втомлюваність, м'язова слабкість, м'язові посмикування, м'язові спазми, м'язово-скелетна скутість, м'язово-скелетний біль у грудній клітці, макулопатія, макулярні висипання, манія, мерехтлива скотома, метаболічний ацидоз, метеоризм, міалгія, мідріаз, млявість, мозочковий синдром, мультиформна еритема, набряк кон'юнктиви, набряк обличчя, набряк обличчя, набряк повік, набряк суглобів, назофарингіт, наявність кристалів у сечі, незвична поведінка, незвичне мислення, незвичний запах шкіри, незвичні відчуття, незвичні відчуття в очах, незграбність, нездатність до навчання., нездужання, нейросенсорна глухота, нейтропенія, неспокій, нетримання сечі, нефролітіаз, ниркова коліка, нирковий біль, нирковоканальцевий ацидоз, ністагм, нічна сліпота, нудота, одностороння глухота, одностороння сліпота, ортостатична гіпотензія, пальпітація, панічна атака, панічні р-ції, панкреатит, параназальна синусова гіперсекреція, параноя, парестезія, парестезія слизової оболонки порожнини рота, паросмія, первинне безсоння, перепади настрою, периорбітальний набряк, периферична нейропатія, персеверація, печінкова недостатність, підвищена втомлюваність, підвищення апетиту, піднесений настрій, пірексія, плаксивість, плач, повторюваність мовлення, погана якість сну, позиви до сечовипускання, полакіурія, полідипсія, помутніння зору, порушення акомодатії, порушення експресивного мовлення, порушення здатності читати, порушення концентрації уваги, порушення координації, порушення мовлення, порушення настрою, порушення пам'яті, порушення рівноваги, порушення розумової діяльності, порушення слуху, порушення сну, порушення спонтанного мовлення, порушення циркадного ритму сну, порушення чутливості, посилення сльозовиділення, постуральне запаморочення, похолодіння кінцівок, пресбіопія, пресинкопе, пригнічення свідомості, припливи, психомоторна гіперактивність, психотичні порушення, раннє пробудження, ринорея, роздратованість, розлади зору, розлади панічного типу, розлади психомоторних функцій, розлади руху очей, розлади ходи, свербіж, седація, сенсорні порушення, сечові камені, с-м Стівенса-Джонсона, синкопе, синусова брадикардія, скотома, слинотеча, слухові галюцинації, сонливість, сплоснення емоційного афекту, сплутаність свідомості, спроба самогубства, статева дисфункція, ступор, суїцидальні думки, сухість очей, сухість у роті, схвильованість, тиніт, токсичний епідермальний некроліз, тремор, тривожність, тромбоцитопенія, феномен Рейно, фотопсія, фотофобія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до топірамату чи до будь-яких компонентів препарату; профілактика мігрені у вагітних і жінок репродуктивного віку, якщо тільки вони не застосовують ефективні методи контрацепції.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ТОПІЛЕПСИН 100	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x3	39,07	
	ТОПІЛЕПСИН 25	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№10x3	47,23	
	ТОПІЛЕПСИН 50	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10x3	37,83	

		обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна					
	ТОПІРОМАКС 100	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТОПІРОМАКС 100	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x3	29,26	
	ТОПІРОМАКС 25	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТОПІРОМАКС 25	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№10x3	54,95	
II.	ЕПІМАТ	Торрент Фармасьютікалс Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг, 100мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТОПАМАКС®	Янссен-Сілаг С.п.А. (первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії)/Янссен Орто ЛЛС (виробництво нерозфасованого продукту), Італія/США	капс. у фл.	25мг	№28	115,78	26,10/\$
	ТОПАМАКС®	Янссен-Сілаг С.п.А. (первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії)/Янссен Орто ЛЛС (виробництво нерозфасованого продукту), Італія/США	капс. у фл.	50мг	№28	89,16	26,10/\$
	ТОПІРАМІН	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у фл.	25мг	№60	58,16	26,44/\$
	ТОПІРАМІН	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у фл.	100мг	№100	27,76	26,44/\$
	ТОПІРАМІН	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у фл.	200мг	№100	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Габапентин (Gabapentin)**

Фармакотерапевтична група: N03AX12 - протиепілептичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: точний механізм дії невідомий; легко проникає у мозок та попереджає судоми; не змінює метаболізм ГАМК, а також не має спорідненості до ГАМК А- або ГАМК В-рецепторів; не зв'язується з іншими нейротрансмітерними рецепторами головного мозку та не взаємодіє з натрієвими каналами; зв'язується з α 2- δ (альфа2-дельта) субодиницею потенціалзалежних кальцієвих каналів, що, за припущеннями, спричиняє протисудомний ефект. Широкий спектр скринінгових досліджень не встановив, що габапентин зв'язується з іншими мішенями, крім α 2- δ ; фармакологічна активність габапентину може бути опосередкована зв'язуванням з α 2- δ субодиницею через зниження вивільнення збуджуючих нейромедіаторів у різних відділах ЦНС.

Показання для застосування ЛЗ: епілепсія, в якості додаткового препарату при лікуванні парціальних судом з або без вторинної генералізації у дорослих та дітей віком від 6-ти років ^{БНФ}; в якості монотерапії при лікуванні парціальних судом з або без вторинної генералізації у дорослих та дітей віком від 12-ти років ^{БНФ}. Показаний для лікування периферичного нейропатичного болю ^{БНФ}, напр., при болючій діабетичній нейропатії, і постгерпетичної невралгії у дорослих.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: можна приймати разом з їжею або окремо. Препарат слід запивати достатньою кількістю рідини (напр., склянкою води). При всіх показаннях (для дорослих та дітей віком від 12-ти років) для початку терапії використовувати схему підбору: день 1 - 300 мг/1 раз на добу; день 2 - 300 мг/2 рази на добу; день 3 - 300 мг/3 рази на добу ^{БНФ}. Відмінати поступово протягом мінімум 1-го тижня, незалежно від показання. Пацієнтам з важким загальним станом або певними обтяжливими факторами, такими як низька маса тіла, стан після трансплантації, титрування слід проводити повільніше або зменшувати крокову дозу, або подовжувати інтервали між збільшенням дози. Епілепсія. Доза визначається лікарем відповідно до індивідуальної переносимості та ефективності. *Дорослі та діти віком від 12-ти років:* ефективні дози при епілепсії 900-3600 мг/добу. Лікування починається з титрування дози препарату, як описано вище, або з дози 300 мг/3 рази на добу в 1-й день. Потім, залежно від індивідуальної переносимості та ефективності, дозу можна збільшувати на 300 мг/добу кожні 2-3 дні ^{БНФ} до максимальної дози 3600 мг/добу ^{БНФ}. Для деяких пацієнтів буває необхідно повільніше титрування. Найкоротший термін досягнення дози 1800 мг/добу – 1 тиждень, 2400 мг/добу – 2 тижні, 3600 мг/добу – 3 тижні. Максимальний інтервал між прийомами препарату не повинен перевищувати 12 годин, щоб уникнути перерв у протисудомній терапії та попередження виникнення судомних нападів. *Діти віком 6-12 років.* Стартова доза препарату - 10 ^{БНФ} -15 мг/кг/добу. Ефективна доза повинна бути досягнута титруванням препарату протягом приблизно 3-х днів. Ефективна доза у дітей віком від 6-ти років становить 25-35 мг/кг/добу ^{БНФ}. Загальну добову дозу слід розділити на рівні частини (прийом 3 рази на добу ^{БНФ}); максимальний інтервал між прийомами препарату не має перевищувати 12 годин. Периферичний нейропатичний біль. *Дорослі.* Лікування

розпочинається з титрування дози препарату, як описано вище, інакше стартова доза 900 мг/добу повинна бути розділена на 3 прийоми ^{БНФ}. Потім, залежно від індивідуальної переносимості та ефективності, дозу можна збільшувати по 300 мг/добу кожні 2-3 дні до максимальної – 3600 мг/добу ^{БНФ}. Для деяких пацієнтів буває необхідно більш повільне титрування. Найкоротший термін досягнення дози 1800 мг/добу – 1 тиждень, 2400 мг/добу – 2 тижні, 3600 мг/добу – 3 тижні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: вірусна інфекція, пневмонія, респіраторна інфекція, інфекція сечовивідних шляхів, отит середнього вуха, лейкопенія, тромбоцитопенія, АР, зниження апетиту, анорексія, підвищення апетиту, ворожість, сплутаність і емоційна лабільність, депресія, тривожність, нервозність, невиразне мовлення, галюцинації, сонливість, атаксія, судоми, гіперкінези, дизартрія, зниження пам'яті, тремор, безсоння, головний біль, порушення чутливості (парестезія, гіпестезія), порушення координації, ністагм, підвищення, зниження або відсутність рефлексів, амнезія, гіпокінезія, інші рухові розлади (в т.ч. хореоатетоз, дискінезія, дистонія), розлади зору (напр., амбліопія або диплопія), системне запаморочення, дзвін у вухах, відчуття посиленого серцебиття, підвищення артеріального тиску, розширення судин, задишка, бронхіт, фарингіт, кашель, риніт, блювання, нудота, гінгівіт, діарея, біль у животі, диспепсія, запор, сухість у роті або у горлі, здуття живота, дисфагія, панкреатит, гепатит, жовтяниця, набряк обличчя, пурпура, висипання, свербіж, акне, с-м Стівенса-Джонсона, ангіоневротичний набряк, мультиформна еритема, алопеція, артралгія, міалгія, біль у спині, м'язові скорочення, міоклонічні судоми, г. ниркова недостатність, нетримання сечі, еректильна дисфункція, гіпертрофія молочних залоз, гінекомастія, підвищена втомлюваність, гарячка, периферичний набряк, порушення ходи, слабкість, біль, відчуття дискомфорту, грипоподібний с-м, генералізований набряк, р-ції відміни (головним чином тривожність, безсоння, нудота, болі, пітливість), біль у грудях, підвищення маси тіла, підвищення показників ф-ції печінки (АСТ, АЛТ) і білірубіну, коливання рівня глюкози в крові у пацієнтів з ЦД, випадкові пошкодження, переломи, подряпини.

Противпоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1,8 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГАБАНТИН 300	ТОВ "Фарма Старт", Україна	капс. у бл.	300мг	№10x6	23,70	
	ГАБАНТИН 300	ТОВ "Фарма Старт", Україна	капс. у бл.	300мг	№10x3	24,95	
	ГАБАПЕНТИН	ПрАТ "Технолог", Україна	капс. тверді у бл.	300мг	№10x2	28,43	
	МЕДІТАН	АТ "Фармак", Україна	капс. у бл.	100мг, 300мг, 400мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МЕДІТАН	ПАТ "Фармак", Україна	капс. у бл.	100мг, 300мг	№10x3, №10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МЕДІТАН	ПАТ "Фармак", Україна	капс. у бл.	300мг	№10x3	27,00	
	МЕДІТАН	ПАТ "Фармак", Україна	капс. у бл.	400мг	№10x3	27,00	
	НЬЮРОПЕНТИН®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД/ТОВ "КУСУМ ФАРМ" (Альтернативний виробник, що здійснює вторинне пакування, контроль якості та випуск серії), Індія/Україна	капс. тверді у бл.	300мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НЬЮРОПЕНТИН®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД/ТОВ "КУСУМ ФАРМ" (Альтернативний виробник, що здійснює вторинне пакування, контроль якості та випуск серії), Індія/Україна	капс. тверді у бл.	300мг	№10x10	21,92	24,25/\$	
II.	ГАБАГАМА® 100	Каталент Джермені Шорндорф ГмбХ/Драгенофарм Аптекарь Пюшл ГмбХ, Німеччина/Німеччина	капс. у бл.	100мг	№10x2, №10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГАБАГАМА® 300	Каталент Джермені Шорндорф ГмбХ/Драгенофарм Аптекарь Пюшл ГмбХ, Німеччина/Німеччина	капс. у бл.	300мг	№10x2, №10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГАБАГАМА® 400	Каталент Джермені Шорндорф	капс. у бл.	400мг	№10x2, №10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	ГмбХ/Драгенофарм Аптекарь Пюшл ГмбХ, Німеччина/Німеччина						
ГАБАЛЕПТ	МІКРО ЛАБС ЛІМІТЕД, Індія	капс. тверді желат. у бл.	300мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ГАБАТА 100	Алкем Лабораторіз Лтд, Індія	капс. у бл.	100мг	№7x1, №10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ГАБАТА 300	Алкем Лабораторіз Лтд, Індія	капс. у бл.	300мг	№10x1, №14x1	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ГАБАТА 400	Алкем Лабораторіз Лтд, Індія	капс. у бл.	400мг	№10x1, №14x1	відсутня у реєстрі ОВЦ		
НЕЙРАЛГІН	Фармасайнс Інк., Канада	капс. у фл.	100мг	№100	58,81	27,00/\$	
НЕЙРАЛГІН	Фармасайнс Інк., Канада	капс. у бл..	100мг	№10x3	64,80	27,00/\$	
НЕЙРАЛГІН	Фармасайнс Інк., Канада	капс. у фл.	300мг	№100	18,63	27,00/\$	
НЕЙРАЛГІН	Фармасайнс Інк., Канада	капс. у бл.	300мг	№10x3	24,03	27,00/\$	
НЕЙРАЛГІН	Фармасайнс Інк., Канада	капс. у бл.	400мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ		
НЕЙРАЛГІН	Фармасайнс Інк., Канада	капс. у фл.	400мг	№100	19,06	27,00/\$	
НУПІНТИН	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	капс. у фл.	100мг, 300мг, 400мг	№20, №50, №100	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ТЕБАНТИН®	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	капс. у бл.	300мг	№10x5, №10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ		

• **Прегабалін (Pregabalin)**

Фармакотерапевтична група: N03AX16 - протиепілептичні засоби, інші протиепілептичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: зв'язується з допоміжною асубодиницею ($\alpha_2\text{-}\delta$ білок) потенціал-залежних кальцієвих каналів у ЦНС.

Показання для застосування ЛЗ: лікування невропатичного болю периферичного або центрального походження у дорослих^{БНФ}; епілепсія: в якості додаткового лікування при парціальних судомних нападах із вторинною генералізацією або без неї^{БНФ}; генералізовані тривожні розлади^{БНФ} у дорослих; фіброміалгія.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймають незалежно від прийому їжі. Діапазон доз ЛЗ може змінюватися в межах 150-600 мг/добу. Добову дозу розподіляють на 2 або 3 прийоми. Нейропатичний біль. лікування можна розпочати з дози 150 мг/добу. Залежно від індивідуальної відповіді та переносимості ЛЗ пацієнтом дозу можна збільшити до 300 мг/добу через 3-7 днів, а за необхідності - до максимальної дози 600 мг/добу ще після 7-ми днів^{БНФ}. Епілепсія. лікування можна розпочати з дози 150 мг/добу. Залежно від індивідуальної відповіді та переносимості ЛЗ пацієнтом дозу можна збільшити до 300 мг/добу після першого тижня лікування. Ще через один тиждень дозу можна збільшити до МДД - 600 мг/добу. Генералізований тривожний розлад. Доза може змінюватися в межах 150-600 мг/добу. Періодично слід переглядати необхідність продовження терапії. Лікування можна розпочати з дози 150 мг/добу^{БНФ}. Залежно від індивідуальної відповіді та переносимості ЛЗ пацієнтом дозу можна збільшити до 300 мг/добу після першого тижня лікування^{БНФ}. Після ще одного тижня прийому дозу можна збільшити до 450 мг/добу. Ще через один тиждень дозу можна збільшити до МДД - 600 мг/добу^{БНФ}. Фіброміалгія. Рекомендована доза становить 300-450 мг/добу. Лікування слід розпочинати із застосування дози 75 мг двічі на добу (150 мг/добу). Залежно від ефективності та переносимості, дозу можна збільшувати до 150 мг двічі на добу (300 мг/добу) протягом одного тижня. Для пацієнтів, для яких застосування дози 300 мг/добу є недостатньо ефективним, можна збільшити дозу до 225 мг двічі на добу (450 мг/добу). Застосування доз вище 450 мг/добу не рекомендується. Відміну ЛЗ слід проводити поступово, протягом щонайменше одного тижня, незалежно від показань.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: абсцес; агевзія; агресія; АР; алопеція; альбумінурія; аменорея; амнезія; анафілактоїдні р-ції; ангіоневротичний набряк; анізокорія; аноргазмія; апатія; апное; АГ; артеріальна гіпотензія; артралгія; астенія; асцит,панкреотит,дисфагія,дисфагія, афтозний стоматит, виразка стравоходу, періодонтальні абцеси; атаксія; ателектаз; атріовентрикулярна блокада першого ступеня; атрофія зорового нерва; атрофія шкіри; афтозний стоматит; баланіт; безсоння; біль; біль в очах, у кінцівках, у молочних залозах, у спині, у шиї; блефарит; блювання; бронхіоліт; везикуло-бульозний висип; вертиго; виділення з молочних залоз; виразки стравоходу, рогівки, шкіри; відчуття печіння, сп'яніння, холоду в кінцівках; внутрішньочерепна гіпертензія; втрата апетиту, зору, периферичного зору, свідомості; галюцинації; гастроєзофагеальна рефлюксна хвороба; гастроентерит; гематурія; генералізований набряк; гепатит; гикавка; гінекомастія; гіпалгізія; гіперакузія; гіпергідроз; гіперемія; гіперестезія; гіперсекреція слини; гіперчутливість; гіпестезія; гіпестезія ротової порожнини; гіпоглікемія; гіпокінезія; гіпорексія; гірсутизм; гломерулонефрит; головний біль; гостра ниркова недостатність; гранульома; грипоподібний с-м; дезорієнтація; делірій; деперсоналізація; депресія; дефекти поля зору; дизартрія; дизурія; диплопія; дискінезія; дисменорея; дисфагія; діарея; дратівливість; ейфоричний настрій; екзема; екзофтальм; екстрапірамідний с-м; ексфолиативний дерматит; енцефалопатія; епідидиміт; еректильна дисфункція; жар; жовтяниця; загальна слабкість; загальне нездужання; задишка; закладеність носа, назофарингіт; залежність; заочеревинний фіброз; запалення жирової тканини; запаморочення; запор; застійна серцева недостатність; затримка еякуляції; затримка сечі; збільшення маси тіла; збільшення молочних залоз; збільшення в крові рівня глюкози, креатиніну, креатинфосфокінази, АЛТ, АСТ; збудження; здуття живота; зменшення в крові кількості тромбоцитів, лейкоцитів; підвищений апетит/втрата апетиту, гіпоглікемія, анорексія, зменшення маси тіла; зменшення рівня калію в крові; зміна зорового сприйняття

глибини; зміни настрою; зниження гостроти зору; зниження лібідо; імпотенція; інтенційний тремор; інфекції ВДШ; ірит; кашель; кератит; кератокон'юнктивіт; коліт; кома; кон'юнктивіт; крововилив в око; кропив'янка; ларингоспазм; лейкорея; летаргія; ліхеноїдний дерматит; маніакальні р-ції; меланоз; мелена; менорагія; метеоризм; метрорагія; міалгія; мідріаз; міоз; міоклонія; мозочковий с-м; набряк; набряк сітківки, диска зорового нерва, очей, обличчя, язика, легень, суглобів; навколоротова парестезія; назофарингіт; незвичайні відчуття; нездужання; нейтропенія; некроз шкіри; нервозність; неспокій; нетримання сечі; нефрит; нечіткість зору; ниркова недостатність; ністагм; нічна сліпота; носова кровотеча; нудота; озноб; олігурія; осцилопсія; офтальмоплегія; падіння; панічні атаки; панкреатит; папульозне висипання; параліч очного м'яза; параноїдні р-ції; парестезія; паросмія; патологічні сновидіння; периферичний набряк; періодонтальний абсцес; петехіальний висип; печінкова недостатність, жовтяниця, підвищений рівень печінкових ферментів; підвищення втомлюваності, слъзовиділення; піднесений настрій; піелонефрит; пірексія; погіршення пам'яті; подовження інтервалу QT; подразнення очей; позіхання; порушення акомодатції, зору, когнітивних ф-цій, координації, психіки, рівноваги, уваги, ходи; посилення лібідо; посіпування м'язів; постуральне запаморочення; пригнічений настрій; припливи; пролежні; психомоторна гіперактивність; птоз; пурпура; пустулярний висип; рабдоміоліз; р-ції фоточутливості; ректальна кровотеча; риніт; розгальмовування; розлади з боку нігтів; розлади мовлення, сну; свербіж; світлобоязнь; седативний ефект; с-м Гієна-Барре; с-м зубчастого колеса; синкопе; синусова аритмія, брадикардія, тахікардія; скутість м'язів; скутість у грудях; с-м Стівенса-Джонсона; сонливість; спазми м'язів шиї; сплутаність свідомості; спрага; статева дисфункція; стиснення в горлі; страбізм; ступор; судоми; сухість в очах, слизової оболонки носа, у роті, шкіри; тахікардія; тремор; тривожність; увеїт; умисне заповідання шкоди; утворення каменів в нирках; утруднений добір слів; фаринголарингеальний біль; фіброз легенів; фотопсія; холелітіаз; холецистит; холодний піт; хропіння; цервіцит; шкірні та підшкірні вузлики; шлунково-кишкова кровотеча; шок; яскравість зору.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГАБАНА®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	капс. у бл.	75мг	№10x2	28,80	
	ГАБАНА®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	капс. у бл.	150мг	№10x2	17,00	
	ГАБАНА®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	капс. у бл.	300мг	№10x2	16,50	
	НЕОГАБІН 150	ТОВ "Фарма Старт", Україна	капс. у бл.	150мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НЕОГАБІН 150	ТОВ "Фарма Старт", Україна	капс. у бл.	150мг	№10x3	21,72	
	НЕОГАБІН 150	ТОВ "Фарма Старт", Україна	капс. у бл.	150мг	№10x6	21,72	
	НЕОГАБІН 75	ТОВ "Фарма Старт", Україна	капс. у бл.	75мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НЕОГАБІН 75	ТОВ "Фарма Старт", Україна	капс. у бл.	75мг	№10x6	33,74	
	НЕОГАБІН 75	ТОВ "Фарма Старт", Україна	капс. у бл.	75мг	№10x3	34,53	
	ОГРАНІЯ	ПАТ "Фармак", Україна	капс. у бл.	75мг	№7x2	31,43	
	ОГРАНІЯ	ПАТ "Фармак", Україна	капс. у бл.	150мг	№10x3	20,00	
	ОГРАНІЯ	ПАТ "Фармак", Україна	капс. у бл.	300мг	№10x3	20,00	
	ПАФІЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" (пакування із форми in bulk фірми-виробника БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦЯ АТ, Болгарія), Україна	капс. у конт. чар/уп.	75мг, 150мг	№14, №28, №56	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПРЕГАБАЛІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	капс. у конт. чар/уп.	75мг, 150мг	№7x4, №7x8	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПРЕГАБАЛІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	капс. у конт. чар/уп.	75мг	№7x2	27,38		
ПРЕГАБАЛІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	капс. у конт. чар/уп.	75мг	№7x3	27,38		
ПРЕГАБАЛІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	капс. у конт. чар/уп.	150мг	№7x2	17,63		

ПРЕГАБАЛІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	капс. у конт. чар/уп.	150мг	№7x3	17,63	
ПРЕГАБАЛІН-ЗН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	капс. тверді у бл.	75мг, 150мг	№10x3, №10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПРЕГАБАЛІН-ЗН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	капс. тверді у бл.	75мг	№10x2	34,46	
ПРЕГАБАЛІН-ЗН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	капс. тверді у бл.	150мг	№10x2	22,11	
ПРЕГАБАЛІН-ЗН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	р-н орал. у фл. по 200мл з доз. пристр.	20 мг/мл	№1	19,04	
ПРЕГАБАЛІН-ЗН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	р-н орал. у фл. по 100мл з доз. пристр.	20 мг/мл	№1	23,77	
ПРЕГАДОЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	капс. у бл.	75мг, 150мг	№10x1, №10x6,	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПРЕГАДОЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	капс. у бл.	75мг	№10x3	27,92	
ПРЕГАДОЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	капс. у бл.	150мг	№10x3	17,44	
II. АЛЬГЕРІКА	ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія	капс. тверді у бл.	75мг, 150мг	№14, №28, №56	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ГАЛАРА	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	капс. тверді у бл.	75мг, 150мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ГАЛАРА	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	капс. тверді у бл.	75мг	№14x1	39,93	28,05/\$
ГАЛАРА	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	капс. тверді у бл.	150мг	№14x1	27,95	28,05/\$
ЕКЗИСТА	АТ "Адамед Фарма" (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, випуск серії), Польща	капс. тверді у бл.	75мг	№14x2	15,24	26,67/\$

ЕКЗИСТА	АТ "Адамед Фарма" (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, випуск серії), Польща	капс. тверді у бл.	75мг	№14x4	17,14	26,67/\$
ЕКЗИСТА	АТ "Адамед Фарма" (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, випуск серії), Польща	капс. тверді у бл.	150мг	№14x2	11,43	26,67/\$
ЕКЗИСТА	АТ "Адамед Фарма" (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, випуск серії), Польща	капс. тверді у бл.	150мг	№14x4	11,43	26,67/\$
ЗОНІК	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	капс. тверді у бл.	75мг, 150мг	№14x4, №14x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЗОНІК	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	капс. тверді у бл.	150мг	№14x2	14,07	27,00/\$
ЗОНІК	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	капс. тверді у бл.	150мг	№14x1	14,29	27,00/\$
ЗОНІК	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	капс. тверді у бл.	75мг	№14x2	17,86	23,98/\$
ЗОНІК	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	капс. тверді у бл.	75мг	№14x1	18,57	23,98/\$
ЛІГАТО	Медокемі ЛТД (Завод AZ) (первинне та вторинне пакування)/Медокемі ЛТД (Центральний Завод) (виробництво готового лікарського засобу, контроль якості, випуск серії), Кіпр/Кіпр	капс. тверді у бл.	75мг, 150мг, 300мг	№14, №21, №56	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛІНБАГ	Лек фармацевтична компанія д.д. (первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії)/С. К. Сандоз С. Р. Л. (контроль серії)/Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С. (виробництво нерозфасованої продукції), Словенія/Румунія/Туреччина	капс. тверді у бл.	25мг, 50мг, 75мг, 100мг, 150мг, 200мг, 225мг, 300мг	№10x3, №7x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛІНЕФОР	Фармацевтичний Завод "Польфарма" С.А., Польща	капс. тверді у бл.	75мг, 150мг, 300мг	№14x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛІРИКА	Пфайзер Менюфектуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина	капс. у бл.	150мг	№21x4	25,26	21,42/\$
ЛІРИКА	Пфайзер Менюфектуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина	капс. у бл.	150мг	№14x4	25,79	26,65/\$
ЛІРИКА	Пфайзер Менюфектуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина	капс. у бл.	150мг	№14x1	30,08	26,65/\$
ЛІРИКА	Пфайзер Менюфектуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина	капс. у бл.	150мг	№21x1	35,38	21,42/\$
ЛІРИКА	Пфайзер Менюфектуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина	капс. у бл.	75мг	№14x1	44,93	26,65/\$
ЛІРИКА	Пфайзер Менюфектуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина	капс. у бл.	75мг	№21x4	49,53	21,42/\$
ЛІРИКА	Пфайзер Менюфектуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина	капс. у бл.	75мг	№21x1	62,52	21,03/\$
ЛІРИКА	Пфайзер Менюфектуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина	капс. у бл.	50мг; 75мг	№21x1, №21x4; №14x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛІРИКА	Пфайзер Менюфектуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина	капс. у бл.	300мг	№21x4	14,67	25,66/\$

ЛІРИКА	Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина	капс. у бл.	300мг	№21x1	17,11	25,66/\$
ЛЮГАБАЛІН	Люпін Лімітед, Індія	капс. у бл.	75мг, 150мг, 300мг	№14x2, №14x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МАКСГАЛІН 150	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд, Індія	капс. у стрип.	150мг	№10x3, №10x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МАКСГАЛІН 75	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд, Індія	капс. у стрип.	75мг	№10x3, №10x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
НЕУРОКЕМ 100	Алкем Лабораторіз Лтд, Індія	капс. у бл.	100мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
НЕУРОКЕМ 150	Алкем Лабораторіз Лтд, Індія	капс. у бл.	150мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
НЕУРОКЕМ 75	Алкем Лабораторіз Лтд, Індія	капс. у бл.	75мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПАГАМАКС	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	капс. у бл.	75мг, 150мг, 300мг	№14x, №14x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПАГАМАКС	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	капс. у бл.	75мг	№14x1	31,43	26,52/\$
ПАГАМАКС	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	капс. у бл.	150мг	№14x1	20,00	26,52/\$
ПРЕГАБАЛІН	Балканфарма-Дупниця АТ, Болгарія	капс. тверді у бл.	75мг, 150мг, 225мг, 300мг	№28, №56	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПРЕГАБАЛІН	Джубілант Дженерікс Лімітед, Індія	капс. у бл.	75мг, 150мг, 300мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПРЕГАБАЛІН КСАНТІС	Санека Фармасьютикалз АТ, Словацька Республіка	капс. тверді у бл.	75мг, 150мг, 300мг	№14, №28, №56	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПРЕГАБІО	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії), Словенія	капс. у бл.	25мг, 50мг, 75мг, 100мг, 150мг, 200мг, 225мг, 300мг	№14, №28, №84	відсутня у реєстрі ОВЦ	
СУДОРЕГА	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Виробнича дільниця - II, Індія	капс. тверді у бл.	75мг, 150мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТОРГАБАЛІН 150	Торрент Фармасьютикалс Лтд, Індія	капс. тверді у бл.	150мг	№4x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТОРГАБАЛІН 150	Торрент Фармасьютикалс Лтд, Індія	капс. тверді у бл.	150мг	№10x3	20,13	25,62/\$
ТОРГАБАЛІН 75	Торрент Фармасьютикалс Лтд, Індія	капс. тверді у бл.	75мг	№10x3	29,33	25,62/\$

6.3. Лікарські засоби, що застосовуються у лікуванні паркінсонізму та інших екстрапірамідних і нейродегенеративних розладів

6.3.1. Дофаміненергічні лікарські засоби

Комбіновані препарати

- **Леводопа + карбідопа (Levodopa + carbidopa) ***

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,6 г (відноситься до леводопи)

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЛЕВОКОМ	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	250мг/25мг	№10x10	10,75	
	ЛЕВОКОМ	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	250мг/25мг	№10x3	10,87	
	ЛЕВОКОМ РЕТАРД	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. прол. дії, вкриті п/о у бл.	200мг/50мг	№10x3, №10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	

II.	ДОПІКАР	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина	табл. у бл.	250мг/25мг	№10x5, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КОНФУНДУС®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл. у бл.	250мг/25мг	№10x10	8,59	26,84/\$
	ЛЕВОКОМ РЕТАРД АСІНО	Асіно Фарма АГ (повний цикл виробництва, первинна та вторинна упаковка), Швейцарія	табл. прол. дії у бл.	100мг/25мг; 200мг/50мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛЕВОКОМ РЕТАРД АСІНО	Асіно Фарма АГ (повний цикл виробництва, первинна та вторинна упаковка), Швейцарія	табл. прол. дії у бл.	100мг/25мг	№10x10	14,34	32,40/€
	ЛЕВОКОМ РЕТАРД АСІНО	Асіно Фарма АГ (повний цикл виробництва, первинна та вторинна упаковка), Швейцарія	табл. прол. дії у бл.	200мг/50мг	№10x10	13,66	32,40/€
	НАКОМ®	Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія	табл. у бл.	250мг/25мг	№10x10	23,46	27,06/\$

● **Леводопа + карбідопа + ентакапон (Levodopa + carbidopa + entacapone)**

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,45 г (відноситься до леводопи)

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КОНФУНДУС® ТРІО	Оріон Корпорейшн/Товариство з обмеженою відповідальністю "КУСУМ ФАРМ" (альтернативний виробник, що здійснює вторинне пакування, контроль якості і випуск серій (для пакування № 100))/Квінта - Аналітика с.р.о. (альтернативний виробник, що здійснює контроль, Фінляндія/Україна/Чеська Республіка	табл., в/о у фл.	50мг/12,5мг/200мг; 100мг/25мг/200мг; 150мг/37,5мг/200мг; 200мг/50мг/200мг	№30, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КОНФУНДУС® ТРІО	Оріон Корпорейшн/Товариство з обмеженою відповідальністю "КУСУМ ФАРМ" (альтернативний виробник, що здійснює вторинне пакування, контроль якості і випуск серій (для пакування № 100))/Квінта - Аналітика с.р.о. (альтернативний виробник, що здійснює контроль, Фінляндія/Україна/Чеська Республіка	табл., в/о у фл.	100мг/25мг/200мг	№100	65,68	26,90/€
	КОНФУНДУС® ТРІО	Оріон Корпорейшн/Товариство з обмеженою відповідальністю "КУСУМ ФАРМ" (альтернативний виробник, що здійснює вторинне пакування, контроль якості і випуск серій (для пакування № 100))/Квінта - Аналітика с.р.о. (альтернативний виробник, що здійснює	табл., в/о у фл.	150мг/37,5мг/200мг	№100	43,78	26,90/€

		контроль , Фінляндія/Україна/Чеська Республіка					
	КОНФУНДУС® ТРІО	Оріон Корпорейшн/Товариство з обмеженою відповідальністю "КУСУМ ФАРМ" (альтернативний виробник, що здійснює вторинне пакування, контроль якості і випуск серій (для пакування № 100))/Квінта - Аналітика с.р.о. (альтернативний виробник, що здійснює контроль , Фінляндія/Україна/Чеська Республіка	табл., в/о у фл.	200мг/50мг/2 00мг	№100	32,84	26,90/€
II.	СТАЛЕВО	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює повний цикл виробництва;альтернативн ий виробник, що здійснює первинне та вторинне пакування)/Квінта - Аналітика с.р.о. (альтернативний виробник, що здійснює контроль якості), Фінляндія/Чеська Республіка	табл., вкриті п/о у бан.	50мг/12,5мг/ 200мг; 100мг/25мг/2 00мг; 150мг/37,5мг /200мг; 200мг/50мг/2 00мг	№100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СТАЛЕВО	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює повний цикл виробництва;альтернативн ий виробник, що здійснює первинне та вторинне пакування)/Квінта - Аналітика с.р.о. (альтернативний виробник, що здійснює контроль якості), Фінляндія/Чеська Республіка	табл., вкриті п/о у бан.	50мг/12,5мг/ 200мг	№30	204,30	31,26/€
	СТАЛЕВО	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює повний цикл виробництва;альтернативн ий виробник, що здійснює первинне та вторинне пакування)/Квінта - Аналітика с.р.о. (альтернативний виробник, що здійснює контроль якості), Фінляндія/Чеська Республіка	табл., вкриті п/о у бан.	100мг/25мг/2 00мг	№30	102,15	31,26/€
	СТАЛЕВО	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює повний цикл виробництва;альтернативн ий виробник, що здійснює первинне та вторинне пакування)/Квінта - Аналітика с.р.о. (альтернативний виробник, що здійснює контроль якості), Фінляндія/Чеська Республіка	табл., вкриті п/о у бан.	150мг/37,5мг /200мг	№30	68,10	31,26/€
	СТАЛЕВО	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює	табл., вкриті п/о у бан.	200мг/50мг/2 00мг	№30	51,08	31,26/€

		повний цикл виробництва;альтернативний виробник, що здійснює первинне та вторинне пакування)/Квінта - Аналітика с.р.о. (альтернативний виробник, що здійснює контроль якості), Фінляндія/Чеська Республіка					
--	--	--	--	--	--	--	--

• **Селегілін (Selegiline)**

Фармакотерапевтична група: N04BD01 - протипаркінсонічні засоби. Інгібітори моноаміноксидази типу В.

Основна фармакотерапевтична дія: селективний інгібітор MAO-B, який також інгібує зворотне захоплення допаміну та пресинаптичний рецептор допаміну, чим потенціює допамінергічну ф-цію мозка. В комбінації з леводопою забезпечує високу концентрацію дофаміну в нігостріарній ділянці, чим збільшує тривалість періоду «включення», зменшує тривалість періоду «виключення» та зменшує вираженість феномену виснаження кінцевої дози; не потенціює гіпертензивний ефект таких речовин, як тирамін («сирний ефект»). При монотерапії щойно виявленої хвороби Паркінсона, яка ще не лікувалася, сповільнює прогресування хвороби, відстрочує її прогресування та необхідність застосування препаратів, що містять леводопу, а також зменшує швидкість розвитку хвороби; має нейропротекторний ефект.

Показання для застосування ЛЗ: хвороба Паркінсона або симптоматичний паркінсонізм^{БНФ} - як монотерапія у початковій стадії хвороби або у комбінації з препаратами леводопи (у поєднанні з периферичними інгібіторами декарбоксилази або без них).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: початкова доза 5 мг, яку приймають вранці; можна збільшити до 10 мг/добу^{БНФ} (приймати вранці або розділити на 2 прийоми).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль в грудній клітці, спині, суглобах, гіперсексуальність; блювання; брадикардія; головний біль; депресія; діарея; запаморочення; запор; затримка сечі; міопатія; незначне підвищення печінкових ферментів; нудота; ортостатична гіпотензія; перепади настрою; порушення зору; психоз; р-ції шкіри; розлади сну; сплутаність свідомості; судоми м'язів; суправентрикулярна тахікардія; сухість у роті; тремор; ажитація; аномальні сновидіння; аритмії; артралгія; вертиго; випадіння волосся; виразки в порожнині рота; висипання; втрата апетиту; галюцинації; гіпертензія; гіпотензія; дратівливість; задишка; закладеність носа; збудження; лейкоцитопенія; мимовільні рухи (дискінезії, акінезія, брадикінезія); минуці порушення сну (безсоння); набряк гомілковостопного суглоба; падіння; підвищене потовиділення; підвищення рівнів печінкових ферментів; порушення рівноваги; постуральна гіпотензія; прискорене серцебиття; розлад контролю імпульсу і примусу; розлади сечовиведення; стенокардія; стоматит; стомлення; тимчасові підвищення рівнів сироваткової аланін-амінотрансферази; тривога; тромбоцитопінія; утруднення сечовиведення; фарингіт; при комбінації з леводопою: дискінезія, гіперкінезія, атипів рухи, ажитація, сплутаність свідомості, галюцинації, постуральна гіпотензія, серцеві аритмії.

Протипоказання до застосування ЛЗ: табл. у флаконі, табл. у блістері: гіперчутливість до будь-якого компонента препарату; комбіноване застосування з селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну, інгібіторами зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну (венлафаксин), трициклічними антидепресантами, симптоміметиками, інгібіторами MAO (наприклад лінезолідом) та опіоїдами (петидином); виразка ДПК або шлунка в стадії загострення. Додатково для табл. у флаконі: терапія агоністами серотоніну; інші екстрапірамідні розлади, не пов'язані з дефіцитом допаміну; у комбінації з леводопою протипоказаний при важких СС захворюваннях, АГ, гіпертиреозі, фаохромоцитомі, вузкокутовій глаукомі, аденомі передміхурової залози з появою залишкової сечі, тахікардією, аритміями, важкою стенокардією, психозами, розвиненою деменцією та тиреотоксикозом.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕЛЬДЕПРИЛ	Оріон Корпорейшн, Фінляндія	табл. у фл.	5мг	№100	3,93	31,45/€
	ЮМЕКС®	ХІНОІН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд., Угорщина	табл. у бл.	5мг	№10x5		відсутня у реєстрі ОБЦ

• **Амантадин (Amantadine)**

Фармакотерапевтична група: N04BB01 - протипаркінсонічні препарати; допамінергічні засоби; похідні адамантану.

Основна фармакотерапевтична дія: виявляє непряму властивість агоніста стріарного допамінового рецептора; збільшує позаклітинну концентрацію допаміну як шляхом збільшення вивільнення допаміну, так і шляхом блокади зворотного захоплення в пресинаптичних нервових клітинах; у терапевтичних концентраціях інгібує вивільнення ацетилхоліну, опосередкованого NMDA-рецепторами, й у такий спосіб може чинити антихолінергічну дію; має ефект синергетичної дії з L-допа. Додатково для капс.: при низьких концентраціях специфічно інгібує реплікацію людського вірусу грипу А (включаючи підтипи Н1N1, Н2N2 і Н3N2, в концентрації 0,4 мкг/мл або менше).

Показання для застосування ЛЗ: Табл.: с-м Паркінсона (лікування с-мів хвороби Паркінсона^{БНФ}, таких як ригідність, тремор, гіпокінезія й акінезія); екстрапірамідні побічні ефекти нейролептиків та інших ЛЗ (рання дискінезія, акатизія й паркінсонізм). Капс.: хвороба Паркінсона^{БНФ}, симптоматичний (постенцефалітний, цереброваскулярний) і спричинений ЛЗ паркінсонізм у дорослих; профілактика у разі ризику інфікування вірусом грипу А, лікування на початкових стадіях (1-2 день захворювання) дорослих і дітей віком від 10-ти років;

екстрапірамідні побічні ефекти нейролептиків та інших ЛЗ (рання дискінезія, акатизія й паркінсонізм). **Розчин для інфузій:** інтенсивна терапія та початкове лікування акінетичного кризу при різких загостреннях симптомів паркінсонізму; для підвищення здатності зосереджувати увагу (вігільності) у посткоматозних станах різної етіології в лікарняних умовах.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: уникати різкого припинення лікування, оскільки може спостерігатися посилення екстрапірамідних симптомів і ефект припинення прийому іноді може проявлятися у вигляді делірію.

Табл.: приймати з невеликою кількістю рідини, бажано вранці і вдень. Останню на добу дозу не слід приймати після 16.00. Лікування при с-мі Паркінсона й порушеннях рухової активності, що спричинені застосуванням ЛЗ, проводити поступово, призначаючи дозування відповідно до терапевтичного ефекту. Лікування розпочинати з прийому 1 табл. н/добу у перші 4-7 днів з подальшим збільшенням добової дози на 1 табл. 1 раз н/тижд. до досягнення ефективної терапевтичної дози. Зазвичай ефективна доза становить 1-3 табл. двічі на добу. Літнім пацієнтам рекомендується добова доза 100 мг; якщо така доза буде неефективною, її можна обережно збільшити під наглядом лікаря до 200 мг/добу. При комбінованому лікуванні з іншими протипаркінсонічними ЛЗ дозу слід підбирати індивідуально. Для пацієнтів, яких раніше лікували розчином для ін'єкцій, початкова доза повинна бути вищою. При різкому погіршенні паркінсонічних симптомів при акінетичному кризі необхідно призначити введення розчину амантадину сульфату. Тривалість лікування залежить від природи і тяжкості перебігу хвороби і визначається лікарем. **Розчин для інфузій:** застосовувати внутрішньовенно. **С-м Паркінсона.** При різкому загостренні симптомів паркінсонізму при акінетичному кризі внутрішньовенна доза 200 мг вводиться 1-3 рази на добу. Швидкість введення не повинна перевищувати 55 крапель за хвилину, яка дорівнює часу інфузії приблизно 3 години. **Вігільність.** Для покращання вігільності у посткоматозному стані різної етіології, терапію з добовою дозою 200 мг, яка вводиться у вигляді повільної інфузії (>3 годин), можна проводити у початковому періоді 3-5 днів. Залежно від клінічної картини лікування може бути продовжено, якщо це можливо, у пероральній формі - до 4-х тижнів у дозі 200 мг н/добу. Тривалість лікування залежить від природи і тяжкості перебігу хвороби і визначається лікарем. Пацієнтам зі зниженою вігільністю, які продовжили лікування табл., не слід приймати препарат довше 4-х тижнів. **Капс.:** приймати внутрішньо разом з їжею, бажано в першій половині дня; капсулу ковтати цілою, запиваючи невеликою кількістю води. **Хвороба Паркінсона.** Початкова доза протягом 4-7 (максимум 15) днів - 100 мг 1 раз н/день. Тривале лікування (звичайна доза) - 100 мг два рази на день. У виняткових випадках (якщо поліпшення терапевтичного ефекту можна очікувати з хорошою переносимістю) - 100 мг 3 рази н/день. Ці регулярні дози рекомендуються як для раніше лікованих пацієнтів, так і для нелікованих пацієнтів. Менша початкова доза допомагає з'ясувати індивідуальну реакцію. Зазвичай через 4-7 днів можна призначати звичайну дозу. Дозування 100 мг 3 рази н/день може забезпечити додаткове покращення, однак такий прийом може супроводжуватися підвищеною токсичністю. У цих випадках дозу слід збільшувати поступово, з інтервалом принаймні один тиждень. **Комбінована терапія хвороби Паркінсона.** Починаючи застосування препарату, раніше ліковані пацієнти повинні продовжити приймати раніше прописані ЛЗ; в багатьох випадках можна поступово зменшити дозу інших антипаркінсонічних препаратів без впливу на успішність лікування. Однак, якщо частіше виникають небажані побічні ефекти, дозу потрібно зменшити більш швидкими темпами. Раніше ліковані пацієнти, які отримували великі дози антихолінергічних засобів або леводопи, повинні отримувати тривале (до 15 днів) початкове лікування низькими дозами препарату. **Вірус грипу типу А.** Діти віком від 10-ти років, підлітки та дорослі віком до 65 років - 100 мг 2 рази н/день. **Профілактика грипу типу А.** Доза 100 мг н/день. Цю дозу можна призначати пацієнтам з непереносимістю препарату в дозі 200 мг н/день. Прийом препарату почати у такому режимі дозування, як тільки будь-який контакт з хворим вірусом грипу є неминучим; лікування повинно тривати протягом усього періоду епідемії вірусу грипу А, зазвичай близько 6-ти тижнів. У разі якщо препарат застосовували разом з інактивованою вакциною вірусу грипу А, лікування необхідно продовжити 2 або 3 тижні після вакцинації. **Лікування грипу типу А.** Почати як можна швидше і продовжувати 4-5 днів. У разі пропуску прийому препарату слід прийняти рекомендовану дозу якомога швидше, якщо тільки не настав час наступного прийому. Ніколи не приймайте подвійні дози.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: Амантадину сульфат: анафілактичні р-ції; анорексія; аритмії серця з тахікардією; атаксія; безсоння; блювання; галюцинації; гарячка; головний біль; дезорієнтація; делірій; депресія; дискінезія; діарея; дратівливість; екзематозний дерматит; епілептичні напади; запаморочення; запор; затримка сечі у пацієнтів із гіпертрофією простати; затуманений зір; злюкисний нейролептичний с-м; зміна лібідо; зниження гостроти зору; лейкопенія; «мармурова шкіра», що супроводжується набряками нижньої частини гомілки і гомілковостопного суглоба; міалгія; мідріаз; моторна й психічна ажитація; набряк рогівки; нетримання сечі; нечітке мовлення; нічні кошмари; нудота; оборотне підвищення активності печінкових ферментів; окулологічні кризи; ортостатична гіпотензія; ортостатична дисрегуляція; ортостатичні порушення; параноїдні екзогенні психози, які супроводжуються зоровими галюцинаціями; парестезія; периферичні набряки; підвищена фоточутливість; підвищене потовиділення; погіршення концентрації уваги; понос; порушення сну; рабдоміоліз; р-ції гіперчутливості; рухові порушення; свербіж; серцева аритмія (шлуночкова тахікардія, фібриляція шлуночків, хаотична поліморфна шлуночкова тахікардія й подовження інтервалу QT); серцева недостатність; с-ми міоклонії та периферичної нейропатії; слабкість; сонливість; сплутаність свідомості; стан гіпоманії та манії; ступор; суїцидальні думки та наміри; сухість у роті; тахікардія; тимчасова втрата зору; тремор; тривожність; тромбоцитопенія; ураження рогівки (точкове субепітеліальне помутніння, яке може бути пов'язане з поверхневим точковим кератитом); шкірні висипання. **Амантадину гідрохлорид:** агресивна поведінка; анорексія; АР (в тому числі анафілактичні р-ції); аритмії; атаксія; безсоння; блювання; вертиго; відсутність апетиту; відчуття сухості у роті; галюцинації; гарячка; гіпергідроз; гіпертензія; гіпертермія; гіпокінезія; гіпоманії; головний біль; гостра дихальна недостатність; дезорієнтація; депресія; дискінезія; дисфагія; занепокоєння; запаморочення; запор; затримка сечі у хворих на гіперплазію передміхурової залози; затуманений зір; збудження; злюкисний нейролептичний с-м; зміни ЕКГ і тремор; кома; лейкопенія; лейкоцитоз; летаргія; манії; «мармурова» шкіра; мимовільні скорочення м'язів; мідріаз; набряк в ділянці гомілок; набряк легень; невиразне мовлення; нервозність; нетримання сечі; нічні кошмари; нудота; оборотне підвищення активності печінкових ферментів; ортостатична гіпотензія; параноїдальні реакції; парестезія; периферичний набряк нижніх кінцівок; підвищений настрій; підвищення рівня білірубину, гамма-глутамілтранспептидази, креатинфосфокінази, лактатдегідрогенази, лужної

фосфатази, сечовини крові, сироваткового креатиніну, сироваткової глутамін-оксалат-трансамінази і сироваткової глутамін-пірувін-трансамінази; порушення концентрації уваги; порушення ходи; ураження рогівки (напр., точкові субепітеліальні помутніння, які можуть бути пов'язані з точковим кератитом, набряком епітелію рогівки і вираженим погіршенням гостроти зору); пронос; психотичні розлади; р-ції гіперчутливості; р-ції фоточутливості; розлади контролю над імпульсами (у пацієнтів, які отримують лікування агоністами допаміну, можуть проявитися такі с-ми, як надмірне захоплення азартними іграми, підвищене лібідо, гіперсексуальність, компульсивні витрати грошових коштів, надмірне або компульсивне вживання їжі); свербіж; серцебиття; серцева недостатність у тому числі злаякісна аритмія, гіпотензія і тахікардія; с-ми, подібні до злаякісного нейролептичному с-му; сплутаність свідомості; ступор; судоми; тахіпноє; тремор; шкірні висипання.

Протипоказання до застосування ЛЗ: Амантадину сульфат: гіперчутливість до амантадину або до будь-яких інших компонентів препарату; декомпенсована серцева недостатність (стадія NYHA IV); кардіоміопатія та міокардит; атріовентрикулярна блокада II або III ступеня; брадикардія (менше 55 ударів/хв); пролонгований інтервал QT (Bazett QTc >420 мс) або з помітними U-хвилями, або з уродженим QT-синдромом у сімейному анамнезі; тяжка шлуночкова аритмія, включаючи хаотичну поліморфну шлуночкову тахікардію; одночасне лікування будипіном або іншими препаратами, що подовжують інтервал QT; знижений рівень калію або магнію в крові; епілепсія та інші судомні напади; тяжка ниркова недостатність; виразкова хвороба. **Амантадину гідрохлорид:** відома гіперчутливість до амантадину або інших компонентів препарату, порушення і сплутаність свідомості, рефрактерна епілепсія, психози або деліріозний с-м, вагітність; відносні протипоказання - доброякісна гіперплазія передміхурової залози, закритокутова глаукома. Одночасний прийом мепаміну.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АМАНТИН	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x6	8,73	
	АМАНТИН	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x3	8,91	
II.	НЕОМІДАНТАН	АТ "Олайнфарм", Латвія	капс. у бл.	100мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПК-МЕРЦ	Мерц Фарма ГмБХ і Ко. КГаА (первинне та вторинне пакування; виробник, відповідальний за випуск серій)/Клоке Фарма-Сервіс ГмБХ (продукція in-bulk; первинне та вторинне пакування), Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x3, №10x9	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПК-МЕРЦ	Мерц Фарма ГмБХ і Ко. КГаА (виробник, відповідальний за випуск серії)/Б. Браун Медикал, СА (виробник готового лікарського засобу), Німеччина/Іспанія	р-н д/інфуз. по 500мл у фл.	0,4 мг/мл	№2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

6.3.2. Агоністи допаміну

- **Праміпексол (Pramipexole)**

Фармакотерапевтична група: N04BC05 - допамінергічні засоби. Агоністи допаміну.

Основна фармакотерапевтична дія: з високою селективністю та специфічністю до допамінових рецепторів підтипу D₂ та має переважну спорідненість з D₃-рецепторами; відзначається повною внутрішньою активністю; полегшує паркінсонічні рухові порушення шляхом стимуляції допамінових рецепторів стріатуму (смугастого тіла).

Показання для застосування ЛЗ: Табл. та табл. прол. дії: ідіопатична хвороба Паркінсона у дорослих ^{БНФ}, як монотерапія (без леводопи) або у комбінації з леводопою протягом перебігу захворювання до пізніх стадій, коли ефект леводопи знижується або стає нестійким і виникає коливання терапевтичного ефекту (феномен «включення-виключення»). **Табл.:** симптоматичне лікування ідіопатичного с-му неспокійних ніг ^{БНФ} від помірного до тяжкого ступеня у дорослих.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вся інформація щодо дозування стосується праміпексолу у вигляді праміпексолу дигідрохлориду. **Табл.** приймати р/ос, запиваючи водою, під час прийому їжі чи без неї. **Табл. пролонгованої дії** призначені для прийому р/ос 1 раз на добу; ковтати цілими, запиваючи водою, не розжовувати, не розділяти на частини і не роздаєлювати; приймати кожного дня приблизно в один і той же час. **Хвороба Паркінсона.** Добову дозу застосовують у 3 прийоми однаковими частками (не стосується табл. пролонгованої дії). **Початкове лікування.** Дозу ЛЗ необхідно збільшувати поступово, з початкової 0,375 мг на добу кожні 5-7 днів. Якщо у пацієнтів не виникають непереносимі побічні явища, дозу необхідно титрувати до досягнення максимального терапевтичного ефекту (1-й тиждень - 3×0,125, загальна добова доза 0,375 мг; 2-й тиждень - 3×0,25, загальна добова доза 0,75 мг; 3-й тиждень - 3×0,5, загальна добова доза 1,5 мг; табл. пролонгованої дії приймаються раз на добу в добовій дозі). При необхідності добову дозу збільшувати на 0,75 мг щотижня до максимальної 4,5 мг/добу. Пацієнти, які вже приймають табл. праміпексолу, можуть бути переведені

на прийом табл. пролонгованої дії (краще робити це на ніч зі збереженням тієї ж самої добової дози). Після переведення на табл. пролонгованої дії доза може бути скоригована залежно від р-ції пацієнта на лікування. *Підтримуюче лікування.* Добова доза коливається у межах 0,375-4,5 мг. Подальше коригування дози потрібно здійснювати з урахуванням клінічної р-ції та побічних р-цій. Рекомендується зменшувати дозу леводопи під час збільшення дози праміпексолу та під час підтримуючого лікування залежно від р-ції окремих пацієнтів. *Пропущений прийом табл. пролонгованої дії.* Якщо прийом дози пропущено, необхідно прийняти табл. впродовж 12-ти год від звичного часу прийому. Якщо після пропуску прийому ЛЗ пройшло >12 год, табл. не приймають, а наступну дозу потрібно прийняти наступного дня у звичний час прийому. *Припинення лікування.* Раптове переривання допамінергічної терапії може призвести до розвитку нейролептичного злякисного с-му. Тому дозу праміпексолу зменшувати за схемою 0,75 мг/добу до добової дози 0,75 мг. Після цього дозу слід зменшувати до 0,375 мг/добу. *Синдром неспокійних ніг (не стосується табл. пролонгованої дії).* Рекомендована початкова доза становить 0,125 мг один раз на добу за 2-3 години до сну. Якщо добова доза для лікування синдрому неспокійних ніг не перевищує 0,75 мг, застосування препарату можна припинити без поступового зменшення дози.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: Табл. та табл. пролонгованої дії: Хвороба Паркінсона. Амнезія; артеріальна гіпотензія; безсоння; нудота, дискенезія, блювання; висипання; втомлюваність; галюцинації; гикавка; гіперкінезія; гіперсексуальність; гіперфагія; гіперчутливість; головний біль; делірій; дискінезія; задишка; занепокоєння; запаморочення; запор; збільшення маси тіла; зменшення маси тіла; зниження апетиту; манія; марення; нудота; параноя; переїдання; периферичні набряки; пневмонія; порушення зору (включаючи диплопію, нечіткість зору і погіршення гостроти зору); порушення секреції антидіуретичного гормону; безсоння, галюцинації, порушення сну; раптовий напад сну; розлади лібідо; свербіж; серцева недостатність; симптоми розладу контролю над спонуканням (патологічний потяг до азартних ігор, непереборний потяг до здійснення покупок, непомірна потребу в їжі) та компульсивна поведінка; с-м відміни агоністів допаміну (включаючи апатію, тривогу, депресію, втому, пітливість, біль); синкопе; сонливість; сплутаність свідомості. *С-м відміни* (можуть виникати немоторні побічні р-ції такі як апатія, тривога, депресія, втома, пітливість, біль). **Табл. :** Синдром неспокійних ніг. Амнезія, артеріальна гіпотензія, безсоння, блювання, висипання, галюцинації, гикавка, гіперкінезія, гіперфагія, гіперчутливість, головний біль, делірій, дискінезія, задишка, занепокоєння, запаморочення, запор, збільшення маси тіла, зменшення маси тіла, зниження апетиту, манія, марення, нудота, параноя, периферичні набряки, підвищена втомлюваність, пневмонія, порушення зору (включаючи погіршення гостроти зору, диплопію і нечіткість зору), порушення секреції антидіуретичного гормону, порушення сну, раптовий напад сну, розлади лібідо, свербіж, серцева недостатність, симптоми розладу контролю над спонуканням та компульсивна поведінка (такі як патологічний потяг до відвідування магазинів, патологічний потяг до азартних ігор гіперсексуальність, переїдання), синдром відміни агоністів допаміну (включаючи апатію, тривогу депресію втому пітливість і біль), синкопе, сплутаність свідомості.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до праміпексолу або іншого компонента препарату.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 2,5 мг (гидрохлорид)

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МІРАКСОЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (фасування із форми "in bulk" фірми-виробника "Synthon Hispania S.L.", Іспанія), Україна	табл. у бл.	0,25мг	№10x3	48,97	
	МІРАКСОЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (фасування із форми "in bulk" фірми-виробника "Synthon Hispania S.L.", Іспанія), Україна	табл. у бл.	1мг	№10x3	37,56	
	ПРАМІПЕКС	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	0,25мг	№10x3	56,62	
	ПРАМІПЕКС	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	1мг	№10x3	46,72	
	ПРАМІПЕКСОЛ ІС	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. у бл.	0,25мг	№10x3	45,00	
	ПРАМІПЕКСОЛ ІС	Товариство з додатковою відповідальністю	табл. у бл.	1мг	№10x3	37,50	

		"ІНТЕРХІМ", Україна					
	ПРАМІПЕКСОЛ-3Н	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	табл. у бл.	0,25мг; 1мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПРАМІПЕКСОЛ-3Н	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	табл. у бл.	0,25мг	№10x3	52,62	
	ПРАМІПЕКСОЛ-3Н	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	табл. у бл.	1мг	№10x3	46,04	
II.	КСОЛЄПРАЛ	Алємбїк Фармас'ютїкелс Лімітед, Індїя	табл. у бл.	0,7мг	№10x3	15,00	27,93/\$
	КСОЛЄПРАЛ	Алємбїк Фармас'ютїкелс Лімітед, Індїя	табл. у бл.	0,175мг	№10x3	108,57	27,93/\$
	МЕДОПЕКСОЛ	Спеціфар СА, Греція	табл. у бл.	0,088мг; 0,18мг; 0,7мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МІРАПЕКС®	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмБХ і Ко. КГ, Німеччина	табл. у бл.	0,25мг	№10x3	122,02	31,83/€
	МІРАПЕКС®	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмБХ і Ко. КГ, Німеччина	табл. у бл.	1мг	№10x3	116,37	31,03/€
	МІРАПЕКС® ПД	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмБХ і Ко. КГ, Німеччина	табл. прол. дії у бл.	0,375мг	№10x3	98,32	31,83/€
	МІРАПЕКС® ПД	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмБХ і Ко. КГ, Німеччина	табл. прол. дії у бл.	0,75мг	№10x3	91,96	31,83/€
	МІРАПЕКС® ПД	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмБХ і Ко. КГ, Німеччина	табл. прол. дії у бл.	1,5мг	№10x3	84,89	31,83/€
	ОПРІМЕА	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво «in bulk», первинну та вторинну упаковку, контроль серій та випуск серій), Словенія	табл. у бл.	0,088мг; 0,18мг; 0,35мг; 0,7мг; 1,1мг	№20, №30, №60, №90, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОПРІМЕА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії)/ТАД Фарма ГмБХ (первинне та вторинне пакування, випуск серії, контроль серії)/Лабор Л+С АГ (контроль мікробіологічної чистоти серії (у випадку контрол, Словенія/Німеччина/Німеччина	табл. прол. дії у бл.	0,26мг; 0,52мг; 1,05мг; 1,57мг; 2,1мг; 2,62мг; 3,15мг	№10x3, №10x9	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПАРКІЗОЛ	Сан Фармас'ютїкал Індастріз Лтд, Індїя	табл. у бл.	0,25мг	№10x3	14,60	24,33/\$
	ПАРКІЗОЛ	Сан Фармас'ютїкал Індастріз Лтд, Індїя	табл. у бл.	1мг	№10x3	12,97	24,33/\$
	ПРАМІМАК	МАКЛЕОДС ФАРМАС'ЮТИКАЛС	табл. у бл.	0,25мг; 1мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	ЛІМІТЕД, Індія					
ПРАМІПЕКС® XR	Лабораторіос Нормон, С.А., Іспанія	табл. прол. дії у бл.	0,75мг	№10х3	50,26	32,40/€
ПРАМІПЕКС® XR	Лабораторіос Нормон, С.А., Іспанія	табл. прол. дії у бл.	1,5мг	№10х3	40,20	32,40/€
ПРАМІПЕКСОЛ ОРІОН	Оріон Корпорейшн (альтернативний виробник, що здійснює вторинне пакування та випуск серії (при вторинній упаковці на зазначеній ділянці))/Специфар С.А., Фінляндія/Греція	табл. у бл.	0,18мг	№10х3	91,72	31,45/€
ПРАМІПЕКСОЛ ОРІОН	Оріон Корпорейшн (альтернативний виробник, що здійснює вторинне пакування та випуск серії (при вторинній упаковці на зазначеній ділянці))/Специфар С.А., Фінляндія/Греція	табл. у бл.	0,7мг	№10х3	70,91	31,45/€
РАМІПЕКС	Торрент Фармасьютікалс Лтд, Індія	табл. у бл.	0,25мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Ропінірол (Ropinirole)**

Фармакотерапевтична група: N04BC04 - протипаркінсонічні препарати. Допамінергічні засоби. Агоністи допаміну.

Основна фармакотерапевтична дія: неерголіновий агоніст D2/D3-рецепторів допаміну, що стимулює стріарні допамінові рецептори; знижує допамінову недостатність; діє на гіпоталамус та гіпофіз, інгібуючи секрецію пролактину.

Показання для застосування ЛЗ: хвороба Паркінсона: (1) монотерапія ^{БНФ} ранніх стадій захворювання у пацієнтів, які потребують допамінергічної терапії, щоб відстрочити призначення препаратів леводопи; (2) у складі комбінованої терапії ^{БНФ} пацієнтів, які отримують препарати леводопи, з метою підвищення ефективності леводопи, включаючи контроль за коливаннями «включення-виключення» та ефектів «закінчення дози», пов'язаних із хронічною терапією L-допою, що дає змогу знижувати щоденну дозу леводопи.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Лікування ропініролом слід припинити поступово, зменшуючи к-ть щоденних доз протягом одного тижня. Табл. приймати 3 р/добу, бажано під час їди, щоб запобігти р-ції на препарат з боку ШКТ. Таблетку можна розділити на дві рівні дози. Табл. пролонгованої дії застосовувати одноразово, в однаковий час щоденно, незалежно від прийому їжі; ковтати цілими, не розжовуючи; не можна ділити навпіл, а також вони не призначені для подрібнення. Хвороба Паркінсона. Початок лікування (табл.). Початкова доза становить 0,25 мг ×3 р/добу протягом одного тижня. Надалі дозу можна збільшити до 0,75 мг ×1 р/добу, як зазначено: 1-й тиждень (разова доза 0,25 мг; добова доза 0,75 мг); 2-й тиждень (0,5; 1,5); 3-й тиждень (0,75; 2,25); 4-й тиждень (1; 3). Терапевтичний режим (табл.). Після початкового підбору дози щотижневе збільшення дози може становити 1,5-3 мг/добу. Терапевтичний ефект звичайно досягається при прийомі дози в межах 3-9 мг/добу. Якщо задовільний результат не досягається або не підтримується, дозу можна збільшити до 24 мг/добу. При переході з лікування іншим допаміновим агоністом на ропінірол перед початком лікування ропініролом слід припинити застосування цього препарату згідно з рекомендаціями, наведеними в інструкції від виробника. Р-ція пацієнта на лікування ропініролом може бути оцінена через 3 місяці з початку лікування. Доза та необхідність продовжувати лікування переглядаються лікарем індивідуально. Якщо лікування переривається більше ніж на декілька діб, терапію необхідно продовжувати, підбираючи дозу. Початок лікування (табл. пролонгованої дії): 1-й тиждень - 2 мг ×1 р/добу щодня; 2-й тиждень - 4 мг ×1 р/добу щодня. Терапевтичний ефект звичайно досягається при прийомі в дозі 4 мг ×1 р/добу. Якщо у пацієнтів спочатку лікування при прийомі початкової дози (2 мг) виникають будь-які побічні ефекти, або терапія важко переноситься, дози мають бути знижені та лікування проводити в нижчій щоденній дозі. Терапевтичний режим Приймають найнижчу дозу препарату до досягнення симптоматичного контролю. Якщо достатній симптоматичний контроль не досягається при дозі 4 мг ×1 р/добу, то дозу слід збільшити на 2 мг з щотижневими або довшими проміжками часу до дози 8 мг одноразово щодня. Терапевтичний ефект звичайно досягається при застосуванні дози 8 мг на добу. Якщо задовільний результат не досягається або не підтримується, дозу можна збільшити до 10-12 мг на добу на два тижні або більш тривалі періоди. Максимальна добова доза не повинна перевищувати 24 мг. Якщо лікування переривається на одну або декілька діб, терапію необхідно продовжувати з підбору дози. Коли пацієнта переводять з іншого допамінового агоніста на ропінірол, перед тим як призначити ропінірол, слід припинити застосування цього препарату згідно з рекомендаціями, наведеними в інструкції виробника цього препарату. Перехід від ропініролу негайної дії до ропініролу пролонгованої дії. переходити лише після досягнення симптоматичного контролю внаслідок застосування ропініролу негайної дії. Перехід від лікування ропініролом негайної дії до застосування ропініролу пролонгованої дії можливий ввечері. Доза ропініролу пролонгованої дії базується на повній щоденній дозі ропініролу негайної дії, яку приймав пацієнт: щоденна доза препарату негайної дії 0,75-2,25 мг - щоденна доза пролонгованої дії 2 мг; 3-4,5 мг - 4 мг; 6 мг - 6 мг; 7,5-9 мг - 8 мг; 12 мг - 12 мг; 15-18 мг - 16 мг; 21 мг - 20 мг; 24 мг - 24 мг відповідно. Після переходу на ропінірол пролонгованої дії рекомендується індивідуальний підбір дози препарату залежно від терапевтичного призначення.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: Табл.: сонливість, синкопе, дискінезія; нудота; амнезія; ангіоневротичний набряк; анорексія; артеріальна гіпотензія; астенія; біль у грудях, у животі; блювання; висип; галюцинації; гіперкінезія; гіперсексуальність; гіпестезія; головний біль; діарея; епізоди раптового засинання; запаморочення (включаючи вертиго); запор; здуття живота; кропив'янка; меланома; незвична денна сонливість; непереборний потяг до імпульсивних витрат та покупок; падіння; парези; парестезії; підвищена пітливість; патологічний потяг до азартних ігор; переїдання та непереборний потяг до їжі; периферична ішемія; периферичні набряки; печінкові р-ції (переважно збільшення рівнів печінкових ферментів); печія; підвищене лібідо; підвищення частоти вірусних та бактеріальних інфекцій; позихання; порушення зору; порушення серцевого ритму; постуральна гіпотензія; приливи; психотичні р-ції (окрім галюцинацій; включаючи делірій манію та параною); р-ції гіперчутливості; свербіж; сплутаність свідомості; сухість очей; сухість у роті; тремор; фіброзні ускладнення. Синдром відміни включає такі симптоми: гіпертермія, сплутаність свідомості. Під час лікування ропініролом може спостерігатись парадоксальне посилення симптомів синдрому неспокійних ніг. **Табл. пролонгованої дії:** галюцинації, гіпотензія, дискінезія, запаморочення (включаючи вертиго), запор, зовнішні набряки, нудота, постуральна гіпотензія, сонливість; печія, диспепсія; набряки ніг.

Протипоказання до застосування ЛЗ: Табл.: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин; тяжка ниркова недостатність (кліренс креатиніну <30 мл/хв); печінкова недостатність; вагітність та лактація. **Табл. пролонгованої дії:** гіперчутливість до ропініролу або до будь-якого з компонентів препарату; порушення ф-ції нирок (кліренс креатиніну <30 мл/хв); порушення ф-ції печінки.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	РОПІНІРОЛ ОРІОН	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює виробництво за повним циклом)/Торрент Фармасьютікал Лтд (виробник, що здійснює виробництво, пакування і контроль якості), Фінляндія/Індія	табл., вкриті п/о у фл.	0,25мг; 1мг; 2мг	№21	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СІНДРАНОЛ®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС (випускний контроль)/ФАРМАТЕН С.А. (повний цикл виробництва, включаючи випуск серії)/ФАРМАТЕН ІНТЕРНЕТШНЛ С.А., Угорщина/Греція/Греція	табл. прол. дії у бл.	2мг, 3мг, 4м, 8мг	№28, №56, №84	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Пірибедил (Piribedil)**

Фармакотерапевтична група: N04BC08 - протипаркінсонічні препарати. Агоністи допаміну.

Основна фармакотерапевтична дія: допамінергічний агоніст, проникає крізь гематоенцефалічний бар'єр і зв'язується з рецепторами допаміну в головному мозку із сильною специфічною спорідненістю до допамінових рецепторів підтипів D₂ і D₃; діє як антагоніст двох основних α₂-адренергічних рецепторів ЦНС (α_{2A} та α_{2C}); стимулює корковий електрогенез «допамінергічного» типу; активізує різні функції, контрольовані допаміном; покращує уважність, а також виконання когнітивних завдань, які вимагають пильності; стимулює збільшення кровообігу у стегових судинах.

Показання для застосування ЛЗ: хвороба Паркінсона: в монотерапії або в комбінації з леводопою, на початку лікування або пізніше.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для р/ос застосування; табл. приймати після їди, ковтати не розжовуючи, запиваючи півсклянкою води. **Хвороба Паркінсона:** для монотерапії - 150-250 мг/добу 3 прийоми; для комбінації з леводопою - 150 мг/добу в 3 прийоми. Дозу слід збільшувати поступово - на 1 табл. через кожні 3 дні. При **припиненні лікування** дозу зменшувати поступово до повної відміни ЛЗ. **Розлади звичок і схильностей:** призначати найнижчу рекомендовану дозу для запобігання ризику розладів звичок і схильностей; у разі виникнення симптомів розладів звичок та схильностей зменшити дозу чи поступово припинити прийом ЛЗ.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АГ; агресивність; дискінезія; епізоди раптового засинання; запаморочення; ортостатична гіпотензія, яка може супроводжуватися непритомністю, нездужанням або нестабільним артеріальним тиском; периферичні набряки; психічні розлади, такі як сплутаність свідомості, ажитация, галюцинації (візуальні, слухові, змішані); психотичні розлади (марення, делірій); р-ції гіперчутливості (у тому числі кропив'янка); розлади звичок і схильностей (патологічна схильність до азартних ігор, підвищення лібідо, гіперсексуальність, непереборний потяг до витрат або здійснення покупок, переїдання та неконтрольований потяг до споживання їжі); слабо виражені розлади ШКТ (нудота, блювання, метеоризм); сонливість.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого компоненту ЛЗ; кардіогенний шок; г. фаза ІМ; у комбінації з нейролептиками (за винятком клозапіну).

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ПРОНОРАН®	Лабораторії Серв'є Індастрі, Франція	табл., в/о прол. дії у бл.	50мг	№15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

6.3.3. Антихолінергічні лікарські засоби

- **Тригексифенідил (Trihexyphenidyl)**

Фармакотерапевтична група: N04AA01 - протипаркінсонічні препарати. Антихолінергічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: антихолінергічний препарат центральної дії, порушує зв'язки між допаміном та ацетилхоліном у ЦНС; чинить виражену центральну Н-холіноблокуючу, а також периферичну М-холіноблокуючу дію; зменшує тремор; меншою мірою впливає на ригідність мускулатури та брадиканезію; зменшує саливацію, потовиділення та сальність шкіри; спазмолітична дія пов'язана з антихолінергічною активністю та прямим міотропним впливом.

Показання для застосування ЛЗ: монотерапія та комбінована терапія (з леводопою) паркінсонізму різного походження^{БНФ}; додатково для табл. по 5 мг: екстрапірамідні симптоми, спричинені нейролептиками або препаратами з подібним ефектом^{БНФ}; хвороба Паркінсона^{БНФ}; хвороба Літтла; спастичні паралічі, пов'язані з ураженням екстрапірамідної системи, у ряді випадків знижує тонус та поліпшує рухи при парезах пірамідного характеру.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дозу підбирати індивідуально, починаючи з найнижчої, підвищуючи її до мінімальної ефективної. Синдрому паркінсонізму початкова доза 1 мг тригексифенідилу гідрохлориду на добу (для дозування 1 мг препарат не застосовують); кожні 3-5 днів дозу поступово підвищують на 1-2 мг/ добу до отримання оптимального лікувального ефекту; підтримуюча доза 6-16 мг/ добу, розподілена на 3-5 прийомів; МДД - 20 мг. Екстрапірамідні розлади, пов'язані із прийомом ЛЗ: по 2-16 мг тригексифенідилу гідрохлориду на добу, залежно від тяжкості симптомів; МДД - 20 мг. Антихолінергічна терапія інших екстрапірамідних розладів: дозу регулювати поступово, підвищуючи кожного дня початкову дозу 2 мг тригексифенідилу гідрохлориду до мінімально ефективною підтримуючої дози, яка може перевищувати ту максимальну кількість, що призначають при інших показаннях; МДД - 50 мг. Дітям віком 5-17 років - тільки для лікування екстрапірамідних дистоній; МДД - 40 мг тригексифенідилу гідрохлориду. Прийом не залежить від часу вживання їжі; рекомендується запивати достатньою кількістю рідини (150-200 мл). При гіперсаливації тригексифенідил приймати після їди. При розвитку в процесі лікування сухості слизової оболонки рота - призначати до їди (якщо при цьому не виникає нудота). Завершувати лікування поступово, знижуючи дозу впродовж 1-2 тижнів до його повної відміни. Різка відміна може призвести до раптового погіршення стану пацієнта за рахунок загострення симптомів захворювання. Тривалість лікування визначає лікар індивідуально в кожному випадку.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: безсоння; блювання; відчуття спраги; галюцинації; гіперкінезія; гіпертермія; головний біль; дилатація товстої кишки; дискінезія у вигляді мимовільних хореєподібних рухів обличчя, губ, тіла, кінцівок (особливо у пацієнтів, які приймають препарати леводопи); дратівливість; ейфорія; загострення міастенії; запаморочення; запор; збудження; зменшення бронхіальної секреції; знижене потовиділення; зниження маси тіла; ізольовані випадки гнійного паротиту, вторинного по відношенню до надмірної сухості у роті; кишкова непрохідність; когнітивні дисфункції, такі як сплутаність свідомості; марення; мідріаз; нервозність; неспокій; нудота; парадоксальна синусова брадикардія; параноїдальні р-ції, особливо в осіб літнього віку і пацієнтів з атеросклерозом; підвищення внутрішньоочного тиску; порушення (нечіткість) зору; порушення акомодатії (в т.ч. циклоплегія); порушення миттєвої та короткочасної пам'яті; порушення пам'яті; порушення сечовипускання, в т.ч. утруднений початок сечовипускання, затримка сечі; порушення сну, в т.ч. сонливість; припливи; психози; р-ції гіперчутливості, включаючи висипання на шкірі; розвиток закритокутової глаукоми (в деяких випадках зі сліпотою); слабкість; сухість шкіри та слизових оболонок, у т.ч. слизової оболонки ротової порожнини з можливим розвитком дисфагії; тахікардія; фотофобія; хорея.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до тригексифенідилу або до інших компонентів препарату; глаукома; затримка сечовипускання; гіпертрофія передміхурової залози з порушенням відтоку сечі, аденома передміхурової залози; стенозуючі захворювання ШКТ (пілородуоденальний стеноз, ахалазія тощо); паралітичний ілеус, атонія кишечника, атонічні запори, механічна кишкова непрохідність, мегаколон; тахіаритмія, в тому числі фібриляція передсердь; кардіопатії в стадії декомпенсації.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 10 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЦИКЛОДОЛ	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл. у бл.	2мг	№10x4	3,29	
	ЦИКЛОДОЛ	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	

6.3.4. Лікарські засоби, що застосовуються при треморі, хореї, тикі та споріднених захворюваннях

- **Галоперидол (Haloperidol) *** (див. п. 5.1.1. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЛІКУВАННІ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ")
- **Рилузол (Riluzole)**

Фармакотерапевтична група: N07XX02 - засоби, що діють на нервову систему.

Основна фармакотерапевтична дія: впливає на механізм глутаматної нейротрансмісії (припускається, що блокує процес вивільнення глутаматів, чим посилює моторику); впливає на процеси нервової передачі в структурах головного мозку, які контролюють рухові та чутливі ф-ції організму.

Показання для застосування ЛЗ: для подовження життя ^{БНФ} або відстрочення часу проведення механічної вентиляції пацієнтам з боковим аміотрофічним склерозом ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування та його тривалість призначає тільки лікар, який має досвід лікування захворювань моторних нейронів. Рекомендована добова доза для дорослих або пацієнтів літнього віку становить 100 мг (50 мг через кожні 12 годин) ^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: астенія, нудота; абдомінальний біль; анафілактоїдні р-ції; анемія; анорексія; біль різної локалізації; блювання; вертиго; включаючи гіперсенситивні пневмоніти; гепатит; головний біль; діарея; запаморочення; зниження легеневої ф-ції; інтерстиціальні захворювання легень; нудота; панкреатит; періоральна парестезія; підвищення АТ; підвищення рівня печінкових ферментів, у т.ч. АЛТ, в сироватці крові зазвичай у перші 3 місяці лікування; р-ції анафілаксії, у тому числі ангіоневротичний набряк; ригідність м'язів; сонливість; тахікардія; тяжка нейтропенія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до рилузолу або до інших компонентів препарату; печінкова недостатність або перевищення у 3 рази верхньої межі норми активності печінкових трансаміназ.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БОРИЗОЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10x6	73,02	

- **Ботулотоксин (Botulinum Toxin)**

Фармакотерапевтична група: M03AX01 - міорелаксанти із периферичним механізмом дії.

Основна фармакотерапевтична дія: блокує периферичне виділення ацетилхоліну у пресинаптичних холінергічних нервових закінченнях шляхом розщеплення SNAP-25, невід'ємної частини зв'язування та виділення ацетилхоліну везикулами, розташованими у нервових закінченнях. Повне відновлення функції кінцевої пластини/передачі імпульсів після внутрішньом'язової ін'єкції в нормі відбувається через 3-4 місяці, протягом яких нервові закінчення проростають і відновлюють зв'язки з пластиною рухового нерва.

Показання для застосування ЛЗ: для тимчасового зменшення помірних та різко виражених вертикальних, глабеллярних, латеральних періорбітальних зморшок, (зморшки у формі «гусячих лапок» та між бровами) ; первинного гіпергідрозу пахвових запади; блефароспазм, ^{БНФ} геміфаціальний спазм ^{БНФ}; фокальна дистонія для лікування: геміфаціального спазму, спастичної кривошиї, фокальної спастичності після інсульту або травматичного ушкодження головного мозку; послаблення симптомів хронічної мігрені; ідіопатична гіперактивність сечового міхура ^{БНФ} та нейрогенна гіперактивність детрузора при нейрогенному сечовому міхурі із симптомами нетримання сечі; фокальна спастичність, пов'язана з динамічною деформацією стопи внаслідок спастичності, у дітей віком від 2-х років, які перебувають на амбулаторному лікуванні церебрального паралічу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: одиниці токсину ботуліну одного препарату є специфічними саме для нього і не є взаємозамінними з одиницями іншого препарату. **БОТОКС®.** Дози, рекомендовані в одиницях-Аплерган (далі - Ода), є відмінними від інших ботулотоксичних препаратів. Доза та кількість ін'єкцій на один м'яз не визначені для всіх показань, тому оптимальну дозу визначають методом титрування, але рекомендовану максимальну дозу не слід перевищувати. Фокальна спастичність, пов'язана з дитячим церебральним паралічем. При геміплегії: початкова рекомендована доза - 4 Ода на 1 кг маси тіла в уражену кінцівку. При диплегії: початкова доза становить 6 Ода на 1 кг маси тіла, розділена між враженими кінцівками. Максимальна загальна доза - 200 Ода. Фокальна спастичність верхніх кінцівок після перенесеного інсульту: точну дозу і кількість місць для ін'єкцій необхідно коригувати, максимальна загальна доза - на курс лікування 200-240 Ода, розподілених на залучені м'язи. Повторні ін'єкції не слід здійснювати раніше ніж через 12 тижнів після ін'єкції. Фокальна спастичність нижніх кінцівок, пов'язана з перенесеним інсультом: у дорослих становить 300 Ода, розподілених на 3 м'язи, але повторну ін'єкцію слід здійснювати не раніше ніж через 12 тижн. Блефароспазм/геміфаціальний спазм: початкова доза 1,25-2,5 Ода; не має перевищувати 25 Ода на одну очну зону. При блефароспазмі загальна доза не повинна перевищувати 100 Ода кожні 12 тижн. Спастичність м'язів шиї та плечей у дорослих (цervікальна дистонія): початкова доза з 200 Ода, при подальших курсах дозу коригують. Не більше 50 Ода препарату в кожну окрему ділянку. Не більше 100 Ода в груднино-соскоподібній м'яз. Загальна доза за один сеанс не повинна перевищувати 300 Ода. Хронічна мігрень: 155-195 Ода, які вводяться в/м по 0,1 мл (5 Ода) у 31-39 ділянок, лікування становить - 12 тижнів. Ідіопатична гіперактивність сечового міхура: 100 Ода, по 0,5 мл ін'єкції (5 Ода) у 20 ділянок детрузора. Нетримання сечі внаслідок нейрогенної гіперактивності детрузора: 200 Ода, по 1 мл ін'єкції (~6,7 Ода) паралельно у 30 ділянок детрузора. Первинний гіпергідроз пахвових западин: 50 Ода п/ш, не слід

повторювати частіше, ніж кожні 16 тижнів. **ДИСПОРТ®** Для кожного показання для застосування необхідні концентрації є специфічними. Фокальна спастичність у дорослих (верхні кінцівки): у кожне окреме місце ін'єкції слід вводити рекомендовані дози але не більш ніж 1 мл ЛЗ. Ін'єкції можна повторювати приблизно 1 раз на 12-16 тижн. Фокальна спастичність нижніх кінцівок у дорослих з ураженням гомілковостопного суглоба: загальна доза не повинна перевищувати 1500 ОД., у кожне окреме місце ін'єкції слід вводити не більш ніж 1 мл розчину. Повторне лікування - не частіше ніж через 12-16 тижн. Верхні та нижні кінцівки: дозу потрібно визначати для кожного пацієнта індивідуально, однак загальна доза не повинна перевищувати 1500 ОД. в/м. Динамічна еквінуса деформація стопи, спричинена фокальною спастичністю внаслідок церебрального паралічу, у дітей віком від 2 р.: розпочинати з нижчої стартової дози. Доза, застосована протягом сеансу лікування, не повинна перевищувати 15 ОД/кг при введенні в одну нижню кінцівку або 30 ОД/кг при введенні в обидві нижні кінцівки; загальна доза протягом одного сеансу лікування не повинна перевищувати 1000 ОД або 30 ОД/кг залежно від того, яка з цих величин є меншою. Загальну дозу слід розділити між ураженими спастичними м'язами нижньої(их) кінцівки(ок). У кожне окреме місце ін'єкції потрібно вводити не більш ніж 0,5 мл. М'язи та дози: *Gastrocnemius* - 5-15 ОД/кг; *Soleus* - 4-6 ОД/кг; *Tibialis posterior* - 3-5 ОД/кг; загальна доза - до 15 ОД/кг. Повторне лікування можна призначати не частіше ніж 1 раз на 12 тижн. Спастична кривошия: початкова доза - 500 ОД , яку вводять частинами у 2 чи 3 найактивніших м'язи шиї. Ротаційна кривошия (rotational torticollis) - 500 ОД; бокова кривошия (laterocollis) - 500 ОД; задня кривошия (retrocollis) - 500 ОД. Рекомендовано застосовувати дози в межах від 250 ОД до 1000 ОД. Максимальна доза не повинна перевищувати 1000 ОД. Ін'єкції можна повторювати приблизно 1 раз на 16 тижн. Препарат вводять в/м. Блефароспазм і геміфаціальний спазм: 40 ОД п/ш на кожне око, але не перевищувати 120 ОД на кожне око. При повторному застосуванні лікарського засобу, якщо ефект початкового лікування незначний, дозу на кожне око слід підвищити до 60 ОД. Лікування геміфаціального спазму таке ж, як і пацієнтів з однобічним блефароспазмом. Гіпергідроз пахвових западин. Вводять в/ш. початкова доза - 100 ОД на кожну пахвову западину. Доза подальших ін'єкцій максимальна може становити до 200 ОД на пахвову западину. Інтервал між ін'єкціями щонайменше 12 тижнів. **КСЕОМІН**. Відновлений розчин ЛЗ призначається для в/м ін'єкції. При лікуванні блефароспазму, спастичної кривошиї та спастичності верхньої кінцівки після інсульту оптимальне дозування і кількість місць для ін'єкцій в м'язі лікар встановлює для кожного пацієнта індивідуально. Слід титрувати дозу. Не рекомендується застосовувати дітям. Після відновлення ЛЗ застосовувати відразу, тільки під час однієї процедури і тільки для одного пацієнта. Блефароспазм: початкова доза - 1,25–2,5 ОД в кожне місце ін'єкції. Початкова доза не повинна перевищувати 25 ОД на 1 око. Загальна доза не повинна перевищувати 100 ОД кожні 12 тижнів. Інтервали між лікувальними процедурами повинні визначатися на основі фактичної клінічної потреби конкретного пацієнта. Спастична кривошия: максимальна доза в процесі однієї процедури не повинна перевищувати 200 ОД, у наступних циклах- індивідуально. Не слід перевищувати дозу 300 ОД протягом одного циклу процедур. В одне місце для ін'єкції не більше 50 ОД. Інтервал між процедурами повинен становити як мінімум 10 тижнів. Спастичність верхньої кінцівки після інсульту: у кожне окреме місце ін'єкції слід вводити рекомендовані дози, але максимальна загальна доза- до 400 ОД на один цикл лікування. Повторне лікування, як правило, можна проводити не частіше ніж через кожні 12 тижнів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: аспірація; астенія, автономна дизрефлексія; алопеція; амнезія; анафілаксія; ангіоневротичний набряк; анорексія; апатія; аритмія; артралгія; артропатія; аспіраційна пневмонія; астенія; бактеріурія, задишка; безсоння; біль (в очах, лицьовий, у животі, у кінцівках, у місці ін'єкції, у шиї, у щелепі шкіри); блефарит; блювання; болісність; бронхіальна плексопатія; бронхіт; бронхоспазм; бурсит; виворіт повіки; виразковий кератит; висипання; висока температура, відчуття важкості, жару; вірусна інфекція; втома, тривога; вушний шум; гарячка; гематома у місці ін'єкції; гематурія; гіпергідроз (непахвові потіння), компенсаторне потовиділення; гіпертонія; гіперчутливість у місці ін'єкції, свербіж; гіпоакузія; гіпоестезія; головний біль; грипоподібне захворювання; денерваційна атрофія; депресія; дерматит; дефект епітелію рогівки; дивертикул сечового міхура; дизартрія; дизурія; диплопія; диспное; дистонія; дисфагія; дисфонія; дихальна недостатність та зупинка дихання; екіміоз; ентропіон; еритема; закритокутова глаукома; запалення; запаморочення; запор; назофарингіт, затримка сечовиділення; інфаркт міокарда; інфекція (вушна, ВДШ, сечовивідних шляхів, локалізована); кератит; крововилив та подразнення у місці ін'єкції; кровоточивість, та/або синці; кропив'янка; лагофтальмоз; лейкоцитурія; лицьовий параліч; локалізована м'язова слабкість; локалізовані м'язові судоми/спонтанні м'язові скорочення; локальний біль; м'язова атрофія; м'язово-скелетний біль; м'язова гіпертензія; м'язова слабкість; м'язова судома; м'язове напруження; м'язовий спазм, ригідність, м'язові розлади (підняття брів); мадароз; міалгія; міастенія гравіс; мігрень; млявість; мультиформна еритема; набряк (обличчя, повіки, периорбітальний, у місці ін'єкції, периферичний); напруженість та ущільнення шкіри; незвичайний запах шкіри; нездужання; незмикання очної щілини; неповне звільнення сечового міхура; непритомність; нетримання сечі; нудота; облісіння; оральна парестезія; ортостатична гіпотензія; парез (лицьового нерва, обличчя); параліч VII черепного нерва, парез мимічної мускулатури, невралгічна аміотрофія; парестезія; периферична нейропатія; перфорація рогівки; підвищена сльозоточивість; підшкірні вузлики; плямистий кератит; подразнення (очей, у місці ін'єкції); полакіурія; порушення координації, зору (включаючи розпливчатий зір), офтальмоплегія; почервоніння; припливи крові; пронос; псоріазоподібний дерматит; набряк повіки, птоз (брови, повіки); пурпура; радикулопатія; реакція фоточутливості; риніт; свербіж; світлобоязнь; сироваткова хвороба; скелетно-м'язовий біль та залякання; сонливість; страбизм; сухість шкіри, очей, ротової порожнини; швидкоплинна симптоматична гіпотензія, депресія, розлади мовлення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини або допоміжних речовин ЛЗ; міастенія гравіс або синдромом Ітона-Ламберта (для усунення вертикальних зморщок між бровами (глабеллярні зморшки) у дітей (віком до 18 років) та пацієнтів літнього віку (понад 65 років); інфекція або запалення у передбаченій для ін'єкції ділянці; аміотрофічний склероз ; порушення функції сечового міхура: наявна на момент лікування ІСШ; гостра затримка сечовиділення на момент лікування у пацієнтів, які не застосовують катетеризацію на регулярній основі; у пацієнтів, які не хочуть та/або не в змозі ініціювати катетеризацію після лікування, якщо необхідно; наявність каменів у сечовому міхурі.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БОТОКС® КОМПЛЕКС БОТУЛІНІЧНОГО ТОКСИНУ ТИПУ А (ВІД CLOSTRIDIUM BOTULINUM)	Аллерган Фармасьютикалз Ірландія, Ірландія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	100 ОД-Аллерган	№1	4284,00	30,00/€
	БОТОКС® КОМПЛЕКС БОТУЛІНІЧНОГО ТОКСИНУ ТИПУ А (ВІД CLOSTRIDIUM BOTULINUM)	Аллерган Фармасьютикалз Ірландія, Ірландія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	200 ОД-Аллерган	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДИСПОРТ®	ІПСЕН БІОФАРМ ЛІМІТЕД, Велика Британія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	500 ОД	№1	6450,00	29,41/€
	ДИСПОРТ®	ІПСЕН БІОФАРМ ЛІМІТЕД, Велика Британія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	300 ОД	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КСЕОМІН	Мерц Фарма ГмбХ і Ко. КгаА (виробництво нерозфасованого продукту, випробування контролю якості в процесі виробництва, кількісне визначення на основі клітин, кількісне визначення Ботулінічного нейротоксину Clostridium Botulinum типу А (ELISA), первинне паку, Німеччина/Німеччина/Німеччина/Ірландія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	50LD50 одиниць	№1	2200,46	28,71/€
	КСЕОМІН	Мерц Фарма ГмбХ і Ко. КгаА (виробництво нерозфасованого продукту, випробування контролю якості в процесі виробництва, кількісне визначення на основі клітин, кількісне визначення Ботулінічного нейротоксину Clostridium Botulinum типу А (ELISA), первинне паку, Німеччина/Німеччина/Німеччина/Ірландія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	100LD50 одиниць	№1	4800,87	28,71/€

- *Пропранолол (Propranolol) * (див. п. 2.1.2. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")*

6.3.5. Лікарські засоби, що застосовуються при боковому аміотрофічному склерозі

- *Рилузол (Riluzole) (див. п. 6.3.4. розділу "НЕВРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")*

6.4. Лікарські засоби для лікування больових синдромів та мігрені

6.4.1. Анальгетики

- *Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid) * ** (див. п. 2.15.3.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")*
- *Парацетамол (Paracetamol) * ** (див. п. 8.8.2. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")*

6.4.2. Нестероїдні протизапальні лікарські засоби

- *Індометацин (Indometacin) (див. п. 8.7.1.1. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")*
- *Диклофенак (Diclofenac) (див. п. 8.7.1.1. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")*
- *Кеторолак (Ketorolac) (див. п. 8.7.1.1. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")*
- *Мелоксикам (Meloxicam) (див. п. 8.7.1.3. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")*
- *Ібупрофен (Ibuprofen) * ** (див. п. 8.7.1.2. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")*

- **Кислота мефенамінова (Mefenamic acid) **** (див. п. 8.7.1.4. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Німесулід (Nimesulid)^[ПМД]** (див. п. 8.7.1.6. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

6.4.3. Інгібітори зворотнього захоплення серотоніну

(див. п. 5.2.1.2. розділу «ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЛІКУВАННІ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ»)

6.4.4. Інші засоби для лікування гострої мігрені

6.4.4.1. Протиблювотні засоби

- **Метоклопрамід (Metoclopramide) *** (див. п. 3.5. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Домперидон (Domperidone) **** (див. п. 3.5. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

6.4.4.2. Антигістамінні засоби для системного застосування

- **Ципрогептадин (Ciproheptadine)** (див. п. 18.3.1.1. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")

6.4.4.3. Селективні агоністи серотоніну

- **Суматриптан (Sumatriptan)**

Фармакотерапевтична група: N02CC01 - селективний агоніст 5HT₁-рецепторів серотоніну. Препарати, що застосовуються для лікування мігрені.

Основна фармакотерапевтична дія: селективний агоніст 5HT₁-рецепторів, що не впливає на інші 5HT-рецептори у черепно-мозкових кровоносних судинах; має селективну вазоконстрикторну дію на судини у системі сонних артерій, але не впливає на мозковий кровообіг; система сонних артерій постачає кров до екстра- та інтракраніальних тканин, напр., мозкових оболонок; розширення цих судин спричиняє мігрень; гальмує активність трійчастого нерва.

Показання для застосування ЛЗ: швидке полегшення стану при нападах мігрені^{БНФ}, з ауорою чи без неї.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл., табл., в/о, капс. ковтати цілими, запиваючи водою. Не застосовувати з метою профілактики нападу мігрені; застосовувати якомога раніше після початку нападу, хоча він є однаково ефективним на кожній стадії. Рекомендована доза для дорослих - 50 мг; в окремих випадках дозу можна підвищити до 100 мг^{БНФ}. Якщо доза ЛЗ виявиться неефективною, не потрібно застосовувати ще одну дозу під час цього ж нападу; наступну дозу можна застосовувати при нових нападах мігрені. Якщо пацієнт відреагував на першу дозу, але симптоми відновлюються, друга доза може бути застосована протягом наступних 24 годин, мінімальний інтервал між цими дозами повинен бути не менше 2 год; загальна добова доза не повинна перевищувати 300 мг^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості, від шкірної до анафілаксії; запаморочення; сонливість; порушення чутливості, включаючи парестезії і гіпестезії, судом, тремор, дистонія, ністагм, скотома; збудження; транзиторне підвищення АТ одразу після прийому препарату, приплив крові, брадикардія, тахікардія, посилене серцебиття, порушення ритму, транзиторні ішемічні зміни на ЕКГ, спазм коронарних артерій, стенокардія, ІМ, артеріальна гіпотензія, хвороба Рейно; задишка; нудота, блювання, ішемічний коліт, діарея; відчуття тяжкості, міалгія, ригідність м'язів шиї, артралгія, мерехтіння, диплопія, зниження гостроти зору, втрата зору (звичайно минуща); гіпергідроз; біль, відчуття тепла/ холоду, стискання або напруженості, відчуття слабкості, втомлюваність; незначні зміни у функціональних печінкових тестах.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого компонента ЛЗ; ІМ в анамнезі; ІХС; стенокардія Принцметала; захворювання периферичних судин або симптоми, характерні для ІХС; інсульт або минуще порушення мозкового кровообігу в анамнезі; помірна або тяжка АГ та легка неконтрольована АГ; тяжка печінкова недостатність; супутнє застосування ерготаміну або його похідних (включаючи метизергід); супутнє застосування будь-якого агоніста триптан/5-гідрокситриптамін-рецепторів (5-HT₁); одночасне застосування інгібіторів MAO [ЛЗ не слід застосовувати протягом 2-х тижнів (14-ти днів) після відміни інгібіторів MAO]; ішемія кишечника.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 50 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АМІГРЕН	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	капс. у бл.	50мг, 100мг	№1x6, №6x1, №10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АМІГРЕН	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	капс. у бл.	50мг	№1x3	21,33	
	АМІГРЕН	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	капс. у бл.	50мг	№1x1	28,00	
	АМІГРЕН	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	капс. у бл.	100мг	№1x3	18,00	
	АМІГРЕН	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	капс. у бл.	100мг	№1x1	25,00	

АНТИМІГРЕН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	50мг, 100мг	№1х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
АНТИМІГРЕН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№3х1	28,57	
АНТИМІГРЕН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№1х1	29,60	
АНТИМІГРЕН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№3х1	29,93	
АНТИМІГРЕН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№1х1	31,10	
СТОПМІГРЕН	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№6х1	11,44	
СТОПМІГРЕН	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД",	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№3х1	12,31	

		Україна					
II.	МІГРАНОЛ	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у бл.	50мг	№10x1	24,13	26,81/\$
	СУМАМІГРЕН	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польща	табл., в/о у бл.	50мг, 100мг	№2x1, №6x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СУМАФІКС	Ауробіндо Фарма Лімітед – Юніт III, Індія	табл. у бл.	50мг, 100мг	№4x5	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Золмітриптан (Zolmitriptan)**

Фармакотерапевтична група: N02CC03 - засоби, що застосовуються при мігрени. Селективні агоністи 5HT₁ - рецепторів серотоніну.

Основна фармакотерапевтична дія: є селективним агоністом рекомбінантних 5-HT_{1B/1D}-рецепторів серотоніну судин людини; має помірну спорідненість із серотоніновими 5-HT_{1A}-рецепторами, не має суттєвої афінності або фармакологічної активності щодо 5HT₂, 5HT₃, 5HT₄-серотонінових рецепторів, α₁, α₂, β₁-адренергічних рецепторів, H₁, H₂-гістамінових рецепторів, M-холінових рецепторів, D₁, D₂-дофамінергічних рецепторів; спричиняє вазоконстрикцію, переважно краніальних судин, блокує вивільнення нейропептидів, зокрема вазоактивного інтестинального пептиду, який є основним ефекторним трансмітером рефлексорного збудження, що спричиняє вазодилатацію, яка лежить в основі патогенезу мігрени; призупиняє розвиток нападу мігрени без прямої аналгетичної дії; високоефективний у комплексному лікуванні мігренового статусу (серії з кількох тяжких, що настають один за одним, нападів мігрени тривалістю 2-5 діб); усуває мігрень, асоційовану з менструацією; поряд з купіруванням мігренового нападу послаблює нудоту, блювання (особливо при лівобічних атаках), фото- і фонофобію; впливає на ядра стовбура головного мозку, залучені в механізм розвитку нападів мігрени, що пояснює стійкий ефект повторного застосування при лікуванні серії з кількох нападів мігрени в одного пацієнта.

Показання для застосування ЛЗ: купірування нападу мігрени^{БНФ} з аурую і без аури.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: не призначений для застосування з метою профілактики мігренового нападу; рекомендується застосовувати якомога раніше після виникнення нападу мігрени, хоча ефективність препарату не залежить від того, через який час після початку нападу він був прийнятий. **Табл.** можна не запивати рідиною; табл. кладуть на язик, де вона розчиняється та проковтується зі слиною; ця лікарська ф-ма може застосовуватися в ситуаціях, коли рідини під рукою немає, або з метою уникнення нудоти та блювання, що можуть виникнути при запиванні таблеток рідиною; блистерну упаковку потрібно розкрити шляхом очищення її від фольги, а не шляхом продавлювання фольги таблеткою. Рекомендована доза для зняття мігренового нападу - 1 таблетка (2,5 мг); якщо симптоми не зникають або виникають повторно протягом 24-х годин, ефективним може бути застосування другої дози, яку слід прийняти не раніше ніж через 2 години після першої; при недостатній ефективності дози 2,5 мг допускається збільшення разової дози до 5 мг (вища разова доза); МДД 10 мг; протягом 24-часового періоду не слід застосовувати більше ніж 2 дози; пацієнтам, які застосовують інгібітори МАО-А, приймати рекомендується в дозі не більше 5 мг/добу. МДД для пацієнтів, які застосовують циметидин, становить не більше 5 мг/добу; МДД 5 мг рекомендується для пацієнтів, які приймають специфічні інгібітори СYP1A2, такі як флувоксамін та хінолони (напр. ципрофлоксацин). Для більшої ефективності **спрею** перед його застосуванням слід прочистити ніздрі (м'яко висякати); перед першим застосуванням препарату слід кілька разів натиснути на розпилювач, направляючи бризки в повітря, доки не сформується рівномірна хмаринка спрею; якщо після останнього застосування препарату минуло більше 4-х тижнів, перше розприскування слід зробити в повітря для запобігання застосуванню неповної дози; в період між використанням флакон з препаратом слід зберігати зі щільно закритим ковпачком; при застосуванні флакон тримати розпилювачем догори; нахилити голову трохи вперед, розпилювач ввести в ніздрю, злегка нахиливши кінчик розпилювача від центра носа, і зробити одне натиснення; у разі необхідності, повторити теж саме з іншою ніздрею. Початкова рекомендована доза - 2,5 мг; максимальна рекомендована доза - 5 мг; за відсутності ефекту або при рецидиві болю можливий повторний прийом, але не раніше ніж через 2 год. після першої дози; МДД - 10 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: табл.: астенія; біль у животі, у м'язах, в горлі, шиї, грудній клітці та кінцівках; блювання; відчуття важкості, жару, серцебиття; гіперестезії; головний біль; дисфагія; запаморочення; імперативні позиви до сечовипускання; ІМ; ішемія або інфаркт (напр. інтестинальна ішемія, інтестинальний інфаркт, інфаркт селезінки); коронароспазм; м'язова слабкість; незначне підвищення АТ; нудота; парестезії; поліурія; порушення чутливості; р-ції гіперчутливості, включаючи кропив'янку, набряк Квінке та анафілактичні р-ції; сонливість; стенокардія; стискання; сухість у роті; тахікардія; тимчасове підвищення системного артеріального тиску; часте сечовипускання. **Спрей:** амнезія; аритмія; астенія; безсоння; біль у животі, у м'язах; блювання; бронхіт; відчуття болю чи тиску в горлі, шиї, грудній клітці та кінцівках, підвищена пітливість; відчуття важкості, жару, серцебиття; втрата свідомості; галюцинації; гіперестезії; гіпертермія; головний біль; депресія; дефект поля зору; дизфагія; диспепсія; задишка; запаморочення; імперативні позиви до сечовипускання; ІМ, селезінки; ішемія та інфаркт судин ШКТ (клінічні прояви представлені болем в животі та діареєю з домішками крові або болем у черевній порожнині); кома; кон'юнктивіт; коронароспазм; лабільність артеріального тиску; м'язова слабкість; набряк гортані; нервово збудження; носова кровотеча; нудота; парестезії; поліурія; порушення чутливості; посилення кашлю; р-ції гіперчутливості, включаючи кропив'янку, набряк Квінке та анафілактичні/анафілактоїдні р-ції; риніт; с-м Рейно; синусит; сонливість; стенокардія; стискання; судоми; сухість очей; сухість у роті; тахікардія; тривога; фарингіт; цереброваскулярні порушення, у тому числі інсульт; часте сечовипускання; шум у вухах. Певні симптоми можуть належати самій мігрени.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату; тяжка або помірна АГ, неконтрольована АГ, легке неконтрольоване підвищення АТ; ІХС, у тому числі ІМ в анамнезі; симптоми чи ознаки, що відповідають ІХС; ангіоспастична стенокардія (стенокардія Принцметала); с-м Вольфа-Паркінсона-Уайта або аритмії, пов'язані з іншими додатковими провідними шляхами серця; ішемічний інсульт або транзиторна ішемічна атака та напади мігрени, що супроводжувалися геміплегією і базиллярними порушеннями в анамнезі; захворювання периферичних судин; кліренс креатиніну нижче 15 мл/хв; одночасне застосування

ерготаміну, похідних ерготаміну (включаючи метисергід) суматриптану, наратриптану чи інших агоністів рецепторів 5HT_{1B/1D}; одночасне застосування інгібіторів МАО-А та протягом 14 днів після їх відміни.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 2,5 мг., назально - 2,5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЗОЛМІГРЕН®	ПАТ "Фармак", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№10x1	20,00	
	ЗОЛМІГРЕН®	ПАТ "Фармак", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№2x1	32,50	
	ЗОЛМІГРЕН® СПРЕЙ	ТОВ Науково-виробнича фірма "МІКРОХІМ" (відповідальний за виробництво та контроль/випробування серії, не включаючи випуск серії)/ПАТ "Фармак" (відповідальний за випуск серії, включаючи контроль/випробування серії), Україна/Україна	спрей наз. доз. по 2мл (20доз) у фл.	2,5 мг/доза	№1	10,75	
	ЗОЛМІГРЕН® СПРЕЙ	ТОВ Науково-виробнича фірма "МІКРОХІМ" (Відповідальний за виробництво та контроль/випробування серії, не включаючи випуск серії)/ПАТ "Фармак" (Відповідальний за випуск серії, включаючи контроль/випробування серії), Україна/Україна	спрей наз. доз. по 2мл (20доз) у фл.	5 мг/доза	№1	5,75	
II.	РАПІМІГ	Актавіс ЛТД, Мальта	табл., що дисперг. у бл.	2,5мг; 5мг	№2x1, №6x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

6.4.5. Профілактика мігрені

Бета-блокатори (див. розділ «КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»)

- **Топірамат (Topiramate)** (див. п. 6.2.2.6. розділу "НЕВРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

6.4.6. Засоби для лікування нейропатичного болю

- **Прегабалін (Pregabalin)** ** (див. п. 6.2.2.6. розділу "НЕВРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Габапентин (Gabapentin)** ** (див. п. 6.2.2.6. розділу "НЕВРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Амітриптилін (Amitriptyline)** (див. п. 5.5.1. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЛІКУВАННІ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ")

6.5. Лікарські засоби, які застосовуються для лікування розсіяного склерозу

6.5.1. Глюкокортикостероїди

- **Метилпреднізолон (Methylprednisolone)** (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: суспензія для ін'єкцій - період загострення розсіяного склерозу ^{БНФ}; табл. - розсіяний склероз у фазі загострення ^{БНФ}; набряк мозку, спричинений пухлиною мозку ^{БНФ}; порошок для розчину для ін'єкцій - набряк головного мозку, зумовлений пухлиною ^{БНФ}, і/або допоміжне лікування при хірургічних операціях або променевої терапії; загострення розсіяного склерозу ^{БНФ}; г. травма спинного мозку (лікування починати в перші 8 год. після травми).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для підтвердження значного ефекту потрібно застосовувати відносно високі дози.

- **Дексаметазон (Dexamethasone)** * (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Преднізолон (Prednisolone)** * (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

6.5.2. Імуносупресори

- **Азатиоприн (Azathioprine)** * (див. п. 18.2.3. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: рецидивний переміжний розсіяний склероз.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендованою дозою для лікування рецидивного переміжного розсіяного склерозу є 2-3 мг/кг маси тіла н/добу у 2-3 прийоми; для досягнення ефективності лікування може знадобитися більше року; контроль за прогресуванням хвороби може бути встановлений після 2 років лікування.

6.5.3. Імуномодулюючі лікарські засоби

- **Інтерферон бета-1а (Interferon beta-1a)** (див. п. 18.1.2.1.1. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")
- **Інтерферон бета-1б (Interferon beta-1b)** (див. п. 18.1.2.1.1. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")
- **Глатирамер ацетат (Glatiramer acetate)** (див. п. 18.1.5.1. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")

6.5.4. Міорелаксанти

- **Баклофен (Baclofen)** (див. п. 10.4.2. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Тизанідин (Tizanidine)** (див. п. 8.10.2. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

6.5.5. Лікарські засоби, що застосовуються при вестибулярних порушеннях

- **Бетагістин (Betahistine)**

Фармакотерапевтична група: N07CA01 - засоби для лікування вестибулярних порушень.

Основна фармакотерапевтична дія: частково проявляє агоністичну активність щодо H₁-рецепторів, а також антагоністичну активність щодо H₃-рецепторів гістаміну в нервовій тканині та має незначну активність щодо H₂-рецепторів гістаміну. Збільшує обмін і вивільнення гістаміну шляхом блокування пресинаптичних H₃-рецепторів та індукції процесу зменшення кількості відповідних H₃-рецепторів. Збільшує мозковий кровотік в кохлеарній зоні, а також у всьому головному мозку; зменшує час відновлення вестибулярної функції після нейректомії; має дозозалежний інгібуючий вплив на генерацію пікових потенціалів у нейронах латеральних і медіальних вестибулярних ядер; зменшує тяжкість та частоту нападів запаморочення при вестибулярних запамороченнях та хворобі Меньєра.

Показання для застосування ЛЗ: хвороба і с-м Меньєра^{БНФ}, які характеризуються основними симптомами: запамороченням, що іноді супроводжується нудотою і блюванням, зниженням слуху (туговухістю), шумом у вухах; симптоматичне лікування вестибулярного запаморочення.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: добова доза для дорослих 24-48 мг, яку рівномірно розподіляють для прийому протягом доби (табл.: по 8 мг - 1-2 табл. 3 р/добу; табл. по 16 мг - 1/2-1 табл. 3 р/добу; табл. по 24 мг - 1 табл. 2 р/добу; р-н оральний: 1-2 мл розчину 3 р/добу або 3 мл 2 р/добу; табл., що диспергуються 1 табл. 2 р/добу). Табл. ковтати, запиваючи водою; р-н оральний можна розводити у стакані з водою або приймати нерозведеним; табл., що диспергуються покласти на язик і дати їй розпастися перед проковтуванням з водою або без води; застосовувати незалежно від прийому їжі; дозу підбирати індивідуально, залежно від ефекту.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль; диспепсія; незначні розлади шлунка (блювання, гастроінтестинальний біль, здуття живота, метеоризм); нудота; реакції гіперчутливості (наприклад анафілаксія, ангіоневротичний набряк, кропив'янка, висипання, свербіж).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого компонента ЛЗ; феохромоцитома.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 24 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АВЕРТИД	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"/РЕСІФАРМ ПАРЕТС СЛ, Україна/Іспанія	р-н д/орал. заст. по 60мл у конт. з доз. шпр.	8 мг/мл	№1	3,92	29,78/€
	БЕТАГІС	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	16 мг	№18x5	3,89	
	БЕТАГІС	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	16 мг	№10x3	4,28	
	БЕТАГІСТИН-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	8 мг	№10x3	5,10	
	БЕТАГІСТИН-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	16 мг	№10x3	3,60	
	БЕТАГІСТИН-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	24 мг	№10x3	2,78	

	ВЕСТІНОРМ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	8 мг	№10x3	8,50	
	ВЕСТІНОРМ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	16 мг	№10x6	5,00	
	ВЕСТІНОРМ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	16 мг	№10x3	5,25	
	ВЕСТІНОРМ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	24 мг	№10x6	4,00	
	ВЕСТІНОРМ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	24 мг	№10x3	4,50	
	МАКСГІСТИН	ТОВ "Фармекс Груп", Україна	табл. у бл.	8 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МАКСГІСТИН	ТОВ "Фармекс Груп", Україна	табл. у бл.	16 мг	№10x3	4,90	
	МАКСГІСТИН	ТОВ "Фармекс Груп", Україна	табл. у бл.	24 мг	№10x3	4,14	
II.	БЕ-СТЕДІ	Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт III), Індія	табл. у бл.	8 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БЕ-СТЕДІ	Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт III), Індія	табл. у бл.	16 мг	№10x3	10,51	25,52/\$
	БЕ-СТЕДІ	Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт III), Індія	табл. у бл.	24 мг	№10x3	10,01	25,52/\$
	БЕТАГІСТИН-ТЕВА	Каталент Джермані Шорндорф ГмБХ (виробництво нерозфасованої продукції, контроль серії (окрім мікробіологічного тестування))/Меркле ГмБХ (первинна та вторинна упаковка, контроль серії; дозвіл на випуск серії)/БАВ Інститут Гігієни та Забезпечення Якості Гмб, Німеччина/Німеччина/Німе ччина	табл. у бл.	8 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БЕТАГІСТИН-ТЕВА	Каталент Джермані Шорндорф ГмБХ (виробництво нерозфасованої продукції, контроль серії (окрім мікробіологічного тестування))/Меркле ГмБХ (виробництво нерозфасованої продукції, контроль серії)/БАВ Інститут Гігієни та Забезпечення Якості ГмБХ (контроль серії, Німеччина/Німеччина/Німе ччина	табл. у бл.	16 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БЕТАГІСТИН-ТЕВА	Роттендорф Фарма ГмБХ (виробництво нерозфасованої продукції, контроль серії (окрім мікробіологічного тестування))/Каталент Джермані Шорндорф ГмБХ (виробництво нерозфасованої продукції, контроль серії (окрім мікробіологічного тестування))/Меркле ГмБХ (перв, Німеччина/Німеччина/Німе ччина/Німеччина/Німеччин а	табл. у бл.	24 мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БЕТАСЕРК®	Майлан Лабораторіс САС, Франція	табл. у бл.	8 мг	№15x2; №30x1; №25x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БЕТАСЕРК®	Майлан Лабораторіс САС,	табл. у бл.	16 мг	№15x2, №2	відсутня у	

	Франція			1x2; №20x3	реєстрі ОВЦ	
БЕТАСЕРК®	Майлан Лабораторізі САС, Франція	табл. у бл.	24 мг	№10x1, №10x5; №20x1, №20x3, №20x5; №25x2, №25x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	
БЕТАСЕРК®	Рецифарм Паретс С.Л., Іспанія	р-н орал. по 60мл у пл. з доз. шпр.	8 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
БЕТАСЕРК® РАПІД	Фамар Легль, Франція	табл., що диспер. у бл.	24 мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ВАЗОСЕРК ДУО	АБДІ ІБРАХІМ Ілач Санаї ве Тіджарет А.Ш., Туреччина	табл. у бл.	24 мг	№15x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ВАЗОСЕРК ФОРТ	АБДІ ІБРАХІМ Ілач Санаї ве Тіджарет А.Ш., Туреччина	табл. у бл.	16 мг	№15x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ВЕРГОСТИН	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	табл. у бл.	8 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ВЕРГОСТИН	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	табл. у бл.	16 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ВЕРГОСТИН	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	табл. у бл.	24 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ВЕСТІБО	Каталент Німеччина Шорндорф ГмБХ (повний цикл)/Балканфарма-Дупниця АТ (первинне, вторинне пакування, випуск серії)/БАВ Інститут Гігієни та Забезпечення Якості ГмБХ (контроль серії (тільки мікробіологічне тестування)), Німеччина/Болгарія/Німеччина	табл. у бл.	8 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ВЕСТІБО	Каталент Німеччина Шорндорф ГмБХ (повний цикл)/Балканфарма-Дупниця АТ (первинне, вторинне пакування, випуск серії)/БАВ Інститут Гігієни та Забезпечення Якості ГмБХ (контроль серії (тільки мікробіологічне тестування)), Німеччина/Болгарія/Німеччина	табл. у бл.	16 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ВЕСТІБО	Каталент Німеччина Шорндорф ГмБХ (повний цикл)/Балканфарма-Дупниця АТ (первинне, вторинне пакування, випуск серії)/БАВ Інститут Гігієни та Забезпечення Якості ГмБХ (контроль серії (тільки мікробіологічне тестування)), Німеччина/Болгарія/Німеччина	табл. у бл.	24 мг	№10x2, №10x6; №15x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МЕДОГІСТИН	Медокемі ЛТД (Центральний Завод)/Фармацевтіш Аналітіш Лабораторіум	табл. у бл.	16 мг	№10x3	4,54	30,26/€

	Дуівен Б.В., Кіпр/Нідерланди						
МЕДОГІСТИН	Медокемі ЛТД (Центральний Завод)/Фармацевтіш Аналітіш Лабораторіум Дуівен Б.В., Кіпр/Нідерланди	табл. у бл.	24 мг	№10x3	3,43	30,26/€	

● **Цинаризин (Cinnarizine)**

Фармакотерапевтична група: N07CA02 - засоби, що застосовуються при вестибулярних порушеннях.

Основна фармакотерапевтична дія: пригнічує скорочення клітин гладкої мускулатури судин шляхом блокування кальцієвих каналів; знижує скорочувальну дію вазоактивних речовин, таких як норепінефрин і серотонін, блокуючи рецепторкеровані кальцієві канали (блокада надходження кальцію до клітин селективна по тканинах і призводить до зменшення вазоконстрикції без впливу на АТ і ЧСС); може додатково поліпшувати недостатню мікроциркуляцію шляхом підвищення еластичності мембрани еритроцитів і зниження в'язкості крові; збільшує клітинну резистентність до гіпоксії; пригнічує стимуляцію вестибулярної системи, що призводить до супресії ністагму та інших вегетативних розладів; запобігає появі або послаблює г. напади запаморочення.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування цереброваскулярних розладів, включаючи запаморочення, шум у вухах (тинітус), головний біль судинного походження, дратівливість, втрату пам'яті та нездатність зосереджуватися; профілактика мігрені; симптоматичне лікування периферичних судинних розладів, включаючи хворобу Рейно, акроціаноз, переміжну кульгавість, трофічні порушення, трофічні та варикозні виразки, парестезію, нічні спазми у кінцівках, холодні кінцівки; симптоматичне лікування лабіринтних розладів, включаючи запаморочення, шум у вухах^{БНФ}, ністагм, нудоту та блювання; профілактика хвороби руху^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для р/ос застосування; віддавати перевагу прийому після їди; **25 мг:** порушення мозкового кровообігу (дорослі та діти віком від 12 р.) - 1 табл. 3 р/добу; порушення периферичного кровообігу (дорослі та діти віком від 12 р.) - 2-3 табл. 3 р/добу; МДД 225 мг/добу; оскільки ефект при запамороченні залежить від дози, дозування слід поступово підвищувати; порушення рівноваги (дорослі та діти віком від 12 р.): 1 табл. 3 р/добу; хвороба руху (дорослі та діти віком від 12 р.) -1 табл. за півгодини до поїздки; прийом можна повторювати кожні 6 год.; хвороба руху (діти віком 5-12 р.) - може бути рекомендована половина дози, яка призначається дорослим. **75 мг:** при с-мах розладів мозкового кровообігу: 1 таб. 1 р/добу; с-мах периферичних судинних розладів: 2-3 таб. (150-225 мг) н/добу; при с-мах лабіринтних розладів: 1 таб. 1 раз н/добу. Максимальна доза не повинна перевищувати 225 мг (3 таб. н/добу). Оскільки ефект при запамороченні залежить від дози, дозування слід поступово підвищувати.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР; біль у верхній частині живота; блювання; відчуття сухості у роті, сухість у роті; вовчакоподібні симптоми; втомлюваність; гіпергідроз; гіперсомнія; головний біль; дискінезія; дискомфорт у шлунку; диспепсія; екстрапірамідні розлади; збільшення маси тіла; летаргія; лишаєподібний кератоз, включаючи червоний плескатий лишай; лишай Вільсона; нудота; обтураційна або холестатична жовтяниця; паркінсонізм; підгострий шкірний червоний вовчак; посилення або поява екстрапірамідних симптомів, іноді у поєднанні з депресивними станами; потовиділення; р-ції гіперчутливості; ригідність м'язів; розлади ШКТ; сонливість; тремор.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до допоміжних речовин препарату.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 90 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	ЦИНАРИЗИН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	табл. у бл.	0,025 г	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦИНАРИЗИН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	табл. у бл.	0,025 г	№10x100	1,44	
	ЦИНАРИЗИН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	табл. у бл.	0,025 г	№10x5	1,44	
	ЦИНАРИЗИН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	табл. у бл.	0,025 г	№10x50	1,44	
	ЦИНАРИЗИН "ОЗ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю	табл. у бл.	25 мг	№1x50	відсутня у реєстрі ОБЦ	

		"ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмежено, Україна/Україна/Україна					
	ЦИНАРИЗИН "ОЗ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмежено, Україна/Україна/Україна	табл. у бл.	25 мг	№50x1	1,51	
	ЦИНАРИЗИН ФОРТЕ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	75 мг	№10x2	2,20	
	ЦИННАРИЗИН СОФАРМА	АТ "Софарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка або виробництво за повним циклом)/АТ "ВІТАМІНИ" (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії), Болгарія/Україна	табл. у бл.	25 мг	№50x1	відсутня у реєстрі OBLЦ	
	ЦИННАРИЗИН СОФАРМА	АТ "Софарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка або виробництво за повним циклом)/ПАТ "Вітаміни" (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії), Болгарія/Україна	табл. у бл.	25 мг	№50x1	відсутня у реєстрі OBLЦ	
II.	СТУГЕРОН	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл. у бл.	25 мг	№25x2	4,90	27,21/\$

6.6. Засоби для лікування хвороб нервово-м'язового синапсу

6.6.1. Парасимпатоміметики

- **Піридостигмін (Pyridostigmin) ***

Фармакотерапевтична група: N07AA02 - інші засоби, що впливають на нервову систему. Парасимпатоміметики. Антихолінестеразні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: інгібує холінестеразу, чим сприяє накопиченню ацетилхоліну на рецепторах у холінергічних синапсах, призводить до більш вираженого і довготривалого ефекту ацетилхоліну; діє переважно на периферичну нервову систему; не впливає на ф-ції ЦНС, оскільки через низьку розчинність у ліпідах не проникає через гематоенцефалічний бар'єр.

Показання для застосування ЛЗ: міастенія гравіс^{ВООЗ БНФ}, міастенічний с-м (синдром Ламберта-Ітона) у складі комбінованої терапії з гуанідином.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для р/ос прийому дорослими; дозу та тривалість лікування визначає лікар, індивідуально, залежно від ступеня тяжкості захворювання та р-ції пацієнта на лікування; не можна перевищувати максимальну добову дозу; табл. приймають, запиваючи незначною кількістю рідини (приблизно ½ склянки води); на табл. є розподільна риска з одного боку, завдяки чому їх можна розділити на дві рівні частини, що дозволяє прийняти половину табл. Міастенія гравіс^{ВООЗ БНФ}: рекомендована доза 180–720 мг/добу в 3-4 прийоми. Міастенічний синдром (синдром Ламберта — Ітона): рекомендована доза 180–720 мг/добу в 3-4 прийоми; якщо ця доза не є досить ефективною, терапію можна доповнити гуанідином у дозі 375–1000 мг, який слід призначати між дозами піридостигміну.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: артеріальна гіпотензія; різке зниження АТ до розвитку судинного колапсу; брадикардичні порушення серцевого ритму; брадикардія до повної зупинки серця; висипання на шкірі; гіперсалівація; діарея; напади абдомінального болю у зв'язку з підвищеною перистальтикою кишечника; нудота, блювання; парадоксальна рефлекторна тахікардія; підвищена сльозотеча; посилене потовиділення; посилення секреції бронхіальних залоз; розлади акомодациї; слабкість м'язів; спазми; тремор м'язів; холінергічний криз (при передозуванні), що характеризується вираженою або зростаючою м'язовою слабкістю аж до паралічу дихальної системи, який загрожує життю; часті позиви до сечовипускання.

Протипоказання до застосування ЛЗ: відома з анамнезу гіперчутливість до складових препаратів; механічна непрохідність ШКТ і сечовивідних шляхів; захворювання, що супроводжуються підвищеним тонусом бронхіальної мускулатури (наприклад, БА і спастичний бронхіт); запалення ока (ірит); період годування грудьми.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,18 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	КАЛІМІН® 60 Н	Меркле ГмБХ (дозвіл на випуск серії)/Клоке Фарма-Сервіс ГмБХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка)/Клоке Верпакунгс-Сервіс ГмБХ (первинна та вторинна упаковка), Німеччина/Німеччина/Німеччина	табл. у фл.	60 мг	№50, №100	11,55	26,38/\$

• **Неостигмін (Neostigmine) ***

Фармакотерапевтична група: N07AA01 - антихолінестеразні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний блокатор холінестерази оборотної дії, має високу спорідненість з ацетилхолінестеразою; взаємодіє з каталітичним центром холінестерази і утворює стабільне з'єднання з ферментом, який тимчасово (від декількох хвилин до декількох годин) втрачає свою специфічну активність, після закінчення цього часу холінестераза звільняється від блокатора і відновлює свою активність; така дія призводить до накопичення і посилення дії ацетилхоліну у холінергічних синапсах; чинить виражену мускарінову та нікотінову дію, здатний напрямно збудливо впливати на скелетні м'язи, призводить до зниження ЧСС, підвищує секрецію екскреторних залоз (слинних, бронхіальних, потових та ШКТ) і сприяє розвитку гіперсаливації, бронхореї, підвищенню кислотності шлункового соку, звужує зіницю, спричинює спазм акомодативної мускулатури, знижує ВТ, підсилює тонус гладкої мускулатури кишечника (підсилює перистальтику та розслаблює сфінктери) і сечового міхура, викликає спазм бронхів, тонізує скелетну мускулатуру.

Показання для застосування ЛЗ: міастенія^{ВООЗ, БНФ}, г. міастенічна криза; рухові порушення після травми мозку; паралічі; відновлювальний період після перенесеного менінгіту, поліомієліту, енцефаліту; неврит, атрофія зорового нерва; атонія кишечника, атонія сечового міхура; усунення залишкових явищ після блокади нервово-м'язової передачі недеполяризуючими міорелаксантами^{ВООЗ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим: п/ш - 0,5-2 мг (1-4 мл) 1-2 р/добу, максимальна разова доза - 2 мг, МДД - 6 мг, курс лікування (окрім міастенії, міастенічного кризу, післяопераційної атонії кишечника та сечового міхура, передозування міорелаксантами) 25-30 днів, за необхідності повторно ч/з 3-4 тижні, значна частина загальної добової дози призначається в денний час; міастенія^{ВООЗ, БНФ}: п/ш або в/м 0,5 мг/добу; курс лікування тривалий, із зміною шляхів введення; міастенічний криз (з утрудненням дихання і ковтання) - 0,25-0,5 мг в/в, надалі п/ш, з невеликими інтервалами; післяопераційна атонія кишечника, сечового міхура, профілактика, в т. ч. післяопераційної затримки сечі: п/ш або в/м 0,25 мг, якомога раніше після операції, повторно - кожні 4-6 год. протягом 3-4 днів; як антидот міорелаксантів (після попереднього введення атропіну сульфату в дозі 0,6 - 1,2 мг в/в, до збільшення частоти пульсу до 80 уд/хв) вводять ч/з 0,5-2 хв у дозі 0,5-2 мг в/в повільно, при необхідності повторюють (у т.ч. атропін у разі брадикардії) загальною дозою не більше 5-6 мг впродовж 20-30 хв, під час процедури забезпечують ШВЛ; **дітям** (тільки в умовах стаціонару): міастенія gravis^{БНФ}: новонароджені - на початковому етапі 0,1 мг в/м, після цього дозу підбирають індивідуально, зазвичай 0,05-0,25 мг (або 0,03 мг/кг маси тіла) в/м кожні 2-4 год., для новонароджених добову дозу можна зменшити навіть до повного скасування; дити до 12 років - 0,2-0,5 мг у вигляді ін'єкцій, дозу корегують відповідно до реакції пацієнта; як антидот міорелаксантів (після попереднього введення атропіну сульфату 0,02-0,03 мг/кг маси тіла в/в, до збільшення частоти пульсу до 80 уд/хв.) - в/в повільно 0,05-0,07 мг/кг маси тіла протягом 1 хв., максимальна рекомендована доза - 2,5 мг; інші показання - 0,125-1 мг у вигляді ін'єкцій, дозу корегувати відповідно до потреб пацієнта.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР, включаючи анафілактичний шок; аритмія; атріовентрикулярна блокада; блювання; бради- або тахікардія; бронхоспазм; вузловий ритм; гіперемія; гіперсаливація; головний біль; дизартрія; діарея; загальні розлади та реакції у місці введення (посилення потовиділення, відчуття жару, сльозотеча, артралгія, р-ції в місці введення, включаючи гіперемію, свербіж, набряк шкіри); задишка; запаморочення; зниження АТ (переважно при парентеральному введенні); зупинка серця; кропив'янка; метеоризм; мимовільне випорожнення; мимовільне сечовипускання; міоз; непритомність; неспецифічні зміни на ЕКГ; нудота; оніміння ніг; порушення зору; посилення бронхіальної секреції; пригнічення дихання, аж до зупинки; р-кції гіперчутливості, включаючи висипання; свербіж, набряк шкіри; слабкість; сонливість; спазми і посмикування скелетної мускулатури, включаючи м'язи язика та гортані; спастичне чорення і посилення перистальтики кишечника; судоми; тремор; часте сечовипускання.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість діючої речовини або до інших компонентів препарату; епілепсія, гіперкінези, ваготомія, ІХС, стенокардія, аритмії, брадикардія, БА, виражений атеросклероз, тиреотоксикоз, виразкова хвороба шлунка та ДПК, перитоніт, механічна обструкція ШКТ та сечовивідних шляхів, гіпертрофія передміхурової залози, що супроводжується утрудненим сечовипусканням, г. період інфекційного захворювання, інтоксикації у різко ослаблених дітей; одночасне застосування із депольаризуючими міорелаксантами.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 2 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ПРОЗЕРИН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	0,5 мг/мл	№10x1	11,43	
	ПРОЗЕРИН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, ко, Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	0,5 мг/мл	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПРОЗЕРИН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, ко, Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	0,5 мг/мл	№10	11,43	
	ПРОЗЕРИН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, ко, Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	0,5 мг/мл	№5x2	11,43	
	ПРОЗЕРИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у конт. чар/уп.	0,5 мг/мл	№5x2	10,28	

• **Іпідакрин (Ipidacrin)**

Фармакотерапевтична група: N07AA - Засоби, що діють на нервову систему. Парасимпатоміметики. Антихолинестеразні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить безпосередній стимулюючий вплив на проведення імпульсу по нервових волокнах, міжнейрональних і нервово-м'язових синапсах периферичної і центральної нервової системи шляхом (1) блокади калієвих каналів мембрани нейронів та м'язових клітин та (2) оборотного інгібування холінестерази в синапсах. Посилює вплив ацетилхоліну, адреналіну, серотоніну, гістаміну, окситоцину на гладкі м'язи. Виявляє такі фармакологічні ефекти: поліпшує і стимулює проведення імпульсу в нервовій системі та нервово-м'язову передачу; відновлює проведення імпульсу в периферичній нервовій системі та нервово-м'язову передачу; посилює скорочуваність гладком'язових органів під впливом усіх антагоністів ацетилхолінових, адреналінових, серотонінових, гістамінових і окситоцинових рецепторів за винятком калію хлориду; покращує пам'ять та здатність до навчання; гальмує проградієнтний розвиток деменції; специфічно помірно стимулює ЦНС з окремими проявами седативного ефекту; проявляє аналгетичний та антиаритмічний ефект.

Показання для застосування ЛЗ: р-н для ін'єкцій: моно- і полінейропатія, полірадікулопатії, міастенія та міастенічний с-м різної етіології; бульбарні паралічі і парези; відновний період органічних уражень ЦНС, які супроводжуються руховими порушеннями. **Табл.:** нейропатії, неврити, поліневрити і полінейропатії, мієлополірадікулонеурити, міастенія та міастенічний с-м різної етіології; бульбарні паралічі і парези; порушення пам'яті різної етіології (хвороба Альцгеймера та інші форми старечого порушення розумової діяльності); при затримці розумового розвитку у дітей; відновлювальний період органічних уражень ЦНС, що супроводжуються руховими порушеннями; у комплексній терапії розсіяного склерозу та інших форм демієлінізуючих захворювань нервової системи; атонія кишечника.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н для ін'єкцій вводити в/м або п/ш; доза і тривалість лікування визначають індивідуально залежно від ступеня тяжкості захворювання; моно- і полінейропатії різного генезу - п/ш або в/м вводити 5-15 мг 1-2 р/добу, курс лікування 10-15 днів (у тяжких випадках до 30 днів); далі лікування продовжувати таблетованою формою ЛЗ; міастенія та міастенічний синдром - п/ш або в/м 5-30 мг 1-3 р/добу, з подальшим переходом на таблетовану форму; загальний курс лікування складає 1-2 місяці; за необхідності лікування можна повторити кілька разів із перервою між курсами в 1-2 місяці; бульбарні паралічі і парези - п/ш та в/м 5-15 мг 1-2 р/добу, курс лікування 10-15 днів, за можливістю переходити на таблетовану форму; відновний період при органічних ураженнях ЦНС - в/м 10-15 мг 1-2 р/добу, курс лікування до 15 днів, далі за можливістю 1-2 р/добу.

Табл. застосовувати р/ос: неврити - по 1 табл. 2-3 р/добу, курс лікування - від 10-15 днів при г. невритах, до 20-30 днів при хр. невритах; у разі необхідності курс лікування повторювати 2-3 рази з інтервалом у 2-4 тижні до досягнення максимального ефекту; мієлополірадікулонеурити і парези - по 1 табл. 2-3 рази на добу протягом 30-40 днів; курси лікування повторювати з перервою 1-2 місяці до досягнення терапевтичного ефекту; міастенія і міастенічний синдром - по 1-2 табл. 2-3 р/добу; при тяжких формах дозу можна підвищити до 200 мг/добу (по 2 табл. 5 р/добу через 2-3 години); лікування курсове, по черзі з класичними антихолінестеразними ЛЗ; розсіяний склероз і інші форми демієлінізуючих захворювань нервової системи, бульбарний параліч - по 1 табл. 3-5 р/добу протягом 60 днів 2-3 рази на рік; хвороба Альцгеймера та інші форми старечого порушення розумової діяльності - починати з дози 1-2 табл./добу, в 2 прийоми, з поступовим підвищенням дози на 2 табл./тиждень до 6-10 табл./добу (2 табл. 3-5 р/добу); тривалість лікування - від 4-х місяців до 1-го року; можлива курсова терапія - по 4-5 місяців з перервою в 1-2 місяці; органічні ураження ЦНС, що супроводжуються руховими порушеннями - по 1 табл. 2-3 рази на добу; середній курс лікування - 30 днів; у разі необхідності курс лікування можна повторити; атонія кишечника - від 1 до 3-х табл./добу, в 3 прийоми; курс лікування 1-3 тижні; діти віком від 12-ти років із затримкою розумового розвитку та захворюваннями периферичної нервової системи - 20 мг 2-3 р/добу; курс лікування 1-2 місяці, залежно від клінічної картини.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР, у тому числі, висипання, свербіж, кропив'янка, ангіоневротичний набряк; біль за грудиною; блювання; посилене відділення секрету бронхів, бронхоспазм; головний біль; діарея; жовтяниця; загальна слабкість; запаморочення; брадикардія; нудота; підвищення тону мати; потовиділення, слиновиділення, посилене серцебиття/знижена чсс; сонливість; судоми. Також для **р-ну для ін'єкцій** - зміни в місці введення; для **табл.** - біль в епігастральній ділянці.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів ЛЗ; епілепсія; екстрапірамідні порушення з гіперкінезами; стенокардія; виражена брадикардія; БА; вестибулярні розлади; механічна непрохідність кишечника і сечовивідних шляхів; виразкова хвороба шлунка або ДПК у стадії загострення.

Визначена добова доза (DDD): перорально/парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МЕДІАТОРН®	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у конт. чар/уп.	15 мг/мл	№10x1	346,50	
	ПАРАПЛЕКСІН®	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	5 мг/мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПАРАПЛЕКСІН®	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	15 мг/мл	№5x2	200,00	
II.	ИПИГРИКС®	АТ "Гріндекс" (виробник, який відповідає за випуск серії, включаючи контроль серії/випробування)/ХБМ Фарма с.р.о. (виробник готового лікарського	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у чар/уп.	5 мг/мл	№5x2	308,77	26,85/€

	засобу (всі стадії виробничого процесу, крім випуску серії), Латвія/Словаччина					
ИПИГРИКС®	АТ "Гріндекс" (виробник, який відповідає за випуск серії, включаючи контроль серії/ випробування)/ХБМ Фарма с.р.о. (виробник готового лікарського засобу (всі стадії виробничого процесу, крім випуску серії), Латвія/Словаччина	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у чар/уп.	15 мг/мл	№5x2	392,69	30,65/€
ИПИГРИКС®	АТ "Гріндекс", Латвія	табл. у бл.	20 мг	№25x2	308,50	31,84/€
НЕЙРОМІДИН®	АТ "Олайнфарм"/АТ "Софарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка), Латвія/Болгарія	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у конт. чар/уп.	5 мг/мл	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НЕЙРОМІДИН®	АТ "Олайнфарм"/АТ "Софарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка), Латвія/Болгарія	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у конт. чар/уп.	15 мг/мл	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НЕЙРОМІДИН®	АТ "Олайнфарм", Латвія	табл. у бл.	20 мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

6.6.2. Неспецифічна терапія

6.6.2.1. Препарати калію

(див. п. 10.5.7. розділу «АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»)

6.6.2.2. Антагоністи альдостерону

(див. розділ «КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»)

6.6.3. Імуномодулюючі лікарські засоби

6.6.3.1. Глюкокортикостероїди

(див. п. 6.5.1. розділу «НЕВРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»)

6.6.3.2. Імуносупресори

(див. п. 6.5.2. розділу «НЕВРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»)

6.6.4. Інші лікарські засоби, що застосовуються у лікуванні периферичної нервової системи

6.6.4.1. Імуноглобулін людини нормальний

- *Імуноглобулін людини нормальний (Immunoglobulin human normale ad usum extravascular) ** (див. п. 18.1.1.1. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")

6.6.4.2. Кислота тіоктова

- *Кислота тіоктова (Thioctic acid)* (див. п. 7.1.3.4. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

6.7. Лікарські засоби, що застосовуються при цереброваскулярних захворюваннях

6.7.1. Антитромботичні лікарські засоби

6.7.1.1. Інгібітори агрегації тромбоцитів

- *Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid) * *** (див. п. 2.15.3.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- *Клопідогрель (Clopidogrel)* (див. п. 13.8.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

6.7.1.2. Фібринолітичні засоби

- *Альтеплазе (Alteplase)* (див. п. 13.8.3. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

6.7.1.3. Група гепарину

- *Гепарин (Heparin) ** (див. п. 13.8.1.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

6.7.1.3.1. Гепарини низької молекулярної маси

- *Далтепарин (Dalteparin)* (див. п. 13.8.1.3. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- *Еноксапарин (Enoxaparin)* (див. п. 13.8.1.3. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- *Надропарин (Nadroparin)* (див. п. 13.8.1.3. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

6.7.1.3.2. Непрямі антикоагулянти

- **Варфарин (Warfarin)** (див. п. 13.8.1.1. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Дабігатрану етексилат (Dabigatran etexilate)** (див. п. 2.15.1.3. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Ривароксабан (Rivaroxaban)** (див. п. 13.8.1.5. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

6.7.2. Вазоактивні лікарські засоби

6.7.2.1. Периферичні вазодилататори

- **Ніцерголін (Nicergoline)**

Фармакотерапевтична група: C04AE02 - засоби, що впливають на СС систему. Периферичні вазодилататори. Алкалоїди ріжків.

Основна фармакотерапевтична дія: похідне ерголіну з альфа-1-адренергічною блокуючою активністю, у разі його парентерального застосування; після застосування р/ос піддається швидкому і екстенсивному метаболізму з утворенням ряду метаболітів, за рахунок яких також спостерігається активність на різних рівнях ЦНС. При застосуванні р/ос проявляє численні нейрофармакологічні ефекти: підвищує надходження та споживання глюкози в мозку, підсилює біосинтез білка та нуклеїнових кислот, впливає на різні нейротрансмітерні системи. Підвищує активність і перенесення до ділянки мембрани кальційзалежних ізоформ протеїнази С (бере участь у механізмі секреції розчинного амілоїдного попередника протеїну, що призводить до посилення його вивільнення і до зниження продукції патологічного бета-амілоїду). Справляє нормалізуючий вплив на результати ЕЕГ у пацієнтів літнього віку та дорослих молодого віку при гіпоксії, підвищуючи α - та β -активність, а також знижуючи δ - та θ -активність. Позитивні зміни щодо викликаного потенціалу та відповіді на подразнення були зареєстровані у пацієнтів з деменцією легкого або помірного ступеня різної етіології (сенільна деменція альцгеймерівського типу та мультиінфарктна деменція); після довготривалого лікування ніцерголіном (2–6 місяців) ці зміни корелюють з покращенням клінічних симптомів. Зменшує когнітивні порушення та порушення поведінки, пов'язані із деменцією.

Показання для застосування ЛЗ: р-н для ін'єкцій та табл., вкриті цукровою оболонкою: г. та хр. цереброваскулярні порушення метаболізму внаслідок атеросклерозу, тромбозу і емболії церебральних судин, транзиторних порушень церебрального кровообігу (транзиторні ішемічні атаки); головний біль; додаткова терапія при лікуванні АГ. **Табл., вкриті п/о:** постінсультні стани, судинна деменція (мультиінфарктна деменція), дегенеративні стани, пов'язані із деменцією (сенільна та пресенільна деменція типу Альцгеймера, деменція при хворобі Паркінсона).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: режими дозування, тривалість лікування та шлях введення залежать від вираженості окремих клінічних проявів захворювання. **Р-н для ін'єкцій:** в/м ін'єкції: 2–4 мг (2–4 мл) 2р/добу (використовується розчинник, що додається). Повільна в/в інфузія: 4–8 мг, розчинених у 100 мл фізіологічного р-ну або р-ну глюкози. За рішенням лікаря ця доза може бути повторно застосована кілька р/добу. Внутрішньоартеріальні ін'єкції: 4 мг, розчинених у 10 мл фізіологічного р-ну, протягом 2 хв. Режим дозування, тривалість лікування та шлях введення залежать від індивідуальної клінічної ситуації. У деяких випадках доцільно розпочинати лікування із парентерального введення, а потім перейти на тривалий прийом р/ос. **Табл., вкриті п/о:** добова доза - 1 табл. 1-2 р/добу (30–60 мг). Добова доза для дорослих - 30 мг (тимчасово можна збільшити до 60 мг). **Табл. вкриті цукровою оболонкою:** добова доза - 5–10 мг 3 р/добу через однакові проміжки часу, бажано між прийомами їжі, для безперервного лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: артеріальна гіпотензія; безсоння; висипання; відчуття жару; головний біль; дискомфорт у животі; діарея; запаморочення; запор; нудота; підвищення рівня сечової кислоти в крові; припливи; свербіж; сонливість; сплутаність свідомості; фіброз. Також для **р-ну для ін'єкцій** - ажитація; для **табл.** - гіперемія, тривожне збудження.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини, алкалоїдів ріжків або до будь-якого компонента препарату; нещодавно перенесений ІМ; г. кровотеча; ортостатична гіпотензія; тяжка брадикардія.

Визначена добова доза (DDD): перорально/парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НІЦЕРГОЛІН	ПАТ "Галичфарм", Україна	табл., в/о у бл.	10 мг	№10x3	100,00	
	НІЦЕРОМАКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	4 мг	№1x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НІЦЕРОМАКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	4 мг	№4x1	1026,86	
II.	СЕРМІОН®	Пфайзер Італія С.р.л., Італія	табл., вкриті п/о у бл.	30 мг	№15x2	312,95	26,17/\$
	СЕРМІОН®	Пфайзер Італія С.р.л., Італія	табл., вкриті ц/о у бл.	5 мг	№15x2	152,00	25,16/\$
	СЕРМІОН®	Пфайзер Італія С.р.л., Італія	табл., вкриті ц/о у бл.	10 мг	№25x2	234,54	25,16/\$
	СЕРМІОН®	Васт Фарма, С.А.	ліоф. д/р-ну	4 мг	№2x2;	876,75	25,16/\$

	(виробництво, контроль якості, первинне пакування, випуск серії для порошку)/Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ (виробництво, контроль якості, первинне пакування, випуск серії для розчинника; вторинне пакування та випуск серії для кінцевого, Іспанія/Бельгія	д/ін'єк. у фл.з розч. у чар. уп.;та у кор.		№1x4		
--	---	--	--	------	--	--

6.7.2.2. Розчини електролітів

- **Магнію сульфат (Magnesium sulfate)** * (див. п. 10.5.5. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

6.7.3. Антигіпертензивні лікарські засоби

6.7.3.1. Інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту

(див. п.2.4. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

6.7.3.2. Блокатори рецепторів ангіотензину II

(див. п.2.5. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

6.7.3.3. Тіазидоподібні діуретики

(див. п.2.9.2. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

6.7.3.4. Бета-адреноблокатори

(див. п.2.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

6.7.3.5. Блокатори кальцієвих каналів

6.7.3.5.1. Селективні блокатори кальцієвих каналів

- **Німодипін (Nimodipine)** ^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: C08CA06 - селективні блокатори кальцієвих каналів з переважним впливом на судини; похідні дигідропіридину.

Основна фармакотерапевтична дія: є антагоністом кальцієвих каналів 1,4-дигідропіридинової групи; добре проникає через гематоенцефалічний бар'єр. При патологічних станах, пов'язаних із підвищеним проникненням іонів Ca²⁺ до нервових клітин, наприклад, при церебральній ішемії, вважають, що покращує їх стабільність та функціональні властивості.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика і лікування ішемічних неврологічних розладів, обумовлених спазмом судин головного мозку після субарахноїдального крововиливу внаслідок розриву аневризми ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: У разі застосування для одночасного лікування разом із препаратами, індукуючими або інгібуючими систему цитохрому P450 3A4, може бути потрібна корекція дози. **Р-н для ін'єкцій.** Пацієнтам, яким об'ємне перевантаження небажане або протипоказане, ЛЗ можна вводити через центральну вену за допомогою катетера без додаткового введення супутнього р-ну для інфузій; призначають у вигляді тривалої в/в інфузії через центральний катетер із використанням інфузійного насоса [системи з'єднуються одна з одною за допомогою триканального блока-клапана. Р-н для інфузій не вводити в пакет або флакон із коінфузійним розчином та не змішувати з іншими ЛЗ; можна вводити разом з одним із таких розчинів: 5% розчином глюкози, 0,9% розчином натрію хлориду, розчином Рінгера лактату, розчином Рінгера лактату з магнієм, розчином декстрану 40, полі (0-2-гідроксіетіл) крохмалю 6%, альбуміном плазми крові 5% або цільною кров'ю, манітол у період до 24-х годин. Співвідношення розчин для інфузій та супутній розчин має становити 1:4]. Призначення ЛЗ, розчину для інфузій, може бути продовжено протягом анестезії, хірургічного втручання та ангіографії. Курс інфузійної терапії розпочинають із в/в введення у дозі 1 мг німодипіну/год протягом перших 2-х год (близько 15 мкг/кг/год). За умови доброї переносимості ЛЗ і при відсутності вираженої артеріальної гіпотензії після перших двох год введення дозу збільшують до 2 мг/год (близько 30 мкг/кг/год). Пацієнтам із масою тіла значно менше 70 кг і особам із лабільним АТ введення розпочинати з дози 0,5 мг/год. **Введення в цистерни головного мозку.** У ході хірургічного втручання свіжоприготований р-н німодипіну (1 мл інфузійного розчину і 19 мл розчину Рінгера), підігрітий до температури тіла, можна вводити інтрацистернально; вказаний розчин використати одразу після приготування. **Профілактичне застосування.** В/в терапію слід розпочинати не пізніше ніж через 4 дні після крововиливу і продовжувати протягом усього періоду максимального ризику розвитку вазоспазму (до 10-14 дня після субарахноїдального крововиливу). **Терапевтичне застосування.** Якщо вже наявні ішемічні неврологічні порушення, спричинені вазоспазмом внаслідок субарахноїдального крововиливу, інфузійну терапію потрібно розпочинати якомога раніше і проводити протягом 5-14 днів. Якщо у процесі профілактичного/терапевтичного застосування розчину проводиться хірургічне лікування крововиливу, внутрішньовенну терапію німодипіном необхідно продовжувати як мінімум протягом 5 днів після оперативного втручання. Після закінчення інфузійної терапії протягом наступних 7-ми днів або довше рекомендується р/ос прийом таблетованої форми у дозі 60 мг 6 р/добу із дотриманням інтервалу між прийомами не менше 4-х годин.

Табл. ковтати не розжовуючи та приймати незалежно від прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю рідини (бажано 1 склянкою води). Інтервал між прийомом кожної дози повинен становити не менше 4 годин. Уникати вживання грейпфрутового соку. Після попередньої інфузійної терапії р-ном для ін'єкцій, що тривала 5-14 днів, призначають у добовій дозі 360 мг (6x60 мг) впродовж близько 7-ми днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР; брадикардія; вазодилатація; гіпотензія; головний біль; кишкова непрохідність; нудота; р-ції у місці ін'єкцій та інфузій, тромбофлебіт у ділянці інфузії; тахікардія; транзиторне підвищення активності ферментів печінки; тромбоцитопенія; шкірний висип.

Протипоказання до застосування ЛЗ: індивідуальна підвищена чутливість до до будь-якого компонента ЛЗ; також табл. протипоказані до одночасного застосування із рифампіцином або протиепілептичними засобами (фенобарбітал, фенітоїн, карбамазепін).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НІМОДИПІН	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	30 мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НІМОДИПІН	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	30 мг	№10x3	32,72	
II.	НЕМОТАН	Медокемі ЛТД (Завод AZ), Кіпр	табл., вкриті п/о у бл.	30 мг	№10x10	60,51	30,26/€
	НЕМОТАН	Медокемі ЛТД (Завод AZ), Кіпр	табл., вкриті п/о у бл.	30 мг	№10x3	80,68	30,26/€
	НІМОТОП®	Байер АГ (весь цикл виробництва: виробництво in-bulk, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)/КВП Фарма + Ветеринар Продукте ГмбХ (альтернативний виробник (вторинне пакування))/Солюфарм Фармацойтіше Ерцойгніссе ГмбХ (альтерн, Німеччина/Німеччина/Німе ччина	р-н д/інфуз. у фл. по 50мл	10 мг/50 мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НІМОТОП®	Байер АГ, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	30 мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НІТОПІН	Анфарм Еллас С.А., Греція	табл., вкриті п/о у бл.	30 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

6.7.4. Гіполіпідемічні засоби

(див. п.2.16. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

6.7.5. Ноотропні лікарські засоби, похідні ГАМК

- **Кислота гама-аміномасляна (Aminobutyric acid) ****

Фармакотерапевтична група: N06BX - психоаналептики. Інші психостимулюючі та ноотропні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: основний медіатор процесів гальмування у ЦНС. Стимулює ГАМК-ергічну систему, що забезпечує нормалізацію динаміки нервових процесів. Активує енергетичні процеси у тканинах мозку, покращує утилізацію ними глюкози, підвищує дихальну активність та покращує кровопостачання. Сприяє відновленню рухової активності, мовлення, інших кіркових функцій після порушення мозкового кровообігу. Чинить психостимулювальну дію: покращує розумову діяльність, пам'ять, концентрацію уваги, а також послаблює вестибулярні розлади, порушення сну; сприяє відновленню рухів та мовлення після порушення мозкового кровообігу. Сприяє зниженню і стабілізації підвищеного АТ та зменшенню суб'єктивних симптомів АГ (запаморочення, порушення сну). Чинить помірну антигіпотоксичну та протисудомну дію. При ЦД знижує вміст глюкози, при нормальному вмісті глюкози у крові чинить зворотній ефект (за рахунок глікогенолізу).

Показання для застосування ЛЗ: у складі комплексного лікування захворювань ЦНС: судинні захворювання головного мозку (атеросклероз, ураження церебральних судин при АГ); хр. недостатність мозкового кровообігу з порушенням пам'яті, концентрації уваги, мовлення, запамороченнями, головним болем; енцефалопатія (алкогольна, постінсультна, посттравматична); дитячий церебральний параліч; відставання розумового розвитку у дітей віком від 5-ти років; старече слабоумство (початкові стадії деменції); морська та повітряна хвороби (для профілактики та лікування симптомокомплексу захитування).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймати внутрішньо до їди. *Дорослим* по 500-1250 мг за прийом залежно від перебігу та тяжкості захворювання; добова доза 1500-3000 мг за 3 прийоми. *Дітям* від 5-ти років, залежно від перебігу і тяжкості захворювання, по 500-3000 мг/добу за 3 прийоми; курс лікування - від 2-х тижнів до 6-ти місяців. За необхідності проводити повторні курси. Для лікування симптомокомплексу захитування призначати

дорослим по 500 мг та дітям віком від 5-ти років по 250 мг 3 р/добу протягом 3-4 діб. З профілактичною метою дорослим по 500 мг 3 р/добу протягом 3-х діб, що передують поїздці або можливого захитуванню. Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР, включаючи шкірні висипання, свербіж; безсоння; блювання; відчуття жару; диспептичні явища; колювання АТ (частіше у перші дні застосування); нудота; підвищення температури; порушення сну.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів ЛЗ; г. ниркова недостатність.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	АМІНАЛОН	АТ "ВІТАМІНИ", Україна	табл., в/о у бл.	250мг	№10, №50, №100	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АМІНАЛОН	ПАТ "Вітаміни", Україна	табл., в/о у бл.	250мг	№10, №50, №100	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АМІНАЛОН®-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	капс. тверді у бл.	250мг	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АМІНАЛОН®-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	капс. тверді у бл. в пач.	250мг	№10x5	27,27	

7. ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

7.1. Засоби, що застосовуються для лікування цукрового діабету

7.1.1. Інсуліни

7.1.1.1. Інсуліни та їх аналоги для ін'єкцій короткої тривалості дії

7.1.1.2. Інсуліни та аналоги для ін'єкцій середньої тривалості дії

7.1.1.3. Комбіновані препарати інсулінів та аналогів для ін'єкцій короткої та середньої тривалості дії

7.1.1.4. Інсуліни та аналоги для ін'єкцій тривалої дії

7.1.2. Пероральні цукрознижуючі засоби

7.1.2.1. Бігуаніди

7.1.2.2. Похідні сульфонілсечовини

7.1.2.3. Тіозолідиндіони (інсулінсенситайзери)

7.1.2.4. Інгібітори дипептидилпептидази 4

7.1.2.5. Комбінації пероральних цукрознижуючих засобів

7.1.2.6. Інші цукрознижуючі засоби

7.1.3. Інші лікарські засоби, які використовуються при цукровому діабеті

7.1.3.1. Інгібітори альдозоредуктази

7.1.3.2. Засоби для лікування ожиріння

7.1.3.2.1. Лікарські засоби периферичної дії для лікування ожиріння

7.1.3.3. Антигіпертензивні засоби

7.1.3.4. Засоби для лікування ускладнень цукрового діабету

7.2. Засоби для лікування гіпоглікемії

7.3. Засоби для лікування захворювань щитоподібної залози

7.3.1. Тиреоїдні гормони

7.3.2. Антитиреоїдні засоби

7.3.3. Препарати йоду

7.3.4. Лікарські засоби, що використовуються для симптоматичної терапії захворювань щитоподібної залози

7.3.4.1. β -адреноблокатори

7.3.4.2. Антиаритмічні лікарські засоби

7.3.4.3. Серцеві глікозиди

7.3.4.4. Сечогінні засоби

7.3.4.5. Лікарські засоби, що впливають на метаболізм серцевого м'язу

7.3.4.6. Лікарські засоби, що впливають на метаболізм головного мозку та мозковий кровообіг

7.3.4.7. Вітаміни

7.3.4.8. Препарати глюкокортикоїдних гормонів для лікування захворювань щитоподібної залози та їх ускладнень

7.4. Засоби для лікування захворювань наднирників

7.4.1. Глюкокортикоїди

7.4.2. Мінералокортикоїди

7.5. Засоби для лікування захворювань статевих залоз

7.5.1. Жіночі статеві гормони та їх антагоністи

7.5.1.1. Естрогени

7.5.1.2. Комбіновані лікарські засоби

7.5.1.3. Антагоністи рецепторів естрогенів

7.5.1.4. Інгібітори ферментів

7.5.1.5. Гестагени

7.5.1.6. Антагоністи рецепторів гестагенів

7.5.2. Чоловічі статеві гормони та їх антагоністи

- 7.5.2.1. Тестостерон
- 7.5.2.2. Антагоністи рецепторів андрогенів
- 7.5.2.3. Інгібітори ферментів
- 7.5.3. Анаболічні стероїди
- 7.5.4. Засоби із змішаною естроген-гестаген-андрогенною активністю
- 7.6. Засоби для лікування захворювань гіпоталамо-гіпофізарної системи
 - 7.6.1. Препарати гормонів гіпоталамуса
 - 7.6.1.1. Аналоги гонадотропін-релізинг гормона (гонадореліна)
 - 7.6.1.2. Аналоги соматостатину
 - 7.6.1.3. Анти-гонадотропін-релізинг гормони
 - 7.6.2. Препарати гормонів гіпофіза
 - 7.6.2.1. Соматропін та аналоги
 - 7.6.2.2. Аналоги вазопресину
 - 7.6.2.3. Окситоцин та його аналоги
 - 7.6.2.4. Гонадотропні гормони
- 7.7. Засоби, що застосовуються для лікування остеопорозу
 - 7.7.1. Патогенетична терапія
 - 7.7.1.1. Естрогени та естроген-гестагенні засоби
 - 7.7.1.2. Антипаратиреоїдні засоби
 - 7.7.1.3. Бісфосфонати
 - 7.7.1.4. Препарати вітаміну D та його аналоги
 - 7.7.1.5. Препарати кальцію
 - 7.7.1.6. Препарати фтору
 - 7.7.1.7. Препарати стронцію
 - 7.7.1.8. Анаболічні стероїди
 - 7.7.2. Симптоматична терапія
 - 7.7.2.1. Анальгетики
 - 7.7.2.2. Нестероїдні протизапальні засоби
 - 7.7.2.3. Міорелаксанти
- 7.8. Інші лікарські засоби, що застосовуються у лікуванні ендокринологічних захворювань
 - 7.8.1. Дофаміноміметики
- 7.9. Невідкладна допомога при гострих ендокринологічних станах
 - 7.9.1. Гіпоглікемічна кома
 - 7.9.2. Гіперглікемічна кома
 - 7.9.2.1. Гіперглікемічна кетоацидотична кома
 - 7.9.2.2. Гіперосмолярна некетоацидотична кома
 - 7.9.2.3. Гіперлактацидемічна кома
 - 7.9.3. Кома при гострій недостатності наднирникових залоз
- 7.1. Засоби, що застосовуються для лікування цукрового діабету
 - 7.1.1. Інсуліни

7.1.1.1. Інсуліни та їх аналоги для ін'єкцій короткої тривалості дії

- **Інсулін людини (*Insulin human*)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: А10АВ01 - протидіабетичні засоби. Інсуліни та аналоги короткої дії.

Основна фармакотерапевтична дія: цукрознижувальний ефект інсуліну полягає у сприянні поглинанню глюкози тканинами після зв'язування інсуліну з рецепторами м'язових і жирових клітин, а також в одночасному пригніченні виділення глюкози з печінки; у середньому характер дії після п/ш ін'єкції такий: початок дії: протягом 1/2 год.; максимальний ефект: від 1,5 до 3,5 год.; тривалість дії: приблизно 7-8 год.

Показання для застосування ЛЗ: ЦД^{вооз бнф, пмд}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводиться п/ш, в/в^{вооз бнф}; інтервал між п/ш ін'єкцією та прийманням їжі не більше 30 хв; дозування інсуліну індивідуальне і визначається лікарем відповідно до потреб хворого, у середньому добова потреба в інсуліні при лікуванні діабету 0,3-1,0 МО/кг маси тіла, у період часткової ремісії, а також у хворих із залишковою ендогенною продукцією інсуліну потреба в інсуліні може знижуватися, тоді як при

станах резистентності до інсуліну (у період пубертації або при ожирінні) добова потреба в інсуліні може істотно зростати; п/ш при кожній наступній ін'єкції місце уколу змінювати в межах ін'єкційної ділянки; в/в інфузії має виконувати лише лікар: інфузійні системи з інсуліном 100 МО/мл при концентрації інсуліну людського від 0,05 ОД/мл до 1,0 ОД/мл в інфузійному р-ні, який містить 0,9% р-н хлориду натрію, 5% або 10 % декстрази і 40 ммоль/л хлориду калію і знаходиться в поліпропіленових інфузійних ємностях, є стабільними при кімнатній t° протягом 24 год., деяка кількість інсуліну на початку може адсорбуватися на внутрішній поверхні інфузійної ємності; під час інфузії інсуліну проводити моніторинг концентрації глюкози в крові. в/м ін'єкції має виконувати лише лікар.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпоглікемія (в тяжкій формі може призвести до втрати свідомості і в крайніх випадках - до смерті) ; гіперглікемія; периферична нейропатія; порушення рефракції; ліподистрофія (ліпоатрофія та ліпогіпертрофія) може розвинути в місцях ін'єкцій, якщо хворий не змінює місця ін'єкцій в одній ділянці; місцева гіперчутливість: шкірні р-ції (почервоніння, набряк, свербіж, біль і гематоми), які зазвичай проходять при продовженні лікування, іноді - набряк; анафілактичні р-ції, кропив'янка, свербіж, висип; іншими симптомами генералізованої гіперчутливості є шкірні висипання, свербіж, пітливість, розлади травного тракту, ангіоневротичний набряк, утруднене дихання, прискорене серцебиття, зниження АТ та втрата свідомості;інсулінорезистентність; тимчасове загострення діабетичної ретинопатії.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіпоглікемія, гіперчутливість до людського інсуліну або будь-якого інгредієнта препарату.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 40 МО

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ІНСУВІТ® Н	Біокон Лімітед/ПАТ "Фармак", Індія/Україна	р-н д/ін'єк. по 3мл, 10мл у картр. в бл. та фл.	100 МО/мл	№1, №5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНСУМАН РАПІД®	Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ "Фарма Лайф" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ», Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл, 10мл у фл.; по 3мл у картр. в бл. та одност. шпр.-руч. СолоСтар® (без голк.); 5мл у фл.р-н д/ін'єк.по 3мл у картр. в бл.;р-н д/ін'єк. по 5мл у фл. в кор.	100 МО/мл	№1, №5, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНСУМАН РАПІД®	Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ "Фарма Лайф" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ», Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Україна	по 3мл у картр. в бл.	100 МО/мл	№5x1	13,33	28,45/\$
	ІНСУМАН РАПІД®	Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ "Фарма Лайф" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ», Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл у фл. в кор.;	100 МО/мл	№5	9,60	28,45/\$
	ФАРМАСУЛІН® Н	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк.по 10мл у фл.	100 МО/мл	№1	11,00	
	ФАРМАСУЛІН® Н	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк.по 5мл у фл.	100 МО/мл	№1	11,00	
	ФАРМАСУЛІН® Н	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по	100 МО/мл	№5x1	14,67	

			3мл у картр. в бл.				
	ХУМОДАР® Р 100Р	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна	р-н д/ін'єк. по 3мл у картр.	100МО/мл	№3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ХУМОДАР® Р 100Р	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна	р-н д/ін'єк.по 5мл у фл.	100МО/мл	№1	10,00	
	ХУМОДАР® Р 100Р	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна	р-н д/ін'єк.по 5мл у фл.	100МО/мл	№5	10,00	
	ХУМОДАР® Р 100Р	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна	р-н д/ін'єк. по 3мл у картр.	100МО/мл	№5	12,67	
	ХУМОДАР® Р 100Р	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна	р-н д/ін'єк.по 10мл у фл.	100МО/мл	№1	9,80	
II.	АКТРАПІД® НМ	А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в флакони, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; виробник для маркування та упаковки флаконів, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон, Данія/Франція	р-н д/ін'єк. по 10мл у фл.	100 МО/мл	№1	11,85	27,74/\$
	АКТРАПІД® НМ ПЕНФІЛ®	А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; виробник для маркування та упаковки Пенфіл®, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон, Данія/Франція/Бразилія	р-н д/ін'єк. по 3мл у картр. в кор.	100 МО/мл	№5	14,77	27,12/\$
	АКТРАПІД® НМ ФЛЕКСПЕН®	А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, первинне пакування; контроль якості продукту в первинному пакуванні (картриджі Пенфіл®) та відповідальний за випуск серії готового продукту (ФлексПен®); виробник нерозфасованого продукту, первинне пакув, Данія/Франція/Бразилія	р-н д/ін'єк. по 3мл у картр. в одностр. шпр.-руч.	100 МО/мл	№ 1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АКТРАПІД® НМ ФЛЕКСПЕН®	А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, первинне пакування; контроль якості продукту в первинному пакуванні (картриджі Пенфіл®) та відповідальний за випуск серії готового продукту (ФлексПен®); виробник нерозфасованого продукту, первинне пакув,	р-н д/ін'єк. по 3мл у картр. в одностр. шпр.-руч.	100 МО/мл	№ 5	15,60	26,04/\$

	Данія/Франція/Бразилія						
ГЕНСУЛІН Р	БІОТОН С.А. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща	р-н д/ін'єк. по 3мл у картр. в бл.	100 МО/мл	№5x1	11,94	29,72/€	
ГЕНСУЛІН Р	БІОТОН С.А. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща	р-н д/ін'єк. по 10 мл у флаконі	100 МО/мл	№1	8,13	29,72/€	
ХУМУЛІН РЕГУЛЯР	Ліллі Франс, Франція	р-н д/ін'єк. по 3мл у скл. картр. в пач.	100 МО/мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ХУМУЛІН РЕГУЛЯР	Ліллі Франс, Франція	р-н д/ін'єк. по 3мл у скл. картр. в шпр.-руч. КвікПен	100 МО/мл	№5x1	27,60	27,45/\$	

• **Інсулін ліспро (Insulin lispro) ***

Фармакотерапевтична група: А10АВ04 - протидіабетичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: регулює метаболізм глюкози; анаболічна та антикатаболічна дія на різні тканини організму (у тканинах м'язів посилення синтезу глікогену, жирних кислот, гліцерину та білка, а також збільшення поглинання амінокислот, одночасно з пригніченням глікогенолізу, глюконеогенезу, кетогенезу, ліполізу, катаболізму білків та виведення амінокислот), характеризується швидким початком дії (приблизно через 15 хв після введення); характеризується швидким початком дії (приблизно ч/з 15 хв. після введення), що дає можливість застосовувати його ближче до прийому їжі (за 0-15 хв. до прийому їжі) порівняно зі звичайним інсуліном (за 30-45 хв. до прийому їжі); швидко виявляє свою дію та має коротку тривалість дії (від 2 до 5 год.) порівняно зі звичайним людським інсуліном; тривалість дії інсуліну ліспро може варіюватися в різних людей або в різний час в однієї і тієї самої особи, а також залежить від дози, місця ін'єкції, кровопостачання, температури і фізичної активності; глюкодинамічна відповідь на інсулін ліспро не залежить від функціональної недостатності нирок або печінки.

Показання для застосування ЛЗ: лікування ЦД у дітей та дорослих, які потребують введення інсуліну для підтримання норми глюкози у крові, первинна стабілізація ЦД.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: доза визначається залежно від стану хворого; можна вводити безпосередньо перед їжею або невдовзі після їжі, вводити п/ш або з використанням п/ш інфузійної помпи, в/в (для контролю рівня глюкози при кетоацидозі, гострих захворюваннях або під час операційного втручання та післяопераційного періоду); після п/ш ін'єкції ефект настає швидше та триває менше (від 2 до 5 год) порівняно із застосуванням звичайного людського інсуліну; для інфузій інсуліну ліспро можна застосовувати лише визначені СЕ-моделі інсулінових pomp (прочитати та виконувати інструкції, що йдуть у комплекті з кожною помпою).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпоглікемія; АР(проявляється висипом по всьому тілу, задишкою, утрудненим диханням, зниженням АТ, прискореним пульсом або підвищеним потовиділенням); місцева р-ція у місці ін'єкції, ліподистрофія, свербіж, висип; набряки.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до інсуліну ліспро або до інших компонентів препарату, гіпоглікемія.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 40 МО

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ХУМАЛОГ®	Ліллі Франс (виробництво за повним циклом)/Елі Ліллі енд Компані (виробництво за повним циклом), Франція/США	р-н д/ін'єк. по 10мл у скл. фл.	100 МО/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ХУМАЛОГ®	Ліллі Франс (виробництво за повним циклом)/Елі Ліллі енд Компані	р-н д/ін'єк. по 3мл у скл. картр. у шпр.-	100 МО/мл	№5	24,22	27,45/\$

		(виробництво за повним циклом), Франція/США	ручці КвікПен				
	ХУМАЛОГ®	Ліллі Франс (виробництво за повним циклом)/Елі Ліллі енд Компані (виробництво за повним циклом), Франція/США	р-н д/ін'ек. по 3мл у скл. картр. в пач.	100 МО/мл	№5	28,82	27,45/\$

• **Інсулін аспарт (Insulin aspart) ***

Фармакотерапевтична група: А10АВ05 - протидіабетичні засоби. Інсуліни та аналоги для ін'єкцій швидкої дії.

Основна фармакотерапевтична дія: аналог короткодійного людського інсуліну; дія настає раніше, через 10-20 хв. після п/ш введення порівняно з розчинним людським інсуліном, при цьому рівень глюкози в крові стає нижчим протягом перших 4 год. після прийому їжі; при п/ш ін'єкції тривалість дії коротша порівняно з розчинним людським інсуліном; максимальний ефект розвивається між 1 і 3 годинами після ін'єкції, тривалість дії - від 3 до 5 год.

Показання для застосування ЛЗ: лікування ЦД у дорослих, підлітків та дітей віком від 1 року ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують п/ш та в/в ^{БНФ}; використовуються у комбінації з препаратами інсуліну середньої тривалості дії або тривалої дії, які вводять, як мінімум, 1 р/добу; індивідуальна потреба в інсуліні звичайно становить від 0,5 до 1,0 ОД/кг/добу; при базально-болюсному режимі 50-70 % потреби в інсуліні задовольняється препаратом, а решта - інсулінами середньої тривалості дії чи тривалої дії; завдяки більш швидкому початку дії препарат слід вводити безпосередньо перед прийманням їжі; при необхідності можна вводити недовзі після приймання їжі ^{БНФ}; вводити п/ш передньої черевної стінки, стегна, у ділянку дельтоподібного м'яза плеча або сідниць, місця ін'єкцій слід змінювати навіть у межах однієї ділянки тіла для зниження ризику ліподистрофії; при п/ш ін'єкціях в ділянці передньої черевної стінки дія препарату починається через 10-20 хв; максимальний ефект розвивається між 1 і 3 год після ін'єкції; тривалість дії - від 3 до 5 год; при необхідності можна вводити в/в; можна використовувати для тривалого п/ш введення за допомогою відповідних інфузійних насосів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпоглікемія; набряки та р-ції в місці ін'єкції (біль, почервоніння, кропив'янка, запалення, синці, набряк та свербіж у місці ін'єкції); анафілактичні р-ції - генералізовані р-ції гіперчутливості (в тому числі генералізований шкірний висип, свербіж, потовиділення, шлунково-кишкові розлади, ангіоневротичний набряк, утруднене дихання, прискорене серцебиття та зниження АТ); периферичні невротатії, швидке поліпшення контролю рівня глюкози в крові може викликати оборотний стан "г. больової невротатії"; порушення рефракції, діабетична ретинопатія; ліподистрофія, місцева гіперчутливість.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активної речовини або до допоміжних речовин.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 40 МО

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	НОВОРАПІД® ФЛЕКСПЕН®	А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту, виробник для збирання, маркування та упаковки ФлексПен®, вторинного пакування)/Ново Нордіск, Данія/Франція/Бразилія	р-н д/ін'ек. по 3мл у картр. в багатодоз. однораз. шпр.-руч. в кор.	100 ОД/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НОВОРАПІД® ФЛЕКСПЕН®	А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту, виробник для збирання, маркування та упаковки ФлексПен®, вторинного пакування)/Ново Нордіск, Данія/Франція/Бразилія	р-н д/ін'ек. по 3мл у картр. у багатодоз. однораз. шпр.-руч. в кор.	100 ОД/мл	№5	25,80	25,65/\$

• **Інсулін глужізін (Insulin glulisine) ***

Фармакотерапевтична група: А10АВ06 - протидіабетичні засоби. Інсуліни та аналоги швидкої дії.

Основна фармакотерапевтична дія: рекомбінантний аналог інсуліну людини, що за силою своєї дії подібний до інсуліну людини; інсулін глюлізін діє швидше та протягом меншого, ніж звичайний інсулін людини, часу; основна дія інсулінів та їх аналогів, включаючи інсулін глюлізін, спрямована на регулювання метаболізму глюкози; знижує рівень вмісту глюкози у крові шляхом стимуляції периферійної утилізації глюкози, особливо у скелетних м'язах і жировій тканині, та пригнічує синтез глюкози у печінці, запобігає ліполізу в адипоцитах, протеолізу та посилює синтез протеїну; якщо інсулін глюлізін застосовується у вигляді ін'єкції п/ш, зниження рівня глюкози у крові починається протягом 10-20 хв.; застосування інсуліну глюлізину через 15 хв. після початку прийому їжі забезпечує глікемічний контроль, подібний до звичайного інсуліну людини, що введений за 2 хв. до початку прийому їжі.

Показання для застосування ЛЗ: ЦД, коли необхідне застосування інсуліну дорослим, підліткам і дітям віком від 6 років і старше^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дозу підбирають та регулюють індивідуально; застосовують безпосередньо до (0-15 хв) або одразу після їди^{БНФ}; інсулін глюлізін застосовується шляхом п/ш ін'єкції або безперервної п/ш інфузії^{БНФ}; повинен застосовуватися в режимі інсулінотерапії, що включає інсулін середньої або довготривалої дії або аналог базального інсуліну, та може використовуватись одночасно з пероральними гіпоглікемічними засобами; застосовується п/ш у зоні черевної стінки, стегна або дельтовидного м'яза або шляхом безперервної інфузії через черевну стінку; п/ш ін'єкція у черевну стінку забезпечує трохи швидшу абсорбцію, ніж при використанні інших місць для ін'єкцій.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпоглікемія, що виникає як наслідок застосування надто великої дози інсуліну по відношенню до наявної потреби; р-ції в місці ін'єкції та місцеві р-ції гіперчутливості (почервоніння, набряк і свербіж у місці ін'єкції); ліподистрофія; кропивниця, стиснення у грудях, задишка, алергічний дерматит, свербіж, тяжка АР, разом з анафілактичною р-цією, що може загрожувати життю.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до інсуліну глюлізину або будь-якого компоненту препарату; гіпоглікемія.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 40 МО

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕПАЙДРА®	Санofi-Авентіс Дойчланд ГмбХ, Німеччина	р-н д/ін'єк. по 3мл в картр. у бл.; та по 10мл у скл. фл.	100 ОД/мл	№5x1, №1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕПАЙДРА®	Санofi-Авентіс Дойчланд ГмбХ, Німеччина	р-н д/ін'єк. по 3мл в картр. у шпр.-руч. СолоСтар® (без голк.)	100 ОД/мл	№5	17,77	24,61/\$

7.1.1.2. Інсуліни та аналоги для ін'єкцій середньої тривалості дії

• Інсулін людини (*Insulin human*) *

Фармакотерапевтична група: А10АС01 - протидіабетичні засоби. Інсуліни та аналоги середньої тривалості дії.

Основна фармакотерапевтична дія: є препаратом інсуліну середньої тривалості дії; основна дія інсуліну полягає у регулюванні метаболізму глюкози; крім того впливає на деякі анаболічні та антикатаболічні процеси в різних тканинах; у тканинах м'язів до таких ефектів належать посилення синтезу глікогену, жирних к-т, гліцерину та білка, а також збільшення поглинання амінокислот з одночасним пригніченням процесів глікогенолізу, глюконеогенезу, кетогенезу, ліполізу, катаболізму білків та вивільнення амінокислот; цукрознижувальний ефект інсуліну полягає у сприянні поглинанню глюкози тканинами після зв'язування інсуліну з рецепторами м'язових і жирових клітин, а також в одночасному пригніченні виділення глюкози з печінки; у середньому характер дії після п/ш ін'єкції такий: початок дії: протягом 1,5 год.; максимальний ефект: 4/з 4 год. до 12 год.; тривалість дії: приблизно 24 год.

Показання для застосування ЛЗ: ЦД^{ВООЗ,БНФ}, при якому показана терапія інсуліном.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять п/ш, суспензії інсуліну ні в якому разі не можна вводити в/в^{ВООЗ,БНФ}; для лікування в різних вікових групах дітей та дорослих; дозування інсуліну індивідуальне і визначається лікарем відповідно до потреб хворого; у середньому добова потреба в інсуліні при лікуванні діабету становить від 0,3 до 1 МО/кг маси тіла; у період часткової ремісії, а також у хворих із залишковою ендогенною продукцією інсуліну потреба в інсуліні може знижуватися, тоді як при станах резистентності до інсуліну (напр., у період пубертації або при ожирінні) добова потреба в інсуліні може істотно зростати.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпоглікемія; анафілактичні р-ції (шкірні висипання, свербіж, пітливість, порушення травлення, ангіоневротичний набряк, утруднене дихання, прискорене серцебиття, падіння АТ та запаморочення/втрату свідомості); ліподистрофія, місцева гіперчутливість, кропив'янка, висипання, периферичні нейропатії (болісні нейропатії), порушення рефракції, дабетична ретинопатія, р-ції у місці ін'єкції, набряк

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіпоглікемія, гіперчутливість на компоненти препарату, в/в введення.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 40 МО

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ІНСУВІТ® ННР	Біокон Лімітед/ПАТ "Фармак", Індія/Україна	сусп. д/ін'єк. по 3мл у картр. та по 10мл у фл.	100 МО/мл	№5, №1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНСУМАН БАЗАЛ®	Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ "Фарма Лайф" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ», Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Україна	сусп. д/ін'єк. по 5мл, 10мл у фл., по 3мл у картр. в бл. та однораз. шпр.-руч. СолоСтар® (без гол.) ;та сусп. д/ін'єк. по 3мл у картр. в бл.	100 МО/мл	№1, №5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНСУМАН БАЗАЛ®	Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ "Фарма Лайф" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ», Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Україна	сусп. д/ін'єк. по 3мл у картр. в бл.	100 МО/мл	№5x1	13,33	28,45/\$
	ІНСУМАН БАЗАЛ®	Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ "Фарма Лайф" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ», Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Україна	сусп. д/ін'єк. по 5мл у фл. в кор.	100 МО/мл	№5	9,60	28,45/\$
	ФАРМАСУЛІН® ННР	ПАТ "Фармак", Україна	сусп. д/ін'єк. по 10мл у фл. в пач.	100 МО/мл	№1	11,00	
	ФАРМАСУЛІН® ННР	ПАТ "Фармак", Україна	сусп. д/ін'єк. по 5мл у фл. в пач.	100 МО/мл	№1	11,00	
	ФАРМАСУЛІН® ННР	ПАТ "Фармак", Україна	сусп. д/ін'єк. по 3мл в картр. у бл.	100 МО/мл	№5x1	14,67	
	ХУМОДАР® Б100Р	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна	сусп. д/ін'єк. по 3мл у картр. в пач.	100 МО/мл	№3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ХУМОДАР® Б100Р	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна	сусп. д/ін'єк. по 5мл у фл. в пач.	100 МО/мл	№1	10,00	
	ХУМОДАР® Б100Р	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна	сусп. д/ін'єк. по 5мл у фл. в пач.	100 МО/мл	№5	10,00	
ХУМОДАР® Б100Р	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна	сусп. д/ін'єк. по 3мл у картр. в пач.	100 МО/мл	№5	12,67		
ХУМОДАР® Б100Р	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна	сусп. д/ін'єк. по 10мл у фл. в пач.	100 МО/мл	№1	9,80		
II.	ГЕНСУЛІН Н	БІОТОН С.А. (виробник,	сусп. д/ін'єк. по	100 Од/мл	№5x1	11,94	29,72/€

	відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща	3мл у картр. в бл.				
ГЕНСУЛІН Н	БІОТОН С.А. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща	сусп. д/ін'єк. по 10мл у фл.	100 Од/мл	№1	8,13	29,72/€
ПРОТАФАН® НМ	А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в флакони, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; виробник для маркування та упаковки флаконів, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон, Данія/Франція	сусп. д/ін'єк.по 10мл у фл.	100 МО/мл	№1	11,42	27,74/\$
ПРОТАФАН® НМ ПЕНФІЛ®	А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; виробник для маркування та упаковки Пенфіл®, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон , Данія/Франція/Бразилія	сусп. д/ін'єк. по 3мл у картр. в кор.	100 МО/мл	№5	15,09	27,12/\$
ПРОТАФАН® НМ ФЛЕКСПЕН®	А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, первинне пакування; контроль якості продукту в первинному пакуванні (картриджі Пенфіл®) та відповідальний за випуск серії готового продукту (ФлексПен®); виробник нерозфасованого продукту, первинне пакув, Данія/Франція/Бразилія	сусп. д/ін'єк. по 3мл у картр. у багатодоз. однораз. шпр.-руч.	100 МО/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПРОТАФАН® НМ ФЛЕКСПЕН®	А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, первинне пакування; контроль якості продукту в первинному пакуванні (картриджі Пенфіл®) та відповідальний за випуск	сусп. д/ін'єк. по 3мл у картр. у багатодоз. однораз. шпр.-руч.	100 МО/мл	№5	17,33	27,74/\$

		серії готового продукту (ФлексПен®); збирання, маркування та вторинне пакування готово, Данія/Франція/Бразилія					
ХУМУЛІН НПХ	Ліллі Франс, Франція		сусп. д/ін'єк. по 3мл у скл. картр. в пач.	100 МО/мл	№5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ХУМУЛІН НПХ	Ліллі Франс, Франція		сусп. д/ін'єк. по 3мл у скл. картр. у шпр.-руч. КвікПен	100 МО/мл	№5x1	24,53	27,45/\$

7.1.1.3. Комбіновані препарати інсулінів та аналогів для ін'єкцій короткої та середньої тривалості дії

• Інсулін людини (*Insulin human*)

Фармакотерапевтична група: A10AD01 - протидіабетичні засоби. Інсуліни та аналоги інсулінів д/ін'єкційного застосування. Комбінація інсулінів короткої та середньої тривалості дії.

Основна фармакотерапевтична дія: є двофазною суспензією ізофан-інсуліну, що містить 25 % розчинного інсуліну та 75 % кристалічного протамін-інсуліну; інсулін, дія якого настає поступово, а ефект триває впродовж тривалого часу; основна дія: знижує рівень цукру в крові та сприяє виникненню анаболічних ефектів, зменшує катаболічні ефекти; посилює внутрішньоклітинний транспорт глюкози, утворення глікогену у м'язах та печінці; збільшує засвоєння пірувату; пригнічує глікогеноліз та глюконеогенез, посилює ліпогенез у печінці та жировій тканині та пригнічує ліполіз, покращує внутрішньоклітинне надходження амінокислот та посилює синтез білка, посилює внутрішньоклітинне надходження калію; у середньому характер дії після п/ш ін'єкції такий: початок дії: через 30-60 хв після п/ш введення; максимальний ефект: від 2 до 4 год.; тривалість дії: протягом 12-19 год.

Показання для застосування ЛЗ: ЦД^{ВООЗ,БНФ}, що потребує інсулінотерапії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: тільки для п/ш ін'єкцій, не можна вводити в/в^{ВООЗ,БНФ}; дозування індивідуальне і визначається лікарем відповідно до потреб хворого; в середньому добова потреба в інсуліні становить від 0,5 до 1,0 МО/кг/добу; базальна метаболічна потреба в інсуліні становить від 40 до 60 % загальної добової потреби; ін'єкцію слід робити за 30-45 хв. до прийому їжі.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпоглікемія/гіперглікемія; шок; АР негайного типу, включаючи артеріальну гіпотензію, ангіоневротичний набряк, бронхоспазм, генералізовані шкірні р-ції; утворення антитіл до інсуліну; набряк; затримка Na в організмі; проліферативна/діабетична ретинопатія; порушення зору; ліподистрофія; р-ції у місці ін'єкції; кропив'янка у місці ін'єкції; запалення/біль/свербіж/еритема/набряк у місці ін'єкції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіпоглікемія, гіперчутливість до компонентів препарату, в/в введення.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 40 МО

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ІНСУВІТ® 30/70	Біокон Лімітед/ПАТ "Фармак", Індія/Україна	сусп. д/ін'єк. по 3мл у картр., та по 10мл у фл.	100 ОД/мл	№5, №1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ІНСУМАН КОМБ 25®	Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ "Фарма Лайф" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ», Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Україна	сусп. д/ін'єк. по 5мл у фл.; по 3мл в картр. у бл. та однор. шпр.-руч. СолоСтар (без голк.) та сусп. д/ін'єк. по 3мл у картр. в бл.; та сусп. д/ін'єк. по 5мл у фл.	100 ОД/мл	№1, №5x2, №5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ІНСУМАН КОМБ 25®	Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ "Фарма Лайф" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ», Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Україна	сусп. д/ін'єк. по 3мл у картр. в бл.	100 МО/мл	№5x1	13,33	28,45/\$

	ІНСУМАН КОМБ 25®	Санофі-Авентіс Дойчланд ГмБХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ "Фарма Лайф" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Санофі-Авентіс Дойчланд ГмБХ», Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Україна	сусп. д/ін'єк. по 5мл у фл.	100 МО/мл	№5	9,60	28,45/\$
	ФАРМАСУЛІН® Н 30/70	ПАТ "Фармак", Україна	сусп. д/ін'єк. по 10мл у фл.	100 МО/мл	№1	11,00	
	ФАРМАСУЛІН® Н 30/70	ПАТ "Фармак", Україна	сусп. д/ін'єк. по 5мл у фл.	100 МО/мл	№1	11,00	
	ФАРМАСУЛІН® Н 30/70	ПАТ "Фармак", Україна	сусп. д/ін'єк. по 3мл у картр. в бл.	100 МО/мл	№5x1	14,67	
	ХУМОДАР® К25 100Р	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна	сусп. д/ін'єк. по 3мл у картр.	100 МО/мл	№3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ХУМОДАР® К25 100Р	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна	сусп. д/ін'єк. по 5мл у фл.	100 МО/мл	№1	10,00	
	ХУМОДАР® К25 100Р	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна	сусп. д/ін'єк. по 5мл у фл.	100 МО/мл	№5	10,00	
	ХУМОДАР® К25 100Р	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна	сусп. д/ін'єк. по 3мл у картр.	100 МО/мл	№5	12,67	
	ХУМОДАР® К25 100Р	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна	сусп. д/ін'єк. по 10мл у фл.	100 МО/мл	№1	9,80	
II.	ГЕНСУЛІН М30	БІОТОН С.А. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща	сусп. д/ін'єк. по 3мл у картр. в бл.	100 ОД/мл	№5x1	11,94	29,72/€
	ГЕНСУЛІН М30	БІОТОН С.А. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща	сусп. д/ін'єк. по 10мл у фл.	100 ОД/мл	№1	8,13	29,72/€
	МІКСТАРД® 30 НМ	А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в флакони, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; Виробник для маркування та упаковки флаконів, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон, Данія/Франція	сусп. д/ін'єк. по 10мл у фл.	100 МО/мл	№1	10,27	27,74/\$
	МІКСТАРД® 30 НМ ПЕНФІЛ®	А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка, контроль якості	сусп. д/ін'єк. по 3мл у картр. в кор.	100 МО/мл	№5	16,27	27,12/\$

		та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; виробник для маркування та упаковки Пенфіл®, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон , Данія/Франція/Бразилія					
МІКСТАРД® 30 НМ ФЛЕКСПЕН®	А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, первинне пакування; контроль якості продукту в первинному пакуванні (картриджі Пенфіл®) та відповідальний за випуск серії готового продукту (ФлексПен®); виробник нерозфасованого продукту, первинне пакув, Данія/Франція/Бразилія	сусп. д/ін'єк. по 3мл у картр. в однор. шпр.-руч.	100 МО/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ		
МІКСТАРД® 30 НМ ФЛЕКСПЕН®	А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, первинне пакування; контроль якості продукту в первинному пакуванні (картриджі Пенфіл®) та відповідальний за випуск серії готового продукту (ФлексПен®); збирання, маркування та вторинне пакування готово, Данія/Франція/Бразилія	сусп. д/ін'єк. по 3мл у картр. в однор. шпр.-руч.	100 МО/мл	№5	15,60	26,04/\$	
ХУМУЛІН МЗ	Ліллі Франс, Франція	сусп. д/ін'єк. по 3мл у скл. картр.	100 МО/мл	№5	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ХУМУЛІН МЗ	Ліллі Франс, Франція	сусп. д/ін'єк. по 3мл у скл. картр. в шпр.-руч. КвінПен	100 МО/мл	№5	17,29	27,45/\$	

• **Інсулін аспарт (Insulin aspart)**

Фармакотерапевтична група: А10АD05 - протидіабетичні засоби. Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, комбінації інсулінів короткої дії з інсулінами середньої та тривалої дії.

Основна фармакотерапевтична дія: двофазова суспензія, що є сумішшю аналогів інсуліну: інсуліну аспарт (аналог людського інсуліну короткої дії) і протамін-інсуліну аспарт (аналог людського інсуліну середньої тривалості дії), співвідношення інсуліну короткої дії та середньої тривалості дії 30/70; рівень глюкози в крові під впливом інсуліну аспарт знижується після зв'язування його з інсуліновими рецепторами, що сприяє захопленню глюкози м'язовими і жировими клітинами й одночасно пригніченню виділення глюкози з печінки; наявність розчинного інсуліну аспарт забезпечує більш швидкий у порівнянні з розчинним людським інсуліном початок дії, що дає змогу вводити препарат безпосередньо перед прийомом їжі (від 0 до 10 хв); кристалічна фаза (70 %) складається з протамін-інсуліну аспарт, профіль активності якого такий самий, як і людського нейтрального протамін-інсуліну Хагедорна (НПХ); починає діяти ч/з 10-20 хв. після п/ш ін'єкції, максимальний ефект розвивається ч/з 1-4 год. після введення; тривалість дії - до 24 год.

Показання для застосування ЛЗ: ЦД^{БНФ}, при якому показана терапія інсуліном для дорослих підлітків та дітей віком від 10 років.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дозування індивідуальне і визначається відповідно до потреб хворого; вводити безпосередньо перед прийомом їжі^{БНФ}; хворим на діабет II типу можна призначати як у вигляді монотерапії, так і в комбінації з пероральними цукрознижувальними засобами (ПЦЗ) у тих випадках, коли рівень глюкози в крові не вдається ефективно регулювати за допомогою лише ПЦЗ; рекомендована початкова доза 6 ОД перед сніданком і 6 ОД перед вечерею, можна починати введення з дози 12 ОД перед вечерею; інтенсифікація терапії: можна перейти з одноразового на дворазове введення на добу після досягнення дози 30 ОД, розділивши дозу порівну перед сніданком і вечерею (50:50). При переході з дворазового введення на триразове: ранкову дозу можна розділити на дозу перед сніданком і обідом (введення тричі на добу).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпоглікемія (холодний піт, блідість шкіри, знервованість або тремор, відчуття неспокою, дратівливість, незвичну втому або слабкість, втрату орієнтації, утруднення у концентрації уваги, сонливість, підвищене почуття голоду, тимчасові порушення зору, головний біль, нудоту,

прискорене серцебиття), тяжка гіпоглікемія може призвести до втрати свідомості, тимчасових або постійних порушень ф-ції мозку і навіть смерті; генералізована гіперчутливість - свербіж, пітливість, розлади травного тракту, ангіоневротичний набряк, утруднене дихання, прискорене серцебиття і зниження кров'яного тиску; периферичні невротатії; порушення зору; ліподистрофія; набряк, який може виникнути на початку інсулінотерапії; кропив'янка, висипання, еритема; р-ції в місці ін'єкції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 40 МО

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	НОВОМІКС® 30 ФЛЕКСПЕН®	А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; Виробники для збирання, маркування та упаковки ФлексПен®, вторинного пакування)/Ново Нордіск, Данія/Франція/Бразилія	сусп. д/ін'єк. по 3мл в картр. у одност. шпр.-руч.	100 ОД/мл	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
	НОВОМІКС® 30 ФЛЕКСПЕН®	А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; Виробники для збирання, маркування та упаковки ФлексПен®, вторинного пакування)/Ново Нордіск, Данія/Франція/Бразилія	сусп. д/ін'єк. по 3мл в картр. у одност. шпр.-руч.	100 ОД/мл	№5	23,66	27,74/\$

7.1.1.4. Інсуліни та аналоги для ін'єкцій тривалої дії

- **Інсулін гларгін (Insulin glargine)**

Фармакотерапевтична група: А10АЕ04 - протидіабетичні засоби. Інсуліни та аналоги тривалої дії для ін'єкцій.

Основна фармакотерапевтична дія: інсулін гларгін розроблений як аналог інсуліну людини, який має низьку розчинність у нейтральному середовищі, він є повністю розчинним завдяки кислому середовищу р-ну для ін'єкцій (рН 4), після введення у підшкірні тканини кислий р-н нейтралізується, що призводить до виникнення мікропреципітатів, з яких постійно вивільняється невелика кількість інсуліну гларгіну, що забезпечує плавний (без піків) та передбачуваний профіль кривої залежності «концентрація-час», а також більш тривалу дію препарату; основною дією є регуляція метаболізму глюкози: інсулін та його аналоги знижують рівень глюкози в крові за рахунок стимуляції його споживання периферичними тканинами, зокрема скелетними м'язами та жировою тканиною, а також пригнічення утворення глюкози у печінці, інсулін пригнічує ліполіз в адипоцитах та протеоліз, одночасно посилюючи синтез білка.

Показання для застосування ЛЗ: лікування ЦД у дорослих, підлітків та дітей віком від 2 років^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: інсулін з тривалим терміном дії застосовується в один і той же час, 1 р/добу; доза - індивідуальна; хворим на ЦД I типу 1 р/добу разом з інсуліном короткої дії; хворим на ЦД II типу - 0,2 одиниці/кг з подальшим індивідуальним її коригуванням; вводити п/ш^{БНФ}; при переході від схем лікування інсулінами середньої тривалості дії або тривалої дії на схему лікування інсуліном гларгін може виникнути потреба у зміні дози базального інсуліну, а також у корекції супутньої протидіабетичної терапії (доз і часу введення додатково застосованих звичайних (регуляр) інсулінів або аналогів інсуліну швидкої дії чи доз пероральних протидіабетичних лікарських засобів): щоб зменшити ризик розвитку гіпоглікемії у нічні або у ранні ранкові години, пацієнтам, які змінюють режим застосування базального інсуліну з дворазового введення інсуліну на одноразове введення інсуліну гларгіну, потрібно зменшити дозу базального інсуліну на 20-30 % протягом перших тижнів лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпоглікемія; АР, генералізовані р-ції з боку шкіри, ангіоедема, бронхоспазм, гіпотензія та шок; дисгевзія; порушення зору, тимчасове погіршення зору, обумовлене тимчасовою зміною тургору кришталика та коефіцієнта переломлення ока; ліподистрофії, ліпоатрофія; міалгія; почервоніння, біль, свербіж, кропив'янка, набряк чи запалення; частота невідома-амілоїдоз шкіри.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; гіпоглікемія.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 40 МО

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АЙЛАР®	Біокон Лімітед/ПАТ "Фармак", Індія/Україна	р-н д/ін`ек. по 10мл у фл.	100 МО/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АЙЛАР®	Біокон Лімітед/ПАТ "Фармак", Індія/Україна	р-н д/ін`ек. по 3мл у картр. в бл.	100 МО/мл	№5x1	29,33	
II.	ЛАНТУС® СОЛОСТАР®	Санofi-Авентіс Дойчланд ГмбХ, Німеччина	р-н д/ін`ек. по 3мл в картр. у однор. шпр.-руч.(без голк.)	100 МО/мл	№5	28,98	24,61/\$
	ТОЖЕО СОЛОСТАР	Санofi-Авентіс Дойчланд ГмбХ, Німеччина	р-н д/ін`ек. по 1,5мл у картр. в однор. шпр.-руч.	300 МО/мл	№1, №5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТОЖЕО СОЛОСТАР	Санofi-Авентіс Дойчланд ГмбХ, Німеччина	р-н д/ін`ек. по 1,5мл у картр. в однор. шпр.-руч.	300 МО/мл	№3	28,06	24,61/\$

• **Інсулін детемір (Insulin detemir)**

Фармакотерапевтична група: А10АЕ05 - препарати, що використовуються при ЦД. Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, тривало діючі.

Основна фармакотерапевтична дія: розчинний аналог базального інсуліну з пролонгованим профілем дії, який застосовується як базальний інсулін; передбачуваність дії препарату більш виражена; пролонгована дія препарату зумовлена тісним взаємозв'язком молекул інсуліну детеміру в місцях ін'єкцій і приєднанням до них альбуміну через бічний ланцюг жирної кислоти; інсулін детемір повільніше розподіляється в периферичних тканинах-мішенях; цей комбінований механізм прол. дії зумовлює більш передбачувані швидкість всмоктування і характер дії інсуліну детеміру; цукрознижуючий ефект препарату полягає у сприянні поглинанню глюкози тканинами після зв'язування інсуліну з рецепторами м'язових і жирових клітин, а також в одночасному пригніченні виділення глюкози з печінки; дія препарату триває до 24 год. залежно від дози, що дає змогу обмежуватися 1 чи 2 ін'єкціями на добу; при введенні 2 р/добу стабілізація глікемії досягається після 2-3-х ін'єкцій; при введенні інсуліну детеміру із розрахунку 0,2-0,4ОД/кг маси тіла більше 50 % максимального ефекту досягається через 3-4 год., а тривалість дії становить 14 год.; після п/ш введення препарату фармакологічний ефект пропорційний дозі препарату; профіль концентрації глюкози в нічні години більш безпиковий, що зумовлює зменшення ризику розвитку гіпоглікемії.

Показання для застосування ЛЗ: лікування ЦД у дорослих, підлітків та дітей ^{БНФ} віком від 1 року.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дозу препарату підбирають індивідуально; вводиться п/ш ^{БНФ}; можна застосовувати окремо як базальний інсулін або у комбінації із болісним інсуліном; в комбінації з пероральними цукрознижувальними засобами рекомендується починати лікування з введення 10 ОД або 0,1-0,2 ОД/кг маси тіла 1 р/добу; коли інсулін детемір є компонентом базально-болісного режиму інсулінотерапії, його вводять 1 або 2 р/добу залежно від потреби хворого.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпоглікемія; р-ції в місцях введення препарату - біль, почервоніння, кропив'янка, запалення, утворення синців, напухання та свербіж; ліподистрофія, набряк; АР, кропив'янка, висип; порушення зору - порушення рефракції, тимчасове загострення діабетичної ретинопатії; периферичні нейропатії - оборотний стан "г. больової нейропатії"; анафілактичні р-ції (генералізовані шкірні висипання, свербіж, підвищене потовиділення, шлунково-кишкові розлади, ангіоневротичний набряк, утруднене дихання, прискорене серцебиття та зниження АТ)

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до інсуліну детемір або до будь-якого інгредієнта препарату.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 40 МО

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЛЕВЕМІР® ФЛЕКСПЕН®	А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; виробник для	р-н д/ін`ек. по 3мл у картр. в однор. шпр.-руч.	100 ОД/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

		збирання, маркування та упаковки ФлексПен®, вторинного пакування)/Ново Нордіск, Данія/Франція/Бразилія					
	ЛЕВЕМІР® ФЛЕКСПЕН®	А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; виробник для збирання, маркування та упаковки ФлексПен®, вторинного пакування)/Ново Нордіск, Данія/Франція/Бразилія	р-н д/ін'єк. по 3мл у картр. в однор. шпр.-руч.	100 ОД/мл	№5	36,51	27,74/\$

7.1.2. Пероральні цукрознижуючі засоби

7.1.2.1. Бігуаніди

- **Метформін (Metformin)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: А10ВА02 - засоби, що впливають на травну систему і метаболізм. Антидіабетичні препарати. Пероральні гіпоглікемічні засоби, за винятком інсулінів. Бігуаніди.

Основна фармакотерапевтична дія: належить до групи бігуанідів; метформін діє трьома шляхами: призводить до зниження продукування глюкози у печінці за рахунок інгібування глікогеногенезу та глікогенолізу; покращує чутливість до інсуліну у м'язах за рахунок поліпшення захоплення та утилізації периферичної глюкози; затримує всмоктування глюкози у кишечнику; стимулює внутрішньоклітинний синтез глікогену, впливаючи на глікогенсинтетазу; збільшує транспортну ємність усіх типів мембранних переносників глюкози (GLUT); незалежно від своєї дії на глікемію метформін спричиняє позитивний ефект на метаболізм ліпідів: знижує вміст загального холестерину, ліпопротеїнів низької щільності та тригліцеридів.

Показання для застосування ЛЗ: ЦД_{БНФ, ВООЗ} 2 типу^{ПМД} (інсуліннезалежний) при неефективності дієтотерапії та фізичних навантажень (особливо у хворих з надмірною масою тіла); як монотерапія або комбінована терапія сумісно з іншими пероральними гіпоглікемічними засобами, або сумісно з інсуліном для лікування дорослих; як монотерапія або комбінована терапія з інсуліном для лікування дітей старше 10 років; зменшення ускладнень діабету у дорослих пацієнтів з ЦД 2 типу і надлишковою масою тіла, які застосовували метформін як препарат першої лінії після неефективної дієтотерапії; табл.пролонг.дії для зниження ризику або затримки початку ЦД 2 типу у дорослих пацієнтів з надмірною вагою та з ПТГ* та/або ПГН* та/або підвищеним рівнем HbA1C, які мають високий ризик розвитку явного (маніфестного) ЦД 2 типу або прогресуючі порушення вуглеводного обміну, незважаючи на модифікацію активного способу життя на протязі від 3 до 6 місяців.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: монотерапія або комбінована терапія з іншими пероральними гіпоглікемічними засобами: дорослі: початкова доза 500 мг^{ВООЗ, БНФ} або 850 мг 2-3 р/добу під час або після прийому їжі (500 мг або 1000 мг увечері 1 р/добу для табл. пролонгованої дії), ч/з 10-15 днів дозу відкоригувати відповідно до результатів вимірювань рівня глюкози у сироватці крові, повільне збільшення дози сприяє зниженню побічних ефектів з боку травного тракту, максимальна рекомендована доза 3000 мг/добу (2000мг/добу на один прийом для табл. пролонгованої дії), розподілена на 3 прийоми; комбінована терапія з інсуліном: початкова доза 500 мг або 850 мг 2-3 р/добу (500 мг 1 р/добу для табл. пролонгованої дії), а дозу інсуліну підбирають відповідно до результатів вимірювання рівня глюкози у крові; монотерапія або комбінована терапія з інсуліном у дітей: застосовують дітям віком старше 10 років, початкова доза 500 мг^{ВООЗ, БНФ} або 850 мг 1 р/добу під час або після прийому їжі, ч/з 10-15 днів проведеного лікування дозу відкоригувати відповідно до результатів вимірювань рівня глюкози у сироватці крові, максимальна рекомендована доза 2000 мг/добу, розподілена на 2-3 прийоми.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота, блювання, діарея, біль у животі, відсутність апетиту; шкірні алергічні р-ції, включаючи висипання, еритему, свербіж, кропив'янку; при тривалому застосуванні препарату у пацієнтів із мегалобластною анемією може знижуватися всмоктування вітаміну В12, що супроводжується зниженням його рівня в сироватці крові, лактацидоз; порушення показників ф-ції печінки або гепатити, котрі повністю зникають після відміни метформіну; порушення смаку.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату; будь-який тип гострого метаболічного ацидозу (лактоацидоз, діабетичний кетоацидоз); діабетична прекома; ниркова недостатність або порушення ф-ції нирок (швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) < 30 мл/хв); г. стани, що протікають з ризиком розвитку порушень ф-ції нирок, такі як: зневоднення організму, тяжкі інфекційні захворювання, шок; г. та хр. захворювання, що можуть призводити до розвитку гіпоксії: СН або ДН, г. ІМ, шок; порушення ф-цій печінки, печінкова недостатність, г. отруєння алкоголем, алкоголізм.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДІАФОРМІН®	ПАТ "Фармак" (пакування)	табл. вкриті п/о	1000мг	№10x3	відсутня у	

	із форми «in bulk» фірми-виробника ЮСВ Прайвіт Лімітед, Індія), Україна	у бл.			реєстрі ОБЦ
ДІАФОРМІН®	ПАТ "Фармак" (пакування із форми «in bulk» фірми-виробника ЮСВ Прайвіт Лімітед, Індія), Україна	табл. вкриті п/о у бл.	1000мг	№10х6	4,67
ДІАФОРМІН®	ПАТ "Фармак", Україна , Україна	табл. вкриті п/о у бл.	1000мг	№10х6	4,67
ДІАФОРМІН®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. вкриті п/о у бл.	500мг	№10х3	2,40
ДІАФОРМІН®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. вкриті п/о у бл.	500мг	№10х6	5,93
ДІАФОРМІН®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. вкриті п/о у бл.	850мг	№10х3	1,88
ДІАФОРМІН®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. вкриті п/о у бл.	850мг	№10х6	4,20
ДІАФОРМІН®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. вкриті п/о у бл.	500мг, 850мг, 1000мг	№10х3, №10х6	відсутня у реєстрі ОБЦ
ДІАФОРМІН® SR	ПАТ "Фармак" (пакування із форми in bulk фірми-виробника "USV Private Limited", Індія), Україна	табл. прол. дії у бл.	500мг, 1000мг	№10х3, №10х10	відсутня у реєстрі ОБЦ
ДІАФОРМІН® SR	ПАТ "Фармак" (пакування із форми in bulk фірми-виробника "USV Private Limited", Індія), Україна	табл. прол. дії у бл.	500мг	№10х6	8,67
ДІАФОРМІН® SR	ПАТ "Фармак" (пакування із форми in bulk фірми-виробника "USV Private Limited", Індія), Україна	табл. прол. дії у бл.	1000мг	№10х6	8,33
МЕТАМІН®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. в/о у бл.	500 мг	№10х10	1,61
МЕТАМІН®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. в/о у бл.	500 мг	№10х6	1,61
МЕТАМІН®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. в/о у бл.	500 мг	№10х3	2,30
МЕТАМІН®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. в/о у бл.	850 мг	№10х10	1,61
МЕТАМІН®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. в/о у бл.	850 мг	№10х6	1,61
МЕТАМІН®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. в/о у бл.	850 мг	№10х3	1,92
МЕТАМІН®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. в/о у бл.	1000 мг	№15х4	2,20
МЕТАМІН®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. в/о у бл.	1000 мг	№15х6	2,20
МЕТАМІН®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. в/о у бл.	1000 мг	№15х2	2,27
МЕТАМІН® SR	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. прол. дії у бл.	500 мг	№7х4	відсутня у реєстрі ОБЦ
МЕТАМІН® SR	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. прол. дії у бл.	500 мг	№15х6	8,17
МЕТАМІН® SR	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. прол. дії у бл.	500 мг	№15х2	8,43
МЕТАФОРА®	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. вкриті п/о у бл.	500мг, 850мг, 1000мг	№10х3,№10х6	відсутня у реєстрі ОБЦ
МЕТФОРМІН ІНДАР	ПрАТ "По виробництву інсулінів "ІНДАР" (виробництво з пакування	табл. вкриті п/о у бл.	500 мг	№10х6	2,33

	in bulk фірми "ІНДОКО РЕМЕДІЗ ЛТД", Індія), Україна						
МЕТФОРМІН ІНДАР	ПрАТ "По виробництву інсулінів "ІНДАР" (виробництво з пакування in bulk фірми "ІНДОКО РЕМЕДІЗ ЛТД", Індія), Україна	табл. вкриті п/о у бл.	500 мг	№10x3	2,53		
МЕТФОРМІН ІНДАР	ПрАТ "По виробництву інсулінів "ІНДАР", Україна (виробництво з пакування in bulk фірми "ІНДОКО РЕМЕДІЗ ЛТД", Індія), Україна	табл. вкриті п/о у бл.	1000 мг	№10x6	3,40		
МЕТФОРМІН ІНДАР	ПрАТ "По виробництву інсулінів "ІНДАР", Україна (виробництво з пакування in bulk фірми "ІНДОКО РЕМЕДІЗ ЛТД", Індія), Україна	табл. вкриті п/о у бл.	1000 мг	№10x3	3,41		
МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ	ТОВ "Астрафарм", Україна	табл. вкриті п/о у бл.	500мг, 850мг, 1000мг	№10x9	відсутня у реєстрі ОВЦ		
МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ	ТОВ "Астрафарм", Україна	табл. вкриті п/о у бл.	500 мг	№10x6	2,80		
МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ	ТОВ "Астрафарм", Україна	табл. вкриті п/о у бл.	500 мг	№10x3	3,47		
МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ	ТОВ "Астрафарм", Україна	табл. вкриті п/о у бл.	850 мг	№10x3	2,59		
МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ	ТОВ "Астрафарм", Україна	табл. вкриті п/о у бл.	850 мг	№10x6	3,29		
МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ	ТОВ "Астрафарм", Україна	табл. вкриті п/о у бл.	1000 мг	№10x6	2,63		
МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ	ТОВ "Астрафарм", Україна	табл. вкриті п/о у бл.	1000 мг	№10x3	2,80		
МЕФАРМІЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника "Індоко Ремедіз Лімітед", Індія), Україна	табл. вкриті п/о у бл.	500мг, 850мг, 1000мг	№10x12	відсутня у реєстрі ОВЦ		
МЕФАРМІЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника "Індоко Ремедіз Лімітед", Індія), Україна	табл. вкриті п/о у бл.	500 мг	№10x3	1,61		
МЕФАРМІЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника "Індоко Ремедіз Лімітед", Індія), Україна	табл. вкриті п/о у бл.	500 мг	№10x6	2,44		
МЕФАРМІЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника "Індоко Ремедіз Лімітед", Індія), Україна	табл. вкриті п/о у бл.	500 мг	№10x5	3,85		
МЕФАРМІЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Індоко Ремедіз Лімітед», Індія), Україна	табл. вкриті п/о у бл.	850 мг	№10x3	1,61		
МЕФАРМІЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Індоко Ремедіз Лімітед», Індія), Україна	табл. вкриті п/о у бл.	850 мг	№10x6	2,44		

	МЕФАРМІЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Індоко Ремедіз Лімітед», Індія), Україна	табл. вкриті п/о у бл.	850 мг	№10x5	3,85	
	МЕФАРМІЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Індоко Ремедіз Лімітед», Індія), Україна	табл. вкриті п/о у бл.	1000 мг	№10x3	2,34	
	МЕФАРМІЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Індоко Ремедіз Лімітед», Індія), Україна	табл. вкриті п/о у бл.	1000 мг	№10x6	2,34	
	МЕФАРМІЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Індоко Ремедіз Лімітед», Індія), Україна	табл. вкриті п/о у бл.	1000 мг	№10x5	3,85	
II.	ГЛЮКОВІН XR	Бафна Фармасьютікалс Лтд., Індія	табл. прол. дії у бл.	750мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ГЛЮКОВІН XR	Бафна Фармасьютікалс Лтд., Індія	табл. прол. дії у бл.	1000мг	№10x3	6,57	27,05/\$
	ГЛЮКОФАЖ XR	Мерк Санте, Франція	табл. прол. дії у бл.	500мг	№15x4	15,35	30,09/€
	ГЛЮКОФАЖ XR	Мерк Санте, Франція	табл. прол. дії у бл.	500мг	№15x2	15,38	30,09/€
	ГЛЮКОФАЖ XR	Мерк Санте/Мерк Хелскеа КГаА, Франція/Німеччина	табл. прол. дії у бл.	1000мг	№10x6	12,01	30,09/€
	ГЛЮКОФАЖ XR	Мерк Санте/Мерк Хелскеа КГаА, Франція/Німеччина	табл. прол. дії у бл.	1000мг	№10x3	13,04	30,09/€
	ГЛЮМЕТ	ТПІ Норвегія АС (виробництво, пакування, контроль якості та випуск серії)/Вістін Фарма АС, завод Фіккебакке (виробництво нерозфасованої продукції), Норвегія/Норвегія	табл. вкриті п/о у бл.	500мг, 850мг, 1000мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ІНСУФОР	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл. вкриті п/о у бл.	850мг	№15x2	3,00	27,89/\$
	ІНСУФОР	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл. вкриті п/о у бл.	500мг, 850мг, 1000мг	№60, №90	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ІНСУФОР	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл. вкриті п/о у бл.	1000мг	№10x3	3,00	27,89/\$
	ІНСУФОР	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл. вкриті п/о у бл.	500 мг	№15x2	2,63	26,02/\$
	МЕГЛІФОРТ 1000	Індоко Ремедіз Лімітед, Індія	табл. вкриті п/о у бл.	1000 мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МЕГЛІФОРТ 500	Індоко Ремедіз Лімітед, Індія	табл. вкриті п/о у бл.	500 мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МЕГЛІФОРТ 850	Індоко Ремедіз Лімітед, Індія	табл. вкриті п/о у бл.	850 мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МЕТФОГАМА ® 1000	Драгенофарм Аптекарь Пюшл ГмбХ, Німеччина	табл. вкриті п/о у бл.	1000 мг	№15x8	5,04	29,72/€
	МЕТФОГАМА ® 1000	Драгенофарм Аптекарь Пюшл ГмбХ, Німеччина	табл. вкриті п/о у бл.	1000 мг	№15x2	6,74	29,72/€
МЕТФОРМІН	Лек С.А., Польща	табл. вкриті п/о	500мг, 850мг	№30, №120	відсутня у		

інсулінзалежний ЦД (ЦД I типу), повна вторинна неефективність терапії глібенкламідом при цукровому діабеті II типу, метаболізм з ухилом у бік ацидозу, прекома або діабетична кома, стан після резекції підшлункової залози, тяжкі порушення функції печінки, тяжкі порушення функції нирок; вагітність та період годування груддю; застосування разом з препаратом бозентан.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 10 мг., перорально - 7 мг (для мікронізованої форми)

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЛІБЕНКЛАМІД	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. у конт.	5мг	№30	0,75	
	ГЛІБЕНКЛАМІД	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ГЛІБЕНКЛАМІД	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x5	0,50	
	ГЛІБЕНКЛАМІД-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x5	0,88	
	ГЛІБЕНКЛАМІД-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у конт	5мг	№50	0,88	
II.	МАНІНІЛ® 3,5	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (Виробництво «in bulk», контроль та випуск серій)/Менаріні-Фон Хейден ГмБХ (Виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії), Німеччина/Німеччина	табл. у фл.	3,5мг	№120	1,17	29,36/€
	МАНІНІЛ® 5	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробник, що виконує виробництво нерозфасованої продукції; виробник, що виконує кінцеве пакування; виробник, що виконує випуск серії)/Менаріні-Фон Хейден ГмБХ (виробник, що виконує виробництво нерозфасованої продукції, виробник, що виконує, Німеччина/Німеччина	табл. у фл.	5мг	№120	1,13	29,36/€

● **Гліквідон (Gliquidone)**^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: А10ВВ08 - гіпоглікемізуючі препарати, за винятком інсуліну. Сульфонаміди, похідні сечовини.

Основна фармакотерапевтична дія: пероральний гіпоглікемічний засіб, похідне сульфонілсечовини другої генерації; стимулює секрецію ендogenous інсуліну β-клітинами підшлункової залози; ефект пониження рівня цукру в крові починається ч/з 60-90 хв. після перорального застосування та досягає максимуму ч/з 2-3 год. після прийому; тривалість ефекту - близько 8-10 год.

Показання для застосування ЛЗ: ЦД 2 типу^{ГМД} у пацієнтів середнього та літнього віку, коли метаболізм вуглеводів не піддається успішному контролю лише дієтотерапією.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: початкова доза - ½ табл (15 мг), що приймається під час сніданку; при неефективності доза може бути поступово збільшена; за умови призначення не більше 2 табл. (60 мг/добу) можна приймати одноразово під час сніданку; при вживанні вищих доз найкращий контроль забезпечується дво- або триразовим прийомом добової дози; в такому разі найвищу дозу приймати під час сніданку; приймати на початку прийому їжі; підвищення дози до 120 мг/добу не приводить до подальшого підсилення лікувального ефекту; МДД - 120 мг; при заміні іншого перорального гіпоглікемізуючого засобу з подібним механізмом дії - початкова доза визначається залежно від перебігу захворювання на момент призначення препарату; при заміні іншого протидіабетичного засобу гліквідонем пам'ятати, що дія 30 мг гліквідону приблизно еквівалента 1000 мг толбутаміду.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпоглікемія; зниження апетиту; сонливість, запаморочення, головний біль; парестезії; порушення акомодатії; стенокардія, екстрасистоли; серцево-судинна недостатність, артеріальна гіпотензія; діарея, блювання, абдомінальний дискомфорт, нудота, запор, сухість у роті, холестаза; висипання, свербіж; с-ром Стівенса-Джонсона, р-ції фоточутливості, кропив'янка; біль у грудях, стомленість; агранулоцитоз, лейкопенія, тромбоцитопенія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: інсулінзалежний ЦД 1 типу; діабетична кома та прекома; порушення метаболізму, ускладнене ацидозом і кетозом; після резекції підшлункової залози; під час г. інфекцій; перед хірургічною операцією; при серйозних порушеннях функції печінки; при інтермітуючій г. (гепатичній) порфірії; при алергії на сульфонаміди; у разі спадкових порушень, при яких можуть бути шкідливими неактивні компоненти препарату, вагітність та період годування груддю.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 60 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ГЛЮРЕНОРМ®	Берінгер Інгельхайм	табл. у бл.	30 мг	№10x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	

Еллас А.Е., Греція

• **Гліклазид (Gliclazide)** * [ГМД]

Фармакотерапевтична група: А10ВВ09 - протидіабетичні засоби. Пероральні цукрознижувальні засоби за виключенням інсулінів. Сульфонаміди, похідні сечовини.

Основна фармакотерапевтична дія: пероральний цукрознижувальний препарат, похідне сульфанілсечовини, що відрізняється від інших сульфонамідних препаратів наявністю гетероциклічного кільця, що містить азот та має ендоциклічні зв'язки; знижує рівень глюкози у плазмі крові внаслідок стимуляції секреції інсуліну β-клітинами островків Лангерганса підшлункової залози; підвищення рівня постпрандіального інсуліну та секреція С-пептиду зберігається навіть після 2 років застосування препарату; має також гемоваскулярні властивості (зменшує мікротромбоз шляхом двох механізмів, які можуть бути задіяні у розвитку ускладнень ЦД: частково інгібує агрегацію та адгезію тромбоцитів, зменшує кількість маркерів активації тромбоцитів (β-тромбоглобулін, тромбоксан В₂); впливає на фібринолітичну активність ендотелію судин (підвищує активність tPa)).

Показання для застосування ЛЗ: ЦД II типу ^{БНФ, ГМД} (інсулінонезалежний) при неможливості нормалізувати рівень глюкози в крові тільки дієтою, фізичними вправами чи зменшенням маси тіла; попередження ускладнень ЦД II типу: зниження ризику макро- та мікросудинних ускладнень, зокрема нових випадків або погіршення нефропатії у пацієнтів з ЦД II типу, які лікуються за стратегією інтенсивного контролю глікемії

Спосіб застосування та дози ЛЗ: терапевтична добова доза 40-320 мг; дозу підбирати залежно від індивідуальної відповіді на лікування; р/ос початкова доза 40-80 мг/добу ^{БНФ} (1/2-1 таб.) під час сніданку; потім дозу поступово збільшувати до досягнення відповідного контролю; разова доза не має перевищувати 160 мг (2 табл.); добова дозу понад 160 мг приймати у 2 прийоми під час основних прийомів їжі; пацієнтам з ожирінням та при відсутності відповідної реакції на лікування гліклазидом необхідно призначити додаткове лікування; **МДД - 320 мг** ^{БНФ} у два прийоми (МДД для табл. з модифікованим вивільненням - 120 мг); для табл. з модифікованим вивільненням **рекомендована початкова доза 30 мг** ^{БНФ}, добова доза 30-120 мг, добову дозу приймають одноразово під час сніданку, табл. ковтати цілою; за необхідності посилення контролю рівня глікемії добова доза може бути послідовно підвищена до 60 мг, 90 мг або 120 мг одноразово під час сніданку; підвищення дози проводить поступово, з інтервалом 1 місяць, окрім випадків, коли не спостерігалось зменшення рівня глюкози в крові протягом 2 тиж. лікування; за таких обставин доза може бути збільшена ч/з 2 тиж. лікування; середня добова доза 60 мг/день одноразово, під час сніданку для більшості пацієнтів від самого початку лікування; рекомендована **МДД - 120 мг** ^{БНФ}; табл. з модифікованим вивільненням 60 мг підлягає поділу, що дає можливість застосовувати препарат у дозі 30 мг (1/2 табл.) та в дозі 90 мг (1,5 табл.); переведення пацієнта із препаратів, що містять гліклазиду 80 мг, на препарат, що містить гліклазиду 60 мг, табл. з модифікованим вивільненням: 1 табл., що містить гліклазид 80 мг, відповідає 1/2 табл. гліклазиду 60 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпоглікемія (головний біль, сильне відчуття голоду, нудота, блювання, втомленість, порушення сну, збудження, порушення концентрації уваги та реакції, депресія, сплутаність свідомості, порушення зору та мовлення, афазія, тремор, парези, порушення чутливості, запаморочення, відчуття безсилля, втрата самоконтролю, делірій, судоми, поверхнєве дихання, брадикардія, сонливість та втрата свідомості, що може призвести до коми та летального кінця); абдомінальний біль, нудота, блювання, диспепсія, діарея та запор; висип, свербіж, кропив'янка, еритема, макропапульозні висипання, бульозний висип; анемія, тромбоцитопенія, лейкопенія, гранулоцитопенія; підвищення рівня ферментів печінки (АЛТ, АСТ, лужної фосфатази); тимчасові порушення зору.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до гліклазиду, інших препаратів сульфонілсечовини, сульфонамідів або до будь-якого компонента препарату; інсулінозалежний ЦД (1-го типу), діабетична прекома та кома, діабетичний кетоацидоз; тяжка печінкова або ниркова недостатність; одночасне лікування міконазолом, квінолоном; тяжкі травми, опіки або інфекційні хвороби у г. періоді; періоди вагітності та годування грудьми; ЦД у дітей.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 60 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЛІКЛАЗИД-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл. у бл.	80мг	№30x1		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ГЛІКЛАЗИД-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії	табл. у бл.	80мг	№10x3	1,37	

		виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна					
	ДІАГЛІЗИД®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	80мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДІАГЛІЗИД®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	80мг	№10x6	0,90	
	ДІАГЛІЗИД® MR	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	30мг	№10x3	2,53	
	ДІАГЛІЗИД® MR	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	30мг	№10x6	5,50	
	ДІАГЛІЗИД® MR	ПАТ "Фармак", Україна	табл. з м/в у бл.	60мг	№10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДІАГЛІЗИД® MR	ПАТ "Фармак", Україна	табл. з м/в у бл.	60мг	№10x3	5,50	
II.	ГЛІКЛАДА	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; відповідальний за контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю))/НЛЗОХ (Національні лабораторія за здоров'я, окреме ін храно) (в, Словенія/Словенія	табл. з м/в у бл.	30мг, 60мг	№30, №60, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЛІКЛАДА	КРКА, д.д., Ново место (виробник відповідальний за виробництво «in-bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; виробник, відповідальний за контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю))/НЛЗОХ (Національні лабораторія за здоров'я,, Словенія/Словенія/Словенія	табл. з м/в у бл.	60мг	№15x2	1,73	26,93/€
	ГЛІКЛАЗИД-ТЕВА	Балканфарма - Дупниця АТ, Болгарія	табл. з м/в у бл.	30мг, 60мг	№10x3, №10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЛІОРАЛ®	Галеніка АТ Белград, Сербія	табл. у бл.	80 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДІАБЕТОН® MR 60 мг	Лабораторії Серв'є Індастрі/Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд, Франція/Ірландія	табл. з м/в у бл.	60мг	№15x6, №15x8	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДІАБЕТОН® MR 60 мг	Лабораторії Серв'є Індастрі/Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд, Франція/Ірландія	табл. з м/в у бл.	60мг	№15x2	2,53	29,29/€
	ОЗІКЛІД	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	табл. з м/в у бл.	30 мг	№10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Глімепірид (Glimepiride)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: А10ВВ12 - пероральні гіпоглікемізуючі засоби. Сульфонаміди, похідні сечовини.

Основна фармакотерапевтична дія: гіпоглікемічна речовина, активна при пероральному прийманні, яка належить до групи сульфонілсечовини; діє переважно шляхом стимуляції вивільнення інсуліну з бета-клітин підшлункової залози, ефект ґрунтується на підвищенні чутливості клітин підшлункової залози до фізіологічної стимуляції глюкозою; глімепірид із високою швидкістю заміщення зв'язується з білком мембрани бета-клітин, пов'язаним з АТФ-залежним калієвим каналом, однак розташування його місця зв'язування відрізняється від звичайного місця зв'язування препаратів сульфонілсечовини; до позапанкреатичних ефектів належать покращення чутливості периферичних тканин до інсуліну та зменшення утилізації інсуліну печінкою.

Показання для застосування ЛЗ: лікування ЦД 2 типу ^{БНФ,ПМД} у дорослих, якщо рівень цукру в крові не можна підтримувати лише дієтою, фізичними вправами та зниженням маси тіла.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймають внутрішньо, табл. ковтати не розжовуючи, запиваючи рідиною, безпосередньо перед або під час ситного сніданку або основного першого прийому їжі, 1 р/добу ^{БНФ}; дозування залежить від результатів аналізів вмісту глюкози в крові та сечі; рекомендована початкова доза 1 мг/добу; якщо глікемічний контроль не є оптимальним, дозу поступово збільшують до 2-4 мг/добу, додаючи по 1 мг з інтервалом у 1-2 тижні; МДД - 6 мг ^{БНФ}; якщо МДД метформіну не забезпечує достатнього глікемічного контролю, можна розпочати супутню терапію глімепіридом.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпоглікемічні р-ції переважно виникають негайно, можуть бути тяжкими та не завжди легко можуть бути скореговані; можуть виникати транзиторні зорові розлади, особливо на початку лікування, зумовлені зміною рівня глюкози у крові; нудота, блювання, діарея, відчуття тяжкості та дискомфорту у животі, біль у животі; тромбоцитопенія, лейкопенія, гранулоцитопенія, агранулоцитоз, еритропенія, гемолітична анемія та панцитопенія; лейкоцитокластичний васкуліт, помірні р-ції гіперчутливості; можлива перехресна алергія з сульфонілсечовиною, сульфонамідами або спорідненими речовинами; можуть виникнути шкірні р-ції гіперчутливості, включаючи свербіж, висипання, кропив'янка та чутливість до світла; підвищення рівнів печінкових ферментів; порушення ф-ції печінки (наприклад, холестаза або жовтяниця), гепатит та печінкова недостатність.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до глімепіриду або інших компонентів препарату, до похідних сульфонілсечовини або інших сульфаніламідних препаратів, ЦД I типу, діабетичний кетоацидоз, діабетична кома, тяжкі порушення ф-ції печінки та/або нирок, у період вагітності і лактації; дитячий вік.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 2 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЛИМАКС®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. у бл.	2мг, 3мг, 4мг	№10х6, №10х10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ГЛИМАКС®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. у бл.	2мг	№10х3	1,93	
	ГЛИМАКС®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. у бл.	3мг	№10х6	1,27	
	ГЛИМАКС®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. у бл.	3мг	№10х3	1,47	
	ГЛИМАКС®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. у бл.	4мг	№10х6	1,42	
	ГЛИМАКС®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. у бл.	4мг	№10х3	1,53	
	ГЛІМЕПІРИД ІНДАР	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар" (виробництво з пакування in bulk фірми Індокор Ремедіс Лтд, Індія), Україна	табл. у бл.	2 мг	№10х3	1,93	
	ГЛІМЕПІРИД ІНДАР	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар" (виробництво з пакування in bulk фірми Індокор Ремедіс Лтд, Індія), Україна	табл. у бл.	3 мг	№10х3	1,51	
	ГЛІМЕПІРИД ІНДАР	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар" (виробництво з пакування in bulk фірми Індокор Ремедіс Лтд, Індія), Україна	табл. у бл.	4 мг	№10х3	1,82	
	ГЛІМЕПІРИД-КВ	АТ "КІЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	2мг, 3мг, 4мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДІАПІРИД®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	2мг, 3мг	№10х6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДІАПІРИД®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	2мг	№10х3	2,50	
	ДІАПІРИД®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	3мг	№10х3	1,89	
ДІАПІРИД®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	4мг	№10х6	1,67		

	ДІАПІРИД®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	4мг	№10x3	1,92	
	ДІМАРИЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	2мг	№10x3	2,17	
	ДІМАРИЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	2мг	№10x6	2,17	
	ДІМАРИЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	2мг	№10x5	2,71	
	ДІМАРИЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	3мг	№10x3	1,63	
	ДІМАРИЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	3мг	№10x6	1,63	
	ДІМАРИЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	3мг	№10x5	2,03	
	ДІМАРИЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	4мг	№10x3	1,76	
	ДІМАРИЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	4мг	№10x6	1,76	
	ДІМАРИЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	4мг	№10x5	2,19	
II.	АМАРИЛ®	САНОФІ С.П.А., Італія	табл. у бл.	2 мг	№15x2	2,97	24,45/\$
	АМАРИЛ®	САНОФІ С.П.А., Італія	табл. у бл.	3 мг	№15x2	2,87	24,45/\$
	АМАРИЛ®	САНОФІ С.П.А., Італія	табл. у бл.	4 мг	№15x2	2,62	24,45/\$
	ГЛАЙРІ-1	Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія	табл. у бл.	1 мг	№15x2	2,67	25,89/\$
	ГЛАЙРІ-2	Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія	табл. у бл.	2 мг	№15x2	2,00	25,89/\$
	ГЛАЙРІ-3	Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія	табл. у бл.	3 мг	№15x2	1,78	25,89/\$
	ГЛАЙРІ-4	Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія	табл. у бл.	4 мг	№15x2	1,67	25,89/\$
	ГЛІМЕПІРИД АЙКОР®	Фармацеутско-Хемійська Індустрія, Здравле АД, Сербія	табл. у бл.	2мг, 3мг, 4мг	№15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЛІМЕПІРИД-ТЕВА	Тева Фармацевтікал Індустріз Лтд./АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Ізраїль/Угорщина	табл. у бл.	2мг, 3мг, 4мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЛІНОВА	Індоко Ремедіз Лімітед, Індія	табл. у бл.	1мг, 2мг, 3мг, 4мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЛІНОВА	Індоко Ремедіз Лімітед, Індія	табл. у бл.	2мг	№10x3	1,98	26,43/\$
	ГЛІНОВА	Індоко Ремедіз Лімітед, Індія	табл. у бл.	3мг	№10x3	1,72	26,43/\$
	ГЛІНОВА	Індоко Ремедіз Лімітед, Індія	табл. у бл.	4мг	№10x3	1,76	26,43/\$
	ГЛІРИД	Лек С. А. (виробництво за повним циклом; пакування, випуск серії), Польща	табл. у бл.	2мг, 3мг, 4мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДІАБРЕКС®	Біофарм Лтд, Польща	табл. у бл.	1мг, 2мг, 3мг, 4мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНСУПРИД	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл. у бл.	2мг, 3мг, 4мг	№15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МЕЛПАМІД	Босналек д.д., Боснія і Герцеговина	табл. у бл.	2мг, 3мг	№15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОЛТАР® 1 МГ	УСВ Лімітед (виробництво "in bulk")/А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л. (виробництво "in bulk", кінцеве пакування, випуск серій; контроль серії),	табл. у бл.	1 мг	№30x1, №30x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	Індія/Італія					
ОЛТАР® 2 МГ	УСВ Прайвет Лімітед (виробництво "in bulk")/А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л. (виробництво "in bulk", кінцеве пакування, випуск серій; контроль серії), Індія/Італія	табл. у бл.	2мг	№30x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ОЛТАР® 2 МГ	УСВ Прайвет Лімітед (виробництво "in bulk")/А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л. (виробництво "in bulk", кінцеве пакування, випуск серій; контроль серії), Індія/Італія	табл. у бл.	2мг	№30x1	3,43	31,17/€
ОЛТАР® 3 МГ	УСВ Прайвет Лімітед (виробництво "in bulk")/А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л. (виробництво "in bulk", кінцеве пакування, випуск серій; контроль серії), Індія/Італія	табл. у бл.	3мг	№30x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ОЛТАР® 3 МГ	УСВ Прайвет Лімітед (виробництво "in bulk")/А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л. (виробництво "in bulk", кінцеве пакування, випуск серій; контроль серії), Індія/Італія	табл. у бл.	3мг	№30x1	2,91	31,17/€
ОЛТАР® 4 МГ	А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л. (Виробництво «in bulk» , пакування, випуск серіїБ контроль серії)/Домпе Фармацеутиці С.п.А. (контроль серії), Італія/Італія	табл. у бл.	4 мг	№30x1	3,21	32,13/€
ОЛТАР® 6 МГ	А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л. (Виробництво «in bulk» , пакування, випуск серіїБ контроль серії)/Домпе Фармацеутиці С.п.А. (контроль серії), Італія/Італія	табл. у бл.	6 мг	№30x1	2,68	32,13/€

7.1.2.3. Тіозолідиндіони (інсулінсенситайзери)

- **Піоглітазон (Pioglitazone)**

Фармакотерапевтична група: А10ВG03 - антидіабетичні препарати. Гіпоглікемічні засоби за виключенням інсулінів. Тіозолідиндіони.

Основна фармакотерапевтична дія: пероральний гіпоглікемічний препарат тіозолідиндіонового ряду, високоселективний агоніст гамма-рецепторів, які активуються проліфератором пероксисом (γ -PPAR); γ -PPAR рецептори присутні у жировій, м'язовій тканинах та у печінці; активація ядерних рецепторів γ -PPAR модулює транскрипцію деяких генів, чутливих до інсуліну, що беруть участь у контролі рівня глюкози та у метаболізмі ліпідів; препарат знижує інсулінорезистентність у периферичних тканинах та у печінці, внаслідок чого відбувається збільшення утилізації глюкози та зниження викиду глюкози з печінки; на відміну від препаратів сульфонілсечовини, піоглітазон не стимулює секрецію інсуліну бета-клітинами підшлункової залози; при інсулінонезалежному ЦД (тип II) зменшення інсулінорезистентності під впливом препарату призводить до зменшення концентрації глюкози в крові, зниження рівнів інсуліну в плазмі крові і HbA1c.

Показання для застосування ЛЗ: лікування ЦД II типу: як монотерапія^{БНФ} пацієнтам (особливо пацієнтам з надлишковою масою тіла) з протипоказаннями та непереносимістю метформіну у разі неадекватного контролю рівня цукру в крові дієтою та фізичними вправами; у вигляді подвійної комбінованої терапії з метформіном^{БНФ} пацієнтам (особливо пацієнтам з надлишковою масою тіла) з недостатнім глікемічним контролем, незважаючи на застосування максимально переносимої дози метформіну; похідними сульфонілсечовини^{БНФ} тільки у пацієнтів з непереносимістю та протипоказанням до метформіну при недостатньому глікемічному контролі, незважаючи на

застосування максимальної переносимої дози похідних сульфонілсечовини; у вигляді потрібної комбінованої терапії з метформіном і похідними сульфонілсечовини^{БНФ} у пацієнтів (особливо з надлишковою масою тіла) з недостатнім глікемічним контролем, незважаючи на застосування подвійної комбінованої терапії; показаний також у комбінації з інсуліном при ЦД II типу^{БНФ} пацієнтам із недостатнім глікемічним контролем при застосуванні інсуліну, яким метформін протипоказаний або є непереносимість метформіну.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймають дорослі перорально 1 р/добу незалежно від прийому їжі; дозу препарату добирають індивідуально; початкова доза піоглітазону становить 15 мг або 30 мг, за необхідності дозу можна підвищити до 30 - 45 мг 1 р/добу^{БНФ}; МДД - 45 мг^{БНФ}; при комбінованій терапії піоглітазону з інсуліном доза інсуліну або залишається такою ж, або при повідомленні пацієнта про гіпоглікемію знижується.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпоглікемія; порушення зору, набряк макули; р-ції гіперчутливості та АР, включаючи анафілаксію, ангіоневротичний набряк, кропив'янка; інфекції ВДШ; синусит; гіпоестезія; рак сечового міхура; переломи кісток; безсоння; збільшення маси тіла; головний біль, запаморочення; втомлюваність; артралгії; метеоризм; глікозурія, протеїнурія; зростання АлАТ, підвищення молочної дегідрогенази; підвищення креатинфосфокінази в плазмі крові; еректильна дисфункція; задихка, СН.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого іншого компонента препарату; інсулінзалежний ЦД I типу; діабетичний кетоацидоз; СН (стадії I - IV NYHA), тяжкі порушення ф-ції печінки, рак сечового міхура наявний або в анамнезі; макроскопічна гематурія невстановленої етіології.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 30 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЛЮТАЗОН®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. у бл.	15мг	№14x2	8,46	
	ГЛЮТАЗОН®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. у бл.	30мг	№14x2	6,77	
	ГЛЮТАЗОН®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. у бл.	15мг, 30мг, 45мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЛЮТАЗОН®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. у бл.	45мг	№14x2	6,57	
II.	ПІОГЛАР	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	табл. у бл.	15мг, 30мг	№10x3, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	

7.1.2.4. Інгібітори дипептидилпептидази 4

- **Саксагліптин (Saxagliptin)**

Фармакотерапевтична група: А10ВН03 - пероральні гіпоглікемізуючі препарати. Інгібітор дипептидилпептидази (інгібітор ДПП-4).

Основна фармакотерапевтична дія: високопотужний (Ki: 1,3 нМ) селективний оборотний конкурентний інгібітор дипептидилпептидази 4 (ДПП-4), призводить до пригнічення активності ферменту ДПП-4 протягом 24 годин; після перорального навантаження глюкозою це пригнічення ДПП-4 призводить до 2-3-разового збільшення рівня циркулюючих активних інкретинових гормонів, включаючи глюкагоноподібний пептид 1 (ГПП-1) та глюкозозалежний інсулінотропний поліпептид (ГІП), зменшення концентрації глюкагону та збільшення глюкозозалежної р-ції бетаклітин, що веде до підвищення концентрації інсуліну та С-пептиду; вивільнення інсуліну бета-клітинами підшлункової залози та зниження вивільнення глюкагону з панкреатичних альфа-клітин асоціюється зі зниженням концентрації глюкози натщесерце та зменшенням рівня глюкози після навантаження глюкозою або прийому їжі; покращує ф-ції альфа- та бета-клітин.

Показання для застосування ЛЗ: дорослим пацієнтам хворим на ЦД II типу^{БНФ} для покращення контролю глікемії: монотерапія^{БНФ} при недостатньому контролі тільки за допомогою дієти та фізичних вправ, а також тим, кому не підходить метформін через наявність протипоказань або непереносимості; подвійна пероральна терапія у комбінації з метформіном, якщо метформін у вигляді монотерапії, з дієтою та фізичними вправами не забезпечують достатній контроль глікемії; сульфонілсечовиною, якщо сульфонілсечовина у вигляді монотерапії, з дієтою та фізичними вправами не забезпечують достатній контроль глікемії у пацієнтів, яким не підходить лікування метформіном; тіазолідиндіоном, якщо тіазолідиндіон у вигляді монотерапії, з дієтою та фізичними вправами не забезпечують достатній контроль глікемії у пацієнтів, яким підходить лікування тіазолідиндіоном^{БНФ}; потрібна пероральна терапія в комбінації з метформіном та сульфонілсечовиною, якщо така схема сама по собі, разом з дієтою та фізичними вправами не забезпечує достатній контроль глікемії; комбінована терапія з інсуліном (з метформіном або без), якщо така схема сама по собі, разом з дієтою та фізичними вправами не забезпечує достатній контроль глікемії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза становить 5 мг 1 р/добу^{БНФ}, табл. не можна ділити або розрізати; у комбінації з інсуліном або сульфонілсечовиною може бути потрібною менша доза інсуліну або сульфонілсечовини, щоб знизити ризик гіпоглікемії.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпоглікемія; інфекції ВДШ; інфекції сечовивідних шляхів; гастроентерит; синусит; назофарингіт; порушення з боку ШКТ, блювання, панкреатит, гастрит; порушення з боку нервової системи, головний біль, запаморочення, втомлюваність; периферичний набряк; ангіоневротичний набряк, дерматит, свербіж, висип, кропив'янка; міалгія, артралгія; еректильна дисфункція.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин або наявність в анамнезі серйозної реакції гіперчутливості, включаючи анафілактичну р-цію, анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк, гіперчутливість до будь-якого інгібітору дипептидилпептидази-4.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ОНГЛІЗА	АстраЗенека Фармасьютікалс ЛП (виробник "in bulk")/АстраЗенека АБ (виробник, відповідальний за контроль якості)/АстраЗенека ЮК Лімітед (виробник, відповідальний за первинне та вторинне пакування, випуск серії), США/Швеція/Велика Британія	2,5 мг	табл. вкриті п/о у бл.	№10x3	39,52	27,05/\$
	ОНГЛІЗА	АстраЗенека Фармасьютікалс ЛП (виробник "in bulk")/АстраЗенека АБ (виробник, відповідальний за контроль якості)/АстраЗенека ЮК Лімітед (виробник, відповідальний за первинне та вторинне пакування, випуск серії), США/Швеція/Велика Британія	5 мг	табл. вкриті п/о у бл.	№10x3	25,40	21.06/\$

• **Ситагліптин (Sitagliptin)**

Фармакотерапевтична група: А10ВН01- гіпоглікемізуючі препарати, за винятком інсулінів. Інгібітори дипептидилпептидази 4.

Основна фармакотерапевтична дія: інгібуючи ДПП-4, ситагліптин підвищує концентрацію двох відомих гормонів сімейства інкретинів: ГПП-1 і глюкозозалежного інсулінотропного пептиду (ГІП); запобігає гідролізу інкретинів ферментом ДПП-4, тим самим збільшуючи плазмові концентрації активних форм ГПП-1 і ГІП; підвищуючи рівень інкретинів, ситагліптин збільшує глюкозозалежний викид інсуліну й сприяє зменшенню секреції глюкагону; прийом однієї дози препарату призводить до інгібування активності ферменту ДПП-4 протягом 24 годин, що призводить до збільшення рівня циркулюючих інкретинів ГПП-1 і ГІП у 2-3 рази, зростанню плазмової концентрації інсуліну й 3-пептиду, зниженню концентрації глюкагону в плазмі крові, зменшенню глікемії натще, а також зменшенню глікемії після навантаження глюкозою або харчовим навантаженням.

Показання для застосування ЛЗ: дорослим пацієнтам з ЦД 2-го типу для поліпшення контролю глікемії, як монотерапія^{БНФ}; коли стан хворого не контролюється належним чином за допомогою лише дієти та фізичних навантажень і яким не можна застосовувати метформін через протипоказання або непереносимість^{БНФ}; як подвійна пероральна терапія в комбінації з: метформіном^{БНФ}, коли дієта та фізичні навантаження у поєднанні з одним лише метформіном не забезпечують належного контролю глікемії; сульфонілсечовиною^{БНФ}, коли дієта та фізичні навантаження у поєднанні з максимальною переносимою дозою однієї тільки сульфонілсечовини не забезпечують належного контролю глікемії і коли не можна застосовувати метформін через протипоказання або непереносимість; агоністом гамма-рецептора активатора проліферації пероксисом (PPAR γ) (тобто тіазолідинедіоном)^{БНФ}, коли застосування агоніста PPAR γ є доцільним і коли дієта та фізичні навантаження у поєднанні з одним тільки агоністом PPAR γ не забезпечують належного контролю глікемії; як потрібна пероральна терапія в комбінації з: сульфонілсечовиною та метформіном^{БНФ}, коли дієта та фізичні навантаження у поєднанні з подвійною терапією цими лікарськими препаратами не забезпечують належного контролю глікемії; агоністом PPAR γ та метформіном^{БНФ}, коли застосування агоніста PPAR γ є доцільним і коли дієта та фізичні навантаження у поєднанні з подвійною терапією цими лікарськими препаратами не забезпечують належного контролю глікемії; також показаний як доповнення до інсуліну (з метформіном або без метформіну), коли дієта та фізичні навантаження у поєднанні зі стабільною дозою інсуліну не забезпечують належного контролю глікемії^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл. можна приймати незалежно від прийому їжі; рекомендовано приймати у дозі 100 мг 1р/добу^{БНФ} як монотерапію або в комбінації з метформіном або агоністом PPAR γ (наприклад, тіазолідинедіоном).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпоглікемія; алергічні р-ції, включаючи анафілактичні р-ції; інфекція ВДШ, ринофарингіт; інтерстиціальне захворювання легенів; головний біль, сонливість, запаморочення; діарея, ксеростомія, нудота, метеоризм, запор, біль у верхній ділянці живота, блювання, г. панкреатит, летальний і нелетальний геморагічний і некротизуючий панкреатит; ангіоневротичний набряк, висипання, кропив'янка, шкірний васкуліт, ексфолюативні стани шкіри, включаючи с-ром Стівенса-Джонсона; остеоартрит, біль у кінцівках, артралгії, міалгії, біль у попереку; погіршення ф-ції нирок, г. ниркова недостатність; периферичні набряки.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату; ЦД 1 типу; діабетичний кетоацидоз.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	СИТЕНА	АТ "Фармак", Україна	табл. вкриті п/о у бл.	50мг, 100мг	№10x3, №10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	ЯНУВІЯ	Мерк Шарп і Доум Б.В. (вир-к відпов. за випуск серії, контр. якості)/ Мерк Шарп і Доум Лімітед (вир-к за повн. цикл.), Нідерланди/ Велика Британія	табл. вкриті п/о у бл.	100 мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

7.1.2.5. Комбінації пероральних цукрознижуючих засобів

- **Метформін + гліпизид (Metformin + glipizide)**

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ
Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДИБІЗИД-М	Мікро Лабс Лімітед, Індія	табл. у бл.	500мг/5мг	№10x6	168,19	28,04/\$

- **Метформін + ситагліптин (Metformin + sitagliptin)**

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.
Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЯНУМЕТ	Мерк Шарп і Доум Б.В. (перв. та втор. уп., дозвіл на випуск серії)/ Есіка Квінборо Лімітед (вир-во нерозфас. прод.)/ Патеон Пуерто Ріко, Інк. (вир-во нерозфас. прод.)/ Фросст Іберика, С.А. (перв. та втор. уп., Нідерланди/ Велика Британія/Пуерто Ріко, США/Іспанія	табл. вкриті п/о у бл.	500мг/50мг	№14x4	1274,24	25,48/\$
	ЯНУМЕТ	Мерк Шарп і Доум Б.В. (перв. та втор. уп., дозвіл на випуск серії)/ Есіка Квінборо Лімітед (вир-во нерозфас. прод.)/ Патеон Пуерто Ріко, Інк. (вир-во нерозфас. прод.)/ Фросст Іберика, С.А. (перв. та втор. уп., Нідерланди/ Велика Британія/Пуерто Ріко, США/Іспанія	табл. вкриті п/о у бл.	850мг/50мг	№14x4	1274,24	25,48/\$
	ЯНУМЕТ	Мерк Шарп і Доум Б.В. (перв. та втор. уп., дозвіл на випуск серії)/ Есіка Квінборо Лімітед (вир-во нерозфас. прод.)/ Патеон Пуерто Ріко, Інк. (вир-во нерозфас. прод.)/ Фросст Іберика, С.А. (перв. та втор. уп., Нідерланди/ Велика Британія/Пуерто Ріко, США/Іспанія	табл. вкриті п/о у бл.	1000мг/50мг	№14x4	1274,24	25,48/\$

7.1.2.6. Інші цукрознижуючі засоби

- **Емпагліфлозин (Empagliflozin) ****

Фармакотерапевтична група: А10ВК03 - Препарати, що застосовуються при цукровому діабеті. Інші препарати для зниження рівня глюкози в крові, за винятком інсулінів.

Основна фармакотерапевтична дія: Емпагліфлозин є оборотним сильнодіючим (IC₅₀ 1,3 нмоль) і селективним конкурентним інгібітором натрій-глюкозного котранспортера 2 (SGLT2). Інгібування SGLT2 у пацієнтів з ЦД 2 та гіперглікемією призводить до ↑ екскреції глюкози з сечею; ↑ екскрецію натрію, що призводить до осмотичного діурезу та ↓ інтраваскулярний об'єм. Екскреція глюкози ↑ одразу після першої дози емпагліфлозину і зберігалась протягом 24 год. Покращує рівні глюкози в плазмі крові як натще, так і після прийому їжі. Механізм дії емпагліфлозину не залежить від функції бета-клітин та шляху дії інсуліну, що сприяє ↓ ризику гіпоглікемії. Крім того, виділення глюкози з сечею спричиняє втрату калорій, пов'язану зі зниженням жирів і зменшенням маси тіла. Глюкозурія, що спостерігалась при застосуванні емпагліфлозину, супроводжується діурезом, що може сприяти довготривалому і помірно зниженню артеріального тиску. Глюкозурія, натрійурез та осмотичний діурез, що спостерігаються при застосуванні емпагліфлозину, можуть сприяти покращенню серцево-судинних прогнозів.

Показання для застосування ЛЗ: ЦД 2 у дорослих, якщо дотримання дієти та фізичні вправи не забезпечують адекватного контролю глікемії: як монотерапія у разі непереносимості метформіну; у комбінації з іншими гіпоглікемізуючими ЛЗ ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Початкова доза становить 10 мг емпагліфлозину 1 раз на добу як монотерапія, і комбінованої терапії з іншими гіпоглікемізуючими ЛЗ: 10 мг 1р/д. При потребі більш суворого глікемічного контролю, добрій переносимості та рШКФ ≥ 60 мл/хв/1,73 м²: 25 мг 1р/д. Приймати з їжею або без їжі,

запиваючи водою, не розжовуючи. У разі пропуску дози її слід прийняти, як тільки пацієнт згадає. Не слід приймати подвійну дозу препарату в один і той же день. При комбінації з сульфонілсечовиною або інсуліном, слід розглянути можливість застосування сульфонілсечовини або інсуліну в низьких дозах, для зменшення ризику гіпоглікемії.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: Гіпоглікемія; тяжка гіпоглікемія; вагінальний кандидоз, вульвовагініт, баланіт та інші інфекції статевих органів; інфекції сечовивідних шляхів; зменшення об'єму міжклітинної рідини, відчуття спраги, свербіж (загальний), висип, підвищене виділення сечі, збільшення ліпідів сироватки крові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: Підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якої з допоміжних речовин; ЦД 1 типу.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДЖАРДІНС®	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмБХ і Ко. КГ (вир-во, пакув., маркув., контр. якості, випуск серії)/ ФармЛог Фарма Лоджістік ГмБХ (альтернативна дільниця для втор. пакув.)/ Штегеманн Лйонферпакунген унд Логістішер Сервіс е. К. (альтернативна, Німеччина	таб. вкриті п/о у бл.	10мг, 25мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Ліраглутид (Liraglutide)**

Фармакотерапевтична група: A10BJ02 - Препарати, що застосовуються при цукровому діабеті, аналоги глюкагоноподібного пептиду-1 (ГПП-1).

Основна фармакотерапевтична дія: є аналогом людського глюкагоноподібного пептиду-1 (ГПП-1) з послідовністю амінокислот на 97% гомологічного людському ГПП-1, що зв'язується з ГПП-1-рецепторами і активує їх; ГПП-1-рецептор є мішенню для нативного ГПП-1 (гормону інкретину, що ендогенно секретується), який потенціє глюкагозалежну секрецію інсуліну β-клітинами підшлункової залози; у людей дає можливість вводити його 1 р/добу; пролонгована дія введеного п/ш обумовлена 3 механізмами: самоасоціацією, що уповільнює всмоктування, зв'язуванням з альбуміном крові і підвищеною стійкістю до дії ферментів дипептидилпептидази IV (ДПП-IV) і нейтральної ендопептидази (НЕП), що проявляється в тривалому періоді напіввиведення препарату з плазми; дія опосередковується специфічною взаємодією з ГПП-1-рецепторами, що призводить до підвищення рівня цАМФ; стимулює секрецію інсуліну залежно від рівня глюкози і одночасно знижує неадекватно високу секрецію глюкагону також залежно від рівня глюкози в крові; при високій концентрації глюкози в крові секреція інсуліну підвищується, а глюкагону - знижується; при гіпоглікемії знижує секрецію інсуліну, але не впливає на секрецію глюкагону; механізм зниження рівня глюкози в крові включає незначне уповільнення випорожнення шлунка; зменшує масу тіла і масу жиру за рахунок механізмів зниження відчуття голоду і споживання енергії; діє впродовж 24 год і покращує контроль глікемії шляхом зниження рівня глюкози в крові натще і після їди у пацієнтів з ЦД II типу.

Показання для застосування ЛЗ: лікування ЦД II типу у дорослих з метою досягнення контролю глікемії як монотерапія, коли застосування метформіну вважається недоцільним через непереносимість або протипоказання; у комбінації з пероральними цукрознижувальними засобами та/або з базальним інсуліном у випадках, коли ці препарати разом з дієтою та фізичними вправами не забезпечують належного контролю глікемії^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: початкова доза - 0,6 мг/добу; ч/з як мінімум 1 тиждень дозу слід підвищити до 1,2 мг; у деяких пацієнтів очікується поліпшення після збільшення дози з 1,2 мг до 1,8 мг і, ґрунтуючись на відповіді на лікування, для подальшого поліпшення контролю глікемії ч/з як мінімум 1 тиждень лікування дозу можна підвищити до 1,8 мг^{БНФ}; добова доза вище 1,8 мг не рекомендується; можна застосовувати додатково до наявної терапії метформіном або комбінації метформіну і тіазолідиндіону; при цьому дози метформіну і тіазолідиндіону, що застосовуються, можуть залишатися незміненими; можна застосовувати додатково до наявної терапії сульфонілсечовиною або комбінації метформіну і сульфонілсечовини; дозу сульфонілсечовини зменшити для того, щоб знизити ризик розвитку гіпоглікемії; на початку лікування у поєднанні з сульфонілсечовиною для коригування дози останньої може бути необхідним проведення самомоніторингу глюкози крові; вводять 1 р/добу у будь-який час незалежно від прийому їжі; його можна ввести п/ш в ділянку передньої черевної стінки, стегна або плеча; місце і час ін'єкції можна змінювати без корекції дози; бажано вводити в один і той же найбільш зручний час дня; не можна вводити в/в або в/м.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпоглікемія, анорексія, зниження апетиту; зневоднення; головний біль, запаморочення; нудота, діарея; диспепсія, біль у верхньому відділі черевної порожнини, запор, гастрит, метеоризм, здуття живота, ГЕРХ, відрижка, зубний біль, вірусний гастроентерит; панкреатит (в т.ч. некротичний панкреатит); підвищення ЧСС; анафілактичні р-ції (з такими додатковими симптомами, як гіпотензія, серцебиття, задишка та набряк); інфекції ВДШ (назофарингіт, бронхіт); нездужання; втома, підвищення t°, р-ції в місцях ін'єкцій; г. ниркова недостатність, порушення ф-ції нирок; висипання; кропив'янка, свербіж; порушення ф-ції щитовидної залози (пухлини щитовидної залози, підвищення рівня кальцитоніну в крові і зоб).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активної речовини або до інших компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 1,5 мг

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ВІКТОЗА®	А/Т Ново Нордск (виробник, нерозфасованого продукту, наповнення, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту)/А/Т Ново Нордск (виробник для збирання, маркування та упаковки, вторинного пакування), Данія/Данія	р-н д/ін'єк. по 3мл у картр. в багатодоз. однораз. шпр.-руч.	6мг/мл	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ВІКТОЗА®	А/Т Ново Нордск (виробник, нерозфасованого продукту, наповнення, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту)/А/Т Ново Нордск (виробник для збирання, маркування та упаковки, вторинного пакування), Данія/Данія	р-н д/ін'єк. по 3мл у картр. в багатодоз. однораз. шпр.-руч.	6мг/мл	№2	176,12	

● **Репаглінід (Repaglinide)**

Фармакотерапевтична група: А10ВХ02 - гіпоглікемізуючі препарати, за винятком інсулінів.

Основна фармакотерапевтична дія: швидкодіючий стимулятор секреції інсуліну, швидко знижує рівень глюкози в крові, стимулюючи секрецію інсуліну підшлунковою залозою, причому ефект його залежить від кількості функціонуючих б-клітин, що збереглися в острівцях залози; закриває АТФ-залежні кальцеві канали у мембрані б-клітин спеціальним білком, що викликає деполаризацію б-клітин і призводить до відкриття кальцевих каналів, що збільшує вхід у клітину іонів кальцію, які стимулюють секрецію інсуліну; підвищення концентрації інсуліну в крові відбувається протягом 30 хв. після прийому всередину репаглініду; це знижує рівень глюкози у крові протягом усього періоду засвоєння прийнятої їжі; концентрація репаглініду у плазмі крові швидко знижується, його низький рівень відзначається у хворих на ЦД II типу протягом 4 год. після його прийому.

Показання для застосування ЛЗ: ЦД II типу (інсулінонезалежний ЦД, ІНЗЦД), коли за допомогою дієти, зниження маси тіла і фізичних навантажень не вдається досягти задовільного контролю рівня глюкози в крові; у комбінації з метформіном або тіазолідиндіонами хворим на ЦД II типу, в яких не вдається досягти задовільного контролю глікемії прийомом цих препаратів окремо, лікування слід розпочинати як доповнення до дієти або фізичних навантажень, щоб зменшити зумовлений прийомами їжі рівень глюкози у крові.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо, зазвичай приймати протягом 15 хв. від початку прийому їжі, проте час прийому може варіювати від безпосередньо перед їжею до 30 хв. до прийому їжі; хворим, які раніше не одержували гіпоглікемічних препаратів, рекомендується розпочинати з дози 0,5 мг на кожен прийом їжі; підбір дози починати ч/з 1-2 тижні (термін визначати за р-цією хворого на лікування); якщо хворий приймав інший пероральний засіб, то початкова доза - 1 мг. Максимальна рекомендована одноразова доза перед основними прийомами їжі становить 4 мг; МДД не має перевищувати 16 мг; хворих можна одразу перевести з інших пероральних цукрознижувальних препаратів на прийом репаглініду; максимальна рекомендована початкова доза для хворих, яких переводять на прийом репаглініду - 1 мг перед прийомом їжі. Якщо рівень глюкози в крові недостатньо ефективно контролюється прийомом метформіну, тіазолідиндіонів або репаглініду, ці препарати можна приймати одночасно; стартова доза репаглініду така ж, як і при монотерапії (0,5 мг).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпоглікемія, гіпоглікемія із втратою свідомості та гіпоглікемічна кома; біль у животі, діарея, блювання, закрп, нудота; АР, генералізовані р-ції гіперчутливості (анафілактичні р-ції), імунні р-ції, такі як васкуліти, еритема, свербіж, висипання, кропив'янка; порушення гостроти зору; СС захворювання; порушення ф-ції печінки, підвищення активності печінкових ферментів.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до репаглініду або до будь-якого компонента препарату; ЦД I типу (інсулінозалежний ЦД, ІЗЦД), С-пептид-негативний діабет; діабетичний кетоацидоз з наявністю або відсутністю коматозного стану; період вагітності та годування груддю; тяжкі порушення ф-ції печінки; сумісне застосування з гемфіброзілом.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 4 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ІНСВАДА	Ривофарм СА, Швейцарія	табл. у бл.	1 мг	№15x2, №15x4, №15x6		відсутня у реєстрі ОБЦ
	НОВОНОРМ®	А/Т Ново Нордск (дозвіл на випуск серій)/Берінгер Інгельхайм Фарма ГмБХ і Ко. КГ (виробництво нерозфасованого	табл. у бл.	1мг	№15x2	24,00	27,74/\$

	продукту)/Каталент Німеччина Шорндорф ГмБХ (виробник відповідальний за первинне та вторинне пакування), Данія/Німеччина/Німеччина					
НОВОНОРМ®	А/Т Ново Нордіск (дозвіл на випуск серії)/Берінгер Інгельхайм Фарма ГмБХ і Ко. КГ (виробництво нерозфасованого продукту)/Каталент Німеччина Шорндорф ГмБХ (виробник відповідальний за первинне та вторинне пакування), Данія/Німеччина/Німеччина	табл. у бл.	1мг, 2мг	№15x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НОВОНОРМ®	А/Т Ново Нордіск (дозвіл на випуск серії)/Берінгер Інгельхайм Фарма ГмБХ і Ко. КГ (виробництво нерозфасованого продукту)/Каталент Німеччина Шорндорф ГмБХ (виробник відповідальний за первинне та вторинне пакування), Данія/Німеччина/Німеччина	табл. у бл.	2мг	№15x2	15,67	27,74/\$
РЕПАГЛІНІД	Джубілант Дженеракс Лімітед, Індія	табл. у бл.	0,5мг, 1мг, 2мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

7.1.3. Інші лікарські засоби, які використовуються при цукровому діабеті

7.1.3.1. Інгібітори альдозоредуктази

- **Ізодибут (Isodibut)**

Фармакотерапевтична група: А10ХА - препарати, що застосовуються при цукровому діабеті. Інгібітори альдозоредуктази.

Основна фармакотерапевтична дія: інгібітор ферменту альдозоредуктази; знижує активність альдозоредуктази в 1,5-3 рази і підвищує активність сорбітолдегідрогенази в 1,2-1,4 рази, завдяки чому пригнічує сорбітоловий шлях обміну глюкози (його активність значно підвищена у хворих на ЦД) і попереджує накопичення сорбітолу в судинній стінці, нервах, кристалику, гальмує процеси глікозилювання білків; перешкоджає набуханню і пошкодженню тканин, в першу чергу судин, нервів, кристалика, знижує вміст у крові та клітинних мембранах глікозилюваних білків; покращує функціональний стан, метаболізм, мікроциркуляцію головного мозку, покращує пам'ять; підвищує гостроту зору, покращує кровопостачання кон'юнктиви та сітківки; покращує нирковий кровоплин, зменшує альбумінурію; відновлює чутливість і знімає болі в нижніх кінцівках, прискорює загоєння виразок; зменшує прояви периферичної нейропатії.

Показання для застосування ЛЗ: засіб для профілактики і лікування ускладнень ЦД: діабетична ангіопатія нижніх кінцівок, ретинопатія, нефропатія, полінейропатія, енцефалопатія, діабетична катаракта.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим і дітям старше 14 років, приймати до їди, по 500мг 3 р/добу; МДД - 4 г; курс лікування - 2-3 місяці; ч/з 6 міс. курс лікування повторюють; з метою профілактики ускладнень ЦД рекомендується проводити двомісячні курси 2 р/рік.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР - шкірний висип, кропив'янка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату; ниркова, печінкова недостатність.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ІЗОДИБУТ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	0,5 г	№10x3, №10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

7.1.3.2. Засоби для лікування ожиріння

7.1.3.2.1. Лікарські засоби периферичної дії для лікування ожиріння

- **Орлістам (Orlistat)** ^[КРИМ] (див. п. 3.15.1. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

7.1.3.3. Антигіпертензивні засоби

- **α-адреноблокатори**
- **Інгібітори АПФ**
- **Блокатори кальцієвих каналів**

7.1.3.4. Засоби для лікування ускладнень цукрового діабету

- **Натрію тіосульфат (Sodium thiosulfate)** * (див. п. 5.7.5. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЛІКУВАННІ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ")
- **Кислота тіоктова (Thioctic acid)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: А16АХ01 - засоби, що впливають на травну систему та метаболічні процеси.

Основна фармакотерапевтична дія: регулює ліпідний, вуглеводний, холестериновий обмін, має гепатопротекторну, дезінтоксикуючу дію, подібну до вітамінів речовина, яка утворюється ендogenousним шляхом; виконує коферментну ф-цію в окислювальному декарбоксилюванні кетокислот; покращує ф-цію печінки; суть дії α-ліпоєвої кислоти при ЦД полягає у зменшенні перекисного окислення ліпідів у периферійних нервах, покращанні ендоневрального кровотоку, що приводить до збільшення швидкості нервового проведення; α-ліпоєва кислота сприяє утилізації глюкози у м'язах незалежно від дії інсуліну, збільшенню вмісту макроергічних сполук у скелетних м'язах хворих на моторну нейропатію.

Показання для застосування ЛЗ: парестезії при діабетичній полінейропатії ПМД.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: інтенсивні парестезії, спричинені діабетичною полінейропатією - в/в концентрат для р-ну д/інф. у дозі від 12 мл (1 ампл. 300 ОД) до 24 мл (2 ампл. 300 ОД) /, що відповідає 300 - 600 мг тіоктової кислоти н/добу; після розведення концентрат для р-ну д/інф. застосовувати в/в протягом 2 - 4 тижнів на початковій стадії лікування, розводити у 250 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду та вводити в/в, тривалість інфузії має становити не менше 30 хв; р-н для інфузій вводять безпосередньо з флакона (тобто без розчинника) у вигляді в/в краплинної інфузії; для подальшої терапії застосовують пероральні форми тіоктової кислоти у дозі 300 - 600 мг/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: петехіальні крововиливи у слизові оболонки/шкіру, гіпокоагуляція, тромбоз, тромбоз; після в/в введення тіоктової кислоти спостерігались геморагічний висип (пурпура), порушення ф-ції тромбоцитів; реакції в місці введення; аутоімунний інсуліновий с-м; шкірні АР у вигляді висипання, кропив'янки, свербіжу, екземи, а також системні р-ції аж до розвитку шоку; зміни або порушення смакових відчуттів, головний біль, припливи, підвищена пітливість, запаморочення, порушення зору; після в/в введення тіоктової кислоти спостерігались судоми, а також двоїння в очах; втрата свідомості, напади; в окремих випадках при швидкому в/в введенні препарату спостерігались нудота, блювання, діарея, біль у животі; холестатичний гепатит; внаслідок поліпшеного засвоєння глюкози у деяких випадках може знижуватися рівень цукру в крові, через що можлива поява симптомів, подібних до симптомів гіпоглікемії, таких як запаморочення, підвищена пітливість, головний біль, розлади зору; при швидкому в/в введенні можливі біль у ділянці серця, тахікардія; після швидкого в/в введення можливі підвищення внутрішньочерепного тиску, утруднене дихання; слабкість.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин ЛЗ в анамнезі.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,6 г., парентерально - 0,6 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	АЛЬФА-ЛІПОН	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. вкриті п/о у бл.	300мг, 600мг	№6x5, №10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЛЬФА-ЛІПОН	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. вкриті п/о у бл.	300мг	№10x3	8,92	
	АЛЬФА-ЛІПОН	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. вкриті п/о у бл.	600мг	№10x3	7,98	
	ДІАЛІПОН®	АТ "Фармак", Україна	р-н д/інфуз. по 20мл в ампл. у бл.	30мг/мл	№5x1	77,00	
	ДІАЛІПОН®	АТ "Фармак", Україна	р-н д/інфуз. по 10мл в ампл. у бл.	30мг/мл	№5x1	88,00	
	ДІАЛІПОН®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/інфуз. по 10мл, 20мл в ампл. у бл.	30мг/мл	№5, №10, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДІАЛІПОН®	ПАТ "Фармак", Україна	капс. у бл.	300мг	№10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДІАЛІПОН®	ПАТ "Фармак", Україна	капс. у бл.	300мг	№10x3	14,33	
	ДІАЛІПОН® ТУРБО	АТ "Фармак", Україна	р-н д/інфуз. по 50мл у скл. фл.	12мг/мл	№1, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛІПОІКА	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл в ампл. у чар/уп.	300 мг/10 мл	№5x1	49,09	
	ЛІПОІКА	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. по 20мл в ампл. у чар/уп.	600 мг/20 мл	№5x1	45,89	

	ЛІПОІКА	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. вкриті п/о у чар/уп. в пач.	300мг, 600мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТІОКТОДАР	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна	р-н д/ін'єк. по 10мл у фл. в бл.чар/уп.	3%	№5x1	72,00	
	ТІОКТОДАР	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна	р-н д/ін'єк. по 10мл у фл. в бл.чар/уп.	3%	№5x2	72,00	
	ТІОКТОДАР	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна	р-н д/ін'єк. по 10мл у фл. в пач.	3%	№1	72,00	
	ТІО-ЛІПОН ТУРБО	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 50мл у фл.	12мг/мл	№1	74,00	
	ТІО-ЛІПОН ТУРБО	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 50мл у фл.	12мг/мл	№10	80,00	
	ТІО-ЛІПОН-НОВОФАРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 20мл у фл. в конт. чар/уп.	30мг/мл	№5x1	70,10	
	ТІО-ЛІПОН-НОВОФАРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 20мл у фл. в конт. чар/уп.	30мг/мл	№5x2	80,00	
	ТІО-ЛІПОН-НОВОФАРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 10мл у фл. в конт. чар/уп.	30мг/мл	№5x2	81,80	
	ТІО-ЛІПОН-НОВОФАРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 10мл у фл. в конт. чар/уп.	30мг/мл	№5x1	82,00	
	ТІО-ЛІПОН-НОВОФАРМ ТУРБО	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 50мл у фл.	12 мг/мл	№1,№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФАРМАЛІПОН	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 20мл у фл.	30 мг/мл	№5	70,00	
	ФАРМАЛІПОН® ТУРБО	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 50мл у фл.	12 мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	БЕРЛІТІОН® 300 ОД	ЕВЕР Фарма Йсна ГмбХ (виробництво «in bulk», первинне пакування, контроль серій, вторинне пакування (тільки маркування ампул))/БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (вторинне пакування, контроль та випуск серій)/Унітакс-Фармалогістік ГмбХ (вторинне пакування)/Белвік Фаллер Фарм, Німеччина/Німеччина/Німеччина/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 12мл в амп. у кор.	300мг/12мл	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БЕРЛІТІОН® 300 ОД	ЕВЕР Фарма Йсна ГмбХ (виробництво «in bulk»,	конц. д/р-ну д/інфуз. по	300мг/12мл	№5	102,65	32,08/€

		первинне пакування, контроль серій, вторинне пакування (тільки маркування ампул))/БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (вторинне пакування, контроль та випуск серій)/Унітакс-Фармалогістік ГмбХ (вторинне пакування)/Белвік Фаллер Фарм, Німеччина/Німеччина/Німеччина/Німеччина	12мл в амп. у кор.				
БЕРЛІТІОН® 600 КАПСУЛИ	Каталент Німеччина Ебербах ГмбХ (виробник, відповідальний за виробництво «in bulk», контроль серій)/Каталент Німеччина Шорндорф ГмбХ (виробник, відповідальний за первинне та вторинне пакування)/БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробник, відповідальний за первинне та втори, Німеччина/Німеччина/Німеччина	капс. м'які у бл.	600мг	№15x1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
БЕРЛІТІОН® 600 КАПСУЛИ	Каталент Німеччина Ебербах ГмбХ (виробник, відповідальний за виробництво «in bulk», контроль серій)/Каталент Німеччина Шорндорф ГмбХ (виробник, відповідальний за первинне та вторинне пакування)/БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробник, відповідальний за первинне та втори, Німеччина/Німеччина/Німеччина	капс. м'які у бл.	600мг	№15x2	15,16	31,37/€	
БЕРЛІТІОН® 600 ОД	Зігфрід Хамельн ГмбХ (виробництво «in bulk», пакування, контроль серій)/БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (випуск серій)/ЕВЕР Фарма Йена ГмбХ (виробництво «in bulk», первинне пакування, контроль серій; вторинне пакування (в тому числі маркування ампул)), Німеччина/Німеччина/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 24мл в амп. у кор.	600мг/24мл	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ		
БЕРЛІТІОН® 600 ОД	Зігфрід Хамельн ГмбХ (виробництво «in bulk», пакування, контроль серій)/БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (випуск серій)/ЕВЕР Фарма Йена ГмбХ (виробництво «in bulk», первинне пакування, контроль серій; вторинне пакування (в тому числі маркування ампул)), Німеччина/Німеччина/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 24мл в амп. у кор.	600мг/24мл	№5	88,53	31,62/€	

ЕСПА-ЛІПОН® 600	Фарма Вернігероде ГмбХ (контроль якості)/еспарма Фарма Сервісез ГмбХ (вторинне пакування)/Адванс Фарма ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії), Німеччина/Німеччина/Німеччина	табл. в/о у бл.	600 мг	№10х3	23,33	29,56/€
ЕСПА-ЛІПОН® ІН'ЄКЦ. 300	Зігфрід Хамельн ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості)/Еспарма ГмбХ (випуск серії), Німеччина/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 12мл в амп. у кор.	25 мг/мл	№10	130,00	31,87/€
ЕСПА-ЛІПОН® ІН'ЄКЦ. 600	Зігфрід Хамельн ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості)/Еспарма ГмбХ (випуск серії), Німеччина/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 24мл в амп. у кор.	25 мг/мл	№5	140,00	29,56/€
ТІОГАМА®	Солюфарм Фармацойтіше Ерцойгніссе ГмбХ, Німеччина	р-н д/інфуз. по 20мл в амп.	3 %	№ 5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ТІОГАМА®	Драгенофарм Аптекарь Пюшл ГмбХ, Німеччина	табл. вкриті п/о у бл.	600 мг	№10х3, №10х6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ТІОГАМА® ТУРБО	Солюфарм Фармацойтіше Ерцойгніссе ГмбХ, Німеччина	р-н д/інфуз. по 50мл у фл.	1,2 %	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ТІОГАМА® ТУРБО	Солюфарм Фармацойтіше Ерцойгніссе ГмбХ, Німеччина	р-н д/інфуз. по 50мл у фл.	1,2 %	№10	72,50	28,07/€
ТІОКТАЦИД® 600 HR	МЕДА Меньюфекчеринг ГмбХ (виробник, відповідальний за виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, контроль якості)/МЕДА Фарма ГмбХ енд Ко. КГ (виробник, відповідальний за випуск серії)/Роттафарм Лтд., Німеччина/Німеччина/Ірландія	табл. в/о у фл.	600мг	№100	10,88	32,00/€
ТІОКТАЦИД® 600 HR	МЕДА Меньюфекчеринг ГмбХ (виробник, відповідальний за виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, контроль якості)/МЕДА Фарма ГмбХ енд Ко. КГ (виробник, відповідальний за випуск серії)/Роттафарм Лтд., Німеччина/Німеччина/Ірландія	табл. в/о у фл.	600мг	№30	15,33	32,00/€

ТЮКТАЦИД® 600Т	Зіґфрид Гамельн ГмБХ (усі виробничі стадії, за винятком випуску серії)/МЕДА Фарма ГмБХ енд Ко. КГ (випуск серії), Німеччина/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 24мл в амп. у конт. чар/уп.	600мг/24мл	№5х1	88,70	
ТЮКТОН	К.Т. РОМФАРМ КОМПАНІ С.Р.Л., Румунія	р-н д/ін'єк. по 24мл у фл.	600мг/24мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

7.2. Засоби для лікування гіпоглікемії

● Глюкоза (Glucose) *

Фармакотерапевтична група: В05СХ01- р-н для в/в введення. Вуглеводи.

Основна фармакотерапевтична дія: забезпечує субстратне поповнення енерговитрат, активує обмінні процеси в організмі; 40 % р-н глюкози як гіпертонічний р-н підвищує осмотичний тиск крові, внаслідок чого посилюється рух рідини з тканин у кров; покращує антитоксичну ф-цію печінки, підвищує скоротливість міокарда, збільшує діурез.

Показання для застосування ЛЗ: гіпоглікемія ^{ВООЗ БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять в/в (дуже повільно), дорослим - по 20-40-50 мл на введення, при необхідності вводять краплинно, зі швидкістю до 30 крап./хв (1,5 мл/кг/год), до 300 мл/добу; МДД для дорослих - 15 мл/кг, але не більше 1000 мл/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперглікемія, гіпокаліємія, гіпофосфатемія, гіпомагніємія, ацидоз, полідипсія, нудота, АР, включаючи підвищення t° тіла, шкірні висипання, ангіоневротичний набряк, шок, поліурія, глюкозурія, порушення водно-електролітного обміну, введення глюкози на тлі недостатності тіаміну (вітаміну В₁), у тому числі у хворих з алкогольним делірієм, може спровокувати розвиток дефіцитних станів, наприклад, енцефалопатії Верніке; у хворих з тяжкою недостатністю харчування можливе виникнення затримки натрію, набряків, набряку легень, застійної СН; зміни у місці введення, включаючи біль у місці введення, подразнення вен, флебіт, венозний тромбоз.

Протипоказання до застосування ЛЗ: внутрішньочерепні та внутрішньоспінальні крововиливи, ішемічний інсульт, за винятком станів, які пов'язані з гіпоглікемією; тяжка дегідратація, включаючи алкогольний делірій; гіперчутливість до глюкози та інших складових препарату; ЦД та інші стани, що супроводжуються гіперглікемією; анурія; с-мом мальабсорбції глюкозо-галактози; не вводити одночасно з препаратами крові.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначена, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	ГЛЮКОЗА	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 10мл, 20мл в амп. у пач.	40%	№5, №10, №5х1, №5х2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЛЮКОЗА	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 10мл в амп. у пач.	40%	№5х2	40,00	
	ГЛЮКОЗА	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 20мл в амп. у пач.	40%	№5х2	70,00	
	ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 10мл, 20мл в амп. у пач.	400мг/мл	№5, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 20мл в амп. у пач.	400мг/мл	№10	61,61	

● Глюкагон (Glucagon) * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: Н04АА01 - гормони підшлункової залози. Глікогенолітичні гормони.

Основна фармакотерапевтична дія: є гіперглікемізуючим агентом, що мобілізує глікоген печінки, який вивільняється в кров у вигляді глюкози; глюкагон не буде ефективним при недостатності глікогену в печінці, тому ефект глюкагону незначний або відсутній у хворих, які тривалий час не приймали їжі, у пацієнтів з недостатністю надниркових залоз, хр. гіпоглікемією, або якщо гіпоглікемія спричинена надмірним вживанням алкоголю; глюкагон стимулює вивільнення катехоламінів; за наявності феохромоцитоми глюкагон може спричинити вивільнення великої кількості катехоламінів пухлиною, що призводить до г. гіпертензивних р-цій; пригнічує тонус і перистальтику гладеньких м'язів у ШКТ.

Показання для застосування ЛЗ: тяжких гіпоглікемічних р-цій, що можуть виникати у дорослих і дітей, хворих на інсулінозалежний ЦД, які отримують інсулін ^{ПМД БНФ}; діагностичне показання ^{БНФ} гальмування перистальтики кишечника у дорослих.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: терапевтичне показання (тяжка гіпоглікемія) - для дорослих: 1 мг ^{БНФ} п/ш або в/м ін'єкції; дітям з масою тіла до 25 кг або віком до 6 - 8 років вводять 0,5 мг ^{БНФ}, дітям з масою тіла > 25 кг або віком від 6 - 8 років вводять 1 мг, діагностичне показання (гальмування шлунково-кишкової перистальтики) - діагностична доза для розслаблення шлунка, цибулини ДПК, ДПК і тонкої кишки становить 0,2-0,5 мг у вигляді в/в ін'єкції або 1 мг в/м ^{БНФ}; доза для розслаблення товстої кишки становить 0,5-0,7 мг в/м або 1-2 мг в/м ^{БНФ}.

Звичайно клінічний ефект від введення препарату настає протягом 10 хв. Коли хворий зможе ковтати, йому слід прийняти всередину їжу, багату на вуглеводи, для відновлення запасів глікогену в печінці та запобігання рецидиву гіпоглікемії, якщо хворий не реагує на введення препарату протягом 10 хв, ввести глюкозу в/в.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: реакції гіперчутливості, включаючи анафілактичні реакції/шок; нудота; блювання, біль у черевній порожнині; вторинна гіпоглікемія, тахікардія та зміни АТ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до глюкагону або до будь-якого компонента препарату; феохромоцитом.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 1 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ГЛЮКАГЕН® 1 МГ ГІПОКІТ	А/Т Ново Нордск (виробник лікарського засобу, первинне та вторинне пакування; виробник, відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; Виробник лікарського засобу, первинне пакування, ліофілізація та контроль готового лікарського засобу. Контроль яко, Данія/Бельгія	ліофіл. д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч.	1мг (1 МО)	№1	552,75	27,82/\$

7.3. Засоби для лікування захворювань щитоподібної залози

7.3.1. Тиреоїдні гормони

- **Левотироксин натрію (Levothyroxine sodium) ***

Фармакотерапевтична група: H03AA01 - препарати гормонів для системного застосування (за винятком статевих гормонів та інсуліну). Препарати для лікування захворювань щитоподібної залози. Тиреоїдні препарати.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний лівообертальний ізомер тироксину, виявляє ефекти, ідентичні тим, які має гормон, що секретується щитовидною залозою; перетворюється у Т₃ (трийодтиронін) у периферичних органах, як ендогенний гормон, і впливає на Т₃-рецептори; немає різниці між функціями ендогенного гормону і екзогенного левотироксину.

Показання для застосування ЛЗ: у дозі 25 - 200 мкг: лікування доброякісного еутиреоїдного зоба, профілактика рецидивів після оперативного лікування еутиреоїдного зоба, як замісна терапія при гіпотиреозі^{ВООЗ БНФ}, супресивна терапія раку щитовидної залози; у дозі 25 - 100 мкг: як допоміжний препарат під час проведення антитиреоїдної терапії при гіпертиреозі; у дозі 100/150/200 мкг: як діагностичний засіб при проведенні тесту тиреоїдної супресії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: добову дозу визначають індивідуально, приймають вранці натще, за 30 хв. до їди^{БНФ}, запиваючи півсклянкою води; рекомендовані дози: лікування доброякісного еутиреоїдного зоба, профілактика рецидивів після оперативного лікування еутиреоїдного зоба - 75-200 мкг/добу^{БНФ}; профілактика рецидивів після оперативного лікування еутиреоїдного зоба - 75-200 мкг/добу, у замісній терапії гіпотиреозу у дорослих: початкова доза - 25-50 мкг/добу^{БНФ}, підтримуюча доза - 100^{ВООЗ БНФ} -200 мкг/добу; для немовлят та дітей із вродженим гіпотиреозом, яким показана негайна замісна терапія початкова доза у перші 3 міс. 10-15 мкг на кг маси тіла н/добу; у замісній терапії гіпотиреозу у дітей: початкова доза - 12,5-50 мкг/добу, підтримуюча доза - 100-150 мкг/м² поверхні тіла; як допоміжний препарат під час проведення антитиреоїдної терапії гіпертиреоза - 50-100 мкг/добу^{ВООЗ БНФ}; як допоміжний препарат під час проведення антитиреоїдної терапії гіпертиреоза - 50-100 мкг/добу^{ВООЗ БНФ}; як діагностичний засіб при проведенні тесту тиреоїдної супресії: за 2 тижні до тесту - 200 мкг/добу, за 1 тиж. до тесту - 200 мкг/добу та за 4 тижні до тесту - 75 мкг/добу, за 3 тижні до тесту - 75 мкг/добу, за 2 тижні до тесту - 150 мкг/добу, за 1 тиждень і до тесту - 150 мкг/добу; супресивна терапія раку щитоподібної залози - 150-300 мкг/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперчутливість, серцеві аритмії (миготлива аритмія, екстрасистолія), тахікардія, стенокардія, відчуття серцебиття, припливи; головний біль, безсоння, відчуття тривоги, псевдотумор мозку, тремор; блювання, діарея, зменшення маси тіла; підвищена пітливість, м'язова слабкість та судоми; підвищення температури тіла, розлади менструального циклу; АР на шкірі та з боку дихальних шляхів, включаючи шкірні висипання, свербіж, кропив'янку, ангіоневротичний набряк, задишку, випадки розвитку набряку Квінке псевдопухлина головного мозку (переважно у дітей).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого компоненту препарату; недостатність наднирникових залоз, гіпофізарна недостатність, тиреотоксикоз, які не лікувалися; г. ІМ, г. міокардит, г. панкардит; комбінована терапія левотироксином та антитиреоїдними засобами під час вагітності не призначається.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,15 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	L-ТИРОКСИН-	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	25мкг	№10x5	6,00	

	ФАРМАК®						
	L-ТИРОКСИН-ФАРМАК®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	50мкг	№10x5	3,30	
	L-ТИРОКСИН-ФАРМАК®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	100мкг	№10x5	1,80	
II.	L-ТИРОКСИН 100 БЕРЛІН-ХЕМІ	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", контроль серій; пакування, контроль та випуск серій), Німеччина	табл. у бл.	100мкг	№25x1, №25x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	L-ТИРОКСИН 100 БЕРЛІН-ХЕМІ	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", контроль серій; пакування, контроль та випуск серій), Німеччина	табл. у бл.	100мкг	№25x2	2,34	32,56/€
	L-ТИРОКСИН 125 БЕРЛІН-ХЕМІ	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", контроль серій; пакування, контроль та випуск серій), Німеччина	табл. у бл.	125мкг	№25x1, №25x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	L-ТИРОКСИН 125 БЕРЛІН-ХЕМІ	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", контроль серій; пакування, контроль та випуск серій), Німеччина	табл. у бл.	125мкг	№25x2	2,03	32,56/€
	L-ТИРОКСИН 150 БЕРЛІН-ХЕМІ	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", контроль серій; пакування, контроль та випуск серій), Німеччина	табл. у бл.	150мкг	№25x1, №25x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	L-ТИРОКСИН 150 БЕРЛІН-ХЕМІ	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", контроль серій; пакування, контроль та випуск серій), Німеччина	табл. у бл.	150мкг	№25x2	1,82	32,56/€
	L-ТИРОКСИН 50 БЕРЛІН-ХЕМІ	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", контроль серій; пакування, контроль та випуск серій), Німеччина	табл. у бл.	50мкг	№25x1, №25x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	L-ТИРОКСИН 50 БЕРЛІН-ХЕМІ	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", контроль серій; пакування, контроль та випуск серій), Німеччина	табл. у бл.	50мкг	№25x2	4,20	32,56/€
	L-ТИРОКСИН 75 БЕРЛІН-ХЕМІ	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", контроль серій; пакування, контроль та випуск серій), Німеччина	табл. у бл.	75мкг	№25x1, №25x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	L-ТИРОКСИН 75 БЕРЛІН-ХЕМІ	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", контроль серій; пакування, контроль та випуск серій), Німеччина	табл. у бл.	75мкг	№25x2	2,93	32,56/€
	ЕУТИРОКС	Мерк Хелскеа КГаА, Німеччина	табл. у бл.	25мкг, 50мкг, 75мкг, 100мкг, 125мкг, 150мкг	№25x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕУТИРОКС	Мерк Хелскеа КГаА, Німеччина	табл. у бл.	25мкг	№25x4	6,47	30,09/€
	ЕУТИРОКС	Мерк Хелскеа КГаА, Німеччина	табл. у бл.	50мкг	№25x4	3,71	30,09/€
	ЕУТИРОКС	Мерк Хелскеа КГаА, Німеччина	табл. у бл.	75мкг	№25x4	2,59	30,09/€

		Німеччина					
ЕУТИРОКС	Мерк Хелскеа КГаА, Німеччина	табл. у бл.	100мкг	№25x4	2,16	30,09/€	
ЕУТИРОКС	Мерк Хелскеа КГаА, Німеччина	табл. у бл.	125мкг	№25x4	1,87	30,09/€	
ЕУТИРОКС	Мерк Хелскеа КГаА, Німеччина	табл. у бл.	150мкг	№25x4	1,64	30,09/€	

• **Тиротропін альфа (Thyrotropin alfa) ****

Фармакотерапевтична група: H01A B01-гормони гіпофіза та гіпоталамуса та аналоги, гормони передньої частки гіпофіза та аналоги.

Основна фармакотерапевтична дія: є гетеродимерним глікопротеїном, виробленим за технологією рекомбінантної ДНК, складається з двох нековалентно зв'язаних субодиниць. Комплементарні ДНК кодують альфа-субодиницю з 92 амінокислотних залишків, що містить два сайти глікозилювання, з'єднані N-зв'язком, та бета-субодиницю з 118 залишків, що містить один сайт глікозилювання, з'єднаний N-зв'язком; має біохімічні властивості, порівнянні із такими ТТГ. Зв'язування тиротропіну-альфа з ТТГ-рецепторами епітеліальних клітин щитовидної залози стимулює захоплення йоду та переведення його в органічну форму, а також синтез та виділення тиреоглобуліну (Тг), трийодтироніну (Т₃) та тироксину (Т₄).

Показання для застосування ЛЗ: для використання при серологічному дослідженні на тиреоглобулін (Тг) разом із візуалізацією з радіоактивним ізотопом йоду або без неї для виявлення залишків щитовидної залози та високодиференційованого раку щитовидної залози у пацієнтів, які перенесли тиреоїдектомію та одержують СГТ ^{БНФ}; у пацієнтів із високодиференційованим раком щитовидної залози групи низького ризику, рівень Тг у сироватці яких не визначається при отриманні СГТ та без стимульованого рекомбінантним тиреотропним гормоном (ТТГ) людини збільшенням рівнів Тг, застосовувати для визначення рівня ТТГ-стимульованого Тг; для претерапевтичної стимуляції у поєднанні з радіоактивним йодом у діапазоні доз від 30 мКі (1,1 ГБк) до 100 мКі (3,7 ГБк) для абляції залишків тироїдної тканини у пацієнтів, яким здійснювали субтотальну або тотальну тиреоїдектомію при високодиференційованому раку щитовидної залози та в яких немає ознак раку щитовидної залози з віддаленими метастазами.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Рекомендований режим дозування - 2 дози по 0,9 мг тиротропіну-альфа, що вводяться з проміжком часу у 24 год. шляхом в/м ін'єкції ^{БНФ}, розчинити водою д/ін'єк. 1,0 мл р-ну (еквівалентно 0,9 мг тиротропіну-альфа); Для візуалізації з радіоактивним ізотопом йоду і абляції введення радіоактивного ізотопу йоду проводити ч/з 24 год. після останнього введення препарату. Діагностична скінтиграфія виконується ч/з 48–72 год. після введення радіоактивного ізотопу йоду, тоді як постабляційну скінтиграфію можна провести пізніше, через кілька діб, коли фонові радіаційна активність знизиться. Для серологічного дослідження на тиреоглобулін (Тг) пробу сироватки крові слід відбирати ч/з 72 год. після останнього введення ЛЗ. Застосування препарату для серологічного дослідження на тиреоглобулін пацієнтам із високодиференційованим раком щитовидної залози, які перенесли тиреоїдектомію, здійснювати згідно з офіційними рекомендаціями щодо лікування раку щитовидної залози.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота, блювання, діарея; запаморочення, головний біль, інсульт, тремор, підвищена втомлюваність, посилене серцебиття, загальна слабкість, грип, грипоподібний стан, пірексія, озноб, відчуття жару, задишка, припливи, агевізія, дисгевзія, парестезія; кропив'янка, висипання, свербіж, гіпергідроз; біль у шиї, біль у спині, артралгія, міалгія; дискомфорт, біль, свербіж, висипання та кропив'янка у місці введення; припухлість новоутворень, біль при метастазах; зниження рівня ТТГ; гіпертиреозидизм, фібриляції передсердь; розростання залишкової тканини щитовидної залози або метастазів; повідомлялося про набряк гортані, порушення ф-ції дихання, яке потребувало здійснення трахеотомії, біль у місці утворення метастазів; випадки геміплегії, геміпарезу або втрати зору.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до бичачого або людського ТТГ або до будь-якої з допоміжних р-н ЛЗ. Вагітність.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ТИРОГЕН® 0,9 мг	Джензайм Лімітед (втор. уп., дозв. на вип. серії)/ Джензайм Ірланд Лімітед (вир-во кінц. прод. (fill/finish), контр. серії, перв. та втор. уп., дозв. на вип. серії)/ Хоспіра Інк. (перв. уп.)/ Джензайм Корпорейшн, Велика Британія/Ірландія/США	пор. д/приг. р-ину д/ін'єк. по 1,1мг у фл.	0,9 мг/мл	№2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

7.3.2. Антитиреоїдні засоби

• **Тіамазол (Thiamazole)**

Фармакотерапевтична група: H03BB02 - антитиреоїдні засоби. Сірковмісні похідні імідазолу.

Основна фармакотерапевтична дія: інгібує включення йоду в тирозин, а отже, інгібує неосинтез гормонів щитовидної залози, що дає змогу проводити симптоматичне лікування гіпертиреозу незалежно від його етіології; на сьогодні не визначено чи пригнічує він імунопатогенетичний процес; не впливає на секрецію попередньо синтезованих тиреоїдних гормонів, цим пояснюється в окремих випадках різна тривалість латентного періоду дії препарату до нормалізації концентрації тироксину і трийодтироніну в сироватці крові, а внаслідок цього - до

поліпшення клінічної картини; не впливає на гіпертиреоз, який розвинувся внаслідок вивільнення гормонів після руйнування клітин щитовидної залози (після лікування радіоактивним йодом або при тиреоїдиті).

Показання для застосування ЛЗ: консервативне лікування гіпертиреозу, особливо з відсутнім або малих розмірів зобом; підготовка до хірургічного лікування при всіх формах гіпертиреозу; підготовка до лікування радіоактивним йодом, особливо пацієнтів з тяжкою формою гіпертиреозу; проміжна терапія після лікування радіоактивним йодом; профілактичне лікування пацієнтів з субклінічною формою гіпертиреозу, автономними аденомами або тиреотоксикозом в анамнезі, які потребують впливу йоду (напр., діагностика із застосуванням йодовмісних контрастних препаратів).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: коригування дози проводити індивідуально; рекомендована доза для дорослих становить 10 - 40 мг/добу, у багатьох випадках пригнічення продукування гормону щитовидної залози забезпечується при прийомі 20 - 30 мг /добу; при захворюванні легкого ступеня тяжкості призначати у нижчому дозуванні, при тяжкому ступені застосовувати у початковій дозі 40 мг/добу; підтримуюча терапія: підтримуюча доза по 5 - 20 мг/добу у комбінації з левотироксином для профілактики гіпотиреозу, у вигляді монотерапії по 2,5 - 10 мг/добу; дітям призначають у початковій дозі 0,5 мг/кг/добу; тривалість терапії при консервативному лікуванні тиреотоксикоза становить від 6 місяців до 2 років; при підготовці до хірургічного лікування при всіх формах тиреотоксикозу - 3-4 тижні; профілактика гіпертиреозу при призначенні препаратів йоду, при існуванні латентного тиреотоксикозу, автономних аденом або тиреотоксикозу в анамнезі - рекомендована доза становить 10 - 20 мг/добу та/або 1 г перхлорату щодня протягом 10 днів, тривалість профілактичного лікування визначається з урахуванням тривалості періоду, протягом якого препарати йоду знаходяться в організмі; підготовка до хірургічного лікування при всіх формах гіпертиреозу - короткочасна підготовча терапія (протягом 3-4 тижнів, у деяких випадках препарат можна застосовувати довше) сприяє відновленню еутиреїдного стану, за рахунок чого зменшуються ризики, зумовлені хірургічним втручанням.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: агранулоцитоз; тромбоцитопенія, панцитопенія, генералізована лімфаденопатія; інсуліновий аутоімунний с-м (відзначається зниження рівня глюкози крові); порушення смакових відчуттів (дисгевзія, агевзія); неврити, полінейропатія; г. запалення слинних залоз; холестатична жовтяниця або токсичний гепатит; алергічні шкірні реакції (свербіж, висип, кропив'янка), тяжкі форми алергічних шкірних р-цій, включаючи генералізовані дерматити, алопецію, червоний вовчак, індукований ЛЗ; артралгія; гарячка, генералізований дерматит, включаючи с-м Стівенса-Джонсона.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до тіамазолу, інших похідних тіонамідів або до будь-якого компонента препарату; помірні та тяжкі порушення кількісного складу крові (гранулоцитопенія); холестаза перед початком лікування, не спричинений тиреотоксикозом; ураження кісткового мозку при проведеній раніше терапії тіамазолом або карбімазолом; сумісна терапія з тиреоїдними гормонами під час вагітності.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 10 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МЕРКАЗОЛІЛ-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у конт.	5мг	№10x5, №10 x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МЕРКАЗОЛІЛ-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у конт.	5мг	№100	5,26	
	МЕРКАЗОЛІЛ-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у конт.	5мг	№50	5,26	
II.	ТИРОЗОЛ	Мерк КГаА, Німеччина	табл. вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Лімії (Lithium) *** (див. п. 5.2.1. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЛІКУВАННІ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ")

7.3.3. Препарати йоду

- **Калію йодид (Potassium iodide) ***

Фармакотерапевтична група: Н03СА - препарати йоду, що застосовуються при захворюваннях щитовидної залози. Тиреоїдні лікарські засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: при надходженні до клітин епітелію фолікулів щитоподібної залози під впливом ферменту йодид-пероксидази відбувається окиснення йоду з утворенням елементарного йоду; речовина вступає в реакцію заміщення з ароматичним циклом тирозину, у результаті цього утворюються тироніни: 3,5-йод похідне (гормон тироксин - T₄) та 3-йод похідне (гормон трийодтиронін T₃); тироніни утворюють комплекс із білком тиреоглобуліном, який депонується у колоїді фолікула щитоподібної залози та зберігається у такому стані протягом кількох днів і тижнів; при дефіциті йоду цей процес порушується; йод, який надходить до організму у фізіологічних кількостях, запобігає розвитку ендемічного зоба, пов'язаного з нестачею цього елемента в їжі; нормалізує розміри щитоподібної залози у новонароджених, дітей і дорослих пацієнтів молодого віку; впливає на показники співвідношення T₃/T₄, рівень ТТГ.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика розвитку дефіциту йоду, у т.ч. у період вагітності або годування груддю; профілактика рецидиву йоддефіцитного зоба після хірургічного видалення, а також після завершення комплексного лікування препаратами гормонів щитоподібної залози; лікування дифузного еутиреїдного зобу у дітей, у т.ч. у новонароджених та дорослих осіб молодого віку.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: профілактика дефіциту йоду та ендемічного зоба: немовлята та діти віком до 12 років: 50-100 мкг/добу; діти віком від 12 років та дорослі: 100-200 мкг/добу; у період вагітності або годування груддю: 200 мкг/добу; профілактика рецидиву зоба після хірургічного видалення або після завершення курсу лікування препаратами гормонів щитовидної залози: діти та дорослі -100-200 мкг/добу; лікування еутиреїдного зоба: новонароджені та діти -100-200 мкг/добу; дорослі особи молодого віку: 300-500 мкг/добу; добову дозу препарату приймати за один прийом після їди, запиваючи достатньою кількістю рідини; дітям до 3 років препарат

можна давати у подрібненому вигляді з їжею, молоком, соком або водою; якщо препарат призначений немовлятам, його слід подрібнити і змішати з їжею; для лікування зоба у немовлят у більшості випадків достатньо 2-4 тижні, а у дітей та дорослих - 6-12 міс. або більше; питання про дозування та тривалість застосування препарату для профілактичних заходів або для лікування захворювань щитовидної залози вирішує лікар в індивідуальному порядку; при загрозі надходження в організм радіоактивного йоду для захисту від опромінення щитовидної залози призначати дорослим та дітям віком від 2 років по 125 мг ($1/2$ табл. 250 мг) 1 р/добу; половину табл. подрібнити і дати з невеликою кількістю солодкого чаю; застосовувати щодня до зникнення загрози надходження радіоактивного йоду в організм.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості (такі, як риніт, спричинений йодом, бульозна або туберозна йододерма, ексфоліативний дерматит, ангіоневротичний набряк, гарячка, акне і припухлість слинних залоз), при терапії зоба у дорослих (добова доза від 300 до 1000 мкг йоду) можливий розвиток гіпертиреозу, спричиненого йодом, прояви йодизму (набряк слизової оболонки носа, кропив'янка, набряк Квінке, шкірні висипання, свербіж, анафілактичний шок), еозинофілія, тахікардія, тремор, дратівливість, порушення сну, підвищене потовиділення, неприємні відчуття в епігастральній ділянці, діарея, можливий розвиток зоба і гіпотиреозу.

Протипоказання до застосування ЛЗ: Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого з допоміжних компонентів ЛЗ. Виражений гіпертиреоз; латентний гіпертиреоз (протипоказано застосовувати ЛЗ у дозах, що перевищують 150 мкг йоду н/добу). У разі автономної аденоми, фокальних та дифузних автономних вогнищ щитоподібної залози протипоказано застосовувати ЛЗ у дозі від 300 до 1000 мкг йоду н/добу (за винятком передопераційної йодотерапії з метою блокади щитоподібної залози за Пламером). Туберкульоз легенів. Геморагічний діатез. Герпетичний дерматит Дюринга (с-м Дюринга - Брока).

Визначена добова доза (DDD): перорально (СтДД) - 300 мкг, перорально - для дози 0,25 г (вказана ціна упаковки)

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЙОДИД-ФАРМАК®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	100мкг	№10x5	1,38	
	ЙОДИД-ФАРМАК®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	200 мкг	№10x5	0,81	
	ЙОД-НОРМІЛ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	100мкг, 200мкг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАЛІУ ЙОДИД	ПАТ "Монфарм", Україна	табл. у стрип.	0,25г	№10x15	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАЛІУ ЙОДИД	ПАТ "Монфарм", Україна	табл. у стрип.	0,25г	№10	20,00	
II.	ЙОДОМАРИН® 100	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", контроль серій; контроль та випуск серій)/Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (виробництво "in bulk", пакування та контроль серій), Німеччина/Німеччина	табл. у фл.	100мкг	№50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЙОДОМАРИН® 100	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", контроль серій; контроль та випуск серій)/Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (виробництво "in bulk", пакування та контроль серій), Німеччина/Німеччина	табл. у фл.	100мкг	№100	2,29	29,36/€
	ЙОДОМАРИН® 200	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", контроль серій; пакування, контроль та випуск серій)/Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (виробництво "in bulk", пакування та контроль серій), Німеччина/Німеччина	табл. у бл.	200мкг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЙОДОМАРИН® 200	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk",	табл. у бл.	200мкг	№25x2	2,29	29,36/€

		контроль серій; пакування, контроль та випуск серій)/Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (виробництво "in bulk", пакування та контроль серій), Німеччина/Німеччина					
--	--	---	--	--	--	--	--

7.3.4. Лікарські засоби, що використовуються для симптоматичної терапії захворювань щитоподібної залози

7.3.4.1. β-адреноблокатори

(див. п.2.1. розділу «КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»)

7.3.4.2. Антиаритмічні лікарські засоби

(див. п.2.14. розділу «КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»)

7.3.4.3. Серцеві глікозиди

(див. п.2.12. розділу «КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»)

7.3.4.4. Сечогінні засоби

(див. п.2.17. розділу «КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»)

7.3.4.5. Лікарські засоби, що впливають на метаболізм серцевого м'язу

(див. п.2.17. розділу «КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»)

7.3.4.6. Лікарські засоби, що впливають на метаболізм головного мозку та мозковий кровообіг

(див. п.2.17. розділу «КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»)

7.3.4.7. Вітаміни

(див. розділ 20. «ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛИ»)

7.3.4.8. Препарати глюкокортикоїдних гормонів для лікування захворювань щитоподібної залози та їх ускладнень

- **Дексаметазон (Dexamethasone)** * (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Преднізолон (Prednisolone)** * (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Метилпреднізолон (Methylprednisolone)** * (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Триамцінолон (Triamcinolone)** (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

7.4. Засоби для лікування захворювань наднирників

7.4.1. Глюкокортикоїди

- **Бетаметазон (Betamethasone)**

Фармакотерапевтична група: H02AB01 - кортикостероїди для системного застосування. Глюкокортикоїди.

Основна фармакотерапевтична дія: має виражену протизапальну, протиалергічну, імуносупресивну дію; впливає на метаболізм вуглеводів, протеїнів та ліпідів. Дія на запальний та імунний процеси: зменшення імуноактивних клітин на рівні осередку запалення, зменшення вазодилатації, стабілізація лізосомальних мембран, пригнічення фагоцитозу, зменшення продукування простагландинів та споріднених сполук; протизапальна дія майже у 25 разів більша за дію гідрокортизону та у 8-10 разів більша за дію преднізолону. Дія на метаболізм вуглеводів та протеїнів: стимулює білковий катаболізм; у печінці звільнені амінокислоти перетворюються на глюкозу та глікоген ч/з процес гліконеогенезу; абсорбція глюкози в периферійні тканини зменшується, що призводить до гіперглікемії та глюкозурії. Дія на метаболізм ліпідів: ліполітична дія, дія на ліпогенез.

Показання для застосування ЛЗ: дерматологічні хвороби: атопічний дерматит (монетоподібна екзема), нейродерміти, контактний дерматит, виражений сонячний дерматит^{БНФ}, кропив'янка^{БНФ}, червоний плоский лишай, інсулінова ліподистрофія, гніздова алопеція, дискоїдний еритематозний вовчак, псоріаз, келоїдні рубці, звичайна пухирчатка, герпетичний дерматит^{БНФ}, кістозні вугри; ревматичні хвороби: РА, остеоартрит, бурсит, тендосиновіт, тендиніт, перитендиніт, анкілозивний спондиліт, епікондиліт, радикуліт, кокцидинія, ішіас, люмбаго, кривошия, гангліозна кіста, екзостоз, фасциїт, г.подагричний артрит, синовіальні кісти, х-ба Мортонна, запалення кубовидної кістки^{БНФ}, захворювання стоп, бурсит на тлі твердої мозолі, шпори, тугорухливість великого пальця стопи; алергічні стани^{БНФ}: БА, астматичний статус, сінна гарячка, тяжкий алергічний бронхіт, сезонний та аперіодичний алергічний риніт, ангіоневротичний набряк, контактний дерматит, атопічний дерматит, сироваткова хвороба, р-ції гіперчутливості на медичні препарати або укуси комах; колагенові хвороби: СЧВ, склеродермія, дерматомиозит, вузловий періартеріт; онкологічні захворювання: паліативна терапія лейкозу та лімфом у дорослих; г.лейкоз у дітей; інші захворювання: адреногенітальний с-ром, виразковий коліт, хвороба Крона, спру; патологічні зміни крові, які потребують проведення терапії ГКС, нефрит, нефротичний с-ром; первинна та вторинна недостатність кори надниркових залоз (при обов'язковому одночасному введенні мінералокортикоїдів), г. адреналова недостатність; передопераційна підтримуюча терапія (а також у випадках травм та супутніх захворювань) при відомій адреналовій недостатності чи при підозрі на неї; шок, не чутливий до традиційної терапії, коли підозрюється адренокортикальна недостатність; двобічна адреналектомія; вроджена адреналова гіперплазія; гострий тиреоїдит, негнійний тиреоїдит та тиреоїдний криз; гіперкальціємія, асоційована з раком;

набряк мозку (підвищений внутрішньочерепний тиск); лікування г. первинного відторгнення і класичного відстроченого відторгнення ниркового алотрансплантата; туберкульозний менінгіт із субарахноїдальною блокадою або її загрозою на тлі специфічної протитуберкульозної хіміотерапії; трихінельоз із неврологічними та міокардіальними ураженнями

Спосіб застосування та дози ЛЗ: сусп. д/ін'єкц.: не призначена для в/в або п/ш введення ! дозу слід підбирати для отримання задовільного клінічного ефекту, при системному застосуванні розпочинають з введення 1-2 мл препарату і за необхідності повторюють; при тяжких станах (СЧВ та астматичний статус), які потребують екстрених заходів, початкова доза 2 мл; при різноманітних дерматологічних захворюваннях 1 мл в/м; при захворюваннях дихальної системи в/м введення 1-2 мл препарату і за необхідності повторюють; при гострих та хронічних бурситах в/м введення 1-2 мл препарату і за необхідності проводять декілька повторних введень; **р-н д/ін'єкц.:** в/м, в/в, в/суглобове введення, дози та режим дозування слід визначити індивідуально, початкова доза д/дорослих становить до 8 мг бетаметазону н/добу, дозу слід корегувати до отримання задовільної клінічної відповіді; д/дітей початкова в/м доза бетаметазону становить 20-125 мкг/кг маси тіла н/добу; набряк головного мозку середня разова доза становить 2-4 мг 4 рази н/добу; р-ції відторгнення ниркового алотрансплантата вводити в/в крапельно, початкова доза становить 60 мг упродовж перших 24 год.; допологова профілактика респіраторного дистрес-синдрому у недоноджених новонароджених: рекомендується впродовж 24-48 год. до очікуваного моменту пологів вводити в/м по 4-6 мг кожні 12 год. (2-4 дози), лікування слід розпочинати принаймні за 24 год. (а ще краще за 48-72 години) до пологів; для профілактики трансфузійних ускладнень вводити 1 або 2 мл препарату (4-8 мг бетаметазону) в/в (безпосередньо перед переливанням крові); Субкон'юнктивально вводити, як правило, 0,5 мл препарату (2 мг бетаметазону).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: затримка натрію, підвищене виділення калію, гіпокаліємічний алкалоз, затримка рідини в тканинах, застійна СН у схильних до цього пацієнтів, гіпертензія, збільшення виведення кальцію, м'язова слабкість, втрата м'язової маси, погіршення міастенічних симптомів при тяжкій псевдопаралітичній міастенії, остеопороз, іноді з сильними болями в кістках та спонтанними переломами (компресійні переломи хребта), асептичний некроз голівок стегнової або плечової кісток, розриви сухожиль, стероїдна міопатія, патологічні переломи, нестабільність суглобів, атрофія шкіри, погіршення загоювання ран, потоншення та послаблення шкіри, петехії, синці, шкірні реакції, такі як алергічний дерматит, ангіоневротичний набряк, еритема обличчя, підвищена пітливість, кропив'янка, виразкові ураження шлунка з можливою перфорацією та кровотечею, панкреатит, здуття живота, перфорація кишечника, виразки стравоходу, нудота, блювання, гикавка, судоми, запаморочення, головний біль, мігрень, підвищення внутрішньочерепного тиску (псевдопухлина мозку), ейфорія, зміна настрою, зміна особистості та тяжка депресія, підвищена дратівливість, безсоння, психотичні реакції, зокрема у пацієнтів із психічними розладами в анамнезі, депресія, глаукома, задня субкапсулярна катаракта, екзофтальм, нечіткість зору, підвищення ВТ, клінічна симптомологія с-му Кушинга, порушення менструального циклу, підвищення потреби у застосуванні ін'єкцій інсуліну чи пероральних антидіабетичних засобів у пацієнтів, хворих на діабет, затримка розвитку плода або росту дитини, порушення толерантності до вуглеводів, прояви латентного ЦД, вторинне пригнічення гіпофізу та кори надниркових залоз є особливо шкідливим у випадку стресу (травми, хірургічне втручання або хвороба), негативний баланс азоту внаслідок катаболізму білка, ліпоматоз, збільшення маси тіла, кортикостероїди можуть спричинити пригнічення шкірних тестів, приховувати симптоми інфекції та активувати латентні інфекції, а також зменшити резистентність до інфекцій, зокрема до мікобактерій, туберкульозу, *Candida albicans* та вірусів, анафілактичні або AP, гіпотензивні реакції або реакції, пов'язані з шоком, поодинокі випадки сліпоты, пов'язані з введенням в осередок ураження у ділянці голови, зокрема обличчя, гіпер- або гіполігментація, підшкірна та шкірна атрофія, асептичні абсцеси, загострення після ін'єкції (внутрішньосуглобове введення) та артропатія Шарко, після повторного внутрішньосуглобового введення можливе ураження суглобів, існує ризик зараження.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до бетаметазону до інших компонентів препарату або до інших ГКС; системні мікози; в/м введення пацієнтам із ідіопатичною тромбоцитопенічною пурпурою; виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки; гострі інфекційні процеси: вірусні інфекції та системні грибкові інфекції; тропічні паразитарні інфекції; після вакцинації живими аттенуйованими вірусами.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 1,5 мг., парентерально (депо) - 0,4 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БЕТАМЕТАЗОН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл. та пач.	4 мг/мл	№5x1, №5x2, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БЕТАСПАН®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у пач.	4мг/мл	№1, №5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БЕТАСПАН®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	4мг/мл	№5x1	15,00	
	ДЕПОС	ПАТ "Фармак", Україна	сусп. д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	5мг+2мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДЕПОС	ПАТ "Фармак", Україна	сусп. д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	5мг+2мг/мл	№5	5,14	
II.	ДИПРОСПАН®	Шерінг-Плау Лабо Н.В.	сусп. д/ін'єк. по	5мг+2мг/мл	№1	відсутня у	

	(для ампул: виробник за повним циклом)/СЕНЕКСІ HSC - ЕРУВІЛЬ СЕНТ КЛЕР (для ампул: виробник in bulk, первинне пакування; для попередньо наповнених шприців), Бельгія/Франція	1мл в амп. у кор. та шпр. в конт.			реєстрі ОБЦ	
ДИПРОСПАН®	Шерінг-Плау Лабо Н.В. (для ампул: виробник за повним циклом)/СЕНЕКСІ HSC - ЕРУВІЛЬ СЕНТ КЛЕР (для ампул: виробник in bulk, первинне пакування; для попередньо наповнених шприців), Бельгія/Франція	сусп. д/ін'єк. по 1мл в амп. у кор. та шпр. в конт.	5мг+2мг/мл	№5	35,79	24,98/\$
ФЛОСТЕРОН	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	сусп. д/ін'єк. по 1мл в амп.	5мг+2мг/мл	№5	24,95	35,35/€

• **Дексаметазон (Dexamethasone)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: H02AB02 - кортикостероїди для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: напівсинтетичний гормон кори надниркових залоз, що має глюкокортикоїдну дію, чинить протизапальну та імуносупресивну дію та впливає на енергетичний метаболізм, обмін глюкози і (ч/з негативний зворотний зв'язок) на секрецію фактора активації гіпоталамуса і трофічного гормону аденогіпофіза, внаслідок зв'язування з рецепторами мінералокортикоїдів вони регулюють метаболізм натрію, калію та водно-електролітну рівновагу; протизапальна та імунодепресивна дія базується на молекулярному та біохімічному впливі; молекулярна протизапальна дія виникає у результаті зв'язування з глюкокортикоїдними рецепторами та від зміни експресії ряду генів, які регулюють формування різних інформаційних молекул, білків та ферментів, що беруть участь у запальній р-ції; біохімічна протизапальна дія - результат блокування утворення та функціонування гуморальних медіаторів запалення: простагландинів, торомбоксанів, цитокінів та лейкотрієнів; виявляє у 30 разів сильнішу дію, ніж кортизол і т.ч. є більш потужним інгібітором кортикотропін-релізінг фактора (CRF) та секреції адренокортикоидного гормона (АКТГ) порівняно з ендogenousним кортизолом, що призводить до зменшення секреції кортизолу, після довготривалого пригнічення секреції CRF та АКТГ - до атрофії надниркової залози.

Показання для застосування ЛЗ: замісна терапія первинної або вторинної (гіпофізарної) недостатності надниркових залоз (крім г. недостатності надниркових залоз, при якій гідрокортизон або кортизон є більш придатними, зважаючи на їх більш виражений гормональний ефект); г. недостатність надниркових залоз (гідрокортизон або кортизон є препаратами вибору; може виявитися необхідним сумісне застосування з мінералокортикоїдами, особливо при застосуванні синтетичних аналогів); перед операціями та у випадках серйозних травм або захворювань у пацієнтів зі встановленою наднирковою недостатністю або при невизначеному аденокортикальному запасі; шок, стійкий до традиційної терапії, при наявній або підозрюваній недостатності надниркових залоз; уроджена гіперплазія надниркових залоз^{БНФ}; негнійне запалення щитовидної залози та тяжкі форми радіаційних тиреоїдитів; ревматологічні захворювання^{БНФ}: як допоміжна терапія у період, коли базова терапія не подіяла, тобто у пацієнтів, у яких знеболювальна та протизапальна дії НПВЗ були незадовільними); РА, включаючи ювенільний РА та позасуглобові прояви РА (ревматичні легені, зміни серця, очей, шкірний васкуліт); синовіт при остеоартрозі; посттравматичний остеоартроз; епіконділіт; г.неспецифічний тендосиновіт; г. подагричний артрит; псоріатичний артрит; анкілозуючий спондиліт; системні захворювання сполучної тканини; васкуліт; СЧВ (лікування полісірозитів та ураження внутрішніх органів); с-дром Шегрена (лікування легеневих, ниркових та церебральних уражень); системний склероз (лікування міозитів, перикардитів та альвеолітів); поліміозити, дерматоміозити; системні васкуліти; амілоїдоз(замісна терапія при недостатності надниркових залоз); пухирчатка; тяжка мультиформна еритема (с-м Стівенса-Джонсона); ексфолювативний дерматит; бульозний герпетичний дерматит; тяжкі форми ексудативної еритеми; вузликова еритема; тяжкі форми себорейного дерматиту, псоріазу; кропив'янка, що не піддається стандартному лікуванню; фунгоїдний мікоз; дерматоміозити; алергічні захворювання^{БНФ} (що не піддаються традиційному лікуванню): БА^{ПМД}; контактний дерматит; атопічний дерматит; сироваткова хвороба; хр. або сезонний алергічний риніт; алергія на ліки^{ПМД}; кропив'янка після переливання крові; захворювання органів зору^{БНФ}: запальні захворювання очей (г. центральний хоріоїдит, неврит зорового нерва); алергічні захворювання (кон'юнктивіти, увеїти, склерити, кератити, ірити); системні імунні захворювання (саркоїдоз, скроневий артеріт); проліферативні зміни в очниці (ендокринна офтальмопатія, псевдопухлина); імуносупресорна терапія при пересадці рогівки; р-н можливо вводити системно або ж місцево (під кон'юнктиву та ретробульбарне введення); шлунково-кишкові захворювання: для виведення пацієнта із критичного періоду при: виразковому коліті (тяжкий розвиток); хв.Крона^{БНФ} (тяжкий розвиток); хр. аутоімунні гепатити; реакція відторгнення при пересадці печінки;симптоматичний саркоїдоз (симптоматично); г. токсичний бронхіоліт^{БНФ}; хр. бронхіт та астма (при загостренні); вогнищевий або дисемінований туберкульоз легень (разом із відповідною протитуберкульозною терапією); бериліоз (гранульоматозне запалення); радіаційний або аспіраційний пневмоніт; набута або вроджена хр. апластична анемія; аутоімунна гемолітична анемія; вторинна тромбоцитопенія у дорослих; еритробластопенія; г. лімфобластозна лейкемія (індукційна терапія); ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура у дорослих (лише в/в введення, в/м введення протипоказане), мієлодиспластичний с-м; ангіоімунобластна злоскісна Т-клітинна лімфома (у комбінації з цитостатиками); плазмоцитома (у комбінації з цитостатиками); тяжка анемія після мієлофіброзу із мієлоїдною метаплазією або з лімфоплазмоцитоїдною імуноцитомою; системний гістоцитоз (системна залежність); імуносупресорна терапія при трансплантації нирки; стимулювання діурезу або

зменшення протеїнурії при ідіопатичному нефротичному синдромі (без уремії) і порушення функції нирок при СЧВ, первинний та вторинний гломерулонефрит (с-м Гудпасчера); ниркова недостатність при системних захворюваннях сполучних тканин (СЧВ, с-м Шегрена); системний васкуліт (зазвичай у комбінації з циклофосфамідами); гломерулонефрит при вузловому поліартриті; с-м Черджа-Строса; гранулематоз Вегенера; пурпура Шенлейна-Геноха; змішана криоглобулінемія; ниркова недостатність при артеріїті Таякасу; інтерстиціальний нефрит; паліативне лікування лейкемії та лімфоми у дорослих; г. лейкемія у дітей; гіперкальціємія при злоякісних захворюваннях; набряк мозку^{БНФ}: набряк головного мозку внаслідок первинної чи метастатичної пухлини головного мозку^{БНФ}, трепанація черепа та черепно-мозкові травми; шок^{ВООЗ}: шок, який не піддається класичному лікуванню; шок у пацієнтів із недостатністю кори надниркової залози; анафілактичний шок^{ВООЗ,БНФ, ПМД} (в/в після призначення адреналіну); перед операцією для запобігання шоку при підозрі або при встановленій недостатності кори надниркових залоз; інші показання: туберкульозний менингіт^{БНФ} із субарахноїдальною блокадою (разом із належною протитуберкульозною терапією); трихінельоз із неврологічними симптомами або трихінельоз міокарда; кістозна пухлина апоневрозу або сухожилля (ганглія); показання для внутрішньосуглобового введення або введення у м'які тканини: РА (тяжке запалення окремого суглоба); анкілозуючий спондиліт (коли запалені суглоби не піддаються традиційному лікуванню); псоріатичний артрит (олігоартрикулярна форма та тендовагініт); моноартрит (після евакуації синовіальної рідини); остеоартрит суглобів (тільки у випадку синовіту та ексудації); позасуглобовий ревматизм (епіконділіт, тендовагініт, бурсит); г. та подагричний артрит; місцеве введення (введення у місце ураження): келоїдні ураження; гіпертрофічні, запальні та інфільтровані ураження при лишай, псоріазі, кільцеподібній грануломі, склерозуючому фолікуліті, дискоїдному вовчаку та шкірному саркоїдозі; дисковий червоний вовчий лишай; хвороба Урбаха-Оппенгейма; локалізована алопеція.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н для ін'єкцій: призначають дорослим та дітям від народження; в/в (за допомогою ін'єкції або інфузії з р-ном глюкози або р-ном натрію хлориду), в/м або місцево (за допомогою ін'єкції у суглоб або ін'єкції у місце ураження на шкірі або в інфільтрат у м'які тканини); дозу слід визначати індивідуально відповідно до захворювання конкретного пацієнта, передбаченого періоду лікування, переносимості кортикоїдів і р-ції організму; рекомендована середня початкова добова доза для в/в чи в/м введення 0,5-9 мг/добу, при необхідності дозу можна збільшити; для введення у суглоб рекомендовані дози від 0,4 мг до 4 мг; зазвичай вводять 2-4 мг у великі суглоби та 0,8-1 мг - у маленькі, повторне введення в суглоб можливе після 3-4 міс.; введення може бути виконано 3 або 4 рази в один суглоб протягом усього життя та одночасно не більш ніж у 2 суглоби; частіше внутрішньосуглобне введення може ушкодити суглобовий хрящ та викликати кістковий некроз; доза дексаметазону, що вводиться у синовіальну сумку, зазвичай становить 2-3 мг, доза в оболонку сухожилля - 0,4-1 мг, у ганглії - від 1 до 2 мг; доза дексаметазону, що вводиться у місце пошкодження, прирівнюється до внутрішньосуглобної дози; дексаметазон можна водночас вводити не більше ніж у два місця пошкодження; дози для введення у м'які тканини (навколо суглоба) становлять 2-6 мг; дітям при в/м введенні рекомендована доза при замісній терапії становить 0,02 мг/кг маси тіла або 0,67 мг/м² площі поверхні тіла, розподілена на 3 дози, що вводиться кожного третього дня, або 0,008-0,01 мг/кг маси тіла або 0,2-0,3 мг/м² площі поверхні тіла на добу; при всіх ін. показаннях рекомендована доза становить 0,02-0,1 мг/кг маси тіла або 0,8-5 мг/м² площі поверхні тіла кожні 12-24 год.; **табл.:** рекомендована початкова доза для дорослих становить 0,5-9 мг на добу, підтримуюча доза - 0,5-3 мг на добу, добову дозу можна розділити на 2-4 прийоми; МДД 15 мг, мінімальна ефективна доза - 0,5-1 мг/добу; для дітей рекомендована доза для перорального застосування при замісній терапії становить 0,02 мг/кг маси тіла або 0,67 мг/м² площі поверхні тіла на добу за 3 прийоми, при всіх інших показаннях діапазон початкових доз становить у формі р-ну д/ін'єкцій - 0,02-0,1 мг/кг маси тіла або 0,8-5 мг/м² площі поверхні тіла кожні 12-24 год, у формі табл. - 0,08-0,3 мг/кг/добу або 2,5 мг-10 мг/м² площі поверхні тіла на добу у 3-4 прийоми; діагностичне випробування гіперфункції надниркових залоз (проба з дексаметазоном (проба Лідла) : проводиться у вигляді малого та великого тестів; під час малого тесту дексаметазон призначати по 0,5 мг кожні 6 год. протягом 48 год. (а саме: о 8 год. ранку, о 14 год., 20 год. та 2 год. ночі), до і після призначення дексаметазону визначати вміст 17-гідроксикортикостероїду або вільного кортизолу у добовій сечі; під час проведення великого тесту дексаметазон призначати по 2 мг кожні 6 год. протягом 48 год. (а саме: 8 мг/добу); також проводять збір сечі для визначення 17-гідроксикортикостероїду або вільного кортизолу (при необхідності визначати вільний кортизол у плазмі).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: реакції гіперчутливості; тромбоемболічні ускладнення, зменшення к-ті моноцитів та/або лімфоцитів, лейкоцитоз, еозінофілія; тромбоцитопенія та нетромбоцитопенічна пурпура; висип, кропив'янка, набряк Квінке, бронхоспазм, анафілактичні р-ції; розвиток опортуністичних інфекцій; мультифокальна екстрасистолія шлуночка, тимчасова брадикардія, СН, зупинка серця; перфорація міокарда внаслідок перенесеного ІМ; гіпертензивна енцефалопатія, гіпертензія; рецидив неактивного туберкульозу; набряк зорового нерва та збільшення внутрішньочерепного тиску (доброякісна внутрішньочерепна гіпертензія) після припинення лікування; запаморочення, вертиго; судоми; головний біль; зміни особистості та поведінки, ейфорія; безсоння, дратівливість, гіперкінез та депресія, нервозність, неспокій також були помічені; маніакально-депресивний психоз, делірії, дезорієнтація, галюцинації, параноя, лабільність настрою, думки про самогубство; психози; порушення сну, сплутаність свідомості, амнезія; погіршення перебігу шизофренії, погіршення перебігу епілепсії; пригнічення ф-ції надниркової залози та атрофія надниркової залози (зменшення реагування на стрес), затримка росту у дітей та підлітків, с-м Кушинга, порушення менструального циклу, гірсутизм; перехід від латентної форми до клінічних проявів діабету, збільшення потреби в інсуліні та оральних протидіабетичних лікарських засобах у хворих на ЦД, затримка натрію та води, збільшення витрат калію; гіпокаліємічний алкалоз, негативний азотний баланс зумовлений білковим катаболізмом; гіпокальціємія; езофагіт, нудота, гикавка, диспепсія, блювання; пептична виразка шлунка або ДПК, перфорації та кровотечі у ШКТ (блювання з домішками крові, малена), панкреатити, перфорація жовчного міхура та кишкова перфорація (особливо у пацієнтів із запальними захворюваннями кишечника); м'язова слабкість, стероїдна міопатія (м'язова слабкість, зумовлена м'язовим катаболізмом), остеопороз (збільшення виведення кальцію з організму) та переломи хребта при здавленні, асептичний кістковий некроз (найчастішим є некроз плечової та бедреної голівки), розриви сухожиль (особливо при одночасному застосуванні з деякими хінолінами); уповільнене загоєння ран, потоншення шкіра,

стриї, петехії та екхімози, еритема, підвищене потовиділення, акне, пригнічення шкірних тестів; набряк Квінке, алергічний дерматит; свербіж шкіри; підвищення ВТ, глаукома, катаракта, екзофтальм; загострення бактеріальних, грибкових або вірусних інфекцій очей; витончення рогівки; імпотенція; аменорея; набряк у місці введення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до дексаметазону або до будь-якого іншого інгредієнта препарату; г. вірусні, бактеріальні або системні грибкові інфекції (якщо не застосовується належна терапія), с-м Кушинга, вакцинація живою вакциною, годування груддю (за винятком невідкладних випадків); в/м введення протипоказане пацієнтам з тяжкими захворюваннями згортання крові; місцеве введення протипоказане при бактеріємії, системних грибкових інфекціях, пацієнтам із нестабільними суглобами, інфекціями у місці застосування, у т.ч. септичному артриті внаслідок гонореї чи туберкульозу.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1,5 мг., парентерально - 1,5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	ДЕКСАМЕТАЗОН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у пач.	4мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДЕКСАМЕТАЗОН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	4мг/мл	№5x1	1,22	
	ДЕКСАМЕТАЗОН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у пач.	4мг/мл	№100	1,22	
	ДЕКСАМЕТАЗОН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	табл. у бл.	0,5мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДЕКСАМЕТАЗОН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	табл. у бл.	0,5мг	№10x5	1,80	
	ДЕКСАМЕТАЗОН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл, 2мл в амп. у пач. та бл.	4мг/мл	№5, №5x1, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДЕКСАМЕТАЗОН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з	р-н д/ін'єк. по 1мл, 2мл в амп. у пач. та бл.	4мг/мл	№5	1,45	

		обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна					
	ДЕКСАМЕТАЗОН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у конт. чар/уп.	4мг/мл	№10x1, №5x2	1,20	
	ДЕКСАМЕТАЗОН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у конт. чар/уп.	4мг/мл	№5x1	1,24	
	ДЕКСАМЕТАЗОН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у конт. чар/уп.	0,5 мг	№10x5	1,10	
	ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у пач. та бл.	4мг/мл	№5,№5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у пач. та бл.	4мг/мл	№10	1,50	
	РАФТ	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у пач. та бл.	4мг/мл	№5, №5x1, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РАФТ	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у пач. та бл.	4мг/мл	№5x2	4,13	
II.	ДЕКСАМЕТАЗОН	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії, контроль серії)/НЛЗОХ (Національні лабораторія за здоров'є, околє ін храно) (контроль серії), Словенія/Словенія	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	4мг/мл	№5x5	4,86	30,27/€
	ДЕКСАМЕТАЗОН	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій), Словенія	табл. у бл.	0,5мг	№10x2,№10x3,№10x5, №10x6,№10x9,№10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДЕКСАМЕТАЗОН	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій), Словенія	табл. у бл.	0,5мг	№10x1	9,28	30,33/€
	ДЕКСАМЕТАЗОН КРКА	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій), Словенія	табл. у бл.	20мг, 40мг	№10x2,№10x3, №5x4,№5x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДЕКСАМЕТАЗОН КРКА	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій), Словенія	табл. у бл.	20мг	№10x1	2,49	27,68/€
	ДЕКСАМЕТАЗОН КРКА	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій), Словенія	табл. у бл.	40мг	№5x2	2,08	27,68/€
	ДЕКСАМЕТАЗОН КРКА	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне	табл. у бл.	4мг, 8мг	№10x1,№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

		пакування, контроль та випуск серії; первинне та вторинне пакування; контроль серії), Словенія					
	ДЕКСАМЕТАЗОН КРКА	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; первинне та вторинне пакування; контроль серії), Словенія	табл. у бл.	8мг	№10x3	3,63	30,57/€
	ДЕКСАМЕТАЗОН КРКА	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; первинне та вторинне пакування; контроль серії), Словенія	табл. у бл.	4мг	№10x3	3,82	30,57/€

● **Метилпреднізолон (Methylprednisolone)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: H02AB04 - кортикостероїди для системного застосування. Глюкокортикоїди.

Основна фармакотерапевтична дія: проникаючи ч/з клітинні мембрани і утворюючи зі специфічними цитоплазматичними рецепторами комплекси, які проникають у клітинне ядро, зв'язуються з ДНК, стимулюють транскрипцію мРНК і подальший синтез різних ферментів, чим пояснюється ефект при системному застосуванні; виявляють істотний вплив на запальний процес, імунну відповідь, впливають на вуглеводний, білковий та жировий обмін, ССС, скелетні м'язи і ЦНС; наявність протизапальних, імуносупресивних та проантіалергічних властивостей призводить до: зменшення кількості імуноактивних клітин навколо осередку запалення; зменшення вазодилатації; стабілізації лізосомальних мембран; пригнічення фагоцитозу; зменшення утворення простагландинів та пов'язаних з ними речовин; катаболічна дія на обмін білків призводить до вивільнення амінокислоти у печінці і перетворення за допомогою процесу глюконеогенезу в глюкозу та глікоген; т.ч. знижується абсорбція глюкози периферичними тканинами, що може призводити до гіперглікемії та глюкозурії, особливо у пацієнтів зі схильністю до ЦД; доза метилпреднізолону 4 мг виявляє такий самий протизапальний ефект, як 20 мг гідрокортизону, метилпреднізолон демонструє лише мінімальний мінералокортикоїдний ефект (200 мг метилпреднізолону відповідає 1 мг дезоксикортикостерону).

Показання для застосування ЛЗ: ендокринні захворювання: первинна і вторинна недостатність коркового шару надниркових залоз (при цьому препаратами першого ряду є гідрокортизон або кортизон; синтетичні аналоги можна застосовувати у поєднанні з мінералокортикоїдами; одночасне застосування мінералокортикоїдів особливо важливе для лікування дітей раннього віку), вроджена гіперплазія надниркових залоз, негнійний тиреоїдит, гіперкальціємія при злоякісних пухлинах; ревматичні захворювання^{БНФ}, як додаткова терапія для короткочасного застосування, при таких захворюваннях як, псоріатичний артрит, РА, включаючи ювенільний РА, анкілозуючий спондиліт, г. і підгострий бурсит; г. неспецифічний тендосиновіт, г. подагричний артрит, посттравматичний остеоартрит, синовіт при остеоартриті, епіконділіт; колагенози^{БНФ}, як підтримуюча терапія при: СЧВ, системний дерматоміозит (поліміозит), г. ревмокардит, ревматична поліміалгія при гігантоклітинному артеріїті, вузликівий періартеріїт; шкірні захворювання^{БНФ}: пухирчатка, бульозний герпетиформний дерматит, тяжка мультиформна еритема (с-м Стівенса-Джонсона), ексфолиативний дерматит, фунгоїдний мікоз, тяжкий псоріаз, тяжкий себорейний дерматит; алергічні стани^{БНФ}, у разі неефективності стандартного лікування: сезонний або цілорічний алергічний риніт, сироваткова хвороба, БА^{ПМД}, медикаментозна алергія, контактний дерматит, atopічний дерматит, кропив'янка; г. неінфекційний набряк гортані; захворювання очей: алергічні крайові виразки рогівки, ураження очей, спричинене *Herpes zoster*; запалення переднього відділу ока, дифузний задній увеїт та хоріоїдит, симпатична офтальмія, алергічний кон'юнктивіт, кератит, хоріоретиніт, неврит зорового нерва, ірит та іридоцикліт; захворювання органів дихання: симптоматичний саркоїдоз, с-м Лефлера, що не піддається терапії іншими методами, бериліоз, фульмінантний або дисемінований легеневий туберкульоз (у комбінації з протитуберкульозною хіміотерапією), аспіраційний пневмоніт; гематологічні захворювання: ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура у дорослих, вторинна тромбоцитопенія у дорослих, набута (аутоімунна) гемолітична анемія, еритробластопенія (еритроцитарна анемія), вроджена (еритроїдна) гіпопластична анемія; онкологічні захворювання, як паліативна терапія: лейкози і лімфоми у дорослих, г. лейкоз у дітей; набряковий с-м: для індукції діурезу або усунення протеїнурії при нефротичному с-мі без уремії, ідіопатичного типу або зумовленому СЧВ; захворювання травного тракту^{БНФ}: для виведення хворого з критичного стану при таких захворюваннях: виразковий коліт, хвороба Крона^{БНФ}; захворювання нервової системи: розсіяний склероз у фазі загострення, набряк мозку, спричинений пухлиною мозку^{БНФ}; захворювання інших органів і систем: туберкульозний менінгіт з субарахноїдальним блоком або при загрозі розвитку блока, у поєднанні з протитуберкульозною хіміотерапією, трихінельоз з ураженням нервової системи або міокарда; трансплантація органів^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: порошок д/ін'єк. - у вигляді в/в ін'єкцій, інфузій або в/м; дозу для дітей та немовлят, можна зменшувати, але керуватися тяжкістю стану і відповіддю пацієнта на лікування, доза повинна становити щонайменше 0,5 мг/кг маси тіла кожні 24 год; допоміжна терапія при станах, що загрожують життю - рекомендована доза становить 30 мг/кг маси тіла при введенні в/в протягом щонайменше 30 хв, цю дозу можна вводити повторно в умовах стаціонару кожні 4-6 год протягом 48 год залежно від клінічної необхідності; пульс-терапія у разі дуже серйозного загострення і/або неефективності стандартної терапії (НПЗЗ, солями золота та пеніциламіном), РА: 1 г/добу в/в протягом 1, 2, 3 чи 4 днів або 1 г/міс в/в 6 міс; дозу вводять в/в протягом 30 хв, і її введення можна проводити повторно, якщо протягом одного тижня після терапії не спостерігається зменшення симптомів або цього вимагає стан пацієнта; профілактика нудоти та блювання, що пов'язані з хіміотерапією з приводу злоякісного новоутворення: хіміотерапія, що спричиняє легкий або помірний еметогенний ефект: 250 мг

в/в протягом щонайменше 5 хв за одну год до проведення хіміотерапії, на початку хіміотерапії та після закінчення хіміотерапії; хіміотерапія, що спричиняє виражений еметогенний ефект -250 мг в/в протягом щонайменше 5 хв з відповідними дозами метоклопраміду або бутирфенону за 1 год до проведення хіміотерапії, а потім - у дозі 250 мг в/в на початку терапії та після закінчення хіміотерапії; г. травма спинного мозку: лікування необхідно починати в перші вісім годин після травми, якщо лікування почали проводити протягом 3 год після травми: вводять метилпреднізолон у дозі 30 мг/кг маси тіла в/в болюсно протягом 15 хвилин під постійним медичним спостереженням. Після болюсної ін'єкції роблять перерву 45 хв, після чого проводять безперервну інфузію препарату у дозі 5,4 мг/кг маси тіла на год протягом 23 год; якщо лікування почали проводити протягом 3-8 год після травми; вводять метилпреднізолон у дозі 30 мг/кг маси тіла в/в болюсно протягом 15 хв під постійним медичним спостереженням, після болюсної ін'єкції роблять перерву 45 хв, після чого проводять безперервну інфузію препарату у дозі 5,4 мг/кг маси тіла на год протягом 47 год, для інфузійної помпи вибирати інше місце для в/в ведення, ніж для болюсної ін'єкції; початкова доза - від 10 до 500 мг залежно від клінічного стану пацієнта та виду захворювання, великі дози можуть бути потрібні у разі короткочасного лікування тяжких г. станів, зокрема БА, сироваткової хвороби, уртикарних трансфузійних реакцій та загострень розсіяного склерозу; початкову дозу до 250 мг включно потрібно вводити в/в протягом щонайменше 5 хв, а дози, які перевищують 250 мг, вводити протягом 30 хв, наступні дози можна вводити в/в або в/м з інтервалами, які залежать від відповіді пацієнта та його клінічного стану; пневмонія, викликана *Pneumocystis carinii*, у пацієнту зі СНІДом: рекомендована доза препарату - 40 мг в/в кожні 6-12 год з поступовим зниженням дози протягом максимум 21 дня або до припинення лікування пневмоцистної інфекції, лікування має бути розпочато протягом 72 год з моменту початку лікування пневмоцистної інфекції; табл.: початкова доза може варіювати залежно від показань, високі дози можуть бути застосовані при таких клінічних ситуаціях, як розсіяний склероз (200 мг/добу), набряк мозку (200-1000 мг/добу) і трансплантація органів (до 7 мг/кг/добу), якщо через належний період часу задовільного клінічного ефекту не досягнуто, терапію таблетками метилпреднізолону відмінити та призначити пацієнту альтернативну терапію, якщо після тривалої терапії препарат потрібно відмінити, то рекомендується проводити це поступово, а не раптово. сусп.д/ін'єк.- у вигляді в/м, в/с введення, періартикулярно, інтрабурсально, інтрасиновіально; дозу встановлюють від тяжкості захворювання та розміру суглоба. у вигляді табл.- початкова доза ЛЗ залежить від показань; окремим пацієнтам можуть бути потрібні вищі стартові дози при таких клінічних ситуаціях, як розсіяний склероз (200 мг/добу), набряк мозку (200-1000 мг/добу) і трансплантація органів (до 7 мг/кг/добу).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції (включаючи підвищену сприйнятливність до виникнення інфекцій та підвищення тяжкості інфекцій з супресією клінічних симптомів); опортуністичні інфекції, рецидив латентного туберкульозу, перитоніт; лейкоцитоз; гіперчутливість до лікарського засобу, анафілактична реакція, анафілактоїдна реакція; кушингоїдний с-м; гіпопітуїтаризм; саркома Капоші; затримка натрію, затримка рідини в організмі; метаболічний ацидоз, гіпокаліємічний алкалоз, дисліпідемія, порушення толерантності до глюкози, підвищена потреба в інсуліні (або пероральних протидіабетичних засобах при ЦД), ліпоматоз, підвищений апетит (що може призвести до збільшення маси тіла), епідуральний ліпоматоз; афективний розлад (у тому числі депресивний настрій та ейфорійний настрій); психози (у тому числі манія, марення, галюцинації та шизофренія), психотична поведінка, афективні розлади (включаючи афективну лабільність, психологічну залежність, суїцидальне мислення), психічний розлад, зміни особистості, сплутаність свідомості, тривожність, перепади настрою, патологічна поведінка, безсоння, дратівливість; підвищення внутрішньочерепного тиску (з набряком диску зорового нерва (доброякісна внутрішньочерепна гіпертензія)), судоми, амнезія, когнітивний розлад, запаморочення, головний біль; катаракта; глаукома, екзофтальм, потоншення склери та рогівки, хоріоретинопатія; вертиго; застійна СН (у пацієнтів зі схильністю до цього), розрив міокарда в ділянці перенесеного ІМ; АГ; артеріальна гіпотензія, артеріальна емболія, тромботичні явища; легенева емболія, гикавка; пептична виразка (з можливою перфорацією та кровотечею); перфорація кишечника, шлункова кровотеча, панкреатит, виразковий езофагіт, езофагіт, здуття живота, біль у животі, діарея, диспепсія, нудота; підвищення рівнів печінкових ферментів (АЛТ, АСТ), атрофія шкіри, акне; ангіоневротичний набряк, гірсутизм, петехії, екхімоз, еритема, гіпергідроз, стрії шкіри, висипання, свербіж, кропив'янка, телеангіоектазії; м'язова слабкість, затримка росту; міалгія, міопатія, атрофія м'язів, остеопороз, остеонекроз, патологічні переломи, нейропатична артропатія, артралгія; нерегулярні менструації; порушення загоєння ран; периферичний набряк, втомлюваність, загальне нездужання, симптоми с-му відміни (занадто раптове зниження дози кортикостероїдів після тривалого застосування може призвести до г.недостатності кори надниркових залоз, артеріальної гіпотензії та летального наслідку); зниження рівня калію в крові; невідомо: підвищення ВТ, зниження толерантності до вуглеводів, підвищення рівня кальцію в сечі, підвищення рівня лужної фосфатази в крові, підвищення рівня сечовини в крові, пригнічення реакцій при проведенні шкірних тестів; розрив сухожилля (зокрема ахіллового сухожилля), компресійний перелом хребта.

Протипоказання до застосування ЛЗ: системні грибкові інфекції, системні інфекції у тих випадках, коли специфічна протимікробна терапія не призначена, гіперчутливість до метилпреднізолону чи інших компонентів ЛЗ, у дозуванні 40 мг протипоказаний пацієнтам з відомою або підозрюваною алергією на коров'яче молоко; застосування живих або живих ослаблених вакцин протипоказане пацієнтам, які отримують імуносупресивні дози ГК; в/в введення (суспензія для ін'єкцій), інтратекальне введення, епідуральне введення, інтраназальне введення та введення в око, а також деякі інші місця ін'єкції (шкіра у ділянці черепа, ротоглотка, крилопіднебінний вузол).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 7,5 мг., парентерально - 20 мг., парентерально (депо) - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МЕТИЛПРЕДНІ ЗОЛОН-ФС	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	4 мг	№10x3	6,35	
	МЕТИЛПРЕДНІ	ТОВ "Фарма Старт",	табл. у бл.	8 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

ЗОЛОН-ФС	Україна						
МЕТИПРЕД	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює виробництво за повним циклом (для пакування № 30, № 100); альтернативний виробник, що здійснює первинне та вторинне пакування (для пакування № 30, № 100) та випуск серії (для пакування № 30))/Товариство з обмеженою , Фінляндія/Україна	табл. у фл.	4мг	№100	відсутня у реєстрі ОБЦ		
МЕТИПРЕД	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює виробництво за повним циклом (для пакування № 30, № 100); альтернативний виробник, що здійснює первинне та вторинне пакування (для пакування № 30, № 100) та випуск серії (для пакування № 30))/Товариство з обмеженою , Фінляндія/Україна	табл. у фл.	4мг	№30	7,38	26,90/€	
II. ДЕПО-МЕДРОЛ	Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ, Бельгія	сусп. д/ін'єк. по 1мл у фл.	40 мг/мл	№1	106,60	25,87/\$	
МЕДРОЛ	Пфайзер Італія С.р.л., Італія	табл. у бл.	4мг	№30	8,55	27,09/\$	
МЕДРОЛ	Пфайзер Італія С.р.л., Італія	табл. у бл.	16мг	№10x5	6,57	27,09/\$	
МЕДРОЛ	Пфайзер Італія С.р.л., Італія	табл. у бл.	32мг	№10x2	4,22	27,09/\$	
МЕТИПРЕД	Оріон Корпорейшн, Фінляндія	табл. у фл.	16 мг	№30	4,55	26,90/€	
МЕТИПРЕД	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює вторинне пакування, контроль якості і випуск серії)/Хікма Фармасаеутика (Португалія), С.А. (виробник, що здійснює виробництво, пакування і контроль якості), Фінляндія/Португалія	пор. ліоф. д/ін'єк. у фл. з розч. або без	250мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
МЕТИПРЕД	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює вторинне пакування, контроль якості і випуск серії)/Хікма Фармасаеутика (Португалія), С.А. (виробник, що здійснює виробництво, пакування і контроль якості), Фінляндія/Португалія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	250мг	№1	15,85	31,45/€	
МЕТИПРЕД	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює вторинне пакування, контроль якості і випуск серії)/Хікма Фармасаеутика (Португалія), С.А. (виробник, що здійснює виробництво, пакування і контроль якості), Фінляндія/Португалія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000 мг	№1	8,96	31,45/€	
СОЛУ-МЕДРОЛ	Пфайзер Менюфекчуринг	пор. д/р-ну	40мг/мл	№1	67,73	27,09/\$	

	Бельгія НВ (виробництво, пакування, контроль якості, випуск серії)/ЕсДжіЕс Лаб Саймон СА (контроль якості при випуску та під час стабільності), Бельгія/Бельгія	д/ін`ек. у фл. типу Act-O-Vial з розч.				
СОЛУ-МЕДРОЛ	Пфайзер Менюфекчуриг Бельгія НВ (виробництво, пакування, контроль якості, випуск серії)/ЕсДжіЕс Лаб Саймон СА (контроль якості при випуску та під час стабільності), Бельгія/Бельгія	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл. типу Act-O-Vial з розч.	125мг/2 мл	№1	31,21	27,09/\$
СОЛУ-МЕДРОЛ	Пфайзер Менюфекчуриг Бельгія НВ (виробництво, пакування, контроль якості, випуск серії)/ЕсДжіЕс Лаб Саймон СА (контроль якості при випуску та під час стабільності), Бельгія/Бельгія	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл. з розч.	1000мг	№1	16,25	27,09/\$
СОЛУ-МЕДРОЛ	Пфайзер Менюфекчуриг Бельгія НВ (виробництво, пакування, контроль якості, випуск серії)/ЕсДжіЕс Лаб Саймон СА (контроль якості при випуску та під час стабільності), Бельгія/Бельгія	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл. з розч.	500мг	№1	16,25	27,09/\$

• **Преднізолон (Prednisolone)** * [ГІМД]

Фармакотерапевтична група: H02AB06 - кортикостероїди для системного застосування. Глюкокортикоїди.

Основна фармакотерапевтична дія: дегідрований аналог гідрокортизону; чинить протизапальну, протиалергічну, імунодепресивну, протишокову і антитоксичну дію; у відносно великих дозах пригнічує активність фібробластів, синтез колагену, ретикулоендотелію і сполучної тканини (гальмування проліферативної фази запалення), затримує синтез і прискорює катаболізм білка у м'язовій тканині, але підвищує його синтез у печінці; протиалергічні та імуносупресивні властивості препарату зумовлені гальмуванням розвитку лімфоїдної тканини з її інволюцією при тривалому застосуванні, зниженням числа циркулюючих Т- і В-лімфоцитів, пригніченням дегрануляції тучних клітин, пригніченням продукції антитіл; протишокова дія зумовлена підвищенням реакції судин на ендо- і екзогенні судинозвужувальні речовини, з відновленням чутливості рецепторів судин до катехоламінів і підсиленням їх гіпертензивного ефекту, а також затримкою виведення з організму натрію і води; антитоксична дія пов'язана зі стимуляцією у печінці процесів синтезу білка і прискоренням інактивації у ній ендогенних токсичних метаболітів і ксенобіотиків, а також із підвищенням стабільності клітинних мембран, у т.ч. гепатоцитів; підсилює у печінці депонування глікогену та синтез глюкози з продуктів білкового обміну; підвищення рівня глюкози в крові активізує виділення інсуліну; пригнічує захват глюкози жировими клітинами, що призводить до активації ліполізу, однак внаслідок збільшення секреції інсуліну відбувається стимуляція ліпогенезу, що сприяє накопиченню жиру; знижує всмоктування кальцію у кишечнику, підвищує вимивання його з кісток і екскрецію нирками; пригнічує вивільнення гіпофізом АКТГ і b-ліпотропину, у зв'язку з чим при тривалому застосуванні може сприяти розвитку функціональної недостатності кори надниркових залоз; пригнічує секрецію тиреотропного та фолікулоstimулюючого гормонів; у високих дозах може підвищувати збудливість тканин мозку і сприяти зниженню порогу судомної готовності; стимулює надмірну секрецію соляної к-ти і пепсину в шлунку, може сприяти розвитку пептичної виразки.

Показання для застосування ЛЗ: ревматична пропасниця, ревматичний кардит, мала хорея, системні захворювання сполучної тканини ^{ВОЗ БНФ} (СЧВ, склеродермія, вузликівий періартеріїт, дерматоміозит ^{БНФ}), розсіяний склероз, г. і хр. запальні захворювання суглобів ^{ВОЗ БНФ} (РА, ювенільний артрит, анкілозуючий спондилоартрит, подагричний і псоріатичний артрити, поліартрит, плечолопатковий періартрит, остеоартрит (у т.ч. посттравматичний), с-м Стілла у дорослих, бурсит, неспецифічний тендосиновіт, синовіт, епікондиліт), БА ^{БНФ}, астматичний статус ^{БНФ}, інтерстиціальні захворювання легень ^{БНФ} (гальвеоліт, фіброз легенів, саркоїдоз II-III ст.), рак легень (у комбінації з цитостатиками), бериліоз, аспіраційна пневмонія (у поєднанні зі специфічною терапією), еозинофільна пневмонія Леффлера, туберкульоз (туберкульоз легенів, туберкульозний менінгіт) - у поєднанні зі специфічною терапією, первинна і вторинна недостатність надниркових залоз (у т.ч. стани після видалення надниркових залоз), вроджена гіперплазія надниркових залоз, адреногенітальний с-м, підгострий тиреоїдит, г. і хр. алергічні захворювання (лікарська і харчова алергії, сироваткова хвороба, поліноз, atopічний дерматит, контактний дерматит із залученням великої поверхні тіла, кропив'янка, алергічний риніт, набряк Квінке, с-м Стівенса-Джонсона, токсикодермія), ^{ВОЗ БНФ} гепатит, гіпоглікемічні стани, аутоімунні захворювання (в т.ч. г.гломерулонефрит), нефротичний с-м, запальні захворювання ШКТ (неспецифічний виразковий коліт, хв.Крона ^{БНФ}, локальний ентерит), захворювання крові та органів кровотворення (агранулоцитоз, панмієлопатія, мієломна хвороба, г.лімфо- і мієлоїдний лейкоз, лімфогранулематоз, тромбоцитопенічна пурпура ^{БНФ}, вторинна

тромбоцитопенія у дорослих, аутоімунна гемолітична анемія, еритробластопенія, вроджена еритроїдна гіпопластична анемія), аутоімунні та інші шкірні захворювання (екзема, себорейний дерматит, псоріаз, с-м Лайелла, бульозний герпетиформний дерматит, пухирчатка, ексfolіативний дерматит), набряк мозку післяопераційний, післярадіаційний, посттравматичний, при пухлині мозку (застосовувати після парентеральних глюкокортикостероїдів); захворювання очей, у т.ч. алергічні та аутоімунні ^{вооз} БНФ (симпатична офтальмія, алергічні форми кон'юнктивіту, алергічна виразка рогівки, негнійний кератит, іридоцикліт, ірит, тяжкі повільні передні і задні увеїти, хоріоїдит, неврит зорового нерва); профілактика реакцій відторгнення трансплантата; гіперкальціємія на тлі онкологічних захворювань ^{вооз}; для профілактики та усунення нудоти, блювання при цитостатичній терапії ^{вооз} і

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дозування та тривалість застосування встановлюється індивідуально; р-н застосовують в/в, в/м та внутрішньосуглобово; для лікування дорослих добова доза 4-60 мг в/в або в/м; дітям в/м (глибоко в сідничний м'яз) суворо за показаннями і під контролем лікаря: дітям 6-12 років - 25 мг/добу, віком від 12 років - 25-50 мг/добу; при хворобі Аддісона добова доза для дорослих 4-60 мг в/в або в/м; при тяжкій формі неспецифічного виразкового коліту - по 8-12 мл/добу (240-360 мг) упродовж 5-6 днів, при тяжкій формі хвороби Крона - по 10-13 мл/добу (300-390 мг) упродовж 5-7 днів; при невідкладних станах вводять в/в, повільно (протягом 3 хв.) або краплинно, в дозі 30-60 мг, якщо в/в вливання утруднене, вводять в/м, глибоко; при цьому способі введення ефект розвивається повільніше; за необхідності вводять повторно в/в або в/м в дозі 30-60 мг ч/з 20-30 хв.; дорослим доза при внутрішньосуглобовому введенні становить 30 мг для великих суглобів, 10-25 мг - для суглобів середньої величини і 5-10 мг - для малих суглобів; вводять кожні 3 дні, курс лікування - до 3 тижнів; табл.: враховувати циркадний ритм секреції глюкокортикоїдів: більшу частину дози (2/3) або всю дозу приймати в ранкові години, близько 8-ї год. ранку, і 1/3 - ввечері; дорослим: при г. станах і в якості замісної терапії 20-30 мг/добу з поступовим переходом на підтримуючу добову дозу 5-10 мг, при необхідності початкова доза може становити 15-100 мг/добу, а підтримуюча доза - 5-15 мг/добу; дітям: початкова доза 1-2 мг/кг/добу і розподіляється на 4-6 прийомів, а підтримуюча доза - 300-600 мкг/кг/добу; застосовують внутрішньо, не розжовуючи і запиваючи невеликою кількістю рідини; лікування припиняють повільно, поступово знижуючи дозу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: підвищення чутливості до бактеріальних, вірусних, грибкових інфекцій, їх тяжкість із маскуванням симптомів, опортуністичні інфекції; підвищення загальної кількості лейкоцитів при зниженні кількості еозинофілів, моноцитів та лімфоцитів, маса лімфоїдної тканини зменшується, може підвищуватися зсідання крові, що призводить до тромбозів, тромбоемболій; пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковозалозної системи, уповільнення росту у дітей та підлітків, порушення менструального циклу, порушення секреції статевих гормонів (аменорея), постклімактеричні кровотечі, кушенгоїдне обличчя, гірсутизм, збільшення маси тіла, зниження толерантності до вуглеводів, підвищення потреби в інсуліні та пероральних цукрознижувальних препаратах, гіперліпідемія, негативний баланс азоту і кальцію, підвищення апетиту, порушення мінерального обміну та електролітного балансу, гіпокаліємічний алкалоз, гіпокаліємія, можлива затримка рідини та натрію в організмі; дратівливість, еуфобія, депресія, схильність до суїциду, безсоння, лабільний настрій, підвищення концентрації, психологічна залежність, манія, галюцинації, загострення шизофренії, деменція, психози, тривожність, порушення сну, епілептичні напади, когнітивна дисфункція (включаючи амнезію та порушення свідомості), підвищення внутрішньочерепного тиску, що супроводжується блюванням та набряк диску зорового нерва у дітей, периферичні нейропатії, парестезії, запаморочення, головний біль, вегетативні розлади, збільшення ВТ, глаукома, набряк диска зорового нерва, катаракта, потоншення рогівки і склери, загострення очних вірусних і грибкових інфекцій, екзофтальм, міокардіальний розрив внаслідок ІМ, артеріальна гіпо- чи гіпертензія, брадикардія, комбінована вентрикулярна аритмія, асистолія (внаслідок швидкого введення препарату), атеросклероз, тромбоз, васкуліт, СН, периферичні набряки, у хворих із г. ІМ - розповсюдження вогнища некрозу, уповільнення формування рубця, алергічні реакції, що спричиняють анафілактичний шок з летальним кінцем, ангіоневротичний набряк, алергічний дерматит, зміна реакції на шкірні проби, рецидив туберкульозу, імуносупресія, реакції гіперчутливості, включаючи висип, свербіж шкіри; нудота, вздуття, неприємний присмак у роті, диспепсія, пептичні виразки з перфорацією і кровотечею, виразка стравоходу, кандидоз стравоходу, панкреатит, перфорація жовчного міхура, шлункова кровотеча, місцевий ілеїт та виразковий коліт; підвищення АлТ, АсТ та лужної фосфатази, що зазвичай не є важливим та оборотне після відміни препарату; уповільнення регенерації, атрофія шкіри, утворення гематом та атрофічних смужок шкіри (стрії), телеангіектазія, вугровий висип, акне, гірсутизм, мікрокрововиливи, екхімоз, пурпура, гіпо- чи гіперпігментація, постстероїдний паннікуліт, що характеризується появою еритематозу, гарячих підшкірних потовщень протягом 2 тижнів після відміни препарату, саркома Капоші; проксимальна міопатія, остеопороз, розрив сухожиль, м'язова слабкість, атрофія, міопатія, переломи хребта та довгих кісток, асептичний остеонекроз; підвищення ризику виникнення уролітів та вмісту лейкоцитів та еритроцитів у сечі без явного пошкодження нирок; нездужання, стійка гикавка при застосуванні препарату у високих дозах, недостатність надниркових залоз, що призводить до артеріальної гіпотензії, гіпоглікемія та летальні випадки у стресових ситуаціях, таких як хірургічне втручання, травма чи інфекція, якщо доза преднізолону не збільшена; при різкій відміні препарату можливий с-м відміни, тяжкість симптомів залежить від ступеня атрофії надниркових залоз, головний біль, нудота, біль у черевній порожнині, запаморочення, анорексія, слабкість, зміни настрою, летаргія, підвищення t° тіла, міалгія, артралгія, риніт, кон'юнктивіт, тяжкі психічні порушення та підвищення внутрішньочерепного тиску, стероїдний псевдоревматизм у пацієнтів із ревматизмом, летальний наслідок; реакції у місці введення: біль, печіння, зміни пігментації (депігментація, лейкодерма), атрофія шкіри, стерильні абсцеси, ліпоатрофія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату; паразитарні та інфекційні захворювання вірусної, грибкової або бактерійної етіології, що існують зараз або нещодавно перенесені: простий герпес, оперізувальний герпес (віремічна фаза), вітряна віспа, кір; амебіаз, стронгілоїдоз (встановлений або підозрюваний); системний мікоз; сифіліс, активний або латентний туберкульоз; поствакцинальний період (тривалість 10 тижнів: 8 тижнів до та 2 тижні після вакцинації), лімфаденіт після щеплення БЦЖ; іммунодефіцитні стани, викликані ВІЛ-інфекцією; захворювання травного тракту: виразкова хвороба шлунка та ДПК, езофагіт, гастрит, г. або латентна пептична виразка, нещодавно створений анастомоз кишечника, неспецифічний виразковий коліт із загрозою перфорації або абсцедування, дивертикуліт; захворювання ССС: нещодавно

перенесений ІМ, декомпенсована хр. СН, АГ, схильність до тромбоемболічної хвороби; захворювання ендокринної системи: ЦД та порушення толерантності до вуглеводів, тиреотоксикоз, гіпотиреоз, хвороба Іценка-Кушинга; тяжка хр. ниркова і/або печінкова недостатність, нефроуролітаз; гіпоальбумінемія; системний остеопороз; міастенія gravis; г. психоз; депресії; ожиріння (III-IV ст.); поліомієліт (за винятком форми бульбарного енцефаліту); відкрито- та закритокутова глаукома, катаракта; тяжка міопатія (за винятком міастенії), вагітність та годування груддю; для внутрішньосуглобових ін'єкцій - інфекції у ділянці введення.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 10 мг., парентерально - 10 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ПРЕДНІЗОЛОН	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	30 мг/мл	№5x1	3,48	
	ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у конт. чар/уп.	30мг/мл	№5	4,39	
	ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у конт. чар/уп.	30мг/мл	№3	5,15	
	ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл.у конт. чар/уп.	5 мг	№10x4	4,17	

• **Преднізон (Prednisone)**

Фармакотерапевтична група: H02AB07 - кортикостероїди для системного застосування. Глюкокортикоїди.

Основна фармакотерапевтична дія: ГК, який не містить фтору, призначений для системного застосування; проявляє швидку протизапальну дію (антиексудативна та антипроліферативна дія) та сповільнений імуносупресивний ефект; інгібує хемотаксис та активність клітин імунної системи, вивільнення та ефект медіатора запалення та імунних реакцій, наприклад, лізосомальні ферменти, простогландини, лейкотриєни; вплив преднізону на порушення прохідності дихальних шляхів балонсується на уповільненні запальних процесів, пригніченні або профілактиці набряку слизової оболонки, гальмуванні бронхіального стенозу, гальмуванні або зменшенні утворення слизу та зменшенні в'язкості слизу.

Показання для застосування ЛЗ: дітям для інтенсивної терапії псевдокрупу (г. стенозний ларинготрахеїт), крупу, спастичного бронхіту.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дітям віком від 6 місяців призначають 100 мг/добу (1 супозиторій); при г. станах достатньо короткотермінової терапії, при необхідності лікування повторити 1 раз; лікування не повинно перевищувати 2 днів (відповідає 200 мг преднізону); супозиторії вводити глибоко в пряму кишку.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперчутливість, с-м Іценка-Кушинга різної інтенсивності з такими проявами, як місяцеподібне обличчя, ожиріння, можливий розвиток діабетичного метаболічного с-му, гіперглікемія аж до розвитку стероїдного діабету, виснаження (аж до атрофії) функції кори надниркових залоз, затримка росту у дітей, порушення секреції статевих гормонів, гірсутизм, зміна гемограми; гіпокаліємія, затримка натрію та рідини в організмі, негативний азотистий баланс; підвищення АТ; підвищення зсідання крові; асептичний некроз кісток, остеопороз, атрофія м'язів; шлункові або кишкові виразки (внаслідок ульцерогенної дії на ШКТ та підвищення кислотності шлункового соку), панкреатит; зміни шкіри (атрофія шкіри, телеангіоектазії, стрії, вугрові висипання; гематоми, синці, зміна кольору шкіри); ламкість судин; стероїдна катаракта, провокування латентної глаукоми; психічні порушення; зниження опору інфекціям, уповільнене загоєння ран.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до преднізону або до будь-якого інгредієнта препарату; при короткочасному застосуванні преднізону для лікування гострих, потенційно загрозливих для життя та ургентних станів інших протипоказань немає; для преднізолону: гіперчутливість до компонентів препарату, паразитарні та інфекційні захворювання вірусної, грибкової або бактерійної етіології, що існують зараз або нещодавно перенесені: простий герпес, оперізувальний герпес (віремічна фаза), вітряна віспа, кір; амебіаз, стронгілоїдоз (встановлений або підозрюваний); системний мікоз; активний або латентний туберкульоз; поствакцинальний період (тривалість 10 тижнів: 8 тижнів до та 2 тижні після вакцинації), лімфаденіт після щеплення БЦЖ; імунodefіцітні стани, викликані ВІЛ-інфекцією; нещодавно перенесений ІМ, декомпенсована хр.СН, АГ, схильність до тромбоемболічної хвороби, ЦД та порушення толерантності до вуглеводів, тиреотоксикоз, гіпотиреоз, хв.Іценка-Кушинга, тяжка хр. ниркова і/або печінкова недостатність, нефроуролітаз, гіпоальбумінемія, системний остеопороз, міастенія gravis, г. психоз, ожиріння (III-IV ст.), поліомієліт (за винятком форми бульбарного енцефаліту), відкрито- та закритокутова глаукома.

Визначена добова доза (DDD): ректально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	РЕКТОДЕЛЬТ 100	Троммсдорфф ГмбХ енд Ко. КГ, Німеччина	супоз. рект. у бл.	100мг	№2x1, №6x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Тріамцинолон (Triamcinolone)**^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: H02AB08 - кортикостероїди для системного застосування. Глюкокортикоїди.

Основна фармакотерапевтична дія: має глюкокортикоїдну дію та пригнічення запальних р-цій у відповідь, що призводить до збільшення глюконеогенезу та зниження засвоєння глюкози у тканинах; катаболізм білків прискорюється та знижується синтез білків, що надходять з їжею, хоча загальний ефект на азотний баланс залежить від інших факторів, включаючи дієту, дозу та тривалість лікування, негативний азотний баланс може виникнути при дозах від 12 до 24 мг н/добу; чинить мінералокортикоїдну дію; під час кортикостероїдної терапії збільшується кількість еритроцитів та нейтрофільних лейкоцитів; знижується кількість еозинофільних та

базофільних лейкоцитів, як і маса лімфоїдної тканини; кортикостероїди попереджують або пригнічують початкові ознаки запального процесу, а саме: почервоніння, болісність, підвищення температури у місці запалення, набряк, а також відстрочені у часі наслідки, включаючи проліферацію фібробластів та відкладення колагену.

Показання для застосування ЛЗ: АР: ^{БНФ} включаючи сезонні та постійні алергічні риніти, нейродерміт, бульозний дерматит, р-ції підвищеної чутливості на ЛЗ, сироваткову хворобу, при анафілактичних р-ціях кортикостероїди не слід застосовувати для лікування г. стану, однак вони можуть бути ефективними для профілактики останньої стадії алергічної р-ції; ревматоїдний артрит, епіконділіт, посттравматичного остеоартрит, синовіт, бурсит) та псоріатичний артрит; герпетичний бульозний дерматит, ексфолюативний дерматит, тяжка поліморфна еритема, тяжкий псоріаз, тяжкий себорейний дерматит, екзема, дискоїдний вовчак, вогнищева алопеція та різні г. та хр. дерматози; тяжкі гострі та хр. алергічні та запальні стани, включаючи алергічний кон'юнктивіт, алергічні крайові виразки рогівки, запалення переднього сегмента ока, хоріоретиніт, дифузний задній увеїт та хоріоїдит, оперізувальний герпес ока, ірит та іридоцикліт, кератит, неврит зорового нерва та симпатичну офтальмію; первинна та вторинна недостатність кірки надниркових залоз, вроджена гіперплазія надниркових залоз, гіперкальціємія, спричинена злюкисною пухлиною, підгострий тиреїдит та хвороба Аддісона; регіонарний ентерит (хвороба Крона) та виразковий коліт у період загострення; аспіраційний пневмоніт, бериліоз, с-м Лефлера, саркоїдоз та гострий міліарний туберкульоз; туберкульозний менінгіт, розсіяний склероз (кортикостероїди застосовують для лікування загострення розсіяного склерозу; вони зменшують тривалість загострення, але не припиняють прогресування захворювання).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дозу підбирати індивідуально залежності від хвороби та р-ції пацієнта у відповідь, можна вводити в/м у дозах від 40 до 80 мг, рекомендована початкова доза для дорослих та дітей віком від 12 років - 60 мг, при необхідності одразу можна ввести дозу 100-120 мг, рекомендована початкова доза для дітей віком 6-12 років - 0,03-0,2 мг/кг у м'яз з інтервалами 1-7 днів, можна очікувати, що однакратна парентеральна доза буде достатньою для 4-7-денного та до 3-4-тижневого контролю хвороби, однакратна доза 40-60 мг може викликати ремісію симптомів протягом сезону у пацієнтів з алергічним ринітом або астмою, спричиненою пилок; звичайні внутрішньосуглобові дози триамцінолону ацетоніду у дорослих -5-10 мг для менших суглобів та 20-60 мг для більших суглобів, дози 6-10 мг на ін'єкцію вдало застосовували для менших суглобів та 40 мг на ін'єкцію для більших суглобів, при ін'єкціях у декілька суглобів робиться введення до 80 мг триамцінолону; рекомендована початкова доза для дітей віком 12-18 років становить 2,5-40 мг, зважаючи на клінічну р-цію у відповідь, наступні дози можна збільшувати. Табл. приймати або 1 р/добу (краще вранці), або за кілька прийомів, особливо якщо загальна добова доза перевищує 16 мг; звичайна добова доза для дорослих - від 4 до 32 мг, після досягнення очікуваного ефекту дозу потрібно поступово зменшувати (на 4 мг кожні 2-3 дні) до досягнення адекватної підтримуючої дози (4 мг/добу), діти, маса тіла яких перевищує 25 кг, повинні одержувати дозу, рекомендовану для дорослих, діти з масою тіла до 25 кг мають одержувати початкову дозу 12 мг/добу, а наступні дози залежать від типу захворювання та відповіді пацієнта на лікування; терапевтичні результати очікувати ч/з 2 або 3 тижні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ція гіперчутливості, алергічні р-ції (висип, кропив'янка, свербіж, здавленість у грудній клітці, набряки обличчя, губ та язика, ангіоневротичний набряк, бронхоспазм, зупинка дихання та анафілактична р-ція); м'язова слабкість, стероїдна міопатія, зменшення м'язової маси, остеонекроз, остеопороз (найбільша втрата кісткової тканини спостерігається у перші 6 міс. лікування і насамперед вражає губчасту кістку), ламкість кісток, патологічні переломи кісток, асептичний некроз голівок стегна і передпліч, розрив сухожиль, сповільнення росту та процесів осифікації у дітей, передчасне закриття епіфізарних зон росту; пептичні виразки та їх наслідки: кровотечі, перфорації товстого або тонкого кишечника (особливо у хворих із запаленням тонкого кишечника), мелена, панкреатит, метеоризм, ульцерогенний езофагіт, диспепсія, підвищений апетит, нудота, блювання, гнійне запалення глотки, сухість у роті; висип, уповільнене загоєння ран, потоншення шкіри, екхімози та гематоми, еритема, надмірна пітливість, алергічний дерматит, кропив'янка, вазомоторний набряк, почервоніння обличчя, атрофія, надмірне оволосіння, стрії, телеангіектазії; судомми, підвищення внутрішньочерепного тиску з папілярним набряком, запаморочення і головний біль; розвиток с-му Кушинга, гальмування росту у дітей, вторинна недостатність кори надниркових залоз і гіпофіза, особливо у стресових ситуаціях; виникнення цукрового діабету і збільшена потреба в інсуліні та протидіабетичних медикаментах у хворих на ЦД; гірсутизм, затримка натрію в організмі (є причиною затримки рідини та призводить до компенсаторного збільшення виведення калію нирками і до гіпокаліємії); катаракта, підвищення внутрішньоочного тиску, глаукома з можливим ураженням зорового нерва, екзофтальм, порушення зору; негативний азотистий баланс, збільшення концентрації глюकोзи в крові та сечі, збільшення маси тіла, порфірія, підвищений рівень загального холестерину, тригліцеридів та ліпопротеїдів низької щільності; тромбоемболічні синдроми, набряк гомілок і стоп, погіршення серцевої ф-ції, серцеві аритмії, АГ, застійна недостатність кровообігу, гіпокаліємія та гіпокаліємічний алкалоз; психічні розлади, ейфорія, раптові зміни настрою, тяжка депресія, седативний ефект, безсоння, зміни особистості, манія, галюцинації та психози (симптоми можуть варіювати між шизофренією, манією чи делірієм), суїцидальні думки, погіршення перебігу епілепсії та інших психічних захворювань; гранулоцитоз, лімфопенія, моноцитопенія; туберкульоз легенів, захриплість, подразнення та сухість у горлі; порушення менструального циклу та вазомоторні симптоми; погане самопочуття, вторинні грибкові і вірусні інфекції, підвищення/зниження рухливості і кількості сперматозоїдів, порушення сну, тривалий біль у горлі, застуда або лихоманка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до триамцінолону або компонентів ЛЗ; системні грибкові інфекції; проксимальна міопатія, дивертикуліт, глаукома, дитячий вік до 3 р., злюкисні новоутворення з метастазами; системні інфекції, крім випадків застосування специфічної антибактеріальної терапії.; хр. первинний геморагічний діатез, зумовлений недостатністю тромбоцитарної ланки гемостазу, з підшкірними крововиливами та крововиливами зі слизових оболонок у природні порожнини (хвороба Вергольфа); в/в, інтраокулярне та епідуральне або інтраокулярне введення; проксимальна міопатія, спричинена кортикостероїдами, в анамнезі. Інші протипоказання є відносними та залежать від очікуваної користі лікування, тривалості застосування та шляху: запалення в активній стадії та інфекція; ЦД, остеопороз, міопатія, пептична виразка, психоз, загоєння рани, вакцинація.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 7,5 мг., парентерально - 7,5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	КЕНАЛОГ	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у фл.	4 мг	№50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КЕНАЛОГ 40	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	сусп. д/ін'єк. по 1мл у бл.	40 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПОЛЬКОРТОЛОН®	АТ "Адамед Фарма", Польща	табл. у бл.	4 мг	№25x2	5,68	26,67/\$

• **Гідрокортизон (Hydrocortisone) *** [ПМД]

Фармакотерапевтична група: H02AB09 - прості препарати кортикостероїдів для системного застосування. Глюкокортикоїди.

Основна фармакотерапевтична дія: має протишокову, антитоксичну, імуносупресивну, антиексудативну, протисвербіжну, протизапальну, десенсибілізуючу, антиалергічну дію; гальмує р-цію гіперчутливості, проліферативні та ексудативні процеси у вогнищі запалення; дія опосередкована ч/з специфічні в/клітинні рецептори; протизапальна дія полягає у гальмуванні всіх фаз запалення: стабілізації клітинних і субклітинних мембран, зменшенні вивільнення протеолітичних ферментів із лізосом, гальмуванні утворення супероксидного аніону та інших вільних радикалів; гальмує вивільнення медіаторів запалення, у т.ч. інтерлейкіну-1 (ІЛ-1), гістаміну, серотоніну, брадікініну тощо, зменшує вивільнення арахідонової к-ти із фосфоліпідів і синтез простагландинів, лейкотрієнів, тромбоксану; зменшує запальні клітинні інфільтрати, знижує міграцію лейкоцитів і лімфоцитів у вогнище запалення; гальмує сполучнотканинні р-ції в ході запального процесу і знижує інтенсивність утворення рубцевої тканини; зменшує кількість опасистих клітин, які виробляють гіалурунову к-ту, пригнічує активність гіалуронідази і сприяє зменшенню проникності капілярів; гальмує продукцію колагенази та активує синтез інгібіторів протеаз; знижує синтез і посилює катаболізм білків у м'язовій тканині; стимулюючи стероїдні рецептори, індукує утворення особливого класу білків - ліпокортинів, яким притаманна протинабрякова дія; має контрінсулярну дію, підвищуючи рівень глікогену у печінці, викликаючи розвиток гіперглікемії; затримує натрій і воду в організмі, збільшуючи при цьому ОЦК та підвищуючи АТ (протишокова дія); стимулює виведення калію, зменшує абсорбцію кальцію з травного тракту, зменшує мінералізацію кісткової тканини; знижує кількість Т-лімфоцитів у крові, зменшуючи тим самим вплив Т-хелперів на В-лімфоцити, гальмує утворення імунних комплексів, зменшуючи прояви АР.

Показання для застосування ЛЗ: ендокринні порушення - первинна або вторинна недостатність кори надниркових залоз; г. недостатність кори надниркових залоз^{ВООЗ, БНФ}; у передопераційному періоді, у разі тяжкої травми або захворювання, пацієнтам з недостатністю кори надниркових залоз^{БНФ} або у разі сумнівів щодо резервних функцій кори надниркових залоз; шок^{БНФ, ПМД}, нечутливий до традиційної терапії, коли є або підозрюється недостатність кори надниркових залоз^{БНФ}; уроджена гіперплазія надниркових залоз; негнійний тиреоїдит; гіперкальціємія пов'язана зі злякисним новоутворенням; ревматичні захворювання^{БНФ} - як допоміжна терапія для короткочасного застосування (г. і підгострий бурсит, г. подагричний артрит, г. неспецифічний тендосиновіт; анкілозуючий спондиліт, епіконділіт, посттравматичний остеоартроз, псоріатичний артрит, РА, у тому числі ювенільний РА, синовіт при остеоартриті); колагенози - г. ревмокардит, системний дерматоміозит (поліміозит), СЧВ; дерматологічні захворювання^{БНФ, ВООЗ} - бульозний герпетиформний дерматит, ексфолювативний дерматит, фунгоїдний мікоз, пухирчатка, тяжкі форми мультиформної еритеми (с-м Стівенса-Джонсона)^{ПМД}, псоріазу, себорейного дерматиту; алергічні стани^{ВООЗ, БНФ, ПМД} г. нейнфекційний набряк гортані^{ПМД}, атопічний дерматит, БА^{БНФ, ПМД}, контактний дерматит, реакції гіперчутливості^{БНФ} до ЛЗ, сезонний або постійний алергічний риніт, сироваткова хвороба, трансфузійні реакції типу кропив'янки; тяжкі г. і хр. алергічні та запальні процеси з ураженням очей^{ВООЗ} (алергічний кон'юнктивіт; алергічна крайова виразка роівки, запалення переднього сегмента ока, хоріоретиніт, дифузійний задній увеїт і хоріоїдит; очна форма оперізуючого герпесу, ірит, іридоцикліт, кератит, неврит зорового нерва, симпатична офтальмія); ШКТ - як системне лікування при виразковому коліті та регіонарному ентериті^{БНФ, ВООЗ}; респіраторні захворювання - аспіраційний пневмоніт, бериліоз, блискавична або дисемінована форма туберкульозу легенів при одночасному призначенні відповідної протитуберкульозної хіміотерапії, с-м Леффлера, який не піддається іншим видам лікування, саркоїдоз; гематологічні захворювання - набута (аутоімунна) гемолітична анемія, вроджена (еритроїдна) гіпопластична анемія, еритробластопенія (еритроцитарна анемія), ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура дорослих, вторинна тромбоцитопенія дорослих; як паліативна терапія при г. лейкозах у дітей, лейкозах і лімфомах у дорослих^{ВООЗ}; стани, що супроводжуються набряком; для індукції діурезу або ремісії протеїнурії при нефротичному с-мі, без уремії, ідіопатичного типу або внаслідок червоного вовчак; невідкладні стани: при шоці, який розвився внаслідок недостатності надниркових залоз, або шоці, резистентному до стандартної терапії у разі можливої недостатності надниркових залоз; при г. алергічних проявах^{ПМД}, які не проходять після застосування адреналіну (астматичний статус, анафілактичні реакції^{ПМД}, укуси комах); трихінельоз з ураженням нервової системи або міокарда; туберкульозний менінгіт із субарахноїдальною блокадою або загрозою блокади у поєднанні з відповідною протитуберкульозною хіміотерапією; плечолопатковий періартрит, бурсит, епіконділіт, тендовагініт.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: порошок д/ін'єк. вводять в/в болюсно, в/в крап., в/м; для первинної невідкладної допомоги лікування розпочинається з в/в введення протягом 30 сек. (100 мг) і до 10 хв. (500 мг і більше); високі дози застосовувати лише до стабілізації стану хворого, але не більше 48-72 год.; початкова доза для дорослих 100-500 мг^{БНФ} або більше, залежно від тяжкості стану хворого; доза призначається повторно через кожні 2-4-6 год., залежно від відповідної реакції організму хворого і клінічної картини захворювання; дітям, у т.ч. немовлятам, дозу лікарського засобу можна зменшити, однак при визначенні дози має керуватися більшою мірою

тяжкістю стану і відповіддю пацієнта на лікування, а не його віком або масою тіла; добова доза повинна становити не менш ніж 25 мг ^{вооз бнф}; сусп.: дорослим та дітям віком від 14 років: разова доза залежно від розміру суглоба і від тяжкості захворювання - 5-50 мг гідрокортизону внутрішньосуглобово та періартикулярно; дітям: разова доза гідрокортизону залежно від розміру суглоба і від тяжкості захворювання - 5-30 мг внутрішньосуглобово та періартикулярно.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: маскування інфекцій, опортуністичні і-ції (спричинені будь-якими збудниками, будь-якої локалізації від легкого ступеня тяжкості до летального наслідку), активація латентних інфекцій, у тому числі повторна активація туберкульозу, у пацієнтів, які отримують кортикостероїдну терапію, повідомлялося про розвиток саркоми Капоші, лейкоцитоз, реакції гіперчутливості, у тому числі анафілаксія та анафілактоїдні р-ції (напр. бронхоспазм, ангіоневротичний набряк, кропив'янка), можливе пригнічення р-цій при проведенні шкірних тестів, кушингоїдний стан, пригнічення гіпофізарно-надниркової системи, симптоми відміни - надто швидке зменшення дози кортикостероїдів після тривалого лікування може призвести до г.недостатності надниркових залоз, артеріальної гіпотензії та летального наслідку; можливе виникнення с-му відміни, який включає пропасницю, міалгію, артралгію, риніт, кон'юнктивіт, появу болісних сверблячих вузлів на шкірі та втрату маси тіла, затримка натрію, гіпокаліємічний алкалоз, порушення толерантності до глюкози, підвищення апетиту (що може призводити до збільшення маси тіла), афективні розлади (такі як дратівливий, ейфоричний, пригнічений або лабільний настрій, психологічна залежність та суїцидальні думки), психотичні р-ції (включаючи манію, марення, галюцинації та загострення шизофренії), порушення поведінки, дратівливість, тривожність, розлади сну, когнітивна дисфункція (включаючи сплутаність свідомості та амнезію), афективні розлади (такі як дратівливий, ейфоричний, пригнічений або лабільний настрій, психологічна залежність та суїцидальні думки), психотичні р-ції (включаючи манію, марення, галюцинації та загострення шизофренії), порушення поведінки, дратівливість, тривожність, розлади сну, когнітивна дисфункція (включаючи сплутаність свідомості та амнезію), підвищення внутрішньочерепного тиску, доброякісна внутрішньочерепна гіпертензія, судомні напади, епідуральний ліпоматоз; субкапсулярна катаракта, екзофтальм, центральна серозна хоріопатія, підвищення ВТ із можливим ушкодженням зорового нерва; стоншення рогівки або склери, загострення вірусних або грибкових захворювань очей; застійна СН (у пацієнтів зі схильністю до цього), розрив міокарда після ІМ; тромбоз, АГ; гикавка; легенева емболія; якщо для приготування до використання застосовувати бензиловий спирт, взяти до уваги, що він може спричинити розвиток летального с-му задишки у недоношених дітей; розвиток пептичної виразки (з можливою перфорацією і кровотечею), шлункова кровотеча, панкреатит, езофагіт, перфорація кишечника, виразки стравоходу, кандидоз стравоходу, диспепсія, нудота; петехія, телеангіктазії, синці, атрофія шкіри, стрії на шкірі, гіперпігментація шкіри, гіпопігментація шкіри, гірсутизм, акне, гіпергідроз; м'язова міопатія, м'язова слабкість, остеонекроз, остеопороз, патологічні переломи, затримка росту; нерегулярний менструальний цикл, аменорея; порушення одужання; зниження рівню калію у крові, негативний баланс азоту (внаслідок катаболізму білків), підвищення рівня кальцію сечі, підвищення рівня аланінамінотрансферази, АСТ, лужної фосфатази крові; компресійний перелом хребта, розрив сухожилля (особливо ахіллового сухожилля), нездужання, збільшення маси тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: інтратекальне та епідуральне введення; підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин; системні інфекції (грибкові), які є також протипоказанням для ін'єкцій у сухожильні піхви та сумки у хребет або інші недіартродіальні суглоби; пацієнтам, які отримують кортикостероїди в імуносупресивних дозах, протипоказане застосування живих або атенуєваних вакцин; в/м кортикостероїдні препарати протипоказані при ідіопатичній тромбоцитопенічній пурпурі; внутрішньосуглобові та періартикулярні ін'єкції, якщо інфікований суглоб або навколишні тканини; протипоказаний немовлятам і дітям віком до 3 років - можуть виникати анафілактичні та токсичні р-ції з летальними наслідками.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 30 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ	ПАТ "Фармак", Україна	сусп. д/ін'єк. по 2мл в амп. у пач.	2,5%	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ	ПАТ "Фармак", Україна	сусп. д/ін'єк. по 2мл в амп. у пач.	2,5%	№5x2	10,20	
	ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ	АТ "БІОЛІК", Україна	сусп. д/ін'єк. по 2мл в амп. у пач.	25 мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	сусп. д/ін'єк. по 2мл в амп. у пач.	25 мг/мл	№10	7,20	
II.	ГІДРОКОРТИЗОН 10 МГ	мібе ГмБХ Арцнайміттель, Німеччина	табл. у бл.	10 мг	№10x6, №10x18	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГІДРОКОРТИЗОН РОМФАРМ	К.Т. Ромфарм Компані С.Р.Л., Румунія	пор.д/р-ну д/ін'єк., д/інфуз. у фл. в кор.	100 мг	№1, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СОЛУ-КОРТЕФ	Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ, Бельгія	пор.д/р-ну д/ін'єк. у фл. в кор.	100 мг	№1	33,73	26,77/\$
	СОЛУ-КОРТЕФ	Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ, Бельгія	пор.д/р-ну д/ін'єк. у фл. типу Act-O-Vial з розч.	100 мг/2 мл	№1	80,31	26,77/\$

7.4.2. Мінералокортикоїди

- **Флудрокортизон (Fludrocortisone) ***

Фармакотерапевтична група: H02AA02 - кортикостероїди для системного застосування. Мінералокортикоїди.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний гормон кори надниркової залози, фторований похідний гідрокортизону з сильною мінералокортикотропною дією; діє на дистальний відділ ниркових каналців, стимулюючи реабсорбцію натрію та затримку води, також збільшує виведення калію та іонів водню; може гальмувати ф-цію кори надниркових залоз, активність щитовидної залози, виділення АКТГ гіпофізом, також може стимулювати відкладення глікогену у печінці, зменшувати кількість еозинофільних гранулоцитів, може призводити до негативного азотистого балансу.

Показання для застосування ЛЗ: замісна терапія первинної та вторинної недостатності кори надниркових залоз^{БНФ}, хвороба Аддісона; лікування адрено-генітального с-му з с-мом втрати солі.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дозу підбирають індивідуально, залежно від тяжкості захворювання та р-ції на терапію; рекомендовані дози дорослим 0,1 - 0,3 мг/добу (1-3 табл.); табл. не ділити; у разі пропуску дози прийняти препарат якнайшвидше або, якщо наближається час прийняття чергової дози, пропущену дозу не приймати та продовжувати прописану схему лікування; не можна приймати дві дози одночасно.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: м'язова слабкість, стероїдна міопатія, втрата м'язової маси, остеопороз, компресійні переломи хребта, асептичний некроз голівки стегнової та плечової кістки, патологічні переломи трубчастих кісток, розрив сухожилля, аваскулярний остеонекроз; пептична виразка та її наслідки: кровотеча, перфорація стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки, перфорація товстого або тонкого кишечника, особливо у хворих із запаленням кишечника; запалення підшлункової залози; здуття живота; ульцерозне запалення стравоходу, порушення травлення; кандидози, надмірний апетит; висипання, уповільнене загоєння ран; потоншення шкіри; екхімози та гематоми; еритема; надмірне потовиділення, пурпура, атрофічні смуги на шкірі, вугри, шкірні прояви, які нагадують зміни, характерні для СЧВ, зниження р-ції у шкірних тестах, гірсутизм; ейфорія, розлади особистості, депресія, розлади сну, судоми; підвищення внутрішньочерепного тиску з папілярним набряком (псевдопухлина мозку - як правило, після занадто швидкого зниження дози); запаморочення та головний біль, неврит або парестезія, посилення симптомів психозу, епілепсія; нерегулярні менструації або аменорея; розвиток с-му Кушинга; гальмування росту у дітей; вторинна недостатність кори надниркових залоз та гіпофіза, особливо у стресових ситуаціях (хвороба, травма, оперативне втручання), зниження толерантності до вуглеводів; маніфестний ЦД та збільшення потреби в інсуліні та антидіабетичних препаратах у хворих із наявним ЦД, гірсутизм, збільшення маси тіла, негативний білковий та кальцієвий баланс, надмірний апетит, задня субкапсулярна катаракта; підвищення ВТ; глаукома; екзофтальм, потоншення рогівки або склери, загострення очних захворювань грибкової та вірусної етіології, нечіткість зорового сприйняття, некротичний васкуліт або лімфангіт, тромбофлебіт та облітеруючий ендартерит, лейкоцитоз, безсоння, алергічні р-кції, анафілактичні р-кції, ангіоневротичний набряк, свербіж, кропив'янка, вертиго, папілоедема, лихоманка, міалгія, артралгія, риніт, кон'юнктивіт, болісні потовщення шкіри, які сверблять, втрата маси тіла; занадто швидка відміна дози після тривалого застосування може призвести до г. адреналової недостатності, гіпотензії та летального наслідку.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; системна інфекція, якщо не проводиться специфічне лікування.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,1 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	КОРТІНЕФФ	АТ "Адамед Фарма", Польща	табл. у фл. в кор.	0,1мг	№20	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КОРТІНЕФФ	АТ "Адамед Фарма", Польща	табл. в кор. та бл.	0,1мг	№20x1	5,55	26,67/\$

7.5. Засоби для лікування захворювань статевих залоз

7.5.1. Жіночі статеві гормони та їх антагоністи

7.5.1.1. Естрогени

- **Естрадіол (Estradiol)** (див. п. 11.6.2.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Естріол (Estriol)** ** [тільки супозиторії] (див. п. 11.6.2.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

7.5.1.2. Комбіновані лікарські засоби

- **Етинілестрадіол + дроспіренон (Ethinylestradiol + drospirenon)** (див. п. 11.6.2.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Естрадіол + дроспіренон (Estradiol + drospirenon)** (див. п. 11.6.2.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Естрадіол + Дидрогестерон (Estradiol + Dydrogesterone)** (див. п. 11.6.2.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Етинілестрадіол + Ципротерон (Ethinylestradiol + Cyproterone)** (див. п. 11.6.2.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Естрадіол + Левоноргестрел (Estradiol + Levonorgestrel)** (див. п. 11.6.2.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Естрадіол + Дієногест (Estradiol + Dienogest)** (див. п. 11.6.2.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

7.5.1.3. Антагоністи рецепторів естрогенів

- **Кломіфен (Clomifene)** * (див. п. 11.6.4.2. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Тамоксифен (Tamoxifen)** * (див. п. 19.2.2.1. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Тореміфен (Toremifene)** (див. п. 19.2.2.1. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")

7.5.1.4. Інгібітори ферментів

- **Анастрозол (Anastrozole)** (див. п. 19.2.2.3. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Летрозол (Letrozole)** (див. п. 19.2.2.3. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Екземестан (Exemestane)** (див. п. 19.2.2.3. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")

7.5.1.5. Гестагени

- **Прогестерон (Progesterone)** (див. п. 11.6.3.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Гідроксипрогестерон (Hydroxyprogesterone)** (див. п. 11.6.3.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Дидрогестерон (Dydrogesterone)** (див. п. 11.6.3.2. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Медрохипрогестерон (Medroxyprogesterone)** * (див. п. 19.2.1.1. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Норетистерон (Norethisterone)** * (див. п. 11.6.3.3. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Лінестренол (Lynestrenol)** (див. п. 11.6.3.3. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

7.5.1.6. Антагоністи рецепторів гестагенів

- **Міфепристон (Mifepristone)** * (див. п. 11.6.5. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

7.5.2. Чоловічі статеві гормони та їх антагоністи

7.5.2.1. Тестостерон

- **Тестостерон (Testosterone)** * (див. п. 12.2.4.1. розділу "УРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ, СЕКСОПАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Местеролон (Mesterolone)** (див. п. 12.2.4.1. розділу "УРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ, СЕКСОПАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

7.5.2.2. Антагоністи рецепторів андрогенів

- **Флутамід (Flutamide)** (див. п. 19.2.2.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Ципротерон (Cyproterone)** (див. п. 19.2.2.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Бікалутамід (Bicalutamide)** (див. п. 19.2.2.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")

7.5.2.3. Інгібітори ферментів

- **Фінастерид (Finasteride)** (див. п. 12.1.3.2. розділу "УРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ, СЕКСОПАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Дутастерид (Dutasteride)** (див. п. 12.1.3.2. розділу "УРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ, СЕКСОПАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

7.5.3. Анаболічні стероїди

- **Нандролон (Nandrolone)**

Фармакотерапевтична група: A14AB01 - анаболічні засоби для системного застосування. Похідні естрену.

Основна фармакотерапевтична дія: є похідним тестостерону; на відміну від тестостерону, чинить більш виражену анаболічну і менш виражену андрогенну дію (дані отримані у ході доклінічних і клінічних досліджень); стимулює еритропоез людини, на що вказує збільшення кількості еритроцитів, підвищення рівнів гематокриту і гемоглобіну; цей ефект застосовується з терапевтичною метою для лікування анемії, зумовлених зниженим продукуванням еритропоетину, а також пов'язаних з пригніченням кісткового мозку при цитотоксичній хіміотерапії або при недостатності внаслідок гіпоплазії; при апластичній анемії стимуляція еритропоезу, як правило, супроводжується посиленням лейкопоезу і тромбоцитопоезу.

Показання для застосування ЛЗ: період реконвалесценції; анемія внаслідок хр. ниркової недостатності.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: анемія - дорослим застосовують в/м: чоловікам - по 200 мг 1 р/тиждень, жінкам - по 100 мг 1 р/тиждень, лікування варто припинити у разі відсутності терапевтичного ефекту після 3-6 місяців застосування; після відповідного поліпшення лабораторних показників крові або її нормалізації варто поступово знизити дозу, регулярно контролюючи гематологічні показники, зниження рівня лабораторних показників крові під час зменшення дози або після закінчення лікування може бути показанням для поновлення лікування; період реконвалесценції - дорослим застосовують по 50 мг кожні 3-4 тижні, в/м, глибоко у м'язи.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: пухлини печінки, р-ції гіперчутливості, пригнічення секреції гонадотропіну, у жінок можуть мати місце симптоми вірилізації (необоротне зниження тембру голосу, порушення менструального циклу, збільшення клітора), аменорея; інгібування сперматогенезу, гінекомастія у чоловіків, порушення лібідо; нудота, холестаза, жовтяниця; акне, гірсутизм; порушення розвитку кісток та як внаслідок передчасне закриття епіфізів у пацієнтів молодшого віку; затримка натрію і води; набряк; підвищення співвідношення концентрації азот сечовини/креатиніну, відхилення (підвищення) показників функціональних печінкових тестів; АГ; печінкова пурпура; alopecія, свербіж; у місці введення набряк, місцеві реакції; підвищення вмісту гемоглобіну; відхилення від норми вмісту ліпідів (зниження вмісту ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ і тригліцеридів).

Протипоказання до застосування ЛЗ: Підвищена чутливість до ЛЗ або до компонентів препарату; карцинома простати, карцинома грудної залози у чоловіків, вагітність, у зв'язку з маскулінізацією плода, період годування груддю; печінкова недостатність будь-якої етіології; нефротичний синдром при тривалій анаболічній терапії; порфірія; дитячий вік.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 2 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	РЕТАБОЛІЛ	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл	50 мг/мл	№1	7,59	28,02/\$

7.5.4. Засоби із змішаною естроген-гестаген-андрогенною активністю

- **Тиболон (Tibolone) **** (див. п. 11.6.3.3. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

7.6. Засоби для лікування захворювань гіпоталамо-гіпофізарної системи

7.6.1. Препарати гормонів гіпоталамуса

7.6.1.1. Аналоги гонадотропін-релізинг гормону (гонадореліна)

- **Лейпрорелін (Leuprorelin)** (див. п. 19.2.1.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")

Показання для застосування ЛЗ: центральне передчасне статеве дозрівання у дітей ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: діти з центральним передчасним статевим дозріванням ^{БНФ}: рекомендована початкова доза 0,3 мг/кг раз на 4 тижні (мінімально 7,5 мг), в/м або п/ш; дозування розраховувати індивідуально у мг/кг маси тіла дитини: до 25 кг - фактична доза 3,75 мг х 2 (загальна доза 7,5 мг), 25 - 37,5 кг - фактична доза 3,75 мг х 3 (загальна доза 11,25 мг ^{БНФ}), більше 37,5 кг - фактична доза 3,75 мг х 4 (загальна доза 15 мг), якщо необхідну дозу не можна забезпечити однією ін'єкцією (у концентрації 3,75 мг/мл), ввести у вигляді кількох ін'єкцій одночасно; якщо не досягнуто достатньої гормональної та клінічної супресії, дозу збільшувати на 3,75 мг кожні 4 тижні ^{БНФ}, ця доза буде вважатися підтримуючою; перша доза, при якій досягнуто бажаного результату, може вважатися підтримуючою для подальшого лікування; пацієнтам, у яких збільшилася маса тіла, рекомендується оцінка ефективності лікування; терапію потрібно припинити у дівчат до настання 11 років, у хлопців - до 12 років.

- **Гозерелін (Goserelin)** (див. п. 19.2.1.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Трипторелін (Triptorelin)** (див. п. 11.7. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ", п. 19.2.1.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")

Показання для застосування ЛЗ: лікування підтвердженого передчасного статевого дозрівання центрального ґенезу ^{БНФ} (дівчатка до 9 років, хлопчики до 10 років).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: передчасне статеве дозрівання центрального ґенезу: лікування дітей потрібно проводити під ретельним наглядом дитячого ендокринолога, педіатра або ендокринолога з досвідом лікування центрального передчасного статевого дозрівання; тривалість введення препарату корегує лікар індивідуально для кожного хворого; у дозі 3,75 мг: по 1 ін'єкції кожні 4 тижні (28 днів); дозування залежить від маси тіла: < 20 кг - 1,875 мг (половина дози), 20-30 кг - 2,5 мг (2/3 дози), > 30 кг - 3,75 мг (повна доза); лікування припинити, якщо у дівчаток віком від 12 років і у хлопчиків віком від 13 років відбувається матурація кісток ^{БНФ}; у дозуванні 11,25 мг дітям з масою тіла більше 20 кг - 1 ін'єкція препарату 11,25 мг в/м кожні 3 місяці. ^{БНФ}

7.6.1.2. Аналоги соматостатину

- **Октреотид (Octreotide)**

Фармакотерапевтична група: H01CB02 - препарати гормонів для системного застосування, за винятком статевих гормонів та інсуліну. Гіпофізарні, гіпоталамічні гормони та їх аналоги. Гіпоталамічні гормони. Соматостатин та аналоги.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний октапептид, похідний природного гормону соматостатину, має подібні фармакологічні ефекти, але значно більшу тривалість дії; пригнічує патологічно підвищену секрецію гормону росту (ГР), та пептидів і серотоніну, які продукуються в гастро-ентеро-панкреатичній ендокринній системі; пригнічує: секрецію ГР, що спричиняється аргініном, фізичним навантаженням та інсуліновою гіпоглікемією; секрецію інсуліну, глюкагону, гастрину та інших пептидів гастро-ентеро-панкреатичної ендокринної системи, що спричиняється прийомом їжі, та секрецію інсуліну і глюкагону, яка стимулюється аргініном; секрецію тиреотропіну, що спричиняється тиреоліберіном.

Показання для застосування ЛЗ: акромегалія: ^{БНФ} для контролю основних проявів захворювання і зниження рівнів гормону росту (ГР) та інсуліноподібного фактора росту 1 (ІФР-1) у плазмі крові у тих випадках, коли відсутній достатній ефект від хірургічного лікування і променевої терапії, показаний також для лікування хворих

на акромегалію, які відмовилися від операції або мають протипоказання до неї, а також для короточасного лікування у проміжках між курсами променевої терапії поки повністю не розвинеться її ефект; ^{БНФ} карциноідні пухлини з наявністю карциноідного синдрому; ВіПоми ^{БНФ} (пухлини, що характеризуються гіперпродукцією вазоактивного інтестинального пептиду); глюкагономи ^{БНФ}; гастриноми/с-м Золлінгера-Еллісона - зазвичай у комбінації з антагоністами гістамінових H₂-рецепторів або інгібіторами протонного насоса; інсулінами (для контролю гіпоглікемії у передопераційний період, а також для підтримуючої терапії); соматоліберінами (пухлини, що характеризуються гіперпродукцією рилізінг-фактора гормону росту); профілактика ускладнень після операцій на підшлунковій залозі ^{БНФ}; метастатичні нейроендокринні пухлини кишечника або у разі невідомої локалізації первинної пухлини, коли інші первинні локалізації, окрім кишечника, були виключені, ^{БНФ} припинення кровотеч і профілактика рецидивів кровотеч із варикозно розширених вен стравоходу у хворих на цироз печінки (у комбінації зі специфічними лікувальними заходами, наприклад з ендоскопічною склерозивною терапією).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н для ін'єкцій вводять п/ш та в/в, суспензія д/ін'єкцій призначена виключно для в/м введення у сідничний м'яз; р-н при акромегалії спочатку вводять по 0,05 - 0,1 мг п/ш кожні 8 або 12 год., у подальшому добір дози повинен ґрунтуватися на щомісячних визначеннях концентрації гормону росту (ГР) та інсуліноподібного фактора росту 1 (ІФР-1) у крові; для більшості хворих оптимальна добова доза - 0,3 мг, МДД - 1,5 мг/добу, яку не перевищувати; якщо впродовж 3 міс. лікування не відмічається достатнього зниження рівня гормону росту і поліпшення клінічної картини захворювання, терапію припинити; пацієнтів, стан яких контролюється п/ш введенням октреотиду, можна безпосередньо перевести на терапію суспензією в/м розпочинаючи із введення 20 мг упродовж 3 міс. з інтервалами між ін'єкціями у 4 тижні; при ендокринних пухлинах ШКТ і підшлункової залози р-н вводять п/ш у початковій дозі по 0,05 мг 1 - 2 р/добу ^{БНФ}; у подальшому, залежно від досягнутого клінічного ефекту, дозу препарату можна поступово збільшити до 0,1 - 0,2 мг 3 р/добу ^{БНФ}; суспензію в/м рекомендується розпочинати із введення 20 мг протягом 3 міс. з інтервалами між ін'єкціями 4 тижні; після першої ін'єкції суспензії протягом 2 тижн. необхідно продовжувати п/ш введення р-ну у попередній ефективній дозі; пацієнтам, у яких симптоми і біологічні маркери лише частково контролюються ч/з 3 міс. лікування дозою 20 мг, дозу можна збільшити до 30 мг кожні 4 тижні; для профілактики ускладнень після операцій на підшлунковій залозі р-н вводять п/ш по 0,1 мг 3 р/добу протягом 7 наступних днів, починаючи з дня операції (щонайменше за 1 год. до лапаротомії); при кровотечі із варикозно розширених вен стравоходу р-н вводять у дозі 25 мкг/год шляхом безперервної в/в інфузії протягом 5 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: діарея, біль у животі, нудота, запор, метеоризм, диспепсія, блювання, здуття живота, стеаторея, неоформлені випорожнення, знебарвлення калових мас, головний біль, запаморочення, гіпотиреоз, дисфункція щитовидної залози (наприклад знижений рівень тиреостимулюючого гормону, знижений рівень загального Т4, холелітіаз, холецистит, жовчні конкременти, гіпербілірубінемія, гіпоглікемія, порушена переносимість глюкози, анорексія, дегідратація, біль у місці ін'єкції, астенія, підвищення рівнів трансаміназ, свербіж, висипання, алопеція, диспное, брадикардія, тахікардія, анафілаксія, алергія/реакції гіперчутливості, кропив'янка, г. панкреатит, г. гепатит без холестаза, холестатичний гепатит, холестаз, жовтяниця, холестатична жовтяниця, аритмія, підвищений рівень лужної фосфатази, підвищений рівень гаммаглутамілтрансферази.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена індивідуальна чутливість до октреотиду або будь-якого з допоміжних компонентів препарату (у тому числі розчинника).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0.7 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ОКТРА®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у пач. або бл.	0,1 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОКТРА®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у пач. або бл.	0,1 мг/мл	№5x1	910,00	
II.	ОКТРЕОТИД - МБ	Бендаліс ГмбХ (виробник, що відповідає за випуск серії)/Вассербургер Арцнейміттельверк ГмбХ (виробник, що здійснює повний цикл виробництва, крім випуску серії)/Біоканол Фарма ГмбХ (альтернативний виробник, що здійснює вторинне пакування)/Солюфарм Фармацой, Німеччина/Німеччина/Німеччина/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп.	0,05 мг/мл	№5	3196,31	26,98/\$
	ОКТРЕОТИД - МБ	Бендаліс ГмбХ (виробник, що відповідає за випуск серії)/Вассербургер	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп.	0,1 мг/мл	№5	1136,80	26,98/\$

	Арцнейміттельверк ГмбХ (виробник, що здійснює повний цикл виробництва, крім випуску серії)/Біоканол Фарма ГмбХ (альтернативний виробник, що здійснює вторинне пакування)/Солюфарм Фармацой, Німеччина/Німеччина/Німеччина					
ОКТРЕОТИД - МБ	Бендаліс ГмбХ (виробник, що відповідає за випуск серії)/Вассербургер Арцнейміттельверк ГмбХ (виробник, що здійснює повний цикл виробництва, крім випуску серії)/Біоканол Фарма ГмбХ (альтернативний виробник, що здійснює вторинне пакування)/Солюфарм Фармацой, Німеччина/Німеччина/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп.	0,5 мг/мл	№5	215,29	25,63/\$
ОКТРЕСТАТИН	Італфармако С.п.А., Італія	р-н д/ін'єк. по 1мл в шпр. у бл.	0,05 мг/мл	№5,№6,№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ОКТРЕСТАТИН	Італфармако С.п.А., Італія	р-н д/ін'єк. по 1мл в шпр. у бл.	0,1 мг/мл	№5,№6,№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ОКТРЕСТАТИН	Італфармако С.п.А., Італія	р-н д/ін'єк. по 1мл в шпр. у бл.	0,5 мг/мл	№5,№6,№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
САНДОСТАТИН®	Новартіс Фарма Штейн АГ, Швейцарія	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у кор.	0,05мг/1 мл, 0,1мг/1 мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
САНДОСТАТИН® ЛАР	Сандоз ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, контроль якості, первинне пакування порошку, контроль якості порошку за всіма параметрами за виключенням молекулярної маси полімеру)/Новартіс Фарма Штейн АГ (вторинне пакування, випуск серії готового прод, Австрія/Швейцарія/Нідерланди	пор. д/сусп д/ін'єк. у фл. з розч.	10мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
САНДОСТАТИН® ЛАР	Сандоз ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, контроль якості, первинне пакування порошку, контроль якості порошку за всіма параметрами за виключенням молекулярної маси полімеру)/Новартіс Фарма Штейн АГ (вторинне пакування, випуск серії готового прод, Австрія/Швейцарія/Нідерланди	пор. д/сусп д/ін'єк. у фл. з розч.	20мг	№1	592,96	26,27/\$

	нди					
САНДОСТАТИН® ЛАР	Сандоз ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, контроль якості, первинне пакування порошку, контроль якості порошку за всіма параметрами за виключенням молекулярної маси полімеру)/Новартіс Фарма Штейн АГ (вторинне пакування, випуск серії готового прод, Австрія/Швейцарія/Нідерланди)	пор. д/сусп д/ін'єк. у фл. з розч.	30мг	№1	494,60	26,27/\$

● **Ланреотид (Lanreotid)**

Фармакотерапевтична група: H01CB03 - гормони гіпофіза та гіпоталамуса та їх аналоги; соматостатин та його аналоги.

Основна фармакотерапевтична дія: октапептид, аналог природного соматостатину; пригнічує ряд ендокринних, нейроендокринних, екзокринних та паракринних механізмів; виражена його тропність до соматостатинових рецепторів людини SSTR 2 та 5, низька тропність до SSTR1, 3 та 4; пригнічуючи синтез тиреотропного гормону (TSH), також нормалізує функцію щитовидної залози у пацієнтів, що хворіють на аденому з підвищеною секрецією тиреотропного гормону; пригнічує екзокринну кишкову секрецію, травні гормони та механізм утворення кліткових протофібрил; чинить загальну антисекреторну дію; пригнічує базальну секрецію мотиліну, шлункових інгібуючих пептидів та поліпептидів підшлункової залози; пригнічує кровообіг у верхній брижовій артерії та ворітній вені, що індукується їжею; зменшує гідроелектролітичну секрецію в порожній кишці (секрецію води, натрію, калію та хлоридів), яка стимулюється простагландином E1; знижує рівень пролактину у пацієнтів з акромегалією, що отримують лікування протягом тривалого часу.

Показання для застосування ЛЗ: лікування акромегалії^{БНФ} при підвищеному рівні циркулюючого гормону росту (GH) та інсуліноподібного фактора росту (IGF-1) після оперативного втручання та/або радіотерапії, або у разі, якщо протипоказані оперативне втручання та/або радіотерапія; лікування клінічних симптомів, спричинених акромегалією^{БНФ}; лікування нейроендокринних пухлин ШКТ або підшлункової залози^{БНФ} (GEP-NETS) 1-го ступеня диференціювання та підмножини пухлин 2-го ступеня диференціювання (індекс Ki67 до 10%) з первинною локалізацією у середній кишці, підшлунковій залозі або з невідомою первинною локалізацією^{БНФ}, при виключенні локалізації з ділянок задньої кишки^{БНФ}, у дорослих пацієнтів при нерезектабельних місцевопоширених або метастатичних пухлинах^{БНФ}; лікування клінічних симптомів карциноїдних пухлин^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: акромегалія: рекомендована доза - 60^{БНФ} -120 мг кожні 28 днів, зменшити дозу, якщо було досягнуто повного контролю (рівень гормону росту (GH) <1 нг/мл, нормалізація рівня інсуліноподібного фактора росту (IGF-1) та/або зникнення клінічних симптомів), залишити дозу без змін, якщо рівень гормону росту (GH) - знаходиться у межах 2,5 нг/мл до 11 нг/мл, підвищити дозу при рівні гормону росту (GH) > 2,5 нг/мл; лікування симптомів, спричинених нейроендокринними пухлинами: на початку лікування рекомендована доза - 90 мг кожні 28 днів (4 тижні) протягом 2 міс., необхідно окремо коригувати терапію для кожного пацієнта в спеціалізованому відділенні, дозу підбирають індивідуально, залежно від р-ції пацієнта, яку оцінюють шляхом контролю за рівнем гормону росту (GH) та інсуліноподібного фактору росту (IGF-1) в плазмі, а також на підставі оцінки зміни симптомів; у разі недостатньої р-ції, що оцінюється на підставі клінічних симптомів, дозу можна підвищити до 120 мг кожні 28 днів^{БНФ}, якщо р-ція достатня, що оцінюється на підставі клінічних симптомів, дозу можна знизити до 60 мг кожні 28 днів (4 тижні);^{БНФ} лікування нейроендокринних пухлин шлунково-кишкового тракту або підшлункової залози (GEP-NETS): рекомендована доза становить одну ін'єкцію 120 мг кожні 28 днів^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: діарея, болі в животі, ЖКХ, підвищення АЛТ, відхилення від норми АСТ, відхилення від норми АЛТ, підвищення рівня білірубіну в крові, підвищення рівня глюкози в крові, підвищення рівня глікованого Hb, зниження маси тіла; зменшення рівня ферментів підшлункової залози, підвищення АСТ, підвищення рівня лужної фосфатази в крові, відхилення від норми рівня білірубіну в крові, зниження рівня натрію в крові, синусова брадикардія; припливи крові до обличчя, запаморочення, безсоння, головний біль, летаргія, рідке випорожнення, біль у животі, нудота, блювання, запор, метеоризм, здуття живота, неприємні відчуття в животі, диспепсія, стеаторея; зміна кольору калових мас, алопеція, гіпотрихоз, гіпоглікемія, зниження апетиту, гіперглікемія, ЦД, астенія, стомлюваність, р-ції в місці введення (біль, набряк, затвердіння, вузлики, свербіж), холелітаз; розширення жовчних протоків, скелетно м'язовий біль, міалгія, панкреатит, холецистит, ангіоневротичний набряк, анафілаксія, гіперчутливість.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до соматостатину або споріднених пептидів та до будь-якого з компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 3 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	СОМАТУЛІН АУТОЖЕЛЬ 120 МГ	ІПСЕН ФАРМА БІОТЕК, Франція	р-н д/ін'єк. прол. вивіл. у	120мг/шприц	№1	823,80	30,80/€

			шпр. по 0,5мл та 1голк.			
СОМАТУЛІН АУТОЖЕЛЬ 60 МГ	ІПСЕН ФАРМА БІОТЕК, Франція	р-н д/ін'єк. прол. вивіл. у шпр. по 0,5мл та 1голк.	60 мг/шприц	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
СОМАТУЛІН АУТОЖЕЛЬ 90 МГ	ІПСЕН ФАРМА БІОТЕК, Франція	р-н д/ін'єк. прол. вивіл. у шпр. по 0,5мл та 1голк.	90 мг/шприц	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

7.6.1.3. Анти-гонадотропін-релізинг гормони

- **Цетрорелікс (Cetrorelix)** (див. п. 11.8. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

7.6.2. Препарати гормонів гіпофіза

7.6.2.1. Тиротропін

- **Тиротропін альфа (Thyrotropin alfa)** ** (див. п. 7.3.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

7.6.2.2. Соматропін та аналоги

- **Соматропін (Somatropin)**

Фармакотерапевтична група: H01AC01 - гормони передньої долі гіпофіза та їх аналоги. Соматропін і агоністи соматропіну.

Основна фармакотерапевтична дія: метаболічний гормон, що впливає на обмін ліпідів, вуглеводів та протеїнів; основним ефектом є стимуляція росту скелета, м'язової маси та виражений вплив на процеси обміну речовин; у дітей з недостатністю ендогенного гормону росту соматропін прискорює лінійний ріст скелета і швидкість росту; як у дорослих, так і у дітей соматропін підтримує нормальну структуру тіла шляхом покращення засвоєння азоту, прискорення росту скелетних м'язів і вивільнення ліпідів із жирових депо; особливо чутливою до соматропіну є вісцеральна жирова тканина; крім стимуляції ліполізу, соматропін зменшує надходження тригліцеридів у жирові депо; більшість ефектів соматропіну зумовлена інсуліноподібним фактором росту, він підвищує сироваткову концентрацію інсуліноподібного ростового фактора ІРФ-І та ІРФ-зв'язуючого білка ІРФЗБ-3; стимулює рецептори холестерин-ліпопротеїнів низької щільності (ХЛПНЦ), що знаходяться в печінці, та впливає на профіль ліпідів та ліпопротеїдів у сироватці крові; збільшує рівень інсуліну, однак рівень глюкози натще зазвичай не змінюється; сприяє затримці натрію, калію та фосфору; стимулює кістковий метаболізм; аналогічно загальному росту і збільшенню маси тіла, відзначається пропорційне збільшення розмірів інших тканин: підвищений ріст сполучної тканини, шкіри і відростків; збільшення скелетної мускулатури зі зростанням розмірів і кількості клітин; збільшення тимусу, печінки з підвищеною проліферацією клітин; незначне збільшення гонад, надниркової і щитовидної залози; відзначається накопичення натрію, калію і фосфору; у дорослих у перші місяці лікування кісткова маса дещо зменшується за рахунок посиленої резорбції, проте після тривалого лікування кісткова маса збільшується.

Показання для застосування ЛЗ: діти: затримка росту у дітей, спричинена зменшенням або відсутністю секреції ендогенного гормону росту^{БНФ}; затримка росту у дівчаток з дисгенезією гонад (с-ром Тернера)^{БНФ}, підтвердженою хромосомним аналізом; затримка росту у дітей препубертатного віку, спричинена ХНН^{БНФ}; порушення росту у низькорослих дітей віком від 4 років (індекс стандартного відхилення (SDS) існуючого росту < -2,5 та з урахуванням росту батьків SDS < -1), які народились зі зростом, що не відповідає гестаційному віку^{БНФ}, а маса тіла та/або довжина яких при народженні була менше -2 SD (стандартне відхилення), і які не наддогнали необхідний зріст (SDS швидкості росту < 0 протягом останнього року); порушення росту при с-мі Прадера-Віллі^{БНФ} з метою покращення росту і будови тіла; дорослі: замісна терапія у дорослих з вираженим дефіцитом гормону росту^{БНФ}, діагностованим за одним динамічним тестом на дефіцит гормону росту; дефіцит гормону росту, діагностований у дитинстві (пацієнти, у яких недостатність гормону росту була діагностована у дитинстві, перед початком гормонозамісної терапії повинні пройти повторне обстеження для підтвердження дефіциту гормону росту; дефіцит гормону росту, діагностований у дорослому віці (пацієнтам має бути поставлений діагноз недостатності гормону росту внаслідок захворювань гіпоталамуса або гіпофіза та дефіциту щонайменше ще одного гормону (за винятком пролактину).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Затримка росту, спричинена недостатністю секреції ендогенного гормону росту: по 0,7-1,0 мг/м² площі поверхні тіла або по 0,025-0,035 мг/кг маси тіла на добу п/ш або в/м; затримка росту у дівчат с дисгенезією гонад (с-м Тернера): вводять по 1,4 мг/м² площі поверхні тіла або по 0,045-0,050 мг/кг маси тіла на добу п/ш^{БНФ}; затримка росту у дітей препубертатного віку, спричинена ХНН: по 1,4 мг/м² площі поверхні тіла або по 0,045-0,050 мг/кг маси тіла на добу п/ш; низькорослість у дітей, які народились зі зростом, що не відповідає гестаційному віку (НГВ): по 1-2 мг/м² площі поверхні тіла або по 0,035-0,067 мг/кг маси тіла на добу п/ш; с-м Прадера-Віллі, з метою покращення росту і будови тіла у дітей: по 0,035 мг/кг маси тіла на добу (1,0 мг/м² площі поверхні тіла на добу), не перевищувати добову дозу 2,7 мг, не застосовувати дітям зі швидкістю росту менше 1 см на рік і у віці, коли починається закриття епіфізарних зон росту; дефіцит гормону росту, діагностований у дорослому віці: на початковому етапі лікування п/ш вводити низькі дози соматропіну, що становлять 0,15-0,3 мг/добу^{БНФ}; дозу поступово збільшувати та регулювати, враховуючи клінічну відповідь, побічні р-ції та сироваткові рівні інсуліноподібного фактора росту 1 (IGF-1), за необхідності збільшення дози її змінювати один раз на місяць, рекомендована остаточна доза гормону росту рідко перевищує 1,0 мг/добу^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: утворення антитіл, гіпотиреоз, гіперінсулінізм, гіперглікемія, гіпестезія, парестезія, зап'ястий тунельний с-м, ідіопатична внутрішньочерепна гіпертензія (псевдопухлина мозку), головний біль, артралгія, міалгія, біль у кістках, м'язова скутість, епіфізеоліз голівки стегнової кістки, аваскулярний некроз голівки стегнової кістки, набряк суглобів, р-ції у місці ін'єкції, такі як почервоніння, набряк,

свербіж або біль, місцева ліпоатрофія; діти: парестезія, зап'ястний тунельний с-м, артралгія, міалгія, м'язова скутість, біль у кістках, набряк; р-ції у місці введення; щоразу змінюючи ділянку для ін'єкції; панкреатит; гінекомастія; внутрішньочерепні пухлини, зокрема менінгіоми, у підлітків/молоді, які в дитинстві проходили курс лікування опроміненням злоякісних пухлин голови одночасно з терапією соматропіном; раптова смерть у дітей з с-мом Прадера-Віллі з такими факторами ризику, як ожиріння тяжкого ступеня, обструкція ВДШ або апное уві сні та неідентифіковані респіраторні інфекції в анамнезі; виражена діабетична ретинопатія; прогресування сколіозу у дітей; виявлення латентного центрального гіпотиреозу; свербіж; ЦД 2 типу, генералізовані р-ції гіперчутливості; у дорослих рідко - карпальний с-м; висипання; у дітей із с-мом Тернера була відзначена тенденція до збільшення частоти виникнення запалень середнього вуха при застосуванні високих доз ЛЗ; новоутворення доброякісної та злоякісної, лейкемія; утворення антитіл до соматропіну, гіпотиреоз, зниження рівня тироксину в сироватці крові; розлади кістково-м'язової с-ми та сполучної тканини (вивих голівки стегнової кістки); лаб. аналізи: підвищення рівня ЛФ в сироватці крові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активної речовини або до будь-якого компонента препарату; наявність активних пухлин та/або активних внутрішньочерепних уражень, а також підозра на прогресування або рецидив основного внутрішньочерепного об'ємного процесу; г. критичний стан, який розвинувся внаслідок ускладнень після відкритої операції на серці та черевній порожнині, в результаті множинних травм, г. ДН або подібних патологій; проліферативна або передпроліферативна діабетична ретинопатія; закриття епіфізарних зон росту у дітей; у дітей з ХНН лікування соматропіном необхідно припинити на час трансплантації нирки; непереносимість фруктози, напр., уроджений дефіцит фруктозо-1,6-дифосфатази; вагітність, лактація; гіперчутливість до соматропіну або до будь-яких допоміжних речовин препарату чи розчинника; протипоказаний дітям із с-мом Прадера-Віллі, які страждають ожирінням тяжкого ступеня або мають тяжкі порушення з боку ДШ.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 2 МО, парентерально (для препаратів без дозувань у МО) - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	СОМАТИН	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	1,3мг (4МО)	№1	81,65	
	СОМАТИН	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	2,6мг (8МО)	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	ГЕНОТРОПІН®	Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ (повний цикл виробництва, випуск серії)/Ветер Фарма-Фертигунг ГмбХ і Ко. КГ (виробництво in bulk, контроль якості, первинне пакування), Бельгія/Німеччина	пор. ліоф. д/р-ну д/ін'єк. двокам. картр. в ручк. з розч.	16МО (5,3 мг)	№1	527,38	24,82/\$
	ГЕНОТРОПІН®	Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ, Бельгія	пор. ліоф. д/р-ну д/ін'єк. двокам. картр. в ручк. з розч.	36МО (12мг)	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЕНОТРОПІН®	Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ, Бельгія	пор. ліоф. д/р-ну д/ін'єк. двокам. картр. в ручк. з розч.	36МО (12мг)	№1	325,56	26,64/\$
	ГРОУТРОПІН	Донг-А СТ Ко., Лтд, Корея	р-н д/ін'єк. по 0,5мл, 2мл у фл.	8 МО/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГРОУТРОПІН	Донг-А СТ Ко., Лтд, Корея	р-н д/ін'єк. по 2мл у фл.	8 МО/мл	№10	100,00	24,91/\$
	ГРОУТРОПІН	Донг-А СТ Ко., Лтд, Корея	р-н д/ін'єк. по 0,5мл у фл.	8 МО/мл	№10	110,00	24,91/\$
	ЗОМАКТОН	Феррінг ГмбХ (відповідальний за виробництво порошку, вторинне пакування, контроль якості та випуск серії)/Вассербургер Арцнайміттельверк ГмбХ (відповідальний за виробництво порошку та розчинника)/Феррінг-	пор. д/р-ну д/ін'єк у фл. з розч. в амп.	4 мг	№1	2347,57	27,95/€

	Лечива, а.с. (відповідальний за вторинне пакування), Німеччина/Німеччина/Чеська Республіка					
НОРДІТРОПІН® НОРДІЛЕТ® 10 МГ/1,5 МЛ	А/Т Ново Нордск (виробник, відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; виробник лікарського засобу, первинне та вторинне пакування; виробник для вторинного пакування), Данія	р-н д/ін'єк. по 1,5мл у шпрц.-руч. з катр.	10 мг/1,5 мл	№1	6310,00	27,74/\$
ОМНІТРОП®	Сандоз ГмбХ - БП Шафтенау (виробництво in bulk, пакування, випуск серії), Австрія	р-н д/ін'єк. по 1,5мл у картр. в кор.	5 мг/1,5 мл, 10 мг/1,5 мл	№1, №5, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
САЙЗЕН®	Мерк Сероно С.п.А. (Вхідний контроль, приготування розчину, стерильний розлив, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серій)/Мерк Сероно С.А., відділення у м. Обонн (Вторинне пакування), Італія/Швейцарія	р-н д/ін'єк. по 1,03мл, 1,5мл у картр.	5,83мг/мл, 8мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
САЙЗЕН® 8 МГ КЛІК.ІЗІ	Мерк Сероно С.п.А., Італія	пор. д/приг. р-ну д/ін'єк.у фл. з розч. у картр.	8мг	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
САЙЗЕН® 8 МГ КЛІК.ІЗІ	Мерк Сероно С.п.А., Італія	пор. д/приг. р-ну д/ін'єк.у фл. з розч. у картр.	8мг	№1	2496,00	27,26/\$

7.6.2.3. Аналоги вазопресину

- **Десмопресин (Desmopressin)**

Фармакотерапевтична група: H01BA02 - препарати гормонів для системного застосування, окрім статевих гормонів та інсулінів. Гіпоталамічні та гіпофізарні гормони та аналоги. Гормони задньої частки гіпофіза. Вазопресин та його аналоги.

Основна фармакотерапевтична дія: структурний аналог природного гормону аргінін-вазопресину, отриманий внаслідок змін у побудові молекули вазопресину - дезамінування 1-цистеїну й заміщення L-аргініну на D-аргінін; ці структурні зміни призводять до втрати вазопресорної дії (значною мірою) та пролонгації антидіуретичного ефекту; збільшує водопроникність епітелію дистальних відділів звивистих каналців і прямих каналців нирок та реабсорбцію води з первинної сечі; у високих дозах, 0,3 мкг/кг маси тіла в/в, призводить до підвищення в 2-4 рази коагулянтної активності фактора VIII (VIII:C); збільшується вміст антигену до фактора фон Віллебранда (vWF:Ag), але меншою мірою; у той же час відбувається вивільнення активатора плазміногену (t-PA). EC₅₀ (напівмаксимальна ефективна концентрація) десмопресина, яка спричиняє антидіуретичний ефект, становить 1,6 пг/мл.

Показання для застосування ЛЗ: нецукровий діабет центрального генезу^{БНФ}; первинний нічний енурез у пацієнтів (старше 5 років)^{БНФ} після виключення органічних розладів з боку органів сечовиділення (застосування у рамках загальних принципів терапії, напр., у випадках неефективності інших немедикаментозних методів лікування або призначення в якості фармакотерапії; лікування стану, що спричинений нічною недостатністю антидіуретичного гормону); симптоматичне лікування ніктурії (щонайменше два випадки сечовипускання вночі) у дорослих у поєднанні з нічною поліурією^{БНФ} (у ситуаціях, коли виділення сечі перевищує ємність сечового міхура); посттравматична поліурія та полідипсія при наявності транзиторної недостатці або відсутності антидіуретичного гормону після гіпофізектомії^{БНФ}, операції у ділянці гіпофіза або ЧМТ; як діагностичний засіб: для експрес-теста для визначення концентраційної здатності нирок; для диференційної діагностики нецукрового діабету^{БНФ}. р-н: скорочення чи нормалізація подовженого часу кровотечі перед інвазивними лікувальними і діагностичними втручаннями або для консервативного лікування кровотеч у пацієнтів з подовженим часом кровотечі внаслідок уродженої або медикаментозно індукованої дисфункції тромбоцитів, уремії, цирозу печінки або у пацієнтів з подовженим часом кровотечі невідомої етіології, консервативне лікування та профілактика кровотеч, пов'язаних з незначними хірургічними втручаннями, у пацієнтів з легкою формою гемофілії типу А та хвороби фон Віллебранда^{БНФ}, які позитивно відреагували на тестову дозу^{БНФ}, можливе лікування навіть помірно вираженої форми захворювання.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: нецукровий діабет центрального генезу - початкова доза для дорослих та дітей віком від 5 років - по 0,1 мг або 0,2 мг 3 р/добу^{БНФ}; добова доза варіює від 0,2 до 1,2 мг на добу,^{БНФ} первинний нічний енурез: дозування для дорослих та дітей віком від 5 років становить 0,2 мг перед сном, у випадку недостатнього ефекту дозу можна збільшити до 0,4 мг, під час лікування необхідно обмежити прийом

рідини, курс лікування - 3 міс. ^{БНФ} ніктурія: початкова доза - 0,1 мг/ніч, якщо ця доза недостатньо ефективна протягом 1 тижн., то дозу збільшують до 0,2 мг і надалі при щотижневому збільшенні до 0,4 мг, експрес-тест для визначення концентраційної здатності нирок та для диференційної діагностики нецукрового діабету: добова доза дорослих - 1 x 40 мкг 4 впорскування, добова доза дітей віком 1 рік та старше - 1 x 20 мкг 2 впорскування, діти віком до 1 року - 1 x 10 мкг 1 впорскування; р-н: 0,3 мкг/кг маси тіла розводять у фізіологічному р-ні до 10 мл і вводять у вигляді в/в інфузії протягом 10 хв або 0,3 мкг/кг у вигляді п/ш ін'єкції, якщо отримано позитивний ефект, введення можна повторити 1-2 рази з інтервалом 6-12 год, подальше повторення дози може призвести до зменшення ефекту; сублінгвально: добова доза у межах 120-720 мкг, початкова доза для дітей і дорослих - 60 мкг 3 р/добу ^{БНФ}, сублінгвально, для більшості пацієнтів оптимальною підтримуючою дозою є 60-120 мкг 3 р/добу, первинний нічний енурез - початкова доза становить 120 мкг /ніч, сублінгвально, при відсутності ефекту дозу можна збільшити до 240 мкг, необхідне обмеження вживання рідини, курс лікування - 3 міс ^{БНФ}, при необхідності продовження лікування потрібна перерва не менш ніж 1 тижд. без прийому препарату, ніктурія з нічною поліурією - початкова доза - 60 мкг /ніч, сублінгвально ^{БНФ}, при відсутності ефекту протягом 1-го тижня дозу збільшувати до 120 мкг і в подальшому до 240 мкг при збільшенні дози з частотою не більше 1 р/тижд, необхідне обмеження прийому рідини в нічний час. ^{БНФ}

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: дорослі: анафілактичні реакції, гіпонатріємія; дегідратація, гіпернатріємія, безсоння; сплутаність свідомості, головний біль; запаморочення; сонливість, парестезії; судоми, астенія, кома, порушення зору, вертиго, відчуття серцебиття, АГ; ортостатична гіпотензія, задишка, нудота, біль у животі, діарея, запор, блювання; диспепсія, метеоризм, здуття живота, пітливість, свербіж, висипання, кропив'янка; алергічний дерматит, м'язові судоми, міальгія, симптоми з боку сечового міхура та уретральні симптоми, набряки, підвищена втомлюваність; дискомфорт, біль у грудях, грипоподібний стан, підвищення маси тіла, підвищення рівня печінкових ферментів, гіпокаліємія; **діти та підлітки:** анафілактичні реакції, гіпонатріємія, лабільність настрою, агресія, симптоми тривожності, кошмари, зміни настрою; аномальна поведінка, емоційні порушення, депресія, галюцинації, безсоння, головний біль; сонливість; порушення уваги, психомоторна гіперактивність, судоми, АГ, носова кровотеча, біль у животі, нудота, блювання, діарея, висипання, алергічний дерматит, пітливість, кропив'янка, симптоми з боку сечового міхура та уретральні симптоми, периферичні набряки, підвищена втомлюваність; підвищена збудливість.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до десмопресину або до інших компонентів препарату; вроджена або психогенна полідипсія (з об'ємом сечоутворення понад 40 мл/кг/добу), полідипсія у хворих на алкоголізм; діагностована або підозрювана СН; стани, які потребують лікування діуретиками; діагностована гіпонатріємія; помірна та тяжка ниркова недостатність (кліренс креатиніну \downarrow 30 мл/хв для розн. д/ін'єк.; кліренс креатиніну \downarrow 50 мл/хв для спрея, таб., та ліоф. оральн.); с-ром порушення секреції антидіуретичного гормону; вік пацієнтів від 65 років, якщо десмопресин застосовувати для лікування ніктурії; тяжкі форми хвороби Віллебранда (тип ІІб); зниження активності фактора VIII до 5 % та наявність антитіл до фактора VIII.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,4 мг., парентерально - 4 мкг., назально - 25 мкг., сублінгвально/букально - 0,24 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	УРОПРЕС®	ПАТ "Фармак", Україна	крап. назал. по 5мл у фл.	0,1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	УРОПРЕС®	ПАТ "Фармак", Україна	крап. назал. по 2,5мл у фл.	0,1 мг/мл	№1	22,00	
	УРОПРЕС®	ПАТ "Фармак", Україна	спрей назал. по 5мл у фл.	0,1 мг/мл	№1	22,50	
	УРОПРЕС®	ПАТ "Фармак", Україна	спрей назал. по 2,5мл у фл.	0,1 мг/мл	№1	27,00	
II.	МІНІРИН	Феррінг Інтернешнл Сентер СА (виробництво)/Феррінг ГмБХ (відповідальний за випуск серії), Швейцарія/Німеччина	табл. у фл.	0,1 мг	№30	70,20	32,91/€
	МІНІРИН	Феррінг Інтернешнл Сентер СА (виробництво)/Феррінг ГмБХ (відповідальний за випуск серії), Швейцарія/Німеччина	табл. у фл.	0,2 мг	№30	65,81	32,91/€
	МІНІРИН	Феррінг ГмБХ (виробництво, відповідальний за первинне пакування, контроль якості та випуск серії)/Феррінг Інтернешнл Сентер СА (відповідальний	спрей наз. по 50доз (5мл) у фл.	10 мкг/дозу	№1	20,57	32,91/€

	за вторинне пакування), Німеччина/Швейцарія					
МІНІРИН МЕЛТ	Феррінг Інтернешнл Сентер СА (вторинне пакування)/Каталент Ю.К. Свіндон Зідіс Лімітед (виробництво, первинне пакування, контроль якості)/Феррінг ГмБХ (відповідальний за контроль якості, випуск серії), Швейцарія/Великобританія /Німеччина	ліоф. орал. у бл.	60мкг, 120мкг, 240мкг	№10, №30, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МІНІРИН МЕЛТ	Феррінг Інтернешнл Сентер СА (вторинне пакування)/Каталент Ю.К. Свіндон Зідіс Лімітед (виробництво, первинне пакування, контроль якості)/Феррінг ГмБХ (відповідальний за контроль якості, випуск серії), Швейцарія/Великобританія /Німеччина	ліоф. орал. у бл.	60мкг	№10x3	109,69	32,91/€
МІНІРИН МЕЛТ	Феррінг Інтернешнл Сентер СА (вторинне пакування)/Каталент Ю.К. Свіндон Зідіс Лімітед (виробництво, первинне пакування, контроль якості)/Феррінг ГмБХ (відповідальний за контроль якості, випуск серії), Швейцарія/Великобританія /Німеччина	ліоф. орал. у бл.	120мкг	№10x3	109,69	32,91/€
ОКТОСТИМ	Феррінг ГмБХ (виробництво, первинне пакування, відповідальний за контроль якості, випуск серії)/Феррінг-Лечива, а.с. (вторинне пакування), Німеччина/Чеська Республіка	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп.	15 мкг/мл	№10	138,62	32,90/€

7.6.2.4. Окситоцин та його аналоги

- **Демокситоцин (Demoxytocin)**

Фармакотерапевтична група: H01BB01 - гіпофізарні та гіпоталамічні гормони та аналоги. Гормони задньої долі гіпофіза. Окситоцин та його похідні.

Основна фармакотерапевтична дія: утеротонізуюча, стимулююча пологову активність, лактотропна; за хімічною структурою близький до окситоцину і має аналогічні фармакологічні властивості; збуджує гладку мускулатуру матки, скорочує міоепітеліальні клітини молочних залоз, посилюючи виділення молока; демокситоцину властива виражена й триваліша дія порівняно з дією окситоцину, оскільки препарат стійкий до ферментативної інактивації (до окситоцинази); скорочення матки починаються ч/з 20-40 хв. (максимально 50-60 хв.) після трансбукального застосування; демокситоцин позбавлений вазопресорної і антидіуретичної дії, що дозволяє застосовувати його жінкам хворим на АГ, з пізніми токсикозами вагітних і порушеннями ф-цій нирок; швидко абсорбується ч/з слизову оболонку ротової порожнини в системний кровотік, не руйнується ферментами слини; стійкий до окситоцинази, що руйнує окситоцин; властивості препарату дозволяють застосовувати його трансбукально.

Показання для застосування ЛЗ: для збудження і посилення пологової активності при її первинній та вторинній слабкості; для стимулювання лактації у післяпологовий період.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл. застосовують трансбукально, закладаючи за щоку попеременно праворуч і ліворуч, і утримують у ротовій порожнині до повного її р-нення і всмоктування; для збудження і стимулювання пологової діяльності; звичайно застосовують по 50 МО (1 табл.) кожні 30 хв; необхідну дозу препарату визначають індивідуально; максимальна доза звичайно становить 500 МО (10 табл.), у поодиноких випадках - 900 МО і більше; при появі регулярних, сильних перейм наступні разові дози зменшують удвічі (1/2 табл.) або збільшують інтервал між прийомами (1 год); за відсутності ефекту препарат можна повторно приймати

через 24 год; для стимулювання лактації призначають з 2-го по 6-й день післяпологового періоду по 25 або 50 МО (1/2 або 1 табл.) демокситоцину за 5 хв до годування дитини 2-4 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: великі дози демокситоцину та підвищена чутливість матки можуть спричинити наступні побічні дії: **у матері** - спазми матки (також при застосуванні малих доз), гіпертонус матки, тетанічні скорочення, гіперактивність матки з розривами матки та вагінальних тканин; нудота, блювання, гіперсалівація, підвищення АТ, тахікардія, аритмія; можливий летальний результат; у разі ускладнень вагітності та пологів може виникати небезпечно для життя афібриногенемія, післяпологова кровотеча, анафілактичний шок, існує ризик дисемінованої внутрішньо судинної коагуляції; **у плода:** брадикардія, аритмія, асфіксія, г. гіпоксія плода, фарбування меконієм амніотичної рідини; можливий летальний результат; **у новонароджених** може бути жовтяниця, крововилив у сітківці; у подальшому: р-ції гіперчутливості, в т.ч. анафілактичні реакції (з утрудненням дихання, артеріальною гіпотензією або шоком), головний біль, тахікардія, брадикардія, нудота, блювання, аритмія, висипання.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; гіпертонічні скорочення матки, механічні ушкодження репродуктивних шляхів, гіпоксія плоду, внутрішньоутробна загибель плода; невідповідність розмірів таза та плода, поперечне або косе положення плода, передлежання плаценти або пуповинних судин, передчасне відшарування плаценти, опущення пуповини, загрозливий розрив матки у зв'язку з великою кількістю вагітностей, розтягнення матки (багатоплідна вагітність, полігідрамніон), інвазивна карцинома шийки матки, багатоводдя, велика кількість вагітностей та наявність рубців на стінці матки після операцій, включаючи кесарів розтин; не можна тривалий час застосовувати при тяжкому прееклампсичному токсикозі та тяжких захворюваннях серця та судин, а також у випадку інертної матки (резистентність до демокситоцину/окситоцину).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 100 МО

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДЕЗАМІНООКСИТОЦИН	АТ "Гріндекс", Латвія	табл. у бл.	50 МО	№10x1	32,22	26,95/€

- **Окситоцин (Oxytocin) *** (див. п. 11.9.2. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

7.6.2.5. Гонадотропні гормони

- **Хоріонічний гонадотропін (Chorionic gonadotrophin)** (див. п. 11.6.4.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Менопаузальний гонадотропін людини (Human menopausal gonadotrophin)** (див. п. 11.6.4.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Урофолітропін (Urofollitropin)** (див. п. 11.6.4.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Фолітропін альфа (Follitropin alfa)** (див. п. 11.6.4.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Фолітропін бета (Follitropin beta)** (див. п. 11.6.4.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

7.7. Засоби, що застосовуються для лікування остеопорозу

7.7.1. Патогенетична терапія

7.7.1.1. Естрогени та естроген-гестагенні засоби

- **Естрадіол (Estradiol)** (див. п. 11.6.2.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Комбіновані препарати

- **Естрадіол + Левоноргестрел (Estradiol + Levonorgestrel)** (див. п. 11.6.2.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

7.7.1.2. Антипаратиреодні засоби

7.7.1.3. Бісфосфонати

- **Кислота клодронова (Clodronic acid)** (див. п. 19.5. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Кислота памідронова (Pamidronic acid)** (див. п. 19.5. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Кислота золедронова (Zoledronic acid)** (див. п. 19.5. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Кислота алендрона (Alendronic acid)** (див. п. 8.7.3.1. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

7.7.1.4. Препарати вітаміну D та його аналоги

- **Ергокальциферол (Ergocalciferol)** (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")
- **Альфакальцидол (Alfacalcidol)** (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")

- **Холекальциферол (Colecalciferol)** (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")

7.7.1.5. Препарати кальцію

- **Кальцію глюконат (Calcium gluconate)** * [тільки таблетки]

Фармакотерапевтична група: А12АА03 - препарати кальцію.

Основна фармакотерапевтична дія: регулює метаболічні процеси, поповнює дефіцит кальцію в організмі; чинить гемостатичну, протиалергічну дію та знижує проникність капілярів; іони кальцію беруть участь у передачі нервових імпульсів, скороченні гладких і поперечносмугастих м'язів, функціонуванні міокарда, згортанні крові; необхідні для формування кісткової тканини, функціонування інших систем та органів; чинить протизапальну, кровоспинну дію.

Показання для застосування ЛЗ: захворювання, що супроводжуються гіпокальціємією^{ВООЗ БНФ}, підвищенням проникності клітинних мембран, порушенням проведення нервових імпульсів у м'язовій тканині; гіпаратиреоз (латентна тетанія^{БНФ}, остеопороз), порушення обміну віт. D (рахіт, спазмофілія, остеомалія), гіперфосфатемія у хворих з ХНН, підвищена потреба у кальції (період інтенсивного росту дітей та підлітків, вагітність, період годування груддю), недостатній вміст кальцію у їжі, порушення його обміну у постменопаузальному періоді, переломи кісток, посилення виведення кальцію (тривалий постільний режим, хр.діарея, гіпокальціємія при тривалому прийомі діуретиків, протиепілептичних ЛЗ, ГКС), у комплексній терапії: кровотечі різної етіології, алергічні захворювання (сироваткова хвороба, кропив'янка, пропасний с-м, сверблячі дерматози, ангіоневротичний набряк); БА, дистрофічні аліментарні набряки, легеневий туберкульоз, еклампсія, паренхіматозний гепатит, токсичні ураження печінки, нефрит, отруєння солями магнію, щавлевою кислотою, розчинними солями фтористі кислоти (при взаємодії з кальцію глюконатом утворюються нерозчинні та нетоксичні кальцію оксалат та кальцію фторид); недостатність ф-ції паразитовидних залоз; гіперкаліємія; гіперкаліємічна форма пароксизмальної міоплеїї.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н: в/в і в/м; вводити повільно, протягом 2-3 хв.; дорослим та дітям старше 14 років вводять по 5 - 10 мл 10-% р-ну 1 р/добу щоденно, або через 1-2 доби, залежно від перебігу захворювання та стану пацієнта; дітям тільки в/в, залежно від віку, 10 % р-н вводять у таких дозах: віком до 6 місяців - 0,1-1 мл, 6-12 місяців - 1-1,5 мл, 1-3 роки - 1,5-2 мл, 4-6 років - 2-2,5 мл, 7-14 років - 3-5 мл; табл: дорослим і дітям від 14 років застосовувати у разовій дозі 1-3 г (2-6 табл.), дітям віком 3-4 роки - по 1 г (2 табл.), 5-6 років - по 1-1,5 г (2-3 табл.), 7-9 років - по 1,5-2 г (3-4 табл.), 10-14 років - по 2-3 г (4-6 табл.) 2-3 р/добу; добова доза для осіб літнього віку не має перевищувати 2 г (4 табл.).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперкальціємія, гіперкальціурія; можливі нудота, блювання, пітливість, відчуття тяжкості у голові, синкопальний стан, загальна слабкість, артеріальна гіпотензія, вазомоторний колапс, іноді летальний, іноді діарея, брадикардія, відчуття жару у ротовій порожнині, а згодом - в усьому тілі, котрі швидко минають самостійно; біль в епігастральній ділянці, запори, утворення кальцієвих конкрементів у кишечнику; порушення ф-ції нирок (почастішання сечовипускання, набряки нижніх кінцівок); кальцифікація м'яких тканин унаслідок екстравазації р-ну кальцію; в/м ін'єкції можуть викликати місцеве подразнення; АР та анафілактичні р-ції, аж до анафілактичного шоку.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів ЛЗ; схильність до тромбозів; гіперкальціємія; тяжка гіперкальціурія; виражений атеросклероз; гіперкоагуляція; тяжка ниркова недостатність; нефроуролітаз (кальцієвий), саркоїдоз; одночасне застосування із серцевими глікозидами, цефтриаксоном; до 18 років- кальцію глюконат не слід використовувати для підготовки повного парентерального харчування; повторне та довготривале лікування дітей до 18 р. та осіб з порушеннями ф-цій нирок; не можна вводити разом з цефтриаксоном, через ризик утворення нерозчинного комплексу цефтриаксон-кальцій, у таких випадках: недоношеним новонародженим віком ≤ 41 тижд. із урахуванням строку в/утробного розвитку (гестаційний вік + вік після народження), доношеним новонародженим (віком ≤ 28 днів).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 3 г., парентерально - 3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ ін'єк. по 10мл в амп. у конт. чар/уп.	100мг/мл	№5x2	10,88	
	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ ін'єк. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	100мг/мл	№5x2	11,89	
	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	ПАТ "Монфарм", Україна	табл. у стрип.та бл.	0,5 г	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл.	500 мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл.	500мг	№10	4,03	
	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	табл. у бл.	500 мг	№10x1,№10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАЛЬЦІЮ	ПАТ "Галичфарм"/ПАТ	табл. у стрип.	500мг	№10	відсутня у	

ГЛЮКОНАТ	"Київмедпрепарат", Україна/Україна					реєстрі ОБЦ
КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	ПАТ "Галичфарм"/ПАТ "Київмедпрепарат", Україна/Україна	табл. у бл.	500мг	№10x1	3,75	
КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ	АТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл, 10мл в амп. у бл.	100мг/мл	№5,№10,№ 5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ	АТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 10мл в амп. у бл.	100мг/мл	№5x2	19,50	
КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у бл.	100мг/мл	№5x2	21,00	
КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ- ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп. у пач.	500мг	№10, №10x3, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ- ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп. у пач.	500мг	№10	3,74	
КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ- ДАРНИЦЯ (СТАБІЛІЗОВАНИЙ)	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл, 10мл в амп. у конт. чар/уп.	100мг/мл	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ- ДАРНИЦЯ (СТАБІЛІЗОВАНИЙ)	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	100мг/мл	№5x2	18,31	
КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ- ДАРНИЦЯ (СТАБІЛІЗОВАНИЙ)	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 10мл в амп. у конт. чар/уп.	100мг/мл	№5x2	19,23	
КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ- ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	500мг	№10, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ- ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	500мг	№10x1	4,79	
КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ- ЗДОРОВ'Я (СТАБІЛІЗОВАНИЙ)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл, 10мл у кор. та бл.	100мг/мл	№5,№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ- ЗДОРОВ'Я (СТАБІЛІЗОВАНИЙ)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 10мл у кор.	100мг/мл	№10	18,82	
КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ- ЗДОРОВ'Я (СТАБІЛІЗОВАНИЙ)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл у бл.	100мг/мл	№5x2	21,61	
КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ- ЗДОРОВ'Я (СТАБІЛІЗОВАНИЙ)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл у кор.	100мг/мл	№10	21,61	

7.7.1.6. Препарати фтору

- **Натрію фторид (Sodium fluoride) ****

Фармакотерапевтична група: А12СD01 - мінеральні добавки. Препарати фтору.

Основна фармакотерапевтична дія: стимулює мінералізацію твердих тканин зуба, сприяє визріванню і затвердінню зубної емалі, а також її стійкості до дії кислоти, зменшує продукцію кислоти бактеріями і спричиняє бактерицидну дію щодо мікроорганізмів, які спричиняють карієс зубів, гальмує утворення молочної кислоти з вуглеводів, стимулює остеобласти і поповнює дефіцит фтору в організмі.

Показання для застосування ЛЗ: у складі комплексу лікувально-профілактичних заходів у дітей віком від 6 до 14 років для профілактики карієсу^{БНФ,ВООЗ}; і для покращання формування твердих тканин постійних зубів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати р/ос, доза залежить від віку дитини і концентрації фтору у воді (призначають при вмісті фтору у воді менше 0,7 мг/л); приймати перед сном після чищення зубів; табл. необхідно повільно розжувати і запити водою; дітям віком від 6 до 14 років по 1 табл. (2,21 мг) на добу; курс лікування - не менше 250 днів на рік, щороку до 14-річного віку.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: реакції гіперчутливості, включаючи дерматит; кропив'янка, АР, прояви гіпотиреозу, стоматит, утворення виразок у роті, дерматит, гіперемія шкіри, нудота, диспептичні явища, біль у ногах та суглобах, підвищена стомлюваність, скарги на головний біль, хр.токсичність у вигляді флюорозу зубів та підвищеної щільності кісток.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; концентрація фтору в питній воді > ніж 0,7 мг/л; тяжкі захворювання печінки та нирок; загострення виразкової хвороби шлунка та ДПК; порушення функції підшлункової залози.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ФЛЮР-Е-ДЕЙ	Фармасайнс Інк., Канада	табл. жув. у фл.	2,21 мг	№120	відсутня у реєстрі ОВЦ	

7.7.1.7. Препарати стронцію

- **Стронцію ранелат (Strontium ranelate)** (див. п. 8.7.3.2. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

7.7.1.8. Анаболічні стероїди

(див. п.2.17.2.1. розділу «КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»)

7.7.2. Симптоматична терапія

7.7.2.1. Анальгетики

(див. п.8.8. розділу «РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ», п.10.3. розділу «АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ, РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»)

7.7.2.2. Нестероїдні протизапальні засоби

(див. п.8.7.1. розділу «РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»)

7.7.2.3. Міорелаксанти

(див. п.8.10. розділу «РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»)

7.8. Інші лікарські засоби, що застосовуються у лікуванні ендокринологічних захворювань

7.8.1. Дофаміноміметики

- **Бромокриптин (Bromocriptine)** (див. п. 11.5.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Спосіб застосування та дози ЛЗ: акромегалія^{БНФ} - після досягнення добової дози 2,5 мг, доза може збільшуватися на 2,5 мг/добу з інтервалами у 2-3 дні таким чином: 2,5 мг кожні 8 год, 2,5 мг кожні 6 год, 5 мг кожні 6 год^{БНФ}

- **Каберголін (Cabergoline)** (див. п. 11.5.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

7.9. Невідкладна допомога при гострих ендокринологічних станах

Найбільше клінічне значення мають невідкладні стани при ЦД і криз при г. недостатності наднирникових залоз.

До г., невідкладних станів при ЦД належать різні види коматозних станів. При ЦД виділяють гіпоглікемічну кому й три види діабетичної коми: гіперкетонемічну (кетонацидотичну, власне діабетичну), гіперосмолярну (некетотичну, акетотичну, неацидемічну, діабетичну кому без кетозу) та лактацидемічну (лактатацидоз). Перші два види діабетичної коми являють собою крайні ступені порушень метаболізму, властиві ЦД, й часто поєднуються або трансформуються один в одного у процесі перебігу. Лактат-ацидоз не є специфічним для діабету с-мом, розвивається частіше як ускладнення тяжких загальних захворювань на фоні ЦД.

7.9.1. Гіпоглікемічна кома

Гіпоглікемічна кома – крайній ступінь гіпоглікемії – небезпечного, г. стану, що розвивається внаслідок швидкого зниження рівня глюкози в крові й утилізації її мозком. Гіпоглікемія розвивається у хворих на ЦД найчастіше при невідповідності дози інсуліну, що вводиться, або значно рідше сульфаніламідних препаратів, та споживаної їжі, особливо вуглеводної. Інсулінові гіпоглікемії трапляються в 40% хворих на ЦД. Найчастіше гіпоглікемії і гіпоглікемічні коми виникають у хворих з тяжким, лабільним першим типом ЦД, при якому визначити зовнішню причину раптового підвищення чутливості до інсуліну неможливо. Дуже часто інсулінова гіпоглікемія виникає, якщо введення інсуліну не супроводжувалось адекватним прийманням їжі відразу після ін'єкції і через 2-3 год в період максимального ефекту інсуліну короткої дії.

При лікуванні препаратами продовженої дії ці реакції можуть наставати в другій половині дня і вночі. Причиною гіпоглікемії може бути посилена утилізація глюкози при інтенсивному м'язовому навантаженні, різних емоційних станах, інфекціях, г. захворюваннях, родах, частіше в період виходу з цих ситуацій, що супроводились тимчасовою інсулінорезистентністю. Нерідко настання компенсації ЦД підвищує чутливість до інсуліну, що

потребує своєчасного зниження дози. Порушення функції печінки, кишок, ендокринного статусу, розвиток ниркової недостатності, що супроводять ЦД, можуть створювати схильність до гіпоглікемії.

Сульфаніламідні препарати також можуть спричиняти гіпоглікемічні реакції, особливо у хворих похилого віку при поєднанні ЦД з захворюваннями нирок, печінки або на фоні явищ СН, а також при голодуванні або недостатності харчування. Застосування деяких ЛЗ у поєднанні з гіпоглікемізуючими сульфаніламидами, може провокувати коматозний стан.

Хр. алкоголізм, а також епізодичне вживання алкоголю можуть сприяти гіпоглікемічній комі у хворих на ЦД, оскільки під дією алкоголю зменшується надходження глюкози з печінки в кров і потенціюється дія сульфаніламідів. Коматозні стани можуть виникати у хворих з порушеною толерантністю до глюкози і невиявленим легким ЦД, внаслідок наявності в цих хворих на початку розвитку хвороби гіперінсулінемії.

У патогенезі гіпоглікемічної коми основне значення має зниження утилізації глюкози клітинами головного мозку, оскільки мозок найчутливіший до зниження постачання глюкозою. Внаслідок нестачі глюкози в клітинах мозку настає г. гіпоксія з наступним порушенням їхньої функції, а при глибокій і тривалій гіпоглікемії дегенерація і загибель.

Гіпоглікемію до певної міри можна розглядати як своєрідну пристосувальну реакцію на надмірну кількість інсуліну, за якої в разі збереження гіпофізарно-надниркових функцій негайно починають діяти захисні, компенсаторні механізми, зокрема підвищується тонуус симпатико-адреналової системи, вивільняються в кров контрінсулінові гормони: адреналін, адренкортикотропний гормон, кортизол, соматотропний гормон. Ці механізми супроводжуються підвищенням глікогенолізу в печінці, стимуляцією неоглюкогенезу. У легких випадках мобілізація цих чинників може усунути гіпоглікемію без відповідних терапевтичних заходів.

Гіпоглікемічна кома розвивається гостро. Зазвичай їй передують короткочасний період провісників. Іноді він такий малий, що кома починається практично раптово.

Симптоматика гіпоглікемії, що передують стадії гіпоглікемічної коми, поліморфна й зумовлена двома головними механізмами: зменшенням вмісту глюкози в мозку й реакціями, пов'язаними із збудженням симпатикоадреналової системи.

Характерні різні порушення поведінки, неврологічні розлади, непритомність, судоми й, нарешті, кома. Реакції, зумовлені збудженням симпатичної вегетативної нервової системи, характеризуються клінікою різних вегетативних порушень, тахікардією, спазмом судин, піломоторною реакцією, потовиділенням, відчуттям напруження, неспокою, страху. Часто настає дезорієнтація, стан хворого може нагадувати алкогольне сп'яніння, характеризується агресивністю, немотивованими вчинками, негативізмом, відмовленням від їжі. У цей період настають розлади зору, ковтання, мови, які переходять в афазію. Якщо в цей час не здійснюються заходи для усунення гіпоглікемії, а власні компенсаторно-пристосувальні механізми виявляються недостатніми, сплутаність свідомості змінюється руховим збудженням, з'являються клонічні й тонічні судороги, які можуть переходити в великий епілептичний напад. У міру поглиблення гіпоглікемії психомоторне збудження змінюється оглушеністю й непритомністю, розвивається кома. Хворий у гіпоглікемічній комі блідий, шкіра волога, спостерігається тахікардія, дихання рівне, тургор очних яблук звичайний, язик вологий, немає запаху ацетону. У разі затяжної гіпоглікемічної коми дихання стає поверхневим, артеріальний тиск знижується, настають брадикардія, гіпотермія, м'язова атонія, гіпо- й арефлексія. Зіниці вузькі, реакції на світло й корнеальних рефлексів немає. Гіпоглікемічна кома може ускладнитись порушенням кровообігу, інсультом, геміплегією, інфарктом, погіршенням перебігу ретинопатії, крововиливом у сітківку.

Основним біохімічним критерієм, який дає змогу діагностувати гіпоглікемію, є низький рівень цукру в крові. При зниженні його вмісту до 3,33-2,77 ммоль/л (60-50 мг%) настають перші гіпоглікемічні прояви. При рівні цукру 2,77-1,66 ммоль/л (50-30 мг%) з'являються всі типові ознаки гіпоглікемії. Не завжди ступінь зниження глікемії корелює з вираженістю клінічної симптоматики. Інші лабораторні дані при гіпоглікемічній комі неспецифічні.

Якщо хворий непритомний або приймання солодкого чаю не дало ефекту, йому треба в/в струминно ввести 40-80 мл 40% р-ну глюкози. Якщо свідомість хворого не відновлюється, вливання глюкози повторюють. Для активації глікогенолізу показане п/ш введення епінефрину (1 мл 0,1% р-ну), а також глюкагону 1-2 мл в/м. У разі недостатньої ефективності названих заходів необхідне в/в краплинне введення 5% р-ну глюкози, яке продовжується до нормалізації глікемії. Таке введення проводиться в разі необхідності в поєднанні з подрібненими дозами інсуліну під контролем глікемії, яка підтримується на рівні 8,0-13,0 ммоль/л. Одночасно з початком в/в вливання глюкози вводять 75-100 мг гідрокортизону або 30-60 мг преднізолону. Хворому вводять 100 мг кокарбоксілази, 5 мл 5% р-ну кислоти аскорбінової, при необхідності симптоматичні засоби, кисень. У випадках затяжної коми для профілактики набряку мозку вводять в/в 5-10,0 мг 25% р-ну манію сульфату, в/в краплинно 15% або 20% р-ну манітолу (0,5-1,0 г/кг маси тіла).

- **Глюкагон (Glucagon)** ^[ГІМД] (див. п. 7.2. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Глюкоза (Glucose)** * (див. п. 7.2. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

7.9.2. Гіперглікемічна кома

7.9.2.1. Гіперглікемічна кетоацидотична кома

Діабетична кома розвивається частіше від інших коматозних станів і залишається найтяжчим г. ускладненням ЦД. Основною причиною (у 25%) діабетичного кетоацидозу й коми можна вважати, особливо в молодих людей, несвоєчасну діагностику маніфестного ЦД; далі йдуть похибки в інсулінотерапії (самовільне припинення введення або неадекватне зменшення дози) або, рідше, у прийманні пероральних цукрознижуючих засобів, грубі порушення дієти й режиму, стресові ситуації, нескореговані відповідною зміною дози інсуліну, травми, інфекції, інфектурентні захворювання, оперативні втручання, вагітність, роди.

Патогенетичною основою діабетичного кетоацидозу й коми є відносна нестача інсуліну, г. зростання потреби в ньому. Дефіцит інсуліну супроводжується зниженням утилізації глюкози тканинами, в основному м'язовою і жировою. Це зумовлює наростання гіперглікемії, що ускладнюється посиленням глікогенолізу й глюконеогенезу в печінці і м'язах. Гіперглікемія і пов'язана з нею глюкозурія, прогресуючий осмотичний діурез супроводжуються втратою води, іонів калію, натрію, хлору, внутрішньоклітинною дегідратацією, гемоконцентрацією, гіперосмолярністю. Ці чинники спричиняють недостатність периферичного кровообігу внаслідок різкого зменшення об'єму циркулюючої крові, розвитку шоку. Ці порушення супроводжуються гіпотонією, яка призводить

до зниження ниркової течії крові і розвитку анурії. Паралельно дефіцит інсуліну провокує ліполіз, спустошуються жирові депо, в печінці з нестерифікованих жирових кислот утворюються ліпопротеїни дуже низької щільності. У зв'язку з неповним окисленням жирів у печінці (тільки до стадії ацетил-КоА), посилюються кетогенез (утворення ацетооцтової і β -оксимасляної кислот) при зниженні утилізації кетонових тіл м'язовою тканиною. Накопичення органічних кислот, ацетоацетату, β -оксибутирату, ацетону призводить до різкого зменшення лужних резервів, зниження рН крові, розвивається некомпенсований метаболічний ацидоз. Кетонемія й ацидоз у клінічній симптоматиці супроводжуються розвитком характерного глибокого "дихання Куссмауля" – специфічної ознаки настання коми. Висока кетонемія супроводжується виділенням кетонових тіл з сечею, що зменшує вміст зв'язаних основ, веде до втрати натрію. Білковий обмін характеризується посиленням катаболічної спрямованості, збільшенням глюконеогенезу, підвищенням концентрації азоту в сечі, дегідратацією клітин, втратою іонів калію. Ці порушення супроводжуються надмірною секрецією контрінсулінових гормонів. Високий вміст неестерифікованих жирових кислот, контрінсулінових гормонів, ацидоз є причинами, що сприяють порушенню гормнально-рецепторних взаємодій, розвитку інсулінорезистентності.

Клінічна картина діабетичної коми розвивається, як правило, поступово протягом кількох днів, іноді год. на фоні прогресуючої декомпенсації ЦД. Якщо своєчасно не усуваються причини, які спровокували кетоз, немає адекватної терапії, патологічний процес прогресує і розвивається стадія клінічно вираженого кетоацидозу або прекоми, а далі коми.

Стан вираженого кетоацидозу, прекоми може продовжитись кілька днів, а іноді й год. При огляді хворого з клінічною картиною діабетичної коми в початковому періоді відзначають руховий неспокій. Його мучить головний біль, є позиви на блювання, г. біль в епігастральній ділянці і спастичний біль у животі. Можуть бути клонічні судороги. Ці симптоми характеризують ранні прояви мозкових розладів при діабетичній комі й відображують надмірну збудливість усіх відділів головного мозку. У міру прогресування метаболічних розладів хворий стає дедалі байдужим, з трудом відповідає на запитання, оглушений, настає деяка сплутаність свідомості. Потім розвивається сонливість, хворий впадає в сорозний стан, з якого його можна вивести тільки сильними подразненнями, після чого він непритомніє і настає кома. Шкіра суха, холодна, тургор її знижений, часто злущується, нерідко на ній виявляються ксантоми, фурункули, розчухи, екзема та інші трофічні зміни. У разі прогресуючого порушення кислотно-лужної рівноваги (рН 7,2 і нижче), дихання стає прискореним, глибоким і гучним ("дихання Куссмауля" – характерний симптом діабетичної коми). Це компенсаторна реакція організму – посилена вентиляція, спрямована на виведення CO_2 , що накопичується в крові, усунення ацидозу. У термінальних стадіях діабетичної коми дихання Куссмауля переходить у поверхневе, а надалі спонтанне дихання припиняється. У повітрі, яке видихає хворий, різкий запах ацетону, який відчувається при вході в кімнату, де лежить хворий. Очні яблука внаслідок втрати тонуусу очних м'язів при надавлюванні м'які. Тонус м'язів кінцівок знижений. t° тіла нормальна або знижена. Підвищення t° тіла свідчить про наявність супровідної інфекції.

СС система при діабетичній комі уражується найбільше. Пульс частий, малого наповнення, м'який, частіше ритмічний. Тони серця глухі. АТ тиск спадає. Язик сухий, шершавий, яскраво-малиновий, обкладений коричневим нальотом. Живіт здутий, нерідко болючий і напружений в епігастральній ділянці. Шлунок розтягнутий, в ньому багато рідини, часто з домішкою крові. Часті явища парезу шлунка і кишок, симптоми подразнення очеревини. Буває блювання, іноді з домішкою крові (блювання "кавовою гущею"). Іноді розвивається симптомокомплекс з сильним болем у животі й напруженням черевних м'язів, що нагадує г. живіт. Сечовипускання часте, при глибокій комі – мимовільне. Поліурія зумовлена високою гіперглікемією й "осмотичним діурезом". Поряд з цим трапляються випадки з затримкою сечі, аж до анурії, зумовленої спадом тонуусу м'язів сечового міхура. Анурія є грізним симптомом, що розвивається на фоні зменшення об'єму циркулюючої крові, спаду АТ, колапсу й припинення ниркової фільтрації.

Виявляються різні порушення неврологічного статусу, зумовлені ацидозом, гіпоксією, електролітними порушеннями, енергетичним дефіцитом і дегідратацією клітин ЦНС і периферичної нервової системи.

Провідними біохімічними показниками гіперглікемічної коми є виражені гіперглікемія, глікозурія, кетонемія і відповідна кетонурія. Розвиваються порушення водно-електролітного балансу. Особливо прогресуючий дефіцит калію. Спостерігається азотемія зниження лужного резерву.

Основними напрямками лікування хворого з гіперкетонемічною комою є інсулінотерапія, регідратація, корекція електролітних розладів і порушень кислотно-основної рівноваги. Крім цих основних методів лікування здійснюються заходи щодо профілактики ускладнень коматозного стану – інфекції, набряку мозку, тромбозу.

- **Інсулін (Insulin)** *
- **Натрію хлорид (Sodium chloride)** * (див. п. 10.5.5. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Натрію бікарбонат (Sodium bicarbonate)** *

Фармакотерапевтична група: B05XA02 - Кровозамінники та перфузійні розчини. Розчини електролітів..

Основна фармакотерапевтична дія: відновлення лужного стану крові та корекції метаболічного ацидозу; при дисоціації натрію гідрокарбонату вивільняється бікарбонатний аніон, він зв'язує іони водню з утворенням карбонної кислоти, яка потім розпадається на воду та вуглекислий газ, що виділяється при диханні; у результаті рН крові зміщується в лужний бік, підвищується буферна ємкість крові; збільшує виділення з організму іонів натрію та хлору, підвищує осмотичний діурез, залужнює сечу, запобігає осаду сечової кислоти у сечовидільній системі.

Показання для застосування ЛЗ: некомпенсований метаболічний ацидоз^{БНФ,ВООЗ} при інтоксикаціях різної етіології, тяжкому перебігу післяопераційного періоду, інфекційних захворюваннях, ЦД, під час наркозу і в післяопераційному періоді, при реанімаційних заходах, пов'язаних із зупинкою серця, поширених та/або глибоких опіках, шоку, діабетичній комі, тривалій діареї, нестримному блюванні, г.масивних крововтратах, тяжкому ураженні печінки та нирок, тривалих пропасних станах, тяжкій гіпоксії новонароджених; абсолютним показанням є зниження рН крові нижче 7,2 (норма 7,37-7,42).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: 4,0% р-н: дорослим в/в або ректально краплинно; дітям - в/в краплинно; залежно від ступеня вираженості ацидозу препарат застосовувати нерозведеним або розведеним р-ном глюкози

5 % у співвідношенні 1:1; дорослим в/в зі швидкістю приблизно 60 крап./хв, до 200 мл на добу; дозу вираховувати залежно від показників газів крові за формулою: об'єм 0,5-молярного буферного гідрокарбонату натрію 4,2 % у мл = дефіцит баз (-BE) x кг маси тіла хворого x 0,3 x 2 (фактор 0,3 відповідає частці позаклітинної рідини порівняно з загальною рідиною); дітям віком від 1 року призначати у дозі 5-7 мл на 1 кг маси тіла. МДД для дорослих - 300 мл (при підвищеній масі тіла - 400 мл), для дітей від 100 до 200 мл залежно від маси тіла. 8,4% р-н: середня доза для дорослих - від 2 до 5 ммоль/кг (2 - 5 мл/кг), вводити протягом 4-8 год; для дітей доза - 1 ммоль/кг (1 мл/кг) при повільному введенні, або вводити р-н 8,4 %, розведений 1:1 з 5 % р-ном глюкози, кількість препарату залежить від показників кислотно-лужного балансу крові, при зупинці серця первинна доза для дорослих становить 1 ммоль/кг, після чого - 0,5 ммоль/кг кожні 10 хв, необхідно контролювати кислотно-лужний стан крові та клінічний стан пацієнта.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота, блювання, анорексія, біль у шлунку, головний біль, неспокій, АГ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: метаболічний або респіраторний алкалоз, гіпокаліємія, гіпернатріємія.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначена, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НАТРІЮ БІКАРБОНАТ	ПрАТ "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	4%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НАТРІЮ БІКАРБОНАТ	ПрАТ "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	4%	№1	20,10	
	НАТРІЮ БІКАРБОНАТ	ПрАТ "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	4%	№1	29,70	
	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл., по 100мл, 250мл у конт. полім., по 2мл, 5мл у конт. однодоз.	40мг/мл	№1, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	40мг/мл	№1	20,06	
	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	40мг/мл	№1	29,60	
	СОДА-БУФЕР®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 50мл, 400мл у скл. пл.	42мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СОДА-БУФЕР®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 20мл у скл. пл.	42мг/мл	№1	18,95	
	СОДА-БУФЕР®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл, у скл. пл.	42мг/мл	№1	46,25	
	СОДА-БУФЕР®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл, у скл. пл.	42мг/мл	№1	68,80	

- **Антибактеріальні засоби**
- **Вітаміни групи В**
- **Кислота аскорбінова (Ascorbic acid)** [тільки таблетки] (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")
- **Неостигмін (Neostigmine) *** (див. п. 6.6.1. розділу "НЕВРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Метоклопрамід (Metoclopramide) *** (див. п. 3.5. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Гепарин (Heparin) *** [тільки мазь та гель] (див. п. 13.8.1.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

7.9.2.2. Гіперосмолярна некетоацидотична кома

Гіперосмолярна кома – особливий вид діабетичної коми, що характеризується крайнім розладом метаболізму при ЦД без кетоацидозу, з високою гіперглікемією. Кардинальними симптомами такої коми є висока гіперглікемія, що досягає 55 ммоль/л і вище, різке обезводнення, клітинний ексікоз, гіпернатріємія, гіперхлоремія, азотемія без кетонемії й кетонурії.

Гіперосмолярна кома розвивається в основному у хворих на легкий і середньотяжкий 2-й тип ЦД, компенсованого невеликими дозами сульфаніламідів або дієтою. В основному це особи старші 50 років.

Основним провокуючим фактором гіперосмолярної коми є дегідратація на фоні механізмів, які посилюють відносну інсулінову недостатність. Інтеркурентні захворювання, інфекції, опіки, травми, г. порушення мозкового і коронарного кровообігу, гастроентерити, панкреатити, що супроводяться блюванням, поносом, призводять до дегідратації і гіперосмолярності. Розвиткову гіперосмолярного с-му сприяють крововтрати різного походження, в т.ч. при хірургічних втручаннях. Іноді ця кома виникає як ускладнення на фоні лікування діуретиками, ГК, імунодепресантами, введення великих кількостей сольових, гіпертонічних р-нів, манітолу, проведення гемодіалізу і перитонеального діалізу. Ці механізми посилюються на фоні введення глюкози, надмірного вживання вуглеводів.

Провідну роль у патогенезі гіперосмолярної коми відіграють клітинна дегідратація (церебральна й екстрацеребральна) внаслідок масивного осмотичного діурезу, що спричиняється високою гіперглікемією, а також

електролітні порушення. Гіперосмолярність поряд із високою гіперглікемією є головною характерною особливістю цього виду коми. В основі гіперосмолярності при ЦД лежить інсулінова недостатність, яка сприяє декомпенсації ЦД й наростанню глікемії. Фактори, що провокують дегідратацію, у поєднанні з гіперглікемією, й осмотичним діурезом утворюють порочне коло, яке призводить до прогресуючого згущення крові, накопичення осмотично активних речовин, клітинної дегідратації. Гіперосмолярності сприяє гіпернатріємія, яка розвивається у відповідь на підвищення секреції кортизолу, альдостерону, зниження каналцевої реабсорції води внаслідок зменшення секреції антидіуретичного гормону. Високий осмотичний діурез призводить до швидкого розвитку гіповолемії, дегідратації клітин і міжклітинного простору, судинного колапсу зі зниженням течії крові в органах і тканинах. Загальне обезводнення органів і тканин супроводиться дегідратацією головного мозку, зниженням лікворного тиску, розвитком внутрішньомозкових і субдуральних крововиливів. Те, що при гіперосмолярній комі немає кетозу, пояснюється передусім тим, що цей с-м розвивається, як правило, в осіб з 2-м типом ЦД з відносною інсуліновою недостатністю без схильності до кетозу. Невелика кількість ендogenous інсуліну, очевидно, достатня для пригнічення ліполізу й кетогенезу, тим більше, що ці процеси інгібуються дегідратацією, глибоким порушенням функції печінки, а також надмірно високою концентрацією глюкози в крові, що гальмує утворення кетонів тіл.

Клінічна картина гіперосмолярної коми розвивається поступово. Характерно, що при всій тяжкості клінічної симптоматики звичайно немає диспетичних проявів, характерних для кетоацидозу.

У клінічному статусі превалюють симптоми дегідратації: сухість слизових оболонок, запалі, м'які очні яблука, різке зниження м'язового тону. Хворий часто, поверхнево дихає. Стан його прогресивно погіршується, розвивається виражена дегідратація, падає АТ, настає тахікардія, нерідкі розлади серцевого ритму (миготлива тахіаритмія або екстрасистоля), значний на початку діурез швидко падає й розвивається анурія, поступово настає картина гіповолемічного шоку. Іноді буває пастозність або навіть набряк нижніх кінцівок, мошонки. Дуже характерні порушення неврологічного і психічного статусу. Свідомість сплутана від схильності до збудження до загальмованості й коми. На відміну від діабетичної коми глибокий розлад свідомості розвивається у термінальних стадіях або взагалі не настає. Часті гіперрефлексія або арефлексія, патологічні рефлекси, спастичний геміпарез або тетрапарез, парез черепно-мозкових нервів, дисфагія, вестибулярні порушення, менінгеальні знаки, епілептиформні судороги, анізокорія і квола реакція зіниць. Часто буває висока гарячка, зумовлена дегідратацією гіпоталамічних вегетативних утворів.

Кардинальними лабораторними ознаками гіперосмолярної коми є надзвичайно висока гіперглікемія – 35-55 ммоль/л, однак при тяжкій супровідній патології вона може бути нижчою (20-25 ммоль/л).

Інші специфічні симптоми – значна гіперосмолярність плазми (іноді до 400 мосм/л) і нормальна кетонемія, ацетону в сечі немає. Ці специфічні ознаки дають змогу без особливих труднощів поставити діагноз. Крім цих особливостей у більшості хворих буває гіпернатріємія (понад 140-150 ммоль/л), хоч іноді вміст натрію і крові може бути нормальним. Підвищені рівні хлору й сечовини в крові. Рівень бікарбонатів у крові й рН крові звичайно нормальні. Вміст калію в крові на перших етапах може бути підвищений, але під впливом терапії в міру зниження глікемії й настання ефекту розведення він може знизитись до гіпокаліємії. Ліпемія і вміст неестерифікованих жирних кислот у крові помірно підвищені. У сечі виявляють високу глюкозурію, реакція сечі на ацетон негативна або слабо позитивна. Гіперосмолярний с-м без кетонемії й ацетону в сечі, характерна клінічна картина, відсутність дихання Куссауля дають змогу діагностувати гіперосмолярну кому.

Основні принципи лікування гіперосмолярної коми подібні до принципів лікування при діабетичній комі і зводяться до регідратації та інсулінотерапії. Особливістю лікування при цій комі є те, що у зв'язку з вираженою гіперосмолярністю й гіпернатріємією (понад 145-150 ммоль/л) регідратацію на перших етапах лікування здійснюють не ізотонічним, а гіпотонічним (0,45% або 0,6%) р-ном натрію хлориду. Після зниження вмісту натрію в сироватці крові до 145 ммоль/л дегідратацію можна робити ізотонічним р-ном натрію хлориду. Надмірна вираженість дегідратації при гіперосмолярній комі потребує більшого введення загальної кількості рідини, ніж при кетоацидозі. Інсулінотерапію проводять переважно в режимі малих доз, беручи до уваги ту особливість гіперосмолярної коми, що їй у більшості випадків не характерна інсулінорезистентність. Основним принципом лікування при гіперосмолярній комі є своєчасна і адекватна регідратація і зниження осмолярності. Паралельно проводять профілактику гіпокаліємії в/в введенням калію так, як і при гіперкетонемічній комі. Здійснюють симптоматичну терапію, аналогічну заходам при діабетичній комі.

- **Натрію хлорид (Sodium chloride) *** (див. п. 10.5.5. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Інсулін (Insulin) ***
- **Глюкоза (Glucose) *** (див. п. 7.2. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Гепарин (Heparin) *** [тільки мазь та гель] (див. п. 13.8.1.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Антибактеріальні засоби**

7.9.2.3. Гіперлактацидемична кома

Гіперлактацидемична кома (гіперлактатацидемія, лактатацидоз) – с-м, не специфічний тільки для ЦД, він може розвиватись при ряді інших тяжких патологічних станів, коли створюються передумови для підвищеного утворення й накопичення в крові і тканинах лактатної кислоти. Цими передумовами є передусім захворювання, що супроводяться тканинною гіпоксією, яка посилює анаеробний гліколіз з надмірним утворенням і накопиченням у тканинах лактатної кислоти. СН, ДН і ниркова недостатність, захворювання печінки з порушенням її функції, нирок, крововтрата, сепсис, с-м тривалого здавлення можуть провокувати розвиток лактатацидозу.

При ЦД, особливо декомпенсованому, є механізми, зокрема гіпоксія й гепатоцелюлярна недостатність, які можуть змістити нормальний метаболізм лактатної кислоти в бік накопичення її в крові й тканинах. Інсулінова недостатність пригнічує піруватдегідрогеназу, яка каталізує перетворення піруватної кислоти до кінцевих продуктів, що супроводжується посиленням перетворенням пірувату в лактат.

Нормальне співвідношення концентрації лактат і піруват в сироватці крові (10:1) зміщується в бік лактату. Особливо небезпечним є таке порушення метаболізму у хворих, які приймають бігуаніди. На фоні приймання

бігуанідів (фенформіну) може розвиватись блокада утилізації лактату печінкою і м'язами, що веде до розвитку гіперлактатацидемії і тяжкого метаболічного ацидозу.

Гіперлактатацидемічна кома хоч і рідкий, проте дуже тяжкий стан, летальність при якому коливається від 50 до 90%. При ЦД трапляється переважно в осіб похилого віку, уражених тяжкими захворюваннями серця, легень, печінки, нирок. Розвивається зазвичай швидко, протягом кількох год. Провісників, як правило, немає, або вони не характерні. Хворий може відчувати м'язевий біль, біль за грудиною, диспептичні явища, прискорене дихання, апатія, сонливість або безсоння. Проте на фоні загального тяжкого стану цих хворих, зумовленого наявною у них патологією, ці симптоми залишаються непоміченими. Стан прогресивно погіршується, в міру наростання ацидозу може з'являтися біль у животі, посилюється блювання. Спостерігається поліморфна неврологічна симптоматика від арефлексії до спастичних парезів і гіперкінезів. У зв'язку з тим, що лактатацидоз супроводжується вираженим метаболічним ацидозом, у хворих перед розвитком повної коми настає гучне дихання КуССмауля. Зазвичай має місце брадикардія або брадиаритмія, рідше виражена тахікардія, гіпотензія, розвивається колапс з оліго-, а потім анурією, гіпотермією. На цьому фоні прогресує ДВЗ-с-м, нерідкі внутрішньосудинні тромбози з геморагічними некрозами пальців рук і ніг.

Діагноз лактатної коми ставлять на підставі клінічної картини тяжкого метаболічного ацидозу без кетозу й вираженої гіперглікемії з гіперлактатацидемією і підвищенням відношення лактат/піруват. Різко знижений вміст гідрокарбонатних іонів без гіперкетонемії і кетонурії, буває спад рН крові нижче 7,3. Виявляють гіперазотемію, гіперліпідемію. При дослідженні сечі визначають аглюкозурію, ацетону в сечі не має.

Провідне значення в терапії лактатацидозу мають заходи щодо усунення ацидозу. Паралельно роблять корекцію інших метаболічних розладів, борються з шоком, анемією, гіпоксією. В/в краплинно вводять 2,5% р-н натрію гідрокарбонату в кількості 1-2 л/добу (1 л вводять протягом 3 год). У разі крайніх ступенів ацидозу (рН крові 7-6,8) вводять в/в струминно повільно 45-50 мл 8,4% р-ну гідрокарбонату. Усуненню ацидозу сприяє метиленовий синій, що зв'язує іони водню, який вводять в/в краплинно в кількості 50-100 мл 1% р-ну (з розрахунку 1-5 мг/кг маси тіла). Для боротьби з ацидозом використовують також трисамін (трис-буфер, триоксиметаламінметан).

Трисамін діє швидше, ніж бікарбонат, тому його доцільно вводити на початку лікування при різко зниженому рН крові, особливо у хворих з вираженою СН. Як допоміжний захід переливають кров, плазмозамінні р-ни, вводять гідрокортизон (до 250-500 мг). Пресорні агенти неефективні, а катехоламіни протипоказані, оскільки посилюють накопичення лактату в тканинах. Інсулінотерапію проводять малими дозами, у поєднанні з 5% глюкозою у зв'язку з невисокими рівнями глікемії. У тяжких випадках, при рівнях рН крові 7 і нижче, показане застосування перитонеального діалізу або гемодіалізу з безлактатним діалізатом.

- **Гемодіаліз**
- **Натрію бікарбонат (Sodium bicarbonate)** (див. п. 7.9.2.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Інсулін (Insulin)** *
- **Глюкоза (Glucose)** * (див. п. 7.2. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Антибіотикотерапія**
- **Глюкокортикоїди**
- **Протишокова терапія**

7.9.3. Кома при гострій недостатності наднирникових залоз

Г. недостатності наднирникових залоз (г. недостатності кори наднирникових залоз) – ургентний клінічний с-м, який розвивається внаслідок раптового та значного зниження функціональної активності коркового шару наднирникових залоз (супроводжується виразним зниженням вмісту у крові глюко- та мінералкортикоїдів).

Г. недостатності наднирникових залоз (ГННЗ) виникає як первинно-гостра недостатність наднирникових залоз або як декомпенсація хр. недостатності наднирникових залоз (ХННЗ).

Розрізняють наступні причини розвитку ГННЗ:

- декомпенсація ХННЗ;
- с-м відміни глюкокортикостероїдів при довготривалій терапії;
- первинно-гостра недостатність наднирникових залоз:

а) двобічний крововилив у наднирники при менінгококцемії (с-м Уотерхауса-Фредеріксена), при порушеннях системи згортання крові;

б) адреналектомія.

- г. гіпофізарна недостатність;
- декомпенсація уродженої дисфункції кори наднирникових залоз;
- застосування ЛЗ, що пригнічують утворення кортикостероїдів (мітотан, кетоконазол) або таких, що прискорюють їх метаболізм (фенітоїн, рифампіцин).

Принципи ведення хворих з г. недостатністю наднирникових залоз:

- невідкладна масивна замісна терапія препаратами гормонів кори наднирникових залоз;
- регідратація хворих та корекція електrolітних порушень (р-ни декстрози, сольові р-ни);
- етіотропна та симптоматична терапія (при лихоманці, за виключенням станів зневоднення, антибіотикотерапія).

Лікування починають невідкладно, не очікуючи результатів лабораторних тестів (при можливості проводять попереднє визначення у крові концентрацій кортизолу, кортикотропіну, електrolітів, біохімічні, клінічні аналізи), з в/в введення р-нів натрію хлориду та декстрози. Натрію хлорид, 0,9% р-н, вводять крапельно зі швидкістю 500 мл/год, під контролем показника гематокриту, гемодинамічних параметрів, загального стану хворого (у випадках колаптоїдних станів р-н вводять струменево) до 2000 – 3000 мл/добу. Глюкоза, 5-10% р-н, вводиться в/в крапельно, 500-1000 мл/добу. **Протипоказано введення калійвмісних, гіпотонічних р-нів, діуретиків.**

Також невідкладно починають в/в введення гідрокортизону по 100 мг 4-6 р/добу. У подальшому, при наявності позитивної динаміки (стабілізація гемодинамічних показників) доза препарату зменшується до 150-200 мг/добу (при стабільних показниках гемодинаміки вводиться в/м орієнтовно по 75 мг ранком, 50 мг вдень, 25 мг ввечері) протягом 2-ї та 3-ї доби. У подальшому доза гідрокортизону складає 30 мг/добу (20 мг та 10 мг).

Паралельно з лікуванням контролюють показники гематокриту, електролітів, вмісту глюкози у крові, гемодинамічні параметри (ЧСС, АТ), частоту дихання, аускультативну картину легень.

8. РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

- 8.1. Лікарські засоби для лікування м'язево-скелетних захворювань суглобів
- 8.2. Імуносупресанти
- 8.3. Структурні аналоги фолієвої кислоти
- 8.4. Алкілюючі сполуки
- 8.5. Протималарійні лікарські засоби
- 8.6. Біологічні агенти
 - 8.6.1. Інгібітори фактору некрозу пухлин α (ФНП- α)
 - 8.6.2. Анти-CD-20-агенти
 - 8.6.3. Інгібітори інтерлейкіну
- 8.7. Засоби, що впливають на опорно-руховий апарат
 - 8.7.1. Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби
 - 8.7.1.1. Похідні оцтової кислоти та споріднені сполуки
 - 8.7.1.2. Похідні пропіонової кислоти
 - 8.7.1.3. Оксиками
 - 8.7.1.4. Фенамати (препарати мефенамінової кислоти)
 - 8.7.1.5. Коксиби
 - 8.7.1.6. Інші нестероїдні протизапальні/протиревматичні засоби
 - 8.7.1.7. Специфічні протиревматичні засоби
 - 8.7.1.8. Інші лікарські засоби для лікування м'язево-скелетної системи
 - 8.7.2. Засоби, що застосовуються для лікування подагри
 - 8.7.3. Засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток
 - 8.7.3.1. Бісфосфонати
 - 8.7.3.2. Інші лікарські засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток
 - 8.7.3.3. Препарати вітаміну Д
 - 8.7.3.4. Препарати кальцію
 - 8.7.3.5. Препарати кальцитоніну
 - 8.7.4. Інші засоби, які застосовуються для лікування опорно-рухового апарату
- 8.8. Анальгетики
 - 8.8.1. Опіоїди
 - 8.8.2. Інші анальгетики та антипіретики
- 8.9. Глюкокортикоїди для системного та локального застосування
- 8.10. Міорелаксанти
 - 8.10.1. Міорелаксанти з центральним механізмом дії
 - 8.10.2. Інші міорелаксанти центральної дії

8.1. Лікарські засоби для лікування м'язево-скелетних захворювань суглобів

- Сульфасалазин (*Sulfasalazine*) * ^[ПМД] (див. п. 3.13.1. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: лікування пацієнтів з РА ^{ПМД} ^{вооз} ^{БНФ}, у яких саліцилати або НПЗП були недостатньо ефективні (недостатня терапевтична ефективність або непереносимість при відповідному прийомі повних доз одного або більше НПЗП); лікування ЮРА ^{БНФ} з поліартритичним с-мом у випадках, коли саліцилати або інші НПЗП були недостатньо ефективні.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: РА ^{ПМД} ^{вооз} ^{БНФ} дорослі: 2 г/добу ^{вооз} ^{БНФ} у двох рівних дозах; починати терапію нижчими дозами, 0,5 ^{вооз} ^{БНФ} -1 г /добу для зменшення можливої непереносимості з боку ШКТ; може бути розглянута можливість підвищення добової дози препарату до 3 г ^{вооз} ^{БНФ}, якщо клінічна ефективність ч/з 12 тижнів є недостатньою; рекомендується ретельне спостереження за пацієнтом при застосуванні дози понад 2 г /добу; режим дозування при РА у дорослих: 1тижд.- 500мг 1р/д, 2тижд. - 500мг 2р/д, 3 тижд.-500мг/зранку

1000мг/вечері, 4тижд. - 1000мг 2р/д^{ВООЗ БНФ}; ЮРА^{БНФ} з поліартритичним с-мом: не рекомендований дітям, для яких разова доза, розрахована, виходячи з їх маси тіла, становить < 500 мг; діти від 6 років: 30-50 мг/кг маси тіла/добу, розподілені на 2 рівні дози, максимальна доза становить 2 г/добу, розпочинати з чверті або третини запланованої підтримуючої дози та підвищувати її кожного тижня до досягнення підтримуючої дози ч/з один місяць

8.2. Імуносупресанти

- **Азатиоприн (Azathioprine)** * ^[ПМД] (див. п. 18.2.3. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: монотерапія або у комбінації з кортикостероїдами та/або іншими препаратами (що може включати зменшення дози або відміну кортикостероїдів) при тяжкому перебігу РА^{ВООЗ, БНФ, ПМД}, СЧВ^{БНФ}, дерматоміозиті та поліміозиті^{БНФ}; вузликовому поліартеріїті, хр. рефрактерній ідіопатичній тромбоцитопенічній пурпурі.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: початкова доза 1-3 мг/кг маси тіла на добу і повинна уточнюватись у цих межах залежно від клінічної відповіді^{БНФ} (яка проявляється через тижні або місяці лікування) та гематологічної толерантності; при появі терапевтичного ефекту підтримуюча доза зменшується до рівня, при якому цей терапевтичний ефект підтримується; при відсутності терапевтичного ефекту через 3 міс. лікування переглянути доцільність призначення; підтримуюча доза може бути у межах від менше 1 мг/кг маси тіла до 3 мг/кг маси тіла на добу^{БНФ}, залежно від клінічного стану та індивідуальної відповіді пацієнта, включаючи гематологічну толерантність.

- **Лефлуномід (Leflunomide)** ^[ПМД] (див. п. 18.2.3. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: лікування хворобо-модифікуючим антиревматичним ЛЗ активної фази РА у дорослих пацієнтів, лікування активної фази псоріатичного артриту у дорослих^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: повинен призначати і контролювати лікар з досвідом лікування РА і псоріатичного артриту; РА: доза насичення - 100мг 1 р/день протягом 3 днів, підтримуюча доза - 10-20мг 1 р/добу^{БНФ}, доза може бути зменшена до 10мг 1 р/добу; псоріатичний артрит: доза насичення - 100мг 1 р/день протягом 3 днів, підтримуюча доза - 20 мг 1 р/добу^{БНФ}; терапевтичний ефект виявляється через 4-6 тижн. від початку лікування і може посилюватись протягом 4-6 міс.

- **Циклоспорин (Cyclosporin)** * ^[ПМД] (див. п. 18.2.2. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: тяжкі форми активного РА^{ПМД, БНФ}, тяжкі форми псоріазу, коли стандартне лікування виявилось неефективним або неприйнятним, атопічний дерматит^{БНФ}, тяжкі форми при необхідності системної терапії

Спосіб застосування та дози ЛЗ: РА: ^{БНФ} протягом перших 6 тижнів лікування рекомендована доза - 3 мг/кг/добу внутрішньо, розподілена на 2 прийоми, у разі недостатнього ефекту добову дозу можна поступово збільшити, якщо дозволяє переносимість, але не перевищуючи 5 мг/кг/добу, для досягнення максимальної ефективності лікування препаратом можна продовжувати до 12 тижнів, для підтримуючої терапії дозу слід титрувати індивідуально до досягнення найнижчої ефективної у межах переносимості; псоріаз: для індукції ремісії початкова доза становить 2,5 мг/кг/добу, розподілена на 2 прийоми^{БНФ}; якщо ч/з 1 міс. лікування не спостерігається покращення, дозу поступово збільшити максимум до 5 мг/кг/добу; лікування необхідно відмінити, якщо протягом одного міс. щоденного прийому 5 мг/кг/добу не досягнуто достатньої відповіді або якщо ефективна доза не сумісна зі встановленими рекомендаціями з безпеки; для підтримуючої терапії дозу потрібно підбирати індивідуально, на мінімальному ефективному рівні, і вона не повинна перевищувати 5 мг/кг/добу; атопічний дерматит: для дорослих та підлітків віком від 16 років рекомендована доза становить 2,5 - 5 мг/кг/добу, яку розподіляють на 2 прийоми^{БНФ}, якщо у пацієнтів з атопічним дерматитом не спостерігається достатнє покращення після 1 міс. застосування, лікування необхідно припинити; рекомендована тривалість індивідуальних циклів лікування - не більше 8 тижнів

8.3. Структурні аналоги фолієвої кислоти

- **Метотрексат (Methotrexate)** * ^[ПМД] (див. п. 19.1.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")

Показання для застосування ЛЗ: тяжкі форми псоріазу, тяжкі випадки РА^{БНФ, ВООЗ, ПМД}; поширений хр. псоріаз, особливо у пацієнтів літнього віку та інвалідів, у разі недостатньої ефективності інших видів терапії

Спосіб застосування та дози ЛЗ: РА: рекомендована початкова доза - 7,5 мг 1 р/тижд^{ВООЗ БНФ} р/ос та 10 мг 1 р/тиждень в/в чи в/м, терапевтичний ефект виявляється після 4-8 тижнів терапії, залежно від особливостей перебігу хвороби та переносимості, дозу можна поступово збільшувати на 2,5 мг/тижд.; оптимальна тижнева доза становить 7,5-15 мг; не перевищувати максимальну дозу 25 мг/тижд^{БНФ} (табл. - 20 мг/тижд.); якщо після 8 тижнів лікування у максимальній дозі ефекту немає, метотрексат відмінити; у разі досягнення бажаного терапевтичного ефекту лікування продовжують у мінімально можливій ефективній підтримувальній дозі; оптимальна тривалість терапії метотрексатом поки що не визначена, попередні дані свідчать про збереження початкового ефекту щонайменше протягом 2 років у разі продовження підтримуючої терапії; після припинення лікування метотрексатом симптоми хвороби можуть повертатися ч/з 3-6 тижнів; псоріаз: р-н д/ін'єкц. - рекомендується пробне парентеральне введення 5-10 мг за 1 тижд. до початку терапії з метою виявлення ідіосинкразійних небажаних ефектів, рекомендована початкова доза - 10-25 мг 1 р/тижд. в/м або в/в; дозу можна поступово збільшувати, терапевтичний ефект виявляється після 4 тижнів лікування; у разі досягнення бажаного терапевтичного ефекту лікування продовжують у мінімально можливій ефективній підтримувальній дозі; табл. - 7,5 мг на тиждень одноразово або 3 рази по 2,5 мг з інтервалами 12 годин

8.4. Алкілюючі сполуки

- **Циклофосфамід (Cyclophosphamide)** * (див. п. 19.1.1. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")

Показання для застосування ЛЗ: аутоімунні захворювання з небезпечним для життя прогресуванням: тяжкі прогресуючі форми вовчакового нефриту та грануломатозу Вегенера^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: тяжкі прогресуючі форми люпус-нефриту, гранулематозу Вегенера: дозування при в/в введенні, початкова доза 500-1000 мг/м² ППТ в/в; для щоденного застосування - 1-2 мг/кг МТ (2 мг/кг при грануломатозі Вегенера), для пероральної пульс-терапії дотримуватися таких же рекомендацій з дозування, що й для відповідного в/в застосування препарату (спочатку 500–1000 мг/м² ППТ).

8.5. Протималярійні лікарські засоби

- **Гідроксихлорохін (Hydroxychloroquine)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: P01BA02 - Антипаразитарні лікарські засоби. Антималярійні засоби. Амінохіноліни. Гідроксихлорохін

Основна фармакотерапевтична дія: ефекти включають взаємодію із сульфгідрильними групами, зміну активності ферментів (у тому числі фосфоліпази, НАДН-цитохром С-редуктази, холінестерази, протеаз і гідролаз); зв'язування з ДНК; стабілізацію лізосомальних мембран; інгібування вироблення простагландину; інгібування хемотаксису і фагоцитозу поліморфноядерних клітин; можливе втручання у синтез моноцитами інтерлейкіну 1 та інгібування вивільнення нейтрофілами супероксиду.

Показання для застосування ЛЗ: СЧВ; дискіодний червоний вовчак^{БНФ}; ЮРА; РА^{БНФ, ПМД}, дерматологічні захворювання, причиною виникнення або погіршення перебігу яких є дія сонячного світла^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначений для р/ос застосування, кожну дозу приймати під час їжі або запиваючи склянкою молока, має кумулятивну дію, для досягнення терапевтичного ефекту потрібно кілька тижнів, незначні побічні ефекти можуть виникати відносно рано; якщо при лікуванні ревматичного захворювання стан хворого не покращується упродовж 6 міс., препарат відмінити; дорослі та пацієнти літнього віку: застосовувати мінімальну ефективну дозу, яка не перевищує 6,5 мг/кг маси тіла (у розрахунку на ідеальну, а не фактичну масу тіла хворого) на добу, та становить або 200 мг, або 400 мг/добу^{БНФ}; діти: застосовувати мінімальну ефективну дозу, яка не перевищує 6,5 мг/кг ідеальної маси тіла на добу^{БНФ}, не можна застосовувати для лікування дітей з ідеальною масою тіла < 31 кг; при хворобах, пов'язаних із підвищеною чутливістю до світла, лікування проводити тільки під час періодів максимальної інсоляції.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ретинопатія зі зміною пігментації та появою дефектів поля зору, макулопатії та макулярна дегенерація, які можуть бути необоротними; зміни рогівки, включаючи набряк і помутніння (поява ореолів, нечіткість зору чи фотофобія), парацентральної чи периферичної кільцеподібної скотоми, скроневі скотоми або порушення сприйняття кольорів; нечіткість зору може бути спричинена порушенням акомодатії (дозозалежна, оборотна); шкірні висипання; свербіж, зміни пігментації шкіри та слизових оболонок, знебарвлення волосся та алопеція, бульозні висипання, включаючи поодинокі випадки мультиформної еритеми, с-му Стівенса-Джонсона, токсичного епідермального некролізу, еозинофілія, системні симптоми (синдром DRESS), фоточутливість, ексклзивний дерматит, г. генералізовані екзантематозні пустульозні висипання, загострення псоріазу, підвищення t° та гіперлейкоцитоз; нудота, діарея, відсутність апетиту, абдомінальний біль, блювання; запаморочення, вертиго, шум у вухах, втрата слуху, головний біль, афективна лабільність, нервозність, психоз, суїцидальна поведінка, судоми, екстрапірамідальні розлади (дистонія, дискінезія, тремор), міопатія скелетних м'язів або нейроміопатія, що призводять до прогресуючої слабкості та атрофії проксимальних груп м'язів, пригнічення сухожильного рефлексу та аномальна нервова провідність, сенсорно-моторні розлади; подовження інтервалу QT, аритмія (torsade de pointes, шлуночкова тахікардія) кардіоміопатія, СН, у деяких випадках з летальним наслідком, порушення провідності (блокада пучка Гіса/AV-блокада), а також гіпертрофія обох шлуночків; пригнічення ф-ції червоного кісткового мозку, анемія, апластична анемія, агранулоцитоз, лейкопенія та тромбоцитопенія, загострення або погіршення перебігу порфірії; зміни показників функціональних проб печінки, гіпоглікемія, фульмінантна ПН; кропив'янка, ангіоневротичний набряк, бронхоспазм.

Протипоказання до застосування ЛЗ: відома гіперчутливість до похідних 4-амінохіноліну; макулопатія, яка діагностована до початку лікування; Вік менше 6 років (таблетки по 200 мг неприйнятні до застосування пацієнтам з масою тіла < 35 кг) або ідеальна маса тіла < 31 кг.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,516 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ПЛАКВЕНІЛ®	САНОФІ-АВЕНТІС С.А., Іспанія	таб., вкриті п/о у бл.	200 мг	№15x4, №10x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	

8.6. Біологічні агенти

8.6.1. Інгібітори фактору некрозу пухлин α (ФНП-α)

- **Адалімуаб (Adalimumab)** (див. п. 3.13.3. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: L04AB04 - Імуносупресанти. Інгібітори фактора некрозу пухлини-альфа. Адалімуаб.

Основна фармакотерапевтична дія: це рекомбінантний імуноглобулін (IgG1) людини, моноклональне антитіло, що містить тільки пептидні послідовності людини; створений за технологією фагового відображення, яке дозволило отримати характерні тільки для людини варіабельні ділянки тяжких та легких ланцюгів, які проявляють свою специфічність по щодо фактора некрозу пухлин (ФНП), а також важкий ланцюг IgG1 людини та послідовність легких ланцюгів каппа-типу; зв'язується з високим ступенем спорідненості та специфічністю з розчинним ФНП-α, але не з лімфотоксином (ФНП-β); специфічно зв'язується з ФНП та нейтралізує біологічні

ефекти ФНП, блокуючи його взаємодію з p55 та p75 рецепторами ФНП на поверхні клітини; модулює біологічні реакції відповіді, що індукуються або регулюються ФНП, включаючи зміни рівнів молекул адгезії, відповідальних за міграцію лейкоцитів (ELAM-1, VCAM-1 та ICAM-1 при IC₅₀ 1-2 x 10⁻¹⁰ M).

Показання для застосування ЛЗ: РА: у комбінації з метотрексатом для лікування РА середнього та високого ст. активності у дорослих пацієнтів, коли адекватна відповідь на терапію протиревматичними ЛЗ, що модифікують перебіг захворювання, включаючи метотрексат, не була отримана; лікування активного прогресуючого РА високого ст. активності у дорослих пацієнтів, які раніше не отримували терапію метотрексатом; можна застосовувати як монотерапію у випадку непереносимості метотрексату, або коли продовження терапії метотрексатом є неприйнятним; активний та прогресуючий псоріатичний артрит у дорослих пацієнтів, коли не була отримана адекватна відповідь на попередню терапію протиревматичними ЛЗ, що модифікують перебіг захворювання; лікування дорослих пацієнтів з високим ступенем активності анкілозуючого спондиліту, які не отримали адекватну відповідь на традиційну терапію; лікування дорослих пацієнтів з високим ст. активності аксіального спондилоартриту (АС) без рентгенологічного підтвердження АС, але з наявними ознаками запалення, на підставі підвищеного рівня СРП та/або за результатами МРТ; ЮРА: у комбінації з метотрексатом для лікування активного поліартикулярного артриту у дітей віком від 2 років, які не отримали адекватну відповідь на терапію одним або кількома протиревматичними препаратами, що модифікують перебіг захворювання; у монотерапії у випадку непереносимості метотрексату або коли продовження терапії метотрексатом є неприйнятним^{БНФ}; бляшковий псоріаз (БП) у дітей^{БНФ} віком від 4 років та дорослих^{БНФ}, у яких не отримано клінічної відповіді або є протипоказання/ непереносимість місцевої терапії або фототерапії; лікування активного ентезит-асоційованого артриту у дітей^{БНФ} віком від 6 років, які не відповідали на традиційну терапію, або при наявності непереносимості чи медичних протипоказань до таких видів терапії; лікування активного помірного та важкого гнійного гідраденіту^{БНФ} (acne inversa) у дорослих та підлітків віком від 12 років, які не відповідали на традиційну системну терапію ГГ; лікування хронічного неінфекційного переднього увеїту^{БНФ} у дітей віком від 2 років, неінфекційного інтермедіарного, заднього та панувеїту у дорослих^{БНФ}, які не відповідали або мали непереносимість традиційної терапії або яким традиційна терапія протипоказана.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: РА: дорослим 40 мг 1 р/2 тижн., п/ш; під час терапії продовжувати застосовувати метотрексат, можна продовжувати терапію ГК, саліцилатами, НПЗЗ, аналгетиками; у деяких хворих, які не застосовують метотрексат, можна збільшити частоту введення до 40 мг 1 р/1 тижд., п/ш; аксіальний спондилоартрит (анкілозуючий спондиліт та аксіальний спондилоартрит без рентгенологічного підтвердження АС) та псоріатичний артрит: дорослим 40 мг 1 р/2 тиж, п/ш; клінічна відповідь досягається протягом 12 тиж. лікування, переглянути необхідність продовження терапії у пацієнтів, у яких протягом вказаного терміну не спостерігається відповіді на лікування; бляшковий псоріаз: рекомендована початкова доза для дорослих 80 мг, ч/з 1 тижд. застосовувати 40 мг п/ш; підтримуюча терапія - 40 мг 1 р/2 тижд., п/ш; у деяких пацієнтів може бути ефективним підвищення частоти введення дози до 40 мг 1 р/тиж., переглянути необхідність продовження для пацієнтів, у яких не спостерігається клінічної відповіді після підвищення частоти введення ЛЗ; рекомендована доза для дітей віком від 4 до 17 років з масою тіла від 15 кг до 30 кг - початкова доза 20 мг на тижні 0, потім 20 мг 1 р/2 тижн. починаючи з тижня 1, від 30 кг - початкова доза 40 мг на тижні 0, потім 40 мг 1 р/2 тижн. починаючи з тижня 1; гнійний гідраденіт: дорослі - 160 мг початково на тижні 0 (день 1), дозу можна вводити 4 р/добу в один день або 2р/добу протягом 2 днів поспіль, потім 80 мг через 2 тижні (день 15), дозу вводити 2р/добу в один день, через 2 тижні (день 29) - 40 мг 1 р/тиж., діти від 12 років та масою тіла не менше 30 кг - рекомендована доза становить 80 мг початково на тижні 0, потім 40 мг 1 р/2 тиж., починаючи з тижня 1, п/ш, можливе підвищення частоти застосування дози 40 мг до 1 р/тиж., переглянути необхідність продовження терапії понад 12 тижнів для пацієнтів, у яких у межах цього терміну не спостерігається клінічної відповіді; увеїт: дорослі - 80 мг, починаючи з 1-го тижня після початкової дози необхідно перейти до підтримуючої терапії - 40 мг 1 р/2 тиж п/ш, діти від 2 років у комбінації з метотрексатом і вагою до 30 кг - 20 мг 1 р/2тиж., від 30 кг - 40 мг 1 р/2тиж., початкова навантажувальна доза для пацієнтів від 6 років і масою тіла до 30 кг - 40 мг, з масою тіла 30 кг і більше - 80 мг, її можна ввести за тиждень до початку підтримуючої терапії; ЮРА: поліартикулярний ювенільний ревматоїдний (ідіопатичний) артрит у дітей віком від 2 років: застосовують 1 р/2 тижн. п/ш: від 10 кг до 30 кг - 20 мг 1 р/2 тижн., 30 кг та більше - 40 мг 1 р/2 тижн., ентезит-асоційований артрит у дітей віком від 6 років - 1 р/2 тижн. п/ш, від 15 кг до 30 кг - 20 мг 1 р/2 тижн., від 30 кг - 40 мг 1 р/2 тижн.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: зниження опірності організму до інфекцій та злоскісних новоутворень, інфекції дихальних шляхів (інфекції НДШ та ВДШ, пневмонія, синусит, фарингіт, ринофарингіт, пневмонія, спричинена вірусом герпесу); системні інфекції (сепсис, кандидоз та грип), кишкові інфекції (вірусний гастроентерит), інфекції шкіри та м'яких тканин (пароніхія, целюліт, імпетиго, некротичний фасциїт, оперізуючий герпес), інфекції вуха, інфекції ротової порожнини (вірус простого герпесу, герпес ротової порожнини та інфекції зубів), інфекції статевих органів (грибковий вульвовагініт), ІСШ (пієлонефрит), грибкові інфекції, інфекції суглобів; реактивація гепатиту В, лейкоз, карцинома Меркеля (нейроендокринна карцинома шкіри), саркоїдоз; васкуліт; опортуністичні інфекції (кокцидіодомікоз, гістоплазмоз та інфекції *Mycobacterium avium* комплексу, дисемінований гістоплазмоз, пневмоцистна пневмонія, аспергільоз, лістеріоз); дивертикуліт; туберкульоз (в т.ч. міліарний та позалегенової локалізації), неврологічні інфекції (вірусний менінгіт), інфекції ока, бактеріальні інфекції; доброякісні новоутворення, рак шкіри, за винятком меланоми (включаючи базально-клітинну карциному та плоскоклітинну карциному); лімфома, гепатолієнальна Т-клітинна лімфома, новоутворення паренхіматозних органів (рак молочної залози, пухлина легенів та пухлина щитовидної залози), меланома, лейкопенія (нейтропенія та агранулоцитоз), анемія, апластична анемія; тромбоцитопенія, лейкоцитоз; ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура; панцитопенія; гіперчутливість, алергія (в т.ч. сезонна), с-м Стівенса-Джонсона, шкірний васкуліт, анафілаксія, ангіоневротичний набряк, псоріаз (в т.ч. долонно-підшовний пустульозний), мультиформна еритема, алопеція, погіршення сим-мів дерматоміозиту, ліхеноїдна реакція шкіри; випадки центральних та периферичних демієлінізуючих розладів (неврит зорового нерва, с-м Гійєна-Барре); підвищення рівня ліпідів крові; гіпокаліємія, гіперурикемія, відхилення від норми концентрації натрію у плазмі крові, гіпокальціємія, гіперглікемія, гіпофосфатемія, дегідратація, зміни настрою (депресія), тривога, безсоння, головний біль, парестезія (гіпестезія), мігрень, стиснення нервових корінців; тремор, невротія; розсіяний склероз;

порушення гостроти зору, кон'юнктивіт, блефарит, набряк ока; диплопія; вертиго; глухота, дзвін у вухах; тахікардія; аритмія, хр. СН; зупинка серця, ІМ; АГ, припливи, гематома, інсульт; оклюзія артерій, тромбоз, аневризма аорти; кашель, астма, диспное; ХОЗЛ, інтерстиціальне захворювання легенів, пневмоніт, легенева емболія, плевральний випіт, легеневий фіброз; біль у животі, нудота та блювання; шлунково-кишкова кровотеча, перфорація кишечника, диспепсія, ГЕРХ, сухий с-м (с-м Шегрена); панкреатит, дисфагія, набряк обличчя; підвищення рівня печінкових ферментів, гепатит (в т. ч. аутоімунний); холецистит та холелітаз, підвищення рівня білірубіну, стеатоз печінки, ПН; висип (включаючи ексфолювативний висип); свербіж, кропив'янка, екхімози (пурпура), дерматит (екзема), оніхоклазія, підвищена пітливість; нічна пітливість, рубці; скелетно-м'язовий біль; спазми м'язів (підвищення рівня креатинфосфокінази у плазмі крові); рабдоміоліз, СЧВ; гематурія, НН; ніктурія; ерекційна дисфункція; р-ції у місці введення (почервоніння, геморагії, біль або набряк); біль у грудях, набряк; запалення; коагуляція та порушення системи згортання крові (подовження активованого частково тромбoplastинового часу (АЧТЧ)), позитивні тести на аутоантитіла (в т. ч. антитіла до дволанцюгової ДНК), підвищення рівня лактатдегідрогенази у плазмі крові; повільне загоювання, пірексія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до адалімумабу або до будь-якого іншого компонента препарату; активний туберкульоз або інші тяжкі інфекції (сепсис та опортуністичні інфекції); помірна та тяжка СН (III/IV клас за NYHA).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 2,9 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ХАЙРІМОЗ (HYRIMOZ)	Сандоз ГмбХ Шафтенау (випуск серії, контр./випроб. серії)/Сандоз ГмбХ Кундль (контр./випроб. серії)/ Майлан Лабораторізі Лтд. (вир-во in bulk, контр./випроб. серії, перв. пак.)/ Кук Фарміка ЛПС (вир-во in bulk, контроль, Австрія/Індія/США/Словенія/Німеччина/Швейцарія	р-н д/ін'ек. у шпр. та шпр.-руч. по 0,8 мл у пач.	40мг/0,8мл	№1x1, №2x1, №2x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ХАЙРІМОЗ 40	Новартіс Фарма Штайн АГ (контр. (хім./фіз.))/Новартіс Фарма АГ (контр. серії (біолог.))/Лек д.д., ПЕ Виробництво Менгеш (контроль серії (біолог.))/СИНЛАБ Аналітикс енд Сервісис Швейцарія АГ (контр. серії (біолог.))/Сандоз ГмбХ - , Швейцарія/Словенія/ Австрія/Німеччина	р-н д/ін'ек. у шпр. по 0,8мл у бл. в кор.	40мг/0,8мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ХАЙРІМОЗ 40	Новартіс Фарма Штайн АГ (контр. (хім./фіз.))/Новартіс Фарма АГ (контр. серії (біолог.))/Лек д.д., ПЕ Виробництво Менгеш (контроль серії (біолог.))/СИНЛАБ Аналітикс енд Сервісис Швейцарія АГ (контр. серії (біолог.))/Сандоз ГмбХ - , Швейцарія/Словенія/ Австрія/Німеччина	р-н д/ін'ек. у шпр. по 0,8мл у бл. в кор.	40мг/0,8мл	№2	455,99	27,69/\$
	ХАЙРІМОЗ 40 МГ	Сандоз ГмбХ- Виробнича дільниця Асептичні Лікарські Засоби Шафтенау (Асептичні ЛЗШ) (випуск серії, вир-во in bulk, контр./випроб. серії, перв. та втор. пак.)/Сандоз ГмбХ - Виробнича дільниця Біотехнологічні Лікарські Субстанції Кунд, Австрія/Індія/США/Словенія/Німеччина/ Швейцарія	р-н д/ін'ек. у шпр. по 0,8мл у кор.	40мг/0,8мл	№1, №2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ХУМІРА®	Веттер Фарма-Фертігунг ГмбХ і Ко. КГ (лікарська форма, перв. втор. пак.)/Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко. КГ (тестування)/Еббві Біотекнолоджі ГмбХ (випуск серії), Німеччина	р-н д/ін'ек. у однодоз. шпр. по 0,8мл з 1серв. у конт. чар/уп. в кор.	40мг/0,8мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

ХУМІРА®	Веттер Фарма-Фертігунг ГмбХ і Ко. КГ (лікарська форма, перв. втор. пак.)/Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко. КГ (тестування)/Еббві Біотекнолоджі ГмбХ (випуск серії), Німеччина	р-н д/ін'єк. у однодоз. шпр. по 0,8мл з 1серв. у конт. чар/уп. в кор.	40мг/0,8мл	№2	506,63	25,08/\$
ХУМІРА®	Веттер Фарма-Фертігунг ГмбХ і Ко. КГ (лікарська форма, перв. втор. пак.)/Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко. КГ (тестування)/Еббві Біотекнолоджі ГмбХ (випуск серії), Німеччина	р-н д/ін'єк. у фл. по 0,8мл (набір: 1фл., 1шпр., 1гол., 1адапт. д/фл., 2серв.) в кор.	40мг/0,8мл	№2	506,63	25,08/\$
ХУМІРА®	Веттер Фарма-Фертігунг ГмбХ і Ко. КГ (лікарська форма, перв. втор. пак.)/Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко. КГ (тестування)/Еббві Біотекнолоджі ГмбХ (випуск серії), Німеччина	р-н д/ін'єк. у однодоз. шпр. по 0,2мл з серв. в конт. чар/уп. в кор.	20мг/0,2мл	№2	506,65	25,08/\$
ХУМІРА®	Веттер Фарма-Фертігунг ГмбХ і Ко. КГ (лікарська форма, перв. втор. пак.)/Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко. КГ (тестування)/Еббві Біотекнолоджі ГмбХ (випуск серії), Німеччина	р-н д/ін'єк. у однодоз. шпр. по 0,4мл з серв. в конт. чар/уп. в кор.	40мг/0,4мл	№2	506,63	25,08/\$

- **Інфліксимаб (Infliximab)** (див. п. 18.2.4. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: РА^{БНФ} в активній формі, для послаблення симптомів, а також з метою поліпшення фізичної функціональності, при яких відповідна р-ція організму на базові протиревматичні препарати, що модифікують перебіг хвороби (DMARDs), є неадекватною; із захворюваннями в тяжкій, активній або прогресуючій формі, яким раніше не проводилось лікування метотрексатом або іншими базовими протиревматичними препаратами, що модифікують перебіг хвороби (DMARDs); анкілозуючий спондилоартрит в активній та прогресуючій формах^{БНФ}; псоріатичний артрит^{БНФ} в активній та прогресуючій формах, псоріаз^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: пацієнтам з РА^{БНФ}, які розпочинають лікування вперше, застосовують 3 мг/кг препарату як 2-годинну в/в інфузію, після чого додатково проводять інфузії у тій же дозі на 2 та 6 тижнях лікування, далі через кожні 8 тижнів^{БНФ}. Застосовувати у комбінації з метотрексатом. Терапевтичний ефект досягається протягом 12 тижнів після початку лікування. У випадку виникнення неадекватної р-ції або при відсутності терапевтичного ефекту після 12 тижнів можна розглянути питання щодо поетапного збільшення дози приблизно на 1,5 мг/кг до максимальної 7,5 мг/кг кожні 8 тижнів^{БНФ}. В іншому випадку можна розглянути можливість прийому 3 мг/кг кожні 4 тижні. У пацієнтів, які не демонструють позитивний терапевтичний ефект протягом перших 12 тижнів лікування або після корекції дози, необхідно ретельно оцінити доцільність продовження терапії^{БНФ}. Анкілозуючий спондилоартрит - 5 мг/кг в/в за схемою введення на 2-му та 6-му тижні після першої інфузії і у подальшому з інтервалом 6 - 8 тижнів. У випадку відсутності відповіді на 6-му тижні (після отримання 2 доз) подальшого лікування препаратом проводити не слід. Псоріатичний артрит - вводять у дозі 5 мг/кг в/в за схемою введення на 2-му та 6-му тижні після першої інфузії з наступним проведенням інфузій кожні 8 тижнів^{БНФ}; псоріаз: 5 мг/кг в/в на 2 та 6 тижні лікування після першої інфузії, далі - через кожні 8 тижнів^{БНФ}. Якщо у пацієнта не спостерігається відповіді після 14 тижнів (після отримання 4 доз), подальше лікування препаратом не проводити^{БНФ}.

8.6.2. Анти-CD-20-агенти

- **Ритуксимаб (Rituximab)** * (див. п. 18.2.4. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ", п. 19.1.6. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")

Показання для застосування ЛЗ: активний РА^{БНФ} у дорослих у комбінації з метотрексатом при неефективності або непереносимості лікування іншими хворобо-модифікуючими протиревматичними препаратами у тому числі лікування одним чи кількома інгібіторами фактора некрозу пухлини^{БНФ}; лікування тяжких форм активного гранулематозу з поліангітом (гранулематоз Вегенера) і мікроскопічного поліангіту у комбінації з глюкокортикоїдами з метою індукції ремісії у дорослих пацієнтів.^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: РА: курс складається з 2-х в/в вливань по 1000 мг; рекомендована доза ритуксимабу становить 1000 мг в/в з наступним другим вливанням 1000 мг ч/з 2 тижні.^{БНФ} Потреба у подальших курсах повинна визначатися через 24 тижні після попереднього курсу, клінічна відповідь досягається протягом 16-24 тижнів після початкового курсу лікування; питання щодо продовження терапії необхідно повторно розглянути стосовно пацієнтів, у яких впродовж цього періоду часу відсутні очевидні докази терапевтичної користі; гранулематоз з поліангітом і мікроскопічний поліангіт^{БНФ}: рекомендована доза з метою індукції ремісії - 375 мг/м² поверхні тіла, що вводиться у вигляді в/в інфузії 1 р/тижд. протягом 4 тижнів (всього 4 інфузії); рекомендується проведення профілактики пневмоцистної пневмонії.

8.6.3. Інгібітори інтерлейкіну

- **Тоцилізумаб (Tocilizumab)**

Фармакотерапевтична група: L04AC07 - імуносупресанти. Інгібітори інтерлейкіну.

Основна фармакотерапевтична дія: рекомбінантне гуманізоване моноклональне антитіло до людського рецептора ІЛ-6 з підкласу імуноглобулінів IgG₁; селективно зв'язується та пригнічує як розчинні, так і мембранні рецептори ІЛ-6 (sIL-6R і mL-6R), ІЛ-6 залучений у такі процеси, як стимуляція секреції Іg, активація Т-клітин, стимуляція продукування білків г. фази в печінці та стимуляція гемопоєзу, у патогенез захворювань, у тому числі запальних захворювань, остеопорозу та новоутворень.

Показання для застосування ЛЗ: РА: у комбінації з метотрексатом для лікування тяжкого, активного і прогресуючого РА у дорослих, які раніше не отримували лікування метотрексатом; лікування РА із середнім чи високим ст. активності у дорослих, у яких спостерігалася неналежна відповідь або непереносимість попередньої терапії одним або більше захворювання-модифікуючим протизапальним препаратом або антагоністом фактора некрозу пухлини, у таких пацієнтів можна призначати у вигляді монотерапії у випадку непереносимості метотрексату або якщо продовження лікування метотрексатом є недоречним, при призначенні в комбінації з метотрексатом гальмує прогресування деструктивних змін у суглобах за рентгенологічними даними та покращує фізичну ф-цію; лікування активного системного ювенільного ідіопатичного артриту у хворих віком від 2 років (р-н д/ін"екц. - від 1 року) і старших, у яких спостерігалася неналежна відповідь на попередню терапію НПЗЗ і системними КС, можна призначати як у вигляді монотерапії (у випадку непереносимості метотрексату або коли лікування метотрексатом є недоречним), так і в комбінації з метотрексатом; лікування активного поліартикулярного ювенільного ідіопатичного артриту у комбінації з метотрексатом (позитивний або негативний ревматоїдний фактор, або розширений олігоартрит) у пацієнтів віком від 2 років, у яких спостерігалась неналежна відповідь на попередню терапію метотрексатом. можна призначати як у вигляді монотерапії (у випадку непереносимості метотрексату або у випадках, коли продовження терапії метотрексатом є недоречним), так і в комбінації з метотрексатом ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: РА: рекомендована доза 8 мг/кг, 1 р/4 тижні в/в крапельно протягом щонайменше 1 год., не рекомендується збільшення дози вище 800 мг на одну інфузію ^{БНФ} пацієнтам з масою тіла >100 кг, доза вище 1,2 г не вивчалася у клінічних дослідженнях, у вигляді п/ш ін'екції рекомендована доза - 162 мг 1 р/тижд.; системний ювенільний ідіопатичний артрит: рекомендована доза пацієнтам з масою тіла <30 кг - 12 мг/кг 1 р/2 тиж., розводити до кінцевого об'єму 50 мл стерильним апірогенним 0,9 % розчином натрію хлориду в асептичних умовах, пацієнтам з масою тіла ≥30 кг - 8 мг/кг 1 р/2 тиж. ^{БНФ}, розводити до 100 мл стерильним апірогенним 0,9 % розчином натрію хлориду в асептичних умовах, в/в крап. протягом щонайменше 1 год., безпека та ефективність застосування дітям до 2 років не встановлені; або 162 мг 1р/тиждень п/ш при масі тіла ≥ 30 кг або 162 мг 1р/2 тижні п/ш при масі тіла < 30 кг; поліартикулярний ювенільний ідіопатичний артрит: рекомендована доза 8 мг/кг одноразово кожні 4 тижні для пацієнтів з масою тіла ≥30 кг ^{БНФ} в/в або 10 мг/кг одноразово кожні 4 тижні для пацієнтів з масою тіла менше ніж 30 кг в/в, безпека та ефективність застосування дітям до 2 років не встановлені; або 162 мг п/ш 1р/2 тижні, якщо маса тіла пацієнта ≥ 30 кг, та 162 мг п/ш 1р/3 тижні, якщо маса тіла < 30 кг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції ВДШ, активний туберкульоз, який проявлявся легеневидами або позалегеневидами формами; інвазивні легеневі інфекції, включаючи кандидоз, аспергільоз, кокцидіодомікоз та пневмоцистну пневмонію; оперізувальний лишай, сепсис, бактеріальний артрит, вітряна віспа, середній отит, випадки опортуністичних інфекцій, інтерстиціальна хвороба легень (включаючи пневмоніт та легневий фіброз), назофарингіт, флегмони, пневмонія, інфекції, спричинені *Herpes simplex 1 myru* та *Herpes zoster*; дивертикуліт, перфорації ШКТ (як ускладнення дивертикуліту), включаючи розлитий гнійний перитоніт, фістулу та абсцес, виразки ротової порожнини, гастрит, гастроентерит, болі в животі, епігастральний дискомфорт, нудота, діарея, стоматит, виразка шлунка, висипання, свербіж, кропив'янка, головний біль, запаморочення, ураження печінки, індуковані ЛЗ, гепатит, жовтяниця, ПН, підвищення рівня печінкових трансаміназ, збільшення маси тіла, підвищення рівня загального білірубину, АГ, зменшення числа тромбоцитів, лейкопенія, панцитопенія, нейтропенія, гіперфібриногенемія, гіперхолестеринемія, інфузійні реакції, гіпотензія, гіпертригліцеридемія, периферичні набряки, р-ції гіперчутливості, анафілаксія (летальна), синдром Стівенса-Джонсона, кашель, задишка, кон'юнктивіт, нефролітіаз, гіпотиреоз, артралгія; реакції у місці ін'екції

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до тоцилізумабу або до будь-якого іншого компонента препарату; активні, тяжкі інфекції.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 20 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АКТЕМРА®	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко. Лтд (виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування)/Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд (випуск серії, вторинне пакування, випробування контролю якості)/Рош Фарма АГ (випробування контролю якості), Японія/Швейцарія/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 4мл у фл.	20мг/мл	№1	926,21	24,51/\$
	АКТЕМРА®	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко. Лтд (виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування)/Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд (випуск серії, вторинне пакування, випробування контролю якості)/Рош Фарма АГ (випробування контролю якості), Японія/Швейцарія/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл у фл.	20мг/мл	№1	926,98	24,51/\$
	АКТЕМРА®	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко. Лтд	конц. д/р-ну	20мг/мл	№1, №4	відсутня у реєстрі	

	(виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування)/Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд (Вторинне пакування, випробування контролю якості, випуск серії)/Рош Фарма АГ (випробування контролю якості), Японія/Швейцарія/Німеччина	д/інфуз. по 4мл, 10мл, 20мл у фл.			ОВЦ
АКТЕМРА®	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ і Ко КГ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування, випробування на стерильність та бактеріальні ендотоксини; випробування на стерильність та бактеріальні ендотоксини)/Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд (вторинне пакування, , Німеччина/Швейцарія/Німеччина	р-н д/ін'єк. у шпр. по 1мл у кор.	162мг/0,9мл	№4	941,21 23,29/\$

8.7. Засоби, що впливають на опорно-руховий апарат

8.7.1. Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби

8.7.1.1. Похідні оцтової кислоти та споріднені сполуки

• **Диклофенак (Diclofenac)** ^[ГМД] [окрім гелю]

Фармакотерапевтична група: M01AB05 - нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. M02AA15 - нестероїдні протизапальні засоби для місцевого застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: протиревматична, протизапальна, анагетична, жарознижувальна дія; основний механізм дії - гальмування біосинтезу простагландинів, які відіграють важливу роль у генезі запалення, болю і пропасниці; при ревматичних захворюваннях клінічний ефект характеризується значним зменшенням вираженості таких симптомів і скарг, як біль у спокої і при русі, ранкова скутість, припухлість суглобів, а також поліпшенням функції суглобів; не пригнічує біосинтез протеогліканів хрящової тканини; виявляє значний анагетичний ефект препарату при помірному і сильно вираженому больовому с-мі неревматичного генезу; здатний усувати больові відчуття і знижувати вираженість крововтрат при первинній дисменореї; виявляє лікувальний ефект при нападах мігрені, при наявності запалення, спричиненого травмою або хірургічним втручанням, швидко усуває спонтанний біль, біль при рухах, зменшує запальну набряклість тканин і набряк у ділянці хірургічної рани, при одночасному застосуванні з опіоїдами для зняття післяопераційного болю, зменшує потребу в опіоїдах.

Показання для застосування ЛЗ: запальні і дегенеративні форми ревматичних захворювань (РА^{ГМД}, ЮРА, анкілозуючий спондиліт, остеоартроз, спондилоартрити^{БНФ}); больові с-ми з боку хребта; ревматичні захворювання позасуглобових м'яких тканин^{БНФ}; г. напади подагри,^{БНФ} ниркова та біліарна колики; біль та набряк після травм і операцій; тяжкі напади мігрені^{БНФ}; біль та/або запалення, що супроводжують запальні гінекологічні захворювання (дисменорея, аднексит); післяопераційний біль^{БНФ}, запалення і набряк (після стоматологічних або ортопедичних операцій); як допоміжний засіб при інфекціях ЛОР-органів, що супроводжуються вираженим болем і запаленням^{БНФ} (фарингит, отит); полегшення болю та зменшення запалення різного ступеня при різних станах, включаючи патологію суглобів: остеоартрит, г. м'язово-скелетні захворювання, такі як періартрит (плечолопатковий періартрит), тендиніт, тендовагініт, бурсит; інші патологічні стани, викликані травмами, у тому числі переломи, біль у попереку, розтягнення, вивихи, забиття, запалення сухожиль, зв'язок, м'язів та суглобів; ортопедичні, стоматологічні та інші незначні оперативні втручання.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: доза становить 75 мг /добу^{БНФ}, яку вводять шляхом глибокої ін'єкції у верхній зовнішній сектор великого сідничного м'яза, використовуючи асептичну техніку; у тяжких випадках, ДД можна збільшити до двох ін'єкцій по 75 мг^{БНФ}; як альтернативу 75 мг^{БНФ} р-ну д/ін'єкц. можна комбінувати з іншими лікарськими формами до максимальної сумарної добової дози 150 мг^{БНФ}. Мігрень - початкове застосуванням 1 амп. 75 мг^{БНФ}, дозу вводять при можливості одразу ж після застосування супоз. по 100 мг у той же самий день (за необхідності). Загальна добова доза не має перевищувати 175 мг у перший день. В/в: перед початком в/в інфузії розвести у 100-500 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду або 5 % р-ну глюкози. Обидва р-ни спершу потрібно буферизувати р-ном бікарбонату натрію (0,5 мл 8,4 % р-ну або 1 мл 4,2 %). Використовувати можна тільки прозорі розчини. Для лікування помірної і важкої п/операційного болю 75 мг^{БНФ} вводити безперервно від 30 хв до 2 год; у разі необхідності лікування повторити ч/з 4-6 год, але доза не повинна перевищувати 150 мг/добу^{БНФ}; профілактика п/операційного болю ч/з 15 хв - 1 год після хірургічного втручання - ввести навантажувальну дозу 25-50 мг, після цього необхідно застосувати безперервну інфузію приблизно 5 мг/год аж до МДД 150 мг^{БНФ}. Табл.: рекомендована доза - 100-150 мг/добу^{БНФ}; у разі помірної вираженості симптомів достатнім є застосування дози препарату 75 мг^{БНФ} -100 мг/добу; ДД розподіляти на 2-3 прийоми^{БНФ}; діти віком від 14 років - ДД становить 50-100 мг, розподіляти на 2-3 прийоми; при первинній дисменореї ДД становить 50-100 мг, за необхідності можна призначати 100 мг та підвищити протягом наступних кількох менструальних циклів до максимальної - 150 мг/добу; при нападах мігрені рекомендована разова доза становить 50 мг, наступні 50 мг можна застосувати через 2 год від першого прийому, за необхідності можна продовжити застосування ЛЗ через 4-6 год, МДД - 150 мг. Капс.: 1капс./добу, перед їжею, не розжовуючи та запиваючи склянкою води. Емульгель: застосовують 2 р/добу (20 мг/г) або 3-4 р/добу (10 мг/г), вранці та ввечері, злегка втираючи в шкіру в місці локалізації болю, кількість препарату, яка застосовується, залежить від розміру ураженої зони (так, 2-4 г, що за розміром відповідає вишні або волоському горіху, достатньо для нанесення на ділянку площею 400-800 см²). Суппоз.:початкова доза - 100-150 мг/добу^{БНФ}, при невиражених симптомах, а також при тривалій терапії достатньо дози 75 мг^{БНФ} -100 мг/добу, добову дозу розподіляють на 2-3 прийоми, при первинній дисменореї добову дозу підбирають індивідуально,

зазвичай вона становить 50-150 мг/добу^{БНФ}. Початкова доза може бути 50-100 мг/добу, але за необхідності її можна збільшити протягом кількох менструальних циклів до максимальної, що становить 150 мг/добу; для лікування нападів мігрені - курс починають у дозі 100 мг при прояві перших ознак початку нападу, за необхідності в той же день може бути застосований другий супозиторій (50 мг диклофенаку), у наступні дні лікування можна продовжити (добова доза препарату не повинна перевищувати 150 мг^{БНФ}, дозу розподіляють на 2-3 застосування); діти 1 - 14 років з ЮРА: 1-3 мг/кг/добу за кілька прийомів (лише супп. по 25 мг); діти 6 -14 років з г. післяопераційним боєм: 1-2 мг/кг/добу за кілька прийомів, тривалість застосування до 4 днів (лише супп. по 25 мг)

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тромбоцитопенія, лейкопенія, анемія (включаючи гемолітичну та апластичну анемію), агранулоцитоз, панцитопенія, гіперчутливість, анафілактична та анафілактоїдна р-ція (включаючи звуження дихальних шляхів, респіраторний дистрес-синдром, пришвидшене серцебиття, артеріальну гіпотензію та шок); ангіоневротичний набряк (включаючи набряк обличчя), відчуття жару, холоду або оніміння кінцівок, дезорієнтація, депресія, безсоння, нічні кошмари, дратівливість, психічні та психотичні розлади, головний біль, запаморочення, переднепритомний стан, збудження, сонливість, підвищена стомлюваність; парестезія, порушення пам'яті, судоми, занепокоєність, тривожність, тремор, асептичний менінгіт, розлад відчуття смаку, інсульт; сплутаність свідомості, галюцинації, порушення чутливості, загальне нездужання, виражена слабкість, порушення зору, нечіткість зору, диплопія; неврит зорового нерва, вертиго; шум/дзвін у вухах, порушення слуху, посилене серцебиття (пальпітація), відчуття серцебиття, біль у грудях, СН, ІМ, АГ, артеріальна гіпотензія, васкуліт, синдром Коуніса, аритмія, брадикардія, астма (у т. ч. задишка, диспное), бронхоспазм, пневмоніт, пригнічення або зупинка дихання, порушення з боку травного тракту, біль у шлунку, нудота, блювання, діарея, диспепсія, абдомінальний біль, абдомінальні спазми, метеоризм, втрата апетиту, анорексія; гастрит, кровотечі ШКТ, блювання з домішками крові, геморагічна діарея, мелена, виразка шлунка або кишечнику з/без кровотечі або перфорації (іноді з летальним наслідком, особливо у пацієнтів літнього віку), коліт (включаючи ішемічний, геморагічний коліт та загострення виразкового коліту або хв. Крона), гастроінтестинальний стеноз з перфорацією, перитоніт, проктит, запор, стоматит (у тому числі виразковий стоматит), біль у горлі, глосит, ураження стравоходу, діафрагмоподібні стриктури кишечнику, панкреатит, загострення геморою, збільшення рівня трансаміназ; гепатит, жовтяниця, порушення ф-ції печінки; блискавичний гепатит, гепатонекроз, ПН, шкірні висипання; кропив'янка; пустульозне, бульозне висипання, екзантема, екзема, еритема, мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайєлла), ексфолиативний дерматит, алопеція, р-ція фоточутливості, генералізовані шкірні висипи, пурпура, алергічна пурпура, пурпура Шенлейна-Геноха, свербіж, сухість шкіри, відчуття печіння, контактний дерматит, затримка рідини в організмі, набряки, г. ушкодження нирок (г. НН), гематурія, протеїнурія, нефротичний с-м, тубулоінтерстиціальний та інтерстиціальний нефрит, нирковий папілярний некроз, р-ція у місці ін'єкції, біль, затвердіння; набряк, некроз у місці ін'єкції, абсцес у місці ін'єкції, імпотенція, гарячка, гриппоподібні симптоми, носові кровотечі, шкірні крововиливи, підвищений ризик тромботичних ускладнень (ІМ чи інсульт), пов'язаний із застосуванням диклофенаку, зокрема у високих терапевтичних дозах (150 мг/добу) та при тривалому застосуванні, некротизуючий фасциїт.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини, земляного горіха, сої, ацетилсаліцилової к-ти або до будь-якого іншого компонента препарату, г. виразка шлунка або кишечнику; гастроінтестинальна кровотеча або перфорація, кровотеча або перфорація шлунково-кишкового тракту в анамнезі, що пов'язані з попереднім лікуванням НПЗП, активна форма виразкової хвороби/кровотечі або рецидивуюча виразкова хвороба/кровотеча в анамнезі (два або більше окремих епізоди встановленої виразки або кровотечі), невизначені порушення кровотворення, останній триместр вагітності, запальні захворювання кишечнику (хв.Крона або виразковий коліт), ПН, НН, застійна СН (NYHA II-IV); неконтрольована АГ, високий ризик розвитку післяопераційних кровотеч, незгортання крові, порушень гемостазу, гемопоетичних порушень або цереброваскулярних кровотеч, лікування періопераційного болю при аорто-коронарному шунтуванні (або використання апарату штучного кровообігу); ІХС у пацієнтів, які мають стенокардію, перенесли ІМ; цереброваскулярні захворювання у пацієнтів, які перенесли інсульт або мають епізоди транзиторних ішемічних атак; захворювання периферичних артерій; протипоказаний пацієнтам, у яких у відповідь на застосування ібупрофену, ацетилсаліцилової кислоти або інших НПЗП виникають напади бронхіальної астми, ангіоневротичний набряк, кропив'янка або гострий риніт, поліпи носа та інші алергічні симптоми; пластир, гель: пошкоджена шкіра, екзема, опік або рана; суппоз.: проктит; спрей: дитячий вік до 14 років

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,1 г., парентерально - 0,1 г., ректально - 0,1 г., зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	ДИКЛОФЕНАК	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	табл. у бл. в пач.	0,05г	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДИКЛОФЕНАК	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	табл. у бл. в пач.	0,05г	№10x3	0,77	
	ДИКЛОФЕНАК	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	табл. у бл.	0,05г	№10	0,84	
	ДИКЛОФЕНАК	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	гель по 40 г у алюм. тубі; по 100 г у ламінат. тубі	10мг/г, 50мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

ДИКЛОФЕНАК	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	гель по 40г, 100 г у тубі	50мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
ДИКЛОФЕНАК	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	гель по 50 г у тубі	50мг/г	№1	63,12
ДИКЛОФЕНАК	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	супоз. у бл.	0,1г	№5x2	2,30
ДИКЛОФЕНАК НАТРИЮ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 3мл в амп. у кор.	25мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОВЦ
ДИКЛОФЕНАК НАТРИЮ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 3мл в амп. у кор.	25мг/мл	№100	4,56
ДИКЛОФЕНАК НАТРИЮ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 3мл в амп. у однобічн. бл.	25мг/мл	№5x1	4,56
ДИКЛОФЕНАК НАТРИЮ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 3мл в амп. у кор.	25мг/мл	№100	5,20
ДИКЛОФЕНАК НАТРИЮ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 3мл в амп. у однобічн. бл.	25мг/мл	№5x1	5,20
ДИКЛОФЕНАК НАТРИЮ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	капс. у бл.	25 мг	№10x3	1,92
ДИКЛОФЕНАК НАТРИЮ	ПАТ "Монфарм", Україна	супоз. рект. у стрип.	0,05 г	№5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ
ДИКЛОФЕНАК НАТРИЮ	АТ "Лубнифарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 3 мл в амп. у пач. та бл.	25мг/мл	№5, №10, №5x20	відсутня у реєстрі ОВЦ
ДИКЛОФЕНАК НАТРИЮ	АТ "Лубнифарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 3 мл в амп. у пач. та бл.	25мг/мл	№5x2	4,93
ДИКЛОФЕНАК НАТРИЮ	АТ "Лубнифарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 3 мл в амп. у пач. та бл.	25мг/мл	№5x1	5,09
ДИКЛОФЕНАК НАТРИЮ	ПАТ "Фармак", Україна	гель по 40 г у тубі	10мг/г	№1	25,00
ДИКЛОФЕНАК-БІОЛІК	АТ "БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк. по 3 мл в амп. у пач.	25 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОВЦ
ДИКЛОФЕНАК-БІОЛІК	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк. по 3 мл в амп. у пач.	25 мг/мл	№5	4,00
ДИКЛОФЕНАК-ВІОЛА	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	гель по 40 г у тубі	10мг/г	№1	21,36
ДИКЛОФЕНАК-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 3мл в амп. у конт. чар/уп.	25мг/мл	№5x2	5,49
ДИКЛОФЕНАК-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 3мл в амп. у кор.	25мг/мл	№10	5,49
ДИКЛОФЕНАК-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 3мл в амп. у конт. чар/уп. .	25мг/мл	№5x1	5,83
ДИКЛОФЕНАК-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	таб., в/о к/р у конт. чар/уп.	25мг	№10x3	1,44
ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ'Я УЛЬТРА	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	спрей нашк., р-н по 50мл у скл. фл. з розпил.	40мг/мл	№1	101,87
ДИКЛОФЕНАК-	Товариство з обмеженою	спрей нашк., р-	40мг/мл	№1	71,63

ЗДОРОВ'Я УЛЬТРА	відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	н по 30мл у скл. фл. з розпил.				
ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	гель по 30г у тубі	10мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	гель по 50г у тубі	10мг/г	№1	22,39	
ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'ек. по 3мл в амп. у кор. та бл.	25 мг/мл	№5, №5x1	6,88	
ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ'Я УЛЬТРА	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	гель по 100г у тубі	50мг/г	№1	141,19	
ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ'Я УЛЬТРА	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	гель по 50г у тубі	50мг/г	№1	87,78	
ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	гель по 50г у тубі	30 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ДИКЛОФЕНАК-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	супоз. рект.у стрип. у пач.	100мг	№5x2	2,34	
НАТРИЮ ДИКЛОФЕНАК-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	капс. тверді у бл.	25 мг	№10x3	1,51	
ОРТОФЕН	АТ "ВІТАМІНИ", Україна	табл., в/о, к/р у бл.	25 мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ОРТОФЕН	ПАТ "Вітаміни", Україна	табл., в/о, к/р у бл.	25 мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ОРТОФЕН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о, к/р у бл.	25мг	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ОРТОФЕН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о, к/р у бл.	25мг	№10x100	1,26	
ОРТОФЕН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о, к/р у бл.	25мг	№10x3	1,44	
ОРТОФЕН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл., в/о, к/р у бл.	25мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ОРТОФЕН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл., в/о, к/р у бл.	25мг	№30x1	1,97	
ОРТОФЕН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., в/о, к/р у бл.	50мг	№10x3	1,27	
ОРТОФЕН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія	табл., в/о, к/р у бл.	50мг	№10x1	1,40	

		"Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна					
II.	АЛМІРАЛ	Медокемі ЛТД (Ампульний Ін'єкційний Завод), Кіпр	р-н д/ін'єк. по 3 мл в амп. у бл.	75мг/3мл	№5x1	19,53	30,26/€
	АЛМІРАЛ	Медокемі ЛТД (Ампульний Ін'єкційний Завод), Кіпр	р-н д/ін'єк. по 3 мл в амп. у бл.	75мг/3мл	№5x2	19,53	30,26/€
	АРГЕТТ ДУО	Драгенофарм Апотекер Пюшл ГмбХ (первинне та вторинне пакування)/Свісс Капс ГмбХ (первинне та вторинне пакування, випуск серії)/Теммлер Ірландія Лімітед (виробництво нерозфасованої продукції, контроль якості), Німеччина/Німеччина/Ірландія	капс. з м/в тверді у бл.	75 мг	№10x1, №10x2, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АРГЕТТ РАПІД	Свісс Капс ГмбХ (первинне та вторинне пакування та випуск серії)/Теммлер Ірландія Лімітед (виробництво нерозфасованої продукції, контроль якості)/Драгенофарм Апотекер Пюшл ГмбХ (первинне та вторинне пакування), Німеччина/Ірландія/Німеччина	капс. к/р тверді у бл.	75 мг	№10x1, №10x2, №10x3, №10x5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АРГЕТТ СПРЕЙ	Фарбіл Валтроп ГмбХ, Німеччина	спрей нашк., р-н по 12,5 г, 25 г у фл. з доз. прист.	40 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ВОЛЬТАРЕН ЕМУЛЬГЕЛЬ	ГСК Консьюмер Хелскер С.А., Швейцарія	емульгель д/зовн. застос. по 20 г, 50 г, 100 г у тубі	10 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ВОЛЬТАРЕН ФОРТЕ	ГСК Консьюмер Хелскер С.А., Швейцарія	емульгель д/зовн. застос. по 50 г, 100 г у тубі	20 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ВОЛЬТАРЕН®	Делфарм Хюнінг САС, Франція	супоз. у стрип.	25мг, 50мг, 100мг	№5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ВОЛЬТАРЕН®	Новартіс Фарма С.п.А./Новартіс Саглік, Гіда ве Тарім Урунлері Сан. Ве Тік. А.С., Італія/Туреччина	табл. г/р у бл.	25мг, 50мг	№10x2, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ВОЛЬТАРЕН®	Новартіс Фарма Штейн АГ/Лек Фармасьютікалс д.д., Швейцарія/Словенія	р-н д/ін'єк. по 3 мл в амп.	75 мг/3 мл	№5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ВОЛЬТАРЕН® РАПІД	Новартіс Саглік, Гіда ве Тарім Урунлері Сан. Ве Тік. А.С., Туреччина	таб. вкриті ц/о у бл.	25мг, 50мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ВОЛЬТАРЕН® РАПІД	Новартіс Саглік, Гіда ве Тарім Урунлері Сан. Ве Тік. А.С., Туреччина	таб. вкриті ц/о у бл.	50мг	№10x2	9,32	26,47/\$

ВОЛЬТАРЕН® РЕТАРД	Новартис Фарма С.п.А., Італія	табл., в/о прол. дії у бл.	75мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ДИКЛАК®	Лек Фармацевтична компанія д.д., Словенія	р-н д/ін`ек. по 3 мл в амп.	75 мг/3 мл	№5	13,64	23,21/\$
ДИКЛАК®	Салютас Фарма ГмБХ, Німеччина	таб. к/р у бл.	50 мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ДИКЛАК® ID	Салютас Фарма ГмБХ, Німеччина	таб. з м/в у бл.	75 мг	№10x2, №10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ДИКЛАК® ID	Салютас Фарма ГмБХ (виробництво in bulk, пакування, випуск серії)/Лек С.А. (пакування, випуск серії), Німеччина/Польща	таб. з м/в у бл.	150 мг	№10x2, №10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ДИКЛАК® ГЕЛЬ	Салютас Фарма ГмБХ, Німеччина	гель по 50 г, 100 г у тубі	50 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ДИКЛАК® ЛІПОГЕЛЬ	Салютас Фарма ГмБХ, Німеччина	гель по 50 г у тубі	10 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ДИКЛОБЕРЛ® 100	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	супоз. у бл.	100мг	№5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ДИКЛОБЕРЛ® 100	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	супоз. у бл.	100мг	№5x1	9,94	32,08/€
ДИКЛОБЕРЛ® 50	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	супоз. у бл.	50мг	№5x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ДИКЛОБЕРЛ® 50	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	супоз. у бл.	50мг	№5x2	12,83	32,08/€
ДИКЛОБЕРЛ® N 75	А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л. (виробництво препарату «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Альфасігма С.п.А. (виробництво препарату «in bulk», первинне пакування та контроль серії), Італія/Італія	р-н д/ін`ек. по 3 мл в амп.	75 мг/3 мл	№5	21,44	28,71/€
ДИКЛОБЕРЛ® РЕТАРД	Хенніг Арцнайміттель ГмБХ & Ко КГ (виробництво капсул твердих "in bulk", контроль серії)/БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (кінцеве пакування, випуск серії)/Менаріні-Фон Хейден ГмБХ (кінцеве пакування, контроль серії), Німеччина/Німеччина/Німе чина	капс. тверді прол. дії у бл.	100мг	№10x1, №10x5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ДИКЛОБЕРЛ® РЕТАРД	Хенніг Арцнайміттель ГмБХ & Ко КГ (виробництво капсул твердих "in bulk", контроль серії)/БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (кінцеве пакування, випуск серії)/Менаріні-Фон Хейден ГмБХ (кінцеве пакування, контроль серії), Німеччина/Німеччина/Німе чина	капс. тверді прол. дії у бл.	100мг	№10x2	4,36	29,05/€
ДИКЛОДЕВ®	ДЕМО С.А. Фармасьютикал Індастрі, Греція	р-н д/ін`ек. по 3 мл в амп.	25 мг/мл	№5	25,45	27,27/\$
ДИКЛОФЕНАК ЄВРО	Юнік Фармасьютикал Лабораторіс (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз ЛТд."),	табл., в/о, к/р у бл.	50мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	

	Індія						
ДИКЛОФЕНАК ЄВРО	Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	табл., в/о, к/р у бл.	50мг	№10x10	0,90	27,60/\$	
ДИКЛОФЕНАК-ТЕВА	Меркле ГмБХ (виробництво нерозфасованого продукту, первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії; контроль якості), Німеччина	р-н д/ін'єк. по 3 мл в амп. у бл.	75 мг/3 мл	№5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ДІКЛОСЕЙФ®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	супоз. у стрип.	100мг	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ДІКЛОСЕЙФ®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	супоз. у стрип.	100мг	№5x2	6,90	23,98/\$	
ДІКЛОСЕЙФ®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	супоз. у стрип.	50мг	№5x2	9,20	23,98/\$	
ДІКЛОСЕЙФ®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	емульс. гель д/зовн. застос. по 100 г у тубі	10мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ДІКЛОСЕЙФ®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	емульс. гель д/зовн. застос. по 30 г у тубі	10мг/г	№1	50,00		
ДІКЛОСЕЙФ® ФОРТЕ	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	емульс. гель д/зовн. застос. по 30 г, 100 г у тубі	20 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ДОЛОКС РЕТАРД	Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	табл., вкриті п/о прол. дії у бл.	100мг	№10x1, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ДОЛОКС РЕТАРД	Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	табл., вкриті п/о прол. дії у бл.	100мг	№10x2	2,77	27,60/\$	
ЕВІНОПОН	БРОС ЛТД, Греція	р-н д/ін'єк. по 3 мл в амп.	25 мг/мл	№5	25,47	29,85/€	
КАТАФАСТ	Міфарм С.п.А. (виробництво за повним циклом)/Новартіс Фарма АГ (контроль якості), Італія/Швейцарія	пор. д/орал. р- ну у саше	50 мг	№3, №9, №21	відсутня у реєстрі ОБЦ		
КЛОДИФЕН	К.О. СЛАВІЯ ФАРМ С.Р.Л., Румунія	гель по 45 г у тубі	10 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
КЛОДИФЕН	К.О. СЛАВІЯ ФАРМ С.Р.Л., Румунія	гель по 45 г у тубі	50 мг/г	№1	86,27	27,05/\$	
КЛОДИФЕН	Мефар Ілач Сан. А.Ш., Туреччина	р-н д/ін'єк. по 3 мл в амп. у конт. чар/уп.	25 мг/мл	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
НАКЛОФЕН	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	таб. к/р у бл.	50 мг	№10x2	8,87	30,27/€	
НАКЛОФЕН	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	р-н д/ін'єк. по 3 мл в амп. у бл.	75 мг/3 мл	№5x1	29,69	35,35/€	
НАКЛОФЕН	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	супоз. у стрип.	50 мг	№5x2	17,68	30,27/€	
НАКЛОФЕН ДУО	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	капс. у бл.	75мг	№10x2	8,08	35,35/€	

НАКЛОФЕН РЕТАРД	КРКА, д.д., Ново место (первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Хенніг Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ (виробництво «in bulk»), Словенія/Німеччина	таб. прол. дії у бл.	100 мг	№10x2	5,54	30,27/€
ОЛФЕН®	Тейка Фармасьютикал Ко., Лтд. (виробник, який відповідає за виробництво нерозфасованого продукту; первинна та вторинна упаковка, контроль серії)/Меркле ГмбХ (виробник, який відповідає за контроль серії; виробник, який відповідає за випуск серії), Японія/Німеччина	пластир лікув. на 140 см2 у пак.	140мг/12год	№2, №5, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ОЛФЕН® ГІДРОГЕЛЬ	Меркле ГмбХ (виробник, який відповідає за виробництво продукту in bulk, первинне пакування, вторинне пакування, контроль серії; виробник, який відповідає за випуск серії), Німеччина	гель по 20 г, 50 г у тубі	10 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ОЛФЕН®-100 СР ДЕПОКАПС	Ацино Фарма АГ (виробництво за повним циклом)/Унтерзхунгсінсти тут Хеппелер (додаткова лабораторія, що приймає участь в контролі якості), Швейцарія/Німеччина	таб. прол. дії у бл.	100 мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ОЛФЕН®-50 ЛАКТАБ	Ацино Фарма АГ (виробництво за повним циклом)/Унтерзхунгсінсти тут Хеппелер (додаткова лабораторія, що приймає участь в контролі серії), Швейцарія/Німеччина	табл. к/р у бл.	50 мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РАПТЕН 75	"Хемофарм" АД, Сербія	р-н д/ін'єк. по 3 мл в амп. у бл.	25 мг/мл	№5x1	14,66	30,72/€
РАПТЕН ГЕЛЬ	"Хемофарм" АД, Вршац, відділ виробнича дільниця Шабац (виробник готового лікарського засобу, первинне, вторинне пакування, контроль серії)/"Хемофарм" АД (виробник, відповідальний за випуск серії), Сербія/Сербія	гель по 40 г у тубі	10 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РАПТЕН РАПІД	"Хемофарм" АД (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль серії, випуск серії)/"Хемофарм" д.о.о. (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль серії), Сербія/Боснія і Герцеговина	таб., в/о у бл.	50 мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РАПТЕН РЕТАРД	"ХЕМОФАРМ" АД, Сербія	таб. вкрит. п/о прол. дії у бл.	100 мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ФЛЕШ АКТ	ЮРОПІЕН ІДЖІПШЕН ФАРМАС'ЮТІКАЛ	гран. д/орал. р- ну по 2 г у саше	50 мг	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Індометацин (Indometacin)** ^[тільки мазь]

Фармакотерапевтична група: M01AB01 - нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Похідні оцтової к-ти і споріднені сполуки. M02AA23 - уестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування. Індометацин.

Основна фармакотерапевтична дія: має виражену протизапальну дію, яка значно перевищує дію фенілбутазону і ацетилсаліцилової к-ти, його аналгетична активність відповідає аналгетичній активності метамізолу; має антипіретичну дію, проявляє сильну пригнічувальну дію на синтез простагландинів шляхом пригнічення циклооксигенази, зменшує агрегацію тромбоцитів, ліпоксигеназну активність в області запалення, лейкотрієни; зменшує вивільнення ендогенних пірогенів, інактивує лізосомні ферменти, пригнічує активність нейтральних протеаз; декупелює окисне фосфорилування і пригнічує зворотне захоплення катехоламінів, посилює обмін норадреналіну, має відому гангліоблокуючу дію, при місцевому застосуванні чинить пряму протизапальну і болезаспокійливу дію на запалені тканини.

Показання для застосування ЛЗ: г. і хр. біль при запальних і дегенеративних захворюваннях опорно-рухового апарату ^{БНФ}; РА; г. і в стадії загострення хр. анкілозівний спондилоартрит (хвороба Бехтерева); напад подагри ^{БНФ} і подагричний артрит; остеоартрит від помірної до тяжкої форми; стеоартроз, псоріатичний поліартрит; захворювання навколосуглобних тканин: тендиніти, бурсити (г. хворобливе плече), тендобурсити, тендовагініти, больовий с-м та запалення після травм та оперативних втручань; місцеве симптоматичне лікування при розтягненнях, вивихах, забоях; синовіти, запалення фасцій та суглобних зв'язок; дископатія, плексит, радикулоневрит; дисменорея ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі та діти віком від 14 років: табл. перорально, після їжі, не розжовуючи, запиваючи достатньою кількістю рідини, початкова доза - 25-50 мг 2-4 р/добу, при недостатньому терапевтичному ефекті дозу збільшувати до 150 мг /добу на 3 прийоми, МДД 200 мг ^{БНФ}; при тривалому лікуванні добова доза не повинна перевищувати 75 мг; для купірування г. нападу подагри початкова доза 100мг, після чого продовжувати лікування дозою по 50 мг 3 р/добу до зменшення болю; *per rectum* звичайна доза - по 50 мг 2 р/добу або по 100 мг 1 р/добу, МДД 200 мг ^{БНФ}, тривалість лікування не повинна перевищувати 7 діб; місцево, на шкіру наносити на уражену ділянку 3-4 р/добу, кількість мазі залежить від площі ураження і становить приблизно 4-5см, застосовувати не менше ніж через 6-год. інтервал; застосовувати місцеві форми у комплексному лікуванні з табл., тривалість лікування - 7-10 днів, якщо за цей період часу немає впливу на симптоми, лікування переглянути

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія, агранулоцитоз, анемія (включно гемолітична та апластична), пригнічення діяльності кісткового мозку, дисеміноване внутрішньосудинне згортання, бронхоспазм, астматичні напади, анафілактичні або анафілактоїдні р-ції у алергічних пацієнтів, гарячка, васкуліт, анафілаксія, набряк легень, мозку, підвищення рівня сечовини, збільшення маси тіла, підвищення рівня печінкових ферментів, підвищене потовиділення, прискорення хрящової дегенерації, затримка рідин, гіперглікемія, глюкозурія, гіперкаліємія, носова кровотеча, легенева субтропічна еозинофілія, диспное, г. респіраторний дистрес, збудження, судоми, м'язова слабкість, мимовільні м'язові рухи, психічні розлади, посилення епілепсії і паркінсонізму, порушення свідомості, кома, дизартрія, асептичний менінгіт, галюцинації, страх, запаморочення, головний біль, сомнолентність, вертиго, сонливість, депресія, втомлюваність, тривожність, слабкість, порушення концентрації, парестезія, дезорієнтація, безсоння, дратівливість, периферична невротія, розлади пам'яті, психотичні р-ції, непритомність, деперсоналізація, неврит зорового нерва, відкладення на рогівці та пошкодження сітківки, в тому числі жовтої плями, кон'юнктивіт, біль у навколоочній ділянці, диплопія, затуманення зору, порушення слуху, шум у вухах, глухота, тахікардія, стенокардія, пальпітація, аритмії, набряки, СН, пов'язана з застосуванням НПЗЗ, ризик артеріальних тромботичних подій (ІМ, інсульт), АГ, гіпотензія, тромботична мікроангіопатія, анорексія, порушення смаку, гастроентерит, ерозивно-виразковий ураження, кровотечі і перфорації травного тракту, проктит, стриктури кишківника, гастрит, кровотеча із сигмовидної кишки або із дивертикулу, регіональний ілеїт, холестаза, втрата апетиту, нудота, блювання, діарея, диспепсія, запор, біль у животі, метеоризм, мелена, кровава блювота, виразковий стоматит, загострення виразкового коліту (хв. Крона), загострення існуючої виразки, токсичний гепатит з або без жовтяниці, фульмінантний гепатит, випадіння волосся, загострення псоріазу, екзема, свербіж із або без висипань, уртикарія, везикулярне висипання, петехії, екхімози, ангіоневротичний набряк, ексфолювативний дерматит, пурпура, вузликова еритема, мультиформна еритема, бульозні висипання, включаючи с-м Стівенса-Джонсона і токсичний епідермальний некроліз, порушення ф-ції нирок, набряки, вагінальна кровотеча, збільшення і напруженість молочних залоз, гінекомастія, протеїнурія, гематурія, нефротичний с-м, інтерстиціальний нефрит, ГНН, папілярний некроз, місцеве подразнення та набряк, печіння у місці застосування, почервоніння, лущення, сухість шкіри, місцева кровотеча та загострення геморою, свербіж в аноректальній ділянці, тенезми, підвищення рівня амінотрансфераз у сироватці крові (АЛТ, АСТ), мінуще підвищення білірубіну.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату; підвищена чутливість до ацетилсаліцилової к-ти або до інших НПЗЗ із клінічним проявом астматичного нападу, ангіоневротичного набряку, кропив'янки або риніту; активна пептична виразка шлунка та ДПК або рецидиви (два або більше випадків доведених виразок та кровотеч), виразковий коліт і/або ентероколіт; шлунково-кишкові кровотечі або перфорації в анамнезі, пов'язані із застосуванням НПЗЗ в анамнезі; одночасне застосування інших НПЗЗ, включаючи специфічні інгібітори циклооксигенази-2 через підвищений ризик виникнення небажаних ефектів; тяжка СН; тяжка ПН та НН; перед- і постопераційний біль при операції аортокоронарного обхідного шунтування; супоз.: геморої, анальні фістули та тріщини, проктити та інші хвороби прямої кишки і ануса; кровотечі із гемороїдальних вузлів.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ІНДОМЕТАЦИН СОФАРМА	АТ "Софарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка або виробництво за повним циклом)/ПАТ "Вітаміни" (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії), Болгарія/Україна	таб., в/о, к/р у бл.	25 мг	№30x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНДОМЕТАЦИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	таб., в/о, к/р у бл.	25мг	№30x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНДОМЕТАЦИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	таб., в/о, к/р у бл.	25мг	№10x3	4,46	
II.	ІНДОМЕТАЦИН СОФАРМА	АТ "Софарма", Болгарія	супоз. у стрип.	50 мг	№6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНДОМЕТАЦИН СОФАРМА	АТ "Софарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка; дозвіл на випуск серії), Болгарія	мазь по 40 г у тубі	10 %	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Кеторолак (Ketorolac)** ^[гель]

Фармакотерапевтична група: M01AB15 - нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби, M02AA - нестероїдні протизапальні засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болях.

Основна фармакотерапевтична дія: НПЗЗ із вираженим знеболювальним, жарознижувальним та протизапальним ефектом; інгібує фермент циклооксигеназу (ЦОГ), що призводить до зниження синтезу простагландинів - модуляторів больової чутливості, терморегуляції та запалення, тромбоксанів і простагліну; здатний купірувати або зменшувати біль малої та середньої інтенсивності, гальмувати агрегацію тромбоцитів; не має відомого впливу на опіатні рецептори; не пригнічує дихання, не спричиняє звуження зіниць, не володіє седативними або анкіолітичними властивостями і не впливає на перистальтику кишечника, не викликає медикаментозної залежності

Показання для застосування ЛЗ: купірування болю помірної та сильної інтенсивності, включаючи післяопераційний біль ^{БНФ}; гель: посттравматичні запалення та біль у м'язах, зв'язках, суглобах, пошкодження м'яких тканин, розтяжки, вивихи, бурсити, тендиніти, епікондиліти; запалення синовіальної оболонки; остеоартрити поверхневих суглобів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендується для короткочасного застосування (до 5 діб р/ос та 2 доби парентерально) у найменшій ефективній дозі протягом найкоротшого періоду часу, необхідного для контролю симптомів; дорослим - по 10 мг кожні 4-6 год при необхідності; не рекомендується перевищувати дозу 40 мг/добу р/ос, 90 мг для пацієнтів молодого віку, 60 мг для пацієнтів літнього віку, пацієнтів із НН та пацієнтів із масою тіла < 50 кг - парентерально ^{БНФ}; для пацієнтів, які отримують препарат парентерально та яким призначено р/ос, сумарна комбінована добова доза не має перевищувати 90 мг (60 мг для осіб літнього віку, пацієнтів із порушенням ф-ції нирок та пацієнтів з масою тіла <50 кг), а дозування р/ос форми не має перевищувати 40 мг/добу, якщо змінено застосування форми випуску; пацієнтів переводити на р/ос застосування якомога раніше;

гель застосовувати нашкірно 3-4 р/добу; спрей: по одному розпиленню в кожну ніздрю кожні 6-8 год.; МДД: дорослі пацієнти - 126 мг; дорослі пацієнти з масою тіла < 50 кг, пацієнти літнього віку, пацієнти з порушенням фізії нирок - МДД 63 мг, рекомендована доза - 31,5 мг кожні 6-8 год.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: пептична виразка, ерозивно-виразкові зміни, в тому числі перфорація або шлунково-кишкова кровотеча, іноді з летальним наслідком (особливо у людей літнього віку), нудота, диспепсія, шлунково-кишковий біль, відчуття дискомфорту у животі, біль в епігастрії, блювання з домішками крові, гастрит, езофагіт, виразкова хвороба, діарея, відрижка, запор, метеоризм, відчуття переповнення шлунка, мелена, ректальна кровотеча, виразковий стоматит, блювання, крововиливи, перфорація, панкреатит, загострення коліту та хв. Крона, анорексія; відчуття тривожності, сонливість, запаморочення, головний біль, загальна слабкість, непритомний стан, ригідність м'язів потилиці, дезорієнтація, гіперактивність (зміни настрою, неспокій), нервозність, дратівливість, парестезія, функціональні порушення, депресія, ейфорія, судоми, порушення концентрації уваги, безсоння, нездужання, підвищена стомлюваність, збудження, вертиго, порушення сну, незвичні сновидіння, сплутаність свідомості, галюцинації, патологічні думки, гіперкінезія, асептичний менінгіт з відповідною симптоматикою, психотичні р-ції, розлади мислення; порушення зору, нечіткість зорового сприйняття, ретробульбарний неврит, неврит зорового нерва; зниження та втрата слуху, дзвін/шум у вухах; сильний біль у місці проєкції нирок, часте сечовипускання, дизурія, азотемія, олігурія, гематурія, протеїнурія, ГНН, гіпонатріємія, гіперкаліємія, гемолітичний уремічний с-м, біль у боку (з/без гематурії), підвищений вміст сечовини та креатиніну у сироватці крові, інтерстиціальний нефрит, затримка сечі, нефротичний с-м, папілярний некроз, НН; жіноче безпліддя; порушення фізії печінки, гепатит, жовтяниця та ПН, гепатомегалія, підвищення активності печінкових трансаміназ; припливи, брадикардія, відчуття серцебиття, блідість, АГ, артеріальна гіпотензія, пальпітація, біль у грудях, виникнення набряків, СН, підвищений ризик розвитку артеріальних тромбоемболічних ускладнень (ІМ, інсульт); задишка, тахіпноє, диспноє, тяжкість або біль у грудній клітці, свистяче дихання, БА, ускладнення перебігу БА, набряк легень, дискомфорт або відчуття печіння у носі та/або горлі; пурпура, тромбоцитопенія, гіперкаліємія, агранулоцитоз, апластична та гемолітична анемія, еозінофілія, лейкопенія; гіперемія, свербіж, подразнення, кропив'янка, фоточутливість шкіри, с-м Лайелла, бульозні р-ції, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, ексфолюативний дерматит, мультиформна еритема, зміна кольору шкіри обличчя, макулопапульозні та мокнучі шкірні висипання; неспецифічні АР, анафілаксія, анафілактоїдні реакції, реактивність респіраторного тракту, бронхоспазм, набряк гортані, набряк повік, періорбітальний набряк, набряк обличчя, гомілок, пальців, ступнів, набряк язика, висипання різних типів, кропив'янку, ангіоневротичний набряк; підвищена післяопераційна кровоточивість ран, гематома, носова кровотеча, подовження тривалості кровотечі, крововиливи під шкіру, зниження швидкості згортання крові, подовження часу кровотечі, астенія, набряки, збільшення маси тіла, підвищення t° тіла, підвищена пітливість, сухість у роті, посилена спрага, порушення смакових відчуттів, міалгія, гарячка із ознобом або без, біль, припухлість і гіперемія у місці введення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до кеторолаку або до інших компонентів препарату; активна пептична виразка, нещодавня шлунково-кишкова кровотеча або перфорація, виразкова хвороба або шлунково-кишкова кровотеча в анамнезі; БА, риніт, ангіоневротичний набряк або кропив'янка, спричинені застосуванням ацетилсаліцилової к-ти або іншими НПЗЗ (через можливість виникнення тяжких анафілактичних р-цій); БА в анамнезі; не застосовувати як анальгезуючий засіб перед і під час значного оперативного втручання та після маніпуляцій на коронарних судинах; тяжка СН; повний або частковий с-м носових поліпів, набряку Квінке або бронхоспазму; пацієнтам, у яких було оперативне втручання з високим ризиком крововиливу або неповної зупинки кровотечі; тяжка ПН або активне захворювання печінки, прогресуюче захворювання нирок, помірна чи тяжка НН (КлКр в сироватці крові >160 мкмоль/л, < 30 мл/хв), ризик виникнення НН внаслідок зменшення об'єму рідини; підозрювана або підтверджена цереброваскулярна кровотеча, геморагічний діатез, включаючи порушення згортання крові і високий ризик кровотечі або неповного гемостазу, гемофілія та ін. розлади коагуляції; запальні захворювання кишечника (виразковий коліт, хв. Крона), одночасне лікування іншими НПЗЗ (включаючи селективні інгібітори циклооксигенази), ацетилсаліциловою к-тою, окспентоксифіліном, пробенецидом, солями літію, антикоагулянтами, включаючи варфарин та низькі дози гепарину (2500-5000 ОД кожні 12 год); гіповолемія, дегідратація; підтверджена гіперкаліємія, період вагітності, переймів, пологів і годування груддю; порушення гемопоєзу невідомої етіології; дитячий вік до 16 років (спрей до 18 років); р-н д/ін'єк. - протипоказане епідуральне або інтратекальне введення; не застосовувати для лікування хр. болю

Визначена добова доза (DDD): перорально - 30 мг., парентерально - 30 мг., назально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АМБІТ®	АТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 1 мл в амп. у бл.	30мг/мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АМБІТ®	АТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 1 мл в амп. у бл.	30мг/мл	№10x1	10,00	
	АСПРІКС	ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна	спрей наз. доз. по 4 мл (40доз) у фл.	15,75 мг/доза	№1	341,00	
	КЕТАЛЬГІН®	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	таб. у бл.	0,01г	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	

КЕТАЛЬГИН®	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	таб. у бл.	0,01г	№10x1	7,80	
КЕТАЛЬГИН® ЛОНГ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 1 мл в амп. у бл., в пач.	30мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КЕТАЛЬГИН® ЛОНГ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 1 мл в амп. у бл., в пач.	30мг/мл	№100	13,30	
КЕТАЛЬГИН® ЛОНГ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 1 мл в амп. у бл., в пач.	30мг/мл	№5x2	13,30	
КЕТОЛАК	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	10 мг	№10x1	3,00	
КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ®	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 1 мл в амп. у конт. чар/уп.	30мг/мл	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ®	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 1 мл в амп. у конт. чар/уп.	30мг/мл	№5x2	11,24	
КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ®	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	10мг	№10x1	8,12	
КЕТОРОЛАК - ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл. у бл., у конт.	10мг	№10x2, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КЕТОРОЛАК - ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл. у бл., у конт.	10мг	№10x1	10,08	
КЕТОРОЛАК-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 1 мл в амп. в кор., у бл.	30мг/мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КЕТОРОЛАК-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 1 мл в амп. в кор., у бл.	30мг/мл	№10, №10x1	16,13	
КЕТОРОЛАК-МІКРОХІМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (відповідальний за виробництво та контроль/випробування серії, не включаючи випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "МІКРОХІМ"	р-н д/ін'єк., по 1 мл в амп. у касеті	30 мг/мл	№5x2	10,50	

		(відповідальний за виробництво та контроль, Україна/Україна)					
II.	КЕТАНОВ	КК Терапія АТ, Румунія	табл. в/о у бл.	10 мг	№10x1, №10x2, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЕТАНОВ	КК Терапія АТ, Румунія	р-н д/ін'єк. по 1 мл в амп. у кор.	30 мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЕТОРЗ	Аспіро Фарма Лімітед, Індія	р-н д/ін'єк. по 1 мл у фл.	30 мг/мл	№5, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЕТОРОЛ	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд (Виробнича дільниця – VI), Індія	р-н д/ін'єк. по 1 мл в амп. у бл.	30 мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЕТОРОЛ	Д-р Редді'с Лабораторіс Лімітед, Індія	р-н д/ін'єк. по 1 мл в амп. у бл.	30 мг/мл	№10	22,98	27,69/\$
	КЕТОРОЛ	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Виробнича дільниця - II, Індія	табл. вкриті п/о у бл.	10 мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЕТОРОЛ ГЕЛЬ	Д-р Редді'с Лабораторіс Лімітед, Індія	гель по 30 г у тубі	20 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЕТОРОЛ ЕКСПРЕС	Д-р Редді'с Лабораторіс Лімітед, Індія	табл., що дисперг. у бл.	10 мг	№10x1, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЕТОРОЛАК ГРІНДЕКС	АТ "Гріндекс" (виробник який відповідає за випуск серії, включаючи контроль серії/випробування)/ХБМ Фарма с.р.о. (всі стадії виробничого процесу, крім випуску серії), Латвія/Словаччина	р-н д/ін'єк. по 1 мл в амп. у конт. чар/уп.	30мг/мл	№5x20	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЕТОРОЛАК ГРІНДЕКС	АТ "Гріндекс" (виробник який відповідає за випуск серії, включаючи контроль серії/випробування)/ХБМ Фарма с.р.о. (всі стадії виробничого процесу, крім випуску серії), Латвія/Словаччина	р-н д/ін'єк. по 1 мл в амп. у конт. чар/уп.	30мг/мл	№5x2	12,08	26,85/€
	МЕДРОЛГІН	ФармаВіжн Сан. ве Тідж. А.Ш., Туреччина	р-н д/ін'єк. по 1 мл в амп. у конт. чар/уп.	30 мг/мл	№5x1	14,54	28,67/\$

• **Етодолак (Etodolac)**

Фармакотерапевтична група: M01AB08 - нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби. Похідні оцтової кислоти і споріднені сполуки

Основна фармакотерапевтична дія: похідне індолоцтової кислоти, що відрізняється від інших НПЗЗ наявністю ядра тетрагідропіраноїндолу; має протизапальні, анальгетичні та жарознижувальні властивості; знижує синтез простагландинів з арахідонової кислоти, інгібуючи фермент циклооксигеназу, завдяки чому зменшується чутливість рецепторів до медіаторів болю (гістаміну, брадикініну), зменшується ексудація, міграція лейкоцитів, та чутливість гіпоталамічних центрів терморегуляції до дії ендогенних пірогенів (інтерлейкіну-1 та ін.); має помірну селективність щодо ЦОГ-2, тому діє переважно у вогнищі запалення.

Показання для застосування ЛЗ: для невідкладного або тривалого лікування остеоартритів, РА^{БНФ}; больовий с-м^{БНФ} різного походження.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл. пролонг. дії: доросли рекомендована разова доза 600 мг^{БНФ} 1р/добу під час або після їжі, табл. ковтати цілою, запиваючи склянкою води; табл.: дорослим рекомендована доза становить 400-500 мг 2 р/добу вранці і ввечері після їжі, МДД - 1000 мг; за умови тривалого курсу терапії дозу коригувати через кожні 2-3 тижні застосування; при лікуванні больових станів внаслідок г. запальних процесів (зубний біль, міозити, тендиніти), після операційних больових синдромів курс лікування становить 5 діб; при головному і менструальному болях приймають по 1-2 табл./добу за необхідності не більше 3 діб; для ↓ ризику виникнення ПР слід застосовувати найменшу ефективну дозу протягом найкоротшого терміну лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тромбоцитопенія, нейтропенія, лейкопенія, панцитопенія, агранулоцитоз, анемія, апластична анемія, гемолітична анемія, подовження часу кровотечі, лімфаденопатія, неспецифічні АР та анафілаксія; анафілактоїдні р-ції; реактивність дихальних шляхів - БА, загострення БА, бронхоспазм та задишка; змішані шкірні розлади, включаючи різні види висипів, свербіж, кропив'янку, пурпуру, ангіоневротичний набряк, ексфолюативний та бульозний дерматоз (включаючи епідермальний некроліз та мультиформну еритему), депресія, головний біль, запаморочення, безсоння, сплутаність свідомості, порушення свідомості, галюцинації, дезорієнтація, парестезія, тремор, слабкість, нервозність, збудження, судоми, кома,

сонливість, зміна смаку, асептичний менінгіт (особливо у пацієнтів з аутоімунними захворюваннями - СЧВ, захворювання сполучної тканини) з такими симптомами, як ригідність м'язів потилиці, головний біль, нудота, блювання; розлади з боку очей (порушення зору), неврит зорового нерва, затуманення зору, фотофобія, кон'юнктивіт, шум у вухах, вертиго, глухота, набряки, АГ, аритмія, серцебиття, СН, васкуліт, припливи крові до обличчя, ризик розвитку судинних тромботичних явищ (ІМ, інсульт); пептична виразка, перфорація чи шлунково-кишкова кровотеча, іноді з летальним наслідком, особливо у пацієнтів літнього віку, нудота, блювання, діарея, диспепсія, біль в епігастрії, біль у животі, виразковий стоматит, запор, метеоризм, блювання кров'ю, мелена, виразки ШКТ, порушення травлення, печія, ректальна кровотеча, загострення коліту та хв. Крона, гастрит, панкреатит, глосит, спрага, сухість у роті, анорексія, відрижка, дуоденіт, езофагіт із стриктурами або кардіоспазмом чи без таких, порушення ф-ції печінки (білірубінурія), підвищення активності ферментів печінки, гепатит, холестатичний гепатит, жовтяниця, холестатична жовтяниця, ПН, некроз печінки, бульозні р-ції, включаючи с-м Стівенса-Джонсона і токсичний епідермальний некроліз, фоточутливість, підвищене потовиділення, гіперпігментація, алопеція, лущення шкіри, екхімози, дизурія, почастищення сечовипускання, нефротоксичність у різних формах, включаючи інтерстиціальний нефрит, нефротичний с-м, НН, підвищення рівня сечовини, підвищення рівня креатиніну, папілярний некроз нирок, олігурія/поліурія, протеїнурія, гематурія, цистит, камені в нирках, інфільтрація легеневої системи з еозинофілією, бронхіт, фарингіт, риніт, синусит, пригнічення дихання, пневмонія, носова кровотеча, підвищена втомлюваність, слабкість, астения, озноб, підвищення температури тіла, порушення водно-електролітного балансу, гіпернатріємія, гіперкаліємія, лейкорея, нерегулярна маткова кровотеча, гіперглікемія у пацієнтів з контрольованим рівнем цукру у хворих на ЦД, зміна маси тіла, інфекції, сепсис, летальні випадки

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату; наявність в анамнезі р-ції гіперчутливості (нападів БА, кропив'янки, риніту, ангіоневротичного набряку) внаслідок прийому АСК, ібупрофену або інших НПЗЗ; активна або рецидивна пептична виразка/кровотеча в анамнезі (два або більше окремих підтверджених випадки виразки або кровотечі); шлунково-кишкова кровотеча або перфорація, пов'язана з попередньою терапією НПЗЗ в анамнезі; цитопенія, тяжка печінкова, ниркова, СН; лікування болю при аортокоронарному шунтуванні; період вагітності і годування груддю; дитячий вік

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,4 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕТОВА-400	Іпка Лабораторіз Лтд., Індія	табл. вкриті п/о у бл.	400 мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕТОВА-500	Іпка Лабораторіз Лтд., Індія	табл. вкриті п/о у бл.	500 мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕТОЛ SR	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл. прол. дії у бл.	600 мг	№10х1, №14х1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

8.7.1.2. Похідні пропіонової кислоти

- **Ібупрофен (Ibuprofen)** * [сусп. орал., сироп, капс., гель, крем, капс., табл., в/о]

Фармакотерапевтична група: M01AE01 - НПЗП та протиревматичні засоби. Похідні пропіонової кислоти.

Основна фармакотерапевтична дія: анальгезуюча, жарознижувальна, протизапальна; механізм дії полягає в інгібуванні синтезу простагландинів - медіаторів болю, запалення та температурної р-ції у тканинах шляхом пригнічення активності циклооксигенази (ЦОГ-1, ЦОГ-2), що призводить до вираженого зниження синтезу простагландинів; оборотно пригнічує агрегацію тромбоцитів.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування головного болю, мігрені, зубного болю, дисменореї, невралгії, болю у спині, суглобах, м'язах^{БНФ}, ревматичний біль^{ВООЗ БНФ}, біль низької та помірної інтенсивності при менструаціях, при ознаках застуди і грипу^{БНФ}, пропасниці, лихоманка^{БНФ}; РА^{БНФ}, анкілозуючий спондиліт, остеоартрит, неревматоїдні (серонегативні) артропатії, гарячка^{БНФ} у дітей від 6 міс. до 12 р. з масою тіла не менше 7 кг: гарячка після імунізації^{БНФ}, ГРВІ, грип, біль при прорізуванні зубів, біль після видалення зуба, зубний біль, головний біль, біль у горлі, вухах, суглобах та м'язах, біль при розтягненні зв'язок та інші види болю, у т.ч. запального генезу, набряку або запаленні м'яких тканин біля суглобів (при бурситі, тендиніті, тендовагініті, тендосиновіті, плечолопатковому періартриті, ураженні зв'язок і суглобової капсули)^{БНФ}, післяопераційний біль.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл.: внутрішньо, короткотривало, дорослим і дітям старше 12 років: разова доза 200-400 мг, потім, при необхідності, по 200-400 мг кожні 4-6 год, МДД 1200 мг; капс.: внутрішньо, короткотривало, під час або після їжі, не розжовувати, запивати водою, дорослим і дітям з масою тіла ≥ 40 кг початкова доза становить 200-400 мг кожні 4-6 год, МДД 1200 мг (3 капс.), дітям з масою тіла ≤ 39кг МДД становить 20-30 мг/кг за 3-4 прийоми, інтервал 6-8 год., дітям з масою тіла 30- 39 кг рекомендована початкова доза 200 мг, МДД 800 мг, дітям з масою тіла 20-29 кг рекомендована початкова доза 200 мг, МДД 600 мг, приймати під час вживання їжі, не розжовуючи, запиваючи водою; капс. жув. м'які: перорально, розжувати перед ковтанням, короткотривало, рекомендована добова доза 20–30 мг/кг, яку розподіляють на рівні дози; діти 7 – 9 років: 2 капс. можна застосовувати 3 рази протягом 24 годин, діти 10 – 12 років: 3 капс. можна застосовувати 3 рази протягом 24 годин, приймати кожні 6 – 8 год (або з мін. інтервалом 6 годин, якщо потрібно); сусп. (200мг/5мл): перорально, короткотривало, добова доза 20-30 мг/кг маси тіла дитини, розділена на рівні дози, з інтервалом 6-8 год.; дітям віком від 6-11 міс. з масою тіла 7-9 кг - по 1,25 мл (50 мг) 3-4 р/добу; дітям 1-3 р. з масою тіла 10-15 кг - по 2,5 мл (100 мг) 3 р/добу; дітям 4-5 р. з масою тіла 16-19 кг - по 3,75 мл (150 мг) 3 р/добу; дітям 6-9 р. з масою тіла 20-29 кг - по 5 мл (200 мг) 3 р/добу; дітям 10-12 р. з масою тіла 30-40 кг - по 7,5 мл (300 мг) 3 р/добу; супоз.: короткотривало, ректально; максимальна разова доза не має перевищувати 10 мг/кг, інтервал дозування не повинен бути менше 6 год, МДД - 20 - 30 мг/кг маси тіла^{БНФ}, розподілена на 3 - 4 разові дози; сироп: короткотривало, перорально; діти віком від 12 років - 200-400 мг одноразово або за 3-4 р/добу, максимальна разова доза 400 мг, МДД 1200 мг, дітям з масою тіла більше 7 кг ДД 20 мг/кг розділена на 3-4

прийоми; гран. шип.: перорально, під час їжі (можна застосовувати натще пацієнтам, які не страждають на захворювання ШКТ), повністю розчинивши вміст пакета в склянці води; дорослі - рекомендована доза 1200-1800 мг/добу за 2-3 прийоми, МДД не більше 2400 мг за кілька прийомів; щоб мінімізувати небажані ефекти, застосовувати найнижчу ефективну дозу протягом найкоротшого періоду часу, необхідного для контролю симптомів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: порушення кровотворення (анемія, включаючи апластичну та гемолітичну, лейкопенія, тромбоцитопенія, нейтропенія, панцитопенія та агранулоцитоз, першими ознаками таких порушень є пропасниця, біль у горлі, поверхневі виразки в ротовій порожнині, грипоподібні симптоми, тяжка форма виснаження, кровотечі (носова, шкірна) та гематоми невідомої етіології), ризик виникнення артеріальних тромботичних ускладнень (ІМ, інсульт), р-ції гіперчутливості, що супроводжуються кропив'янкою та свербіжем, неспецифічні алергічні реакції та анафілаксія, анафілактичний шок; реактивність дихальних шляхів, БА, загострення БА, бронхоспазм та задишка, пурпура, ангіоневротичний набряк, диспное, ексфолиативні та бульозні дерматози, різні висипи на шкірі, тяжкі форми шкірних реакцій, токсичний епідермальний некроліз, синдром Стівенса-Джонсона та мультиформна еритема, фоточутливість, DRESS-синдром, гострий генералізований екзантематозний пустульоз, тяжкі р-ції гіперчутливості, симптоми яких можуть включати набряк обличчя, язика та гортані, тахікардію, артеріальну гіпотензію, тяжкий шок, головний біль, вертиго, асептичний менінгіт, риніт, ригідність потиличних м'язів, пропасниця, дезорієнтація, парестезії, сонливість і дратівливість, відчуття серцебиття, СН, набряк, АГ, васкуліт, біль в животі, нудота, езофагіт, диспепсія, діарея, метеоризм, запор, блювання, печія, виразкова хвороба шлунка та ДПК, шлунково-кишкова перфорація або шлунково-кишкова кровотеча, мелена, криваве блювання, іноді з летальним наслідком, виразковий стоматит, гастрит, панкреатит, загострення коліту і хв. Крона, локалізоване ректальне подразнення (супозиторії), короткочасне відчуття печіння у ротовій порожнині або горлі (сироп/гран. шип.), формування кишкових діафрагмоподібних стриктур, порушення ф-ції печінки, пошкодження печінки, гепатит (в т.ч. гострий) та жовтяниця, ПН, аномальні показники ф-ції печінки, алопеція, г. порушення ф-ції нирок, папілонекроз, сосочковий некроз, гіпернатріємія, підвищений рівень сечовини в плазмі/сироватці крові, зменшення екскреції сечовини, НН (в т.ч. гостра), нефротоксичність, включаючи інтерстиціальний нефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит та нефротичний с-м, психічні розлади, психотичні реакції, безсоння, збудження, депресія, тривожність, галюцинації, сплутаність свідомості, порушення зору, неврит зорового нерва, токсична нейропатія зорового нерва, порушення (зниження) слуху, дзвін/шум у вухах та запаморочення, зниження Нь, нездужання, втома, роздратованість, загострення запалення, пов'язаного з інфекцією (некротизуючий фасциїт), на фоні вітряної віспи можуть виникати тяжкі шкірні інфекції та ускладнення з боку м'яких тканин.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до ібупрофену або до будь-якого з компонентів препарату; р-ції гіперчутливості (БА, бронхоспазм, риніт, ангіоневротичний набряк або кропив'янка), які спостерігались раніше після застосування ібупрофену, АСК або інших НПЗЗ, виразкова хвороба шлунка та ДПК/кровотеча в активній формі або рецидиви в анамнезі (два і більше виражених епізоди виразкової хвороби чи кровотечі); шлунково-кишкова кровотеча або перфорація, пов'язана із застосуванням НПЗЗ, в анамнезі; запальне захворювання кишечника в активній формі, гострий або перенесений раніше виразковий коліт, хв. Крона; тяжке порушення функції печінки (ПН), нирок (НН - клубочкова фільтрація < 30 мл/хв - гран.шип./сироп), тяжка СН (гран. шип./сироп/сусп.орал./капс./табл. 400 мг - IV функціональний клас за критеріями Нью-Йоркської Асоціації Серця (NYHA)); останній триместр вагітності; цереброваскулярні або інші кровотечі в активній фазі, порушення кровотворення або згортання крові (геморагічний діатез) нез'ясованої етіології; тяжке зневоднення, що виникло внаслідок блювання, діареї або недостатнього споживання рідини; с-м недостатнього всмоктування глюкози-галактози або дефіцит сахарози-ізомальтози, непереносимість фруктози (сироп/сусп.орал./табл. 200 мг), підлітки з масою тіла менше 40 кг або діти молодше 12 років (капс.), діти з масою тіла менше 6 кг і віком до 3-х місяців (супоз.); алергія на арахіс чи сою в анамнезі (капс. жув.)

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1,2 г., перорально - дитяча добова доза не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БОФЕН	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	сусп. орал. по 100мл. у фл. скл. з доз. лож.	100мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БОФЕН	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	сусп. орал. по 100мл. у бан. з доз. лож.	100мг/5мл	№1	25,39	
	БОФЕН	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-	сусп. орал. по 100мл. у фл. плім. з доз. лож.	100мг/5мл	№1	25,39	

	фармацевтичний завод", Україна					
ІБУНОРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	капс. у бл.	200мг	№10x2	12,39	
ІБУНОРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	капс. у бл.	200мг	№10x1	13,77	
ІБУНОРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	капс. у бл.	400мг	№10x1	10,95	
ІБУНОРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	капс. у бл.	400мг	№10x2	9,85	
ІБУНОРМ БЕБІ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	сусп. орал. по 50мл у фл. з доз. пристр.	100мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ІБУНОРМ БЕБІ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	сусп. орал. по 100мл у фл. з доз. пристр.	100мг/5мл	№1	54,83	
ІБУНОРМ БЕБІ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	сусп.орал. по 200мл у фл. з доз. пристр.	100мг/5мл	№1	94,68	
ІБУПРОФЕН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма	капс. у бл.	200мг, 400мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

		"Вертекс" (виробництво з продукції in bulk Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я», Україна), Україна					
	ІБУПРОФЕН	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл. вкриті п/о у бл.	200мг	№10x5	4,22	
	ІБУПРОФЕН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. в/о у бл.	200мг	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ІБУПРОФЕН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. в/о у бл.	200мг	№10x90	3,08	
	ІБУПРОФЕН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. в/о у бл.	200мг	№10x5	4,72	
	ІБУПРОФЕН	ПАТ "Вітаміни", Україна	табл. в/о у бл.	200 мг	№10x1, №10x3, №10x5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ІБУПРОФЕН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	200мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ІБУПРОФЕН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	200мг	№10x5	4,16	
	ІБУПРОФЕН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	200мг	№10x2	4,41	
	ІБУТАРД 300	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	капс. прол. дії у бл.	300мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ІБУТАРД 300	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	капс. прол. дії у бл.	300мг	№10x2	9,46	
II.	АРОФЕН ДЛЯ ДІТЕЙ	Лабораторіос Базі – Індустрія Фармацевтика, С.А., Португалія	сусп. орал. зі смак. малин. та ябл. по 100 мл у конт.	100 мг/5 мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АРОФЕН ДЛЯ ДІТЕЙ	Фармеа, Франція	супоз. рект. у стрип.	60 мг	№5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АФФИДА ДЛЯ ДІТЕЙ	АЛКАЛОЇД АД Скоп'є, Північна Македонія	сусп. орал. зі смак. абрик. по 100 мл у фл.	100 мг/5 мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АФФИДА МАКС	Апотекс Недерланд Б.В., Нідерланди	табл. в/о у бл.	400 мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АФФИДА МАКС ЕКСПРЕС	Джелтек Прайвет Лімітед, Індія	капс. м'які у стрип.	400 мг	№10x1, №10x2, №10x3, №10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БЛОКМАКС	Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія	табл. вкриті п/о у бл.	200 мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БЛОКМАКС ДЛЯ ДІТЕЙ	АЛКАЛОЇД АД Скоп'є, Республіка Македонія	сусп. орал. по 100 мл у фл.	100 мг/5 мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БЛОКМАКС РАПІД	АЛКАЛОЇД АД Скоп'є, Республіка Македонія	табл. вкриті п/о у бл.	684 мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БЛОКМАКС ФОРТЕ	АЛКАЛОЇД АД Скоп'є, РЕСПУБЛІКА МАКЕДОНИЈА	табл. вкриті п/о у бл.	400 мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БРУФЕН®	Аббві С.р.л., Італія	сироп, по 100 мл у фл. з мірн.	100 мг/5 мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

		шпр.			
БРУФЕН®	Аббві С.р.л., Італія	гран. шипучі у саше	600 мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ
БРУФЕН® РАПІД	Гелтек Прайвет Лімітед, Індія	капс. м'які у бл.	400 мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ
БРУФЕН® РЕТАРД	Фамар А.В.Е. Антоусса Планта, Греція	табл. прол. дії вкриті п/о у бл.	800 мг	№10x1, №10x2, №14x1	відсутня у реєстрі ОБЦ
ГОФЕН 200	Мега Лайфсайенсіз Паблік Компані Лімітед, Таїланд	капс. м'які у бл. в конв.	200 мг	№(10x1)x5, №(10x1)x6	відсутня у реєстрі ОБЦ
ГОФЕН 400	Мега Лайфсайенсіз Паблік Компані Лімітед, Таїланд	капс. м'які у бл. в конв.	400 мг	№(10x1)x5, №(10x1)x6	відсутня у реєстрі ОБЦ
ЄВРОФАСТ	Марксанс Фарма Лтд, Індія	капс. жел. м'які у бл.	200мг, 400мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ
ІБУПРОМ	ТОВ ЮС Фармація, Польща	табл., в/о у саше, бл. та фл.	200 мг	№2, №10, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ
ІБУПРОМ ДЛЯ ДІТЕЙ	Фармасьєрра Мануфекчурін, С.Л. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії готового лікарського засобу)/Фамар Нідерленд Б.В. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії готового лікарського з, Іспанія/Нідерланди/Іспанія/Польща/Іспанія	сусп. орал. по 100мл, 150мл, 200мл у фл. з шпр.-доз.	100мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ
ІБУПРОМ ДЛЯ ДІТЕЙ ФОРТЕ	Фармасьєрра Мануфекчурін, С.Л. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії готового продукту)/Біолаб С.Л. (альтернативна дільниця для проведення мікробіологічного контролю (субдоговір з виробником Фармалідер, С.А.))/Фамар Н, Іспанія/Іспанія/Нідерланди/Іспанія/Польща	сусп. орал. по 30 мл, 100 мл, 150 мл, 200 мл у фл. з шпр.-доз.	200 мг/5 мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ
ІБУПРОМ МАКС	ТОВ ЮС Фармація (виробник, відповідальний за упаковку, контроль та випуск серії готового продукту)/Шуефарм Сервісез Лтд (виробник, відповідальний за виробництво, контроль та випуск продукту in bulk), Польща/Велика Британія	табл., в/о у бл. та фл.	400 мг	№6, №12, №24	відсутня у реєстрі ОБЦ
ІБУПРОМ СПРИНТ КАПС	ТОВ ЮС Фармація (виробник, відповідальний за упаковку, контроль та випуск серії готового продукту)/Патеон Софтджелс Б.В. ((виробник, відповідальний за виробництво, контроль та випуск продукції in bulk)), Польща/Нідерланди	капс. м'які у бл.	200 мг	№6, №10, №12, №24, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ
ІБУПРОМ СПРИНТ МАКС	ТОВ ЮС Фармація (первинне та вторинне	капс. м'які у бл. в кор.	400 мг	№6, №10, №20	відсутня у реєстрі ОБЦ

	пакування, контроль та випуск серії)/Патеон Софтджелс Б.В. (виробництво та контроль якості продукту in bulk, контроль в процесі виробництва, контроль серії)/Проксі Лабораторіз Б.В. (контроль серії), Польща/Нідерланди/Нідерланди					
ІБУФЕН® ДЛЯ ДІТЕЙ МАЛИНА	Медана Фарма Акціонерне Товариство, Польща	сусп. орал. по 100 мл у пласт. фл. з адапт. з шприц.-доз.	100 мг/5 мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ІБУФЕН® ДЛЯ ДІТЕЙ ПОЛУНИЦЯ	МЕДАНА ФАРМА Акціонерне Товариство, Польща	сусп. орал. по 100 мл, 120 мл у пласт. фл. з шприц.-доз.	100 мг/5 мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ІБУФЕН® ФОРТЕ	Медана Фарма Акціонерне Товариство, Польща	сусп. орал. з полун. аром. по 40 мл, 100 мл у фл. з шпр.-доз.	200мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ІБУФЕН® ЮНІОР	Медана Фарма Акціонерне Товариство, Польща	капс. м'які у бл.	200 мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ІМЕТ®	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробник, що виконує виробництво препарату "in bulk" та контроль серії, виробник, що виконує пакування, контроль та випуск серії)/Адванс Фарма ГмбХ (виробник, що виконує виробництво препарату "in bulk", пакування та контроль серії)/Менарін, Німеччина/Німеччина/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ІМЕТ®	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробник, що виконує виробництво препарату "in bulk" та контроль серії, виробник, що виконує пакування, контроль та випуск серії)/Адванс Фарма ГмбХ (виробник, що виконує виробництво препарату "in bulk", пакування та контроль серії)/Менарін, Німеччина/Німеччина/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№10x2	11,01	29,36/€
ІМЕТ®	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробник, що виконує виробництво препарату "in bulk" та контроль серії, виробник, що виконує пакування, контроль та випуск серії)/Адванс Фарма ГмбХ (виробник, що виконує виробництво препарату "in bulk", пакування та контроль серії)/Менарін, Німеччина/Німеччина/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№10x1	12,33	29,36/€
ІМЕТ® ДЛЯ ДІТЕЙ 2	Лабораторіос Алкала	сусп. орал. по	100 мг/5 мл	№1	відсутня у	

%	Фарма, С.Л. (виробництво "in bulk", пакування, контроль та випуск серій)/БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (випуск серій), Іспанія/Німеччина	100 мл, 150 мл, 200 мл у фл. з доз. прист.			реєстрі ОБЦ
ІМЕТ® ДЛЯ ДІТЕЙ 2 %	Фармасьєра Меньюфекчерінг С.Л. (виробництво "in bulk", пакування, контроль та випуск серій)/БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (випуск серій)/Лабораторіос Алкала Фарма, С.Л. (виробництво "in bulk", пакування, контроль та випуск серій), Іспанія/Німеччина/Іспанія	сусп. орал. по 100 мл, 150 мл, 200 мл у фл. з доз. прист.	100 мг/5 мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ
ІМЕТ® ДЛЯ ДІТЕЙ 4 %	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (випуск серій)/Лабораторіос Алкала Фарма, С.Л. (виробництво "in bulk", пакування, контроль та випуск серій), Німеччина/Іспанія	сусп. орал. по 100 мл, 200 мл у фл. з доз. прист.	200 мг/5 мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ
ІМЕТ® ДЛЯ ДІТЕЙ 4 %	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (випуск серій)/Фармасьєра Меньюфекчерінг С.Л. (виробництво "in bulk", пакування, контроль та випуск серій)/Лабораторіос Алкала Фарма, С.Л. (виробництво "in bulk", пакування, контроль та випуск серій), Німеччина/Іспанія/Іспанія	сусп. орал. по 100 мл, 200 мл у фл. з доз. прист.	200 мг/5 мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ
КАФФЕТІН® ЛЕДІ	Алкалоїд АД Скоп'є, Македонія, колишня Югославська Республіка	табл. вкриті п/о у бл.	200 мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ
КАФФЕТІН® ЛЕДІ	Алкалоїд АД Скоп'є, Північна Македонія	табл. вкриті п/о у бл.	200 мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ
МІНІДОЛ	Олів Хелскере, Індія	капс. м'які желат. у бл.	200 мг	№4, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ
НЕОФЕН БЕЛУПО ФОРТЕ	Белупо, ліки та косметика, д.д., Хорватія	табл. вкриті п/о у бл.	400 мг	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ
НУРОФЄН®	Рекітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Велика Британія	табл., в/о у бл.	200 мг	№6, №8, №12, №24	відсутня у реєстрі ОБЦ
НУРОФЄН® 12+	Рекітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Велика Британія	табл., в/о у бл.	200 мг	№12, №24	відсутня у реєстрі ОБЦ
НУРОФЄН® ДЛЯ ДІТЕЙ	Рекітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед (випуск серії готового лікарського засобу, первинне та вторинне пакування)/Патеон Софтджелс Б.В. (виробництво та пакування in bulk, контроль серії та випуск готового лікарського засобу (хімічний, фізичний та мік, Велика Британія/Нідерланди/Нідерланди)	капс. жув. м'які у бл.	100 мг	№12x1, №12x2	відсутня у реєстрі ОБЦ
НУРОФЄН® ДЛЯ ДІТЕЙ	Фамар А.В.Е. Завод Авлон, Греція	супоз. у бл.	60мг	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ

НУРОФЕН® ДЛЯ ДІТЕЙ	Рекітт Бенкізер Хелскер (Юкей) Лімітед (виробництво in bulk, пакування (первинне та вторинне), контроль якості, випуск серії)/Рекітт Бенкізер Хелскер Індія Прайвет Лімітед (виробництво in bulk, пакування (первинне та вторинне), контроль якості), Велика Британія/Індія	сусп. орал. з полун. та апел. смак., по 100мл, 200мл у фл.	100мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ
НУРОФЕН® ДЛЯ ДІТЕЙ ФОРТЕ	Рекітт Бенкізер Хелскер (Юкей) Лімітед, Велика Британія	сусп. орал. з полун. та апел. смак., по 100мл, 150мл у фл.	200мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ
НУРОФЕН® ЕКСПРЕС УЛЬТРАКАП	Рекітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед (відповідальний за первинне, вторинне пакування, контроль якості готового продукту та випуск серії)/Патеон Софтжелс Б.В. (відповідальний за виробництво in bulk, включаючи проведення контролю якості)/РБ Хелс Ману, Велика Британія/Нідерланди/США	капс. м'які у бл.	200 мг	№4x1, №10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ
НУРОФЕН® ЕКСПРЕС ФОРТЕ	Рекітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед (відповідальний за пакування та випуск серії)/Патеон Софтжелс Б.В. (відповідальний за виробництво in bulk), Велика Британія/Нідерланди	капс. м'які у бл.	400мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ
НУРОФЕН® ФОРТЕ	Рекітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Велика Британія	табл. в/о у бл.	400 мг	№12	відсутня у реєстрі ОБЦ
ОРАФЕН	ЛАБОРАТОРІО АЛЬДО-ЮНІОН, С.Л., Іспанія	сусп. орал. з апельс. смак., по 200 мл у фл.	100 мг/5 мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ
ФАСПІК	Замбон Швейцарія	гран. д/орал. р-ну з м'ятн. смак. у спар. пак.	200 мг	№12	відсутня у реєстрі ОБЦ
ФАСПІК	Замбон С.П.А., Італія	табл. в/о у бл.	400 мг	№6x1	відсутня у реєстрі ОБЦ

8.7.1.3. Оксиками

- **Мелоксикам (Meloxicam)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: M01AC06 - нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна, анагетична, антипіретична дії; ЛЗ класу енолієвої к-ти, що виявив високу протизапальну активність на всіх стандартних моделях запалення; точний механізм дії залишається невідомим, проте є загальний механізм дії для всіх НПЗП (включаючи мелоксикам): пригнічення біосинтезу простагландинів, які є медіаторами запалення.

Показання для застосування ЛЗ: короткотривале симптоматичне лікування загострення остеоартрозу; довготривале симптоматичне лікування РА ^{ПМД} та анкілозивного спондиліту ^{БНФ}, короткотривале симптоматичне лікування г. нападу РА та анкілозивного спондиліту, коли р/ос та per rectum шляхи застосування не можуть бути застосовані.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: загострення остеоартрозу: 7,5 мг/добу, якщо необхідно, дозу можна збільшити до 15 мг/добу ^{БНФ}; РА, анкілозивний спондиліт: 15 мг/добу. Згідно з терапевтичним ефектом дозу можна зменшити до 7,5 мг/добу ^{БНФ}; не перевищувати дозу 15 мг/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анемія; відхилення показників аналізу крові від норми (включаючи зміну кількості лейкоцитів), лейкопенія, тромбоцитопенія, агранулоцитоз, цитопенія, ризик розвитку

судинних тромботичних явищ (ІМ, інсульт); АР, анафілактична р-ція, анафілактоїдна р-ція, анафілактичний шок; зміна настрою, нічні кошмари; сплутаність свідомості, дезорієнтація, безсоння; головний біль; запаморочення, сонливість; розлади функції зору (нечіткість зору); кон'юнктивіт; вертиго, шум/дзвін у вухах; відчуття серцебиття; СН; підвищення АТ, АГ, припливи, гіперемія; БА у пацієнтів з алергією на ацетилсаліцилову кислоту та інші НПЗЗ; інфекції ВДШ, кашель; диспепсія, нудота, блювання, біль у животі, запор, метеоризм, відрижка, діарея; прихована або макроскопічна шлунково-кишкова кровотеча, мелена, блювання кров'ю, виразковий стоматит, гастрит, відрижка; коліт, гастродуоденальна виразка, езофагіт; шлунково-кишкова перфорація, панкреатит, загострення коліту та хв. Крона; порушення показників ф-ції печінки (підвищення трансаміназ або білірубіну); гепатит; жовтяниця, ПН; ангіоневротичний набряк, свербіж, висипання; с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, кропив'янка; бульозний дерматит, мультиформна еритема; р-ції фоточутливості, ексфоліативний дерматит; затримка натрію та води, гіперкаліємія, зміни показників ф-ції нирок (підвищення КлКр та/або сечовини сироватки крові); ГНН, інтерстиціальний нефрит, гострий тубулярний некроз, нефротичний синдром, папілярний некроз, ІСШ, порушення частоти сечовипускання, гостра затримка сечі; жіноче безпліддя, затримка овуляції, набряк, включаючи набряк нижніх кінцівок; грипоподібні симптоми; артралгія, біль у спині, ознаки та симптоми, пов'язані з суглобами, затвердіння та біль в місці ін'єкції (ін'єкц.), печіння, свербіж в аноректальній ділянці(супоз.)

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до складових ЛЗ, НПЗЗ, кислота ацетилсаліцилова; симптоми астми, носові поліпи, ангіоневротичний набряк або кропив'янка після прийому кислоти ацетилсаліцилової чи інших НПЗЗ в анамнезі; ІІІ триместр вагітності; шлунково-кишкова кровотеча або перфорація, пов'язана з попередньою терапією НПЗЗ в анамнезі; активна або рецидивуюча пептична виразка/кровотеча в анамнезі (два або більше окремих підтверджених випадки виразки або кровотечі); тяжка ПН; тяжка НН без застосування діалізу; шлунково-кишкова кровотеча, цереброваскулярна кровотеча в анамнезі або інші порушення згортання крові; розлади гемостазу або одночасне застосування антикоагулянтів; тяжка СН; лікування періопераційного болю при коронарному шунтуванні; вік пацієнта до 18 років (табл. та супоз. до 16 років); проктит в анамнезі та ректальна кровотеча (супоз.)

Визначена добова доза (DDD): перорально - 15 мг., парентерально - 15 мг., ректально - 15 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	АЛГЕЗИКАМ®	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін`єк. по 1,5 мл в амп. у бл.	10мг/мл	№5x1	27,00	
	АЛСОКАМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін`єк. по 1,5 мл в амп. у бл.	10 мг/мл	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНФЛАМІН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	р-н д/ін`єк. по 1,5 мл в амп. у пач., у бл.	10мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНФЛАМІН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	р-н д/ін`єк. по 1,5 мл в амп. у пач., у бл.	10мг/мл	№100	27,00	
	ІНФЛАМІН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	р-н д/ін`єк. по 1,5 мл в амп. у пач., у бл.	10мг/мл	№5x1	27,00	
	ІНФЛАМІН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	супоз. рект. у бл.	0,015г	№5x2	14,70	
	МЕЛОКСИКАМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	табл. у бл.	0,0075г, 0,015г	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МЕЛОКСИКАМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	табл. у бл.	0,0075г	№10x2	5,50	
	МЕЛОКСИКАМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	табл. у бл.	0,015г	№10x2	3,71	
	МЕЛОКСИКАМ-БЕРКАНА	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	р-н д/ін`єк. по 1,5мл в амп. у бл.	10 мг/мл	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МЕЛОКСИКАМ-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	7,5мг, 15мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МЕЛОКСИКАМ-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	15мг	№10x2	3,37	

МЕЛОКСИКАМ-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	7,5мг	№10x2	4,01	
МЕЛОКСИКАМ- МІКРОХІМ	ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна	табл. у бл. або бан.	7,5мг, 15мг	№10x2, №20	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МЕЛОКСИКАМ- ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії циклу виробництва та випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії циклу виробництва крім випуску серії), Україна/Україна	р-н д/ін`ек. по 1,5 мл в амп. пач. конт. чар. уп.	10мг/мл	№5	31,85	
МЕЛОКСИКАМ- ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії циклу виробництва та випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії циклу виробництва крім випуску серії), Україна/Україна	р-н д/ін`ек. по 1,5 мл в амп. або фл. у бл., пач.	10мг/мл	№5x1	31,85	
МЕЛСІ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/ін`ек. по 1,5 мл у фл. в конт. чар. уп.	10 мг/мл	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МЕЛСІ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	7,5мг	№10x2	6,20	
МЕЛСІ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	15мг	№10x2	5,65	
НОВОКСИКАМ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/ін`ек. по 1,5 мл у фл. в конт. чар. уп.	10мг/мл	№5x1	28,00	
РЕВМАЛГІН	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	супоз. рект. у стрип.	15мг	№5x2	15,59	
РЕВМАЛГІН	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	супоз. рект. у стрип.	15мг	№5x1	17,30	
РЕВМАЛГІН	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП"/ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (весь виробничий процес готового лікарського засобу, включаючи вторинне пакування, за винятком випуску серії та контролю якості), Україна/Україна	р-н д/ін`ек. по 1,5 мл в амп. у пач. конт. чар. уп.	10мг/мл	№5	34,25	
РЕВМАЛГІН	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП"/ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (весь виробничий процес готового лікарського засобу, включаючи вторинне пакування, за винятком випуску серії та контролю якості), Україна/Україна	р-н д/ін`ек. по 1,5 мл в амп. у бл., пач., конт. чар. уп.	10мг/мл	№5x1	34,25	
РЕВМАЛГІН	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	табл. у бл.	7,5мг	№10x2	9,31	
РЕВМАЛГІН	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	табл. у бл.	15мг	№10x2	7,09	

	РЕВМАЛГИН	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	табл. у бл.	15мг	№10x1	7,29	
	РЕВМАСТОП	ТОВ "НІКО" (контроль, випуск серії)/ДЕМО СА ФАРМАСЬЮТИКАЛ ІНДАСТРІ (нерозфасований продукт, первинна упаковка, вторинна упаковка, контроль), Україна/Греція	р-н д/ін`ек. по 1,5 мл в амп. у пач.	10 мг/мл	№5	25,80	
	РЕВМОКСИКАМ®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін`ек. по 1,5 мл в амп. у пач. або бл.	10мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	РЕВМОКСИКАМ®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін`ек. по 1,5 мл в амп. у пач. або бл.	10мг/мл	№5x1	28,00	
	РЕВМОКСИКАМ®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін`ек. по 1,5 мл в амп. у пач. або бл.	10мг/мл	№3x1	28,33	
	РЕВМОКСИКАМ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	7,5мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	РЕВМОКСИКАМ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	7,5мг	№10x2	9,20	
	РЕВМОКСИКАМ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	15мг	№10x2	6,75	
	РЕВМОКСИКАМ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	15мг	№10x1	7,80	
	РЕВМОКСИКАМ®	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"/ПАТ "Фармак", Україна/Україна	супоз. рект. у бл.	15мг	№5x1	15,60	
II.	АЛГЕЗИКАМ®	КО "МАГІСТРА С енд С" Т. О. В., Румунія	табл. у бл.	15 мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АРОКСИКАМ	Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт III), Індія	табл. у бл.	7,5мг	№10x1	10,01	25,52/\$
	АРОКСИКАМ	Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт III), Індія	табл. у бл.	15мг	№10x1	6,01	25,52/\$
	АСПІКАМ	Біофарм Лтд, Польща	табл. у бл.	7,5мг, 15мг	№10x1, №10x2, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛОКСИДОЛ	К.О. Ромфарм Компані С.Р.Л., Румунія	р-н д/ін`ек. по 1,5 мл в амп. у конт. чар. уп.	15мг/1,5мл	№3x1	31,31	28,67/\$
	ЛОКСИДОЛ	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл. у бл.	15мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛОКСИДОЛ	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл. у бл.	15мг	№10x1	9,57	27,05/\$
	ЛОКСИДОЛ	ФармаВіжн Сан. ве Тідж. А.Ш., Туреччина	р-н д/ін`ек. по 1,5 мл в амп. в кор.	15 мг/1,5 мл	№3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МЕДИКСИКАМ	ХЕЛП С.А., Греція	р-н д/ін`ек. по 1,5 мл в амп. у пач.	15мг/1,5мл	№5	32,00	27,05/\$
	МЕЛБЕК®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл. у бл.	7,5мг, 15мг	№10x1, №4x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МЕЛБЕК®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл. у бл.	15мг	№10x3	10,31	22,90/\$
	МЕЛБЕК®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл. у бл.	7,5мг	№10x3	11,38	22,90/\$
	МЕЛБЕК®	ІДОЛ ІЛАЧ ДОЛУМ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	р-н д/ін`ек. по 1,5 мл в амп.	15 мг/1,5 мл	№3	31,00	26,30/\$

МЕЛОКС	Медокемі ЛТД (Ампульний Ін'єкційний Завод), Кіпр	р-н д/ін`ек. по 1,5 мл в амп. у бл.	15мг/1,5мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МЕЛОКС	Медокемі ЛТД (Ампульний Ін'єкційний Завод), Кіпр	р-н д/ін`ек. по 1,5 мл в амп. у бл.	15мг/1,5мл	№5x1	24,21	30,26/€
МЕЛОКС	Медокемі ЛТД (Центральний Завод), Кіпр	табл. у бл.	15 мг	№10x1	6,05	30,26/€
МЕЛОКСА КСАНТІС	Санека Фармасьютикалз АТ, Словацька Республіка	табл. у бл.	15 мг	№10x1, №10x2, №10x3, №10x5, №10x6, №10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МЕЛОКСИК	Фармацевтичний Завод "Польфарма" С. А., Польща	р-н д/ін`ек. по 1,5 мл в амп. у конт. чар. уп.	15мг/1,5мл	№3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МЕЛОКСИК	Фармацевтичний Завод "Польфарма" С. А., Польща	р-н д/ін`ек. по 1,5 мл в амп. у конт. чар. уп.	15мг/1,5мл	№5	21,47	25,02/\$
МЕЛОКСИКАМ-САНОФІ	ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка	р-н д/ін`ек. по 1,5 мл в амп. у кор.	15 мг/1,5 мл	№5, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МЕЛОКСИКАМ-ТЕВА	Ципла Лімітед (виробництво продукції in bulk)/Меркле ГмбХ (первинна та вторинна упаковка, контроль якості, дозвіл на випуск серії), Індія/Німеччина	табл. у бл.	7,5мг, 15мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МЕЛОКСИКАМ-ТЕВА	Хелп С.А., Греція	р-н д/ін`ек. по 1,5 мл в амп. у пласт. конт.	15 мг/1,5 мл	№5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МІЛІКСОЛ	ХЕЛП С.А., Греція	р-н д/ін`ек. по 1,5 мл в амп.	15мг/1,5мл	№5	25,00	
МОВАЛГІН	Фармасайнс Інк., Канада	табл. у бл.	7,5 мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МОВАЛГІН	Фармасайнс Інк., Канада	табл. у бл.	15 мг	№10x1	8,37	27,00/\$
МОВАЛІС®	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко. КГ/Берінгер Інгельхайм Еллас А.Е., Німеччина/Греція	табл. у бл.	7,5мг	№10x2	25,15	31,83/€
МОВАЛІС®	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко. КГ/Берінгер Інгельхайм Еллас А.Е., Німеччина/Греція	табл. у бл.	15мг	№10x2	16,71	31,83/€
МОВАЛІС®	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко. КГ/Берінгер Інгельхайм Еллас А.Е., Німеччина/Греція	табл. у бл.	15мг	№10x1	19,42	31,83/€
МОВАЛІС®	Берінгер Інгельхайм Еспана, СА (виробництво та первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості та випуск серії), Іспанія	р-н д/ін`ек. по 1,5 мл в амп. в кор.	15мг/1,5мл	№5	34,06	31,83/€
МОВІКСИКАМ®	Хелп СА, Греція	р-н д/ін`ек. по 1,5 мл в амп. в конт.	15 мг/1,5 мл	№5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МОВІКСИКАМ® ОДТ	Алпекс Фарма СА (повний цикл виробництва)/Ламп	табл., що дисперг. у бл.	7,5мг, 15мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	

		Сан Просперо С.п.А. (первинне та вторинне пакування), Швейцарія/Італія				
ПАРТІЯЛ		АНФАРМ ХЕЛЛАС С.А., Греція	р-н д/ін'єк. по 1,5 мл в амп. в кор	15 мг/1,5 мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ
ПАРТІЯЛ		АНФАРМ ХЕЛЛАС С.А., Греція	табл. у бл.	15 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ

8.7.1.4. Фенамати (препарати мефенамінової кислоти)

- **Кислота мефенамінова (Mefenamic acid) ****

Фармакотерапевтична група: M01AG01- нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби

Основна фармакотерапевтична дія: механізм протизапальної дії обумовлений здатністю пригнічувати синтез медіаторів запалення, знижувати активність лізосомальних ферментів, які беруть участь у запальній р-ції; стабілізує білкові ультраструктури та мембрани клітин, зменшує проникність судин, порушує процеси окисного фосфорилування, пригнічує синтез мукополісахаридів, гальмує проліферацію клітин у вогнищі запалення, підвищує резистентність клітин та стимулює загоєння ран; жарознижувальні властивості пов'язані зі здатністю гальмувати синтез простагландинів та впливати на центр терморегуляції; у механізмі знеболювальної дії, поряд із впливом на центральні механізми больової чутливості, істотну роль відіграє місцевий вплив на вогнище запалення та здатність гальмувати утворення альгогенів (кініни, гістамін, серотонін); стимулює утворення інтерферону.

Показання для застосування ЛЗ: ГРВІ та грип, біль низької та середньої інтенсивності^{БНФ}; м'язовий, суглобовий, травматичний, зубний, головний біль різної етіології, післяопераційний^{БНФ} і післяпологовий біль, первинна дисменорея, дисфункціональні менорагії^{БНФ}, у т.ч. спричинені наявністю внутрішньоматкових контрацептивів, за відсутності патології тазових органів; запальні захворювання опорно-рухового апарату: РА^{БНФ}, ревматизм, хв. Бехтерева.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл./капс. внутрішньо, після їжі, запиваючи молоком; дорослим і дітям старше 12 років - 250-500 мг 3-4 р/день^{БНФ}; за показаннями та при хорошій переносимості дозу підвищують до МДД - 3000 мг, після досягнення терапевтичного ефекту дозу знижують до 1000 мг/добу; дітям 5-12 років по 250 мг 3-4 р/день; курс лікування при захворюваннях суглобів може тривати від 20 днів до 2-х місяців і більше; при лікуванні больового синдрому курс лікування триває до 7 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль в епігастральній ділянці, анорексія, печія, нудота, метеоризм, блювання, ентероколіт, коліт, заострення коліту та хв. Крона, гастрит, гепатотоксичність, стеаторея, холестатична жовтяниця, гепатит, панкреатит, гепаторенальний с-м, геморагічний гастрит, пептична виразка, з кровотечею чи без такої, мелена, виразковий стоматит; шлунково-кишкові кровотечі, диспепсія, запор, діарея, перфорація або шлунково-кишкова кровотеча, іноді з летальним наслідком, особливо у пацієнтів літнього віку; підвищення рівня печінкових ферментів у плазмі крові; АГ, аритмія, застійна СН, периферичні набряки, синкопе, артеріальна гіпотензія, серцебиття, задихка, тромботичні ускладнення (ІМ або інсульт); диспное, бронхоспазм; дизурія, цистит; порушення ф-ції нирок, альбуміурія, гематурія, олігурія або поліурія, НН, включаючи некроз сосочків, г. інтерстиціальний нефрит, нефротичний с-м, алергічний гломерулонефрит, гіпонатріємія, гіперкаліємія; апластична анемія, аутоімунна гемолітична анемія, подовження часу кровотечі, еозінофілія, лейкопенія з ризиком інфекції, сепсису, дисемінованої внутрішньосудинної коагуляції, тромбоцитопенія, зниження гематокриту, тромбоцитопенічна пурпура, агранулоцитоз, нейтропенія, панцитопенія, гіпоплазія кісткового мозку; сонливість або безсоння, слабкість, дратівливість, збудження, головний біль, затуманення зору, судоми, сплутаність свідомості, депресія, галюцинації, неврит зорового нерва, парестезії, запаморочення, ригідність потиличних м'язів, лихоманка, втрата орієнтації; дзвін/біль у вухах, оталгія, порушення зору, оборотна втрата здатності розрізняти кольори, подразнення очей; пурпура, р-ції гіперчутливості, шкірні висипання/свербіж, набряк обличчя, алергічний риніт, ангіоневротичний набряк, набряк гортані, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, мультиформна еритема, кропив'янка, бульозний пемфігус, фоточутливість, БА, анафілаксія; порушення толерантності до глюкози у пацієнтів, хворих на ЦД, асептичний менінгіт, пітливість, підвищена втомлюваність, нездужання, поліорганна недостатність, гіпертермія, позитивна р-ція у деяких тестах на наявність мефенамінової кислоти та її метаболітів у жовчі та сечі

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату; бронхоспазм, набряк Квінке, риніт, БА або кропив'янка в анамнезі, що виникли після застосування АСК або інших НПЗЗ; одночасний прийом специфічних інгібіторів ЦОГ-2; виразкова хвороба шлунка та ДПК, у т.ч. в анамнезі, запальні захворювання кишечника, захворювання органів кровотворення, тяжка СН, тяжкі порушення ф-ції печінки або нирок, шлунково-кишкові кровотечі або перфорації, спричинені прийомом НПЗЗ., лікування болю після операції аортокоронарного шунтування.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АМІФЕНА ІС	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. вкриті п/о у бл.	250мг, 500мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МЕФЕНАМІНКА®	ПрАТ "Фармацевтична	табл. вкриті п/о	500мг	№10x2	6,97	

	фірма "Дарниця", Україна	у конт. чар/уп.					
МЕФЕНАМІНКА®	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. вкриті п/о у конт. чар/уп.	500мг	№10x1	7,07		
МЕФЕНАМІНОВА КИСЛОТА	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	табл. у бл.	500 мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ		
МЕФЕНАМІНОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	500мг	№10x2	4,75		
II. МЕФЕНАМІНОВА КИСЛОТА	Фламінго Фармасьютикалс Лтд., Індія	капс. у бл.	250мг	№10x2	5,69	23,69/\$	
МЕФЕНАМІНОВА КИСЛОТА	Фламінго Фармасьютикалс Лтд., Індія	капс. у бл.	500мг	№10x2	3,91	23,69/\$	

8.7.1.5. Коксиби

- **Целекоксиб (Celecoxib)** ^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: M01AH01 - протизапальні та антиревматичні ЛЗ. Коксиби.

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна, анагетична, антипіретична дія; механізм дії полягає в пригніченні синтезу простагландинів, головним чином шляхом пригнічення циклооксигенази-2 (ЦОГ-2).

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування остеоартриту ^{БНФ}, РА ^{ГМД} ^{БНФ} та анкілозивного спондиліту ^{БНФ}; г. біль у дорослих; первинна дисменорея.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: остеоартрит: 200 мг/добу за 1-2 прийоми; РА: 100-200 мг 2 р/добу; анкілозивний спондиліт: 200 мг/добу за 1-2 прийоми ^{БНФ}, за відсутності ефекту ч/з 6 тижн. лікування варто спробувати 400 мг/добу ^{БНФ}, за відсутності ефекту ч/з 6 тижн. застосування в дозі 400 мг/добу ^{БНФ}, розглянути можливість застосування альтернативних видів лікування; г. біль і первинна дисменорея: початкова рекомендована доза 400 мг; за необхідності у перший день застосувати додаткову дозу 200 мг, у наступні дні рекомендована доза 200 мг 2 р/добу за потреби.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль у животі/шлунку; діарея; диспепсія; метеоризм; нудота; біль у спині; випадкове ушкодження; периферичні набряки; запаморочення; головний біль; безсоння; фарингіт; риніт; синусит; інфекція ВДШ; висипання, запор, дивертикуліт, дисфагія, відрижка, езофагіт, гастрит, гастроентерит, гастроєзофагеальний рефлюкс, геморої, хітальна грижа, мелена, сухість у роті, стоматит, тенезми, блювання; гіпертермія; погіршення перебігу АГ, стенокардія (в т.ч. нестабільна), функціональна недостатність аортального клапану, атеросклероз коронарної артерії, синусова брадикардія, гіпертрофія шлуночка, ІХС, ІМ; ішемічний інсульт; тромбоз глибоких вен, васкуліт; помутніння склоподібного тіла, крововилив у кон'юнктиву; анорексія, стривоженість, підвищений апетит, депресія, нервозність, сонливість, бронхіт, бронхоспазм, посилення бронхоспазму, кашель, задишка, ларингіт, назофарингіт, пневмонія, алопеція, дерматит, р-ції фоточутливості, свербіж, еритематозні висипання, макуло-папульозні висипання, захворювання шкіри, сухість шкіри, підвищена пітливість, кропив'янка, панікуліт, контактний дерматит, альбумінурія, цистит, дизурія, гематурія, часте сечовипускання, СКХ; анемія (в т.ч. апластична), агранулоцитоз, панцитопенія, лейкопенія; екхімоз, носова кровотеча, тромбозитемія; тромбозитопенія; неприємність, застійна СН, фібриляція шлуночків, тромбоемболія легеневої артерії, г. порушення мозкового кровообігу, периферична гангрена, тромбофлебіт, непрохідність кишечника, перфорація кишки, шлунково-кишкова кровотеча, коліт з кровотечею, перфорація стравоходу, панкреатит, кишкова непрохідність, сепсис, раптовий летальний наслідок, холелітаз, некроз печінки, гепатит, жовтяниця, печінкова недостатність, атаксія, суїцид, ГНН, інтерстиціальний нефрит, підвищення рівня азоту сечі, нефролітаз, підвищення рівня креатинфосфокінази в крові, гіперхолестеринемія, гіперглікемія, гіпоглікемія, гіпонатріємія, гіпокаліємія, підвищення рівня небілкового азоту, підвищення рівня креатиніну, підвищення рівня лужної фосфатази, збільшення маси тіла, відчуття серцебиття, тахікардія, підвищення рівнів печінкових ферментів (у т.ч. аспартаттрансамінази та аланінтрансамінази); реакції гіперчутливості, АР, анафілактична реакція, ангіоневротичний набряк; біль у грудях, кіста (без додаткових уточнень), генералізований набряк, набряк обличчя, підвищена втомлюваність, гарячка, припливи, грипоподібні симптоми, біль, периферичний біль; судоми ніг, гіпертонія, гіпестезія, мігрень, парестезія, вертиго; глухота, шум у вухах, лабіринтит; артралгія, артроз, міалгія, синовіт, тендиніт, епіконділіт, розрив сухожилля; кіста яєчника; підвищений рівень калію/натрію/тестостерону в крові; асептичний менінгіт, агевзія, аносмія, летальний внутрішньочерепний крововилив.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість (анафілактичні р-ції та серйозні шкірні р-ції) до целекоксибу або до будь-яких компонентів ЛЗ; пацієнтам з наявністю в анамнезі БА, випадків кропив'янки або інших р-цій алергічного типу після застосування АСК або інших НПЗП, у таких пацієнтів були зареєстровані тяжкі, інколи летальні, анафілактичні р-ції на НПЗП; після проведення хірургічної операції з аортокоронарного шунтування; пацієнтам, в яких були зареєстровані р-ції алергічного типу до сульфаніламідних препаратів.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	РЕВМОКСИБ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	капс. у бл.	200мг	№10x1	9,60	
	ФЛОГОКСИБ-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії	капс. у бл.	100мг, 200мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна					
ФЛОГОКСИБ-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна	капс. у бл.	200мг	№10x1	11,22	
ФЛОГОКСИБ-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна	капс. у бл.	100мг	№10x1	12,76	
II. ДІЛАКСА®	КРКА, д.д., Ново место (повн. цикл вир-ва; контр. серії), Словенія	капс. у бл.	100мг, 200мг	№10x1, №10x2, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РАНСЕЛЕКС	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	капс. у бл.	100мг, 200мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕЛЕБРЕКС®	Неолфарма Інк. (вир-во п-ту in bulk)/ Пфайзер Фармасютикалз ЛЛС (вир-во препарату in bulk)/ Р-Фарм Джермані ГмбХ (випуск серії, пак., маркув., контр. якості при випуску)/ Пфайзер Менюфекчуриг Дойчленд ГмбХ (пакув., контр. якост, США/Німеччина	капс. у бл.	200мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕЛЕБРЕКС®	Неолфарма Інк. (вир-во п-ту in bulk)/ Пфайзер Фармасютикалз ЛЛС (вир-во препарату in bulk)/ Р-Фарм Джермані ГмбХ (випуск серії, пак., маркув., контр. якості при випуску)/ Пфайзер Менюфекчуриг Дойчленд ГмбХ (пакув., контр. якост, США/Німеччина	капс. у бл.	200мг	№10x2	13,84	25,39/\$

● **Парекоксиб (Parecoxib)**

Фармакотерапевтична група: M01AH04 - нестероїдні протизапальні та протиревматичні ЛЗ. Коксиби.

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна, анальгетична, антипіретична дія; є селективним інгібітором циклооксигенази-2 (ЦОГ-2).

Показання для застосування ЛЗ: лікування г. болю; передопераційна (превентивна) аналгезія; короткотривале лікування післяопераційного болю^{БНФ} у дорослих; сумісне застосування з опіатними анальгетиками для зменшення потреби в опіатах; рішення щодо призначення селективного інгібітору ЦОГ-2 повинно базуватися на індивідуальній оцінці всіх факторів ризику пацієнта.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза - 40 мг, в/в або в/м, з подальшим введенням, якщо необхідно, 20 мг або 40 мг кожні 6-12 год, не перевищувати дозу 80 мг/добу^{БНФ}; проводити якнайкоротший курс терапії та застосовувати найнижчу ефективну добову дозу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: фарингіт, альвеолярний остеїт (суха лунка); патологічні серозні виділення з рани у ділянці груднини, інфікування рани; післяопераційна анемія; тромбоцитопенія; анафілактоїдна р-ція; гіпокаліємія; гіперглікемія, анорексія; збудження, безсоння; гіпестезія, запаморочення; цереброваскулярний розлад; біль у вухах; ІМ, інсульт, транзиторна ішемічна атака, тромбоз глибоких вен, брадикардія; судинний колапс, застійна СН, тахікардія; АГ, артеріальна гіпотензія; ортостатична гіпотензія; дихальна недостатність; тромбоемболія легеневої артерії; задишка, бронхоспазм; нудота; біль у животі, блювання, запор, диспепсія, метеоризм; виразки шлунка та ДПК, GERX, сухість у роті, патологічні звуки у ШКТ; панкреатит, езофагіт, гепатит, періоральний набряк; свербіж, гіпергідроз; екхімоз, висипання, кропив'янка; тяжкі шкірні реакції, с-м Стівенса-Джонсона, мультиформна еритема, ексфолюативний дерматит; біль у спині; артралгія; олігурія; ГНН; НН; периферичні набряки; астенія, біль у місці ін'єкції, р-ції у місці ін'єкції; р-ції гіперчутливості, зокрема анафілаксія та ангіоневротичний набряк; збільшення вмісту креатиніну у крові; підвищення рівня креатинфосфокінази, лактатдегідрогенази, АСТ, АЛТ та азоту сечовини крові; ускладнення після процедури (шкірні); глибокі післяопераційні інфекції, порушення загоєння рани у ділянці груднини.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або допоміжних речовин або сульфонамідів; тяжкі АР будь-якого типу на препарат у анамнезі, особливо шкірні р-ції (с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, мультиформна еритема), активна пептична виразка або шлунково-кишкова кровотеча; пацієнти, у яких спостерігався бронхоспазм, г. риніт, носові поліпи, ангіоневротичний набряк, кропив'янка або інші типи АР після застосування ацетилсаліцилової к-ти або НПЗЗ, включаючи інгібітори циклооксигенази-2; III триместр вагітності або годування груддю, тяжка ПН (альбумін у сироватці крові < 25 г/л або показник за шкалою Чайлда-П'ю >10); запальні захворювання кишечника; застійна СН (NYHA II-IV); лікування

післяопераційного болю при проведенні операції аортокоронарного шунтування; встановлена ІХС, захворювання периферичних артерій та/або цереброваскулярна хвороба.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 40 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДИНАСТАТ	Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ (втор. пакув., випуск серії)/ Фармація і Апджон Компані ЛЛС (вир-во in bulk, перв. пакув.), Бельгія/США	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	40мг	№10	140,06	25,70/\$
	ДИНАСТАТ	Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ (втор. пакув., випуск серії)/ Фармація і Апджон Компані ЛЛС (вир-во in bulk, перв. пакув.), Бельгія/США	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	40мг	№5	167,90	25,70/\$

• **Рофекоксиб (Rofecoxib)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: M01AH02 - нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби. Коксиви.

Основна фармакотерапевтична дія: високоселективний інгібітор циклооксигенази-2; має знеболювальні, жарознижувальні, протизапальні властивості; протизапальна дія здійснюється за рахунок пригнічення синтезу простагландинів шляхом інгібування ЦОГ-2; в терапевтичних к-цях не пригнічує циклооксигеназу-1 (ЦОГ-1); не чинить впливу на простагландини, які синтезуються за рахунок активації ЦОГ -1, і ч/з це не перешкоджає нормальним фізіологічним процесам, пов'язаним з ЦОГ-1 в тканинах, особливо в ШКТ та тромбоцитах.

Показання для застосування ЛЗ: остеоартрит, РА ^{ПМД}, г. больовий с-м різного ґенезу, альгодисменорея, зубний біль, у післяопераційному періоді з приводу хірургічних втручань та у стоматології.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос при лікуванні больового с-му та первинної дисменореї рекомендована доза - 50 мг 1 р/добу, наступні дози - 25 мг або 50 мг 1 р/добу у разі необхідності, МДД- 50 мг; лікування проводити до зникнення г. больового с-му, але не більше 2 тижн.; остеоартрит і РА: рекомендована початкова доза - 12,5 мг 1 р/добу, яку можна збільшити до 25 мг 1 р/добу, що є максимальною рекомендованою добовою дозою, призначати курси по 4-6 тижнів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: застійна СН, набряки нижніх кінцівок, порушення мозкового та коронарного кровообігу, біль за грудиною, в/черепний крововилив із летальним наслідком, крововилив в око, оклюзія артерій або вен сітківки, інсульт, ІМ, порушення ритму серцевих скорочень (брадикардія, миготлива аритмія, поява передчасного шлуночкового комплексу, тахікардія), г.СН, раптова зупинка серця, емболія легеневої артерії, нестабільна стенокардія, набряк легень; АГ; ангіоневротичний набряк, алергічний риніт, васкуліт, анафілактичний шок, анафілаксія, шкірні висипання, у т.ч. висипання еритематозного типу, бульозний висип, екзофоліативний дерматит, мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз, г. генералізований екзантематозний пухляк, фоточутливість, с-м Стівенса-Джонсона, кропив'янка, атопічний дерматит, свербіж, екхімоз, алопеція, диспепсія, печія, дискомфорт/біль в епігастральній ділянці, нудота; афтозний стоматит, виразки шлунка, кишечнику; шлунково-кишкова кровотеча., діарея, метеоризм, блювання, дисфагія, запор, відрижка, гастрит, загострення запальних захворювань ШКТ, перфорація шлунку/кишечнику, езофагіт, мелена, панкреатит, коліт/загострення коліту; збільшення активності АЛТ, АСТ, гепатит, у т.ч. блискавичний, печінкова недостатність, некроз печінки; інфікування ВДШ, синусити, бронхіти, грипоподібні симптоми, фарингіт, риніт, кашель, задишка, бронхоспазм; сонливість, ослаблення швидкості мислення, запаморочення, головний біль, неспокій, депресія; гіперестезія (парестезія), безсоння, виснаження, втомлюваність, асептичний менінгіт, марення, судоми ніг, тривожність, сплутаність свідомості, галюцинації, атаксія, зміна смакових відчуттів, загострення епілепсії, агевзія, анозмія; нечіткість зору, кон'юнктивіт, отит, дзвін у вухах; ниркова недостатність, підвищення рівня креатиніну, підвищення рівня азоту сечовини крові, інтерстеціальний нефрит, гіпонатріємія, ІСШ, агранулоцитоз, лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія, панцитопенія, артралгія, міозит, порушення менструального циклу, гіперкаліємія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до препарату та інших НПЗЗ, астма, особливо, викликана ацетилсаліциловою к-тою; активна пептична виразка або кровотеча ШКТ, г. риніт, поліпи носа, ангіоневротичний набряк, кропив'янка або інші АР після прийому ацетилсаліцилової к-ти або НПЗП, включаючи ЦОГ-2 в анамнезі; жінки репродуктивного віку, які можуть завагітніти і які не застосовують ефективну контрацепцію; порушення ф-ції печінки тяжкого ступеня (рівень альбуміну у сироватці крові <25 г/л або оцінка за шкалою Чайлд-П'ю ≥10), пацієнти зі встановленим КлКр<30 мл/хв.; запальні захворювання кишечнику; застійна СН (клас II-IV за критеріями NYHA); діагностована ІХС; облітеруючі захворювання периферичних артерій та/або цереброваскулярні захворювання; при лікуванні онкологічних хворих та пацієнтів, які належать до групи підвищеного ризику з боку ССС(перенесеними інфарктами, інсультами, АГ(III ст), прогресуючими клінічними формами атеросклерозу);у пацієнтів старше 65 років.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДЕНЕБОЛ	Мепро Фармасьютикалс Приват Лімітед, Індія	табл. у бл.	25мг, 50мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Еторикоксиб (Etoricoxib)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: M01AH05 - нестероїдні протизапальні та протиревматичні препарати; коксиви.

Основна фармакотерапевтична дія: селективний інгібітор циклооксигенази-2 у межах клінічного діапазону доз; циклооксигеназа відповідає за утворення простагландинів; ідентифіковано дві ізоформи - ЦОГ-1 та ЦОГ-2. ЦОГ-2

є ізоформою ензиму, що індукується імпульсом прозапалення та розглядається як основний фактор, що відповідає за синтез прораножних медіаторів болю, запалення та лихоманки.

Показання для застосування ЛЗ: остеоартрит, РА, анкілозуючий спондиліт, біль та ознаки запалення, пов'язані з г. подагричним артритом^{БНФ}; нетривале лікування помірного післяопераційного болю, пов'язаного зі стоматологічними операціями.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: остеоартрит: 30 мг 1 р/добу, у деяких пацієнтів з недостатнім послабленням симптомів збільшення дози до 60 мг 1 р/добу може підвищити ефективність, але не повинна перевищувати 60 мг/добу^{БНФ}; РА: 60 мг 1 р/добу; анкілозуючий спондиліт: 60 мг 1 р/добу, у разі появи г. болю застосовують лише у г. симптоматичний період; доза при РА та анкілозуючому спондиліті не повинна перевищувати 90 мг/добу; ^{БНФ} г. подагричний артрит: 120 мг 1 р/добу, доза не повинна перевищувати 120 мг/добу, максимальний період лікування 8 днів^{БНФ}; післяопераційний біль, пов'язаний із стоматологічним оперативним втручанням: 90 мг на 1 р/добу - максимум 3 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: альвеолярний остит; гастроентерит, інфекції ВДШ, ІСШ; анемія (переважно в результаті шлунково-кишкової кровотечі), лейкопенія, тромбоцитопенія; гіперчутливість; ангіоневротичний набряк/ анафілактичні/ анафілактоїдні р-ції, у т.ч. шок; набряки/затримка рідини; зниження або посилення апетиту, збільшення маси тіла; тривожність, депресія, погіршення розумової діяльності, галюцинації; сплутаність свідомості, неспокійний стан; запаморочення, головний біль; дисгевзія, безсоння, парестезія/гіпестезія, сонливість; нечіткість зору, кон'юнктивіт; шум у вухах; серцебиття, аритмія; фібриляція передсердь, тахікардія, застійна СН, неспецифічні зміни на ЕКГ, стенокардія, ІМ; гіпертензія; припливи крові, порушення мозкового кровообігу, транзиторна ішемічна атака, гіпертонічний криз, васкуліт; бронхоспазм; кашель, диспное, носова кровотеча; біль у животі; запор, метеоризм, гастрит, печія/кислотний рефлюкс, діарея, диспепсія/дискомфорт в ділянці епігастрію, нудота, блювання, езофагіт, виразки в ротовій порожнині; здуття живота, зміна характеру перистальтики кишечника, сухість у роті, гастродуоденальні виразки, пептичні виразки, у т.ч. перфорація і кровотеча ШКТ, с-м подразненого кишечника, панкреатит; підвищення АЛТ/АСТ; гепатит; ПН, жовтяниця; екхімоз; набряк обличчя, свербіж, висип, еритема, кропив'янка; с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, стійка медикаментозна еритема; спазми/судоми м'язів, скелетно-м'язовий біль/скутість; протеїнурія, підвищення рівня креатиніну в сироватці крові, НН/ дисфункція; астенія/втома, гриппоподібні симптоми; біль у грудній клітці; підвищення рівня азоту сечовини крові, підвищення рівня креатинфосфокінази, гіперкаліємія, підвищення рівня сечової к-ти; зниження рівня натрію в крові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого компонента препарату; активна пептична виразка або активна шлунково-кишкова кровотеча; пацієнтам, у яких виникав бронхоспазм, г. риніт, назальні поліпи, ангіоневротичний набряк, кропив'янка або інші АР після застосування ацетилсаліцилової к-ти або НПЗЗ, включаючи інгібітори ЦОГ-2; вагітність, годування груддю; тяжкі порушення ф-ції печінки (альбумін сироватки крові <25 г/л або ≥10 балів за шкалою Чайлда-П'ю); КлКр < 30 мл/хв; діти до 16 років; запальні захворювання кишечника; застійна СН (NYHA II-IV); пацієнтам з АГ, у яких показники АТ постійно вищі за 140/90 мм рт.ст. та недостатньо контролюються; діагностована ІХС, захворювання периферичних артерій та/або цереброваскулярні захворювання

Визначена добова доза (DDD): перорально - 60 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕТОРИКОКСИБ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	30мг, 60мг, 90мг, 120мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	АРКОКСІЯ®	Мерк Шарп і Доум Б.В. (пакування, випуск серії)/Фросст Іберика, С.А. (виробник нерозфасованої продукції, контроль якості, пакування), Нідерланди/Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	30 мг	№7x1, №7x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АРКОКСІЯ®	Мерк Шарп і Доум Б.В. (пакування, випуск серії)/Фросст Іберика, С.А. (виробник нерозфасованої продукції, контроль якості, пакування), Нідерланди/Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	60мг	№7x4	19,40	23,69/\$
	АРКОКСІЯ®	Мерк Шарп і Доум Б.В. (пакування, випуск серії)/Фросст Іберика, С.А. (виробник нерозфасованої продукції, контроль якості, пакування), Нідерланди/Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	60мг	№7x1	20,37	23,69/\$
	АРКОКСІЯ®	Мерк Шарп і Доум Б.В. (пакування, випуск серії)/Фросст Іберика, С.А.	табл., вкриті п/о у бл.	90мг	№7x4	16,17	23,93/\$

	(виробник нерозфасованої продукції, контроль якості, пакування), Нідерланди/Іспанія					
АРКОКСІЯ®	Мерк Шарп і Доум Б.В. (пакування, випуск серії)/Фросст Іберика, С.А. (виробник нерозфасованої продукції, контроль якості, пакування), Нідерланди/Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	90мг	№7x1	17,98	23,93/\$
АРКОКСІЯ®	Мерк Шарп і Доум Б.В. (пакування, випуск серії)/Фросст Іберика, С.А. (виробник нерозфасованої продукції, контроль якості, пакування), Нідерланди/Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	120мг	№7x1	17,46	24,18/\$
КОСТАРОКС	Каділа Фармасьютікалз Лімітед (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування)/Фармакер Преміум Лтд. (тестування)/Салютас Фарма ГмБХ (випуск серій), Індія/Мальта/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	30мг, 60мг, 90мг, 120мг	№4, №7, №28, №100	відсутня у реєстрі ОВЦ	

8.7.1.6. Інші нестероїдні протизапальні/протиревматичні засоби

- **Німесулід (Nimesulid)** ^[ПМД] [гель та гранули]

Фармакотерапевтична група: M01AX17 - нестероїдні протизапальні та протиревматичні препарати; M02AA26 - нестероїдні протизапальні засоби для місцевого застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна, анагетична, антипіретична дії; діє як селективний інгібітор циклооксигенази-2, що призводить до пригнічення синтезу простагландинів, які беруть участь у формуванні набряку та болю при запаленні, пригнічує фактор активації тромбоцитів, фактор некрозу пухлин α , вивільнення протеїнази та гістаміну, утворення вільних кисневих радикалів, при зовнішньому застосуванні спричиняє зменшення або зникнення болю у ділянці нанесення, у тому числі болю у суглобах, зменшує ранкову скутість і набряклість суглобів.

Показання для застосування ЛЗ: лікування г. болю ^{ПМД}; первинної дисменореї; місцево лікування патологічних станів опорно-рухового апарату, що характеризується болем, запаленням та скутістю рухів, таких як остеоартрит, періартрит, посттравматичний тендиніт, тендосиновіти, розтягнення м'язів, тяжкі фізичні навантаження на суглоби.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: максимальна тривалість курсу лікування - 15 діб; дорослі та діти від 12 років: 100 мг 2 р/добу після їжі (ДД - 200 мг); місцево: 3 см гелю наносять на уражену ділянку і злегка втирають 3-4 р/добу, тривалість терапії не >4 тижнів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анемія, еозинофілія, тромбоцитопенія, панцитопенія, пурпура, підвищена чутливість, анафілаксія, гіперкаліємія, відчуття страху, нервозність, нічні жажливі сновидіння, запаморочення, головний біль, сонливість, енцефалопатія (с-м Рея), нечіткий зір, розлади зору, вертиго, тахікардія, АГ, геморагія, лабільність АТ, припливи, підвищення ризику виникнення артеріальних тромботичних ускладнень (ІМ, інсульт), СН, задишка, астма, ядуха, бронхоспазм, діарея, нудота, блювання (в т.ч. криваве блювання), запор, метеоризм, гастрит, кровотечі у травному тракті, виразка та перфорація ДПК/шлунка, біль у животі, диспепсія, стоматит (в т.ч. виразковий), мелена, збільшення рівня ферментів печінки, гепатит, миттєвий (фульмінантний) гепатит, із летальним наслідком, жовтяниця, холестаза, АР, реакції гіперчутливості, включаючи анафілактичні реакції, свербіж, висип, підвищена пітливість, еритема, лущення шкіри, дерматит, кропив'янка, ангіоневротичний набряк (Квінке), набряк обличчя, вазомоторний риніт, еритема поліформна/мультиформна, бульозні реакції, в т.ч. с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, утворення пухирів, дизурія, гематурія, затримка сечовипускання, НН, олігурія, інтерстиціальний нефрит, набряк, нездужання, астенія, гіпотермія, загострення коліту та хв.Крона.

Протипоказання до застосування ЛЗ: відома підвищена чутливість до німесуліду або до будь-якого компонента препарату чи будь-якого іншого НПЗЗ; гіперергічні р-ції, в анамнезі (bronхоспазм, риніт, кропив'янка) у зв'язку з застосуванням ацетилсаліцилової к-ти чи інших НПЗЗ, гепатотоксичні р-ції на німесулід в анамнезі; виразка шлунка чи ДПК у фазі загострення, рецидивуючі виразки, перфорації чи кровотечі з ШКТ, шлунково-кишкові кровотечі або перфорації в анамнезі, пов'язані з попереднім застосуванням НПЗЗ, цереброваскулярні кровотечі або інші ураження, які супроводжуються кровотечами; тяжкі порушення згортання крові; тяжка СН, тяжке порушення функції нирок, порушення функції печінки; підвищена t° тіла та/або грипоподібні симптоми; супутнє застосування інших речовин із потенційною гепатотоксичністю; алкоголізм та наркотична залежність; підозра на гостру хірургічну патологію; дитячий вік до 12 років; ІІІ триместр вагітності та період годування груддю; для гелю - дерматити, інфекційні захворювання шкіри, uszkodження епідермісу.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,2 г., Зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НІМЕДАР	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	гран. д/орал. сусп. по 2 г у однодоз. пак.	100мг/2г	№9	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НІМЕДАР	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	гран. д/орал. сусп. по 2 г у однодоз. пак.	100мг/2г	№30	13,01	
	НІМЕДАР	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	гран. д/орал. сусп. по 2 г у однодоз. пак.	100мг/2г	№15	13,70	
	НІМЕДАР	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	гель по 30 г у тубі	10 мг/г	№1	58,78	
	НІМЕДАР®	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар. уп.	100мг	№10x3	3,39	
	НІМЕЛГАН	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	гран. д/орал. сусп. у саше	100мг	№20	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НІМЕЛГАН	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	гран. д/орал. сусп. у саше	100мг	№30	12,20	
	НІМЕЛГАН	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	гран. д/орал. сусп. у саше	100мг	№10	16,00	
	НІМЕЛГАН	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	100 мг	№10x1, №10x3, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НІМЕСУЛІД	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл.	100мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НІМЕСУЛІД	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл.	100мг	№10x3	2,54	
	НІМЕСУЛІД	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	табл. у бл.	0,1г	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НІМЕСУЛІД	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	табл. у бл.	0,1г	№10x3	1,82	
	НІМЕСУЛІД-ФІТОФАРМ	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	табл. у бл.	100мг	№12x1	4,22	
	НІМІД®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД/ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Індія/Україна	гран. по 2 г у саше	100мг/2г	№30	11,20	
	НІМІД®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД/ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Індія/Україна	табл. у бл.	100мг	№10x1, №10x1x10, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НІМІД®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД/ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Індія/Україна	табл. у бл.	100мг	№10x10	2,46	
	РЕМЕСУЛІД®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	100мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РЕМЕСУЛІД®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	100мг	№10x3	4,20	
	РЕМЕСУЛІД® РАПІД	ПАТ "Фармак", Україна	гран. д/орал. сусп. по 2 г у саше	100 мг/2 г	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РЕМІСІД	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	гель по 30 г у тубі	10мг/г	№1	60,89		
II.	АПОНІЛ	Медокемі ЛТД (Центральний Завод)/Медокемі ЛТД (Завод AZ), Кіпр/Кіпр	табл. у бл.	100мг	№10x2	5,44	32,78/€
	АФФИДА ФОРТ-НІМЕСУЛІД	Файн Фудс енд Фармасьютикалз Н.Т.М. С.П.А., Італія	гран. д/орал. сусп. по 2 г у саше	100 мг/2 г	№1, №3, №6, №30, №999	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НАЙЗ®	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Виробнича дільниця - ІІ/Д-р Редді'с Лабораторіс Лімітед,	табл. у бл.	100 мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	Індія/Індія					
НІМЕСИЛ®	Лабораторіос Менаріні С.А. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій)/Файн Фудс енд Фармасьютикалз Н.Т.М. С.П.А. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій), Іспанія/Італія	гран. д/орал. сусп. по 2 г у однодоз. пак.	100мг/2г	№9, №15	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НІМЕСИЛ®	Лабораторіос Менаріні С.А. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій)/Файн Фудс енд Фармасьютикалз Н.Т.М. С.П.А. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій), Іспанія/Італія	гран. д/орал. сусп. по 2 г у однодоз. пак.	100мг/2г	№30	13,93	29,03/€
НІМЕСИН®	Евертоджен Лайф Саенсиз Лімітед, Індія	табл. у бл.	100 мг	№10x1, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НІМІД®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	гель д/зовн. заст. по 30г у тубі	10мг/г	№1	36,32	23,98/\$
НІМІД®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	гель д/зовн. заст. по 100г у тубі	10мг/г	№1	95,27	23,98/\$

• **Діацереїн (Diacerein)**

Фармакотерапевтична група: M01AX21 - нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: має анальгетичні, антипіретичні і протизапальні властивості, але не інгібує синтез простагландинів і не має гастродуоденальних побічних ефектів; пригнічує синтез та вивільнення різних прозапальних цитокінів (інтерлейкіну 1, інтерлейкіну 6, інтерлейкіну 18 і фактору некрозу пухлини альфа), протеолітичних ферментів (наприклад, колагенази стромелізіну), вільних радикалів кисню та інших факторів, які беруть участь у запальному процесі суглоба; стимулює синтез протеогліканів, глікозаміногліканів і гіалуронової кислоти, які є основними компонентами хряща; уповільнює прогресування деструкції синовіальної речовини і суглобів.

Показання для застосування ЛЗ: лікування пацієнтів із симптомами остеоартриту стегна або коліна, з відкладеним ефектом.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі: перші 2-4 тижн. лікування по 50 мг разом з вечірнім прийомом їжі, запиваючи водою; починаючи з 2-4-го тижня лікування, дозу препарату збільшувати до 100 мг/добу в 2 прийоми (вранці і ввечері під час їжі); діацереїн має повільну із затримкою початкову активність та ефект залишкової дії після припинення лікування, позитивна симптоматична дія проявляється через 2-4 тижн. лікування та зберігається протягом 3-х міс. після періоду застосування; враховуючи природу захворювання, рекомендовано тривалий курс лікування не менше 3 міс., який може бути повторений, якщо з'являються симптоми; тривалість курсу лікування встановлює лікар, який має досвід лікування остеоартриту, індивідуально

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: диспептичні порушення, діарея, біль в животі, часті випорожнення, метеоризм, пігментація слизової оболонки кишечника (псевдомеланоз), випадки підвищення рівня печінкових ферментів у сироватці крові, забарвлення сечі, свербіж, висипи, екзема, головний біль, випадки г.ураження печінки, випадки гепатиту, зневоднення, порушення водно-електролітного балансу.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до компонентів ЛЗ або до похідних антрахінону в анамнезі, хвороби печінки наявні або в анамнезі, запальні кишкові захворювання (неспецифічний виразковий коліт, хв. Крона), кишкова непрохідність або псевдонепрохідність, біль у животі невизначеного походження, період вагітності або годування груддю.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДІАМАКС®	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	капс. тверді у бл.	50мг	№10x3	273,08	
	ФЛЕКЦЕРИН	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	капс. тверді у бл.	50мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	ФЛЕКЦЕРИН	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	капс. тверді у бл.	50мг	№10x3	178,45	
II.	АРТРОДАР®	ТРБ Фарма С.А., Аргентина	капс. у бл.	50 мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОРЦЕРИН	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	капс. у бл.	50 мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

8.7.1.7. Специфічні протиревматичні засоби

- **Пеніциламін (Penicillamine) ***

Фармакотерапевтична група: M01CC01 - специфічні протиревматичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: протиуролітична, дезінтоксикаційна по відношенню до важких металів; має високу комплексоутворюючу активність щодо іонів міді, ртуті, свинцю, заліза та кальцію; здатність препарату утворювати хелатні сполуки з міддю робить його засобом вибору для лікування гепатолентикулярної дегенерації (хв. Вільсона); знижує резорбцію міді із їжі і сприяє видаленню її з тканин організму; є ефективним засобом при тяжкій формі свинцевого отруєння, при отруєнні іншими важкими металами - залізом, ртуттю; механізм дії пеніциламіну при ревматоїдному запаленні суглобів не вивчений, але ймовірно препарат підвищує активність лімфоцитів, знижує к-цію ревматоїдного фактору (IgM) і комплексів Ig у сироватці і суглобовій рідині з незначним зниженням загальної к-ції Ig у сироватці, гальмує активність Т-лімфоцитів, не впливаючи на В-лімфоцити; у хворих на цистинурію пеніциламін утворює комплекси із цистиним, в результаті цього к-ція цистину в сечі значно зменшується, що має велике значення у профілактиці цистинових каменів.

Показання для застосування ЛЗ: тяжкий активний РА; хвороба Вільсона (гепатолентикулярна дегенерація)^{БНФ} ^{ВООЗ}; цистинурія^{БНФ}; отруєння свинцем^{ВООЗ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: РА та ювенільний РА: дорослим - 125-250 мг/добу протягом 1-го місяця застосування, потім дозу підвищують кожні 4-12 тиж на 125-250 мг до досягнення ремісії хвороби, після чого застосовують мінімальну ефективну дозу, якщо протягом 12 міс. застосування терапевтичний ефект не досягається, лікування припинити, підтримуюча доза 500-750 мг/добу, МДД 1,5 г^{ВООЗ} ^{БНФ}, після досягнення ремісії хвороби, що продовжується 6 міс., дозу поступово зменшувати на 125-250 мг кожні 12 тижн., пацієнтам літнього віку початкова доза не має перевищувати 125 мг/добу протягом 1-го місяця застосування, потім дозу можна збільшувати кожні 4-12 тижд. на 125 мг до досягнення ремісії хвороби, МДД 1 г, дітям підтримуюча доза - 15-20 мг/кг маси тіла/добу, початкова доза 2,5-5 мг/кг маси тіла/добу, її можна підвищувати поступово кожні 4 тижд. протягом 3-6 міс. до досягнення мінімальної ефективної дози^{ВООЗ}; хв. Вільсона: дорослим - 1,5-2 г/добу за кілька прийомів, після досягнення ремісії хвороби дозу можна зменшити до 0,75 г-1,0 г/добу^{БНФ}, пацієнтам із негативним балансом міді застосовувати мінімальну ефективну дозу, дозу 2 г/добу не слід застосовувати довше, ніж протягом 1 року^{БНФ}, пацієнтам літнього віку - 20 мг/кг маси тіла/добу за кілька прийомів^{БНФ}, дозу підібрати так, щоб досягти ремісії хвороби і утримати негативний баланс міді, дітям - 20 мг/кг маси тіла/добу за 2-3 прийоми за 1 год до прийому їжі^{БНФ}, для дітей віком від 12 років доза ЛЗ становить 0,75 - 1 г/добу; мінімальна доза - 500 мг/добу; цистинурія: встановити мінімальну ефективну дозу після кількісного визначення к-ції амінокислот у сечі хроматографічним методом; розчинення цистинових каменів: дорослим - 1-3 г/добу за кілька прийомів, утримувати к-цію цистину у сечі нижче 200 мг/л; профілактика цистинових каменів: дорослим - 0,5-1 г/добу до моменту досягнення к-ції цистину у сечі нижче 300 мг/л, хворим літнього віку призначають мінімальну дозу до моменту досягнення к-ції цистину у сечі нижче 200 мг/л^{БНФ}, дітям - 20-30 мг/кг/добу за 2-3 прийоми, за 1 год до прийому їжі^{БНФ}, дозу коригувати до досягнення к-ції цистину в сечі нижче 200 мг/л; отруєння свинцем: дорослим - 1-1,5 г/добу за кілька прийомів до зниження рівня свинцю в сечі до 0,5 мг/добу^{ВООЗ}, пацієнтам літнього віку - 20 мг/кг маси за кілька прийомів до зниження рівня свинцю в сечі до 0,5 мг/добу, дітям застосовувати, якщо к-ція свинцю в крові становить < 45 мг/дл. Загальна добова доза 15-20 мг/кг за 2-3 прийоми.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: хронічний бронхіт, холестатична жовтяниця, шум у вухах, р-ції гіперчутливості, артралгія, міастенія гравіс, вовчакоподібний с-м, тромбоцитопенія, збільшення лімфатичних вузлів, агранулоцитоз, апластична анемія, гемолітична анемія, лейкопенія, інфекція сечовивідних шляхів, с-м Гудпасчера, висип, кропив'янка, еритема, свербіж, ексфолювативний дерматит, токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайєлла), пухирчатка, набряк, неврит зорового нерва, стоматит, панкреатит, рецидив виразкової хвороби шлунка, гарячка, виразки ротової порожнини, анорексія, нудота, блювання, діарея, афтозний стоматит, глосит, повна втрата або спотворення смакових відчуттів, г. коліт, ілеальні виразки, стеноз, еластоз, еластична псевдоксантома, слабкість шкіри, пеніцилініндукований червоний вовчак, порушення обміну колагену і еластину (пемфігоїд, дерматоміозит, негативний вплив на волосся, збільшення ламкості шкіри, геморагічне ураження, зморшки і в'ялість шкіри), оральний червоний плоский лишай, алопеція, с-м Стівенса-Джонсона, бульозний епідермоліз, вовчакоподібні р-ції (еритематозний висип, поява антинуклеарних антитіл до ДНК), РА, септичний артрит, біль у попереку, спині, поліміозит (рідко з залученням серця), дерматоміозит, агранулоцитоз і апластична анемія з летальним наслідком, мієлотоксичність та мієлосупресія, тромбоцитопенічна пурпура, еозинфілія, погіршення неврологічних симптомів хвороби Вільсона (дистонія, ригідність, дизартрія), оборотний поліневрит (пов'язаний з дефіцитом піридоксину), поліневрит, сенсорні і моторні невропатії, міастенія (птоз, диплопія, загальна слабкість, слабкість дихальних м'язів), внутрішньопечінковий холестаза, гепатотоксичність, нефрит, гематурія, протеїнурія, гломерулонефрит, нефротичний с-м, алергічний альвеоліт, інтерстиціальний пневмоніт, дифузний фіброзний альвеоліт, легеневі кровотечі, риніт, синусит, блокада серця, с-м Адамса-Стокса, міокардит з летальним наслідком, збільшення молочних залоз з розвитком галактореї (у жінок), блефарит.

Противпоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого компонента препарату, СЧВ, вагітність (крім випадків наявності у вагітної хв. Вільсона), період годування груддю, апластична анемія або агранулоцитоз в анамнезі, пов'язані із пеніциламіном, ревматоїдне запалення суглобів із одночасною або наявною в анамнезі

дисфункцією нирок, ч/з можливість негативного впливу пеніциламіну на нирки, хр. отруєння свинцем у разі рентгенологічно підтвердженої наявності свинцю у ШКТ, одночасне застосування препаратів золота, протималярійних засобів, цитостатиків, оксифенілбутазону, фенілбутазону, які викликають побічні р-ції з боку кровотворної системи і нирок, помірна або тяжка НН, тяжка тромбоцитопенія, пов'язана з пеніциламіном.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,5 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	КУПРЕНІЛ®	ТОВ Тева Оперейшнз Поланд (Виробництво за повним циклом), Польща	табл., вкриті п/о у пл.	250мг	№100	17,57	28,87/€

8.7.1.8. Інші лікарські засоби для лікування м'язево-скелетної системи

- **Кислота гіалуронова (Hyaluronic acid)**

Фармакотерапевтична група: M09AX01 - засоби, що застосовуються при патології опорно-рухового апарату.

Основна фармакотерапевтична дія: компонент, наявний у високих к-ціях у складі суглобового хряща та синовіальної рідини, ендогенна гіалуронова к-та забезпечує в'язкість та еластичність синовіальної рідини, також вона необхідна для формування протеогліканів у суглобовому хрящі; завдяки нормалізації якості синовіальної рідини та активації процесів оновлення тканин у суглобовому хрящі поліпшує ф-цію суглобів; чинить протизапальну дію на епітелій суглоба, стимулює природне утворення гіалуронової к-ти всередині суглоба.

Показання для застосування ЛЗ: травматична та дегенеративна патологія суглобів; допоміжний засіб при ортопедичній хірургії. Артрита колінних суглобів легкого та помірного ступеня тяжкості.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим - по 2 мл (20мг) шляхом внутрішньосуглобового введення 1 р/тижд. Від 3 до 5 тижнів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції у місці ін'єкції, включаючи дискомфорт, біль, набряк, почервоніння, подразнення, висипання, вузлики, пустули, везикули, геморагії, екхімоз, свербіж, запалення суглобів, синовіїт, суглобовий випіт, скутість суглобів, порушення рухливості суглобів; р-ції гіперчутливості, включаючи анафілактоїдні р-ції, ангіоневротичний набряк, шкірні р-ції, включаючи висип, свербіж, еритема, екзема, дерматит, кропив'янка; анафілактичний шок без летальних наслідків; сироваткова хвороба; гарячка, відчуття жару, головний біль, парестезії; випадки бактеріального артриту та реактивного артриту у місці внутрішньосуглобової ін'єкції.

Противпоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до складових компонентів препарату, наявність в анамнезі алергії на білки домашньої птиці; тяжкі порушення ф-ції печінки; внутрішньосуглобові ін'єкції протипоказані у випадку існуючої інфекції або захворювань шкіри ділянки місця ін'єкції з метою зменшення потенційного розвитку септичного артриту.

Визначена добова доза (DDD): парентерально (внутрішньосуглобово) - 3,6 мг

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ГІАЛГАН	Фідія Фармацевтика С.п.А., Італія	р-н д/ін'єк. по 2 мл у фл., у шпр.	20 мг/2 мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

8.7.2. Засоби, що застосовуються для лікування подагри

- **Алопуринол (Allopurinol) *** (див. п. 12.1.2.1. розділу "УРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ, СЕКСОПАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: підвищення рівня сечової к-ти в крові та утворенням уратних/оксалатних каменів ^{БНФ} (подагра ^{БНФ} ^{ВООЗ}, г. уратна нефропатія та уратна СКХ), лікування злоякісних новоутворень, що потенційно призводять до загострення усіх форм гіперурикемії ^{БНФ} ^{ВООЗ}, а саме при різних гемобластозах (глейкозі, хр. мієлолейкозі, лімфосаркомі), уратній нефропатії, яка виникла внаслідок лікування лейкоїд; вроджена ферментативна недостатність, с-м Леша-Ніхана (частковий або повний дефіцит гіпоксантин-гуанін-фосфорибозилтрансферази) та дефіцит аденін-фосфорибозилтрансферази; лікування захворювань, спричинених недостатньою активністю аденін-фосфорибозилтрансферази та утворенням 2,8-дигідроксиаденінових каменів у нирках; лікування захворювань, спричинених утворенням змішаних кальцій-оксалатних каменів у нирках при гіперурикозурії, що не контролюються дієтою.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим добова доза визначається індивідуально залежно від рівнів сечової к-ти у сироватці крові і становить від 100 мг/добу ^{ВООЗ} ^{БНФ}; підвищувати дозування тільки у випадку, якщо рівень сечової к-ти в сироватці крові знижується недостатньо; рекомендуються наступні режими дозування: при легких станах - від 100 мг до 200 мг/добу ^{ВООЗ} ^{БНФ}; при помірно тяжких станах - від 300 мг до 600 мг/добу ^{ВООЗ} ^{БНФ}; при тяжких станах: від 700 мг до 900 мг/добу ^{ВООЗ} ^{БНФ}; при розрахунку дози препарату на масу тіла пацієнта застосовувати дози 2-10 мг/кг/добу.

8.7.3. Засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток

8.7.3.1. Бісфосфонати

- **Кислота алендроніва (Alendronic acid)**

Фармакотерапевтична група: M05BA04 - засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток.

Основна фармакотерапевтична дія: належить до групи амінобісфосфонатів, є синтетичним аналогом природного пірофосфату; пригнічує преципітацію кальцію фосфату, блокує його трансформацію у гідроксіапатит, затримує агрегацію кристалів апатиту з утворенням більших кристалів і прискорює зворотне розчинення цих кристалів; селективна дія зумовлена високим спорідненням бісфосфонатів із мінеральними компонентами кісток;

діє як ефективний негормональний специфічний інгібітор остеокластопосередкованої кісткової резорбції, точні механізми цього процесу з'ясовані не до кінця; відновлює позитивний баланс між резорбцією та відновленням кістки, збільшує мінеральну щільність кісток хребта, таза тощо, сприяє формуванню кісткової тканини з нормальною гістологічною структурою, запобігає появі нових переломів кісток, знижує рівень кальцію в сироватці крові за рахунок гальмування кісткової резорбції та зменшення вивільнення кальцію з кісткової тканини.

Показання для застосування ЛЗ: лікування постменопаузального остеопорозу; зменшення ризику переломів стегон і вертебральних переломів^{БНФ}; глюкокортикоїдного остеопорозу; лікування остеопорозу у чоловіків з метою попередження переломів^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза для дорослих 70 мг 1 р/тиждень; 10 мг 1 р/добу; приймати принаймні за півгодини до першого прийому їжі, рідини або ліків, запиваючи лише простою водою; після цього пацієнтам не лягати протягом 30 хв^{БНФ}; тривалість лікування залежить від перебігу та тривалості захворювання і визначається лікарем індивідуально для кожного хворого на підставі періодичної оцінки співвідношення користь/ризик (особливо після 5-ти та більше років застосування препарату); додатково необхідно приймати кальцій та вітамін D, якщо прийому цих речовин з їжею недостатньо.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, запаморочення, порушення смаку (гіркий або незвичний присмак), увеїт, склерит, епісклерит, вертиго, остеонекроз зовнішнього слухового проходу, біль у животі, диспепсія, запор, діарея, метеоризм, виразки слизової оболонки ротової порожнини, глотки та стравоходу, дисфагія, напруження стінки черевної порожнини, печія, регургітація шлункового вмісту, нудота, блювання, гастрит, езофагіт, ерозія стравоходу, мелена, езофагеальні стриктури, ураження верхньої частини ШКТ (перфорація, виразка, кровотеча), висипання, свербіж, еритема (почервоніння), висипання, що підсилюються під впливом світла (реакції фоточутливості), тяжкі шкірні реакції, включаючи с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, випадіння волосся (алопеція), кістково-м'язовий біль, остеонекроз, атипові переломи стегнової кістки, набряки суглобів, симптоматична гіпокальціємія, часто у зв'язку з наявністю провокуючих факторів, біль в суглобах, скороминучі симптоми (нездужання, гарячка, біль у м'язах), які виникають зазвичай на початку лікування, астения, периферичні набряки, АР (кропив'янка, ангіоневротичний набряк), гіпофосфатемія

Протипоказання до застосування ЛЗ: патології стравоходу (стриктура або ахалазія), які спричиняють затримку евакуації вмісту стравоходу; неспроможність стояти або сидіти з прямою спиною впродовж щонайменше 30 хв; гіперчутливість до алендронату або допоміжних речовин препарату; гіпокальціємія; вагітність, годування груддю; важка НН (кліренс креатиніну < 35 мл/хв); одночасне застосування інших бісфосфонатів.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 10 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АЛЕНДОН-10	Мікро Лабс Лімітед, Індія	таб. у бл.	10мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЛЕНДОН-10	Мікро Лабс Лімітед, Індія	таб. у бл.	10мг	№10x3	2,96	28,20/\$
	АЛЕНДОН-70	Мікро Лабс Лімітед, Індія	таб. у бл.	70мг	№10x1	2,86	28,20/\$
	АЛЕНДРА®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	таб. у бл.	70мг	№4x1	5,20	23,98/\$

- **Кислота Ібандронова (Ibandronic acid) (див. п. 19.5. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")**

Показання для застосування ЛЗ: постменопаузальний остеопороз^{БНФ}, з метою попередження переломів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза 1 табл. 150 мг 1 р/місяць^{БНФ}, внутрішньо після нічного голодування (щонайменше 6 год) і за 60 хв до першого прийому їжі чи рідини (окрім води) в день чи інших р/ос ЛЗ чи добавок (включаючи кальцій), приймати в один і той же день щомісячно, якщо щомісячна доза була пропущена, пацієнтові слід одразу прийняти її наступного ранку, якщо тільки день прийому наступної запланованої дози не припадає на період найближчих 7 днів, наступні дози приймати у раніше встановлений день місяця, якщо день прийому наступної запланованої дози припадає на період найближчих 7 днів, то слід пропустити прийом і наступну дозу приймати у запланований день; не приймати 2 табл. по 150 мг протягом одного тижня; парентерально: 1 в/в ін'єкція 3 мл р-ну (3 мг) тривалістю 15-30 секунд кожні 3 міс.^{БНФ}, додатково приймати кальцій та вітамін D, якщо планову дозу пропущено, ін'єкцію препарату слід зробити одразу, як тільки це буде можливо, в подальшому ін'єкції потрібно робити кожні 3 місяці з моменту останнього введення препарату; оптимальна тривалість лікування остеопорозу бісфосфонатами не встановлена, слід періодично переглядати питання щодо необхідності продовження лікування з урахуванням користі та потенційного ризику застосування для кожного пацієнта окремо, особливо після 5 або більше років застосування

Визначена добова доза (DDD): перорально - 5 мг., парентерально - 6 мг (курсва доза)

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ІБАНДРОНОВА КИСЛОТА - ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	р-н д/ін'єк. по 3 мл у шпр. з голк. у конт. чар. уп.	1мг/мл	№1	3282,50	
II.	БОНВІВА®	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд (виробництво нерозфасованої продукції, випробування контролю якості, випуск серії, первинне та вторинне	таб., вкриті п/о у бл.	150мг	№1x1	10,17	21,80/\$

	пакування)/Іверс-Лі АГ (первинне та вторинне пакування)/Пенн Фармасьютікал Сервісез Лтд (виробництво нерозфасованої продукції, в, Швейцарія/Швейцарія/Велика Британія					
БОНВІВА®	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд (виробництво нерозфасованої продукції, випробування контролю якості, випуск серії, первинне та вторинне пакування)/Іверс-Лі АГ (первинне та вторинне пакування)/Пенн Фармасьютікал Сервісез Лтд (виробництво нерозфасованої продукції, в, Швейцарія/Швейцарія/Велика Британія	таб., вкриті п/о у бл.	150мг	№3x1	10,17	21,80/\$
БОНВІВА®	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ і Ко. КГ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування)/Рош Діагностикс ГмбХ (вторинне пакування, випробування контролю якості та випуск серії), Німеччина/Німеччина	р-н д/ін`ек. по 3 мл р-ну у шпр. з 1 стер. голк.	3мг/3мл	№1	3154,62	24,51/\$
БОНЕВІСТА	Евер Фарма Джен ГмбХ (виробництво bulk, первинне та вторинне пакування)/Енестія Белджиум Н.В. (вторинне пакування)/Сінтон Хіспанія, С.Л. (випуск серії), Німеччина/Бельгія/Іспанія	р-н д/ін`ек., по 3 мл в шпр. з голк. у конт. чар/уп.	1мг/мл	№1	3000,00	32,91/€
ВІВАНАТ РОМФАРМ	К.Т. РОМФАРМ КОМПАНІ С.Р.Л., Румунія	р-н д/ін`ек. по 3 мл у шпр. з голк.	3 мг/3 мл	№1, №4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ІБАНДРОНОВА КИСЛОТА-ВІСТА 150 мг	Сінтон Хіспанія, С.Л., Іспанія	таб., вкриті п/о у бл.	150мг	№3x1	8,94	35,35/€

• **Кислота золедронова (Zoledronic acid) (див. п. 19.5. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")**

Показання для застосування ЛЗ: остеопороз у жінок у постменопаузному періоді та у чоловіків при підвищеному ризику переломів^{БНФ}, включаючи осіб з недавнім низькотравматичним переломом стегна; остеопороз, пов'язаний з довгостроковою системною ГК терапією у жінок у постменопаузному періоді та у чоловіків при підвищеному ризику переломів^{БНФ}; лікування кісткової хвороби Педжета у дорослих^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: постменопаузний остеопороз, остеопороз у чоловіків, остеопороз, пов'язаний з довгостроковою системною ГК терапією: рекомендована доза - 1 в/в інфузія 5 мг на рік^{БНФ}; оптимальна тривалість лікування остеопорозу бісфосфонатами не встановлена; необхідність продовження лікування періодично переглядати, оцінюючи користь і ризик індивідуально для кожного пацієнта, особливо після 5 або більше років застосування препарату; пацієнтам з недавнім низькотравматичним переломом стегна - введення ч/з 2 або більше тижнів після операції з приводу перелому стегна, пацієнтам з недавнім низькотравматичним переломом стегна перед першим введенням рекомендується застосування вітаміну D в ударній дозі від 50000 до 125000 МО р/ос або в/м^{БНФ}; лікування хвороби Педжета: рекомендована доза - 1 в/в інфузія 5 мг^{БНФ}; повторне лікування хвороби Педжета: після початку лікування спостерігається тривалий період ремісії у пацієнтів, які відповідають на лікування, повторне лікування включає додаткову в/в інфузію 5 мг пацієнтам, які мали рецидив, з інтервалом 1 рік або довше після початку лікування; інфузії проводять за умови адекватної гідратації, особливо пацієнтів літнього віку та пацієнтів, які отримують діуретики, рекомендується адекватний прийом кальцію і

вітаміну D, пацієнти з хворобою Педжета потребують застосування кальцію додатково, принаймні 500 мг елементарного кальцію 2 р/добу протягом щонайменше 10 діб після введення к-ти золедронові.^{БНФ}

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 4 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АКЛАСТА	Новартіс Фарма Штейн АГ (виробництво за повним циклом)/Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ (виробництво, первинне пакування; контроль якості за показником "Бактеріальні ендотоксини")/АГЕС ГмбХ ІМЕД (контроль якості за показником "Стерильність"), Швейцарія/Австрія/Австрія	р-н д/інфуз, по 100мл у фл.	5мг/100мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЗОЛЕУМ	Євролайф Хелткеар Пвт. Лтд., Індія	р-н д/інфуз, по 100мл у конт.	5мг/100мл	№1	2371,65	26,95/\$
	ЗОЛТОНАР	Ідол Ілач Долум Сан. ве Тідж. А.Ш./Мефар Ілач Сан. А.Ш., Туреччина/Туреччина	р-н д/інфуз, по 100мл у фл.	5мг/100мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

8.7.3.2. Інші лікарські засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток

- **Стронцію ранелат (Strontium ranelate)**

Фармакотерапевтична група: M05BX03 - ЛЗ для лікування захворювань кісток. Засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток

Основна фармакотерапевтична дія: збільшує утворення кістки у культурі кісткової тканини, а також розмноження попередників остеобластів і синтез колагену у культурі клітин кістки; зменшує резорбцію кісткової тканини за рахунок зменшення диференціації остеокластів і зниження їхньої резорбційної активності; подвійний механізм дії призводить до ребалансування обмінних процесів у кістковій тканині на користь остеогенезу; підвищує трабекулярну кісткову масу, кількість трабекул і їхню товщину; збільшує міцність кістки; у кістковій тканині стронцій в основному адсорбується на поверхні кристалів апатиту й тільки у незначній кількості замінює кальцій у кристалах апатиту у наново сформованій кістковій тканині; стронцію ранелат не змінює характеристики кристалів кісток. In vitro стронцію ранелат: стимулює формування хрящового матриксу в здоровому та пошкодженому остеоартрозом суглобі людини без стимуляції резорбції хряща; зменшує активність резорбції кісткової тканини в субхондральній кістці людини. In vivo: зменшує розвиток макроскопічних пошкоджень виростків стегна та верхньої суглобової поверхні великогомілкової кістки, а також вираженість синовііту та склерозу субхондральної кістки; призводить до позитивного впливу стронцію ранелату як на суглобовий хрящ, так і на субхондральну кістку.

Показання для застосування ЛЗ: лікування тяжкого остеопорозу з високим ризиком виникнення переломів: у жінок у постменопаузальному періоді; у дорослих чоловіків, за умови, якщо не може бути призначена інша терапія для лікування остеопорозу внаслідок непереносимості, протипоказань; у жінок у постменопаузальному періоді зменшує ризик виникнення переломів стегна та хребців; рішення щодо призначення має базуватися на індивідуальній оцінці сукупних ризиків кожного пацієнта.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована добова доза 2 г/добу, перед застосуванням розчинити у 1/3 склянки води (мінімум 30 мл); приймати перед сном, бажано не раніше ніж ч/з 2 год після прийому їжі^{БНФ}; призначений для довготривалого застосування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: лімфоаденопатія (одночасно з проявами р-цій гіперчутливості з боку шкіри), пригнічення ф-ції кісткового мозку; еозинofilія (одночасно з проявами р-цій гіперчутливості з боку шкіри); гіперхолестеринемія; безсоння, сплутаність свідомості, головний біль, порушення свідомості, втрата пам'яті, запаморочення, парестезія, судоми, вертиго, ІМ, венозна тромбоемболія, гіперреактивність бронхів, нудота, діарея та рідкі випорожнення, блювання, біль у абдомінальній ділянці, шлунково-кишковий біль, ГЕРХ, диспепсія, запор, метеоризм, подразнення слизової оболонки порожнини рота, включаючи стоматити та/або утворення виразок, сухість у роті, гепатит, підвищення рівня трансаміназ у сироватці крові (одночасно з проявами р-цій гіперчутливості з боку шкіри), прояви р-ції гіперчутливості з боку шкіри (висипання, свербіж, кропив'янка, ангіоедема), екзема, дерматит, алопеція, р-ції, що супроводжуються еозинofilією та виникненням системних симптомів (DRESS-синдром), с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, скелетно-м'язовий біль (спазми м'язів, міалгія, біль у кістках, артралгія та біль у кінцівках), периферичні набряки, підвищення t° тіла (одночасно з проявами р-цій гіперчутливості з боку шкіри), нездужання, підвищення рівня КФК.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якої з речовин препарату; венозна тромбоемболія, включаючи тромбоз глибоких вен та тромбоемболію легеневої артерії, у т.ч. в анамнезі; тимчасова або довготривала іммобілізація (післяопераційний період або тривалий постільний режим);

встановлена ІХС (у т.ч. в анамнезі), захворювання периферійних артерій та/або цереброваскулярні захворювання, неконтрольована АГ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БІВАЛОС®	Лабораторії Серв'є Індастрі, Франція	гран. д/орал. сусп. у саше	2 г	№7, №14, №28, №56	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Деносумаб (Denosumab)**

Фармакотерапевтична група: M05BX04 - ЛЗ для лікування захворювань кісток, інші ЛЗ, що впливають на структуру та мінералізацію кісток.

Основна фармакотерапевтична дія: моноклональне антитіло людини (IgG2), мішенню для якого є RANKL, з яким препарат зв'язується з високою афінністю та специфічністю, запобігаючи активації його рецептора RANK на поверхні прекурсорів остеокластів та остеокластів; запобігання взаємодії RANKL/RANK пригнічує утворення остеокластів, погіршує їх функціонування та життєздатність, таким чином зменшуючи резорбцію як трубчастих, так і губчастих кісток; швидко зменшує рівень кісткового ремоделювання, досягаючи найнижчого рівня сироваткового маркера резорбції кісток - С-телопептидів колагену 1 типу (СТХ) (85 % зменшення) - через 3 дні та утримується протягом усього інтервалу між дозами, в кінці кожного періоду після введення дози препарату ефект зниження рівня СТХ був частково послаблений: з максимального зниження більш ніж на 87 % до зниження приблизно більш ніж на 45 % (у діапазоні від 45 до 80 %), що відображає зворотність ефектів деносумабу відносно ремоделювання кісткової тканини після зниження сироваткового рівня препарату.

Показання для застосування ЛЗ: лікування остеопорозу у жінок у постменопаузальному періоді та у чоловіків із підвищеним ризиком переломів ^{БНФ}; у жінок у постменопаузальному періоді значно зменшує ризик переломів хребців, переломів нехребцевої локалізації та переломів стегна; лікування втрати кісткової маси у чоловіків з підвищеним ризиком переломів, які отримують гормонотерапію у зв'язку з раком передміхурової залози ^{БНФ}; у чоловіків з раком передміхурової залози, які отримують гормонотерапію, значно знижує ризик переломів хребців; лікування втрати кісткової маси, пов'язаної з тривалою системною терапією глюкокортикоїдами у дорослих пацієнтів із підвищеним ризиком переломів; попередження кісткових подій (патологічний перелом, опромінення кісток, компресія спинного мозку або хірургічне втручання на кістках) у дорослих пацієнтів із пізньою стадією злоякісних пухлин, які вражають кістки ^{БНФ}; лікування дорослих та підлітків з дозрілою кістковою системою, які мають гігантоклітинну пухлину кісток, що не може бути видалена або якщо хірургічна резекція, найімовірніше, призведе до тяжких наслідків ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н д/ін'єк. (60 мг/мл) - п/ш ін'єкція вводиться ^{БНФ} у стегно, живіт або зовнішню поверхню плеча 60 мг 1 р/6 міс. ^{БНФ}; р-н д/ін'єк. (70 мг/мл) - п/ш ін'єкція 120 мг 1 раз кожні 4 тижні ^{БНФ}, що вводиться у стегно, живіт або зовнішню поверхню плеча, пацієнти як доповнення повинні отримувати препарати та харчові добавки, що містять кальцій та вітамін D: ^{БНФ} при гігантоклітинній пухлині кісток додатково призначають по 120 мг на 8 та 15 дні лікування. ^{БНФ}

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції сечовидільної системи, інфекції верхніх відділів дихальної системи/ВДШ, дивертикуліт, целюліт, інфекції вуха, гіпокальціємія, ішіас, запор, дискомфорт у животі, висипання, екзема, алопеція, біль у кінцівках, остеонекроз щелепи, атипові переломи стегна, підвищена чутливість до препарату, медикаментозна гіперчутливість, лишаєподібні висипання, анафілактична р-ція, остеонекроз зовнішнього слухового каналу, скелетно-м'язовий біль, видалення зубів, діарея, диспное, гіпофосфатемія, гіпергідроз, гіперкальціємія після припинення лікування у пацієнтів із гігантоклітинною пухлиною кісток, нове первинне злоякісне новоутворення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого з допоміжних компонентів препарату; нелікована гіпокальціємія тяжкого ступеня; ураження після стоматологічних або хірургічних втручань в ротовій порожнині, що не загоюються.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,33 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ІКСДЖЕВА®	Амджен Мануфекчурінг Лімітед (виробник нерозфасованої продукції, первинне пакування)/Амджен Європа Б.В. (вторинне пакування та випуск серії), США/Нідерланди	р-н д/ін'єк. у фл. по 1,7 мл (120мг)	70мг/мл	№1	27,99	28,41/\$
	ПРОЛІА®	Амджен Мануфекчурінг Лімітед (виробник нерозфасованої продукції)/Амджен Європа Б.В. (виробник для	р-н д/ін'єк. по 1мл у фл. та шпр. з голк. у бл. та кор.	60мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	пакування та випуску серії), США/Нідерланди					
ПРОЛІА®	Амджен Мануфекчурінг Лімітед (виробник нерозфасованої продукції)/Амджен Європа Б.В. (виробник для пакування та випуску серії), США/Нідерланди	р-н д/ін'єк. по 1мл в шпр. з голк. та захист. ковп. у бл.	60мг/мл	№1	33,17	28,12/\$

8.7.3.3. Препарати вітаміну Д

(див. п. 7.7.1.4. розділу «ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»)

8.7.3.4. Препарати кальцію

- **Кальцію глюконат (Calcium gluconate)** * [тільки таблетки] (див. п. 7.7.1.5. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

8.7.3.5. Препарати кальцитоніну

8.7.4. Інші засоби, які застосовуються для лікування опорно-рухового апарату

- **Алпростадил (Alprostadil)** (див. п. 2.13.3.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: хр. облітеруючі захворювання артерій III ст. (за класифікацією Фонтейна), які не підлягають ревазуляризації або у яких ревазуляризація не мала успіху.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: порош. д/р-ну д/інфуз. вводять шляхом в/в інфузії 60 мкг 1 р/добу, інфузійний р-н готують безпосередньо перед інфузією, розчиняючи вміст 1 ампули у 50-250 мл 0,9% р-ну натрію хлориду, ампулу відкривають звичайним способом, тривалість інфузії 2 год; конц. д/р-ну д/інфуз. - рекомендована доза 50-200 мкг/добу в/в за 1 чи 2 інфузії, кожна з яких тривалістю щонайменше 2 год., розчинники: фіз. р-н, 5% чи 10% р-н глюкози, р-н готують безпосередньо перед інфузією, курс лікування не < 2 тижн., у разі позитивного ефекту лікування продовжують ще 7-14 днів, (але не > 4 тижн.), препарат відмінити, якщо не досягається бажаного ефекту у перші 2 тижн. лікування

8.8. Анальгетики

8.8.1. Опіоїди

- **Трамадол (Tramadol)** (див. п. 10.3.1.2. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

8.8.2. Інші анальгетики та антипіретики

- **Парацетамол (Paracetamol)** * [окрім розчину для інфузії]

Фармакотерапевтична група: N02BE01 - анальгетики та антипіретики.

Основна фармакотерапевтична дія: знеболювальна, жарознижувальна, протизапальна; механізм дії зумовлений пригніченням синтезу ПГ та переважним впливом на центр терморегуляції у гіпоталамусі.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування болю слабкої та помірної інтенсивності та/або підвищення t° тіла^{ВО03, БНФ}; від 2 місяців: біль під час прорізування зубів, зубний біль, біль у горлі, гарячка при застуді, грип та дитячих інфекціях (вітрянка, коклюш, кір, паротит), лікування поствакцинальної гіпертермії у немовлят віком 2-3 місяці^{БНФ}; головний біль, включаючи мігрень та головний біль напруження; біль у спині; ревматичний біль; біль у м'язах; періодичні болі у жінок; невралгії; біль після стоматологічних процедур або видалення зуба; полегшення симптомів застуди та грипу, таких як гарячка, ломота, біль, помірний біль при остеоартритах; короточасне лікування больового синдрому середньої інтенсивності, особливо у післяопераційний період, та короточасне лікування гіпертермічних реакцій, коли в/в застосування є клінічно обґрунтованим або інші способи застосування неприйнятні.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл.: дорослим та дітям від 12 р.: по 500-1000 мг до 4 р/добу^{БНФ}, МДД - 4000 мг^{БНФ}, дітям 6-11 р.: по 250-500 мг до 4 р/добу, разова доза парацетамолу -10-15 мг/кг маси тіла, максимальна добова доза - 60 мг/кг маси тіла; табл. шип.: дітям з масою тіла від 15 до 21 кг (віком 3 - 6 років) – по ½ табл. (250 мг), при необхідності прийоми повторювати з інтервалом у 6 годин, але не більше 2 таблеток за добу, дітям з масою тіла від 21 до 25 кг (віком 6 - 10 років) – по ½ табл. (250 мг), при необхідності прийоми повторювати з інтервалом у 4 години, але не більше 3 таблеток за добу, дітям з масою тіла від 26 до 40 кг (віком 8 - 13 років) – по 1 табл. (500 мг), при необхідності прийоми повторювати з інтервалом у 4 години, але не більше 4 таблеток за добу, дітям з масою тіла від 41 до 50 кг (віком 12 - 15 років) – по 1 табл. (500 мг), при необхідності прийоми повторювати з інтервалом у 4 години, але не більше 6 таблеток за добу, дорослим і дітям з масою тіла більше 50 кг (старші 15 років) – по 1-2 табл. (500-1000 мг) на один прийом, при необхідності прийом можна повторити через 4 години, середня добова доза становить 3 г парацетамолу на добу (6 таблеток), однак при сильних болях можна приймати максимальну добову дозу - 4 г парацетамолу (8 таблеток) з інтервалом між прийомами не менше 4 годин; р-н оральний: для дітей з масою тіла 4-32 кг (від 1 міс. до 12 р.), разова доза 15 мг/кг маси тіла, МДД - 60 мг/кг маси тіла: 1-2 міс. (4 кг) - 60 мг/прийом - 240 мг/добу, 3-5 міс. (6 кг) - 90 мг/прийом - 360 мг/добу, 6-10 міс. (8 кг) - 120 мг/прийом - 480 мг/добу, 11-12 міс. (10 кг) - 150 мг/прийом - 600 мг/добу, 2 р. (12 кг) - 180 мг/прийом - 720 мг/добу^{БНФ}, 3 р. (14 кг) - 210 мг/прийом - 840 мг/добу, 4-5 р. (16 кг) - 240 мг/прийом - 960 мг/добу^{БНФ}, 6-7 р. (20-24 кг) - 300-360 мг/прийом - 1200-1440 мг/добу, 8-9 р. (26-30 кг) - 390-450 мг/прийом - 1560-1800 мг/добу, 10-12 р. (30-32 кг) - 450-480 мг/прийом - 1800-1920 мг/добу, інтервал між прийомами не менше 6 год; сусп. орал.: діти від 3 міс. до 12 р: поствакцинальна гіпертермія разова доза 10-15 мг/кг, її можна повторити не раніше ніж через 4 год, більше 2 доз/добу не давати, МДД 60 мг/кг, в ін. випадках при болю та температурі разова доза 10-15 мг/кг, її можна повторити не раніше ніж через 4 год, більше 4 доз/добу не давати, МДД 60 мг/кг; суп. рект.: 60 мг/кг маси тіла/добу, за 4 прийоми, тобто 15 мг/кг маси тіла кожні 6 год^{БНФ}, суп. рект. по 80 мг призначені для дітей з масою тіла 4-6 кг, суп. рект. по 150 мг - для дітей 8-12 кг, суп. рект. по 300 мг - для дітей 15-24 кг; р-н д/інф.: маса тіла - <

10 кг, одноразова доза - 7,5 мг/кг, об'єм на один прийом - 0,75 мл/кг, максимальний об'єм на один прийом - 7,5 мл, МДД - 30 мг/кг; маса тіла - > 10 кг - ≤ 33кг, одноразова доза - 15 мг/кг, об'єм на один прийом - 1,5 мл/кг, максимальний об'єм на один прийом - 49,5 мл, МДД - 60 мг/кг, не перевищуючи 2 г; маса тіла - > 33 кг - ≤ 50кг, одноразова доза - 15 мг/кг, об'єм на один прийом - 1,5 мл/кг, максимальний об'єм на один прийом - 75 мл, МДД - 60 мг/кг, не перевищуючи 3 г; маса тіла - > 50 кг, за наявності факторів ризику розвитку гепатотоксичності, одноразова доза - 1 г, об'єм на один прийом - 100 мл, максимальний об'єм на один прийом - 100 мл, МДД - 3 г^{БНФ}; маса тіла - > 50 кг, при відсутності факторів ризику розвитку гепатотоксичності, одноразова доза - 1 г, об'єм на один прийом - 100 мл, максимальний об'єм на один прийом - 100мл, МДД - 4 г^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анафілаксія, анафілактичний шок, р-ції гіперчутливості, включаючи шкірний свербіж, висип на шкірі і слизових оболонках (генералізований висип, еритематозний, кропив'янка), еритема, ангіоневротичний набряк (набряк Квінке), мультиформна ексудативна еритема (у т. ч. с-м Стівенса-Джонсона), токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайелла); нудота, біль в епігастрії; гіпоглікемія, аж до гіпоглікемічної коми; тромбоцитопенія, лейкопенія, нейтропенія, агранулоцитоз, анемія, сульфгемоглобінемія і метгемоглобінемія (ціаноз, задишка, біль в серці), гемолітична анемія, синці чи кровотечі; бронхоспазм у пацієнтів, чутливих до аспірину та до інших НПЗЗ; порушення ф-ції печінки, підвищення активності печінкових ферментів, без розвитку жовтяниці, нездужання, зниження АТ, припливи, ниркова коліка, гепатонекроз (дозозалежний ефект); асептична піурія (сироп), препарат може мати незначний проносний ефект (сироп), подразнення прямої кишки та анального отвору (супоз.), артеріальна гіпотензія, біль та печіння в місці введення (р-н д/нфуз.), тахікардія, слабкість.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до парацетамолу або до ін. компонентів препарату; тяжкі порушення ф-ції печінки та/або нирок; непереносимість фруктози (табл. шип.); вроджена гіпербілірубінемія, дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, алкоголізм, захворювання крові, с-м Жильбера, виражена анемія, лейкопенія; гепатоцелюлярна недостатність; для твердих лікарських форм діти вік до 6 років, для рідких (педіатричних лікарських форм) - діти до 3 міс.; супоз.- запалення слизової оболонки прямої кишки та порушення ф-ції ануса, ректальна кровотеча, дитячий вік до 1 міс. (маса тіла дитини до 4 кг), діарея.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 3 г., парентерально - 3 г., перорально\ректально (дитяча доза) - не визначені, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I. ГРИПОМЕД®	Публічне акціонерне товариство "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	р-н орал. по 100 мл у бан. скл. або полім. з доз. піпет.	30 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ІНФУЛГАН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 50мл в пл.	10мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ІНФУЛГАН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл в пл.	10мг/мл	№1	188,16	
ІНФУЛГАН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 20мл в пл.	10мг/мл	№1	388,50	
ПАРАМОЛ	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 100 мл у конт.	1000 мг/100 мл	№1	327,09	
ПАРАЦЕТАМОЛ	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	сироп по 60 мл, 90 мл у бан. з доз. скл.	120 мг/5 мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПАРАЦЕТАМОЛ	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії вир-ва, контроль якості), Україна	капс. у бл.	325мг, 500мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПАРАЦЕТАМОЛ	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії вир-ва, контроль якості), Україна	капс. у бл.	325мг	№10x1	13,93	
ПАРАЦЕТАМОЛ	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контр. якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії вир-ва, контроль	капс. у бл.	500мг	№10x1	11,59	

	якості), Україна						
ПАРАЦЕТАМОЛ	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	супоз. рект. у стрип.	80мг	№5x2	43,47		
ПАРАЦЕТАМОЛ	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	супоз. рект. у стрип.	150мг	№5x2	50,41		
ПАРАЦЕТАМОЛ	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл.	325мг	№10x10	9,23		
ПАРАЦЕТАМОЛ	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 100 мл у конт.	1000 мг/100 мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ПАРАЦЕТАМОЛ	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл.	200мг	№10	9,69		
ПАРАЦЕТАМОЛ	ПАТ "Монфарм", Україна	супоз. рект. у стрип.	0,08г, 0,17г, 0,33г	№5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ПАРАЦЕТАМОЛ	ПАТ "Галичфарм"/ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	таб. у бл. в пач.	200мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ПАРАЦЕТАМОЛ	ПАТ "Галичфарм"/ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	200мг	№10	9,90		
ПАРАЦЕТАМОЛ БЕБІ	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	сусп. орал. по 50 мл, 100 мл у фл.; по 5 мл, 10 мл у саше	120мг/5мл	№1, №20	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ПАРАЦЕТАМОЛ БЕБІ	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	сусп. орал. по 100мл у фл. з доз. прист.	120мг/5мл	№1	34,15		
ПАРАЦЕТАМОЛ БЕБІ	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	сусп. орал. по 10 мл у саше у карт.кор.	120мг/5мл	№1	93,13		
ПАРАЦЕТАМОЛ ДЛЯ ДІТЕЙ	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	сироп по 50мл у фл. полім. з доз. лож.	120мг/5мл	№1	17,20		
ПАРАЦЕТАМОЛ ДЛЯ ДІТЕЙ	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	сироп по 100мл у бан. полім. з доз. лож.	120мг/5мл	№1	26,27		
ПАРАЦЕТАМОЛ СОЛЮБЛ	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	таб. шипучі у стрип.	500 мг	№2x6	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ПАРАЦЕТАМОЛ-ВІШФА	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	сироп по 60мл у бан. з доз. скл.	120мг/5мл	№1	17,60		
ПАРАЦЕТАМОЛ-ВІШФА	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	сироп по 90мл у бан. з доз. скл.	120мг/5мл	№1	37,09		
ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп. в пач. та без	200мг, 500мг	№10x1, №10x10, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп. в пач. та без	200мг	№10	10,13		
ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп. в пач. та без	500мг	№10x1	8,33		
ПІАРОН	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	таб., в/о у бл.	500мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ПІАРОН	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	таб., в/о у бл.	500мг	№10x2	6,99		
ПІАРОН	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	сусп. орал. по 100 мл у фл.	120мг/5мл	№1	43,60		
II. АНАПІРОН	Євролайф Хелткеар Пвт. Лтд., Індія	р-н д/інфуз. по 100 мл у конт.	10мг/мл	№1	297,7	28,11/\$	2
БЛІМОЛ	"Юнік Фармасьютикал Лабораторіз" (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	р-н д/інфер. по 50мл у фл.	10мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ		
БЛІМОЛ	"Юнік Фармасьютикал Лабораторіз" (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд	р-н д/інфер. по 100мл у фл.	10мг/мл	№1	262,5	24,51/\$	0

	Фармасьютикалз Лтд.), Індія					
ГРИПОСТАД® ГАРЯЧИЙ НАПІЙ	СТАДА Арцнайміттель АГ (випуск серій)/алфамед ФАРБІЛ Арцнайміттель ГмбХ (вир-во нерозфас. продукту, первинне та вторинне пакування, контроль серій), Німеччина	пор. д/орал р-ну по 5 г у пак.	120 мг/г	№5, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЕЛГАН	Алкон Парентералс (Індія) Лтд, Індія	р-н д/інф. по 100 мл у фл.	1000 мг/100 мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЕФЕРАЛГАН	УПСА САС, Франція	таб. шипучі у стрип.	500 мг	№4x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЕФЕРАЛГАН	УПСА САС, Франція	р-н орал. по 90 мл у фл. з мірн. лож.	30 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЕФЕРАЛГАН	УПСА САС, Франція	супоз. рект. у бл.	80мг, 150мг, 300мг	№5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПАНАДОЛ	ГлаксоСмітКлайн Дангарван Лімітед (вир-во ЛЗ, перв. та втор. пак., контр. якості, випуск серії)/ СмітКляйн Бічем С.А. (перв. та втор. пак., контр. якості, випуск серії), Ірландія/Іспанія	табл., в/о у бл.	500 мг	№10x1, №8x8, №8x12	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПАНАДОЛ БЕБІ	Фармаклер, Франція	сусп. орал. по 100 мл у фл.	120 мг/5 мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПАНАДОЛ®	ГлаксоСмітКлайн Дангарван Лімітед (вир-во ЛЗ, перв. та втор. пак., контр. якості, випуск серії)/ СмітКляйн Бічем С.А. (перв. та втор. пак., контр. якості, випуск серії), Ірландія/Іспанія	табл., в/о у бл.	500 мг	№10x1, №8x8, №8x12	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПАНАДОЛ® БЕБІ	Фармаклер, Франція	сусп. орал. по 100 мл у фл.	120 мг/5 мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПАНАДОЛ® ЕДВАНС	ГлаксоСмітКлайн Дангарван Лімітед, Ірландія	табл. вкриті п/о у бл.	500 мг	№12x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПАНАДОЛ® СОЛЮБЛ	Фамар А.В.Е. Антоса плант/ ГлаксоСмітКлайн Дангарван Лімітед, Греція/Ірландія	таб. шипучі у стрип.	500 мг	№2x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПАРАФУЗІВ	С.М. Фармачеутічі С.Р.Л., Італія	р-н д/інфуз. по 50 мл у фл.	10мг/мл	№1, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПАРАФУЗІВ	С.М. Фармачеутічі С.Р.Л., Італія	р-н д/інфуз. по 100 мл у фл.	10мг/мл	№10	294,0 0	31,03/€
ПАРАЦЕТАМОЛ Б. БРАУН 10 МГ/МЛ	Б. Браун Медікал СА, Іспанія	р-н д/інфуз. по 10 мл в амп., по 50 мл, 100 мл у фл.	10мг/мл	№20, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПАРАЦЕТАМОЛ Б. БРАУН 10 МГ/МЛ	Б. Браун Медікал СА, Іспанія	р-н д/інфуз. по 100мл у фл.	10мг/мл	№10	156,6 0	27,98/\$
ПАРАЦЕТАМОЛ ЄВРО	Ес.Сі. Інфомед Флуїдс С.Р.Л., Румунія	р-н д/інфуз. по 50 мл, 100 мл у конт.	10мг/мл	№1, №12	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПАРАЦЕТАМОЛ ЄВРО	Ес.Сі. Інфомед Флуїдс С.Р.Л., Румунія	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	10мг/мл	№12	237,5 0	30,78/€

- **Метамізол натрію (Metamizole sodium)** ** [тільки таблетки] (див. п. 10.3.5. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

8.9. Глюкокортикоїди для системного та локального застосування

- **Бетаметазон (Betamethasone)** * (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ", п. 9.1.2. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: РА, остеоартрити, бурсити, тендосиновіїти, тендиніти, перитендиніти, анкілозивний спондиліт, епікондиліт, радикуліт, кокцидинія, ішіас, люмбаго, кривошия, гангліозна кіста, екзостоз, фасциїт, г. подагричний артрит, синовіальні кістки, хв. Мортон, запалення кубовидної кістки, захворювання стоп, бурсит на тлі твердого мозоля, шпори, тугорухливість великого пальця стопи, СЧВ, склеродермія, дерматоміозит, вузликівий періартеріт.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: початкова доза препарату у більшості випадків дорівнює 1-2 мл, введення повторюють за необхідності, залежно від стану хворого; вводять глибоко в/м у сідницю: при тяжких станах (СЧВ), які потребують екстрених заходів, початкова доза - 2 мл; при г. та хр. бурситах доза для в/м введення -1-2 мл, за необхідності проводять декілька повторних введень; при г. бурситах (субдельтоподібному, підлопатковому, ліктьовому та тугорухливість великого пальця стопи) введення 1-2 мл препарату у синовіальну сумку може полегшити біль та повністю відновити рухливість за декілька годин; при г. тендосиновіїтах, тендинітах та перитендинітах одна ін'єкція препарату полегшує стан хворого, при хр. - повторити ін'єкцію препарату залежно від р-ції. При РА та остеоартриті в/суглобове введення препарату в дозі 0,5-2 мл зменшує біль, болючість та тугорухливість суглобів протягом 2-4 год після введення. Рекомендовані дози препарату при введенні у великі суглоби (колінний, стегновий) - 1-2 мл; у середні (ліктьовий)- 0,5-1 мл; у малі (кистьовий)- 0,25-0,5 мл. Рекомендовані разові дози препарату (з інтервалами між введеннями 1 тижд.): при бурситі під мозолем - 0,25-0,5 мл; при п'яточній шпорі - 0,5 мл; при тугорухливості великого пальця стопи - 0,5 мл; при варусному малому пальці стопи - 0,5 мл; при синовіальній кістці - від 0,25 до 0,5 мл; при тендосиновіїті - 0,5 мл; при запаленні кубовидної кістки - 0,5 мл; при г. подагричному артриті - від 0,5 до 1 мл, при метатарзалгії Мортон - 0,25-0,5 мл. Доза повинна бути мінімальною, а період застосування - максимально коротким. Не призначений для в/в або п/ш введення.

- **Метилпреднізолон (Methylprednisolone) * ^[ГІМД]** (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ", п. 9.1.2. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: як додаткова терапія для короткотривалого застосування (при загостренні процесу) при псоріатичному артриті; РА, включаючи ЮРА (в окремих випадках може бути потрібною підтримуюча терапія низькими дозами); анкілозуючому спондиліті; г. і підгострому бурситі; г. неспецифічному тендосиновіїті; г.подагричному артриті; посттравматичному остеоартриті; синовіті при остеоартриті; епікондиліті; СЧВ; системному дерматоміозиті (поліміозиті); г.ревмокардиті; ревматичній поліміалгії при гігантоклітинному артеріїті БНФ, вузликовому періартеріті

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл.: початкова доза може варіювати і її слід підбирати індивідуально, залежно від характеру захворювання та реакції пацієнта на терапію, якщо через належний період часу задовільного клінічного ефекту не досягнуто терапію слід поступово відмінити та призначити пацієнту альтернативну терапію; після досягнення задовільного ефекту, слід підібрати індивідуальну підтримуючу дозу шляхом поступового зменшення початкової дози через певні проміжки часу до найнижчої дози, яка дасть змогу підтримувати досягнутий клінічний ефект; якщо після тривалої терапії препарат потрібно відмінити, то рекомендується проводити це поступово, а не раптово; р-н д/ін'єкц.: рекомендована доза - 30 мг/кг маси тіла при введенні в/в протягом 30 хв, можна вводити повторно в умовах стаціонару кожні 4-6 год протягом 48 год залежно від клінічної необхідності; РА: 1 г/добу в/в протягом 1, 2, 3 чи 4 днів або 1 г/міс в/в протягом 6 міс; при інших показаннях початкова доза від 10 до 500 мг залежно від клінічного стану пацієнта та виду захворювання, початкову дозу до 250 мг включно потрібно вводити в/в протягом щонайменше 5 хв, а дози, які перевищують 250 мг, вводити протягом 30 хв; сусп. д/ін'єкц.: вводять в/м, внутрішньосуглобове, періартикулярно, інтрабурсально, в м'які тканини чи в патологічний осередок, для підтримуючої терапії пацієнтів з РА вводять 40-120 мг 1 р/тижд. в/м, внутрішньосуглобове введення залежить від розміру суглоба та тяжкості захворювання - великі (колінний, гомілковостопний, плечовий) від 20 мг до 80 мг, середні (ліктьовий, променезап'ястковий) від 10 мг до 40мг, малі (п'ястково-фаланговий, міжфаланговий, груднино-ключичний, акроміально-ключичний) від 4 мг до 10 мг з інтервалом від 1 до 5 (або більше) тижнів залежно від ступеня полегшення, спричиненого першою ін'єкцією; при інших захворюваннях: ганглії, тендиніти, епікондиліт рекомендована доза від 4 мг до 30 мг відповідно до тяжкості захворювання, при рецидивуючих або хронічних захворюваннях можливе проведення повторних ін'єкцій.

- **Преднізолон (Prednisolone) *** (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

8.10. Міорелаксанти

8.10.1. Міорелаксанти з центральним механізмом дії

- **Толперизон (Tolperisone)**

Фармакотерапевтична група: М03ВХ04 - міорелаксанти з центральним механізмом дії.

Основна фармакотерапевтична дія: міорелаксанти центральної дії, механізм дії повністю не з'ясований; володіє високою афінністю до нервової тканини, досягаючи найбільших концентрацій у стовбурі головного мозку, спинному мозку та периферичній нервовій системі; чинить гальмівну дію на спинномозковий рефлекторний шлях, інгібує спадні провідні шляхи чим і обумовлює терапевтичну користь; чинить мембраностабілізуючу дію та знижує електричну збудливість рухових нейронів і первинних аферентних волокон, дозозалежно гальмує активність потенціалзалежних натрієвих каналів, внаслідок чого знижується амплітуда і частота потенціалу дії; доведений його пригнічувальний ефект на потенціалзалежні кальцієві канали; може гальмувати викид медіатору; має деякі слабко виражені властивості альфа-адренергічних антагоністів і чинить антиму斯卡ринову дію.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування м'язового спазму у дорослих після перенесеного інсульту.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймати після їжі, запиваючи 1 склянкою води, недостатній прийом їжі може знизити біодоступність толперизону; дорослим залежно від індивідуальної потреби й переносимості р/ос по 150-450 мг/добу, розподіливши на 3 прийоми.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анемія, лімфаденопатія, р-ція гіперчутливості, анафілактична р-ція; анафілактичний шок, анорексія, полідипсія, безсоння, порушення сну; зниження активності, депресія; сплутаність свідомості, головний біль, запаморочення, сонливість; порушення уваги, тремор, судоми, гіпестезія, парестезія, летаргія, порушення зору; шум у вухах, вертиго; стенокардія, тахікардія, прискорене серцебиття, зниження АТ; брадикардія, гіпотонія; гіперемія шкіри; утруднення дихання, носова кровотеча,

прискорене дихання; відчуття дискомфорту в животі, діарея, сухість слизової оболонки порожнини рота, диспепсія, нудота; болі в епігастрії, запор, метеоризм, блювання; пошкодження печінки легкого ступеня; алергічний дерматит, гіпергідроз, свербіж, кропив'янка, висип; м'язова слабкість, міалгія, болі в кінцівках; відчуття дискомфорту в кінцівках, остеопенія, енурез, протеїнурія; астенія, дискомфорт, підвищена стомлюваність; відчуття сп'яніння, відчуття жару, дратівливості, спрага; відчуття дискомфорту в грудях, зниження артеріального тиску, підвищення к-ції білірубіну в крові, зміна активності печінкових ферментів, зниження кількості тромбоцитів, лейкоцитоз; підвищення к-ції креатиніну в крові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або подібного до неї за хімічним складом еперизону, або до будь-якої з допоміжних речовин, міастенія гравіс, період годування груддю.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МІДОСТАД	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	50мг, 150мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТОККАТА®	ПАТ "Фармак", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	50 мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТОККАТА®	ПАТ "Фармак", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	150мг	№10х3	8,67	
	ТОЛПЕРІЛ-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стад. вир-ва, контр. якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стад. вир-ва, контр. якості), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10х3	26,49	
	ТОЛПЕРІЛ-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стад. вир-ва, контр. якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стад. вир-ва, контр. якості), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	150мг	№10х3	10,24	
II.	МІДОКАЛМ	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	50мг, 150мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

8.10.2. Інші міорелаксанти центральної дії

• Тизанідин (Tizanidine)

Фармакотерапевтична група: M03BX02 - міорелаксанти центральної дії.

Основна фармакотерапевтична дія: релаксан/спазмолітик скелетної мускулатури центральної дії; стимулюючи пресинаптичні α_2 -адрено-рецептори, він пригнічує вивільнення стимулюючих амінокислот, які стимулюють рецептори N-метил-D-аспартату (NMDA-рецептори), внаслідок чого пригнічується полісинаптична передача сигналу на рівні міжнейронних зв'язків у спинному мозку, що відповідає за надмірний тонус м'язів (тонус м'язів знижується); є ефективним при гострих болісних спазмах м'язів, при хронічній спастичності спинномозкового та церебрального походження; знижує опір пасивним рухам, пригнічує спазм та клонічні судоми та покращує силу активних скорочень м'язів.

Показання для застосування ЛЗ: болісний м'язовий спазм; спастичність внаслідок розсіяного склерозу ^{БНФ}; спастичність внаслідок ушкоджень спинного мозку; спастичність внаслідок ушкоджень головного мозку.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: полегшення болісних м'язових спазмів: 2-4 мг 3 р/добу, у тяжких випадках перед сном прийняти додаткову дозу 2 або 4 мг ^{БНФ}; спастичність при неврологічних порушеннях: початкова добова доза не повинна перевищувати 6 мг, за 3 прийоми, її можна підвищувати поступово на 2-4 мг з інтервалами 3-7 днів, оптимальний терапевтичний ефект досягається при добовій дозі 12-24 мг, за 3-4 прийоми, МДД 36 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: безсоння, порушення сну; сонливість, слабкість, запаморочення, брадикардія, гіпертензія, тахікардія, незначне зниження АТ, артеріальна гіпотензія, гастроінтестинальні розлади, сухість у роті; нудота, підвищені рівні трансаміназ сироватки крові, м'язова слабкість, підвищена втомлюваність, р-ції підвищеної чутливості (включаючи анафілаксію, ангіоневротичний набряк, задишку і кропив'янку), галюцинації, сплутаності свідомості, вертиго, синкопе, затуманення зору, гепатит, печінкова недостатність, висипи, еритема, свербіж, дерматит, астенія, с-м відміни.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату чи до будь-яких допоміжних речовин, тяжкі порушення ф-ції печінки, одночасне застосування тизанідину з потужними інгібіторами CYP1A2, такими як флувоксамін або ципрофлоксацин.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 12 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
--	-------------------	-----------------	---------------	-----------	----------------------	----------------	-----------------------------

I.	ТІЗАЛУД	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	2мг	№10x3	17,97	
	ТІЗАЛУД	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	4мг	№10x3	12,60	
II.	СИРДАЛУД®	Новартіс Саглік, Гіда ве Тарім Урунлері Сан. Ве Тік. А.С. (вир-во за повним циклом)/С.К. Сандоз С.Р.Л. (контроль якості)/Новартіс Фарма ГмБХ (випуск серії), Туреччина/Румунія/Німеччина	табл. у бл.	2мг, 4мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

9. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

9.1. Засоби для застосування у дерматології

- 9.1.1. Загальні принципи лікування дерматологічних захворювань (лікарські форми та кількісні норми призначення)
- 9.1.2. Кортикостероїди для зовнішнього (топічного) застосування
- 9.1.3. Засоби для топічного (зовнішнього) лікування інфекційних захворювань шкіри
 - 9.1.3.1. Антибактеріальні засоби для топічного застосування
 - 9.1.3.2. Протигрибкові засоби для топічного застосування
 - 9.1.3.3. Противірусні засоби для топічного застосування
 - 9.1.3.4. Протипаразитарні засоби для зовнішнього застосування
- 9.1.4. Антисептичні та дезинфікуючі засоби. Засоби для очищення шкіри
- 9.1.5. Засоби для лікування псоріазу
 - 9.1.5.1. Засоби для системного застосування. Імунодепресанти (лікарські засоби, що впливають на імунну відповідь)
 - 9.1.5.2. Засоби для зовнішнього (топічного) застосування
- 9.1.6. Засоби для лікування дерматитів (у т.ч. атопічного дерматиту) та екзем
- 9.1.7. Топічні місцеві анестетики та засоби проти свербіжжя
 - 9.1.7.1. Антигістамінні засоби для топічного застосування
 - 9.1.7.2. Анестетики для топічного застосування
- 9.1.8. Лікарські засоби для лікування вугрів та розацеа
 - 9.1.8.1. Засоби для зовнішнього застосування
 - 9.1.8.1.1. Бензоїл пероксид та азелаїнова кислота
 - 9.1.8.1.2. Антибактеріальні засоби
 - 9.1.8.1.3. Ретиноїди
 - 9.1.8.1.4. Інші лікарські засоби
 - 9.1.8.2. Засоби для системного застосування
 - 9.1.8.2.1. Антибіотики
 - 9.1.8.2.2. Ретиноїди
 - 9.1.8.2.3. Гормональні лікарські засоби
- 9.1.9. Засоби із захисною та пом'якшувальною дією
 - 9.1.9.1. Засоби із захисною дією
 - 9.1.9.2. Засоби із пом'якшувальною дією
- 9.1.10. Лікувальні шампуні та інші засоби для лікування патологічних станів волосистої частини голови

9.2. Засоби для лікування венеричних хвороб (сифіліс, гонорея) та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом

- 9.2.1. Засоби для лікування сифілісу та гонореї
 - 9.2.1.1. Пеніциліни, що чутливі до дії бета-лактамаз
 - 9.2.1.2. Тетрацикліни
 - 9.2.1.3. Макроліди
 - 9.2.1.4. Антибіотики групи цефалоспоринів
 - 9.2.1.5. Фторхіноліни
 - 9.2.1.6. Інші антибактеріальні лікарські засоби
- 9.2.2. Засоби для лікування неускладненої уrogenітальної хламідійної інфекції та інших негонококових уrogenітальних інфекцій
 - 9.2.2.1. Тетрацикліни
 - 9.2.2.2. Фторхіноліни
 - 9.2.2.3. Макроліди
 - 9.2.2.4. Лінкозаміди

9.2.3. Засоби для лікування урогенітальної трихомонадної інфекції (трихомоніазу)

9.1. Засоби для застосування у дерматології

9.1.1. Загальні принципи лікування дерматологічних захворювань (лікарські форми та кількісні норми призначення)

9.1.2. Кортикостероїди для зовнішнього (топічного) застосування

- **Гідрокортизон (Hydrocortisone) *** (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: D07AB02 - кортикостероїди для застосування в дерматології.

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна, антиалергічна, протинабрякова, протисвербіжна дія; застосування у рекомендованих дозах не спричиняє пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковозалозної системи.

Показання для застосування ЛЗ: стани з відповіддю на лікування топічними кортикостероїдами (екзема^{БНФ.ВООЗ}, дерматити^{БНФ.ВООЗ}, псоріаз^{ВООЗ}), виникнення яких не пов'язане з м/о та які, очікувано, даватимуть неповну відповідь на лікування активними препаратами слабкої дії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: курсова доза препарату, яку можна застосовувати протягом тижня, не повинна перевищувати 30 - 60 г на тиждень; тривалість курсу лікування залежить від динаміки лікування; препарат наносити у невеликій кількості на шкіру не більше 2 р/добу; для забезпечення кращого терапевтичного ефекту можна накладати оклюзійну пов'язку за виключенням мокнучих уражень.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: дерматит, екзема, контактний дерматит; контактна алергія, пустульозне акне; атрофія шкіри, часто необоротна, що супроводжується потоншенням епідермісу, телеангіоектазіями, пурпурою та стріями; депігментація, гіпертрихоз; розацеаподібний та періоральний дерматит, що супроводжується або не супроводжується атрофією шкіри; «ефект рикошету», що може призвести до стероїдної залежності; уповільнене загоювання ран; інфекція шкіри, почервоніння, подразнення, печіння, висипи, свербіж, сухість шкіри, фолікуліт, пітниця, акне, мацерація, адренкортикальна супресія, с-м Кушинга, гіперглікемія, глюкозурія, затримка росту та внутрішньочерепна гіпертензія, підвищення ВТ та ризик виникнення катаракти (при систематичному попаданні препарату на кон'юнктиву), р-ції гіперчутливості, розмитий зір.

Протипоказання до застосування ЛЗ: пошкодження шкіри, викликані бактеріальними інфекціями (піодермія, сифілітичні або туберкульозні ураження), вірусними інфекціями (вітряна віспа, простий герпес, оперізувальний герпес, бородавка звичайна, бородавка плоска, конділома, контагіозний молюск); інфекції, спричинені грибами та дріжджами; паразитарні інфекції (короста); виразкові ураження шкіри; побічні реакції, викликані ГК (періоральний дерматит, стрії); іхтіоз, ювенільний підшовний дерматоз, вульгарні вугри, розацеа, ламкість судин шкіри, атрофія шкіри; АР гіперчутливості на компоненти препарату або ГК; новоутворення шкіри.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БУТИКОРТ	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	мазь по 10г у тубі	1 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БУТИКОРТ	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	мазь по 30г у тубі	1 мг/г	№1	130,00	
	ГІДРОКОРТИЗОНО ВИЙ КРЕМ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості), Україна/Україна	крем по 15г у тубі	1 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГІДРОКОРТИЗОНО ВИЙ КРЕМ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП"	крем по 30г у тубі	1 мг/г	№1	111,93	

		(контроль якості), Україна/Україна					
	КОРТИДЕРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості), Україна/Україна	крем по 10г у тубі	1 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КОРТИДЕРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості), Україна/Україна	крем 30г у тубі	1 мг/г	№1	124,46	
	КОРТИДЕРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості), Україна/Україна	крем по15г у тубі	1 мг/г	№1	73,22	
II.	ЛОКОЇД КРЕЛО	Темплер Італія С.р.л., Італія	емульс. нашк. по 30г у фл.	1 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛОКОЇД ЛІПОКРЕМ	Темплер Італія С.р.л., Італія	крем по 30г у тубі	1 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛОКОЇД®	Темплер Італія С.р.л., Італія	мазь по 30г у тубі	1 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛОКОЇД®	Темплер Італія С.р.л., Італія	крем по 30г у тубі	1 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

- **Бетаметазон (Betamethasone) * ^[1]** (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: D07AC01 - кортикостероїди для застосування в дерматології. Активні кортикостероїди (група III).

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна, протисвербіжна, судинозвужувальна, антиалергічна, антипроліферативна дія.

Показання для застосування ЛЗ: лікування алергічних та атопічних дерматитів; дерматозів, чутливих до сильнодіючої глюкокортикостероїдної терапії, таких як псоріаз^{БНФ, ВООЗ}, токсичної екземи, початкове лікування тяжкої атопічної екземи^{БНФ, ВООЗ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: наносити тонким шаром на уражені ділянки шкіри декілька разів на добу; при поліпшенні стану частоту нанесень можна знизити; слід уникати тривалого застосування ЛЗ (більше 3 місяців) або нанесення на великі ділянки (понад 20 % поверхні тіла), або лікування більше 10 % поверхні тіла протягом більше 1 тижня; форму препарату слід адаптувати до типу шкіри і стадії захворювання.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: опортуністичні інфекції, реакції локальної підвищеної чутливості; пригнічення осі гіпоталамус - передня частка гіпофіза - кора надниркових залоз: кушингоїдні ознаки (наприклад, місяцеподібне обличчя, центральне ожиріння), затримка збільшення маси тіла/росту у дітей, остеопороз, глаукома, гіперглікемія/глюкозурія, катаракта, артеріальна гіпертензія, збільшення маси тіла/ожиріння, зменшення рівня ендogenousного кортизолу, алопеція, ламкість волосся; затуманення зору; свербіж, відчуття місцевого печіння/болю шкіри, алергічний контактний дерматит/дерматит, (включаючи розацеаподібний [періоральний] дерматит), еритема, висипання, кропив'янка, пустульозна форма псоріазу, потоншення шкіри/атрофія шкіри, зморщування шкіри, висушування шкіри, стрії на шкірі, телеангіоектазії, зміни пігментації, гіпертрихоз, загострення основних симптомів, стероїдні вугри, подразнення/біль у місці нанесення, фолікуліт, вторинна інфекція, сухість шкіри в місці нанесення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату; вірусні інфекції, у т.ч. поствакцинальні реакції та вітряна віспа; вірусні шкірні інфекції (простий герпес, оперізувальний лишай, вітряна віспа); рожеві та звичайні вугри; розацеаподібний (періоральний) дерматит; генералізований бляшковий псоріаз; бактеріальні дерматози, у т.ч. туберкульоз і сифіліс шкіри; грибові захворювання; офтальмологічні захворювання; не рекомендується застосування під оклюзійними пов'язками (гіпс тощо); І триместр вагітності, дітям до 1 року (р-н нашкірний).

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БЕТАЗОН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості), Україна/Україна	крем д/зовн. застос. по 15г у тубі	0,1%	№1	47,14	
	БЕТАЗОН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості), Україна/Україна	крем д/зовн. застос. по 30г у тубі	0,1%	№1	77,53	
	БЕТАМЕТАЗОН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	крем по 15г у тубі	0,64 мг/г	№1	36,60	
	МЕЗОДЕРМ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	крем по 30г у тубі	1 мг/г	№1	54,41	
II.	БЕЛОДЕРМ	Белупо, ліки та косметика, д.д., Хорватія	крем д/зовн. застос. по 15г у тубі	0,05%	№1	75,45	26,80/€
	БЕЛОДЕРМ	Белупо, ліки та косметика, д.д., Хорватія	крем д/зовн. застос. по 30г у тубі	0,05%	№1	95,50	26,80/€
	БЕЛОДЕРМ	Белупо, ліки та косметика, д.д., Хорватія	мазь д/зовн. застос. по 15г у тубі	0,05%	№1	75,45	26,80/€
	БЕЛОДЕРМ	Белупо, ліки та косметика, д.д., Хорватія	мазь д/зовн. застос. по 30г у тубі	0,05%	№1	95,50	26,80/€
	БЕЛОДЕРМ	Белупо, ліки та косметика, д.д., Хорватія	спрей по 20мл у фл.	0,05%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БЕЛОДЕРМ	Белупо, ліки та косметика, д.д., Хорватія	спрей по 50мл у фл.	0,05%	№1	180,50	26,80/€
	БЕТЛІБЕН®	Ядран-Галенський Лабораторій д.д., Хорватія	крем по 25г у тубі	0,5 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БЕТЛІБЕН®	Ядран-Галенський Лабораторій д.д., Хорватія	мазь по 25г у тубі	0,5 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СОДЕРМ	мібе ГмбХ Арцнайміттель,	р-н нашк. по	0,1%	№1	відсутня у	

		Німеччина	15мл, 30мл, 50мл, 100мл у фл. з крап.			реєстрі ОБЦ
СОДЕРМ		мібе ГмБХ Арцнайміттель, Німеччина	мазь по 25г, 50г у тубі	0,1%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ
СОДЕРМ		мібе ГмБХ Арцнайміттель, Німеччина	крем по 25г, 50г у тубі	0,1%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ
СОДЕРМ		мібе ГмБХ Арцнайміттель, Німеччина	емульс. нашк. по 20мл, 50мл у фл.	0,1%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ
СОДЕРМ®		мібе ГмБХ Арцнайміттель, Німеччина	р-н нашк. по 15мл, 30мл, 50мл, 100мл у фл. з крап.	0,1%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ
СОДЕРМ®		мібе ГмБХ Арцнайміттель, Німеччина	мазь по 25г, 50г у тубі	0,1%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ
СОДЕРМ®		мібе ГмБХ Арцнайміттель, Німеччина	крем по 25г, 50г у тубі	0,1%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ
СОДЕРМ®		мібе ГмБХ Арцнайміттель, Німеччина	емульс. нашк. по 20мл, 50мл у фл.	0,1%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ
ЦЕЛЕСТОДЕРМ-В®		Шерінг-Плау Лабо Н.В., Бельгія	мазь по 15г, 30г у тубі	0,1%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ

• **Клобетазол (Clobetasol)**

Фармакотерапевтична група: D07AD01 - кортикостероїди для місцевого застосування, високоактивні кортикостероїди

Основна фармакотерапевтична дія: є неспецифічна протизапальна дія завдяки вазоконстрикції та зменшенню синтезу колагену.

Показання для застосування ЛЗ: призначають дорослим, особам літнього віку та дітям старше 1 року тільки для короткотривалого лікування порівняно більш стійких запальних та свербіжних проявів стероїд-чутливих дерматозів, які нечутливі до менш активних кортикостероїдів: псоріаз^{БНФ} (за винятком поширеного бляшкового псоріазу), дерматози, що важко піддаються лікуванню; червоний плесканий лишай, дискоїдний червоний вовчак та інші захворювання шкіри, що не піддаються лікуванню менш активними ГКС.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: крем - д/лікування вологих та мокнучих ділянок шкіри; мазь д/лікування уражень шкіри, що супроводжуються її сухістю, ліхеніфікацією або лущенням; наносити тонким шаром, покриваючи всі уражені ділянки шкіри, 1-2 р/добу до появи покращення клінічних проявів, потім зменшують частоту застосування або змінюють препарат на менш потужний; у разі погіршення або відсутності покращення протягом 2-4 тижнів діагноз та лікування слід переглянути; лікування не має тривати більше ніж 4 тижні, максимальна тижнева доза не повинна перевищувати 50 г; при досягненні контролю за захворюванням застосування клобетазолу слід поступово відмінити, а також продовжувати застосування пом'якшувального засобу як підтримувальної терапії; повернення симптомів попередніх дерматозів можливе при раптовій відміні ЛЗ; у разі більш стійких уражень, особливо з гіперкератозом, ефект ЛЗ можна підсилити, накривши уражену ділянку шкіри оклюзійною поліетиленовою пов'язкою; для місцевого застосування: дерматози, що важко піддаються лікуванню/пацієнти з частими загостреннями захворювання - після досягнення ефекту від безперервного курсу місцевого застосування кортикостероїду, розглянути інтермітуючу схему застосування (1 р/добу, 2 р/тижд., без оклюзійної пов'язки), яку об'єднати з постійним щоденним застосуванням емолієнтів. Слід регулярно оцінювати клінічний стан, а також користь та ризик від продовження лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: опортуністичні інфекції, гіперчутливість, генералізований висип; пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової системи: кушингоїдні ознаки (наприклад місяцеподібне обличчя, центральне ожиріння), затримка збільшення маси тіла/ росту у дітей, остеопороз, глаукома, гіперглікемія/глюкозурія, катаракта, АГ, збільшення маси тіла/ ожиріння, зменшення рівня ендогенного кортизолу, алопеція, ламкість волосся; свербіж, відчуття місцевого печіння/болю у шкірі, місцева атрофія шкіри, атрофічні смуги на шкірі, телеангіоектазії; потоншення шкіри, зморщування шкіри, висушування шкіри, зміни пігментації, гіпертрихоз, загострення основних симптомів, алергічний контактний дерматит/дерматит, пустульозна форма псоріазу, еритема, висипання, кропив'янка, акне, подразнення/біль у місці нанесення, порушення чіткості зору.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-яких компонентів препарату; неліковані інфекції шкіри; рожеві вугрі (розацеа); звичайні вугрі (акне); свербіж без запалення; періанальний та генітальний свербіж; періоральний дерматит; дерматози у дітей віком до 1 року, включаючи дерматити та пелюшкові висипання.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КЛОБЕСКІН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія"	крем по 25г у тубі	0,5 мг/г	№1	107,90	

		"Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості), Україна/Україна					
	КЛОБЕСКІН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості), Україна/Україна	мазь по 25г у тубі	0,5 мг/г	№1	107,02	
II.	ДЕЛОР®	Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія	крем по 25г у тубі	0,5 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДЕЛОР®	Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія	мазь по 25г у тубі	0,5 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДЕРМОВЕЙТ™	ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А., Польща	мазь по 25г у тубі	0,5 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДЕРМОВЕЙТ™	ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А., Польща	крем по 25г у тубі	0,5 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КАРІЗОН	мібе ГмбХ Арцнайміттель, Німеччина	р-н нашк. по 15мл, 30мл, 50мл у фл. з крап.	0,5 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КАРІЗОН	мібе ГмбХ Арцнайміттель, Німеччина	крем по 15г, 30г, 50г у тубі	0,5 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КАРІЗОН	мібе ГмбХ Арцнайміттель, Німеччина	мазь по 15г, 30г, 50г у тубі	0,5 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КАРІЗОН	мібе ГмбХ Арцнайміттель, Німеччина	жирна мазь по 15г, 30г, 50г у тубі	0,5 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КЛОВЕЙТ®	Фармзавод Єльфа А.Т., Польща	крем по 25г у тубі	0,5 мг/г	№1	79,00	
	КЛОВЕЙТ®	Фармзавод Єльфа А.Т., Польща	мазь по 25г в тубі	0,5 мг/г	№1	79,00	
	ПОВЕРКОРТ	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія	крем по 5г, 15г у тубі	0,5 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Флуоцинолон (Fluocinolone)**

Фармакотерапевтична група: D07AC04 - ГК для застосування в дерматології.

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна, протиалергічна, протисвербіжна. У результаті місцевої судинозвужувальної дії знижує ризик розвитку ексудативних р-цій; знижує синтез білків і відкладення колагену; прискорює розпад білків у шкірі і ослаблює проліферативні процеси;сприяє утворенню білків ліпокортинів, що мають протинабрякову активність.

Показання для застосування ЛЗ: нетривале місцеве лікування г. і тяжких неінфекційних запальних захворювань шкіри (сухі форми), які супроводжуються стійким свербіжем або гіперкератозом та реагують на лікування ГКС: себорейного дерматиту, уртикарного лишая, атопічного дерматиту, контактної алергічної екземи^{БНФ}, мультиформної еритеми, червоного вовчачка, псоріазу^{БНФ} волосяних ділянок шкіри, запущеного псоріазу, плескатоного лишая.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: наносити тонким шаром на уражену шкіру, гель застосовують спочатку 2-3 р/добу, а потім, після пом'якшення г. запального стану, не частіше 1-2 р/добу^{БНФ}; мазь або крем наносити 1-2 р/добу; лікування не проводити безперервно понад 2 тижні (гель, мазь) або 10 днів (крем); не можна застосовувати на шкіру обличчя більше 1 тижня; протягом тижня рекомендується застосувати не більше 15 г; при необхідності глибокого проникнення діючої речовини можна обережно втирати в шкіру у місці застосування; не застосовувати під оклюзійну пов'язку, під час лікування рекомендується носити просторий одяг; з обережністю,

під контролем лікаря застосовувати препарат дітям віком від 2 років (гель, мазь) або від 16 років (крем) тільки 1 р/добу на невеликій ділянці шкіри; не наносити на шкіру обличчя дитини.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: при зовнішньому застосуванні на шкіру повік - катаракта або глаукома; атрофія підшкірної клітковини та порушення цілісності шкіри, атрофічні смуги, пригнічення росту епідермісу, телеангіоектазія; гіпертрихоз; знебарвлення або гіперпігментація шкіри, стероїдні вугрі, сухість шкіри, надмірний ріст волосся на тілі або алопеція, свербіж, відчуття печіння, подразнення шкіри, контактний дерматит; кропив'янка, уртикарне або плямисто-папульозне висипання або загострення існуючих змін; АР або р-ції гіперчутливості; системна дія: набряки, АГ, зниження імунітету, пригнічення росту і розвитку у дітей, гіперглікемія, глюкозурія, розвиток с-му Кушинга, зміщення гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової осі; вторинні інфекції; фолікуліт, мацерація шкіри, стероїдна пурпура, періоральний дерматит, погіршення перебігу екземи (феномен рикошету); гіперкератоз, фурункульоз, загострення існуючих патологічних уражень, гірсутизм, гастрит, стероїдна виразка шлунка, стероїдний ЦД, недостатність надниркових залоз; вторинний імунодефіцит (загострення хр. інфекційних захворювань, генералізація інфекційного процесу, розвиток опортуністичних інфекцій), уповільнення репаративних процесів.

Протипоказання до застосування ЛЗ: пiodермія, вітряна віспа, герпес, актиномікоз, бластомікоз, споротрихоз, численні псоріатичні бляшки, шкірні прояви сифілісу, туберкульоз шкіри, ерозивно-виразкові ураження ШКТ, рани на ділянках аплікацій, невус, атерома, меланома, гемангіома, ксантома, саркома, пухлини шкірного покриву, рак шкіри, рожеві та вульгарні вугрі, періанальний та генітальний свербіж, періоральний дерматит, пелюшковий дерматит, тромбофлебіт та трофічні виразки на тлі варикозного розширення вен; не застосовувати: після вакцинації, на великих ділянках шкіри, особливо на рани, що довго не загоюються (глибокі опікові рани), в офтальмології, при бактеріальних, вірусних та грибкових інфекціях шкіри, звичайних та рожевих вуграх, пелюшковому дерматиті, періоральному дерматиті, після профілактичних щеплень, періанальному та генітальному свербіжі, а також у випадку підтвердженої підвищеної чутливості до флуоцинолону ацетоніду або до інших ГКС чи інших компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АЛЕРГОДЕРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості), Україна/Україна	мазь по 15г у тубі	0,25 мг/г	№1	30,62	
	СИНАФЛАН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості), Україна/Україна	мазь по 15г у тубі	0,25 мг/г	№1	40,78	
	СИНАФЛАНУ МАЗЬ	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	мазь по 10 у тубі	0,25 мг/г	№1	33,79	
	СИНАФЛАН-ФІТОФАРМ	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	мазь по 15 у тубі	0,25 мг/г	№1	46,36	
	ФЛУЦАР®-ДАРНИЦЯ	ПРАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	крем по 15г у тубі	1 мг/г	№1	29,99	
II.	СИНАФЛАН	АТ "Нижфарм", Російська Федерація	мазь по 15г у тубі	0,25 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФЛУЦИНАР®	Фармзавод Ельфа А.Т., Польща	мазь по 15 у тубі	0,25 мг/г	№1	95,00	
	ФЛУЦИНАР®	Фармзавод Ельфа А.Т., Польща	гель по 15г у тубі	0,25 мг/г	№1	98,00	

- **Флутиказон (Fluticasone)**

Фармакотерапевтична група: D07AC17 - кортикостероїди для застосування в дерматології. Активні кортикостероїди (група III).

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна активність; низький рівень пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковозалозної системи при місцевому застосуванні; висока спорідненість із глюкокортикоїдними рецепторами людини.

Показання для застосування ЛЗ: дерматози, чутливі до лікування ГК: атопічні дерматити; нумулярний дерматит (дискоїдна екзема); вузлуватий свербіж; псоріаз^{БНФ} (за винятком поширеного бляшкового псоріазу); простий хр. лишай (нейродерматит), червоний плесканий лишай; себорейний дерматит^{БНФ}; подразнювальний або алергічний контактний дерматит; дискоїдний червоний вовчак; генералізована еритродермія (як додатковий засіб); р-ція на укуси комах; червона пітниця; лікування атопічного дерматиту у дітей віком від 3 міс. у разі відсутності ефекту від лікування менш потужними ГК.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим, дітям та немовлятам старше 3 міс препарат наноситься тонким шаром на уражені ділянки шкіри 1-2 р/добу^{БНФ}, тривалість лікування при щоденному застосуванні становить до 4 тижнів до покращення стану, потім зменшити частоту нанесення крему (мазі) або змінити на лікування менш потужним препаратом, після нанесення крему (мазі) надати достатньо часу для абсорбції препарату перед наступним нанесенням емолієнту, після досягнення контролю над хворобою частоту застосування топічних ГК поступово зменшити до повної відміни і як підтримуючу терапію застосовувати емолієнти, крем особливо сприйнятливий для лікування вологих або мокнучих поверхонь шкіри; мазь особливо сприйнятлива для лікування сухих поверхонь шкіри, а також шкіри з лишайними або лусочковими ураженнями; якщо при застосуванні мазі дітям протягом 7-14 днів не настає покращення, лікування слід припинити та дитину дообстежити.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: опортуністичні інфекції, гіперчутливість, пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи: збільшення маси тіла/ожиріння; затримка збільшення маси тіла/затримка росту у дітей; кушингоїдні ознаки (місяцеподібне обличчя, центральне ожиріння); зменшення рівня ендогенного кортизолу; гіперлікемія/глюкозурія; АГ; остеопороз; катаракта; глаукома; свербіж; відчуття місцевого печіння у шкірі; потоншення шкіри, атрофія шкіри, стрії, телеангіоектазії, гіпертрихоз, гіполігментація, алергічний контактний дерматит, загострення дерматозів, пустульозна форма псоріазу, еритема, висипання, кропив'янка; порушення чіткості зору.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів ЛЗ, неліковані інфекції шкіри, рожеві вугрі, звичайні вугрі, періоральний дерматит, періанальний та генітальний свербіж, свербіж без запалення, дерматози у дітей віком до 3 міс, включаючи дерматити та пелюшкові висипання.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ФЛУДЕРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості), Україна/Україна	крем по 15г у тубі	0,5 мг/г	№1	110,34	
	ФЛУДЕРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості), Україна/Україна	крем по 15г у тубі	0,05 мг/г	№1	114,43	
II.	КУТІВЕЙТ™	ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А., Польща	мазь по 15г у тубі	0,005%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КУТІВЕЙТ™	ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А., Польща	крем по 15г у тубі	0,05%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

- **Мометазон (Mometasone)** ^[7] (див. п. 4.2.1. розділу "ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ", п. 16.2.1.1.5. розділу "ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: D07AC13 - кортикостероїди для місцевого застосування у дерматології.

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна, протисвербіжна, антиексудативна.

Показання для застосування ЛЗ: запальні явища і свербіж при дерматозах, що піддаються терапії кортикостероїдами, у тому числі псоріаз ^{БНФ} (крім поширеного бляшкового псоріазу) та атопічний дерматит, у дорослих та дітей віком від 2 років; лікування запалення та свербіжу, спричинених дерматозами на поверхні волосистої частини шкіри (шкіра голови).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: крем (мазь) наносять тонким шаром на ураженні ділянки шкіри 1 р/добу ^{БНФ}; кілька крап. лосьйону наносити на ураженні місця 1 р/добу; обережно та ретельно втирати до повного всмоктування препарату. тривалість лікування визначається тяжкістю, перебігом захворювання та визначається індивідуально; використання місцевих ГК дітям та на обличчі необхідно обмежити мінімальною кількістю порівняно з ефективними терапевтичними режимами, при цьому тривалість лікування не має перевищувати 5 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: фолікуліт; інфекції, фурункули, відчуття печіння; парестезії, свербіж; контактний дерматит, гіпопигментація шкіри, гіпертрихоз, атрофічні смуги шкіри, дерматит акнеподібний, атрофія шкіри, біль у місці нанесення, реакції у місці нанесення, подразнення шкіри та місцеві шкірні реакції, сухість та подразнення шкіри, дерматит, періоральний дерматит, мацерація шкіри, стрії, заострення захворювання, еритема, пітниця та телеангіктазії, папульозні, пустульозні висипання та відчуття поколювання.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до будь-якого з компонентів ЛЗ або до інших ГК; розацеа, акне вульгаріс, атрофія шкіри, періоральний дерматит, періанальний та генітальний свербіж, підгузкові висипання, бактеріальні (імпетиго, підерміт), вірусні (герпес простий, герпес оперізувальний та вітряна віспа, прості бородавки, г. конділоми, контагіозний молюск), паразитні та грибові (кандида або дерматофіт) інфекції, туберкульоз, сифіліс або поствакцинальні реакції; не застосовувати на ранах або на вкритій виразками шкірі.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕЛОДЕРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості), Україна/Україна	мазь по 15г у тубі	1 мг/г	№1	103,42	
	ЕЛОДЕРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості), Україна/Україна	мазь по 30г у тубі	1 мг/г	№1	178,31	
	МОЛЕСКІН	ПАТ "Фармак", Україна	крем по 15г у тубі	0,1%	№1	85,00	
	МОЛЕСКІН®	АТ "Фармак", Україна	крем по 15г у тубі	0,1%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МОЛЕСКІН®	АТ "Фармак", Україна	мазь по 15г у тубі	0,1%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	ЕЛОЗОН®	Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія	крем по 30г у тубі	1 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕЛОКОМ®	Шерінг-Плау Лабо Н.В., Бельгія	мазь по 15г, 30г у тубі	1 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕЛОКОМ®	Шерінг-Плау Лабо Н.В., Бельгія	крем по 15г, 30г у тубі	1 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

ЕЛОКОМ®	Фамар Монреаль Інк., Канада	лосьйон по 30мл у фл.-крап.	1 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
МОМАТ КРЕМ	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд./Гленмарк Фармасьютикалз Лімітед, Індія/Індія	крем по 5г, 15г у тубі	1 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
МОМАТ МАЗЬ	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд./Гленмарк Фармасьютикалз Лімітед, Індія/Індія	мазь по 5г, 15г у тубі	1 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
МОМЕДЕРМ®	Фармзавод Ельфа А.Т., Польща	мазь по 15г у тубі	1 мг/г	№1	82,00
МОМЕДЕРМ®	Фармзавод Ельфа А.Т., Польща	крем по 30г у тубі	1 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
МОМЕДЕРМ®	Фармзавод Ельфа А.Т., Польща	крем по 15г у тубі	1 мг/г	№1	82,00

• **Триамцинолон (Triamcinolone)**

Фармакотерапевтична група: D07AB09 - кортикостероїди для застосування в дерматології.

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна, протиалергічна, протисвербіжна.

Показання для застосування ЛЗ: захворювання шкіри, чутливі до кортикостероїдів (екзема, вульгарний псоріаз, алергічний дерматит).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим крем (мазь) наноситься 2-3 р/добу тонким шаром на уражену ділянку (МДД для дорослих не більше, ніж 15 г) або застосовують під оклюзійну пов'язку (МДД для дорослих не більше, ніж 10 г); дітям віком старше 1 року тонкий шар наносять максимум 2 р/добу на уражену ділянку шкіри; тривалість застосування препарату дітям не повинна перевищувати 5 днів; застосування оклюзійної пов'язки дітям протипоказано.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції підвищеної чутливості, пригнічення ф-ції кори надниркових залоз (вторинна недостатність кори надниркових залоз), гіпокаліємічний алкалоз, затримка в організмі води та натрію, гіпокаліємія, АГ, психічні порушення, судоми, запаморочення, головний біль, підвищення внутрішньочерепного тиску, безсоння, катаракта, задня субкапсулярна катаракта, екзофтальм, глаукома, набряк соска зорового нерва, виразка рогової, СН, шлункова кровотеча, шлунково-кишкова кровотеча, шлунково-кишкова перфорація, езофагіт, панкреатит, пептична виразка, дерматит, відчуття печіння, фолікуліт, акнеформні висипи, контактний дерматит, сухість та потоншення шкіри, еритема, гірсутизм, підвищене потовиділення, попрілості, свербіж, атрофія шкіри, гіпопигментація, подразнення, стрії, телеангіктазії, уповільнення загоєння ран, затримка росту у дітей, стероїдна міопатія, остеопороз, остеонекроз, асептичний некроз, підвищення ВЧ, негативний азотистий баланс, уповільнення р-цій при шкірних тестах, активізація латентних інфекцій, маскування перебігу інфекцій, опортуністичні інфекції; місцеві шкірні р-ції на допоміжні речовини.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату; не можна застосовувати в очі або ділянки шкіри біля очей; в якості монотерапії без проведення специфічного лікування при грибкових і бактеріальних шкірних інфекціях; туберкульоз; вірусні ураження шкіри, особливо при простому герпесі та вітряній віспі; при паразитарних інфекціях (короста); шкірні прояви сифілісу; шкірні р-ції після вакцинації; періанальний і генітальний свербіж; виразка гомілки; варикозне розширення вен; поширений бляшковий псоріаз; ураження шкіри обличчя (рожеві вугрі, вульгарні вугрі, періоральний дерматит); попрілості шкіри, спричинені мокрими пелюшками; лікування сухого лущення шкіри та нанесення мазі на груди безпосередньо перед годуванням груддю; діти віком до 1 року.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АЛЕРГОКОРТ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості), Україна/Україна	мазь по 15г у тубі	1 мг/г	№1	85,53	
	ФОКОРТ®-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	крем по 15г у тубі	1 мг/г	№1	41,89	

II.	ФТОРОКОРТ®	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	мазь по 15г у тубі	1 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ
-----	------------	----------------------------------	-----------------------	--------	----	---------------------------

- **Метилпреднізолон (Methylprednisolone) **** (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: D07AC14 - кортикостероїди для застосування в дерматології.

Основна фармакотерапевтична дія: при місцевому застосуванні пригнічує запальні та АР шкіри, а також реакції, пов'язані з гіперпроліферацією клітин, що сприяє усуненню як об'єктивних симптомів (еритеми, набряку, інфільтрації, ліхеніфікації), так і суб'єктивних скарг (свербіж, печіння, біль).

Показання для застосування ЛЗ: атопічний дерматит (нейродерміт, ендегенна екзема); справжня (істинна) екзема, контактна екзема, простий контактний дерматит та алергічний контактний дерматит; дисгідротична екзема, дитяча екзема.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: наносити на уражені ділянки шкіри 1 р/добу тонким шаром, тривалість застосування у звичайних випадках не повинна перевищувати для дорослих 2 тижнів у формі емульсії та 12 тижнів у формі мазі та крему, для дітей - 4 тижні; у разі пропуску нанесення ЛЗ, не застосовувати підвищену дозу препарату при наступному нанесенні; мазь забезпечує шкірі відповідний рівень жиру, не блокуючи при цьому потіння та теплообмін; формула крему у зв'язку з підвищеним вмістом води забезпечує витікання ексудату і, таким чином, є особливо пристосованою для лікування мокнучих екзематозних елементів у г. фазі, а також ділянок шкіри з мацерацією, покритих або непокритих волоссям.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: печіння, свербіж у місці нанесення, сухість, еритема, везикули, подразнення, екзема, папули в місці нанесення, периферичні набряки, фолікуліт, гіпертрихоз, висипання, пustuли, біль, парестезія у місці нанесення, атрофія шкіри, екхімоз, імпетиго, надмірно жирна шкіра, акне, телеангіектазія, поява стріїв, навколоротовий дерматит, шкірні тріщини, зміна кольору шкіри, бактеріальний целюліт, контактний дерматит, піодермія, інфекції шкіри, грибові ураження, знебарвлення шкіри, шкірна АР, гіперчутливість до ЛЗ, системний вплив.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до метилпреднізолону ацепонату або до будь-якого іншого компонента ЛЗ; туберкульозні та сифілітичні процеси у ділянці нанесення ЛЗ; вірусні захворювання (вітряна віспа, оперізувальний лишай), розацеа, навколоротовий дерматит, виразки, звичайні вугри, атрофічний дерматит, шкірні реакції після щеплення у ділянці нанесення препарату; шкірні захворювання, що супроводжуються бактеріальними або грибковими інфекціями.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МЕТИЗОЛОН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості), Україна/Україна	крем д/зовн. застос. по 15г у тубі	1 мг/г	№1	145,85	
	СТЕРОКОРТ®	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	крем по 15г у тубі	1 мг/г	№1	163,11	
II.	АДВАНТАН®	Байер Хелскер Мануфактурінг С.Р.Л., Італія	крем по 5г, 15г у тубі	1 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

9.1.3. Засоби для топічного (зовнішнього) лікування інфекційних захворювань шкіри

9.1.3.1. Антибактеріальні засоби для топічного застосування

- **Мупіроцин (Mupirocin) ***

Фармакотерапевтична група: D06AX09 - а/б та хіміотерапевтичні засоби для місцевого застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: а/б, що виробляється шляхом ферментації м/о *Pseudomonas fluorescens*; інгібує синтез білка у бактеріальній клітині; не має перехресної резистентності до інших а/б; при застосуванні у мінімально інгібуючих концентраціях має бактериостатичні, а при застосуванні у більш високих концентраціях - бактерицидні властивості; in vitro активний проти грам(+) аеробів (*Staph. aureus*, *Staph. epidermidis* (включаючи штами, резистентні до метициліну та беталактамазопродукуючі штами), інших коагулазонегативних штамів стафілококів (включаючи метицилінрезистентні штами); *Str. species*; грам(-) аеробів: *Haemophilis influenzae* та *Escherichia coli*

Показання для застосування ЛЗ: крем: місцеве лікування вторинних бактеріальних інфекційних ускладнень^{БНФ} при травматичних ушкодженнях (невеликі рвані рани, захиті рани або садна довжиною до 10 см або до 100 см² за площею); мазь застосовується для лікування бактеріальних інфекцій шкіри, таких як імпетиго, фолікуліт, фурункульоз.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим, дітям застосовувати до 3 р/добу, наносити невелику кількість тонким шаром^{БНФ} на уражену ділянку шкіри, протягом 10 днів, залежно від перебігу захворювання; можна накладати під пов'язку; не змішувати з іншими препаратами, тому що при розведенні крему або мазі зменшується їх антибактеріальна активність та може втрачатись стабільність діючої речовини.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: реакції гіперчутливості у місці нанесення, включаючи кропив'янку, свербіж, еритему, відчуття печіння, висипання, екзема, сухість шкіри, посилення ексудації, припухлість у місці нанесення, контактний дерматит головний біль, запаморочення; нудота, абдомінальний біль, виразковий стоматит; системні АР (анафілаксія, генералізований висип, ангіоневротичний набряк).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів ЛЗ; мазь для зовнішнього застосування не призначена для офтальмологічного та інтраназального застосування.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БАКТІАЛІС	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	мазь по 15г у тубі	2%	№1	112,60	
II.	БАКТОПІК	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	мазь по 15г у тубі	2%	№1	93,85	24,25/\$
	БАКТРОБАН™	Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Велика Британія	мазь по 15г у тубі	2%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БАКТРОБАН™	Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Велика Британія	крем по 15г у тубі	2%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БОНДЕРМ	Белупо, ліки та косметика, д.д., Хорватія	мазь по 15г у тубі	20 мг/г	№1	125,08	30,70/€

• **Сульфадіазин срібла (Silver sulfadiazine) ***

Фармакотерапевтична група: D06BA01 - а/б та хіміотерапевтичні препарати, що застосовуються у дерматології. Сульфонаміди.

Основна фармакотерапевтична дія: широкий спектр дії проти Гр (+) і Гр (-) м/о та гриби; вивільняється у міжклітинну рідину, зв'язується зі стінкою бактеріальної клітини; проникає у некротизовані тканини та ексудат.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика інфікування та лікування інфікованих опіків і ран^{ВООЗ БНФ}; лікування термічних та хімічних опіків; пролежнів, виразок, поверхневих ран зі слабкою ексудацією, саден; трансплантація шкіри.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: після очищення поверхні опіку або іншої рани наносять тонким шаром (2-4 мм) на ушкоджену ділянку 1-2 р/добу, під стерильну пов'язку або відкритим способом, у тяжких випадках - до 4 р/добу; важливо, щоб уражені ділянки шкіри були весь час вкриті шаром крему або мазі; лікування триває зазвичай 10-14 днів; перед кожним наступним нанесенням уражену поверхню необхідно промити 0,9 % р-ном натрію хлориду або р-ном антисептика для видалення залишків крему або мазі та ранового ексудату; застосовують до повного загоєння рани або до моменту, коли поверхня рани буде підготовлена до відповідного хірургічного втручання; максимальна разова доза мазі - 300 г.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперчутливість, включаючи дерматити, еритеми та екзантеми, анафілаксія; лейкопенія; метгемоглобінемія; подразнення шкіри, відчуття печіння, біль при нанесенні, висипи, фотосенсибілізація, гіперпігментація, знебарвлення шкіри, мультиформна еритема, шкірні р-ції гіперчутливості з почервонінням, свербіжем, некроз шкіри; при тривалому застосуванні може спостерігатися накопичення срібла у печінці, нирках, сітківці очей, аргірія; нудота, блювання, діарея, глосит, біль у суглобах, головний біль, сплутаність свідомості, судоми, анемія, тромбоцитопенія, недостатність фолієвої к-ти, еозінофілія, агранулоцитоз, медикаментозна гарячка, порушення ф-ції печінки та/або нирок, гепатит, некроз печінки, кристалурія, інтерстиціальний нефрит, гіпоглікемія, токсичний нефроз, с-м Стівенса-Джонсона, ексфолюативний дерматит.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до сульфонамідів або до компонентів ЛЗ; порфірія; генетичний дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (при застосуванні на великих поверхнях може виникнути гемоліз); гнійні рани та опікові рани з масивною ексудацією (недоцільно); недоношені діти, немовлята до 3 міс (небезпека виникнення ядерної жовтяниці).

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АРГЕДИН БОСНАЛЕК	Босналек д.д., Боснія і Герцеговина	крем по 40г у тубі	10 мг/г	№1	120,00	26,39/€
	ДЕРМАЗИН	Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина	крем по 50г у тубі	10 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СУЛЬФАРГИН®	АТ Таллінський	мазь по 50г у тубі	10 мг/г	№1	106,06	26,85/€

	фармацевтичний завод/АТ "Гріндекс", Естонія/Латвія	тубі				
--	--	------	--	--	--	--

● **Кислота фузидова (Fusidic acid)**

Фармакотерапевтична група: D06AX01 - інші антибіотики для місцевого застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: бактеріостатична або бактерицидна дія; а/б, що утворюється у процесі росту *Fusidium coccineum*, порушує синтез білка мікробної клітини; справляє потужну антибактеріальну дію на широке коло грам(+) м/о - *Staph. spp.*, *Str. spp.*, *Corynebacterium minutissimum*, в т.ч. на стафілококи, стійкі до дії пеніциліну, стрептоміцину, хлорамфеніколу, еритроміцину та інших а/б; має властивість діяти через інтактну шкіру.

Показання для застосування ЛЗ: як монотерапія або в комбінації із системною терапією, для лікування первинних або вторинних інфекцій шкіри^{БНФ} та м'яких тканин, спричинених чутливими штамми м/о *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.* та *Corynebacterium minutissimum*, у тому числі: імпетиго, фолікуліт, пароніхії, сикоз шкіри у ділянці бороди, еритразма, вугрові висипання, інфіковані рани та опіки, інфікований контактний дерматит, інфікований екземоподібний дерматит. Крем застосовувати для лікування мокнучих захворювань шкірних покривів. Мазь застосовувати при сухих ураженнях та при хронічних процесах.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: гель: дорослим та дітям старше 1 міс: наносити тонким шаром на уражені ділянки шкіри після видалення некротичних мас 2 - 3 р/добу протягом 7 днів; можна застосовувати під пов'язку - у даному випадку можна застосовувати рідше (1-2 р/добу); лікування вугрів необхідно проводити протягом більш тривалого часу - до 14 днів. мазь/крем: дорослим і дітям віком від 2 р. наносити на уражені ділянки шкіри 2-3 р/добу протягом 7 днів. При наявності некротичних мас їх необхідно видалити перед нанесенням препарату.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: свербіж, легке печіння, відчуття поколювання, дерматит, включаючи контактний та екзематозний, шкірні висипання (еритематозні, пустулярні, везикулярні, макулопапульозні і папульозні). Також спостерігався генералізований висип., еритема, біль у місці нанесення, р-ції у місці нанесення, р-ції підвищеної чутливості (подразнення шкіри, печіння, кон'юнктивіт, переорбітальний набряк, ангіоневротичний набряк, кропив'янка), кон'юнктивіт.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до фузидієвої к-ти або до інших компонентів ЛЗ, інфекції шкіри та м'яких тканин, нечутливі до препарату (*Pseudomonas aeruginosa*).

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ФУЗІДЕРМ®	Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія	мазь по 15г у тубі	20 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФУЗІДЕРМ®	Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія	крем по 15г у тубі	20 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФУЗІДЕРМ®	Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія	гель по 15г у тубі	20 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФУЗІКУТАН	мібе ГмБХ Арцнайміттель, Німеччина	крем по 5г, 10г, 15г, 30г у тубі	20 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФУЗІКУТАН	мібе ГмБХ Арцнайміттель, Німеччина	мазь по 5г, 15г, 30г у тубі	20 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Метронідазол (Metronidazole) (див. п. 17.2.9., п. 17.6.3., п. 17.6.5. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")**

Фармакотерапевтична група: D06BX01 - хіміотерапевтичні засоби для місцевого застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: антипротозойна, антибактеріальна дія; виявляє ефективність щодо *Trichomonas vaginalis*, *Giardia intestinalis*, *Entamoeba histolytica*, *Lambliа*, а також до облигатних анаеробів – *Bacteroides spp.*, *Fusobacterium spp.*; після проникнення в клітину м/о взаємодіє з ДНК, пригнічуючи її синтез, що призводить до загибелі м/о; при місцевому застосуванні чинить противугрову дію.

Показання для застосування ЛЗ: місцеве лікування запальних папул і пустул при розацеа^{БНФ} та вульгарних вуграх, розацеаподібного стероїдного дерматиту.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: крем та гель наносити тонким шаром на уражену ділянку шкіри після її очищення; рекомендується робити перерву в 15-20 хв між очищенням шкіри та нанесенням ЛЗ; застосовувати 2 р/день (вранці і ввечері), середня тривалість лікування становить 3-4 місяці; якщо необхідно, застосовувати оклюзійну пов'язку (для гелю); терапевтичний ефект спостерігається після 3 тижнів лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: запаморочення, головний біль, судоми, периферична сенсорна нейропатія; енцефалопатія, підгострий мозочковий синдром (атаксія, дизартрія, порушення ходи, ністагм, тремор), які можуть минати після припинення прийому препарату; сплутаність свідомості, галюцинації; слъзотеча (якщо гель наносити близько до ділянки очей), тимчасові порушення зору (диплопія, міопія); лейкопенія, лейкоцитоз, агранулоцитоз, нейтропенія, тромбоцитопенія; АР, шкірний висип, легка сухість, кропив'янка, шкірний свербіж, гіперемія шкіри, пропасниця, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок; пустульозної висип. Крем: гіпоастезія, парестезія, дисгевзія (металевий присмак у роті); нудота, дисульфірамоподібні симптоми, контактний дерматит; тимчасове посилення симптомів розацеа.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до метронідазолу, а також до похідних нітроїмідазолу, парабенів та подібних сполук або до будь-яких компонентів, що входять до складу ЛЗ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	МЕТРОГІЛ®	"Юнік Фармасьютикал Лабораторіз" (відділення фірми "Дж.Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	гель д/зовн. застос. по 30г у тубі	10 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	РОЗАМЕТ®	Ядран-Галенський Лабораторій д.д., Хорватія	крем по 25г у тубі	10 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Тетрациклін (Tetracyclin)**

Фармакотерапевтична група: D06AA04 - дерматологічні засоби. Антибіотик для місцевого застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: бактеріостатичний а/б широкого спектра дії з групи тетрациклінів, порушує утворення комплексу між транспортною РНК та рибосомами, що порушує синтез білка; активний щодо *Propionibacterium acnes (Corynebacterium acnes)*, Гр+ (*Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Haemophilus influenzae, Listeria spp., Bacillus anthracis*) та Гр- м/о (*Neisseria gonorrhoeae, Bordetella pertussis, Escherichia coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Shigella spp.*), а також *Rickettsia spp., Chlamidia spp., Mycoplasma spp., Treponema spp.*, стійкі до препарату: *Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Serratia spp.*, більшість штамів *Bacteroides spp.* та грибів, дрібні віруси.

Показання для застосування ЛЗ: лікування гнійних інфекцій шкіри: фурункульоз, екземи інфіковані, вугровий висип, фолікуліт.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати місцево дорослим та дітям віком від 11 років, наносити тонким шаром безпосередньо на уражену ділянку шкіри 1-2 р/добу, тривалість лікування від кількох днів до 2-3 тижнів, залежно від ефективності лікування та індивідуальної чутливості хворого до компонентів препарату визначає лікар індивідуально.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: свербіж, почервоніння шкіри, легке печіння у місці нанесення мазі, зміна кольору шкіри, фотосенсибілізація, в осіб з індивідуальною гіперчутливістю можливий розвиток системних АР (набряк Квінке, шкірні висипання).

Протипоказання до застосування ЛЗ: індивідуальна гіперчутливість до компонентів ЛЗ або до інших а/б тетрациклінового ряду, грибкові захворювання шкіри.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ТЕТРАЦИКЛІН	АТ "Нижфарм", Російська Федерація	мазь по 15г у тубі	3%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Хлорамфенікол (Chloramphenicol) ** (див. п. 17.2.8. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")**

Фармакотерапевтична група: D06AX02 - а/б для місцевого застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: антибактеріальна (бактеріостатична) дія; активний проти більшості грам(+) і грам(-) бактерій; впливає на збудників стійких до а/б групи пеніциліну, стрептоміцину, сульфаніламідів; стійкість до хлорамфеніколу розвивається повільно; механізм протимікробної дії обумовлений здатністю порушувати процеси синтезу білка; при зовнішньому застосуванні препарат погано проникає через неушкоджену шкіру і слизові оболонки, тому резорбтивна дія слабка.

Показання для застосування ЛЗ: місцеве лікування гнійно-запальних уражень шкіри (карбункули, фурункули), гнійних ран, трофічних виразок, що довго не загоюються, опіків II-III ступеня, тріщин сосків у породіль, при опіках, порізах, тріщинах шкіри, трахомі, отитах та запальних захворюваннях, ускладнених гнійною патологією.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-ном спиртовим змазувати уражені поверхні шкіри (можна застосовувати під оклюзійну пов'язку); при гнійних отитах закапують у зовнішній слуховий прохід (по 2-3 крап.) 1-2 р/день, а при значних виділеннях, які змивають нанесений р-н, до 3-4 р/день; лінімент наносять на уражені ділянки і зверху накладають пов'язку, з пергаментним або компресним папером чи без такого, зміна пов'язок робиться щоденно або через день; при тріщинах сосків після годування дитини грудну залозу обережно обмивають і накладають стерильну серветку з лініментом; термін застосування - 2-5 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР (шкірні висипання, свербіж, дерматити, печіння, гіперемія, ангіоневротичний набряк, набряк Квінке, кропив'янка).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату, дефіцит ферменту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, г. інтермітуюча порфірія, захворювання шкіри (псоріаз, екзема, грибкові ураження); токсичні р-ції (диспепсичні явища, дисбактеріоз, психічні розлади); дітям: у перші 4 тижні життя у формі лініменту, до 1 року у формі р-ну нашкірного.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЛЕВОМІЦЕТИНУ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 0,25 %	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н нашк., спирт. по 25мл у фл.	2,5 мг/мл	№1	12,44	
	ЛЕВОМІЦЕТИНУ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 1 %	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 25мл у фл. в пач.	0,01 г/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛЕВОМІЦЕТИНУ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 1 %	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 25мл у фл.	0,01 г/мл	№1	11,04	
	СИНТОМІЦИН	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	лінімент д/зовн. застос. по 25г у тубі	50 мг/г	№1	33,40	
	СИНТОМІЦИН	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	лінімент д/зовн. застос. по 25г у тубі	100 мг/г	№1	50,00	
	СИНТОМІЦИН	АТ "Лубнифарм", Україна	лінімент по 25г у тубі	50 мг/г	№1	35,98	

• **Сульфаніламід (Sulfanilamide) **** (див. п. 17.2.10. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: D06BA05 - хіміотерапевтичні засоби для місцевого застосування. Сульфаніламід.

Основна фармакотерапевтична дія: антимікробний вплив на стрептококи та інші м/о; порушує утворення в мікробній клітині факторів росту - фолієвої, дегідрофолієвої к-т, інших сполук, що містять у своїй молекулі параамінобензойну к-ту

Показання для застосування ЛЗ: виразки, опіки, тріщини, рани, піодермії, бешихове запалення, гнійно-запальні процеси шкіри, які не супроводжуються вираженою ексудацією, інфіковані рани у стадії регенерації.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: наносити тонким шаром на уражену поверхню відкритим способом або під марлеву пов'язку; кількість аплікацій на добу, тривалість застосування коригують залежно від характеру захворювання та досягнутого терапевтичного ефекту.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР (дерматити, кропив'янка).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до сульфаніламідів та інших компонентів ЛЗ, ниркова недостатність, г. порфірія, період вагітності та годування груддю.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	СТРЕПТОЦИД	ТОВ "Исток-Плюс", Україна	пор. нашк. у саше та фл.	2 г, 5г, 15г	№20, №1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СТРЕПТОЦИД	АТ "Лубнифарм", Україна	лінімент по 30г у тубі	50 мг/г	№1	21,04	
	СТРЕПТОЦИД	АТ "Лубнифарм", Україна	мазь по 25г у банці	100 мг/г	№1	15,37	
	СТРЕПТОЦИД	АТ "Лубнифарм", Україна	мазь по 25г у тубі	100 мг/г	№1	15,85	
	СТРЕПТОЦИДОВА МАЗЬ 10 %	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	мазь по 25г у конт.	10%	№1	13,24	
	СТРЕПТОЦИДОВА МАЗЬ 10 %	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	мазь по 25г у тубі	10%	№1	16,34	
	СТРЕПТОЦИДОВА МАЗЬ 10 %	ТОВ "Тернофарм", Україна	мазь по 25г у тубі в пач.	10%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СТРЕПТОЦИДОВА МАЗЬ 10 %	ТОВ "Тернофарм", Україна	мазь по 25г у тубі	10%	№1	14,48	
	СТРЕПТОЦИДОВА МАЗЬ 5 %	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	мазь по 25г у конт.	5%	№1	12,86	
	СТРЕПТОЦИДОВА МАЗЬ 5 %	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	мазь по 25г у тубі	5%	№1	15,22	

Комбіновані препарати

- **Неоміцину сульфат + Бацитрацин цинку (Neomycin sulphate + Bacitracin Zink) ****

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НЕОМІЦИН ПЛЮС	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	мазь по 10г у тубі	5000МО/250 МО/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НЕОМІЦИН ПЛЮС	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	мазь по 20г у тубі	5000МО/250 МО/г	№1	111,42	
II.	БАНЕОЦИН	Сандоз ГмбХ-ТехОпс (відповідальний за випуск серії)/Мерк КГаА & Ко Верк Шпіттал (виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування), Австрія/Австрія	мазь по 5г, 20г у тубі	5000МО/250 МО/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БАНЕОЦИН	Фармацойтіше Фабрік Монтавіт ГмбХ (виробник продукції in bulk, пакування)/Сандоз ГмбХ-ТехОпс (відповідальний за випуск серії), Австрія/Австрія	пор. нашк. по 10г у конт.	5000МО/250 МО/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Хлорамфенікол + Метилурацил (Chloramphenicol + Methyluracil) ****

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЛЕВОМЕКОЛЬ	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	мазь по 25г у конт.; по 20г, 30г у тубах в пач. та без	7,5мг/40мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛЕВОМЕКОЛЬ	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	мазь по 20г у тубі в пач.	7,5мг/40мг/г	№1	14,89	
	ЛЕВОМЕКОЛЬ	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	мазь по 40г у тубі	7,5мг/40мг/г	№1	20,40	
	ЛЕВОМЕКОЛЬ	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	мазь по 40г у тубі в пач.	7,5мг/40мг/г	№1	23,83	
	ЛЕВОМЕКОЛЬ	ПАТ "Фармак", Україна	мазь по 40г у тубі	7,5мг/40мг/г	№1	22,00	
	ЛЕВОМЕКОЛЬ	АТ "Лубнифарм", Україна	мазь по 25г у тубі	7,5мг/40мг/г	№1	19,27	
	ЛЕВОМЕКОЛЬ	АТ "Лубнифарм", Україна	мазь по 40г у тубі	7,5мг/40мг/г	№1	27,62	
	ЛЕВОМЕКОЛЬ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	мазь по 30г у тубі	7,5мг/40мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛЕВОМЕКОЛЬ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-	мазь по 40г у тубі	7,5мг/40мг/г	№1	20,98	

		фармацевтичний завод", Україна					
	ЛЕВОМЕКОЛЬ	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	мазь по 40г у тубі	7,5мг/40мг/г	№1	18,80	

9.1.3.2. Протигрибкові засоби для топічного застосування

● Біфоназол (Bifonazole) **

Фармакотерапевтична група: D01AC10 - протигрибковий препарат для місцевого застосування. Біфоназол.

Основна фармакотерапевтична дія: протигрибковий препарат широкого спектру; порушує синтез ергостерину, який входить до складу кліткової мембрани грибів; активний щодо дерматофітів, дріжджів, пліснявих та інших грибків (*Malassezia furfur*, *Corynebacterium minutissimum*, *Candida albicans*, *Trichophyton*, *Microsporon*).

Показання для застосування ЛЗ: лікування грибкових захворювань шкіри, спричинених чутливими до біфоназолу збудниками (дерматофітами; дріжджовими, пліснявими грибками та іншими грибковими інфекціями; *Malassezia furfur* та *Corynebacterium minutissimum*): поверхневих кандидозів та мікозів шкіри (у тому числі мікозів ступнів та міжпальцевих проміжків, мікозів кистей, мікозів гладкої шкіри та складок шкіри тіла); різнобарвного лишая; еритразми; обробка нігтьового ложа при проведенні курсу лікування грибкових захворювань нігтів (оніхомікозів) після видалення нігтьової пластини.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: крем (гель, р-н на шкірний), застосовувати 1 р/добу, бажано ввечері перед сном, наносити тонким шаром на уражену ділянку шкіри та втирати, для забезпечення тривалого ефекту лікування препаратом, необхідно проводити впродовж вказаних строків лікування, навіть після зникнення симптомів, звичайні курси лікування: мікози ступнів та міжпальцевих проміжків - 3 тижні; мікози кистей, мікози гладкої шкіри та складок шкіри тіла - 2-3 тижні; різнобарвний лишай, еритразма - 2 тижні; поверхневий кандидоз шкіри - 2-4 тижні, невеликої кількості препарату зазвичай достатньо для лікування ділянки шкіри розміром з долоню; нігтьове ложе обробляють кремом 1 р/добу впродовж 4 тижнів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: контактний дерматит, біль та набряк шкіри у місці застосування, системні р-ції гіперчутливості, алергічний дерматит, еритема, екзема, свербіж шкіри, висипання, кропив'янка, пухирі, лущення, сухість, подразнення, мацерація та відчуття жару на шкірі, АР

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь якої іншої допоміжної речовини, гіперчутливість до протигрибкових засобів групи імідазолу, лікування дітей з поприлостями, препарат не для вагінального використання, лікування інфекції волосистої шкіри голови, не застосовувати до видалення ураженої частини нігтьової пластини для лікування грибкових захворювань нігтів, р-н на шкірний не призначено для лікування уражень слухового проходу.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БІФОНАЛ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	гель по 15г у тубі	10 мг/г	№1	79,30	
II.	БІФОН® СКІН	мібе ГмБХ Арцнайміттель, Німеччина	р-н нашк. по 15мл, 25мл, 35мл у фл.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАНЕСПОР®	Керн Фарма С.Л./ГП Грензах Продуктіонс ГмБХ, Іспанія/Німеччина	крем по 15г у тубі	0,01 г/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● Клотримазол (Clotrimazole) ***

Фармакотерапевтична група: D01AC01 - протигрибкові засоби для місцевого застосування. Похідні імідазолу та триазолу.

Основна фармакотерапевтична дія: механізм антимікотичної дії пов'язаний із пригніченням синтезу ергостеролу, що призводить до структурного та функціонального пошкодження цитоплазматичної мембрани, має широкий спектр антимікотичної активності *in vitro* та *in vivo* та діє на дерматофіти, дріжджові, плісняві та диморфні гриби, механізм дії пов'язаний із первинною фунгістатичною або фунгіцидною активністю, залежно від концентрації клотримазолу в місці інфекції, *in vitro* активність обмежена елементами гриба, що проліферують; спори гриба мають лише незначну чутливість, додатково до антимікотичної активності також діє на грампозитивні мікроорганізми (стрептококи, стафілококи, *Gardnerella vaginalis*) та Гр (-) м/о (Bacteroids), *in vitro* пригнічує розмноження *Corynebacteria* та Гр (+) коків (за винятком Enterococci), первинно резистентні штами чутливих видів грибів зустрічаються рідко.

Показання для застосування ЛЗ: інфекції шкіри та слизових оболонок, спричинені дерматофітами, дріжджовими грибами^{БНФ, ВООЗ} та пліснявими грибками та іншими збудниками, чутливими до клотримазолу, інфекції шкіри, викликані *Malassezia furfur* (різнобарвний лишай) та *Corynebacterium minutissimum* (еритразма); кандидозний пелюшковий дерматит, інфекції статевого губ та суміжних ділянок у жінок (кандидозний вульвіт^{БНФ}), а також запалення головки статевого члена та крайньої плоті статевого партнера, спричинене дріжджовими грибами (кандидозний баланіт).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: мазь: тонкий шар наноситься на уражену ділянку шкіри 1-3 р/добу^{БНФ, ВООЗ} до зникнення симптомів патологічного процесу та негативних мікологічних досліджень; загальна тривалість лікування кандидозного вульвіту та баланіту 1-2 тижні; дерматомікози - 3-4 тижні; еритразма - 2-4 тижні;

різнобарвний лишай - 1-3 тижні; крем застосовувати 2-3 р/добу, 0,5 см смужки крему наносити тонким шаром на ділянку шкіри розміром з долоню та втирати, при кандидозному вульвіті та кандидозному баланіті у дорослих смужку крему наносити тонким шаром на уражені ділянки (зовнішні статеві органи і промежину у жінок або головку статевого члена і крайню плоть у чоловіків) та втирати, терапія даних захворювань вимагає одночасного лікування обох партнерів, для надійного видалення збудника та залежно від симптомів лікування продовжувати приблизно 2 тижні після зникнення суб'єктивних симптомів; порошок/розчин: наносити на уражені ділянки 2-3 р/добу до зникнення с-мів захворювання.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР, включаючи анафілактичні/анафілактоїдні р-ції (анафілактичний шок, ангіоневротичні набряки, артеріальна гіпотензія, непритомність, задишка, кропив'янка), синкопе.; почервоніння (еритема), пухирі, нездужання, дискомфорт/біль, набряк, подразнення, лущення, свербіж, висипання, поколювання, алергічний/контактний дерматит, печіння/відчуття жару.

Протипоказання до застосування ЛЗ: не застосовувати у випадках гіперчутливості до клотримазолу або до будь-яких інших компонентів препарату, не використовувати крем/мазь для лікування нігтів або інфекцій шкіри голови.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КЛОТРИМАЗОЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	мазь по 25г у тубі	10 мг/г	№1	19,98	
	КЛОТРИМАЗОЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	р-н д/зовн. заст. по 25мл у фл. в пач.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛОТРИМАЗОЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	р-н д/зовн. заст. по 25мл у фл.	10 мг/мл	№1	20,72	
	КЛОТРИМАЗОЛ-ФІТОФАРМ	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	мазь по 15г у тубі	10 мг/г	№1	15,68	
	КЛОТРИМАЗОЛ-ФІТОФАРМ	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	мазь по 25г у тубі	10 мг/г	№1	25,32	
II.	КАНДІД	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія	р-н д/зовн. заст. по 20мл у фл.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАНДІД	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія	крем по 20г у тубі	10 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАНДІД	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія	пор. нашк. по 30г у фл.	10 мг/1г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛОТРИМАЗОЛ	ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А., Польща	крем по 20г у тубі	10 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛОТРИМАЗОЛ	Енк'юб Етікалз Прайвіт Лімітед, Індія	мазь по 20г у тубі	10 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Еконазол (Econazole) ****

Фармакотерапевтична група: D01AC03 - протигрибкові препарати для зовнішнього застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: бактерицидна та фунгіцидна дія; похідне імідазолу; блокує синтез ергостеролу, що регулює проникність клітинної стінки грибів; активний щодо дерматофітів *Trichophyton spp.*, *Microsporum spp.*, *Epidermophyton spp.*, дріжджоподібних грибів роду *Candida spp.*, а також *Malassezia furfur* (*Pitysporum orbiculare*), що спричинює висівкоподібний лишай, і *Corynebacterium minutissimum*, деяких *Gr(+)* бактерій (*Str. spp.*, *Staph. spp.*, *Nocardia minutissima*).

Показання для застосування ЛЗ: дерматомікози ніг та інших ділянок шкіри, спричинені чутливими до препарату грибами^{БНФ}, включаючи ускладнені суперінфекцією (*Gr(+)* бактеріями), кандидози шкіри, різнобарвний лишай, оніхомікози^{БНФ}, мікози слухового каналу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим та дітям від 16 років: крем наносять на уражені ділянки шкіри тонким рівним шаром 2 р/добу^{БНФ} (вранці і ввечері); при лікуванні оніхомікозів крем наносити 1 р/добу під

оклюзійну пов'язку^{БНФ}; тривалість лікування - 2 тижні; гель наносити тонким шаром 1-2 р/добу, тривалість лікування - 2-4 тижні; лікування висококератинізованих ділянок шкіри (стопа) може тривати 1,5 міс.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: контактний дерматит, печіння, свербіж, подразнення і гіперемія шкіри (еритема), сухість, кропив'янка, пухирі, ексфолюативні зміни шкіри, гіпопигментація, шкірні висипання, набряк, подразнення у місці застосування; атрофія шкіри, ангіоневротичний набряк; реакції гіперчутливості; біль, дискомфорт, набряк.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до еконазолу або до будь-якого іншого компонента ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕКОНАЗОЛ	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	гель по 15г у тубі	10 мг/г	№1	38,00	
II.	ЕКОДАКС®	"Юнік Фармасьютікал Лабораторіз" (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютікалз Лтд."), Індія	крем по 10г у тубі	10 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Кетоконазол (Ketoconazole) ****

Фармакотерапевтична група: D01AC08 - протигрибкові препарати для місцевого застосування. Похідні імідазолу та триазолу.

Основна фармакотерапевтична дія: протигрибкова активність щодо дерматофітів *Trichophyton spp.*, *Epidermophyton floccosum* та *Microsporum spp.*, а також дріжджів, у тому числі *Malassezia spp.* та *Candida spp.*, інгібує біосинтез ергостеролу у грибах та змінює склад інших ліпідних компонентів у мембрані.

Показання для застосування ЛЗ: місцеве лікування при інфекціях шкіри, спричинених дерматофітами^{БНФ}: епідермофітія тіла, рук, ступнів, пахової епідермофітії, спричинені *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Microsporum canis* та *Epidermophyton floccosum*; кандидоз шкіри, висівкоподібний лишай; себорейний дерматит^{БНФ} (стан шкіри, пов'язаний з присутністю *Malassezia furfur*).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: кандидоз шкіри, епідермофітія тіла, рук, ступнів, пахова епідермофітія та висівкоподібний лишай: наносити на уражену шкіру та навколишні ділянки 1 р/добу; себорейний дерматит: наносити на уражену шкіру 1-2 р/добу на день залежно від тяжкості інфекції; звичайна тривалість лікування: висівкоподібний лишай - 2-3 тижні, дріжджові інфекції - 2-3 тижні, пахова епідермофітія - 2-4 тижні, епідермофітія тіла - 3-4 тижні, епідермофітія ступнів - 4-6 тижнів; себорейний дерматит 2-4 тижнів, підтримуюча терапія: крем наноситься 1 р/тиждень.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: еритема, свербіж; відчуття печіння; кровоточивість, відчуття дискомфорту, сухість, запалення, подразнення, парестезія; р-ції гіперчутливості; бульозні висипання, контактний дерматит, лущення або липкість шкіри, висипання, кропив'янка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КЕТОДІН	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна	крем по 15г у тубі	20 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЕТОКОНАЗОЛ-ФІТОФАРМ	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	крем по 15г у тубі	20 мг/г	№1	34,91	
	КЕТОКОНАЗОЛ-ФІТОФАРМ	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	крем по 25г у тубі	20 мг/г	№1	58,57	
II.	ДЕРМАЗОЛ®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	крем по 15г у тубі	20 мг/г	№1	53,44	23,98/\$
	ДЕРМАЗОЛ®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	крем по 30г у тубі	20 мг/г	№1	89,78	23,98/\$
	НІЗОРАЛ®	Янссен Фармацевтика НВ, Бельгія	крем по 15г у тубі	20 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Міконазол (Miconazole) * ****

Фармакотерапевтична група: D01AC02 - протигрибкові препарати для місцевого застосування. Похідні імідазолу і триазолу.

Основна фармакотерапевтична дія: протигрибкова дія; пригнічує біосинтез ергостеролу та змінює ліпідний склад мембрани, що призводить до загибелі клітини гриба; активний відносно дерматофітів (*Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum canis*), дріжджових та дріжджоподібних

грибів (*Candida albicans* та ін.), інших патогенних грибів (*Malassezia furfur*, *Aspergillus niger*, *Penicillium cruceum* та ін.); виявляє бактерицидну дію, більш виражену щодо грам(+) бактерій, таких як стафілококи, стрептококи; має помірну гіперосмолярну активність, виявляє антиексудативну дію.

Показання для застосування ЛЗ: грибкові інфекції^{ВООЗ, БНФ} шкіри та нігтів^{БНФ}, спричинені дерматофітами^{ВООЗ} або грибами роду *Candida*, чутливими до міконазолу; суперінфекції, спричинені грампозитивними бактеріями^{ВООЗ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: наносять тонким шаром на ретельно висушені уражені ділянки шкіри 2 р/добу^{ВООЗ, БНФ}, охоплюючи невелику ділянку навколо враженої поверхні, гель не втирають в шкіру, крем втирають до повного всмоктування; середня тривалість лікування кандидомікозів шкіри - 1-3 тижні, інфекцій, спричинених дерматофітами - 3-4 тижні, більш затяжних інфекцій - 5-6 тижнів; застосування продовжувати ще не менше 1-го тижня після зникнення клінічних симптомів захворювання; грибкові інфекції нігтів: після попереднього відшарування ураженої нігтьової пластини наносити тонким шаром на нігтьове ложе 1-2 р/добу^{ВООЗ, БНФ}, із подальшим накладанням оклюзійної пов'язки, лікування продовжувати мінімум 3 місяці до остаточного формування нового нігтя.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: реакції у місці нанесення, почервоніння, подразнення, печіння, поколювання, висипання, свербіж, сухість шкіри; контактний дерматит; реакції гіперчутливості, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, анафілактичні реакції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів ЛЗ; захворювання шкіри, викликані герпес-вірусами.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МІКОГЕЛЬ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	гель по 15г у тубі	20 мг/г	№1	29,00	
	МІКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	крем по 30г у тубі	20 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МІКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	крем по 15г у тубі	20 мг/г	№1	37,49	

- **Ністатин (*Nystatin*)** (див. п. 17.4.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: D01AA01 - протигрибкові препарати, що застосовуються у дерматології зовнішньо. А/б.

Основна фармакотерапевтична дія: а/б поліенової групи; діє на патогенні гриби та особливо на дріжджоподібні гриби роду *Candida*, а також на аспергіли; відносно бактерій неактивний; має помірну гіперосмолярну активність, унаслідок чого проявляє антиексудативну дію.

Показання для застосування ЛЗ: захворювання шкіри, спричинені грибами роду *Candida*

Спосіб застосування та дози ЛЗ: місцево, тонким шаром на уражену поверхню шкіри 1-2 р/добу протягом 7-10 днів; при хр. рецидивуючих та генералізованих кандидомікозах проводити повторні курси лікування з перервами між ними 2-3 тижні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР (включаючи свербіж, висип, гарячка, озноб).

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до ністатину або до інших компонентів ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НІСТАТИНОВА МАЗЬ	АТ "Лубнифарм", Україна	мазь по 15г у тубі	100000 ОД/г	№1	27,50	

- **Тербінафін (*Terbinafine*)** * **

Фармакотерапевтична група: D01AE15 - протигрибкові препарати для місцевого застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: фунгіцидна, фунгістатична дія; являє собою аліламін і має широкий спектр дії проти грибкових інфекцій шкіри, волосся і нігтів, спричинених такими дерматофітами, як *Trichophyton* (напр. *T. rubrum*, *T. mentagrophytes*, *T. verrucosum*, *T. violaceum*), *Microsporum* (напр. *Microsporum canis*), *Epidermophyton floccosum* і дріжджі роду *Candida* (напр. *Candida albicans*) та *Pityrosporum*; у низьких концентраціях виявляє фунгіцидну дію відносно дерматофітів, пліснявих і деяких диморфних грибів; специфічно пригнічує ранній етап біосинтезу стеринів у клітині гриба, що приводить до дефіциту ергостеролу і до внутрішньоклітинного накопичення сквалену, що викликає загибель клітини гриба.

Показання для застосування ЛЗ: грибкові інфекції^{БНФ} шкіри^{БНФ}, спричинені дерматофітами, такими як *Trichophyton* (*T. rubrum*, *T. mentagrophytes*, *T. verrucosum*, *T. violaceum*), *Microsporum canis* та *Epidermophyton floccosum*, міжпальцева епідермофітія стоп^{БНФ} ("стопа атлета"), пахова дерматофітія ("свербіж жокея"), дерматофітія тулуба ("стригучий лишай"), різнобарвний лишай^{БНФ}, спричинений *Pityrosporum orbiculare* (*Malassezia furfur*), кандидоз шкіри^{БНФ}, спричинений грибами роду *Candida*, зазвичай *Candida albicans*.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: спрей: епідермофітія стоп і трахофітія гладкої шкіри - 1 р/добу протягом тижня; різнобарвний лишай - 2 р/добу протягом тижня; крем: міжпальцева дерматофітія стоп, пахова дерматофітія та дерматофітія тулуба: 1 р/добу протягом 1 тижня; сквамозно-гіперкератотична дерматофітія стоп ("мокасинова стопа"): 2 р/добу протягом 2 тижнів; кандидоз шкіри: 1-2 р/добу^{БНФ} протягом 1-2 тижнів; різнобарвний лишай: 1-2 р/добу протягом 2 тижнів^{БНФ}; гель, дорослим: дерматофітія стоп (міжпальцева): 1 р/добу протягом 1 тижня; пахова дерматофітія та дерматофітія тулуба: 1 р/добу протягом 1 тижня; різнобарвний лишай: 1 р/добу протягом 1 тижня; р-н нашірний дорослим та підліткам віком від 15 років: одноразове нанесення 1 раз на обидві стопи.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості (кропив'янка), подразнення очей, лущення шкіри, свербіж, пошкодження шкіри, утворення кірки, ураження шкіри, порушення пігментації, еритема, відчуття печіння шкіри, відчуття сухості шкіри, контактний дерматит (бульозний дерматит), екзема, висипання, біль у місці нанесення, подразнення у місці нанесення, загострення симптомів.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до тербінафіну або до будь-якого з неактивних інгредієнтів, що входять до складу препарату, не призначати препарат у період годування груддю.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЛАМІКОН®	ПАТ "Фармак", Україна	крем по 15г у тубі	0,01 г/г	№1	95,00	
	ЛАМІКОН®	АТ "Фармак", Україна	спрей нашк. по 25г у фл. з дозат.	10 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛАМІКОН®	ПАТ "Фармак", Україна	спрей нашк. по 25г у фл. з дозат.	10 мг/г	№1	140,00	
	ЛАМІКОН® ДЕРМГЕЛЬ	АТ "Фармак", Україна	гель по 30г у тубі	10 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛАМІКОН® ДЕРМГЕЛЬ	АТ "Фармак", Україна	гель по 15г у тубі	10 мг/г	№1	90,00	
	ЛАМІФЕН®	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	гель по 15г у тубі	10 мг/г	№1	117,84	
	ЛАМІФЕН®	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	гель по 30г у тубі	10 мг/г	№1	196,39	
II.	ЕКЗИФІН	Д-р Редді'с Лабораторіс Лімітед, Індія	гель по 15г, 30г у тубі	10 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛАМІДЕРМ	Індоко Ремедіс Лімітед, Індія	крем по 10г, 15г у тубі	10 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛАМІЗИЛ	ГСК Консьюмер Хелскер С.А., Швейцарія	крем по 15г, 30г у тубі	10 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛАМІЗИЛ УНО	ГСК Консьюмер Хелскер С.А. (виробництво за повним циклом)/ФОНДАСЬЙОН ПОЛІВАЛЬ, Антрепріз соціаль а вокасьйон індюстріель (вторинне пакування-альтернативна дільниця), Швейцарія/Швейцарія	р-н нашк., плівкоутв. по 4г у тубі	10 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МІКОФІН®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	крем по 15г у тубі	10 мг/г	№1	78,07	26,02/\$
	МІКОФІН®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	спрей нашк. по 30мл у фл.	10 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕРБІЗИЛ	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	крем по 15г у тубі	10 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕРБІНАФІН-ФТ	ТОВ "Фармтехнологія", Республіка Білорусь	спрей нашк. по 25мл у фл.	10 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕРБІНОРМ	К.О. Ромфарм Компані С.Р.Л., Румунія	спрей нашк. по 20мл у фл. з розпил.	10,08 мг/мл	№1	109,40	26,38/\$

Комбіновані препарати

- **Натаміцин + Неоміцину сульфат + Гідрокортизон (Natamycin + Neomycin sulphate + Hydrocortisone)**

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ПІМАФУКОРТ®	Темплер Італія С.р.л., Італія	мазь по 15г у тубі	10мг/3,5мг/1 0мг/г	№1	48,00	
	ПІМАФУКОРТ®	Темплер Італія С.р.л., Італія	крем по 15г у тубі	10мг/3,5мг/1 0мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

9.1.3.3. Протівірусні засоби для топічного застосування

Для системного лікування вірусних інфекцій шкіри (інфекції, що спричинені вірусом простого герпесу та вірусом варицелла-зостер) також застосовується системна терапія ацикловіром, валацикловіром та фамцикловіром (див. п. 17.5.2.1. розділу "Протимікробні та антигельмінтні засоби") та інозин пранобекс (див. п. 18.1.3. розділу "Імуномодулятори та протиалергічні засоби").

- **Ацикловір (Aciclovir) *** (див. п. 17.5.2.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: D06BB03 - протівірусні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: протівірусний препарат, має високу активність in vitro проти вірусу простого герпесу I та II типів; токсична дія відносно клітин організму господаря мінімальна; потрапляючи у клітини, інфіковані вірусом герпесу, фосфорилується з утворенням активної сполуки - трифосфату ацикловіру; перший етап цього процесу залежить від наявності вірусокодованої тимідинкінази; трифосфат ацикловіру діє як інгібітор та субстрат для вірусної ДНК-полімерази, запобігаючи подальшому синтезу вірусної ДНК, не впливаючи на звичайні клітинні процеси.

Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій губ та обличчя, спричинені вірусом простого герпесу^{БНФ} (Herpes labialis).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим та дітям віком від 12 років: наносити крем (мазь) 5 р/добу^{БНФ} з 4-год інтервалами, за винятком нічного часу; розпочати лікування якнайшвидше на початку інфекції, найкраще - під час продромального періоду або на стадії еритеми, можна почати лікування і на пізніх стадіях - папули або пухира; лікування триває щонайменше 4 дні; якщо загоєння не відбулося, можна продовжити лікування до 10 днів; якщо симптоми захворювання не зникають після 10 днів лікування, звернутися до лікаря.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тимчасовий г. або пекучий біль; помірне висушування та лущення шкіри; еритема (почервоніння), свербіж; контактний дерматит; реакції негайної гіперчутливості (ангіоневротичний набряк, кропив'янка)

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до ацикловіру, валацикловіру, пропіленгліколю або до інших компонентів.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна, заявлена в реєстрі ОБЦ

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АГЕРП	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна	крем по 2г, 10г у тубі	50 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЦИКЛОВІР	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	мазь по 10г у тубі	25 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЦИКЛОВІР-ВІШФА	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	мазь по 10г у тубі	25 мг/г	№1	54,34	
	ГЕРПЕВІР®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	мазь по 5г у тубі	25 мг/г	№1	55,00	
	ГЕРПЕВІР®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	мазь по 15г у тубі	25 мг/г	№1	70,00	
	ЛІПСТЕР	ПАТ "Фармак", Україна	крем по 5г у тубі	50 мг/г	№1	75,00	
II.	АЦИК®	Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина	крем по 2г у тубі	50 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЦИКЛОВІР БЕЛУПО	Белупо, ліки та косметика, д.д., Хорватія	крем д/зовн. заст. 10г у тубі	50 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЦИКЛОВІР БЕЛУПО	Белупо, ліки та косметика, д.д., Хорватія	крем д/зовн. заст. 2г у тубі	50 мг/г	№1	45,50	26,80/€

АЦИКЛОВІР БЕЛУПО	Белупо, ліки та косметика, д.д., Хорватія	крем д/зовн. заст. 5г у тубі	50 мг/г	№1	55,50	26,80/€
АЦИКПОСТАД®	СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина	крем по 2г у тубі	50 мг/г	№1	39,28	28,88/€
ЗОВІРАКС	Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Велика Британія	крем по 2г у тубі	50 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

9.1.3.4. Протипаразитарні засоби для зовнішнього застосування

(див. п.9.1.4.2. розділу «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»)

● Бензилбензоат (Benzyl benzoate) * **

Фармакотерапевтична група: P03AX01 - препарати, що застосовуються при ектопаразитозах, включаючи коросту.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить акарицидну дію відносно різних видів кліщів, включаючи коростяних кліщів (*Acanis scabiei*) і кліщів роду *Demodex*, має протипедикульозну активність; проходить крізь хітиновий покрив і накопичується в організмі ектопаразитів у токсичних концентраціях, спричиняючи загибель їхніх личинок і дорослих особин; не діє на яйця.

Показання для застосування ЛЗ: педикульоз^{вооз}, короста^{бнф, вооз}, демодекоз.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дітям віком від 3 до 5 років препарат розвести кип'яченою водою у співвідношенні 1:1; педикульоз: зовнішньо, місцево; емульсією змочити ватний або марлевий тампон, нанести на волосся голови або волоссяні частини тіла і злегка втерти у шкіру; мазь або крем втирають в шкіру волосистої частини голови і волосся, на ділянки з ніжною шкірою наносять без інтенсивного втирання; волосся мити милом або шампунем, розчісувати густим гребінцем, видаляти неживих вошей і гнид; ефективність визначається через 1 год або через 1 добу; короста: необхідне одночасне лікування всіх членів сім'ї, які проживають спільно, а також контактних осіб; емульсією, мазь або крем наносити на все тіло, за винятком обличчя і волосистої частини голови, достатньо 1 обробки шкіри, повторна обробка протягом 5 подальших днів знижує вірогідність залишкової інвазії; тривалість курсу лікування визначається динамікою очищення шкірних покривів, купіруванням запального процесу, припиненням свербіж; демодекоз: нанести на ніч емульсією тонким шаром на шкіру обличчя, уникаючи потрапляння препарату в очі, ніс і рот; вранці обличчя вмити теплою водою з милом; тривалість лікування 2-3 тиж.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: печіння у місці нанесення, подразнення шкіри; АР (в т.ч. висипи, набряк), свербіж, почервоніння, сухість, контактний дерматит

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату; гнійничкові захворювання та пошкодження шкіри.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БЕНЗИЛБЕНЗОАТ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	емульс. нашк. по 50г, 100г у фл.	200 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БЕНЗИЛБЕНЗОАТ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	емульс. нашк. по 50г у фл. в кор.	200 мг/г	№1	50,00	
	БЕНЗИЛБЕНЗОАТ	ПАТ "Фармак", Україна	крем по 80г у тубі	250 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БЕНЗИЛБЕНЗОАТ	ПАТ "Фармак", Україна	крем по 40г у тубі	250 мг/г	№1	33,00	
	БЕНЗИЛБЕНЗОАТ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	мазь по 30г у тубі	250 мг/г	№1	12,85	
	БЕНЗИЛБЕНЗОАТУ ЕМУЛЬСІЯ	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	емульс. нашк. по 50г у фл.	200 мг/г	№1	14,01	
II.	БЕНЗИЛБЕНЗОАТ ГРІНДЕКС	АТ Таллінський фармацевтичний завод, Естонія	мазь по 30г у тубі	200 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● Перметрин (Permethrin) * **

Фармакотерапевтична група: P03AC04 - засоби, що діють на ектопаразитів, включаючи коростяних кліщів, інсектициди, репеленти.

Основна фармакотерапевтична дія: належить до групи синтетичних перетроїдів; має педикульцидну дію, згубно впливає на гниди, личинки і статевозрілі форми головних і лобкових вошей; порушує проникність натрієвих каналів мембран нервових клітин комах, гальмує процес поляризації (реполяризації) нервової клітини, що приводить до паралізуючого ефекту.

Показання для застосування ЛЗ: короста, педикульоз (головний, лобковий)^{вооз, бнф}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: мазь: невелику кількість мазі тонким шаром наносити на уражені коростою ділянки шкіри і масуючими рухами ретельно втирати у шкіру, через 24 год після процедури мазь необхідно змити

водою з милом і змінити одяг, як правило, процедуру проводити одноразово, але якщо свербіж не припиняється чи з'являються нові елементи корости (ознака недостатньої ефективності), через 14 днів (не раніше) обробку повторити; **p-н наскірний:** волосся добре змочити р-ном за допомогою ватного тампона, втираючи ЛЗ у корені волосся, залишити на волоссі на 10-40 хв (голову можна покрити хустинкою), потім ретельно змити теплою проточною водою з милом або шампунем і висушити звичайним способом; розчесати густим гребінцем для видалення загблих паразитів; у разі виявлення живих вошей обробку повторити перед наступним миттям волосся або через 7 днів; залежно від густоти і довжини волосся - від 10 мл до 60 мл; при лобковому педикульозі волосисту частину лобкової зони рясно змочити нерозведеним р-ном за допомогою ватного тампона, через 30 хв оброблені ділянки вимити з милом та ретельно промити водою; **спрей:** натискувати на голівку розпилювача та розпилювати на волосся, втираючи його у корені волосся, край розпилювача необхідно тримати на відстані 3 см від волосся; препарат залишити на волоссі на 10-40 хв (голову можна покрити хустинкою), потім ретельно змити теплою проточною водою з милом або шампунем і висушити звичайним способом, після миття волосся розчесати густим гребінцем для видалення загблих паразитів; у разі виявлення живих вошей обробку повторити перед наступним миттям волосся або через 7 днів, при лобковому педикульозі спрей розпилити короткими натисканнями на голівку розпилювача до повного покриття всієї волосистої частини лобкової зони, через 30 хв оброблені ділянки вимити з милом та ретельно промити водою.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: шкірні висипи, свербіж, почервоніння, біль, екзема, лущення/сухість шкіри; гіпопигментація шкіри, фолікуліт; шкірний дерматит, кропив'янка; розлади чутливості, відчуття печіння, поколювання або оніміння; р-ції гіперчутливості - проявляються як задишка; нудота, діарея.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до активної речовини, інших піретроїдів чи піретринів або до будь-якої допоміжної речовини, г. запальні захворювання шкіри волосистої частини голови, порушення цілісності шкіри, запальні процеси та вторинні інфекції шкіри, період вагітності або годування груддю, дитячий вік до 3 років; не рекомендується при БА, обструктивному бронхіті, у тому числі в анамнезі (ризик виникнення бронхоспазму при вдиханні ЛЗ); Підвищена чутливість до рослин роду хризантем або інших рослин родини складноцвітих.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ПЕРМЕТРИН	АТ "Стома", Україна	спрей по 50г у бал. з розпил.	5 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПЕРМЕТРИН	АТ "Стома", Україна	р-н нашк. по 50г у фл.	5 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	ПЕРМЕТРИНОВА МАЗЬ 4%	ТОВ "ЛМП", Латвія	мазь по 40г у тубі	40 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

9.1.4. Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Засоби для очищення шкіри

• **Етоній (Aethonium) ****

Фармакотерапевтична група: D08AJ - антисептичні та дезінфекційні засоби. Сполуки четвертинного амонію.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить бактеріостатичну та бактерицидну дію, зумовлену порушенням процесів синтезу клітинної оболонки стрептококів, стафілококів; легка місцевоанестезуюча і ранозагоювальна дія; сприяє регенерації пошкоджених тканин; детоксикуюча дія щодо стафілококового токсину.

Показання для застосування ЛЗ: трофічні виразки шкіри, тріщини сосків, прямої кишки та промежини, вагініт, опіки (термічні, хімічні, променеві та слизових оболонок), рентгенівські дерматити.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: зовнішньо; трофічні виразки і опіки - нанести безпосередньо на ушкоджену поверхню і накласти стерильну пов'язку або мазь накласти на пов'язку, а потім її - на рану; дорослим 1-2 р/добу; тривалість курсу лікування - від 3 днів до 1 міс.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперемія шкіри, свербіж, АР.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена індивідуальна чутливість до препарату (алергічний дерматит, екзема); АР на компоненти препарату, гнійні і гангренозні форми пупльітів.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕТОНІЙ	АТ "Лубнифарм", Україна	мазь по 15г у бан.	10 мг/г	№1	39,64	
	ЕТОНІЙ	АТ "Лубнифарм", Україна	мазь по 15г у тубі	10 мг/г	№1	39,64	

• **Кислота борна (Boric acid) ****

Фармакотерапевтична група: D08AD - антисептичні та дезінфікуючі засоби. Препарати борної кислоти.

Основна фармакотерапевтична дія: антисептична дія; коагулює білки (в тому числі ферменти) мікробної клітини, порушує проникність клітинної оболонки, завдяки чому затримується ріст і розвиток бактерій; виявляє слабку подразнювальну дію на грануляційну тканину.

Показання для застосування ЛЗ: дерматит, піодермія, мокнуча екзема, поспрілості, тріщини шкіри, г. та хр. середній та зовнішній отит, кон'юнктивіти, кольпіти; педикульоз.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при піодермії, попрілостях, екземі уражені ділянки шкіри обробляти за допомогою серветки, попередньо змоченої спиртовим р-ном препарату, 2-3 р/добу; при отиті у зовнішній слуховий прохід вводити змочені спиртовим р-ном турунди або закапувати по 3-5 крап. 2-3 р/добу; при педикульозі мазь наносити на волосисту частину голови залежно від ступеня зараженості, густоти і довжини волосся, по 10-15-25 г; через 20-30 хв змити теплою проточною водою із застосуванням миючих засобів; волосся ретельно вичісувати густим гребенем; при попрілості та тріщинах шкіри мазь наносити тонким шаром на уражені ділянки; при дерматитах, мокнучій екземі для примочок використовувати 3 % водний р-н (3 г борної кислоти в 100 мл води), водні р-ни готувати з порошку ex tempore; при піодермії, попрілостях для змазування уражених ділянок застосовувати також у вигляді 10 % р-ну у гліцерині (10 г борної кислоти, гліцерину до 100 мл), цей р-н використовувати і для змазування слизової оболонки при кольпітах; для промивання кон'юнктивального мішка при кон'юнктивітах призначати 2 % водний р-н (2 г борної кислоти в 100 мл води), тривалість курсу лікування - не більше 3-5 діб.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота, головний біль, блювання, сплутаність свідомості, діарея, шкірний висип, десквамація епітелію, олігурія; АР (почервоніння шкіри, свербіж, кропив'янку, набряк); розвиток анафілактичної р-ції, включаючи шок; судоми.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; порушення ф-ції нирок, хр. мезотимпаніт із нормальною або малозміненою слизовою оболонкою, травматичні перфорації барабанної перетинки; період вагітності та обробка молочних залоз у період годування груддю, дитячий вік (у тому числі новонароджені).

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БОРНА КИСЛОТА	Публічне акціонерне товариство "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	пор. кристал. у саше	10г	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БОРНА КИСЛОТА	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	р-н д/зовн. заст., спирт. по 20мл у фл.	3%	№1	6,39	
	БОРНА КИСЛОТА	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/зовн. заст., спирт. по 25мл у фл.	3%	№1	7,00	
	БОРНА КИСЛОТА	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	пор. кристал. у конт. або бан.	10г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БОРНА КИСЛОТА	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	пор. кристал. у пак.	10г	№1	14,05	
	БОРНА КИСЛОТА	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	пор. кристал. у пак.	30г	№1	24,71	
	БОРНА МАЗЬ 5 %	ТОВ "Тернофарм", Україна	мазь по 25г у тубі в пач.	5%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БОРНА МАЗЬ 5 %	ТОВ "Тернофарм", Україна	мазь по 25г у тубі	5%	№1	25,89	
	БОРНОЇ КИСЛОТИ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/зовн. заст., спирт. по 10мл, 25мл у фл.	2%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БОРНОЇ КИСЛОТИ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/зовн. заст., спирт. по 25мл у фл. в пач.	2%	№1	9,00	
	БОРНОЇ КИСЛОТИ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 2 %	ТОВ "Тернофарм", Україна	р-н д/зовн. заст., спирт. по 10мл, 20мл у фл. та фл.-крап. в пач. та без	0,02 г/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БОРНОЇ КИСЛОТИ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 2 %	ТОВ "Тернофарм", Україна	р-н д/зовн. заст., спирт. по 20мл у фл.-крап.	0,02 г/мл	№1	6,94	
	БОРНОЇ КИСЛОТИ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 3 %	ТОВ "Фарма Черкас", Україна	р-н д/зовн. заст., спирт. по 20мл, 25мл у фл.	3%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БОРНОЇ КИСЛОТИ	ПрАТ Фармацевтична	р-н д/зовн.	3%	№1	відсутня у	

РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 3 %	фабрика "Віола", Україна	заст., спирт. по 20мл, 25мл у фл. в пач. та без			реєстрі ОБЦ
БОРНОЇ КИСЛОТИ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 3 %	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	р-н д/зовн. заст., спирт. по 20мл у фл.	3%	№1	4,78

• **Хлоргексидин (Chlorhexidine) ** [ГІМД]**

Фармакотерапевтична група: D08AC02 - антисептичні та дезінфекційні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: бактеріоцидна дія; проникає у внутрішньоклітинні мембрани бактеріальних клітин, осідає на цитоплазмі і змінює ф-цію мембрани, перешкоджаючи споживанню кисню, що спричиняє загибель клітин, руйнує ДНК і порушує синтез ДНК у м/о, забезпечує тривалу персистентну антимікробну активність, діє на Гр (+) та Гр (-) бактерії (*Treponema pallidum*, *Chlamidia spp.*, *Ureaplasma spp.*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides fragilis*), найпростіші (*Trichomonas vaginalis*), віруси (*Herpes virus*), але не впливає на кислотостійкі ф-ми.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом (сифіліс, гонорея, трихомоніаз, хламідіоз, уреоплазмоз, генітальний герпес); дезінфекція^{БНФ, ВООЗ} гнійних ран, інфікованих опікових поверхонь^{БНФ}; лікування інфекцій шкіри та слизових оболонок у хірургії, акушерстві, гінекології, урології (уретрити, уретропростатити), стоматології (полоскання та зрошування - гінгівіт, стоматит^{БНФ}, афти, парадонтит, альвеоліт); дезінфекція мікротравм (ран, подряпин, опіків).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: тільки для зовнішнього та місцевого застосування; при мікротравмах шкіру навколо рани обробляти р-ном, після чого на рану накладати серветку, змочену р-ном, і фіксувати її пов'язкою або пластирем.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості, сухість та свербіж шкіри, дерматити, липкість шкіри рук, фотосенсибілізація.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів ЛЗ, схильність до АР та алергічних захворювань, дерматити, вірусні захворювання шкіри; не рекомендується застосовувати для обробки кон'юнктиви і промивання порожнини, на рани з великою поверхнею, при операціях у ділянках ЦНС і слухового каналу, в офтальмології, для введення у слуховий канал.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I. ХЛОРГЕКСИДИН	ТОВ "Славія 2000", Україна	р-н д/зовн. заст. по 50мл, 100мл, 200мл у фл.	0,05%	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
ХЛОРГЕКСИДИН	Приватне акціонерне товариство "Біолік", Україна	р-н д/зовн. заст. по 1л у каніст.	0,05%	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
ХЛОРГЕКСИДИН	Приватне акціонерне товариство "Біолік", Україна	р-н д/зовн. заст. по 100мл у фл.	0,05%	№1	12,00	
ХЛОРГЕКСИДИН	Приватне акціонерне товариство "Біолік", Україна	р-н д/зовн. заст. по 1л у фл.	0,05%	№1	149,00	
ХЛОРГЕКСИДИН	Приватне акціонерне товариство "Біолік", Україна	р-н д/зовн. заст. по 200мл у фл.	0,05%	№1	19,50	
ХЛОРГЕКСИДИН	ТОВ "Фарма Черкас", Україна	р-н д/зовн. заст. по 100мл у фл.	0,05%	№1	10,50	
ХЛОРГЕКСИДИН	ТОВ "Фарма Черкас", Україна	р-н д/зовн. заст. по 200мл у фл.	0,05%	№1	27,00	
ХЛОРГЕКСИДИН	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/зовн. заст. по 100мл у фл. з насад.	0,05%	№1	15,21	
ХЛОРГЕКСИДИН	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/зовн. заст. по 200мл у фл. з насад.	0,05%	№1	24,31	
ХЛОРГЕКСИДИН	ТОВ "МЕДЛЕВ", Україна	р-н д/зовн. заст. по 1л у фл.	0,05%	№1	145,00	
ХЛОРГЕКСИДИН	ТОВ "МЕДЛЕВ", Україна	р-н д/зовн. заст. по 100мл у фл. з уретр. насад.	0,05%	№1	19,40	
ХЛОРГЕКСИДИН	ТОВ "МЕДЛЕВ", Україна	р-н д/зовн. заст.	0,05%	№1	720,0	

		по 5л у каніст.			0	
ХЛОРГЕКСИДИН	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	р-н д/зовн. заст. по 100мл, 200мл у фл.	0,05%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ХЛОРГЕКСИДИН	ПП "Кілафф", Україна	р-н д/зовн. заст. по 100мл, 200мл у бан. скл. та фл.	0,05%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ХЛОРГЕКСИДИН-ВІОЛА	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	р-н д/зовн. заст. по 100мл у фл. в пач.	0,05%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ХЛОРГЕКСИДИН-ВІОЛА	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	р-н д/зовн. заст. по 100мл у фл.	0,05%	№1	14,90	
ХЛОРГЕКСИДИН-ВІОЛА	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	р-н д/зовн. заст. по 200мл у фл.	0,05%	№1	24,43	
ХЛОРГЕКСИДИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії вир-ва, ко, Україна	р-н по 50мл у фл. полім.	0,5 мг/мл	№1	12,47	
ХЛОРГЕКСИДИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії вир-ва, ко, Україна	р-н по 100мл у фл. полім.	0,5 мг/мл	№1	15,55	
ХЛОРГЕКСИДИН-КР	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	р-н д/зовн. заст. по 100мл у конт. з насад. з вагін. аплік. або без	0,05%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ХЛОРГЕКСИДИН-КР	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	р-н д/зовн. заст. по 100мл у конт. з насад. в пач.	0,05%	№1	16,60	

- **Декаметоксин (Decamethoxin) **** ^{[1][МД]} (див. п. 16.1.2.2. розділу "ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: D08A - антисептичні та дезінфекційні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: антимікробна, антивірусна, протигрибкова дія, вплив на мембрани мікробної клітини: руйнує надмембранний шар, розпушує мембрану, підвищує її проникність для великомолекулярних речовин, оскільки на мембранних структурах фіксується більшість ферментів, змінює ензиматичну активність клітини, пригнічуючи ферментативні системи; чинить виражену бактерицидну дію на Gr(+), Gr(-) аеробні та анаеробні м/о: стафілококи, стрептококи, дифтерійну і кишкову палички, сальмонели, протей, клебсієли, шигели, псевдомонади, клостридії, кампілобактерії, гарднерели, хламідії, мікоплазми, діє фунгіцидно на дріжджоподібні гриби, збудники епідермофітії, трихофітії, міроспорії, деякі види пліснявих грибів (аспергіли, пеніцили), чинить вірусоцидну дію на ліпофільні віруси, у тому числі СНІДу, гепатиту.

Показання для застосування ЛЗ: дезінфекція шкіри рук персоналу медичних закладів, оброблення шкіри рук медперсоналу перед і після виконання медичних маніпуляцій; оброблення ділянок шкіри, уражених стафілококовим і стрептококовим імпетіго, і ділянок, що межують з ними; знезаражування шкіри рук у всіх випадках, пов'язаних із підвищеним ризиком інфікування та поширення небезпечних для здоров'я мікроорганізмів; оброблення мікротравм шкіри; гігієнічна дезінфекція шкіри

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначати для зовнішнього застосування у вигляді протирань, примочок; руки ретельно мити проточною водою з милом, видаляти залишки мильної піни, витирати; наливати у долоню 3-5 мл препарату і ретельно розподіляти його по внутрішній і зовнішній поверхні кисті, міжпальцевих проміжках і навколонигтевих ділянках, нижній третині передпліччя протягом 1-2 хв; після цього шкіру висушити; якщо руки попередньо не мити з милом, то обробку проводити двічі; при загрозі появи пролежнів витирати у ділянки шкіри за допомогою ватної кульки; при наявності пролежнів застосовувати у вигляді аппликацій; шкіру обличчя після гоління протирати тампоном або долонею, змоченими препаратом.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: індивідуальна чутливість до компонентів ЛЗ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГОРОСТЕН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/зовн. застос. по 2мл в конт.; по 30мл у бан. в пач.	0,25 мг/мл	№10, №1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГОРОСТЕН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/зовн. застос. по 400мл у бан.	0,25 мг/мл	№1	308,50	
	ГОРОСТЕН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у бан.	0,25 мг/мл	№1	96,23	
	ДЕКАСАН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н по 50мл, 100мл, 500мл, 2000мл, 3000мл, 5000мл у пл. та конт.; по 2мл, 5мл у однодоз. конт.	0,2 мг/мл	№1, №4, №8, №10, №12	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДЕКАСАН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н по 400мл у пл. скл.	0,2 мг/мл	№1	142,95	
	ДЕКАСАН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н по 1000мл у конт. полім.	0,2 мг/мл	№1	246,29	
	ДЕКАСАН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н по 100мл у пл. скл.	0,2 мг/мл	№1	76,05	
	ДЕКАСАН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н по 2мл у однодоз. конт.	0,2 мг/мл	№10	81,20	
	ДЕКАСАН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н по 250мл у конт. полім.	0,2 мг/мл	№1	90,42	
	ДЕКАСАН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н по 200мл у пл. скл.	0,2 мг/мл	№1	91,61	

• **Етанол (Ethanol)** * [ГІМД]

Фармакотерапевтична група: D08AX08 - антисептичні та дезінфекційні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: антисептична, дезінфікуюча, місцевоподрознювальна дія; активний відносно гр(+) і гр(-) бактерій та вірусів. 96% - чинить «дубильну» дію на шкіру і слизові оболонки.

Показання для застосування ЛЗ: 96 % р-н - дезінфекція шкіри рук; 70% р-н - фурункули, панариції, інфільтрати, мастити на початкових стадіях; для обтирання та компресів; хірургічна обробка рук хірургів^{BOO3}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: 70% р-н: зовнішньо - для обтирання, компресів, дезінфекції шкіри^{BOO3}, у т.ч. рук; для компресів, обтирань (з метою запобігання опіку) розвести водою у співвідношенні 1:1; 96% р-н: зовнішньо - наносять на шкіру за допомогою ватних тампонів, серветок.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: подразнення шкіри або слизових оболонок.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена індивідуальна чутливість, г. запальні процеси шкіри; 96 % р-н протипоказаний дітям до 14 років.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БІОСЕПТ	Приватне акціонерне товариство "Біолік", Україна	р-н д/зовн. застос. по 5л у каніст.	96%	№1	1500,00	
	БІОСЕПТ	Приватне акціонерне товариство "Біолік", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл. або бан.	96%	№1	43,00	
	БІОСЕПТ 70	ПрАТ "Біолік", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл. або бан.	70%	№1	38,00	

ВІТАСЕПТ	ТОВ "Панацея", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл.	96%	№1	34,00	
ВІТАСЕПТ	ТОВ "Панацея", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл, 250мл у фл.	70%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЕТАНОЛ 70	ПП "Кілафф", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл.	70%	№1	35,00	
ЕТАНОЛ 70 %	ТОВ "Фарма Черкас", Україна	р-н по 100мл у фл.	70%	№1	30,84	
ЕТАНОЛ 96	ПП "Кілафф", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл.	96%	№1	37,00	
ЕТАНОЛ 96	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фарма Черкас", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл.	96%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЕТАНОЛ 96 %	ТОВ "Фарма Черкас", Україна	р-н по 100мл у фл.	96%	№1	35,48	
ЕТИЛОСЕПТ 70	ПрАТ "Біолік"/ТОВ "Виробниче об'єднання "Тетерів", Україна/Україна	р-н по 100мл у фл.	70%	№1	38,00	
ЕТИЛОСЕПТ 96	ПрАТ "Біолік"/ТОВ "Виробниче об'єднання "Тетерів", Україна/Україна	р-н по 100мл у фл.	96%	№1	39,00	
ЕТИЛ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича фармацевтична компанія "БІО-ФАРМА ЛТД", Україна	р-н по 100мл у фл.	96%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЕТИЛ 70 %	Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича фармацевтична компанія "Біо-Фарма ЛТД", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у скл. фл.	70%	№1	26,00	
ЄВРАЕТИЛ 70 %	ТОВ "ЄВРАЗІЯ", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл.	70%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЄВРАЕТИЛ 96 %	ТОВ "ЄВРАЗІЯ", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл.	96%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МЕДАСЕПТ 70	Дочірнє підприємство "Межиріцький вітамінний завод" Публічного акціонерного товариства "Укрмедпром", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл.	70%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МЕДАСЕПТ 96	Дочірнє підприємство "Межиріцький вітамінний завод" Публічного акціонерного товариства "Укрмедпром", Україна	р-н по 100мл у фл.	96%	№1	45,00	
СЕПТАВІОЛ 70 %	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл. полім.	70%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
СЕПТАВІОЛ 70 %	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл. скл.	70%	№1	26,28	
СЕПТАВІОЛ ПЛЮС 96 %	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл. полім.	96%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
СЕПТАВІОЛ ПЛЮС	ПрАТ Фармацевтична	р-н д/зовн.	96%	№1	27,48	

96 %	фабрика "Віола", Україна	застос. по 100мл у фл. скл.				
СЕПТИЛ	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл.	70%	№1	29,67	
СЕПТИЛ ПЛЮС	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	р-н по 100мл у фл.	96%	№1	35,21	
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н спирт. д/зовн. застос. по 50мл у фл. скл.	70%	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н спирт. д/зовн. застос. по 100мл у фл. скл.	70%	№1	29,73	
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %	Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича фармацевтична компанія "Біо-Фарма ЛТД", Україна	р-н д/зовн. застос. по 5л, 10л, 20л у каніст.	70%	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %	Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича фармацевтична компанія "Біо-Фарма ЛТД", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл. скл.	70%	№1	30,84	
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл.	70%	№1	19,15	
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %	Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт", Україна	р-н по 100мл у фл.	70%	№1	22,14	
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл.	70%	№1	27,84	
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %	АТ "Лубнифарм", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл.	70%	№1	30,84	
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %	ТОВ "МЕДЛЕВ", Україна	р-н по 10л у каніст. полім.	70%	№1	2839,21	
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %	ТОВ "МЕДЛЕВ", Україна	р-н по 100мл у фл. скл.	70%	№1	30,71	
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %	ПрАТ "Біолік", Україна	р-н по 100мл у фл. скл.	70%	№1	38,00	
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н спирт. д/зовн. застос. по 50мл у фл. скл.	96%	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н спирт. д/зовн. застос. по 100мл у фл. скл.	96%	№1	37,64	
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %	Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича фармацевтична компанія "Біо-Фарма ЛТД", Україна	р-н д/зовн. застос. по 5л, 20л у каніст.	96%	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %	Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича фармацевтична компанія "Біо-Фарма ЛТД", Україна	р-н д/зовн. застос. по 10л у каніст.	96%	№1	2850,47	
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ	Товариство з обмеженою	р-н д/зовн.	96%	№1	32,71	

96 %	відповідальністю "Виробнича фармацевтична компанія "Біо-Фарма ЛТД", Україна	застос. по 100мл у скл. фл.				
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл.	96%	№1	23,22	
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %	Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт", Україна	р-н по 100мл у фл.	96%	№1	28,60	
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл.	96%	№1	34,80	
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %	ПрАТ "Біолік"/ТОВ "Виробниче об'єднання "Тетерів", Україна/Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у скл. фл.	96%	№1	39,00	
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %	АТ "Лубнифарм", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл.	96%	№1	42,14	
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %	ТОВ "МЕДЛЕВ", Україна	р-н д/зовн. застос. по 10л у каніс. полім.	96%	№1	2839,21	
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %	ТОВ "МЕДЛЕВ", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл. скл.	96%	№1	41,97	
СПИРТ МЕДИЧНИЙ 70	Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл.	70%	№1	25,00	
СПИРТ МЕДИЧНИЙ 96	Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл.	96%	№1	26,00	
СПИРТОЛ®	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл.	96%	№1	55,28	
СПИРТОЛ®	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл.	70%	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
ФАРМАСЕПТ	ПрАТ "Біолік", Україна	р-н д/зовн. застос. спирт. по 50мл у фл., 100мл у бан.	96%	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
ФАРМАСЕПТ	ПрАТ "Біолік", Україна	р-н д/зовн. застос. спирт. по 100мл у фл.	96%	№1	29,00	
ФАРМАСЕПТИЛ	ТОВ "МЕДЛЕВ", Україна	р-н по 100мл у скл. фл.	96%	№1	41,97	
II. АХД 2000	А.Ф.П. Антисептика Форшунгс і Продукшнсгезельшафт ГмбХ, Німеччина за ліцензією Лізоформ Др.Ханс Роземанн ГмбХ, Німеччина	р-н нашк., по 250мл у фл. з розпил.; по 125мл, 500мл, 1000мл у фл.; по 5л у каніст.	75мг/100г	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ

- **Хлорофіліпм (Chlorophyllipt) (див. п. 16.3.2. розділу "ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")**

Фармакотерапевтична група: D08AX - антисептичні та дезінфікуючі засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: є сумішшю хлорофілів з листя евкаліпта, має а/б (бактеріостатичну і бактеріцидну) активність щодо стафілококів, а також антисептичну та протизапальну активність.

Показання для застосування ЛЗ: лікування захворювань, спричинених антибіотикостійкими стафілококами: ерозії шийки матки, опіки, трофічні виразки і виразки кінцівок, що довго загоюються, у комплексному лікуванні післяопераційних, післяпологових та іншого походження септичних станів; при лікуванні стафілококових дисбіозів кишечника і санації стафілококових носійств.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають внутрішньо, місцево, у клізмах; дітям від 12 років застосовують за призначенням лікаря; внутрішньо при носійстві стафілококів у кишечнику та для профілактики післяопераційних ускладнень по 5 мл 1 % спиртового р-ну, розведеного 30 мл води 3 р/добу за 40 хв до їди щоденно; у клізмі (по 20 мл 1 % спиртового р-ну розводять у 1 л води) 1 р/добу через кожні 2 дні курсом 10 процедур; для місцевого застосування (лікування опіків і трофічних виразок) 1 % спиртовий р-н розводять 0,25 % р-ном новокаїну у пропорції 1 : 5; ерозія шийки матки: осушують тампоном усі складки слизової оболонки піхви і піхвової частини шийки матки і змазують 1 % р-ном канал шийки матки; для спринцювання піхви 15 мл 1 % спиртового р-ну розводять в 1 л води; або використовують р-н олійний - змазують канал шийки матки, змочений у препараті тампон залишають на шийці матки на 15-20 хв., 1 р/добу протягом 10 днів, у разі неповної епітелізації ерозії курс лікування необхідно повторити.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР (висипання, свербіж, гіперемія, ангіоневротичний набряк, набряк слизових оболонок).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ХЛОРОФІЛІПТ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	р-н в олії по 20мл у фл. в кор.	20 мг/мл	№1	32,12	
	ХЛОРОФІЛІПТ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	спрей 15мл у конт.	30 мг/мл	№1	59,61	
	ХЛОРОФІЛІПТ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	р-н спирт. по 100мл у фл. в пач.	10 мг/мл	№1	80,86	
	ХЛОРОФІЛІПТ	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н спирт. по 100мл у фл. та бан.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ХЛОРОФІЛІПТ®	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н олійн. по 25мл у фл.	20 мг/мл	№1	30,00	

• **Перекис водню (Hydrogen peroxide) ****

Фармакотерапевтична група: D08AX01 - антисептичні та дезінфікуючі засоби

Основна фармакотерапевтична дія: при контакті р-ну перекису водню з ушкодженою шкірою та слизовими оболонками вивільняється активний кисень, який сприяє очищенню ранової поверхні та інактивації органічних

речовин (протеїн, кров, гній); при застосуванні препарату відбувається лише тимчасове зменшення кількості м/о; препарат має кровоспинний ефект.

Показання для застосування ЛЗ: для зупинки капілярної кровотечі при поверхневому ушкодженні тканин^{БНФ}, носових кровотечах, для обробки слизової оболонки при стоматитах, пародонтитах, ангінах, гінекологічних захворюваннях, а також при гнійних ранах.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н наносять на ушкоджену ділянку шкіри для дезінфекції ран *per se* (без розведення); для полоскання розчинити 1 стол. л. в 1 склянці води; для аплікацій, обробки ранових поверхонь, зупинки кровотечі (капілярної) уражені ділянки обробляють тампоном, просоченим р-ном перекису водню; тривалість лікування залежить від досягнутого ефекту.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: відчуття печіння в момент обробки рани; місцеві АР; гіпертрофія сосочків язика.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ВОДНЮ ПЕРОКСИД	ТОВ "Фарма Черкас", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл.	3%	№1	4,90	
	ПЕРЕКИС - ВІШФА	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл.	3%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПЕРЕКИС ВОДНЮ	ТОВ "Тернофарм", Україна	р-н д/зовн. застос. по 40мл у фл. в пач.	3%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПЕРЕКИС ВОДНЮ	ТОВ "Тернофарм", Україна	р-н д/зовн. застос. по 40мл у фл.	3%	№1	5,06	
	ПЕРЕКИС ВОДНЮ	ТОВ "Тернофарм", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл.	3%	№1	6,47	
	ПЕРЕКИС ВОДНЮ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/зовн. застос. по 40мл, 100мл у фл. скл. або полім.	3%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПЕРЕКИС ВОДНЮ	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	р-н д/зовн. застос. по 200мл у фл.	3%	№1	14,09	
	ПЕРЕКИС ВОДНЮ	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	р-н д/зовн. застос. по 40мл у фл.	3%	№1	5,61	
	ПЕРЕКИС ВОДНЮ	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл.	3%	№1	7,12	
	ПЕРЕКИС ВОДНЮ 3 %	Приватне акціонерне товариство "Біолік", Україна	р-н д/зовн. застос. по 50мл, 100мл, у фл. та бан.	3%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПЕРЕКИС ВОДНЮ 3 %	Приватне акціонерне товариство "Біолік", Україна	р-н д/зовн. застос. по 200мл у фл.	3%	№1	11,30	
	ПЕРЕКИС ВОДНЮ 3 %	Приватне акціонерне товариство "Біолік", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл.	3%	№1	6,30	
	ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/зовн. застос. по 25мл, 40мл, 200мл у фл.; по 30мл, 50мл у фл. з розпил. в пач.	3%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/зовн. застос. по	3%	№1	15,03	

		200мл у фл. полім.				
ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/зовн. застос. по 30мл у полім. фл. з розпил.	3%	№1	26,18	
ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/зовн. застос. по 50мл у полім. фл. з розпил.	3%	№1	36,74	
ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/зовн. застос. по 40мл у фл. скл.	3%	№1	5,64	
ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл. скл.	3%	№1	7,41	
ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/зовн. застос. по 100мл у фл. полім.	3%	№1	9,80	
ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 3 %	ТОВ "Славія 2000", Україна	р-н д/зовн. застос., водн. по 100мл, 110мл, 120мл, 200мл у фл. скл. або полім.; по 50мл, 100мл у фл. полім. з розпил.	3%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 3 %	ТОВ "Славія 2000", Україна	р-н д/зовн. застос., водн. по 100мл у фл. полім.	3%	№1	3,80	
ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 3 %	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	р-н д/зовн. застос., водн. по 40мл, 100мл, 200мл у фл. скл. або полім. в пач. та без	3%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 3 %	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	р-н д/зовн. застос., водн. по 200мл у фл. полім.	3%	№1	11,77	
ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 3 %	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	р-н д/зовн. застос., водн. по 40мл у фл. скл.	3%	№1	4,61	
ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 3 %	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	р-н д/зовн. застос., водн. по 100мл, у фл. скл.	3%	№1	5,84	
ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 3 %	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	р-н д/зовн. застос., водн. по 100мл у фл. полім.	3%	№1	8,00	

● **Йод (Iodine) ****

Фармакотерапевтична група: D08AG03 - антисептичні та дезінфекційні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: препарат містить елементарний йод, для якого характерні протимікробна, місцевоподразнювальна та відволікаюча дії. при нанесенні на шкіру і слизові оболонки препарат зумовлює подразнювальну дію і може спричинити рефлекторні зміни в діяльності організму, проникаючи, йод активно впливає на обмін речовин, посилює процеси дисиміляції.

Показання для застосування ЛЗ: зовнішньо як антисептичний, подразнювальний засіб при інфекційно-запальних захворюваннях шкіри та слизових оболонок, для обробки операційного поля, для профілактики інфікування невеликих ушкоджень цілісності шкіри, для зменшення запальних процесів при міозитах, невралгіях (чинить відволікаючу дію).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при зовнішньому застосуванні йодом змочують ватний тампон, який використовують для обробки уражених ділянок шкіри.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нежить, кропив'янка, слино- та сльозовиділення, висипи на шкірі, контактний дерматит, набряк Квінке.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до йоду; діабетичні, трофічні виразки.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЙОД	ТОВ "МЕДЛЕВ", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 20мл у фл.	5%	№1	13,65	
	ЙОД	ТОВ "МЕДЛЕВ", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 10мл у фл.	5%	№1	9,60	
	ЙОД	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 10мл у фл.	5%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЙОД	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 20мл у фл.	5%	№1	13,87	
	ЙОД	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 10мл, 1000мл у фл.	5%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЙОД	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 20мл у фл.	5%	№1	8,68	
	ЙОД	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 20мл у фл.	5%	№1	16,88	
	ЙОД	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 100мл у фл.	5%	№1	74,20	
	ЙОД	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 10мл у фл.	5%	№1	9,51	
	ЙОД	ПП "Кілафф", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 1л у каніст.	5%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЙОД	ПП "Кілафф", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 20мл у фл.	5%	№1	13,50	
	ЙОД	ПП "Кілафф", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 100мл у фл.	5%	№1	74,50	
	ЙОД-ВІШФА	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 20мл у фл.	5%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЙОДДИЦЕРИН®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н нашк. по 25мл у фл. в пач.	5 мг/г	№1	21,00	
	ЙОДУ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 5 %	ТОВ "Тернофарм", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 9мл, 20мл у фл. та фл.-крап. в пач.	5%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЙОДУ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 5 %	ТОВ "Тернофарм", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 20мл у фл.-крап.	5%	№1	13,54		
ЙОДУ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 5 %	ТОВ "Тернофарм", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт.	5%	№1	6,12		

			по 9мл у фл.			
ЙОДУ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 5 %	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 10мл, 20мл у фл.	5%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

- **Мірамістин (Myramistin)** ** [ПМД] (див. п. 15.1.1.3. розділу "ОФТАЛЬМОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: D08AJ - антисептичні та дезінфікуючі засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: має виражену антимікробну дію відносно грам(+) і грам(-), аеробних і анаеробних, спороутворюючих і аспорогенних бактерій у вигляді монокультур і мікробних асоціацій, включаючи госпітальні штами з полірезистентністю до а/б; діє згубно на збудників захворювань, що передаються статевим шляхом: гонококки, бліді трепонеми, трихомонади, хламідії, а також на віруси герпесу, імунодефіциту людини й ін.; виявляє протигрибкову дію на аскоміцети роду *Aspergillus* і роду *Penicillium*, дріжджові (*Rhodotorula rubra*, *Torulopsis gabrata* і т.д.) і дріжджеподібні (*Candida albicans*, *Candida tropicalis*, *Candida krusei* і т.д.) гриби, на дерматофіти (*Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton schoenleinii*, *Trichophyton violaceum*, *Epidermophyton Kaufman-Wolf*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum gypseum*, *Microsporum canis* і т.д.), а також на інші патогенні гриби (наприклад *Pityrosporum orbiculare* (*Malassezia furfur*) у вигляді монокультур і мікробних асоціацій, включаючи грибкову мікрофлору з резистентністю до хіміотерапевтичних препаратів; препарат знижує стійкість м/о до а/б.

Показання для застосування ЛЗ: місцеве лікування інфікованих ран різної локалізації та етіології; профілактика вторинної інфекції гранулюючих ран; лікування опіків II і III А ступенів; підготовка опікових ран до дерматопластики; профілактика та лікування нагноєння післяпологових ран, післяпологових інфекцій, ран промежини та піхви; запальні захворювання зовнішніх статевих органів і піхви (вульвовагініт); комплексне лікування кандидозів шкіри і слизових оболонок, мікозів стоп і великих складок; індивідуальна профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом (сифіліс, гонорея, генітальний герпес).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Застосовувати місцево дорослим, зрошувати поверхню ран та опіків, рихло тампонувати рану і норицеві ходи, фіксувати марлеві тампони, змочені антисептиком, лікувальну процедуру повторювати 2-3 р/добу протягом 3-5 днів; профілактика післяпологової інфекції: у вигляді піхвових зрошень до пологів (5-7 днів) та у вигляді внутрішньопіхвових тампонів, змочених 50 мл препарату, після пологів з експозицією 2 год. протягом 5 днів; лікування запальних захворювань жіночих статевих органів: внутрішньопіхвове введення тампонів з ЛЗ протягом 2 тижнів, обробка шкіри зовнішніх статевих органів, а також електрофорез ЛЗ; кандидомікоз шкіри та слизових оболонок, мікози стоп і великих складок: зрошувати за допомогою розпилювальної насадки, 3-4-разовим натисненням або апікацій 2-4 р/добу; індивідуальна профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом: застосовувати не пізніше 2 год. після статевого акту; вміст флакона за допомогою уретральної насадки вводити у сечовивпускальний канал - 2-3 мл (чоловікам), 1-2 мл (жінкам), у піхву - 5-10 мл на 2-3 хв. (після процедури не рекомендується спорожнення сечового міхура протягом 2 год.); при гнійних гайморитах під час пункції верхньощелепну пазуху промивати 10 мл препарату; при лікуванні тонзилітів і ларингітів проводити багаторазові полоскання горла розчином; при отитах тампон, змочений препаратом, вводити у зовнішній слуховий прохід 4-6 р/добу протягом 10-14 днів; при лікуванні пародонтитів розчин вводити у пародонтальні кишени на турундах з подальшими апікаціями на ясна протягом 15 хв.; після проведення вестибулопластики і френулектомії застосовувати у вигляді ванночок в амбулаторних умовах.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: печіння, висипання, свербіж, гіперемія, сухість шкіри, дерматит, мокнуття, подразнення шкіри.

Противопоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до інших компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕРОПОЛ®	ТОВ "Славія 2000", Україна	р-н д/зовн. застос. по 20мл, 50мл у фл. з уретр. насад.	0,1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МІРАМІДЕЗ®	ТОВ "Виробниче об'єднання "Тетерів"/ТОВ "Тернофарм", Україна/Україна	р-н нашк. спирт. по 100мл у фл.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МІРАМІСТИН®	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/зовн. застос. по 50мл у фл. з уретр. насад.	0,1 мг/мл	№1	82,49	
	МІРАМІСТИН®-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	мазь по 15г у тубі	5 мг/г	№1	31,69	
	МІРАМІСТИН®-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	мазь по 1000г у бан.	5 мг/г	№1	512,72	

МІРАМІСТИН®-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	мазь по 30г у тубі	5 мг/г	№1	62,14	
---------------------	--	--------------------	--------	----	-------	--

• **Нітрофура́л (Nitrofurals) ** [ПМД]**

Фармакотерапевтична група: D08AF01 - антисептичні та дезінфекційні засоби. Похідні нітрофурану.

Основна фармакотерапевтична дія: антибактеріальний засіб, який діє на стафілококи, стрептококи, дизентерійну і кишкову паличку, сальмонелу, збудників газової гангрени; сприяє процесам грануляції і загоєння ран; механізм дії пов'язаний з його здатністю відновлювати нітрогрупу в аміногрупу, порушувати функцію ДНК, гальмувати клітинне дихання м/о

Показання для застосування ЛЗ: гнійні рани, пролежні, виразкові ураження, опіки II та III ступенів, остеомієліт, емпієма плеври, хр. гнійні отити, анаеробні інфекції, полоскання рота і горла

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для зовнішнього і місцевого застосування у вигляді водного 0,02 % (1:5000) р-ну: 1 табл. розчиняють у 100 мл ізотонічного р-ну натрію хлориду або води дистильованої (для швидкого розчинення використовують гарячу воду); зовнішньо при гнійних ранах, пролежнях, виразкових ураженнях, опіках II-III ст., для підготовки гранулюючої поверхні до пересадження шкіри і до вторинного шва зрошують рану водним р-ном і накладають вологі пов'язки; місцево: остеомієліт після операції - промивання порожнини водним р-ном з подальшим накладенням вологої пов'язки; емпієма плеври - після видалення гною проводять промивання плевральної порожнини і вводять 20-100 мл водного р-ну; при анаеробній інфекції, після стандартного хірургічного втручання, рану також обробити р-ном; при хр.гнійних отитах 8-10 крапель водного р-ну нанести на ватний тампон або турунду і ввести у зовнішній слуховий прохід 2 р/добу (попередньо р-н слід підігріти до температури тіла)

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: дерматити, при полосканні горла — подразнення слизової оболонки порожнини рота; АР, включаючи свербіж, гіперемія, шкірні висипи; ангіоневротичний набряк.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до препарату (ідіосинкразія), алергічні дерматози.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	ФУРАЦИЛ	ТОВ "Исток-Плюс", Україна	пор. д/р-ну д/зовн. застос. по 2г у саше	40мг	№20		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ФУРАЦИЛІН®	ПАТ "Галичфарм"/ПАТ "Київмедпрепарат", Україна/Україна	табл. д/приг. р-ну д/зовн. застос. у стрип. та бл.	20мг	№10		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ФУРАЦИЛІН®	ПАТ "Галичфарм"/ПАТ "Київмедпрепарат", Україна/Україна	табл. д/приг. р-ну д/зовн. застос. у бл.	20мг	№10x2	46,70	
	ФУРАЦИЛІН-ТЕРНОФАРМ	ТОВ "Тернофарм", Україна	пор. д/приг. р-ну д/зовн. застос. по 0,94г у саше	20мг	№30	70,40	

• **Калію перманганат (Potassium permanganate) * ** [ПМД]** (див. п. 1.4. розділу "НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ")

Фармакотерапевтична група: D08AX06 - антисептичні та дезінфікуючі засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: сильний окиснювач, у присутності органічних речовин, що легко окиснюються (компоненти тканин, гнійні виділення), легко відщеплює кисень і перетворюється у діоксид марганцю, який залежно від концентрації р-ну виявляє в'язучу, подразливу, припікальну дію; кисень, що вивільнився, зумовлює протимікробний і дезодораційний вплив, застосовується як антидот при отруєнні фосфором, опіоїдами.

Показання для застосування ЛЗ: інфіковані рани^{БНФ, ВООЗ}, опіки, виразки шкіри, дерматомікози, вагініт, уретрит, цистит, баланопостит, фарингіт, ларингіт, тонзиліт.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати у вигляді водних р-нів зовнішньо, для полоскання, спринцювання, промивання шлунку; в хірургічній, гінекологічній, урологічній, оториноларингологічній, стоматологічній практиці застосовують 0,01%-0,02%-0,1% р-ни, для промивання ран застосовують 0,1%-0,5% р-ни, для змазування (зрошення) виразкових і опікових поверхонь застосовувати 2-5% р-ни.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: у р-нах високої концентрації може спричинити подразнення тканин, при підвищеній чутливості тканини - опік, при потрапленні внутрішньо у пацієнтів зі зниженою кислотністю шлункового соку спричиняє гемотоксичну дію (метгемоглобінемія).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
--	-------------------	-----------------	---------------	-----------	----------------------	----------------	-----------------------------

I.	КАЛІЮ ПЕРМАНГАНАТ	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	пор. у бан.	3г, 5г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАЛІЮ ПЕРМАНГАНАТ	ТОВ "Исток-Плюс", Україна	пор. д/р-ну д/зовн. застос. у фл.	5г	№1	19,50	

• **Повідон йод (Povidone-Iodine) * ** [ПМД]**

Фармакотерапевтична група: D08AG02 - антисептичні та дезінфікуючі засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: антисептичний препарат широкого спектра протимікробної дії по відношенню до бактерій, деяких вірусів, грибків і найпростіших м/о; при контакті зі шкірою та слизовими оболонками йод поступово вивільняється та чинить бактерицидну дію; при утворенні комплексу із полімером полівінілпіролідону йод в значній мірі втрачає місцевоподразнювальну дію, яка притаманна спиртовим розчинам йоду, і тому добре переноситься шкірою, слизовими оболонками і ураженими поверхнями; завдяки механізму дії резистентність на препарат, у тому числі вторинна резистентність, при довготривалому застосуванні не розвивається.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика інфекцій при дрібних порізах та саднах^{БНФ, ВООЗ}, невеликих опіках і незначних хірургічних процедурах, лікування грибкових та бактерицидних інфекцій шкіри, інфекцій пролежнів і трофічних виразок, дезінфекція рук і антисептична обробка^{ВООЗ} слизових оболонок (перед хірургічними операціями, гінекологічними та акушерськими процедурами, катетеризацією сечового міхура, біопсією, ін'єкціями, пункціями, взяттям крові), як перша допомога при випадковому забрудненні шкіри інфікованим матеріалом, антисептична обробка ран та опіків, гігієнічна та хірургічна дезінфекція рук.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: мазь та лінімент: для лікування інфекції - наносити 1 - 2 р/добу, тривалість лікування - не більше 14 днів; для профілактики інфекції - наносити 1 - 2 р/тиждень, доки це необхідно; нанести мазь/лінімент на уражену поверхню шкіри; на оброблену шкіру можна накласти пов'язку; р-ни можна застосовувати^{ВООЗ} 2-3 р/добу; гігієнічна дезінфекція рук - 2 рази по 3 мл нерозведеного р-ну - кожна доза по 3 мл залишається на шкірі протягом 30 сек; хірургічна дезінфекція рук - 2 рази по 5 мл нерозведеного р-ну - кожна доза по 5 мл залишається на шкірі протягом 5 хв; для дезінфекції шкіри нерозведений р-н після його застосування залишається до висихання; р-н можна застосовувати після розведення водопровідною водою; при операціях, а також при антисептичній обробці ран та опіків для розведення застосовувати фізіологічний р-н чи р-н Рінгера; рекомендуються такі розведення: приготування вологого компресу - 1:5 - 1:10, занурення та сидячі ванни - 1:25, передопераційна ванна - 1:100, гігієнічна ванна - 1:1000, спринцювання піхви, введення ВМС, зрошення промежини, зрошення в урології - 1:25, зрошення хр. і післяопераційних ран - 1:2 - 1:20; зрошення в ортопедії і травматології, зрошення при операціях у порожнині роту - 1:10.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперчутливість, анафілактичні реакції; порушення функції нирок, г. ниркова недостатність; місцеві шкірні реакції гіперчутливості, такі як контактний дерматит з утворенням псоріазоподібних червоних дрібних бульозних утворень; АР, включаючи свербіж, почервоніння, висипання, ангіоневротичний набряк, ексфолюативний дерматит, сухість шкіри, хімічний та термічний опік шкіри; гіпертиреоз (з симптомами: тахікардія або занепокоєння); гіпотиреоз; електролітний дисбаланс; метаболічний ацидоз; описаний йод-індукований гіпертиреоз, зміна рівня електролітів сироватки крові (гіпернатріємія) і осмолярності, метаболічний ацидоз

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до йоду чи підозра на неї або підвищена чутливість до інших компонентів препарату; герпетичний дерматит Дюринга; порушення функції щитовидної залози (вузловий колоїдний зоб, ендемічний зоб і тиреоїдит Хашимото); період перед та після лікування та сцинтиграфії з радіоактивним йодом у хворих із карциномою щитовидної залози; гіпертіреоїдизм або інші гострі порушення щитоподібної залози; ниркова недостатність.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БЕТАЙОД-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	мазь по 40г у тубі	100 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БЕТАЙОД-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	мазь по 20г у тубі	100 мг/г	№1	67,54	
	БЕТАЙОД-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н нашк. по 100мл у конт.	100 мг/мл	№1	144,17	
	БЕТАЙОД-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н нашк. по 1000мл у фл. з насад.	100 мг/мл	№1	506,49	
	БЕТАЙОД-	Товариство з обмеженою	р-н нашк. по	100 мг/мл	№1	92,48	

ЗДОРОВ'Я	відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	50мл у фл. з насад.					
ЙОД ПЕЧАЄВСЬКИЙ	ПрАТ "Технолог", Україна	р-н д/зовн. застос. по 50мл, 100мл, у фл. з насад.	10%	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЙОД ПЕЧАЄВСЬКИЙ	ПрАТ "Технолог", Україна	р-н д/зовн. застос. по 120мл бан. з пр-крап.	10%	№1	110,60		
ЙОД ПЕЧАЄВСЬКИЙ	ПрАТ "Технолог", Україна	р-н д/зовн. застос. по 30мл у фл. з пр-крап.	10%	№1	35,00		
ЙОД ПЕЧАЄВСЬКИЙ	ПрАТ "Технолог", Україна	р-н д/зовн. застос. по 1000мл у конт.	10%	№1	560,00		
ПОВІДОН-ЙОД	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	лінімент по 30г у тубі	10%	№1	35,80		
РАНОСТОП®	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	мазь по 100г у тубі	10%	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ	
РАНОСТОП®	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	мазь по 40 г у тубі	10%	№1	109,46		
РАНОСТОП®	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	мазь по 20г у тубі	10%	№1	62,02		
РАНОСТОП®	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/зовн. та місц. застос. по 100мл у фл. з пр.-крап.	10%	№1	140,89		
РАНОСТОП®	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/зовн. та місц. застос. по 50мл у фл. з пр.-крап.	10%	№1	89,17		
II. БЕТАДИН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	мазь 20г у тубі	10%	№1	91,66	25,75/\$	
БЕТАДИН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	р-н д/зовн. та місц. застос. по 120мл, у фл.-крап. в пач.	10%	№1	144,96	25,75/\$	
БЕТАДИН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	р-н д/зовн. та місц. застос. по 1000мл. у фл.-крап.	10%	№1	502,87	25,75/\$	
БЕТАДИН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	р-н д/зовн. та місц. застос. по 30мл, у фл.-крап. в пач.	10%	№1	95,01	25,75/\$	
БЕТАДИНЕ®	Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія	р-н нашк. по 100мл з пр.-піпет.	10г/100мл	№1	120,00	26,32/\$	
БЕТАДИНЕ®	Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія	р-н нашк. по 1000мл у фл.	10г/100мл	№1	450,00	26,32/\$	

● **Діамантовий зелений (Viride nitens) ****

Фармакотерапевтична група: D08AX - антисептичні та дезінфікуючі засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: антисептичний засіб для зовнішнього та місцевого застосування, чинить антимікробну дію, препарат активний відносно Гр(+) бактерій.

Показання для застосування ЛЗ: гнійно-запальні процеси шкіри (підермія, фурункульоз, карбункульоз, блефарит) легкої форми, обробка операційного поля, шкірних покривів після операцій та травм.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: наносять на поверхню шкіри, охоплюючи при порушенні її цілісності навколишні здорові тканини; при захворюваннях очей змазують краї повік.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР (свербіж, кропив'янка), при попаданні р-ну на слизову оболонку ока - печіння, слъзотеча, опіки.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до компонентів ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 50мл, 100мл у фл.	1%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 20мл у фл.	1%	№1	9,78	
	БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 20мл у фл.-крап.	1%	№1	6,02	
	БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	АТ "Лубнифарм", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 15мл у фл.	1%	№1	5,67	
	БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 15мл у фл.	1%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 25мл у фл.-крап.	1%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 20мл у фл.-крап.	1%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 10мл у фл.	1%	№1	5,51	
	БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 20мл у фл.	1%	№1	8,39	
	БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	ТОВ "Тернофарм", Україна	р-н д/зовн. заст., спирт. по 10мл, 20мл у фл. та фл.-крап. в пач. та без	1%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	ТОВ "Тернофарм", Україна	р-н д/зовн. заст., спирт. по 20мл у фл.-крап.	1%	№1	4,21		

• **Ектеріцид (Ectericid) ****

Фармакотерапевтична група: D08AX - антисептичні та дезінфікуючі засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: активний щодо піогенної мікрофлори: синьогнійної та кишкової паличок, протей, стафілококів; малотоксичний.

Показання для застосування ЛЗ: лікування післяопераційних та травматичних ран, ускладнених гнійною інфекцією, ран, що повільно гранулюють та довго не загоюються, фурункулів, карбункулів, норицевих форм остеомієліту, опіків, трофічних виразок з нагноєнням.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати місцево в нерозведеному вигляді як засіб монотерапії чи в комплексі з іншими препаратами; промивання інфікованих ран проводити 2 р/добу до зникнення гнійного виділення, після чого промивання та перев'язки робити 1 р/3 - 4 дні до повного загоювання ран; при лікуванні інфікованих опіків відкритим способом застосовувати з новокаїном: до 50 мл препарату додати 10 мл 0,5 % р-ну новокаїну; ранову поверхню зрошувати кожні 6 - 8 год; при закритому способі 2 р/добу з інтервалом 6 - 8 год на опікову поверхню накладати пов'язки, сильно змочені препаратом; зрошувати нижній шар пов'язки, не знімаючи її; проводять до повного зникнення гною; лікування карбункулів та фурункулів після їх розтину та евакуації гнійних

мас проводити шляхом накладання на рану добре змочених препаратом марлевих серветок; перші 2 - 3 дні перев'язки робити щодня, а далі 1 р/2 - 3 дні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР (в т.ч. набряк, гіперемія, свербіж, висипання на шкірі).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕКТЕРИЦИД®	АТ "БІОЛІК", Україна	р-н д/зовн. застос. по 50мл, 250мл у пл. скл.	0,0034г-екв.	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕКТЕРИЦИД®	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	р-н д/зовн. застос. по 50мл, 250мл у пл. скл.	0,0034г-екв.	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

9.1.5. Засоби для лікування псоріазу

9.1.5.1. Засоби для системного застосування. Імунодепресанти (лікарські засоби, що впливають на імунну відповідь)

- **Циклоспорин (Ciclosporin)** * (див. п. 18.2.2. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: тяжкі форми псоріазу^{БНФ}, коли традиційна терапія неефективна або неприйнятна; лікування тяжких форм атопічного дерматиту^{БНФ} при необхідності системної терапії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: псоріаз - для індукції ремісії рекомендована початкова доза 2,5 мг/кг/добу в 2 прийоми; за відсутності поліпшення після 1 міс. терапії добова доза може бути поступово збільшена, але не повинна перевищувати 5 мг/кг; лікування припинити, якщо не був досягнутий задовільний ефект протягом 1 міс. лікування дозою 5 мг/кг/добу або якщо ефективна доза не відповідає встановленим параметрам безпеки; застосування початкової дози 5 мг/кг на добу є виправданим для хворих, стан яких потребує швидкого поліпшення; якщо задовільний ефект досягнутий, то препарат можна відмінити, а наступний рецидив лікувати повторним призначенням препарату у попередній ефективній дозі; за необхідності проведення підтримуючої терапії дози повинні добиратись індивідуально, на мінімальному ефективному рівні і не повинні перевищувати 5 мг/кг/добу; атопічний дерматит - для дорослих та підлітків віком від 16 років рекомендована доза 2,5-5 мг/кг/добу в 2 прийоми; якщо початкова доза 2,5 мг/кг/добу не дає змоги досягнути задовільного ефекту протягом 2 тижнів, добову дозу можна швидко збільшити до максимальної - 5 мг/кг; у дуже тяжких випадках швидкого й адекватного контролю захворювання можна досягнути, застосовуючи початкову дозу 5 мг/кг/добу, при досягненні задовільного ефекту дозу потрібно поступово знижувати і, якщо можливо, відмінити; у випадку виникнення рецидиву провести повторний курс лікування; рекомендована тривалість індивідуальних циклів лікування - не більше 8 тижнів.

- **Інфліксимаб (Infliximab)** (див. п. 18.2.4. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: бляшкоподібний псоріаз середнього та тяжкого ступеня у дорослих пацієнтів при відсутності відповіді, непереносимості чи медичних протипоказаннях до застосування інших видів системної терапії^{БНФ} включаючи циклоспорин, метотрексат або ПУВА-терапію

Спосіб застосування та дози ЛЗ: по 5 мг/кг шляхом в/в інфузії на 2 та 6 тижнях лікування після першої інфузії, далі - через кожні 8 тижнів; якщо у пацієнта не спостерігається відповіді після 14 тижнів (тобто після отримання 4 доз), подальше лікування препаратом не слід проводити.

- **Метотрексат (Methotrexate)** * (див. п. 8.3. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ", п. 19.1.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")

Показання для застосування ЛЗ: тяжкі та поширені форми псоріазу^{БНФ,ВООЗ}, вульгарного, особливо бляшкового типу, у дорослих пацієнтів при неефективності традиційної терапії (фотолікування, PUVA-терапії та застосування ретиноїдів).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: псоріаз: рекомендовано вводити парентерально пробну дозу 5-10 мг за 1 тиждень до початку лікування з метою виявлення ідіосинкразійних побічних реакцій; рекомендована початкова доза становить 7,5 мг, п/ш, в/м або в/в 1 р/тиждень; дозу підвищувати поступово, але не перевищувати максимальну тижневу дозу 25 мг; реакцію на лікування можна очікувати приблизно через 2-6 тижнів; після досягнення бажаного терапевтичного ефекту дозу зменшувати поступово до мінімально можливої ефективної підтримуючої дози; табл. - рекомендована початкова доза дорослим становить 2,5 мг 3р/тиждень з 12-год інтервалами або 7,5 мг 1 р/тиждень, максимальна тижнева доза не повинна перевищувати 20 мг.

- **Уstekinumab (Ustekinumab)** ^(ГМД)

Фармакотерапевтична група: L04AC05 - імуносупресанти. Інгібітори інтерлейкіну.

Основна фармакотерапевтична дія: повністю людські моноклональні антитіла типу IgG1k, що мають високу специфічність до субдоданиці р40 інтерлейкінів людини ІЛ-12 і ІЛ-23 (гетеродимерні цитокіни, що секретуються активованими антигенпрезентуючими клітинами - макрофагами і дендритними клітинами); блокує біологічну активність ІЛ-12 і ІЛ-23, запобігаючи їх зв'язуванню з білковим рецептором ІЛ-12Rb1, що експресується на поверхні імунних клітин; не може зв'язуватися з ІЛ-12 і ІЛ-23, вже зв'язаними з рецептором, не бере участь у формуванні комплемент- або антитілозалежної цитотоксичності клітин, що несуть ці рецептори; усуває вплив ІЛ-12 та ІЛ-23 на активацію імунних клітин, зокрема на внутрішньоклітинну передачу сигналу і секрецію цитокінів; перериває каскад р-цій передачі сигналу і секреції цитокінів, проявляє клінічну ефективність при псоріазі та псоріатичному артриті за рахунок зв'язування субдоданиці р40 ІЛ-12 та ІЛ-23 і порушення вироблення цитокінів Th1 та Th17, які є ключовими ланками патогенезу даних захворювань.

Показання для застосування ЛЗ: бляшковий псоріаз від помірного до тяжкого ступеня у дорослих, у яких не було позитивного ефекту лікування або які мають протипоказання або непереносимість інших засобів системної терапії^{БНФ}, включаючи циклоспорин, метотрексат або PUVA-терапію; бляшковий псоріаз у дітей: лікування бляшкового псоріазу від помірного до тяжкого ступеня у дітей віком від 12 років, стан яких недостатньо

контролюється іншими засобами системної терапії або фотолікуванням, або при непереносимості такого лікування; як монотерапія або у комбінації з метотрексатом для лікування псоріатичного артриту в активній формі у дорослих, у яких не було позитивного ефекту від лікування базовими протиревматичними препаратами, що модифікують перебіг хвороби (DMARD).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: бляшковий псоріаз: початкова доза 45 мг, наступну дозу 45 мг вводять через 4 тиж від початку лікування, потім - кожні 12 тижнів; розглянути питання про доцільність продовження терапії пацієнтам, у яких відсутній терапевтичний ефект до 28 тижня лікування; пацієнтам з масою тіла більше 100 кг початкова доза 90 мг, наступну дозу 90 мг вводять через 4 тижні, потім - кожні 12 тижнів, доза 45 мг також може бути ефективною^{БНФ}; псоріатичний артрит: початкова доза 45 мг, наступну дозу 45 мг вводять через 4 тижні, потім - кожні 12 тижнів, пацієнтам із масою тіла більше 100 кг початкова доза може становити 90 мг; розглянути питання про доцільність продовження терапії пацієнтам, у яких відсутній терапевтичний ефект до 28 тижня лікування; бляшковий псоріаз у дітей віком від 12 років: рекомендована доза в залежності від маси тіла: < 60 кг - 0,75 мг/кг, ≥ 60 - ≤ 100 кг - 45 мг, > 100 кг - 90 мг; після введення початкової дози наступну вводять через 4 тижні, а потім - кожні 12 тижнів. *Не змішувати з іншими лікарськими засобами в одній ємкості!!!*

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції верхніх дихальних шляхів, назофарингіт; запалення підшкірної клітковини, стоматологічні інфекції, оперізувальний лишай (*Herpes Zoster*), інфекції нижніх дихальних шляхів, вірусні інфекції верхніх дихальних шляхів, вульвовагінальні мікози; р-ції гіперчутливості (включаючи висипання, кропив'янку); серйозні АР (включаючи анафілаксію, ангіоневротичний набряк); депресія; запаморочення, головний біль; параліч лицьового нерва; біль у горлі/глотці; закладеність носа; алергічний альвеоліт, еозинофільна пневмонія; діарея, нудота, блювання; свербіж; пустульозний псоріаз, лущення шкіри, акне; ексофоліативний дерматит; біль у спині, міалгія, артралгія; слабкість, почервоніння місця ін'єкції, біль у місці ін'єкції; р-ції у місці ін'єкції (включаючи кровотечу, гематому, ущільнення, набряк, свербіж).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до устекінумабу або до будь-якої з допоміжних речовин ЛЗ, наявність клінічно важливих інфекційних захворювань у активній формі (туберкульоз та ін.).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,54 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	СТЕЛАРА®	Сілаг АГ, Швейцарія	р-н д/ ін'єк. по 0,5мл, 1мл у фл. або шпр. з пристр. д/введ. UltraSafe Passive®	45мг/0,5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СТЕЛАРА®	Сілаг АГ, Швейцарія	р-н д/ ін'єк. по 0,5мл у шпр. з пристр. д/введ. UltraSafe Passive®	45мг/0,5мл	№1	886,63	24,25/\$

9.1.5.2. Засоби для зовнішнього (топічного) застосування

Також застосовуються ГК для топічного застосування – див. п.9.1.1.

- **Кальцитріол (Calcitriol)**

Фармакотерапевтична група: D05AX03 - антипсоріатичні засоби для місцевого застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: інгібує проліферацію та стимулює диференціювання кератиноцитів; зменшує зчеплення та пришвидшує злущування рогових клітин; інгібує проліферацію Т-лімфоцитів та нормалізує продукцію різних факторів запального процесу.

Показання для застосування ЛЗ: бляшкоподібний псоріаз легкого та середнього ступеня тяжкості^{БНФ} (місцеве лікування шкірних проявів) з ураженням до 35 % площі поверхні тіла.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: мазь наносити тонким шаром на уражені ділянки шкіри 2 р/добу^{БНФ} (зранку та ввечері); щоденне нанесення мазі не повинно перевищувати 35 % поверхні шкіри^{БНФ}; не застосовувати мазь у кількості більше ніж 30 г/добу^{БНФ}; середня тривалість лікування 6 тижнів; за рекомендацією лікаря можливе більш тривале лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості, включаючи АР; свербіж, відчуття дискомфорту, печіння, подразнення шкіри (може набувати вираженої форми у вигляді пустул, папул або везикул), еритема (почервоніння), сухість шкіри, псоріаз (погіршення перебігу, загострення), набряк шкіри, контактний дерматит; можливе виникнення дерматиту на обличчі, зокрема навколо рота, який зазвичай минає після відміни ЛЗ; гіперкальціємія; гіперкальціурія, сечокам'яна хвороба.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату; гіперкальціємія та інші патологічні стани, що характеризуються порушенням метаболізму кальцію; системна терапія кальцієвого гомеостазу; порушення ф-ції печінки та нирок.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
--	-------------------	-----------------	---------------	-----------	----------------------	----------------	-----------------------------

II.	ФОРКАЛ®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	мазь по 30г, 100г у тубі	3 мкг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ
-----	---------	----------------------------------	-----------------------------	---------	----	---------------------------

● **Кислота саліцилова (Salicylic acid) * ****

Фармакотерапевтична група: D02AF - дерматологічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: при місцевому застосуванні виявляє слабку антисептичну, а також подразнювальну, відволікаючу дію; викликає набряк і розм'якшення рогового шару шкіри, який поступово знебарвлюється і легко знімається з поверхні шкіри великими пластами; пригнічує секрецію сальних і потових залоз; у низьких концентраціях виявляє кератопластичну, а у високих - кератолітичну дію.

Показання для застосування ЛЗ: мазь 2 % та 5 %: топічне лікування гіперкератозів^{вооз} великої площі (псоріазу).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: перед накладенням пов'язки з саліциловою маззю рани звільнити від некротичних мас, промити антисептичним р-ом; на уражені місця мазь накладати 2-3 р/добу стерильною серветкою або накладати на рани стерильну пов'язку, просякнуту маззю; при вираженому запаленні 2 % мазь розбавляти вазеліном у співвідношенні 1:2 - 1:4 рази і застосовувати 1-2 р/добу; після усунення злущування використовувати інші засоби; тривалість курсу лікування - від 6 до 20 діб.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: місцеві р-ції у вигляді свербіж, печіння, шкірних висипань, сухості, лущення, подразнення, контактного дерматиту, кропив'янки; при тривалому застосуванні можливе всмоктування препарату в загальний кровообіг і розвиток характерних для саліцилатів побічних ефектів: шум у вухах, запаморочення, біль в епігастрії, нудота, блювання, ацидоз, пришвидшене дихання.

Противпоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до саліцилової кислоти.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	САЛІЦИЛОВА МАЗЬ	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	мазь по 20г, 25г у тубі в пач. та без	2%, 5%, 10%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	САЛІЦИЛОВА МАЗЬ	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	мазь по 25г у конт.	2%	№1	32,15	
	САЛІЦИЛОВА МАЗЬ	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	мазь по 25г у конт.	5%	№1	33,95	
	САЛІЦИЛОВА МАЗЬ	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	мазь по 25г у конт.	10%	№1	35,65	

9.1.6. Засоби для лікування дерматитів (у т.ч. atopічного дерматиту) та екзем

9.1.7. Топічні місцеві анестетики та засоби проти свербіж

9.1.7.1. Антигістамінні засоби для топічного застосування

- **Диметинден (Dimetindene) **** (див. п. 18.3.1.1. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: D04AA13 - антигістамінні засоби для місцевого застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: антагоніст гістаміну на рівні H₁-рецепторів; має високу спорідненість з H₁-рецепторами та знижує гіперпроникність капілярів, що пов'язана з р-ціями гіперчутливості; має також місцевоанестезуючі властивості.

Показання для застосування ЛЗ: шкірний свербіж, наприклад, при укусах комах, алергічні подразнення невеликих ділянок шкіри, кропив'янка, неускладнені невеликі опіки шкіри та необширна сонячна еритема.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим і дітям від 2 років наносити на уражені ділянки шкіри 2 - 4 р/добу; у разі дуже сильного свербіж або розповсюджених уражень шкіри рекомендується разом з місцевими аплікаціями гелю/емульсії застосовувати р/ос форми препарату; дітям віком до 2 років застосовувати за призначенням лікаря.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: незначні та короточасні р-ції на шкірі у місці нанесення; сухість шкіри, відчуття печіння шкіри, АР, включаючи шкірні висипання, свербіж та набряк, алергічний дерматит, кропив'янка.

Противпоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого компонента ЛЗ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕДЕРМІК	ПАТ "Фармак", Україна	гель по 30г у тубі	0,1%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	ФЕНІСТИЛ ГЕЛЬ	ГСК Консьюмер Хелскер С.А. (виробництво за повним циклом), Швейцарія	гель по 30г у тубі	0,1%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

ФЕНІСТИЛ ЕМУЛЬСІЯ	ГСК Консьюмер Хелскер С.А., Швейцарія	емул. нашк. по 8мл у фл. з аплік.	0,1%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
ФЕНІСТИЛ ЕМУЛЬСІЯ	Новартіс Консьюмер Хелс СА, Швейцарія	емул. нашк. по 8мл у фл. з аплік.	0,1%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ

- **Дифенгідрамін (Diphenhydramine) **** (див. п. 29.5.1.1. розділу "Додаток 8. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ")

Фармакотерапевтична група: D04AA32 - протисвербіжні засоби, включаючи антигістамінні, місцевоанестезуючі та інші засоби. Антигістамінні засоби для місцевого застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: протисвербіжна, антигістамінна та місцевоанестезуюча.

Показання для застосування ЛЗ: алергічні дерматити, сонячні опіки, інші опіки першого ступеня, укуси комах, кропив'янка, свербіж різної етіології, екзема зі свербжежем, свербіж країв ран та саден, вітряна віспа, дерматити, поліморфні дерматози (сонячна алергія).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: наносити **гель** на uszkodжені ділянки шкіри тонким рівномірним шаром за допомогою легких розгладжуючих рухів; дорослим та дітям від 2 років гель наносити 3-4 р/добу; **мазь**: протягом доби дорослим та дітям віком від 12 років наносити 5-15 см (що відповідає 18-54 мг дифенгідраміну) 3-4 р/добу, не застосовувати більше 15 г мазі (300 мг дифенгідраміну); дітям 6-12 років наносити 8-10 см 3-4 р/добу, не застосовувати більше 41 см смужки мазі (150 мг дифенгідраміну)/добу; дітям 2-6 років наносити 3 см 2-3 р/добу, не рекомендується застосовувати більше 10 см смужки мазі (37 мг дифенгідраміну)/добу, похилим та ослабленим пацієнтам, так само як і пацієнтам із тяжкою печінковою та нирковою недостатністю, дозування і тривалість застосування підбирати в залежності від ступеня тяжкості ураження та ефективності терапії і визначати лікарем індивідуально.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР; контактний дерматит, р-ції фоточутливості шкіри (уникати прямих сонячних променів) з почервонінням, свербжежем, утворенням пухирів і набряку шкіри, сухість у роті; р-ції гіперчутливості; відчуття втоми, особливо у дітей; збудженість; занепокоєння; тривожність та спазми; розлади сечовипускання.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату, нанесення на великі зони ураженої шкіри, комбінації з іншими засобами, що містять дифенгідрамін; дитячий вік до 2 років; не рекомендується наносити на відкриті рани, переломи та слизові оболонки, а також на великі зони ураженої шкіри, особливо при вітряній віспі, кору, везикулярних ураженнях шкіри.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДЕРМАДРІН	Фармацевтише фабрік Монтавіт ГмБХ, Австрія	мазь по 20г, 50г, 100г у тубі	20 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПСИЛО-БАЛЬЗАМ®	СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина	гель по 20г у тубі	10 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

9.1.7.2. Анестетики для топічного застосування

- **Лідокаїн (Lidocaine)** (див. п. 10.2.2. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: D04AB01 - препарати для місцевої анестезії.

Основна фармакотерапевтична дія: мембраностабілізуюча, засіб групи амідів для місцевої анестезії; інгібує чутливі нервові закінчення шкіри і слизових оболонок, тобто спричиняє зворотне пригнічення провідності тканинних елементів нервових клітин (нейрон, аксон, синапси); серед різних сенсорних способів дії перш за все пригнічує больову чутливість, що супроводжується пригніченням відчуття тепла і тактильних відчуттів.

Показання для застосування ЛЗ: анестезія шкіри і слизових оболонок при малих хірургічних втручаннях.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при кожному розпиленні 1 порції спрею на поверхню викидається 4,8 мг лідокаїну (1 доза); зазвичай достатньо 1-2 розпилень (максимальна доза 40 розпилень/70 кг маси тіла); дерматологія - 1-3 натиски; за допомогою просоченого аерозолем ватного тампона препарат може наноситися на великі поверхні; у дітей віком до 2 років можна застосовувати у такий самий спосіб.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: печіння, транзиторна еритема, набряк і зниження чутливості; АР: висипання на шкірі, свербіж, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, шок; збудження, депресія, нервозність, запаморочення, сонливість, спазми, втрата свідомості, параліч органів дихання; артеріальна гіпотензія, ІМ, брадикардія, зупинка серця.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату, амідних місцевоанестезуючих ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): місцево - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЛІДОКАЇН-	Товариство з обмеженою	спрей д/місц.	10%	№1	303,58	

	ЗДОРОВ'Я	відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	застос. по 38г у фл. з клап.- насос. та розпил.				
II.	ЛІДОКАІН	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	спрей по 38г у фл. з клап.- дозат.	10%	№1	275,08	26,45/\$

9.1.8. Лікарські засоби для лікування вугрів та розацеа

Лікування вугрів треба розпочинати якомога раніше з метою запобігання утворенню рубців. Пацієнти мають бути попереджені, що покращання може і не спостерігатись протягом декількох місяців. Вибір методу лікування залежить від типу вугрів (переважно запальні або комедонні) та важкості пербігу.

Якщо перебіг захворювання легкий або помірний, лікування проводять переважно топічними препаратами. Системне лікування із застосуванням пероральних антибактеріальних препаратів призначають при помірному та важкому перебігу або, якщо топічні препарати погано переносяться або неефективні, а також у випадку, якщо застосування (нанесення) топічних форм утруднене. До інших пероральних препаратів, що застосовуються при лікуванні вугрів у жінок, належать комбіновані гормональні препарати, що містять *етинілестрадіол + ципротерону ацетат*.

9.1.8.1. Засоби для зовнішнього застосування

9.1.8.1.1. Бензоїл пероксид та азелаїнова кислота

- **Бензоїл пероксид (Benzoyl peroxide) * ****

Фармакотерапевтична група: D10AE01 - місцеві засоби для лікування акне.

Основна фармакотерапевтична дія: має антисептичні та кератолітичні властивості, гальмує (внаслідок вивільнення кисню) розвиток анаеробних *M/o Propionibacterium* у вуграх, сприяє очищенню пор.

Показання для застосування ЛЗ: місцеве лікування та профілактика вугрових висипань^{БНФ, ВООЗ} (*Acne vulgaris*) у дорослих та дітей віком від 12 років.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: нанести тонким шаром на вимиту і висушену шкіру, уражену вуграми, обережно втерти кінчиками пальців до повного всмоктування, починати з 1 р/день, потім поступово підвищувати до 2-3 р/день^{ВООЗ}; у разі надмірної сухості або лущення, скоротити застосування до 1 р/день або через день; терапевтичний ефект розвивається протягом 8-12 тижнів від початку застосування; з метою профілактики можна продовжувати лікування 1 р/день до отримання стійкої ремісії; курс застосування не повинен перевищувати 3 місяців; у тяжких випадках комбінувати з іншими засобами для лікування акне.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: може спричинити подразнення, що супроводжується почервонінням, лущенням чи сухістю шкіри, відчуттям тепла, поколювання, печіння та свербіж; шкірні висипання, алергічний контактний дерматит (печіння, утворення пухирів і кірок, свербіж, почервоніння або набряк).

Противпоказання до застосування ЛЗ: діти віком до 12 років; гіперчутливість до бензоїлу пероксиду та інших компонентів ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): місцево - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	УГРЕСОЛ	Фармасайнс Інк., Канада	лосьйон по 30мл у фл. в кор.	10%	№1	89,53	26,81/\$

- **Кислота азелаїнова (Azelaic acid) ****

Фармакотерапевтична група: D10AX03 - місцеві засоби для лікування акне.

Основна фармакотерапевтична дія: антимікробна, кератолітична дія; терапевтичну ефективність препарату при лікуванні акне обумовлюють його антимікробна дія та безпосередній вплив на фолікулярний гіперкератоз; спостерігається значне зниження щільності колонізації *Propionibacterium acnes* і суттєве зменшення фракції вільних жирних к-т у ліпідах поверхні шкіри.

Показання для застосування ЛЗ: **гель:** папулопустулярні форми акне^{БНФ} на обличчі слабкого або/та помірною ступеня тяжкості, папулопустулярна форма розацеа^{БНФ}; **крем:** акне (вугрі звичайні)^{БНФ}, що характеризується наявністю комедонів, папул, пустул і маленьких вузликів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: наносити на ретельно вимиту та висушену шкіру 2 р/добу^{БНФ} (вранці та ввечері) у достатній, проте не надмірній, кількості (приблизно 2,5 см =0,5 г вичавленого із туби крему або гелю достатньо для всієї поверхні обличчя); у разі надмірного подразнення шкіри зменшити^{БНФ} або кількість засобу, що наноситься, або частоту застосування до 1 р/добу до зникнення подразнення; тривалість курсу лікування може змінюватись залежно від індивідуальної картини захворювання й також визначається ступенем його тяжкості.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: явища місцевого подразнення шкіри (сухість, висипання, набряк, свербіж, печіння, почервоніння, лущення шкіри); АР.

Противпоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АКНЕСТОП	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	крем по 30г у тубі	200 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	СКІНОРЕН®	Байєр Хелскер Мануфактурінг С.Р.Л., Італія	гель по 5г, 30г у тубі	0,15 г/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

9.1.8.1.2. Антибактеріальні засоби

- **Кліндаміцин (Clindamycin) **** (див. п. 17.2.5. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: D10AF01 - протимікробні засоби для лікування акне.

Показання для застосування ЛЗ: лікування звичайних вугрів^{БНФ, ВООЗ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: наносити тонким шаром на уражену ділянку очищеної шкіри 2 р/добу^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості, діарея, діарея з домішками крові та коліт, включаючи псевдомембранозний коліт, біль у животі та шлунково-кишкові розлади, нудота, блювання; фолікуліт, спричинений грам(-) м/о, подразнення шкіри, печіння, свербіж, сухість, еритема, жирність/жирна шкіра, контактний дерматит, кропив'янка, печіння очей, пов'язані із місцевим застосуванням.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЗЕРКАЛІН®	Ядран-Галенський Лабораторій д.д., Хорватія	р-н нашк. по 30мл у скл. фл.	1%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

Комбіновані препарати

- **Бензоїл пероксид + кліндаміцин (Benzoyl peroxide + clindamycin) ****

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДУАК	Стіфел Лабораторіз (Ірландія) Лтд./Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Ірландія/Велика Британія	гель у тубі по 5г, 15г, 25г, 50г	50мг/10мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

9.1.8.1.3. Ретиноїди

- **Адапален (Adapalene)**

Фармакотерапевтична група: D10AD03 - препарати для лікування акне. Ретиноїди для місцевого лікування акне.

Основна фармакотерапевтична дія: похідний нафтоїної кислоти, ретиноїдоподібна речовина, що модулює процеси клітинної диференціації і кератинізації, а також запальні процеси у шкірі, які є основними патогенетичними ланками у розвитку акне; зв'язується з ретиноїдними рецепторами ядра клітини, сприяє нормальній диференціації епітеліальних клітин фолікулів, що призводить до зменшення утворення мікрокомедонів і перешкоджає розвитку акне, сприяє збереженню неушкодженої шкіри.

Показання для застосування ЛЗ: місцеве лікування акне (acne vulgaris)^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: місцево дорослим і підліткам старше 12 років в місцях висипань, 1 р/добу, на ніч^{БНФ} наносити кінчиками пальців тонким шаром на чисту суху шкіру у місцях висипів, уникаючи ділянки навколо очей та губ; терапевтичний ефект розвивається через 8-12 тижнів лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР, реакції фоточутливості, відчуття поколювання, почервоніння, лущення, сухість, свербіж і печіння шкіри у місці застосування, загострення вугрового процесу, подразнення шкіри у перші тижні лікування.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; новоутворення шкіри, екзема, себореїний дерматит, ушкодження шкіри, опіки шкіри, застосування засобів, що пересушують шкіру (препарати сірки, цинку, саліцилової кислоти); дитячий вік до 12 років.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БЕЛАКНЕ	Белупо, ліки та косметика, д.д., Хорватія	гель по 30г у тубі	1 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

БЕЛАКНЕ	Белупо, ліки та косметика, д.д., Хорватія	крем по 30г у тубі	1 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ
ДЕРИВА ВОДНИЙ ГЕЛЬ	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія	гель по 5г, 15г у тубі	1 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ

9.1.8.1.4. Інші лікарські засоби

- **Кислота саліцилова (Salicylic Acid) **** (див. п. 9.1.5.2. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Основна фармакотерапевтична дія: антисептичний засіб, при місцевому застосуванні чинить протимікробну, подразнювальну, відволікаючу дію.

Показання для застосування ЛЗ: інфекційні ураження шкіри: звичайні вугрі, піодермія.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати зовнішньо, змащуючи або розтираючи уражені ділянки шкіри ватним тампоном, просоченим препаратом 2 - 3 р/добу, курс лікування визначає лікар індивідуально залежно від перебігу та тяжкості захворювання.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сухість, лущення, подразнення, контактний дерматит, прояви алергічних реакцій (кропив'янка, свербіж); шум у вухах, запаморочення, біль в епігастрії, нудота, блювання, ацидоз, пришвидшене дихання.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до ЛЗ

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА	ТОВ "Тернофарм", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 40мл у фл. в пач.	1%	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
	КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА	ТОВ "Тернофарм", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 40мл у фл.	1%	№1	6,59	
	КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА 1 %	ТОВ "Фарма Черкас", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 25мл, 40мл у фл.	1%	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
	САЛІЦИЛКА-ВІШФА	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 40мл у фл.	1%	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
	САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 25мл у фл.	1%	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
	САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 40мл у фл.	1%	№1	7,98	
	САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 40мл у фл. в пач.	1%	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
	САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 40мл у фл.	1%	№1	6,46	
	САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА	ПАТ "Фармак", Україна	р-н нашк. спирт. по 25мл у фл.	20 мг/мл	№1	8,00	
	САЛІЦИЛОВОЇ КИСЛОТИ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/зовн. застос., спирт. по 40мл у фл.	1%	№1	8,34	

9.1.8.2. Засоби для системного застосування

9.1.8.2.1. Антибіотики

Загальні принципи застосування АБЗ (тетрациклін, окситетрациклін, доксициклін, еритроміцин, триметоприм) – див. розділ «Протимікробні та антигельмінтні засоби».

9.1.8.2.2. Ретиноїди

- **Ізотретиноїн (Isotretinoin)**

Фармакотерапевтична група: D10BA01 - засоби для системного лікування акне.

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна дія; синтетичний стереоізомер транс-ретиноевої кислоти (третиноїну); механізм дії докладно ще не визначено, проте встановлено, що поліпшення клінічної картини тяжких

форм акне пов'язано з зниженням активності сальних залоз і гістологічно підтвердженим зменшенням їх розмірів; доведена протизапальна дія на шкіру.

Показання для застосування ЛЗ: тяжкі форми акне^{БНФ} (зокрема вузликів та конглобатні акне, акне зі схильністю до постійного рубцювання^{БНФ}), що не піддаються стандартним методам лікування (системна антибактеріальна терапія^{БНФ}, місцеве лікування).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймати під час їди 1-2 р/добу; лікування розпочинати з дози 0,5 мг/кг на добу^{БНФ}; у більшості хворих доза коливається від 0,5 до 1 мг/кг маси тіла на добу; частота ремісії та профілактика рецидивів оптимальна при застосуванні курсової дози 120-150 мг/кг (на курс лікування), тривалість терапії може змінюватись залежно від добової дози; повної ремісії акне можна досягти за 16-24 тижні лікування^{БНФ}; у більшості хворих акне повністю зникають після одноразового курсу лікування; при вираженому рецидиві провести повторний курс лікування не раніше, ніж через 8 тижнів після закінчення лікування^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: грам(+) бактеріальні інфекції шкіри та слизових оболонок; анемія, прискорення ШОЕ, тромбоцитопенія, тромбоцитоз; нейтропенія; лімфаденопатія; АР з боку шкіри, анафілактичні р-ції, р-ції гіперчутливості; ЦД, гіперурикемія; депресія, посилення депресії, схильність до агресії, тривожність, зміни настрою; порушення поведінки, психотичні розлади, спроби самогубства, самогубство; головний біль; доброякісна внутрішньочерепна гіпертензія, судоми, сонливість, запаморочення; блефарит, кон'юнктивіт, сухість очей, подразнення очей; нечіткість зору, катаракта, порушення кольоросприйняття, непереносимість контактних лінз, помутніння рогівки, зниження гостроти сутінкового зору, кератит, набряк соска зорового нерва (як прояв доброякісної внутрішньочерепної гіпертензії), фотофобія, порушення зору; порушення слуху; васкуліт (гранулематоз Вегенера, алергічний васкуліт); носові кровотечі, сухість у носі, назофарингіт; бронхоспазм (у пацієнтів з астмою), дисфонія; коліт, ілеїт, сухість у горлі, шлунково-кишкові кровотечі, геморагічна діарея, запальні захворювання кишечника, нудота, панкреатит. тяжка діарея; підвищення трансаміназ, гепатит; хейліт, дерматит, сухість шкіри, локалізоване лущення, свербіж, еритематозне висипання, травматичність шкіри (ризик ушкодження при терті); алопеція; фульмінантні форми акне, загострення акне (гіперемія акне), еритема (обличчя), екзантема, розлади з боку волосся, гірсутизм, оніходистрофія, пароніхій, фотосенсибілізація, піогенна гранульома, гіперпігментація шкіри, підвищена пітливість; мультиформна еритема, с-м Стівенса - Джонсона, токсичний епідермальний некроліз; артралгія, міалгія, біль у спині (особливо у дітей та підлітків); артрит, кальциноз (кальцифікація зв'язок та сухожилів), передчасне закриття зон росту епіфізів, екзостоз, гіперостоз, зменшення щільності кісткової тканини, тендиніти; гломерулонефрит; - порушення статевої ф-ції, у тому числі еректильна дисфункція та зниження лібідо, гінекомастія, грануляція тканини (підвищене формування), втома; гіпертригліцеридемія, зменшення рівня ліпопротеїдів високої щільності; гіперхолестеринемія, гіперглікемія, гематурія, протеїнурія; підвищення КФК в крові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: вагітність і годування груддю; у жінок репродуктивного віку при невиконанні всіх умов «Програми попередження вагітності»; печінкова недостатність, гіпервітаміноз А; виражена гіперліпідемія; гіперчутливість до препарату; супутня терапія тетрациклінами; дитячий вік до 12 років; пацієнтам з алергією до арахісу та сої.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 30 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АКНЕТІН®	С.М.Б. Технолоджи СА, Бельгія	капс. у бл.	8мг, 16мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АКНЕТРЕКС 10	Мега Лайфсайенсіз Паблік Компані Лімітед, Таїланд	капс. м'які у бл.	10мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АКНЕТРЕКС 20	Мега Лайфсайенсіз Паблік Компані Лімітед, Таїланд	капс. м'які у бл.	20мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РОАККУТАН®	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд (первинне та вторинне пакування, випробування контролю якості, випуск серії)/Кетелент Джермані Ебербах ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, випробування контролю якості), Швейцарія/Німеччина	капс. у бл.	20мг	№10х3	21,19	22,04/\$
	РОАККУТАН®	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд (первинне та вторинне пакування, випробування контролю якості, випуск серії)/Кетелент Джермані Ебербах ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, випробування контролю	капс. у бл.	10мг	№10х3	38,92	26,65/\$

	якості), Швейцарія/Німеччина					
РОАККУТАН®	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд (первинне та вторинне пакування, випробування контролю якості, випуск серії)/Кетелент Джермані Ебербах ГмБХ (Виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, випробування контролю якості), Швейцарія/Німеччина	капс. у бл.	10мг, 20мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

9.1.8.2.3. Гормональні лікарські засоби Комбіновані препарати

- **Етинілестрадіол + Ципротерон (Ethinylestradiol + Cyproterone)** (див. п. 11.6.2.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

9.1.9. Засоби із захисною та пом'якшувальною дією

9.1.9.1. Засоби із захисною дією

- **Цинку оксид (Zinc Oxide) ****

Фармакотерапевтична група: D02AB - дерматологічні засоби. Препарати з пом'якшувальною та захисною дією. Препарати цинку.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить адсорбуючу, підсушувальну, антисептичну, протизапальну, в'язучу дію; має високу гігроскопічність, адсорбує виділення потових і сальних залоз, ексудат, зменшує тертя шкірних складок, захищає шкіру від несприятливого зовнішнього впливу; спричиняє денатурацію білків і утворення альбумінатів, які пригнічують процес місцевого запалення з ослабленням болючих відчуттів, звужують кровоносні судини, ущільнюють клітинні мембрани; зменшує вираженість місцевих явищ запалення і подразнення, пом'якшує та підсушує шкіру.

Показання для застосування ЛЗ: лікування та профілактика пелюшкового дерматиту, попрілості, дерматитів, екземи, невеликих термічних та сонячних опіків.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: пелюшковий дерматит у дітей: з метою профілактики мазь наносити на чисту суху шкіру (під пелюшки), особливо перед сном, для запобігання виникненню подразнення шкіри через тривалий контакт з мокрими пелюшками; з лікувальною метою мазь наносити на шкіру тонким шаром 3 р/добу (у разі необхідності - під час кожної зміни пелюшок) при появі перших ознак гіперемії (почервоніння шкіри), попрілості або незначного подразнення шкіри; **дерматити, екзема, термічні та сонячні опіки, попрілості:** мазь наносити тонким шаром на уражену поверхню, у разі необхідності накладати марлеву пов'язку; **присипку** наносити на суху ділянку попрілостей після купання та при замінах пелюшок; термін лікування визначає лікар залежно від характеру та перебігу захворювання.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: малоймовірна; АР: свербіж, гіперемія, висипання.

Протипоказання до застосування ЛЗ: індивідуальна гіперчутливість до препарату; г. гнійно-запальні захворювання шкіри і прилеглих тканин, мокнучі ділянки шкіри.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	ВАЛІСКІН	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	мазь по 50г у тубі	40%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПРИСИПКА ДИТЯЧА	АТ "Лубнифарм", Україна	пор. нашк. по 40г, 50г у бан.	0,1 г/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПРИСИПКА ДИТЯЧА	АТ "ВІТАМІНИ", Україна	пор. нашк. по 50г у бан. та конт.	0,1 г/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПРИСИПКА ДИТЯЧА	ПАТ "ВІТАМІНИ", Україна	пор. нашк. по 50г у бан. та конт.	0,1 г/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦИНКОВА МАЗЬ	ТОВ "Тернофарм", Україна	мазь по 20г у тубі	10%	№1	11,18	
	ЦИНКОВА МАЗЬ	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	мазь по 20г, 30г у тубах в пач. та без	10%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦИНКОВА МАЗЬ	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	мазь по 20г у тубі	10%	№1	12,01	
	ЦИНКОВА МАЗЬ	ПрАТ Фармацевтична	мазь по 25г у	10%	№1	12,05	

	фабрика "Віола", Україна	конт.					
ЦИНКУ МАЗЬ	АТ "Лубнифарм", Україна	мазь по 25г, 40г у бан. та тубі в пач. та без	10%	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦИНКУ МАЗЬ	АТ "Лубнифарм", Україна	мазь по 25г у бан. скл.	10%	№1	11,04		
ЦИНКУ МАЗЬ	АТ "Лубнифарм", Україна	мазь по 25г у тубі в пач.	10%	№1	14,03		
ЦИНКУ МАЗЬ	АТ "Лубнифарм", Україна	мазь по 40г у бан. скл.	10%	№1	16,83		

9.1.9.2. Засоби із пом'якшувальною дією

- **Вазелін (Vaseline) ****

Фармакотерапевтична група: D02AC - засоби з пом'якшувальною та захисною дією.

Основна фармакотерапевтична дія: пом'якшувальна, захисна; очищена суміш твердих та рідких вуглеводів, які одержують із нафти.

Показання для застосування ЛЗ: для пом'якшення шкіри рук та обличчя, у тому числі після впливу на шкіру несприятливих температурних факторів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати зовнішньо; у невеликій кількості наносити на необхідну ділянку шкіри і легко втирати.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: подразнення, АР.

Протипоказання до застосування ЛЗ: індивідуальна підвищена чутливість до ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ВАЗЕЛІН	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	мазь у тубі	30г	№1	15,66	
	ВАЗЕЛІН	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	мазь у тубах в пач. та без	20г, 25г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАЗЕЛІН	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	мазь у тубі	25г	№1	11,50	
	ВАЗЕЛІН	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	мазь у конт.	25г	№1	11,76	
	ВАЗЕЛІН	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	мазь у конт.	50г	№1	19,66	
	ВАЗЕЛІН	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	мазь у тубі	30г	№1	12,00	
	ВАЗЕЛІН МЕДИЧНИЙ	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	мазь д/зовн. застос. у тубі	25г	№1	13,48	

- **Гліцерин (Glycerol) ****

Фармакотерапевтична група: D02AX - засоби з пом'якшувальною та захисною дією.

Основна фармакотерапевтична дія: виявляє пом'якшувальну дію на шкіру; застосовується як розчинник для борної кислоти, бури, протарголу, таніну; майже не проникає крізь шкіру, але добре проникає крізь слизові оболонки.

Показання для застосування ЛЗ: пом'якшення шкіри та обробка слизових оболонок; як основа для виготовлення лініментів та мазей.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: зовнішньо обробляти шкіру та слизові оболонки, робити аплікації 30% р-ном на суху шкіру (розводити водою у співвідношенні 1:3).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: не виявлені.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; наявність пошкоджень на шкірі (тріщини, відкриті рани).

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЛІЦЕРИН	ДП "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України", Україна	р-н д/зовн. застос. по 25г, 30г у фл.	85%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

ГЛІЦЕРИН	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	рідина по 25г у фл. в пач.	85%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
ГЛІЦЕРИН	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	рідина по 25г у фл.	85%	№1	16,63
ГЛІЦЕРИН	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	рідина по 50г у фл.	85%	№1	28,32
ГЛІЦЕРИН	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н нашк. по 25г у фл.	85%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
ГЛІЦЕРИН	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/зовн. застос. по 25г у фл.	85%	№1	22,76

- **Кислота саліцилова (Salicylic Acid) **** (див. п. 9.1.5.2. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Основна фармакотерапевтична дія: при місцевому застосуванні проявляє слабку антисептичну, а також подразнювальну, відволікаючу дію; пригнічує секрецію сальних і потових залоз; у низьких концентраціях проявляє кератопластичну, а у високих - кератолітичну дію.

Показання для застосування ЛЗ: мазь 10 %: топічне лікування бородавок і мозолів^{БНФ}; р-н нашк.: звичайні бородавки, плоскі бородавки, юнацькі бородавки, підошовні бородавки (папіломи), мозолі, шкірні мозолі.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: мазь 10%: для лікування бородавок та мозолів застосовувати; перед накладенням пов'язки з саліциловою маззю рани звільнити від некротичних мас, промити антисептичним р-ном; на уражені місця мазь накладати 2-3 р/добу стерильною серветкою або накладати на рани стерильну пов'язку, просякнуту маззю. **Р-н нашк.:** перед застосуванням помістити уражену ділянку в гарячу воду на 5 хв., протерти м'яким рушником; нанести 1-2 крап. р-ну у центр ураженої ділянки, уникаючи контакту зі здоровою шкірою; висушити протягом декількох хв. до утворення еластичної плівки; накласти пов'язку та залишити на 24 год. уникаючи контакту з водою; ч/з 24 години зняти пов'язку, промити теплою водою, видалити плівку та очистити ушкоджений фрагмент шкіри; повторювати процедуру щодня до повного видалення бородавки. Лікування може тривати до 6-12 тижнів, при виникненні подразненні шкіри - необхідно припинити лікування на 2-3 дні до зникнення запалення.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ВЕРРУФІЛМ	БРЮФАРМЕКСПОРТ с.п.р.л. (відповідальний за випуск серії)/ФАРМАЛАБОР-Продукт Фармасьютікос, С.А. (повний цикл, окрім випуску серії), Бельгія/Португалія	р-н нашк. по 10мл у фл.	167,0 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

Комбіновані препарати

- **Кислота саліцилова + Кислота молочна (Salicylic Acid + Lactic acid)**

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДУОФІЛМ	Стіфел Лабораторіз (Ірландія) Лтд., Ірландія	р-н нашк. по 15мл у фл.	167мг/167мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

9.1.10. Лікувальні шампуні та інші засоби для лікування патологічних станів волосистої частини голови

- **Кетоконазол (Ketoconazole) **** (див. п. 9.1.3.2. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: лікування та профілактика уражень шкіри та волосся, що спричинені дріжджовими м/о *Malassezia* (попередня назва *Pityrosporum*), таких як лупа^{БНФ}, висівкоподібний лишай^{БНФ} (локальний), себорейний дерматит^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: на уражені ділянки нанести шампунь на 3-5 хв, після чого змити водою^{БНФ}; лікування: лупа та себорейний дерматит (себорейна екзема): 2 р/тиждень протягом 2-4 тижнів^{БНФ}; висівкоподібний лишай: щоденно протягом 5 днів^{БНФ}; профілактика: лупа та себорейні дерматити (себорейна екзема): кожен тиждень або 1 раз на два тижні^{БНФ}.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КЕТОЗОРАЛ®-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	шампунь по 100г у фл.	20 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КЕТОЗОРАЛ®-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	шампунь по 60г у фл.	20 мг/г	№1	73,11	
II.	ДЕРМАЗОЛ®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	шампунь по 100мл у фл.	20 мг/мл	№1	120,58	23,98/\$
	ДЕРМАЗОЛ®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	шампунь по 8мл у саше	20 мг/мл	№20	200,37	23,98/\$
	ДЕРМАЗОЛ®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	шампунь по 50мл у фл.	20 мг/мл	№1	79,20	23,98/\$
	ЕБЕРСЕПТ	БРОС ЛТД, Греція	шампунь по 25мл, 60мл, 120мл у фл.	20 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КЕНАЗОЛ®	Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія	шампунь по 100мл у фл.	20 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НІЗОРАЛ®	Янссен Фармацевтика НВ, Бельгія	шампунь по 25мл, 60мл у фл.	20 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

9.2. Засоби для лікування венеричних хвороб (сифіліс, гонорея) та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом

9.2.1. Засоби для лікування сифілісу та гонореї

9.2.1.1. Пеніциліни, що чутливі до дії бета-лактамаз

- **Бензатину бензилпеніцилін (Benzathine benzylpenicillin) *** (див. п. 17.2.1.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: інфекції, спричинені чутливими до препарату м/о: сифіліс^{BOO3} та інші захворювання, спричинені трепонемами (фрамбезія, ендемічний сифіліс, пінта)^{BOO3}; профілактика інфекцій, спричинених чутливими до препарату м/о: сифіліс (після контакту з хворим).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати тільки в/м; сифіліс: превентивне лікування - 2 400 000 МО одноразово; первинний сифіліс - 2 400 000 МО, розподіляючи на 2 місяця введення; вторинний свіжий та ранній прихований сифіліс - 2 400 000 МО, у 2 місяця введення; якщо клінічні прояви повторюються або результати лабораторних досліджень залишаються позитивними - лікування повторити; пізній сифіліс (серопозитивний латентний сифіліс): 2 400 000-4 800 000 МО щотижня протягом 3-5 тижнів; лікування фрамбезії: 1 200 000 - 2 400 000 МО одноразово, особам, які мали контакт з хворими або хворими з латентною формою інфекції, вводити половину дози; лікування пінти (ендемічні трепонематози): 2 400 000 МО одноразово.

- **Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin) *** (див. п. 17.2.1.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: інфекції статевих шляхів; лікування ускладнень, спричинених гонореєю та сифілісом.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування хворих на сифіліс, гонорею проводити за спеціально розробленими схемами; залежно від форми та тяжкості захворювання, застосовувати від 7-10 днів до 2 місяців і більше.

9.2.1.2. Тетрацикліни

- **Доксициклін (Doxycycline) *** (див. п. 17.2.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: інфекції, спричинені *Chlamydia trachomatis*, включаючи неускладнені уретральні та ендоцервікальні інфекції, інфекції прямої кишки. Негонококові уретрити, спричинені *Ureaplasma urealyticum* (*T-mycoplasma*); м'який шанкр, пахова гранульома, венерична гранульома; лікування гонореї та сифілісу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: первинний та вторинний сифіліс - по 200 мг внутрішньо 2 р/добу протягом 2 тижнів^{БНФ} (альтернатива пеніцилінотерапії); неускладнені гонококові інфекції (виняток - аноректальні інфекції у чоловіків): 100 мг 2 р/добу протягом 7 днів; г. епідидимоорхіт, спричиненого *Neisseria gonorrhoea*: по 100 мг 2 р/добу протягом 10 днів.

- **Тетрациклін (Tetracyclin) (див. п. 17.2.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")**

Показання для застосування ЛЗ: гонорея.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: разова доза 200 мг (2 табл.) кожні 6 год; при тяжких інфекціях доза може бути збільшена до 500 мг кожні 6 год; МДД - 2 г; тривалість лікування не менше 10 діб; лікування слід продовжувати протягом 3 діб після зникнення клінічних проявів захворювання.

9.2.1.3. Макроліді

- **Еритроміцин (Erythromycin)** * (див. п. 17.2.4. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: дорослим та дітям старше 3 років в лікуванні сифілісу^{БНФ, ВООЗ} та гонореї.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо за 1-1,5 год до або через 2-3 год після їди: дорослим - по 200-500 мг 4 р/добу^{БНФ}; вища разова доза - 500 мг, МДД - 2 г; дітям від 30 до 50 мг/кг/добу, розподілених на 4 прийоми кожні 6 год, від 3 до 6 років - 500-700 мг/добу; від 6 до 8 років - 700 мг/добу; від 8 до 14 років - до 1 г/добу, розподіливши добову дозу на 4 прийоми; віком від 14 років - у дозі для дорослих; курс лікування - 5-14 днів, після зникнення симптомів захворювання застосовують ще протягом 2 днів.

- **Джозаміцин (Josamycin)** (див. п. 17.2.4. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: інфекції сечостатевої системи (рекомендований пацієнтам з АР на пеніцилін).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі: 1-2 г (2-4 табл.) за 2-3 прийоми; у тяжких випадках дозу можна збільшити до 3 г і більше; діти від 5 років 40-50 мг/кг маси тіла на день, розділена на кілька прийомів.

9.2.1.4. Антибіотики групи цефалоспоринів

- **Цефтриаксон (Ceftriaxone)** * (див. п. 17.2.1.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: гонорея^{БНФ, ВООЗ}, сифіліс^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: гонорея: разова доза 500 мг в/м^{БНФ}; сифіліс: дорослі^{БНФ} і діти старше 12 років: рекомендованими дозами є 500 мг - 1 г 1 р/добу із збільшенням дози до 2 г 1 р/добу при нейросифілісі протягом 10 - 14 днів^{БНФ}; новонароджені (до 2 тижнів): 50 мг/кг маси тіла 1 р/добу; протипоказаний новонародженим віком ≤28 днів при необхідності (чи очікуваній необхідності) лікування в/в р-нами, які містять кальцій, у т.ч. в/в вливання, які містять кальцій, у зв'язку з ризиком виникнення преципітатів кальцієвих солей цефтриаксону; новонароджені та діти віком від 15 днів до 12 років: 75-100 мг/кг маси тіла (максимально 4 г) 1 р/добу; дітям з масою тіла понад 50 кг призначають дози для дорослих; в/в дози 50 мг/кг або вищі вводити шляхом інфузії протягом 30 хв.

- **Цефотаксим (Cefotaxime)** * (див. п. 17.2.1.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: інфекції сечостатевої системи, спричинені гонококами.^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять в/м^{БНФ} або в/в 1 г 1 р/добу.

9.2.1.5. Фторхіноліни

- **Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)** * (див. п. 17.2.11. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: Інфекції статевих шляхів: гонококовий уретрит і цервіцит, орхоепідидиміт та запальні захворювання органів малого таза.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: гонококовий уретрит і цервіцит - 500 мг одноразово (табл.); орхіепідидиміт та запальні захворювання органів таза - 500-750 мг (табл.) 2 р/добу; в/в інфузії - 400 мг 2-3 р/добу; тривалість лікування не менше 14 днів.

- **Офлоксацин (Ofloxacin)** * (див. п. 17.2.11. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: неускладнена гонорея^{БНФ} уретри або цервікального каналу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл. одноразово 400 мг^{БНФ}; р-н для інфузій по 200 мг 2 р/добу.

9.2.1.6. Інші антибактеріальні лікарські засоби

- **Спектиноміцин (Spectinomycin)** * (див. п. 17.2.8. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: г. гонорейний уретрит та проктит у чоловіків і г. гонорейний цервіцит та проктит у жінок, спричинені чутливими до спектиноміцину штамми *N. gonorrhoeae* та у випадках, коли бета-лактамі а/б не показані.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза 2 г (глибока в/м ін'єкція) як для чоловіків, так і для жінок^{ВООЗ}, а також для пацієнтів, у яких попередня а/б терапія була неефективною; у випадках, що тяжко піддаються лікуванню, а також у регіонах, де є дані про резистентність до а/б, рекомендується призначати 4 г; ефективна доза у дітей 40 мг/кг; якщо необхідна доза становить 4 г (10 мл), тоді 10 мл можуть бути розподілені для введення у 2 місця.

9.2.2. Засоби для лікування неускладненої уrogenітальної хламідійної інфекції та інших негонококових уrogenітальних інфекцій

До інших уrogenітальних інфекцій відносять також інфекції, що спричинені *Mycoplasma Hominis*, *Ureaplasma Urealyticum*.

9.2.2.1. Тетрацикліни

- **Доксициклін (Doxycycline)** * (див. п. 17.2.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: інфекції, спричинені *Chlamydia trachomatis*, включаючи неускладнені уретральні та ендocerвікальні інфекції, інфекції прямої кишки. Негонококові уретрити, спричинені *Ureaplasma urealyticum* (*T-mycoplasma*); м'який шанкр, пахова гранульома, венерична гранульома; лікування гонореї та сифілісу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: первинний та вторинний сифіліс - по 200 мг внутрішньо 2 р/добу протягом 2 тижнів^{БНФ} (альтернатива пеніцилінотерапії); неускладнені гонококові інфекції (виняток - аноректальні інфекції у чоловіків): 100 мг 2 р/добу протягом 7 днів; г. епідидимоорхіт, спричиненого *Neisseria gonorrhoea*: по 100 мг 2 р/добу протягом 10 днів.

- **Тетрациклін (Tetracyclin)** (див. п. 17.2.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: гонорея

Спосіб застосування та дози ЛЗ: разова доза 200 мг (2 табл.) кожні 6 год; при тяжких інфекціях доза може бути збільшена до 500 мг кожні 6 год; МДД - 2 г; тривалість лікування не менше 10 діб; лікування слід продовжувати протягом 3 діб після зникнення клінічних проявів захворювання.

9.2.2.2. Фторхіноліни

- **Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)** * (див. п. 17.2.11. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: орхоепідидиміт та запальні захворювання органів малого таза.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: орхіепідидиміт та запальні захворювання органів таза - 500-750 мг 2 р/добу; в/в інфузії - 400 мг 2 р/добу; тривалість лікування не менше 14 днів.

- **Офлоксацин (Ofloxacin)** * ^[ПМД] (див. п. 17.2.11. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: інфекції верхніх і нижніх ^{ПМД} сечовивідних шляхів; негонококовий уретрит ^{БНФ} і цервіцит.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: інфекції нижніх сечовивідних шляхів: 200-400 мг/добу (табл.); негонококовий уретрит ^{БНФ} і цервіцит: 300 мг/добу (табл.) за один або кілька прийомів; р-н для в/в краплинного введення: інфекції сечовивідних шляхів: 200 мг/добу; тривалість лікування залежить від перебігу захворювання та у більшості випадків становить 7-10 днів.

- **Гатифлоксацин (Gatifloxacin)** (див. п. 17.2.11. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: J01MA16 - АБЗ групи хінолонів; фторхінолони.

Основна фармакотерапевтична дія: механізм дії ЛЗ пов'язаний з інгібуванням ДНК-гірази та топоізомерази IV; відноситься до 8-метоксифлороквінолонів, має антибактеріальну активність проти широкого діапазону грам(-) і грам(+) аеробних м/о, анаеробів і внутрішньоклітинних збудників.

Показання для застосування ЛЗ: уретральна та вагінальна гонорея без ускладнень, ендоцервікальна, ректальна гонорея без ускладнень у жінок.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі: р/ос, в/в краплинно по 400 мг одноразово.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: запаморочення, блювання, діарея, вагініт, абдомінальний біль, головний біль; р-ції гіперчутливості, сироваткова хвороба, анафілактоїдні реакції, анафілактичний шок, васкуліт, екзема, ангіоневротичний набряк; шкірні висипання, кропив'янка, еритема, свербіж, фотосенсибілізація, фототоксичність, екзема, алергічний дерматит, підвищена пітливість, сухість шкіри, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз; ажитація, збудження, порушення свідомості, втрата свідомості, депресія, нервозність, неспокій, тривожність, кошмари або параноя, порушення сну, безсоння, сонливість, неспокійний сон, парестезія, порушення смакових відчуттів, запаморочення, головний біль, тремор, судоми, порушення зору, дзвін у вухах, ототоксичність, нейропатія; тахікардія, брадикардія, відчуття серцебиття, артеріальна гіпертензія, артеріальна гіпотензія, периферичні набряки, розширення судин, подовження інтервалу QT на ЕКГ, синкопе, *torsades de pointes*; біль у животі, анорексія, запор, диспепсія, здуття живота, глосит, гастрит, кандидоз ротової порожнини, стоматит, виразка ротової порожнини, печія, діарея, порушення апетиту, блювання, нудота, спрага, сухість у роті, панкреатит, шлунково-кишкова кровотеча; артропатії, артралгії, міалгії, судоми м'язів, порушення суглобового хряща, тендиніти, тендовагініти, розриви сухожилля; підвищення рівня печінкових ферментів, холестатична жовтяниця, гепатит, біль у правому підбер'ї, г. некроз гепатоцитів, печінкова недостатність; коливання рівня цукру у крові - гіпоглікемія (в т.ч. гіпоглікемічна кома), гіперглікемія (в т.ч. гіперосмолярна некетонемічна гіперглікемія); порушення ф-ції нирок (в т.ч. г. ниркова недостатність, кристалурія, транзиторний нефрит, дизурія, гематурія), вагініт; диспное, задишка, фарингіт; нейтропенія, анемія, (в т.ч. гемолітичну та апластичну, тромбоцитопенія, агранулоцитоз, панцитопенія, тромбоцитопенічна пурпура, лейкопенія або інші порушення з боку крові); підвищення рівня АЛТ, АСТ, лужної фосфатази, білірубину, амілази, порушення рівня електролітів, підвищення МНВ /протромбінового часу; лихоманка, жар, озноб, астенія (слабкість), біль у спині, біль у грудях; порушення мислення, порушення толерантності до алкоголю, артрит, бронхіальна астма (бронхоспазм), атаксія, біль у кістках, брадикардія, біль у спині, хейліт, коліт, ціаноз, деперсоналізація, дисфагія, біль у вухах, екхімози, носова кровотеча, ейфорія, біль в очах, фоточутливість очей, шлунково-кишкові геморагії, генералізовані набряки, гінгівіт, ворожість, галюцинації, маткові кровотечі, гематурія, гіперстезія, гіпервентиляція, гіпоглікемія, лімфаденопатія, макулопапульозні висипання, метрорагія, мігрень, набряк губ, міалгія, міастенія, біль у шиї, панічні атаки, параноя, параосмія, фотофобія, псевдомембранозний коліт, психоз, птоз, ректальні геморагії, стрес, субстернальний біль, везикулобульозні висипання; дуже рідко: тендиніт, розрив сухожилля, артралгія, біль у кінцівках, порушення ходи, нейропатії, пов'язані з парестезією, депресія, втома, порушення пам'яті, порушення сну, порушення слуху, зору, смаку та запаху.

Протипоказання до застосування ЛЗ: Підвищена чутливість до гатифлоксацину та інших фторхінолонів в анамнезі або до будь-яких інших компонентів ЛЗ; ЦД, захворювання ЦНС (епілепсія, знижений судомний поріг).

9.2.2.3. Макроліди

- **Азитроміцин (Azithromycin)** * (див. п. 17.2.4. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: інфекції, що передаються статевим шляхом ^{БНФ, ВООЗ} (неускладнені генітальні інфекції, спричинені Chlamydia trachomatis).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: по 1 г одноразово ^{БНФ, ВООЗ} (4 капс. по 250 мг або 2 табл. по 500 мг).

- **Джозаміцин (Josamycin)** (див. п. 17.2.4. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: інфекції сечостатевої системи (рекомендований пацієнтам з АР на пеніцилін).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі: 1-2 г (2-4 табл.) за 2-3 прийоми; у тяжких випадках дозу можна збільшити до 3 г і більше; діти від 5 років 40-50 мг/кг маси тіла на день, розділена на кілька прийомів.

- **Спіраміцин (Spiramycin)** (див. п. 17.2.4. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: негонококові генітальні інфекції.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим по 6 млн МО - 9 млн МО (2-6 табл./добу) в 2-3 прийоми; дітям старше 6 років - 1,5-3 млн МО на кожні 10 кг маси тіла на добу за 2-3 прийоми; тривалість лікування визначає лікар залежно від клінічної ситуації (в середньому до 10 днів).

- **Мідекаміцин (Midecamycin)** (див. п. 17.2.4. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: інфекції сечостатевого тракту, що викликані мікоплазмами, легіонелами, хламідіями та *Ureaplasma urealyticum*.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймати до їди; дорослі та діти з масою тіла понад 30 кг: по 1 табл. 400 мг 3 р/добу; МДД для дорослих становить 1600 мг; лікування триває від 7 до 14 днів; лікування хламідійної інфекції 14 днів.

9.2.2.4. Лінкозаміди

- **Кліндаміцин (Clindamycin)** * (див. п. 17.2.5. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: цервіцити, викликані *Chlamydia trachomatis*.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: 600-1800 мг/добу, розподілені на кілька прийомів, протягом 10-14 днів.

9.2.3. Засоби для лікування уrogenітальної трихомонадної інфекції (трихомоніазу)

- **Метронідазол (Metronidazole)** * (див. п. 17.2.9. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Орнідазол (Ornidazole)** (див. п. 17.2.9. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: трихомоніаз (сечостатеві інфекції у жінок і чоловіків, спричинені *Trichomonas vaginalis*).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос: табл., капс. мг 500 мг застосовують у схемах одноразової або п'ятиденної терапії; разова терапевтична доза - 3 табл. або капс. ввечері; п'ятиденна терапія - по 1 табл. чи капс. вранці та ввечері; одноразова добова доза для дітей складає 25 мг/кг.

- **Тинідазол (Tinidazole)** (див. п. 17.2.9. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: уrogenітальний трихомоніаз у чоловіків та жінок.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі - рекомендована доза - 2 г р/ос, одноразово; діти віком від 3 років - рекомендована доза становить 50-75 мг/кг маси тіла одноразово; може знадобитися повторення цієї дози.

10. АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

10.1. Засоби загальної анестезії (загальні анестетики)

10.1.1. Інгаляційні анестетики

10.1.1.1. Галогенізовані вуглеводні

10.1.1.2. Інші центральні анестетики

10.1.2. Неінгаляційні анестетики

10.1.2.1. Барбітурати

10.1.2.2. Інші неінгаляційні анестетики

10.1.2.3. Похідні бензодіазепіну

10.2. Засоби для місцевої анестезії (місцеві анестетики)

10.2.1. Етери амінобензойної кислоти

10.2.2. Амідни

10.3. Анальгетичні засоби

10.3.1. Опіюди

10.3.1.1. Природні алкалоїди опію

10.3.1.2. Інші опіюди

10.3.2. Похідні фенілпіперидину

10.3.3. Похідні орипавіну

10.3.4. Похідні морфіану

10.3.5. Похідні піразолону

10.4. Міорелаксанти з периферичним та центральним механізмом дії

10.4.1. Міорелаксанти з периферичним механізмом дії

10.4.2. Міорелаксанти з центральним механізмом дії

10.5. Кровозамінники та перфузійні розчини

10.5.1. Білкові фракції крові

10.5.2. Препарати декстрану

10.5.3. Препарати желатину

10.5.4. Препарати гідроксиетильованого крохмалю

10.5.5. Електроліти

10.5.6. Електроліти у комбінації з іншими лікарськими засобами

10.5.7. Амінокислоти

10.5.8. Вуглеводи

10.6. Розчини для парентерального живлення, перитонеального діалізу та гемофільтрації

10.6.1. Амінокислоти

10.6.2. Жирові емульсії

10.6.3. Вуглеводи

10.6.4. Комбіновані розчини

10.7. Розчини осмотичних діуретиків

10.8. Засоби сорбційної терапії

10.8.1. Ентеросорбенти

10.9. Інші лікарські засоби

10.9.1. Нестероїдні протизапальні лікарські засоби

10.9.2. Інші снодійні та седативні засоби

10.1. Засоби загальної анестезії (загальні анестетики)

10.1.1. Інгаляційні анестетики

10.1.1.1. Галогенізовані вуглеводні

- **Севофлуран (Sevofluran) ***

Фармакотерапевтична група: N01AB08 - засоби для загальної анестезії; галогенвмісні вуглеводні.

Основна фармакотерапевтична дія: інгаляц. застосування для вступного наркозу спричиняє швидку втрату свідомості, яка швидко відновлюється після закінчення анестезії; вступний наркоз супроводжується мінімальним збудженням або ознаками подразнення ВДШ і не спричиняє підвищеної секреції у трахеобронхіальному дереві та стимуляції ЦНС; спричиняє дозозалежне пригнічення дихальної ф-ції та зниження АТ; у людини адреналін-індукований аритмогенний пороговий рівень севофлурану відповідає такому ж рівню ізофлурану та перевищує пороговий рівень галотану; діє мінімально на ВЧТ та не зменшує р-цію на CO₂; не чинить клінічно значущого впливу на ф-цію печінки або нирок і не спричиняє підсилення ниркової та печінкової недостатності; не впливає на концентраційну ф-цію нирок навіть при тривалому наркозі (приблизно до 9 год.).

Показання для застосування ЛЗ: індукція та підтримання загальної анестезії у дорослих пацієнтів і дітей^{БНФ} при стаціонарних та амбулаторних операціях.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити за допомогою випарника, спеціально каліброваного для застосування севофлурану таким чином, щоб концентрацію, яка подається, можна було точно контролювати; індукція: дозу добирати індивідуально та підвищувати до бажаного ефекту відповідно до віку і клінічного статусу пацієнта; можна вводити короткодійний барбітурат або інший в/в засіб для індукції, після чого шляхом інгаляції ввести севофлуран (можна вводити у кисні або у суміші кисню з закисом азоту); застосування севофлурану в концентрації до 5%; дає хірургічну анестезію менш ніж за 2 хв у дорослих, в концентрації до 7% - у дітей; підтримання: хірургічні рівні анестезії можна підтримувати за допомогою концентрацій 0,5%-3% севофлурану із закисом азоту або без нього; мінімальна альвеолярна концентрація севофлурану знижується з віком та при додаванні закису азоту; час виходу із анестезії короткий, пацієнти можуть потребувати раннього післяопераційного знеболювання.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анафілактичні реакції, гіперчутливість (можуть асоціюватися з реакціями гіперчутливості, особливо при тривалому застосуванні інгаляційних анестетиків), анафілактоїдні реакції; судоми, м'язова дистонія; зупинка серця, пролонгація QT, аритмія по типу torsade de pointes; задишка, стридор (можуть асоціюватися з реакціями гіперчутливості, особливо при тривалому застосуванні інгаляційних анестетиків), бронхоспазм, набряк легень, апное; гепатит, печінкова недостатність, некроз печінки; висип, контактний дерматит, набряк обличчя (можуть асоціюватися з реакціями гіперчутливості, особливо при тривалому застосуванні інгаляційних анестетиків), кропив'янка, свербіж; г. ниркова недостатність; дискомфорт у грудній клітці (може асоціюватися з реакціями гіперчутливості, особливо при тривалому застосуванні інгаляційних анестетиків), злаякісна гіпертермія; м'язові посмикування.

Противопоказання до застосування ЛЗ: підтверджена або підозрювана генетична схильність до злаякісної гіпертермії; підтверджена або підозрювана підвищена чутливість до севофлурану або до інших галогенвмісних анестетиків (наявність в анамнезі порушення ф-ції печінки із підвищенням рівня печінкових ферментів, гарячкою, лейкоцитозом та/або еозинофілією, що виникли з нез'ясованих причин після застосування галогенвмісних анестетиків); якщо протипоказана загальна анестезія.

Визначена добова доза (DDD): інгаляційно - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	СЕВО-АНЕСТЕРАН	К.Т. РОМФАРМ КОМПАНІ С.Р.Л., Румунія	рідина д/інгал. по 100 мл, 250 мл у фл.	100 %	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СЕВОРАН	Аесіка Квінборо Лтд/Еббві С.р.л., Великобританія/Італія	рідина д/інгал. по 250 мл у фл.	100%	№1	2960,16	24,85/\$
	СЕВОФЛУРАН	Пірамал Критікал Кер Інк, США	рідина д/інгал. по 250 мл у фл.	100%	№1	4451,25	25,29/\$
	СЕВОФЛУРАН, ЮСП	Галокarbon Продактс Корп., Сполучені Штати Америки (США)	рідина д/інгал. по 250 мл у фл.	100%	№1	4641,00	

10.1.1.2. Інші центральні анестетики

- **Азоту закис (Nitrous oxide) ***

Фармакотерапевтична група: N01AX13 - інші засоби для загальної анестезії.

Основна фармакотерапевтична дія: засіб для інгаляційної загальної анестезії; неспецифічно взаємодіє з мембранами нейронів, пригнічує передачу аферентних імпульсів в ЦНС, змінює кірково-підкіркові взаємини; має високу анальгезивну активність; малі концентрації спричиняють відчуття сп'яніння і легку сонливість; стадія анальгезії досягається впродовж 2-3 хв при концентрації до 80 % азоту закису і 20 % кисню в газовій суміші; через 6-8 хв після короткочасної, але досить вираженої стадії збудження настає 1 стадія хірургічної анестезії; підтримується загальна анестезія при концентрації азоту закису 40-50 % з відповідним збільшенням подачі кисню; достатня релаксація скелетної мускулатури при цьому не досягається, азоту закис комбінують з іншими ЛЗ для інгаляційної анестезії і міорелаксантами для досягнення необхідного ефекту; пробудження настає через 3-5 хв; збільшує ЧСС, спричиняє звуження периферичних судин, підвищувати ВЧТ, пригнічує дихання.

Показання для застосування ЛЗ: загальна анестезія^{ВООЗ,БНФ}, що не вимагає глибокого наркозу та міорелаксації (у хірургії^{ВООЗ}, оперативній гінекології^{ВООЗ}, стоматології, для знеболення пологів); посилення наркотичної і анальгетичної дії інших анестетиків^{ВООЗ,БНФ} (у т.ч. лікувальний анальгетичний наркоз у післяопераційному періоді^{ВООЗ}), травматичний шок (профілактика); больовий с-м при г. коронарній недостатності, ІМ, г. панкреатиті (купірування); знеболення для виконання медичних процедур, що потребують відключення свідомості.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: інгаляційно: у суміші з киснем (при вмісті кисню не менше 30%) та іншими засобами для інгаляційної анестезії за допомогою спеціальних апаратів для газового наркозу; для купірування і профілактики больового с-му лікувальний наркоз проводити при концентрації закису азоту 40-70%, для швидкого досягнення необхідної глибини загальної анестезії (ввідний наркоз) концентрація азоту закису - 70 %, для підтримки загальної анестезії - 40-50%; при необхідності додавати потужніші наркотичні ЛЗ: барбітурати, фторотан, ефір; після припинення подачі закису азоту продовжити подачу кисню впродовж 4-5 хв. (для уникнення дифузійної гіпоксії); для знеболення пологів користуватися методом переривчастої аутоаналгезії з застосуванням суміші азоту закису (40-70%) і кисню: породілля починає вдихати суміш при появі передвісників переймів і закінчує вдихання на висоті переймів або до їх закінчення; для виконання медичних процедур, що потребують відключення свідомості, інгаляції 25-50% у суміші з киснем; для дітей дози підбирати індивідуальні, до 70% у дихальній суміші з киснем; для зменшення емоційного збудження, попередження нудоти і блювання та потенціювання дії - проведення премедикації: в/м 1-2 мл 0,5% р-ну діазепаму (5-10 мг), 2-3 мл 0,25% р-ну дроперидолу (5,0-7,5 мг).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: під час введення в наркоз: надшлуночкові аритмії, брадикардія, недостатність кровообігу, посилення СН, пригнічення дихання, злоякісний гіпертермічний криз; після виходу із загальної анестезії: дифузна гіпоксія, післянаркозний делірій (відчуття тривоги, сплутаність свідомості, збудження, галюцинації, нервозність, рухові збудження; нудота, блювання, сонливість; при тривалому застосуванні (2-4 дні): мегалобластна анемія, порушення гемопоєзу, лейкопенія, панцитопенія, пригнічення функції кісткового мозку, невротії, пригнічення дихання, злоякісний гіпертермічний криз, післяопераційний озноб.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість; гіпоксія; захворювання легень; захворювання НС, хр. алкоголізм, стан алкогольного сп'яніння (можливі збудження, галюцинації); з обережністю при ЧМТ, підвищенні ВЧТ в анамнезі, внутрішньочерепній пухлині; ранній дитячий вік(до 28 діб).

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II. АЗОТУ ЗАКИС	ТОВ "Торговий Дім "Медичний Газовий Сервіс", Російська Федерація	газ стисн. по 6,2 кг ± 0,2 кг у бал. по 10 л	98%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Ксенон (Хелон)**

Фармакотерапевтична група: N01AX - засоби для інгаляційної загальної анестезії.

Основна фармакотерапевтична дія: у співвідношенні з киснем (60:40, 70:30, 80:20) чинить міорелаксуючу, аналептичну та анестезуючу дію; мінімальна альвеолярна концентрація для ксенону - 71 %, закису азоту - 105 %; через 2 хв з моменту інгаляції виникає стадія периферичної парестезії і гіпоалгезії, на 3-й хв. - стадія психомоторної активності, на 4-й хв. - стадія часткової амнезії та аналгезії, на 5-й хв. - стадія анестезії, що відповідає першому рівню хірургічної стадії анестезії ефіром (за Гіделом); показники гемодинаміки та газообміну протягом анестезії стабільні; вихід із загальної анестезії швидкий; через 2-3 хв. після відключення газу повертається свідомість з повною орієнтацією у просторі і часі; аналгезія настає від вдихання 30 - 40 % суміші з киснем; свідомість втрачається при інгаляції 65 - 70 % суміші з киснем; маючи високу дифузійну здатність, заповнює замкнуті порожнини в організмі зі збільшенням об'єму.

Показання для застосування ЛЗ: маскова інгаляційна монокомпонентна загальна анестезія і комбінована ендотрахеальна, що не потребує глибокої анестезії і міорелаксації (у хірургії, оперативній гінекології, стоматології, при болісних маніпуляціях, для знеболення пологів); посилення наркотичної та аналгетичної дії інших анестетиків; терапія післяопераційного больового с-му.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: інгаляційно, у вигляді ксенону-кисневих сумішей, максимальна концентрація ксенону - 80%; дихальна газова суміш формується в наркозному апараті; залежно від характеру операції або маніпуляції встановлюється задана концентрація ксенону і кисню, під контролем ротаметрів і газоаналізатора за киснем, встановленого на каналах вдиху і видиху; при масковій інгаляції монокомпонентної загальної анестезії домогтися повної герметичності у системі дихального контуру, а після досягнення хірургічної стадії застосовувати ларингеальну маску; при ендотрахеальному варіанті увідної анестезії у комбінації з барбітуратами або іншими ЛЗ для в/в загальної анестезії (кетамін+седуксен, диприван, брystal), після яких вводиться міорелаксант і здійснюється інтубація; після переведення на ШВЛ проводиться 5-хв. денітрогенізація 100% киснем при газовідтоку 10 л/хв і хвилинному об'ємі дихання 8-10 л/хв при напіввідкритому контурі; після денітрогенізації встановлюється газова суміш ксенону і кисню під контролем газоаналізатора і ротаметрів; після закінчення загальної анестезії відключити подачу ксенону і легені пацієнта вентилювати протягом 4-5 хв. киснево-повітряною сумішшю для надійної елімінації ксенону, використовуючи при цьому допоміжну вентиляцію; екстубація здійснюється при появі перших ознак свідомості, за умов повного відновлення спонтанного дихання.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: охриплість, металевий присмак у роті, гіпоксія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: індивідуальна підвищена чутливість до ЛЗ; захворювання, що супроводжуються гіпоксією; хірургічні маніпуляції на органах грудної клітки; кардіохірургія.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.

I.	КСЕСАН	ТОВ "АЙСБЛІК", Україна	газ стисн. по 1л, 3л, 5л, 10л у стал. бал.	99,999 %	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ
----	--------	------------------------	--	----------	----	------------------------

10.1.2. Неінгаляційні анестетики

10.1.2.1. Барбітурати

- **Тіопентал натрію (Thiopental) ***

Фармакотерапевтична група: N01AF03 - засоби для загальної анестезії; барбітурати, монопрепарати.

Основна фармакотерапевтична дія: засіб для неінгаляційного наркозу; подовжує період відкриття ГАМК-залежних каналів на постсинаптичних мембранах нейронів головного мозку, час входу іонів хлору всередину нервової клітини та викликає гіперполяризацію мембран; пригнічує збуджувальну дію амінокислот (аспартату та глутамату); у великих дозах проявляє ГАМК-міметичну дію; проявляє протисудомну активність (підвищує поріг збудливості нейронів та блокуючи проведення та поширення судомного імпульсу головним мозком); сприяє міорелаксації (пригнічує полісинаптичні рефлексії, та сповільнює проведення по вставних нейронах спинного мозку); уповільнює метаболічні процеси у головному мозку, утилізацію мозком глюкози та кисню; має снодійну дію, прискорює процес засинання та змінює структури сну; пригнічує дихальний центр та зменшує його чутливість до вуглекислого газу; здійснює негативний інотропний ефект (зменшує ударний об'єм, серцевий викид та АТ); збільшує ємність венозної системи, знижує печінковий кровотік та швидкість клубочкової фільтрації.

Показання для застосування ЛЗ: індукційний наркоз^{ВООЗ,БНФ}; додатковий засіб для базисного наркозу^{ВООЗ,БНФ} (з подальшим використанням анальгетиків та міорелаксантів); додатковий засіб для купірування судомних станів^{БНФ} різної етіології, у т.ч. зумовлених використанням засобів для місцевої анестезії; для зниження ВЧТ у пацієнтів з підвищеним ВЧТ під час проведення ШВЛ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовується лише в умовах стаціонару; застосовується лише в/в повільно; застосовують у вигляді р-ну 25 мг/мл^{ВООЗ}; в окремих випадках - 50 мг/мл; доза повинна бути пропорційна до маси тіла хворого; для ввідного наркозу використовувати в/в повільно за 10-15 секунд 100-150 мг; можливе повторне введення дози 100-150 мг через 1 хв^{ВООЗ,БНФ}; доза повинна бути відкоригована залежно від відповіді пацієнта, щоб звести до мінімуму ризик пригнічення дихання або можливість передозування, при цьому враховувати вік, стать і вагу пацієнта; анестезія зазвичай настає протягом 1 хв після в/в введення; для дорослих з масою тіла 70 кг середня доза складає 200-300 мг (8-12 мл р-ну 25 мг/мл), максимальна доза - 500 мг^{ВООЗ,БНФ}; для дітей середню дозу розчину 2-7 мг/кг маси тіла вводять в/в повільно за 10-15 секунд; за необхідності можливе повторне введення дози 2-7 мг/кг маси тіла через 1 хв^{ВООЗ}; доза повинна бути ретельно відкоригована залежно від відповіді пацієнта, максимальна доза - не вище 7 мг/кг; купірування судомних станів: середня доза -75-125 мг (3-5 мл р-ну 25 мг/мл), вводять якомога скоріше після початку судом^{БНФ}; повторне введення може знадобитися з метою купірування судомних станів, спричинених застосуванням ЛЗ для місцевої анестезії; зниження ВЧТ під час проведення ШВЛ у неврологічних пацієнтів: інтермітуючі болюсні ін'єк. у дозі 1,5-3 мг/кг маси тіла^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кашель, чихання; АР, включаючи шкірні висипання, кропив'янку, свербіж, набряк Квінке, гіперемію шкіри, озноб, анафілактичний шок, гемолітична анемія, ниркова недостатність асоційована з ростом а/т до тіопенталу; гіперсаливація, нудота, блювання, анорексія; гіпо- та/або гіперкаліємія; гіпертонус м'язів, сонливість, головний біль, сплутаність свідомості, амнезія, запаморочення; делірій у пацієнтів літнього віку; пригнічення або зупинка дихання, ларингоспазм, бронхоспазм; артеріальна гіпотензія, тахікардія, аритмія, СН, зниження скоротливої здатності міокарда; нездужання, підвищена втомлюваність; у випадку екстравазації барбітуратами (проникнення ЛЗ у навколишні м'які тканини при в/в введенні) існує ризик виникнення некрозу і сильного болю; при введенні 5 % р-ну можливий розвиток тромбофлебіту; при випадковому внутрішньоартеріальному введенні - сильний артеріальний спазм та інтенсивний пекучий біль навколо місця ін'єк.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до тіопенталу та/або до інших барбітуратів, напади г. переміжної порфірії (в анамнезі хворого або у його близьких родичів), загострення БА, г. виражене порушення кровообігу, хвороба Аддісона, колапс, термінальна стадія шоку, гарячкові стани, диспное або обструкція ДШ; з обережністю пацієнтам із тяжкими захворюваннями СС системи, тяжкими бронхолегеневими захворюваннями і при АГ різної етіології.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ТІОПЕНТАЛ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	0,5г	№1	52,00	
	ТІОПЕНТАЛ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1,0г	№1	67,00	

10.1.2.2. Інші неінгаляційні анестетики

- **Кетамін (Ketamine) ***

Фармакотерапевтична група: N01AX03 - засоби для загальної анестезії.

Основна фармакотерапевтична дія: анестезуючий ЛЗ з вираженою знеболювальною дією; спричиняє дисоціативну анестезію - функціональну дисоціацію між таламо-неокортикальною та лімбічною системами; анальгезивна дія триває довше, ніж анестезія; седативна та гіпнотична дії менш виражені; проявляє також місцевоанестезуючу дію; має від'ємний інотропний ефект та антиаритмічну дію (прямий кардіальний ефект); розслабляє мускулатуру бронхів.

Показання для застосування ЛЗ: анестезуючий засіб (монотерапія) при проведенні нетривалих (короткочасних) діагностичних процедур і хірургічних втручань^{БНОЗ, БНФ} у дітей та у деяких спеціальних випадках у дорослих: введення в наркоз та його підтримання^{БНФ}; проведення загального наркозу^{БНОЗ, БНФ}; спеціальні показання^{БНФ} (самостійно або у комбінації з іншим ЛЗ): болісні процедури (заміна пов'язки у хворого з опіками); нейродіагностичні процедури (пневмоенцефалографія, вентрикулографія, мієлографія); ендоскопія; деякі процедури в офтальмології; діагностичні та хірургічні втручання у ділянці шиї або ротової порожнини; при лікуванні зубів; отоларингологічні втручання; гінекологічні екстраперитонеальні втручання; втручання в акушерстві, введення у наркоз для операції кесаревого розтину; втручання в ортопедії та травматології; проведення наркозу у хворих в шоківому стані та з гіпотензією, у зв'язку з особливостями дії кетаміну на серце та кровообіг; проведення наркозу хворим, у яких перевага надається в/м введенню (у дітей).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати в/в повільно, в/м, в/в крап.; підбір дози проводити індивідуально; при застосуванні в комбінації дозу кетаміну знизити; дорослим та дітям: в/в повільно протягом 1 хв, початкова доза 0,7-2 мг/кг, що забезпечує хірургічну анестезію протягом 5-10 хв через 30 сек. після введення (хворим з високим ризиком, літнього віку або хворим, що перебувають у стані шоку - 0,5 мг/кг); в/м, початкова доза 4-8 мг/кг, що забезпечує хірургічну анестезію протягом 12-25 хв через кілька хв після введення; в/в крап., 500 мг кетаміну + 500 мл ізотонічного 0,9% р-ну натрію хлориду або 5% р-ну глюкози, початкова доза 80-100 крап./хв, підтримуюча доза 20-60 крап./хв (2-6 мг/кг/год); доза для дорослого - 2-6 мг/кг/год; підтримуюча анестезія: половину або загальну початкову дозу можна вводити повторно в/м або в/в; поява ністагму, рухова реакція на подразнення вказують на недостатність наркозу, у такому випадку можливе введення повторної дози, але мимовільні рухи кінцівок можуть з'являтися незалежно від глибини наркозу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анафілактичні реакції; анорексія; галюцинації, аномальні чи кошмарні сновидіння, сплутаність свідомості, психомоторне збудження, неадекватна поведінка, відчуття тривоги, делірій, симптом «зворотного кадру», дисфорія, безсоння, дезорієнтація; ністагм, підвищення тону скелетних м'язів та тоніко-клонічні судоми; диплопія, підвищення ВТ; підвищення АТ та ЧСС, брадикардія, аритмія; гіпотензія; збільшення частоти дихання, пригнічення дихання, ларингоспазм, обструкція дихальних шляхів або зупинка дихання; зміна лабораторних показників функції печінки, медикаментозне ураження печінки; нудота, блювання, слинотеча; кропив'янка, еритема та/або короподібний висип; цистит, геморагічний цистит; реакції в місці введення, включаючи біль та/або висип в місці введення ЛЗ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до кетаміну або до інших компонентів ЛЗ; еклампсія, прееклампсія; підвищення АТ, що може становити серйозну загрозу для життя; ЧМТ, внутрішньочерепний крововилив, інсульт, тяжкі СС захворювання, порушенням мозкового кровообігу.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КЕТАМІН	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/н'єк. по 2 мл, 10 мл в амп. та фл. у пач. та бл.	50 мг/мл	№5, №10, №5x2, №5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЕТАМІН-ЗН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	р-н д/н'єк. по 2 мл в амп. у кор. та бл.	50 мг/мл	№10, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Пропофол (Propofol) ***

Фармакотерапевтична група: N01AX10 - засоби для загальної анестезії.

Основна фармакотерапевтична дія: засіб для загальної анестезії короткої дії зі швидким настанням ефекту протягом 30 сек.; вихід з наркозу швидкий; реалізує седативний та наркотичний ефекти шляхом позитивного впливу на інгібуючу функцію нейротрансмітера ГАМК через полегшення взаємодії останнього з ліганд-активованими ГАМК_A-рецепторами.

Показання для застосування ЛЗ: індукція та підтримання загальної анестезії у дорослих та дітей віком > 1 міс; седація при проведенні діагностичних та хірургічних процедур, окремо або у комбінації з ЛЗ для місцевої чи загальної анестезії, у дорослих та дітей віком >1 міс; седація пацієнтів віком > 16 років, яким проводиться ШВЛ у відділенні інтенсивної терапії^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: індукція загальної анестезії:^{БНФ} незалежно, проведено чи не проведено премедикацію доролу пацієнту, титрувати дозу (у вигляді болюсної ін'єк. або інфуз. 40 мг кожні 10 сек. для дорослих пацієнтів^{БНФ} із задовільним станом здоров'я) в залежності від реакції хворого до появи клінічних ознак анестезії; для більшості дорослих пацієнтів до 55 р. доза - 1,5-2,5 мг/кг^{БНФ}; сумарну необхідну загальну дозу можна зменшити шляхом зменшення швидкості введення (від 20 до 50 мг/хв.); для пацієнтів від 55 р. потрібна нижча доза^{БНФ}; пацієнтам III і IV класів за шкалою ASA вводити з меншою швидкістю (20 мг кожні 10 сек^{БНФ}); не рекомендується для індукції анестезії дітям до 1 міс.; при застосуванні дітям з метою забезпечення індукції в анестезію вводити повільно до виникнення клінічних ознак анестезії, дозу коригувати згідно з віком та/або масою тіла; для більшості дітей віком від 8 років для вступної анестезії потрібно 2,5 мг/кг, для дітей віком до 8 років (особливо від 1 до 3 міс. 2,5-4 мг/кг маси тіла) дози можуть бути вищими, нижча доза рекомендується для дітей III-IV класу за шкалою ASA; підтримання загальної анестезії:^{БНФ} дорослим анестезію підтримувати введенням ЛЗ у вигляді безперервної інфузії або повторних болюсних ін'єк. для підтримання належної глибини анестезії; безперервна інфузія: швидкість введення варіює залежно від індивідуальних особливостей пацієнтів, але

зазвичай у межах 4-12 мг/кг/год^{БНФ} забезпечує підтримку адекватної анестезії; зниження підтримуючої дози приблизно 4 мг/кг/год може бути достатньою анестезією при незначних хірургічних процедурах; якщо застосовують техніку, що включає повторні болюсні ін'єк., то використовуються введення зростаючих доз від 25 мг до 50 мг; дітям від 1 міс. швидкість введення варіює залежно від індивідуальних особливостей пацієнтів, але складає у межах 9-15 мг/кг/год^{БНФ}; для забезпечення седативного ефекту під час інтенсивної терапії дорослим пацієнтам, яким проводять ШВЛ, вводити шляхом постійної інфузії зі швидкістю інфузії 0,3-4 мг/кг/год^{БНФ}; не показаний для забезпечення седативного ефекту при інтенсивній терапії пацієнтів до 16 р.^{БНФ}; пацієнтам літнього віку не застосовувати швидке болюсне введення; для забезпечення седативного ефекту при проведенні хірургічних або діагностичних процедур швидкість введення підбирати індивідуально і титрувати в залежності від клінічної відповіді, для більшості пацієнтів для настання седативного ефекту необхідне введення від 0,5 до 1 мг/кг протягом 1-5 хв.; підтримання седативного ефекту - 1,5-4,5 мг/кг/год^{БНФ}; крім інфузії можна проводити болюсне введення 10-20 мг^{БНФ}, якщо необхідне швидке настання глибокого седативного ефекту; для пацієнтів III і IV класу за ASA необхідним є зниження дози і швидкості введення; не рекомендується для забезпечення седативного ефекту у дітей^{БНФ}; тривалість застосування не повинна перевищувати 7 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анафілаксія (ангіоневротичний набряк, бронхоспазм, еритема, гіпотензія); головний біль на стадії пробудження, епілептиформні рухи (судоми, опістотонус на стадії індукції, підтримки анестезії та пробудження), післяопераційна втрата свідомості; брадикардія, набряк легенів; артеріальна гіпотензія, припливи крові у дітей, тромбоз, флебіт; тимчасове апное на стадії індукції; нудота та блювання на стадії пробудження; панкреатит, знебарвлення сечі при тривалому введенні; сексуальне розгальмування; місцевий біль на стадії індукції; некроз тканин після випадкового позасудинного введення; симптоми відміни у дітей; післяопераційна гарячка; частота невідома: метаболічний ацидоз, гіперкаліємія, гіперліпідемія, ейфорія, зловживання, медикаментозна залежність, мимовільні рухи, серцева аритмія, СН, пригнічення дихання (дозозалежне), гепатомегалія, рабдоміоліз, ниркова недостатність, місцевий біль, набряк після випадкового позасудинного введення, ЕКГ типу Бругада.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до пропофолу або будь-якої з допоміжних речовин ЛЗ; дитячий вік до 1 місяця (для індукції та підтримання загальної анестезії); пацієнтам з гіперчутливістю до арахісу чи сої; не слід застосовувати з метою седації пацієнтам віком ≤ 16 років, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДИПРОФОЛ®	АТ "Фармак" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Synthon Hispania, S.L., Іспанія (на виробничій дільниці Fresenius Kabi Austria GmbH, Австрія), Україна	емул. д/ін'єк. по 50мл у фл.	10мг/мл	№1	170,00	
	ДИПРОФОЛ®	ПАТ "Фармак" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Synthon Hispania, S.L., Іспанія (на виробничій дільниці Fresenius Kabi Austria GmbH, Австрія), Україна	емул. д/ін'єк. по 20 мл в амп. у бл.; по 50 мл у фл.	10мг/мл, 20мг/мл	№5x1, №1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДИПРОФОЛ®	АТ "Фармак" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Synthon Hispania, S.L., Іспанія (на виробничій дільниці Fresenius Kabi Austria GmbH, Австрія), Україна	емул. д/ін'єк. по 50мл у фл.	20мг/мл	№1	335,00	
	ДИПРОФОЛ®	ПАТ "Фармак" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Synthon Hispania, S.L., Іспанія (на виробничій дільниці Fresenius Kabi Austria GmbH, Австрія), Україна	емул. д/ін'єк. по 20мл в амп. у бл.	10мг/мл	№5x1	232,60	
	ДИПРОФОЛ® ЕДТА	АТ "Фармак", Україна	емул. д/інфуз. по 20мл у фл. та амп.	10мг/мл, 20мг/мл	№1, №5, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДИПРОФОЛ® ЕДТА	ПАТ "Фармак", Україна	емул. д/інфуз. по 50мл у фл.	10мг/мл	№1	200,00	

	ДИПРОФОЛ® ЕДТА	АТ "Фармак", Україна	емул. д/інфуз. по 50мл у фл.	20мг/мл	№1	390,00	
	ДИПРОФОЛ® ЕДТА	ПАТ "Фармак", Україна	емул. д/інфуз. по 20мл у амп. у пач.	10мг/мл	№5	232,60	
	ПРОПОФОЛ-НОВО	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	емул. д/інфуз. по 10мл, 100мл у пл.	10мг/мл	№1, №5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПРОПОФОЛ-НОВО	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	емул. д/інфуз. по 50мл у пл. в пач.	10мг/мл	№1	126,00	
	ПРОПОФОЛ-НОВО	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	емул. д/інфуз. по 20мл у пл. в конт. чар/уп	10мг/мл	№5	255,84	
II.	ДИПРИВАН	Корден Фарма С.п.А. (виробник "in bulk", пакування)/АстраЗенека ЮК Лімітед (виробник, відповідальний за випуск серії), Італія/Велика Британія	емул. д/інфуз. по 50 мл у фл.	10мг/мл	№1	163,80	24,94/\$
	ДИПРИВАН	Корден Фарма С.п.А. (виробник "in bulk", пакування)/АстраЗенека ЮК Лімітед (виробник, відповідальний за випуск серії), Італія/Велика Британія	емул. д/інфуз. по 20мл в амп. у конт. чар/уп.	10мг/мл	№5	313,27	25,32/\$
	ПРОПОФОЛ	БАКСТЕР ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ІНДІЯ ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД, Індія	емул. д/інфуз. по 10 мл, 20 мл, 50 мл, 100 мл у фл.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПРОПОФОЛ КАБІ	Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія	емул. д/ін'екц. або інфуз. по 20 мл в амп., по 50 мл у фл.	10мг/мл, 20мг/мл	№5, №1, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПРОПОФОЛ КАБІ	Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія	емул. д/ін'ек. або інфуз. по 20мл в амп. у пач.	10мг/мл	№5	245,43	32,72/€
	ПРОПОФОЛ КАБІ	Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія	емул. д/ін'ек. або інфуз. по 50мл у фл.	10мг/мл	№1	209,39	32,21/€
	ПРОПОФОЛ ФАРМЮНІОН	Донг Кук Фармасьютікал Ко., Лтд., Корея	емул. д/інфуз. по 20 мл в амп.	10мг/мл	№5	265,02	25,00/\$
	ПРОПОФОЛ ФРЕЗЕНІУС	Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія	емул. д/ін'ек. або інфуз. по 20 мл в амп., по 50 мл в фл.	10 мг/мл	№5, №1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПРОПОФОЛ-ЛІПУРО 1 %	Б. Браун Мельзунген АГ (виробництво, первинна та вторинна упаковка, випуск серії флаконів; контроль серії флаконів; повний цикл виробництва ампул), Німеччина	емул. д/інфуз. по 100мл у фл.	10мг/мл	№5, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПРОПОФОЛ-ЛІПУРО 1 %	Б. Браун Мельзунген АГ (виробництво, первинна та вторинна упаковка, випуск серії флаконів; контроль серії флаконів; повний цикл виробництва ампул),	емул. д/інфуз. по 50мл у фл.	10мг/мл	№10	1483,64	26,12/\$

	Німеччина					
ПРОПОФОЛ-ЛІПУРО 1 %	Б. Браун Мельзунген АГ (виробництво, первинна та вторинна упаковка, випуск серії флаконів; контроль серії флаконів; повний цикл виробництва ампул), Німеччина	емул. д/інфуз. по 20мл в амп. у кор.	10мг/мл	№5	300,00	26,12/\$

- **Натрію оксибутират (Sodium oxybate)**

Фармакотерапевтична група: N01AX11 - засоби для загальної анестезії.

Основна фармакотерапевтична дія: натрієва сіль γ -оксимасляної кислоти; за хімічною будовою та фармакологічними властивостями подібний до γ -аміномасляної кислоти, основного гальмівного медіатора ЦНС; має елементи ноотропної активності і виявляє седативну, снодійну, наркотичну, центральну міорелаксуючу дію, посилює болезаспокійливу активність наркотичних і ненаркотичних аналгетиків, посилює стійкість організму, головного мозку, серця, сітківки ока до гіпоксії, активує окиснювальні процеси.

Показання для застосування ЛЗ: неінгаляційний наркоз, ввідний та базисний наркоз в хірургії, акушерстві та гінекології; у психіатричній та неврологічній практиці - інтоксикації^{БНФ}, травматичні ураження ЦНС.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати в/в, в/м або внутрішньо; в/в вводять дорослим із розрахунку 70-120 мг/кг маси тіла, ослабленим пацієнтам - 50 -70 мг/кг маси тіла; р-н вводять повільно, зі швидкістю 1-2 мл/хв; через 5-7 хв. після початку введення хворі засинають; дорослим натрію оксибутират можна також вводити в/в у дозі 35 - 40 мг/кг маси тіла одночасно з тіопенталом натрію (4-6 мг/кг); в/м вводити у дозах 120-150 мг/кг (для мононаркозу) або 100 мг/кг у комбінації з барбітуратами (тіопентал натрію); дітям - в/в у дозі 100 мг/кг у 30-50 мл 5 % р-ну глюкози протягом 5-10 хв.; при наркозі із застосуванням натрію оксибутирату попередньо провести звичайну премедикацію (промедолом, атропіном, дипразином, піпільфеном); для лікувального акушерського наркозу вводити в/в повільно (1-2 мл/хв.) у дозі 50-60 мг/кг у 20 мл 40 % р-ну глюкози 10-15 хв. або внутрішньо у дозі 40-80 мг/кг; сон або поверхневий наркоз триває 1,5-3 год.; при переході до акушерських операцій вводити в/в протягом 10-15 хв. у дозі 60-70 мг/кг, і на цьому тлі здійснювати інтубаційний наркоз при дробовому введенні міорелаксантів; при патології та травматичних ураженнях головного мозку, токсичних ураженнях організму, що супроводжуються гіпоксичним набряком головного мозку застосовувати в/в у дозі 50-100 мг/кг (у комплексі з іншими заходами); у вигляді 5 % р-ну натрію оксибутират застосовувати внутрішньо, якщо умови приготування такого р-ну будуть гарантувати безпечність застосування та точне дозування: внутрішньо для наркозу дорослим призначати 5 % р-н з розрахунку 100-200 мг/кг за 40-60 хв. до операції; дітям внутрішньо призначати для ввідного наркозу у дозі 150 мг/кг у 20-30 мл 5 % р-ну глюкози за 40-60 хв. до операції.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: запаморочення; гіперчутливість; анорексія, зниження апетиту; депресія, катаплексія, незвичайні сновидіння, сплутаність свідомості, дезорієнтація, нічні кошмари, сомнабулізм, порушення сну, безсоння, збудження, суїцидальні спроби/думки, психоз, параноя, галюцинації, патологічні думки, ажитація, розлад засипання; запаморочення, вертиго, головний біль, сонливість, тремор, порушення рівноваги, порушення уваги, гіпоестезія, парестезія, дисгевзія, судомне сіпання м'язів, амнезія, с-м неспокійних ніг, судоми; нечіткість зору; серцебиття, гіпертензія, брадикардія; задишка, закладеність носу, назофарингіт, синусити, пригнічення дихання, апное; нудота, блювання, діарея, біль у животі, нетримання калу; гіпергідроз, висипання, кропив'янка; артралгія, м'язовий спазм, біль в попереку; нетримання сечі, ніктурія; астенія, стомлюваність, відчуття сп'яніння, гіпокаліємія, периферичні набряки, збільшення маси тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіпокаліємія, міастенія; токсикози вагітних з гіпертензивним с-мом, гіперчутливість до компонентів ЛЗ, важка депресія, дефіцит дегідрогенази напівальдегіду янтарної к-ти, феохромоцитома.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НАТРІУ ОКСИБУТИРАТ	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'ек. по 5мл, 10мл в амп. у пач. та бл.	200 мг/мл	№5, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	

10.1.2.3. Похідні бензодіазепіну

- **Діазепам (Diazepam)** * [П] [ПМД] (див. п. 5.3.1. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЛІКУВАННІ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ")

10.2. Засоби для місцевої анестезії (місцеві анестетики)

10.2.1. Етери амінобензойної кислоти

- **Прокаїн (Procaine)**

Фармакотерапевтична група: N01BA02 - ЛЗ для місцевої анестезії.

Основна фармакотерапевтична дія: місцевоанестезуючий з помірною активністю і великою терапевтичною широтою; механізм дії пов'язаний з блокадою натрієвих каналів, гальмуванням калієвого току, конкуренцією з кальцієм, зниженням поверхневого натягу фосфоліпідного шару мембран, пригніченням окисно-відновних процесів та генерації імпульсів; зменшує утворення ацетилхоліну, знижує збудливість периферичних холінореактивних систем, проявляє блокуючу дію на вегетативні ганглії, зменшує спазми гладкої мускулатури, знижує збудливість серцевого м'яза і моторних зон кори головного мозку.

Показання для застосування ЛЗ: р-н д/ін'єк. по 2,5мг/мл або 5,0мг/мл: місцева та інфільтраційна анестезія, лікувальні блокади; р-н д/ін'єк. по 20 мг/мл: провідникова, епідуральна та спінальна анестезія в хірургії, урології, офтальмології, стоматології, оториноларингології, блокада периферичних нервів та нервових сплетень.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н д/ін'єк. по 2,5мг/мл або 5,0мг/мл: місцева анестезія: доза залежить від концентрації, характеру оперативного втручання, способу введення, стану та віку хворого; паранефральна блокада у навколонишкову клітковину: дорослим вводити 50-70 мл 0,5 % або 100-150 мл 0,25 % р-ну; інфільтраційна анестезія: вищі дози для дорослих - перша разова доза на початку операції 0,75 г (150 мл) 0,5 % р-ну новокаїну або 1,25 г (500 мл) 0,25 % р-н, надалі протягом кожної год. операції - не більше 2 г (400 мл) 0,5 % р-ну новокаїну або 2,5 г (1000 мл) 0,25 % р-ну; р-н д/ін'єк. по 20 мг/мл: мандибулярна анестезія 2-3 мл 2% р-ну (40-60 мг), інфраорбітальна 0,5-1 мл 2% р-ну (10-20 мг), знеболення пальців (без адреналіну) 3-4 мл 1% р-ну (30-40 мг), парацервікальна (у вигляді повільних 5-хв ін'єкцій) по 3 мл (у кожному з 4-х ділянок) (80-120 мг); для проведення каудальної та люмбальної епідуральної блокади вводять 15-25 мл 2 % р-ну, максимальний об'єм разового введення не вище 25 мл, повторні дози менші від початкової на 2-6 мл, вводити з інтервалом 40-50 хв, максимальна разова доза для дорослих 11 мг/кг, але не більше максимальної загальної дози 800 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, запаморочення, сонливість, слабкість, рухове занепокоєння, втрата свідомості, судоми, тризм, тремор, зорові/слухові порушення, ністагм, с-м кінського хвоста (параліч ніг, парестезії), параліч дихальних м'язів, блок моторний/чуттєвий, повернення болю, стійка анестезія; підвищення/зниження АТ, периферична вазодилатація, колапс, брадикардія, аритмії, біль у грудній клітці; мимовільне сечовипускання; нудота, блювання, мимовільна дефекація; метгемоглобінемія; свербіж шкіри, шкірні висипання, дерматит, лущення шкіри, інші анафілактичні реакції (ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок), кропив'янка (на шкірі і слизових оболонках); гіпотермія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до прокаїну; міастенія, артеріальна гіпотензія, гнійний процес у місці введення, термінові хірургічні втручання, що супроводжуються г. крововтратою, виражені фіброзні зміни у тканинах (для анестезії методом повзучого інфільтрату); д/р-ну д/ін'єк. по 20 мг/мл додатково: кардіогенний шок, тяжкі форми хр. СН, знижена функція лівого шлуночка, АВ-блокада II-III ст., тяжка брадикардія, с-м Адамса-Стокса; судомні напади в анамнезі, спричинені застосуванням прокаїну; с-м слабкості синусового вузла, тяжкі порушення функції печінки, гіповолемія, кровотечі, інфікування місця проведення люмбальної пункції, септицемія, при глаукомі заборонено вводити ретробульбарно.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НОВОКАЇН	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у пач.	5мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НОВОКАЇН	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у пач.	5мг/мл	№5x2	22,80	
	НОВОКАЇН	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у пач.	5мг/мл	№100	228,00	
	НОВОКАЇН	АТ "Лубнифарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у пач.	5 мг/мл	№10	22,87	
	НОВОКАЇН	ПрАТ "Інфузія", Україна	р-н д/інф. по 200мл у пл.	0,5%	№1	18,86	
	НОВОКАЇН	ПрАТ "Інфузія", Україна	р-н д/інф. по 400мл у пл.	0,5%	№1	21,06	
	НОВОКАЇН	ПрАТ "Інфузія", Україна	р-н д/інф. по 200 мл у пл.	0,25%	№1	18,46	
	НОВОКАЇН	ПрАТ "Інфузія", Україна	р-н д/інф. по 400мл у пл.	0,25%	№1	20,21	
	НОВОКАЇН	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	5мг/мл	№5x2	21,00	
	НОВОКАЇН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 400мл у пл.	2,5мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НОВОКАЇН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 200 мл у пл.	2,5мг/мл	№1	11,79	
	НОВОКАЇН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 200мл у пл.	5мг/мл	№1	15,75	
	НОВОКАЇН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 400мл у пл.	5мг/мл	№1	18,78	

НОВОКАЇН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'ек. по 2мл в амп. у кор. або конт. чар/уп.	5 мг/мл	№10, №5x2	14,41	
НОВОКАЇН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'ек. по 5мл в амп. у кор. або конт. чар/уп.	5 мг/мл	№10, №5x2	24,38	
НОВОКАЇН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'ек. по 2мл в амп. у кор. або конт. чар/уп.	20 мг/мл	№10, №5x2	24,45	
НОВОКАЇН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'ек. по 2мл, 5мл в амп. у кор. та бл.	5 мг/мл	№5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НОВОКАЇН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'ек. по 2мл в амп. у кор. або бл.	5 мг/мл	№10, №10x1	20,33	
НОВОКАЇН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'ек. по 2мл в амп. у кор. та бл.	20мг/мл	№5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НОВОКАЇН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'ек. по 2мл в амп. у кор. або бл.	20мг/мл	№10, №10x1	35,75	

10.2.2. Аміді

• Бупівакаїн (Bupivacaine) *

Фармакотерапевтична група: N01BB01 - препарати для місцевої анестезії.

Основна фармакотерапевтична дія: місцевий анестетик тривалої дії амідного типу; зворотно блокує провідність імпульсів нервовими волокнами, пригнічуючи транспорт іонів натрію через нервові мембрани, подібні ефекти також можуть спостерігатися на збуджувальних мембранах мозку та міокарда; довга тривалість ефекту, різниця між тривалістю ефекту бупівакаїну в комбінації з адреналіном та без нього є відносно невеликою; особливо придатний для проведення тривалої епідуральної блокади; нижчі к-ції менше впливають на волокна рухових нервів та меншу тривалість ефекту, а також можуть бути придатними для тривалого знеболення, наприклад під час пологів або в п/операційному періоді.

Показання для застосування ЛЗ: місцева анестезія шляхом черезшкірної інфільтрації, периферичної (-их) нервової (-их) блокади (блокад) і центральної нервальної блокади (каудальної або епідуральної) ^{ВОЗ,БНФ} - коли необхідно досягти тривалої анестезії; полегшення болю (наприклад, під час пологів)

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дотримуватися особливої обережності, включаючи ретельну аспірацію, для запобігання випадковим в/судинним ін'єкціям; при епідуральній анестезії ввести тестову дозу 3-5 мл з адреналіном, оскільки в/судинна ін'єкція адреналіну швидко призводить до прискорення частоти серцебиття; при виникненні симптомів інтоксикації введення ЛЗ слід негайно припинити; для інфільтраційної анестезії вводити 5-30 мл ЛЗ (25-150 мг); для міжреберної блокади - по 2-3 мл (10-15 мг) на один нерв до загальної кількості 10 нервів; для блокад великих нервів (наприклад, епідуральної, сакральної та анестезії плечового сплетіння) -15-30 мл (75-150 мг); для акушерської анестезії (наприклад, епідуральної анестезії та каудальної анестезії при піхвових пологах або вакуум-екстракції) -6-10 мл р-ну по 5 мг/мл (30-50 мг); наведені дози є початковими, введення яких можна повторювати кожні 2-3 год.; для епідуральної блокади (при проведенні кесаревого розтину) -15-30 мл р-ну (75-150 мг); макс. рекоменд. доза, що застосовується протягом одного й того ж випадку, розраховується за нормою 2 мг/кг маси тіла, для дорослих макс. доза становить 150 мг протягом 4 год; макс. рекоменд. доза/добу - 400 мг; заг. дозу слід коригувати залежно від віку пацієнта, заг. стану та інших значущих обставин.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: побічні реакції, спричинені ЛЗ, важко відрізнити від фізіологічних ефектів блокади нервів (наприклад, зниження АТ, брадикардія), явищ спричинених голковою пункцією (ушкодження нервів, епідуральний абсцес); АР, анафілактичний шок; парестезія, запаморочення; симптоми токсичності з боку ЦНС (судоми, навколоротова парестезія, оніміння язика, гіперакузія, порушення зору, втрата свідомості, тремор, легке запаморочення, дзвін у вухах, дизартрія); невротатія, ушкодження периферичних нервів, арахноїдит, парез, паралепгія; двоїння в очах; брадикардія; зупинка серця, серцеві аритмії; артеріальна гіпотензія; АГ; пригнічення дихання; нудота, блювання; затримка сечі

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до місцевих анестетиків амідного ряду або до будь-якого компонента ЛЗ; не слід застосовувати для в/в регіонарної анестезії (блокада Бієра); не застосовувати для епідуральної анестезії у пацієнтів з вираженою артеріальною гіпотензією, у випадку кардіогенного або гіповолемічного шоку; епідуральна анестезія незалежно від застосовуваного місцевого анестетика має протипоказання, які включають: захворювання НС в актив.ст., такі як менінгіт, поліомієліт, в/черепний крововилив, підгостра комб. дегенерація СМ внаслідок перніціозної анемії та пухлин ГМ та СМ; туберкульоз хребта; гнійна інфекція шкіри в місці або поруч із ділянкою проведення люмбарної пункції; порушення згортання крові або поточне лікування антикоагулянтами; інтратекальна анестезія, незалежно від застосовуваного місцевого анестетика, має свої протипоказання, які включають: активні захворювання ЦНС, такі як менінгіт, поліомієліт, в/черепні крововиливи, підгостра комбінована дегенерація СМ через перніціозну анемію та пухлини СМ та ГМ; туберкульоз хребта; гнійна інфекція шкіри в місці або поруч із ділянкою проведення люмбарної пункції; порушення згортання крові або поточне лікування антикоагулянтами.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БУПІВАКАЇН	ТОВ "НІКО" (контроль, випуск серії)/ДЕМО СА ФАРМАСЬЮТІКАЛ ІНДАСТРІ (нерозфасований продукт, первинна упаковка, вторинна упаковка, контроль), Україна/Греція	р-н д/ін'єк. по				відсутня у реєстрі ОВЦ
10мл в ампулах							відсутня у реєстрі ОВЦ
пачка	5мг/мл	№10	360,00				відсутня у реєстрі ОВЦ
I.	БУПІВАКАЇН	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 10 мл в ампулах у чар/уп.	5 мг/мл	№5x1		відсутня у реєстрі ОВЦ
	БУПІВАКАЇН СПІНАЛ	ТОВ "НІКО" (контроль, випуск серії)/ДЕМО СА ФАРМАСЬЮТІКАЛ ІНДАСТРІ (нерозфасований продукт, первинна упаковка, вторинна упаковка, контроль), Україна/Греція	р-н д/ін'єк. по 4мл в ампулах у пач.	5мг/мл	№5	320,00	
	БУПІВАКАЇН СПІНАЛ	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 4 мл в ампулах у чар/уп.	5 мг/мл	№5x1		відсутня у реєстрі ОВЦ
	БУПІВАКАЇН-ЗН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в ампулах у бл.	5мг/мл	№10	448,14	
	БУПІВАКАЇН-ЗН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в ампулах у бл.	5мг/мл	№5x2	448,14	
	БУПІВАКАЇН-М	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	р-н д/ін'єк. по				відсутня у реєстрі ОВЦ
5мл в ампулах							відсутня у реєстрі ОВЦ

чар/уп.	5 мг/мл	№5x1				відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	МАРКАІН	Ресіфарм Монс, Франція	р-н д/ін'єк. по 20мл у фл.	5мг/мл	№5	302,70	25,32/\$
	МАРКАІН СПІНАЛ ХЕВІ	Сенексі, Франція	р-н д/ін'єк. по 4мл в амп. у конт. чар/уп.	5мг/мл	№5x1	362,21	25,32/\$

• **Лідокаїн (Lidocaine) *** (див. п. 2.14.1.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: N01BB02 - ЛЗ для місцевої анестезії.

Основна фармакотерапевтична дія: мембраностабілізуючий засіб групи амідів для місцевої анестезії, інгібує чутливі нервові закінчення шкіри і слизових оболонок, тобто спричиняє оборотне пригнічення провідності тканинних елементів нервових клітин (нейрон, аксон, синапси); пригнічує активоване подразником транзиторне підвищення проникності для іонів натрію і меншою мірою знижує уповільнену проникність для іонів калію і натрію, за рахунок чого він стабілізує нейронні мембрани; зменшує ступінь деполяризації, що відбувається у відповідь на фізіологічний подразник, а також амплітуду потенціалу дії, і пригнічує нервову провідність; пригнічує больову чутливість, що супроводжується пригніченням відчуття тепла і тактильних відчуттів; абсорбований після місцевого застосування ЛЗ може спричиняти збудження або депресію з боку ЦНС, його вплив на серцево-судинну систему може проявлятися у вигляді порушення провідності і периферичної вазодилатації.

Показання для застосування ЛЗ: місцева анестезія^{БНФ} (термінальна, інфільтраційна^{ВООЗ,БНФ}, провідникова) у хірургії, стоматології^{ВООЗ, БНФ}, офтальмології, отоларингології; блокада периферичних нервів і нервових сплетень при різних больових с-х

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н д/ін'єк.: застосовують п/ш, в/м, місцево на слизові оболонки; для термінальної анестезії слизові оболонки дорослим змазують ЛЗ у дозі до 2 мг/кг, тривалість анестезії - 15-30 хв.; максимальна доза ЛЗ для дорослих - 4,5 мг/кг маси тіла, максимальна загальна доза - 300 мг; для провідникової анестезії (для знеболювання плечового і крижового сплетіння) вводять 5-10 мл (100-200 мг); для анестезії пальців кінцівок, носа, вух вводять 2-3 мл (40-60 мг); для анестезії в офтальмології по 2 краплі. ЛЗ інстальювати у кон'юнктивальний мішок 2-3 рази з інтервалом 30-60 сек. безпосередньо перед дослідженням або хірургічним втручанням; дітям - максимальна разова доза ЛЗ 3 мг/кг маси тіла. Максимальна доза для дітей віком до 3 років становить 1,25 мл, у т.ч. дітям з порушенням функції нирок.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: занепокоєння, сонливість, запаморочення, головний біль, порушення сну, сплутаність свідомості, втрата свідомості, аж до коми, порушення чутливості, м'язові спазми, судороги, моторний блок, дизартрія, дисфагія; стійка анестезія, парез або елегія нижніх кінцівок та втрата управління сфінктером (наприклад, синдром кінського хвоста), поколювання шкіри; метгемоглобінемія; оніміння язика і губ; анорексія, дратівливість, неврахованість, галюцинації, депресії; після застосування високих доз - збуджений стан, ейфорія, дезорієнтація; порушення зору, ністагм, оборотна сліпота, диплопія, миготіння «мушок» перед очима, світлобоязнь, кон'юнктивіт; вертиго, слухові порушення, шум або дзвін у вухах, гіперакузія; при застосуванні у високих дозах - аритмія, брадикардія, уповільнення провідності серця, поперечна блокада серця, зупинка серцевої діяльності, периферична вазодилатація, колапс; тахікардія, підвищення/зниження артеріального тиску, біль у серці, припливи; нудота, блювання; задишка, риніт, пригнічення або зупинка дихання; алергічні реакції, включаючи набряк, шкірні реакції, кропив'янка, свербіж, ангіоневротичний набряк, реакції гіперчутливості, включаючи анафілактоїдні реакції (у т.ч. анафілактичний шок), генералізований екссfolіативний дерматит; пригнічення імунної системи, едема; відчуття жару, холоду або оніміння кінцівок, зловісна гіпертермія, набряки, слабкість; реакції у місці введення, відчуття легкого печіння, що зникає зі зростанням анестезуючого ефекту протягом 1 хв, тромбофлебіт, гіперемія; при спінальній або епідуральній анестезії може спостерігатися біль у спині, ногах, часткова/повна спинномозкова блокада, що супроводжується артеріальною гіпотензією, порушенням дефекації, мимовільним сечовипусканням, імпотенцією та втратою чутливості у ділянці промежини (імовірність цих ефектів зростає при застосуванні вищих доз або у разі випадкового введення лідокаїну у спинномозковий простір, коли доза, призначена для введення в епідуральний простір, проникає у спинномозковий простір). В окремих випадках після такого втручання відновлення рухової, сенсорної та/або вегетативної функції відбувається повільно (через кілька місяців) або неповною мірою.

Протипоказання до застосування ЛЗ: д/р-ну д/ін'єк.: підвищена індивідуальна чутливість до компонентів ЛЗ, до інших амідних місцево-анестезуючих ЛЗ, наявність в анамнезі епілептиформних судом на лідокаїн, тяжка брадикардія, тяжка артеріальна гіпотензія, кардіогенний шок, тяжкі форми хр. СН (II-III ступеня), СССВ, с-м Вольфа-Паркінсона-Уайта, с-м Адамса-Стокса, АВ-блокада II і III ст., гіповолемія, тяжкі порушення ф-ції печінки/нирок, порфірія, міастенія, ретробульбарне введення хворим на глаукому; період у перші три місяці після ІМ зі зменшеним серцевим викидом лівого шлуночка (менше 35 % від норми); розлади згортання крові, антикоагулянтна терапія; інфекції у місці ін'єк.; неконтактні пацієнти; істотне зниження ф-ції лівого шлуночка.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЛІДОКАІН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у пач.	20мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛІДОКАІН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім -	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у	20мг/мл	№5x2	19,20	

	Харків", Україна	однобіч. бл.				
ЛІДОКАЇН	АТ "Пубнифарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у пач.	20мг/мл	№10	19,20	
ЛІДОКАЇН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 3,5мл 5мл в амп. у бл. та пач.	10мг/мл	№10, №5x2, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛІДОКАЇН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 3,5мл в амп. у бл.	10мг/мл	№5x2	28,30	
ЛІДОКАЇН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 3,5мл в амп. у пач.	10мг/мл	№100	283,00	
ЛІДОКАЇН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у конт. чар/уп	20мг/мл	№5x2	15,95	
ЛІДОКАЇН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у кор. або бл.	20мг/мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛІДОКАЇН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у кор. або бл.	20мг/мл	№10, №10x1	16,73	
ЛІДОКАЇНУ ГІДРОХЛОРИД	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у конт. чар/уп.	20мг/мл	№10, №10x1	12,00	
II. ЛІДОКАЇН	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у бл.	2%	№5x20	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛІДОКАЇН	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у бл.	2%	№5x2	68,13	24,33/\$

● **Мепівакаїн (Mepivacaine)**

Фармакотерапевтична група: N01BB03 - ЛЗ для місцевої анестезії.

Основна фармакотерапевтична дія: місцевий анестетик амідного типу зі швидким початком дії анестезії, зумовленої оборотним пригніченням провідності нервових імпульсів у вегетативних, сенсорних та рухових нервових волокнах, а також серцевої провідності; застосовується у стоматології; швидкий початок знеболювання (від 1 до 3 хв.), виражена знеболювальна дія та добра локальна толерантність; блокує стресозалежні натрієві канали мембрани нервового волокна; тривалість дії при пульпарній анестезії становить 20-40 хв., при знеболюванні м'яких тканин - від 45 до 90 хв.

Показання для застосування ЛЗ: інфільтраційна та провідникова анестезія у стоматології^{БНФ}; неускладнене видалення зубів, препарування порожнин та обробка культі зубів під реставрації та ортопедичні конструкції; рекомендований пацієнтам, яким протипоказані судинозвужувальні ЛЗ.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лише для знеболювання у стоматології; для дорослих і дітей віком від 4 років; для забезпечення ефективною анестезією використовувати необхідний мінімум розчину: дорослим - 1-4 мл, дітям віком від 4 років з масою тіла 20-30 кг достатньо дози 0,25-1 мл; для дітей з масою тіла 30-45 кг - 0,5-2 мл; кількість визначати залежно від віку та маси тіла дитини та тривалості операції; середня доза становить 0,75мг/кг; макс. доза для здорових дорослих 4 мг/кг маси тіла (0,133 мл/кг); макс. доза для дітей старше 4 років - не вище 3мг/кг (0,1 мл/кг); для введення використовувати спеціальні картриджні шпр. багаторазового використання.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нейропатія, невралгія (невропатичний біль), парестезія (печіння, поколювання, свербіж, пощипування, локальне відчуття тепла або холоду без видимої фізичної причини) оральних та періоральних структур; гіпестезія, оніміння, дизестезія, включаючи дисгевзію (металевий присмак, порушення смакових відчуттів), агевзію (втрата смакових відчуттів); збудження та/або пригнічення ЦНС, запаморочення, головний біль, неспокій, порушення свідомості, ністагм, тремор, пригнічення та параліч, зупинка дихання, переднепритомний стан (пресинкопе), непритомність (синкопе), психоз, дезорієнтація, вертиго, порушення дикції (дизартрія, логорея), слабкість/збудження, порушення координації (порушення рівноваги), сонливість; глибоке пригнічення ЦНС: судоми (у т. ч. тоніко-клонічні), втрата свідомості, кома; нервозність, тривожність, ейфорія; порушення гостроти зору, затуманення зору, порушення акомодатії; с-м Горнера: птоз повік, енофтальм, диплопія (параліч окорухових м'язів), амавроз, сліпота, мідріаз, міоз; дискомфорт та шум у вухах, гіперакузія; пригнічення СС системи; тахікардія; брадикардія; брадиаритмія; тахіаритмія (в т.ч. шлуночкові аритмії (екстрасистоли і фібриляція)); тріпотіння передсердь; стенокардія; артеріальна гіпотензія; артеріальна гіпертензія; порушення провідності серця (атріовентрикулярна блокада); аритмія; вазодилатація; СС недостатність, що приводить до зупинки серця; пригнічення дихання; тахіпноє; брадипноє; позіхання; диспноє; гіпоксія (у т. ч. церебральна); гіперкапнія; дисфонія (хрипота); реакції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання; кропив'янка; анафілактичні/анафілактоїдні реакції; анафілактичний шок; ангіоневротичний набряк (обличчя, язика, губ, горла, гортані, періорбітальний); підвищення t° тіла; бронхоспазм; астма; нудота, блювання, виразки/луцення слизової оболонки ясен/ ротової порожнини; набряк язика, губ, ясен, стоматит, гінгівіт;

почервоніння шкіри, висипання, свербіж, набряк обличчя; посмикування м'язів, озноб (тремтіння); набряк у місці ін'єк., локальний набряк, біль у грудях, втома, астения, відчуття жару, біль у місці ін'єк., гіпертермія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до будь-якого компонента ЛЗ або алергія на локальні анестетики амідного типу; злаякісна гіпертермія; порушення провідникової системи серця (AV-блокада II-III ст., задокументована брадикардія), порушення AV-провідності, які не підтримуються кардіостимулятором; г. СН; тяжка артеріальна гіпотензія; медикаментозно неконтрольована епілепсія; порфірія; дитячий вік до 4 років (маса тіла до 20 кг).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МЕПІФРИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 1,7мл в амп. та капсул. у кор. та бл.	30мг/мл	№10, №10x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МЕПІФРИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 1,7мл в карпул. у бл.	30мг/мл	№10x5	622,49	
II.	СКАНДОНЕСТ 3 % ПРОСТИЙ	СЕПТОДОНТ, Франція	р-н д/ін'єк. по 1,8мл у картр	3%	№10, №50	відсутня у реєстрі ОВЦ	

● **Ропівакаїн (Ropivacaine)**

Фармакотерапевтична група: N01BB09 - Засоби для місцевої анестезії. Аміді.

Основна фармакотерапевтична дія: місцевий анестетик амідного типу; оборотно блокує провідність імпульсів по нервових волокнах, пригнічуючи транспортування іонів натрію через нервові мембрани; подібні ефекти спостерігаються на збуджувальних мембранах мозку та міокарда; має анестезуючий та аналгетичний ефекти; при застосуванні високих доз досягається хірургічна анестезія, нижчі дози призводять до сенсорної блокади (аналгезії) та непрогресуючої моторної блокади; при потрапленні в кровообіг великої кількості препарату швидко розвиваються симптоми з боку ЦНС та ССС.

Показання для застосування ЛЗ: 7,5 мг/мл та 10 мг/мл: дорослим і дітям від 12 років для анестезії при хірургічних втручаннях (епідуральна анестезія при хірургічних втручаннях, включаючи кесарів розтин; блокада великих нервів; блокада периферичних нервів)^{БНФ}; 2 мг/мл - дорослим і дітям від 12 років для купірування г. болю^{БНФ} (тривала епідуральна інфузія або періодичні болюсні ін'єк.^{БНФ} для усунення післяопераційного болю або для знеболювання пологів; блокада периферичних нервів^{БНФ}; тривала блокада периферичних нервів шляхом тривалої інфузії або періодичних болюсних ін'єк., для усунення післяопераційного болю^{БНФ}); для немовлят від 1 року та дітей до 12 років для купірування г. болю під час та після хірургічного втручання^{БНФ} (периферична блокада при одноразовому введенні ЛЗ); для новонароджених, немовлят від 1 року та дітей до 12 років для каудальної епідуральної блокади під час та після хірургічного втручання (тривала епідуральна інфузія).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для досягнення достатнього ступеня анестезії застосовувати мінімально можливі дози; дорослим та дітям від 12 років анестезія при хірургічних втручаннях потребує високих доз та більш високих концентрацій, ніж знеболювання з метою купірування г. болю, для якого потрібна концентрація 2 мг/мл; для в/суглобових ін'єк. - концентрація 7,5 мг/мл; люмбальна епідуральна ін'єк. д/проведення хірургічного втручання - 15-25 мл (7,5мг/мл) або 15-20 мл (10мг/мл); люмбальна епідуральна ін'єк. д/проведення кесаревого розтину - 15-20 мл (7,5 мг/мл); торакальна епідуральна ін'єк. д/післяопераційної знеболювальної блокади - 5-15 мл залежно від рівня ін'єк. (7,5 мг/мл); блокада плечового сплетіння - 10-40 мл (7,5 мг/мл); блокада невеликих та середніх нервів та інфільтраційна анестезія - 1-30 мл (7,5 мг/мл); купірування г. болю: люмбальне епідуральне введення, болюс - 10-20 мл (2мг/мл); періодичні ін'єк. (додаткові дози), для знеболювання при пологах - 10-15 мл з інтервалами щонайменш 30 хв. (2 мг/мл); тривала інфузія, для післяопераційного знеболювання або

знеболювання пологів - 6-14 мл/год. (2 мг/мл); тривала інфузія, для післяопераційного знеболювання (торакальне епідуральне введення) - 6-14 мл/год. (2 мг/мл); блокада периферичних нервів та інфільтраційна анестезія - 1-100 мл (2 мг/мл); внутрішньосуглобова ін'єкція (одноразова доза при артроскопії колінного суглоба) - 20 мл (7,5 мг/мл); блокади периферичних нервів (стегова або міжрабинчаста блокада), тривала інфузія або періодичні ін'єкції (для післяопераційного знеболювання) - 5-10 мл/год. (2 мг/мл); дотримуватися особливої обережності для попередження випадкових внутрішньосудинних ін'єк.; до та під час ін'єк. загальної дози, ретельно проводити аспіраційну пробу; загальну дозу вводити повільно, зі швидкістю 25-50 мг/хв; діти: каудальна блокада нижче рівня T12 дітям 0-12 років з масою тіла до 25 кг - 1 мл/кг (2 мг/мл); тривала епідуральна інфузія дітям з масою тіла до 25 кг проводиться концентрацією 2 мг/мл (болюсна доза): 0-6 міс. та 6-12 міс. - 1-2 мг/кг, 1-12 років - 2 мг/кг; тривала епідуральна інфузія дітям з масою тіла до 25 кг проводиться концентрацією 2 мг/мл (інфузія тривалістю до 72 год): 0-6 міс - 0,2 мг/кг/год; 6-12 міс. та 1-12 років - 0,4 мг/кг/год.; блокада периферичних нервів (тривала інфузія): 1-12 років - 0,2-0,6 мг/кг/год; застосування ропівакаїну у дозах 7,5 і 10 мг/мл дітям призводить до системного токсичного впливу та токсичного впливу на ЦНС; дози до 3 мг/кг включно при концентрації ропівакаїну 3 мг/мл безпечно застосовували дітям від 4 років; досвід застосування каудальних блокувань дітям з масою тіла понад 25 кг обмежений.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: спінальна гематома, головний біль, що з'явився після пункції дуального простору, менінгіт, епідуральний абсцес; нудота, блювання, артеріальна гіпотензія; тривожність, парестезії, запаморочення, головний біль; судоми, великий епілептичний напад, інсульт, диспное, навколоротова парестезія, оніміння язика, гіперакузія, дзвін у вухах, порушення зору, дизартрія, судомні рухи м'язів, тремор, гіпестезія, дискінезія; брадикардія, тахікардія, зупинка серця, аритмії; АГ/артеріальна гіпотензія; непритомність, задишка, затримка сечі, підвищення t° , озноб, біль у спині; гіпотермія; АР (анафілактичні р-ції, ангіоневротичний набряк та кропив'янка); невротія та дисфункції спинного мозку (с-м передньої спинномозкової артерії, арахноїдит, с-м кінського хвоста); тотальна спінальна блокада; токсичний вплив на ЦНС (симптоми - легке запаморочення, навколоротова парестезія, оніміння язика, гіперакузія, дзвін у вухах та порушення зору; дизартрія, ригідність м'язів і судомні рухи м'язів, генералізовані судоми, втрата свідомості та великий епілептичний напад, зупинка дихання, ацидоз, гіперкаліємія, гіпокальціємія, дефіцит кисню); токсичний вплив на СС систему (пригнічення провідності і скорочення).

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до ропівакаїну або будь-якої з допоміжних речовин; підвищена чутливість до місцевих анестетиків амідного типу; загальні протипоказання, пов'язані з епідуральною або регіонарною анестезією, незалежно від того, який місцевий анестетик застосовується; в/в регіонарна анестезія; парацервікальна анестезія в акушерстві; епідуральна анестезія у пацієнтів з гіповолемією.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	НАРОПІН	АстраЗенека Пті Лтд, Австралія	р-н д/ін'єк. по 100мл у конт. в конт. чар/уп.	2мг/мл	№1x5	2192,72	25,32/\$
	НАРОПІН	АстраЗенека АБ, Швеція	р-н д/ін'єк. по 10мл в амп. у конт. чар/уп.	7,5мг/мл	№1x5	635,42	25,32/\$
	НАРОПІН	АстраЗенека АБ, Швеція	р-н д/ін'єк. по 10мл в амп. у конт. чар/уп.	10мг/мл	№1x5	854,00	25,32/\$

Комбіновані препарати

- **Артикаїн + Епінефрин (Articain + Epinephrine)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АРТИФРИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 1,7мл в амп. у бл.	40мг/0,006мг/мл	№5x2, №10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

АРТИФРИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 1,7мл в амп. у кор.	40мг/0,006мг /мл	№10	120,00	
АРТИФРИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 1,7мл в карпул. у бл.	40мг/0,006мг /мл	№10x5	600,00	
АРТИФРИН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 1,7мл у карпул. в бл.	40мг/0,01мг/мл	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
АРТИФРИН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 1,7мл у карпул. в бл.	40мг/0,01мг/мл	№10x5	662,14	
II. АРТІНІБСА З ЕПІНЕФРИНОМ 1:100.000	ЛАБОРАТОРІОС ІНІБСА, С.А., Іспанія	р-н д/ін'єк. по 1,8мл у картр.	40мг/0,01мг/мл		відсутня у реєстрі ОБЦ	
мл №50					відсутня у реєстрі ОБЦ	
II. ОРАБЛОК 1:100,000	Пієррел С.п.А., Італія	р-н д/ін'єк. по 1,8мл у картр.	40мг/0,01мг/мл	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ОРАБЛОК 1:200,000	Пієррел С.п.А., Італія	р-н д/ін'єк. по 1,8мл у картр.	40мг/0,005мг /мл	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
СЕПТАНЕСТ З АДРЕНАЛІНОМ 1/100 000	СЕПТОДОНТ, Франція	р-н д/ін'єк. по 1мл, 1,7мл у картр.	40мг/0,01мг/мл	№10, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
СЕПТАНЕСТ З АДРЕНАЛІНОМ 1/200 000	СЕПТОДОНТ, Франція	р-н д/ін'єк. по 1мл, 1,7мл у картр.	40мг/0,005мг /мл	№10, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ	

УБІСТЕЗИН	3М Дойчланд ГмбХ, Німеччина	р-н д/ін'єк. по 1,7мл у картр.	40мг/0,006мг /мл	№50	відсутня у реєстрі ОВЦ
УБІСТЕЗИН ФОРТЕ	3М Дойчланд ГмбХ, Німеччина	р-н д/ін'єк. по 1,7мл у картр.	40мг/0,012мг /мл	№50	відсутня у реєстрі ОВЦ
УЛЬТРАКАЇН® Д-С	Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ/ДЕЛЬФАРМ ДІЖОН, Німеччина/Франція	р-н д/ін'єк. по 2мл, 1,7мл в амп. та карт.	40мг/0,006мг /мл	№10х1х10, №5х2х10, №10х10	відсутня у реєстрі ОВЦ
УЛЬТРАКАЇН® Д-С ФОРТЕ	Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ/ДЕЛЬФАРМ ДІЖОН, Німеччина/Франція	р-н д/ін'єк. по 2мл, 1,7мл в амп. та карт.	40мг/0,012мг /мл	№10х1х10, №5х2х10, №10х10	відсутня у реєстрі ОВЦ

• **Бупівакаїн + Епінефрин (Bupivacaine + Epinephrine)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.
Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БУПІНЕКАЇН	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у касеті	5мг/0,005мг/мл	№5х1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БУПІНЕКАЇН	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у касеті	5мг/0,005мг/мл	№5х2	136,10	

10.3. Анальгетичні засоби

10.3.1. Опіоїди

10.3.1.1. Природні алкалоїди опію

- **Морфін (Morphine)** * [7] [ГМД] (див. п. 2.21.1.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Морфін + носкапін + папаверин + кодеїн + тебаїн (Morphine + noscarpine + papaverine + codeine + tebaine)**

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ОМНОПОН-3Н	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	11,5мг/5,4мг/0,72мг/1,44мг/0,1мг/мл	№5, №10, №100	відсутня у реєстрі ОВЦ	

10.3.1.2. Інші опіоїди

- **Трамадол (Tramadol)**

Фармакотерапевтична група: N02AX02 - аналгетики; опіоїди.

Основна фармакотерапевтична дія: опіоїдний знеболювальний засіб центральної дії; неселективний агоніст опіатних μ -, δ і κ -рецепторів із більшою спорідненістю до μ -рецепторів; інші механізми забезпечення знеболюючої дії – інгібування зворотного захоплення і посилення серотонінергічної відповіді; чинить протикашльову дію; у терапевтичних дозах майже не пригнічує дихання і не порушує СС діяльність; активність трамадолу оцінюється у діапазоні від 1/10 до 1/6 активності морфіну.

Показання для застосування ЛЗ: лікування помірного та сильного болю^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують р/ос та парентерально (в/в, в/м та п/ш); дози і тривалість встановлюються індивідуально з урахуванням інтенсивності болювого с-му, призначати найменшу ефективну дозу; дорослим і дітям віком від 14 років призначають р/ос або парентерально по 50-100 мг кожні 4-6 год. МДД - 400 мг^{БНФ}; якщо після застосування разової дози 50 мг полегшення болю не настає впродовж 30-60 хв., можна призначити іншу разову дозу 50 мг; при сильному болю може знадобитися більш висока початкова доза - 100 мг^{БНФ}; тривалість дії становить 4-8 год.; р-н д/ін'єк. застосовують дітям з 1 року, призначають 1-2 мг/кг у вигляді одноразової дози; добова доза - 4-8 мг/кг; МДД - 8 мг/кг (або 400 мг трамадолу).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: галюцинації, судоми розлади сну, тривожність, нічні жахи; зміни настрою (ейфорія, дисфорія), зміни активності/ когнітивних/ сенсорних здібностей (розлади процесу прийняття рішення, сприйняття); залежність; запаморочення, головний біль, затьмарення свідомості, зміна апетиту, парестезії, тремор, пригнічення дихання, епілептиформні напади, мимовільне посмикування м'язів,

порушення координації, синкопе, безсоння, сонливість, порушення мовлення; затуманення зору, мідріаз; прискорене серцебиття, тахікардія, брадикардія, АГ, ортостатична гіпотензія або СС колапс; задишка; нудота, блювання, запор, сухість у роті, позиви до блювання, подразнення травного тракту (наприклад, відчуття тяжкості у шлунку, метеоризм), діарея; підвищення рівня ферментів печінки; підвищена пітливість, шкірні реакції (у тому числі висипання, свербіж, еритема, кропив'янка); рухова слабкість; утруднене сечовипускання, дизурія та затримка сечі; втомлюваність, АР (дистонія, бронхоспазм, ангіоневротичний набряк, охриплість голосу), анафілаксія, порушення смаку, загальмованість, зниження швидкості реакцій, порушення менструального циклу; абстинентний синдром: збудження, тривожність, нервозність, порушення сну, гіперкінезія, тремор і розлади з боку травної системи; після відміни трамадолу: напади болю, тяжкий стан тривоги, галюцинації, парестезії, шум у вухах, незвичні симптоми з боку ЦНС (сплутаність свідомості, манія, деперсоналізація, розлади сприйняття оточуючого середовища, параноя).

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до трамадолу або до компонентів ЛЗ; г. отруєння алкоголем, снодійними, знеболювальними, опіоїдними або іншими психотропними ЛЗ; одночасне застосування інгібіторів MAO (та 2 тижні після їх відміни); тяжка печінкова/ниркова недостатність (кліренс креатиніну <10 мл/хв); епілепсія, що не контролюється лікуванням; с-м відміни наркотиків; не застосовується для лікування опіоїдної залежності.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ТРАМАДОЛ	ПАТ "Фармак", Україна	капс. у бл.	50мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТРАМАДОЛ-ЗН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл, 2мл в амп. у бл.	50 мг/мл	№5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТРАМАДОЛ-ЗН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	капс. у бл.	50мг	№10, №20, №30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТРАМАДОЛ-М	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл, 2мл в амп. у бл.	50 мг/мл	№5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТРАМАДОЛУ ГІДРОХЛОРИД	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у пач. та бл	50 мг/мл	№10, №5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	ТРАМАДОЛ КАЛЦЕКС	АТ "Калцекс" (виробник, який відповідає за випуск серії)/АТ "Гріндекс" (відповідає за контроль серії/випробування)/ХБМ Фарма с.р.о. (всі стадії виробничого процесу, крім випуску серії), Латвія/Латвія/Словаччина	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у конт. чар/уп	100мг/2мл	№5x2, №5x20	відсутня у реєстрі ОВЦ	

10.3.2. Похідні фенілпiperидину

- **Фентаніл (Fentanyl)** * (див. п. 19.5. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")

Фармакотерапевтична група: N01AH01 - засоби для опіоїдної анестезії.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний опіоїдний беззаспокійливий засіб; подібний до морфіну; чинить швидку, короткочасну беззаспокійливу дію; при парантеральному введенні спричиняє виражену аналгезію, пригнічення дихання, брадикардію та інші характерні для морфіну ефекти (блювання, запор, фізичну залежність, деякі вагусні ефекти та седацію різного ступеня); максимальний ефект триває 30 хв.

Показання для застосування ЛЗ: у малих дозах для знеболювання під час малих операцій; у великих дозах знеболення та зменшення частоти спонтанного дихання при ШВЛ; нейролептаналгезія у комбінації з нейролептичними ЛЗ^{БНФ}; полегшення тяжких болів (біль при ІМ).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують в/в (болусно/ інфузійно) та в/м; дорослі: спонтанне дихання - початкова доза 50-200 мкг, додаткова доза - 50 мкг; ШВЛ: початкова доза 300-3500 мкг, додаткова доза - 100-200 мкг; дози вище 200 мкг застосовують тільки для анестезії; для премедикації вводити в/м по 1-2 мл за 45 хв до

анестезії; у хірургічних процедурах з низькою інтенсивністю болю в/в введення 2 мл пацієнтам без премедикації забезпечує достатню аналгезію тривалістю 10-20 хв., болюсне введення 10 мл забезпечує аналгезію тривалістю приблизно 1 год; сильна аналгезія тривалістю 4-6 год досягається при введенні 50 мкг/кг; можна вводити у вигляді інфузій, пацієнтам, яким проводять ШВЛ, початкову дозу можна вводити у вигляді ступеневої інфузії - 1 мкг/кг/хв протягом перших 10 хв., потім 0,1 мкг/кг/хв; початкову дозу можна вводити у вигляді болюсної ін'єк.; якщо у післяопераційний період ШВЛ не передбачена, інфузію припинити за 40 хв. до закінчення операції; менша швидкість інфузії (0,05-0,08 мкг/кг/хв) необхідна, якщо збережене спонтанне дихання; більшу швидкість інфузії (до 3 мкг/кг/хв) застосовують при операції на серці; діти 2-11 років: спонтанне дихання або ШВЛ - початкова доза 1-3 мкг/кг, додаткова доза - 1-1,25 мкг/кг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР (анафілактичний шок, анафілактична реакція, кропив'янка); збудженість; ейфорія; безсоння, порушення сексуальної функції (послаблений статевий потяг); делірій (симптомами можуть бути поєднання таких реакцій як збудження, занепокоєння, дезорієнтація, сплутаність свідомості, страх, зорові і слухові галюцинації, порушення сну, нічні кошмари); м'язова ригідність; дискінезія, седація, запаморочення; головний біль; судоми, втрата свідомості, міоклонус; порушення зору; брадикардія, тахікардія, аритмія; асистолія; артеріальна гіпотензія/гіпертензія, біль у венах, розширення кровоносних судин; флебіт, коливання артеріального тиску; пригнічення дихання, ларингоспазм, бронхоспазм, апное; гіпервентиляція, гикавка; повторне пригнічення дихання; нудота, блювання; алергічний дерматит; свербіж; озноб, гіпотермія; с-м відміни препарату; сплутаність свідомості після операцій; ускладнення у дихальних шляхах, пов'язані з анестезією.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до фентанілу, до інших морфіноміметичних ЛЗ або до будь-якої допоміжної речовини ЛЗ; пригнічення дихання, ХОЗЛ; травми голови, підвищений ВЧТ; наркоманія; печінкова недостатність; період вагітності або годування груддю; дитячий вік до 2 років; застосування з інгібіторами MAO одночасно або протягом 2 тижнів після припинення застосування інгібіторів MAO.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ФЕНТАНІЛ	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у бл.	0,05 мг/мл	№5, №10, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	ФЕНСТУД	Русан Фарма Лтд, Індія	р-н д/ін'єк. по 2мл, 10мл в амп. у бл., кор.	50 мкг/мл	№10, №5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФЕНТАНІЛ КАЛЦЕКС	ХБМ Фарма с.р.о. (всі стадії виробничого процесу, крім випуску серії)/АТ "Гріндекс" (виробник, який відповідає за контроль серії/випробування)/АТ "Калцекс" (виробник, який відповідає за випуск серії), Словаччина/Латвія/Латвія	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у конт. чар/уп.	0,05 мг/мл	№5, №10,	відсутня у реєстрі ОБЦ	
№1 00						відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Тримеперидин (Trimeperidine)**

Фармакотерапевтична група: N02AX аналгетики, опіоїди

Основна фармакотерапевтична дія: впливає на ЦНС, а також на гладку мускулатуру внутрішніх органів, пригнічує відчуття болю, а також дихальний, кашльовий та блювотний центри; уповільнює частоту серцевих скорочень, звужує зіниці; підсилює дію засобів анестезії, полегшує настання сну у випадках, коли це утруднено через біль, розслаблює м'язи, тобто діє спазмолітично, сприяє виникненню регулярних скорочень матки в разі дискоординованої родової діяльності (прискорюючи процес пологів), зменшує родові болі. через ейфоричну дію та дію, що викликає абстиненцію, може викликати психічну та фізичну залежність, у зв'язку з цим - наркоманію.

Показання для застосування ЛЗ: зменшення сильного болю в разі поранень, переломів кісток, опіків, ІМ, г. панкреатиту, ниркових, печінкових і кишкових колік, при злоякісній пухлині, а також після хірургічних операцій; зменшення родових болів і для сприяння родовій діяльності у разі дисфункції шийки матки, при відсутності можливості проводити епідуральну анестезію і якщо народження дитини прогнозується не раніше ніж через 2 години; премедикація перед операцією.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим: 10-40 мг (0,5-2 мл), введення дози можна повторювати кожні 4 год, максимальна разова доза - 40 мг, МДД – 160 мг; для премедикації п/ш або в/м 20-30 мг (1-1,5 мл) разом з 0,5 мг атропіну за 30-45 хв до операції, у невідкладних випадках препарат можна вводити в/в; у післяопераційний період як знеболюючий та протишоковий засіб п/ш вводити 20 мг (1 мл); для знеболення пологів п/ш вводити 20-40 мг (1-2 мл), при необхідності ін'єкцію повторюють через 2-3 год; дітям від 2 років: разова доза (залежно від віку) становить 3-10 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: свербіж, кропив'янка, висипи; АР, контактний дерматит; дезорієнтація, занепокоєння, зміни настрою, галюцинації, дисфорія; запаморочення, сонливість, головний біль; міоз, двоїння в очах; артеріальна гіпотензія, брадикардія, тріпотіння серця, ортостатична гіпотензія, підвищений

ВЧТ; пригнічення дихання; запор, нудота, блювання, відчуття сухості у роті; спазми жовчовивідних шляхів; ригідність м'язів, судоми; утруднене сечовипускання, спазми сечовивідних шляхів; зменшення лібідо або потенції; загальна слабкість, посилене потовиділення, почервоніння обличчя, гіпотермія, біль та запалення в місці введення; зміни показників ферментів печінки, гіперглікемія; залежність; с-м абстиненції (нудота, блювання, пронос, підвищене потовиділення, мідріаз, сльози в очах, озноб, позіхання, біль у животі, м'язах або суглобах, тремор м'язів, тривога, занепокоєння, дратівливість, безсоння, а також прискорене серцебиття, дихання, підвищений кров'яний тиск).

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до активної речовини; пригнічення дихання; ХОЗЛ (в т.ч. напади БА); паралітичний ілеус або ризик його розвитку; болі неясного походження в животі; підвищений ВЧТ або травма голови; інтоксикація алкоголем; судоми; стан коми; феохромоцитом; не призначати одночасно з інгібіторами MAO, а також протягом 2 тижнів після припинення їх застосування; вік до 2 років або понад 65 років; період вагітності або годування груддю.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ПРОМЕДОЛ-ЗН	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	20 мг/мл	№5, №10, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС	ХБМ Фарма с.р.о. (всі стадії виробничого процесу, крім випуску серії)/АТ "Гріндекс" (виробник, який відповідає за контроль серії/випробування)/АТ "Калцекс" (виробник, який відповідає за випуск серії), Словаччина/Латвія/Латвія	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у конт. чар/уп.	20 мг/мл	№5, №10, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	

10.3.3. Похідні орипавіну

- **Бупренорфін (Buprenorphine) ***

Фармакотерапевтична група: N02AE01 - аналгетики; опіоїди; похідні орипавіну.

Основна фармакотерапевтична дія: анальгетик центральної дії, збуджує капа-підтип опіатних рецепторів, чим пояснюється висока анальгезивна активність, і одночасно блокує мю-рецептори, що відповідають за розвиток ейфорії; на відміну від інших наркотичних анальгетиків не спричиняє ейфорії, і тому є менш небезпечним як засіб, що спричиняє звикання

Показання для застосування ЛЗ: больовий синдром помірної і високої інтенсивності після оперативних втручань^{БНФ}, в онкологічних хворих, при ІМ, нирковій коліці, опіках

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити в/в повільно або в/м, дорослим 0,5-1 мл (0,15-0,3 мг), при необхідності ін'єкції повторювати з інтервалом 6-8 годин, МДД - 8 мл (2,4 мг); дітям віком від 12 років призначати 0,5-0,8 мл (0,15-0,25 мг), МДД для дітей - 6,6 мл (2 мг).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: галюциногенний ефект, запаморочення, сонливість, безсоння, головний біль, астения, непритомність, блідість, тривожність, нервозність, сплутаність свідомості; ортостатична гіпотензія, брадикардія, тахікардія, артеріальна гіпотензія; підвищення рівнів трансаміназ печінки та жовтяниця, некроз печінки; пригнічення дихання; сухість у роті, нудота, блювання, запор, астения, некроз печінки і гепатит; реакції гіперчутливості (наприклад, висипання, кропив'янка, свербіж, бронхоспазм), набряк Квінке (ангіоневротичний набряк), анафілактичний шок; затримка сечі; пітливість, блідість, зміни у місці введення, риніт, озноб, біль у спині, сльозотеча; місцеві реакції (іноді септичні), г. гепатит

Протипоказання до застосування ЛЗ: індивідуальна непереносимість або підвищена чутливість до бупренорфіну; тяжка дихальна або печінкова недостатність; фізична залежність

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БУПРЕН® IC	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. сублінг.			відсутня у реєстрі ОБЦ	
у бл.	0,0002г	№10x1				відсутня у реєстрі ОБЦ	
I.	БУПРЕН® IC	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. сублінг.			відсутня у реєстрі ОБЦ	

у бл.	0,0004г	№10x1				відсутня у реєстрі ОБЦ
I.	БУПРЕНОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	р-н д/ін'єк., по			відсутня у реєстрі ОБЦ
1мл в ампулі						відсутня у реєстрі ОБЦ
бл.	0,3 мг/мл	№5x1, №5x1,				відсутня у реєстрі ОБЦ
№5x20						відсутня у реєстрі ОБЦ

10.3.4. Похідні морфіну

- **Буторфанол (Butorphanol)**

Фармакотерапевтична група: N02AF01 - опіоїдні анальгетики.

Основна фармакотерапевтична дія: опіоїдний анальгетик, діє як агоніст κ-опіоїдних рецепторів і як змішаний агоніст/антагоніст μ-опіоїдних рецепторів, змінює сприйняття больових відчуттів на рівні ЦНС; має активність антагоніста опіоїдів, що еквівалентна активності налорфіну, у 30 разів перевищує активність пентазоцину і становить 1/40 активності налоксону; тривалість пригнічення дихання залежить від введеної дози; спричиняє психоміметичні ефекти; максимальна анальгетична дія настає через 1-2 год.; тривалість знеболювання залежить від характеру болю і від способу введення (в/м, в/в) та становить 3-4 год

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування помірного і сильного болю, біль у післяопераційний період, знеболювання у щелепно-лицьовій хірургії; мігрень; премедикація перед хірургічною операцією або наркозом, як доповнення до збалансованої анестезії; знеболювання пологів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: знеболювання: при в/м введенні рекомендована доза - 2 мг одноразово, за необхідності дозу можна застосувати повторно з інтервалом 3-4 год; залежно від тяжкості болю лікування ефективне в дозуванні 1-4 мг кожні 3-4 год.; при в/в введенні рекомендована доза 1 мг одноразово, з інтервалом 3-4 год, у разі необхідності; залежно від тяжкості больового с-му лікування ефективне в інтервалі доз 0,5-2 мг кожні 3-4 год.; введення перед операцією/наркозом: звичайна доза - в/м, 2 мг за 30-60 хв. до початку хірургічної операції; у разі проведення збалансованої анестезії звичайна доза - в/в, 2 мг незадовго до введення наркозу та/або в/в, 0,5 мг - під час операції; при такому дробному введенні загальну дозу можна збільшити до 0,06 мг/кг (4 мг/70 кг), залежно від доз раніше введених седативних, анальгетичних або снодійних ЛЗ; загальна доза буторфанолу може варіювати, однак пацієнтам лише іноді потрібне введення менше 4 мг або більше 12,5 мг (звичайно 0,6-0,18 мг/кг); пологи: вагітним жінкам із нормальним терміном виношування плода на початку пологової діяльності можна ввести в/в або в/м 1-2 мг і повторити цю ж дозу через 4 год.; під час пологів або якщо пологи очікуються у межах 4 год., застосовувати інші ЛЗ знеболювання; застосовувати з обережністю у випадку передчасних пологів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сонливість, нудота і/або блювання, пітливість/вологість шкіри; астения, головний біль, відчуття жару; сухість у роті; сплутаність свідомості, відчуття легкості/ейфорія, запаморочення, сновидіння, хвилювання, депресія, тривога, дизартрія, дисфорія, галюцинації, парез, відчуття холоду, ейфорія, знервованість; підвищення/зниження АТ, тахікардія, відчуття серцебиття; диплопія; АР, висипання, кропив'янка; мілгія; уповільнення дихання, обструкція дихальних шляхів, поверхнєве дихання; зловживання ЛЗ, залежність.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до буторфанолу або до будь-якого іншого компонента ЛЗ, тяжкі порушення функції печінки та/або нирок.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 12 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БУТОЛАР®	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в ампулі у кор.	2мг/мл	№275		відсутня у реєстрі ОБЦ
	БУТОЛАР®	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в ампулі у касет. в пач.	2мг/мл	№5x1	149,84	

- **Налбуфін (Nalbuphine)**

Фармакотерапевтична група: N02AF02 - анагетика; опіоїди; похідні морфіну.

Основна фармакотерапевтична дія: опіоїдний анагетик групи агоністів-антагоністів опіатних рецепторів (агоніст капла-рецепторів і антагоніст мю-рецепторів); порушує міжнейронну передачу больових імпульсів на різних рівнях ЦНС, впливаючи на вищі відділи головного мозку; гальмує умовні рефлексії, чинить седативну дію, викликає дисфорію, міоз, збуджує блювотний центр; меншою мірою, ніж морфін, промедол, фентаніл, порушує дихальний центр і впливає на моторику ШКТ; не впливає на гемодинаміку; ризик розвитку звикання і опіоїдної залежності при контрольованому застосуванні значно нижчий, ніж для опіоїдних антагоністів; при в/в введенні ефект розвивається через декілька хв, при в/м - через 10-15 хв, максимальний ефект досягається через 30-60 хв, тривалість дії - 3-6 год.

Показання для застосування ЛЗ: больовий с-м сильної та середньої інтенсивності; як додатковий ЛЗ при проведенні анестезії, для зниження болю у перед- та післяопераційний період, знеболення під час пологів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують в/в та в/м; дозування повинне відповідати інтенсивності болю, фізичному стану пацієнта та враховувати взаємодію з іншими одночасно застосовуваними ЛЗ; для знеболювання - вводити 0,15 - 0,3 мг/кг маси тіла; за необхідності повторювати кожні 4-6 год; максимальна разова доза для дорослих - 0,3 мг/кг, МДД - 2,4 мг/кг; при ІМ: в/в повільно, 20 мг, може бути необхідним збільшення дози до 30 мг; за відсутності чіткої позитивної динаміки больового с-му - 20 мг повторно, через 30 хв; для премедикації: 100-200 мкг/кг, при проведенні в/в наркозу: для введення у наркоз - 0,3-1 мг/кг за період 10-15 хв, для підтримання наркозу - 250-500 мкг/кг кожні 30 хв; при знеболюванні під час пологів - 20 мг в/м.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: запаморочення, загальна слабкість, головний біль, седація, диплопія, знервованість, депресія, збудження, плаксивість, ейфорія, ворожість, сонливість, нічні жахи, галюцинації, дзвін у вухах, сплутаність свідомості, дисфорія, парестезії, відчуття нереальності, порушення мовлення, зміна настрою; судоми, ригідність м'язів, тремор, мимовільні м'язові скорочення, підвищення внутрішньочеревного тиску; звикання до препарату, психоміметичні реакції, невротичні реакції, неспокій, знервованість (невгамовність), ейфорія; підвищення/зниження АТ, брадикардія, тахікардія, ортостатична гіпотензія, відчуття серцебиття; нечіткість або порушення зору, міоз; сухість у роті, коліки, спазми у животі, запор, диспепсія, гіркий присмак, анорексія; симптоми подразнення ШКТ, порушення функціональних показників печінки; спазм жовчовивідних шляхів, при запальних захворюваннях кишечника - паралітична кишкова непрохідність і токсичний мегаколон (запор, метеоризм, нудота, гастралгія, блювання); пригнічення дихання, зменшення хвилинного об'єму дихання, диспное, астматичні напади; підвищена вологість шкіри, свербіж, кропив'янка, відчуття жару; іктеричність склери та жовтушність шкіри; болючість у місці введення, гіпотермія, набряк, почервоніння, печіння; зниження лібідо або потенції, анафілактичні реакції, шок, респіраторний дистрес-с-м, набряк Квінке, набряк обличчя, чхання, бронхоспазм, набряк легень, шкірні висипи, підвищене потовиділення, припливи, затуманення зору; зменшення діурезу, часті позиви до сечовипускання, спазм сечовивідних шляхів; гепатотоксичність; медикаментозна залежність, синдром відміни (спастичний біль у животі, нудота, блювання, ринорея, слюзотеча, слабкість, відчуття тривожності, підвищення t° тіла); в акушерській практиці – пригнічення дихання у новонароджених.

Противказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до налбуфіну гідрохлориду або до будь-якого з інгредієнтів ЛЗ; пригнічення дихання або виражене пригнічення ЦНС, підвищений ВЧТ, травма голови, г. алкогольне отруєння, алкогольний психоз, порушення функції печінки та нирок; не рекомендовано комбіноване застосування препарату з чистими агоністами морфіноміметиків; не рекомендовано застосовувати препарат без проведення відповідної діагностики при хірургічному черевному синдромі, оскільки налбуфін може маскувати його прояви; не слід застосовувати жінкам у період годування груддю (за винятком випадків застосування під час пологів).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 80 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	НАЛБУК	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл, 2мл в амп. у пач. та шпр. з голк. у бл.	10мг/мл	№1, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НАЛБУК	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у бл.	10мг/мл	№5x1	188,00	
	НАЛБУК	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	10мг/мл	№5x1	192,00	
	НАЛБУК	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в шпр. з голк. у бл.	10мг/мл	№1	568,00	
	НАЛБУФІН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл, 2мл у шпр. та амп. в конт. чар/уп.	10мг/мл	№1x1, №5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НАЛБУФІН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у конт. чар/уп.	10мг/мл	№5x2	182,07	

НАЛБУФІН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у конт. чар/уп.	10мг/мл	№5x2	203,78	
НАЛБУФІН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл у шпр. з голк. у конт. чар/уп.	10мг/мл	№1x1	317,40	
НАЛБУФІН-ЗН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл, 2мл в амп. у кор. та бл.	10 мг/мл	№5, №10, №5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НАЛБУФІН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії, включаючи випуск серії)/ТОВ "ХФП "Здоров'я народу" (всі стадії, окрім випуску серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії, включаючи вторинне пакування та контроль якості, з, Україна/Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл, 2мл у шпр. з гол. та амп. в конт. чар/уп. або бл.	10мг/мл	№5x1, №5x2, №10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НАЛБУФІН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії, включаючи випуск серії)/ТОВ "ХФП "Здоров'я народу" (всі стадії, окрім випуску серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії, включаючи вторинне пакування та контроль якості, з, Україна/Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл у амп. у бл.	10мг/мл	№5x1	271,04	
НАЛБУФІН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії, включаючи випуск серії)/ТОВ "ХФП "Здоров'я народу" (всі стадії, окрім випуску серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії, включаючи вторинне пакування та контроль якості, з, Україна/Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл, 2мл у шпр. з гол. та амп. в конт. чар/уп. або бл.	10мг/мл	№10x1	283,28	
НАЛБУФІН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії, включаючи випуск серії)/ТОВ "ХФП "Здоров'я народу" (всі стадії, окрім випуску серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії, включаючи вторинне пакування та контроль якості, з, Україна/Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл, 2мл у шпр. з гол. та амп. в конт. чар/уп. або бл.	10мг/мл	№5x2	283,28	
НАЛБУФІН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії, включаючи випуск серії)/ТОВ "ХФП "Здоров'я народу" (всі стадії, окрім випуску серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії, включаючи вторинне пакування та контроль якості, з, Україна/Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл у шпр. з гол. в конт. чар/уп.	10мг/мл	№1x1	466,48	

		випуску серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії, включаючи вторинне пакування та контроль якості, з, Україна/Україна/Україна					
	НАЛБУФІН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії, включаючи випуск серії)/ТОВ "ХФП "Здоров'я народу" (всі стадії, окрім випуску серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії, включаючи вторинне пакування та контроль якості, з, Україна/Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл у шпр. з гол. в конт. чар/уп.	10мг/мл	№1x1	811,20	
II.	НАЛБАКСОН	Мюнгмун Фарм. Ко., Лтд., Республіка Корея	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп.	10мг/мл	№10	245,42	
	НАЛБУФІН ІН'ЄСКЦІЇ 10 МГ	Русан Фарма Лтд, Індія	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп.	10мг/мл	№10	192,00	25,03/\$
	НАЛБУФІН ІН'ЄСКЦІЇ 20 МГ	Русан Фарма Лтд, Індія	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп.	20мг/мл	№5	192,00	25,03/\$
	НАЛБУФІН СЕРБ	Серб (випуск серії)/Сенексі (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, контроль якості), Франція/Франція	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп.	20 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НОФА	СТЕРИЛ-ДЖЕН ЛАЙФ САЙЄНСІЗ (П) Лтд, Індія	р-н д/ін'єк. по 1мл у амп.	10мг/мл	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

10.3.5. Похідні піразолону

- **Метамізол натрію (Metamizole sodium) ***

Фармакотерапевтична група: N02BB02 - аналгетики та антипіретики; піразолони.

Основна фармакотерапевтична дія: похідний піразолону, володіє знеболювальною, жарознижувальною, спазмолітичною, протизапальною дією; неселективно блокує ЦОГ, знижує утворення простагландинів з арахідонової кислоти; уповільнює проведення больових екстра- і пропріорецептивних імпульсів у ЦНС, підвищує поріг збудливості таламічних центрів больової чутливості; збільшує тепловіддачу

Показання для застосування ЛЗ: больовий с-м малої і середньої інтенсивності різного походження і локалізації (головний, зубний біль, опіки, біль у післяопераційному періоді, дисменорея, артралгії, невралгії, радикуліти, біль у м'язах, суглобах, міозити); гіпертермічний с-м, гарячкові стани (при грипі, ГРВІ та інших інфекціях); ниркова і печінкова коліки (у комбінації зі спазмолітичними ЛЗ); як допоміжний ЛЗ для зменшення болю після хірургічних і діагностичних втручань

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують р/ос, в/м та в/в струминно; спосіб введення та доза залежать від тяжкості захворювання і визначаються індивідуально; парентерально: для запобігання різкому зниженню АТ в/в введення проводять повільно, пацієнт повинен знаходитись у положенні лежачи, необхідний контроль АТ, ЧСС і дихання; для парентерального введення: дітям та підліткам віком до 14 років застосовувати одноразову дозу 8-16 мг/кг маси тіла, при лихоманці достатньою для дітей є доза 10 мг/кг, дорослим та підліткам віком від 15 років (> 53 кг) МДД 1000 мг. Добова доза може бути розділена на 4 прийоми з інтервалом 6-8 год.; для табл.: дорослим і дітям віком від 14 років призначати по 0,5-1 табл. (250–500 мг) 1–2 р/добу, МДД - 1 г, дітям віком від 12 до 14 р. - по 0,5 табл. (250 мг) 1–2 р/добу, тривалість лікування - не більше 3 днів; супозиторії: дітям від 1 до 3 років - 1 супозиторій 100 мг 1 раз на добу; від 4 до 7 років - по 1 супозиторію 100 мг 2 рази на добу не частіше ніж через 4-6 годин або 1 супозиторій 250 мг 1 раз на добу; від 8 до 14 років - 1 супозиторій 250 мг 1-2 рази на добу не частіше ніж через 4-6 годин; після застосування супозиторія дитині необхідно протягом 30 хвилин знаходитись у положенні лежачи; тривалість лікування - встановлюється індивідуально, становить від 1 до 3 діб.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гепатит; олігурія, анурія, протеїнурія, інтерстиціальний нефрит, забарвлення сечі у червоний колір; зниження АТ, тахікардія; агранулоцитоз, лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія, гранулоцитопенія; реакції гіперчутливості, включаючи висипання на шкірі та слизових оболонках, гіперемія шкіри, свербіж, кропив'янка, кон'юнктивіт, набряк Квінке; с-м Стівенса - Джонсона, с-м Лайелла, бронхоспастичний с-м, анафілактичні реакції, анафілактичний шок; інфільтрати у місці введення (при внутрішньом'язовому введенні), гіперемія, набряк, місцеві висипи та свербіж шкіри у місці введення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до метамізолу натрію, інших похідних піразолону та компонентів ЛЗ; напади БА, порушення кровотворення (агранулоцитоз, цитостатична/ інфекційна нейтропенія);

печінкова і/або ниркова недостатність, спадкова гемолітична анемія (дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази), біль у животі невстановленого генезу, анемія, лейкопенія, пієлонефрит, гломерулонефрит, у т. ч. в анамнезі; р-н д/ін'єк.: систолічний АТ нижче 100 мм рт. ст.; політравма, шок; порфірія; третій триместр вагітності

Визначена добова доза (DDD): перорально - 3 г., парентерально - 3 г., ректально - дитяча добова доза не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АНАЛЬГІН	ТОВ "Тернофарм", Україна	табл. у бл.	0,5г	№10	4,55	
	АНАЛЬГІН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у конт. чар/уп.	500мг/мл	№5x2	8,93	
	АНАЛЬГІН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у пач	500мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АНАЛЬГІН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у пач.	500мг/мл	№5x2	10,38	
	АНАЛЬГІН	ТОВ "Агрофарм", Україна	табл. у бл. в пач. та без	500мг	№10,	відсутня у реєстрі ОБЦ	
№1 0x1						відсутня у реєстрі ОБЦ	
I.	АНАЛЬГІН	ПАТ "Монфарм", Україна	табл. у бл.	0,5г	№10x2,	відсутня у реєстрі ОБЦ	
№1 0x1 0						відсутня у реєстрі ОБЦ	
I.	АНАЛЬГІН	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	табл. у бл.	0,5г	№6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АНАЛЬГІН	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	табл. у бл.	0,5г	№10	3,24	
	АНАЛЬГІН	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл.	500мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АНАЛЬГІН	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл.	500мг	№10	4,03	
	АНАЛЬГІН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, ко, Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл, 2мл в амп. у кор. та бл.	500мг/мл	№5x2, №10, №10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
АНАЛЬГІН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, ко, Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у кор.	500мг/мл	№10	11,26		

	АНАЛЬГІН ДЛЯ ДІТЕЙ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	супоз. рект. у бл.	0,1г	№5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АНАЛЬГІН ДЛЯ ДІТЕЙ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	супоз. рект. у бл.	0,1г	№5x2	25,00	
	АНАЛЬГІН ДЛЯ ДІТЕЙ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	супоз. рект. у бл.			відсутня у реєстрі ОВЦ	
бл.	0,25г	№5x2				відсутня у реєстрі ОВЦ	
I.	АНАЛЬГІН ДЛЯ ДІТЕЙ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	супоз. рект. у бл.	0,25г	№5x2	30,50	
	АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. в конт. чар/уп. в пач. та без.	500мг	№10, №10x1	4,12	
	АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у конт. чар/уп.	500мг/мл	№5x2	9,27	
	АНАЛЬГІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	500мг	№6, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АНАЛЬГІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл, 2мл в амп. у бл.	500мг/мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АНАЛЬГІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у бл. або кор.	500мг/мл	№10, №10x1	13,13	
	АНАЛЬГІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл. або кор.	500мг/мл	№10, №10x1	20,54	

Комбіновані препарати

- Метамізол натрію + Дифенгідрамін (Metamizole sodium + Diphenhydramine)**

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АНАЛЬДИМ	ПАТ "Монфарм", Україна	супоз. рект. у стрип.	100мг/10мг	№5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АНАЛЬДИМ	ПАТ "Монфарм", Україна	супоз. рект. у стрип.	250мг/20мг	№5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	

- Метамізол натрію + Бензокаїн + Красавка + Натрію гідрокарбонат (Metamizole sodium + Benzocaine + Atropa belladonna + Sodium hydrocarbonate) ****

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БЕЛАЛГІН	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"/Товариство з обмеженою відповідальністю	табл. у бл.	250мг/250мг/15мг/100мг	№10x1	29,60	

		"АГРОФАРМ", Україна/Україна					
--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

- **Метамізол натрію + Кофеїн-бензоат натрію (Metamizole sodium + Caffeine and sodium benzoate)****

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КОФАЛЬГІН	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"/Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОФАРМ", Україна/Україна	табл. у бл.	300мг/50мг	№10x1	20,19	

- **Метамізол натрію + Пітофенон + Фенпівериній (Metamizole sodium + Pitophenone + Fenpiverinium) [тільки таблетки] (див. п. 12.1.2.2. розділу "УРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ, СЕКСОПАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")**

Визначена добова доза (DDD): перорально/парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	РЕАЛГІН	ПАТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл.	500мг/5мг/0, 1мг	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РЕАЛГІН	ПАТ "Лубнифарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп.	500мг/2мг/0, 02мг/мл	№5, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РЕНАЛГАН®	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	табл. у бл.	500мг/5мг/0, 1мг	№10x1	35,00	
	РЕНАЛГАН®	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	табл. у бл.	500мг/5мг/0, 1мг	№10x2	70,00	
	РЕНАЛГАН®	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл, 5мл в амп. у пач. та бл.	500мг/2мг/0, 02мг/мл	№5, №10, №100, №5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РЕНАЛГАН®	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у пач.	500мг/2мг/0, 02мг/мл	№100	1798,00	
	РЕНАЛГАН®	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у бл	500мг/2мг/0, 02мг/мл	№100	1798,00	
	РЕНАЛГАН®	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у бл.	500мг/2мг/0, 02мг/мл	№5x2	89,90	
	РЕНАЛГАН®	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у бл	500мг/2мг/0, 02мг/мл	№5x1	89,90	
	РЕОНАЛЬГОН®	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	табл. у бл.	500мг/5мг/0, 1мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РЕОНАЛЬГОН®	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	табл. у бл.	500мг/5мг/0, 1мг	№10x1	37,00		
II.	БАРАЛГІН®	Мікро Лабс Лімітед, Індія	табл. у бл.	500мг/5мг/0, 1мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БАРАЛГІН®	Мікро Лабс Лімітед, Індія	табл. у бл.	500мг/5мг/0,	№10x10	400,95	24,82/\$

				1мг		
	СПАЗМАЛГОН®	АТ "Софарма", Болгарія	р-н д/ін'єк. по 2мл, 5мл в амп. у бл.	500мг/2мг/0,		відсутня у реєстрі ОВЦ
02м г/мл	№5х1, №10х1					відсутня у реєстрі ОВЦ
II.	СПАЗМАЛГОН®	Балканфарма-Дупниця АТ/АТ "Фармацевтична і Хімічна Індустрія, Здравле", Болгарія/Сербія	табл. у бл.	500мг/5мг/0,		відсутня у реєстрі ОВЦ
1мг	№10, №20, №50					відсутня у реєстрі ОВЦ
II.	СПАЗМІЛ-М	АТ "Фармацевтичні заводи Мілве" (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка)/АТ "Софарма" (дозвіл на випуск серії), Болгарія/Болгарія	табл. у бл.	500мг/5,25мг		відсутня у реєстрі ОВЦ
/0,1 мг	№10х2					відсутня у реєстрі ОВЦ

- **Метамізол натрію + Парацетамол + Кофеїн-бензоат натрію + Фенобарбітал + Кодеїн (Metamizole sodium + Paracetamol + Caffeine and sodium benzoate + Phenobarbital + Codeine)**

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ПЕНТАЛГІН ІС®	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. у бл.	300мг/200мг/50мг/10мг/9,5мг	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПЕНТАЛГІН ІС®	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. у бл. в пач.	300мг/200мг/50мг/10мг/9,5мг	№10х1	17,00	
	ПЕНТАЛГІН ФС ЕКСТРА КАПСУЛИ	ТОВ "Фарма Старт", Україна	капс. у бл.	150мг/150мг/25мг/5мг/4мг	№10х1, №10х2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПЕНТАЛГІН-ФС	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл. в пач. та без	300мг/300мг/50мг/10мг/8мг	№10, №10х1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	П'ЯТИРЧАТКА® ІС	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл., у бл.	300мг/200мг/50мг/10мг/9,5мг	№10х1	19,00	

- **Метамізол натрію + Кофеїн + Тіамін (Metamizole sodium + Coffeine + Thiamine)****

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	СЕДАЛГІН ПЛЮС	Балканфарма-Дупниця АТ, Болгарія	табл. у бл.	500мг/50мг/38,75мг	№10, №20, №50	відсутня у реєстрі ОВЦ	

- **Метамізол натрію + Темпідон (Metamizole sodium + Tempidone)****

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ТЕМПАЛГІН®	АТ "Софарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка або	табл., в/о у бл.	500мг/20мг	№10х1, №10х2	відсутня у реєстрі ОВЦ	

		виробництво за повним циклом)/АТ "Вітаміни" (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії), Болгарія/Україна				
	ТЕМПАЛГІН®	АТ "Софарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка або виробництво за повним циклом)/ПАТ "Вітаміни" (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії), Болгарія/Україна	табл., в/о у бл.	500мг/20мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ

10.4. Міорелаксанти з периферичним та центральним механізмом дії

10.4.1. Міорелаксанти з периферичним механізмом дії

- **Суксаметоній (Suxamethonium) ***

Фармакотерапевтична група: М03АВ01 - міорелаксанти; похідні холіну.

Основна фармакотерапевтична дія: деполаризуючий міорелаксанти короткої дії; за хімічною будовою - подвоєна молекула ацетилхоліну; має високу спорідненість з постсинаптичним нервово-м'язовим рецептором, конкурентно блокує нервово-м'язову передачу, викликає деполаризацію постсинаптичної мембрани та короточасну релаксацію скелетних м'язів; швидко руйнується псевдохолінестеразою з утворенням холіну та бурштинової кислоти, через що ефект дитиліну є короточасним; після в/в введення дія проявляється через 2-3 хв. і зберігається в повному обсязі до 3 хв.

Показання для застосування ЛЗ: міорелаксація при інтубації трахеї, ендоскопічних процедурах^{ВООЗ} (бронхо-, езофаго-, ларинго-, цистоскопія), короточасні операції, що вимагають міорелаксації^{БНФ} (вправлення вивихів, репозиція уламків кістки), підтримання міоплегії при оперативних втручаннях (гінекологічних, торакальних, абдомінальних), усунення судом при правці.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують в/в болюсно, інфузійно або в/м; дозу встановлювати індивідуально з урахуванням маси тіла, реакції пацієнта, ступеня необхідної м'язової релаксації, шляху введення; ендотрахеальна інтубація: дорослим вводити в/в по 1мг/кг, доза спричиняє м'язову релаксацію через 30-60 сек., що триває 2-6 хв.; додаткові дози, що становлять 50%-100% від початкової дози, вводити з інтервалами 5-10 хв.^{ВООЗ}, підтримують м'язову релаксацію протягом короточасного хірургічного втручання під загальною анестезією; для тривалого розслаблення мускулатури протягом усієї операції можна вводити у вигляді інфузій 0,1-0,2 % р-ну, розведеного у 5 % р-ні глюкози або 0,9 % р-ні натрію хлориду зі швидкістю 2,5-4 мг/хв; заг. доза при повторних в/в ін'єк. або безперервній інфузії не повинна перевищувати 500 мг/год^{ВООЗ}; дітям від 1 року рекомендована в/в доза - 1 мг/кг; при введенні дітям шляхом в/в інфузії дозу визначати як для дорослих, але початкову швидкість інфузії знижувати пропорційно до маси тіла; рекомендована в/м доза - до 4 мг/кг; ці дози спричиняють м'язову релаксацію тривалістю на 3 хв.; сумарна доза не має перевищувати 150 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: підвищення ВТ; гіперсалівація, підвищення внутрішньошлункового тиску, ризик регургітації і потрапляння шлункового вмісту в дихальні шляхи; порушення функції печінки; гіперглікемія, транзиторне підвищення рівня калію; АГ, артеріальна гіпотензія, припливи, брадикардія, асистолія, тахікардія, аритмія (шлуночкової аритмії), порушення серцевої провідності, кардіогенний шок, зупинка серця, колапс; апное, бронхоспазм, пролонгований параліч дихальних м'язів (пов'язаний з генетично зумовленим порушенням продукування псевдохолінестерази); поява м'язового болю через 10-12 год. після введення, фасцикуляції м'язів, тризм, рабдоміоліз із наступним розвитком міоглобінемії та міоглобінурії; почервоніння шкіри, висипання, гіперчутливість, анафілактичний шок; гіпертермія, зміни у місці введення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів ЛЗ, глаукома, міастенія, г. печінкова недостатність, виражена анемія, злаякісна гіпертермія в анамнезі, атипова активність холінестерази плазми крові; гіперкаліємія при великих травмах чи опіках, при довготривалій іммобілізації хворого, паралічі скелетних м'язів; гіперкаліємія, пов'язана з нирковою недостатністю; відкрита травма ока та випадки, коли підвищення ВТ є небажаним; міопатія скелетних м'язів, рабдоміоліз; одночасне застосування ЛЗ, що підвищують чутливість до суксаметонію.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	ДИТИЛІН-БІОЛІК	АТ "БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у пач.	20 мг/мл	№5, №10		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ДИТИЛІН-БІОЛІК	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у пач.	20мг/мл	№5		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ДИТИЛІН-БІОЛІК	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у пач.	20мг/мл	№10	61,74	

ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	20мг/мл	№5x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. в кор. або у конт. чар/уп.	20мг/мл	№10, №5x2	98,87	

• **Піпекуронію бромід (Pipcuronium bromide)**

Фармакотерапевтична група: M03AC06 - міорелаксанти з периферичним механізмом дії.

Основна фармакотерапевтична дія: недеполяризуючий нервово-м'язовий блокатор тривалої дії; за рахунок компетитивного зв'язку з нікотин-чутливими рецепторами ацетилхоліну, розташованими в моторних закінченнях поперечно-смугастих м'язових волокон, блокує передачу сигналу від нервових закінчень до м'язових волокон; антидоти піпекуронію броміду - інгібітори ацетилхолінестерази (неостигмін, піридостигмін, ендорфоній); не спричиняє м'язової фасцикуляції; не чинить гормональної дії; не має гангліоблокуючої, ваголітичної та симпатоміметичної активності; максимальна дія залежить від дози і настає через 1,5-5 хв.

Показання для застосування ЛЗ: міорелаксація на фоні загальної анестезії для полегшення ендотрахеальної інтубації та проведення хірургічних втручань, що вимагають більш ніж 20-30-хвилинної міорелаксації

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують в/в; дозу підбирають для кожного пацієнта індивідуально, з урахуванням типу анестезії, передбачуваної тривалості хірургічного втручання, можливих взаємодій з іншими ЛЗ, які використовуються до або під час анестезії, супутніх захворювань і загального стану хворого; застосовувати стимулятор периферичних нервів для забезпечення контролю нервово-м'язового блоку; дорослим: початкова доза для інтубації і наступного хірургічного втручання - 0,06-0,08 мг/кг, забезпечує умови для інтубації протягом 150-180 сек., тривалість м'язової релаксації - 60-90 хв; початкова доза для міорелаксації при інтубації з використанням сукцинілхоліну - 0,05 мг/кг, забезпечує 30-60-хв. міорелаксацію; підтримуюча доза 0,01-0,02 мг/кг, забезпечує 30-60-хв. міорелаксацію під час хірургічної операції; діти: у разі комбінованого наркозу початкова доза для дітей 1-14 років - 0,08-0,09 мг/кг; для новонароджених та дітей до 1 року - 0,04-0,06 мг/кг; зазначені дози забезпечують релаксацію при 25-35 - хв. хірургічному втручанні; при необхідності подовження міорелаксації ще на 25-35 хв піпекуронію бромід вводять повторно у дозі, що становить 1/3 від початкової дози; можливе подовження часу дії в наступних випадках: надлишкова вага тіла, ожиріння (при підборі дози виходити з ідеальної ваги тіла), одночасне застосування інгаляційних анестетиків (дозу пірекуронію можна зменшити), під час інтубації із сукцинілхоліном (пірекуронію бромід вводять після зникнення клінічних ознак дії сукцинілхоліну, його введення після деполаризуючого міорелаксantu скорочує час, необхідний для настання міорелаксації, і збільшує тривалість максимального ефекту); припинення ефекту при 80-85 % блокаді, виміряної за допомогою стимулятора периферичних нервових волокон, або при частковій блокаді, визначеній за клінічними ознаками, застосування атропіну (дорослим у дозі 0,5-1,25 мг) у комбінації з неостигміном (дорослим у дозі 1-3 мг) або галантаміном (дорослим у дозі 10-30 мг) припиняє міорелаксуючу дію ЛЗ.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анафілактичні та анафілактоїдні реакції; підвищення рівня креатиніну, гіпоглікемія, гіперкаліємія; тетанія; сонливість; гіпестезія, пригнічення центральної нервової системи; параліч; блефарит, птоз повік; інсульт, тромбоз, ішемія міокарда, фібриляція передсердь, шлуночкова екстрасистолія; аритмія, брадикардія, пригнічення роботи серця, тахікардія і фібриляція шлуночків, АГ, гіпотензія, вазодилатація; пригнічення дихання, ларингоспазм, ателектаз; апное, задишка, гіповентиляція легенів, бронхоспазм, кашель; м'язова атрофія, утруднена інтубація; м'язова слабкість; висипання, кропив'янка; анурія; незначне зниження рівня калію, магнію, кальцію у плазмі крові; підвищення рівня глюкози; збільшення концентрації сечовини у крові; зменшення ЧСС.

Протипоказання до застосування ЛЗ: відома підвищена чутливість до пірекуронію броміду або до будь-якої допоміжної речовини ЛЗ; міастенія.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АРКУРОН	АТ "БІОЛІК", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. в амп.	4 мг	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АРКУРОН	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. в амп.	4 мг	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	АРДУАН®	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	4мг	№5x5	1484,81	28,02/\$

• **Рокуронію бромід (Rocuronium bromide)**

Фармакотерапевтична група: M03AC09 - міорелаксанти з периферичним механізмом дії.

Основна фармакотерапевтична дія: швидкодіючий, середньої тривалості дії, недеполяризуючий міорелаксant, що має всі фармакологічні ефекти, характерні для цього класу ЛЗ (курареподібних); блокує н-холінорецептори кінцевої пластинки рухового нерва скелетного м'яза; антагоністами цієї дії є інгібітори ацетилхолінестерази (неостигмін, ендорфоній, піридостигмін).

Показання для застосування ЛЗ: як додатковий засіб дорослим та дітям (0-18 років) при загальній анестезії для полегшення інтубації трахеї під час звичайної послідовної індукції анестезії і для забезпечення релаксації

скелетної мускулатури під час хірургічних операцій; дорослим - для полегшення інтубації трахеї під час швидкої послідовної індукції анестезії і як додатковий засіб для проведення ШВЛ у відділеннях інтенсивної терапії^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводиться в/в болюсно або безперервно інфузійно; дозу підбирати індивідуально для кожного пацієнта; при підборі дози брати до уваги метод анестезії і очікувану тривалість операції, метод премедикації та очікувану тривалість ШВЛ, можливу взаємодію з іншими ЛЗ, що вводяться одночасно, а також загальний стан пацієнта; для оцінки ефективності нервово-м'язової блокади і відновлення нервово-м'язової провідності використовувати відповідну методику нервово-м'язового моніторингу; коригувати дозу шляхом введення найменших підтримуючих доз ЛЗ через більші інтервали часу або ж максимального зниження швидкості інфузії під час тривалих (більше 1 год.) процедур, що проводяться із застосуванням інгальційного наркозу; дорослі: стандартна доза для проведення ендотрахеальної інтубації під час звичайної анестезії складає 0,6 мг/кг^{БНФ}, після якої адекватні умови для інтубації трахеї встановлюються приблизно через 60 сек.; при проведенні швидкої послідовної індукції анестезії рекомендована доза - 1 мг/кг; при застосуванні в дозі 0,6 мг/кг маси тіла для проведення швидкої послідовної індукції анестезії рекомендується проводити інтубацію трахеї пацієнта через 90 сек. після введення; застосування рокуронію броміду протягом швидкої послідовної індукції анестезії пацієнтам, яким проводиться кесарів розтин: може бути використаний як частина методу швидкої послідовної індукції анестезії (якщо при цьому не очікується виникнення ускладнень при інтубації) та введено достатню дозу анестетика, або після інтубації з введенням суксаметонію; застосовують лише у дозуванні 0,6 мг/кг (безпечно дозування для породіль, які перенесли кесарів розтин); підтримуюча доза під час хірургічних процедур: рекомендована підтримуюча доза - 0,15 мг/кг^{БНФ}; у разі тривалого інгальційного наркозу її зменшити до 0,075 - 0,1 мг/кг; підтримуючі дози вводити у той момент, коли амплітуда м'язових скорочень відновиться до 25% від контрольного рівня або при появі 2-3 відповідей при моніторингу у режимі послідовної чотирирозрядної стимуляції (TOF); для безперервної інфузії навантажувальна доза складає 0,6 мг/кг^{БНФ}, коли нервово-м'язова провідність почне відновлюватися, почати інфузійне введення; швидкість інфузії підібрати так, щоб коротлива реакція скелетних м'язів знаходилася на рівні 10 % від контрольного рівня або підтримки 1-2 відповідей при моніторингу в режимі чотирирозрядної стимуляції; у дорослих при в/в загальній анестезії швидкість інфузії, необхідна для підтримки нервово-м'язового блоку на цьому рівні, 0,3-0,6 мг/кг/год, а при інгальційному наркозі - 0,3-0,4 мг/кг/год; діти: для новонароджених (0-27 днів), немовлят (28 днів-2 міс.), дітей раннього віку (3 міс.-23 міс.), дітей старшого віку (2-11 років) і підлітків (12-17 років) рекомендована доза для інтубації під час звичайної анестезії і підтримувальна доза такі ж самі, як і для дорослих^{БНФ}; під час безперервного введення ЛЗ дітям (за винятком дітей 2-11 років, яким може бути необхідною вища швидкість інфузії) швидкість інфузії така ж, як і для дорослих; для дітей 2-11 років початкові швидкості інфузії рекомендуються такі ж, як і для дорослих і під час процедури вони повинні бути скориговані для підтримки амплітуди м'язових скорочень на рівні 10% від контрольної амплітуди або для підтримки 1-2 відповідей при моніторингу в режимі чотирирозрядної стимуляції; досвід застосування рокуронію броміду при швидкій послідовній індукції у дітей є обмеженим, тому рокуронію бромід не рекомендується для покращення умов трахеальної інтубації під час швидкої послідовної індукції у дітей; застосування у відділенні інтенсивної терапії: при ендотрахеальній інтубації у відділенні інтенсивної терапії застосовують ті самі дози, що й при хірургічних втручаннях; рекомендована початкова навантажувальна (підтримуюча доза) становить 0,6 мг/кг^{БНФ} з подальшою безперервною інфузією відразу після того, як ступінь м'язових скорочень відновиться до 10 % від контрольного рівня або буде отримано 1-2 відповіді при моніторингу у режимі чотирирозрядної стимуляції; дози рокуронію броміду титрувати залежно від ефективності у кожного окремого пацієнта; рекомендована початкова швидкість інфузії для підтримки нервово-м'язової блокади на рівні 80-90% (1-2 відповідей при стимуляції у режимі TOF) у дорослих пацієнтів становить 0,3-0,6 мг/кг/год протягом першої год. введення^{БНФ}, після чого протягом 6-12 год. знижувати швидкість введення відповідно до індивідуальної реакції пацієнта; не застосовувати для проведення ШВЛ при інтенсивній терапії дітей та хворих літнього віку.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: підвищена чутливість, анафілактична/анафілактоїдна реакція, анафілактичний/анафілактоїдний шок; в'ялий параліч; тахікардія; с-м Коуніса; гіпотензія; судинний колапс/шок, припливи крові; бронхоспазм; ангіоневротичний набряк, кропив'янка, висип, еритематозний висип; слабкість м'язів, стероїдна міопатія; неефективність ЛЗ, послаблення дії ЛЗ/терапевтичного ефекту, посилення дії ЛЗ/терапевтичного ефекту, біль у місці ін'єк., реакція у місці ін'єк.; набряк обличчя; подовження нервово-м'язової блокади, затримане відновлення після анестезії/Подовження нервово-м'язової блокади, затримане відновлення після анестезії; ускладнення анестезії з боку ДШ

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до рокуронію, бромідів, або до будь-якої допоміжної речовини ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕСМЕРОН®	Н.В.Органон (виробництво in bulk, первинне/вторинне пакування, контроль якості та випуск серії)/Хамельн рдс а.с. (альтернативний контроль якості)/Сігфрід Хамельн ГмбХ (виробництво in bulk, первинне пакування та контроль якості), Нідерланди/Словаччина/Ні	р-н д/ін'єк. по 5мл у фл.	10мг/мл	№10	822,74	28,05/\$

		меччина					
РОКУРОНІЙ КАБІ	Фрезеніус Кабі Австрія Гмбх, Австрія	р-н д/ін'єк. по 5мл, 10мл у скл. фл.	10 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОВЦ		
РОКУРОНІЙ КАБІ	Фрезеніус Кабі Австрія Гмбх, Австрія	р-н д/ін'єк. по 5мл, 10мл у скл. фл.		№10	787,65	32,72/€	

● **Атракуріум (Atracurium) ***

Фармакотерапевтична група: М03АС04 - міорелаксанти з периферичним механізмом дії; інші сполуки четвертинного амонію.

Основна фармакотерапевтична дія: високоселективний міорелаксанти периферичної дії недеполяризуючого конкурентного типу, з середньою тривалістю дії; блокує Н-холінорецептори кінцевих пластинок скелетних м'язових волокон і перешкоджає деполаризуючій дії ацетилхоліну, в результаті чого виникає пригнічення нервово-м'язової передачі на рівні постсинаптичної мембрани.

Показання для застосування ЛЗ: для міорелаксації при хірургічних втручаннях і діагностичних процедурах^{БНФ} (за наявності засобів для проведення ендотрахеальної інтубації та ШВЛ).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовується в/в ін'єк. або у вигляді тривалої інфузії; застосування у дорослих: в/в у вигляді болюсної ін'єк., у дозуванні 0,3-0,6 мг/кг^{БНФ}, залежно від необхідної тривалості повної нервово-м'язової блокади і забезпечує адекватну релаксацію протягом 15-35 хв.; ендотрахеальну інтубацію проводити протягом перших 90 сек. після в/в введення в дозах 0,5-0,6 мг/кг; за необхідності подовження блокуючої дії додатково вводити в дозах 0,1-0,2 мг/кг^{БНФ}; правильне додаткове дозування не збільшує кумулятивного ефекту нервово-м'язової блокади; відновлення нормальної нервово-м'язової передачі відбувається через 35 хв.; нервово-м'язову блокаду, спричинену застосуванням атракуріуму, можна усунути стандартними дозами антихолінергічних ЛЗ; після початкового введення болюсної дози 0,3-0,6 мг/кг подальше підтримання нервово-м'язової блокади під час тривалого хірургічного втручання здійснюється шляхом тривалої в/в інфузії у дозуванні 0,3-0,6 мг/кг/год.; може застосовуватись шляхом в/в інфузій під час аортокоронарного шунтування; при необхідності гіпотермії тіла до t° 25-26°C зменшується рівень інактивації атракуріуму, тому для підтримання повної нервово-м'язової блокади у цьому разі швидкість інфузійного введення може бути зменшена наполовину; атракуріум застосовують у дітей старше 1 міс/ у тих же дозових режимах, що і для дорослих^{БНФ}, розраховуючи дозу на масу тіла дитини; хворі, які лікуються у палатах інтенсивної терапії: після введення необхідної початкової болюсної дози 0,3-0,6 мг/кг^{БНФ} подальше підтримання нервово-м'язової блокади забезпечується постійною в/в інфузією зі швидкістю 11-13 мкг/кг/хв (0,65 - 0,78 мг/кг/год); існує широка індивідуальна варіабельність у дозовому режимі введення, що може змінюватись з часом; деяким хворим може бути необхідна більш низька швидкість введення - 4,5 мкг/кг/хв (0,27 мг/кг/год), іншим - вища 29,5 мкг/кг/хв (1,77 мг/кг/год); швидкість відновлення нервово-м'язової передачі у хворих не залежить від тривалості застосування та становить 32-108 хв.; з метою індивідуалізації дозового режиму контролювати функціонування нервово-м'язової передачі.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпотензія (помірна, транзиторна), гіперемія шкіри; тяжкі анафілактоїдні/ анафілактичні реакції, шок, циркуляторна недостатність, зупинка серця; кропив'янка; бронхоспазм; судоми (у пацієнтів з факторами схильності до судом: травма голови, набряк мозку, вірусний енцефаліт, гіпоксична енцефалопатія, уремія), міопатія, м'язова слабкість.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до атракуріуму, цисатракуріуму або бензолсульфонової к-ти.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АТРАКУРІУМ-НОВО	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/ін'єк. по 2,5мл у фл. в конт. чар/уп.	10мг/мл	№5x1	170,00	
	АТРАКУРІУМ-НОВО	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл у фл. в конт. чар/уп.	10мг/мл	№5x1	254,00	
II.	АТРАКУРІЙ КАЛЦЕКС	АТ "Калцекс" (виробник, який відповідає за випуск серії)/АТ "Гріндекс" (виробник, який відповідає за контроль серії/випробування)/ХБМ Фарма с.р.о. (всі стадії виробничого процесу, крім випуску серії), Латвія/Латвія/Словаччина	р-н д/ін'єк. по 2,5мл в амп. у конт. пласт/уп.	10мг/мл	№5	161,10	26,85/€

АТРАКУРІЙ КАЛЦЕКС	АТ "Калцекс" (виробник, який відповідає за випуск серії)/АТ "Гріндекс" (виробник, який відповідає за контроль серії/випробування)/ХБМ Фарма с.р.о. (всі стадії виробничого процесу, крім випуску серії)), Латвія/Латвія/Словаччина	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у конт. пласт/уп.	10мг/мл	№5	241,65	
ТРАКРІУМ™	ГлаксоСмітКляйн Мануфактуринг С.П.А., Італія	р-н д/ін'єк. по 2,5мл в амп. у конт. пласт/уп.	10мг/мл	№5	176,00	25,32/\$
ТРАКРІУМ™	ГлаксоСмітКляйн Мануфактуринг С.П.А., Італія	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у конт. пласт/уп.	10мг/мл	№5	246,00	25,32/\$

10.4.2. Міорелаксанти з центральним механізмом дії

• **Баклофен (Baclofen)**

Фармакотерапевтична група: М03ВХ01 - міорелаксанти центральної дії.

Основна фармакотерапевтична дія: міорелаксанти, що діє на рівні спинного мозку; зменшує підвищений тонус м'язів, зумовлений ураженням спинного мозку; пригнічує шкірні рефлекси і тонус м'язів, незначно знижує амплітуду сухожильних рефлексів; механізм дії складається з гіперполяризації висхідних нервів і гальмуванні моно- та полісинаптичних рефлексів на рівні спинного мозку; оскільки баклофен у великих дозах може викликати пригнічення функцій ЦНС, існує вірогідність дії на центри, які знаходяться вище спинного мозку; зменшує больові флексорні спазми та спонтанні м'язові скорочення, завдяки чому покращується рухливість пацієнта та зменшується залежність від допомоги інших людей; зменшує больову чутливість^{БНФ}, стимулює шлункову секрецію.

Показання для застосування ЛЗ: спастичні стани під час: розсіяного склерозу^{БНФ}; інших уражень спинного мозку (пухлини спинного мозку, сирингомієлія, хвороба рухового нейрона, поперековий мієліт, травми спинного мозку^{БНФ}); мозкових інсультів; церебрального паралічу; запалення оболонок спинного і головного мозку; травм голови; дітям - при симптоматичному лікуванні спастичних станів церебрального ґенезу, що виникли у результаті ДЦП, а також внаслідок церебральних судинних інцидентів через новоутворення або захворювання головного мозку дегенеративного ґенезу

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати р/ос під час їжі; дозу встановлювати індивідуально визначаючи найменшу ефективну дозу, яка не спричиняє побічних ефектів; до початку лікування визначити максимальну ефективність лікування баклофеном; дорослі: розпочинати з добової дози - 15 мг, розподіленої на кілька рівних прийомів; рекомендовані схеми дозування: 5 мг Зр/добу (день 1-3)^{БНФ}, 10 мг Зр/добу (день 4-6), 15 мг Зр/добу (день 7-9), 20 мг Зр/добу (день 10-12); терапевтичний ефект настає при дозі 30-75 мг/добу, за необхідності дозу можна з обережністю та поступово підвищувати; МДД - не вище 100 мг^{БНФ}; діти: лікування розпочати з низької дози (що відповідає дозі у перерахуванні 0,3 мг/кг/добу), на 2-4 прийоми (краще 4 рівні прийоми), для дітей дозу підвищувати з обережністю, з інтервалом в 1 тижд., до досягнення оптимального терапевтичного ефекту у дитини, добова доза підтримуючої терапії - 0,75-2 мг/кг^{БНФ}, МДД - не вище 40 мг (для дітей до 8 років) та 60 мг (для дітей від 8 років); у вигляді табл. не призначати дітям з масою тіла менше 33 кг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сплутаність свідомості, сонливість, безсоння, дезорієнтація, ейфорія, збудження, депресія, галюцинації, кошмарні сновидіння, марення, зниження судомної готовності, збільшення кількості судомних приступів (особливо у пацієнтів з епілепсією) синдром апное під час сну; сонливість, седація, дихальна депресія, відчуття пустоти у голові, втомлюваність, головний біль, атаксія, парестезії, порушення мовлення, розлад смаку, вертиго, шум у вухах; порушення зору, порушення акомодатії, ністагм; пригнічення СС системи, зниження хвилинного об'єму серця, почуття задухи, дуже часте серцебиття, біль у грудній клітці; зниження АТ, запаморочення, набряки стоп; нудота, сухість у роті, розлад смаку, відраза до їжі, позиви до блювання, блювання, запор, діарея, болі у животі; порушення функції печінки; висипання, підвищене потовиділення, свербіж, кропив'янка; слабкість, біль у м'язах, тремор, м'язове тремтіння; поліурія, нетримання сечі, сечовипускання з болем, затримка сечовипускання, нічний енурез, гематурія, анурія; порушення еякуляції, порушення ерекції, імпотенція; збільшення маси тіла; пригнічення дихання, відчуття закладеності носа; Слабкість, втомлюваність, виснаження, гіпотермія; позитивний результат аналізу на скриту кров у калі, зміни цукру в крові

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до баклофену або до будь-якої допоміжної речовини ЛЗ, виразкова хвороба шлунка і ДПК у стадії загострення, порфірія.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 50 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БАКЛОФЕН	Фармацевтичний Завод "Польфарма" С.А., Польща	табл. у фл.	10мг	№50	14,76	25,02/\$
	БАКЛОФЕН	Фармацевтичний Завод "Польфарма" С.А., Польща	табл. у фл.	25мг	№50	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Тизанідин (Tizanidine)** (див. п. 8.10.2. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

• **Толперизон (Tolperisone)** (див. п. 8.10.1. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

10.5. Кровозамінники та перфузійні розчини

Вміст води в організмі. Об'єм води в організмі людини перевищує вміст усіх інших хімічних речовин (у людей середнього віку загальний вміст води сягає 55-60 % маси тіла (МТ)). З віком спостерігається зниження вмісту води до 45-55 %.

Рідина в організмі розподіляється за водними секторами: внутрішньоклітинний простір (до 66 % загальної води); міжклітинний простір (до 72,5 % позаклітинної води); внутрішньосудинний простір (25 % позаклітинної води); трансцелюлярна рідина, або рідина природних порожнин (до 2,5 % позаклітинної води).

В клініці виділяють також поняття «**третього водного простору**», що використовується тільки для характеристики патологічних станів. «Третій водний простір» включає рідину, яка накопичується в серозних порожнинах у разі асцити, плевриту, перикардиту, перитоніту; в глибоких шарах шкіри при опіках та інших патологічних станах.

Потреби організму у воді тісно пов'язані з рівнем основного обміну: в нормі вони становлять приблизно 1 мл на кожну калорію енергії, що виробляється організмом.

Для обчислення об'ємів інфузійної терапії корисно спочатку розрахувати добову потребу хворого у рідині. Для цього існують декілька формул, однією з яких (і найпопулярнішою) є **правило «4+2+1»**. Згідно з цією формулою, потреби хворого у рідині залежать від маси тіла та розраховуються наступним чином (таблиця 1).

Таблиця 1

Розрахунок щогодинної потреби в рідині на:
• перші 10 кг ваги – по 4 мл/кг/год;
• з 11 до 20 кг ваги – по 2 мл/кг/год;
• з 21 кг – по 1 мл/кг/год
Park GR, Roe PG, 2005

Вміст води в організмі визначається рівновагою між її надходженням та виділенням. Об'єм позаклітинного простору та вміст в ньому електролітів залежать від надходження рідини та її втрат за рахунок випаровування та ниркової регуляції. Обсяги калу, блювотних мас або відсмоктаних рідин необхідно ретельно обраховувати. Отримані результати враховуються при плануванні програми та складу інфузійної терапії.

Нижче, в табл. 2. надаємо склад і осмолярність найбільш поширених кристалоїдних розчинів, які можна використовувати для корекції виявлених порушень водно-електролітного балансу.

Таблиця 2.

Склад розчинів, які використовують для корекції водно-електролітних розладів

Назва	Осмолярність (мосм/л)	Na	Cl	K	Ca	Mg	Буфер, мЕкв/л	Вуглевод, г/л
		ммоль/л						
Глюкоза 5%	278	-	-	-	-	-	-	Глюкоза 50
ГіК	320	-	-	67	-	-	-	Глюкоза 50
0,9% NaCl	308	154	154	-	-	-	-	-
Розчин Рінгера	320	147	160	4	4,5	-	-	-
Р-н Рінгер-Локка	329	140	143	2,6	1,8	-	Бікарбонат - 24	Глюкоза 5,5
Р-н Рінгер-лактатний	270	130	109	4	2	-	Лактат - 27	-
Дисоль	252	126	103	-	-	-	Ацетат - 23	-
Ацесоль	244	109	99	13	-	-	Ацетат - 23	-
Трисоль	292	133	99	13	-	-	Бікарбонат - 47	-
Глюксил	287	147	155	4	2,2	-	-	Глюкоза 5,6 мЕкв/л

У більшості клінічних ситуацій лікар повинен відкоригувати наявні у хворого порушення швидко, якісно та з мінімальним ризиком розвитку побічних ефектів. Оптимальним способом усунення зазначених порушень є в/в крапельне введення лікарських засобів. Ця рекомендація ґрунтується на багатьох аргументах:

1. При будь-якому шляху введення (крім в/в) до системного кровотоку потрапляє лише частина введеної дози лікарського засобу (ЛЗ). Тільки при в/в введенні біодоступність ЛЗ дорівнює 100 %.
2. В/в спосіб введення забезпечує надійний та відтворюваний ефект, дозволяє використовувати дози, що точно відповідають бажаному результату, а також звести до мінімуму індивідуальні відмінності у реакції на ЛЗ.
3. Більшість ЛЗ, рекомендованих для в/в застосування, потрібно вводити повільно, щоб уникнути ускладнень, зумовлених швидким збільшенням концентрації ЛЗ у плазмі; чим вищий темп введення ЛЗ, тим менша його частина зв'яжеться з білком і досягне свого органу-мішені.
4. В лікуванні багатьох патологічних станів важливо в першу чергу створити ефективну концентрацію ЛЗ в крові, що дасть сприятиме прояву їх терапевтичних ефектів (введення р-нів кристалоїдів та колоїдів при гіповолемії та крововтраті, інсуліну - при діабетичному кето ацидозі тощо). Тому часто раціональною є терапія, що розпочинається з в/в введення ЛЗ (досягнення ефективної концентрації), а потім, за потреби та технічної можливості, здійснюється перехід на пероральний або інший шлях введення ЛЗ.
5. Слід пам'ятати ще й про так звані «традиційні» для інфузійної терапії завдання – відновлення ОЦК у разі гіповолемії та крововтрати, поповнення дефіциту деяких речовин, втрачених внаслідок захворювання (фактори згортання крові, білки, вуглеводи, ліпіди), підтримка енергетичного балансу організму (усі різновиди парентерального харчування).

Основні завдання, які можна вирішити за допомогою інфузійної терапії, є наступними:

- Відновлення екстра- та інтрацелюлярного об'єму при дегідратації, яку викликає втрата рідини при різних патологічних процесах (кровотеча, г. гіповолемія внаслідок порушення функції ШКТ, інфекційних захворювань тощо).
- Ліквідація порушень обміну речовин (декомпенсація ЦД, лікування ниркової недостатності).
- Поліпшення реологічних властивостей крові (всі види розладів периферичного кровообігу).
- Покращення мікроциркуляції та перфузії тканин (лікування с-му порушення мікроциркуляції крові).

- Корегування гемостатичного потенціалу крові (введення складових частин коагуляційної та антикоагуляційної систем).
- Відновлення електролітного, осмотичного та кислотно-лужного балансу (при г. та хр. розладах відповідних показників гемостазу).
- У якості компонента дезінтоксикаційної терапії (ендо- та екзоінтоксикації, г. отруєння).
- Лікування больового с-му та гіпертермії (введення інфузійних аналгетиків та антипіретиків).
- Покращення доставки ліків до патологічного вогнища.

Для того, щоб максимально безпечно для хворого провести інфузійну терапію та уникнути розвитку побічних ефектів, потрібно дотримуватися наступних **правил**:

- Обов'язково враховувати всі показання та протипоказання до введення інфузійних ЛЗ.
- Перед введенням інфузійного засобу уважно вивчати склад ЛЗ та інструкцію до його застосування.
- Ніколи не будувати всю програму інфузійної терапії, використовуючи лише один ЛЗ. Рациональне поєднання різних засобів дозволяє зменшити кількість та вираженість побічних ефектів.
- Не перебільшувати максимально рекомендованих разових та добових доз.
- Контролювати темп інфузій. Для більшості пацієнтів безпечним є введення р-ну зі швидкістю 20-30 крап/хв.
- Ретельно спостерігати за станом пацієнта як під час інфузії так і після неї, а за потреби – контролювати рівень важливих біохімічних показників (наприклад, у хворих на ЦД – рівень глікемії, кетонемії тощо).

Дотримання цих вимог зробить інфузійну терапію ефективною та безпечною.

10.5.1. Білкові фракції крові

- **Розчин альбуміну людини (Albumin)**

Фармакотерапевтична група: В05AA01 - кровозамінники та білкові фракції плазми крові.

Основна фармакотерапевтична дія: білкова фракція плазми людини; має гіперонкотичний ефект; бере участь в онкотичному тиску крові та її транспортних функціях; стабілізує циркулюючий об'єм крові, переносить гормони, ензими, ЛЗ та токсини.

Показання для застосування ЛЗ: відновлення та підтримка об'єму циркулюючої крові при наявному дефіциті об'єму^{БНФ} та якщо показане застосування колоїду; застосування альбуміну або штучного колоїду залежатиме від клінічного стану пацієнта згідно з офіційними рекомендаціями.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати в/в або розводити ізотонічним р-м; концентрацію, дозування та швидкість інфузії підбирати залежно від індивідуальних потреб пацієнта; необхідна доза залежить від маси тіла пацієнта, ступеня тяжкості травми або захворювання і від втрат рідини та протеїну; для встановлення необхідної дози використовувати визначення достатності об'єму циркулюючої крові, а не рівні альбуміну в плазмі крові; якщо потрібно вводити альбумін людини, тоді регулярно перевіряти гемодинамічні характеристики, що включають: АТ та ЧСС, центральний венозний тиск, тиск заклинювання у легеневій артерії, діурез, концентрацію електролітів, гематокрит/Нв; можна вводити пацієнтам на ГД; швидкість інфузії підбирати відповідно індивідуальних обставин і показань; при заміщенні плазми, швидкість інфузії коригувати відповідно до швидкості виведення.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: почервоніння обличчя (припливи крові), кропив'янка, підвищення температури тіла (гарячка), нудота; шок, АР, анафілактична реакція, гіперволемія (головний біль, задишка, застій в яремних венах, підвищення АТ, набряк легень)

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до ЛЗ альбуміну або до будь-яких допоміжних речовин ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АЛЬБУМІН-БІОФАРМА	ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" (виробництво, первинне пакування; виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серій), Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у фл.	10%	№1	1005,20	
	АЛЬБУМІН-БІОФАРМА	ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" (виробництво, первинне пакування; виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серій), Україна	р-н д/інфуз. по 50мл у фл.	10%	№1	483,00	
	АЛЬБУМІН-БІОФАРМА	ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" (виробництво, первинне пакування; виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серій), Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у фл.	20%	№1	1650,00	
	АЛЬБУМІН-БІОФАРМА	ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" (виробництво, первинне пакування; виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серій), Україна	р-н д/інфуз. по 50мл у фл.	20%	№1	880,00	

		пакування, контроль якості, випуск серій), Україна					
II.	АЛЬБУМІН ЛЮДИНИ 200 Г/Л	Кедріон С.п.А., Італія	р-н д/інфуз. по 50мл у пл.	200г/л	№1	1134,63	32,42/€
	АЛЬБУМІН ЛЮДИНИ 200 Г/Л	Кедріон С.п.А., Італія	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	200г/л	№1	2269,26	32,42/€
	АЛЬБУНОРМ 20 %	Октафарма Фармацевтика Продуктiонсгес. м.б.Х. (виробник, відповідальний за виробництво in-bulk, первинну упаковку, контроль якості, вторинну упаковку, візуальна інспекція, маркування, випуск серії)/Октафарма АБ (виробник, відповідальний за виробництво in-, Австрія/Швеція/Франція/Німеччина/Німеччина	р-н д/інфуз. по 100мл у фл.	20%	№1	1956,29	32,60/€
	АЛЬБУНОРМ 20 %	Октафарма Фармацевтика Продуктiонсгес. м.б.Х. (виробник, відповідальний за виробництво in-bulk, первинну упаковку, контроль якості, вторинну упаковку, візуальна інспекція, маркування, випуск серії)/Октафарма АБ (виробник, відповідальний за виробництво in-, Австрія/Швеція/Франція/Німеччина/Німеччина	р-н д/інфуз. по 50мл у фл.	20%	№1	978,15	32,60/€
	АЛЬБУНОРМ 25 %	Октафарма Фармацевтика Продуктiонсгес. м.б.Х. (виробник, відповідальний за виробництво in-bulk, первинну упаковку, контроль якості, вторинну упаковку, візуальна інспекція, маркування, випуск серії)/Октафарма АБ (виробник, відповідальний за виробництво in-, Австрія/Швеція/Франція/Німеччина/Німеччина	р-н д/інфуз. по 50мл у фл.	25%	№1	1169,86	32,60/€
	АЛЬБУНОРМ 25 %	Октафарма Фармацевтика Продуктiонсгес. м.б.Х. (виробник, відповідальний за виробництво in-bulk, первинну упаковку, контроль якості, вторинну упаковку, візуальна інспекція, маркування, випуск серії)/Октафарма АБ (виробник, відповідальний за виробництво in-, Австрія/Швеція/Франція/Німеччина/Німеччина	р-н д/інфуз. по 100мл у фл.	25%	№1	2339,73	32,60/€
	ФЛЕКСБУМІН	Баксалта ЮС Інк./Бакстер АГ, США/Австрія	р-н д/інфуз. по 50мл, 100мл у п/е пак.	200 г/л	№1, №12, №24		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ФЛЕКСБУМІН	Бакстер АГ (контроль якості, випуск серії)/Баксалта ЮС	р-н д/інфуз. по 50мл, 100мл у п/е пак.	200 г/л	№1, №12, №24		відсутня у реєстрі ОБЦ

		Інк.(стерильне наповнення, остаточна пастеризація, первинне та вторинне пакування; виробництво нерозфасованої продукції, термообробка), Австрія/США			
--	--	---	--	--	--

10.5.2. Препарати декстрану

- **Декстран-40 (Dextran-40) ***

Фармакотерапевтична група: V05AA05 - кровозамінники і перфузійні р-ни.

Основна фармакотерапевтична дія: плазмозамінний колоїдний р-н декстрану (полімеру глюкози); дія виявляється у покращенні реологічних властивостей крові, зниженні її в'язкості, відновленні мікроциркуляторного кровотоку, запобіганні та усуненні агрегації формених елементів, нормалізації артеріального і венозного кровообігу; при швидкому введенні об'єм плазми крові може збільшитися на величину, що майже у 2 рази перевищує об'єм введеного ЛЗ, оскільки кожні 10 мл ЛЗ сприяють перерозподілу 20-25 мл рідини з тканин у кров'яне русло.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика і лікування гіповолемічного, дистрибутивного шоку; трансплантаційні судинні та пластичні операції; додаток до перфузійної рідини в апаратах штучного кровообігу при операціях на серці.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують в/в краплинно; перед введенням р-н підігріти до 35-37 °С; дози і швидкість введення визначати індивідуально; при порушенні капілярного кровотоку (різні форми шоку): МДД для дорослих - 20 мл/кг, для дітей - 5-10 мл/кг (при необхідності - до 15 мл/кг); при операціях зі штучним кровообігом додавати у кров із розрахунку 10-20 мл/кг для заповнення насоса оксигенатора; концентрація декстрану у перфузійному р-ні не має перевищувати 3 %; у післяопераційний період застосовувати у таких же дозах, як при порушенні капілярного кровотоку; вводити, не змішуючи з іншими ЛЗ; за життєвими показаннями вводити швидко, навіть струминно із розрахунку 15 мл/кг; пацієнтам з геморагічним інсультом, ЧМТ вводити з розрахунку 10-15 мл/кг і не більше.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк, висипання, свербіж, відчуття жару, пропасниця, підвищення потовиділення, реакції гіперчутливості; колювання АТ, тахікардія, задишка, набряки; нудота, блювання, сухість у роті, біль у животі; головний біль, запаморочення, тремор; збільшення/ зменшення діурезу, гіперосмолярність, г. ниркова недостатність; акроціаноз, гіперемія, зниження функції тромбоцитів; ускладнення з визначення групи крові; загальна слабкість, набряк кінцівок, біль у попереку, біль за грудиною, відчуття нестачі повітря, судоми; колапс.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіпергідратація, гіперволемія, тромбоцитопенія (рівень тромбоцитів $80 \times 10^9/\text{л}$ і нижче), захворювання нирок, що супроводжуються олігурією, анурією; декомпенсована ССН II-III стадії, ДВЗ-синдром, схильність до виражених АР, гіперчутливість до декстрану; з 0,9 % р-ном натрію хлориду не вводити при патологічних змінах у нирках, а з 5 % р-ном глюкози - при порушенні вуглеводного обміну, особливо при ЦД; стани, при яких не можна вводити рідину у великих об'ємах.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	РЕОПОЛІГЛЮКІН	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 250мл, 500мл у пл.	10г/0,9г/100мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РЕОПОЛІГЛЮКІН	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	10г/0,9г/100мл	№1	110,50	
	РЕОПОЛІГЛЮКІН	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	10г/0,9г/100мл	№1	77,53	
	РЕОПОЛІГЛЮКІН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	100мг/9мг/мл	№1	107,45	
	РЕОПОЛІГЛЮКІН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	100мг/9мг/мл	№1	70,86	
	РЕОПОЛІГЛЮКІН-НОВОФАРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл, 250мл, 400мл, 500мл у пл. в пач. та без	100мг/9мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РЕОПОЛІГЛЮКІН-НОВОФАРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	100мг/9мг/мл	№1	105,92	
	РЕОПОЛІГЛЮКІН-	Товариство з обмеженою	р-н д/інфуз. по	100мг/9мг/мл	№1	90,00	

НОВОФАРМ	відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	200мл у пл.				
----------	--	-------------	--	--	--	--

10.5.3. Препарати желатину

Комбіновані препарати

- **Желатин сукцинілований + натрію хлорид (Gelatine succinate + sodium chloride) ****

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ГЕЛОФУЗИН	Б.Браун Медикал СА, Швейцарія	р-н д/інфуз. по 500мл у фл.	40г/7,01г/100		відсутня у реєстрі ОБЦ	
0мл	№1					відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	ГЕЛОФУЗИН	Б.Браун Медикал СА, Швейцарія	р-н д/інфуз. по 500мл у фл.	40г/7,01г/100		відсутня у реєстрі ОБЦ	
0мл	№10	1548,65	28,27/\$			відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Желатину полісукцинат + натрію ацетата тригідрат + натрію хлорид + калію хлорид + кальцію хлориду дигідрат + магнію хлориду гексагідрат + натрію гідроксид (Gelatine polysuccinate + sodium acetate trihydrate + sodium chloride + potassium chloride + calcium chloride dihydrate + magnesium chloride hexahydrate + sodium hydroxide)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ВОЛЮТЕНЗ®	Серумверк Бернбург АГ, Німеччина	р-н д/інфуз. по 500мл у пл.	40г/3,675г/4, 59г/0,40		відсутня у реєстрі ОБЦ	
3г/0,13						відсутня у реєстрі ОБЦ	
3г/0,20							
3г/0,98г							
/1000мл	№1	235,92	30,32/€			відсутня у реєстрі ОБЦ	

10.5.4. Препарати гідроксиетильованого крохмалю

- **Гідроксиетилкрохмаль 130000/0,4, 130000/0,42 (Hydroxyethylstarch 130000/0,4, 130000/0,42)**

Фармакотерапевтична група: В05АА07 - кровозамінники та перфузійні розчини.

Основна фармакотерапевтична дія: похідне крохмалю кукурудзи воскової стиглості, складається з полімеру глюкози (амілопектину); синтетичний колоїд для поповнення об'єму; фармакологічні властивості залежать від молярного заміщення у гідроксиетильних групах, середньої молекулярної маси, концентрації, співвідношення заміщення (співвідношення С2/С6), а також дозування та швидкості інфузії; підтримує об'єм крові.

Показання для застосування ЛЗ: гіповолемія, спричинена г. крововтратою, у випадках, коли застосування тільки кристалодів вважається недостатнім.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати лише в/в; добова доза та швидкість інфузії залежать від об'єму крововтрати, підтримки або відновлення гемодинаміки та від гемодилуції (ефекту розбавлення); можна вводити повторно протягом кількох днів; перші 10 - 20 мл вводити повільно; дорослим до 50 мл р-ну/кг маси тіла (еквівалентно 3 г гідроксиетилкрохмалю та 7,7 мЕкв натрію/кг), що еквівалентно 3500 мл р-ну для пацієнта вагою 70 кг; дітям дозування адаптувати до потреб у колоїдах конкретного пацієнта, з урахуванням перебігу захворювання, а також гемодинаміки та статусу гідратації; для новонароджених та дітей віком до 2 років середня доза становить 16 ± 9 мл/кг; дітям 2-12 років - становить 36 ± 11 мл/кг; доза для підлітків віком від 12 років така ж, як доза для дорослих.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анафілактичні/анафілактоїдні реакції (гіперчутливість, слабкі гриппоподібні симптоми, брадикардія, тахікардія, бронхоспазм, некардіальний набряк легенів); свербіж; підвищення рівня амілази в сироватці крові; при високих дозах ефекти розведення призводять до відповідного

розведення компонентів крові (факторів згортання крові та інших білків плазми крові) та зменшення гематокриту; ушкодження печінки та нирок.

Протипоказання до застосування ЛЗ: сепсис, тяжкі захворювання печінки; відома підвищена індивідуальна чутливість до гідроксietилового крохмалю; клінічні захворювання, де об'ємне перевантаження є потенційною проблемою, особливо у разі набряку легенів та застійної СН; дегідратація; вже наявні порушення коагуляції та згортання крові; внутрішньочерепна кровотеча; ниркова недостатність або замісна ниркова терапія; тяжка гіпернатріємія або тяжка гіперхлоремія; пацієнти з опіками, з трансплантованими органами та критично хворі пацієнти через ризик ураження нирок та летального наслідку.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЕКОВЕН	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	6г/0,9г/100мл	№1	136,74	
	ГЕКОВЕН	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 250мл у пл.	6г/0,9г/100мл	№1	154,95	
	ГЕКОВЕН	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	6г/0,9г/100мл	№1	216,30	
	ГЕКОВЕН	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 500мл у пл.	6г/0,9г/100мл	№1	255,30	
II.	ВОЛЮВЕН	Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмБХ., Німеччина	р-н д/інфуз. по 250мл у мішк. Freeflex®	6г/0,9г/100мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВОЛЮВЕН	Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмБХ., Німеччина	р-н д/інфуз. по 500мл у п/е фл	6г/0,9г/100мл	№1	190,25	29,27/€
	РЕФОРТАН® 130	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	р-н д/інфуз. по 250мл, 500мл у фл.	60г/9г/л	№1, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РЕФОРТАН® 130	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	р-н д/інфуз. по 250мл у фл.	60г/9г/л	№10	1435,64	28,71/€
	РЕФОРТАН® 130	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	р-н д/інфуз. по 500мл у фл.	60г/9г/л	№10	2469,30	28,71/€

• **Гідроксietилкрохмаль 200 000/0,5 (Hydroxyethylstarch 200 000/ 0,5) ***

Фармакотерапевтична група: В05АА07 - кровозамінники та перфузійні р-ни; ЛЗ гідроксietильованого крохмалю.

Основна фармакотерапевтична дія: колоїдний плазмозамінник гідроксietилкрохмалю в ізотонічному р-ні натрію хлориду; середня молекулярна маса колоїду становить 200000 Дальтон; в процесі в/в гідролізу полімерів ГЕК постійно утворюються дрібніші молекули, які, у свою чергу, проявляють онкотичну активність, перш ніж виводяться нирками; знижує показник гематокриту та в'язкість плазми крові; нормалізує об'єм циркулюючої крові, покращує гемодинаміку та функцію серця.

Показання для застосування ЛЗ: гіповолемія, спричинена г. крововтратою, у випадках, коли застосування тільки кристалоїдів вважається недостатнім.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують в/в краплинно дорослим; перші 10-20 мл потрібно вводити повільно і при суворому контролі стану пацієнта (через можливі анафілактичні реакції); призначати у найнижчих ефективних дозах протягом найкоротшого періоду часу; лікування слід супроводжувати безперервним моніторингом гемодинаміки і припинити одразу після досягнення відповідних показників гемодинаміки; МДД 6% р-ну - 30 мл/кг, 10% р-ну - 18 мл/кг (екв. для ГЕК 1,8 г/кг), максимальна швидкість інфузії - 18-20 мл/кг/год (залежно від стану серцевого кровообігу)

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: зниження гематокриту та концентрації білків у плазмі крові; порушення згортання крові; підвищення об'єму циркулюючої крові; ураження печінки; свербіж, підвищення рівня амілази у крові; біль у ділянці нирок, ураження нирок; анафілактичні/анафілактоїдні реакції різної інтенсивності.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до гідроксietилкрохмалю або до будь-якого іншого компонента ЛЗ; гіперволемія; гіпергідратація; гіперхлоремія; виражена гіпернатріємія; стан дегідратації, коли потрібна корекція водно-електролітного балансу; хр. СН; ниркова недостатність, пацієнти з замісною нирковою терапією, виражена печінкова недостатність; набряк легень; внутрішньочерепні крововиливи; тяжкі порушення системи згортання крові; сепсис; опіки; критично хворі пацієнти через ризик ураження нирок та смерті; пацієнти з трансплантованими органами.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЕК-ІНФУЗІЯ 10 %	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	10г/0,9г/100мл	№1	103,08	
	ГЕК-ІНФУЗІЯ 10 %	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	10г/0,9г/100мл	№1	179,70	
	ГЕК-ІНФУЗІЯ 6 %	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	6г/0,9г/100мл	№1	136,70	
	ГЕК-ІНФУЗІЯ 6 %	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	6г/0,9г/100мл	№1	90,48	
	ГЕКОДЕЗ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 250мл, 500мл у пл. та конт.	60 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЕКОДЕЗ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	60 мг/мл	№1	143,80	
	ГЕКОДЕЗ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 500мл у конт.	60 мг/мл	№1	247,40	
	ГЕКОДЕЗ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	60 мг/мл	№1	249,82	
	РЕФОРДЕЗ-НОВОФАРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 250мл, 500мл у пл.	60 мг/л	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РЕФОРДЕЗ-НОВОФАРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	60 мг/л	№1	136,80	
РЕФОРДЕЗ-НОВОФАРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	60 мг/л	№1	242,40		
II.	РЕФОРТАН®	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", кінцеве пакування, контроль та випуск серій), Німеччина	р-н д/інфуз. по 250мл у фл.	60 мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РЕФОРТАН®	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", кінцеве пакування, контроль та випуск серій), Німеччина	р-н д/інфуз. по 500мл у фл.	60 мг/мл	№10	2851,31	33,19/€
	РЕФОРТАН® Н ГЕК 10 %	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", кінцеве пакування, контроль та випуск серій), Німеччина	р-н д/інфуз. по 250мл, 500мл у фл.	100мг/9мг/мл	№1, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РЕФОРТАН® Н ГЕК 6 %	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", пакування, контроль та випуск серій), Німеччина	р-н д/інфуз. по 250мл або 500мл у фл.	60мг/9мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РЕФОРТАН® Н ГЕК 6 %	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", пакування, контроль та випуск серій), Німеччина	р-н д/інфуз. по 250мл у фл.	60мг/9мг/мл	№10	1554,82	32,06/€
	РЕФОРТАН® Н ГЕК 6 %	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", пакування, контроль та випуск серій), Німеччина	р-н д/інфуз. по 500мл у фл.	60мг/9мг/мл	№10	2452,46	32,06/€

		випуск серій), Німеччина					
РЕФОРТАН® ПЛЮС	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", кінцеве пакування, контроль та випуск серій), Німеччина	р-н д/інфуз. по 500мл у скл. фл.	100мг/мл	№10	3120,1 7	33,19/€	

Комбіновані препарати

- **Гідроксиетилкрохмаль 130/04 + ксилітол + натрію лактат + натрію хлорид + калію хлорид + кальцію хлорид + магнію хлорид (Hydroxyethylstarch 130/04 + xylitol + sodium lactate + sodium chloride + potassium chloride + calcium chloride + magnesium chloride)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЕКОТОН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 250мл у конт.	5г/5г/1,5г/0,8г /0,03г/0,02г/0,01г/100мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЕКОТОН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у скл. пл.	5г/5г/1,5г/0,8г /0,03г/0,02г/0,01г/100мл	№1	145,47	
	ГЕКОТОН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у скл. пл.	5г/5г/1,5г/0,8г /0,03г/0,02г/0,01г/100мл	№1	235,15	
	ГЕКОТОН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 500мл у конт.	5г/5г/1,5г/0,8г /0,03г/0,02г/0,01г/100мл	№1	285,58	

- **Гідроксиетилкрохмаль 130000/0,4, 130000/0,42 + натрію хлорид + калію хлорид + кальцію хлорид + магнію хлорид + натрію ацетат + І-малонова кислота (Hydroxyethylstarch 130000/0,4, 130000/0,42 + sodium chloride + potassium chloride + calcium chloride + magnesium chloride + sodium acetate + I-malic acid)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ТЕТРАСПАН 6 %	Б.Браун Мельзунген АГ (виробництво, первинна та вторинна упаковка, випуск серії, контроль серії)/Б.Браун Медикал СА (повний цикл виробництва), Німеччина/Швейцарія	р-н д/інфуз. по 250мл, 500мл мішк.	6%	№20	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕТРАСПАН 6 %	Б.Браун Мельзунген АГ (виробництво, первинна та вторинна упаковка, випуск серії, контроль серії)/Б.Браун Медикал СА (повний цикл виробництва), Німеччина/Швейцарія	р-н д/інфуз. по 500мл у			відсутня у реєстрі ОБЦ	
кон т.	6%	№10	2069,10	24,18/\$		відсутня у реєстрі ОБЦ	

10.5.5. Електроліти

- **Натрію хлорид (Sodium chloride) ***

Фармакотерапевтична група: В05ХА03 - кровозамінники та перфузійні р-ни; р-ни електролітів.

Основна фармакотерапевтична дія: нормалізує водно-сольовий баланс і ліквідує дефіцит рідини в організмі людини, який розвивається при дегідратації або через акумуляцію позаклітинної рідини у вогнищах великих опіків і травм, при операціях на органах черевної порожнини, перитоніті; поліпшує перфузію тканин, підвищує ефективність гемотрансфузійних заходів при масивних крововтратах і тяжких формах шоку; виявляє дезінтоксикаційний ефект внаслідок короточасного підвищення об'єму рідини, зниження концентрації токсичних продуктів у крові, активації діурезу.

Показання для застосування ЛЗ: для поповнення нестачі рідини в організмі^{ВООЗ,БНФ} та у комплексі заходів інтенсивної терапії; як розчинник інших сумісних ЛЗ^{БНФ}; місцеве промивання ран, слизової оболонки носа^{ГМД}, а також катетерів і систем для трансфузії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати в/в, ректально та зовнішньо; вводити в/в краплинно до 3 л/добу (і більше) зі швидкістю 4-10 мл/кг/год., залежно від клінічної ситуації та рівня втрати рідини^{ВООЗ}; застосовувати р/ос; призначати у клізмах по 75-100 мл; застосовувати для промивання ран, слизових оболонок; дітям при шоківій дегідратації (без визначення лабораторних показників) вводити 20-30 мл/кг, у подальшому режим дозування коригувати залежно від лабораторних показників, загальна добова доза залежить від водно-електролітного балансу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: не спостерігаються при правильному застосуванні; при проведенні масивних інфузій можливий розвиток гіперхлоремічного ацидозу.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіпергідратація, гіперхлоремія, гіпернатріємія, гіперхлоремічний ацидоз, стани, пов'язані з небезпекою розвитку набряку легенів; не застосовувати для промивання очей при офтальмологічних операціях.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НАТРІЮ ХЛОРИД	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл, 10мл в амп. у пач., бл. та кор.	9мг/мл	№10,		відсутня у реєстрі ОВЦ
№5 x2,							відсутня у реєстрі ОВЦ
№1 00							відсутня у реєстрі ОВЦ
I.	НАТРІЮ ХЛОРИД	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у бл.	9мг/мл	№5x2	16,60	
	НАТРІЮ ХЛОРИД	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у кор.	9мг/мл	№100	165,00	
	НАТРІЮ ХЛОРИД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у конт.	50мг/мл	№1	19,32	
	НАТРІЮ ХЛОРИД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	50мг/мл	№1	20,45	
	НАТРІЮ ХЛОРИД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у конт.	50мг/мл	№1	24,15	
	НАТРІЮ ХЛОРИД	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл, 10мл в амп. у кор.	9мг/мл	№10		відсутня у реєстрі ОВЦ
	НАТРІЮ ХЛОРИД	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у бл.	9мг/мл	№5x2	14,43	
	НАТРІЮ ХЛОРИД	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 10мл в амп. у бл.	9мг/мл	№5x2	19,54	
	НАТРІЮ ХЛОРИД	ТОВ фірма "Новофарм-Біосинтез"/ПАТ "Галичфарм", Україна/Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у скл. пл.	9мг/мл	№1		відсутня у реєстрі ОВЦ
	НАТРІЮ ХЛОРИД	ТОВ фірма "Новофарм-Біосинтез"/ПАТ "Галичфарм", Україна/Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у скл. пл.	9мг/мл	№1	12,30	
	НАТРІЮ ХЛОРИД	ТОВ фірма "Новофарм-Біосинтез"/ПАТ "Галичфарм", Україна/Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у скл. пл.	9мг/мл	№1	15,38	
	НАТРІЮ ХЛОРИД	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл, 500мл у конт.	0,9%	№1		відсутня у реєстрі ОВЦ
	НАТРІЮ ХЛОРИД	Дочірнє підприємство	р-н д/інфуз. по	0,9%	№1	130,00	

	"Фарматрейд", Україна	3000мл у конт.				
НАТРИЮ ХЛОРИД	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 5000мл у конт.	0,9%	№1	157,50	
НАТРИЮ ХЛОРИД	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	0,9%	№1	16,00	
НАТРИЮ ХЛОРИД	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 250мл у конт.	0,9%	№1	19,00	
НАТРИЮ ХЛОРИД	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у конт.	0,9%	№1	24,00	
НАТРИЮ ХЛОРИД	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 1000мл у конт.	0,9%	№1	70,00	
НАТРИЮ ХЛОРИД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	9мг/мл	№1	12,74	
НАТРИЮ ХЛОРИД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у конт.	9мг/мл	№1	13,15	
НАТРИЮ ХЛОРИД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 250мл у конт.	9мг/мл	№1	13,15	
НАТРИЮ ХЛОРИД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	9мг/мл	№1	13,24	
НАТРИЮ ХЛОРИД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	9мг/мл	№1	13,24	
НАТРИЮ ХЛОРИД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у конт.	9мг/мл	№1	15,00	
НАТРИЮ ХЛОРИД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 500мл у конт.	9мг/мл	№1	15,48	
НАТРИЮ ХЛОРИД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	9мг/мл	№1	16,24	
НАТРИЮ ХЛОРИД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 1000мл у конт.	9мг/мл	№1	48,49	
НАТРИЮ ХЛОРИД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 3000мл у конт.	9мг/мл	№1	77,35	
НАТРИЮ ХЛОРИД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'ек. по 2мл, 5мл, 10мл, 20мл у конт. однодоз.; по 5 мл або 10 мл в амп. у конт. чар/уп.	9мг/мл	№5x1, №5x2, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НАТРИЮ ХЛОРИД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'ек. в амп. по 5мл у конт. чар/уп.	9мг/мл	№5x2	11,40	
НАТРИЮ ХЛОРИД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'ек. по 2мл у конт. однодоз.	9мг/мл	№10	32,34	
НАТРИЮ ХЛОРИД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'ек. в амп. по 5мл у конт. чар/уп.	9мг/мл	№5x1	8,80	
НАТРИЮ ХЛОРИД	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл, 250мл, 400мл, 500мл у пл. з кор. та без	9мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НАТРИЮ ХЛОРИД	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	9мг/мл	№1	14,40	
НАТРИЮ ХЛОРИД	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	9мг/мл	№1	15,40	
НАТРИЮ ХЛОРИД	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	9мг/мл	№1	20,40	

	НАТРИЮ ХЛОРИД - ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	9мг/мл	№5x2	17,18	
	НАТРИЮ ХЛОРИД - ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 10мл в амп. у конт. чар/уп.	9мг/мл	№5x2	25,93	
	НАТРИЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у фл.	9мг/мл	№1	10,46	
	НАТРИЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у фл.	9мг/мл	№1	14,49	
	НАТРИЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у фл.	9мг/мл	№1	17,52	
	НАТРИЮ ХЛОРИД-СОЛЮВЕН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 50мл у конт.	9мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НАТРИЮ ХЛОРИД-СОЛЮВЕН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	9мг/мл	№1	18,73	
	НАТРИЮ ХЛОРИД-СОЛЮВЕН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у конт.	9мг/мл	№1	20,58	
	НАТРИЮ ХЛОРИД-СОЛЮВЕН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у конт.	9мг/мл	№1	22,66	
	НАТРИЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9 %	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	0,9%	№1	14,46	
	НАТРИЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9 %	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	0,9%	№1	15,22	
	НАТРИЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9 %	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 250мл у пл.	0,9%	№1	15,29	
	НАТРИЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9 %	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 500мл у пл.	0,9%	№1	16,52	
	НАТРИЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9 %	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	0,9%	№1	23,00	
	НАТРИЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9 %	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/ін'єк. по 10мл в амп. полімерних в пач.	0,9%	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НАТРИЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9 %	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. полімерних в пач.	0,9%	№10	17,28	
	НАТРИЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9 %	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. полімерних в пач.	0,9%	№10	29,28	
II.	НАТРИЮ ХЛОРИД	ДІАКО БІОФАРМАЧЕУТИЧІ С.Р.Л., Італія	р-н д/інфуз. по 250мл або 500мл у скл. пл.	9мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НАТРИЮ ХЛОРИД	ДІАКО БІОФАРМАЧЕУТИЧІ С.Р.Л., Італія	р-н д/інфуз. по 100мл у скл. пл.	9мг/мл	№1	15,50	24,52/\$
	НАТРИЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН ІЗОТОНІЧНИЙ 0,9 % Б. БРАУН	Б. Браун Мельзунген АГ (виробництво, первинна та вторинна упаковка, випуск серії, контроль серії)/Б.Браун Медикал СА, Німеччина/Іспанія	р-н д/інфуз. по 250мл, 1000мл у фл.	0,9%	№20, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НАТРИЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН ІЗОТОНІЧНИЙ 0,9 % Б. БРАУН	Б. Браун Мельзунген АГ (виробництво, первинна та вторинна упаковка, випуск серії, контроль серії)/Б.Браун Медикал СА,	р-н д/інфуз. по 500мл у фл.	0,9%	№10	140,00	25,54/\$

	НІМЕЧЧИНА/ІСПАНІЯ					
НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН ІЗОТОНІЧНИЙ 0,9 % Б. БРАУН	Б. Браун Мельзунген АГ (виробництво, первинна та вторинна упаковка, випуск серії, контроль серії)/Б.Браун Медикал СА, Німеччина/Іспанія	р-н д/інфуз. по 100мл у фл.	0,9%	№20	150,00	25,54/\$
СОЛЕН	Євролайф Хелткеар Пвт. Лтд., Індія	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	0,9%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Натрію бікарбонат (Sodium bicarbonate) *** (див. п. 7.9.2.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Магнію сульфат (Magnesium sulfate) ***

Фармакотерапевтична група: В05ХА05 - кровозамінники та інфузійні р-ни; р-ни електролітів.

Основна фармакотерапевтична дія: фізіологічний антагоніст кальцію, метаболічний кофактор більшості обмінних реакцій, у тому числі пов'язаних із синтезом і вивільненням енергії, зменшує секрецію катехоламінів, регулює функціонування Na^+ - K^+ -АТФази, нейрохімічну передачу, м'язову збудливість, знижує вміст ацетилхоліну у ЦНС, периферичній НС, чинить седативну, анагезуючу, протисудомну, спазмолітичну, жовчогінну та токолітичну дію; розширює коронарні та периферичні артерії, знижує АТ, постнавантаження на серце, гальмує розвиток реперфузійного ураження міокарда; зменшує частоту шлуночкових і надшлуночкових аритмій, уповільнює провідність у ділянці синусового та АВ-вузла; антитромбоцитарні властивості магнію пов'язані зі зменшенням синтезу тромбоксану A_2 , похідних ліпоксигенази (12-НЕТЕ), стимуляцією синтезу простагліцину та ліпопротеїнів високої щільності; при підвищенні дози спричиняє негативну ізотропну та міорелаксуючу дію.

Показання для застосування ЛЗ: гіпертонічний криз; шлуночкові порушення ритму серця^{БНФ} (тахікардія типу «пірует»); судомний с-м: еклампсія^{БНФ}, гіпомагніємія, підвищена потреба у магнії^{БНФ}; у комплексній терапії передчасних пологів; стенокардії напруження, при отруєнні солями важких металів, тетраетилсвинцем, розчинними солями барію (антидот).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/м, в/в повільно або у вигляді в/в інфузії; помірно виражена гіпомагніємія (0,5-0,7 ммоль/л): дорослим по 1 г магнію сульфату (4 мл) в/м кожні 6 год; тяжка гіпомагніємія (<0,5 ммоль/л): при в/м введенні сумарну дозу підвищити до 1 мл/кг (250 мг/кг) і вводити частинами протягом 4 год.; у вигляді в/в інфузії при тяжкій гіпомагніємії 5 г магнію сульфату (20 мл) додати до 1 л 0,9 % р-ну натрію хлориду або 5 % глюкози і вводити протягом не менше 3 год.; МДД при в/в введенні 18 г (72 мл); при АГ I-II стадії - щодня в/м по 5-10-20 мл; курс лікування - 15-20 ін'єк.; гіпертонічний криз: в/м або в/в (повільно, струминно) - по 10-20 мл; аритмії серця: в/в 1-2 г магнію сульфату (4-8 мл) протягом 5-10 хв, при необхідності ін'єкцію повторити (сумарне введення до 4 г магнію сульфату), можливе введення спочатку у дозі навантаження 8 мл протягом не менше 5 хв з подальшою інфузією 20 мл ЛЗ, розведеного р-ном 0,9 % натрію хлориду або 5 % глюкози, протягом не менше 6 год, або спочатку 8 мл протягом не менше 30 хв з подальшою інфузією протягом не менше 12 год; ішемічний інсульт: по 10-20 мл в/в протягом 5-7 діб; судомний с-м: дорослим - 5-10-20 мл в/м, дітям в/м із розрахунку 0,08-0,16 мл/кг (20-40 мг/кг); токсикоз вагітних - по 10-20 мл/1-2 р/добу, в/м (з одночасним прийомом нейролептиків); при прееклампсії або еклампсії в/м або в/в, спочатку одноразово в/м по 10 мл у кожному сідниці, або в/в 16 мл (4 г магнію сульфату) протягом 3-4 хв, далі продовжувати в/м 16-20 мл (4-5 г) кожні 4 год або в/в крап. 4-8 мл/год (1-2 г/год) при постійному контролі сухожильних рефлексів та ф-ції дихання, терапію продовжувати до припинення нападу, МДД - 40 г магнію сульфату, при порушенні ф-ції нирок - 20 г/48 год; знеболення пологів: 5-10-20 мл в/м, у разі потреби комбінують магнію сульфат з анагетиками; при затримці сечовиведення та свинцевій коліці - в/м, 5-10 мл або в/в, 5-10 мл розведеного у 5 разів 25 % р-ну магнію сульфату (призначати також у вигляді клізми); при інтоксикації ртуттю, миш'яком, тетраетилсвинцем вводити в/в, по 5-10 мл розведеного у 2,5-5 разів 25 % р-ну магнію сульфату; при отруєнні розчинними солями барію в/в, вводити 4-8 мл або промити шлунок 1 % р-ном магнію сульфату; при внутрішньочерепній гіпертензії та тяжкій асфіксії у новонароджених вводити в/м, розпочинаючи з дози 0,2 мл/кг на добу, підвищуючи дозу на 3-4-ту добу до 0,8 мл/кг на добу, протягом 3-8 діб у комплексній терапії; для ліквідації дефіциту магнію у новонароджених призначають по 0,5-0,8 мл/кг 1 р/добу протягом 5-8 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: артеріальна гіпотензія, брадикардія, відчуття серцебиття, порушення провідності, припливи/відчуття жару, подовження інтервалу PQ та розширення комплексу QRS на ЕКГ, аритмія, кома, зупинка серця; задишка, пригнічення дихання; головний біль, запаморочення, загальна слабкість, сонливість, сплутаність/ втрата свідомості, пригнічення настрою, зниження сухожильних рефлексів, диплопія, тривога, порушення мовлення, тремор, оніміння кінцівок; м'язова слабкість; нудота, блювання; анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк, гіпертермічний с-м, озноб; гіперемія, свербіж, висипання, кропив'янка, посилене потовиділення; поліурія; атонія матки; гіпокальціємія, гіпофосфатемія, гіперосмолярна дегідратація; гіперемія, набряк, біль.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена індивідуальна чутливість до компонентів ЛЗ; артеріальна гіпотензія; виражена брадикардія (ЧСС <55 уд/хв); АВ-блокада; стани, обумовлені дефіцитом кальцію та пригніченням дихального центру; кахексія; порушення функції нирок; виражена печінкова або ниркова недостатність; міастенія; злаякісна новоутворення.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. по	250мг/мл	№5x2	відсутня у	

			10мл в амп. у конт. чар/уп.			реєстрі ОБЦ
МАГНІЮ СУЛЬФАТ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна		р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	250мг/мл	№5x2	17,72
МАГНІЮ СУЛЬФАТ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна		р-н д/ін'єк. по 5мл, 10мл в амп. у пач. та бл.	250мг/мл	№10, №100, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ
МАГНІЮ СУЛЬФАТ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна		р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у бл.	250мг/мл	№5x2	23,50
МАГНІЮ СУЛЬФАТ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна		р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у пач.	250мг/мл	№100	235,00
МАГНІЮ СУЛЬФАТ	ПАТ "Галичфарм", Україна		р-н д/ін'єк. по 5мл, 10мл в амп. у конт. чар/уп. та кор.	250мг/мл	№5x1, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ
МАГНІЮ СУЛЬФАТ	ПАТ "Галичфарм", Україна		р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	250мг/мл	№5x2	17,40
МАГНІЮ СУЛЬФАТ	ПАТ "Галичфарм", Україна		р-н д/ін'єк. по 10мл в амп. у конт. чар/уп.	250мг/мл	№5x2	21,35
МАГНІЮ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна		р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	250мг/мл	№5x2	26,25
МАГНІЮ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна		р-н д/ін'єк. по 10мл в амп. у конт. чар/уп.	250мг/мл	№5x2	32,64

• **Кальцію хлорид (Calcium chloride)**

Фармакотерапевтична група: В05ХА07 - кровозамінники і перфузійні р-ни; р-ни електrolітів.

Основна фармакотерапевтична дія: усуває дефіцит іонів кальцію; іони кальцію беруть участь у передачі нервових імпульсів, скороченні гладкої та скелетної мускулатури, у функціональній діяльності міокарда, згортанні крові; усуває гіпокальціємію, зменшує проникність судин, проявляє кровоспинну дію; в/в введення збуджує симпатичну нервову систему, що приводить до посилення виділення норадреналіну.

Показання для застосування ЛЗ: гіпокальціємія^{БНФ}, що потребує швидкого підвищення концентрації іонів кальцію у плазмі крові (тетанія при функціональній недостатності паращитовидної залози, тетанія при недостатності вітаміну D, гіпокальціємія при обмінному переливанні крові та вливанні цитратної крові, алкалозі); у складі комплексної терапії при г. свинцевій коліці; магнієва інтоксикація, що виникає при передозуванні магнієм; гіперкаліємія, зареєстрована на ЕКГ порушенням серцевої функції.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують в/в струминно (дуже повільно) та в/в краплинно (повільно); дорослі: в/в струминно 5 мл 10% р-ну зі швидкістю 1 мл/хв; в/в краплинно 5 - 10 мл 10% р-ну розводити в 100 - 200 мл 0,9% р-ну натрію хлориду або 5% р-ну глюкози, вводити зі швидкістю 6-8 крап./хв.; обмінне переливання крові та переливання цитратної крові: дорослим і дітям по 30 мг (0,3 мл) на кожні 100 мл крові; тетанія у дорослих: 10 мл 10% р-ну (1 г) протягом 10-30 хв, у разі необхідності повторити через 6 год.; гіпокальціємія: 500 мг-1 г (5-10 мл) з інтервалом 1-3 дні, залежно від реакції пацієнта або рівня кальцію у плазмі крові, у разі необхідності ввести повторну дозу; магнієва інтоксикація: 500 мг (5 мл) вводити швидко під лікарським наглядом та моніторингом стану пацієнта, перед введенням наступних доз; гіперкаліємія, зареєстрована на ЕКГ, як порушення серцевої функції: підбирати дозу індивідуально, залежно від стану пацієнта, який потрібно постійно контролювати за допомогою ЕКГ; діти: при гіпокальціємії вводити повільно, зі швидкістю до 0,5 мл/хв, у дозі 10-20 мг/кг (0,1-0,2 мл/кг), при необхідності повторювати кожні 4-6 год.; при тетанії по 10 мг/кг (0,1 мл/кг) протягом 5-10 хв., у разі необхідності повторити через 6 год. або продовжити у вигляді інфузій; МДД для дітей (незалежно від віку) - 10 мл (1000 мг).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: смак крейди у роті; гіперкальціємія; депресія; помірне та короточасне зниження АТ, брадикардія, аритмія, АГ, венозний тромбоз, фібриляція шлуночків серця; відчуття жару, поколювання спочатку у порожнині рота, а потім по всьому тілу, гіперемія шкіри обличчя, АР, кропив'янка; біль та гіперемія по ходу вен; при екстравазації можливі печія, некроз тканин, виникнення струпу, целюліт і кальцифікація м'яких тканин.

Противопоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до компонентів ЛЗ, гіперкальціємія, виражена гіперкальціурія, нефроуролітаз (кальцієвий), тяжка ниркова недостатність, саркоїдоз, гіперкоагуляція, схильність до тромбоутворення; виражений атеросклероз із явищами артеріальної оклюзії; фібриляція шлуночків; асистолія та електромеханічні дисоціації; прийом ЛЗ наперстянки; одночасне застосування з цефтриаксоном.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	КАЛЬЦІУ ХЛОРИД	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл, 10мл в амп. у конт. чар/уп.	100 мг/мл	№5х2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАЛЬЦІУ ХЛОРИД	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	100мг/мл	№5х2	18,02	
	КАЛЬЦІУ ХЛОРИД	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 10мл в амп. у конт. чар/уп.	100мг/мл	№5х2	24,67	
	КАЛЬЦІУ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	100мг/мл	№5х2	25,64	
	КАЛЬЦІУ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 10мл в амп. у конт. чар/уп.	100мг/мл	№5х2	34,87	

● **Калію хлорид (Potassium chloride) ***

Фармакотерапевтична група: В05ХА01 - р-ни електролітів; А12ВА01 - мінеральні добавки, ЛЗ калію.

Основна фармакотерапевтична дія: основний внутрішньоклітинний катіон більшості тканин організму; іони калію необхідні для багатьох життєво важливих фізіологічних процесів, беруть участь у регуляції функції збудження, скоротливості, проведення та автоматизму міокарда; необхідні для підтримки внутрішньоклітинного тиску, проведення та синаптичної передачі нервового імпульсу, підтримки концентрації калію в міокарді, скелетних м'язах і гладеньком'язових клітинах, для підтримки нормальної функції нирок; в малих дозах іони калію розширюють коронарні судини, у великих - звужують; калій сприяє підвищенню вмісту ацетилхоліну і збудженню симпатичного відділу ЦНС, має помірну діуретичну дію; збільшення рівня калію знижує ризик розвитку токсичної дії серцевих глікозидів на серце; відіграє важливу роль у розвитку та корекції порушень кислотно-лужного балансу.

Показання для застосування ЛЗ: гіпокаліємія^{В003,БНФ}, зумовлена застосуванням салуретиків, нестримним блюванням, профузною діареєю, хірургічним втручанням; інтоксикація серцевими глікозидами; аритмії різного походження (пов'язані в основному з електролітними порушеннями та абсолютною або відносною гіпокаліємією); гіпокаліємічна форма пароксизмальної міоплегії; м'язова дистрофія, міастенія; відновлення рівня калію в організмі при застосуванні кортикостероїдів; табл. та капс. додатково застосовують для профілактики гіпокаліємії^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують в/в краплинно та р/ос; р-н д/інфуз.: визначення необхідної дози базується на показниках вмісту калію у сироватці^{В003, БНФ}; дефіцит калію розраховують за формулою: калій = маса тіла х 0.2 х 2 х 4.5, де калій - розрахунок в ммоль, маса тіла - розрахунок в кг, 4.5 - нормальний рівень калію в ммоль в сироватці, отриманий результат - кількість калію хлориду 4% р-ну, який в звичайних випадках розводять водою д/ін'єк. в 10 разів (до 500 мл) і вводять краплинно (20 - 30 крап./хв); також в якості р-ника можна використовувати р-н натрію хлориду 0,9 % або р-н глюкози 5 %; при тяжких інтоксикаціях, що потребують швидкого усунення патологічних явищ застосовують калію хлорид 4 % в 40 % р-ні глюкози; звичайна рекомендована доза не повинна перевищувати 20 ммоль/год або 2 - 3 ммоль/кг протягом доби; в екстремальних випадках, коли рівень калію в сироватці менше, ніж 2,0 ммоль/л або існує загроза гіпокаліємії (рівень калію в сироватці нижчий ніж 2,0 ммоль/л, або мають місце зміни в ЕКГ та/або параліч м'язів), доза може становити до 40 мг/год або 400 мг/добу під ретельним наглядом лікаря та моніторингом ЕКГ і частою перевіркою калію в сироватці крові, щоб запобігти гіперкаліємії та зупинці серця; концентрат д/р-ну д/інфуз.: дорослим призначати 0,5-2 г/добу, як розчинник використовувати 200-250 мл р-ну натрію хлориду 0,9 % або глюкози 5 %, швидкість введення - 20-30 крап./хв.; р/ос: табл. по 750 мг: звичайні дози для дорослих при незначній гіпокаліємії - 750-1500 мг/добу (1-2 табл./добу), при тяжкій гіпокаліємії - 1500-4500 мг/добу (2-6 табл./добу); табл. по 1000мг: для профілактики гіпокаліємії - 1000мг/добу (1 табл./добу), для лікування гіпокаліємії - 1000-2000 мг/добу (1-2 табл./добу), для лікування тяжкої гіпокаліємії - 3000-6000 мг/добу (3-6 табл./добу), через регулярні проміжки часу; капс. по 600 мг: звичайні дози для дорослих для профілактики гіпокаліємії - 1200-1800 мг/добу (2-3 капс./добу), для лікування гіпокаліємії - 3000-7200 мг (5-12 капс./добу), якщо добова доза перевищує 2 табл. чи капс., її розподілити на кілька прийомів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль в місці введення, біль, почервоніння, флебіти при концентрації більше 30 ммоль/л, гіперкаліємія (особливо при зниженні функції нирок), зниження АТ, парестезії, збільшення кількості екстрасистол, шкірні висипання; гіпофосфатемія, гіпомангніємія, гіперкаліємія, гіпонатріємія; диспептичні розлади (нудота, блювання, метеоризм, біль у животі, відчуття дискомфорту, діарея, відчуття печіння у шлунку та стравоході, запор, незначні ерозійні зміни у тонкому кишечнику); брадикардія, тахікардія, порушення провідності серця, аритмія, екстрасистоля, артеріальна гіпотензія; АР (гіпертермія, шкірні висипання, ангіоневротичний набряк, шок); слабкість, сплутаність свідомості, гіперволемія; ядуха; біль у горлі; для тверд. р/ос форм - кровотечі ШКТ, гастродуоденальні виразки, непрохідність.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до калію хлориду або будь-яких компонентів ЛЗ; гіперкаліємія, гіперкаліємічний періодичний параліч, ниркова недостатність, одночасне застосування з калійзберігаючими діуретиками або салуретиками, недостатність кори надниркових залоз (хвороба Аддісона), гіпоренімічний гіпоальдостеронізм, вроджена параміотонія, метаболічний ацидоз (при неконтрольованому ЦД),

г. дегідратація, стани зі значним руйнуванням клітин (наприклад важкі опіки), шлунково-кишкова кровотеча, загострення виразкової хвороби, адренкортикальна недостатність; порушення AV-провідності, повна блокада серця, гіперхлоремія, гіповолемія з гіпонатріємією; гіпергідратація; набряк мозку; після травми тканин, не вводити одночасно з препаратами крові

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КАЛІЮ ХЛОРИД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл, 20мл у конт.	75мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАЛІЮ ХЛОРИД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл у фл.	75мг/мл	№1	14,24	
	КАЛІЮ ХЛОРИД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. по 20мл у фл.	75мг/мл	№1	26,11	
	КАЛІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 4 %	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 50мл у пл.	4%	№1	18,92	
	КАЛІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 4 %	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	4%	№1	29,59	
II.	КАЛЬДІУМ®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	капс. прол. дії у фл.	600мг	№50	104,33	27,90/\$
	КАЛЬДІУМ®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	капс. прол. дії у фл.	600мг	№100	178,25	27,90/\$

Комбіновані препарати

- **Натрію ацетат + натрію хлорид (Sodium acetate + sodium chloride)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДИСОЛЬ	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	200мг/600мг/400мл у пл.		відсутня у реєстрі ОБЦ	
	100 мл	№1	23,32			відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Натрію ацетат + натрію хлорид + калію хлорид (Sodium acetate + sodium chloride + potassium chloride)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АЦЕСОЛЬ	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. у пл. по 400мл	200мг/500мг/100мг/100мл	№1	24,00	
	АЦЕСОЛЬ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл, 400мл у конт.	2мг/5мг/1мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЦЕСОЛЬ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у скл. пл.	2мг/5мг/1мг/мл	№1	16,18	
	АЦЕСОЛЬ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у скл. пл.	2мг/5мг/1мг/мл	№1	21,24	

- **Натрію хлорид + Калію хлорид + Натрію гідрокарбонат (Sodium chloride + Potassium chloride + Sodium hydrocarbonate)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.
Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ТРИСОЛЬ	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	0,5г/0,1г/0,4г/100мл	№1	23,21	
	ТРИСОЛЬ	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	0,5г/0,1г/0,4г/100мл	№1	26,00	
	ТРИСОЛЬ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл, 400мл у конт.	5мг/1мг/4мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТРИСОЛЬ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	5мг/1мг/4мг/мл	№1	14,77	
	ТРИСОЛЬ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	5мг/1мг/4мг/мл	№1	24,65	

- **Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.
Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	РІНГЕРА РОЗЧИН	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл, 400мл у пл.скл. або фл.	0,86г/0,03г/0,		відсутня у реєстрі ОБЦ	
032 2г/100мл	№1					відсутня у реєстрі ОБЦ	
I.	РІНГЕРА РОЗЧИН	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	0,86г/0,03г/0,0322г/100мл	№1	21,48	
	РІНГЕРА РОЗЧИН	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	0,86г/0,03г/0,0322г/100мл	№1	24,40	
	РІНГЕРА РОЗЧИН	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у конт.	0,86г/0,03г/0,048г/100мл	№1	17,56	
	РІНГЕРА РОЗЧИН	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 250мл у конт.	0,86г/0,03г/0,048г/100мл	№1	17,96	
	РІНГЕРА РОЗЧИН	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 500мл у конт.	0,86г/0,03г/0,048г/100мл	№1	23,15	
	РІНГЕРА РОЗЧИН	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у конт.	0,86г/0,03г/0,048г/100мл	№1	23,38	
	РОЗЧИН РІНГЕРА	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 250мл, 500мл, 2500мл у конт.	8,6мг/0,3мг/0,24мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РОЗЧИН РІНГЕРА	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	8,6мг/0,3мг/0,24мг/мл	№1	17,45	
	РОЗЧИН РІНГЕРА	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	8,6мг/0,3мг/0,24мг/мл	№1	23,29	

- **Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид + Натрію лактат (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride + Sodium lactate)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.
Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	РІНГЕРА ЛАКТАТ РОЗЧИН	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 250 мл, 500мл у пл.	0,602г/0,0373г/0,0294г/0,3138г/100мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РІНГЕРА ЛАКТАТ РОЗЧИН	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	0,602г/0,0373г/0,0294г/0,3138г/100мл	№1	25,00	
	РІНГЕРА ЛАКТАТ РОЗЧИН	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	0,602г/0,0373г/0,0294г/0,3138г/100мл	№1	33,00	
	РОЗЧИН РІНГЕР-ЛАКТАТНИЙ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл, 200мл, 500мл, 1000мл у конт.	6мг/0,4мг/0,203мг/3,2мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РОЗЧИН РІНГЕР-ЛАКТАТНИЙ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	6мг/0,4мг/0,203мг/3,2мг/мл	№1	27,74	
	РОЗЧИН РІНГЕР-ЛАКТАТНИЙ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	6мг/0,4мг/0,203мг/3,2мг/мл	№1	30,24	
	РОЗЧИН РІНГЕР-ЛАКТАТНИЙ-ЦИТОКЛІН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 1000мл у конт.	6мг/0,4мг/0,203мг/3,2мг/1мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Натрію хлорид + натрію ацетат + калію ацетат + кальцію ацетат + магнію ацетат (Sodium chloride + sodium acetate + potassium acetate + calcium acetate + magnesium acetate)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЙОНОСТЕРИЛ	Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ, Німеччина	р-н д/інфуз. по 500мл у мішк. Freeflex	6,43г/3,674г/0,393г/0,261г/0,268г/л	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЙОНОСТЕРИЛ	Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ, Німеччина	р-н д/інфуз. по 500мл у фл. в кор.	6,43г/3,674г/0,393г/0,261г/0,268г/л	№1	500,63	29,80/€

10.5.6. Електроліти у комбінації з іншими лікарськими засобами

- **Калію хлорид + Глюкоза (Potassium chloride + Glucose)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГІК®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	5мг/50мг/мл	№1	43,48	
	ГІК®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	5мг/50мг/мл	№1	53,07	

- **Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид + Магнію хлорид + Фруктоза (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride + Magnesium chloride + Fructose)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначена, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЛІКОСТЕРИЛ Ф10	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 250мл у пак.	0,8г/0,0298/0			відсутня у реєстрі ОБЦ
024 2г/0 ,02 54г							відсутня у реєстрі ОБЦ
/10г /10 0мл л	№1	82,54					відсутня у реєстрі ОБЦ
I.	ГЛІКОСТЕРИЛ Ф10	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 500мл у пак.	0,8г/0,0298/0			відсутня у реєстрі ОБЦ
024 2г/0 ,02 54г							відсутня у реєстрі ОБЦ
/10г /10 0мл л	№1	92,33					відсутня у реєстрі ОБЦ
I.	ГЛІКОСТЕРИЛ Ф5	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 250мл, 500мл у пл. та пак. полім.	0,8г/0,0298/0,0242г/0,0254г/5г/100мл	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ГЛІКОСТЕРИЛ Ф5	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	0,8г/0,0298/0,0242г/0,0254г/5г/100мл	№1	62,69	
	ГЛІКОСТЕРИЛ Ф5	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	0,8г/0,0298/0,0242г/0,0254г/5г/100мл	№1	70,49	

- **Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид + Глюкоза (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride + Glucose)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЛЮКОСОЛ	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	0,86г/0,03г/0,04			відсутня у реєстрі ОБЦ
8г/0 ,1г/ 100 мл	№1						відсутня у реєстрі ОБЦ
I.	ГЛЮКОСОЛ	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у конт.	0,86г/0,03г/0,04			відсутня у реєстрі ОБЦ
8г/0 ,1г/ 100 мл	№1	13,00					відсутня у реєстрі ОБЦ
I.	ГЛЮКОСОЛ	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 250мл у конт.	0,86г/0,03г/0,04			відсутня у реєстрі ОБЦ
8г/0 ,1г/ 100 мл	№1	13,50					відсутня у реєстрі ОБЦ
I.	ГЛЮКОСОЛ	Дочірнє підприємство	р-н д/інфуз. по	0,86г/0,03г/0,			відсутня у

		"Фарматрейд", Україна	400мл у конт.	04		реєстрі ОВЦ
8г/0,1г/100мл	№1	15,30				відсутня у реєстрі ОВЦ
I.	ГЛЮКОСОЛ	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 500мл у конт.	0,86г/0,03г/0,04		відсутня у реєстрі ОВЦ
8г/0,1г/100мл	№1	16,50				відсутня у реєстрі ОВЦ

- **Глюкоза + Ксиліт + Натрію ацетат + Натрію хлорид + Кальцію хлорид + Калію хлорид + Магнію хлорид (Glucose + Xylitol + Sodium acetate + Sodium chloride + Calcium chloride + Potassium chloride + Magnesium chloride)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЛЮКСИЛ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 250мл, 400мл, 500мл у пл. та конт.	75мг/50мг/4, 98мг/2,88мг/0,1мг/0,45мг/0,43мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ГЛЮКСИЛ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	75мг/50мг/4, 98мг/2,88мг/0,1мг/0,45мг/0,43мг/мл	№1	58,12	

- **Ксиліт + Натрію ацетат + Натрію хлорид + Кальцію хлорид + Калію хлорид + Магнію хлорид (Xylitol + Sodium acetate + Sodium chloride + Calcium chloride + Potassium chloride + Magnesium chloride)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначена, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КСИЛАТ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	50мг/2,6мг/6мг/0,1мг/0,3мг/0,1мг/мл	№1	135,63	
	КСИЛАТ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	50мг/2,6мг/6мг/0,1мг/0,3мг/0,1мг/мл	№1	97,92	

- **Сорбітол + Натрію лактат + Натрію хлорид + Кальцію хлорид + Калію хлорид + Магнію хлорид (Sorbitol + Sodium lactate + Sodium chloride + Calcium chloride + Potassium chloride + Magnesium chloride)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначена, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	РЕОСОРБІЛАКТ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл, 400мл у пл. в пач.; 250мл, 500мл у конт.	60мг/19мг/6мг/0,1мг/0,3мг/0,2мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	РЕОСОРБІЛАКТ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	60мг/19мг/6мг/0,1мг/0,3мг/0,2мг/мл	№1	107,05	
	РЕОСОРБІЛАКТ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	60мг/19мг/6мг/0,1мг/0,3мг/0,2мг/мл	№1	82,46	

				0,2мг/мл		
	СОРБІЛАКТ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл, 400мл у пл. в пач.; 250мл, 500мл у конт.	200мг/19мг/6 мг/0,1 мг/0,3м г/0,2мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ

10.5.7. Амінокислоти

- **Аргініну гідрохлорид (Arginine hydrochloride)**

Фармакотерапевтична група: В05ХВ01 - кровозамінники та перфузійні р-ни; додаткові р-ни для в/в введення; амінокислоти, аргініну гідрохлорид

Основна фармакотерапевтична дія: амінокислота, що належить до класу умовно незамінних амінокислот; активний і різнобічний клітинний регулятор численних життєво важливих функцій організму, виявляє важливі в критичному стані організму протекторні ефекти; спричиняє антигіпоксичну, мембраностабілізуючу, цитопротекторну, антиоксидантну, антирадикальну, дезінтоксикаційну активність, є активним регулятором проміжного обміну і процесів енергозабезпечення, відіграє певну роль у підтриманні гормонального балансу в організмі; збільшує вміст у крові інсуліну, глюкагону, соматотропного гормону і пролактину, бере участь у синтезі проліну, поліаміну, агматину, включається в процеси фібриногенолізу, сперматогенезу, чинить мембранодеполяризуючу дію; один із основних субстратів у циклі синтезу сечовини в печінці; гіпоамоніємічний ефект реалізується шляхом активації перетворення аміаку в сечовину; чинить гепатопротекторну дію; субстрат для NO-синтази - ферменту, що каталізує синтез оксиду азоту в ендотеліоцитах; активує гуанілатциклазу, підвищує рівень циклічного гуанідинмонофосфату в ендотелії судин, зменшує активацію й адгезію лейкоцитів, тромбоцитів до ендотелію судин, пригнічує синтез протеїнів адгезії VCAM-1 і MCP-1, запобігаючи утворенню і розвитку атеросклеротичних бляшок, пригнічує синтез ендотеліну-1; пригнічує синтез асиметричного диметиларгініну - потужного ендогенного стимулятора оксидативного стресу; стимулює діяльність вилочкової залози, що продукує Т-клітини, регулює вміст глюкози в крові під час фізичного навантаження; чинить кислотоутворювальну дію і сприяє корекції кислотно-лужної рівноваги.

Показання для застосування ЛЗ: метаболічний алкалоз, гіперамоніємія, атеросклероз судин серця і головного мозку, атеросклероз периферичних судин, у тому числі із проявами переміжної кульгавості, діабетична ангіопатія, АГ, хр. СН, гіперхолестеринемія, ХОЗЛ, легенева гіпертензія, затримка розвитку плода і преєклампсія.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати в/в краплинно зі швидкістю 10 крап./хв протягом перших 10-15 хв, потім швидкість введення збільшити до 30 крап./хв.; добова доза - 100 мл р-ну; при тяжких порушеннях кровообігу в центральних і периферичних судинах, при виражених явищах інтоксикації, гіпоксії, астенічних станах дозу можна збільшити до 200 мл/добу; максимальна швидкість введення інфузійного р-ну не повинна перевищувати 20 ммоль/год.; дітям віком до 12 років доза 5-10 мл/1 кг/добу; для лікування метаболічного алкалозу дозу можна розрахувати: аргініну гідрохлорид (ммоль)/ надлишок лугів (Ве) (ммоль/л) x 0,3 x кг маси тіла; введення починати з половини розрахованої дози; можливу додаткову корекцію проводити після отримання результатів оновленого кислотно-лужного балансу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпертермія, відчуття жару, ломота у тілі; біль у суглобах; сухість у роті, нудота, блювання; зміни в місці введення, включаючи гіперемію, відчуття свербіжжю, блідість шкіри, аж до акроціанозу; анафілактичний шок, реакції гіперчутливості, висипання, кропив'янка, ангіоневротичний набряк; задишка, коливання АТ, зміни серцевого ритму, біль у ділянці серця; головний біль, запаморочення, відчуття страху, слабкість, судороги, тремор, частіше при перевищенні швидкості введення, гіперкаліємія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість ЛЗ, тяжкі порушення функції нирок, гіперхлоремічний ацидоз; АР в анамнезі; застосування калійзберігаючих діуретиків, а також спіронолактону, ІМ (у т.ч. в анамнезі)

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	АНГІО-БЕТАРГІН	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	42мг/мл	№1	90,00	
	АРГІЛАЙФ	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл. або у фл.	42мг/мл	№1	69,00	
	ЛІБРА®	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	42 мг/мл	№1	92,00	
	САРГІН	ПАТ "Фармак"/ПрАТ "Інфузія", Україна/Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у фл.	42мг/мл	№1	82,00	
	СОЛАРГІН	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	42 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТІВОМАКС-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у фл. в пач.	42мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

ТІВОМАКС-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у фл	42мг/мл	№1	86,27	
ТІВОРТІН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	42мг/мл	№1	116,13	
ТІВОРТІН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	42мг/мл	№1	90,06	

10.5.8. Вуглеводи

- **Глюкоза 5 % (Glucose 5%) ***

Фармакотерапевтична група: В05СХ01 - кровозамінники та перфузійні р-ни.

Основна фармакотерапевтична дія: р-н глюкози 5% ізотонічний щодо плазми крові і при його в/в введенні поповнює об'єм циркулюючої крові, при її втраті є джерелом поживного матеріалу, а також сприяє виведенню отрути з організму; забезпечує субстратне поповнення енергозатрат; при в/в ін'єк. активізує метаболічні процеси, покращує антитоксичну функцію печінки, посилює скорочувальну активність міокарда, розширює судини, збільшує діурез.

Показання для застосування ЛЗ: гіпер- та ізотонічна дегідратація^{ВООЗ БНФ}; у дітей для запобігання порушенням водно-електролітного балансу під час оперативних втручань; інтоксикація; гіпоглікемія^{ВООЗ,БНФ,ПМД}, як розчинник інших сумісних р-нів ЛЗ.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати в/в крап.; доза для дорослих становить до 1500 мл/добу, МДД для дорослих - 2000 мл; у разі необхідності максимальна швидкість введення для дорослих – 150 крап./хв. (500 мл/год).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: порушення електролітного балансу та загальні р-ції організму: гіпокаліємія, гіпофосфатемія, гіпоманіємія, гіпонатріємія, гіперволемія, гіперглікемія; АР (гіпертермія, шкірні висипання, ангіоневротичний набряк, шок); нудота центрального походження.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперглікемія; гіперчутливість до глюкози; одноканне введення з препаратами крові.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЛЮКОЗА	ТОВ фірма "Новофарм-Біосинтез"/ПАТ "Галичфарм", Україна/Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	50мг/мл	№1	13,94	
	ГЛЮКОЗА	ДП "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 3000мл у конт.	5%	№1	100,00	
	ГЛЮКОЗА	ДП "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 5000мл у конт.	5%	№1	108,00	
	ГЛЮКОЗА	ДП "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	5%	№1	16,00	
	ГЛЮКОЗА	ДП "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у конт.	5%	№1	17,00	
	ГЛЮКОЗА	ДП "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 250мл у конт.	5%	№1	18,00	
	ГЛЮКОЗА	ДП "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у конт.	5%	№1	20,00	
	ГЛЮКОЗА	ДП "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 500мл у конт.	5%	№1	23,00	
	ГЛЮКОЗА	ДП "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 1000мл у конт.	5%	№1	60,00	
	ГЛЮКОЗА	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл, 2000мл, 5000мл у конт. та скл.пл.	50 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ГЛЮКОЗА	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл,200мл,250мл,400мл,500мл,1000мл,2000мл,3000мл,5000мл у конт. та скл.пляш.	50мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ГЛЮКОЗА	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по	50мг/мл	№1	12,90	

			200мл у конт.				
ГЛЮКОЗА	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 250мл у конт.	50мг/мл	№1	13,30		
ГЛЮКОЗА	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у скл. пл.	50мг/мл	№1	13,65		
ГЛЮКОЗА	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у конт.	50мг/мл	№1	15,80		
ГЛЮКОЗА	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 500мл у конт.	50мг/мл	№1	16,76		
ГЛЮКОЗА	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у скл. пл.	50мг/мл	№1	17,22		
ГЛЮКОЗА	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 1000мл у конт.	50мг/мл	№1	64,74		
ГЛЮКОЗА	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 3000мл у конт.	50мг/мл	№1	81,97		
ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у фл.	50мг/мл	№1	14,91		
ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у фл.	50мг/мл	№1	16,36		
ГЛЮКОЗА-НОВОФАРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл, 250мл, 400мл, 500мл у пл. в пач. та без	50мг/мл	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ	
ГЛЮКОЗА-НОВОФАРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	50мг/мл	№1	16,40		
ГЛЮКОЗА-НОВОФАРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	50мг/мл	№1	21,60		
ГЛЮКОЗИ РОЗЧИН 5 % ДЛЯ ІНФУЗІЙ	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	5%	№1	17,40		
ГЛЮКОЗИ РОЗЧИН 5 % ДЛЯ ІНФУЗІЙ	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 250мл у пл.	5%	№1	20,57		
ГЛЮКОЗИ РОЗЧИН 5 % ДЛЯ ІНФУЗІЙ	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 500мл у пл.	5%	№1	22,00		
ГЛЮКОЗИ РОЗЧИН 5 % ДЛЯ ІНФУЗІЙ	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	5%	№1	22,91		
II. ГЛЮКОЗА	ДІАКО БІОФАРМАЧЕУТИЧІ С.Р.Л., Італія	р-н д/інфуз. по 250мл, 500мл у пляш.	50 мг/мл	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ	

10.6. Розчини для парентерального живлення, перитонеального діалізу та гемофільтрації

10.6.1. Амінокислоти

Комбіновані препарати

- **Гліцин + лізин + аланін + аргінін + валін + гістидин + ізолейцин + лейцин + метіонін + пролін + треонін + триптофан + фенілаланін (Glycine + lysine + alanin + arginin + valine + histidine + isoleucine + leucine + methionine + prolin + treonin + tryptophan + phenylalanin)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АМІНОЛ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.; по	8мг/11,5мг/6, 4мг/6,4			відсутня у реєстрі ОБЦ

			3мл, 5мл у фл.			
мг/ 4,9 мг/ 3,2 мг/ 4,4 мг/						відсутня у реєстрі ОБЦ
9,8 мг/ 5,7 мг/ 6,4 мг/ 4,3						відсутня у реєстрі ОБЦ
мг/ 1,4 4мг /7м г/м л	№1, №5					відсутня у реєстрі ОБЦ
I.	АМІНОЛ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	8мг/11,5мг/6,4мг/6,4		відсутня у реєстрі ОБЦ
мг/ 4,9 мг/ 3,2 мг/ 4,4 мг/						відсутня у реєстрі ОБЦ
9,8 мг/ 5,7 мг/ 6,4 мг/ 4,3						відсутня у реєстрі ОБЦ
мг/ 1,4 4мг /7м г/м л	№1	167,42				відсутня у реєстрі ОБЦ
I.	АМІНОЛ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	8мг/11,5мг/6,4мг/6,4		відсутня у реєстрі ОБЦ
мг/ 4,9 мг/ 3,2 мг/ 4,4 мг/						відсутня у реєстрі ОБЦ
9,8 мг/ 5,7 мг/ 6,4 мг/ 4,3						відсутня у реєстрі ОБЦ
мг/ 1,4 4мг /7м г/м л	№1	246,28				відсутня у реєстрі ОБЦ

- **Ізолейцин + Лейцин + Лізин + Валін + Метіонін + Серин + Тирозин + Таурин + Треонін + Фенілаланін + Триптофан + Аргінін + Гістидин + Аланін + Гліцин + Пролін (Isoleucine + Leucine + Lysine + Valine + Methionine + Serine + Tyrosine + Taurin + Treonin + Phenylalanin + Tryptophan + Arginin + Histidine + Alanin + Glycine + Pprolin)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АМІНОВЕН 10 %	Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія	р-н д/інфуз. по 500мл у фл.	10%	№1	224,33	24,93/€
	АМІНОВЕН 15 %	Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія	р-н д/інфуз. по 500мл у фл.	15%	№1	261,72	24,93/€
	АМІНОСОЛ® НЕО 10 %	"Хемофарм" АД (контроль якості, випуск серії)/Хемомонт д.о.о. (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості), Сербія/Чорногорія	р-н д/інфуз. по 500мл у пл.	10%	№1	171,53	28,83/€
	АМІНОСОЛ® НЕО 15 %	Хемомонт д.о.о. (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості)"Хемофарм" АД (контроль якості, випуск серії), Чорногорія/Сербія	р-н д/інфуз. по 500мл у пл.	15%	№1	171,53	28,83/€

- **Кислота глутамінова + гліцин + лізин + орнітин + серин + ізолейцин + лейцин + метіонін + фенілаланін + триптофан + валін + аргінін + гістидин + аланін + пролін + тирозин + кислота аспарагінова + цистеїн + треонін + аспарагін (Glutamic acid + glycine + lysine + ornithine + serine + isoleucine + leucine + methionine + phenylalanin + tryptophan + valine + arginin + histidine + alanin + prolin + tyrosine + aspartic acid + cysteine + threonine + asparagin)**

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АМІНОПЛАЗМАЛЬ® ГЕПА - 10 %	Б. Браун Мельзунген АГ (виробництво, первинна та вторинна упаковка, випуск серії, контроль серії), Німеччина	8,8г/13,6г/10,6г/1,2г/1,6г/4,6г/1,5г/10,6г/8,8г/4,7г/6,3г/8,3г/7,1г/2,5г/0,55г/0,8г/5,7г/1,66г/100г/15,3г/0,508г/3,581г	р-н д/інфуз. по 500мл у фл.	№10	2400,00	27,04/\$

- **Лізин + гліцин + валін + ізолейцин + лейцин + метіонін + треонін + фенілаланін + триптофан + аланін + аргінін + гістидин + пролін + серин + цистеїн (Lysine + glycine + valine + isoleucine + leucine + methionine + threonine + phenylalanin + tryptophan + alanin + arginin + histidine + prolin + serine + cysteine) ****

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ГЕПАСОЛ® НЕО 8 %	"Хемофарм" АД (контроль якості, випуск серії)/Хемомонт д.о.о. (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості),	р-н д/інфуз. по 500мл у пл.	8%	№1	181,91	28,83/€

10.6.2. Жирові емульсії

- **Олія соєва (Soybean oil)**

Фармакотерапевтична група: V05BA02- р-ни для парентерального харчування; жирові емульсії.

Основна фармакотерапевтична дія: забезпечує організм есенціальними і неесенціальними довголанцюговими жирними кислотами, які необхідні для енергетичного метаболізму і є складовими клітинних мембран.

Показання для застосування ЛЗ: парентеральне харчування (як джерело енергії і незамінних жирних к-т); поповнення дефіциту незамінних жирних к-т у хворих, не здатних до самостійного поповнення нормального балансу есенціальних жирних к-т шляхом перорального споживання.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі: рекомендована максимальна доза - 3 г тригліцеридів/кг маси тіла на добу, що відповідає 15 мл/кг /добу, швидкість інфузії не має перевищувати 500 мл за 5 год; діти: рекомендована доза - 0,5-4 г тригліцеридів/кг маси тіла на добу, що відповідає 2,5-20 мл/кг/добу, швидкість інфузій не повинна перевищувати 0,17 г тригліцеридів/кг на год (4 г/кг за 24 год), недоношеним новонародженим та новонародженим з низькою масою тіла бажано проводити інфузію 20% р-ном безперервно протягом доби; початкова доза, що становить 0,5-1 г тригліцеридів/кг на добу, може бути поступово збільшена до дози 2 г/кг на добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, підвищення t^0 тіла, втома, тремтіння, озноб, припливи, підвищена пітливість, біль у грудній клітці та спині, відчуття тиску в очах, подразнення в місці введення інфузії; підвищена стомлюваність; ціаноз, гемодинамічні ефекти (гіпер/гіпотензія); абдомінальний біль, нудота, блювання; тимчасове підвищення показників в печінкових пробах, гепатомегалія; жовтяниця, що виникла внаслідок центрального глобулярного холестазу; тахіпноє; гіперкоагуляція, тромбоцитопенія, гемоліз, ретикулоцитоз, лейкопенія, лейкоцитоз, спленомегалія; пріапізм; накопичення коричневого пігменту; р-ції гіперчутливості; висипання, кропив'янка; гіперліпідемія; контамінація центрального венозного катетера та сепсис, подразнення вени, тромбоемболія; с-м жирового перенавантаження (парціальні напади, гепатомегалія, спленомегалія, лейкоцитоз, шок).

Протипоказання до застосування ЛЗ: г. стадія шоку, гіперліпідемія, ліпоїдний нефроз, г. панкреатит, гемофагоцитарний с-м, тяжка ниркова та/або печінкова недостатність, некомпенсований ЦД, гіпотиреоз (при супутній гіпертригліцеридемії), гіперчутливість до білків яєць, сої та арахісу або до інших компонентів ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ІНТРАЛІПІД 20 %	Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ (повний цикл виробництва; візуальний контроль та вторинне пакування), Австрія	емул. д/інфуз. по 500мл у фл.	20%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ІНТРАЛІПІД 20 %	Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ (повний цикл виробництва; візуальний контроль та вторинне пакування), Австрія	емул. д/інфуз. по 100мл у фл.	20%	№1	265,90	30,56/€
	ЛІПОФУНДИН МСТ/ЛСТ 20 %	Б. Браун Мельзунген АГ (виробництво, первинна та вторинна упаковка, випуск серії; контроль серії), Німеччина	емул. д/інфуз. по 250мл, 500мл у фл.	20%	№1, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛІПОФУНДИН МСТ/ЛСТ 20 %	Б. Браун Мельзунген АГ (виробництво, первинна та вторинна упаковка, випуск серії; контроль серії), Німеччина	емул. д/інфуз. по 500мл у фл.	20%	№10	1984,50	25,56/\$
	СМОФЛІПІД 20 %	Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія	емул. д/інфуз. по 100мл, 250мл, 500мл у фл.	20%	№1, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СМОФЛІПІД 20 %	Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія	емул. д/інфуз. по 100мл у фл.	20%	№1	209,10	32,72/€

10.6.3. Вуглеводи

- **Глюкоза 10 % (Glucose 10%)** * [ГМД]

Фармакотерапевтична група: V06DC01 - р-ни для парентерального харчування.

Основна фармакотерапевтична дія: плазмозамінна, гідратуюча, метаболічна та дезінтоксикаційна дія; підтримує об'єм циркулюючої крові та поповнює об'єм втраченої рідини; здатен спричинити діурез залежно від клінічного стану пацієнта; зазнає повного метаболізму, може зменшувати втрати протеїну та азоту, підтримує відкладення глікогену та зменшує кетоз або запобігає йому (надмірне утворення кетонів тіл) при призначенні

достатніх доз; у процесі метаболізму глюкози у тканинах виділяється значна кількість енергії, яка необхідна для життєдіяльності організму.

Показання для застосування ЛЗ: гіпоглікемія^{ВООЗ, БНФ, ПМД}; парентеральне харчування; порушення, пов'язані з підвищеним розпадом білка внаслідок гіпоергозу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати в/в краплинно: доза для дорослих становить до 1500 мл/добу; МДД для дорослих - 2000 мл, за необхідності максимальна швидкість введення для дорослих - 150 крап./хв. (500 мл/год).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сплутаність або втрата свідомості; гіперглікемія; гіпокаліємія; гіпофосфатемія; гіпомангіємія; поліурія; глюкозурія; полідипсія; нудота; гіперволемія; відчуття припливів та почервоніння шкіри; АР (гіпертермія, шкірні висипання, ангіоневротичний набряк, шок); біль у місці введення; подразнення вен, флебіт, венозний тромбоз.

Протипоказання до застосування ЛЗ: внутрішньовчерепні та внутрішньоспінальні крововиливи за винятком станів, які пов'язані з гіпоглікемією та необхідністю парентерального харчування; тяжка гіпертонічна дегідратація; гіперчутливість до декстрази; діабетична кома з гіперглікемією; гіперосмолярна кома; с-м мальабсорбції глюкозо-галактози; одночасне введення з препаратами крові.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЛЮКОЗА	ДП "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 250мл у конт.	10%	№1	11,50	
	ГЛЮКОЗА	ДП "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	10%	№1	14,00	
	ГЛЮКОЗА	ДП "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 500мл у конт.	10%	№1	16,25	
	ГЛЮКОЗА	ДП "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у конт.	10%	№1	19,00	
	ГЛЮКОЗА	ДП "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у конт.	10%	№1	24,00	
	ГЛЮКОЗА	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл, у конт. полім. чи пл. скл.	100мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЛЮКОЗА	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у конт. полім. чи пл. скл.	100мг/мл	№1	17,95	
	ГЛЮКОЗИ РОЗЧИН 10 % ДЛЯ ІНФУЗІЙ	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 250мл, 500мл у пл.	10%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЛЮКОЗИ РОЗЧИН 10 % ДЛЯ ІНФУЗІЙ	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	10%	№1	20,79	
	ГЛЮКОЗИ РОЗЧИН 10 % ДЛЯ ІНФУЗІЙ	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	10%	№1	26,62	

10.6.4. Комбіновані розчини

- *Ізолейцин + лейцин + лізин + метіонін + фенілаланін + треонін + триптофан + валін + аргінін + гістидин + аланін + гліцин + кислота аспарагінова + кислота глутамінова + пролін + серин + тирозин + натрію ацетат + натрію гідроксид + калію ацетат + магнію хлориду гексагідрат + династрію фосфат додекагідрат (Isoleucine + leucine + lysine + methionine + phenylalanin + threonine + tryptophan + valine + arginin + histidine + alanin + glycine + aspartic acid + glutamic acid + prolin + serine + tyrosine + sodium acetate + sodium hydroxide + potassium acetate + magnesium chloride hexahydrate + disodiumphosphate dodecahydrate) ***

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АМІНОПЛАЗМАЛЬ	Б. Браун Мельзунген АГ	8,9г/5г/8,56г/4,4	р-н д/інфуз.	№10	2350,0	24,71/\$

Б.БРАУН 10 % Е	(виробництво, первинна та вторинна упаковка, випуск серії, контроль серії), Німеччина	г/4,7г/4,2г/1,6г/6,2г/11,5г/3г/10,5г/12г/5,6г/7,2г/5,5г/2,3г/0,4г/2,85г/0,36г/2,453г/0,508г/3,581г	по 500мл у фл.		0	
----------------	---	--	----------------	--	---	--

- **Лізин + ізолейцин + лейцин + метіонін + цистеїн + фенілаланін + треонін + триптофан + валін + аргінін + гістидин + кислота амінооцтова + аланін + пролін + серин + кислота оцтова (Lysine + isoleucine + leucine + methionine + cysteine + phenylalanin + threonine + tryptophan + valine + arginin + histidine + aminoacetic acid + alanin + prolin + serine + acetic acid)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АМІНОСТЕРИЛ Н-ГЕПА	Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія	р-н д/інфуз. по 500мл у фл.	6,88г/10,4г/13,09г/1,1г/0,52г/0,88г/4,4г/0,7г/10,08г/10,72г/2,8г/5,82г/4,64г/5,73г/2,24г/4,42г/1000мл	№10	2617,87	32,72/€

- **Кислота глутамінова + гліцин + лізин + калію хлорид + магнію хлорид + ізолейцин + лейцин + метіонін + фенілаланін + триптофан + валін + аргінін + гістидин + аланін + натрію гідроксид + натрію ацетат + кислота аспарагінова + ксиліт + треонін (Glutamic acid + glycine + lysine + potassium chloride + magnesium chloride + isoleucine + leucine + methionine + phenylalanin + tryptophan + valin + arginin + histidine + alanin + sodium hydroxide + sodium acetate + aspartic acid + xylitol + threonine)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ІНФЕЗОЛ® 40	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	р-н д/інфуз. по 250мл у фл.	5г/7г/2г/1,86г/0,51г/2,10г/2,75г/1,75г/3,15г/0,5г/2,25г/4,55г/1,35г/4г/0,6г/3,4г/2г/50г/1,6г/л	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНФЕЗОЛ® 40	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	р-н д/інфуз. по 500мл у фл.	5г/7г/2г/1,86г/0,51г/2,10г/2,75г/1,75г/3,15г/0,5г/2,25г/4,55г/1,35г/4г/0,6г/3,4г/2г/50г/1,6г/л	№10	2110,29	29,03/€

- **Кальцію хлорид + кислота глутамінова + гліцин + лізин + орнітин + калію хлорид + натрію хлорид + ацетилцистеїн + магнію хлорид + серин + ізолейцин + лейцин + метіонін + фенілаланін + триптофан + валін + аргінін + гістидин + аланін + пролін + кислота яблучна + натрію гідроксид + натрію ацетат + кислота аспарагінова + треонін + ацетилтирозин (Calcium chloride + glutamic acid + glycine + lysine + ornithine + potassium chloride + sodium chloride + acetylcysteine + magnesium chloride + serine + isoleucine + leucine + methionine + phenylalanin + tryptophan + valin + arginin + histidine + alanin + prolin + malic acid + sodium hydroxide + sodium acetate + aspartic acid + threonine + acetyltirosine)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ИНФЕЗОЛ® 100	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	р-н д/інфуз. по 250мл у фл.	0,735г/5г/7,5 5г/10,02г/2,4 2г/3,355г/0,6 25г/0,673г/1, 017г/4,3г/5,8 5г/6,24г/4,68г /5,4г/2г/5г/9,6 6г/3,3г/15,5г// 7,5г/3г/1,324г /3,456г/1,91г/ 5г/2г/л	№10	2099,8 1	32,06/€
	ИНФЕЗОЛ® 100	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	р-н д/інфуз. по 500мл у фл.	0,735г/5г/7,5 5г/10,02г/2,4 2г/3,355г/0,6 25г/0,673г/1, 017г/4,3г/5,8 5г/6,24г/4,68г /5,4г/2г/5г/9,6 6г/3,3г/15,5г// 7,5г/3г/1,324г /3,456г/1,91г/ 5г/2г/л	№10	3016,6 8	32,06/€

- **Ізолейцин + лейцин + лізин + метіонін + фенілаланін + треонін + триптофан + валін + аргінін + кислота глутамінова + гістидин + аланін + кислота аспарагінова + гліцин + пролін + серин + магнію ацетату тетрагідрат + натрію ацетата тригідрат + калію дигідрофосфат + калію гідроксид + натрію гідроксид + глюкози моногідрат + кальцію хлорид (Isoleucine + leucine + lysine + methionine + phenylalanin + threonine + tryptophan + valine + arginin + glutamic acid + histidine + alanin + aspartic acid + glycine + prolin + serine + magnesium acetate tetrahydrate + sodium acetate thrihydrate + kalium dihydrophosphate + kalium hydroxide + sodium hydroxide + glucose monohydrate + calcium chloride)**

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	НУТРИФЛЕКС СПЕЦІАЛЬНИЙ	Б.Браун Медикал СА, Швейцарія	р-н д/інфуз. по 1000мл, 1500мл у двокам. мішк.	4,11г/5,48г/3, 98г/3,42г/6,1 5г/3,18г/1г/4, 54г/4,73г/2,1 5г/2,19г/8,49г /2,63г/2,89г/5, 95г/5,25г/1,0 8г/1,63г/2г/0, 62г/1,14г/264 г/0,6г/1000мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Олія оливкова рафінована + олія соєва рафінована + І-аланін + І-аргінін + гліцин + І-гістидин + І-ізолейцин + І-лейцин + І-лізин + І-метіонін + І-фенілаланін + І-пролін + І-серин + І-треонін + І-триптофан + І-тирозин + І-валін + натрію ацетат + натрію гліцерофосфат + калію хлорид + магнію хлорид + глюкози моногідрат + кальцію хлорид (Refined olive oil + refined soya oil + I-alanine + I-arginine + glycine + I-histidine + I-isoleucine + I-leucine + I-lysine + I-methionine + I-phenylalanine + I-proline + I-serine + I-threonine + I-tryptophan + I-tyrosine + I-valine + sodium acetate + sodium glycerophosphate + potassium chloride + magnesium chloride + glucose monohydrate + calcium chloride)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ОЛІКЛІНОМЕЛЬ N4-550E	Бакстер С.А., Бельгія	емул. д/інфуз. у трикам. пласт. пак. по 1500мл	30г/6,83г/3,8г /3,4г/1,58г/1, 98г/2,41г/1,9	№4	4980,0 7	25,85/\$

				1г/1,32г/1,85г/2,24г/1,65г/1,39г/0,59г/0,13г/1,91г/1,47г/3,22г/1,79г/0,67г/132г/0,44г/1500мл			
ОЛІКЛІНОМЕЛЬ N7-1000E	Бакстер С.А., Бельгія	емул. д/інфуз. у трикам. пласт. пак. по 1500мл в кор.	40г/8,28г/4,6г/4,12г/1,92г/2,4г/2,92г/2,32г/1,6г/2,24г/2,72г/2г/1,68г/0,72г/0,16г/2,32г/2,45г/2,14г/1,79г/0,45г/176г/0,3г	№4	5319,25	25,85/\$	
ОЛІКЛІНОМЕЛЬ N7-1000E	Бакстер С.А., Бельгія	емул. д/інфуз. у трикам. пласт. пак. по 2000мл в кор.	40г/8,28г/4,6г/4,12г/1,92г/2,4г/2,92г/2,32г/1,6г/2,24г/2,72г/2г/1,68г/0,72г/0,16г/2,32г/2,45г/2,14г/1,79г/0,45г/176г/0,3г	№4	5377,16	25,85/\$	
ОЛІКЛІНОМЕЛЬ N7-1000E	Бакстер С.А., Бельгія	емул. д/інфуз. у трикам. пласт. пак. по 1000мл в кор.	40г/8,28г/4,6г/4,12г/1,92г/2,4г/2,92г/2,32г/1,6г/2,24г/2,72г/2г/1,68г/0,72г/0,16г/2,32г/2,45г/2,14г/1,79г/0,45г/176г/0,3г	№4	5915,91	25,85/\$	

- **Лізин + натрію хлорид + тирозин + валін + ізолейцин + лейцин + гістидин + аргінін + кальцію хлорид + магнію хлорид + натрію лактат + триптофан + фенілаланін + треонін + серин + пролін + гліцин + аланін + метіонін (Lysine + sodium chloride + tyrosine + valin + isoleucine + leucine + histidine + arginin + calcium chloride + magnesium chloride + sodium lactate + tryptophan + phenylalanin + threonine + serine + prolin + glycine + alanin + methionine)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	НУТРИНІЛ ПД4 з 1,1 % ВМІСТОМ АМІНОКИСЛОТ	Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія	р-н д/перит. діалізу по 2л у пласт. міш. з ін'єкц. портом в пак.	0,955г/5,38г/0,3г/1,393г/0,85г/1,02г/0,714г/1,071г/0,184г/0,051г/4,48г/0,27г/0,57г/0,646г/0,51г/0,595г/0,51г/0,951г/0,85г/1000мл	№5	3274,82	25,99/\$

- **Глюкоза + Натрію хлорид + Кальцію хлорид + Магнію хлорид + Натрію лактат (Glucose + Sodium chloride + Calcium chloride + Magnesium chloride + Sodium lactate)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДІАВІТЕК ПД 1,5 %	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/перит.	1,5%	№1	340,55	28,60/€

			діалізу по 2000мл у конт.				
ДІАВІТЕК ПД 1,5 %	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/перит. діалізу по 2500мл у конт.	1,5%	№1	375,80	28,60/€	
ДІАВІТЕК ПД 2,5 %	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/перит. діалізу по 2000мл у конт.	2,5%	№1	340,55	28,60/€	
ДІАВІТЕК ПД 2,5 %	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/перит. діалізу по 2500мл у конт.	2,5%	№1	375,80	28,60/€	
ДІАВІТЕК ПД 4,25 %	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/перит. діалізу по 2000мл у конт.	4,25%	№1	340,55	28,60/€	
ДІАВІТЕК ПД 4,25 %	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/перит. діалізу по 2500мл у конт.	4,25%	№1	375,80	28,60/€	
ДІАВІТЕК ПД4 1,36 %	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/перит. діалізу по 2000мл, 2500мл, 5000мл у конт. з ін'єк. портом, з'єдн. та порож. міш. д/дренаж.	1,36%	№5, №4, №2	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ДІАВІТЕК ПД4 2,27 %	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/перит. діалізу по 2000мл, 2500мл, 5000мл у конт. з ін'єкц. портом, з'єдн. та порож. міш. д/дренаж.	2,27%	№5, №4, №2	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ДІАВІТЕК ПД4 3,86 %	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/перит. діалізу по 2000мл, 2500мл, 5000мл у конт. з ін'єкц. портом, з'єдн. та порож. міш. д/дренаж.	3,86%	№5, №4, №2	відсутня у реєстрі ОБЦ		
II.							
БАЛАНС 1,5 % ГЛЮКОЗИ 1,75 ММОЛЬ/Л КАЛЬЦІЮ	Фрезеніус Медикал Кер Дойчланд ГмбХ, Німеччина	р-н д/перит. діалізу 3000мл, 5000мл у сист. двокам. мішк. стей-сейф	1,5%	№2, №4	відсутня у реєстрі ОБЦ		
БАЛАНС 1,5 % ГЛЮКОЗИ 1,75 ММОЛЬ/Л КАЛЬЦІЮ	Фрезеніус Медикал Кер Дойчланд ГмбХ, Німеччина	р-н д/перит. діалізу 2000мл у сист. двокам. мішк. стей-сейф	1,5%	№4	1017,80	35,34/€	
БАЛАНС 1,5 % ГЛЮКОЗИ 1,75 ММОЛЬ/Л КАЛЬЦІЮ	Фрезеніус Медикал Кер Дойчланд ГмбХ, Німеччина	р-н д/перит. діалізу 2500мл у сист. двокам. мішк. стей-сейф	1,5%	№4	1171,90	35,34/€	
БАЛАНС 2,3 % ГЛЮКОЗИ 1,75 ММОЛЬ/Л КАЛЬЦІЮ	Фрезеніус Медикал Кер Дойчланд ГмбХ, Німеччина	р-н д/перит. діалізу 3000мл, 5000мл у сист. двокам. мішк. стей-сейф	2,3%	№2, №4	відсутня у реєстрі ОБЦ		
БАЛАНС 2,3 % ГЛЮКОЗИ 1,75 ММОЛЬ/Л КАЛЬЦІЮ	Фрезеніус Медикал Кер Дойчланд ГмбХ, Німеччина	р-н д/перит. діалізу 2000мл у сист. двокам. мішк. стей-сейф	2,3%	№4	1017,80	35,34/€	
БАЛАНС 2,3 %	Фрезеніус Медикал Кер	р-н д/перит.	2,3%	№4	1171,90	35,34/€	

ГЛЮКОЗИ 1,75 ММОЛЬ/Л КАЛЬЦІУ	Дойчланд ГмбХ, Німеччина	діалізу 2500мл у сист. двокам. мішк. стей- сейф			0	
БАЛАНС 4,25 % ГЛЮКОЗИ 1,75 ММОЛЬ/Л КАЛЬЦІУ	Фрезеніус Медикал Кер Дойчланд ГмбХ, Німеччина	р-н д/перит. діалізу 3000мл, 5000мл у сист. двокам. мішк. стей-сейф	4,25%	№2, №4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
БАЛАНС 4,25 % ГЛЮКОЗИ 1,75 ММОЛЬ/Л КАЛЬЦІУ	Фрезеніус Медикал Кер Дойчланд ГмбХ, Німеччина	р-н д/перит. діалізу 2000мл у сист. двокам. мішк. стей- сейф	4,25%	№4	1017,8 0	35,34/€
БАЛАНС 4,25 % ГЛЮКОЗИ 1,75 ММОЛЬ/Л КАЛЬЦІУ	Фрезеніус Медикал Кер Дойчланд ГмбХ, Німеччина	р-н д/перит. діалізу 2500мл у сист. двокам. мішк. стей- сейф	4,25%	№4	1171,9 0	35,34/€
ДІАНИЛ ПД4 3 ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 1,36 % М/ОБ/13,6 МГ/МЛ	Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія	р-н д/перит. діалізу по 3000мл у міш. "Віафлекс" PL146-3 з ін'єкц. портом та з'єдн., або у міш. "ТвінБег" з ін'єкц. портом, з'єдн. та порож. міш. д/дрен.	1,36%	№3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ДІАНИЛ ПД4 3 ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 1,36 % М/ОБ/13,6 МГ/МЛ	Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія	р-н д/перит. діалізу по 2500мл у міш. "Віафлекс" PL146-3 з ін'єкц. портом та з'єдн., або у міш. "ТвінБег" з ін'єкц. портом, з'єдн. та порож. міш. д/дрен.	1,36%	№4	1780,8 8	25,88/\$
ДІАНИЛ ПД4 3 ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 1,36 % М/ОБ/13,6 МГ/МЛ	Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія	р-н д/перит. діалізу по 2000мл у міш. "Віафлекс" PL146-3 з ін'єкц. портом та з'єдн., або у міш. "ТвінБег" з ін'єкц. портом, з'єдн. та порож. міш. д/дрен.	1,36%	№5	3290,4 8	25,88/\$
ДІАНИЛ ПД4 3 ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 1,36 % М/ОБ/13,6 МГ/МЛ	Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія	р-н д/перит. діалізу по 5000мл у міш. "Віафлекс" PL146-3 з ін'єкц. портом та з'єдн., або у міш. "ТвінБег" з ін'єкц. портом, з'єдн. та порож. міш. д/дрен.	1,36%	№2	834,01	25,88/\$
ДІАНИЛ ПД4 3 ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 2,27 % М/ОБ / 22,7 МГ/МЛ	Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія	р-н д/перит. діалізу по 3000мл у міш. "Віафлекс" PL146-3 з	2,27%	№3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

			ін'єкц. портом та з'єдн., або у міш. "ТвінБег" з ін'єкц. портом, з'єдн. та порож. міш. д/дрен.				
ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 2,27 % М/ОБ / 22,7 МГ/МЛ	Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія	р-н д/перит. діалізу по 2500мл у міш. "Віафлекс" PL146-3 з ін'єкц. портом та з'єдн., або у міш. "ТвінБег" з ін'єкц. портом, з'єдн. та порож. міш. д/дрен.	2,27%	№4	1780,8 8	25,88/\$	
ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 2,27 % М/ОБ / 22,7 МГ/МЛ	Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія	р-н д/перит. діалізу по 2000мл у міш. "Віафлекс" PL146-3 з ін'єкц. портом та з'єдн., або у міш. "ТвінБег" з ін'єкц. портом, з'єдн. та порож. міш. д/дрен.	2,27%	№5	2031,9 6	25,88/\$	
ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 2,27 % М/ОБ / 22,7 МГ/МЛ	Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія	р-н д/перит. діалізу по 5000мл у міш. "Віафлекс" PL146-3 з ін'єкц. портом та з'єдн., або у міш. "ТвінБег" з ін'єкц. портом, з'єдн. та порож. міш. д/дрен.	2,27%	№2	834,01	25,88/\$	
ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 3,86 % М/ОБ / 38,6 МГ/МЛ	Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія	р-н д/перит. діалізу по 3000мл у міш. "Віафлекс" PL146-3 з ін'єкц. портом та з'єдн., або у міш. "ТвінБег" з ін'єкц. портом, з'єдн. та порож. міш. д/дрен.	3,86%	№3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 3,86 % М/ОБ / 38,6 МГ/МЛ	Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія	р-н д/перит. діалізу по 2500мл у міш. "Віафлекс" PL146-3 з ін'єкц. портом та з'єдн., або у міш. "ТвінБег" з ін'єкц. портом, з'єдн. та порож. міш. д/дрен.	3,86%	№4	1780,8 8	25,88/\$	
ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 3,86 % М/ОБ / 38,6 МГ/МЛ	Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія	р-н д/перит. діалізу по 2000мл у міш. "Віафлекс" PL146-3 з ін'єкц. портом та з'єдн., або у міш. "ТвінБег" з ін'єкц. портом, з'єдн. та порож. міш. д/дрен.	3,86%	№5	2031,9 6	25,88/\$	

			з'єдн. та порож. міш. д/дрен.				
	ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 3,86 % М/ОБ / 38,6 МГ/МЛ	Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія	р-н д/перит. діалізу по 5000мл у міш. "Віафлекс" PL146-3 з ін'єкц. портом та з'єдн., або у міш. "ТвінБег" з ін'єкц. портом, з'єдн. та порож. міш. д/дрен.	3,86%	№2	834,01	25,88/\$

- **Ікодекстрин + Натрію хлорид + Кальцію хлорид + Магнію хлорид + Натрію лактат (Icodextrin + Sodium chloride + Calcium chloride + Magnesium chloride + Sodium lactate)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕКСТРАНІЛ	Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія	р-н д/перит. діалізу по 2,5л у мішк. з ін'єк. порт. та з'єдн.	75г/5,4г/0,257г/0,051г/4,5г/1000мл	№4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕКСТРАНІЛ	Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія	р-н д/перит. діалізу по 2,5л у мішк. з ін'єк. порт., з'єдн. та мішк. д/дрен. в пак.	75г/5,4г/0,257г/0,051г/4,5г/1000мл	№4	3657,13	25,79/\$
	ЕКСТРАНІЛ	Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія	р-н д/перит. діалізу по 2л у мішк. з ін'єк. порт. та з'єдн.	75г/5,4г/0,257г/0,051г/4,5г/1000мл	№5	4220,66	25,79/\$
	ЕКСТРАНІЛ	Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія	р-н д/перит. діалізу по 2л у мішк. з ін'єк. порт., з'єдн. та мішк. д/дрен. в пак.	75г/5,4г/0,257г/0,051г/4,5г/1000мл	№5	4363,80	25,79/\$

- **Кальцію хлорид + гліцин + лізин + ізолейцин + лейцин + метіонін + фенілаланін + триптофан + валін + аргінін + гістидин + аланін + пролін + кислота яблучна + треонін + натрію гліцерофосфат + магнію хлориду гексагідрат + калію гідроксид (Calcium chloride + glycine + lysine + isoleucine + leucine + methionine + phenylalanin + tryptophan + valin + arginin + histidine + alanin + prolin + malic acid + threonine + sodium glycerophosphate + magnesium chloride hexahydrate + kalium hydroxide)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АМІНОСОЛ® НЕО Е 10 %	"Хемофарм" АД (контроль якості, випуск серії)/Хемомонт д.о.о. (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості), Сербія/Чорногорія	р-н д/інфуз. по 500мл у пл.	10%	№1	171,53	28,83/€

10.7. Розчини осмотичних діуретиків

- **Манітол (Mannitol) ***

Фармакотерапевтична група: B05BC01 - р-ни осмотичних діуретиків.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить виражену діуретичну дію за рахунок підвищення осмотичного тиску плазми і фільтрації без наступної канальцевої реабсорбції, призводить до утримання води в канальцях і збільшення об'єму сечі, підвищуючи осмолярність плазми, спричиняє переміщення рідини з тканин у судинне русло; сприяє швидкому виведенню рідини із судинного русла, підвищує нирковий кровотік, завдяки чому зменшується гіпоксія ниркової тканини; знижує реабсорбцію води, збільшує об'єм циркулюючої крові, чинить сечогінну дію, знижує ВЧТ; спричиняє підвищення об'єм циркулюючої крові (через зростання осмотичного тиску в судинному руслі).

Показання для застосування ЛЗ: набряк мозку^{ВООЗ, БНФ}, церебральна гіпертензія, інтенсивна терапія судомного статусу, асцит; г. печінкова або ниркова недостатність зі збереженою фільтраційною здатністю нирок та інші стани, які потребують посилення діурезу (епілептичний статус, г. напад глаукоми^{ВООЗ, БНФ}, операції із застосуванням екстракорпорального кровообігу, посттрансфузійні ускладнення після введення несумісної крові, отруєння барбітуратами та інші отруєння).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити в/в краплинно або повільно струминно; дорослим вводити 50-100 г манітолу зі швидкістю, що забезпечує рівень діурезу не менше 30-50 мл/год.; при набряку мозку, підвищеному ВЧТ або глаукомі - інфузія з розрахунку 0,25-1 г/кг протягом 30-60 хв^{БНФ}, у пацієнтів з низькою масою тіла або знесилених хворих достатньою є доза 0,5 г/кг; при отруєннях - 50-180 г зі швидкістю інфузії, що забезпечує діурез на рівні 100-500 мл/год., МДД для дорослих - 140-180 г; дітям як діуретичний засіб вводити в/в краплинно з розрахунку 0,25-1 г/кг або 30 г на 1 м² поверхні тіла протягом 2-6 год, при набряку мозку, підвищеному ВЧТ або глаукомі - 0,5-1 г/кг або 15-30 г на 1 м² поверхні тіла протягом 30-60 хв, у дітей з низькою масою тіла або знесилених пацієнтів достатньою є доза 0,5 г/кг; при отруєннях у дітей проводити в/в інфузію в дозі до 2 г/кг або 60 г на 1 м² поверхні тіла; при нирковій недостатності з олігурією вводити 0,2 г/кг протягом 3 - 5 хв, далі спостерігати за діурезом упродовж 1-2 год; якщо він становить понад 30 мл/год або підвищиться на 50 %, продовжувати введення манітолу в/в повільно так, щоб діурез утримувався на рівні 40 мл/год.; пробна доза: пацієнтам з олігурією або при підозрі на наявність порушення вивідної функції нирок вводити контрольну дозу манітолу: для дорослих звичайна контрольна доза становить 0,2 г/кг; для дітей - 0,2 г/кг або 6 г/м² поверхні тіла; контрольна доза вводиться протягом 3-5 хв, діурез повинен збільшитися до 30-50 мл/год протягом 2-3 год, якщо діурез не збільшився, може бути введена повторна контрольна доза.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: зневоднення організму, порушення водно-сольового балансу, гіпонатріємія, гіпокаліємія; сухість шкіри, шкірні висипання, свербіж; тахікардія, біль за грудиною, зниження та підвищення АТ; судоми, галюцинації, головний біль; диспепсія, сухість у роті, спрага; м'язова слабкість, флебіт, набряк обличчя.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до компонентів ЛЗ; тяжка СН; тяжкі форми дегідратації; гіперосмолярний стан, ниркова недостатність з порушенням фільтраційної функції нирок; ГНН з тривалістю анурії понад 12 год; геморагічний інсульт; субарахноїдальний крововилив; гіпонатріємія; гіпохлоремія; гіпокаліємія; ураження головного мозку, що супроводжуються порушенням цілісності гематоенцефалічного бар'єра; коматозні стани.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МАНІТ	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	15%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МАНІТ	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	15%	№1	54,69	
	МАНІТ	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	15%	№1	79,30	
	МАНІТ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл, 250мл, 500мл у пл. та конт.	150мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МАНІТ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	150мг/мл	№1	56,50	
	МАНІТ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 400мл у пл.	150мг/мл	№1	83,07	
	МАНІТ-НОВОФАРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 250мл, 400мл, 500мл у пл.	150мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МАНІТ-НОВОФАРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	150мг/мл	№1	70,00	

10.8. Засоби сорбційної терапії

10.8.1. Ентеросорбенти

- **Вугілля медичне активоване (Medicinal charcoal) * ****

Фармакотерапевтична група: А07ВА01 - ентеросорбенти.

Основна фармакотерапевтична дія: адсорбуючий засіб; має велику поверхневу активність і високу сорбційну здатність; поглинає з травного тракту токсичні речовини, солі важких металів, алкалоїди і глікозиди, лікарські речовини, сприяючи їх виведенню з організму; адсорбує на своїй поверхні газів; нетоксичний.

Показання для застосування ЛЗ: г. та хр. отруєння^{БНФ, ВООЗ} харчовими, побутовими та промисловими отрутами, алкалоїдами, ЛЗ, солями важких металів; при підготовці до рентгенологічних досліджень; харчові токсикоінфекції; при проживанні у несприятливих екологічних умовах або дії шкідливих виробничих чинників, зміні звичайного способу харчування під час відпустки, відрядження, подорожей; у якості допоміжної терапії при розладах та інфекційних захворюваннях ШКТ (диспепсія, метеоризм, кишкові інфекції, г. та хр. вірусні гепатити); при захворюваннях, що супроводжуються с-мом ендогенної інтоксикації (г. та хр. ураженнях печінки, нирок, алергічних, аутоімунних та онкологічних захворюваннях, при підвищеному вмісті холестерину).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати р/ос; табл.: при отруєннях дорослим у дозі 20-30 г на прийом у вигляді водної суспензії (на 1-2 склянки води); при підвищеній кислотності дорослим 1-2 г 3-4 р/добу; дітям віком від 3 років звичайна доза становить 2-4 табл. 3-4 р/добу; у разі діареї дозу збільшувати до 4-5 табл. 3-4 р/добу; при різних отруєннях дітям віком 3-7 років призначати внутрішньо у дозі 5 г 3 р/добу; дітям 7-14 років внутрішньо у дозі 7 г 3 р/добу; табл. та капс.: при метеоризмі та диспепсії дорослим застосовувати по 1-3 капс./табл. 3-4 р/добу; при отруєннях та інтоксикаціях дорослим застосовувати по 2-6 капс. 3 р/добу, дітям від 7 років застосовувати по 1-3 капс. 3-4 р/добу; порош.: залежно від ступеня інтоксикації дорослим призначати по 5-10 г 3 р/добу, дітям віком 7-14 років - по 2,5-5 г 3 р/добу; тривалість курсу лікування при г. захворюваннях 3-5 днів, при хр., які зумовлені ендогенними інтоксикаціями - 10-15 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота, блювання, прояви підвищеної чутливості; розлади функцій кишечника (діарея, запор), порушеннями всмоктування, дефіцит вітамінів, гормонів, жирів, білків.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до активованого вугілля або до компонентів ЛЗ; виразки ШКТ, шлункові кровотечі, кишкова непрохідність.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 5 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА", Україна	табл. у бл.	0,25г	№10, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл. у бл.	250мг	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл. в конт. безчар. уп.	250мг	№10	7,04	
	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	табл. у бл.	0,25г	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	табл. у бл.	0,25г	№10	6,96	
	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	табл. у бл.	0,25г	№10x10	6,96	
	СОРБЕКС®	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА", Україна	капс. у бл. в пач.	0,25г	№10x1, №10x2, №2x100	відсутня у реєстрі ОВЦ	

- **Гідрогель метилкремнієвої кислоти (Methylsiliconic acid hydrogel) **** (див. п. 3.12.2.2. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

10.9. Інші лікарські засоби

10.9.1. Нестероїдні протизапальні лікарські засоби

- **Еторикоксиб (Etoricoxib)** (див. п. 8.7.1.5. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

10.9.2. Інші снодійні та седативні засоби

- **Дексмедетомідин (Dexmedetomidine)**

Фармакотерапевтична група: N05CM18 - психолептики; інші снодійні та седативні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: високоселективний агоніст α -2-рецептора; має сильний симпатолітичний ефект завдяки зниженню вивільнення норадреналіну із закінченню симпатичних нервів; завдяки зниженому збудженню блакитної плями, основного норадренергічного ядра, що знаходиться у стовбурі мозку виявляє седативний ефект (подібний до природного сну без швидкого руху очей), набуваючи здатності чинити седативну дію і одночасно дозволяючи пацієнту знаходитися у пробудженому та активному стані; чинить анестезуючу і помірну знеболювальну дію; не чинить пригнічувальної дії на дихальну систему.

Показання для застосування ЛЗ: седація в госпітальних умовах (у відділеннях інтенсивної терапії, анестезіології та реанімації)^{БНФ} пацієнтів, які потребують рівня седації не глибше, ніж пробудження у відповідь на голосову стимуляцію.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в інфузійно із застосуванням контрольованого інфузійного пристрою; дуже сильнодіючий, тому швидкість інфузії вказується на одну год.; вводити особам, які мають досвід лікування пацієнтів, що потребують інтенсивної терапії; застосовувати лише у вигляді розведеної внутрішньовенної інфузії із застосуванням контрольованого інфузійного пристрою; дорослим пацієнтам, яким вже проведена інтубація та які знаходяться в стані седації, можна переводити на дексмететомідин із початковою швидкістю інфузії 0,7 мкг/кг/год, яку можна поступово корегувати в межах дози 0,2-1,4 мкг/кг/год для досягнення бажаного рівня седації^{БНФ}; для ослаблених пацієнтів розглянути доцільність застосування найнижчої початкової швидкості інфузії; зазвичай ударна доза навантаження не потрібна; залежно від процедури може знадобитися супутня місцева анестезія або аналгезія для досягнення бажаного клінічного ефекту, рекомендується застосовувати додаткову аналгезію або седативні засоби у разі проведення болісних процедур або за необхідності більшої глибини седації.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпер-/гіпоглікемія; метаболічний ацидоз, гіпоальбумінемія; ажитація, галюцинації; брадикардія, ішемія, ІМ, тахікардія, AV-блокада I ст., зменшення хвилинного об'єму серця; гіпотензія, АГ; пригнічення дихання, диспное, апное; нудота, блювання, сухість у роті, здуття живота; загальні порушення і реакції в місці введення, с-м відміни, гіпертермія; неефективність ЛЗ, спрага; поліурія.

Противоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до дексмететомідину або до будь-якої з допоміжних речовин препарату; AV-блокада II-III ст. (при відсутності штучного водія ритму); неконтрольована артеріальна гіпотензія; г. цереброваскулярна патологія.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 1 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДЕКСДОР	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серій)/Оріон Корпорейшн, Оріон Фарма, Завод в Турку (виробник, що здійснює контроль якості та вторинне пакування), Фінляндія/Фінляндія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 2мл, 4мл, 10мл в амп. та фл. у кор	100мкг/мл	№4, №5, №25	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДЕКСДОР	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серій)/Оріон Корпорейшн, Оріон Фарма, Завод в Турку (виробник, що здійснює контроль якості та вторинне пакування), Фінляндія/Фінляндія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 2мл в амп. та фл. у кор	100мкг/мл	№5	1897,10	29,41/€
	ДЕКСДОР	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серій)/Оріон Корпорейшн, Оріон Фарма, Завод в Турку (виробник, що здійснює контроль якості та вторинне пакування), Фінляндія/Фінляндія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 4мл в амп. та фл. у кор	100мкг/мл	№4	2483,22	30,25/€
	ДЕКСМЕДЕТОМІ ДИН ЕВЕР ФАРМА	ЕВЕР Фарма Єна ГмбХ (повний цикл виробництва готового лікарського засобу, включаючи первинне та вторинне пакування, контроль якості; вторинне пакування)	конц. д/р-ну д/інфуз. по 2мл, 4мл, 10мл в амп. та фл. у кор.	100мкг/мл	№4, №5, №25	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	(додаткова дільниця), Німеччина					
ДЕКСМЕДЕТОМІ ДИН ЕВЕР ФАРМА	ЕВЕР Фарма Єна ГмБХ (повний цикл виробництва готового лікарського засобу, включаючи первинне та вторинне пакування, контроль якості; вторинне пакування (додаткова дільниця), Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 2мл в амп. у кор.	100мкг/мл	№5	1800,2 9	30,21/€
ДЕКСМЕДЕТОМІ ДИНУ ГІДРОХЛОРИД	Янгсу Хенгруї Медіцинс Ко., Лтд, Китай	р-н д/ін'єк. по 2мл у скл. фл.	100мкг/мл	№25	1962,8 0	27,16/\$
МИРОДЕКС	ТОВ "Фармідея", Латвія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 2мл	100мкг/мл	№4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МИРОДЕКС	ТОВ "Фармідея", Латвія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 2мл	100мкг/мл	№5	1400,0 0	30,24/€

11. АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

11.1. Протимікробні та антисептичні засоби

11.1.1. Антибіотики

11.1.2. Похідні хіноліну

11.1.3. Похідні імідазолу

11.1.4. Лікарські засоби для лікування протозойних інфекцій

11.1.5. Інші протимікробні та антисептичні засоби

11.2. Засоби, що підвищують тонус та скорочувальну активність міометрію

11.2.1. Алкалоїди ріжків

11.2.2. Простагландини

11.3. Засоби, що пригнічують скоротливу активність матки

11.4. Контрацептиви для місцевого застосування

11.4.1. Внутрішньоматкові контрацептиви

11.4.2. Вагінальні контрацептиви

11.5. Інші засоби, що застосовуються в гінекології

11.5.1. Інгібітори пролактину

11.5.2. Інші засоби, що застосовуються в гінекології

11.6. Гормони статевих залоз та лікарські засоби, що застосовуються при патології статевої системи

11.6.1. Гормональні контрацептиви для системного застосування. Гестагени

11.6.2. Естрогени

11.6.2.1. Прості препарати природних та напівсинтетичних естрогенів

11.6.3. Гестагени

11.6.3.1. Похідні прегнену

11.6.3.2. Похідні прегнадієну

11.6.3.3. Похідні естрену

11.6.4. Гонадотропіни та інші стимулятори

11.6.4.1. Гонадотропні гормони

11.6.4.2. Синтетичні стимулятори овуляції

11.6.5. Антигестагенні засоби

11.7. Аналоги гонадотропін-релізинг гормона

11.8. Анти-гонадотропін-релізинг гормони

11.9. Гормони задньої долі гіпофіза

11.9.1. Окситоцин та його аналоги

11.10. Розчин для іригацій

11.11. Вакцини для профілактики захворювань, що викликаються папіломавірусною інфекцією

11.1. Протимікробні та антисептичні засоби

11.1.1. Антибіотики

- **Натаміцин (Natamycin) **** (див. п. 17.4.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: G01AA02 - протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються у гінекології, за винятком комбінованих препаратів, які містять кортикостероїди. А/б. Натаміцин.

Основна фармакотерапевтична дія: фунгіцидний засіб, незворотно зв'язується зі стероїдами клітинної мембрани, сприяючи порушенню ф-ції та цілісності останньої, т. ч. руйнуючи м/о, до натаміцину чутливі велика

кількість дріжджових грибів, дріжджоподібних організмів, дерматофітів та грибів, середня мінімальна фунгіцидна концентрація (МФК) становить 1-10 мкг/мл для більшості м/о, включно зі штамми *Candida albicans*, найпоширенішим патогеном, що спричиняє грибові інфекції.

Показання для застосування ЛЗ: вагініти, спричинені *Candida albicans*.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати дорослим жінкам по 1 песарію (супоз.) 3-6 днів., вводити якнайглибше вводити у піхву (у положенні лежачи) 1 р/добу (на ніч), у разі необхідності проведення лікування протягом кількох днів курс терапії завершити до початку менструації чи розпочинати лікування після її закінчення.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ція гіперчутливості, відчуття печіння та подразнення, може спостерігатися підвищена чутливість до спирту цетилового.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ФЕМІФУЦИН	ПАТ "Монфарм", Україна	песарії у стрип.	100мг	№3x1, №3x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	ПІМАФУЦИН®	Темплер Італія С.р.л., Італія	супоз. вагін. у стрип.	100мг	№3x1, №3x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Кліндамицин (Clindamycin) *** (див. п. 17.2.5. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: G01AA10 - протимікробні і антисептичні засоби для застосування в гінекології, за винятком комбінованих препаратів, що містять КС.

Основна фармакотерапевтична дія: це лінкозамідний а/б, що пригнічує синтез білків бактерій, діючи на бактеріальні рибосоми; а/б переважно зв'язується з рибосомною субодиноцею 50S і впливає на процес трансляції; як і більшість інгібіторів синтезу білків, чинить переважно бактеріостатичну дію, його ефективність пов'язана з тривалістю часу, коли концентрація діючої речовини залишається вище МІК (мінімальна інгібуюча концентрація) збудника інфекції; проявляє активність проти наступних зареєстрованих штамів мікроорганізмів, асоційованих з бактеріальним вагінозом: *Bacteroides spp.*, *Gardnerella vaginalis*, *Mobiluncus spp.*, *Mycoplasma hominis*, *Peptostreptococcus spp.*

Показання для застосування ЛЗ: лікування бактеріального вагінозу^{БНФ} (попередні назви - гемофільний вагініт, гарднерельозний вагініт, неспецифічний вагініт, коринебактерний вагініт, анаеробний вагіноз).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза - 1 повний аплікатор 2% вагінального крему (приблизно 5 г^{БНФ}) інтравагінально, перед сном, протягом 3-7 днів поспіль^{БНФ} або 1 супоз. (100 мг) інтравагінально, перед сном, протягом 3 днів поспіль.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: цервіцит/вагініт, подразнення вульви та піхви, вагінальний кандидоз, запаморочення, головний біль, вертиго, печія, нудота, блювання, діарея, запор, біль у животі, псевдомембранозний коліт, висипання, екзантема, кропив'янка, здуття живота, метеоризм, запах із рота, порушення з боку ШКТ, диспепсія, дисгевзія, біль у місці введення, запалення, гіпертиреоїдизм, інфекції ВДШ, носова кровотеча, грибові інфекції, бактеріальні інфекції, вагінальні інфекції, кандидоз (на шкірі), інфекції сечовидільного тракту, глюкозурія, протеїнурія, дизурія, біль у спині, біль у боці, вульвовагінальні розлади, біль у піхві, виділення з піхви, порушення менструального циклу, маткова кровотеча, патологічні пологи, біль у тазу, трихомонадний вульвовагініт, ендометріоз, свербіж, еритема, р-ції гіперчутливості, нейтропенія, лейкопенія, агранулоцитоз, тромбоцитопенія, анафілактоїдні р-ції, жовтяниця, мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини, лінкоміцину або до будь-яких допоміжних речовин; протипоказаний пацієнтам, які мають у анамнезі запальні захворювання кишечника або коліт, асоційований з прийомом а/б.

Визначена добова доза (DDD): вагінально - 0,1 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ВАГЦИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	крем вагін. по 20г у тубі з Заплік.	20 мг/г	№3	17,68	
	МІЛАГІН	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна	супоз. вагін. у стрип.	100мг	№3x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	БАНБАКТ®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	супоз. вагін. у стрип.	100мг	№3x1	46,67	23,98/\$
	ДАЛАЦИН	Фармація і Апджон Компані ЛЛС, США	супоз. вагін. у стрип. з 1аплік.	100мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДАЛАЦИН ПІХВОВИЙ КРЕМ	Фармація і Апджон Компані ЛЛС, США	крем вагін. по 20г у тубі з Заплік.	20 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Хлорамфенікол (Chloramphenicol) *** (див. п. 17.2.8. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: G01AA05 - протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються у гінекології. Антибіотики.

Показання для застосування ЛЗ: бактеріальні гінекологічні інфекції (вагініти, цервіцити), спричинені чутливими до синтоміцину м/о; профілактика гнійно-запальних захворювань у гінекології; перед інвазивними процедурами: абортами, гінекологічними операціями (діатермокоагуляція шийки матки, гістерографія), до та після встановлення внутрішньоматкової спіралі.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують дорослим жінкам по 1 супоз. 2-3 р/добу вводити якомога глибше у піхву, МДД - 4 супоз., курс лікування - 5-7 днів.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	СИНТОМІЦИН	ПАТ "Монфарм", Україна	супоз. вагін. у стрип.	0,25г	№5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	

Комбіновані препарати

- **Натаміцин + Неоміцину сульфат + Гідрокортизон (Natamycin + Neomycin sulphate + Hydrocortisone)** (див. п. 9.1.3.2. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

11.1.2. Похідні хіноліну

- **Хлорхінальдол (Chlorquinaldol)**

Фармакотерапевтична група: G01AC03 - протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються у гінекології.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить протигрибкову дію щодо аскоміцетів роду *Aspergillus* та роду *Penicillium*, дріжджових та дріжджоподібних (*Candida albicans* та ін.) грибів, а також щодо дерматофітів; чинять а/б дію щодо Гр (+) і Гр (-) бактерій (*Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus vulgaris*, *Corinebacterium diphtheriae*, *Salmonella spp.*, *Escherichia coli*), а також деяких найпростіших (*Entamoeba histolitica*, *Trichomonas vaginalis*, *Lambliа intestinalis*), ЛЗ властива помірна гіперосмолярна активність, унаслідок якої він поглинає піхвові виділення.

Показання для застосування ЛЗ: кольпіти, вульвовагініти грибкової та неспецифічної бактеріальної етіології.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим жінкам вагінально по 1 супоз./добу протягом 20 днів або по 1 супоз. 2 р/добу протягом 10 днів (перед застосуванням супозиторій необхідно змочити водою); терапію розпочинати на початку менструального циклу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР, висип, свербіж у ділянці статевих органів, контактний дерматит, реакції у місці введення, печіння, подразнення, реакції шкіри, контактний дерматит.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до хлорхінальдолу або до інших компонентів препарату.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ХІНОФУЦИН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	супоз. вагін. у бл.	0,015г	№5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	

- **Декваліній (Dequalinium) ****

Фармакотерапевтична група: G01AC05 - протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються в гінекології.

Основна фармакотерапевтична дія: четвертинна амонієва сполука з широкою антимікробною активністю щодо багатьох Гр(+) та Гр(-) бактерій, грибків і найпростіших (*Trichomonas vaginalis*); основний механізм дії деквалінію хлориду полягає в посиленні проникності бактеріальної клітини та подальшої втрати активності ферментів, що призводить до загибелі клітини; проявляє швидку бактерицидну та фунгіцидну дію; зазвичай чутливі види: аеробні Гр (+) бактерії - *Enterococcus faecalis*, *Listeria spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae* (стрептококи групи В), *Streptococcus pyogenes* (стрептококи групи А), аеробні Гр (-) бактерії - *Enterobacter spp.*, *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Serratia spp.*; анаеробні бактерії - *Atopobium vaginae*, *Bacteroides spp.*, *Fusobacteria*, *Gardnerella vaginalis*, *Prevotella spp.*, *Peptostreptococci*, *Poryphyromonas spp.*; гриби - *Candida albicans*, *Candida tropicalis*, *Candida glabrata*, *Candida krusei*; організми з первинною резистентністю - *Proteus sp.*, *Chlamydia trachomatis*.

Показання для застосування ЛЗ: вагінальні інфекції бактеріального та грибкового походження, бактеріальний вагіноз, кандидоз.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати 1 вагін.табл. щодня протягом 6 днів, вагін. табл. вводити глибоко у піхву ввечері перед тим, як лягти спати, краще зробити це, лежачи на спині, ледь зігнувши ноги, під час менструації лікування припинити і продовжити після її припинення; незважаючи на те, що зменшення виділень та запалення зазвичай настає ч/з 24-72 год, необхідно продовжувати лікування, навіть якщо вже немає відчуття дискомфорту (свербіж, виділення, запах), лікування, що триває < 6 днів, може призвести до рецидиву, курс лікування - 6 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: вагінальні виділення, вульвовагінальний свербіж, відчуття печіння у вульвовагінальній зоні, вагінальна кровотеча, біль у піхві, виразки та мацерація піхвового епітелію, маткова кровотеча, почервоніння, вагінальна сухість, вагінальний кандидоз, бактеріальний вагініт, грибкова інфекція шкіри, вульвіт, вульвовагініт, цистит, головний біль, нудота, АР з симптомами кропив'янки, еритема, екзантема, набряк, висипання або свербіж, лихоманка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин; виразки епітелію піхви та піхвової частини шийки матки; не застосовувати молодим дівчатам, у яких не було першої менструації та які не досягли статевої зрілості.

Визначена добова доза (DDD): вагінально - 20 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ФЕМІКЛІН	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. вагін. у бл.	10мг	№6x1	31,42	
	ФЛУМІБАКТ ІС	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. вагін. у бл.	10мг	№6x1	31,00	
II.	ФЛУОМІЗИН	Медінова АГ (відповідальний за контроль якості та випуск серії)/ Роттендорф Фарма ГмбХ (відповідальний за вир-во, відповідальний за перв. та втор. пакув.), Швейцарія/ Німеччина	табл. вагін. у бл.	10мг	№6x1, №2x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

11.1.3. Похідні імідазолу

- **Метронідазол (Metronidazole)** * (див. п. 17.2.9. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: G01AF01 - протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються у гінекології.
Похідні імідазолу.

Основна фармакотерапевтична дія: належить до 5-нітроімідазолу, м-м дії полягає у біохімічному відновленні 5-нітрогрупи метронідазолу в/клітинними транспортними протеїнами анаеробних м/о та найпростіших, відновлена 5-нітрогрупа взаємодіє з ДНК клітини м/о, інгібуючи синтез їхніх нуклеїнових кислот, що призводить до загибелі бактерій; має широкий спектр протимікробної дії; до препарату чутливі: Peptostreptococcus spp., Clostridium spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Prevotella spp., Veilonella; нестійно чутливі: Bifidobacterium spp., Eubacterium spp.; нечутливі: Propionibacterium, Actinomyces, Mobiluncus; пригнічує розвиток найпростіших - Trichomonas vaginalis, Giardia intestinalis (Lambliа intestinalis), Entamoeba histolytica.

Показання для застосування ЛЗ: трихомонадний вагініт^{ВООЗ}, неспецифічні вагініти^{ВНФ}, бактеріальні вагінози^{ВНФ} різної етіології, підтверджені клінічними і мікробіологічними даними.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: трихомонадний вагініт: 500 мг (1 супоз., песарій або вагін. табл.) 1 р/добу на ніч 10 днів, лікування поєднувати з р/ос застосуванням метронідазолу; неспецифічні вагініти: 500 мг (1 супоз., песарій або вагін. табл.) 1 р/добу 7 днів, за необхідності призначати табл. р/ос ; максимальна тривалість лікування не повинна перевищувати 10 днів, а кількість курсів лікування - не більше 2-3 на рік; необхідним є одночасне лікування статевого партнера пацієнтки, навіть у разі відсутності у нього симптомів інфекції; не припиняти лікування у період менструації; бактеріальні вагінози - рекомендована доза вагінального гелю становить 5 г інтравагінально (1 повний аплікатор) 2р/добу (вранці і ввечері), курс лікування 5 днів^{ВНФ}, протягом курсу лікування уникати статевих контактів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: агранулоцитоз, нейтропенія, тромбоцитопенія, панцитопенія; лейкопенія, анорексія, галюцинації; психотичні р-ції з параноєю та/або делірієм, які у поодиноких випадках можуть супроводжуватися думками суїцидального характеру або спробами суїциду, депресивний настрій, периферична сенсорна нейропатія; головний біль, запаморочення, сплутаність свідомості, судоми; асептичний менінгіт, енцефалопатія, що може супроводжуватися змінами на МРТ, як правило, оборотного характеру, летальні випадки, підгострий мозочковий с-м (атаксія, дизартрія, порушення ходи, ністагм, тремор), тимчасові порушення зору, наприклад порушення чіткості зору, диплопія, міопія, зниження гостроти зору, зміни у сприйнятті кольорів; оптична нейропатія/неврит, порушення слуху/втрата слуху (включаючи нейросенсорну), дзвін у вухах, незначні розлади ШКТ (біль в епігастрії, нудота, блювання, діарея); глосит з сухістю у роті, стоматит, смакові розлади; випадки панкреатиту, які мають оборотний характер; зміна кольору або зміна зовнішнього вигляду язика (мікоз), підвищення рівнів печінкових ферментів (АСТ, АЛТ, лужна фосфатаза), випадки г. холестатичного або змішаного гепатиту та гепатоцелюлярного ураження печінки, інколи з появою жовтяниці, випадки гепатоцелюлярної недостатності, при якій може виникати необхідність у трансплантації печінки; припливи з гіперемією, свербіж, висипи, які можуть супроводжуватися пропасницею; кропив'янка, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок, г.генералізований екзентематозний пустульоз, токсичний епідермальний некроліз; фіксована токсикодермія; с-м Стівенса-Джонсона, с-м Лаелла, міалгія, артралгія, сеча може набувати червоно-коричневого забарвлення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до метронідазолу або до іншого компонента препарату; гіперчутливість до похідних імідазолу; не призначати одночасно з дисульфірамом або алкоголем.

Визначена добова доза (DDD): вагінально - 0,5 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГРАВАГІН	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна	песарії у стрип.	500мг	№5x2		відсутня у реєстрі ОБЦ
	МЕТРОНІДАЗОЛ	ПАТ "Монфарм", Україна	супоз. вагін. у стрип.	0,1г	№5x2		відсутня у реєстрі ОБЦ
	МЕТРОНІДАЗОЛ-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	песарії у бл.	500мг	№5x2	3,59	
II.	МЕТРОГІЛ® ВАГІНАЛЬНИЙ ГЕЛЬ	"Юнік Фармасьютикал Лабораторіз" (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	гель вагін. по 30г у тубі з аплік.	10 мг/г	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
	МЕТРОНІДАЗОЛ	ТОВ "Фармапрім", Республіка Молдова	песарії у стрип.	500мг	№5x2		відсутня у реєстрі ОБЦ
	МІСТОЛ®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	супоз. вагін. у стрип.	500мг	№5x2	7,88	27,00/\$
	ТРИХОПОЛ®	Фармацевтичний Завод "Польфарма" С. А., Польща	табл. вагін. у бл.	500мг	№10x1		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ФЛАГІЛ®	Юнітер Ліквід Мануфекчурінг, Франція	супоз. вагін. у стрип.	500мг	№5x2		відсутня у реєстрі ОБЦ

11.1.4. Лікарські засоби для лікування протозойних інфекцій

- **Фентиконазол (Fenticonazole)**

Фармакотерапевтична група: G01AF12 - протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються в гінекології. Похідні імідазолу.

Основна фармакотерапевтична дія: протигрибковий засіб широкого спектра дії, препарат має високу фунгістатичну та фунгіцидну активність відносно дерматофітів (усі види Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton), Candida albicans та до інших грибкових інфекцій шкірних покривів та слизових оболонок, інгібує кислотну протеїназу Candida albicans, чинить антибактеріальну дію відносно Gr (+) м/о, механізм дії полягає у інгібуванні окислення ензимів накопиченим пероксидом та некрозі грибкових клітин, що виявляється у безпосередній дії на мембрани, також виявляє активність по відношенню до Trichomonas vaginalis in vivo та in vitro.

Показання для застосування ЛЗ: генітальний кандидоз (молочниця), вульвовагініти, кольпіти^{БНФ}, вагінальний трихомоніаз та змішані інфекції слизових оболонок статевих шляхів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: капс. ваг. м'які: застосовують інтравагінально, 1 капс. вводять глибоко у вагіну у положенні лежачи увечері перед сном^{БНФ}, інфекції, викликані Trichomonas vaginalis, та змішані інфекції - при необхідності провести повторне застосування ч/з 24 год, інфекції, викликані Candida albicans - 1 капс. застосовувати однократно ввечері, якщо симптоми зберігаються, застосувати ще 1 капс. ч/з 3 дні; крем застосовується інтравагінально, глибоко у піхву вводять вміст одного аплікатора, приблизно 5 г, застосовують перед сном за допомогою чистого багаторазового аплікатора^{БНФ}, щоб уникнути повторного інфікування, рекомендується одночасно проводити місцеве лікування статевого партнера пацієнтки шляхом нанесення крему на голівку статевого члена та крайньої плоти.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: печіння слизової оболонки піхви, почервоніння, свербіж, висипання.

Противпоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин препарату.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЛОМЕКСИН®	Каталент Італі С.п.А., Італія	капс. вагін. м'які у бл.	200мг, 600мг, 1000мг	№1, №2, №3, №6		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ЛОМЕКСИН®	Рекордати Індастріа Хіміка е Фармасевтіка С.п.А., Італія	крем вагін. по 78г у тубі з аплік.	20 мг/г	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ

- **Клотримазол (Clotrimazole) * ** (див. п. 9.1.3.2. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")**

Фармакотерапевтична група: G01AF02 - протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються в гінекології. Клотримазол.

Основна фармакотерапевтична дія: механізм антимікотичної дії пов'язаний з пригніченням синтезу ергостеролу, що призводить до структурного та функціонального пошкодження цитоплазматичної мембрани, має широкий спектр антимікотичної активності in vitro та in vivo та діє на дерматофіти, дріжджові та плісняві гриби; механізм дії пов'язаний з первинною фунгістатичною або фунгіцидною активністю, залежно від концентрації клотримазолу у місці інфекції, додатково до антимікотичної активності також діє на Gr (+) м/о (стрептококи, стафілококи, Gardnerella vaginalis) та Gr (-) м/о (Bacteroids).

Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій у ділянці статевих органів: запалення піхви (вагініт) та статевих губ (вульвіт), ^{вооз, бнф} спричинених дріжджовими грибами (зазвичай роду Candida), та суперінфекцій, спричинених бактеріями, чутливими до клотримазолу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: 1 табл. вагінальна застосовується ввечері, курс лікування для табл. вагінальних 100 мг становить 6 днів; 200 мг - 3 дні ^{вооз, бнф}; 500 мг - 1 день ^{вооз, бнф}; табл. вагінальні вводити у піхву якомога глибше, наскільки можливо, увечері, найзручніше вводити лежачи на спині зі злегка зігнутими ногами; лікування завершити до початку менструації; при лікуванні генітальних інфекцій 5 г гелю (1 повний апплікатор) ^{бнф} вводити якомога глибше у вагіну ввечері (перед сном) протягом 6 днів, лікування не проводити під час менструації, а необхідно завершити до її початку, терапія даних захворювань вимагає одночасного лікування обох партнерів; крем ваг. вводити інтравагінально за допомогою апплікатора 7 г крему (1 повний апплікатор) вводити якомога глибше у піхву ввечері (перед сном) одноразово, курс лікування - 1 день, другий курс терапії може бути призначений, якщо це необхідно, суппоз.: ввести у піхву якомога глибше, наскільки це можливо, перед сном, найзручніше вводити супоз. лежачи на спині зі злегка зігнутими ногами, один курс терапії: по 2 суппоз (200мг). протягом трьох днів або по 1 супоз. (100мг) протягом шести днів, другий курс терапії може бути призначений, якщо це необхідно.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР, непритомність, гіпотензія, задишка, кропив'янка, лущення шкіри у ділянці статевих органів, свербіж, висип, набряк, еритема, дискомфорт, відчуття печіння, подразнення, тазовий біль, вагінальна кровотеча, біль у животі; почервоніння, пухирі, біль, відчуття жару, відчуття поколювання, дискомфорт у ділянці вульви та вагіни

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена індивідуальна чутливість до клотримазолу або до інших компонентів препарату; не використовувати гель для лікування нігтів або інфекцій шкіри голови.

Визначена добова доза (DDD): вагінально - 0,1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КЛОТРИМАЗОЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл. вагін. у бл.	100мг	№10x1	2,08	
II.	КАНДІД	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія	гель вагін. 30г у тубі з апплік.	20 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАНДІД-В6	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія	табл. вагін. у стрип. з апплік.	100мг	№6x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАНЕСТЕН®	Байер АГ, Німеччина	табл. вагін. у бл. з апплік.	100мг, 200мг, 500мг	№6x1, №3x1, №1x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАНЕСТЕН® КОМБІ	Байер АГ (вир-во in-bulk вагінальних таблеток; первинне пакування вагінальних таблеток; вторинне пакування комбі-упаковки: вагінальні таблетки та крем; контроль якості для вагінальних таблеток; вир-к, відповідальний за випуск серії комбі-упаковки:, Німеччина / Іспанія	табл. вагін. у бл. з апплік. + крем у тубі по 20г	200мг + 1%	комбі-упак.: №3 + №1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАНЕСТЕН® КОМБІПАК	Байер АГ (вир-к in-bulk вагінальних таблеток; первинне пакування вагінальних таблеток; вторинне пакування комбі-упаковки: вагінальні таблетки та крем; контроль якості для вагінальних таблеток; вир-к, відповідальний за випуск серії комбі-упаковки: та, Німеччина/ Іспанія	табл. вагін. у бл. з апплік. + крем у тубі по 20г	500мг + 1%	комбі-упак.: №1 + №1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛОТРИМАЗОЛ	ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А.,	табл. вагін. у бл.	100мг	№6x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	Польща						
КЛОТРИМАЗОЛ	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед, Індія	табл. вагін. у стрип. та бл. з аплік.	100мг	№6x1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
КЛОФАН	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	суппоз. вагін. у стрип.	100мг	№6x1	10,00	23,98/\$	
КЛОФАН	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	суппоз. вагін. у стрип.	500мг	№1	15,00	23,98/\$	
КЛОФАН®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	крем вагін. по 7г у тубі з аплік.	100 мг/г	№1	5,68	24,25/\$	

- **Еконазол (Econazole)** (див. п. 9.1.3.2. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: G01AF05 - протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються у гінекології.
Основна фармакотерапевтична дія: є триазоловим фунгіцидом; виявляє антимікотичну активність щодо дерматофітів, дріжджів та пліснявих грибів; активний відносно деяких Gr(+) та Gr(-) бактерій; ушкоджує клітинні мембрани грибів, шляхом підвищення проникності грибкових клітин та ушкодження внутрішньоклітинних мембран в цитоплазмі.

Показання для застосування ЛЗ: вульвовагінальні мікози^{БНФ}, спричинені збудниками грибкових інфекцій, чутливими до еконазолу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим призначають курс лікування - по 150 мг по 1 песарію або супоз. 1 р/добу у задне склепіння піхви перед сном^{БНФ}; бажано у положенні лежачи на спині; курс лікування - 3 дні поспіль, у разі рецидиву або якщо ч/з тижд. після лікування аналіз культури показав позитивний результат, провести повторний курс лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперчутливість, свербіж, відчуття печіння, кропив'янка, контактний дерматит, лущення шкіри, висипання, еритема, випадки генералізованих АР, включаючи ангіоневротичний набряк, відчуття печіння у піхві, локалізовані р-ції у місці застосування, такі як еритема, висип, контактний дерматит, лущення шкіри, відчуття печіння та свербіж, біль, подразнення, набряк.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого компонента препарату.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕКОНАЗОЛ-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	песарії у бл.	150мг	№3x1, №5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	САНТЕКВІН®	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	супоз. вагін. у бл.	0,15г	№3x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Кетоконазол (Ketoconazole)** ** (див. п. 9.1.3.2. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: G01AF11 - протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються в гінекології.
Похідні імідазолу.

Основна фармакотерапевтична дія: є синтетичним похідним імідазолдіоксолану; чинить виражену фунгіцидну та фунгістатичну дію на дерматофіти (Trichophyton spp., Epidermophyton floccosum, Microsporum spp.), дріжджові гриби (Candida spp., Pityrosporum spp., Torulopsis spp., Cryptococcus spp., Rhodotorula spp.), диморфні і вищі гриби (зуміцети); менш чутливі до кетоконазолу Aspergillus spp., Sporothrix schenckii, деякі Dermatiaceae, Mucor spp. та інші фукоміцети, за винятком Entomophthrales; активний також відносно Gr (+) коків (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.); механізм його дії полягає в інгібуванні біосинтезу ергостеролу і зміні ліпідного складу мембрани грибів, що призводить до їх лізису.

Показання для застосування ЛЗ: г. та хр. рецидивуючий вульвовагінальний кандидоз^{БНФ}; профілактика грибкових інфекцій піхви при зниженій резистентності організму та на тлі лікування препаратами, що порушують нормальну мікрофлору піхви.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: по супоз або песарію 1 р/добу, безпосередньо перед сном протягом 3 - 5 днів залежно від перебігу захворювання; при потребі курс лікування повторюють до одужання клінічного та підтвердженого лабораторними дослідженнями; при хр. кандидозі - по 1 супоз. або песарію протягом 10 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: свербіж, висипання, печіння, гіперемія, подразнення слизової оболонки піхви, шкірні висипання, кропив'янка, можливі реакції у місці введення, нудота, біль у животі, запаморочення, кропив'янка, анафілактичні та анафілактоїдні реакції, ангіоневротичний набряк.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до кетоконазолу або інших складових препарату.

Визначена добова доза (DDD): вагінально - 0,4 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КЕТОДІН	Спільне українсько-	супоз. вагін. у	400мг	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

		іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна	стрип.				
	КЕТОКОНАЗОЛ-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	песарії у бл.	400мг	№5x2	19,50	
	КЕТОКОНАЗОЛ-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	песарії у бл.	400мг	№5x1	29,90	
	ЛІВАГІН-М®	ПАТ "Монфарм", Україна	песарії у стрип.	400мг	№5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛІВАРОЛ	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	песарії у бл.	400мг	№5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	ДЕРМАЗОЛ	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	супоз. вагін. у стрип.	400мг	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДЕРМАЗОЛ	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	супоз. вагін. у стрип.	400мг	№5x2	15,73	23,98/\$

- **Сертаконазол (Sertaconazol)**

Фармакотерапевтична група: G01A19 - протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються у гінекології. Похідні імідазолу.

Основна фармакотерапевтична дія: протигрибковий препарат, похідний імідазолу, з високою фунгіцидною активністю, призначений для місцевого застосування у гінекології; м-м дії полягає у пригніченні синтезу ергостеролу і збільшенні проникності клітинної мембрани, що призводить до знищення збудників; ефективний щодо патогенних дріжджових грибів (*Candida spp*, *Candida albicans*, *Malassezia furfur*), дерматофітів (*Trichophyton*, *Epidermophyton* і *Microsporum spp*) та збудників, які спричиняють інфекційні захворювання шкіри та слизових оболонок, в т. ч. Гр(+) м/о (*Staphylococcus*, *Streptococcus*).

Показання для застосування ЛЗ: місцеве лікування вагінального кандидозу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі: 1 песарій вводять глибоко у піхву ввечері перед сном 1р/добу, якщо клінічні ознаки захворювання не зникають, можливе повторне застосування препарату ч/з 7 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: транзиторна місцева подразнююча реакція (відчуття печіння та свербіж), АР.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до протигрибкових засобів, похідних імідазолу, або до будь-яких допоміжних речовин препарату.

Визначена добова доза (DDD): вагінально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	СЕРТАКОНАЗОЛ	ПАТ "Монфарм", Україна	песарії у стрип.	300мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СЕРТАКОНАЗОЛ-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	песарії у бл.	300мг	№1	218,40	

Комбіновані препарати

- **Міконазол + метронідазол (Miconazole + metronidazole)**

Визначена добова доза (DDD): вагінально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ГАЙНЕКС®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	супоз. вагін. у стрип.	100мг/500мг	№7x2	220,00	23,98/\$
	ГАЙНЕКС® ФОРТЕ	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	супоз. вагін. у стрип.	200мг/750мг	№7x1	150,00	23,98/\$
	КЛІОН-Д 100	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл. вагін. у стрип.	100мг/100мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛІМЕНДА	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	супоз. вагін. у бл. з 14 напальч.	200мг/750мг	№7x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛІМЕНДА	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	супоз. вагін. у бл. з 7 напальч.	200мг/750мг	№7x1	167,72	28,05/\$
	НЕО-ПЕНОТРАН® ФОРТЕ	Екселтіс Ілач Санаї ве Тіджарет Анонім Шіркети, Туреччина	супоз. вагін. у бл.	200мг/750мг	№7x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

11.1.5. Інші антимікробні та антисептичні засоби

- **Ніфурадел (Nifuratel) ^[ПМД]**

Фармакотерапевтична група: G01AX05 - протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються у гінекології; протимікробні та антисептичні засоби за винятком комбінованих препаратів, що містять кортикостероїди.

Основна фармакотерапевтична дія: широкий спектр дії проти м/о, включаючи інфекції сечостатевої системи, також властива антипротозойна та протигрибкова активність; ч/з свої метаболіти впливає на ферменти, що приймають участь у процесі росту м/о; виступає у якості а/б - засобу для Гр (-) та Гр (+) аеробних та анаеробних бактерій: *Gardnerella vaginalis*, *Escherichia coli*, *Shigella*, *Salmonella spp.*, *Bacillus sp.*, *Proteus spp.*, *Klebsiella pneumoniae*, проявив сильні пригнічувальні властивості на ріст *Chlamydia trachomatis* та менш виражену дію проти *Mycoplasma pneumoniae* та *Ureaplasma urealyticum*. Широкий спектр а/б, антипротозойної та протигрибкової дії доводить ефективність ніфурателю при всіх видах сечостатевих системних інфекцій.

Показання для застосування ЛЗ: вульвовагінальні інфекції, спричинені чутливими до препарату збудниками (патогенними мікроорганізмами, трихомонадами, грибами, дріжджами, хламідіями, грибами роду *Candida*); захворювання сечостатевої системи (цистит^{ПМД}, уретрит, пієлонефрит, пієліт); кишковий амебіаз та лямбліоз.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вульвовагінальні інфекції - дорослі: 1 табл.(200мг) 3 р/добу після прийому їжі протягом 7 днів для лікування жінки та її партнера при можливості, пацієнтам, які лікуються лише табл., збільшити дозу до 4 табл.(800мг)/добу; утримуватися від сексуальних контактів під час лікування; діти від 10 років і старше: рекомендована доза - 10 мг/кг маси тіла/добу розділена на 2 прийоми, після їжі, тривалість лікування - у середньому 10 днів; інфекції сечовивідних шляхів - дорослі: рекомендована доза залежить від ступеня тяжкості захворювання і становить 3-6 табл./добу (200-400 мг 3 р/добу) після їди, курс лікування - у середньому 1-2 тижні; діти від 6 років і старше: рекомендована доза 10-20 мг/кг маси тіла/добу розділена на 2 прийоми, приймати після їди, тривалість лікування 7 - 14 днів; табл. можна застосовувати для продовження курсу лікування або повторного циклу лікування інфекцій сечовивідних шляхів; кишковий амебіаз - дорослі: по 2 табл.(400мг) 3 р/добу, після їди, протягом 10 діб; діти від 6 років і старше: рекомендована доза по 30 мг/кг маси тіла/добу розділена на 3 прийоми, протягом 10 діб; кишковий лямбліоз - дорослі: по 2 табл.(400мг) 2-3 р/добу, після їди, протягом 7 діб; діти від 6 років і старше: рекомендована доза по 30 мг/кг маси тіла/добу розділена на 2 прийоми, після їди, протягом 7 діб.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота, гіркота у роті, діарея, блювання, диспепсія; шкірні висипання, кропив'янка, свербіж; периферичні нейропатії.

Протипоказання до застосування ЛЗ: відома індивідуальна підвищена чутливість до діючої речовини або до інших компонентів препарату; порушення функції нирок; при невропатія; пацієнтам з дефіцитом глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (G6PD).

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	МАКМІРОР	Доппель Фармацеутиці С.р.л., Італія	табл., в/о у бл.	200мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Фуразолідон (Furazolidone)** (див. п. 17.2.12. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Хлоргексидин (Chlorhexidine)** ** (див. п. 9.1.4. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: G01AX - протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються в гінекології.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить швидку та виражену дію на Гр(+) та Гр(-) бактерії, дріжджі та дерматофіти: *Treponema pallidum*, *Chlamidia spp.*, *Ureaplasma spp.*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*; до препарату слабо чутливими є деякі штами *Pseudomonas spp.*, *Proteus spp.*; не чутливі: кислотостійкі форми бактерій, спори бактерій, гриби, віруси; при інтравагінальному застосуванні практично не всмоктується, системної дії не чинить.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика венеричних захворювань (сифіліс, гонорея, трихомоніаз, хламідіоз, уреаплазмоз) та інфекційно-запальних ускладнень в акушерстві та гінекології (перед оперативним лікуванням гінекологічних захворювань, перед пологам та аборт, до та після встановлення внутрішньоматкової спіралі, до та після діатермокоагуляції шийки матки, перед внутрішньоматковими дослідженнями); лікування бактеріального вагінозу, кольпіту, ерозії шийки матки.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують інтравагінально; по 1 супоз. або песарію 2 р/добу протягом 7-10 днів залежно від характеру захворювання, за необхідності можливе продовження курсу лікування до 20 днів; для профілактики венеричних захворювань - одноразово по 1 супоз. або песарію не пізніше ніж ч/з 2 год після статевого акту; вагітність: зважаючи на ступінь вираженості інфекційного процесу, дані бактеріологічних досліджень, явища загрози переривання вагітності - по 1 супоз. або песарію 1-2 р/день як монотерапію, або у складі комплексної терапії, тривалість застосування - від 5 до 10 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР, свербіж у місці введення .

Протипоказання до застосування ЛЗ: індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЕКСИТЕКС	Спільне українсько-	песарії у	16мг	№5x1,	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна	стрип.		№5x2	
ГЕКСІГІН-М®	ПАТ "Монфарм", Україна	песарії у стрип.	16мг	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ
ГЕКСІКОН	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	песарії у стрип.	16мг	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ
ГЕКСІЯ	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	песарії у конт. чар/уп.	16мг	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ
КЛІОРОН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	супоз. вагін. у бл.	16мг	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ
ЛЕДІСЕПТ-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	песарії у стрип.	16мг	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ
ХЛОРГЕКСИД ІН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	песарії у трип.	16мг	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ

- **Повідон йод (Povidone-Iodine) **** (див. п. 9.1.4. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: G01AX11 - протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються у гінекології. Протимікробні та антисептичні засоби за винятком комбінованих препаратів, що містять кортикостероїди.

Основна фармакотерапевтична дія: антисептичний препарат широкого спектра протимікробної дії по відношенню до бактерій, деяких вірусів, грибків і найпростіших м/о, при контакті зі шкірою та слизовими оболонками йод поступово вивільняється та виявляє бактерицидну дію; має широкий спектр протимікробної дії щодо бактерій, вірусів, грибків та найпростіших м/о.

Показання для застосування ЛЗ: г. та хр. вагінальні інфекції (кольпіт): змішані інфекції; неспецифічні інфекції (бактеріальний вагіноз, викликаний *Gardnerella vaginalis*); грибкові інфекції (*Candida albicans*); вагінальні інфекції внаслідок лікування а/б та стероїдними препаратами; трихомоніаз (при необхідності проводити комбіноване системне лікування); передопераційна профілактика при хірургічних операціях у піхві або діагностичних процедурах.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: 1 зволожений супоз. або песарій вводять щодня на ніч; застосовувати щодня (навіть під час менструації); при помірній інфекції - 1 р/добу протягом 7 днів, при більш тяжкій інфекції курс терапії застосовувати ще 7 днів; при стійких інфекціях призначають 2 р/добу (після консультації з лікарем).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: контактний дерматит з появою псоріазоподібних червоних дрібних бульозних утворень, АР, включаючи свербіж, почервоніння, висипання, ангіоневротичний набряк, порушення функції нирок, ГНН, гіпертиреоз, може спричинити сперміцидну дію, г. р-ції зі зниженням АТ та/або утрудненим диханням, електролітний дисбаланс; метаболічний ацидоз.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до йоду чи підозра на неї або до інших компонентів препарату, пацієнти з порушеннями функції щитовидної залози (вузловий колоїдний зоб, ендемічний зоб і тиреоїдит Хашимото), гіпертиреозидизм, перед та після лікування та скінтиграфії з радіоактивним йодом, у хворих із карциномою щитовидної залози, герпетичний дерматит Дюринга, ниркова недостатність.

Визначена добова доза (DDD): вагінально - 0,2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БЕТАЙОД-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	песарії у бл.	200мг	№7x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БЕТАЙОД-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	песарії у бл.	200мг	№7x2	13,01	
	ПОВІДИН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	супоз. вагін. у бл.	0,3г	№5x1, №5x2, №7x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	БЕТАДИН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	супоз. вагін. у бл.	200мг	№7x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БЕТАДИН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	супоз. вагін. у бл.	200мг	№7x2	27,31	25,75/\$
	БЕТАДИНЕ®	Алкалоїд АД - Скоп'є/ТОВ "МАРІФАРМ", Республіка Македонія/Республіка Словенія	песарії у стрип.	200мг	№7x2	10,81	29,96/€

11.2. Засоби, що підвищують тонус та скорочувальну активність міометрію

11.2.1. Алкалоїди ріжків

- **Метилергометрин (Methylergometrine) ***

Фармакотерапевтична група: G02AB01 - засоби, що підвищують тонус та скоротливу активність міометрія.

Основна фармакотерапевтична дія: напівсинтетичне похідне природного алкалоїду ріжків (ергометрину), підвищує тонус та скоротливу активність міометрія; стимуляційна дія алкалоїдів ріжків на матку проявляється у вигляді інтенсивних скорочень; вагітна матка, особливо наприкінці вагітності, надзвичайно чутлива до алкалоїдів ріжків; низькі дози спричиняють інтенсивні ритмічні скорочення матки, які змінюються періодами релаксації; високі дози цього препарату спричиняють скорочення разом з підвищенням базального тонусу; спричиняє скорочення гладеньких м'язів кровоносних судин; кровообіг через спіральні артерії знижений внаслідок скорочення гладеньких м'язів, а не через вплив лікарського препарату на кровоносні судини матки; це може призводити до підвищення центрального венозного тиску, а також до підвищення АТ; у післяпологовий період може знижувати продукування пролактину та секрецію молока; тривале застосування ЛЗ спричиняє ерготизм (отруєння алкалоїдами ріжків); посилює тонус матки, частоту та амплітуду її ритмічних скорочень; його швидкий та тривалий вплив на тонус матки скорочує третій період пологів та зменшує втрати крові.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика та лікування кровотечі, спричиненої атонією матки у післяпологовий період та після абортів; лікування субінволюції матки та, за умови ретельного акушерського нагляду, застосування для скорочення другого періоду пологів, з уведенням безпосередньо після появи передньої частини плеча дитини.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: пологи: 0,2 мг в/м або в/в 0,1-0,2 мг (0,5-1 мл) після появи голівки та передньої частини плеча плода; для пологів під наркозом 0,2 мг (1 мл); у випадку пологів з тазовим передлежанням плода ін'єкцію проводити безпосередньо після народження дитини, у випадку багатоплідної вагітності - після народження останньої дитини; якщо здійснення в/в ін'єкції неможливе, то 0,2-0,4 мг (1-2 мл) вводити шляхом в/м ін'єкції; кесарів розтин: після народження плода в/в - 0,05-0,1 мг (евентуально 0,2 мг) або в/м - 0,2 мг (1 мл); атонія матки після пологів та абортів: при атонічній матковій кровотечі - 0,2 мг (1 мл) в/м або 0,1 мг (0,5 мл); аборт: перед втручанням - в/в 0,1-0,2 мг (0,5-1 мл); при спонтанних абортах (викиднях) показане в/в введення 0,05-0,1 мг (0,25-0,5 мл); субінволюція матки: 0,1-0,2 мг (0,5-1 мл) п/ш або в/м до 3 р/д; не рекомендується продовжувати лікування більше 5-6 днів (для запобігання виникнення явищ ерготизму).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, шуми, тимчасове підвищення АТ, гіпотензія, нудота, блювання, абдомінальний біль, галюцинації, запаморочення; цереброваскулярні розлади, спазми м'язів кінцівок, зміна смаку, інсульт, вертиго, шум у вухах, відчуття серцебиття, брадикардія або тахікардія, біль у грудях, спазм коронарних судин, ІМ, спазм периферичних судин, закладеність носа, диспное, набряк легенів, висип, пітливість, гематурія, зміни в місці введення, включаючи тромбофлебіт, апоплексія, інтоксикація водами, анафілаксія, знижує секрецію молока, парестезії, вентрикулярна фібриляція, шлуночкова тахікардія, стенокардія, АВ-блокада.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до препарату та/або алкалоїдів ріжків; перший період пологів; другий період пологів до появи голівки плода; АГ; захворювання периферичних судин та серця (нестійка або вазоспастична стенокардія); сепсис; токсемія.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	МЕТИЛЕРГОБРЕВІН	"Хемофарм" АД, Республіка Сербія	р-н д/ін'єк., по 1мл в амп. у бл.	0,2 мг/мл	№5x10	10,70	32,47/€

11.2.2. Простагландини

• Динопростон (Dinoprostone)

Фармакотерапевтична група: G02AD02 - засоби, що діють на сечостатеву систему і статеві гормони, інші гінекологічні засоби, засоби, що підвищують скоротливу активність матки, простагландини, динопростон.

Основна фармакотерапевтична дія: належить до родини природних ненасичених жирних кислот; стимулює органи, що мають у своєму складі гладком'язову тканину, і змінювати у бажаному напрямі відповідь органів на інші гормональні стимули; сприяє дозріванню шийки матки у пацієнток з негативними індукційними показниками; препарат підвищує об'єм циркуляції крові в тканинах шийки матки так само, як це відбувається на початкових стадіях спонтанних пологів, ці дані чітко вказують на те, що ендocerвікальне застосування динопростону стимулює гемодинаміку шийки матки, у такий спосіб сприяючи її дозріванню.

Показання для застосування ЛЗ: гель вагінальний показаний для індукції пологів^{БНФ} у жінок з доношеною або майже доношеною вагітністю, які мають зрілу шийку матки та один плід у потиличному передлежанні; гель д/ендоцервік. введ.: для дозрівання шийки матки у вагітних жінок з доношеною або майже доношеною вагітністю, у разі необхідності індукції родової діяльності за терапевтичними чи акушерськими показаннями.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для індукції пологів у жінок^{БНФ} з доношеною або майже доношеною вагітністю початкова доза 1 мг, гель вагінальний застосовувати шляхом обережного введення повного вмісту шприца у заднє склепіння піхви, при необхідності ч/з 6 год можна застосувати другу дозу - 1 мг, щоб збільшити відповідь на початкову дозу; 2 мг, якщо відповіді на початкову дозу немає^{БНФ}; гель д/ендоцер. введ.: вводять шприц у цервікальний канал (безпосередньо під внутрішнім вічком шийки матки), і за допомогою катетера вводять увесь вміст шприца (0,5 мг динопростону = 3 г гелю), після чого катетер видаляють; не вводити вище рівня внутрішнього вічка шийки матки; після введення гелю пацієнтка повинна лежати на спині щонайменше 15 хв, щоб звести до мінімуму витікання гелю.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: с-м ДВЗ крові, анафілактичний шок, АР, анафілактоїдні р-ції (включаючи анафілактоїдний с-м вагітності), р-ції гіперчутливості, зупинка серця, артеріальна гіпотензія, гіпертензія, астма, бронхоспазм, легенева емболія, набряк легень, хрипи, дискомфорт в ділянці грудної клітки, кашель, задишка, апное, нудота; діарея, біль у спині, патологічні зміни скоротливої активності матки; передчасне відшарування плаценти, емболія амніотичною рідиною, швидке розкриття шийки матки, розрив матки, мертвонародження, смерть новонародженого, відчуття печіння у піхві та/або вульві; подразнення піхви, лихоманка; головний біль; порушення ЧСС плода; блювання; нудота; діарея, дистрес-с-м плода, у пацієнток, пологи у яких були індуковані фармакологічними засобами, динопростоном або окситоцином, було описано підвищення ризику розвитку післяпологового с-му ДВЗ крові, індукція пологів пов'язана із ризиком

анафілактоїдного с-му вагітності (емболія амніотичною рідиною), г.гіпотензія, зупинка серця, серцеві аритмії, симптоми-передвісники у вигляді збудження та відчуття нездужання, судоми, ціаноз, задишка або г. респіраторний дистрес-с-м, дистрес плода, кровотеча у матері, що у більшості випадків пов'язана з дисемінованою внутрішньосудинною коагуляцією.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до динопростону або до будь-яких допоміжних речовин препарату; пацієнткам, яким протипоказані засоби, що стимулюють родову діяльність: при багатоплідній вагітності; жінки, які мали шість або більше доношених вагітностей; якщо голівка плода не вставлена в родові шляхи; при наявності рубців на матці (після кесаревого розтину, гістеротомії тощо); при невідповідності розмірів голівки плода тазу матері; при зміні ЧСС плода, що свідчить про початок його ураження; якщо існують акушерські умови, за яких співвідношення ризик/користь для матері або плода свідчить на користь хірургічного втручання; при наявності під час вагітності патологічних маткових кровотеч або виділень зі статевих шляхів нез'ясованої етіології; при непотилічному передлежанні плода; при інфекційних захворюваннях нижніх статевих шляхів; важкі і/або травматичні пологи в анамнезі; при передлежанні плода вище площини входу в малий таз; дистрес плода; при хворобах серця, легень, нирок або печінки в активній фазі; при розриві хоріоамніотичних оболонок.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ПРЕПІДИЛ	Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ, Бельгія	гель д/ендоцервік. введ. по 3г у шпр. в бл. з катет.	0,5мг/3г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПРОСТИН Є2	Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ, Бельгія	гель вагін. по 3г у шпр.	1мг/3г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

11.3. Засоби, що пригнічують скоротливу активність матки

- **Гексопреналін (Hexoprenaline)**

Фармакотерапевтична група: G02CA - засоби, що впливають на сечостатеву систему та статеві гормони. Інші засоби, що застосовують у гінекології. Симпатоміметики, що пригнічують скорочувальну активність матки.

Основна фармакотерапевтична дія: селективний β_2 -симпатоміметик, що зменшує частоту та інтенсивність скорочень матки; пригнічує спонтанні, а також спричинені окситоцином пологові перейми.

Показання для застосування ЛЗ: короткочасне лікування неускладненого перебігу передчасних пологів: пригнічення скоротливої активності матки у пацієток з терміном вагітності від 22 до 37 тижнів за відсутності медичних або гінекологічних протипоказань до проведення токолітичної терапії; перед поворотом плода з поперечного положення; як екстрений захід при передчасних пологах перед транспортуванням вагітної до лікарні.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: перед поворотом плода з поперечного положення та при застосуванні у якості екстреного заходу при передчасних пологах перед транспортуванням вагітної до лікарні - р-н д/ін'єкц. 10 мкг (1 амп. по 2 мл), розведених у 10 мл 0,9 % р-ні натрію хлориду або 5 % р-ні глюкози, вводити впродовж 5-10 хв в/в, у разі необхідності продовжити лікування препаратом концентрат для р-ну д/інфузій; короткочасне лікування передчасних пологів при наявності вкорочення і/або розкриття шийки матки - на початку лікування починають із струминного введення дози 10 мкг (1 амп. по 2 мл) з подальшою інфузією зі швидкістю 0,3 мкг/хв; як альтернативне лікування можливе застосування тільки інфузій препарату зі швидкістю 0,3 мкг/хв без попереднього струминного введення препарату; вводити в/в крапл. (при розрахунку швидкості введення з використанням звичайних інфузійних систем враховувати, що 20 крапл. = 1 мл), необхідну кількість амп. концентрату для інфузій розчинити в 500 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду або 5 % р-ні глюкози; короткочасне лікування передчасних пологів без вкорочення або розкриття шийки матки - безперервна інфузія 0,075 мкг/хв, вводити в/в крапл.; тривалість лікування препаратом не повинна перевищувати 48 год, оскільки дані досліджень свідчать про те, що за допомогою токолітичної терапії вдається відстрочити пологи на період до 48 год.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ліполіз; гіпокаліємія, гіперглікемія (більш виражена у хворих на ЦД); тремор, головний біль, запаморочення, тривожність; тахікардія, відчуття серцебиття, зниження діастолічного тиску, артеріальна гіпотензія, порушення серцевого ритму, фібриляція передсердь, ішемія міокарда, периферична вазодилатація, шлуночкова екстрасистолія, збільшення серцевого викиду, підвищення систолічного тиску, невеликі коливання ЧСС плода, стенокардія; набряк легень; нудота, блювання, пригнічення перистальтики кишечника, атонія кишечника; (транзиторне) підвищення концентрації трансаміназ у сироватці крові; пітливість, почервоніння шкіри; зниження діурезу (особливо на початковій фазі лікування), набряк, можливий розвиток тяжких р-цій гіперчутливості та бронхоспазму, можливість розвитку ацидозу у новонароджених, нудота, діарея, свистяче дихання, г.астматичний напад, порушення свідомості або шок, підвищення рівня глюкози та інсуліну в крові матері, у пацієнтів із БА, сульфати, що містяться у препараті, можуть спровокувати р-цію гіперчутливості з можливими симптомами: нудота, діарея, свистяче дихання, г.астматичний напад, порушення свідомості або шок.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до гексопреналіну або до будь-якого компонента препарату; наявність будь-якого захворювання до 22 тижнів вагітності; застосування препарату в якості токолітичного засобу у пацієнтів із ІХС в анамнезі або пацієнтів із істотними факторами ризику розвитку ІХС; загроза викидня під час I та II триместрів вагітності; будь-яке захворювання матері або плода, при якому збереження вагітності є небезпечним (тяжкий ступінь токсемії, внутрішньоутробна інфекція, вагінальна кровотеча внаслідок передлежання плаценти, еклампсія або тяжка прееклампсія, відшарування плаценти або здавлення пуповини); внутрішньоутробна загибель плода, летальні вроджені аномалії в анамнезі або летальні хромосомні аномалії; БА з підвищеною чутливістю до сульфатів; захворювання СС системи (тахіаритмія, міокардит, вада мітрального клапана); гіпертиреоз; тяжкі захворювання печінки та нирок; закритокутова глаукома; протипоказаний пацієнтам, що мають захворювання, на тлі яких застосування β -міметиків може мати небажану дію (легенева

гіпертензія, захворювання ССС (гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія або перешкода току крові з лівого шлуночка, наприклад, аортальний стеноз).

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ГІНІПРАЛ	Такеда Австрія ГмбХ, Австрія	р-н д/ін'єк., по 2мл в амп.	10мкг/2мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГІНІПРАЛ	Такеда Австрія ГмбХ, Австрія	конц. д/р-ну д/інфуз., по 5мл в амп.	25мкг/5мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Атосибан (Atosiban)**

Фармакотерапевтична група: G02CX01 - інші гінекологічні препарати.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний пептид, конкурентний антагоніст людського окситоцину на рівні рецепторів, який зв'язується з рецепторами окситоцину, знижує частоту скорочень матки і тонус міометрія, призводячи до пригнічення скорочення матки, зв'язується з рецепторами вазопресину, пригнічуючи ефект речовини, у разі розвитку передчасних пологів у рекомендованих дозах пригнічує скорочення матки й забезпечує матці функціональний спокій.

Показання для застосування ЛЗ: застосовують для запобігання передчасним пологам у вагітних за наявності усіх нижчезазначених умов: регулярні маткові скорочення тривалістю не < 30 с і частотою > 4 разів протягом 30 хв; розкриття шийки матки від 1 до 3 см (0 - 3 см для жінок, які народжують вперше) і згладжування шийки матки > ніж на 50 %; у жінок старше 18 років; термін вагітності від 24 до 33 повних тижнів^{БНФ}; нормальна ЧСС у плода.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в^{БНФ} у 3 послідовні етапи - болюсно вводиться р-н для ін'єкцій у початковій дозі 6,75 мг, одразу після цього проводиться тривала інфузія концентрату для приготування інфузійного р-ну в високій дозі - 300 мкг/хв (навантажувальна інфузія) протягом 3 год; після цього йде тривала (до 45 год) інфузія концентрату в низькій дозі 100 мкг/хв, тривалість лікування не повинна перевищувати 48 год^{БНФ}; повна доза на весь курс терапії не повинна перевищувати 330,75 мг; в/в одномоментне введення повинно здійснюватися відразу після постановки діагнозу передчасних пологів; після введення болюсної ін'єкції розпочинати інфузію; якщо скорочувальна активність матки персистує на тлі терапії атосибаном, розглянути питання про альтернативне лікування; якщо виникає потреба в повторному застосуванні, його також розпочинати з болюсного введення р-ну для ін'єкцій, за яким йде введення концентрату д/р-ну д/інф.; повторне лікування можна починати у будь-який час після першого лікування, його можна повторювати до 3 разів; повна методика дозування препарату для болюсного введення й подальшої інфузії: в/в болюсна ін'єкція 0,9 мл протягом 1 хв доза 6,75 мг, в/в навантажувальна інфузія протягом 3 год зі швидкістю 24 мл/год (300 мкг/хв) доза 54 мг (18 мг/год), подальша тривала інфузія протягом періоду до 45 год зі швидкістю 8 мл/год (100 мкг/хв) доза до 270 мг (6 мг/год).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР, гіперглікемія, безсоння, головний біль, запаморочення, тахікардія, артеріальна гіпотензія, припливи, нудота; блювання, свербіж, висипи, маткові кровотечі, атонія матки, р-ція у місці ін'єкції; гіпертермія, респіраторні випадки, такі як задишка і набряк легенів, особливо в поєднанні із супутнім введенням інших ЛЗ з токолітичною активністю таких як антагоністи кальцію та бета-міметики, та/або багатоплідна вагітність.

Протипоказання до застосування ЛЗ: термін вагітності < 24 або > 33 повних тижнів; передчасний розрив навколоплідного міхура при вагітності > 30 тижнів; порушення частоти серцебиття плода; внутрішньоутробна ретардація росту й аномальна ЧСС плода; допологова маткова кровотеча, що вимагає негайних пологів; еклампсія й тяжка прееклампсія, що вимагає негайних пологів; внутрішньоутробна смерть плода; підозра на внутрішньоматкову інфекцію; передлежання плаценти; відшарування плаценти; будь-які інші стани, що стосуються як матері, так і плода, при яких збереження вагітності становить небезпеку; гіперчутливість до діючої речовини або допоміжних речовин в анамнезі.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 165 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	МИРОСИБАН	ТОВ "Фармідея", Латвія	р-н д/ін'єк. по 0,9мл у фл	6,75мг/0,9мл	№1	18445,04	
	МИРОСИБАН	ТОВ "Фармідея", Латвія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	37,5мг/5мл	№1	9075,00	
	ТРАКТОЦИЛ	Феррінг ГмбХ (відповідальний за вир-во, первинне пакування, контроль якості та випуск серії готового продукту)/Феррінг-Лечива, а.с. (відповідальний за вторинне пакування), Німеччина/Чеська Республіка	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	7,5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТРАКТОЦИЛ	Феррінг ГмбХ (відповідальний за вир-во, первинне пакування, контроль якості та випуск серії готового продукту)/Феррінг-	р-н д/ін'єк. по 0,9мл у фл.	7,5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	Лечива, а.с. (відповідальний за вторинне пакування), Німеччина/Чеська Республіка			
--	--	--	--	--

11.4. Контрацептиви для місцевого застосування

11.4.1. Внутрішньоматкові контрацептиви

- **Пластикові внутрішньоматкові протизаплідні засоби з прогестинами (Plastic IUD with progesterogen)*** [ПМД]

Фармакотерапевтична група: G02BA03 - контрацептив для місцевого застосування. Внутрішньоматковий контрацептив.

Основна фармакотерапевтична дія: контрацептивна дія; має переважно місцевий прогестогеновий вплив на порожнину матки; висока концентрація левоноргестрелу в ендометрії зменшує функцію рецепторів ендометріального естрогену та прогестерону, завдяки чому ендометрій стає нечутливим до циркулюючого естрадіолу, а також спостерігається значний антипроліферативний ефект; згущення цервікального слизу запобігає проходженню сперми по цервікальному каналу, локальне середовище матки та маткових труб пригнічує рухливість і функцію сперматозоїдів, запобігаючи заплідненню.

Показання для застосування ЛЗ: контрацепція (протягом трьох років для дози 13,5 мг)^{БНФ, ПМД}; ідіопатична менорагія^{БНФ}; гіперменорея; дисменорея; місцева терапія прогестагенами під час замісного лікування естрогенами^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: система вводиться у порожнину матки^{БНФ}; доза 52 мг (20 мкг/24 год) - діє ефективно протягом 5 років^{БНФ}; жінкам репродуктивного віку систему можна вводити у порожнину матки протягом 7 днів від початку менструації^{БНФ}; заміну системи на нову можна в будь-який день менструального циклу, також можна вводити одразу після аборт; післяпологове введення відкласти до повної інволюції матки, але не раніше, ніж ч/з 6 тижнів після пологів, якщо інволюція настає повільно, доцільно розглянути питання про введення системи ч/з 12 тижнів після пологів^{БНФ}, систему не можна використовувати як посткоїтальний контрацептив, при застосуванні з метою контрацепції система повинна бути видалена через п'ять років, якщо жінка бажає використовувати той самий метод контрацепції, тоді ж можна ввести нову систему; для забезпечення постійного/безперервного контрацептивного ефекту негайно встановити нову систему або почати використовувати альтернативний метод контрацепції; лікування менорагії^{БНФ}, гіперменореї та дисменореї: система вводиться в порожнину матки протягом семи днів від початку менструації (провести заміну системи на нову систему можна в будь-який час менструального циклу); захист ендометрія під час замісної терапії естрогенами^{БНФ}: у складі замісної гормональної терапії, можливе використання в комбінації з пероральними або трансдермальними препаратами, що містять естроген; доза 13,5 мг - вводити у порожнину матки протягом семи днів від початку менструації^{БНФ}, можна вводити одразу після аборт у першому триместрі вагітності^{БНФ}, післяпологове введення відкласти до повної інволюції матки, проте його можна проводити не раніше ніж ч/з 6 тижнів після пологів, якщо інволюція настає занадто повільно, доцільно провести введення системи ч/з 12 тижнів після пологів, систему видалити не пізніше закінчення трирічного періоду^{БНФ}, якщо пацієнтка бажає продовжувати користуватися цим методом, нову систему ввести відразу після видалення попередньої системи, якщо вагітність не бажана, видалення системи проводити протягом семи днів від початку менструації, якщо у жінки ще є регулярні менструації; якщо система видаляється у будь-який інший період або у жінки відсутні регулярні менструації, а у жінки протягом тижня до видалення системи були статеві стосунки, існує ризик завагітніти, для забезпечення контрацептивної дії негайно встановити нову систему або почати використовувати альтернативний метод контрацепції.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: пригнічений настрій/депресія, знервованість, зниження лібідо, головний біль, мігрень, абдомінальний біль, нудота, здуття живота, акне, алопеція, гірсутизм, свербіж, екзема, хлоазма/гіперпигментація шкіри, висипання, кропив'янка, біль у спині, доброякісні кісти яєчників, маткові/вагінальні кровотечі, в т. ч. кровомазання, олігоменорея, аменорея, біль у ділянці малого таза, дисменорея, виділення зі статевих органів, вульвовагініт, нагубання молочних залоз, біль у молочних залозах, експульсія ВМС, перфорація стінки матки, запальні захворювання органів таза, ендометрит, цервіцит/цитологічний мазок в нормі, клас II, набряк, збільшення маси тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: вагітність або підозра на вагітність; прогестагензалежні пухлини, наприклад рак молочної залози; г. чи хр. запальне захворювання органів малого таза; цервіцит; інфекційне захворювання нижніх відділів статевих шляхів; післяпологовий ендометрит; інфікований викидень або аборт протягом останніх 3 міс.; стани, пов'язані з підвищеною сприйнятливістю до інфекційних захворювань; цервікальна дисплазія; підтвержені або підозра на злоякісні пухлини шийки матки або матки; маткові кровотечі, причина яких не з'ясована; вроджена або набута патологія матки, включаючи лейоміому, в разі деформації порожнини матки; захворювання печінки в г. стадії або пухлини печінки; підвищена чутливість до діючої речовини або до допоміжних речовин препарату.

Визначена добова доза (DDD): внутрішньоматково - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДЖАЙДЕС®	Байер Оу, Фінляндія	вн./матк. система з прист. д/введ. у бл.	13,5мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МІРЕНА	Байер Оу, Фінляндія	вн./матк. система та прист. д/введ.	52мг (20мкг/24год)	№1	1813,73	31,90/€

11.4.2. Вагінальні контрацептиви

- **Бензалконію хлорид (Benzalkonium chloride) ** [ПМД]**

Фармакотерапевтична група: G02BB - контрацептиви для місцевого застосування. Інтравагінальні контрацептиви.

Основна фармакотерапевтична дія: має властивості і сперміциду, і антисептика, активна речовина спричиняє розрив мембрани сперматозоїда, деструкція сперматозоїда відбувається у дві стадії: спочатку руйнується джгутик, а потім - голівка, не впливає на сапрофітну мікрофлору (зберігаються палички Додерлейна), проявляє активність щодо збудників інфекцій, що передаються статевим шляхом, зокрема: *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia spp.*, *Herpes simplex* типу 2, *BVL*, *Trichomonas vaginalis*, *Staphylococcus aureus*, проте засіб неактивний щодо *Mycoplasma spp.* і має низьку активність щодо *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans*, *Haemophilus ducreyi* та *Treponema pallidum*; не впливає на менструальний цикл, лібідо, фертильність.

Показання для застосування ЛЗ: місцева контрацепція ПМД, місцевий контрацептив (сперміцид) для запобігання вагітності, який, як і інші методи контрацепції, не виключає її повністю, ефективність сперміциду залежить від дотримання інструкції для медичного застосування, можна застосовувати як окремо, так і разом з іншими засобами для посилення контрацептивної дії, призначений для всіх жінок репродуктивного віку; особливо доцільно застосовувати: у разі наявності тимчасових або постійних протипоказань до застосування р/ос контрацептивів або внутрішньоматкового засобу (внутрішньоматкова спіраль); після пологів, у період годування груддю, у період премопаузи; у разі необхідності епізодичного запобігання вагітності; як допоміжний засіб до р/ос контрацепції у разі пропуску прийому таблетки чи її прийому пізніше, ніж потрібно (у цьому випадку необхідно додатково застосовувати до кінця менструального циклу); як допоміжний засіб при бар'єрній контрацепції (піхвова діафрагма, цервікальний ковпачок), при застосуванні внутрішньоматкової спіралі (особливо при довготривалому одночасному прийомі деяких препаратів, наприклад НПЗЗ).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити інтравагінально, застосовувати систематично перед кожним статевим актом незалежно від фази менструального циклу, у положенні лежачи ввести 1 ваг. супоз. глибоко у піхву за 5 хв. до статевого акту; у разі повторного статевого акту ввести ще один супозиторій, тривалість контрацептивної дії - 4 год; крем ваг.: у положенні лежачи ввести 1 дозу вагін. крему глибоко у піхву, використовуючи аплікатор, перед статевим актом, у разі повторного статевого акту ввести ще одну дозу крему за допомогою аплікатора, контрацептивна дія засобу починається миттєво та триває не <10 год.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: свербіж, відчуття печіння або місцеве подразнення в одного або обох партнерів, алергічні прояви.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до бензалконію хлориду або допоміжних речовин, вагініт, виразки та подразнення слизової оболонки піхви та шийки матки.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕРОТЕКС	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна	супоз. вагін. у стрип. (лаван., троян., лимон)	18,9мг	№5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕРОЦЕПТИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	песарії у бл.	18,9мг	№5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	ВАГІТЕК	Ес.Сі. Магістра Сі&Сі С.Р.Л., Румунія	песарії у стрип.	18,9мг	№2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФАРМАТЕКС	Іннотера Шузі (вир-к відпов. за втор. пак., контроль та випуск серії)/ Юнітер Ліквід Мануфекчурінг (вир-к відпов. за вир-во in bulk, перв. та втор. пак., контроль серії), Франція/ Франція	супоз. вагін. у бл.	18,9мг	№5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФАРМАТЕКС	Іннотера Шузі (вир-к відпов. за втор. пак., контроль та випуск серії)/ Лабораторія Шеміно (вир-к відпов. за вир-во in bulk, перв. та втор. пак., контроль серії), Франція/ Франція	крем вагін. по 72г у тубі з аплік.-дозат.	1,2%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

11.5. Інші засоби, що застосовуються в гінекології

11.5.1. Інгібітори пролактину

- **Бромокриптин (Bromocriptine)**

Фармакотерапевтична група: G02CB01 - інші засоби для лікування гінекологічних захворювань, інгібітори пролактину. N04BC01 - протипаркінсонічні засоби, агоністи дофамінових рецепторів

Основна фармакотерапевтична дія: пригнічує секрецію пролактину, не впливаючи на нормальні рівні інших гормонів, що вивільняються передньою часткою гіпофіза, зменшує підвищений рівень гормону росту, ці ефекти зумовлені стимуляцією рецепторів дофаміну, як специфічний інгібітор секреції пролактину бромокриптин можна застосовувати для запобігання або пригнічення фізіологічної лактації, а також для лікування пролактин-індукованих патологічних станів, при аменореї та/або ановуляції (з галактореєю або без) бромокриптин можна застосовувати для відновлення менструального циклу та овуляції; при застосуванні бромокриптину звичайні заходи, що застосовують при пригніченні лактації, такі як обмеження споживання рідини, непотрібні, бромокриптин зупиняє ріст або зменшує розмір аденом гіпофізу, які секретують пролактин (пролактиноми); у пацієнтів з акромегалією, крім зниження рівня гормону росту і пролактину в плазмі крові, бромокриптин

сприятливо впливає на клінічні симптоми та толерантність до глюкози, бромокриптин полегшує клінічні симптоми с-му полікістозу яєчників шляхом відновлення нормальної схеми секреції ЛГ, ефективний у лікуванні хв. Паркінсона за умови введення у дозах, які зазвичай перевищують дози, рекомендовані для ендокринологічних показань, полегшує тремор, ригідність м'язів, брадиканезію та інші симптоми хв. Паркінсона на усіх стадіях, комбіноване лікування з леводопою призводить до посилення протипаркінсонічного ефекту та часто дає змогу зменшити необхідну дозу леводопи, зменшує вираженість симптомів депресії, які часто спостерігаються у пацієнтів з хв. Паркінсона.

Показання для застосування ЛЗ: запобігання або пригнічення фізіологічної лактації^{БНФ} у післяпологовому періоді тільки за медичними показаннями (інтранатальна загибель плода, неонатальна смерть, ВІЛ-інфікування матері); не рекомендується для рутинного пригнічення лактації або для полегшення симптомів післяпологового болю та нагрудання молочних залоз у тих випадках, коли ефективні немедикаментозні методи впливу (делікатна підтримка грудей, холодні компреси) та/або ненаркотичні знеболювальні засоби; лікування гіперпролактинемії^{БНФ} у із гіпогонадізмом та/або галактореєю^{БНФ}; лікування жіночого безпліддя^{БНФ}, з нормальним базальним рівнем гонадотропіну та гіперпролактинемією^{БНФ} (абсолютною або відносною), препарат першого вибору у лікуванні пацієнтів з макроаденомами і представляти альтернативу хірургічному втручанню (трансфеноїдальної гірофізектомії) у пацієнтів з мікроаденомами; лікування пролактинсекретуючих аденом; доповнення до хірургічного втручання та/або променевої терапії з метою зниження рівня гормону росту в системному кровоотоці при лікуванні пацієнтів з акромегалією^{БНФ}; у лікуванні ідіопатичної хв. Паркінсона застосовують як монотерапію, або в комбінації з леводопою пацієнтам, які раніше не лікувалися, і пацієнтам з наявністю феномена «ввімкнення-вимкнення», застосовували з епізодичною ефективністю пацієнтам, які не реагують на лікування леводопою або не переносять її, а також пацієнтам, р-ція яких на леводопу зменшується.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: МДД - 30 мг/добу; на початку лікування застосовують дозу 1,25 мг перед сном з її поступовим збільшенням ч/з 2-3 дні до 2,5 мг перед сном, потім доза може збільшуватися на 1,25 мг з інтервалами у 2-3 дні до досягнення добової дози 2x2,5 мг; подальше збільшення дози, якщо воно є необхідним, здійснюють аналогічно; попередження лактації - 2,5 мг у день пологів з наступним введенням 2,5 мг 2р/добу протягом 14 днів^{БНФ}; пригнічення лактації - 2,5 мг у перший день з наступним підвищенням дози до 2,5 мг 2 р/добу ч/з 2-3 дні, курс лікування -14 днів^{БНФ}; для цих показань поступове збільшення дози бромокриптину не вимагається; гіпогеніталізм/с-ми галактореї/стерильність - у більшості пацієнтів з гіперпролактинемією належна р-ція досягається шляхом застосування 7,5 мг/добу (у декілька прийомів), проте використовувалися і дози до 30 мг/добу; у стерильних пацієнток без підвищення рівнів пролактину у сироватці звичайна доза 2,5 мг 2 р/добу^{БНФ}; пролактинемії^{БНФ} - після досягнення добової дози 2,5 мг, доза може збільшуватися на 2,5 мг на добу з інтервалами у 2-3 дні таким чином: 2,5 мг кожні 8 год, 2,5 мг кожні 6 год, 5 мг кожні 6 год^{БНФ}; р-ція спостерігалася при застосуванні доз до 30 мг/добу^{БНФ}; хвороба Паркінсона - в 1-й тиждень 1,25 мг перед сном, на 2-й тиждень 2,5 мг перед сном, на 3-й тиждень 2,5 мг 2р/добу, 4-й тиждень - 2,5 мг 3р/добу^{БНФ}; пізніше добова доза може збільшуватися на 2,5 мг протягом 3 - 14 днів залежно від реакції пацієнта; підвищення дози можна продовжувати до досягнення оптимальної дози 10- 30 мг/добу^{БНФ}; одночасно доза леводопи може поступово зменшуватися до досягнення оптимального балансу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: Сплутаність свідомості, психомоторне збудження, галюцинації, бзсоння, психічні розлади, гіперсексуальність, підвищення лібідо, патологічний потяг до азартних ігор, імпульсивна розтрата грошей чи шопоголія, переїдання, компульсивна обжерливість, головний біль, млявість, запаморочення, дискінезія, сонливість, парестезія, надмірна денна сонливість, раптове засинання, порушення зору, розмитість поля зору, шум у вухах, перикардальний випіт, констриктивний перикардит, тахікардія, брадикардія, аритмія, патологія серцевих клапанів (включно з регургітацією) та пов'язані розлади (перикардит та перикардальний випіт), фіброз серцевих клапанів, артеріальна гіпотензія, ортостатична гіпотензія (дуже рідко спричинює синкопе), зворотна блідість пальців рук та ніг під впливом холоду (особливо у пацієнтів з хворобою Рейно в анамнезі), плевральний випіт, фіброз плеври, фіброз легень, плеврит, задишка, нудота, запор, блювання, сухість у роті, ретроперитонеальний фіброз, кровотеча з ШКТ, виразки у ШКТ, біль у животі, діарея, алергічні шкірні р-ції, випадіння волосся, судоми ніг, підвищена втомлюваність, периферійний набряк, с-м, схожий на злосликий нейролептичний с-м при різкій відміні бромкриптину.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини, інших алкалоїдів ріжків або до будь-якої з допоміжних речовин препарату, неконтрольована гіпертензія, гіпертензивні стани, пов'язані з вагітністю (включаючи екламписю, преекламписю або гестаційну АГ), АГ раннього і пізнього післяпологового періоду, для пригнічення лактації та при інших показаннях, що не загрожують життю у пацієнток з наявністю в анамнезі ІХС або іншої тяжкої СС патології, або симптомів/наявних в анамнезі тяжких психічних розладів; при ознаках патології серцевих клапанів, одержаних під час ехокардіографії, проведеної перед початком лікування.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БРОМКРИПТИН - КВ	АТ "КІЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	2,5мг	№10x3	6,99	
II.	БРОМОКРИПТИН -РІХТЕР	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл. у фл.	2,5мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Каберголін (Cabergoline)**

Фармакотерапевтична група: G02CB03 - засоби, що застосовують в гінекології. Інгібітор пролактину.

Основна фармакотерапевтична дія: дофамінергічне похідне ріжків, що характеризується сильною та довготривалою пролактин-знижуючою активністю; безпосередньо стимулює D₂-дофамінові рецептори на поверхні лактотропних клітин гіпофіза, таким чином інгібуючи секрецію пролактину; каберголін чинить центральну дофамінергічну дію через стимуляцію D₂ рецепторів.

Показання для застосування ЛЗ: інгібування/пригнічення фізіологічної лактації - інгібування фізіологічної післяпологової лактації одразу після пологів або для пригнічення лактації, що встановилася ^{БНФ}, у таких випадках: після пологів, якщо мати вирішила не годувати дитину груддю або коли годування груддю протипоказано матері чи дитині з медичних причин; після народження мертвого плода або аборт; лікування гіперпролактинемічних станів ^{БНФ} - порушення, пов'язані з гіперпролактинемією (аменореї, олігоменореї, ановуляції та галактореї); лікування пацієнтів з пролактинсекретуючими аденомами гіпофіза (мікро- та макропролактиноми), ідіопатичною гіперпролактинемією або із с-мом «порожнього» турецького сідла з супутньою гіперпролактинемією, які є основними патологічними станами, що зумовлюють вищезгадані клінічні прояви.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: інгібування/пригнічення фізіологічної лактації - рекомендована терапевтична доза препарату 1 мг ^{БНФ} (2 табл. по 0,5 мг), що приймається однократно; для пригнічення лактації, що вже встановилася, рекомендований терапевтичний режим дозування - 0,25 мг (1/2 табл. по 0,5 мг) кожні 12 год протягом 2 днів ^{БНФ} (загальна доза - 1 мг); лікування гіперпролактинемічних станів - рекомендована початкова доза 0,5 мг 1 р/тижд. або 1/2 табл. по 0,5 мг 2 р/тижд. ^{БНФ}, підвищення тижневої дози здійснювати поступово, підвищувати її на 0,5 мг/тижд. кожен місяць до досягнення оптимальної терапевтичної ефективності; зазвичай терапевтична доза - 1 мг/тижд. і може коливатися у діапазоні від 0,25 мг до 2 мг/тижд. ^{БНФ}; для лікування пацієнтів з гіперпролактинемією - до 4,5 мг/тижд. ^{БНФ}, максимальна доза препарату не має перевищувати 3 мг/добу; тижневу дозу можна прийняти за 1 раз або розподілити на два або більшу кількість прийомів на тиждень, залежно від переносимості препарату пацієнтом, якщо призначені дози перевищують 1 мг/тижд. - ділити тижневу дозу препарату на декілька прийомів, оскільки переносимість препарату у дозуванні, що перевищує 1 мг при прийомі разовою тижневою дозою, оцінювалася тільки у декількох пацієнтів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпотензивний ефект у пацієнтів, які отримують довготривале лікування; постуральна артеріальна гіпотензія; периферичний вазоспазм, втрата свідомості; судоми в ногах; слабкість у м'язах; шкірні р-ції, алопеція, свербіж, висипання; алергічні шкірні р-ції; у жінок з аменореєю спостерігалася зниження Нв протягом перших декількох місяців після менструації; депресія, порушення сну; агресія, патологічна пристрасть до азартних ігор, підвищення лібідо, гіперсексуальність, компульсивне бажання витратити гроші та купувати, булімія та компульсивне переїдання; запаморочення/вертиго, головний біль; раптове засинання, синкопе; припливи; біль у животі, диспепсія, гастрит, нудота; запор, блювання; біль у молочних залозах; астенія, підвищена втомлюваність; запаморочення/вертиго, головний біль, сонливість; синкопе; ураження клапанів серця (у тому числі регургітація) та споріднені розлади (перикардит та випіт у порожнину перикарда); прискорене серцебиття, носова кровотеча, безсимптомне зниження АТ, випіт у плевральну порожнину, фіброз легенів, біль у животі, нудота; блювання; біль в епігастральній ділянці, транзиторна геміанопсія; порушення зору, р-ція гіперчутливості, марення, диспное, порушення дихання, ДН, випіт у плевральну порожнину, фіброз легенів, порушення функції печінки, алопеція, висипання, набряк, підвищений рівень КФК в крові; нервозність, дисменорея, акне, біль, артралгія, риніт, сухість у ротовій порожнині, діарея, здуття живота, подразнення глотки, зубна біль, симптоми подібні застуді, периорбітальний набряк, периферичний набряк, анорексія, безсоння, збільшення/зменшення маси тіла, порушення концентрації уваги, збудження.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до каберголіну, до будь-яких допоміжних речовин препарату або до будь-яких алкалоїдів ріжків; неконтрольована гіпертензія; наявність в анамнезі фіброзних захворювань легенів, перикарда та заочеревинного простору; для довготривалого лікування: ознаки ураження клапанів серця, що визначаються за допомогою ехокардіографії до початку лікування.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АЛАКТИН	Тева Чех Індастріз с.р.о., Чеська Республіка	табл. у пл.	0,5мг	№2, №8	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДОСТИНЕКС	Пфайзер Італія С.р.л., Італія	табл. у фл.	0,5мг	№8	172,68	27,09/\$
	ДОСТИНЕКС	Пфайзер Італія С.р.л., Італія	табл. у фл.	0,5мг	№2	207,22	27,09/\$
	КАБЕРГОЛІН	ЗАТ "Обнінська хіміко-фармацевтична компанія", Російська Федерація	табл. у бл. та бан.	0,5мг	№2, №8	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАБЕРЛІН	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	табл. у бл. або стрип.	0,5мг	№2, №4	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Хінаголід (Quinagolide)**

Фармакотерапевтична група: G02CB04 - засоби, що застосовуються в гінекології. Інгібітори пролактину.

Основна фармакотерапевтична дія: селективний агоніст дофамінових D₂-рецепторів, що не належить до хімічної групи похідних ріжків; чинить сильну інгібуючу дію на секрецію пролактину передньої частки гіпофіза, не знижуючи при цьому нормальні рівні інших гіпофізарних гормонів; у деяких пацієнтів зниження секреції пролактину може супроводжуватися короткотривалими незначними підвищеннями рівня гормону росту в плазмі крові; клінічна значимість цього явища невідома; хінаголід інгібітор секреції пролактину пролонгованої дії є ефективним при призначенні внутрішньо 1 р/добу пацієнтам із гіперпролактинемією, призводячи до зменшення вираженості

таких клінічних симптомів, як галакторея, олігоменорея, аменорея, безпліддя і зниження лібідо; тривале лікування призводить до зменшення розмірів або зупинки росту пролактинсекретуючих мікро- і макроаденом гіпофіза, клінічно значиме зниження рівня пролактину в крові настає ч/з 2 год. після прийому препарату, досягає максимуму ч/з 4 - 6 год. і зберігається майже 24 год; встановлена пряма залежність тривалості дії препарату від величини його дози, тоді як для пролактинзнижуючого ефекту такої залежності немає; максимальний пролактинінгібууючий ефект відзначений після одноразового застосування дози 50 мкг; посилення дії спостерігалось не при збільшенні дози, а при збільшенні тривалості застосування.

Показання для застосування ЛЗ: гіперпролактинемія^{БНФ} (ідіопатична або спричинена пролактинсекретуючою мікро- або макроаденомою гіпофіза).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: з огляду на можливість розвитку ортостатичної гіпотензії, нудоти, блювання та запаморочення внаслідок дофамінергічної стимуляції дозу збільшувати до терапевтичної поступово; приймати 1 р/добу, бажано на ніч, перед сном, з невеликою кількістю їжі; дорослі: оптимальну дозу підбирати індивідуально, враховуючи ступінь зменшення рівня пролактину в плазмі крові й переносимість; у перші 3 дні призначають у дозі 25 мкг/добу; у наступні 3 дні - в дозі 50 мкг/добу; починаючи з 7-го дня й далі рекомендована доза - 75 мкг/добу; при необхідності здійснюють подальше поступове збільшення дози до досягнення оптимального терапевтичного ефекту; підтримуюча доза - 75 - 150 мкг/добу; у 1/3 пацієнтів виникає необхідність застосування добової дози 300 мкг/добу й вище; у таких випадках добову дозу підвищувати в межах 75 - 150 мкг з інтервалами не менше 4 тижн.^{БНФ} до досягнення задовільного терапевтичного ефекту або погіршення переносимості препарату, що може потребувати перерви в лікуванні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анорексія, безсоння; оборотний гострий психоз; запаморочення, головний біль; сонливість, закладеність носа, нудота, блювання, біль у животі, запор, діарея, підвищена втомлюваність; набряки, припливи, випадки надмірної схильності до азартних ігор, збільшення сексуального потягу, гіперсексуальності, нав'язливих витрат або покупок, компульсивного або панічного переїдання, зменшення ортостатичного АТ, яке може призвести до непритомності, ризик виникнення р-ції гіперчутливості.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини або до інших компонентів препарату, порушення функції нирок або печінки, наявність в анамнезі психічних розладів.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	НОРПРОЛАК	Ельфа Фармасетікал Компані СА (відповідальний за вир-во, упаковку та контроль якості готового продукту)/ Феррінг ГмБХ (відповідальний за випуск серії), Польща/Німеччина	табл. у бл.	25мкг + 50мкг	№3+№3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НОРПРОЛАК	Ельфа Фармасетікал Компані СА (відповідальний за вир-во, упаковку та контроль якості готового продукту)/ Феррінг ГмБХ (відповідальний за випуск серії), Польща/Німеччина	табл. у бл.	75мкг, 150мкг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

11.5.2. Інші засоби, що застосовуються в гінекології

- **Бета-аланін (Beta-alanin)****

Фармакотерапевтична група: G02CX - засоби, що застосовують у гінекології.

Основна фармакотерапевтична дія: β-аланін - чиста амінокислота, з хімічною структурою, яка повністю відрізняється від структури гормону; протидіє різкому вивільненню гістаміну, однак не має антигістамінної активності (відсутність блокування H₁-рецепторів); має прямиий вплив виключно на шкірну периферичну вазодилатацію, що зумовлює вегетативні припливи, відчуття тепла, жару, головний біль; сприяє насиченню периферичних рецепторів нейротрансмітерів, що беруть участь у процесі.

Показання для застосування ЛЗ: для лікування припливів, зумовлених менопаузою.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо приймають 400 - 800 мг/добу (перед основним прийомом їжі); ця доза може бути збільшена до 1200 мг/добу; курс лікування - від 5 до 10 днів (до припинення припливів); при поновленні припливів лікування може здійснюватися протягом усього періоду клінічних вазомоторних розладів, без обмеження часу застосування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: парестезія, зазвичай у кінцівках; АР, включаючи висипання на шкірі та слизових оболонках, почервоніння шкіри, свербіж, кропив'янка; синці.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату, підвищена чутливість або непереносимість глютену, оскільки препарат містить крохмаль пшеничний.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АБ'ЮФЕН	Лабораторії Бушара Рекордаті, Франція	табл. у бл.	400мг	№15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

11.6. Гормони статевих залоз та лікарські засоби, що застосовуються при патології статевої системи

11.6.1. Гормональні контрацептиви для системного застосування.

Гестагени

- **Левоноргестрел (Levonorgestrel)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: G03AD01 - статеві гормони і модулятори статевої системи, засоби екстреної контрацепції. G03AC03 - гормональні контрацептиви для системного застосування. Екстрені контрацептиви.

Основна фармакотерапевтична дія: точний механізм дії невідомий; у рекомендованих дозах впливає на овуляцію і запліднення, якщо статевий акт має місце у преовуляторну фазу менструального циклу, тобто у момент найбільшої імовірності запліднення; при імплантації, що почалася, препарат не ефективний.

Показання для застосування ЛЗ: для термінової р/ос контрацепції^{БНФ, ВООЗ, ПМД} у перші 72 год після незахищеного статевих акту або в разі, якщо застосований метод контрацепції не був досить надійним.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: прийняти 1,5 мг якомога швидше, бажано протягом 12 год і не пізніше ніж ч/з 72 год після незахищеного статевих акту, якщо протягом 3 год після прийому табл. виникло блювання, негайно прийняти 1,5 мг;^{ВООЗ БНФ} можна приймати в будь-який день менструального циклу, якщо немає затримки менструальної кровотечі, застосування препарату не є протипоказанням для продовження регулярного прийому р/ос гормонального протизаплідного засобу; жінкам, які протягом останніх 4-х тижнів приймали ферментіндукуючі препарати і яким необхідна екстрена контрацепція, рекомендується використовувати негормональні методи екстреної контрацепції, тобто, мідну ВМС, або прийняти подвійну дозу левоноргестрелу (3 мг) для жінок^{БНФ}, які не можуть або не бажають використовувати мідну ВМС

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, запаморочення, нудота, біль в нижніх відділах живота, кровотеча, не пов'язана з менструацією, затримка менструації більш ніж на 7 днів, нерегулярні кровотечі (кров'янисті виділення), набухання молочних залоз, підвищена втомлюваність, висипання, кропив'янка, свербіж, біль в ділянці таза, дисменорея, набряк обличчя.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини (левоноргестрелу) або до будь-якої з допоміжних речовин, тяжка ступінь печінкової недостатності; вагітність.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АВОДЕЛЬ	ЛАБОРАТОРІОС ЛЕОН ФАРМА, С.А., Іспанія	табл. у бл.	1,5мг	№1x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕСКАПЕЛ	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл. у бл.	1,5мг	№1x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ САНДОЗ®	Лабораторіос Леон Фарма, С.А. (виробництво "in bulk", пакування, тестування)/Салютас Фарма ГмБХ (випуск серій), Іспанія/Німеччина	табл. у бл.	1,5мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛЕРГЕСАН	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд., Індія	табл. у бл.	0,75мг; 1,5мг	№2x1, №1x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛЮПІНОР	Люпін Лімітед, Індія	табл. у бл.	1,5мг	№1x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МОДЕЛЛЬ 911	Лабораторіос Леон Фарма, С.А./Лабораторія Д-р Ф. Ечеварне, аналіз, С.А. (дільниця проведення мікробіологічного контролю), Іспанія/Іспанія	табл. у бл.	1,5мг	№1x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НАВЕЛА 0.75	Лабораторіос Леон Фарма, С.А., Іспанія	табл. у бл.	0,75мг	№2x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НАВЕЛА 1.5	Лабораторіос Леон Фарма, С.А., Іспанія	табл. у бл.	1,5мг	№1x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПОСТИНОР	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл. у бл.	0,75мг	№2x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

- **Медроксипрогестерон (Medroxyprogesterone)** * [ПМД] (див. п. 19.2.1.1. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")

Фармакотерапевтична група: G03AC06 - гормональні контрацептиви для системного застосування. Гестагени.

Показання для застосування ЛЗ: з метою контрацепції^{БНФ, ВООЗ, ПМД} - довготривалої або короткотривалої (для партнерок чоловіків, які перенесли вазектомію, для захисту, доки вазектомія не стане ефективною; жінкам, імунізованим проти краснухи, для запобігання вагітності під час періоду активності вірусу; жінкам, які очікують на стерилізацію. Не призначають для застосування до настання менструального періоду.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: контрацепція - рекомендована доза суспензії для ін'єкції становить 150 мг 1 раз^{ВООЗ БНФ} на 3 місяці (12-13 тижн.), в/м у сідничний або дельтоподібний м'яз. Початкову в/м ін'єкцію здійснити протягом перших 5 днів після початку звичайного менструального циклу, після пологів: для збільшення впевненості, що пацієнтка не є вагітною на час першого застосування препарату, ін'єкцію здійснити протягом 5 днів після пологів^{БНФ}, якщо жінка не годує груддю; якщо пацієнтка годує дитину груддю - ч/з 6 тижн. після пологів або пізніше^{ВООЗ БНФ}. Подальші ін'єкції - з інтервалами у 12 тижн. Подальші дози: застосовувати з інтервалом у 12

тижн., якщо ін'єкцію вводити не пізніше ніж ч/з 5 днів після цього часу, додаткові заходи контрацепції не потрібні, для партнерок чоловіків, які перенесли вазектомію, може бути необхідна друга ін'єкція 150 мг в/м ч/з 12 тижн. після першої. Якщо з будь-якої причини час від проведення попередньої ін'єкції перевищує 89 днів (12 тижн. і 5 днів), перед наступною ін'єкцією виключити вагітність, а пацієнці застосовувати додаткові заходи контрацепції протягом 14 днів після проведення цієї наступної ін'єкції.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 1,67 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДЕПО-ПРОВЕРА®	Пфайзер Менюфектуринг Бельгія НВ, Бельгія	сусп. д/ін'єк., по 1мл у фл. або шпр.	150 мг/мл	№1	1,50	25,48/\$

11.6.2. Естрогени

11.6.2.1. Прості препарати природних та напівсинтетичних естрогенів

• *Естрадіол (Estradiol)*

Фармакотерапевтична група: G03CA03 - гормони статевих залоз та препарати, що застосовуються при патології статевої сфери. Естрогени.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний естрадіол (17 β -синтезований естрадіол), є хімічно та біологічно ідентичним до ендogenous естрадіолу людини, ЗГТ мінімізує симптоми недостатності естрадіолу у жінок після настання менопаузи; компенсує втрату продукції естрогену в жінок у період менопаузи та зменшує виразність менопаузальних симптомів; естріол особливо ефективний при лікуванні уrogenітальних порушень, у разі атрофії нижніх відділів сечостатевого тракту естріол нормалізує епітелій і сприяє відновленню нормальної мікрофлори та фізіологічного рівня рН у піхві, внаслідок цього підвищується резистентність клітин епітелію сечостатевого тракту до інфекції та запалення, що призводить до зменшення таких вагінальних хвороб та їх симптомів, як диспареунія, сухість, свербіж, вагінальні інфекції та інфекції сечового тракту, порушення сечовипускання та незначне нетримання сечі.

Показання для застосування ЛЗ: замісна гормональна терапія (ЗГТ) для лікування ознак та симптомів дефіциту естрогенів у жінок після настання менопаузи ^{БНФ}, замісна гормональна терапія (ЗГТ) при наявності симптомів естрогенної недостатності у жінок в період постменопаузи ^{БНФ} (у жінок з відсутністю менструальних кровотеч протягом не < 6 міс. або жінок з хірургічною менопаузою зі збереженою або видаленою маткою ^{БНФ}); профілактика остеопорозу у жінок у постменопаузальний період ^{БНФ} при високому ризику переломів у разі непереносимості або наявності протипоказань для застосування інших ЛЗ передбачених для профілактики остеопорозу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл.: 2 мг щодня ^{БНФ}, після 3 тижнів прийому необхідно зробити перерву щонайменше на 1 тижд. з метою уникнення значної гіперплазії ендометрія; у пацієнток, яким не проводили гістеректомію, лікування комбінувати з прийомом монопрогестагену, показаним для такої клінічної ситуації, протягом щонайменше 12-14 днів на місяць ^{БНФ} або протягом 28-денного циклу; пласт. трансдерм.: 1 пласт. з інтервалом у 3-4 дні (у середньому 2 р/тижд.), якщо після 3 міс застосування пластиру симптоми дефіциту естрогенів не усуваються, дозу можна підвищити ^{БНФ}, але максимальна доза не має перевищувати 100 мкг/добу, розпочати застосування пластиру можна у будь-який час, але пацієнткам, які переходять з циклічної терапії, розпочати застосування препарату на наступний день після закінчення попередньої схеми лікування, для профілактики постменопаузального остеопорозу у жінок пластир застосовують у дозі 50 мкг/добу (1 пластир з інтервалом у 3-4 дні); гель:початкова доза - 1 г/добу, що відповідає 1 мг естрадіолу, тривалість застосування і дози підбирає лікар з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнтки (залежно від клінічного стану, після 2-3 циклів дозу можна коригувати: від 0,5 г до 1,5 г гелю/добу, що відповідає 0,5-1,5 мг естрадіолу /добу), пацієнткам з інтактною маткою гель комбінувати з терапією прогестагенами з інтервалом в 1 міс., застосовуючи медроксипрогестерону ацетат, норетиндрон, норетиндрону ацетат або дидрогестерон протягом не менше 12-14 днів, спреї: фіксовану дозу спрею наносять 1 р/добу (початкова доза) на суху і неушкоджену шкіру передпліччя; дозу можна збільшити до 2-х нанесень/добу на шкіру передпліччя залежно від вираженості клінічної відповіді пацієнтки. МДД – 3 нанесення (4,59 мг/добу) на шкіру передпліччя.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кропив'янка, анафілактичні реакції (включаючи та ангіоедему), анафілактоїдні реакції, гіперхолестеринемія; зміна толерантності до вуглеводів, погіршення перебігу порфірії, депресія, нервозність, афективна лабільність; порушення лібідо; загострення епілепсії, головний біль; сонливість, безсоння, зміни настрою, роздратованість, припливи; мігрень, запаморочення; парестезії; хорея, порушення зору, відчуття сухості в очах; непереносимість контактних лінз, АГ, емболія, тахікардія, втрата свідомості; венозна тромбоемболія, відчуття тяжкості у ногах, варикозне розширення вен; емболія, нудота, диспепсія, метеоризм, діарея, біль у животі, відчуття переповнення; підвищення апетиту; блювання, запор, підвищення рівня ферментів печінки; порушення функції печінки та порушення відтоку жовчі (утворення каменів у жовчному міхурі), холестатична жовтяниця, ЖКХ, порушення функції жовчного міхура, реакції у місці застосування, включаючи місцеві кровотечі, синці, пекучість, екзему, набряк, запалення, біль, папули, парестезію, припухлість, везикули; подразнення шкіри, еритема; акне, висипи на шкірі, сухість шкіри, свербіж; зміна кольору шкіри; контактний дерматит, пігментація, алопеція;некроз шкіри, поява зайвого волосся, мультиформна еритема, вузлувата еритема і геморагічний висип, хлоазма або меланоз, судинна пурпура, генералізована екзантема; біль у спині; артралгія, м'язові судоми, біль у суглобах, біль у кінцівках, міастенія, біль у горлі, дизурія, інфекційні захворювання сечовидільних шляхів, відчуття напруженості та біль у молочних залозах, дисменорея, менструальні порушення; збільшення молочних залоз, спазми матки, гіперплазія ендометрія, вагінальні інфекції, виділення (білі), посилення секреції з шийки матки, новоутворення шийки матки, патології матки, маткові/вагінальні кровотечі, включаючи кровомазання, біль у тазовій ділянці, патології ендометрія, вульвовагініти, вагінальний кандидоз, сухість піхви, рак молочних залоз, кіста яєчника, фіброкістозні

захворювання молочних залоз, кіста молочних залоз, відхилення від норми показників цитологічного мазка, опущення матки; лейоміома матки, утворення кіст поза трубами, ендочервікальні поліпи, галакторея, виділення з молочних залоз; фіброзно-кістозна мастопатія, біль, дорсалгія, астенія, периферичні набряки, зміна маси тіла (збільшення або зменшення); АР, нездужання, затримка води чи солей в організмі, втрата апетиту; носові кровотечі, підвищення рівня трансаміназ; аномальні результати тесту функції печінки, непереносимість контактних лінз, порушення зору,

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин препарату, рак молочної залози, діагностований на даний момент, в анамнезі або підозра на нього, злویкісні пухлини, що є естрогензалежними, або підозра на них, генітальна кровотеча нез'ясованої етіології, невилікувана гіперплазія ендометрія, венозні тромбоемболічні події (тромбоз глибоких вен, тромбоемболія легеневої артерії), що спостерігаються нині або виникали у минулому; артеріальні тромбоемболічні події (стенокардія, ІМ), що спостерігаються нині або виникали у минулому; схильність до розвитку тромбозів (дефіцит протеїну С, дефіцит протеїну S або антитромбіну); високий ризик розвитку венозного або артеріального тромбозу; г.захворювання печінки або наявність таких захворювань в анамнезі (поки показники функції печінки не повернуться до норми); тяжкі захворювання печінки; порфірія; пухлини печінки (доброякісні або злویкісні) нині або в минулому; тяжка гіпертригліцеридемія.

Визначена добова доза (DDD): трансдермально (гель) - 1 мг

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДИВИГЕЛЬ	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює випуск серій; виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості), Фінляндія	гель по 1г у пак.	1 мг/пак.	№28	13,41	31,45/€
	ДИВИГЕЛЬ	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює випуск серій; виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості), Фінляндія	гель по 0,5г, у пак.	0,5 мг/пак.	№28	15,90	31,45/€
	ЕСТРАМОН 50	Гексал АГ, Німеччина	пластир т/д у пак.	50 мкг/доба	№6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕСТРОЖЕЛЬ	Безен Меньюфекчурінг Белджіум СА, Бельгія	гель д/місц. застос. по 80г у фл.	0,6 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛЕНЗЕТТО®	Геден Ріхтер Румунія А.Т., Румунія	спрей т/д, р-н у скл. фл. по 8,1мл (56доз)	1,53 мг/доза	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПРОГІНОВА	Дельфарм Лілль САС - ЛУС-ЛЕЗ-ЛАННОЙ, Франція	табл., в/о у бл.	2мг	№21x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Естріол (Estriol)** ** [тільки супозиторії]

Фармакотерапевтична група: G03CA04 - гормони статевих залоз та препарати, що застосовуються при патології статевої сфери. Прості препарати природних і напівсинтетичних естрогенів.

Основна фармакотерапевтична дія: природний жіночий гормон естріол; на відміну від інших естрогенів, естріол є короткодійним, оскільки він взаємодіє з ядрами клітин ендометрія; компенсує втрату продукції естрогену у жінок у період менопаузи та зменшує виразність менопаузальних симптомів; є особливо ефективним при лікуванні сечостатевого сечостатевого тракту естріол нормалізує епітелій та сприяє відновленню нормальної мікрофлори та фізіологічного рівня рН у піхві; внаслідок цього підвищується резистентність клітин епітелію сечостатевого тракту до інфекцій та запалення, що призводить до зменшення таких вагінальних симптомів, як диспареунія, сухість, свербіж, вагінальні інфекції та інфекції сечовидільного тракту, порушення сечовипускання та незначне нетримання сечі.

Показання для застосування ЛЗ: гормональна замісна терапія для лікування атрофії слизової оболонки нижніх відділів сечостатевого тракту, пов'язаної з дефіцитом естрогену^{БНФ}; перед- і післяопераційне лікування жінок у постменопаузальному періоді при вагінальних хірургічних втручаннях^{БНФ}; як допоміжний засіб для діагностики при сумнівних випадках атрофічної картини цервікального мазка в жінок у постменопаузальному періоді у разі виявлення патологічних клітин, які вказують на атрофію епітелію.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: супоз.; при атрофії нижніх відділів сечостатевого тракту - 1 супоз./добу протягом перших тижнів з подальшим поступовим зниженням до підтримуючої дози (по супоз. 2 р/тижд.) залежно від ступеня зменшення симптомів; для перед- та післяопераційного лікування жінок у постменопаузальному періоді при вагінальних хірургічних втручаннях: 1 р/добу протягом 2 тижнів до операції; 1 р/добу протягом 2 тижнів після операції; як допоміжний засіб для діагностики при отриманні атрофічної картини цервікального мазка: 1 р/добу ч/з день протягом тижня перед взяттям наступного мазка; у разі пропуску чергової дози ввести препарат одразу після згадування, якщо це не відбулося у день введення наступної дози, в останньому випадку пропущену дозу пропустити і продовжити лікування за звичайною схемою введення, не вводити 2 дози препарату в один день; крем.ваг.атрофія нижніх відділів сечостатевого тракту - 1 доза препарату/добу протягом перших тижнів (максимум - до 4 тижнів) із подальшим поступовим зниженням до підтримувальної дози (максимум по 1 дозі препарату 2 р/тижд.^{БНФ}) залежно від ступеня зменшення симптомів; перед- та післяопераційне лікування жінок у постменопаузальному періоді при вагінальних хірургічних втручаннях: 1 доза/добу 2 тижні до операції^{БНФ}; по 1 дозі препарату 2 р/тижд. протягом 2 тижнів після операції; як допоміжний засіб для діагностики при отриманні

атрофічної картини цервікального мазка: по 1 дозі препарату ч/з день протягом тижня перед взяттям наступного мазка.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: подразнення та свербіж у місці введення, грипозні симптоми, дискомфорт і біль у молочних залозах, посткліматеричні кров'яністі виділення, вагінальні виділення, нудота, набряки, доброякісні та злоякісні естрогензалежні новоутворення, рак ендометрія, захворювання жовчного міхура, порушення з боку шкіри та підшкірної клітковини: хлоазма, мультиформна еритема, вузликова еритема, геморагічна пурпура, можлива деменція у віці від 65 років, ризик розвитку раку молочної залози.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якої допоміжної речовини, встановлений, наявний в анамнезі або підозрюваний рак молочних залоз, встановлені або підозрювані естрогензалежні злоякісні пухлини (рак ендометрія), вагінальна кровотеча невизначеної етіології, нелікована гіперплазія ендометрія, попередня або наявна нині венозна тромбоемболія (тромбоз глибоких вен, емболія легенів), встановлені тромбоемболічні порушення (дефіцит протеїну С, протеїну S або антитромбіну), активне або нещодавно перенесене тромбоемболічне захворювання артерій (стенокардія, ІМ), захворювання печінки в активній формі або захворювання печінки в анамнезі, після якого показники функції печінки не повернулися до нормальних величин, порфірія.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II. ОВЕСТИН®	Юнітер Індастріс (вир-к дозованої форми, вир-к, відпов. за контроль та випуск серії), Франція	супоз. вагін. у бл.	0,5мг	№5x3		відсутня у реєстрі ОБЦ
ОВЕСТИН®	Аспен Бад Олдесло ГмбХ (вир-к, відповідальний за вир-во, перв. та втор. пак., контроль якості та випуск серії), Німеччина	крем вагін. по 15г у тубі з аплік.	1 мг/г	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ

Комбіновані препарати

• Етинілестрадіол + Гестоден (Ethinylestradiol + Gestoden)

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II. АПЛІК	Ацино АГ (вир-во in-bulk, перв. упаковка, контроль якості)/ Єврофінс БіоФарма Продакт Тестинг Мюнх ГмбХ (контроль якості (тільки мікробіологічний контроль))/ Байер Ваймар ГмбХ і Ко. КГ (втор. пак., випуск серій), Німеччина	пластир т/д у саше	13мкг/60мкг/24год.	№1x3		відсутня у реєстрі ОБЦ
ВЕНДІОЛ	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл., вкриті п/о у бл. з в пак.-саше та календ.-стикер.	0,015/мг0,06 мг	№28(24+4)x1; №28(24+4)x3		відсутня у реєстрі ОБЦ
ЛІНДИНЕТ 20	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл., в/о у бл.	0,02мг/0,075 мг	№21x1, №21x3		відсутня у реєстрі ОБЦ
ЛІНДИНЕТ 30	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл., в/о у бл.	0,03мг/0,075 мг	№21x1, №21x3		відсутня у реєстрі ОБЦ
ЛОГЕСТ®	Дельфарм Лілль С.А.С. (вир-во за повним циклом)/ Байер Ваймар ГмбХ і Ко. КГ (вир-во продукції in-bulk, контроль серії)/Байер АГ (перв. та втор. пак., випуск серії), Франція/ Німеччина	табл., в/о у бл. з календ. шкал.	20мкг/75мкг	№21x1		відсутня у реєстрі ОБЦ
МОДЕЛЛЬ ТІН	Хаупт Фарма Мюнстер ГмбХ (вир-во нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль серії)/ ПЛІВА Хрватска д.о.о. (дозвіл на випуск серії), Німеччина/Хорватія	табл., вкриті п/о у бл. з календ.	15мкг/60мкг	№28(24+4)x1		відсутня у реєстрі ОБЦ
ФЕМОДЕН®	Байер Фарма АГ(всі стадії вир-ва, окрім нерозфасованої продукції)/ Байер Ваймар ГмбХ і Ко. КГ	табл., в/о у бл. з календ. шкал.	0,03мг/0,075 мг	№21x1		відсутня у реєстрі ОБЦ

	(всі стадії вир-ва), Німеччина				
--	--------------------------------	--	--	--	--

• **Етинілестрадіол + Дезогестрел (Ethinylestradiol + Desogestrel)**

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II. ДЕЗОФЕМІН 30	мібе ГмБХ Арцнайміттель, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	0,03мг/0,15мг	№21x1, №21x3, №21x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МАРВЕЛОН®	Н.В.Органон (за повним циклом), Нідерланди	табл. у бл. в саше	0,03мг/0,150мг	№21x1, №21x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НОВІНЕТ	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл., в/о у бл.	0,02мг/0,15мг	№21x1, №21x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РЕГУЛОН®	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл., в/о у бл.	0,03мг/0,15мг	№21x1, №21x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Етинілестрадіол + Дієногест (Ethinylestradiol + Dienogest)**

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II. ДЕНОВЕЛЬ® 30	мібе ГмБХ Арцнайміттель, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	0,03мг/2мг	№21, №63, №126	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ДІНОРЕТ	Лабораторіос Леон Фарма, С.А. (контроль якості, вир-во готового продукту, пакування, випуск серії)/ Лабораторіо де Аналісис Др. Ечаварне, С.А. (мікробіологічний аналіз)/ТОВ "Манантіал Інтегра" (альтернативна ділянка для вторинного пакування), Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	0,03мг/2мг	№21x1, №21x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЖАНІН®	Байер АГ (первинна та вторинна упаковка)/Байер Ваймар ГмБХ і Ко. КГ (повний цикл виробництва), Німеччина/Німеччина	табл., в/о у бл. з календ. шкал.	0,03мг/2мг	№21x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЖАСТІНДА	Лабораторіос Леон Фарма С.А., Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	0,03мг/2мг	№21x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЖАСТІНДА	Лабораторіос Леон Фарма С.А., Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	0,03мг/2мг	№21x3	425,25	32,39/€
ЛУВІНА	Люпін Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	0,03мг/2мг	№21x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НААДІН	Циндеа Фарма, С.Л., Іспанія	табл., в/о у бл.	0,03мг/2мг	№21x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
СИЛУЕТ®	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	0,03мг/2мг	№21x1, №21x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
СОФІТІ®	Лабораторіос Леон Фарма, С.А., Іспанія	табл., вкриті п/о у бл. з календ. шкал.	0,03мг/2мг	№28(21+7)	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ФЛАМЕНКО	Салютас Фарма ГмБХ (дозвіл на випуск серії)/Лабораторіос Леон Фарма С.А. (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, контроль серії), Німеччина/Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	30мкг/2мг	№21, №63, №126	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Етинілестрадіол + Дроспіренон (Ethinylestradiol + drospirenon)**

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II. ВЕЛМАРІ	Лабораторіос Леон Фарма, С.А. (контроль якості, вир-во готового продукту, пакування, випуск серії)/ Лабораторіо де Аналісис Др. Ечаварне, С.А. (мікробіологічний контроль)/	табл., вкриті п/о у бл.	0,02мг/3мг	№28, №84, №168, №364	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	ТОВ "Манантіал Інтегра" (альтернативна ділянка вторинного пакування), Іспанія					
ВІДОРА	Лабораторіос Леон Фарма, С.А., Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	0,03мг/3мг	№28x1, №28x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ВІДОРА МІКРО	Лабораторіос Леон Фарма, С.А., Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	0,02мг/3мг	№28x1, №28x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ДАРІЛІЯ	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	0,02мг/3мг	№28x1, №28x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ДЖАЗ	Байер АГ (первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії для активної таблетки; первинне та вторинне пакування, випуск серії для "плацебо"; вир-во нерозфасованої продукції та проведення контролю якості для «плацебо»)/ Байер Ваймар ГмбХ, Німеччина	табл., в/о у бл.	0,02мг/3мг	№28	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ДІФЕНДА	Лабораторіос Леон Фарма С.А. (повний цикл виробництва)/МАНАНТІАЛ ІНТЕГРА, С.Л.У. (альтернативний вир-к, який відповідає за вторинне пакування)/ АТДІС ФАРМА, С.Л. (Альтернативний вир-к, який відповідає за вторинне пакування), Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	0,02мг/3мг	№28 (24+4)x1	157,50	32,39/€
ДРОСПІФЕМ 20	мібе ГмбХ Арцнайміттель, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	0,02мг/3мг	№28, №84, №168	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ДРОСПІФЕМ 30	мібе ГмбХ Арцнайміттель, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	0,03мг/3мг	№21, №63, №126	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ДРОСПІФЕМ® 20	мібе ГмбХ Арцнайміттель, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	0,02мг/3мг	№28, №84, №168	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ДРОСПІФЕМ® 30	мібе ГмбХ Арцнайміттель, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	0,03мг/3мг	№21, №63, №126	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ІЗНЕЛЬ 30	Людін Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	0,02мг/3мг	№21x1, №21x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛІБЕРАТТІ®	Лабораторіос Леон Фарма, С.А., Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	0,02мг/3мг	№28	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МІДІАНА	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	0,03мг/3мг	№21x1, №21x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МІЛАНДА	Лабораторіос Леон Фарма С.А. (повний цикл вир-ва)/ МАНАНТІАЛ ІНТЕГРА, С.Л.Ю. (альтернативний вир-к, який відповідає за вторинне пакування)/ АТДІС ФАРМА, С.Л. (Альтернативний вир-к, який відповідає за вторинне пакування), Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	0,03мг/3мг	№21x1	157,50	32,39/€
МОДЕЛЛЬ ПРО	Оман Фармасьютикал Продактс Компані ТОВ (вир-во нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль серії)/ ПЛІВА Хрватска д.о.о. (дозвіл на випуск серії), Султанат Оман/Хорватія	табл., вкриті п/о у бл.	0,03мг/3мг	№21, №63, №126	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ФЕМІНАТІ®	Лабораторіос Леон Фарма,	табл., вкриті	0,03мг/3мг	№28	відсутня у реєстрі	

	С.А., Іспанія	п/о у бл. з календ. шкал.			ОВЦ
ЯРИНА®	Байер АГ (первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії)/Байер Ваймар ГмБХ і Ко. КГ (вир-во нерозфасованої продукції), Німеччина	табл., в/о у бл. з кален. шкал.	0,03мг/3мг	№21x1	відсутня у реєстрі ОВЦ

• **Етинілестрадіол + Етоногестрел (Ethinylestradiol + Ethonogestrel)**

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II. НОВАРИНГ®	Н.В.Органон (за повним циклом), Нідерланди	кілецьє вагін. у саше	11,7мг/2,7мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Етинілестрадіол + Левоноргестрел (Ethinylestradiol + Levonorgestrel) ***

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II. ЛЕВЕРЕТ МІНІ	Лабораторіос Леон Фарма, С.А. (контроль якості, вир-во готового продукту, пакування, випуск серії)/Лабораторіо де Аналісис Др. Ечаварне, С.А. (мікробіологічний контроль)/ТОВ Манантіал Інтегра (альтернативна ділянка втор. пак.), Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	0,02мг/0,1мг	№21, №63, №126	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛЕВОМІН 30	мібе ГмБХ Арцнайміттель, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	0,03мг/0,15мг	№21, №63, №126	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МОДЕЛЛЬ ЕРО	ТОВ Тева Оперейшнз Поланд, Польща	табл., вкриті п/о у бл.	0,01мг + 0,03мг/0,15мг	№91x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИГЕВІДОН	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл., в/о у бл.	0,03мг/0,15мг	№21x1, №21x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТРИ-РЕГОЛ	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл., в/о у бл.	0,03мг/0,05мг; 0,04мг/0,075мг; 0,03мг/0,125мг	комб.-упак. №21, №63	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦЕРІНТА	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд., Індія	табл. у бл.	0,03мг/0,15мг	№21x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Етинілестрадіол + норелгестромін (Ethinylestradiol + norelgestromin)**

Визначена добова доза (DDD): трансдермально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена у реєстрі ОВЦ.
Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II. ЕВРА®	Янссен Фармацевтика НВ (втор. упаковка та випуск серії)/ЛТС Ломанн Терапевтичні Системи АГ (вир-во нерозфасованого продукту та первинна упаковка), Бельгія/Німеччина	пласт. т/д терап. сист. (ТТС)	0,6мг/6мг	№3x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЕВРА®	Янссен Фармацевтика НВ (втор. упаковка та випуск серії)/ЛТС Ломанн Терапевтичні Системи АГ (вир-во нерозфасованого продукту та первинна упаковка), Бельгія/Німеччина	пласт. т/д терап. сист. (ТТС)	0,6мг/6мг	№3x1	342,13	24,65/\$

• **Етинілестрадіол + Хлормадинон (Ethinylestradiol + Chlormadinone)**

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II. БЕЛАРА®	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	0,03мг/2мг	№21x1, №21x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	

МАДІНЕТ	мібе ГмБХ Арцнайміттель, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	0,03мг/2мг	№21, №63, №126	відсутня у реєстрі ОБЦ
МАДІНЕТ®	мібе ГмБХ Арцнайміттель, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	0,03мг/2мг	№21, №63, №126	відсутня у реєстрі ОБЦ
МОДЕЛЛЬ АНТИ	Хаупт Фарма Мюнстер ГмБХ (вир-во нерозфасованої продукції, перв. та втор. упаковка, контроль серії)/ПЛІВА Хрватска д.о.о. (дозвіл на випуск серії), Німеччина/Хорватія	табл., вкриті п/о у бл.	30мкг/2мг	№21, №63, №126	відсутня у реєстрі ОБЦ

• **Етинілестрадіол + Ципротерон (Ethinylestradiol + Cyproterone)**

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II. ДЕБОРА	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд., Індія	табл. вкриті п/о, у бл.	0,035мг/2мг	№21x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ДІАНЕ-35	Байер АГ (первинна, вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії)/Байер Ваймар ГмБХ і Ко. КГ (повний цикл вир-ва), Німеччина	табл. в/о, у бл. з календ. шкал.	0,035мг/2мг	№21x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МОДЕЛЛЬ ПЬЮР	Хаупт Фарма Мюнстер ГмБХ (вир-во нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості)/ПЛІВА Хрватска д.о.о. (дозвіл на випуск серії), Німеччина/Хорватія	табл. в/о, у бл.	0,035мг/2мг	№21x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Естрадіол + Дидрогестерон (Estradiol + Dydrogesterone)**

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II. ФЕМОСТОН®	Абботт Біолоджікалз Б.В., Нідерланди	табл., вкриті п/о у бл.	1мг+1мг/10мг; 2мг+2мг/10мг	комбі-упак. №28, №56, №84	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ФЕМОСТОН® КОНТІ	Абботт Біолоджікалз Б.В., Нідерланди	табл., вкриті п/о у бл.	1мг/5мг	№28, №56, №84	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ФЕМОСТОН® КОНТІ МІНІ	Абботт Біолоджікалз Б.В., Нідерланди	табл., вкриті п/о у бл.	0,5мг/2,5мг	№28, №84	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Естрадіол + Дієногест (Estradiol + Dienogest)**

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II. КЛАЙРА	Байер Ваймар ГмБХ і Ко. КГ, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	3мг+2мг/2мг + 2мг/3мг + 1мг + плацебо	№28 (2+5+17+2+2)	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КЛІМОДІЄН	Байер Ваймар ГмБХ і Ко. КГ, Німеччина	табл., в/о у бл.	2мг/2мг	№28x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Естрадіол + дроспіренон (Estradiol + drospirenon)**

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II. АНЖЕЛІК	Байер АГ (первинна та вторинна упаковка, контроль серії, відповідальний за випуск серії)/Байер Ваймар ГмБХ і Ко. КГ (вир-во нерозфасованої продукції), Німеччина	табл., в/о у бл. з календ. шкал.	1мг/2мг	№28	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Естрадіол + Левоноргестрел (Estradiol + Levonorgestrel)**

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II. КЛІМОНОРМ	Дельфарм Лілль САС-ЛУС-ЛЕЗ-ЛАННОЙ (відповідає за випуск	табл., в/о у бл.	2мг+2мг/0,15мг	№21 (9+12)	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	серії)/ Байер Ваймар ГмБХ і Ко. КГ (вир-во "in bulk", перв. та втор. пак., контроль якості), Франція/Німеччина				
--	--	--	--	--	--

● **Естрадіол + естрадіол + ципротерон (Estradiol + estradiol + cyproterone)**

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II. КЛІМЕН®	Дельфарм Лілль САС - ЛУС-ЛЕЗ-ЛАННОЙ, Франція	табл., в/о у бл. з календ. шкал.	2мг + 2мг/1мг	комбі-уп.: №21 (11+10)		відсутня у реєстрі ОБЦ

● **Естріол + lactobacillus acidophilus (Estriol + lactobacillus acidophilus) ****

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II. ГІНОФЛОР	Медінова АГ (контроль якості та випуск серії)/Хаупт Фарма Амарег ГмБХ (вир-во, перв. та втор. пакування), Швейцарія/Німеччина	табл. вагін. у бл.	0,03мг/100м л життєздат. бакт.	№2x1, №6x1, №6x2		відсутня у реєстрі ОБЦ

● **Проместрієн (Promestriene)**

Фармакотерапевтична група: G03CA09 - прості препарати природних і напівсинтетичних естрогенів.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний естрогеноподібний засіб, призначений для місцевого застосування, що чинить місцеву естрогенну дію на слизову оболонку нижніх відділів уrogenіального тракту, відновлює їх трофіку; при внутрішньовагінальному введенні не чинить системної дії, тому не впливає на ендометрій, молочні залози та гіпофіз; виявляє місцевий естрогенний вплив на слизову оболонку піхви: сприяє проліферації піхвового епітелію.

Показання для застосування ЛЗ: вагінальна атрофія, зумовлена дефіцитом естрогенів; затримка загоєння піхви, шийки матки та вульви після пологів, хірургічного втручання, фізіотерапії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: по 1 капс. (попередньо зволожений) вводити глибоко у піхву протягом 20 днів; у разі необхідності лікування може бути продовжено (менопауза, кастрація, застосування естроген-прогестинвмісних контрацептивів); крем наносити 1-2 р/добу кожні 2-3 дні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: місцеві реакції, включаючи подразнення, свербіж, печіння; АР; ризик розвитку раку молочної залози, рак яєчників, ризик розвитку венозної тромбоемболії, ризик розвитку ішемічного інсульту; захворювання жовчного міхура; порушення з боку шкіри та підшкірних тканин: хлоазма, мультиформна еритема, вузлувата еритема, судинна пурпура; можлива деменція у жінок віком від 65 років.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до промєстріну або до будь-якого компонента препарату, період грудного вигодовування, одночасне застосування з сперміцидними засобами або латексними презервативами, рак молочної залози (підтверджений, підозрюваний або в анамнезі) або діагностовані або підозрювані естрогензалежні пухлини (наприклад, рак ендометрія), нелікована гіперплазія ендометрія, генітальна кровотеча нез'ясованої етіології, венозна тромбоемболія, у т.ч. в анамнезі (тромбоз глибоких вен, емболія легеневої артерії), діагностовані тромбофілічні порушення (дефіцит антитромбіну, протеїну С, протеїну S), г. або недавно перенесена артеріальна тромбоемболія (стенокардія, ІМ), г.(або в анамнезі) захворювання печінки, доки показники ф-ції печінки не повернуться в межі норми; порфірія.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II. КОЛПОТРОФІН	Лабораторія ШЕМІНО (вир-во за повним циклом) /Конфарма Франс (контроль серії (тільки мікробіологічне тестування)), Франція	крем вагін. по 15г у тубі	10 мг/1г	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
КОЛПОТРОФІН	Лабораторія ШЕМІНО (вир-во за повним циклом) / Конфарма Франс (контроль серії (тільки мікробіологічне тестування)) / Тева Фармасьютикалз Юероп Б.В. (дозвіл на випуск серії), Франція/Нідерланди	крем вагін. по 15г у тубі	10 мг/1г	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
КОЛПОТРОФІН	Капсужель Пloedermель (вир-во нерозфасованої продукції, контроль серії) / Лафаль Ендюстрі (первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії) / Конфарма Франс (контроль серії (тільки мікробіологічне тестування)) / Тева Фармасьютикалз Юероп Б.В.	капс. вагін. м'які у бл.	10мг	№10x1		відсутня у реєстрі ОБЦ

(дозвіл н, Франція/Нідерланди)

• **Проместрієн + Хлорхінальдол (Promestriene + Chlorquinaldol)**

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II. КОЛПОСЕПТИН	Лабораторія МАКОР (вир-во за повним циклом)/ Конфарма Франс (контроль серії (тільки мікробіологічне тестування))/ Тева Фармасьютикалз Юероп Б.В. (дозвіл на випуск серії), Франція/Нідерланди	табл. вагін. у бл.	10мг/200мг	№6х3	відсутня у реєстрі ОВЦ	

11.6.3. Гестагени

11.6.3.1. Похідні прегнену

• **Гідроксипрогестерон (Hydroxprogesterone)**

Фармакотерапевтична група: G03DA03 - гормони статевих залоз і препарати, що застосовуються при патології статевої сфери. Прогестерони.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний аналог гормона жовтого тіла, що викликає трансформацію слизової оболонки матки з фази проліферації в секреторну фазу, що необхідно для нормальної імплантації заплідненого яйця, а після запліднення сприяє її переходу в стан, необхідний для розвитку заплідненої яйцеклітини; також зменшує збудливість і скоротливість мускулатури матки і маткових труб; стимулює розвиток кінцевих елементів молочних залоз; у малих дозах стимулює, а у великих пригнічує секрецію гонадотропних гормонів; гальмує дію альдостерону, що призводить до посилення секреції натрію і хлору із сечею; більш стійкий в організмі, ніж прогестерон і має більш тривалий ефект, після одноразової в/м ін'єкції зберігає свою дію від 7 до 14 днів.

Показання для застосування ЛЗ: патологічні процеси, зумовлені недостатністю жовтого тіла: загроза викидня; первинна та вторинна аменорея; поліменорея; дисфункціональні маткові кровотечі; гіперпластичні процеси в ендометрії, ендометріоз.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: загроза викидня або викиднень, що почався - в I триместрі вагітності по 125-250 мг (1-2 мл 12,5% р-ну) в/м 1 р/тижд.; аменорея (первинна і вторинна) - безпосередньо після припинення застосування естрогенних препаратів 250 мг 1-2 прийоми; нормалізація менструального циклу (при поліменореї, дисфункціональних маткових кровотечах) - 62,5-125 мг (0,5-1,0 мл 12,5 % р-ну) на 20-22 день циклу; жінкам із гіперплазією ендометрія (при відсутності гормонально активних пухлин яєчників) до 45 років у I фазі менструального циклу - естрогени (етинілестрадіол 0,05 мг на день з 5-го по 25-й день циклу) та гідроксипрогестерон по 1 мл 12,5 % р-ну 1 р/тижд. на 5-й, 12-й і 19-й день циклу 4-5 циклів, жінкам від 45 років - по 2 мл 12,5 % р-ну 1 р/тижд. 6-8 менструальних циклів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: підвищення АТ, тахікардія, задишка, порушення кровообігу (ІМ та інсульт), тяжкі артеріальні та венозні тромбоемболії, у т. ч. легенева емболія (іноді фатальна), набряки, затримка рідини, альбумінурія, погана переносимість глюкози, зміни ліпідного профілю плазми, зміни апетиту, здуття живота, біль у животі, запор, діарея, порушення ф-ції печінки та зміни функціональних проб печінки, холестатична жовтяниця, нудота, блювання, головний біль, мігренозний головний біль, запаморочення, депресія, безсоння, сонливість, слабкість, підвищена втомлюваність, парестезії, біль у спині, збільшення маси тіла, біль і напруження у молочних залозах, зміна вагінальних виділень, нерегулярні маткові кровотечі, ановуляція після лікування, аменорея під час лікування або після нього, олігоменорея, порушення менструального циклу, передменструальний с-м, зміни лібідо, гірсутизм, цистит, спазми матки, порушення з боку зовнішніх статевих органів (печіння, сухість, генітальний свербіж, вагінальні виділення, збільшення продукції цервікального слизу, кров'янисті виділення, кровотеча відміни, проривні кровотечі, вагінальний мікоз), р-ції гіперчутливості, анафілактичні р-ції, ангіоневротичний набряк, кропив'янка, алопеція, акне, жовті пігментні плями на обличчі (хлоазма), АР на шкірі (висипання, свербіж), мультиформна еритема, порушення зору, тромбоз сітківки, запалення зорових нервів, гарячка; зміни у місці введення, біль та припухлість, абсцес, надмірна кількість прогестерону може спричинити вірилізацію плода жіночої статі (аж до невизначеності статевої належності).

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до компонентів препарату, друга половина вагітності, позаматкова вагітність або вагітність, що завмерла, в т. ч. в анамнезі, вагінальні кровотечі невстановленого ґенезу, стан після аборту, порушення ф-ції печінки, захворювання печінки (гепатит, цироз), холестатична жовтяниця у період вагітності або в анамнезі, доброякісна гіпербілірубінемія, печінкова недостатність, ниркова недостатність, порфірія, нервові розлади з явищами депресії, тахікардія, злоякісні пухлини молочних залоз та статевих органів, активна венозна або артеріальна тромбоемболія, тяжкий тромбофлебіт або такі стани в анамнезі.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 10 мг.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I. ІНЖЕСТА® ОКСІ	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. в етилолеаті по 1мл в амп. у пач. та бл.	125 мг/мл	№5, №10, №5х2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ІНЖЕСТА® ОКСІ	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. в етилолеаті по 1мл	125 мг/мл	№5х1	1,92	

			в амп. у бл.			
ОКСИПРОГЕСТЕРОНУ КАПРОНАТ	ТОВ "Ф3 "БІОФАРМА", Україна	р-н д/ін'єк. олійн. по 1мл в амп. у бл.	125 мг/мл	№5x2	0,99	

● **Прогестерон (Progesterone)**

Фармакотерапевтична група: G03DA04 - гормони статевих залоз та препарати, які застосовуються при патології статеві сфери. Гестагени.

Основна фармакотерапевтична дія: є гормоном жовтого тіла, що сприяє утворенню нормального секреторного ендометрія у жінок, спричиняє перехід слизової оболонки матки з фази проліферації у секреторну фазу, а після запліднення сприяє її переходу в стан, необхідний для розвитку заплідненої яйцеклітини, зменшує збудливість та скоротливість мускулатури матки та маткових труб; не має андрогенної активності, виявляє блокуючу дію на секрецію гіпоталамічних факторів вивільнення ЛГ та ФСГ, пригнічує утворення гіпофізом гонадотропних гормонів та овуляцію; у тканинах молочної залози прогестерон знижує проникність капілярів, що підвищується внаслідок дії естрогенів; бере участь у регуляції росту та диференціації молочних проток та часток, блокує індукований естрогенами цикл швидкого мітозу епітеліальних клітин.

Показання для застосування ЛЗ: табл. вагін.: зниження здатності до запліднення при первинній або вторинній безплідності при частковій або повній лютеїновій недостатності ^{БНФ} (дизовуляція, підтримка лютеїнової фази під час приготування до екстракорпорального запліднення, програма донації яйцеклітин), профілактика звичного викидня або загрози спонтанного викидня при лютеїновій недостатності, профілактика передчасних пологів у жінок з короткою шийкою матки або у жінок з наявністю передчасних спонтанних пологів в анамнезі, неможливість або обмеження р/ос застосування препарату.; табл.сублінгв.: лікування ендогенного дефіциту прогестерону у формі порушень менструального циклу, вторинної аменореї, ановуляторних циклів, передменструального с-му ^{БНФ}, функціональних маткових кровотеч ^{БНФ}, при штучному заплідненні, безплідді, пов'язаному з лютеальною недостатністю ^{БНФ}, звичному невиношуванні та загрози мимовільного аборту при дефіциті прогестерону, недостатності жовтого тіла ^{БНФ}, вторинній аменореї, запобігання гіпертрофії ендометрія у жінок, які приймають естрогени (при гормональній замісній терапії); гель: есенціальна мастодинія; мастодинія, пов'язана з доброякісним захворюванням молочної залози (комплексне лікування доброякісної мастопатії на фоні прогестеронової недостатності); р-н д/ін'єкц.: для підтримки функції жовтого тіла (лютеїнової фази) при використанні методів допоміжних репродуктивних технологій у безплідних жінок, які не здатні застосовувати або переносити вагінальні препарати прогестерону ^{БНФ}; капс.: передменструальний с-м; ^{БНФ} порушення менструального циклу (дизовуляція, ановуляція), фіброзно-кістозна мастопатія, передклімактеричний період; замісна гормонотерапія у менопаузі (у поєднанні з естрогенною терапією); безплідність при лютеїновій недостатності ^{БНФ}; профілактика звичного викидня або загрози викидня на фоні лютеїнової недостатності ^{БНФ}; загроза передчасних пологів; гель ваг.: лікування безпліддя, спричиненого недостатністю лютеїнової фази; лікування безпліддя у рамках процедур IVF (запліднення *in vitro*): у пацієток з нормальними овуляторними циклами, у яких безпліддя пов'язане із захворюваннями труб, ендометріозом або ідіопатичними патологіями.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н д/ін'єкц.: п/ш та в/м, застосовують після першого відкриття; 1 ін'єкція 25 мг 1 р/добу з дня пункції фолікулів і до 12 тижня підтвердженої вагітності ^{БНФ}; табл. ваг.: вводять вагінально по 1 табл.(100мг) 2 -3 р/день, починаючи з дня імплантації ембріона, тривалість лікування - до 12 тижнів ^{БНФ}; табл.сублінгв.: порушення менструального циклу та передменструальний с-м ^{БНФ} - 50 мг прогестерону 3-4 р/добу сублінгвально 3-6 циклів; запобігання гіпертрофії ендометрія (при замісній гормональній терапії) у поєднанні з естрогенами найчастіше - по 50 мг прогестерону 3-4 р/добу; при пролонгованих переривчастих схемах застосовувати під язик протягом останніх 12-14 днів 28-денного циклу; при пролонгованих безперервних схемах прогестерон застосовувати щоденно без перерв; при виконанні прогестеронової проби при вторинній аменореї - по 50 мг 3-4 р/добу сублінгв., менструація повинна з'явитися протягом 7-10 днів після закінчення лікування, функціональні маткові кровотечі - по 50 мг прогестерону 3-4 р/добу сублінгв. з 15-го по 25-й день циклу 2-3 місяці, звичне невиношування та загроза самовільного аборт, ановуляторні та індуковані цикли - по 100 мг прогестерону 3-4 р/добу; у випадку звичного невиношування застосування прогестерону потрібно розпочати під час циклу, у якому заплановано вагітність, навіть раніше (прегравідарна підготовка за 3-4 міс.), лікування потрібно продовжувати безперервно приблизно до 18-20-го тижня вагітності; у програмах запліднення *in vitro* (екстракорпорального) застосовувати 100-150 мг прогестерону 3-4 р/добу; гель: трансдермальна, терапія впродовж місяця, включаючи дні менструації, безперервна зі щоденним застосуванням ЛЗ, середня тривалість лікування від 3 до 6 міс., МДД-5мг; капс.: середньодобова доза - р/ос 200-300 мг у 1 або 2 прийоми ^{БНФ} (200 мг ввечері, перед сном, та 100 мг вранці, якщо виникає така потреба), недостатність лютеїнової фази ^{БНФ}: 10 діб (зазвичай з 17-ї по 26-у добу циклу включно); при замісній гормонотерапії менопаузи: окремо естрогенотерапія не рекомендована, прогестерон необхідно застосовувати як доповнення до неї останні 2 тижні кожного терапевтичного курсу, які настають за однотижневою підтримкою будь-якої замісної терапії, в ході якої може спостерігатися кровотеча відміни; загроза передчасних пологів: 400 мг ч/з кожні 6-8 год до зникнення симптомів, після зникнення симптомів дозу знижують до підтримуючої (200 мг 3 р/добу), у цій дозі можна застосовувати до 36 тижнів вагітності, застосування після 36 тижнів вагітності не рекомендовано; інтравагінально: часткова недостатність лютеїнової фази - добова доза 200 мг 10 діб (з 17-ї по 26-у добу циклу); повна недостатність лютеїнової фази [повна відсутність прогестерону у жінок з нефункціонуючими (відсутніми) яєчниками (донація яйцеклітин)]: доза прогестерону - 100 мг на 13-у та 14-у добу циклу переносу, з 15-ї по 25-у добу циклу доза - 200 мг, розподілених на 2 прийоми (вранці та ввечері), з 26-ї доби, в разі ранньої діагностики вагітності, доза збільшується, поступово (кожного тижня) на 100 мг/добу, досягаючи максимуму 600 мг/добу, розподілених на 3 прийоми; підтримка лютеїнової фази під час проведення циклу екстракорпорального запліднення: 600 мг/добу в 3 прийоми (200 мг одноразово ч/з кожні 8 год), загроза викидня або для профілактики звичних викиднів ч/з лютеїнову недостатність: 200-400 мг/добу (100-200 мг на 1 прийом ч/з кожні 12 год) до 12 тижнів вагітності; профілактика передчасних пологів у жінок з короткою шийкою матки або у жінок з наявністю передчасних спонтанних пологів в анамнезі: 200 мг/добу ввечері перед сном з 22-го по 36-ий тижд. вагітності; гель ваг.: безпліддя, спричинене недостатністю лютеїнової фази - після встановленої овуляції або альтернативно на

18-21-й день циклу вводять вміст 1 аплікатора (1,125 г 8 % гелю) щоденно; при застосуванні у рамках IVF-процедур - після лабораторного підтвердження вагітності вводять вміст 1 аплікатора (1,125 г 8 % гелю) щоденно впродовж 30 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: зміна настрою; головний біль; запаморочення, сонливість; здуття живота, абдомінальний біль, нудота, блювання, запор; розлади травного тракту; свербіж, висипання; нагубання молочних залоз, біль у грудях, вульвовагінальний свербіж, вульвовагінальний дискомфорт, вульвовагінальне запалення; розлади з боку грудей; реакції у місці введення (подроздринення, біль, свербіж і набряк); гематоми у місці введення, затвердіння у місці введення, підвищена втомлюваність; припливи, нездужання, депресія, безсоння, жовтяниця, порушення менструального циклу, передменструальний с-м, кропив'янка, гірсутизм, алопеція, вугрові висипання (акне), збільшення маси тіла, анафілактоїдні р-ції, інфекції сечовидільної системи, периферичний набряк, хлоазма, мастодинія, зниження лібідо, диспареунія, ніктурія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до прогестерону або до будь-якого компонента препарату, вагінальні кровотечі невідомого генезу, позаматкова вагітність або вагітність, що завмерла, тяжкі захворювання печінки, злоякісні пухлини молочних залоз і репродуктивних органів або підозра на їх наявність, активна фаза артеріальної або венозної тромбоемболії або тяжкого тромбофлебиту, а також їх наявність в анамнезі, порфірія

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,3 г., парентерально - 5 мг., вагінально - 90 мг., Сублінгвально/зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ІНЖЕСТА®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у пач. та бл.	10мг/мл, 25мг/мл	№5, №10, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНЖЕСТА®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	10 мг/мл	№5x1	5,00	
	ІНЖЕСТА®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	25 мг/мл	№5x1	3,40	
	ПРОГЕСТЕРОН	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	р-н д/ін'єк. олійн. по 1мл в амп. у бл.	10 мг/мл	№5x2	2,99	
	ПРОГЕСТЕРОН	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	р-н д/ін'єк. олійн. по 1мл в амп. у бл.	25 мг/мл	№5x2	1,51	
	ПРОЖЕСТІН-КР®	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	гель, по 40г у тубі зі шпат.-доз.	10 мг/г	№1	113,00	
II.	ГИНПРОГЕСТ	Лабораторіос Леон Фарма, С.А. (виробництво готового продукту, пакування, контроль якості, випуск серії)/Лабораторіо де Аналісис Др. Ечаварне, С.А. (мікробіологічний контроль)/ТОВ "Манантіал Інтегра" (альтернативна ділянка для вторинного пакування), Іспанія/Іспанія/Іспанія	м'які капс. у бл.	100мг, 200мг	№15x1, №15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕНДОМЕТРИН	Бен-Шимон Флоріс Лтд., Ізраїль	табл. вагін. у конт. з аплік.	100мг	№6, №15, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КРИНОН®	Фліт Лабораторія Лімітед (вир-к нерозфас. прод. та контр. якості)/ Херд Манді Річардсон Лімітед (контр. якості)/ маропак аг (перв. уп.)/ Централ Фарма (Контракт Пекінг) Лімітед (втор. уп. та випуск серії), Швейцарія/ Великобританія	гель вагін. в однодоз. аплік.	8% (90мг/1аплік)	№6, №15	59,81	27,26/\$
	ЛЮТЕІНА	АТ "Адамед Фарма", Польща	табл. вагін. у бл.	50мг	№15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

ЛЮТЕІНА	АТ "Адамед Фарма", Польща	табл. вагін. у бл. заплік. або без	100мг	№15x2	8,00	26,67/\$
ЛЮТЕІНА	АТ "Адамед Фарма", Польща	табл. вагін. у бл. з аплік. або без	200мг	№10x3	6,00	26,67/\$
ЛЮТЕІНА	АТ "Адамед Фарма", Польща	табл. вагін. у бл. з аплік. або без	200мг	№10x2	6,60	26,67/\$
ЛЮТЕІНА	АТ "Адамед Фарма", Польща	табл. сублінг. у конт. або бл.	50мг	№30, №15x2	240,00	26,67/\$
ПРОГИНОРМ ГЕСТА	ЛАБОРАТОРІОС ЛЕОН ФАРМА С.А., Іспанія	капс. м'які у бл.	200мг	№15x2	24,75	30,43/€
ПРОГИНОРМ ГЕСТА	ЛАБОРАТОРІОС ЛЕОН ФАРМА С.А., Іспанія	капс. м'які у бл.	100мг	№15x2	30,50	30,43/€
ПРОГИНОРМ ОВО	ЛАБОРАТОРІОС ЛЕОН ФАРМА С.А., Іспанія	капс. м'які у бл.	100мг	№15x2	30,50	30,43/€
ПРОГИНОРМ ОВО	ЛАБОРАТОРІОС ЛЕОН ФАРМА, С.А., Іспанія	капс. м'які у бл.	200мг	№15x2	24,75	30,43/€
ПРОЖЕСТОЖЕЛЬ ®	Безен Меньюфекчурінг Белджіум СА, Бельгія	гель, по 80г у тубі	10 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПРОЛЮТЕКС	ІБСА Інститут Біохімік С.А. (випуск серії, вир- во готового лікарського засобу, первинне та вторинне пакування), Швейцарія	р-н д/ін'ек. по 1мл у фл.	25 мг/мл	№7	відсутня у реєстрі ОВЦ	
УТРОЖЕСТАН®	Безен Меньюфекчурінг Белджіум СА (перв. та втор. уп., контр. якості, дозвіл на випуск серії)/ Капсуджель Плоермель (вир-во нерозфас. прод.)/ Сіндеа Фарма, СЛ (вир-во нерозфас. прод. перв. та втор. уп., ко, Бельгія/Франція/Іспанія	капс. у бл.	100мг, 200мг	№15x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	

11.6.3.2. Похідні прегнадієну

- **Дидрогестерон (Dydrogesterone)**

Фармакотерапевтична група: G03DB01 - гормони статевих залоз і препарати, які застосовуються при патології статевої системи. Гестагени. Похідні прегнадієну.

Основна фармакотерапевтична дія: є селективним гестагеном, який заміщує деякі функції прогестерону; як гестаген, дидрогестерон виключно впливає лише на ендометрій, слизову піхви та цервікальний канал; не пригнічує овуляцію; можливість запліднення яйцеклітини у невагітних жінок при прийомі дидрогестерону залишається; дидрогестерон і його метаболіти не мають термогенних властивостей; у жінок у постменопаузі зі збереженою маткою замісна терапія естрогенами призводить до підвищеного ризику розвитку гіперплазії ендометрія і раку ендометрія; додавання прогестагенів може запобігти надмірному ризику; циклічне додавання дидрогестерону жінкам, у яких ендометрій був стимульований естрогеном, переводить його у фазу секреції; не має маскулінізуючих або вірлізуючих, анаболічних або ГК властивостей.

Показання для застосування ЛЗ: нерегулярні менструальні цикли; ендометріоз; дисменорея; безпліддя, спричинене лютеїною недостатністю; підтримка лютеїнової фази при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ); загрозовий і звичний викидень, пов'язаний з прогестероновою недостатністю; як циклічне доповнення до терапії естрогенами у жінок з інтактною маткою: для попередження гіперплазії ендометрія у період менопаузи; при дисфункційних маткових кровотечах; при вторинній аменореї.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: нерегулярні менструальні цикли: довжина циклу 28 днів може бути досягнута шляхом призначення 10 мг/добу з 11-го по 25-й день циклу; ендометріоз: від 10 до 30 мг/добу з 5-го по 25-й день циклу або протягом усього циклу, призначити найвищу дозу на початковому етапі лікування; дисменорея: від 10 до 20 табл./добу з 5-го по 25-й день циклу, призначити найвищу дозу на початковому етапі лікування; безпліддя, спричинене лютеїною недостатністю: 10 мг/добу з 14-го по 25-й день циклу, лікування продовжити протягом мінімум 6 послідовних циклів, підтримка лютеїнової фази при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ): 1 табл. 3 р/день (30 мг/добу), лікування починають з дня забору ооцитів і продовжують 10 тижн., якщо вагітність підтверджується; загроза викидня: початкова доза: 4 табл. одразу, потім по 1 табл. кожні 8 год., дози, кратні 10 мг/добу, рівномірно розподілити протягом доби, якщо симптоми не зникають або знову з'являються під час лікування, дозу необхідно збільшити на 1 табл. кожні 8 год.; звичний викидень: лікування розпочати до зачаття, 1 табл./добу до 20-го тижня вагітності, після чого поступово знижувати дозу, якщо симптоми загрози переривання вагітності з'являються під час лікування, лікування продовжити, як це описано у випадку загрози викидня; дисфункційна маткова кровотеча - 20 мг/добу протягом 5-7 днів у поєднанні з естрогеном, ч/з кілька днів після закінчення такого лікування з'явиться кровотеча відміни, з метою профілактики подальшого виникнення кровотечі - дидрогестерон 10 мг /добу з 11-го по 25-й день циклу, у разі кістозної геморагічної метропатії - дидрогестерон 10 мг/добу з 11-го по 25-й день циклу; вторинна аменорея - естроген з 1-го по 25-й день циклу, з

11-го по 25-й день у поєднанні з дидрогестерон 10 мг/добу; попередження гіперплазії ендометрія у період менопаузи: протягом кожного 28-денного циклу терапії естрогенами приймати лише естроген протягом перших 14 днів, і протягом наступних 14 днів приймати 1 або 2 табл., що містять 10 мг дидрогестерону, додатково до терапії естрогенами, у разі дозування 10 мг дидрогестерону 2 р/добу прийом табл. розподілити протягом доби, кровотеча відміни зазвичай виникає під час застосування дидрогестерону.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: збільшення у розмірах прогестагензалежних новоутворень (менінгіоми), гемолітична анемія, депресивний настрій, р-ції гіперчутливості, головний біль і мігрень, запаморочення, сонливість, нудота, блювання, біль у животі, порушення функції печінки, що супроводжуються слабкістю або нездужанням, жовтяницею та болем у животі, алергічний дерматит (висипання, свербіж і кропив'янка), ангіоневротичний набряк, менструальні розлади (у т. ч. метрорагія, менорагія, оліго-/аменорея, дисменорея та нерегулярні менструації), біль у молочних залозах/чутливість молочних залоз, припухлість молочних залоз, набряки, збільшення маси тіла, рак молочної залози, гіперплазія та карцинома ендометрія, рак яєчників, венозна тромбоемболія; ІМ, ІХС, ішемічний інсульт, вагінальна кровотеча, мігрень.

Протипоказання до застосування ЛЗ: недіагностована вагінальна кровотеча; наявні серйозні захворювання печінки, або наявність серйозних захворювань печінки у минулому, якщо показники функції печінки не нормалізувалися; протипоказання для естрогенів у комбінації з прогестагенами, такими як дидрогестерон; встановлена гіперчутливість до активної речовини або до будь-якого іншого компонента препарату; встановлені або підозрювані прогестагензалежні новоутворення (менінгіома); лікування з метою підтримки лютеїнової фази при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) припинити, якщо діагностований аборт/викидень.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДУФАСТОН®	Абботт Біолоджікалз Б.В., Нідерланди	табл., вкриті п/о у бл.	10мг	№20, №14, №28	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Діногест (Dienogest) ****

Фармакотерапевтична група: АТХ G03DB08 - гормони статевих залоз та препарати, які застосовують при патології статевих органів. Прогестогени.

Основна фармакотерапевтична дія: похідне нортестостерону без андрогенної та з певною антиандрогенною активністю; зв'язується з рецепторами прогестерону у матці тільки з 10 % відносною афінністю, однак незважаючи на низьку афінність до рецепторів прогестерону, має сильний прогестогенний ефект *in vivo*; не проявляє значну андрогенну, мінералокортикоїдну або глюкокортикоїдну активність *in vivo*; впливає на ендометріоз, зменшуючи ендогенну продукцію естрадіолу і таким чином пригнічуючи трофічні ефекти естрадіолу на еутопічний та ектопічний ендометрій; при безперервному застосуванні призводить до створення гіпоестрогенного, гіпергестагенного ендокринного середовища, що спричиняє початкову децидуалізацію тканини ендометрія з подальшою атрофією ендометріюїдних вогнищ.

Показання для застосування ЛЗ: лікування ендометріозу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для р/ос застосування.; по 1 табл. щодня без перерви у застосуванні препарату приблизно в один і той же час, запиваючи невеликою кількістю рідини; табл. можна приймати незалежно від прийому їжі, застосовувати регулярно, незалежно від менструальної кровотечі, як тільки табл. з однієї упаковки закінчилися, починати приймати з наступної упаковки, не роблячи перерви у застосуванні; відсутній досвід лікування пацієнок з ендометріозом довше 15 міс.; прийом препарату можна розпочати у будь-який день менструального циклу; застосування будь-яких гормональних контрацептивів слід припинити перед початком терапії препаратом; якщо необхідна контрацепція, додатково застосовувати негормональний метод запобігання вагітності (бар'єрний метод); у випадку пропуску прийому табл., блювання та/або діареї (які мали місце протягом 3-4 год після прийому табл.), ефективність препарату може зменшитися; у разі пропуску прийому однієї або кількох табл. 1 табл. прийняти, як тільки жінка згадає про це, а наступну приймати у звичайний час, аналогічно, табл., що не всмокталася через блювання або діарею, замінити на іншу табл.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анемія, підвищення маси тіла, зниження маси тіла, підвищений апетит, пригнічений настрій, порушення сну, нервозність, зниження лібідо, зміни настрою, занепокоєння, депресія, лабільність настрою, головний біль, мігрень, порушення вегетативної регуляції, порушення уваги, сухість очей, дзвін у вухах, неспецифічні циркуляторні розлади, посилене серцебиття, АГ, диспное, нудота, біль у животі, метеоризм, здуття живота, блювання, діарея, запор, дискомфорт у черевній порожнині, запалення ШКТ, гінгівіт, акне, алопеція, сухість шкіри, гіпергідроз, свербіж, гірсутизм, оніхоклазія, лупа, дерматит, порушення росту волосся, р-ції фоточутливості, зміни пігментації, біль у спині, біль у кістках, м'язові судоми, біль у кінцівках, відчуття тяжкості у кінцівках, інфекція сечовивідних шляхів, дискомфорт у молочних залозах, кіста яєчників, припливи, маткові/ вагінальні кровотечі, в т.ч. кровомазання, вагінальний кандидоз, сухість вульви та піхви, виділення зі статевих органів, біль у ділянці малого таза, атрофічний вульвовагініт, збільшення молочних залоз, кістозно-фіброзні захворювання молочних залоз, нагрубання молочних залоз, астеничні стани, дратівливість, набряк.

Протипоказання до застосування ЛЗ: венозна тромбоемболія в активній формі; артеріальні або кардіоваскулярні захворювання нині або в анамнезі (ІМ, цереброваскулярна подія, ІХС); ЦД з ураженням судин; тяжкі захворювання печінки нині або їх наявність в анамнезі, поки показники функції печінки не повернуться до норми; пухлини печінки нині або в анамнезі (доброякісні або злоякісні); відомі або підозрювані злоякісні пухлини, залежні від статевих гормонів; вагінальна кровотеча нез'ясованої етіології; підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого з компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 2 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.

II.	ВІЗАН	Байер Ваймар ГмБХ і Ко. КГ, Німеччина	табл. у бл.	2мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДІЄНОГЕСТ АЛВОГЕН	Хаупт Фарма Мюнстер ГмБХ, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	2мг	№14x2, №14x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДІЄНОФАМ	Лабораторіос Леон Фарма, С.А. (контроль якості, виробництво готового продукту, пакування, випуск серії)/ЛАБОРАТОРІО ДР. Ф. ЕЧАВАРНЕ, АНАЛІСІС, С.А. (мікробіологічний контроль)/ТОВ "Манантіал Інтегра" (альтернативна ділянка для вторинного пакування), Іспанія/Іспанія/Іспанія	табл. у бл.	2мг	№28x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МІТРЕН	ЛАБОРАТОРІОС ЛЕОН ФАРМА С.А. (Вир-во, контроль якості, первинне та вторинне пакування, відповідальний за випуск серії)/ МАНАНТІАЛЬ ІНТЕГРА, С.Л.У. (Вторинне пакування)/ ЛАБОРАТОРІО ЕЧЕВАРНЕ, С.А. (Контроль якості), Іспанія	табл. у бл.	2мг	№28x1	14,64	
	МОДЕЛЛЬ ЕНДО	Лабораторіос Леон Фарма, С.А. (Вир-во за повним циклом)/ Лабораторіо Ечеварне, С.А. (Контроль серії (тільки випробування мікробіологічної чистоти))/ Манантіаль Інтегра, С.Л.У. (Вторинне пакування), Іспанія	табл. у бл.	2мг	№28x1, №28x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	

11.6.3.3. Похідні естрену

- **Норетистерон (Norethisterone)**

Фармакотерапевтична група: G03DC02 - гормони статевих залоз та препарати, що застосовуються при патології статевої сфери. Гестагени.

Основна фармакотерапевтична дія: це прогестаген; у жінок, чутливих до дії естрогенів, при курсовому р/ос прийомі 100-150 мг протягом одного менструального циклу можна досягти суцільної зміни ендометрія, тобто від проліферативного до секреторного стану; секреція гонадотропінів та ановуляція інгібуються при щоденному прийомі 0,5 мг; є пірогенною речовиною й впливає на базову t° тіла.

Показання для застосування ЛЗ: вторинна аменорея та ендометріоз^{БНФ, ВООЗ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для попередження вагітності необхідності застосовувати негормональні методи контрацепції (бар'єрні); вторинна аменорея: гормональне лікування вторинної аменореї проводити тільки після виключення вагітності; перед початком лікування вторинної аменореї виключити наявність пухлини гіпофіза, що виділяє пролактин, не можна виключити, що макроаденоми збільшуються в розмірах під дією високих доз естрогенів протягом тривалого періоду часу; спочатку протягом 14 днів застосовувати естроген, а потім норетистерон по 1-2 табл./добу протягом 10 днів; при досягненні достатнього вироблення естрогенів організмом можна припинити лікування естрогенами та викликати циклічну кровотечу шляхом застосування 1 табл. 2р/добу з 16 по 25-ий день циклу; ендометріоз^{ВООЗ, БНФ}: лікування розпочинають між 1-м і 5-м днем циклу з прийому по 1 табл. 2р/добу^{ВООЗ, БНФ}; у випадку виникнення кровомазання підвищити дозу до 2р/добу по 2 табл.^{БНФ}; після припинення кровотечі можна зменшити дозу до початкової; тривалість курсу лікування становить не < ніж 4 - 6 міс.^{БНФ}; при безперервному щоденному застосуванні препарату овуляція і менструація зазвичай відсутні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості; головний біль, мігрень; зорові порушення; задишка; нудота; кропив'янка, висипання; маткові/вагінальні кровотечі, в т.ч. кровомазання, неінтенсивна менструація (гіпоменорея), аменорея; набряк; тромбоемболія; пухлини печінки, які призводять до внутрішньочеревних кровотеч; хлоазма; збільшення частоти незвично сильної мігрені; раптові розлади сприйняття; перші ознаки тромбозу чи симптоми тромбоемболії; відчуття болю й стиснення в грудній клітці; поява жовтяниці, розвиток гепатиту, свербіж шкіри, суттєве підвищення АТ; запаморочення, посилення депресії, біль у животі, холестаза; холестатичні порушення печінки.

Протипоказання до застосування ЛЗ: вагітність або підозра на неї; годування груддю; венозні або артеріальні тромботичні/тромбоемболічні явища (ІМ, інсульт, транзиторна ішемічна атака, тромбоз глибоких вен, легенева тромбоемболія) нині або в анамнезі; наявність на даний час або в анамнезі передвісників тромбозу (транзиторна ішемічна атака, стенокардія); наявність факторів високого ризику артеріального тромбозу; ЦД із судинними ускладненнями; тяжкі захворювання печінки нині або в минулому, доки показники функції печінки не повернуться до нормальних значень; с-м Дубіна-Джонсона, с-м Ротора, жовтяниця чи випадки вираженого шкірного свербіжу впродовж попередніх вагітностей; попередні випадки пемфігоїду вагітних (герпес вагітних); доброякісні або злоякісні пухлини печінки в даний час чи в минулому; злоякісні пухлини, що є залежними від впливу статевих гормонів, або підозра щодо їх наявності; підвищена чутливість до норетистерону або до будь-якого з допоміжних компонентів препарату; мігрень із вогнищевими неврологічними симптомами в анамнезі; в анамнезі під час вагітності ідіопатична жовтяниця або сильний свербіж; вагінальна кровотеча невідомої етіології; нелікована гіперплазія ендометрію; застосування противірусних препаратів прямої дії, що містять омбітасвір, паритапревір, або дасабувір, або їх комбінації.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	НОРКОЛУТ®	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл. у бл.	5мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПРИМОЛЮТ-НОР	Байєр Ваймар ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина	табл. у бл.	5мг	№15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Лінестренол (Lynestrenol)**

Фармакотерапевтична група: G03DC03 - гормони статевих залоз і препарати, що застосовуються при патології статевої сфери. Похідні естрену.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний прогестаген, який має фармакологічні характеристики натурального гормону прогестерону; чинить виражену прогестагенну дію на ендометрій; при безперервному застосуванні препарату пригнічується як овуляція, так і менструація; можна застосовувати при станах, лікування яких вимагає застосування засобів з вираженою прогестагенною дією.

Показання для застосування ЛЗ: поліменорея; менорагія та метрорагія; окремі випадки первинної або вторинної аменореї та олігоменореї з недостатніми рівнями ендogenousного естрогену; ендометріоз; доброякісні пухлини молочних залоз; окремі випадки карциноми ендометрія; пригнічення овуляції, біль при овуляції та менструації; для затримки нормальної менструації; як доповнення до терапії естрогенами в період пери- та постменопаузи - з метою попередження гіперплазії ендометрія.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: поліменорея - по 1 табл.(5 мг)/добу з 14-го по 25-й дні циклу; менорагія та метрорагія - по 2 табл.(10мг)/добу 10 днів, у більшості випадків кровотеча припиняється ч/з декілька днів після початку лікування, лікування повторювати протягом 3-х менструальних циклів, приймаючи по 1 табл.(5мг)/добу з 14-го по 25-й день кожного циклу, якщо скарги не зникають протягом лікування або після його закінчення, провести подальше обстеження пацієнтки; окремі випадки первинної або вторинної аменореї та олігоменореї з недостатніми рівнями ендogenousного естрогену - розпочинати із застосування естрогену, по 0,02-0,05 мг етинілестрадіолу/добу 25 днів, разом із цим 1 табл.(5мг) лінестренолу приймати щодня з 14-го по 25-й день циклу, у більшості випадків кровотеча відміни починається протягом 3 днів після припинення лікування, лікування естрогеном поновити на 5-й день кровотечі відміни і продовжити до 25-го дня циклу, далі знову з 14-го по 25-й день циклу застосовувати по 1 табл.(5мг) лінестренолу, таке лікування повторити протягом як мінімум ще одного циклу; ендометріоз - по 1-2 табл.(5-10мг)/добу протягом як мінімум 6 міс; доброякісні пухлини молочних залоз - по 1 табл.(5мг)/добу щоденно з 14-го по 25-й день циклу протягом як мінімум 3-4 міс; окремі випадки карциноми ендометрія - по 6-10 табл.(30-50мг)/добу протягом тривалого періоду часу; пригнічення овуляції, біль при овуляції та менструації - по 1 табл.(5мг)/добу найкраще починати в 1-й день циклу, але не пізніше, ніж на 5-й день циклу, лікування продовжувати протягом багатьох міс. (приймаючи препарат щодня, без днів пропуску), якщо, незважаючи на лікування, виникає кровотеча прориву, дозу препарату підвищити до 2(10мг) або 3 табл.(15мг)/добу протягом 3-5 днів; для затримки нормальної менструації - по 1 табл.(5мг)/добу починати за 2 тижні до очікуваного початку менструації, якщо курс лікування починати < ніж за 1 тижд. до очікуваного початку менструації, то доза повинна становити 2-3 табл.(10-15мг)/ добу, у цьому випадку затримка > ніж на 1 тижд. небажана, якщо курс лікування розпочати пізніше, підвищується можливість проривної кровотечі, лікування не починати пізніше, ніж за 3 дні до очікуваного початку менструації; як доповнення до терапії естрогенами в період пери- та постменопаузи - з метою попередження гіперплазії ендометрію - по 1 табл./добу протягом 12-15 днів/міс. (протягом перших 2-х тижн. кожного календарного місяця), естрогенний препарат приймати щодня, без днів пропуску, в мінімальній ефективній дозі.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: збільшення маси тіла; затримка рідини, посилене потовиділення, зниження переносимості глюкози та зміни профілю ліпопротеїнів; головний біль, мігрень, запаморочення, нервовість, депресивний настрій; нудота, блювання, абдомінальний біль, діарея, запор; патологічні показники функції печінки, жовтяниця; хлоазма, акне, себорея, гіперчутливість, висипання, кропив'янка, гірсутизм, свербіж; метрорагії; зміна лібідо (як посилення, так і послаблення); болючість молочних залоз; аменорея; зміни вагінальної та цервікальної секреції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин, що входять до складу препарату; період вагітності або її імовірність; тяжкі форми захворювання печінки, холестатична жовтяниця або гепатит (чи тяжке захворювання печінки в анамнезі при відсутності нормалізації патологічно змінених показників функціональних проб печінки), гепатоцелюлярні пухлини, с-м Ротора і с-м Дубіна-Джонсона; вагінальна кровотеча невстановленої етіології; стани, на які впливає прийом статевих стероїдних гормонів та які вперше виникли або погіршувалися у період вагітності або в ході лікування статевими стероїдними гормонами, сильний свербіж, холестатична жовтяниця, герпес у вагітних, порфірія та отосклероз; венозні тромбоемболічні порушення в активній фазі.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ОРГАМЕТРИЛ®	Н.В. Органон (за повним циклом), Нідерланди	табл. у бл.	5мг	№30x1	18,89	25,94/\$

• **Тиболон (Tibolone) ****

Фармакотерапевтична група: G03CX01 - гормони статевих залоз та засоби, що використовуються при патології статевої сфери. Естрогени.

Основна фармакотерапевтична дія: після р/ос прийому тиболон швидко метаболізується в 3 компоненти, що впливають на фармакодинаміку; два метаболіти (3 α -ОН-тиболон та 3 β -ОН-тиболон) виконують естрогеноподібну активність, тоді як третій метаболіт (Д4-ізомер тиболону) виявляє прогестагеноподібну та андрогеноподібну

активність, тиболон заміщує втрату при зниженні продукування естрогену у жінок в період постменопаузи та полегшує симптоми, викликані менопаузою.

Показання для застосування ЛЗ: лікування симптомів дефіциту естрогену^{БНФ} у жінок у постменопаузі, якщо менопауза настала більш ніж 1 рік тому; рішення про призначення тиболону має базуватись на оцінці індивідуальних чинників ризику; для пацієнтів віком від 60 років, брати до уваги ризик виникнення інсульту.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза - 1 табл./добу (2,5 мг/добу)^{БНФ}; необхідності в корекції дози для пацієток літнього віку немає; табл. необхідно приймати, запиваючи невеликою кількістю води або іншими напоями, бажано в один і той же час дня; для початку та продовження лікування при симптомах постменопаузи необхідно застосовувати найменшу ефективну дозу впродовж найкоротшого періоду часу; при лікуванні не застосовувати окремо прогестагени; жінкам із природною менопаузою рекомендується починати лікування препаратом не раніше як через 12 міс після останньої природної кровотечі; в разі менопаузи, що настала після хірургічного втручання, лікування препаратом можна розпочинати негайно; перед початком прийому препарату причину будь-якої нерегулярної/позапланової вагінальної кровотечі, як при застосуванні гормонозамісної терапії (ГЗТ), так і без неї, потрібно визначити для виключення злякисного новоутворення; при переході з послідовного режиму застосування ГЗТ застосування препарату починати наступного дня після завершення попереднього режиму; якщо перехід відбувається з безперервного режиму застосування комбінованого препарату ГЗТ, то лікування препаратом можна розпочинати у будь-який час; пропущену дозу необхідно прийняти відразу ж, як тільки пацієнт про неї згадає, якщо затримка становить не > 12 год, якщо затримка у прийомі становить > ніж 12 год, наступну дозу приймають у звичайний для цього час; пропуск дози може збільшити вірогідність проривної кровотечі або кров'янистих виділень.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль у нижній частині живота, патологічний ріст волосся, акне, вагінальні виділення, біль у молочних залозах, потовщення стінок ендометрія, постменопаузальна кровотеча, відчуття дискомфорту в молочних залозах, свербіж статевих органів, вагінальний кандидоз, вагінальна кровотеча, біль в ділянці таза, дисплазія шийки матки, вульвовагініт, грибова інфекція, вагінальний мікоз, біль у сосках, запаморочення, висипання, себорейний дерматоз, свербіж, розлади ШКТ, набряки, головний біль, мігрень, порушення зору (включаючи нечіткість зору), депресія, вплив на скелетно-м'язову систему, наприклад артралгія або міальгія, та зміни показників функцій печінки, рак ендометрія; венозні тромбоемболії (тромбоз глибоких вен ніг або тазових вен), а також емболія легеневої артерії; ІМ; захворювання жовчного міхура; захворювання шкіри та підшкірної клітковини (хлоазма, мультиформна еритема, нодозна еритема, судинна пурпура); деменція.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активної речовини або до будь-якої з допоміжних речовин; вагітність та годування груддю; підозра на рак молочної залози, його наявність в даний час або в анамнезі (підвищення ризику рецидиву раку молочної залози); підозрювані або наявні естрогенозалежні пухлини (рак ендометрія); вагінальна кровотеча нез'ясованої етіології; нелікована гіперплазія ендометрія; венозна тромбоемболія в анамнезі або в даний час (тромбоз глибоких вен, емболія легеневих судин); відомі тромбофілічні розлади (дефіцит білка С, білка S або антитромбіну); артеріальні тромбоемболічні захворювання в анамнезі (стенокардія, ІМ, інсульт або транзиторне ішемічне порушення мозкового кровообігу); г. захворювання печінки або захворювання печінки в анамнезі, до нормалізації показників печінкових проб; порфірія.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 2,5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕСПА-ТИБОЛ	Ліндофарм ГмбХ, Німеччина	табл. у бл.	2,5мг	№28x1	17,86	29,56/€

11.6.4. Гонадотропіни та інші стимулятори

11.6.4.1. Гонадотропні гормони

- **Хоріонічний гонадотропін (Chorionic gonadotrophin)**

Фармакотерапевтична група: G03GA01 - гонадотропіни та інші стимулятори овуляції. Гонадотропні гормони.

Основна фармакотерапевтична дія: людський хоріонічний гонадотропін (ЛХГ) з активністю лютеїнізуючого гормону (ЛГ), що є необхідним для росту і дозрівання гамет у чоловіків та жінок, а також для продукування статевих стероїдних гормонів; жінкам застосовувати в якості замітника викиду ендогенного лютеїнізуючого гормону (ЛГ) в середині циклу, щоб індукувати завершальну фазу дозрівання фолікулів, що призводить до овуляції; можна застосовувати як замітник ендогенного ЛГ під час лютеїнової фази; чоловікам застосовувати для стимуляції клітин Лейдига для прискорення процесу утворення тестостерону.

Показання для застосування ЛЗ: жінки: стимуляція овуляції при безплідді^{БНФ} зумовленому ановуляцією або порушенням визрівання фолікулів; підготовка фолікулів до пункції у програмах контрольованої стимуляції яєчників (у медичних програмах допоміжної репродукції)^{БНФ}; підтримка лютеїнової фази при проведенні контрольованої гіперстимуляції яєчників (у програмі допоміжної репродукції) із застосуванням аналогів гонадотропін-рилізінг гормону або інших засобів для стимуляції овуляції при жіночому безплідді^{БНФ}, зумовленому ановуляцією при відсутності активності ендогенного естрогену (I група недостатності яєчників по класифікації ВООЗ); чоловіки: гіпогонадотропний гіпогонадизм; безпліддя, пов'язане з ідіопатичною диспермією; хлопчики: затримка статевого дозрівання, пов'язана з недостатньою продукцією гонадотропіну гіпофізом; крипторхізм, не пов'язаний з анатомічною обструкцією.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: жінки: індукація овуляції при безплідді та підготовка фолікулів до пункції: зазвичай 1 ін'єкція становить 5000-10000 МО після лікування фолікулостимулюючим гормоном (ФСГ) або людським менопаузальним гонадотропіном (ЛМГ); підготовка фолікулів до пункції у програмах контрольованої стимуляції яєчників - 1 ін'єкція у дозі від 5000 до 10000 МО після лікування ФСГ або ЛМГ, підтримка лютеїнової фази: 2-3 ін'єкції по 1000-3000 МО кожна протягом 9 днів після овуляції або пересадки ембріона (наприклад, у 3-й, 6-й та 9-й дні після стимульованої овуляції); чоловіки: гіпогонадотропний гіпогонадизм та ідіопатична диспермія: по 1000-2000 МО 2-3 р/тижд., у разі безпліддя внаслідок диспермії можливе поєднання препарату (2-3 р/тижд.) із препаратом, що містить ФСГ, покращення сперматогенезу можна очікувати після проведення терапії протягом

щонайменше 3 міс, під час лікування припинити тестостерон-замісну терапію, іноді для закріплення покращення стану достатньо введення людського хоріонічного гонадотропіну (ЛХГ); хлопчики: затримка статевого дозрівання, пов'язана з недостатнім продукуванням гонадотропіну гіпофізом - 1500 МО 2-3 р/тижд. не < 6 міс; крипторхізм, не пов'язаний з анатомічною обструкцією - до 2 років: 250 МО 2 р/тижд. 6 тижнів; до 6 років: 500-1000 МО 2 р/тижд. 6 тижнів; старше 6 років: 1500 МО 2 р/тижд. 6 тижнів, при необхідності лікування можна повторити.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: генералізовані р-ції гіперчутливості (генералізоване висипання або пропасниця); АР в місці ін'єкції; місцеві р-ції в місці ін'єкції (синець, біль, почервоніння, припухлість, свербіж); жінки тромбоемболізм, асоційований із лікуванням ФСГ/ЛХГ, при тяжкій формі с-му гіперстимуляції яєчників; гідроторакс як ознака тяжкої форми с-му гіперстимуляції яєчників; абдомінальні та шлункові порушення (нудота, діарея) як ознака с-му гіперстимуляції яєчників середньої тяжкості; асцит як ускладнення тяжкої форми с-му гіперстимуляції яєчників; небажана гіперстимуляція яєчників, легка та тяжка форми с-му гіперстимуляції яєчників; СГЯ легкої форми тяжкості: болісні відчуття у молочних залозах, збільшення яєчників (від легкого до помірного), кіста яєчника, біль у животі, дискомфорт у животі, симптоми з боку ШКТ (нудота, діарея, метеоризм); СГЯ тяжкої форми тяжкості: великі кісти яєчників (схильні до розриву), г.абдомінальний біль, асцит, збільшенням маси тіла, гідроторакс, тромбоемболічні ускладнення внаслідок застосування ФСГ/ЛХГ; збільшення маси тіла як ознака тяжкої форми с-му гіперстимуляції яєчників; у чоловіків: спостерігалися затримка води та натрію в організмі після застосування препарату у високих дозах (вважається результатом надмірного продукування андрогенів); лікування ЛХГ може призводити до гінекомастії.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до гонадотропінів людини або до будь-якого з компонентів препарату, діагностовані або підозрювані пухлини яєчників, молочних залоз, матки, тестикулів, простати, гіпофізу або гіпоталамуса, вроджена патологія репродуктивних органів, при якій протипоказана вагітність, фіброїдна пухлина матки, при якій протипоказана вагітність, патологічна (не менструальна) вагінальна кровотеча без встановленої/діагностованої етіології.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ПРЕГНІЛ®	Н.В. Органон (вир-во за повн. цикл. (пор. для р-ну д/ін'єкц.), втор. пак. та випуск серії (р-ник (р-н натрію хлориду 0,9 %))/ Джубілант ХоллістерСтаєр ЛЛС (вир-во, контроль якості та випуск серії, пакування (р-ник in, Нідерланди/ США	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	1500МО, 5000МО	№3, №1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Менопаузальний гонадотропін людини (Human menopausal gonadotrophin)**

Фармакотерапевтична група: G03GA02 - гонадотропіни та інші стимулятори овуляції. Людський менопаузальний гонадотропін.

Основна фармакотерапевтична дія: містить менотропін (лМГ), який складається з фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) і лютеїнізуючого гормону (ЛГ), присутній людський хоріонічний гонадотропін (лХГ), гормон, який виділяють з постменопаузальної сечі та який сприяє активності ЛГ; менотропін, що має активність ФСГ та ЛГ, індукує фолікулярний ріст і розвиток, а також гонадну секрецію стероїдів у жінок, які не страждають на первинну недостатність яєчників, спочатку ФСГ запускає відновлення фолікулярного росту на стадії раннього фолікулогенезу, тоді як ЛГ є важливим для оваріального стероїдогенезу та бере участь у фізіологічних процесах, що призводять до розвитку відповідного передовуляторного фолікула, фолікулярний ріст можна стимулювати ФСГ при повній відсутності ЛГ, але отримані фолікули розвиваються аномально, крім того, така стимуляція супроводжується низькими рівнями естрадіолу, що призводить до недостатньої лютеїнізації.

Показання для застосування ЛЗ: жіноче безпліддя, зумовлене ановуляцією (включаючи с-м полікістозних яєчників (СПКЯ) у жінок, що не піддається лікуванню кломіфену цитратом), ^{БНФ} при контрольованій гіперстимуляції яєчників для індукції множинного утворення фолікулів у рамках проведення допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) (включаючи запліднення in vitro/ембріональне перенесення, внутрішньотрубно перенесення гамет (ВПГ) та інтрацитоплазматичну ін'єкцію сперматозоїдів (ІЦІС)), стимуляція дозрівання фолікул при безплідді жінок, проведення допоміжних репродуктивних технологій (ART), наприклад, IVF (запліднення in vitro), GIFT (перенесення гамет у маткові труби) для настання запліднення (стимуляція множинних фолікулів), стимуляція фолікулярного росту у жінок з гіпогонадотропним гіпогонадізмом.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування починати під наглядом лікаря, який має досвід лікування безпліддя; препарат застосовують п/ш або в/м ^{БНФ}, вводять після розчинення у розчиннику, що міститься в упаковці препарату; при розчиненні уникати інтенсивного струшування; р-н не можна використовувати, якщо він непрозорий або містить частинки; ановуляція (включаючи СПКЯ): мета терапії - розвиток одного Граафова фолікула, з якого після введення людського хоріонічного гонадотропіну (лХГ) вивільняється овоцит; терапію починати протягом перших 7 днів менструального циклу; рекомендована щоденна початкова доза - від 75 до 150 МО; подальший режим лікування - індивідуально відповідно до р-ції яєчників та на підставі результатів клінічного контролю (який включає УЗД у поєднанні з визначенням рівнів естрадіолу); дозу препарату не змінювати частіше ніж ч/з 7-денні інтервали; рекомендоване покровоке збільшення дози -37,5 МО, при цьому воно не має перевищувати 75 МО; МДД не має перевищувати 225 МО; у випадку неналежної р-ції пацієнтки після 4 тижн. лікування терапевтичний цикл припинити і розпочати новий цикл з вищої дози, порівняно з тією, яка застосовувалась у попередньому циклі; при досягненні оптимальної р-ції - ч/з 1 день після останньої ін'єкції зробити разову ін'єкцію лХГ у дозі від 5000 до 10000 МО; у день введення лХГ і наступного дня рекомендується здійснювати статеві контакти; альтернативно - в/маткове запліднення (IU); якщо спостерігається надмірна р-ція на застосування, курс лікування припинити та відмінити введення лХГ; контрольована гіперстимуляція яєчників з

метою індукції розвитку множинних фолікулів в рамках проведення допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ): у протоколі, що передбачає застосування даун-регуляції шляхом введення агоніста гонадотропін-рилізінг-гормону (ГнРГ), терапію розпочинати приблизно ч/з 2 тижні після початку лікування агоністом, початкова доза препарату в перші 5 дні - 150-225 МО/добу; одноразове підвищення дози не має перевищувати 150 МО, МДД не повинна перевищувати 450 МО, у більшості випадків лікування проводити не довше 20 днів, після досягнення оптимального стимулювання необхідно ввести 1 ін'єкцію ЛХГ у дозі 5000-10000 МО з метою завершення дозрівання фолікула та підготовки до вивільнення овоцита, якщо спостерігається надмірна реакція на застосування препарату, курс лікування припинити та не вводити ЛХГ.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: порушення зору, абдомінальний біль, здуття живота, нудота; блювання, абдомінальний дискомфорт, діарея, р-ції у місці ін'єкції; втома; гарячка, нездужання, р-ції гіперчутливості, збільшення маси тіла, скелетно-м'язовий біль (артралгія, біль у спині, біль у шиї і біль у кінцівках, головний біль), запаморочення, СГСЯ, біль у ділянці таза (біль у ділянці яєчників і придатків матки); кіста яєчників, скарги на порушення з боку молочних залоз (біль, чутливість, дискомфорт, набряк молочних залоз і болісність сосків); перекручування яєчника, акне, висип; свербіж, кропив'янка, припливи; тромбоемболія, тимчасовий амавроз, диплопія, мідріаз, скотома, фотопсія, плаваючі помутніння склистого тіла, помутніння зору, біль у місці ін'єкції, локалізовані або генералізовані АР, включаючи анафілактичні р-ції, поряд з відповідною симптоматикою

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до допоміжних речовин препарату; пухлини гіпофіза або гіпоталамуса; карциноми яєчника, матки або молочних залоз; гінекологічні кровотечі невстановленої етіології; з передчасною менопаузою; кісти яєчника або збільшені яєчники, що не пов'язано із с-мом полікістозних яєчників (СПКЯ); період вагітності або годування груддю, первинна недостатність яєчників; при вроджених вадах розвитку статевих органів, несумісних з вагітністю; при фіброїдних пухлинах матки, несумісних з вагітністю.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 75 МО

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	МЕНОГОН	Феррінг ГмбХ (відповідальний за вир-во, первинне пакування та випуск серії)/ Феррінг-Лечива, а.с. (відповідальний за вторинне пакування)/ Хаупт Фарма Вюльфінг ГмбХ (відповідальний за вир-во розчинника)/ Зентіва к.с. (відповідальний за вир-во р, Німеччина/Чеська Республіка	пор. д/р-ну д/ін'єк. у амп. з розч.	75 МО	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МЕНОПУР	Феррінг ГмбХ (вир-к готового продукту)/ Феррінг-Лечива, а.с. (втор. пак.), Німеччина/ Чеська Республіка	пор. ліоф. д/приг. р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	75 МО	№10	424,50	32,91/€
	МЕНОПУР	Феррінг ГмбХ (відповідальний за вир-во порошку та розчинника, контроль якості та випуск серії)/ Феррінг Інтернешнл Сентер СА (відповідальний за вторинне пакування), Німеччина/Швейцарія	пор. ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	600МО, 1200МО	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МЕРІОНАЛ	ІБСА Інститут Біохімік С.А., Швейцарія	пор. ліоф. д/приг. р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	75МО, 150МО	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ХУМОГ - 75 В.О.	Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед, Індія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	75 МО	№1	270,43	27,04/\$

● **Урофолітропін (Urofollitropin)**

Фармакотерапевтична група: G03GA04 - гонадотропіни та інші стимулятори овуляції. Гонадотропні гормони.

Основна фармакотерапевтична дія: є високоочищеним препаратом сечового фолікулостимулюючого гормону (ФСГ), виділеного з сечі жінок у період постменопаузи; ФСГ стимулює зростання і розвиток фолікулів, а також продукування гонадотропних стероїдів у жінок, які не страждають на первинну дисфункцію яєчників; стимулює ріст і дозрівання фолікулів яєчника, підвищує рівень естрогенів, стимулює проліферацію ендометрія; не чинить лютеїнізуючої дії; згідно з даними клінічних випробувань, фармакодинамічні ефекти урофолітропіну не відрізняються від ефектів рекомбінантного ФСГ при такому ж способі введення; після п/ш введення урофолітропін спричиняє таку ж р-цію з боку фолікулів, утворення таких же пікових концентрацій естрадіолу і кількість дозріваючих і зрілих овоцитів, як і при застосуванні рекомбінантного ФСГ без відмінностей у сумарній дозі і тривалості лікування; застосування урофолітропіну зазвичай розпочинають після застосування хоріонічного гонадотропного гормону (ХГГ) для індукції кінцевого етапу дозрівання фолікула та овуляції.

Показання для застосування ЛЗ: жіноче безпліддя^{БНФ}, зумовлене ановуляцією (зокрема у результаті оваріального полікістозу яєчників) у жінок, які не піддаються лікуванню кломіфеном цитратом^{БНФ}, при контрольованій гіперстимуляції яєчників для індукції множинного утворення фолікулів при проведенні

медикаментозних програм з лікування безпліддя (включаючи запліднення in vitro/ембріональне перенесення, внутрішньотрубне перенесення гамет (ВПГ) та інтрацитоплазматичну ін'єкцію сперматозоїдів (ІЦІС).^{БНФ}
, безпліддя у чоловіків, пов'язане з порушенням сперматогенезу на фоні гіпо- та нормогонадизму.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводиться в/м або п/ш^{БНФ}. дози підбирати індивідуально, залежно від реакції яєчників на лікування, це вимагає контролю функції яєчників або тільки за допомогою ультразвукового методу, або у поєднанні з лабораторним контролем рівня естрадіолу, можна застосовувати як окремо, так і в комбінації з гонадотропним рилізінг-фактором; рекомендоване дозування і тривалість лікування може лікар змінювати залежно від індивідуалізованої схеми лікування; ановуляція: рекомендована початкова доза - 75 МО/добу в 7 днів, дозу можна регулювати не частіше одного разу в 7 днів, рекомендоване одноразове підвищення дози - 37,5 МО і не повинно перевищувати 75 МО, МДД не має перевищувати 225 МО, у разі відсутності результату протягом 4 тижнів курс лікування припинити, після досягнення оптимального результату лікар або медсестра мають ввести разову дозу ХГГ у кількості від 5000 до 10000 МО наступного дня після останньої введеної дози, у день введення ХГГ і наступного дня рекомендується здійснювати статеві контакти, альтернативним способом є проведення штучного внутрішньоматкового запліднення. За станом пацієток необхідно ретельно спостерігати щонайменше протягом 2 тижнів після введення ХГГ, у разі підвищеної реакції лікування припинити, а пацієнткам утриматися від статевих контактів або використовувати бар'єрні методи контрацепції до початку наступного місячного циклу; контрольована гіперстимуляція яєчників для індукції розвитку фолікулів у рамках застосування допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ): розпочати приблизно ч/з 2 тижні після початку лікування агоністом, початкова доза - 150-225 МО/добу упродовж мінімум перших 5 днів лікування, подальше дозування індивідуалізувати, але не перевищувати 150 МО на кожне регулювання дози, МДД не має перевищувати 450 МО і тривалість лікування упродовж більше 12 днів не рекомендується. У схемах, що не передбачають зниження регуляції (down regulation) - лікування розпочинати на 2-й-3-й день менструального циклу, величина і режим дозування такі ж, як запропоновані для вищезгаданих протоколів із застосуванням агоністів ХГГ для зниження регуляції, досягши оптимальної р-ції організму, пацієнткам ввести разову дозу до 10000 МО ХГГ для індукції остаточного дозрівання фолікула і підготовки до виходу овоцита, пацієнтки мають перебувати під ретельним наглядом щонайменше протягом 2-х тижнів після введення ХГГ.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ІСШ, назофарингіт; нудота, блювання, біль у животі, запор, діарея, метеоризм; головний біль, запаморочення, летаргія; лабільність настрою; припливи; помірне збільшення яєчників, утворення кіст яєчників, ущільнення молочних залоз, гіпертрофія та біль у молочних залозах, припливи; можливий с-м гіперстимуляції яєчників (проявляється головним чином у пацієток з с-мом полікістозних яєчників), що виявляється такими симптомами: біль у нижній ділянці живота, нудота, діарея, незначне збільшення яєчників, розвиток кіст яєчників; виникнення великих кіст, асцит, гідротораксу, а також тяжкі тромбоемболічні ускладнення; м'язові спазми, збільшення маси тіла; підвищення ризику позаматкової і багатоплідної вагітності; викидень, вагінальна кровотеча, вагінальні виділення, перекручування яєчника; у чоловіків: гінекомастія, акне, збільшення маси тіла; гіпертиреозидизм; диспное, носова кровотеча; артралгія, м'язові спазми; сухість шкіри, випадання волосся; р-ції у місці ін'єкції препарату, включаючи біль, почервоніння, набряк, висип, свербіж, подразнення, гематома; гарячка, озноб, кропив'янка, можливі алергічні місцеві та загальні р-ції з боку шкіри та р-ції гіперчутливості уповільненого типу при застосуванні препаратів гонадотропінів; артеріальна тромбоемболія, периферична або мозкова венозна оклюзія (наприклад легенева емболія, аоплексія, емболія периферичних артерій), міалгія, артралгія, загальна слабкість, в'ялість, цистит, ризик інфекційної передачі; пролонгація тривалості кровотечі.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до фолікулостимулюючого гормону або до інших компонентів препарату; високий рівень фолікулостимулюючого гормону при первинній яєчкової недостатності; збільшення яєчників або наявність кіст (за винятком с-му полікістозних яєчників); кровотечі неясної етіології; рак яєчника, матки або молочної залози; пухлини гіпофіза та гіпоталамуса; патологія щитовидної залози та надниркових залоз у ст. декомпенсації; безпліддя, не пов'язане з порушенням функції яєчників, метрорагія; передчасна менопауза; безпліддя з порушенням розвитку нормального фолікула (наприклад при патології маткових труб або шийки матки), крім випадків участі у програмах допоміжних репродуктивних технологій; гіпергонадотропна недостатність яєчників; гіперпролактинемія; призначення ХГГ у разі підозри на с-м гіперстимуляції яєчників, тобто у разі простої фолікулярної стимуляції: рівень естрадіолу плазми ≥ 4 пмоль/мл (≥ 1100 пг/мл) та/або за наявності 3 або більше фолікулів діаметром ≥ 16 мм; у разі множинної фолікулярної стимуляції (програми допоміжних репродуктивних технологій): рівень естрадіолу плазми крові ≥ 11 пмоль/мл (≥ 3000 пг/мл) за наявності 20 фолікулів діаметром ≥ 12 мм; вагітність, період годування груддю; первинна яєчкова недостатність; первинна недостатність яєчок у чоловіків; патологія розвитку або враження статевих органів, не сумісні з вагітністю; фіброзні пухлини матки, несумісні з вагітністю; у період вагітності або годування груддю;

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ФОСТИМОН	ІБСА Інститут Біохімік С.А., Швейцарія	пор. ліоф. д/приг. р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	75МО, 150МО	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Фолітропін альфа (Follitropin alfa)**

Фармакотерапевтична група: G03GA05 - гонадотропіни. Фолітропін альфа.

Основна фармакотерапевтична дія: це препарат фолікулостимулюючого гормону (ФСГ), одержаний за допомогою методів генної інженерії з клітин яєчника китайського хом'яка; у жінок важливішим ефектом парентерального застосування ФСГ є розвиток дозрілих граафових фолікулів; у чоловіків з недостатністю ФСГ сумісне застосування з ЛХГ протягом щонайменше 4 міс призводить до індукування сперматогенезу.

Показання для застосування ЛЗ: ановуляція (включаючи с-м полікістозних яєчників - СПКЯ) у жінок, які виявилися нечутливими до лікування кломіфену цитратом^{БНФ}; стимуляція розвитку множинних фолікулів у

пацієнток при проведенні суперовуляції у рамках допоміжних репродуктивних технологій^{БНФ} (ДРТ), таких як запліднення in vitro (IVF)^{БНФ}, перенесення гамет до фаллопієвої труби (GIFT) і перенесення зиготи до фаллопієвої труби (ZIFT); стимуляція розвитку фолікулів у жінок із тяжкою недостатністю лютеїнізуючого гормону (ЛГ) та фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) (у комбінації з препаратом ЛГ); стимуляція сперматогенезу у чоловіків^{БНФ} з уродженим або набутим гіпогонадотропним гіпогонадизмом^{БНФ}, одночасно з терапією людським хоріонічним гонадотропіном (лХГ).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують для п/ш ін'єкцій^{БНФ}; жінкам з ановуляцією^{БНФ}, включаючи СПКЯ - у вигляді курсу щоденних ін'єкцій, у пацієнток з менструаціями лікування розпочинати впродовж перших 7 днів менструального циклу; дозування та схема введення залежать від індивідуальної р-ції, яку оцінюють шляхом призначають у вигляді курсу щоденних ін'єкцій^{БНФ}, у пацієнток з менструаціями лікування розпочинати впродовж перших 7 днів менструального циклу, зазвичай застосовуваний режим лікування розпочинається із введення 75 – 150 МО ФСГ щоденно, у разі необхідності для отримання адекватної, але не надмірної р-ції дозу збільшувати на 37,5 (краще) або на 75 МО з 7- або (краще) 14-денними інтервалами; лікування має бути адаптованим до індивідуальної р-ції пацієнтки, яка оцінюється за результатами УЗД розміру фолікула та/або визначення рівня секреції естрогенів, МДД не перевищує 225 МО ФСГ, якщо пацієнтка протягом 4 тижнів не реагує на лікування належним чином, цей лікувальний цикл припиняють, проводять додаткове обстеження пацієнтки і повторно розпочинають лікування з більшої, ніж у попередньому циклі, початкової дози препарату; коли досягнуто оптимальної р-ції, протягом 24 – 48 годин після останньої ін'єкції одноразово вводять 250 мкг рекомбінантного лХГ (р-лХГ) або 5000 – 10000 МО лХГ, пацієнтці рекомендується цього та наступного після введення лХГ дня мати статеві зносини, альтернативно можна провести внутрішньоматкове запліднення; стимуляція розвитку множинних фолікулів у жінок при проведенні суперовуляції у рамках ДРТ або запліднення in vitro^{БНФ} - введення 150 – 225 МО щоденно, починаючи з 2-го або 3-го дня циклу, лікування продовжують до досягнення адекватного фолікулярного розвитку, дозу підбирають відповідно до р-ції пацієнтки, але доза не повинна перевищувати 450 МО щоденно, загалом належний фолікулярний розвиток досягається у середньому на 10-й день лікування (у межах від 5 до 20 днів), для індукції остаточного дозрівання фолікулів через 24 – 48 год після останньої ін'єкції вводять разову ін'єкцію 250 мкг р-лХГ або 5000 – 10000 МО лХГ, для пригнічення різкого підйому рівня ендогенного ЛГ та контролю за тонічним рівнем ЛГ застосовують пригнічувальну регуляцію агоністами або антагоністами гонадотропін-релізінг-гормону (Гн-РГ), за звичайним протоколом лікування введення розпочинають приблизно ч/з 2 тижні після початку застосування агоніста і продовжують їх сумісне введення до досягнення належного фолікулярного розвитку; жінки з ановуляцією, спричиненою тяжкою недостатністю секреції ЛГ та ФСГ - режим лікування розпочинається із введення 75 МО лютропіну α одночасно з 75 – 150 МО ФСГ щоденно, лікування адаптувати до індивідуальної р-ції пацієнтки, що оцінюється за рівнем секреції естрогенів та даними УЗД розміру фолікула, якщо вважається за необхідне збільшення дози ФСГ, її змінювати з 7 – 14-денними інтервалами на 37,5 – 75 МО, у рамках одного циклу може бути прийнятним збільшення тривалості стимуляції до 5 тижнів, досягнуто оптимальної р-ції, протягом 24 – 48 год після останньої ін'єкції фолітропіну α та лютропіну α одноразово вводять 250 мкг р-лХГ або 5000 – 10000 МО лХГ, пацієнтці рекомендується цього та наступного після введення лХГ дня мати статеві зносини; чоловіки з гіпогонадотропним гіпогонадизмом^{БНФ} - доза 150 МО Зр/тижд. одночасно із введенням лХГ протягом щонайменше 4 міс.; якщо після закінчення цього курсу у пацієнта не спостерігатиметься р-ції, комбіноване лікування можна продовжити, сучасний клінічний досвід свідчить про те, що у разі необхідності для досягнення сперматогенезу лікування можна продовжувати протягом 18 місяців.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості від легкого до тяжкого ступеня, включаючи анафілактичні реакції та шок, головний біль, тромбоемболія, загострення або погіршення астми, абдомінальний біль, відчуття розтягнення та дискомфорту у черевній порожнині, нудота, блювання, діарея, кісти яєчників; СГСЯ від легкого до помірного ступеня тяжкості, тяжкий СГСЯ, ускладнення тяжкого СГСЯ, р-ції у місці ін'єкції (біль, еритема, гематома, набряк та/або подразнення у місці ін'єкції), акне, гінекомастія, варикоцеле, збільшення маси тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до фолітропіну альфа, ФСГ або будь-яких допоміжних речовин препарату; пухлини гіпоталамуса або гіпофіза; збільшення яєчників або кісти, не пов'язані з с-мом полікістозних яєчників; гінекологічні кровотечі невідомої етіології; карциноми яєчників, матки або молочних залоз; первинна недостатність яєчників; уроджені вади статевих органів, несумісні з вагітністю; фіброїдні пухлин матки, несумісні з вагітністю; первинна тестикулярна недостатність.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 75 МО

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БЕМФОЛА	ВАТ "Гедеон Ріхтер" (зборка ручка для ін'єкцій, втор. уп., дозвіл на випуск серії)/ Глюко Тера ГмбХ (контроль якості за наступними показниками: Oxidised forms; N-Glycans)/ Лабораторія фармакології та токсикології ГмбХ и Ко. КГ ((контроль якості за н, Угорщина/Німеччина/Австрія/Швейцарія/Франція/Велика Британія	р-н д/ін'ек. в руч. у картр. з однораз. голк. та сервет.	75МО, 150МО, 225МО, 300МО, 450МО	№1, №5, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГОНАЛ-Ф®	Мерк Сероно С.А., відділення у м. Обонн/Мерк Сероно С.п.А., Швейцарія/Італія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч. у шпр.,	75МО	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

		5голк. д/розв. та 5голк. д/введ. у конт. чар/уп.				
ГОНАЛ-Ф®	Мерк Сероно С.А., відділення у м. Обонн/Мерк Сероно С.п.А., Швейцарія/Італія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. у шпр., 1голк. д/розв. та 1голк. д/введ. у конт. чар/уп.	75 МО	№1x1	528,88	27,26/\$
ГОНАЛ-Ф®	Мерк Сероно С.п.А., Італія	р-н д/ін'єк. по 0,5мл у картр. в руч. д/введ. та 8гол.	300 МО	№1	550,92	27,26/\$
ГОНАЛ-Ф®	Мерк Сероно С.п.А., Італія	р-н д/ін'єк. по 0,75мл у картр. в руч. д/введ. та 12гол.	450 МО	№1	550,92	27,26/\$
ГОНАЛ-Ф®	Мерк Сероно С.п.А., Італія	р-н д/ін'єк. по 1,5мл у картр. в руч. д/введ. та 20гол.	900 МО	№1	550,92	27,26/\$

• **Фолітропін бета (Follitropin beta)**

Фармакотерапевтична група: G03GA06 - гонадотропіни та інші стимулятори овуляції. Фолітропін бета.

Основна фармакотерапевтична дія: ФСГ необхідний для забезпечення нормального росту та дозрівання фолікулів і для синтезу статевих стероїдних гормонів; рівень ФСГ у жінок є фактором, який визначає початок і тривалість розвитку фолікулів, і отже, визначає кількість дозріваючих фолікулів, а також час їх дозрівання; можна застосовувати для стимуляції розвитку фолікулів і синтезу стероїдів при деяких порушеннях функцій яєчників; може використовуватися для індукції множинного розвитку фолікулів при проведенні штучного запліднення, наприклад, у методиках екстракорпорального запліднення/пересаджування ембріона (ЕКЗ/ПЕ), ін'єкції сперматозоїдів у матковій труби та інтрацитоплазматичної ін'єкції сперматозоїдів.

Показання для застосування ЛЗ: безпліддя^{БНФ} - ановуляція (включаючи с-м полікістозних яєчників, СПКЯ) у жінок, нечутливі до лікування кломіфеном цитрату^{БНФ}; контрольована гіперстимуляція яєчників при індукції множинного розвитку фолікулів під час проведення допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ)^{БНФ}, наприклад: екстракорпоральне запліднення/перенесення ембріонів (ЕКЗ/ПЕ), ін'єкції сперматозоїдів у матковій труби (ВМІ) та інтрацитоплазматичної ін'єкції сперматозоїдів (ІКСІ); у чоловіків^{БНФ} - недостатній сперматогенез внаслідок гіпогонадотропного гіпогонадізму^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: жінки: ановуляція - щоденне введення 50 МО фолітропіну β 7 днів; за відсутністю відповіді яєчників щоденну дозу збільшують, поки не буде досягнуто росту фолікулів або рівня естрадіолу, що свідчить про достатню р-цію яєчників (оптимальним є щоденне збільшення к-ції естрадіолу в плазмі крові на 40-100%); отриману дозу підтримують до досягнення стану преовуляції; для досягнення цього стану потрібно 7-14 днів лікування; після цього введення фолітропіну β припиняють та індукують овуляцію введенням людського хоріонічного гонадотропіну (ЛХГ); якщо кількість фолікулів, які відповідають, занадто велика або концентрація естрадіолу збільшується дуже швидко, тобто > ніж у 2 р/добу протягом 2-3 наступних днів, то щоденну дозу зменшити; оскільки кожний фолікул діаметром > 14 мм може призвести до виникнення вагітності, то наявність декількох преовулянтних фолікулів діаметром > 14 мм несе ризик багатоплідної вагітності; у цьому разі ЛХГ не вводять і вживають заходів щодо попередження багатоплідної вагітності; контрольована гіперстимуляція яєчників у програмах допоміжних репродуктивних технологій - протягом 4 перших днів вводять 100-225 МО препарату; після цього дозу можна підбирати індивідуально, виходячи з р-ції яєчників; звичайно буває достатнім підтримуючої дози 75-375 МО 6-12 днів, але у деяких випадках може знадобитися і більш тривале лікування; фолітропін β застосовувати як ізольовано, так і в комбінації з агоністом або антагоністом ГнРГ для запобігання передчасному формуванню жовтого тіла; при застосуванні агоністу ГнРГ можуть знадобитися більш високі дози фолітропіну β для досягнення відповідного росту фолікулів; р-цію яєчників контролюють шляхом УЗД і визначення концентрації естрадіолу в плазмі крові, при наявності не менше 3-х фолікулів діаметром 16-20 мм (за даними УЗД) і достатньої відповіді естрадіолу (концентрації естрадіолу у плазмі крові 300-400 пкг/мл (1000-1300 пмоль/л) на кожен фолікул діаметром >18 мм) індукують кінцеву фазу дозрівання фолікула шляхом введення ЛХГ; ч/з 34-35 год проводять аспірацію яйцеклітин (ооцитів); для чоловіків: дозування 450 МО/тижд., загальну тижневу дозу розділити на 3 дози по 150 МО, лікування проводити разом з ЛХГ; лікування продовжувати 3-4 міс, в цей період очікується покращення сперматогенезу; для оцінки ефективності ч/з 4-6 міс після початку лікування провести аналіз сперми; у разі відсутності покращення комбіноване лікування продовжити; для відновлення сперматогенезу період лікування -18 міс. або довше.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль; здуття живота, біль у черевній порожнині, дискомфорт у черевній порожнині, запор, діарея, нудота; с-м гіперстимуляції яєчників (СГСЯ), біль у ділянці таза; симптоми з боку молочних залоз, метрорагія, кіста яєчника, збільшення яєчника, перекручення яєчника, збільшення матки, кровотеча з піхви; р-ція у місці введення; генералізовані р-ції підвищеної чутливості; напруженість, біль та/або набухання та біль у сосках; синці, біль, почервоніння, припухлість і свербіж; еритема,

кропив'янка, висипання та свербіж, ектопічна вагітність, викидні та багатоплідні вагітності, тромбоемболія, місцеві р-ції у місці введення включають затвердіння та біль, акне; висип, епідидимальна кіста; гінекомастія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату; пухлини яєчників, молочної залози, матки, яєчок, гіпофіза або гіпоталамуса; первинна недостатність статевих залоз; вагітність; вагінальні кровотечі невстановленої етіології; кісти яєчників або збільшення яєчників, не пов'язане із с-мом полікістозних яєчників (СПКЯ); порушення анатомії репродуктивних органів, несумісне з вагітністю; фіброма матки, несумісна з вагітністю.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ПУРЕГОН®	Н.В.Органон (контроль якості та тестування стабільності, вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії)/ Веттер Фарма-Фертигунг ГмБХ і Ко. КГ (вир-во нерозфасованої продукції та первинна упаковка, контроль якості, тестування стерильності та бактеріальних, Нідерланди/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 0,420мл, 0,780мл у картр. з голк.	833 МО/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПУРЕГОН®	Н.В. Органон, Нідерланди	р-н д/ін'єк. по 0,5мл у фл.	100МО/0,5мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

11.6.4.2. Синтетичні стимулятори овуляції

- **Кломіфен (Clomifene) ***

Фармакотерапевтична група: G03GB02 - стимулятори овуляції, синтетичні.

Основна фармакотерапевтична дія: антиестрогенна дія, механізм якої пояснюється здатністю специфічно зв'язуватися з рецепторами естрогенів у гіпоталамусі та яєчниках; у малих дозах посилює секрецію гонадотропних гормонів (пролактину, фолікулостимулюючого та лютеїнізуючого) і стимулює овуляцію; у великих дозах гальмує секрецію гонадотропінів; не виявляє гестагенної та андрогенної активності.

Показання для застосування ЛЗ: лікування порушень овуляції^{БНФ}, у тому числі індукція овуляції у жінок з ановуляторним циклом для того, щоб завагітніти; вторинні аменореї різної етіології (у тому числі аменорея після застосування протизаплідних засобів); с-м Штейна-Левенталю; олігоменорея; с-м Кіарі-Фроммеля (с-м пролонгованої післяпологової аменореї-галактореї); олігоспермія.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: у випадку безпліддя доза^{БНФ} і тривалість лікування залежать від чутливості (здатності реагувати) яєчників, у разі регулярних циклічних кровотеч рекомендується розпочинати лікування на 5-й день циклу (або на 3-й день циклу у випадку ранньої овуляції якщо фолікулярна фаза коротше 12 днів), І схема лікування: дозу 50 мг/добу призначати протягом 5 днів^{ВООЗ БНФ} під контролем р-ції яєчників шляхом проведення клінічних і лабораторних досліджень, овуляція здебільшого відбувається у період між 11-м і 15-м днями циклу, у разі відсутності овуляції у відповідь на наведене лікування необхідно перейти до схеми лікування II: з 5-го дня наступного циклу призначати 100 мг щодня протягом 5 днів, якщо у цей час також не настає овуляція, те ж саме лікування (100 мг/добу) повторити ще раз^{ВООЗ БНФ}, у разі відсутності овуляції зробити тримісячну перерву і рекомендувати провести ще один трицикловий курс лікування^{БНФ}, якщо після цього не відбулася овуляція, повторювати лікування не рекомендується, загальна доза препарату протягом будь-якого одного циклу не має перевищувати 750 мг, при аменореї після застосування протизаплідних засобів доза - 50 мг /добу протягом 5 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, запаморочення, підвищена втомлюваність; виснаження, судороги, нервові напруження, безсоння, непритомність, порушення мозкового кровообігу, церебральні тромбози, неврологічні порушення, дезорієнтація та розлади мовлення; розлади зору (світлочутливість, двоїння в очах, розмиті контури, світлобоязнь, спалахи, скотоми); після зображення, катаракта, неврит зорового нерва; скотома, фосфени (спалахи), зниження гостроти зору; блювання, нудота, «г. живіт», діарея, запор, біль у животі, здуття живота, панкреатит; відхилення від норми показників ф-ції печінки, гепатит, жовтяниця; тахікардія, серцебиття; збільшення частоти сечовипускання; алергічний дерматит, висипання, свербіж, пухирі, оборотна втрата волосся; мультиформна еритема, екхімоз, ангіоневротичний набряк, алопеція, кропив'янка; збільшення або зменшення маси тіла, підвищення апетиту, гіпертригліцеридемія; вазомоторні феномени, припливи; тромбоз судин головного мозку; патологічні маткові кровотечі, дисменорея, збільшення яєчників, болючі менструації, болючість та дискомфорт у молочних залозах; сухість слизової оболонки піхви; с-м гіперстимуляції яєчників, поява або погіршення проявів ендометріозу, ектопічна вагітність; гормонозалежні пухлини або погіршення їх перебігу, рак яєчників; міжменструальні кров'янисті виділення або менорагія; депресія, параноїдальний психоз; припливи жару; кістозне збільшення яєчників, особливо при с-мі Штейна-Левенталю; багатоплідна вагітність; одночасна внутрішньоутробна та позаматкова вагітність; позаматкова вагітність; новоутворення або пухлини залежні від ендокринної системи; рак яєчників; АР; збільшення яєчників; посилення болю в яєчниках при зміні циклу (овуляторний с-м); виникнення кіст та подовження лютеїнової фази циклу, аномальне збільшення яєчників.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого компонента препарату, захворювання печінки або порушення ф-ції печінки в анамнезі, кіста яєчника (за винятком с-му полікістозу яєчників), зниження ф-ції гіпофіза, функціональні розлади щитовидної або надниркових залоз, маткові кровотечі нез'ясованої етіології, гормонально-залежні пухлини, порушення зору (недавнє або хронічні порушення зору), вагітність, пацієнтам з дискінезією яєчників, під час менопаузи або з іншими станами при яких не може застосовуватися препарат.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 9 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	КЛОСТИЛБЕГІТ®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл. у фл.	50мг	№10	15,08	26,38/\$

11.6.5. Антигестагенні засоби

- **Міфепристон (Mifepristone) ***

Фармакотерапевтична група: G03XB01 - засоби, що впливають на сечостатеву систему та статеві гормони. Антигестагенні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: є синтетичним стероїдним антигестагенним засобом (блокує дію прогестерону на рівні рецепторів); у жінок міфепристон у дозах понад 1 мг/кг маси тіла нейтралізує дію прогестерону на ендометрій та міометрій; у період вагітності міфепристон підвищує чутливість міометрію до дії простагландинів, які спричиняють скорочення матки; при застосуванні у I триместрі вагітності міфепристон сприяє розширенню та розкриттю шийки матки; при застосуванні міфепристону у комбінації з аналогами простагландинів у ранньому терміні вагітності частота випадків успішного переривання маткової вагітності становить близько 95 % (залежно від простагландину і режиму його введення), а також прискорюється виведення плідного яйця.

Показання для застосування ЛЗ: медикаментозне переривання маткової вагітності у ранній термін (до 49 днів аменореї) у комбінації з мізопростолом^{БНФ}; консервативне пом'якшення та розширення шийки матки перед хірургічним перериванням вагітності у I триместрі вагітності^{БНФ}; потенціювання дії аналогів простагландинів при перериванні вагітності за медичними показаннями (у II-III триместрах вагітності); підготовка та індукція пологів при внутрішньоутробній загибелі плода, якщо застосування простагландинів або окситоцину протипоказане^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: медикаментозне переривання маткової вагітності у ранній термін (до 49 днів аменореї) у комбінації з мізопростолом - 600 мг р/ос одноразово^{БНФ} у присутності лікаря, ч/з 36-48 год застосовують аналоги простагландину (мізопростол 400 мкг р/ос, пацієнтка має знаходитись під наглядом медичного персоналу принаймні протягом 3-х год після застосування; ч/з 14-21 день після застосування міфепристону проводиться клінічне обстеження і УЗД^{БНФ}, а також визначають рівень β-хоріонічного гормону для підтвердження того, що стався повний викидень і вагінальна кровотеча припинилася; консервативне пом'якшення та розширення шийки матки перед хірургічним перериванням вагітності у I триместрі вагітності: 200 мг міфепристону р/ос одноразово в присутності лікаря, через 36-48 год (але не пізніше) проводити хірургічний аборт^{БНФ}; потенціювання дії аналогів простагландинів при перериванні вагітності за медичними показаннями (у II-III триместрах вагітності): 600 мг міфепристону приймати р/ос одноразово в присутності лікаря, через 36-48 год застосовувати простагландини з необхідною періодичністю, пацієнтка має перебувати під наглядом медичного персоналу принаймні протягом 3 год після застосування простагландину; підготовка та індукція пологів при внутрішньоутробній загибелі плода: два дні поспіль по 600 мг міфепристону р/ос одноразово^{БНФ} в присутності лікаря, якщо пологи не починаються протягом 72 год після прийому першої дози міфепристону, для індукції пологів застосовують звичайні методи^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль; нудота, блювання, діарея; спазми травного тракту (слабкі або помірної тяжкості); реакції гіперчутливості, шкірні висипання; кропив'янка, еритродермія, вузликова еритема, токсичний епідермальний некроліз; ангіоневротичний набряк; інфекції після аборту; підозрювані або підтвержені інфекції (ендометрит, запальні захворювання тазових органів); випадки розвитку серйозного або навіть летального інфекційно-токсичного шоку, спричиненого патогенними мікроорганізмами *Clostridium sordellii endometritis* та *Escherichia coli* (з пропасницею та іншими очевидними симптомами розвитку інфекції або без них); артеріальна гіпотензія; нездужання, вагусні симптоми (гарячі припливи, запаморочення, озноб), пропасниця; скорочення матки або спазми протягом декількох год після застосування простагландинів; інтенсивна маточна кровотеча, яка у 0-1,4 % випадків вимагає гемостатичного коректажу; при перериванні вагітності за медичними показаннями у II триместрі вагітності, а також індукції пологів при внутрішньоутробній загибелі плода у III триместрі вагітності були відзначені випадки розриву матки після застосування простагландинів (переважно у жінок, які народили кількох дітей, а також жінок з рубцем на матці після кесаревого розтину).

Протипоказання до застосування ЛЗ: хр. недостатність кори надниркових залоз; підвищена чутливість до діючої речовини або інших інгредієнтів препарату; тяжка неконтрольована БА; успадкована порфірія; протипоказання для медикаментозного переривання маткової вагітності: вагітність, не підтверджена ультразвуковим дослідженням (УЗД) або біологічними тестами; термін вагітності понад 49 днів аменореї; підозра на позаматкову вагітність; наявність протипоказань для застосування простагландинів; протипоказання для консервативного пом'якшення та розширення шийки матки перед хірургічним перериванням вагітності у I триместрі вагітності: вагітність, не підтверджена УЗД або біологічними тестами; термін вагітності понад 84 дні аменореї; підозра на позаматкову вагітність; протипоказання для потенціювання дії аналогів простагландинів при перериванні вагітності за медичними показаннями (у II-III триместрах вагітності): протипоказання для застосування простагландинів; протипоказання для підготовки та індукції пологів при внутрішньоутробній загибелі плода: гестоз тяжкого ступеня, передеклампися, еклампсія, недоношена або переношена вагітність.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	МІФЕПРИСТОН	Чайна Резоурзес Зіжу Фармас'ютікал Ко., Лтд., Китайська Народна Республіка	табл. у бл.	200мг	№1, №3		відсутня у реєстрі ОБЦ
	МІФОТАБ	Новаст Лабораторіз Лтд, Китай	табл. у бл.	200мг	№3x1		відсутня у реєстрі ОБЦ

- **Уліпристалу ацетам (Ulipristal) ****

Фармакотерапевтична група: G03X B02 - статеві гормони та модулятори системи статевих органів, модулятори рецепторів прогестерону.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний селективний модулятор прогестеронових рецепторів, що характеризується тканинспецифічним частковим антипрогестероновим ефектом, безпосередньо впливає на ендометрій, чинить прямий вплив на фіброміоми, зменшуючи їх розмір шляхом пригнічення проліферації клітин та індукції апоптозу.

Показання для застосування ЛЗ: показаний для одного курсу передопераційної терапії помірних і тяжких симптомів міоми матки у дорослих жінок репродуктивного віку; для інтермітуючої терапії помірних і тяжких симптомів міоми матки у дорослих жінок репродуктивного віку, яким не показано оперативне лікування.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймають по 1 табл. 5 мг 1 р/добу курсами тривалістю не > 3 міс. кожен, незалежно від прийому їжі; розпочинати лише після початку менструацій: перший курс лікування завжди починати протягом першого тижня менструації; повторні курси лікування починати якомога раніше - протягом першого тижня другого менструального циклу після закінчення попереднього курсу терапії; досліджена тривалість довгострокового лікування становить 4 курси інтермітуючої терапії; у разі пропуску прийому дози - прийняти якомога швидше, якщо запізнення становить > 12 год, то пропущену дозу не приймають, а відновлюють звичний режим прийому.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперчутливість до препарату, неспокій, емоційні розлади, головний біль, запаморочення, вертиго, епітаксис, біль у животі, нудота, сухість у роті, запор, диспепсія, метеоризм, печінкова недостатність, акне, алопеція, сухість шкіри, гіпергідроз, ангіоневротичний набряк, скелетно-м'язовий біль, біль у спині, нетримання сечі, аменорея, потовщення ендометрія, припливи, біль у малому тазі, кісти яєчників, болючість/напруженість молочних залоз, маткові кровотечі, метрорагія, виділення із піхви, дискомфорт в ділянці молочних залоз, розрив кісти яєчника, набухання молочних залоз, відчуття втоми, набряки, астенія, збільшення маси тіла, підвищення вмісту холестерину в крові, підвищення вмісту тригліцеридів у крові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин препарату; період вагітності та годування груддю; кровотеча з піхви неясної етіології або з причин, не пов'язаних з міомою матки; рак матки, рак шийки матки, рак яєчників або молочних залоз; наявне захворювання печінки.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕСМІЯ	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл. у бл.	5мг	№14x2, №14x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	

11.7. Аналоги гонадотропін-релізинг гормона

- **Гозерелін (Goserelin) (див. п. 19.2.1.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")**

Показання для застосування ЛЗ: ендометріоз^{БНФ} : полегшує симптоми, включаючи біль, зменшення розміру та кількості ендометріальних ушкоджень; для попереднього потоншення ендометрія перед його абляцією або резекцією; у поєднанні з терапією препаратами заліза для поліпшення гематологічного статусу хворих на анемію із фібромами перед хірургічною операцією^{БНФ} ; десенсибілізація гіпофіза при підготовці до стимуляції суперовуляції^{БНФ} .

Спосіб застосування та дози ЛЗ: 3,6 мг п/ш у передню черевну стінку кожні 28 днів^{БНФ}; 10,8 мг п/ш в передню черевну стінку кожні 12 тижнів; екстракорпоральне запліднення: 3,6 мг призначають для десенсибілізаційної терапії гіпофіза^{БНФ} , яка визначається за концентрацією естрадіолу у сироватці крові і має відповідати такій на ранній фолікулярній фазі (приблизно 150 пмоль/л); це відбувається між 7-ю і 21-ю добою менструального циклу; суперовуляцію (контрольована стимуляція яєчників) за допомогою гонадотропіну розпочинають, коли вже досягнута десенсибілізація; десенсибілізація, спричинена введенням препарату, є стійкішою, в деяких випадках може виникнути потреба у збільшенні дози гонадотропіну; на відповідній стадії розвитку фолікула введення гонадотропіну припиняється і надалі вводять хоріонічний гонадотропін людини для індукції овуляції; ендометріоз лікувати не більше 6 міс.^{БНФ} , повторні курси лікування не проводять через небезпеку втрати частини мінеральних компонентів та зменшення щільності кісткової тканини, додаткова замісна гормонотерапія (щоденний прийом естрогенного і прогестагенного препаратів) зменшувала втрату мінеральної щільності кісткової тканини і вираженість вазомоторних симптомів; для потоншення ендометрія^{БНФ} призначають на 4-8 тижнів; при великих розмірах матки або невизначеності терміну хірургічного втручання^{БНФ} може знадобитися введення другої капсули; жінкам з анемією, спричиненою фібромою матки, гозерелін комбінації з препаратами заліза можна вводити за 3 міс до хірургічного втручання.^{БНФ}

- **Трипторелін (Triptorelin) (див. п. 7.6.1.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ", п. 19.2.1.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")**

Показання для застосування ЛЗ: жіноче безпліддя; додаткове лікування у комбінації з гонадотропінами (менопаузальний гонадотропін людини (hMG), фолікулостимулюючий гормон (FSH), хоріонічний гонадотропін (hCG)) для стимуляції овуляції з метою запліднення in vitro і трансплантації ембріона (I.V.F.E.T); попередження передчасного підвищення рівня лютеїнізуючого гормону (ЛГ) у жінок, яким проводять контрольовану гіперстимуляцію яєчників у рамках допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ); передопераційне зменшення розміру міоми для зняття кровотечі і болю у жінок із симптоматичною міомою матки^{БНФ} ; лікування симптоматичного ендометріозу^{БНФ} , підтвердженого лапароскопією, якщо пригнічення функції гормонування яєчників і оперативне втручання не призначається у першу чергу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: жіноче безпліддя: застосовувати у комбінації з гонадотропінами, п/ш ін'єкція 0,1 мг 1 р/добу, з 2-го дня менструального циклу (одночасно з початком стимуляції яєчників) до дня, що передує запланованій індукції овуляції, тобто середній період застосування - 10-12 днів на кожний цикл лікування; міома

матки та ендометріоз: одним шприцом 3,75 мг 1 р/4 тижні ^{БНФ}, розпочинати у перші 5 днів циклу; допоміжні репродуктивні технології: лікування можна розпочинати на початку фолікулярної фази (2-й чи 3-й день менструального циклу) або в середині лютеїнової фази (21-й - 23-й день менструального циклу або за 5-7 днів до очікуваного початку менструації), контрольовану гіперстимуляцію яєчників гонадотропінами розпочинати приблизно ч/з 2-4 тижні після початку лікування триптореліном, після того як відповідна кількість фолікулів досягне належного розміру, лікування триптореліном і гонадотропінами припинити та одноразово ввести ін'єкцію людського хоріонічного гонадотропіну (лХГ) для індукції остаточного дозрівання фолікулів, якщо ч/з 4 тижні не підтверджено ефективність методу, розглянути питання про припинення лікування; загальна тривалість лікування - від 4 до 7 тижнів; при застосуванні триптореліну забезпечувати підтримку лютеїнової фази згідно з затвердженими схемами лікування.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,1 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДЕКАПЕПТИЛ	Феррінг ГмБХ (відпов. за вир-во готового продукту, перв. та втор. уп., контроль якості та випуск серії)/ Феррінг-Лечива, а.с. (відпов. за втор. уп.), Німеччина/Чеська Республіка	р-н д/ін'єк. у шпр. по 1мл в конт. чар/уп.	0,1 мг/мл	№7	129,11	31,17/€
	ДИФЕРЕЛІН®	ІПСЕН ФАРМА БІОТЕК (порошок – вир-во, тестування, пакування, випуск серії; втор. пак., випуск серії)/СЕНЕКСІ (розчинник – вир-во, первинне пакування та контроль якості), Франція	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	0,1мг	№7	відсутня у реєстрі ОБЦ	

11.8. Анти-гонадотропін-релізинг гормони

• Ганірелікс (Ganirelix)

Фармакотерапевтична група: H01CC01 - антагоніст гонадотропін-релізинг гормону.

Основна фармакотерапевтична дія: є антагоністом ГнРГ, який модулює гіпоталамо-гіпофізарно-гонадальну систему шляхом конкурентного зв'язування з рецепторами ГнРГ у гіпофізі; у наслідок цього відбувається швидке повне та зворотне пригнічення вивільнення ендогенних гонадотропінів без попередньої стимуляції, як це спостерігається при введенні агоністів ГнРГ.

Показання для застосування ЛЗ: попередження передчасного підйому рівня лютеїнізуючого гормону (ЛГ) у жінок, яким проводять контрольовану гіперстимуляцію яєчників (КГЯ) з використанням допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: повинен призначати тільки спеціаліст, який має досвід лікування безпліддя ^{БНФ}, КГЯ за допомогою ФСГ або корифолітропіну α можна розпочинати на 2-й або 3-й день менструального циклу; 0,25 мг, п/ш, 1 р/добу, починаючи з 5-го або 6-го дня застосування корифолітропіну α ^{БНФ}, початок застосування залежить від оваріальної відповіді, що включає кількість і розмір зростаючих фолікулів і/або кількості естрадіолу в циркулюючій крові, початок лікування препаратом може бути відстрочений при відсутності фолікулярного росту; ганірелікс та ФСГ необхідно вводити в один і той самий час, дозу ФСГ підбирати залежно від кількості і розміру прогресуючих фолікулів, а не від концентрації естрадіолу у крові; щоденне застосування ганіреліксу необхідно продовжувати до моменту утворення достатньої кількості фолікулів відповідного розміру, остаточне дозрівання фолікулів можна викликати введенням препарату людського хоріонічного гонадотропіну (лХГ); інтервал між двома ін'єкціями ганіреліксу, так само як і інтервал між останньою ін'єкцією ганіреліксу та ін'єкцією лХГ, не має перевищувати 30 год, оскільки у випадку збільшення інтервалу може виникнути передчасний пік ЛГ; тому якщо ганірелікс ввести вранці, то таке лікування продовжувати протягом усього періоду лікування гонадотропіном, включаючи день ініціації овуляції, якщо ін'єкції вводять у другій половині дня, то останній раз ганірелікс необхідно ввести у другій половині дня, за день до ініціації овуляції.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: реакції гіперчутливості (включаючи висипання, набряк обличчя, диспное, анафілаксію (включаючи анафілактичний шок), ангіоневротичний набряк, кропив'янку), погіршення стану при екземі, головний біль, нудота, місцеві реакції шкіри в місці ін'єкції (почервоніння, з або без набряку), нездужання, біль у відділі таза, здуття живота, с-м гіперстимуляції яєчників, ектопічна вагітність, спонтанний аборт.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини або будь-яких допоміжних речовин, підвищена чутливість до ГнРГ або до інших його аналогів, порушення функції нирок або печінки помірного або важкого ступеня тяжкості, вагітність або період годування груддю.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ОРГАЛУТРАН®	Веттер-Фарма Фертигунг ГмБХ і Ко. КГ (вир-во нерозфас. прод. та перв. уп., контроль якості)/ Н.В. Органон (втор. уп., контроль якості, дозвіл на	р-н д/ін'єк. по 0,5мл у шпр. з голк. у лотку	0,5 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	випуск серії), Німеччина				
--	--------------------------	--	--	--	--

- **Цетрорелікс (Cetrorelix)**

Фармакотерапевтична група: H01CC02 - антигонадотропін рилізінг-гормони.

Основна фармакотерапевтична дія: антагоніст гормону, що звільняє лютеїнізуючий гормон (ГЗЛГ), зв'язується із мембранними рецепторами клітин гіпофіза, конкурує з ендогенним ГЗЛГ за зв'язування з цими рецепторами; завдяки такому механізму дії цетрорелікс контролює секрецію гонадотропінів (лютеїнізуючого (ЛГ) та фолікулоstimулюючого (ФСГ) гормонів); у дозозалежний спосіб інгібує секрецію ЛГ та ФСГ із гіпофіза; супресія фактично починається одразу ж після введення препарату і підтримується за рахунок продовженого лікування, причому без початкового стимулюючого ефекту; у жінок цетрорелікс викликає затримку підвищення рівня ЛГ та, як наслідок, овуляції; у жінок, які піддаються оваріальній стимуляції, тривалість дії цетрореліксу є дозозалежною, після завершення лікування антагоністичний гормональний ефект цетрореліксу повністю зникає.

Показання для застосування ЛЗ: запобігання передчасній овуляції у пацієнток контролюваної оваріальної стимуляції з наступним вилученням ооцитів і застосуванням допоміжних репродуктивних технологій^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: можуть призначати лише спеціалісти, які мають досвід роботи у цій галузі^{БНФ}, перше введення препарату проводити під наглядом лікаря та в умовах, що забезпечать негайне лікування у разі розвитку можливих алергічних/псевдоалергічних реакцій, наступні ін'єкції препарату пацієнтка може вводити самостійно доти, поки вона не помітить ознак або симптомів, що можуть вказувати на розвиток р-цій гіперчутливості, або наслідків таких реакцій, що потребуватиме негайного медичного втручання; 0,25 мг 1 р/добу^{БНФ} з 24-годинними інтервалами або вранці, або ввечері, після першого введення р-ну препарату залишити пацієнтку на 30 хв під медичним наглядом, щоб уловнитись у відсутності алергічних/псевдоалергічних р-цій; введення вранці: 0,25 мг розпочинають на 5-й або 6-й день циклу оваріальної стимуляції^{БНФ} (приблизно ч/з 96-120 год після початку оваріальної стимуляції із застосуванням препаратів сечового або рекомбінантного гонадотропіну) та продовжують протягом періоду застосування гонадотропінів, включаючи день індукції овуляції або день введення людського хоріонічного гонадотропіну^{БНФ} (лХГ), введення ввечері: введення 0,25 мг на 5-й день циклу оваріальної стимуляції^{БНФ} (ч/з 96-108 год після початку оваріальної стимуляції із застосуванням препаратів сечового або рекомбінантного гонадотропіну) та продовжують протягом періоду застосування гонадотропінів до вечора перед днем проведення індукції овуляції включно^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: системні алергічні/псевдоалергічні реакції, включаючи анафілактичні реакції, що загрожують життю, головний біль, нудота, с-м гіперстимуляції яєчників від легкого до помірного ступеня (ступінь I або II за BOO3), який є невід'ємним ризиком процедури стимуляції, тяжка форма с-му гіперстимуляції яєчників (ступінь III за BOO3), місцеві реакції у місці введення ін'єкції (наприклад еритема, набряк та свербіж).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-яких структурних аналогів гонадотропін-рилізінг гормону (Гн-РГ), екзогенних пептидних гормонів або допоміжних речовин препарату; вагітність та період годування груддю; тяжке порушення функції нирок.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,25 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЦЕТРОТІД® 0,25 мг	Бакстер Онколоджи ГмбХ (вир-к нерозфас. прод. та перв. пак.)/ П'єр Фабр Медикамент Продакшн (вир-к нерозфас. прод. та перв. Пак.)/ Абботт Біолоджікалз Б.В. (втор. пак.)/ Мерк Хелскеа КГаА (відповідальний за випус, Німеччина/Франція/Нідерланди	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч., 1гол. д/розч., 1гол. д/введ. та 2тамп. у конт. чар/уп.	0,25мг	№7	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЦЕТРОТІД® 0,25 мг	Бакстер Онколоджи ГмбХ (вир-к нерозфас. прод. та перв. пак.)/ П'єр Фабр Медикамент Продакшн, Акітен Фарм Інтернасьйональ (ПФМП/АФІ) (вир-к нерозфас. прод. та перв. Пак.)/ Абботт Біолоджікалз Б.В. (втор. пак.)/ Ме, Німеччина/Франція/Нідерланди	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч., 1гол. д/розч., 1гол. д/введ. та 2тамп. у конт. чар/уп.	0,25мг	№7	568,9 1	27,26/\$

11.9. Гормони задньої долі гіпофіза

11.9.1. Аналоги вазопресину

- **Терліпресин (Terlipressin) ****

Фармакотерапевтична група: H01BA04 - Гормони задньої долі гіпофіза. Вазопресин та аналоги.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний аналог вазопресину, природного гормону задньої долі гіпофіза, що відрізняється від нього заміщенням у 8-й позиції аргініну на лізин та тим, що три гліцинових залишки приєднані до термінальної аміногрупи цистеїну; фармакологічна дія полягає у поєднанні специфічного ефекту речовин, утворених у результаті його ферментативного розщеплення; ефектами терліпресину є виражений вазоконстрикторний та антигеморагічний; найбільш помітним у цьому відношенні ефектом є зниження кровообігу в паренхімі внутрішніх органів, внаслідок чого знижується печінковий кровотік і тиск у системі ворітної вени; подібно до аналогічних пептидів, спричиняє спазм артеріол, вен і венул переважно в паренхімі внутрішніх органів, скорочення гладкої мускулатури стінки стравоходу, підвищення тону та перистальтики кишечника загалом; крім впливу на гладкі м'язи судин стимулює гладку мускулатуру матки, у т.ч. при відсутності вагітності; максимальна його активність спостерігалась у внутрішніх органах і шкірі.

Показання для застосування ЛЗ: Кровотечі травного тракту та сечостатеєвих шляхів: кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу, виразки шлунка і ДПК; маткова кровотеча, зумовлена функціональними порушеннями або іншими причинами, пологами, абортom тощо; кровотечі, пов'язані з хірургічними втручаннями, зокрема на органах черевної порожнини й малого таза; місцево - під час гінекологічних втручань на шийці матки.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Дорослі: спочатку проводити в/в ін'єкцію 2 мг терліпресину кожні 4 год.; лікування слід продовжувати, доки не мине 24 год. з моменту зупинення кровотечі, але не довше 48 год.; після застосування початкової дози дозу можна відкорегувати до 1 мг в/в кожні 4 год. для пацієнтів із масою тіла < 50 кг або у разі появи побічних р-цій. *Кровотечі сечостатеєвих шляхів:* з огляду на різницю активності ендопептидаз у плазмі крові та тканинах діапазон дозувань є достатньо широким - від 0,2 до 1 мг, які призначають з інтервалом 4-6 год.; при ювенільних маткових кровотечах рекомендовані дози - від 5 до 20 мкг/кг маси тіла, в/в. *Місцеєє застосування при гінекологічних втручаннях на шийці матки:* 0,4 мг (400 мкг) розводять 0,9 % р-ном натрію хлориду до об'єму 10 мл, застосовують інтрацервікально та/або парацервікально; у цьому випадку ефект препарату розвивається ч/з 5-10 хв.; за необхідності дозу можна збільшити або призначити повторно. *Кровотечі з внутрішніх органів у дітей:* зазвичай вводять у дозі від 8 до 20 мкг/кг маси тіла з інтервалом 4-8 год.; препарат слід вводити протягом усього періоду кровотечі; загальною рекомендацією є продовження введення для запобігання рецидиву кровотечі так само, як у разі кровотеч у дорослих; за наявності склерозованих варикозних вузлів стравоходу призначають одноразове введення у дозі 20 мкг/кг маси тіла болюсно. *Кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу у дорослих:* 1 мг (1000 мкг) кожні 4-6 год. протягом 3-5 днів; для запобігання рецидиву кровотечі лікування слід продовжувати протягом 24-48 год. після її припинення; вводять в/в болюсно або у вигляді короткочасної інфузії; застосовують нерозведеним або розводять 0,9 % р-ом натрію хлориду. *Інші види кровотеч травного тракту у дорослих:* 1 мг (1000 мкг) кожні 4-6 год.; також можна застосовувати як засіб першої допомоги незалежно від хірургічного втручання, якщо є підозра на кровотечу з верхніх відділів травного тракту.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: брадикардія; фібриляція передсердь, шлуночкові екстрасистоли, тахікардія, біль у грудях, ІМ, переважаність рідиною з набряком легенів, тахікардія типу «пірует» (torsade de pointes), СН; звуження периферичних судин, периферична ішемія, блідість шкіри обличчя, АГ; ішемія кишечника, периферичний ціаноз, гарячі припливи; респіраторний дистрес, ДН; задишка; транзиторна діарея, транзиторний спастичний біль у животі; транзиторні нудота, блювання; головний біль; гіпонатріємія, якщо не контролюється баланс рідини; місцевий некроз шкіри; порушення скоротливої активності матки, зниження маткового кровотоку; некроз у місці ін'єкції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого допоміжного компонента препарату; септичний шок у пацієнтів з низьким серцевим викидом; вагітність.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 12 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	РЕМЕСТИП	Зентіва к.с. (вир-к готового продукту, відповідальний за контроль якості, перв. уп.)/ Феррінг-Лечива, а.с. (відпов. за випуск серії та втор. Уп.), Чеська Республіка	р-н д/ін'єк., по 10мл в амп. в упак.	0,1 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РЕМЕСТИП	Зентіва к.с. (вир-к готового продукту, відповідальний за контроль якості, перв. уп.)/ Феррінг-Лечива, а.с. (відпов. за випуск серії та втор. уп.), Чеська Республіка	р-н д/ін'єк., по 2мл в амп. в упак.	0,1 мг/мл	№5	13028,88	32,90/€

11.9.2. Окситоцин та його аналоги

• Окситоцин (Oxytocin) *

Фармакотерапевтична група: H01BB02 - гормони для системного застосування, за виключенням статевих гормонів, гормони задньої долі гіпофіза, окситоцин та аналоги.

Основна фармакотерапевтична дія: клініко-фармакологічні властивості подібні з властивостями ендогенного окситоцину задньої долі гіпофіза; мускулатура матки містить чутливі до окситоцину рецептори сімейства G-протеїнозалежних рецепторів; спричиняє скорочення гладкої мускулатури матки, збільшуючи внутрішньоклітинну концентрацію кальцію, імітуючи таким чином родові перейми при нормальній, спонтанній скорочувальній діяльності матки і тимчасово перешкоджаючи кровотоку в матці; зі збільшенням амплітуди і тривалості м'язових скорочень відбувається розширення і згладжування шийки матки; по мірі розвитку вагітності кількість рецепторів до окситоцину і чутливість матки до нього зростають і до кінця вагітності досягають свого максимуму; у певних кількостях здатний підсилити скорочувальну здатність матки до рівня, характерного для мимовільної родової діяльності аж до тетанічного стану; спричиняє скорочення міоепітеліальних клітин, прилеглих до альвеол грудної залози, сприяє виділенню молока; впливаючи на гладку мускулатуру судин, спричиняє вазодилатацію, збільшує кровоток у нирках, коронарних судинах та судинах головного мозку; при цьому АТ залишається зазвичай незмінним, проте при в/в введенні великих доз або концентрованого р-ну АТ може тимчасово знизитися з розвитком рефлексаторної тахікардії і рефлексаторного збільшення серцевого викиду; слідом за деяким початковим зниженням АТ настає тривале, хоча і невелике, його підвищення; на відміну від вазопресину, має слабку антидіуретичну дію; гіпергідратація можлива при одночасному застосуванні з великими кількостями безелектролітних рідин і/або при швидкому введенні.

Показання для застосування ЛЗ: застосовується для збудження і посилення скорочувальної діяльності матки; в передпологовому періоді: індукція пологів^{БНФ, ВООЗ} (індукція пологової діяльності на останніх або близьких до них

термінах вагітності при наявності АГ (пreekлампсія, еклампсія або при наявності СС та ниркового захворювання), еритробластоз плода, материнський або гестаційний ЦД, допологова кровотеча, необхідність дострокового розродження, передчасний розрив плодових оболонок, при яких не відбувається спонтанної скорочувальної діяльності матки; планова індукція скорочувальної діяльності матки може бути показана при перенесеній вагітності (більше 42 тижнів); індукція скорочувальної діяльності матки може також бути показана у випадках внутрішньоутробної смерті плода, внутрішньоутробної затримки розвитку плода); посилення скорочувальної діяльності матки^{БНФ} (у першому або другому періоді пологів можна застосовувати в/в у вигляді інфузії для посилення переймів при тривалих пологах або при дисфункціональній інертності матки); у післяпологовий період: у разі гіпотонії матки, для зупинки післяпологової кровотечі^{БНФ, ВООЗ}; інші показання до застосування: у якості ад'ювантної терапії при неповному аборті або аборті, що не відбувся^{БНФ, ВООЗ}; застосування з метою діагностики (для визначення ембріонально-плацентарної дихальної здібності плода (навантажувальний тест з окситоцином)).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для індукції або стимуляції пологової діяльності застосовується у вигляді в/в краплинної інфузії з обов'язковим дотриманням запропонованої швидкості інфузії і моніторингом маткових скорочень і серцевої діяльності плода^{ВООЗ БНФ}; почати введення фізіологічного р-ну, який не містить окситоцину, для приготування стандартного р-ну для інфузії треба змішати в стерильних умовах 1 мл (5 МО) окситоцину і 1000 мл негідрофільного розчинника, отриманий р-н ретельно перемішати, обертаючи ємність, в результаті 1 мл розчину містить 5 МОД окситоцину; швидкість введення початкової дози не повинна перевищувати 0,5-4 МОД/хв, кожні 20-40 хв її можна збільшувати на 1-2 МОД/хв, поки не буде досягнуто бажаного ступеня скорочувальної діяльності матки, після досягнення бажаної частоти маткових скорочень (що відповідає нормальній пологовій діяльності), при відсутності ознак фетального дистресу і при розкритті зіву матки на 4-6 см можна поступово знизити швидкість інфузії в темпі, подібному до її прискорення, на пізніх термінах вагітності проведення інфузії з високою швидкістю вимагає обережності, лише в рідкісних випадках може знадобитися швидкість, що досягає 8-9 МОД/хв, у разі передчасних пологів може знадобитися більш висока швидкість інфузії, яка в окремих випадках може перевищувати 20 МОД/хв; контроль маткових кровотеч у післяпологовому періоді^{БНФ}: в/в інфузія (краплинний метод): для зупинки кровотечі в післяпологовому періоді змішати 10-40 ОД окситоцину^{БНФ} і 1000 мл негідрофільного розчинника, профілактика маткової атонії - 20-40 тМО/хв окситоцину; ад'ювантна терапія при неповному аборті або аборті, що не відбувся: в/в інфузія 10 МО окситоцину в 500 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду або суміші 5 % глюкози з 0,9 % р-ном натрію хлориду зі швидкістю 20-40 крап./хв, діагностика матково-плацентарної недостатності (навантажувальний тест із окситоцином): почати в/в інфузію зі швидкістю 0,5 тМО/хв і кожні 20 хв подвоювати швидкість до тих пір, поки не буде досягнута ефективна доза, що зазвичай становить 5-6 тМО/хв, максимум 20 тМО/хв, після появи протягом 10-хвилинного періоду 3 помірних скорочень тривалістю по 40-60 секунд кожне припинити введення окситоцину і простежити за зміною, тобто уповільненням серцевої діяльності плода.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: дефіцит фактора І, гіпопротромбінемія, тромбоцитопенія; р-ції гіперчутливості, анафілактичні р-ції/анафілаксія, диспное, гіпотензія, шок, кропив'янка, утруднене дихання, набряк, гіперемія шкіри, висип, підвищення t° тіла, озноб, гіпергідратація; запаморочення, головний біль; аритмія, брадикардія, рефлекторна тахікардія, шлуночкові екстрасистолія; зниження АТ з подальшим підвищенням; нудота, блювання; летальний наслідок пологів, післяпологова кровотеча, гіпертонус матки; крововиливи в органи малого таза, спазми матки; тетанічні скорочення матки, розрив матки; висип, р-ції у місці введення; свербіж; рововилив у сітківку ока у новонароджених, аритмія, синусова брадикардія, тахікардія, шлуночкова екстрасистолія, асфіксія, загибель плода через асфіксію, жовтяниця новонароджених, ушкодження головного мозку, низька оцінка за шкалою Апгар через 5 хв після народження.

Протипоказання до застосування ЛЗ: клінічно вузький таз; несприятливе положення плода, що перешкоджає пологам природним шляхом без попереднього втручання (поперечне положення плода); термінові акушерські надзвичайні ситуації, при яких співвідношення користь-ризик для плода або матері вимагає екстреного хірургічного втручання; розвиток фетального дистресу до початку пологової діяльності; тривале застосування при відсутності скоротливої діяльності матки або вираженій токсемії; гіпертонічний характер маткових скорочень; гіперчутливість до компонентів препарату; індукція або збільшення скорочувальної діяльності матки у випадках, коли пологи через природні родові шляхи протипоказані (передлежання або випадіння петель пуповини, повне передлежання плаценти або передлежання судин пуповини), тяжкі захворювання ССС.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 15 МО

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ОКСИТОЦИН	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	5 МО/мл	№5x2	19,18	
	ОКСИТОЦИН	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	5 МО/мл	№5x1	21,00	
	ОКСИТОЦИН-БІОЛІК	АТ "БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у пач.	5 МО/мл	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОКСИТОЦИН-БІОЛІК	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у пач.	5 МО/мл	№10	7,65	
II.	ОКСИТОЦИН	СТЕРИЛ-ДЖЕН ЛАЙФ САЙНСИЗ (П) Лтд, Індія	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у конт. чар/уп. у карт. уп.	10 МО/мл	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОКСИТОЦИН	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у карт. уп.	5 МО/мл	№5	35,30	28,02/\$

- **Карбетоцин (Carbetocin)**

Фармакотерапевтична група: H01BB03 - препарати гормонів для системного застосування (крім статевих гормонів і інсулінів). Гіпофізарні, гіпоталамічні гормони та їх аналоги. Гормони задньої частки гіпофіза. Окситоцин та його похідні.

Основна фармакотерапевтична дія: карбетоцин є агоністом окситоцину тривалої дії; подібно до окситоцину, карбетоцин селективно зв'язується з рецепторами окситоцину гладком'язових клітин міометрія, стимулює ритмічні скорочення матки, збільшує частоту скорочень, що вже почалися, і підвищує тонус мускулатури матки; у постнатальному періоді карбетоцин здатний збільшувати частоту й силу спонтанних скорочень матки; після введення карбетоцину інтенсивний початок скорочувальної дії з потужними скороченнями досягається протягом 2 хв; одноразове введення 100 мкг карбетоцину в/в після народження дитини є достатнім для підтримання адекватної скоротності матки, що запобігає атонії матки й надмірній крововтраті порівняно з інфузією окситоцину протягом декількох год.

Показання для застосування ЛЗ: для профілактики атонії матки у разі кесарева розтину^{БНФ}, що здійснюється із застосуванням спінальної або епідуральної анестезії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять лише в/в^{БНФ} за наявності відповідного медичного нагляду в умовах стаціонару, у дозі 1 мл (100 мкг) одноразово повільно^{БНФ} протягом 1 хв, лише після проведення кесаревого розтину й народження дитини; вводити одразу після пологів, бажано перед відокремленням плаценти^{БНФ}; надалі препарат не вводити.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анемія, нудота, біль у животі; металевий присмак у роті, блювання, відчуття жару, озноб, біль, головний біль, тремор, запаморочення, біль у грудях, задишка, свербіж, артеріальна гіпотензія, почервоніння обличчя.

Протипоказання до застосування ЛЗ: період вагітності та пологів до народження дитини; не застосовувати для стимуляції пологової діяльності; підвищена чутливість до карбетоцину або окситоцину; захворювання печінки й нирок; епізоди еклампсії й прееклампсії; тяжкі захворювання СС системи; епілепсія.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,1 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	КАРБЕТОЦИН	ТОВ "Фармідея", Латвія	р-н д/ін'єк. по 1мл у фл.	100 мкг/мл	№4	700,26	29,93/€
	КАРБЕТОЦИН	ТОВ "Фармідея", Латвія	р-н д/ін'єк. по 1мл у фл.	100 мкг/мл	№5	700,26	29,93/€
	ПАБАЛ	Феррінг ГмбХ (вир-во, відпов. за перв. пак., контроль якості та випуск серії)/ Феррінг-Лечива, а.с. (відпов. за втор. пак.), Німеччина/Чеська Республіка	р-н д/ін'єк. по 1мл у фл.	100 мкг/мл	№5	855,43	32,90/€

11.10. Розчин для іригацій Комбіновані препарати

- **Сорбітол + манітол (Sorbitol + mannitol) ****

Визначена добова доза (DDD): для іригацій - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ТУРУСОЛ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/іригацій по 5000мл у конт.	27мг/5,4мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТУРУСОЛ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/іригацій по 2000мл у конт.	27мг/5,4мг/мл	№1	149,30	
	ТУРУСОЛ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/іригацій по 3000мл у конт.	27мг/5,4мг/мл	№1	188,20	
	ТУРУСОЛ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/іригацій по 1000мл у конт.	27мг/5,4мг/мл	№1	97,98	

11.11. Вакцини для профілактики захворювань, що викликаються папіломавірусною інфекцією

- **Вакцина для профілактики захворювань, що викликаються папіломовірусом (тип 6, 11, 16, 18) (Papillomavirus vaccine (human types 6, 11, 16, 18)) (див. п. 21.1.2.6. розділу "ВАКЦИНИ ТА АНАТОКСИНИ")**

- **Вакцина для профілактики захворювань, що викликаються папіломовірусом (тип 16, 18) (Papillomavirus vaccine (human types 16, 18))** (див. п. 21.1.2.6. розділу "ВАКЦИНИ ТА АНАТОКСИНИ")

12. УРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ, СЕКСОПАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

12.1. Урологія. Лікарські засоби

12.1.1. Засоби для лікування запальних інфекційних захворювань нирки

12.1.1.1. Антибактеріальні засоби системного застосування для лікування інфекційних захворювань сечовивідних шляхів

12.1.1.2. Протигрибкові засоби для системного застосування

12.1.1.3. Антимікробні засоби інших груп

12.1.1.4. Нестероїдні протизапальні засоби

12.1.1.5. Засоби, що діють на мікобактерії

12.1.2. Засоби для лікування сечокам'яної хвороби

12.1.2.1. Засоби, що сприяють чи гальмують утворення сечових конкрементів

12.1.2.2. Анальгетичні засоби

12.1.2.3. Спазмолітичні засоби

12.1.2.4. М-холіноблокатори

12.1.2.5. Нестероїдні протизапальні засоби

12.1.3. Засоби для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози

12.1.3.1. Альфа¹-адреноблокатори

12.1.3.2. Інгібітори 5-альфа-редуктази

12.1.4. Засоби для лікування раку нирки

12.1.5. Засоби для лікування раку сечового міхура

12.1.6. Засоби для лікування раку передміхурової залози

12.1.7. Засоби для лікування раку яєчка

12.1.8. Засоби для лікування раку статевого члена

12.1.9. Засоби для лікування функціональних нейрогенних порушень сечовипускання

12.1.9.1. Вегетотропні лікарські засоби

12.1.9.1.1. Антихолінергічні засоби

12.1.9.1.2. Холіноміметики

12.1.9.2. Міорелаксанти центральної дії

12.1.9.3. Трициклічні антидепресанти

12.1.9.4. Антидіуретичний гормон

12.1.10. Засоби для лікування порушень видільної функції нирки

12.2. Андрологія, сексопатологія. Лікарські засоби

12.2.1. Протимікробні та антисептичні засоби

12.2.1.1. Антибіотики

12.2.1.2. Похідні хіноліну

12.2.1.3. Похідні імідазолу

12.2.1.4. Інші антимікробні та антисептичні засоби

12.2.2. Інші засоби, що застосовуються в андрології

12.2.2.1. Інгібітори пролактину

12.2.3. Протизапальні засоби

12.2.4. Гормони статевих залоз та лікарські засоби, що застосовуються при патології статевої системи

12.2.4.1. Андростенон та його похідні

12.2.4.2. Гонадотропні гормони

12.2.5. Антиандрогени

12.2.6. Лікарські засоби для стимуляції статевої дисфункції

- 12.2.6.1. Адаптогени
- 12.2.6.2. Біостимулятори
- 12.2.6.3. Вітаміни
- 12.2.7. Засоби для інтракавернозної терапії
- 12.2.8. Засоби, що використовуються для терапії передчасного сім'явиверження
- 12.2.9. Засоби для лікування еректильної дисфункції
- 12.2.10. Лікарські засоби для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози
 - 12.2.10.1. Альфа адреноблокатори
 - 12.2.10.2. Інгібітори 5-альфаредуктази
- 12.3. Нефрологія. Лікарські засоби
 - 12.3.1. Антибактеріальні засоби
 - 12.3.1.1. Похідні фторхінолону
 - 12.3.1.2. Цефалоспорини
 - 12.3.1.3. Похідні нітрофурантоїну
 - 12.3.1.4. Похідні сульфаметоксазолу і триметаприму
 - 12.3.1.5. Лікарські засоби групи пеніциліну
 - 12.3.1.6. Аміноглікозиди
 - 12.3.1.7. Макроліди
 - 12.3.1.8. Протигрибкові засоби
 - 12.3.2. Антикоагулянти
 - 12.3.2.1. Антикоагулянти прямої дії
 - 12.3.2.2. Периферичні вазодилататори
 - 12.3.2.3. Похідні синтетичних пентасахаридів
 - 12.3.2.4. Антикоагулянти непрямой дії
 - 12.3.2.4.1. Похідні кумаринів
 - 12.3.2.4.2. Похідні індандіону
 - 12.3.2.5. Антиагреганти
 - 12.3.2.6. Фібринолітичні засоби
 - 12.3.2.7. Антитромбічні засоби
 - 12.3.3. Діуретики
 - 12.3.3.1. Високоактивні діуретики
 - 12.3.3.2. Тіазидні діуретики
 - 12.3.3.3. Нетіазидні діуретики
 - 12.3.3.4. Калійзберігаючі діуретики
 - 12.3.4. Спазмолітики
 - 12.3.4.1. Синтетичні спазмолітики та антихолінергічні засоби
 - 12.3.4.2. Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби
 - 12.3.4.3. Аналгетики та антипіретики, аніліди
 - 12.3.4.4. Мінеральні комбінації
 - 12.3.5. Імуносупресанти
 - 12.3.5.1. Неселективні, загальної дії
 - 12.3.5.1.1. Алкілюючи сполуки
 - 12.3.5.1.2. Антиметаболіти
 - 12.3.5.2. Селективні
 - 12.3.6. Біологічні агенти
 - 12.3.6.1. Анти СД –20 - агенти
 - 12.3.7. Кортикостероїди для системного застосування
 - 12.3.8. Антигіпертензивні лікарські засоби
 - 12.3.8.1. Інгібітори ангіотензинперетворюючого фермента (АПФ)

- 12.3.8.2. Блокатори рецепторів ангіотензину II, комбіновані лікарські засоби
- 12.3.8.3. Блокатори кальцієвих каналів
 - 12.3.8.3.1. Дигідропіридинові похідні
 - 12.3.8.3.2. Бензодіазепіни, комбіновані
- 12.3.8.4. β -адреноблокатори
 - 12.3.8.4.1. Неселективні β -адреноблокатори
 - 12.3.8.4.2. Комбіновані α - і β -адреноблокатори
- 12.3.8.5. Антигіпертензивні лікарські засоби центральної дії
 - 12.3.8.5.1. Агоністи центральних α -адреноблокаторів
 - 12.3.8.5.2. Селективні α -адреноблокатори
- 12.3.9. Гіполіпідемічні лікарські засоби
 - 12.3.9.1. Інгібітори редуктази 3-гідрокси-3-метилглутарилкоензиму A, або статини
 - 12.3.9.2. Похідні нікотинової кислоти
- 12.3.10. Лікарські засоби, що нормалізують процеси у стінці судин
 - 12.3.10.1. Антиоксиданти
 - 12.3.10.2. α -адреноблокатори
 - 12.3.10.2.1. Похідні нікотинової кислоти
 - 12.3.10.2.2. Похідні метилксантинів
 - 12.3.10.2.3. Похідні індолу
 - 12.3.10.3. Ангіопротектори
- 12.3.11. Лікарські засоби для лікування порушень мінерального обміну
- 12.3.12. Антианемічні засоби
 - 12.3.12.1. Еритропоетини
 - 12.3.12.2. Вітаміни
 - 12.3.12.3. Препарати заліза

12.1. Урологія. Лікарські засоби

- 12.1.1. Засоби для лікування запальних інфекційних захворювань нирки
 - 12.1.1.1. Антибактеріальні засоби системного застосування для лікування інфекційних захворювань сечовивідних шляхів

Інфекції сечовивідних шляхів частіше зустрічаються у жінок, ніж у чоловіків; якщо їх спостерігають у чоловіків, це вказує на патологію функції нирок. Рецидив інфекцій є показанням для рентгенологічного дослідження, особливо у дітей з нелікованим пієлонефритом, що може привести до незворотного пошкодження нирок. *Escherichia coli* є найбільш поширеною причиною інфекцій сечовивідних шляхів. *Staphylococcus saprophyticus* також відноситься до збудників захворювань сечовивідних шляхів, особливо у молодих жінок, які ведуть активне статеве життя. *Proteus spp.* та *Klebsiella spp.* є менш поширеними причинами зазначених інфекцій. *Pseudomonas aeruginosa* частіше є збудником внутрішньолікарняних інфекцій і може бути пов'язана з функціональними чи анатомічними порушеннями функції нирок. *Staphylococcus epidermidis* та *Enterococcus faecalis* – збудники інфекцій, внаслідок катетеризації чи застосування іншого інструментарію.

Перед початком антибактеріальної терапії повинен бути проведений аналіз сечі у хворого для посіву на флору і визначення чутливості до а/б:

- у чоловіків;
- у вагітних жінок;
- у дітей віком до 3 років;
- у пацієнтів з підозрою на інфекції сечовивідних шляхів, ускладненими інфекціями чи рецидивними інфекціями;
- у пацієнтів з підозрою на стійкість до мікроорганізмів.

Під час очікування результатів не слід відкладати лікування. При виборі АБЗ потрібно враховувати поточну місцеву бактеріальну чутливість до антибактеріальної терапії.

Для лікування неускладнених інфекцій нижніх сечовидільних шляхів часто застосовують триметоприм, нітрофурантоїн або амоксицилін, який використовують протягом 7 днів (3 днів – для лікування інфекцій у жінок). Інфекції викликані чутливими бактеріями можуть реагувати на застосування двох доз амоксициліну по 3 г. Проте, повідомлялась поширена стійкість до ампіциліну, амоксициліну і триметоприму. Для лікування резистентних збудників альтернативою є: амоксицилін з клавулановою к-тою, пероральні цефалоспорини, нітрофурантоїн чи хінолони.

Для лікування неускладнених інфекцій нижніх сечовивідних шляхів, викликаних декількома резистентними до АБЗ збудниками може бути використаний фосфоміцин.

Деякі пацієнти для попередження рецидиву інфекції потребують довготривалої низькодозованої терапії; до показань відносять: часті рецидиви і значні пошкодження функції нирок. Для тривалої терапії рекомендовані: триметоприм, нітрофурантоїн та цефалексин.

Гострий пієлонефрит може привести до септицемії і лікується спочатку ін'єкційними формами АБЗ широкого спектру дії, такі як: цефуроксим або хінолони – у тяжко хворих; гентаміцин також може використовуватися.

Простатит складно піддається лікуванню, тривалість терапії АБЗ, які проникають у тканини передміхурової залози може складати до декількох тижнів, до них відносять: триметоприм або деякі хінолони.

Інфекції сечовивідних шляхів під час вагітності можуть протікати безсимптомно і вимагають негайного лікування, щоб попередити прогресування г. пієлонефриту. Для лікування інфекцій сечовивідних шляхів у вагітних жінок можна застосовувати: пеніциліни та цефалоспорины. Слід уникати застосування сульфаніламідів і хінолонів під час вагітності; бажано уникати використання триметоприму, особливо в I триместрі вагітності.

Пацієнтам з нирковою недостатністю слід з особливою обережністю використовувати аміноглікозиди; уникати застосування тетрациклінів, уротропіну та нітрофурантоїну.

Діти з інфекціями сечовивідних шляхів вимагають негайного антибактеріального лікування, щоб мінімізувати ризик пошкодження функції нирок. Дітям старше 3 місяців з неускладненими інфекціями нижніх сечовивідних шляхів можна застосовувати триметоприм, нітрофурантоїн, цефалоспорины I покоління (наприклад цефалексин), або амоксицилін протягом 3 днів. Амоксицилін слід застосовувати лише у випадку, якщо збудник чутливий до нього.

Дітям старше 3 місяців з г. пієлонефритом можна застосовувати цефалоспорины I покоління або ко-амоксиклав протягом 7-10 днів. Дітям з тяжкими формами захворювання найкраще лікувати спочатку ін'єкційними формами антибактеріальних засобів широкого спектру дії, такі як цефотаксим або амоксицилін з клавулановою к-тою; як альтернатива – гентаміцин.

Рецидиви інфекції є показанням для проведення діагностичної візуалізації.

Дітям з рецидивними інфекціями, значними захворюваннями сечовивідних шляхів та значними пошкодженнями функції нирок показана антибактеріальна профілактика низькими дозами триметоприму або нітрофурантоїну.

12.1.1.2. Протигрибкові засоби для системного застосування

(див. п. 17.4. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

12.1.1.3. Антимікробні засоби інших груп

• Діоксидин (Dioxydine)

Фармакотерапевтична група: J01XX - антибактеріальні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: АБЗ широкого спектра дії; ефективний при інфекціях, спричинених вульгарним протеєм, синьогнійною паличкою, паличкою Фрідлендера, кишковою та дизентерійною паличками, сальмонелами, стафілококами, стрептококами, патогенними анаеробами, включаючи збудників газової гангрені; активний відносно штамів бактерій, резистентних до а/б, сульфаніламідів, нітрофуранів та інших ЛЗ.

Показання для застосування ЛЗ: гнійно-запальні процеси різної локалізації: гнійні плеврити, емпієма плеври, абсцес легенів, перитоніт, цистит, рани з глибокими порожнинами, абсцеси м'яких тканин, флегмони, післяопераційні рани сечо- та жовчовивідних шляхів, профілактика інфекційних ускладнень після катетеризації сечового міхура.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лише дорослим; перед початком курсу лікування - пробу на переносимість: у гнійну порожнину вводять 10 мл 1 % р-ну; за відсутності протягом 3-6 год. побічних явищ (запаморочення, ознобу, підвищення t° тіла) розпочинають курсове лікування; р-н вводять у порожнину ч/з дренажну трубку, катетер або шпр. - 10-50 мл 1 % р-ну; МДД - 70 мл 1 % р-ну; застосовувати 1 або 2 р/добу; тривалість лікування залежить від тяжкості захворювання та переносимості; курс лікування може тривати 3 тижні і більше; за необхідності курс лікування повторюють ч/з 1-1,5 міс.; застосовують також місцево, накладаючи на рану пов'язки, змочені 1 % р-ном.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: в/порожн. введення: головний біль, озноб, підвищення t° тіла, диспептичні розлади, судомні скорочення м'язів, АР, фотосенсибілізуювальний ефект (поява пігментних плям на тілі при дії сонячних променів); зовнішнє застосування: навколорановий дерматит, свербіж.

Противпоказання до застосування ЛЗ: індивідуальна непереносимість препарату, недостатність кори надниркових залоз в анамнезі.

Визначена добова доза (DDD): місцево - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДІОКСИДИН	ПАТ "Фармак", Україна	р-н по 10мл в амп. у пач.	10 мг/мл	№10	175,00	
	ДІОКСИДИН	ПАТ "Фармак", Україна	р-н по 10мл в амп. в бл.	10 мг/мл	№5x2	240,00	

• Нітроксолін (Nitroxoline)

Фармакотерапевтична група: J01XX07 - протимікробні ЛЗ для системного застосування; АБЗ.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний уроантисептик, що діє за механізмом хелатування; селективно інгібує синтез бактеріальної ДНК, утворюючи комплекси з металовмісними ферментами мікробної клітини та запобігаючи їх зв'язуванню зі специфічним субстратом, що призводить до бактеріостатичного, б/ц і фунгіцидного ефекту; ефективний щодо широкого спектра Gr(+) та Gr(-) м/о і грибів; його антибактеріальний і протигрибковий спектр охоплює більшість м/о, що спричинюють ІСШ: Escherichia coli, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Candida spp., Torulopsis spp.; Proteus spp., Staphylococcus spp.; Pseudomonas spp., Providencia spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp.; анаеробні бактерії; Corynebacterium diphtheriae, Enterococcus spp., Salmonella spp., Shigella spp., Neisseria gonorrhoeae та Hemophilus influenzae.

Показання для застосування ЛЗ: г., хр. та рецидивуючі ІСШ (цистит, уретрит, уретерит), спричинені Гр(+) та Гр(-) м/о і грибами, чутливими до нітроксоліну; профілактика рецидивуючих ІСШ.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі: рекомендована добова доза - 400-800 мг, розподілена на 4 прийоми; середня добова доза - 400 мг (100 мг 4 р/добу); при тяжких захворюваннях добову дозу збільшити до 800 мг (200 мг 4р/добу); МДД - 800 мг; діти старше 3 років: рекомендована добова доза - 200-400 мг; тривалість лікування залежить від характеру та перебігу захворювання; при хр.інфекціях призначають повторними курсами тривалістю 2 тижн. з двотижневими перервами (курс лікування може тривати кілька міс.).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: помірні кишково-шлункові розлади (у поодиноких випадках можливі нудота, вздуття, блювання, втрата апетиту), яким можна запобігти, застосовуючи препарат під час їди, зниження активності трансаміназ, порушення функції печінки, АР, такі як шкірні висипання, свербіж, що швидко минають після припинення прийому препарату; АР з розвитком тромбоцитопенії, головний біль, атаксія, парестезії, полінейропатія, зменшення вмісту сечової кислоти у плазмі крові, тахікардія, загальна слабкість, при лікуванні препаратом сеча забарвлюється в інтенсивний жовтий колір.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до нітроксоліну або іншого компонента ЛЗ, до інших хінолінів; тяжка ПН та НН (КлКр < 0,33 мл/с).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1 г.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I. НІТРОКСОЛІН	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"/ ТОВ "Натур+" (втор. пак.), Україна	табл., вкриті п/о у бл. в пач.	50 мг	№10x5	7,84	
НІТРОКСОЛІН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	50 мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
НІТРОКСОЛІН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	50 мг	№10x5	5,43	
НІТРОКСОЛІН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	50 мг	№10x80	8,62	
II 5-НОК®	Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія	табл., в/о у конт.	50мг	№50	відсутня у реєстрі ОВЦ	

- **Спектиномицин (Spectinomycin)** * (див. п. 9.2.1.6. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ", п. 17.2.8. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Фосфоміцин (Fosfomicin)** (див. п. 17.2.8. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

12.1.1.4. Нестероїдні протизапальні засоби

- **Диклофенак (Diclofenac)** ^[тільки гель] (див. п. 8.7.1.1. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Кеторолак (Ketorolac)** (див. п. 8.7.1.1. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Німесулід (Nimesulid)** ^[тільки гель] (див. п. 8.7.1.6. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.1.1.5. Засоби, що діють на мікобактерії

(див. п. 17.3. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

12.1.2. Засоби для лікування сечокам'яної хвороби

12.1.2.1. Засоби, що сприяють чи гальмують утворення сечових конкрементів

- **Алопуринол (Allopurinol)** * ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: M04AA01 - препарати, що пригнічують утворення сечової к-ти.

Основна фармакотерапевтична дія: алопуринол та його метаболіт оксипуринол порушують синтез сечової к-ти, мають уростатичні властивості, які здатні пригнічувати фермент ксантиноксидазу, що каталізує окиснення гіпоксантину до ксантину і ксантину до сечової к-ти, що призводить до зменшення к-ції сечової к-ти і сприяє розчиненню уратів.

Показання для застосування ЛЗ: підвищення рівня сечової к-ти в крові та утворенням уратних/оксалатних каменів ^{БНФ} (подагра ^{БНФ} ^{вооз}, г. уратна нефропатія та уратна СКХ), лікування злоякісних новоутворень, що потенційно призводять до загострення усіх форм гіперурикемії ^{БНФ} ^{вооз}, а саме при різних гемобластозах (г.лейкозі, хр. мієлолейкозі, лімфосаркомі), уратній нефропатії, яка виникла внаслідок лікування лейкоемії; вроджена ферментативна недостатність, с-м Леша-Ніхана (частковий або повний дефіцит гіпоксантин-гуанінін-фосфорибозилтрансферази) та дефіцит аденін-фосфорибозилтрансферази; лікування захворювань, спричинених недостатньою активністю аденін-фосфорибозилтрансферази та утворенням 2,8-дигідроксиаденинових каменів у нирках; лікування захворювань, спричинених утворенням змішаних кальцій-оксалатних каменів у нирках при гіперурикозурії, що не контролюються дієтою.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос; добову дозу визначають індивідуально залежно від рівня сечової к-ти в сироватці крові; для зменшення ризику виникнення побічних р-цій лікування розпочинати з 100 мг 1 р/добу ^{вооз}, ^{БНФ} і підвищувати тільки, якщо рівень сечової к-ти в сироватці крові знижується недостатньо; дорослим рекомендовані наступні режими дозування: при легких станах 100-200 мг/добу ^{БНФ}; при помірно тяжких станах - 300-600 мг/добу ^{БНФ}; при тяжких станах: 700-900 мг/добу ^{БНФ}; при розрахунку дози препарату на масу тіла застосовувати дози 2-10 мг/кг маси тіла/добу; дітям віком від 15 років добова доза 10-20 мг/кг маси тіла, МДД - 400 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: реактивні напади подагри, тяжке ушкодження кісткового мозку (тромбоцитопенія, агранулоцитоз, апластична анемія), зміни показників крові (лейкопенія, лейкоцитоз, гранулоцитоз та еозинофілія), істинна еритроцитарна аплазія, р-ції гіперчутливості уповільненого типу, що супроводжуються лихоманкою, шкірними висипаннями, васкулітом, лімфаденопатією, псевдолімфомою, артралгією, лейкопенією, еозинофілією, гепатоспленомегалією, відхиленням від норми показників функціональних проб печінки (оборотне підвищення трансаміназ і ЛФ); г. холангіт і ксантинові камені, анафілактичний шок, ангіоімунобластна Т-клітинна лімфома, нудота, блювання, діарея, гематемезис, стеаторея, стоматит, порушення випорожнення, порушення ф-ції печінки від асимптоматичного підвищення показників ф-ції печінки до гепатиту (включаючи некроз печінки і грануломатозний гепатит), висипання, включаючи с-м Стівенса-Джонсона (ССД)/токсичний епідермальний некроліз(ТЕН); алопеція, фурункульоз, набряк Квінке, знебарвлення волосся, дерматит, стенокардія, атаксія, периферичний неврит, порушення смакових відчуттів, кома, головний біль, нейропатія, параліч, запаморочення, сонливість, парестезія, брадикардія, АГ, ЦД, гіперліпідемія, депресія, гінекомастія, імпотенція, безпліддя, гематурія, уремія, азотемія, катаракта, дегенерація сітківки, порушення зору, м'язовий біль, загальне нездужання, астенія, набряки, пірексія, запаморочення, підвищення рівня ТТГ в крові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до алопуринолу або інших компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,4 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АЛОПУРИНОЛ	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (вир-во за повню цикл.)/ ТОВ "АГРОФАРМ" (вир-во, пак-ня, випуск серій) Україна	табл. у бл.	100мг	№10x5	3,89	
	АЛОПУРИНОЛ-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	100мг	№10x5	3,27	
	АЛОПУРИНОЛ-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	300мг	№10x3	3,18	
II.	АЛОПУРИНОЛ САНДОЗ®	Салютас Фарма ГмбХ (вир-во за повн. цикл.)/ Сандоз Прайвет Лімітед (вир-во in bulk (альтернативна дільниця)/ С.К. Сандоз С.Р.Л. (контроль серії (альтернативна дільниця))/ Лек Фармацевтична компанія д.д. (перв. і втор. пак., дозвіл на в, Німеччина/ Індія/Румунія/Словенія	табл. у бл.	100мг	№10x5	11,30	27,19/\$
	АЛОПУРИНОЛ САНДОЗ®	Салютас Фарма ГмбХ (вир-во за повн. цикл.)/ Сандоз Прайвет Лімітед (вир-во in bulk (альтернативна дільниця)/ С.К. Сандоз С.Р.Л. (контроль серії (альтернативна дільниця))/ Лек Фармацевтична компанія д.д. (перв. і втор. пак., дозвіл на в, Німеччина/ Індія/Румунія/Словенія	табл. у бл.	300мг	№10x5	8,17	27,19/\$

- **Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) *** (див. п. 2.9.2. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Комбіновані препарати

- **Кислота лимонна + тринатрію цитрат + калію гідрокарбонат (Citric acid + trisodium citrate + potassium hydrocarbonate) ****

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БЛЕМАРЕН®	альфамед Фарбіл Арцнейміттель ГмбХ/Лабораторіос Медікаментос Інтернасьоналес, С.А., Німеччина/Іспанія	табл. шипучі у конт.	1197мг/835, 5мг/967,5мг	№20x4	750,00	29,56/€
	БЛЕМАРЕН®	Лабораторіос Медікаментос Інтернасьоналес, С.А., Іспанія	табл. шипучі у конт.	1197мг/835, 5мг/967,5мг	№20x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

12.1.2.2. Анальгетичні засоби

- **Трамадол (Tramadol)** (див. п. 10.3.1.2. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Тримеперидин (Trimeperidine)** (див. п. 10.3.2. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Метамізол натрію (Metamizole sodium)** ** [тільки таблетки] (див. п. 10.3.5. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Комбіновані препарати

- **Метамізол натрію + Пітофенон + Фенпівериній (Metamizole sodium + Pitophenone + Fenpiverinium)** ** (див. п. 10.3.5. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.1.2.3. Спазмолітичні засоби

- **Дротаверин (Drotaverine)** [ПМД] [тільки гель] (див. п. 3.3.2. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: спазми гладкої мускулатури при захворюваннях сечового тракту (нефролітіаз, уретролітіаз, пієліт, цистит ПМД, тенезми сечового міхура).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос, в/м та в/в; внутрішньо р/ос, дорослі: середня доза 120-240 мг/добу за 2-3 прийоми; дітям: 6-12 років - МДД 80 мг (розділена на 2 прийоми); старше 12 років - МДД 160 мг (розділена на 2-4 прийоми); середня добова доза для дорослих 40-240 мг (за 1-3 окремих введення), в/м; при г. коліках у дорослих хворих із каменями у сечових або жовчних шляхах - 40-80 мг, в/в.

12.1.2.4. М-холіноблокатори

- **Атропін (Atropine)** * (див. п. 3.3.3. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ", п. 15.4.1. розділу "ОФТАЛЬМОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Платифілін (Platyphylline)** (див. п. 3.3.1. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.1.2.5. Нестероїдні протизапальні засоби

- **Диклофенак (Diclofenac)** [тільки гель] (див. п. 8.7.1.1. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Лорноксикам (Lornoxicam)**

Фармакотерапевтична група: M01AC05 - нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби; оксиками.

Основна фармакотерапевтична дія: виявляє анальгезивні та протизапальні властивості, належить до класу оксикамів; інгібує синтез простагландинів (інгібує фермент ЦОГ), що призводить до десенсибілізації периферичних ноцицепторів та інгібування запалення; передбачається центральний вплив на ноцицептори, який не пов'язаний з протизапальною дією.

Показання для застосування ЛЗ: короткочасне лікування г. болю легкого та помірного ступеня.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос, в/м та в/в; рекомендована доза - 8 мг в/м або в/в, для деяких пацієнтів - додаткове введення дози 8 мг у перші 24 год. МДД - 16 мг, тривалість в/в введення р-ну не <15 с, в/м - не < 5 с; г. біль: рекомендована доза - 8-16 мг/добу, початкова доза - 16 мг, ч/з 12 год - ще 8 мг у перший день лікування; після першого дня лікування добова доза не має перевищувати 16 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота, диспепсія, розлад травлення, біль у животі, блювання, діарея, фарингіт, анемія, тромбоцитопенія, еозинофілія, лейкопенія, розлади коагуляції, подовження тривалості кровотечі, панцитопенія, екхімоз, нейтропенія, агранулоцитоз, апластична та гемолітична анемії, гарячка, озноб, анафілактичні р-ції, анафілаксія, втрата апетиту, зміни маси тіла, гіпонатріємія, інсомнія, депресія, сплутаність свідомості, неспокій, підвищена збудливість, порушення здатності концентруватись, зміни уваги, когнітивні розлади, легкий короткочасний головний біль, запаморочення, сонливість, парестезії, дисгевзія, тремор, мігрень, гіперкінезія, гіпестезія; асептичний менінгіт у хворих на СЧВ та змішані захворювання сполучної тканини; кон'юнктивіт; порушення зору, у т. ч. затуманення зору, порушення кольоросприйняття, дефекти полів зору, амбліопія, диплопія; скотома, іридоцикліт; вертиго, дзвін у вухах; відчуття серцебиття, тахікардія, набряки, затримка рідини, СН, почервоніння обличчя; АГ, припливи, крововиливи, васкуліт, гематоми; риніти; диспное, кашель, бронхоспазм; підвищення рівня печінкових ферментів (АЛТ, АСТ), висипання, свербіж, підвищене потовиділення, еритематозні висипання, кропив'янка та ангіоневротичний набряк, алопеція, дерматит, екзема, макуло-папульозна висипка, пурпура, артралгія, ніктурія, порушення сечовиділення, підвищення рівня азоту сечовини і КлКр в крові, нездужання, набряк обличчя, астенія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до лорноксикаму або до інших компонентів ЛЗ; тромбоцитопенія; гіперчутливість (с-ми подібні до таких як при БА, риніти, ангіоневротичному набряку або уртикарії) до інших НПЗЗ, включаючи ацетилсаліцилову к-ту; тяжка форма СН; ШК кровотечі, церебрально-судинні або інші кровотечі; ШК кровотеча або перфорація виразки в анамнезі, пов'язані з попередньою терапією НПЗЗ; активна рецидивуюча пептична виразка шлунка/кровотеча або рецидивуюча пептична виразка

шлунка/кровотеча в анамнезі (2 або більше окремих доведених епізодів розвитку виразки або кровотечі); тяжка форма ПН та НН (рівень сироваткового креатиніну > 700 мкмоль/л); III триместр вагітності.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 12 мг., парентерально - 12 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	КСЕФАЛГІН	Глобал Фармацевтікалс Індастріас, Єгипет	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	8мг	№5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КСЕФОКАМ®	Такеда ГмбХ, місце вир-ва Оранієнбург, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	4мг	№10x1	19,52	32,40/€
	КСЕФОКАМ®	Такеда ГмбХ, місце вир-ва Оранієнбург, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	8мг	№10x1	16,86	32,40/€
	КСЕФОКАМ®	Такеда Австрія ГмбХ (втор. пак. та випуск серій)/ Вассербургер Арцнайміттельверк ГмбХ (вир-во нерозфас. прод., перв. пак.), Австрія/ Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	8мг	№5	129,67	30,09/€
	КСЕФОКАМ® РАПІД	Такеда ГмбХ, місце вир-ва Оранієнбург, Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	8мг	№6x1	19,54	30,54/€
	ЛАРФІКС	Кусум Хелтхкер Пвт Лтд, Індія	табл., в/о у бл.	8мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛАРФІКС	Кусум Хелтхкер Пвт Лтд, Індія	табл., в/о у бл.	8мг	№10x10	6,91	23,98/\$

12.1.3. Засоби для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози

12.1.3.1. Альфа¹-адреноблокатори

- **Альфузозин (Alfuzosin)**

Фармакотерапевтична група: G04CA01 - засоби, які застосовують для лікування ДГПЗ; антагоністи α-адренорецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: активне похідне хіназоліну; вибірково діє на α₁-адренорецептори в передміхуровій залозі, на дні сечового міхура та в передміхуровій частині сечовипускального каналу; активація α₁-адренорецепторів стимулює скорочення гладкої мускулатури, підвищуючи тонус простати, оболонки простати, передміхурової частини сечовивідного каналу і дна сечового міхура, що призводить до закупорки відтоку із сечового міхура та вторинної нестабільності сечового міхура; α-блокада послабляє інтравезикальну непрохідність шляхом прямої дії на гладку мускулатуру передміхурової залози; знижує тиск у сечовивідному каналі і зменшує опір відтоку сечі в ході сечовипускання; пригнічує гіпертонічну р-цію уретри раніше, ніж судинної мускулатури; поліпшує параметри виділення, знижуючи тонус уретри та опірність відтоку із сечового міхура, полегшує випорожнення міхура.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування ДГПЗ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос; рекомендована доза - 10 мг 1 р/добу^{БНФ}. Виятьково чоловікам! Табл.ковтати цілими.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: непритомність/запаморочення, головний біль, вертиго, нездужання, сонливість; тахікардія, прискорене серцебиття, артеріальна гіпотензія (постуральна), синкопе, виникнення, погіршення або рецидив стенокардії у пацієнтів з попередньо існуючою хворобою коронарних артерій; нудота, біль у животі, діарея, сухість у роті; висип, свербіж, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, астенія, припливи крові, набряк, біль у грудях, приапізм.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до альфузозину та/або до інших компонентів ЛЗ; ортостатична гіпотензія; комбінація з іншими α-блокаторами; ПН; ХНН (КлКр<30 мл/хв).

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АЛФІРУМ	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	табл. з м/в у бл.	10мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	

- **Доксазозин (Doxazosin)** (див. п. 2.8.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Тамсулозин (Tamsulosin)**

Фармакотерапевтична група: G04CA02 - ЛЗ, що застосовуються при ДГПЗ; антагоністи α₁-адренергічних рецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: вибірково і конкурентно блокує постсинаптичні α₁-адренорецептори (α_{1A} та α_{1D}) у гладкій мускулатурі передміхурової залози, шийки сечового міхура і простатичної частини уретри; приводить до зниження тону гладкої мускулатури передміхурової залози, шийки сечового міхура і простатичної частини уретри та поліпшення виділення сечі; одночасно зменшуються симптоми обструкції та подразнення, пов'язані з доброякісною гіперплазією передміхурової залози (утруднення початку сечовипускання, послаблення струменя сечі, крапання після закінчення сечовипускання, відчуття неповного спорожнення сечового міхура, часті позиви до сечовипускання, позиви до сечовипускання в нічний час, невідкладність сечовипускання); здатність α_{1A}-адреноблокаторів зменшувати АТ пов'язана зі зменшенням периферичного тону судин.

Показання для застосування ЛЗ: функціональні розлади з боку нижніх сечових шляхів при доброякісній гіперплазії простати^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос; рекомендована доза для дорослих - 0,4 мг/день^{БНФ} щоденно.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: запаморочення, головний біль, непритомність; відчуття серцебиття, ортостатична гіпотензія; риніт; запор, діарея, нудота, блювання; висип, кропив'янка, свербіж, ангіоневротичний набряк Квінке, с-м Стівенса-Джонсона; розлади еякуляції, включаючи ретроградну еякуляцію і недостатність еякуляції, астенія; затуманення чи порушення зору; носова кровотеча; сухість у роті; мультиформна еритема, ексфолювативний дерматит, пріапізм.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до тамсулозину г/х, включаючи медикаментозно-індукований ангіоневротичний набряк, або до будь-якої з допоміжних речовин; наявність в анамнезі ортостатичної гіпотензії; тяжка ПН.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,4 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АДЕНОРМ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	капс. з м/в тверді у бл.	0,4мг	№10х3	4,98	
	ОМІКС	ПрАТ "Технолог", Україна	капс. тверді прол. дії у бл.	0,4мг	№10х1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОМІКС	ПрАТ "Технолог", Україна	капс. тверді прол. дії у бл.	0,4мг	№10х3	4,90	
	ТАМСУЛІД	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (фас. із форми "in bulk" вир-ків Сінтон Хіспанія С.Л., Іспанія, Фамар А.В.Е. Антоусса Плант, Греція; Роттендорф Фарма ГмбХ, Німеччина), Україна	капс. з м/в у бл.	0,4мг	№10х3	4,69	
II.	АЛЬФА М	Апотекс Інк., Канада	табл., вкриті п/о, з м/в у бл.	0,4мг	№10х3, №10х6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОД-ТАМ	Ауробіндо Фарма Лімітед - Юніт VII, Індія	капс. прол. дії у бл.	0,4мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОМЛОС	Алкалоїд АД - Скоп'є (випуск серії)/СІНТОН ХІСПАНІЯ С. Л. (вир-во нерозфас. прод., перв. та втор. пак., контроль якості (фізичний, хімічний та мікробіологічний))/ Роттендорф Фарма ГмбХ (вир-во нерозфас. прод., первинн, Республіка Македонія/Іспанія/Німеччина/ Чеська Республіка	капс. з м/в тверді у бл.	0,4мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОМНІК ОКАС	Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нідерланди	табл., вкриті п/о, прол. дії з перор. сист. контр. абсорб. у бл.	0,4мг	№10х3	24,19	29,20/€
	ОМНІК®	Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нідерланди	капс. з м/в тверді у бл.	0,4мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПРОСТАЗАН-ВІСТА	Сінтон Хіспанія, С.Л. (вир-во, перв., втор. пак., контроль якості, випуск серії)/ Роттендорф Фарма ГмбХ (вир-во, перв., втор. пак., контроль якості)/ Фамар А.В.Е. Антуза Плант (вир-во, перв., втор. пак., контр, Іспанія/Німеччина/ Греція	капс. з м/в тверді у бл.	0,4мг	№10х3	5,00	26,49/€
	ПРОСТАЗАН-ВІСТА	Сінтон Хіспанія, С.Л. (вир-во, перв., втор. пак., контроль якості, випуск серії)/	табл. прол. дії у бл.	0,4мг	№10х3	7,67	30,26/€

	Роттендорф Фарма ГмбХ (вир-во, перв., втор. пак., контроль якості)/ Джі І Фармасьютикалс, Лтд (перв., втор. пак.)/ Сінтон БВ (контроль, Іспанія/Німеччина/Болгарія/Нідерланди					
РАНОПРОСТ	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	капс. у бл.	0,4мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТАМСІН ФОРТЕ	Сінтон Хіспанія, С.Л. (вир-во за повним циклом)/Джі І Фармасьютикалс, Лтд (перв. та втор. пак.), Іспанія/Болгарія	табл. прол. дії у бл.	0,4мг	№10х3	7,18	26,77/\$
ТАМСОЛ®	"Гедеон Ріхтер Румунія" А.Т. (вир-во нерозфас. прод., перв., втор. уп., контр. якості, випуск серії)/ВАТ "Гедеон Ріхтер" (вип. серії), Румунія/Угорщина	капс. тверді з м/в у бл.	0,4мг	№10х1, №10х3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТАМСУЛОСТАД	СТАДА Арцнайміттель АГ (вип. серій)/Фамар А.В.Е. Антоусса Плант (вир-во нерозфас. прод., перв. та втор. пак., контроль серій)/ Сінтон Хіспанія С.Л. (вир-во нерозфас. прод., перв. та втор. пак., контр. с, Німеччина/Греція/Іспанія/Італія /Нідерланди	капс. з м/в тверді у бл.	0,4мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТАНІЗ ЕРАС	КРКА, д.д., Ново место (перв. та втор. пак., контр. серії (хімічні/фізичні та мікробіологічні випробування) та випуск серії; контр. серії (хімічні/фізичні випробування))/ Сінтон Іспанія С.Л. (вир-во "in bulk", перв. та втор. пак., Словенія/Іспанія/Нідерланди/Чеська Республіка	табл. прол. дії у бл.	0,4мг	№10х3, №10х9	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТАНІЗ®	КРКА, д.д., Ново место (вир-к, відпов. за перв. і втор. пак., контр. якості та випуск серії)/ Роттендорф Фарма ГмбХ (вир-к, відпов. за вир-во «bulk»)/ Фамар А.В.Е./Сінтон Іспанія С.Л., Словенія/Німеччина/ Греція/Іспанія	капс. з м/в тверді у бл.	0,4мг	№10х1, №10х2, №10х3, №10х6, №10х9, №10х20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
УРИМАК	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	капс. прол. дії тверді у бл.	0,4мг	№ 30 (10х3)	3,67	27,12/\$
ФЛОСІН®	Фамар А.В.Е. Антоусса Плант (вир-во "in bulk", пак., контр. серій)/ Роттендорф Фарма ГмбХ (вир-во "in bulk", контр. серій)/ Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (пак., контр. та випуск серії)/ Сінтон Хіспанія С.Л. (вир-во "in bulk", пак., Греція/Німеччина/Іспанія	капс. тверді з м/в у бл.	0,400 мг	№10х3	3,90	27,67/€
ФОКУСИН®	С.С. "Зентіва С.А.", Румунія	капс. тверді з м/в у бл.	0,4мг	№ 30 (10х3), № 90 (10х9), № 30 (15х2), № 90 (15х6)	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Теразозин (Terazosin)**

Фармакотерапевтична група: G04CA03 - ЛЗ, що застосовуються при ДГПЗ; антагоністи α -адренорецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: вибірково блокує периферичні постсинаптичні α_1 -адренорецептори; спричиняє розширення артеріальних судин, зниження загального периферичного опору, АТ та постнавантаження на серце, знижується тонус венозних судин; сприяє нормалізації ліпідного обміну (знижує рівень загального холестерину, тригліцеридів, ЛПНЩ і ЛПДНЩ, підвищує рівень ЛПВЩ); блокує постсинаптичні α_1 -адренорецептори гладких м'язів вихідного отвору сечового міхура, проксимальної частини уретри та простати, зменшує опір току сечі та нормалізує сечовипускання у хворих на ДГПЗ; не впливає на розмір простати.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматична терапія затримки сечовипускання, зумовленої ДГПЗ^{БНФ}; АГ^{БНФ} (у вигляді монотерапії та у комбінації з іншими антигіпертензивними ЛЗ).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос; ДГПЗ: початкова доза - 1 мг/добу; підтримуюча доза - 5-10 мг 1 р/добу^{БНФ}, МДД - 20 мг; терапевтичний ефект спостерігається ч/з 2 тижн. від початку лікування; для досягнення стійкого ефекту курс лікування підтримуючою дозою має становити 4 тижні; АГ: початкова доза - 1 мг на ніч; підтримуюча добова доза підвищується поступово до 2 мг^{БНФ}, 5 мг або 10 мг 1 р/добу^{БНФ}, подвоюючи її з тижневими інтервалами до досягнення бажаного рівня АТ, МДД - 20 мг^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: аритмія, ортостатична гіпотензія, вазодилатація, периферичні набряки, відчуття серцебиття, тахікардія, постуральна гіпотензія, фібриляція передсердь, фібриляція шлуночків, тромбоцитопенія, зниження Нв, лейкоцитів, гематокриту, загального білка, альбумінів, що свідчить про можливість гемодилуції, непритомність, запаморочення, сонливість, головний біль, парестезії, неясність зору, амбліопія, інтраопераційний с-м в'ялої райдужки (ІСДР), порушення зору та кон'юнктивіт, вертиго, дзвін у вухах, закладеність носа, риніт, задишка, синусит, бронхіт, носова кровотеча, симптоми грипу, фарингіт, посилення кашлю, нудота, абдомінальний біль, запор, діарея, сухість у роті, диспепсія, метеоризм, блювання, посилення позивів до сечовипускання, інфекції сечовивідних шляхів, нетримання сечі у жінок у постклімактеричному періоді, свербіж, висипання, підвищене потовиділення, біль у спині, біль у кінцівках, біль у шиї, плечах, артралгія, артрит, біль у суглобах, міалгія, подагра, підвищена втомлюваність, астенія, набряк, збільшення маси тіла, біль у грудях, набряк обличчя, пропасниця, анафілактоїдна р-ція, АР, імпотенція, приапізм, зниження лібідо, депресія, нервозність, страх, безсоння.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до terazозину або до будь-якої допоміжної речовини та до інших аналогічних за структурою антагоністів α -адренорецепторів.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	СЕТЕГИС®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл. у бл.	1мг, 2мг, 5мг, 10мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

12.1.3.2. Інгібітори 5-альфа-редуктази

- **Фінастерид (Finasteride)**

Фармакотерапевтична група: G04CB01 - ЛЗ, які застосовують при ДГПЗ.

Основна фармакотерапевтична дія: специфічний інгібітор 5- α -редуктази типу II, внутрішньоклітинного ферменту, який перетворює тестостерон у більш активний андроген дигідротестостерон (ДГТ); високоефективно знижує циркулюючий і внутрішньопростатичний ДГТ; не має спорідненості з рецепторами андрогенів.

Показання для застосування ЛЗ: лікування та контроль доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ)^{БНФ} у пацієнтів зі збільшеною передміхуровою залозою з метою: зменшення розмірів (регресії) збільшеної залози, поліпшення відтоку сечі та зменшення симптомів, пов'язаних з ДГПЗ; зниження ризику виникнення г.затримки сечі та необхідності хірургічного втручання, у тому числі трансуретрорезекції передміхурової залози і простатектомії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос; рекомендована доза - 5 мг 1 р/день^{БНФ}; можна застосовувати як монотерапію у комбінації з α -блокатором доксазозином; термін лікування визначається індивідуально, для оцінки ефективності дії необхідно принаймні шестимісячний прийом препарату, після чого необхідно продовжити лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції підвищеної чутливості, такі як ангіоедема (в т. ч. набряк губ, язика, горла і обличчя), зниження лібідо, зниження лібідо, що може продовжитись після припинення терапії, депресія, тривожність, прискорене серцебиття, підвищений рівень ферментів печінки, висип, свербіж, кропив'янка, імпотенція, розлад еякуляції, болочість та збільшення молочних залоз, біль у яєчках, гематоспермія, статеві розлади (еректильна дисфункція та розлади еякуляції), які можуть тривати після припинення лікування; чоловіче безпліддя та/або порушення якості сперми (про нормалізацію або покращення якості сперми повідомлялося після припинення прийому фінастериду), зменшення еякуляту.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищення чутливості до фінастериду або до будь-якого компонента ЛЗ; діти, жінки; вагітність.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АДЕНОСТЕРИД-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контр. якості, випуск серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії вир-ва, контр. якості), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№10x3	11,60	
	ПРОСТАН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	5мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПРОСТАН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	5мг	№10x3	5,33	

II. БІНФІН	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№15x2	відсутня у реєстрі ОВЦ
ПЕНЕСТЕР®	ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка	табл., в/о у бл.	5мг	№30 (15x2)	відсутня у реєстрі ОВЦ
ПРОСКАР®	АІАС Інтернешнл Фарма, ТОВ (вир-к нерозфас. прод.)/ Мерк Шарп і Доум Лімітед (перв. пак.)/ Мерк Шарп і Доум Б.В. (втор. пак., випуск серії), США/Велика Британія/ Нідерланди	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОВЦ
ФІНПРОС	КРКА, д.д., Ново место (перв. та втор. пак., контр. серії та випуск серії)/Інтас Фармасьютикалз Лімітед (вир-во "in bulk", перв. та втор. пак.), Словенія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№10x3, №10x9, №14x2	відсутня у реєстрі ОВЦ

• **Дутастерид (Dutasteride)**

Фармакотерапевтична група: G04CB02 - засоби, що застосовуються при ДГПЗ; інгібітори тестостерон-5 α -редуктази.

Основна фармакотерапевтична дія: подвійний інгібітор 5 α -редуктази, що гальмує тип 1 та тип 2 ізоферментів 5 α -редуктази, які відповідають за перетворення тестостерону на 5 α -дигідротестостерон; андроген, який відповідає за гіперплазію тканини передміхурової залози.

Показання для застосування ЛЗ: лікування симптомів середнього та тяжкого ступеня ДГПЗ^{БНФ}; зменшення ризику виникнення г. затримки сечі та у разі необхідності хірургічного втручання у хворих з симптомами середнього та тяжкого ступеня ДГПЗ.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос, самостійно або у комбінації з α -блокатором - тамсулозином (0,4 мг); ^{БНФ} рекомендована доза для дорослих чоловіків - 0,5 мг/добу, застосовувати не менше 6 міс ^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: імпотенція, зміна (зниження) лібідо; порушення еякуляції; захворювання молочної залози, СН, АР, висипання, свербіж, кропив'янка, локалізований набряк та ангіоневротичний набряк, депресія, алопеція, гіпертрихоз, тестикулярний біль та набряк.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до дутастериду, інших інгібіторів 5 α -редуктази, сої, арахісу або інших компонентів ЛЗ; жінкам та дітям; хворим з тяжкою ПН.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,5 мг.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II. АВОДАРТ	ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А., Польща	капс. м'які желат. у бл.	0,5мг	№10x3, №10x9	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АДЕНОКС	Олів Хелтхкере, Індія	капс. м'які желат. у бл.	0,5мг	№30 (10x3)	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ДУТАСТЕРИД-ВІСТА	ГАЛЕНІКУМ ХЕЛС, С.Л. (дільниця, що відпов. за контр. якості (фіз.-хім.), випуск серії)/ ЦИНДЕА ФАРМА, С.Л. (дільниця, що відпов. за вир-во, перв. та втор. пак., фіз.-хім. та мікробіологічний контр. якості, вип. серії, Іспанія/Іспанія	капс. м'які у бл.	0,5мг	№10x9	15,56	31,59/€
ДУТАСТЕРИД-ВІСТА	ГАЛЕНІКУМ ХЕЛС, С.Л. (дільниця, що відпов. за контр. якості (фіз.-хім.), вип. серії)/ ЦИНДЕА ФАРМА, С.Л. (дільниця, що відпов. за вир-во, перв. та втор. пак., фіз.-хім. та мікробіологічний контр. якості, випуск серії, Іспанія/Іспанія	капс. м'які у бл.	0,5мг	№10x3	16,33	31,59/€
ДУТРИС	КРКА, д.д., Ново место (втор. уп., контр. та вип. серії) /Лабораторіос Леон Фарма, С.А., (вир-во "in bulk", перв. та втор. уп., контр. та вип. серії)/ ЛАБОРАТОРІО ДР. Ф. ЕЧЕВАРНЕ АНАЛІСІЗ, С.А. (контр. серії)/ ВЕССЛІНГ Угорщ, Словенія/Іспанія	капс. м'які у бл.	0,5мг	№10x3, №10x9, №15x2, №15x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	

НОРМОПРОСТ	АЛКАЛОЇД АД Скоп'є (вир-к, відпов. за вип. серії)/ ЛАБОРАТОРІОС ЛЕОН ФАРМА, С.А. (вир-во нерозфас. прод., перв. та втор. пак., контр. якості)/ АТДІС ФАРМА, С.Л. (втор. пак. (альтернативні вир-ки))/ МАНАНТІАЛ, Республіка Македонія/Іспанія	капс. м'які у бл.	0,5мг	№15x2	відсутня у реєстрі ОВЦ
ПРОСТІД	Олів Хелскер, Індія	капс. м'які у бл.	0,5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ
СТРИДАРТ	СТРАЙДС ФАРМА САЙЕНС ЛІМІТЕД, Індія	капс. м'які жел.у бл., у конт.	0,5мг	№10 (10x1), №30 (30x1), №90 (90x1)	відсутня у реєстрі ОВЦ

12.1.4. Засоби для лікування раку нирки

Частка пацієнтів з пухлинами нирки складає 2-3 % в структурі онкологічних захворювань. Нирково-клітинна карцинома є найбільш поширеною пухлиною, досягаючи 90 % від всіх випадків. Чоловіки хворіють в 1,5 рази частіше ніж жінки, з піком захворюваності у віковому проміжку з 60 до 70 років.

Основним методом лікування локалізованих форм пухлин нирки є хірургічний, що включає органозберігаючі та органовиносні оперативні втручання. У випадках поширеного нирково-клітинного раку згідно даних рекомендацій EAU та NCCN можливе використання ад'ювантної системної терапії. До препаратів системної терапії відносяться імунотерапевтичні ЛЗ (інтерферон- α , інтерлейкін-2, що представлені в розділі 18 «Імуномодулятори та протиалергічні засоби») та таргетні ЛЗ. Препарати таргетної терапії, в свою чергу, розділені на 2 групи: інгібітори VEGFR (сорафеніб, сунітініб, пазопаніб, акситиніб, бевацизумаб) та mTOR, що представлені в розділі 19 *"ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ"*. Препаратами першої лінії таргетної терапії вважають інгібітори VEGFR.

При прогресії захворювання проводиться заміна таргетного препарату на інгібітор mTOR або інший інгібітор VEGFR. На сьогоднішній день проводиться розробка нових препаратів для ад'ювантної системної терапії нирково-клітинного раку, що відносяться групи імунотерапевтичних (моноклональні антитіла, інгібітори PD-1 рецепторів, кластерів диференціювання 20 та 52, та інші).

12.1.5. Засоби для лікування раку сечового міхура

Рак сечового міхура займає 9 місце серед найбільш поширених злоякісних новоутворень. Пухлини сечового міхура зустрічаються в 3,8 рази частіше у чоловіків в порівнянні з жінками. Фактором ризику виникнення раку сечового міхура достовірно є тютюнопаління. У випадках поверхневого раку сечового міхура (Ta, Tis, T1) пацієнти підлягають ендоскопічному видаленню пухлини, шляхом трансуретральної резекції з подальшою внутрішньоміхуровою імунотерапією або хіміопрофілактикою. До препаратів внутрішньоміхурової імунотерапії відноситься вакцина БЦЖ-вакцина; хіміотерапії – доксорубіцин, мітоміцин С (див. розділ *"ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ"*).

У випадках локалізованих м'язово-інвазивних форм раку сечового міхура золотим стандартом залишається радикальна цистектомія. Вибір методу деривації сечі ґрунтується на локалізації та об'ємі враження сечового міхура, наявності чи відсутності враження задньої уретри, уретерогіднефрозу, психо-емоційному стані пацієнта та ін.

У випадках поширеного раку сечового міхура, згідно рекомендацій EAU та NCCN, пацієнти підлягають хіміотерапії. Стандартними схемами хіміотерапії є Гем-Цист (гемцитабін, цисплатин) та MVAC (метотрексат, вінбластин, доксорубіцин, цисплатин) (див. розділ *"ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ"*). Схема Гем-Цист, згідно даних клінічних досліджень, володіє меншою токсичністю та кращими онкологічними результатами.

Перспективним напрямком системної терапії раку сечового міхура є імунотерапія з використанням моноклональних антитіл, що блокують хімічні ланки порушення апоптозу.

12.1.6. Засоби для лікування раку передміхурової залози

Рак передміхурової залози найбільш часто зустрічаємо пухлина серед чоловічого населення. Підвищення рівнів виживаності у групі даної нозології в першу чергу пов'язане з розвитком скринінгових методів, ростом числа оперативних втручань та появою нових ефективних фармацевтичних груп препаратів.

Золотим стандартом лікування локалізованих форм раку передміхурової залози є лапароскопічна радикальна простатектомія. Аналогом оперативному лікуванню локалізованих пухлин передміхурової залози є променева терапія, проте вона володіє меншою ефективністю та гіршими показниками якості життя. Використання променевої терапії можливе також в ад'ювантному режимі після оперативного втручання. Аналогами оперативному втручання та променевої терапії може слугувати активне спостереження.

Для досягнення максимальної антиандрогенної блокади зазвичай використовують комбінацію агоністів/антагоністів ЛГРГ та не стероїдних анти андрогенів (див. розділ *"ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ"*).

За умови неефективності гормональної терапії стандартами лікування передбачено проведення хіміотерапії препаратами таксанового ряду – доцетаксел, кабазітаксел в комбінації з преднізолоном (див. розділ *"ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ"*).

За умови подальшої прогресії захворювання на фоні приведеної терапії згідно стандартів EAU та NCCN можливе також використання ензалутаміду або абіратерону.

Враховуючи часте враження раком передміхурової залози кісткової тканини, пацієнти досить часто потребують використання препаратів золендронової к-ти (див. розділ *"ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ"*).

ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ") або моноклональних антитіл, що впливають на RANKL рецептори (деносумаб), тим самим подовжуючи проміжок часу до настання кісткових подій (див. розділ "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ").

12.1.7. Засоби для лікування раку яєчка

Пухлини яєчка найбільш часто зустрічаються серед чоловічого населення віком 30-40 років. Активність пухлини та студіювання проводиться з урахуванням поширеності пухлини та рівнів онкомаркерів (АФП, ХГЧ, ЛДГ). Стандартом лікування є хірургічне видалення первинного вогнища (пахова орхфунікулектомія). Необхідність проведення хіміо- або променевої терапії визначається згідно даних гістологічного дослідження та поширеності процесу. До першої лінії хіміотерапії відноситься хіміотерапія по схемі ВЕР (блеоміцин, етопозид, цисплатина). За умови рецидиву захворювання або розвитку рефрактерності можливе використання наступних схем: PEI\VIP (цисплатин, етопозид, іфосфамід), TIP (паклітаксел, іфосфамід, цисплатина), VEIP (вінбластин, іфосфамід, цисплатина) (див. розділ "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ").

12.1.8. Засоби для лікування раку статевого члена

Рак статевого члену є відносно рідкісним онкологічним захворюванням, проте характеризується високим рівнем злоякісності. За умови наявності локалізованих форм захворювання, стандартом лікування є оперативне (резекція або ампутація статевого члену). Променева терапія зазвичай використовується у випадках регіонарного метастазування в пахові лімфовузли. За умови регіонарного метастазування також можливе проведення регіонарної лімфаденектомії. Системна хіміотерапія зазвичай використовується у випадках поширеного раку статевого члену. До хіміотерапевтичних препаратів, активних по відношенню до раку статевого члена відносяться цисплатин, 5-FU, доцетаксел, паклітаксел. (див. розділ "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ").

12.1.9. Засоби для лікування функціональних нейрогенних порушень сечовипускання

12.1.9.1. Вегетотропні лікарські засоби

12.1.9.1.1. Антихолінергічні засоби

- **Оксибутинін (Oxybutynin)**

Фармакотерапевтична група: G04BD04 - засоби, що застосовуються в урології; спазмолітики, які діють на сечовивідні шляхи.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить пряму спазмолітичну дію на гладком'язові волокна детрузора, антихолінергічну дію, блокує вплив ацетилхоліну на М-холінорецептори гладких м'язів; спричиняє розслаблення детрузора сечового міхура; у пацієнтів з нестабільним сечовим міхуром збільшує об'єм сечового міхура і зменшує частоту спонтанних скорочень детрузора.

Показання для застосування ЛЗ: дорослі - нетримання сечі, імперативні позиви або прискорене сечовипускання при нестабільності ф-ції сечового міхура внаслідок нейрогенної дисфункції сечового міхура^{БНФ} (гіперрефлексії детрузора), що спостерігається при таких захворюваннях, як розсіяний склероз та spina bifida, або внаслідок ідіопатичної нестабільності ф-ції детрузора (моторне ургентне нетримання сечі); контроль гіперактивності сечового міхура, що виникає після хірургічних операцій на сечовому міхурі або передміхуровій залозі або при супутньому циститі; діти^{БНФ} - нетримання сечі, імперативні позиви або прискорене сечовипускання при нестабільності ф-ції сечового міхура^{БНФ} внаслідок ідіопатичної гіперактивності сечового міхура або нейрогенної дисфункції сечового міхура^{БНФ} (гіперактивності детрузора); нічний енурез, пов'язаний з гіперактивністю детрузора^{БНФ}, у поєднанні з немедикаментозним лікуванням, у випадку неефективності іншої терапії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос; для дорослих звичайна доза - 5 мг 2-3 р/добу, МДД - 5 мг 4 р/добу; для дітей старше 5 років звичайна доза - 2,5 мг 2 р/добу, дозу можна підвищити до 5 мг 2-3 р/добу^{БНФ} для отримання клінічного ефекту за умови доброї переносимості побічних ефектів; при нічному енурезі останню дозу приймати перед сном; пацієнтам літнього віку з обережністю застосовувати 2,5 мг 2 р/добу; дозу можна підвищити до 5 мг 2 р/добу для отримання клінічного ефекту за умови доброї переносимості побічних ефектів^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекція сечовивідних шляхів, запор, нудота, сухість у роті; діарея, блювання; відчуття дискомфорту у ділянці живота, анорексія, погіршення апетиту, дисфагія; гастроєзофагеальний рефлюкс, псевдонепрохідність у пацієнтів з факторами ризику (літній вік або пацієнти із запором, які застосовують інші ЛЗ, що знижують моторику кишечника), сплутаність свідомості; ажитація, тривожність, галюцинації, кошмарні сновидіння, параноя, порушення когнітивної ф-ції у пацієнтів літнього віку, симптоми депресії, залежність (у пацієнтів з наявністю в анамнезі залежності від ЛЗ та інших речовин, що спричиняють залежність), дезорієнтація, делірій, запаморочення, головний біль, сонливість; порушення когнітивної ф-ції, судоми, тахікардія, аритмія, тепловий удар, с-м сухого ока, закритокутова глаукома, мідріаз, підвищення ВТ, порушення зору, затримка сечі; дизурія, припливи (більше виражені у дітей, ніж у дорослих), сухість шкіри; ангіоневротичний набряк, шкірні висипання, кропив'янка, гіпогідроз, фоточутливість, гіперчутливість.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до оксибутиніну або до будь-якого з інших компонентів ЛЗ; міастенія гравіс; вузькокутова глаукома або мілка передня камера ока; пацієнти з гарячкою або за умови підвищеної t⁰ навколишнього середовища, ч/з ризик провокування гіперпірексії; дитячий вік до 5 років; езофагеальна дисфункція, включаючи грижу стравохідного отвору; функціональна або органічна ШК непрохідність, у т. ч. пілоростеноз, паралітична непрохідність кишечника, атонія кишечника; пацієнти з ілеостомією, колостомією, токсичним мегаколоном; тяжким виразковим колітом; з обструкцією сечовивідних шляхів, коли затримка сечовипускання може загостритися (з гіпертрофією передміхурової залози).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 15 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	СИБУТІН	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x3	16,28	
II.	ДРИПТАН®	Рецифарм Фонтен, Франція	табл. у бл.	5мг	№30x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

● **Толтеродин (Tolterodine)**

Фармакотерапевтична група: G04BD07 - препарати для лікування підвищеної частоти сечовипускань та нетримання сечі.

Основна фармакотерапевтична дія: специфічний конкурентний антагоніст мускаринових рецепторів із селективною дією (дія на сечовий міхур більш виражена, ніж на слинні залози); один із метаболітів толтеродину (5-гідроксиметильне похідне толтеродину) має фармакологічний профіль, аналогічний до вихідної сполуки; у пацієнтів з прискореним (інтенсивним) метаболізмом цей метаболіт значно підсилює терапевтичний ефект толтеродину.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування підвищеної активності сечового міхура з частими імперативними позивами до сечовипускання та/або нетриманням сечі^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза для дорослих та пацієнтів літнього віку - 2 мг 2 р/день^{БНФ}; у випадку появи небажаних побічних реакцій дозу можна зменшити до 2 мг/добу, враховуючи індивідуальну переносимість препарату^{БНФ}; застосування одночасно з інгібіторами СYP3A4 (кетоконазол): рекомендована добова доза - 2 мг/добу (по 1 мг 2 р/добу); ефект лікування оцінювати через 2-3 міс.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: бронхіт, р-ції підвищеної чутливості при відсутності іншої верифікації, анафілактоїдні р-ції, знервованість; сплутаність свідомості, галюцинації, дезорієнтованість, головний біль; запаморочення, сонливість, парестезії; порушення пам'яті, сухість слизових оболонок ока, порушення функції зору, в тому числі порушення акомодації, вертиго, серцебиття; тахікардія, СН, порушення серцевого ритму, припливи, сухість слизових оболонок рота; розлади травлення, запори, біль у ділянці живота, здуття живота, нудота, діарея; ГЕРХ, сухість шкіри, ангіоневротичний набряк, дизурія, затримка сечі, підвищена втомлюваність, біль у грудях, периферичні набряки, підвищення маси тіла, випадки загострення симптомів деменції (сплутаність, дезорієнтованість, хибні уявлення) у пацієнтів, які застосовували інгібітори холінерастери з метою лікування деменції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до толтеродину або до допоміжних речовин ЛЗ; затримка сечовипускання; неконтрольована закритокутова глаукома; міастенія гравіс; виразковий коліт тяжкого ступеня; токсичний мегаколон.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	УРОТОЛ®	ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка	табл., в/о у бл.	2мг	№28 (14x2), №56 (14x4)	відсутня у реєстрі ОВЦ	

● **Соліфенацин (Solifenacin)**

Фармакотерапевтична група: G04BD08 - засоби, що застосовуються в урології; засоби для лікування частого сечовипускання та нетримання сечі.

Основна фармакотерапевтична дія: конкурентний, специфічний антагоніст холінергічних рецепторів переважно M₃ підтипу; має слабку спорідненість з іншими рецепторами і тестованими іонними каналами.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування ургентного (імперативного) нетримання сечі та/або частого сечовипускання^{БНФ}; ургентних (імперативних) позивів до сечовипускання^{БНФ}, характерних для пацієнтів із с-мом гіперактивного сечового міхура.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза для дорослих - 5 мг 1 р/добу; доза може бути підвищена до 10 мг 1 р/добу^{БНФ}; при застосуванні потужних інгібіторів цитохрому P450 3A4: при одночасному прийомі з потужними інгібіторами ізоформи цитохрому СYP3A4 (ритонавіру, нелфінавіру, ітраконазолу, кетоконазолу): МДД - 5 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції сечовивідних шляхів, цистит; анафілактична р-ція, зниження апетиту, гіперкаліємія, галюцинації, сплутаність свідомості, марення, сонливість, порушення смаку, запаморочення, головний біль, нечіткість зору, сухість очей, глаукома, torsades de pointes, подовження інтервалу QT на електрокардіограмі, фібриляція передсердь, відчуття серцебиття, тахікардія, сухість слизової оболонки носової порожнини, дисфонія, сухість у роті, запор, нудота, диспепсія, біль у животі, гастроєзофагеальний рефлюкс, сухість у глотці, непрохідність товстого кишечника, копростаз, блювання, кишкова непрохідність, абдомінальний дискомфорт, порушення ф-цій печінки, сухість шкіри, свербіж, висипання, мультиформна еритема, кропив'янка, набряк Квінке, м'язова слабкість, утруднене сечовипускання, затримка сечовипускання, НН, підвищена втомлюваність, периферичний набряк.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до соліфенацину або до будь-якої з допоміжних речовин; затримка сечовипускання; тяжкі ШК захворювання (включаючи токсичний мегаколон); міастенія гравіс, закритокутова глаукома та пацієнти із ризиком розвитку цих станів; проведення ГД; тяжка ПН чи НН; пацієнти з ПН середнього ступеня тяжкості, які перебувають на лікуванні активними інгібіторами цитохрому СYP3A4 (кетоконазолом).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НІГІСЕМ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	5 мг	№10x3	8,00	
	НІГІСЕМ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	10 мг	№10x3		відсутня у реєстрі ОВЦ
	СОЛІЦИН	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (пак. із форми in bulk вир-ка "Genepharm SA", Греція), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг	№10x1, №10x3		відсутня у реєстрі ОВЦ
II.	ВЕЗИКАР™	Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нідерланди	табл., вкриті п/о у бл.	5 мг	№10x3	11,68	29,20/€
	ВЕЗИКАР™	Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нідерланди	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг	№10x1, №10x3		відсутня у реєстрі ОВЦ
	СОЛЕЦИСТ	ЛАБОРАТОРІОС ЛЕСВІ, С.Л. (вир-во "in bulk", перв. та втор. пак., контр. якості, відпов. за вип. серії)/ МІКРО-БІОС, СЛ (мікробіологічне тестування (альтернативно)), Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг	№15x2		відсутня у реєстрі ОВЦ
	СОЛІФЕНАЦИН КСАНТІС	Санека Фармасьютикалз АТ, Словачька Республіка	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг	№10x3, №10x10		відсутня у реєстрі ОВЦ

12.1.9.1.2. Холіноміетики

- **Метоклопрамід (Metoclopramide)** * (див. п. 3.5. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Неостигмін (Neostigmine)** * (див. п. 6.6.1. розділу "НЕВРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Іпідакрин (Ipidacrin)** (див. п. 6.6.1. розділу "НЕВРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.1.9.2. Міорелаксанти центральної дії

- **Діазепам (Diazepam)** * (див. п. 5.3.1. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЛІКУВАННІ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ")

12.1.9.3. Трициклічні антидепресанти

- **Іміпрамін (Imipramine)** (див. п. 5.5.1. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЛІКУВАННІ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ")

12.1.9.4. Антидіуретичний гормон

- **Десмопресин (Desmopressin)** (див. п. 7.6.2.3. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.1.10. Засоби для лікування порушень видільної функції нирки

- **Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)** * (див. п. 2.9.2. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Спіронолактон (Spironolactone)** * (див. п. 2.9.4. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Фуросемід (Furosemide)** * (див. п. 2.9.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.2. Андрологія, сексопатологія. Лікарські засоби

12.2.1. Протимікробні та антисептичні засоби

12.2.1.1. Антибіотики

- **Натаміцин (Natamycin)** (див. п. 17.4.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Хлорамфенікол (Chloramphenicol)** * (див. п. 17.2.8. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Кліндаміцин (Clindamycin)** * (див. п. 17.2.5. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

12.2.1.2. Похідні хіноліну

- **Хлорхінальдол (Chlorquinaldol)** (див. п. 11.1.2. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Декваліній (Dequalinium)** ** (див. п. 11.1.2. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.2.1.3. Похідні імідазолу

- **Метронідазол (Metronidazole)** * (див. п. 17.2.9., п. 17.6.3., п. 17.6.5. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Клотримазол (Clotrimazole)** * ** (див. п. 9.1.3.2. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Міконазол (Miconazole)** * ** (див. п. 9.1.3.2. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Еконазол (Econazole)** ** (див. п. 9.1.3.2. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Сертаконазол (Sertaconazole)** (див. п. 11.1.4. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.2.1.4. Інші антимікробні та антисептичні засоби

- **Ніфурател (Nifuratel)** (див. п. 11.1.5. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Фуразолідон (Furazolidone)** (див. п. 17.2.12. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Хлоргексидин (Chlorhexidine)** * ** (див. п. 9.1.4. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: профілактика венеричних захворювань (сифіліс, гонорея, трихомоніаз).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: з метою профілактики венеричних захворювань помочитися, вимити руки і статеві органи; у зовнішній отвір сечовивідного каналу ввести носик насадки, щільно притиснути його до стінки сечовивідного каналу і видавити 1,5 - 3 мл р-ну (для чоловіків) або 1 - 1,5 мл р-ну (для жінок); потім, не розтуляючи пальців, витягнути насадку із сечовивідного каналу, а р-н затримати 2 - 3 хв; р-ном, що залишився, жінкам обприскати вагіну, після процедури рекомендується не мочитися 2 год, антисептична обробка шкіри та слизових хлоргексидином ефективна, якщо вона проведена не пізніше 2 год після статевого акту.

- **Повідон йод (Povidone-Iodine)** * ** (див. п. 9.1.4. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.2.2. Інші засоби, що застосовуються в андрології

12.2.2.1. Інгібітори пролактину

- **Бромокриптин (Bromocriptine)** (див. п. 11.5.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Каберголін (Cabergoline)** (див. п. 11.5.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.2.3. Протизапальні засоби

- **Ібупрофен (Ibuprofen)** * ** (див. п. 8.7.1.2. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Напроксен (Naproxen)** ^[ПМД] ^[тільки таблетки по 550 мг]

Фармакотерапевтична група: M01AE02 - нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби; похідні пропіонової к-ти.

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальний, знеболювальний, жарознижувальний, антиагрегантний засіб з групи НПЗЗ; знижує активність циклооксигенази, у результаті чого порушується синтез простагландинів та їх рівні зменшуються у різних рідинах та тканинах організму.

Показання для застосування ЛЗ: мігрень, зубний біль; менструальний біль ^{БНФ}; біль після ушкоджень (розтягнення зв'язок, забиття, перенавантаження ^{БНФ}); біль після хірургічного втручання (у травматології, ортопедії, гінекології, стоматології); ревматичні захворювання (РА, остеоартрит, анкілозуючий спондилоартрит та подагра) ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: звичайна щоденна доза для зменшення болю - 550- ^{БНФ} 1100 мг, початкова доза - 550 мг, пізніше у разі необхідності, її можна збільшити до 1100 мг/добу, у наступні дні звичайною дозою є 275 мг 3-4 р/добу кожні 6-8 год; при перших ознаках мігрені призначити дозу 825 мг та у разі необхідності ч/з 30 хв - додаткову дозу від 275 мг до 550 мг, зняття болю та спазмів при менструації: початкова доза - 550 мг, наступним прийомом є прийом 275 мг у разі необхідності, денна доза не повинна перевищувати 1375 мг ^{БНФ}; г.напад подагри: початкова доза - 825 мг, далі прийом по 275 мг кожні 8 год до припинення нападів та допоки денна доза не перевищуватиме 1375 мг; початкова доза при ревматичних захворюваннях (РА, остеоартрит, анкілозуючий спондилоартрит) - від 550 мг до 1100 мг ^{БНФ} та розподілена на прийоми вранці та ввечері; для пацієнтів із сильним болем уночі або зі скованістю рухів вранці, для пацієнтів, які змінюють прийом високих доз інших протизапальних препаратів на напроксен, та для пацієнтів з артрозом, коли біль є головним симптомом, початкова щоденна доза - 825-1375 мг, лікування продовжувати щоденними дозами 550-1100 мг, розподіленими на 2 прийоми.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: еозинофілія, гранулоцитопенія, лейкопенія, тромбоцитопенія, апластична анемія, гемолітична анемія, р-ція гіперчутливості, анафілактичні р-ції, головний біль, вертиго, запаморочення, сонливість, депресія, порушення сну, нездатність зосередитись, безсоння, слабкість, асептичний менінгіт, когнітивні розлади, судоми, аномальні сновидіння, шум у вухах, порушення слуху, погіршення слуху, порушення зору, помутніння рогівки, папіліт, ретробульбарний неврит, набряк сосочка зорового нерва, набряк легень, відчуття серцебиття, застійна СН, васкуліт, диспное, еозинофілія пневмонія, агранулоцитоз, астма, набряк легень, гіперглікемія, гіпоглікемія, запор, біль у животі, нудота, диспепсія, діарея, стоматит, виразковий стоматит, утворення ШК виразок, ШК кровотечі та/або перфорація шлунка, блювання, блювання з кров'ю, мелена, езофагіт, панкреатит, коліт, підвищений рівень ферментів печінки, жовтяниця, гепатит, свербіж, висипання на шкірі, синці, пурпура, алопеція, фоточутливі дерматити, вузликова еритема, червоний плесканий лишай, пустули, СКВ, епідермальний некроліз, поліморфна еритема, р-ції світлочутливості, схожі на хр. гематопорфірію та бульозний епідермоліз, с-м Стівенса-Джонсона, кропив'янка, біль у м'язах та м'язова

слабкість, гломерулонефрит, гематурія, інтерстиціальний нефрит, нефротичний с-м, порушення ф-ції нирок, НН, некроз ниркових сосочків, безпліддя у жінок, спрага, пітливість, порушення менструацій, гіпертермія (озноб і гарячка), ангіоневротичний набряк, гіперкаліємія, підвищення рівня креатиніну, набряки, АГ та СН, пов'язані із прийомом НПЗЗ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до напроксену або до будь-якої допоміжної речовини; підвищена чутливість до саліцилатів та до інших НПЗЗ, що проявляється у вигляді БА, кропив'янки, ринітів та назальних поліпів; г. період або рецидив виразки шлунка або ДПК, крововиливи у ШКТ, тяжка НН (КлКр < 30 мл/хв), ПН або СН; вагітність та період годування груддю.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,5 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НАПРОКСЕН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	550мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НАПРОКСЕН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	550мг	№10x1	7,04	
II.	АНАПРАН ЕС	АТ "Адамед Фарма", Польща	табл. к/р у бл.	250мг, 500мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АНАПРАН ЕС	АТ "Адамед Фарма", Польща	табл. к/р у бл.	250мг	№10x1	10,73	28,22/\$
	АНАПРАН ЕС	АТ "Адамед Фарма", Польща	табл. к/р у бл.	500мг	№10x1	8,02	28,22/\$
	НАЛГЕЗІН®	КРКА, д.д., Ново место (відпов. за вир-во "in bulk", перв. та втор. уп., контр. та вип. серії)/ Юнічем Лабораторіес Лімітед (відпов. за вир-во "in bulk", перв. та втор. уп.), Словенія/ Індія	табл., вкриті п/о у бл.	275мг	№10x2	7,44	29,43/€
	НАЛГЕЗІН®	КРКА, д.д., Ново место (відпов. за вир-во "in bulk", перв. та втор. уп., контр. та вип. серії)/ Юнічем Лабораторіес Лімітед (відпов. за вир-во "in bulk", перв. та втор. уп.), Словенія/ Індія	табл., вкриті п/о у бл.	275мг	№10x1	9,10	29,43/€
	НАЛГЕЗІН® ФОРТЕ	КРКА, д.д., Ново место (відпов. за вир-во "in bulk", перв. та втор. уп., контр. та вип. серії)/ Юнічем Лабораторіес Лімітед (відпов. за вир-во "in bulk", перв. та втор. уп.), Словенія/ Індія	табл., вкриті п/о у бл.	550мг	№10x2	5,44	29,56/€
	НАЛГЕЗІН® ФОРТЕ	КРКА, д.д., Ново место (відпов. за вир-во "in bulk", перв. та втор. уп., контр. та вип. серії)/ Юнічем Лабораторіес Лімітед (відпов. за вир-во "in bulk", перв. та втор. уп.), Словенія/ Індія	табл., вкриті п/о у бл.	550мг	№10x1	6,56	29,56/€
	НАПРОФФ	Біофарма Ілач Сан.ве Тідж. А.Ш./УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	275мг, 550мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НАПРОФФ	Біофарма Ілач Сан.ве Тідж. А.Ш./УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	275мг	№10x1	6,77	26,27/\$
НАПРОФФ	Біофарма Ілач Сан.ве Тідж. А.Ш./УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	550мг	№10x1	6,73	28,12/\$	

• **Бензидамін (Benzydamine)** ** [р-н ваг., гран. 0/вагін. р-ну]

Фармакотерапевтична група: G02CC03 - протизапальні засоби для вагінального введення.

Основна фармакотерапевтична дія: НПЗЗ з анагетичними і протинабряковими властивостями; має антисептичну та місцеву анестезуючу активність.

Показання для застосування ЛЗ: вульвовагініт різного походження, який характеризується невеликими виділеннями з піхви, свербіжем, подразненням, печією і болем у зовнішніх статевих органах; жіноча гігієна у післяпологовий період.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: 1-2 вагінальних спринцювання щодня 7 послідовних днів; для разового зрошення використовують весь об'єм фл. 140 мл або розчинити вміст 1-2 саше в 1 л води. Процедуру проводити лежачи, рідина має залишатися у піхві кілька хв.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: місцева гіперчутливість у вигляді печіння, фоточутливість, подразнення, сонливість, АР (шкірні висипання, свербіж, кропив'янка).

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини або до інших компонентів препарату, до саліцилової кислоти і/або інших НПЗЗ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ТАНТУМ РОЗА®	Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А., Італія	р-н вагін. по 140мл у фл.	0,1%	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТАНТУМ® РОЗА	Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А., Італія	гран. д/вагін. р-ну в саше	500мг	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	

12.2.4. Гормони статевих залоз та лікарські засоби, що застосовуються при патології статевої системи

12.2.4.1. Андростенон та його похідні

- **Тестостерон (Testosterone) ***

Фармакотерапевтична група: G03BA03 - гормони та їх аналоги; андрогени.

Основна фармакотерапевтична дія: синтезується головним чином у яєчках, в меншій кількості - у корі надниркових залоз; відповідає за формування чоловічих статевих ознак під час внутрішньоутробного розвитку, у ранньому дитинстві, а також у період статевого дозрівання, а згодом - за підтримку чоловічого фенотипу та андрогенозалежні ф-ції (сперматогенез, функції придаткових статевих залоз); реалізує інші ф-ції - у шкірі, у тканинах опорно-рухового апарату, нирках, печінці, кістковому мозку та ЦНС; дія тестостерону андрогенна (простата, сім'яні пухирці, придаток яєчка) або протеїно-анаболічна (м'язи, кістки, кровоносна система, нирки, печінка); дія тестостерону у деяких органах виявляється після перетворення у периферичних тканинах тестостерону в естрадіол, який зв'язується з рецепторами естрогенів у ядрах клітин-мішеней (гіпофіза, жирової тканини, мозку, кісток і тестикулярних клітин Лейдига).

Показання для застосування ЛЗ: замісна терапія тестостероном у чоловіків при гіпогонадизмі^{БНФ, ВООЗ}, за умов підтвердження дефіциту тестостерону клінічно та результатами лабораторних методів дослідження.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити глибоко в/м, режим дозування та тривалість лікування, як правило, залежать від індивідуальної р-ції пацієнта на лікування, р-н д/ін'єкц. - 1 р/10-14 тижн. ін'єкцію робити дуже повільно. Гель: рекомендована доза - 40,5 мг тестостерону, яку наносити 1 р/добу, бажано в один і той же самий час, вранці. Добова доза регулюється лікарем індивідуально для кожного пацієнта залежно від клінічного ефекту і результатів лабораторного контролю, але не має перевищувати 81 г гелю/добу. Збільшувати дозу поетапно по 2,5 г гелю. Дозу збільшувати поступово, враховуючи рівень тестостерону в крові вранці перед нанесенням гелю. Рівноважна концентрація тестостерону у крові досягається звичайно на другу добу лікування препаратом. Дозу можна зменшити, якщо концентрація тестостерону у крові виявиться підвищеною; якщо концентрація низька, дозу можна поступово збільшувати, але вона не має перевищувати 81 мг гелю/добу. Терапію припинити, якщо рівні тестостерону у крові постійно перевищують діапазон нормальних значень при застосуванні найнижчої добової дози 20,25 мг (1,25 г гелю) або якщо при застосуванні найвищої дози 81 мг тестостерону (5 г гелю) рівні тестостерону у крові не досягають діапазону нормальних значень.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: поліцитемія, підвищення рівня гематокриту, підвищення рівня еритроцитів, підвищення Hb, підвищена чутливість, збільшення маси тіла, підвищення апетиту, підвищення рівня глікозильованого Hb, гіперхолестеринемія, підвищення рівня триглицеридів у крові, підвищення рівня холестерину у крові, депресія, емоційний розлад, безсоння, неспокій, агресивність, дратівливість, головний біль, мігрень, тремор, припливи, СС розлади, АГ, запаморочення, бронхіт, синусит, кашель, диспное, хропіння, дисфонія, діарея, нудота, відхилення від норми показників ф-ції печінки, підвищення активності аспартатамінотрансферази, акне, алопеція, еритема, висип, свербіж, сухість шкіри, артралгія, біль у кінцівках, м'язові розлади, напруженість м'язів, підвищення рівня креатинфосфокінази у крові, зниження виділення сечі, затримка сечі, патологія сечового тракту, ніктурія, дизурія, підвищення рівня PSA, патологічні зміни при обстеженні простати, ДГПЗ, внутрішньоепітеліальна неоплазія передміхурової залози, ущільнення простати, простатит, розлади з боку передміхурової залози, зміни лібідо, біль у яєчках, ущільнення грудних залоз, біль у грудних залозах, гінекомастія, підвищення рівня естрадіолу, підвищення рівня тестостерону, підвищена втомлюваність, слабкість, гіпергідроз, легенева мікроемболія внаслідок введення маслянистих розчинів.

Протипоказання до застосування ЛЗ: андрогенозалежна карцинома простати або рак грудної залози у чоловіків; пухлини печінки у даний час або в анамнезі; підвищена чутливість до тестостерону або до будь-якого допоміжного компонента препарату, при гіперкальціємії, що супроводжує злоякісні пухлини, не застосовувати жінкам.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 18 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ТЕСТОСТЕРОНУ ПРОПІОНАТ	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. в ампл. по 1мл у пач. та бл.	5%	№5, №10, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕСТОСТЕРОНУ ПРОПІОНАТ	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. в ампл. по 1мл у пач. та бл.	5%	№5x1	16,56	
II.	АНДРОЖЕЛЬ	Безен Меньюфєкчурінг Белджіум СА, Бельгія	гель д/зовн. заст. по 5г у доз. пак.	0,01 г/1 г	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АНДРОЖЕЛЬ	Безен Меньюфєкчурінг Белджіум СА (вир-во за повн. цикл.)/ Лабораторії Безен Інтернешнл (вир-во за повн. Цикл.)/ Куалі Контрол (випроб. контр. якості (мікробіологічний контр)), Бельгія/Франція	гель д/зовн. заст. 88г у фл.з доз. пр.	16,2 мг/1 г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НЕБІДО	Байєр АГ, Німеччина	р-н д/ін'єк. по 4мл у фл.	250 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОМНАДРЕН® 250	Фармзавод Єльфа А.Т., Польща	р-н олійн. д/ін'єк. в ампл. по 1мл	250 мг/мл	№5	7,70	

• **Местеролон (Mesterolone)**

Фармакотерапевтична група: G03BB01 - гормони статевих залоз і препарати, що застосовуються при патологіях статевої сфери.

Основна фармакотерапевтична дія: усуває вплив порушення продукування андрогенів, що виникає з віком, підходить для лікування станів, викликаних недостатнім ендогенним продукуванням андрогенів, стимулює ріст, розвиток і функціонування органів-мішеней, які залежать від андрогенного впливу, сприяє розвитку вторинних статевих ознак при прегубертатних станах андрогенної недостатності, усуває симптоми дефіциту в тих випадках, коли функціонування статевих залоз припиняється після статевого дозрівання, значно поліпшує або нормалізує кількість і якість сперматозоїдів, а також концентрацію фруктози в еякуляті, збільшуючи тим самим можливість зачаття.

Показання для застосування ЛЗ: недостатність андрогенів або чоловіче безпліддя, спричинені первинним або вторинним зниженням ф-ції статевих залоз (гіпогонадізмом) у чоловіків^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос; на початку лікування: 75-100 мг (3 або 4 табл.) / добу протягом кількох міс.; підтримуюча терапія - 50-75 мг (2-3 табл.) / добу^{БНФ}. Гіпогонадізм - для розвитку вторинних статевих 25 -50 мг ЛЗ 3 р/добу протягом кількох місяців; безпліддя - покращення кількісних та якісних характеристик сперматозоїдів - 25 -50 мг/добу застосовувати протягом циклу сперматогенезу, а саме близько 90 днів; підвищення к-ції фруктози у еякуляті при постпубертатній недостатності клітин Лейдинга: 25мг 2 р/добу протягом кількох місяців.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: часті або дуже тривалі ерекції (варто припинити лікування з метою уникнення ушкодження пеніса); АР (можливо уповільнені) та в окремих випадках бронхоспазм.

Протипоказання до застосування ЛЗ: рак передміхурової залози, пухлини печінки в даний час або в минулому, гіперчутливість до местеролону або до будь-якого із компонентів ЛЗ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ПРОВІРОН®	Байєр Ваймар ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина	табл. у бл.	25мг	№20	відсутня у реєстрі ОБЦ	

12.2.4.2. Гонадотропні гормони

- **Хоріонічний гонадотропін (Chorionic gonadotrophin)** (див. п. 11.6.4.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Менопаузальний гонадотропін людини (Human menopausal gonadotrophin)** (див. п. 11.6.4.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Урофолітропін (Urofollitropin)** (див. п. 11.6.4.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Фолітропін альфа (Follitropin alfa)** (див. п. 11.6.4.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Фолітропін бета (Follitropin beta)** (див. п. 11.6.4.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.2.5. Антиандрогени

- **Ципротерон (Cyproterone)** (див. п. 19.2.2.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")

12.2.6. Лікарські засоби для стимуляції статевої дисфункції

12.2.6.1. Адаптогени

- **Елеутерокок (Eleutherococcus senticosus)** ** [екстр.рідк..., екстр.ор.]

Фармакотерапевтична група: А13А - тонізуючі засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: підвищує фізичну та розумову працездатність, гостроту зору, стійкість до несприятливих факторів навколишнього середовища, покращує обмін речовин, чинить незначну стимулюючу гонадотропну та гіпоглікемічну дію; до складу елеутерококу входять елеутерозиди А, В, В₁, С, D, E, F і G, похідні кумарину, флавоноїди, ефірна олія, рослинний віск, смоли, крохмаль та ін. компоненти.

Показання для застосування ЛЗ: фізична і розумова перевтома, неврастенія та психастенія, функціональне виснаження ЦНС, що супроводжується зниженням працездатності, дратівливістю і безсонням; вегетоневрози, післяопераційний період; в комплексній терапії - при г. та хр. променевої хворобі.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос; дорослим по 20-30 крап. 1 р/день, дітям від 12 років із розрахунку 1 крап. на 1 рік життя дитини 1 р/добу, попередньо розвівши невеликою кількістю води, у першій половині дня (до 15 год.); курс лікування - 25-30 днів; при необхідності - повторити ч/з 1-2 тижні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР (почервоніння шкіри, висипання, свербіж); головний біль, збудження, порушення сну, дратівливість, тривожний стан, зниження працездатності; тахікардія, порушення ритму серця, підвищення АТ; спазм м'язів, порушення з боку ШКТ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів ЛЗ, гіпертермічний с-м, АГ, підвищена збудливість, г.інфекційні захворювання, ІМ, аритмії, безсоння, нейроциркуляторна дистонія, гарячка, епілепсія.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕЛЕУТЕРОКОК	ТОВ "ЄВРАЗІЯ", Україна	екстр. рідк. д/перор. заст., спирт. у фл.	30мл, 50мл	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ЕЛЕУТЕРОКОК	АТ "Лубнифарм", Україна	екстр. рідк. д/перор. заст., спирт. у фл.; у бутлі	20кг	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ЕЛЕУТЕРОКОК	АТ "Лубнифарм", Україна	екстр. рідк. д/перор. заст., спирт. у фл.; у бутлі	50 мл	№1	22,50	
	ЕЛЕУТЕРОКОКУ ЕКСТРАКТ	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	екстр. рідк.у фл.	20 мл, 25 мл, 30 мл	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ЕЛЕУТЕРОКОКУ ЕКСТРАКТ	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна	екстр. рідк.у фл.	50 мл	№1	15,42	
	ЕЛЕУТЕРОКОКУ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	екстр.орал.у фл.	50 мл	№1	19,48	
	ЕЛЕУТЕРОКОКУ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ	ТОВ "Тернофарм", Україна	екстр. рідк. у фл. скл. або полім.	50 мл	№1	20,60	

12.2.6.2. Біостимулятори

- **Алое (Aloe)**

Фармакотерапевтична група: А16АХ - засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси.

Основна фармакотерапевтична дія: стимулює обмін речовин, прискорює процеси регенерації, чинить адаптогенну та загальнотонізуючу дію; поліпшує клітинний метаболізм, трофіку та регенерацію тканин, підвищує загальну неспецифічну резистентність організму та стійкість слизових оболонок до дії ушкоджуючих агентів; стимулює захисні ф-ції гранулоцитів, підвищує апетит; підвищує енергетичні запаси у сперматозоїдах та підсилює їхню рухливість.

Показання для застосування ЛЗ: прогресуюча короткозорість, міопічний хоріоретиніт, блефарит, кон'юнктивіт, кератит, ірит, помутніння склоподібного тіла, виразкова хвороба шлунка та ДПК (у складі комплексної терапії).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: п/ш щоденно; дорослим - по 1 мл; МДД - 3-4 мл; дітям 3-5 років - по 0,2-0,3 мл; від 5 років - по 0,5 мл; курс лікування - 30-50 ін'екц.; повторні курси проводять після 2 або 3 міс. перерви.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: відчуття першіння, диспепсія, біль у животі; підвищення АТ; АР, включаючи гіперемію, свербіж, висипання, кропив'янку; запаморочення, відчуття припливу крові до органів малого таза, посилення менструальних кровотеч, відчуття печіння, гіпертермія, зміни у місці введення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до препарату; тяжкі СС захворювання, АГ, г. ШК розлади (у т. ч. діарея), порушення прохідності кишечника (обструкція або стеноз), хв.Крона, виразковий коліт, апендицит, біль у животі нез'ясованого ґенезу, геморої, порушення ф-ції печінки/нирок, ускладнені форми нефрозо-нефриту, дифузний гломерулонефрит, цистит, метрорагія, кровохаркання, холелітіаз, тяжкий стан дегідратації з втратою води та електролітів, вагітність і період годування груддю, діти до 3 років.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АЛОЕ ЕКСТРАКТ	ТОВ "Ф3 "БІОФАРМА", Україна	екст. рідк. д/ін'єк. в амп. у бл.	1:4,7/мл	№5x2	40,98	
	АЛОЕ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ	АТ "Лубнифарм", Україна	екст. рідк. д/ін'єк. в амп. по 1мл	2,25 мг/мл	№10	54,27	
	АЛОЕ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	екст. рідк. д/ін'єк. в амп. у конт. чар/уп.	2,25 мг/мл	№5x2	61,65	

12.2.6.3. Вітаміни

- **Токоферол (Tocopherol)** (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")
- **Кислота аскорбінова (Ascorbic acid)** * ** [тільки таблетки] (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")

12.2.7. Засоби для інтракавернозної терапії

- **Папаверин (Papaverine)** ** [тільки супозиторії] (див. п. 2.7.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.2.8. Засоби, що використовуються для терапії передчасного сім'явиверження

- **Сертралін (Sertralin)** (див. п. 5.5.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЛІКУВАННІ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ")
- **Пароксетин (Paroxetine)** (див. п. 5.5.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЛІКУВАННІ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ")
- **Магнію сульфат (Magnesium sulfate)** * (див. п. 10.5.5. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.2.9. Засоби для лікування еректильної дисфункції

- **Папаверин (Papaverine)** ** [тільки супозиторії] (див. п. 2.7.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Силденафіл (Sildenafil)**

Фармакотерапевтична група: G04BE03 - засоби, що застосовуються при еректильній дисфункції.

Основна фармакотерапевтична дія: при сексуальному збудженні відновлює знижену еректильну ф-цію шляхом посилення притоку крові до пеніса; зумовлює ерекцію, включає вивільнення оксиду азоту у кавернозних тілах під час сексуального збудження; вивільнений оксид азоту активує фермент гуанілатциклазу, що стимулює підвищення рівня циклічного гуанозинмонофосфату (цГМФ), що викликає розслаблення гладкої мускулатури кавернозних тіл, сприяючи притоку крові; потужний та селективний інгібітор цГМФ-специфічної фосфодіестерази 5 (ФДЕ5) у кавернозних тілах, де ФДЕ5 відповідає за розпад цГМФ; ефекти силденафілу на ерекцію мають периферичний характер; не чинить безпосередньої релаксуючої дії на ізольовані кавернозні тіла людини, але потужно посилює розслаблюючу дію NO на дану тканину; при активації метаболічного шляху NO/цГМФ, що відбувається при сексуальній стимуляції, інгібування силденафілом ФДЕ5 призводить до підвищення рівня цГМФ у кавернозних тілах; щоб силденафіл викликав потрібний фармакологічний ефект, необхідне сексуальне збудження.

Показання для застосування ЛЗ: чоловікам із еректильною дисфункцією^{БНФ}, яка визначається як нездатність досягти або підтримати ерекцію статевого члена, необхідну для успішного статевого акту; для ефективної дії потрібне сексуальне збудження.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос; рекомендована доза - 50 мг за год до сексуальної активності; залежно від ефективності та переносимості дозу можна збільшити до 100 мг або знизити до 25 мг, максимальна рекомендована доза - 100 мг; максимальна рекомендована частота застосування - 1 р/добу^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: риніт, гіперчутливість, головний біль, запаморочення, сонливість, гіпестезія, інсульт, транзиторна ішемічна атака, судоми, рецидиви судом, синкопе, порушення сприйняття кольору, розлади зору, затьмарення зору, розлади сльозовиділення, біль в очах, фотофобія, фотопсія, гіперемія очей, яскравість зору, кон'юнктивіт, неартеріальна передня ішемічна нейропатія зорового нерва, оклюзія судин сітківки, ретинальний крововилив, артеріосклеротична ретинопатія, порушення з боку сітківки, глаукома, дефекти поля зору, диплопія, зниження гостроти зору, міопія, астенія, плаваючі помутніння склистого тіла, порушення з боку райдужної оболонки, мідріаз, поява сяючих кілець навколо джерела світла (гало) у полі зору, набряк очей, припухлість очей, порушення з боку очей, гіперемія кон'юнктиви, подразнення очей, аномальна відчуття в очах, набряк повік, знебарвлення склери, запаморочення, дзвін у вухах, глухота, тахікардія, посилене серцебиття, раптова серцева смерть, ІМ, шлуночкова аритмія, фібриляція передсердь, нестабільна стенокардія, припливи крові до обличчя, приливи жару, гіпертензія, гіпотензія, закладеність носа, носова кровотеча, закладеність придаткових пазух носа, відчуття стиснення у горлі, набряк слизової оболонки носа, сухість у носі, нудота, диспепсія, ГЕРХ, блювання, біль у верхній частині живота, сухість у роті, гіпестезія ротової порожнини, висипання, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, міалгія, біль у кінцівках, гематурія, кровотеча зі статевого члена, пріапізм, гематоспермія, подовжена ерекція, біль у грудях, підвищена стомлюваність, відчуття жару, подразнення, підвищена ЧСС, набряк обличчя, р-ції фоточутливості, шок, астенія, біль, раптове падіння, біль у животі, раптове пошкодження, стенокардія, АВ-блокада, мігрень, постуральна гіпотензія, ішемія міокарда, тромбоз судин головного мозку, раптова зупинка серця, порушення результатів на ЕКГ, кардіоміопатія, глосит, коліт, дисфагія, гастрит, гастроентерит, езофагіт, стоматит, порушення результатів

печінкових проб, ректальна кровотеча, гінгівіт, анемія, лейкопенія, спрага, набряк, подагра, нестабільний діабет, гіперглікемія, периферичні набряки, гіперурикемія, гіпоглікемія, гіпернатріємія, артрит, артроз, розрив сухожилля, теносиновіт, біль у кістках, міастенія, синовіт, атаксія, невралгія, нейропатія, парестезія, тремор, вертиго, депресія, безсоння, аномальні сновидіння, зниження рефлексів, астма, диспное, ларингіт, фарингіт, синусит, бронхіт, посилене слиновиділення, посилення кашлю, кропив'янка, герпес, свербіж, пітливість, виразки шкіри, контактний дерматит, екзофіліативний дерматит, раптове зниження чи втрата слуху, біль у вухах, крововилив у око, катаракта, сухість в очах, цистит, ніктурія, підвищена частота сечовипускань, збільшення молочних залоз, нетримання сечі, порушення еякуляції, набряк статевих органів, аноргазмія, вазооклюзивний криз, тривога, транзиторна глобальна амнезія, тимчасова втрата зору, почервоніння очей, печіння в очах, підвищення внутрішньоочного тиску, набряк сітківки, судинні захворювання сітківки чи кровотеча, відшарування склистого тіла, випадки неартеріальної передньої ішемічної нейропатії зорового нерва.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до активної речовини або будь-якої з допоміжних речовин препарату; одночасне застосування із донорами оксиду азоту (амілінітрил) або нітратами у будь-якій формі; одночасне застосування інгібіторів ФДЕ5 (у тому числі силденафілу) зі стимуляторами гуанілатциклази, такими як ріоцигуат; стани, при яких не рекомендована сексуальна активність (тяжкі СС розлади, такі як нестабільна стенокардія або СН тяжкого ступеня), втрата зору на одне око внаслідок неартеріальної передньої ішемічної нейропатії зорового нерва незалежно від того, пов'язана ця патологія із попереднім застосуванням інгібіторів ФДЕ5 чи ні; порушення ф-ції печінки тяжкого ступеня, артеріальна гіпотензія (АТ < 90/50 мм рт. ст.), нещодавно перенесений інсульт або ІМ та відомі спадкові дегенеративні захворювання сітківки, такі як пігментний ретиніт (невелика кількість таких пацієнтів має генетичні розлади фосфодієстераз сітківки),

Визначена добова доза (DDD): перорально - 50 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕРГОС®	ТОВ "Фармацевтична фірма "ФарКоС", Україна	табл. у бл.	50мг	№1x1, №2x1, №4x1, №4x2		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ЕРО-ЛАЙФ®	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка" (пак. із форми in bulk фірми-виробника Дженефарм СА, Греція), Україна	табл. жув. у бл.	25мг, 50мг, 100мг	№1, №2 (2x1), №4 (4x1)		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ЕРО-ЛАЙФ®	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка" (фас. з форми in bulk фірми-виробника Ауробіндо Фарма Лімітед - ЮНІТ VII, Індія), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	50мг, 100мг	№1, №2 (1x2), №4 (1x4)		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ЕРОСИЛ	ТОВ "Астрафарм", Україна	табл. у бл.	50мг	№4x1	33,50	
	ЕРОСИЛ	ТОВ "Астрафарм", Україна	табл. у бл.	50мг	№2x1	37,50	
	ЕРОСИЛ	ТОВ "Астрафарм", Україна	табл. у бл.	50мг	№1x1	47,00	
	ЕРОСИЛ	ТОВ "Астрафарм", Україна	табл. у бл.	100мг	№4x1	24,25	
	ЕРОСИЛ	ТОВ "Астрафарм", Україна	табл. у бл.	100мг	№2x1	28,50	
	ЕРОСИЛ	ТОВ "Астрафарм", Україна	табл. у бл.	100мг	№1x1	35,50	
	ЕРОСИЛ	ТОВ "АСТРАФАРМ" (фас. із "in bulk" фірми-виробника: ПрАТ "Фармацевтична фірма "ФарКоС", Україна), Україна	табл. у бл.	50мг	№4x1	31,00	
ЕРОСИЛ	ТОВ "АСТРАФАРМ" (фас. із "in bulk" фірми-виробника: ПрАТ "Фармацевтична фірма "ФарКоС", Україна), Україна	табл. у бл.	50мг	№2x1	36,00		
ЕРОТОН®	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відпов. за вир-во, перв., втор. пак., контр. та вип. серії)/ ТОВ "Астрафарм" (відпов. за вир-во, перв., втор. пак., контр. якості)/ ПАТ "Вітаміни" (відпов. за вир-во, перв., Україна	табл. у бл.	50мг, 100мг	№1x1, №2x1, №4x1, №4x2		відсутня у реєстрі ОБЦ	
ІНТАГРА® IC	Товариство з додатковою відпов. "ІНТЕРХІМ" (вир-к, відпов. за вип. серії; випроб. контр. якості	табл., в/о у бл.	25мг, 50мг, 100мг	№1x1, №2x1, №2x2		відсутня у реєстрі ОБЦ	

	(фіз./хім., мікробіологічна чистота), зберігання гот. прод.; вир-во, зберігання (гот. прод., сиров.) Україна					
НО-ЛАГ	ТОВ Науково-виробнича фірма "МІКРОХІМ" (юр. адр. та лаб. фіз.-хім. аналізу та контр. вир-ва; вир. ділн. (всі стадії виробн. проц.); лаб. біолог. аналізу), Україна	табл., в/о у бл.	20мг	№10x9	97,22	
ПОТЕНЦІАЛЕ	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	50мг, 100мг	№2x1, №2x2, №1x1, №1x2, №1x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
СИЛДЕНАФІЛ	ТОВ "Фармацевтична фірма "Вертекс" (вир-во з прод. in bulk ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна), Україна	табл., в/о у бл.	25мг, 50мг, 100мг	№1x1, №1x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
СТРОНДЕКС	ТОВ Науково-виробнича фірма "МІКРОХІМ", Україна	спрей д/рот. порож. доз. у фл. по 5мл, 10мл	12,5 мг/доза	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
СУПЕРВІГА 100	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контр. якості, вип. серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії вир-ва, контр. якості), Україна	табл., в/о у бл.	100мг	№1x1, №1x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
СУПЕРВІГА 25	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контр. якості, вип. серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії вир-ва, контр. якості), Україна	табл., в/о у бл.	25мг	№1x1, №1x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
СУПЕРВІГА 50	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контр. якості, вип. серії)/ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії вир-ва, контр. якості), Україна	табл., в/о у бл.	50мг	№1x1, №1x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ТЕГРУМ	ТОВ "Науково-виробнича фірма "МІКРОХІМ", Україна	табл., в/о у бл.	50мг, 100мг	№1x1, №4x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II. АДЕГРА	Грауре Фармасьютікалс ЛТД, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг, 100мг	№4x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ВІАГРА®	Фарева Амбуаз, Франція	табл., вкриті п/о у бл.	25мг, 50мг, 100мг	№1x1, №4x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ВІАГРА® ODT	Фарева Амбуаз, Франція	табл., що дисперг. у рот. порож. н. у бл.	50мг	№2x1, №4x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ВІВАЙРА	Белупо, ліки та косметика, д.д. (втор. пак., відпов. за випуск серії)/ Дженефарм СА (вир-к гот. ЛЗ, перв. пак., контр. якості), Хорватія/Греція	табл. жув. у бл.	50мг, 100мг	№1x1, №4x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ВІЗАРСИН®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	25мг, 50мг, 100мг	№1x1, №2x1, №4x1,	відсутня у реєстрі ОБЦ	

				№4x2, №4x3		
ВІЗАРСИН® Q-TAB®	КРКА, д.д., Ново место (вир-к, відпов. за вир-во "in bulk", перв. та втор. уп., контр. та вип. серії; вир-к, відпов. за перв. та втор. уп.), Словенія	табл., що дисперг. у рот.порожн. у бл.	25мг, 50мг, 100мг	№1x1, №1x2, №4x1, №4x2, №4x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ГРАНПІДАМ/ GRANPIDAM	Аккорд Хелскеа Лімітед (частково вказаним вир-ком (відпов. за вип. серії); частково вказаним вир-ком (контр. якості серії); частково вказаним вир-ком (перв. та втор. пак. додатково))/ Аккорд Хелскеа Польска Сп. з.о.о. (частко, Велика Британія/Польща/Угорщина /Індія/ Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№10x9	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ДЖЕНАГРА® 100	Дженом Біотек Пвт. Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№1, №4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ДЖЕНАГРА® 25	Дженом Біотек Пвт. Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№1, №4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ДЖЕНАГРА® 50	Дженом Біотек Пвт. Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№1, №4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЕРОТЕКС ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ	Актавіс Лтд., Мальта	табл., вкриті п/о у бл.	50мг, 100мг	№1x1, №4x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ІГРА®	Дженефарм СА, Греція	табл. жув. у бл.	50мг, 100мг	№1x1, №4x1, №4x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ІНФОРС	Санека Фармасьютикалз АТ, Словацька Республіка	табл., вкриті п/о у бл.	50мг, 100мг	№4x1, №10x1, №4x2, №10x2, №4x3, №1x1, №4x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КОНЕГРА ДЕЛЮКС	Генефарм СА, Греція	табл. жув. у бл.	50мг, 100мг	№1x1, №4x1, №4x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КОНЕГРА® КЛАСІК	Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	табл., вкриті п/о у бл.	25мг, 50мг, 100мг	№1x1, №4x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МАКСІГРА	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польща	табл., вкриті п/о у бл.	50мг, 100мг	№1x1, №4x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МОГИНИН®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№4 (4x1)	22,50	23,98/\$
МОГИНИН®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№1 (1x1)	30,00	23,98/\$
МОГИНИН®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№4 (4x1)	18,00	23,98/\$
МОГИНИН®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№1 (1x1)	24,00	23,98/\$
НОВАГРА 100	Марксанс Фарма Лтд, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№1x1, №2x1, №4x1, №4x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НОВАГРА 50	Марксанс Фарма Лтд, Індія	табл., вкриті п/о	50мг	№1x1, №2x1,	відсутня у реєстрі ОБЦ	

		у бл.		№4x1, №4x2		
НОВАГРА НЕО	ФДС Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг, 100мг	№1x1, №2x1, №4x1, №4x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РЕВАЦИО	Фарева Амбуаз, Франція	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№15x6	340,55	25,91/\$
СИЛАГРА	Актавіс Лтд., Мальта	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№4x1	35,05	26,82/\$
СИЛАГРА	Актавіс Лтд., Мальта	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№1x2	39,51	26,82/\$
СИЛАГРА	Актавіс Лтд., Мальта	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№1x1	48,93	26,82/\$
СИЛАГРА	Актавіс Лтд., Мальта	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№4x1	26,51	26,82/\$
СИЛАГРА	Актавіс Лтд., Мальта	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№1x2	29,74	26,82/\$
СИЛАГРА	Актавіс Лтд., Мальта	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№1x1	35,84	26,82/\$
СИЛДЕНАФІЛ 100 АНАНТА	Гетеро Лабз Лімітед/Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№4x1	18,47	28,14/\$
СИЛДЕНАФІЛ 50 АНАНТА	Гетеро Лабз Лімітед/Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№4x1	24,76	28,14/\$
СИЛДЕНАФІЛ МАКЛЕОДС	Маклеодс Фармасьютікалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.; у фл.	20мг	№10x10	121,50	26,59/\$
СИЛДЕНАФІЛ МАКЛЕОДС	Маклеодс Фармасьютікалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.; у фл.	20мг	№90	121,50	26,59/\$
СИЛДОКАД	Джубілант Дженераікс Лімітед, Індія	табл., в/о у бл.	25мг, 50мг, 100мг	№4x1, №10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
СІГРА	Бафна Фармасьютікалс Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг, 100мг	№1x1, №4x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
СІНЕГРА	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	25мг, 50мг, 100мг	№4x1, №1x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ФАКЕЛ®	Дженефарм СА, Греція	табл. жув. у бл.	50мг, 100мг	№1x1, №2x1, №4x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ФІЛАП	Сан Фармасьютікал Індастріз Лімітед, Індія	табл., в/о у бл.	50мг, 100мг	№1x1, №4x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Тадалафіл (Tadalafil)**

Фармакотерапевтична група: G04BE08 - засоби для лікування порушень ерекції.

Основна фармакотерапевтична дія: селективний оборотний інгібітор циклічного гуанозинмонофосфату (цГМФ) - специфічної фосфодіестерази типу ФДЕ 5; коли сексуальна стимуляція спричиняє локальне вивільнення оксиду азоту, інгібування ФДЕ 5 тадалафілом продукує підвищені рівні цГМФ у печеристому тілі; призводить до релаксації гладких м'язів і припливу крові до тканин статевого члена, створюючи ерекцію; не діє без сексуальної стимуляції; ефект інгібування к-ції цГМФ у печеристому тілі спостерігається в гладких м'язах простати, сечовому міхурі та їх судинах, що переносять кров до вищевказаних органів; судинна релаксація призводить до підвищення перфузії крові та може бути причиною зменшення симптомів доброякісної гіперплазії передміхурової залози; судинні ефекти можуть бути доповнені інгібуванням активності аферентних нервів сечового міхура та релаксацією гладких м'язів простати і сечового міхура.

Показання для застосування ЛЗ: лікування еректильної дисфункції у дорослих чоловіків, ефективний за наявності сексуальної стимуляції^{БНФ}; не показаний для застосування жінкам; лікування симптомів доброякісної гіперплазії передміхурової залози у дорослих чоловіків^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос; рекомендована доза для дорослих чоловіків із еректильною дисфункцією - 10 мг за 30 хв. перед передбачуваною сексуальною активністю; пацієнтам, у яких 10 мг не виявляють бажаного ефекту, застосовувати дозу 20 мг^{БНФ}; ефективність зберігається до 36 год. після прийому; максимальна рекомендована частота прийому - 1 р/день^{БНФ}; у дозі 10 мг та 20 мг призначений перед передбачуваною сексуальною активністю, не рекомендований для щоденного застосування; у разі передбачуваного частого застосування (принаймні 2 р/тижд.), режим щоденного застосування більш низьких доз може бути більш доцільним, для таких пацієнтів рекомендована доза - 5 мг/добу приблизно в однаковий час, дозу можна зменшувати до 2,5 мг/добу^{БНФ}; пацієнтам з доброякісною гіперплазією передміхурової залози: для щоденного застосування рекомендована доза - 5 мг/добу^{БНФ} приблизно в однаковий час; для лікування дорослих чоловіків із еректильною дисфункцією та проявами і симптомами доброякісної гіперплазії передміхурової залози рекомендована доза для щоденного застосування - 5 мг/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості, ангіоневротичний набряк; головний біль, запаморочення; порушення мозкового кровообігу (вкл. геморагічні явища), втрата свідомості, транзиторна ішемічна атака, мігрень, судоми, транзиторна амнезія; нечіткий зір, відчуття болю в очах; дефекти поля зору, набряк повік, кон'юнктивальна гіперемія, неартеріальна передня ішемічна оптична нейропатія, оклюзія вен сітківки; дзвін у вухах, раптова втрата слуху; тахікардія, серцебиття, ІМ, нестабільна стенокардія, шлуночкова аритмія; припливи, артеріальна гіпотензія чи АГ; закладеність носа, диспное, носова кровотеча; диспепсія, ГЕРХ, абдомінальний біль; висипання, кропив'янка, с-м Стівенса-Джонсона, ексфолювативний дерматит; біль у спині, міалгія, біль у кінцівках; гематурія, пріапізм, біль у грудях, набряк обличчя, раптова серцева смерть.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до тадалафілу або до будь-якого іншого компонента ЛЗ; пацієнти, які застосовують органічні нітрати у будь-якій лікарській формі; не застосовувати пацієнтам із СС захворюваннями, для яких сексуальна активність є небажаною, чоловікам з ІМ (протягом останніх 90 днів, пацієнти з нестабільною стенокардією або стенокардією, що виникає під час статевих актів; пацієнти із СН, що відповідає класу 2 або вище за класифікацією Нью-Йоркської асоціації серця, протягом останніх 6 місяців; пацієнти з неконтрольованими аритміями, артеріальною гіпотензією (<90/50 мм рт.ст.) чи неконтрольованою гіпертензією; пацієнти після інсульту, що стався протягом останніх 6 міс., протипоказаний пацієнтам із втратою зору одного ока в результаті неартеріальної передньої ішемічної оптичної нейропатії (НАПІОН) незалежно від того, було це пов'язано із попереднім впливом інгібіторів ФДЕ 5, чи ні; застосування інгібіторів ФДЕ 5, в т. ч. тадалафілу, з стимуляторами гуанілат циклази, такими як ріоцигуат, протипоказано, оскільки потенційно це може призвести до симптоматичної гіпотензії.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 10 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АП-ГРЕЙТ	Метро Фармасьютікалс Приват Лімітед, Індія	табл., в/о у бл.	10мг, 20мг	№1, №2, №4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АРИСТА	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№2 (2x1); №4 (2x2); №8 (4x2)	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АРИСТА	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№4 (4x1)	87,87	26,95/\$
	ПІНАП	РА КЕМ ФАРМА ЛІМІТЕД (вир-во гот. ЛФ, перв. та втор. уп.)/ Дженефарм СА (перв., втор. уп., контр. та вип. серії)/ АПЛ Свіфт Сервісез (Мальта) Лтд (мікробіологічний контр.), Індія/Греція/Мальта		2,5мг, 5мг,	№14x1, №14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПІНАП	РА КЕМ ФАРМА ЛІМІТЕД (вир-во гот. ЛФ, перв. та втор. уп.)/ Дженефарм СА (перв., втор. уп., контр. та вип. серії)/ АПЛ Свіфт Сервісез Лтд (мікробіол. контр.), Індія/Греція/Мальта	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг	№1x1, №2x1, №2x2, №2x4, №4x1, №4x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СІАЛІС®	Ліллі дель Карібе Інк. (вир-во гот. ЛФ)/ Ліллі С.А. (перв. та втор. уп., дозвіл на випуск серії), США/Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	20мг	№1x1, №2x1, №2x2, №2x4,	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СІАЛІС®	Ліллі дель Карібе Інк. (вир-во нерозфас. продукту)/ Ліллі С.А. (перв. та втор. уп., дозвіл на випуск серії),	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг, 5мг	№14x1, №14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	США/Іспанія				
ТАДАПАФІЛ	Джубілант Дженерікс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг, 10мг, 20мг	№4 (4x1), №30 (10x3)	відсутня у реєстрі ОБЦ
ТАДАФІЛ	ГЕТЕРО ЛАБЗ ЛІМІТЕД, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг	№2x1, №4x1	відсутня у реєстрі ОБЦ

• **Варденафіл (Vardenafil)**

Фармакотерапевтична група: G04BE09 - засоби для лікування порушень ерекції.

Основна фармакотерапевтична дія: під час статевої стимуляції відбувається виділення оксиду азоту (NO), який активує фермент гуанілатциклазу, що спричиняє підвищення вмісту циклічного гуанозинмонофосфату (цГМФ) кавернозних тіл; відбувається розслаблення гладких м'язів, що сприяє збільшенню притоку крові до статевого члена; потужний селективний інгібітор цГМФ специфічної фосфодіестерази 5 типу (ФДЕ-5), що є найважливішою ФДЕ у кавернозному тілі людини; активно посилює вплив ендогенного оксиду азоту у кавернозному тілі шляхом пригнічення ФДЕ-5; при вивільненні оксиду азоту у відповідь на статеву стимуляцію інгібування ФДЕ-5 під впливом варденафілу призводить до підвищення рівня цГМФ у кавернозному тілі; для досягнення бажаного терапевтичного ефекту необхідна статеву стимуляція.

Показання для застосування ЛЗ: еректильна дисфункція^{БНФ} у дорослих чоловіків (неспроможність досягти або підтримувати ерекцію, необхідну для здійснення статевого акту).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос; для досягнення бажаного ефекту необхідна статеву стимуляція; початкова доза - 10 мг за 25-60 хв до початку статевого контакту^{БНФ}; з урахуванням ефективності та переносимості дозу підвищити до 20 мг або зменшити до 5 мг; МДД - 20 мг; частота застосування - не >1 р/добу^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кон'юнктивіт; АР, алергічний набряк, розлади сну, тривожність, головний біль, запаморочення, сонливість, парестезія та дизестезія, втрата свідомості, судоми, амнезія, порушення зору, гіперемія очей, неправильне сприйняття кольорів, біль та дискомфорт в очах, фотофобія, підвищення ВТ, посилене слюзовиділення, неартеріальна передня ішемічна невропатія зорового нерва, розлади зору, дзвін у вухах, запаморочення, раптова глухота, відчуття серцебиття, тахікардія, ІМ, шлуночкові тахіаритмії, стенокардія, приливи, АГ, артеріальна гіпотензія, закладеність носа, диспное, закладеність носових пазух, носова кровотеча, диспепсія, ГЕРХ, гастрит, біль по ходу ШКТ та у черевній порожнині, діарея, блювання, нудота, сухість у ротовій порожнині, підвищення рівня трансаміназ, підвищення рівня гаммаглутамілтрансферази, еритема, висипання, р-ції фотосенсибілізації, біль у спині, підвищення рівня креатинфосфокінази, міалгія, підвищення м'язового тону і судоми, гематурія, посилена ерекція, пріапізм, кровотеча зі статевого члена, гематоспермія, погане самопочуття, біль у грудній клітці.

Протипоказання до застосування ЛЗ: індивідуальна підвищена чутливість до варденафілу або до будь-якого з допоміжних компонентів ЛЗ; одночасне застосування з нітратами або донаторами оксиду азоту (амілінітритом) у будь-якій формі; пацієнтам з втратою зору на одне око внаслідок неартеріальної передньої ішемічної невропатії зорового нерва (NAION) незалежно від того, чи є вона наслідком попереднього впливу інгібітора фосфодіестерази 5 типу (ФДЕ-5); не застосовувати чоловікам, для яких статеву активність є небажаною (пацієнтам з тяжкими ССЗ, такими як нестабільна стенокардія або тяжка СН (III або IV класу за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації), хворим: із тяжкими порушеннями ф-ції печінки (клас С за класифікацією Чайлда-П'ю), при захворюваннях нирок у термінальній стадії (коли необхідний ГД), при артеріальній гіпотензії (АТ < 90/50 мм.рт.ст.), після перенесеного інсульту або ІМ (протягом останніх 6 міс.), при нестабільній стенокардії, при спадкових дегенеративних захворюваннях сітківки ока (пігментний ретиніт); одночасне застосування з потужними інгібіторами СУРЗА4 (кетоназол та інтраконазол (р/ос форми)) чоловікам віком від 75 років; одночасне застосування з інгібіторами ВІЛ-протеаз (індинавір, ритонавір);одночасне застосування інгібіторів ФДЕ-5, включаючи варденафіл, та стимуляторів гуанілатциклази, таких як ріоцигуат, протипоказане оскільки може призвести до симптоматичної гіпотензії.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЛЕВІТРА	Байер АГ, Німеччина	табл., в/о у бл.	5мг, 20мг	№1, №4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛЕВІТРА® ОДТ	Байер АГ, Німеччина	табл., що дисперг. у бл.	10мг	№4	відсутня у реєстрі ОБЦ	

12.2.10. Лікарські засоби для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози

12.2.10.1. Альфа адреноблокатори

- **Альфузозин (Alfuzosin)** (див. п. 12.1.3.1. розділу "УРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ, СЕКСОПАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Тамсулозин (Tamsulosin)** (див. п. 12.1.3.1. розділу "УРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ, СЕКСОПАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Теразозин (Terazosin)** (див. п. 12.1.3.1. розділу "УРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ, СЕКСОПАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.2.10.2. Інгібітори 5-альфаредуктази

- **Фінастерид (Finasteride)** (див. п. 12.1.3.2. розділу "УРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ, СЕКСОПАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

- **Дутастерид (Dutasteride)** (див. п. 12.1.3.2. розділу "УРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ, СЕКСОПАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3. Нефрологія. Лікарські засоби

12.3.1. Антибактеріальні засоби

12.3.1.1. Похідні фторхінолону

- **Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)** * (див. п. 17.2.11. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Левофлоксацин (Levofloxacin)** (див. п. 17.2.11. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Норфлоксацин (Norfloxacin)** (див. п. 17.2.11. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

12.3.1.2. Цефалоспорини

- **Цефіксим (Cefixime)** * (див. п. 17.2.1.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Цефтриаксон (Ceftriaxone)** * (див. п. 17.2.1.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Цефподоксим (Cefpodoxime)** (див. п. 17.2.1.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Цефотаксим (Cefotaxime)** (див. п. 17.2.1.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Цефалексин (Cefalexin)** (див. п. 17.2.1.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

12.3.1.3. Похідні нітрофурантоїну

- **Нітрофурантоїн (Nitrofurantoin)** * (див. п. 17.2.12. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Фуразидин (Furazidin)** (див. п. 17.2.12. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

12.3.1.4. Похідні сульфаметоксазолу і триметаприму

Комбіновані препарати

- **Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)** (див. п. 17.2.10. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

12.3.1.5. Лікарські засоби групи пеніциліну

- **Амоксицилін (Amoxicillin)** * (див. п. 17.2.1.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

12.3.1.6. Аміноглікозиди

- **Гентаміцин (Gentamicin)** (див. п. 17.2.3. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

12.3.1.7. Макроліди

- **Азитроміцин (Azithromycin)** * (див. п. 17.2.4. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

12.3.1.8. Протигрибкові засоби

- **Флуконазол (Fluconazole)** * ** [окрім розчину] (див. п. 17.4.3. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

12.3.2. Антикоагулянти

12.3.2.1. Антикоагулянти прямої дії

- **Гепарин (Heparin)** * [тільки мазь та гель] (див. п. 13.8.1.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Далтепарин (Dalteparin)** (див. п. 13.8.1.3. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Еноксапарин (Enoxaparin)** (див. п. 13.8.1.3. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Надропарин (Nadroparin)** (див. п. 13.8.1.3. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.2.2. Периферичні вазодилататори

- **Пентоксифілін (Pentoxifylline)** (див. п. 12.3.10.2.2. розділу "УРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ, СЕКСОПАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.2.3. Похідні синтетичних пентасахаридів

- **Фондапаринукс (Fondaparinux)** ** (див. п. 2.15.1.3. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ", п. 13.8.1.4. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.2.4. Антикоагулянти непрямої дії

12.3.2.4.1. Похідні кумаринів

- **Варфарин (Warfarin)** * (див. п. 13.8.1.1. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.2.4.2. Похідні індандіону

- **Феніндіон (Phenindione)** (див. п. 13.8.1.1. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.2.5. Антиагреганти

- **Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)** * ** (див. п. 2.15.3.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Альтеплазе (Alteplase)** (див. п. 13.8.3. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.2.6. Фібринолітичні засоби

- **Стрептокіназа (Streptokinase)** * (див. п. 13.8.3. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Тенектеплаза (Tenecteplase)** (див. п. 13.8.3. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Кислота амінокапронова (Aminocaproic acid)** (див. п. 13.7.4.1. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.2.7. Антитромбічні засоби

- **Дипіридамола (Dipyridamole)** (див. п. 13.8.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Клопідогрель (Clopidogrel)** (див. п. 13.8.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Тиклопідин (Ticlopidine)** (див. п. 13.8.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)** * ** (див. п. 2.15.3.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.3. Діуретики

12.3.3.1. Високоактивні діуретики

- **Фуросемід (Furosemide)** * (див. п. 2.9.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Торасемід (Torasemide)** (див. п. 2.9.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.3.2. Тіазидні діуретики

- **Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)** * (див. п. 2.9.2. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.3.3. Нетіазидні діуретики

- **Індапамід (Indapamide)** (див. п. 2.9.2. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.3.4. Калійзберігаючі діуретики

- **Спіронолактон (Spironolactone)** * (див. п. 2.9.4. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.4. Спазмолітики

12.3.4.1. Синтетичні спазмолітики та антихолінергічні засоби

- **Дротаверин (Drotaverine)** ** [тільки таблетки] (див. п. 3.3.2. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ", п. 12.1.2.3. розділу "УРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ, СЕКСОПАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.4.2. Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби

- **Ібупрофен (Ibuprofen)** * ** (див. п. 8.7.1.2. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Кеторолак (Ketorolac)** (див. п. 8.7.1.1. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.4.3. Аналгетики та антипіретики, аніліди

- **Парацетамол (Paracetamol)** * ** [окрім розчину для інфузії] (див. п. 8.8.2. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.4.4. Мінеральні комбінації

- **Калію хлорид (Potassium chloride)** (див. п. 10.5.5. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Основна фармакотерапевтична дія: основний внутрішньоклітинний катіон більшості тканин організму; іони калію необхідні для багатьох життєво важливих фізіологічних процесів, беруть участь у регуляції функції збудження, скоротливості, проведення та автоматизму міокарда; необхідні для підтримки внутрішньоклітинного тиску, проведення та синаптичної передачі нервового імпульсу, підтримки концентрації калію в міокарді, скелетних м'язів і гладеньком'язових клітинах, для підтримки нормальної функції нирок; в малих дозах іони калію розширюють коронарні судини, у великих - звужують; калій сприяє підвищенню вмісту ацетилхоліну і збудженню симпатичного відділу ЦНС, має помірну діуретичну дію; збільшення рівня калію знижує ризик розвитку токсичної дії серцевих глікозидів на серце; відіграє важливу роль у розвитку та корекції порушень кислотно-лужного балансу.

Показання для застосування ЛЗ: пофілактика та лікування гіпокаліємії, ^{вооз бнф} гіпокаліємія, ^{вооз бнф} пов'язана з: застосуванням діуретиків, глюкокортикостероїдів, серцевих глікозидів; хр. діареєю та блюванням; перебігом деяких захворювань нирок: вторинного гіперальдостеронізму, цирозу печінки з асцитом; хвороб кровообігу; ЦД.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують в/в краплинно та р/ос; р-н д/інфуз.: визначення необхідної дози базується на показниках вмісту калію у сироватці^{вооз}; дефіцит калію розраховують за формулою: калій = маса тіла х 0.2 х 2 х 4.5, де калій - розрахунок в ммоль, маса тіла - розрахунок в кг, 4.5 - нормальний рівень калію в ммоль в сироватці, отриманий результат - кількість калію хлориду 4% р-ну, який в звичайних випадках розводять водою д/ін'ек. в 10 разів (до 500 мл) і вводять краплинно (20 - 30 крап./хв); також в якості р-ника можна використовувати р-н натрію хлориду 0,9 % або р-н глюкози 5 %; при тяжких інтоксикаціях, що потребують швидкого усунення патологічних явищ застосовують калію хлорид 4 % в 40 % р-ні глюкози; звичайна рекомендована доза не повинна перевищувати 20 ммоль/год або 2 - 3 ммоль/кг протягом доби; в екстремальних випадках, коли рівень калію в сироватці менше, ніж 2,0 ммоль/л або існує загроза гіпокаліємії (рівень калію в

сироватці нижчий ніж 2,0 ммоль/л, або мають місце зміни в ЕКГ та/або параліч м'язів), доза може становити до 40 мг/год або 400 мг/добу під ретельним наглядом лікаря та моніторингом ЕКГ і частою перевіркою калію в сироватці крові, щоб запобігти гіперкаліємії та зупинці серця; концентрат д/р-ну д/інфуз.: дорослим призначати 0,5-2 г/добу, як розчинник використовувати 200-250 мл р-ну натрію хлориду 0,9 % або глюкози 5 %, швидкість введення - 20-30 крап./хв.; р/ос: табл. по 750 мг: звичайні дози для дорослих при незначній гіпокаліємії - 750-1500 мг/добу (1-2 табл./добу), при тяжкій гіпокаліємії - 1500-4500 мг/добу (2-6 табл./добу); табл. по 1000мг: для профілактики гіпокаліємії - 1000мг/добу (1 табл./добу), для лікування гіпокаліємії - 1000-2000 мг/добу (1-2 табл./добу), для лікування тяжкої гіпокаліємії - 3000-6000 мг/добу (3-6 табл./добу), через регулярні проміжки часу; капс. по 600 мг: звичайні дози для дорослих для профілактики гіпокаліємії - 1200-1800 мг/добу (2-3 капс./добу), для лікування гіпокаліємії - 3000-7200 мг (5-12 капс./добу), якщо добова доза перевищує 2 табл. чи капс., її розподілити на кілька прийомів.

12.3.5. Імуносупресанти

12.3.5.1. Неселективні, загальної дії

12.3.5.1.1. Алкілюючи сполуки

- **Циклофосфамід (Cyclophosphamide)** * (див. п. 19.1.1. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")

12.3.5.1.2. Антиметаболіти

- **Азатиоприн (Azathioprine)** * (див. п. 18.2.3. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")
- **Метотрексат (Methotrexate)** * (див. п. 19.1.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")

12.3.5.2. Селективні

- **Циклоспорин (Ciclosporin)** * (див. п. 18.2.2. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")
- **Такролімус (Tacrolimus)** (див. п. 18.2.2. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")
- **Кислота мікофенолова (Mycophenolic acid)** (див. п. 18.2.3. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")

12.3.6. Біологічні агенти

12.3.6.1. Анти СД –20 - агенти

- **Ритуксимаб (Rituximab)** (див. п. 18.2.4. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")

12.3.7. Кортикостероїди для системного застосування

- **Преднізолон (Prednisolone)** * (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Метилпреднізолон (Methylprednisolone)** (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.8. Антигіпертензивні лікарські засоби

12.3.8.1. Інгібітори ангіотензинперетворюючого фермента (АПФ)

- **Еналаприл (Enalapril)** * (див. п. 2.4. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Каптоприл (Captopril)** (див. п. 2.4. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Квінаприл (Quinapril)** (див. п. 2.4. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Лізиноприл (Lisinopril)** (див. п. 2.4. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Периндоприл (Perindopril)** (див. п. 2.4. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Раміприл (Ramipril)** (див. п. 2.4. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.8.2. Блокатори рецепторів ангіотензину II, комбіновані лікарські засоби

- **Епросартан (Eprosartan)** (див. п. 2.5.2. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Кандесартан (Candesartan)** (див. п. 2.5.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Лозартан (Losartan)** (див. п. 2.5.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Олмесартан (Olmesartan medoxomil)** (див. п. 2.5.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.8.3. Блокатори кальцієвих каналів

12.3.8.3.1. Дигідропіридинові похідні

- **Лерканидипін (Lercanidipine)** (див. п. 2.3.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Ніфедипін (Nifedipine)** (див. п. 2.3.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Фелодипін (Felodipine)** (див. п. 2.3.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.8.3.2. Бензодіазепіни, комбіновані

- **Дилтіазем (Diltiazem)** (див. п. 2.3.2. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.8.4. β-адреноблокатори

12.3.8.4.1. Неселективні β-адреноблокатори

- **Пропранолол (Propranolol)** * (див. п. 2.1.2. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.8.4.2. Комбіновані α- і β-адреноблокатори

- **Карведилол (Carvedilol)** (див. п. 2.1.3. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.8.5. Антигіпертензивні лікарські засоби центральної дії

12.3.8.5.1. Агоністи центральних α_2 -адреноблокаторів

- **Гуанфацин (Guanfacine)** ^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: C02AC02 - антигіпертензивні засоби. Антиадренергічні агенти центральної дії. Антагоністи імідазольних рецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: агоніст α_2 -рецепторів центральної дії, антигіпертензивний засіб завдяки своїй здатності зменшувати симпатичну активність; його агоністичний вплив на периферичні пресинаптичні α_2 -рецептори може сприяти антигіпертензивному ефекту, однак перш за все гуанфацин має властивість індукувати брадикардію; зменшує вивільнення норадреналіну у центральних та в периферичних синапсах, завдяки чому зменшується загальний периферичний опір і ЧСС; серцевий викид не змінюється, оскільки зменшення ЧСС супроводжується збільшенням ударного об'єму серця; не впливає на регулювання АТ ні у стані спокою, ні під час фізичних навантажень; практично не впливає на швидкість клубочкової фільтрації; зменшує активність реніну плазми, а також рівень норадреналіну у плазмі крові, однак ці ефекти не мають тісного зв'язку зі ступенем антигіпертензивного ефекту; не впливає на обіг допаміну; завдяки своїм фармакологічним властивостям не чинить шкідливого впливу на основне захворювання у пацієнтів з ХОЗЛ, серцевою або нирковою недостатністю, АВ-блокадою I ст., ЦД, подагрою або гіперліпідемією, які страждають на АГ.

Показання для застосування ЛЗ: АГ ^{ГМД} (особливо есенціальна та реноваскулярна) -ЛЗ застосовують, як правило, у комбінації з іншими антигіпертензивними засобами, якщо відповідь на лікування препаратами першої лінії незадовільна або якщо вони протипоказані.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: початкова доза 0,5-1 мг 1 р/добу перед сном; якщо терапевтичний ефект незадовільний, дозу можна збільшувати на 1 мг че/з кожні 2-3 тижні до МДД 2-3 мг; залежно від денних змін АТ (підвищення АТ за кілька год до прийому наступної дози) вищевказану добову дозу можна розподілити на два прийоми, однак загальна добова доза не повинна перевищувати 3 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сухість у роті, седативний ефект, запаморочення, запор, помірна брадикардія, сонливість, порушення свідомості, нервозність, збудження, тремор, ортостатична гіпотензія; головний біль, безсоння, слабкість і постуральна гіпотензія, слабкість/астенія, втома, підвищена пітливість, відхилення від норми печінкових ферментів; амнезія, занепокоєння, депресія, парестезії, парез; порушення смаку, дзвін у вухах, кон'юнктивіт, запалення райдужної оболонки, зорові порушення; брадикардія, посилене серцебиття, за грудинний біль, задишка; діарея, утруднене ковтання, нудота, відсутність апетиту, абдомінальний біль; зниження лібідо, імпотенція, нетримання сечі; судоми м'язів, біль у суглобах; дерматит, свербіж, пурпура; риніти.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої допоміжної речовини; кардіогенний шок, колапс, артеріальна гіпотензія; одночасне застосування з антагоністами α_2 -адренорецепторів (йохімбін, фентоламін).

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕСТУЛІК®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГПС, Угорщина	табл. у бл.	1мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	

- **Клонідин (Clonidine)** (див. п. 2.6.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Метилдопа (Methyldopa)** ** (див. п. 2.6.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.8.5.2. Селективні α_1 -адреноблокатори

- **Доксазозин (Doxazosin)** (див. п. 2.8.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.9. Гіполіпідемічні лікарські засоби

12.3.9.1. Інгібітори редуктази 3-гідрокси-3-метилглутарилкоензиму А, або статини

- **Аторвастатин (Atorvastatin)** (див. п. 2.16.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Розувастатин (Rosuvastatin)** (див. п. 2.16.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.9.2. Похідні нікотинової кислоти

- **Кислота нікотинова (Nicotinic acid)** * ** [тільки таблетки] (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")

12.3.10. Лікарські засоби, що нормалізують процеси у стінці судин

12.3.10.1. Антиоксиданти

- **Токоферол (Tocopherol)** (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")
- **Кислота нікотинова (Nicotinic acid)** * [тільки таблетки] (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")

12.3.10.2. α_1 -адреноблокатори

12.3.10.2.1. Похідні нікотинової кислоти

- **Ніцерголін (Nicergoline)** (див. п. 6.7.2.1. розділу "НЕВРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.10.2.2. Похідні метилксантинів

- **Пентоксифілін (Pentoxifylline)** (див. п. 12.3.2.2. розділу "УРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ, СЕКСОПАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: C04AD03 - периферичні вазодилататори.

Основна фармакотерапевтична дія: поліпшує реологічні властивості крові (плинність), зменшуючи підвищену в'язкість крові; його фармакологічні властивості пояснюються тим, що він: поліпшує погіршену здатність еритроцитів до деформації шляхом інгібування фосфодієстерази з подальшим зростанням внутрішньоклітинних

концентрацій цАМФ і АТФ, та інгібує агрегацію еритроцитів; інгібує агрегацію тромбоцитів; знижує патологічно високі рівні фібриногену у плазмі крові; інгібує активацію лейкоцитів і адгезію лейкоцитів до ендотелію судин.

Показання для застосування ЛЗ: атеросклеротична енцефалопатія; ішемічний церебральний інсульт; дисциркуляторна енцефалопатія; порушення периферичного кровообігу, зумовлені атеросклерозом^{БНФ} ЦД (включно з діабетичною ангіопатією), запаленням; трофічні розлади у тканинах, пов'язані з ураженням вен^{БНФ} або порушенням мікроциркуляції (посттромбофлебітичний с-м, трофічні виразки, гангрена, відмороження); облітеруючий ендартеріїт; ангіонейропатії (хвороба Рейно); порушення кровообігу ока (г., підг., хр. недостатність кровообігу у сітківці і судинній оболонці ока); порушення ф-ції внутрішнього вуха судинного генезу, які супроводжуються зниженням слуху. Подовження дистанції безбольової ходи у пацієнтів з хр. оклюзійним ураженням периферичних артерій на стадії ІІв за Фонтеном (переміжна кульгавість), коли інші заходи, такі як тренування ходи, ангіопластика та/або відновлювальні процедури не можуть бути проведені або не показані.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим: в/в інфузія 100-600 мг в 100-500 мл р-ну Рінгера лактату, фізіологічного р-ну або 5 % р-ну глюкози 1-2 р/добу; тривалість в/в крапельної інфузії 60-360 хв, тобто введення 100 мг пентоксифіліну повинно тривати щонайменше 60 хв; інфузія може бути доповнена р/ос прийомом 400 мг^{БНФ} з розрахунку, що МДД (інфузійна і р/ос) 1200 мг; при тяжкому стані пацієнта (особливо при постійному болю, при гангрені або трофічних виразках) можливе проведення інфузії протягом 24 год, дозу визначають з розрахунку 0,6 мг/кг/год; розрахована таким чином добова доза для пацієнта масою 70 кг - 1000 мг, для пацієнта масою 80 кг - 1150 мг; незалежно від маси тіла пацієнта МДД - 1200 мг; об'єм інфузійного р-ну розраховується індивідуально з урахуванням супутніх захворювань, стану пацієнта та становить в середньому 1,0-1,5 л/добу; в окремих випадках застосовують шляхом в/в ін'єкції по 5 мл (100 мг), ін'єкцію виконують повільно, протягом 5 хв, лежачи; після поліпшення стану пацієнта продовжити лікування табл.; хр. оклюзійне захворювання периферичних артерій на стадії ІІв за Фонтеном (переміжна кульгавість): по 400 мг 3 р/добу^{БНФ} (1200 мг/добу) або 600 мг 2 р/добу; дисфункція внутрішнього вуха, спричинена розладами кровообігу (включаючи туговухість і раптову втрату слуху): по 400 мг 2-3 р/добу^{БНФ} (800-1200 мг/добу) або 600 мг 1-2 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: підвищення рівня трансаміназ, аритмія, тахікардія, стенокардія, зниження АТ, підвищення АТ, тромбоцитопенія з тромбоцитопенічною пурпурою та апластична анемія (часткове або повне припинення утворення всіх клітин крові, панцитопенія), що може мати летальний наслідок, лейкопенія/нейтропенія, запаморочення, головний біль, асептичний менінгіт, тремор, парестезія, судоми, шлунково-кишкові розлади, відчуття тиску у шлунку, метеоризм, нудота, блювання, діарея, запор, гіперсалівація, свербіж, почервоніння шкіри і кропив'янка, токсичний епідермальний некроліз і с-м Стівенса-Джонсона, висипання, відчуття жару (припливи), кровотечі, кровотечі, периферичні набряки, анафілактичні р-ції, анафілактоїдні р-ції, ангіоневротичний набряк, бронхоспазм та анафілактичний шок, внутрішньопечінковий холестаз, збудження та порушення сну, галюцинації, порушення зору, кон'юнктивіт, крововиливи у сітківку, відшарування сітківки, гіпоглікемія, підвищеної пітливості, підвищення t° тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до пентоксифіліну, до інших метилксантинів або до будь-якої з допоміжних речовин; пацієнтам із масивною кровотечею (ризик посилення кровотечі); обширний крововилив у сітківку ока, крововиливи у мозок (ризик посилення кровотечі), якщо під час лікування відбувається крововилив у сітківку ока, застосування ЛЗ одразу припинити; г. період ІМ; виразка шлунка та/або кишкові виразки; геморагічний діатез.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1 г., парентерально - 0,3 г.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І. ВАЗИТРЕН	ТОВ "НІКО" (контр., вип. серії)/ ДЕМО СА ФАРМАСЬЮТІКАЛ ІНДАСТРІ (нерозфас. прод., перв., втор. уп., контр.), Україна/Греція	р-н д/ін'єк. в ампл. по 5мл у пач.	20мг/мл	№5	90,00	
ЛАТРЕН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. у фл. по 100 мл, 400 мл у пляш.	0,5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛАТРЕН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. у фл. по 200мл у пляш.	0,5 мг/мл	№1	210,48	
ПЕНТОКСИФІЛІН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. в ампл. по 5мл у конт. чар/уп.	20мг/мл	№5x2	10,58	
ПЕНТОКСИФІЛІН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. к/р у бл.	100мг	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПЕНТОКСИФІЛІН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. к/р у бл.	100мг	№10x5	7,00	
ПЕНТОКСИФІЛІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	200мг	№10x2	7,10	
ПЕНТОКСИФІЛІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. в ампл. по 5мл у конт. чар/уп.	20мг/мл	№5x2	16,71	

	ПЕНТОКСИФІЛІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 5мл у конт. чар/уп.	20мг/мл	№5x1	23,96	
	ПЕНТОКСИФІЛІН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.в кор.	100мг	№20x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПЕНТОКСИФІЛІН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.в кор.	100мг	№30x1	9,88	
	ПЕНТОКСИФІЛІН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. в амп.по 5мл у бл.	20мг/мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПЕНТОКСИФІЛІН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. в амп.по 5мл у бл.	20мг/мл	№5, №5x1	23,96	
	ПЕНТОТРЕН	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/інфуз. у фл. по 200мл у фл.	0,5мг/мл	№1	216,45	
II.	АГАПУРИН® СР 400	АТ "Санека Фармасьютикалз" (вир-во ГЛЗ, перв. та втор. пак., контр. та вип.серій)/ТОВ "Зентіва" (вир-во ГЛЗ, перв. та втор. пак., контр. та вип. серій)/ ДІТА виробн. кооператив інвалідів (втор. пак.), Словацька Республіка/ Чеська Республіка	табл. в /о, прол. дії у бл.	400мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ВАЗОНІТ	Г.Л. Фарма ГмбХ, Австрія	табл. ретард, в/о у бл.	600мг	№10x2	16,33	
	ПЕНТИЛІН	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. прол. дії у бл.	400мг	№10x2	15,44	30,27/€
	ПЕНТИЛІН	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	р-н д/ін'єк. в амп.по 5мл у бл.	100мг/5 мл	№5	44,86	30,27/€

12.3.10.2.3. Похідні індолу

- **Ксантинолу нікотинам (Xantinol nicotinate)**

Фармакотерапевтична група: С04AD02 - периферичні вазодилататори. Похідні пурину.

Основна фармакотерапевтична дія: судинорозширювальна, антиагрегаційна, антиатеросклеротична, антигіпоксична дія; має властивості теофіліну і кислоти нікотинової: механізм дії реалізується завдяки блокаді активності фосфодіестерази, конкуренції з аденозином за рецептори, накопичення циклічного аденозинмонофосфату, стимуляції синтезу нікотинамідних коферментів і простацикліну в стінках судин; препарат розширює периферичні кровоносні судини, покращує колатеральний та мозковий кровообіг, зменшує явища церебральної гіпоксії, знижує агрегацію тромбоцитів, покращує мікроциркуляцію в сітківці ока, посилює скорочення серця, покращує метаболічні процеси в мозковій тканині в післяопераційний період, знижує рівень холестерину, атерогенних ліпопротеїдів, сечової кислоти, фібриногену, посилює активність ліпопротеїнази, посилює фібриноліз; в організмі препарат швидко перетворюється - спочатку на теофілін і нікотинову кислоту, потім на продукти їхнього метаболізму.

Показання для застосування ЛЗ: облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок (переміжна кульгавість), хвороба Рейно, діабетична ангіопатія, ретинопатія, ангіоневропатія, г. тромбофлебіт, г. тромбоз, емболії кровоносних судин, мігрень, атеросклеротичні порушення мозкового кровообігу, післяопераційний період після усунення пухлин головного мозку, хвороба Меньєра, трофічні виразки нижніх кінцівок, які погано загоюються, захворювання судин сітківки, дегенерація, відшарування сітківки; атеросклероз коронарних і мозкових судин, хвороба Бюргера, облітеруючий ендартеріїт, діабетичні ангіопатія та ретинопатія, посттромбофлебітичний с-м, пролежні, мігрень, дерматози (порушення трофіки судинного генезу), гіперхолестеринемія, гіпертригліцеридемія.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: початкова доза зазвичай становить внутрішньо по 150 мг 3 р/добу, при необхідності разову дозу збільшити до 300-450 мг 3 р/добу, потім, по мірі поліпшення стану, дозу знижувати до 150 мг 2-3 р/добу, МДД за умови доброї переносимості терапії становить 1800 мг, курс лікування визначає лікар залежно від перебігу захворювання та переносимості препарату; при г. порушеннях мозкового та периферичного кровообігу перевагу віддають ін'єкційній формі препарату; в/в (дуже повільно!) вводити при г. порушеннях периферичного та мозкового кровообігу дорослим по 2 мл 15 % р-ну 1-2 р/день, з переходом на в/м ін'єкції - по 2 мл 1-3 р/день, одночасно призначають р/ос по 2 табл. 3 р/день; у тяжких випадках вводять в/в крапельно: 10 мл 15 % р-ну препарату (1,5 г) розводять у 200-500 мл 5 % р-ну глюкози або 0,9 % р-ну натрію хлориду, введення

здійснюють протягом 1-4 год до 4 р/добу, курс лікування визначається індивідуально, орієнтовно до 21 дня, але можливе і більш тривале лікування; при порушеннях кровопостачання тканин в/м вводять по 2 мл 15 % р-ну (0,3 г) 1-3 р/день, поступово збільшуючи дозу до 4-6 мл 15 % р-ну 2-3 р/добу, тривалість лікування залежить від перебігу захворювання (до 2-3 тижнів); в офтальмологічній практиці дорослим застосовують шляхом іонофорезу на очне яблуко - до 300 мг 1 р/добу, тривалість першої процедури 15 хв, тривалість наступних можна поступово збільшувати до 20-30 хв, курс лікування - 15-20 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості (висип, кропив'янка, свербіж, озноб, гарячка, відчуття жару, гіперемія шкірних покривів, поколювання, ангіоневротичний набряк); підвищена втомлюваність, головний біль, запаморочення; нудота, блювання, діарея, анорексія, здуття живота, дискомфорт у животі, печія, рецидивна виразка, гастралгія, підвищення активності печінкових трансаміназ та лужної фосфатази; припливи, артеріальна гіпотензія, тахікардія, у поодиноких випадках можливе провокування нападів стенокардії, порушень серцевого ритму, розвитку с-му обкрадання; м'язові судоми, слабкість, артрити у зв'язку з виникненням подагри; сухість шкіри, лущення епідермісу, пігментація, гіперкератоз; нечіткість зору, набряки очей, екзофтальм, амбліопія, цистоподібні та плямисті набряки; відчуття нестачі повітря, задишка; зниження толерантності до глюкози; підвищення лужної фосфатази, ЛДГ і BSE (формові елементи крові), підвищення рівня сечової кислоти, що сприяє виникненню подагри, гіперглікемія; загальна слабкість, гіперурикемія; гіперемія та свербіж у місці введення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-яких компонентів препарату, а також до теофіліну та нікотинової к-ти; г. та хр. СН II-III ступеня; г. ІМ; г. ниркова недостатність; г. СН або тяжка застійна СН; г. кровотеча; виразка шлунка і ДПК у стадії загострення; глаукома; мітральний стеноз.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0.9 г., парентерально - 0.9 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КСАНТИНОЛУ НИКОТИНАТ	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у конт. чар/уп., по 2мл в амп. у кор.	150мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КСАНТИНОЛУ НИКОТИНАТ	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у конт. чар/уп., по 2мл в амп. у кор.	150мг/мл	№10x1	12,24	
	КСАНТИНОЛУ НИКОТИНАТ	ПАТ "Галичфарм"/ПАТ "Київмедпрепарат", Україна/Україна	табл. у бл.	150 мг	№10x6	7,72	

12.3.10.3. Ангіопротектори

- **Етамзілам (Etamylate)** (див. п. 13.7.3. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

12.3.11. Лікарські засоби для лікування порушень мінерального обміну

- **Альфакальцидол (Alfacalcidol)** (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")

12.3.12. Антианемічні засоби

12.3.12.1. Еритропоетини

- **Епоетин альфа (Epoetin alfa)** (див. п. 19.5. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Епоетин бета (Epoetin beta)** (див. п. 19.5. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Метокси поліетилен гліколь-епоетину бета (Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta)**

Фармакотерапевтична група: В03ХА03 - інші антианемічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: стимулює еритропоез шляхом взаємодії з рецепторами до еритропоетину на клітинах-попередниках кісткового мозку, є тривалим активатором рецепторів еритропоетину, який, на відміну від еритропоетину, демонструє іншу активність на рецепторному рівні, що характеризується більш повільним з'єднанням і більш швидким відділенням від рецептора, а також тривалішим періодом напіввиведення, природний гормон еритропоетин, первинний фактор росту для еритроїдного розвитку, виробляється нирками і виділяється в судинне русло у відповідь на гіпоксію, у відповідь на гіпоксію еритропоетин взаємодіє з клітинами-попередниками еритропоезу, що призводить до збільшення вироблення еритроцитів.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматична анемія, пов'язана з хр. хворобою нирок (ХХН) ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити п/ш або в/в. Симптоматична анемія у дорослих з ХХН: застосовувати п/ш або в/в з метою підвищення Hb до рівня не > 12 г/дл (7,45 ммоль/л); вплинути на варіабельність Hb можна за допомогою корекції дози із врахуванням цільового діапазону Hb від 10 г/дл (6,21 ммоль/л) до 12 г/дл (7,45 ммоль/л), уникати стійкого підвищення Hb до рівня вище 12 г/дл (7,45 ммоль/л); уникати підвищення Hb вище 2 г/дл (1,24 ммоль/л) протягом 4-тижневого періоду, при виникненні такої ситуації відкоригувати дозу препарату. Для пацієнтів, які не перебувають на діалізі, рекомендована початкова доза - 1,2 мкг/кг маси тіла 1 р/міс. п/ш з метою досягнення рівня Hb >10 г/дл (6,21 ммоль/л), альтернативно - початкова доза 0,6 мкг/кг маси тіла 1 р/2 тижн. п/ш або в/в. пацієнтам, які перебувають на діалізі, та пацієнтам, які не перебувають на діалізі. Пацієнтам, які отримують препарат з частотою 1 р/2 тижн., та у яких Hb >10 г/дл (6,21 ммоль/л) - призначення ЛЗ 1 р/міс. із застосуванням дози, яка дорівнює подвоєній дозі, що вводилася з частотою 1 р/2 тижні. Пацієнтів, які на даний час отримують лікування засобами, які стимулюють еритропоез, можна перевести на терапію метоксиполіетилен гліколь-епоетином β з частотою введення 1р/міс. п/ш або в/в. Початкова доза розраховується на основі попередньої тижневої дози дарбепоетину α чи епоетину, яка вводилася на момент заміни. Якщо вимагається корекція дози для підтримання цільової концентрації Hb вище 10 г/дл (6,21 ммоль/л), місячна доза може бути

збільшена на 25 %, при зростанні Нв більше ніж на 2 г/дл (1,24 ммоль/л) протягом місяця або при зростанні Нв до 12 г/дл (7,45 ммоль/л) дозу препарату зменшують на 25 %. Якщо Нв продовжує зростати, лікування перервати до моменту зниження Нв, після чого відновити введення препарату в дозі, яка на 25 % менша від попередньої дози. Після припинення лікування Нв знижується на 0,35 г/дл (0,22 ммоль/л)/тижд.. Корекція дози препарату не повинна проводитися частіше 1 р/міс.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тромбоцитопенія, істинна еритроцитарна аплазія, р-ції гіперчутливості; анафілактична р-ція, головний біль; гіпертензивна енцефалопатія, АГ; припливи; тромбоз, емболія легеневої артерії, макуло-папульозні висипання; с-м Стівенса-Джонсона/токсичний епідермальний некроліз, тромбоз шунта.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до метокси поліетилен гліколь-епоетину β або до будь-якої допоміжної речовини ЛЗ; неконтрольована АГ.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 4 мкг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	МИРЦЕРА®	Рош Діагностикс ГмбХ (вир-во нерозфас. прод., перв., втор. пак., випроб. контр. якості (за винятком випроб. методом біолог. аналізу "Активність in vivo, на нормоцитемічній миші" для дослід.стабільно, Німеччина /Швейцарія	р-н д/ін'єк., шпр. з голк.д/ін'єк.	75мкг/0,3мл	№1	145,54	26,86/\$
	МИРЦЕРА®	Рош Діагностикс ГмбХ (вир-во нерозфас. прод., перв., втор. пак., випроб. контр. якості (за винятком випроб. методом біолог. аналізу "Активність in vivo, на нормоцитемічній миші" для дослід.стабільно, Німеччина /Швейцарія	р-н д/ін'єк. у шпр. з голк.д/ін'єк.	50мкг/0,3мл	№1	145,54	26,86/\$

12.3.12.2. Вітаміни

- **Кислота фолієва (Folic acid) *** (див. п. 13.1.2.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Кислота аскорбінова (Ascorbic acid) * ** [тільки таблетки]** (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")
- **Тіамін (Thiamine) *** (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")
- **Піридоксин (Pyridoxine) *** (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")
- **Ціанокобаламін (Cyanocobalamin)** (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")

12.3.12.3. Препарати заліза

- **Заліза сульфат (Ferrous sulfate) *** (див. п. 13.1.1.1. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Заліза сахарат (Saccharated iron oxide)** (див. п. 13.1.1.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

13. ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

13.1. Антианемічні засоби

13.1.1. Препарати заліза

13.1.1.1. Препарати двовалентного заліза для перорального застосування

13.1.1.2. Препарати трьохвалентного заліза

13.1.1.3. Комплексні лікарські засоби, що містять залізо та фолієву кислоту

13.1.1.4. Препарати заліза у комбінації із різними сполуками

13.1.2. Препарати вітаміну В12 і фолієвої кислоти

13.1.2.1. Вітамін В12 (ціанокобаламін та його аналоги)

13.1.2.2. Фолієва кислота та її похідні

13.1.3. Інші антианемічні засоби

13.2. Цитостатичні засоби

13.3. Моноклональні антитіла

13.4. Імуномодулюючі засоби

13.5. Імуносупресивні засоби

13.6. Стимулятори гранулоцитопоезу

13.7. Гемостатичні засоби

13.7.1. Компоненти та препарати крові

13.7.2. Препарати вітаміну К

13.7.3. Інші гемостатичні засоби системного застосування

13.7.4. Інгібітори фібринолізу

13.7.4.1. Амінокислоти

13.7.4.2. Інгібітори протеїнази

13.8. Антитромботичні засоби

13.8.1. Антикоагулянти

13.8.1.1. Антагоністи вітаміну К

13.8.1.2. Нефракціонований гепарин

13.8.1.3. Низькомолекулярні гепарини

13.8.1.4. Похідні синтетичних пентасахаридів

13.8.1.5. Інші антитромботичні засоби

13.8.2. Антиагреганти

13.8.3. Фібринолітики

13.1. Антианемічні засоби

13.1.1. Препарати заліза

13.1.1.1. Препарати двовалентного заліза для перорального застосування

- **Заліза сульфат (Ferrous sulfate)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: В03АА07 - антианемічні засоби. Препарати заліза.

Основна фармакотерапевтична дія: містить двовалентний іон заліза сульфату, застосування якого поповнює дефіцит заліза в організмі та стимулює гемопоєз, препарат поповнює дефіцит заліза в організмі, необхідного для синтезу Hb.

Показання для застосування ЛЗ: залізодефіцитні (гіпохромні) анемії^{БНФ, ВООЗ, ПМД}; профілактика залізодефіцитних анемії у жінок в період вагітності^{ПМД}, коли не може бути забезпечене адекватне застосування заліза разом з їжею.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для р/ос застосування^{БНФ} дорослим та дітям старше 7 років; приймати, запиваючи 1 склянкою води перед їдою або під час приймання їжі; з метою профілактики залізодефіцитних анемії (зокрема у вагітних) - 80 мг/добу натще; лікування залізодефіцитної анемії - дітям старше 7 років - 80 мг/добу (вранці); дорослим - 80-160 мг/добу (вранці та ввечері); після нормалізації рівня Hb прийом продовжують 1-3 міс. щодня по 80 мг вранці перед сніданком.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: запор, діарея, здуття живота, абдомінальний біль, зміна кольору калу, нудота; набряк гортані, аномальні кишкові випорожнення, диспепсія, блювання, гастрит, свербіж, еритематозне висипання; р-кції гіперчутливості, кропив'янка, зміна кольору зубів та/або виразки у ротовій порожнині, коли табл. жували, смоктали або тримали у роті (у разі затримки табл. у стравоході або потрапляння її у дихальні шляхи у хворих літнього віку або пацієнтів з розладами ковтання є ризик розвитку виразок стравоходу або некрозу бронхів).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активних компонентів або до інших компонентів препарату, надмірний вміст заліза в організмі (гемосидероз, гемохроматоз), анемії, не зумовлені дефіцитом заліза (мегалобластна анемія, спричинена недостатністю вітамінів В₉ або В₁₂, гемолітична анемія, апластична

анемія, сидероахрестична анемія, залізорефрактерна анемія, анемія при свинцевому отруєнні, таласемія); стеноз стравоходу та/або інші обструктивні захворювання травного тракту, дивертикул кишечника, кишкова непрохідність; регулярні гемотрансфузії, одночасне застосування парентеральних форм заліза.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ТАРДИФЕРОН	П'єр Фабр Медикамент Продакшн, Франція	табл., в/о, прол. дії у бл.	80мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Заліза фумарат (Ferrous fumarate)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: В03AA02 - Антианемічні засоби. Препарати двовалентного заліза для перорального застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: антианемічна дія. Прийом капс. забезпечує захист зубів, а швидкий пасаж заліза крізь шлунок перешкоджає розвитку побічних ефектів, які обумовлені подразнюючою дією заліза на слизову оболонку шлунка. У кишечнику залізо поступово вивільняється з капс. та всмоктується. Заліза фумарат забезпечує поступове та рівномірне вивільнення заліза з травного тракту. Максимальна к-ція заліза фумарату досягається ч/з 4 год. після прийому, залізо у вигляді феритину та гемосидерину створює депо заліза в організмі, біологічний період напівжиття заліза - 12,9 год..

Показання для застосування ЛЗ: лікування і профілактика залізодефіцитної анемії ^{БНФ} вооз, ПМД

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймати натщесерце за 30 хв до сніданку, запивати великою кількістю рідини, дорослі та діти старше 12 років: для профілактики - 350 мг/добу; для лікування - 350 мг 2 р/добу; для лікування та профілактики дози вагітним у II та III триместрах призначають звичайні дози як для дорослих; курс лікування - від 6 до 12 тижнів; прийом продовжувати протягом деякого часу після нормалізації картини периферичної крові для того, щоб поповнити депо заліза в організмі; для дітей доза вище 75 мг/кг може бути токсичною.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль в епігастрії, нудота, блювання, анорексія, забарвлення випорожнення в чорний колір, діарея, металевий присмак у роті; АР, включаючи висипи та свербіж; тривале невинуватне застосування може призвести до запору та гемосидерозу; барвники (азорубін і діамантовий чорний) можуть спричинити АР (можливо уповільнені).

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до компонентів препарату; гемохроматоз, гемосидероз та інші типи анемії, не пов'язані з дефіцитом заліза в організмі; гемоглобінопатія; пептична виразка в активній формі; регіональний ентерит(хв.Крона) і виразковий коліт; повторні трансфузії крові; парентеральне вживання препаратів заліза; дитячий вік до 12 років.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ХЕФЕРОЛ	Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія	капс. у бл.	350мг	№10x3	3,83	29,10/€

13.1.1.2. Препарати трьохвалентного заліза

• **Заліза сахарат (Saccharated iron oxide)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: В03AB02 - препарати тривалентного заліза. В03AC02- антианемічні засоби для парентерального введення. Препарати заліза.

Основна фармакотерапевтична дія: антианемічна, сприяє зниженню дефіциту заліза в організмі при залізодефіцитній анемії, після р/ос прийому всмоктування комплексу заліза відбувається у ДПК та у верхніх відділах тонкого кишечника, потрапивши у системний кровотік, залізо із сироватки крові переходить у тканини, що здатні його депонувати, зокрема у вигляді комплексу з феритином депонується в печінці. Пізніше у кістковому мозку воно включається до складу Hb. У складі Hb залізо знаходиться у двовалентному вигляді, але саме тривалентне залізо стимулює утворення глобіну, що сприяє збільшенню Hb крові. Максимальні рівні заліза, у середньому 538 мкмоль/л (30 мг/л), досягалися ч/з 10 хв після ін'єкції.

Показання для застосування ЛЗ: р/ос: профілактика і лікування залізодефіцитних станів різної етіології; профілактика дефіциту заліза у дітей, жінок дітородного віку; профілактика залізодефіцитної анемії у дорослих, що знаходяться на вегетаріанській дієті, в осіб літнього віку; лікування залізодефіцитних анемії; парентеральні форми: залізодефіцитні стани ^{БНФ} при необхідності швидкого поповнення заліза; пацієнтам, які не переносять або не дотримуються регулярного прийому р/ос препаратами заліза ^{БНФ}; при наявності активних запальних захворювань травного тракту, коли р/ос препарати заліза неефективні ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос: дорослим, а також вагітним жінкам і дітям з 12 років - по 1 ст. л. в 0,5 склянки води 3 р/добу; при нормалізації показника Hb прийом припиняють; парентерально: тільки в/в; шляхом краплинної інфузії ^{БНФ} розводять у 0,9 % р-ні натрію хлориду 1:20; введення максимально допустимої разової дози (7 мг заліза/кг) проводити протягом мінімум 3,5 год. незалежно від загальної дози; у вигляді інфузії максимальну переносиму добову дозу призначати не частіше ніж 1 р/тижд.; перед тим, як розпочати першу крап. інфузію, необхідно провести тест-дозу: 20 мг заліза дорослим і дітям з масою тіла > 14 кг та половину денної дози (1,5 мг заліза/кг) дітям, які мають масу тіла < 14 кг, протягом 15 хв.; при відсутності небажаних явищ можна вводити з рекомендованою швидкістю частину р-ну, що залишилася; можна також вводити в/в повільно ^{БНФ} у вигляді нерозведеного р-ну зі швидкістю 1 мл/хв., але максимальний об'єм р-ну не має перевищувати 10 мл за 1 ін'єкцію; перед тим, як почати введення, необхідно провести тест-дозу повільно протягом 1-2 хв.; якщо протягом періоду спостереження (15 хв.), не з'явилися побічні ефекти, можна вводити частину лікувальної дози, що залишилась; у випадку, коли повна необхідна доза перевищує максимально дозволена одноразову дозу, вводити частинами; якщо ч/з 1-2 тижні після початку лікування не спостерігається поліпшення гематологічних показників, початковий

діагноз переглянути; стандартне дозування: дорослі та пацієнти літнього віку: 100-200 мг заліза 1-3 р/тижд. залежно від рівня Нb; максимальна разова доза для ін'єкцій: 10 мл (200 мг заліза), тривалість введення не < 10 хв., не > 3 р/тижд.; для інфузії залежно від показань разова доза може досягати 500 мг заліза; діти: у випадку клінічної необхідності (для швидкого поповнення організму залізом) - вводити не > 0,15 мл (3 мг елементарного заліза)/кг 1-3 р/тижд. залежно від рівня Нb.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р/ос форми: головний біль; шлунково-кишкові розлади, такі як відчуття важкості і переповнення шлунка; біль у животі, в т.ч. в епігастральній ділянці, метеоризм, диспепсія, блювання, нудота, запор, діарея, металевий присмак у роті, кропив'янка, висипання, екзантема, свербіж, анафілаксія, гіперемія обличчя, відчуття жару, забарвлення зубної емалі у дітей, можливе темне забарвлення випорожнень, зумовлене виділенням заліза, що не всмокталося, тривале невиправдане застосування препаратів заліза може призвести до гемосидерозу; парентеральні форми: дизгевзія, гіпотонія, нудота, пірексія, озноб, р-ції в місці введення; анафілактоїдні р-ції; головний біль, запаморочення; тахікардія, відчуття серцебиття, аритмії; АГ, артеріальна гіпотензія, циркуляторний колапс; бронхоспазм, задишка; блювання, нудота, абдомінальний біль, діарея; свербіж, кропив'янка, висип і екзантема, еритема; м'язові спазми, міалгія, артрит, набряк суглобів; гемоліз, лімфаденопатія, лейкоцитоз, кровотеча; короткочасна глухота; порушення свідомості, сплутаність свідомості, затуманення зору, оніміння, судоми, збудження, тремор, парестезія, непритомність, втрата свідомості; ангіоEDEMA, периферичний набряк, втома, астенія, відчуття нездужання, жару; блідість, пітливість, біль у спині; хроматурія, утворення абсцесів, зміни психічного стану.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до препарату або до його компонентів, гемосидероз, гемохроматоз; гемолітична анемія, мегалобластна анемія, спричинена дефіцитом вітаміну В₁₂, апластична анемія; анемія, спричинена отруєнням свинцем, сидеробластна анемія, таласемія; шкіряна порфірія; І триместр вагітності; стеноз стравоходу та/або інші обструктивні захворювання травного тракту; дивертикул кишечника, кишкова непрохідність; регулярні гемотрансфузії, одночасне застосування парентеральних форм заліза; недоцільно застосовувати препарат при зниженні к-ції заліза в сироватці крові та при анеміях, спричинених хронічними запальними процесами чи новоутвореннями.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЗАЛІЗА САХАРАТ - ЗАЛІЗНЕ ВИНО	ПрАТ "Біолік", Україна	р-н орал. по 100г у фл. аобанк.	7,39г/100г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СУФЕР®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н для в/в ін'єк. по 5мл, 10мл, 20мл у фл. з розч. та без.; по 5мл в амп. у конт. чар/уп.; по 10мл у фл. в конт. чар/уп. з розч	20мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СУФЕР®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н для в/в рн'єк. по 10мл у фл. у конт. чар/уп. з розч	20мг/мл	№1	390,43	
	СУФЕР®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н для в/в ін'єк. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	20мг/мл	№5x1	701,90	
II.	ВЕНОФЕР®	Віфор (Інтернешнл) Інк. (втор. уп., дозвіл на випуск серії)/ Такеда Австрія ГмбХ (вир-во нерозфас. прод., перв. та втор. уп.)/Такеда ГмбХ (вир-во нерозфас. прод., перв. та втор. уп.)/ ІДТ Біологіка Г, Швейцарія/ Австрія/Німеччина	р-н для в/в ін'єк. по 5мл в амп.	20 мг/мл	№5	967,16	30,46/€
	ФЕРМЕД®	Медіце Арцнайміттель Пюттер Гмбх & Ко. КГ (вир-к, відпов. за втор. пак. (включаючи маркування ампул) та випуск серії)/Солюфарм Фармацойтіше Ерцойгніссе ГмбХ (вир-к балку ампул, альтер. вир-к, відпов. за втор. пак., Німеччина	р-н д/ін'єк. в амп. по 5мл	20 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФЕРОКСИД	ХЕЛП С.А., Греція	р-н д/ін'єк., по 5мл в амп. у пач.	20 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФЕРРУМ САНДОЗ®	РАФАРМ СА, Греція	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл в	20 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

		амп.			
--	--	------	--	--	--

• **Заліза гідроксид з полімальтозою (Ferric oxide polymaltose complexes)** ^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: В03АВ05 - препарати тривалентного заліза для перорального застосування. В03А С01 - антианемічні засоби. Препарати тривалентного заліза для парентерального застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: антианемічна. У вигляді активного інгредієнта надходить у ретикуло-ендотеліальну систему печінки, а також захоплюється трансферіном, апоферитином, селезінкою і кістковим мозком. Там воно сполучається з гемоглобіном, міоглобіном і залізовмісними ферментами, а також зберігається в організмі у вигляді феритину. Як і інші препарати заліза, препарат не впливає на еритропоез і не ефективний при анеміях, не пов'язаних з дефіцитом заліза. У крові залізо зв'язується з трансферіном. З плазми крові макромолекулярний комплекс потрапляє в ретикуло-ендотеліальну систему, де розщеплюється на гідроксид заліза й полімальтозу. У тканинах зберігається у складі феритину, у кістковому мозку сполучається з гемоглобіном і використовується в процесі еритропоезу.

Показання для застосування ЛЗ: лікування дефіциту заліза без анемії (латентного дефіциту заліза) та залізодефіцитної анемії (клінічно вираженого дефіциту заліза); профілактика дефіциту заліза у період вагітності і годування груддю, у жінок у репродуктивному періоді, у дітей, у підлітковому віці, у дорослих (вегетаріанців та людей літнього віку) ^[ГМД]. В/в, в/м: застосовують при залізодефіцитних станах пацієнтам, яким не можуть бути призначені р/ос препарати заліза або у разі їх неефективності.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування дефіциту заліза без анемії: від 12 р.та дорослих -1 табл.(100 мг заліза); лікування залізодефіцитної анемії: рекомендована доза від 12 р. та дорослих становить 1-3 табл. (100-300 мг заліза). Добову дозу можна приймати за 1 раз або розподілити на кілька прийомів,тривалість лікування клінічно вираженого дефіциту заліза становить 3-5 міс. до нормалізації рівня Нв, після цього прийом препарату продовжити у відповідному дозуванні для лікування латентного дефіциту заліза протягом наступних кількох тижнів для відновлення запасів заліза,тривалість лікування латентного дефіциту заліза без анемії 1-2 міс, залізодефіцитна анемія: добова доза заліза - немовлята до 1 року - 2,5–5 мл (25–50 мг), латентний дефіцит заліза без анемії - 1,5–2,5 мл (15–25 мг), залізодефіцитна анемія: діти від 1 р. до 12 р. - 5–10 мл (50–100 мг), латентний дефіцит заліза без анемії - діти від 1 р. до 12 р. -2,5–5 мл (25–50 мг); від 12 р. та дорослі - залізодефіцитна анемія: 10–30 мл (100–300 мг), латентний дефіцит заліза без анемії - 5–10 мл (50–100 мг). В/м:дорослі: 2 мл = 100 мг заліза (1 амп.)/добу, діти: МДД діти з масою тіла до 5 кг: 0,5 мл = 25 мг заліза (¼ амп.), МДД діти з масою тіла від 5 до 10 кг: 1мл = 50 мг заліза (½ амп.), МДД пацієнтів з масою тіла від 10 до 45 кг: 2 мл = 100 мг заліза (1 амп.)/добу, МДД дорослих з масою тіла від 45 кг: 4 мл = 200 мг заліза (2 амп.), якщо ознаки покращання з боку гематологічних показників відсутні ч/з 1-2 тижн., первинний діагноз варто переглянути. В/в: шляхом ін'єкції, інфузійно або протягом сеансу ГД; однократне застосування препарату не повинно перевищувати 15 мг заліза/кг маси тіла (для струминного введення) або 20 мг заліза/кг маси тіла (для інфузійного введення); 1000 мг заліза (20 мл препарату), максимальна рекомендована кумулятивна доза - 1000 мг заліза (20 мл)/тижд.; вводити струминно у нерозведеному вигляді у максимальній однократній дозі із розрахунку 15 мг заліза/кг маси тіла, але не більше 1000 мг заліза, при інфузійному введенні препарат має бути розведений, максимальна однократна доза - 20 мг заліза/кг маси тіла і не повинна перевищувати 1000 мг заліза.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР, зміна кольору калу, діарея, нудота, диспепсія, біль у животі, блювання, запор, зміна кольору зубної емалі, свербіж, висип, головний біль, р-ції гіперчутливості, анафілактоїдні р-ції, головний біль, запаморочення, парестезія, дисгевзія, втрата свідомості, вертиго, відчуття тривоги, АГ, артеріальна гіпотензія, припливи, флєбіт у місці інфузії, синкопе, пресинкопе, задишка, бронхоспазм, абдомінальний біль, діарея, метеоризм, свербіж, кропив'янка, еритема, ангіоневротичний набряк, блідість і набряк обличчя, міалгія, біль у спині, артралгія, м'язові спазми, гарячка, втома, біль у грудях, периферичний набряк, біль, озноб, ригідність м'язів, відчуття нездужання, грип як захворювання, підвищення АЛТ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: р/ос-форми: гіперчутливість до будь-якого компонента препарату; надмірний вміст заліза в організмі (гемосидероз і гемохроматоз), розлад механізмів виведення заліза (свинцева анемія, сидероахрестична анемія, таласемія); анемії, що не зумовлені дефіцитом заліза (гемолітична анемія, мегалобластна анемія); стеноз стравоходу та/або інші обструктивні захворювання травного тракту; дивертикул кишечнику, кишкова непрохідність, регулярні гемотрансфузії; одночасне застосування парентеральних форм заліза; парентеральні форми: серйозна гіперчутливість до інших препаратів парентерального заліза, тяжкі порушення гемостазу (гемофілія), порушення еритропоезу, гіпоплазія кісткового мозку, пізня порфірія шкіри, наявність ознак перенасичення організму залізом або порушення процесу утилізації заліза (сидероахрестична анемія, анемія при отруєннях свинцем, шкірна порфірія); с-м Ослера-Рандю-Вебера, хр. поліартрит, БА, інфекційні захворювання нирок у г.стадії, некомпенсований цироз печінки, інфекційний гепатит, І-й триместр вагітності.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 90 мг., парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АКВАФЕРРОЛ	ПрАТ "Технолог", Україна	сироп по 125мл у бан. з мірн. стак.	10 мг/мл	№1	12,10	
	ФЕРУМБО	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	сироп по 50мл, 100мл у фл. скл. або полім. з доз. пристр.;	50мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

			по100мл у бан. з доз. пристр.				
	ФЕРУМБО	ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	сироп по 100мл у бан. з доз. пристр.	50мг/5мл	№1	14,47	
II.	ГЕМОЖЕТ	ЮРОПИЕН ІДЖІПШЕН ФАРМАС'ЮТИКАЛ ІНДАСТРІЗ, Єгипет	сироп по 100мл у фл.	50мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	МАЛЬТОФЕР®	Віфор С.А. (вир-во нерозфас. прод., контр. якості, перв. та втор. уп.)/ Віфор (Інтернешнл) Інк. (контр. якості, дозвіл на випуск серії), Швейцарія	табл. жув. у бл.	100мг	№10x3	4,86	30,24/€
	МАЛЬТОФЕР®	Віфор С.А. (вир-во нерозфас. прод., контр. якості, перв. та втор. уп.)/ Віфор (Інтернешнл) Інк. (контр. якості, дозвіл на випуск серії), Швейцарія	крап. орал. по 10мл, 30мл конт. з крап. або фл.	50мг/мл	№1	8,74	30,24/€
	МАЛЬТОФЕР®	Віфор С.А. (вир-во нерозфас. прод., контр. якості, перв. та втор. уп.)/ Віфор (Інтернешнл) Інк. (контр. якості, дозвіл на випуск серії), Швейцарія	сироп по 75мл або 150мл у фл. з мірн. ковп.	10мг/мл	№1	10,40	30,24/€
	ФЕРИНЖЕКТ®	БІПСО ГмбХ (вир-во нерозфас. прод., перв. та втор. уп.) /ІДТ Біологіка ГмбХ (вир-во нерозфас. прод., перв. та втор. уп.)/ ВАЛІДА (втор. уп.)/ Віфор (Інтернешнл) Інк. (втор. уп., дозвіл на вип., Німеччина/Швейцарія	р-н д/ін'єк. та інфуз. по 2мл, 10мл у фл.	50мг/мл	№1, №5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФЕРИНЖЕКТ®	БІПСО ГмбХ (вир-во нерозфас. прод., перв. та втор. уп.) /ІДТ Біологіка ГмбХ (вир-во нерозфас. прод., перв. та втор. уп.)/ ВАЛІДА (втор. уп.)/ Віфор (Інтернешнл) Інк. (втор. уп., дозвіл на вип., Німеччина/Швейцарія	р-н д/ін'єк. та інфуз. по 2мл у фл.	50мг/мл	№5	1817, 17	30,24/€
	ФЕРРУМ ЛЕК	Лек Фармацевтична компанія д. д., Словенія	табл. жув. у стрип. або бл.	100мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФЕРРУМ ЛЕК	Лек Фармацевтична компанія д.д. (випуск серії)/Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С. (вир-во in bulk, пак.)/ С.К. Сандоз С.Р.Л. (контр./ випроб.серії), Словенія/ Туреччина/Румунія	сироп по 100мл у фл. з мір. лож	50мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФЕРРУМ ЛЕК	Лек Фармацевтична компанія д.д. (випуск серії)/Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С. (вир-во in bulk, пак.)/ С.К. Сандоз С.Р.Л. (контр./ випроб.серії), Словенія/ Туреччина/Румунія	сироп по 100мл у фл. з мір. лож.	50мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФЕРСІНОЛ	ФармаВіжн Сан. ве Тідж. А.Ш., Туреччина	р-н д/ін'єк. в амп. по 2мл у конт. чар/лот.	100мг/2мл	№5	151,8 3	27,05/\$

13.1.1.3. Комплексні лікарські засоби, що містять залізо та фолієву кислоту Комбіновані препарати

- **Заліза гідроксид з полімальтозою + кислота фолієва (Ferric oxide polymaltose complexes + folic acid)** ^[ГІМД]

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ФЕРРОФОЛ	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. жув. у бл.	100мг/0,35мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	МАЛЬТОФЕР® ФОЛ	Віфор С.А. (виробництво нерозфасованої продукції, контроль якості, первинна та вторинна упаковка)/Віфор (Інтернешнл) Інк. (контроль якості, дозвіл на випуск серії), Швейцарія/Швейцарія	табл. жув. у бл.	100мг/0,35мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	

13.1.1.4. Препарати заліза у комбінації із різними сполуками

- **Заліза амонійного цитрат + ціанокобаламін + кислота фолієва (Ferrous ammoniaci citrate + cyanocobalamin + folic acid)** ^[ГМД]

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЕМОФЕРОН	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна	р-н орал. у фл. по 200мл	40мг/0,01мг/0,3мг /мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

- **Заліза сульфат + кислота фолієва (Ferrous sulfate + folic acid)** ^[ГМД]

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ГІНО-ТАРДИФЕРОН	П'єр Фабр Медикамент Продакшн, Франція	табл., в/о, прол. дії у бл..	80мг/0,35мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	

- **Заліза сульфат + Серин (Ferrous sulfate + Serine)** ^[ГМД]

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ФЕРРОЛЕК-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	сироп; по 100мл, 200мл у скл. фл.	171мг/129мг /5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФЕРРОЛЕК-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	крап. орал., р-н по 30мл, 50мл або 100мл у скл. фл.	47,2 мг/35,6 мг/1мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФЕРРОЛЕК-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості), Україна/Україна	капс. м'які у бл.	34,5 мг/129 мг	№10x2, №10x3, №10x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	АКТИФЕРИН	Меркле ГмБХ (дільниця, яка відповідає за виробництво за повним циклом; дільниця, яка відповідає за дозвіл на випуск серії), Німеччина	крап. орал., р-н по 30мл у фл.	9,48мг/35,6 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АКТИФЕРИН	Меркле ГмБХ (дільниця, яка відповідає за первинну та вторинну упаковку; дільниця, яка відповідає за дозвіл на випуск серії)/Каталент Німеччина Ебербах ГмБХ (виробник, який	капс. м'які у бл.	34,5мг/129мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	

		відповідає за виробництво нерозфасованої продукції), Німеччина/Німеччина			
--	--	--	--	--	--

- **Заліза глюконат + марганцю глюконат + міді глюконат (Ferrous gluconate + mangani gluconate + cuprous gluconate)**** [ГІМД]

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ТОТЕМА	Іннотера Шузі, Франція	p-н орал. по 10мл в амп.	50мг/1,33мг/0,7мг/10мл	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Заліза сульфат + Кислота аскорбінова (Ferrous sulfate + Ascorbic acid)** [ГІМД]

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ФЕРОПЛЕКТ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"/Товариство з обмеженою відповідальністю "Натур+" (вторинне пакування), Україна/Україна	табл., в/о у бл.	50мг/30мг	№10x3, №10x6, №50x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	СОРБІФЕР ДУРУЛЕС	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл., в/о з м/в у скл. фл.	320мг/60мг	№30	103,81	26,48/\$
	СОРБІФЕР ДУРУЛЕС	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл., в/о з м/в у скл. фл.	320мг/60мг	№50	135,06	26,48/\$

13.1.2. Препарати вітаміну В12 і фолієвої кислоти

13.1.2.1. Вітамін В12 (ціанокобаламін та його аналоги)

- **Ціанокобаламін (Cyanocobalamin)** (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")

13.1.2.2. Фолієва кислота та її похідні

- **Кислота фолієва (Folic acid)** *

Фармакотерапевтична група: В03ВВ01 - антианемічні засоби. Фолієва кислота та її похідні.

Основна фармакотерапевтична дія: після прийому фолієва к-та відновлюється до тетрагідрофолату, який виконує ф-цію коферменту, що бере участь у різних процесах метаболізму: нормального визрівання мегалобластів, утворення нормобластів, стимулює еритропоез, бере участь у синтезі амінокислот (метіоніну, серину, гліцину і гістидину), нуклеїнових кислот, пуринів, піримідинів, в обміні холіну; виконує захисну ф-цію щодо дії тератогенних факторів, сприяє нормальному дозріванню і функціонуванню плаценти; відіграє важливу роль у процесі дозрівання сперматозоїдів.

Показання для застосування ЛЗ: лікування і профілактика анемії, пов'язаних з дефіцитом фолієвої к-ти: макрозитарної анемії, лейкопенії, спричинених ЛЗ та іонізуючою радіацією; мегалобластної^{В003,БНФ}, постстрекційної анемії, сидеробластної анемії у пацієнтів літнього віку; анемії при запальних захворюваннях кишечника, с-мі мальабсорбції (глутенова ентеропатія, целиакія), спру; профілактика розвитку у плода дефектів нервового стовбура^{В003,БНФ} у жінок, які планують вагітність та перебувають у групі ризику; тривале лікування антагоністами фолієвої к-ти (метотрексат, сульфаметоксазол/триметоприм), протисудомними ЛЗ (фенітоїн, примідон, фенобарбітал); дефіцит фолієвої к-ти при незбалансованому, незадовільному харчуванні; чоловіче безпліддя внаслідок зниженого сперматогенезу (олігоспермія); поліневроїти та поліневропатії, у т.ч. алкогольної етіології; як допоміжний засіб при депресіях та с-мі підвищеної тривожності, при лікуванні дисплазії шийки матки.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати р/ос; дорослим по 1-2 мг 1-3 /добу. МДД- 5 мг, курс лікування 20-30 днів; проводити 2-3 курси з перервою в 1 міс.; жінкам, які планують вагітність та перебувають у групі ризику, для профілактики розвитку у плода вроджених дефектів нервового стовбура призначати^{В003,БНФ} по 5 мг/день 4 тижн. перед настанням вагітності та продовжувати протягом перших 3 міс. вагітності; для попередження розвитку дефектів нервової трубки у плода жінкам, які раніше застосовували контрацептивні засоби, при плануванні вагітності по 400-800 мкг/добу, прийом препарату розпочинати до зачаття і продовжувати I триместр вагітності; для профілактики дефіциту фолієвої к-ти, пов'язаного з незбалансованим, незадовільним харчуванням - 1-5 мг/добу, курс лікування - 20-30 днів, ч/з 1 міс. курс лікування рекомендується повторити; при мегалобластній анемії - по 5 мг/добу 4 міс.; при спру, з макрозитарною анемією, мальабсорбцією, із запальними захворюваннями кишечника, при целиакії - по 5-15 мг/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анорексія, нудота, здуття живота, метеоризм, відчуття гіркоти в роті; р-ції гіперчутливості, включаючи еритему, висипання, свербіж, кропив'янку, задишку, анафілактичні

p-ції, ускладнене дихання у результаті бронхоспазму, шок, артеріальна гіпотензія, гарячка, розлад нічного сну, судоми; гіпертрофія епітеліальних клітин у канальцях нирок і порушення їх ф-цій, пропаснича.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату, нелікований дефіцит кобаламіну, злоякісні анемії, злоякісні новоутворення.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,4мг (профілактична доза)

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ФОЛІЄВА КИСЛОТА	ПАТ "ВІТАМІНИ", Україна	табл. у бл.	5мг	№10x3, №10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФОЛІЄВА КИСЛОТА	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. у конт.	1мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФОЛІЄВА КИСЛОТА	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. у конт.	1мг	№50	0,10	
	ФОЛІЄВА КИСЛОТА	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. у конт.	5мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФОЛІЄВА КИСЛОТА	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. у конт.	5мг	№50	0,10	
	ФОЛІЄВА КИСЛОТА	АТ "ВІТАМІНИ", Україна	табл. у бл.	1мг	№10x3, №10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФОЛІЄВА КИСЛОТА	ПАТ "Вітаміни", Україна	табл. у бл.	1мг	№10x3, №10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФОЛІЄВА КИСЛОТА	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	1мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФОЛІЄВА КИСЛОТА	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	1мг	№10x3	0,08	
II.	ВІТРУМ® ФОЛІКУМ	Юніфарм, Інк., США	табл., в/о у бл.	400мкг	№30, №60, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФОЛАЦИН	"Ядран" Галенська Лабораторія д.д., Хорватія	табл. у бл.	5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

13.1.3. Інші антианемічні засоби

- **Епоетин альфа (Epoetin alfa)** (див. п. 19.5. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Епоетин бета (Epoetin beta)** (див. п. 19.5. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Дарбепоетин альфа (Darbepoetin alfa)**

Фармакотерапевтична група: В03ХА02 - протианемічні, інші протианемічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: дарбепоетин α стимулює еритропоез завдяки тому ж самому механізму, що й ендогенний гормон, дарбепоетин α має п'ять N-пов'язаних вуглеводних ланцюжків, тоді як ендогенний гормон та рекомбінантні людські еритропоетини (r-HuEPO) мають три, додаткові залишки цукрів молекулярно не відрізняються від тих, що є на ендогенному гормоні. Ч/з підвищений вміст вуглеводу рівень дарбепоетину α у кровообігу залишається більшим за мінімальну стимулюючу к-цію, необхідну для еритропоезу, протягом більшого часу, ніж еквівалентна молярна доза r-HuEPO, що дозволяє з меншою частотою застосовувати дарбепоетин α для досягнення такої ж біологічної відповіді.

Показання для застосування ЛЗ: лікування симптоматичної анемії, пов'язаної з хронічною нирковою недостатністю (ХНН) у дорослих та дітей. Лікування симптоматичної анемії у дорослих онкохворих пацієнтів з немієлоїдними злоякісними утвореннями, які отримують хіміотерапію.^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: симптоматична анемія у дорослих та дітей з ХНН: для підвищення Hb до рівня не >120 г/л вводити п/ш або в/в; пацієнтам, які не отримують ГД, препарат вводити п/ш, щоб уникнути проколювання периферичних вен; уникати тривалого Hb понад 120 г/л; уникати підйому Hb більш ніж на 20 г/л за 4-х тижневий період. Для пацієнтів віком від 1 року з ХНН: фаза корекції: початкова доза - 0,45 мкг/кг маси тіла одноразовою ін'єкцією 1 р/тижд.. Альтернативно пацієнтам, які не перебувають на ГД, п/ш вводити послідовні початкові дози одноразовою ін'єкцією: 0,75 мкг/кг 1 р/кожні 2 тижн. або 1,5 мкг/кг 1 р/міс.; якщо підвищення Hb є недостатнім (<10 г/л за 4 тижні), збільшити дозу на 25 %, не збільшувати дозу частіше ніж 1 р/4 тижні; підвищення Hb - > 20 г/л/4 тижні, дозу зменшити на 25 %; Hb продовжує зростати, дозу зменшити на 25 %; якщо після зменшення дози Hb продовжує зростати, дозу тимчасово відмінити, поки Hb не почне знижуватися, а в цей момент терапію розпочати знову при дозі, що є на 25 % нижчою за попередню; Hb вимірювати кожні 1-2 тижні, доки він не стабілізується, після цього Hb вимірювати ч/з більші інтервали; підтримуюча фаза: пацієнтам, які перебувають на діалізі, продовжувати застосовувати одноразову ін'єкцію 1 р/тижд. або 1 р/2 тижні; пацієнти, які перебувають на діалізі, яких переводять з режиму дозування 1 р/тижд. на режим дозування ч/з тижд., мають спочатку отримати дозу, вдвічі більшу за попередню дозу, яку вводили 1 р/тижд., пацієнтам, які не перебувають на діалізі, продовжувати застосовувати як одноразову ін'єкцію 1 р/тижд., 1 р/2 тижні або 1 р/міс., пацієнтам, які

застосовують препарат 1 р/2 тижні, після досягнення бажаного Нв вводити п/ш 1 р/міс., застосовуючи початкову дозу, що вдвічі перевищує попередню дозу, яку вводили 1 р/2 тижні, якщо для підтримання Нв на бажаному рівні потрібне корегування дози, корегувати дозу на 25 %; якщо підвищення Нв - понад 20 г/л за 4 тижні, дозу зменшити на 25 % залежно від швидкості підвищення, якщо Нв перевищує 120 г/л, розглянути питання щодо необхідності зменшити дозу; якщо Нв продовжує зростати, дозу зменшити на 25 %; якщо після зменшення дози Нв продовжує зростати, дозу тимчасово відмінити, поки Нв не почне знижуватися, а в цей момент терапію розпочати знову при дозі, що є приблизно на 25 % нижчою за попередню; після корегування будь-якої дози або режиму дозування кожні 1-2 тижні перевіряти Нв, зміни дози у підтримуючій фазі лікування робити не частіше, ніж кожні 2 тижні; при зміні шляху введення застосовувати ту ж саму дозу та перевіряти Нв кожні 1-2 тижні, щоб відповідним чином скорегувати дозу для підтримання Нв на бажаному рівні. Діти з ХНН: фаза корекції: для дітей від 11 років початкова доза -0,45 мг/кг маси тіла одноразовою ін'єкцією 1 р/ тижд.; альтернативно пацієнтам, які не перебувають на діалізі, п/ш вводити початкову дозу 0,75 мг/кг маси тіла одноразовою ін'єкцією 1 р/2 тижні; якщо збільшення Нв є недостатнім (< 10 г/л за 4 тижні), дозу збільшити на 25 %, не збільшувати дозу частіше ніж 1 р/4 тижні; якщо підвищення Нв > 20 г/л/4 тижні, дозу зменшити на 25 % залежно від швидкості підвищення, якщо Нв перевищує 120 г/л, розглянути необхідність зменшення дози, якщо Нв продовжує зростати, дозу зменшити на 25 %, якщо після зменшення дози Нв продовжує зростати, дозу тимчасово відмінити, поки Нв не почне знижуватися, а в цей момент терапію розпочати знову при дозі, що є на 25 % нижчою за попередню; підтримуюча фаза: для дітей від 11 р. продовжувати застосовувати як одноразову ін'єкцію 1 р/тижд. або 1 р/2 тижні, пацієнти, які перебувають на діалізі, яких переводять з режиму дозування 1 р/тижд. на режим дозування ч/з тиждень, мають спочатку отримати дозу, вдвічі більшу за попередню дозу, яку вводили 1 р/тижд.; пацієнтам, які не перебувають на діалізі, після досягнення бажаного рівня Нв при режимі дозування 1 р/2 тижні вводити п/ш 1 р/міс., застосовуючи початкову дозу, що вдвічі перевищує попередню дозу, що вводили 1 р/2 тижні. Симптоматична анемія, спричиненої хіміотерапією, в онкохворих пацієнтів: вводити п/ш, щоб підвищити Нв не > 120 г/л, наявність варіабельності між пацієнтами іноді у пацієнта можуть спостерігатися індивідуальні значення Нв, що є нижчими та вищими за бажаний Нв, варіабельність Нв контролювати шляхом підбору дози з урахуванням цільових меж Нв від 100 г/л до 120 г/л, уникати тривалого рівня Нв > 120 г/л; рекомендована початкова доза - 500 мг (6,75 мг/кг), яку вводити 1 р/3 тижні, при режимі дозування 1 р/тижд. вводити дозу 2,25 мг/кг маси тіла, Якщо клінічна відповідь пацієнта (слабкість, відповідь гемоглобіну) є неадекватною ч/з 9 тижнів, подальша терапія не може бути ефективною, терапію припинити ч/з 4 тижні після закінчення хіміотерапії.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АГ, інсульт, тромбоемболічні явища, судоми, АР, висип/еритема, істинна еритроцитарна аплазія (PRCA), гіперчутливість, біль у ділянці ін'єкції, набряк, гіпотензія, ХНН, ІСШ, назофарингіт, целюліт, синусит, гіпоглікемія, запаморочення, головний біль, падіння, контузія, висипання, виразка шкіри, анафілактичну р-ція, набряк Квінке, алергічний бронхоспазм, шкірний висип, кропив'янка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин препарату, АТ, яка не піддається адекватному контролю ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 4,5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АРАНЕСП	Амджен Європа Б.В. (маркування, вторинне пакування та випуск серії)/Амджен Мануфекчурінг Лімітед (виробництво, первинне пакування), Нідерланди/США	р-н д/ін'єк. по 0,4мл у шпр. в бл.	25 мг/мл	№1	203,93	28,01/\$
	АРАНЕСП	Амджен Європа Б.В. (маркування, вторинне пакування та випуск серії)/Амджен Мануфекчурінг Лімітед (виробництво, первинне пакування), Нідерланди/США	р-н д/ін'єк. по 0,3мл у шпр. в бл.	100мг/мл	№1	203,93	28,01/\$
	АРАНЕСП	Амджен Європа Б.В. (маркування, вторинне пакування та випуск серії)/Амджен Мануфекчурінг Лімітед (виробництво, первинне пакування), Нідерланди/США	р-н д/ін'єк. по 1мл у шпр. в бл.	500мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

13.2. Цитостатичні засоби

Повна характеристика нижчезазначених ЛЗ наводиться в розділі «Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутворень»

- **Аспарагіназа (Asparaginase) *** (див. п. 19.1.8. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Блеоміцин (Bleomycin) *** (див. п. 19.1.4. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")

- **Бортезоміб (Bortezomib)** (див. п. 19.1.8. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Вінкристин (Vincristine)** * (див. п. 19.1.3. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Гідроксикарбамід (Hydroxycarbamide)** ** (див. п. 19.1.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Дакарбазин (Dacarbazine)** * (див. п. 19.1.1. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Децитабін (Decitabine)** (див. п. 19.1.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Доксорубіцин (Doxorubicin)** (див. п. 19.1.4. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Етопозид (Etoposide)** * (див. п. 19.1.3. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Ідарубіцин (Idarubicin)** (див. п. 19.1.4. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Іматиніб (Imatinib)** (див. п. 19.1.7. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Іфосфамід (Ifosfamide)** (див. п. 19.1.1. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Кальцію фолінат (Calcium folinate)** * (див. п. 19.5. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Кладрибін (Cladribine)** [р-н д/ін'єк., по 5мл у скл. фл.]

Фармакотерапевтична група: L01BB04 - антинеопластичні засоби. Антиметаболіти. Структурні аналоги пурину.

Основна фармакотерапевтична дія: аналог пуринового нуклеозиду, який діє як антиметаболіт; є пропрепаратом, який швидко поглинається клітинами після парентерального введення та внутрішньоклітинно фосфорилується в активний нуклеотид 2-хлордезоксиденозин-5'-трифосфат (CdATP) дезоксицитидинкіназою (dCK); механізм дії пов'язаний із включенням CdATP у ДНК-ланцюжки: синтез нової ДНК у клітинах, що діляться, блокується та пригнічується механізм відновлення ДНК внаслідок чого розриваються ДНК-ланцюжки та зменшується к-ція нікотинамід аденін динуклеотиду і АТР навіть у клітинах у стані спокою; CdATP інгібує рибонуклеотидредуктазу - фермент, який конвертує рибонуклеотиди в дезоксирибонуклеотиди; загибель клітин відбувається ч/з вичерпання енергії та апоптозу.

Показання для застосування ЛЗ: ворсинчастоклітинний лейкоз ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для п/ш болюсних ін'єкцій або в/в введення ^{БНФ}; рекомендований режим застосування для лікування ворсинчастоклітинного лейкозу - один курс введення препарату 0,14 мг/кг маси тіла/добу 5 днів у вигляді п/ш болюсної ін'єкції. Терапію препаратом припинити при виникненні г. токсичності до повного зникнення небажаної наркотичної р-ції. У випадку появи інфекції провести лікування а/б. Пацієнтам із великою пухлинною масою рекомендується проводити профілактичну терапію алопуринолом для контролю рівня сечової кислоти в сироватці крові разом з адекватною або збільшеною гідратацією, яку необхідно розпочинати за 24 год до хіміотерапії, рекомендована добова доза 100 мг алопуринолу р/ос, тривалість лікування - 2 тижн., у випадку перевищення нормального рівня сечової кислоти в сироватці крові дозу алопуринолу збільшити до 300 мг/добу. П/ш введення: рекомендовану дозу вводять шприцом без розведення, перед введенням препарату нагріти його до кімнатної t°.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції, випадки г. довготривалої лімфоцитопенії, серйозні ускладнення з нечастими летальними наслідками пов'язані з опортуністичними інфекціями (наприклад пневмоцитоз, токсоплазмоз, лістеріоз, кандидоз, герпес-вірусні, цитомегаловірусні інфекції та інфекції, спричинені атипичними мікобактеріями), септицемія, пневмонія, вторинна злоякісна пухлина, панцитопенія/мієлосупресія, тяжка тромбоцитопенія, тяжка анемія, тяжка нейтропенія, петехія, кровотеча, носова кровотеча; гіперезинофілія, імуносупресія, гемолітична анемія; р-ція «трансплантат проти господаря», зменшення апетиту, неспокій, сплутаність свідомості, депресія, головний біль, запаморочення; безсоння; сонливість, парестезії, слабкість, летаргія, полінейропатія, атаксія; епілептичний напад, неврологічні розлади мовлення і ковтання, кон'юнктивіт; блефарит, тахікардія, шум у серці, артеріальна гіпотензія, ішемія міокарда; флебіт; СН, фібриляція шлуночків, декомпенсована СН, апоплексія; легенева емболія, пригнічення дихання, хрипи у грудній клітці, кашель; задишка, легенева інтерстиціальна інфільтрація інфекційної етіології; фарингіт, нудота, блювання, запор, діарея; гастроінтестинальний біль, метеоризм, запалення слизової оболонки; ілеус, підвищення білірубину та рівня трансаміназ, холецистит, ПН, висипання, локалізована екзантема, підвищене потовиділення; свербіж, шкірний біль, еритема, кропив'янка; с-м Стівенса-Джонсона/Лайєлла (токсичний епідермальний некроліз), міалгія артралгія, артрит, біль у кістках, НН, р-ції у місці введення, гарячка (до 64 %), втомлюваність (48 %), озноб, астенія; набряк, нездужання, біль; кахексія; амілоїдоз, с-м лізису пухлини.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату; вагітність і період годування груддю; пацієнти до 18 років; пацієнти з помірним або тяжким ступенем ураження нирок (КлКр ≤ 50 мл/хв) або печінки (показник Чайлд-П'ю ≥ 6); одночасне застосування інших мієлосупресивних ЛЗ.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.

II.	ЛІТАК	Ліпомед АГ (відповідає за вторинне пакування, контроль якості та випуск серії)/Гаупт Фарма Вольфратшаузен ГмБХ (виробництво "in bulk", первинне пакування та проміжний контроль випущених серій), Швейцарія/Німеччина	р-н д/ін'ек., по 5мл у скл. фл.	2 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ
-----	-------	---	---------------------------------	---------	----	------------------------

- **Мелфалан (Melphalan)** (див. п. 19.1.1. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Месна (Mesna)** (див. п. 19.5. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Метотрексат (Methotrexate)** * (див. п. 19.1.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Мітоксантрон (Mitoxantrone)** (див. п. 19.1.4. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Нілотиніб (Nilotinib)** ** [ГМД]

Фармакотерапевтична група: L01XE08 - антинеопластичні засоби. Інгібітори протеїнкінази

Основна фармакотерапевтична дія: потужний і селективний інгібітор активності тирозинкінази Abl онкопротеїну Bcr-Abl, що діє в клітинних лініях і в первинних позитивних за філадельфійською хромосомою лейкомічних клітинах; міцно зв'язується в ділянці зв'язування АТФ, формуючи потужний інгібітор дикого типу Bcr-Abl, і зберігає активність проти 32 із 33 резистентних до іматинібу мутуючих форм Bcr-Abl; вибірково інгібує проліферацію і індукує апоптоз у клітинних лініях і в первинних позитивних за філадельфійською хромосомою лейкомічних клітинах, отриманих у пацієнтів з ХМЛ.

Показання для застосування ЛЗ: лікування уперше діагностованої хр. фази хр. мієлоїдної лейкемії (Ph+ ХМЛ), у дорослих з філадельфійською хромосомою ^{ГМД} ^{БНФ}; лікування хр. та прискореної фази (ФА) хр. мієлоїдної лейкемії (Ph+ ХМЛ) у дорослих пацієнтів з філадельфійською хромосомою, у разі резистентності або непереносимості попередньої терапії, включаючи терапію іматинібом ^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза 300 мг 2р/добу ^{БНФ}, терапію продовжувати, доки пацієнт відповідає на лікування. Якщо пацієнт пропустив прийом дози, не приймати додаткову дозу, а прийняти наступну дозу відповідно до призначення. Можлива тимчасова відміна лікування або зменшення дози препарату для зниження гематологічної токсичності (нейтропенія, тромбоцитопенія), яка не пов'язана з самою лейкемією. Якщо виникає клінічно значуща помірна або тяжка негематологічна токсичність, лікування препаратом припинити, а після нормалізації стану можливе поновлення прийому препарату в дозі 400 мг 1 р/добу. Якщо доцільно з клінічної точки зору, спробувати знову підвищити дозу до 300 мг 2р/добу, при підвищенні сироваткової ліпази до 3-4 ступеня дозу знижують до 400 мг 1 р/добу або припиняють прийом препарату, рівні сироваткової ліпази контролювати щомісяця або за клінічними показаннями, при підвищенні рівня білірубіну або печінкових трансаміназ до 3-4-го ступеня зменшити дозу до 400 мг 1р/добу або припинити застосування препарату, рівень білірубіну та печінкових трансаміназ контролювати щомісячно або за клінічними показаннями; застосовувати 2 р/добу, з інтервалом приблизно 12 год; не приймати під час їди, капс. ковтають цілими, запиваючи водою. Не можна їсти принаймні за 2 год. до прийому дози та щонайменше протягом однієї год. після прийому. Дозування для пацієнтів з уперше діагностованою Ph+ ХМЛ хронічної фази (ХФ): 300 мг 2р/добу. ^{БНФ} Дозування для пацієнтів з Ph+ ХМЛ хр. фази і ХМЛ-ФА за наявності резистентності або непереносимості до попередньої терапії: 400 мг 2р/добу ^{БНФ}. Для застосування дози 300 мг 2р/день ^{БНФ} використовують тверді капс. 150 мг. Якщо доцільно з клінічної точки зору, спробувати знову збільшити дозу до 300 мг (уперше діагностована Ph+ ХМЛ-ХФ) або до 400 мг (Ph+ ХМЛ-ХФ або ХМЛ-ФА із резистентністю до іматинібу або непереносимістю лікування) 2р/добу. При підвищенні рівня ліпази до 3-4 ступеня зменшити дозу до 400 мг 1 р/добу або припинити застосування препарату.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: висип, свербіж, головний біль, нудота, стомлюваність, алопеція, міальгія та біль у верхніх відділах живота, запор, діарея, сухість шкіри, астенія, м'язові спазми, артралгія, біль у животі, блювання, периферичні набряки, диспепсія та біль у кінцівках, мієлосупресія, тромбоцитопенія, нейтропенія, анемія, підвищення рівнів аланінтрансферази, гіпербілірубінемію, підвищення рівнів аспартаттрансферази, підвищення рівня ліпази, підвищення рівня білірубіну в крові, гіперглікемію, гіперхолестеринемію, гіпертригліцеридемія, плевральні і перикардальні випоти, шлунково-кишкові кровотечі, біль у кістках, втома, астенія, периферичний набряк, фолікуліт, інфекції ВДШ (у т. ч. фарингіт, назофарингіт, риніт), інфекція вірусу герпесу, кандидоз порожнини рота, підшкірні абсцеси, анальний абсцес, дермофетія стопи, реактивація гепатиту В, папіломи шкіри, папіломи ротової порожнини, парапротеїнемія, лейкопенія, еозинфілія, лімфопенія, панцитопенія, фебрильна нейтропенія, гіперчутливість, вторинний гіперпаратиреоз, гіпофосфатемія (у тому числі зниження рівня фосфору в крові), ЦБ, гіперхолестеринемія, гіперліпідемія, гіпертригліцеридемія, гіперкальціемія, зниження апетиту, гіпокальціемія, гіпокаліємія, гіперкаліємія, дисліпідемія, подагра, гіперурикемія, гіпоглікемія, розлад апетиту, безсоння, депресія, неспокій, амнезія, дисфорія, запаморочення, гіпестезія, периферична нейропатія, ішемічний інсульт, церебральний інфаркт, мігрень, парестезії, порушення мозкового кровообігу, стеноз базиллярної артерії, синкопе, тремор, млявість, дизестезія, синдром неспокійних ніг, гіперестезія, свербіж очей, кон'юнктивіт, сухість очей (у тому числі ксерофтальмія), набряк повік, фотопсія, крововилив кон'юнктиви, гіперемія (склери, кон'юнктиви, ока), періорбітальний набряк, блефарит, біль в очах, хоріоретинопатія, алергічний кон'юнктивіт, захворювання поверхневих тканин ока, вертиго, стенокардія, аритмія (включаючи АВ-блокаду, тахікардію, фібриляцію передсердь, вентрикулярну екстрасистолію, брадикардію), продовжений QT інтервал на ЕКГ, прискорене серцебиття, ІМ, СН, ціаноз, зменшення фракції викиду, перикардальний випіт, перикардит, діастолічна дисфункція, блокада лівої ніжки пучка Гіса, гіпертонія, приливи, гіпертонічний криз, кульгавість, оклюзійні захворювання периферичних артерій, атеросклероз, гематоми, стеноз периферичних артерій, задишка, кашель, плевральний випіт, задишка при фізичному навантаженні, плеврит, носова кровотеча, біль у ротоглотці, здуття живота, дискомфорт у животі, спотворення смаку, метеоризм,

панкреатит, гастрит, чутливість зубів, виразки стравоходу, виразка шлунка, біль у стравоході, стоматит, сухість у роті, ентероколіт, геморої, грижа діафрагми стравохідного отвору, ректальна кровотеча, запалення ясен, гіпербілірубінемія (у тому числі підвищення рівня білірубину в крові), порушення ф-ції печінки, жовтяниця, токсичний гепатит, еритема, гіпергідроз, синці, акне, дерматит (включаючи алергічний, ексфолювативний та вугровий), нічні потовиділення, екзема, лікарський дерматит, болісні відчуття шкіри, мультиформна еритема, кропивниця, блістер, шкірні кісти, гіперплазія сальних залоз, набряк обличчя, атрофія шкіри, гіпертрофія шкіри, відлущування шкіри, гіперпигментація шкіри, знебарвлення шкіри, гіперкератоз, псоріаз, біль у спині, м'язова слабкість, кістково-м'язовий біль, біль у боці, дизурія, полакіурія, хроматурія, еректильна дисфункція, гінекомастія, ущільнення в грудях, менорагія, набряк соска, пірексія, біль у грудях (у тому числі несерцевий біль у грудях), дискомфорт у грудях, біль, озноб, відчуття зміни t° тіла (у тому числі почуття гарячки, озноб), нездужання,

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до нілотинібу та інших компонентів препарату
Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ТАСИГНА	Новартіс Фарма Штейн АГ/Новартіс Фарма ГмБХ/Фарманалітика СА, Швейцарія/Німеччина/Швейцарія	капс. тверді у бл.	200мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТАСИГНА	Новартіс Фарма Штейн АГ/Новартіс Фарма ГмБХ/Фарманалітика СА, Швейцарія/Німеччина/Швейцарія	капс. тверді у бл.	200мг	№4x7	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТАСИГНА	Новартіс Фарма Штейн АГ, Швейцарія	капс. тверді у бл.	200мг	№4x7	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТАСИГНА	Новартіс Фарма Штейн АГ, Швейцарія	капс. тверді у бл.	200мг	№14x2	23639,77	26,27/\$
	ТАСИГНА	Новартіс Фарма Штейн АГ, Швейцарія	капс. тверді у бл.	150мг	№4x7	відсутня у реєстрі ОВЦ	

- **Пегаспаргаза (Pegaspargase)** (див. п. 19.1.8. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Флударабін (Fludarabine)** (див. п. 19.1.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Тіогуанін (Tioguanine)** (див. п. 19.1.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Циклофосфамід (Cyclophosphamide)** * (див. п. 19.1.1. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Цитарабін (Cytarabine)** * (див. п. 19.1.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")

13.3. Моноклональні антитіла

- **Ритуксимаб (Rituximab)** (див. п. 18.2.4. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")

13.4. Імуномодулюючі засоби

- **Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення (Immunglobulin human normale ad usum intravascular)** * (див. п. 18.1.1.1. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")
- **Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b)** (див. п. 18.1.2.1.1. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")

13.5. Імуносупресивні засоби

- **Циклоспорин (Ciclosporin)** * (див. п. 18.2.2. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")
- **Азатиоприн (Azathioprine)** * (див. п. 18.2.3. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")
- **Кислота мікофенолова (Mycophenolic acid)** (див. п. 18.2.3. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")

13.6. Стимулятори гранулоцитопоезу

- **Філграстим (Filgrastim)** (див. п. 19.3.1. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")

- **Ленограстим (Lenograstim)** (див. п. 19.3.1. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")

13.7. Гемостатичні засоби

13.7.1. Компоненти та препарати крові

- **Фактор коагуляції крові людини VIII (Human Blood Coagulation Factor VIII) ***

Фармакотерапевтична група: B02BD02 - фактори згортання крові.

Основна фармакотерапевтична дія: гемостатична; при введенні хворому на гемофілію фактор VIII зв'язується з фактором Віллебранда у кровотоці пацієнта; активований фактор VIII у поєднанні з активованим фактором IX активує фактор X; активований фактор X перетворює протромбін на тромбін, який перетворює фібриноген на фібрин і, т.ч.им чином, утворюється кров'яний згусток.

Показання для застосування ЛЗ: ОКТАНАТ/ОСТАНАТЕ®: лікування та профілактика кровотеч у пацієнтів, хворих на гемофілію А^{ВООЗ} (вроджена або набута недостатність Фактора VIII)^{БНФ}, у т.ч. пацієнтів, що раніше отримували та не отримували терапію; пацієнтів, які перенесли великі й малі хірургічні операції; лікування інгібіторної форми гемофілії для індукції імунної толерантності. Бериате®/ Beriaie®: лікування та профілактика кровотечі у пацієнтів, хворих на гемофілію А (спадкова недостатність фактору коагуляції крові VIII^{ВООЗ, БНФ}); може застосовуватися в лікуванні набутої недостатності фактору VIII^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: доза і тривалість замісної терапії залежать від ступеню дефіциту фактора VIII, локалізації і інтенсивності кровотеч та тяжкості клінічного стану хворого. ОКТАНАТ/ОСТАНАТЕ®: розрахунок необхідної дози фактора VIII базується на емпіричних даних, де 1 МО фактора VIII на 1 кг маси тіла підвищує активність фактора VIII у плазми крові на 1,5-2 % від нормальної; після розведення вводять в/в; необхідні одиниці = маса тіла (кг) x бажаний рівень підвищення фактора VIII (%) (МО/дл) x 0,5; для довгострокової профілактики кровотеч у пацієнтів із тяжкою гемофілією А, зазвичай дозування 20-40 МО Фактора VIII/кг з інтервалами 2-3 дні; особи із низькою відповіддю (інгібітори < 5 ОБ) зазвичай отримують 50-100 МО фактора VIII/кг щодня або ч/з день, а особи із високою відповіддю (інгібітори ≥ 5 ОБ) отримують 100-150 МО/кг кожні 12 год. Бериате®/ Beriate: вводиться в/в, кількість призначених одиниць фактору VIII виражається в міжнародних одиницях (МО) у відповідності до поточного стандарту ВООЗ для препаратів, що містять фактор коагуляції крові VIII; 1 МО активності фактору VIII еквівалентна кількості фактору VIII в 1 мл нормальної плазми людини; необхідна кількість одиниць = маса тіла (кг) x бажане підвищення FVIII (% або МО/дл) x 0,5; при довгостроковій профілактиці кровотеч у пацієнтів з тяжкою гемофілією А звичайні дози становлять 20-40 МО фактора VIII/кг з інтервалом введення 2-3 дні; у деяких випадках, особливо у молодих пацієнтів, можуть знадобитися більш короткі інтервали або більш високі дози; розрахунок доз препарату у дітей відбувається виходячи з маси тіла, на тих самих керівних принципах, що й для дорослих пацієнтів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР або р-ції гіперчутливості (які можуть включати ангіоневротичний набряк, відчуття пощипування та печіння у місці інфузії, озноб, прилив крові до обличчя, генералізовану кропивницю, головний біль, висип, гіпотензію, сонливість, нудоту, збудження, тахікардію, утруднене дихання, поколювання, блювання та стридорозне дихання), анафілаксія (включаючи шок), пригнічення фактора VIII, лихоманка, летаргія, парестезія, підвищення t° тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини або будь-якого іншого компоненту препарату.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БЕРИАТЕ®	ЦСЛ Берінг ГмбХ, Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'ек. або інфуз. у фл. з розч.	250МО	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БЕРИАТЕ®	ЦСЛ Берінг ГмбХ, Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'ек. або інфуз. у фл. з розч.	500МО	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БЕРИАТЕ®	ЦСЛ Берінг ГмбХ, Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'ек. або інфуз. у фл. з розч.	1000МО	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕМОКЛОТ	КЕДРІОН С.П.А./ФАЛОРНІ С.Р.Л./АЛЬФАСІГМА С.П.А., Італія/Італія/Італія/Італія	пор. д/р-ну д/інфуз. з розч. та набор. д/розчин. і введ.	500 МО/10 мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕМОКЛОТ	КЕДРІОН С.П.А./ФАЛОРНІ С.Р.Л./АЛЬФАСІГМА С.П.А., Італія/Італія/Італія/Італія	пор. д/р-ну д/інфуз. з розч. та набор. д/розчин. і введ.	1000 МО/10 мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕМОКЛОТ	КЕДРІОН С.П.А., Італія	пор. д/р-ну д/інфуз. з розч. та набор. д/розчин. і введ.	500 МО/10 мл	№1	4111,00	29,36/€
	ЕМОКЛОТ	КЕДРІОН С.П.А., Італія	пор. д/р-ну д/інфуз. з розч. та набор. д/розчин. і введ.	1000 МО/10 мл	№1	8222,00	29,36/€
	ОКТАНАТ	Октафарма АБ (виробництво	пор. д/р-ну д/ін'ек. у	50МО/мл	№1	3346,02	33,46/€

	за повним циклом за виключенням вторинної упаковки)/Октафарма Фармацевтика Продуктiонсгес м.б.Х. (виробництво за повним циклом)/Октафарма (виробництво за повним циклом за виключенням вторинної упаковки)/Октафарма Дессау ГмбХ (вто, Швеція/Австрія/Франція/Німеччина/Німеччина	фл. з розч. по 5мл та набор. для в/в введ.				
ОКТАНАТ	Октафарма АБ (виробництво за повним циклом за виключенням вторинної упаковки)/Октафарма Фармацевтика Продуктiонсгес м.б.Х. (виробництво за повним циклом)/Октафарма (виробництво за повним циклом за виключенням вторинної упаковки)/Октафарма Дессау ГмбХ (вто, Швеція/Австрія/Франція/Німеччина/Німеччина	пор д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч. по 10мл та набор. для в/в введ.	50МО/мл	№1	6424,36	33,46/€
ОКТАНАТ	Октафарма АБ (виробництво за повним циклом за виключенням вторинної упаковки)/Октафарма Фармацевтика Продуктiонсгес м.б.Х. (виробництво за повним циклом)/Октафарма (виробництво за повним циклом за виключенням вторинної упаковки)/Октафарма Дессау ГмбХ (вто, Швеція/Австрія/Франція/Німеччина/Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч. по 10мл та набор. для в/в введ.	100МО/мл	№1	13183,32	33,46/€

• **Фактор VIII коагуляції крові, октоког альфа (Coagulation factor VIII, octocog alfa) ***

Фармакотерапевтична група: B02BD02 - гемостатичні препарати. Фактор коагуляції крові VIII.

Основна фармакотерапевтична дія: гемостатична.

Показання для застосування ЛЗ: лікування і профілактика кровотеч у дорослих і дітей з гемофілією А^{БНФ} (вроженою недостатністю Фактора VIII)^{БНФ};

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити в/в, лікування потрібно розпочинати під контролем лікаря, який має досвід у лікуванні хворих на гемофілію і має доступні засоби реанімації на випадок виникнення анафілактичної р-ції; доза Фактора VIII (FVIII) виражається в міжнародних одиницях (МО), які пов'язані з стандартом ВООЗ для препаратів Фактора VIII, активність Фактора VIII в плазмі виражається або у відсотках (по відношенню до нормальної людської плазми), або в МО (по відношенню до міжнародного стандарту Фактора VIII в плазмі). 1 МО активності Фактора VIII еквівалентна кількості Фактора VIII в 1 мл нормальної людської плазми. Розрахунок потрібної дози Фактора VIII здійснюється на основі емпірично виявленої залежності: 1 МО Фактора VIII на 1 кг ваги тіла збільшує активність Фактора VIII в плазмі на 2 МО/дл. Необхідна доза визначається за такою формулою: Потрібна кількість одиниць (МО) = вага тіла (кг) x бажане збільшення Фактора VIII (%) x 0,5. У разі появи наступних епізодів кровотечі активність Фактора VIII не повинна опускатися нижче заданого рівня активності в плазмі (у % від нормального рівня або МО/дл) у відповідному періоді. При початковому гемартрозі, кровотеча у м'язах або ротовій порожнині необхідний рівень Фактора VIII (% або МО/дл) 20-40, а повторні інфузії кожні 12-24 год (8-24 год для пацієнтів до 6 років) протягом мінімум 1 дня, до припинення кровотечі, що виражається як біль, або до одужання. При значному гемартрозі, кровотечі у м'язах або гематомі необхідний рівень Фактора VIII (% або МО/дл) 30-60, а повторні інфузії кожні 12-24 год (8-24 год для пацієнтів до 6 років) протягом 3-4 днів чи більше, до припинення болю і зникнення г. порушення. При кровотечах, що загрожують життю, наприклад, травма голови, кровотеча в горлі або сильний біль у животі необхідний рівень Фактора VIII (% або МО/дл) 60-100, а повторні інфузії кожні 8-24 год (6-12 год для пацієнтів до 6 років) до зникнення загрози. При малій операції, в тому числі видаленні зубів необхідний рівень Фактора VIII (% або МО/дл) 30-60, а частота введення доз (год)/тривалість лікування (дні) кожні 24 год (12-24 год для пацієнтів до 6 років) протягом мінімум 1 дня, до одужання. При великій операції необхідний рівень Фактора VIII (% або МО/дл) 80-100 (перед і після

операції), а повторні інфузії кожні 8-24 год (6-24 год для пацієнтів до 6 років) до достатнього загоєння рани, далі постійна терапія протягом іще мінімум 7 днів для підтримання активності Фактора VIII 30-60% від норми (МО/дл). Дозу і частоту введення потрібно адаптувати до клінічної відповіді у кожному окремому випадку. Для тривалої профілактики кровотечі у хворих на тяжку форму гемофілії А звичайні дози складають 20-40 МО Фактора VIII на кг ваги тіла з інтервалом 2-3 дні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: грип, ларингіт, пригнічення Фактора VIII, лімфангіт, анафілактична р-ція, підвищена чутливість, головний біль, запаморочення, погіршення пам'яті, гематома, приплив крові до обличчя, блідість, задишка, діарея, болі у верхній частині живота, нудота, блювання, свербіж, висипання, гіпергідроз, кропив'янка, гіпертермія, периферійний набряк, біль у грудях, дискомфорт у грудях, застуда, погане самопочуття, гематома у місці пункції судини, підвищена втомлюваність, р-ції у місці введення, нездужання, підвищений рівень моноцитів, знижений рівень Фактора коагуляції VIII, знижений гематокрит, відхилення від норми лабораторних показників, післяпроцедурні ускладнення, післяпроцедурна кровотеча, р-ція місця проведення процедури.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активної речовини або до будь-якої допоміжної речовини; відомі АР до білків мишей та хом'яків.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АДВЕЙТ	Бакстер АГ/Баксалта Мануфактурінг Сарл/Баксалта Белджіум Мануфактурінг СА/хамельн фармацевтикалс гмбх, Австрія/Швейцарія/Бельгія/Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч. та набор. д/розч. і введ.	250МО	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АДВЕЙТ	Бакстер АГ/Баксалта Мануфактурінг Сарл/Баксалта Белджіум Мануфактурінг СА/хамельн фармацевтикалс гмбх, Австрія/Швейцарія/Бельгія/Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч. та набор. д/розч. і введ.	500МО	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АДВЕЙТ	Бакстер АГ/Баксалта Мануфактурінг Сарл/Баксалта Белджіум Мануфактурінг СА/хамельн фармацевтикалс гмбх, Австрія/Швейцарія/Бельгія/Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч. та набор. д/розч. і введ.	1000МО	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АДВЕЙТ	Бакстер АГ/Баксалта Мануфактурінг Сарл/Баксалта Белджіум Мануфактурінг СА/хамельн фармацевтикалс гмбх, Австрія/Швейцарія/Бельгія/Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч. та набор. д/розч. і введ.	1500МО	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АДВЕЙТ	Бакстер АГ/Баксалта Мануфактурінг Сарл/Баксалта Белджіум Мануфактурінг СА/хамельн фармацевтикалс гмбх, Австрія/Швейцарія/Бельгія/Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч. та набор. д/розч. і введ.	2000МО	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АДВЕЙТ	Бакстер АГ/Баксалта Мануфактурінг Сарл/Баксалта Белджіум Мануфактурінг СА/хамельн фармацевтикалс гмбх, Австрія/Швейцарія/Бельгія/Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч. та набор. д/розч. і введ.	3000МО	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АДВЕЙТ	Баксалта Белджіум Мануфактурінг СА (вторинне пакування готового лікарського засобу та розчинника, частковий контроль якості)	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч. та прист. д/розвед. БАКСДЖЕКТ II	250МО	№1	1972,75	26,30/\$

	готового лікарського засобу, випуск серії готового лікарського засобу та розчинника)/Баксалта Мануфактуринг Сарл (виробництво нероз, Бельгія/Швейцарія/Австрія/Німеччина					
АДВЕЙТ	Баксалта Белджіум Мануфактуринг СА (вторинне пакування готового лікарського засобу та розчинника, частковий контроль якості готового лікарського засобу, випуск серії готового лікарського засобу та розчинника)/Баксалта Мануфактуринг Сарл (виробництво нероз, Бельгія/Швейцарія/Австрія/Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. та прист. д/розвед. БАКСДЖЕКТ II	500МО	№1	3945,50	26,30/\$
АДВЕЙТ	Баксалта Белджіум Мануфактуринг СА (вторинне пакування готового лікарського засобу та розчинника, частковий контроль якості готового лікарського засобу, випуск серії готового лікарського засобу та розчинника)/Баксалта Мануфактуринг Сарл (виробництво нероз, Бельгія/Швейцарія/Австрія/Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. та прист. д/розвед. БАКСДЖЕКТ II	1000МО	№1	7891,00	26,30/\$
АДВЕЙТ	Баксалта Белджіум Мануфактуринг СА (вторинне пакування готового лікарського засобу та розчинника, частковий контроль якості готового лікарського засобу, випуск серії готового лікарського засобу та розчинника)/Баксалта Мануфактуринг Сарл (виробництво нероз, Бельгія/Швейцарія/Австрія/Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. та прист. д/розвед. БАКСДЖЕКТ II	1500МО	№1	11836,50	26,30/\$
АДВЕЙТ	Баксалта Белджіум Мануфактуринг СА (вторинне пакування готового лікарського засобу та розчинника, частковий контроль якості готового лікарського засобу, випуск серії готового лікарського засобу та розчинника)/Баксалта Мануфактуринг Сарл (виробництво нероз, Бельгія/Швейцарія/Австрія/Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. та прист. д/розвед. БАКСДЖЕКТ II	2000МО	№1	15782,00	26,30/\$
АДВЕЙТ	Баксалта Белджіум Мануфактуринг СА (вторинне пакування готового лікарського засобу та розчинника, частковий контроль якості готового лікарського засобу, випуск серії готового лікарського засобу та розчинника)/Баксалта Мануфактуринг Сарл (виробництво нероз, Бельгія/Швейцарія/Австрія/Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. та прист. д/розвед. БАКСДЖЕКТ II	3000МО	№1	23673,00	26,30/\$

	Мануфактуринг Сарл (виробництво нероз, Бельгія/Швейцарія/Австрія/Німеччина)				
КОДЖИНЕЙТ БАЙЄР / KOGENATE® BAYER	Байєр Хелскер Мануфактуринг С.р.л. (вторинне пакування та маркування, контроль серії, зберігання, випуск серії; виробник розчинника: пакування, зберігання, випуск серії)/Байєр АГ (вторинне пакування та маркування, зберігання; виробник розчинника: змішувач, Італія/Німеччина/США/Німеччина)	пор. д/приг. р-ну д/ін'ек. у фл. сист. Біо-компл.з розч.	2000МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
КОДЖИНЕЙТ БАЙЄР / KOGENATE® BAYER	Байєр Хелскер Мануфактуринг С.р.л. (вторинне пакування та маркування, контроль серії, зберігання, випуск серії; виробник розчинника: пакування, зберігання, випуск серії)/Байєр АГ (вторинне пакування та маркування, зберігання; виробник розчинника: змішувач, Італія/Німеччина/США/Німеччина)	пор. д/приг. р-ну д/ін'ек. у фл. сист. Біо-компл. з розч.	3000МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
РЕКОМБІНАТ	Баксалта Белджіум Мануфактуринг СА/хамельн фармацевтикалс гмбх, Бельгія/Німеччина	ліоф. пор. д/приг. р-ну д/ін'ек. у фл. з розч.	250МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
РЕКОМБІНАТ	Баксалта Белджіум Мануфактуринг СА/хамельн фармацевтикалс гмбх, Бельгія/Німеччина	ліоф. пор. д/приг. р-ну д/ін'ек. у фл. з розч.	500МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
РЕКОМБІНАТ	Баксалта Белджіум Мануфактуринг СА/хамельн фармацевтикалс гмбх, Бельгія/Німеччина	ліоф. пор. д/приг. р-ну д/ін'ек. у фл. з розч.	100МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
РЕКОМБІНАТ	Баксалта Белджіум Мануфактуринг СА (Первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії ГЛЗ; пакування та випуск серії розчинника)/Баксалта Мануфактуринг Сарл (контроль якості ГЛЗ)/Баксалта ЮС Інк. (виробництво продукту in bulk)/Бакстер АГ (конт, Бельгія/Швейцарія/США/Австрія/Німеччина)	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч.	250МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
РЕКОМБІНАТ	Баксалта Белджіум Мануфактуринг СА (Первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії ГЛЗ; пакування та випуск серії розчинника)/Баксалта Мануфактуринг Сарл (контроль якості ГЛЗ);/Баксалта ЮС Інк. (виробництво продукту in bulk)/Бакстер АГ (конт, Бельгія/Швейцарія/США/Австрія/Німеччина)	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч.	500МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
РЕКОМБІНАТ	Баксалта Белджіум Мануфактуринг СА (Первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч.	100МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ

		ГЛЗ; пакування та випуск серії розчинника/Баксалта Мануфактуринг Сарл (контроль якості ГЛЗ)/Баксалта ЮС Інк. (виробництво продукту in bulk)/Бакстер АГ (конт, Бельгія/Швейцарія/США/Австрія/Німеччина			
--	--	---	--	--	--

• **Фактор ІХ коагуляції крові людини (Coagulation factor ІХ) ***

Фармакотерапевтична група: В02ВD04 - антигеморагічні засоби. Фактор згортання ІХ.

Основна фармакотерапевтична дія: гемостатична; має структурні та функціональні характеристики, порівнянні зі структурними та функціональними характеристиками ендogenous фактора ІХ, який активується за участю комплексу фактора VIIa/тканинного фактора у зовнішній системі коагуляції та за участю фактора XIa у внутрішній системі коагуляції; активований фактор ІХ в поєднанні з активованим фактором VIII активує фактор X, що призводить до перетворення протромбіну в тромбін, після чого тромбін перетворює фібриноген у фібрин, в результаті чого утворюється згусток.

Показання для застосування ЛЗ: ОКТАНІН Ф: лікування та профілактика кровотеч у пацієнтів з гемофілією В (вроджений дефіцит фактора ІХ)^{БНФ}; ІМУНІН: лікування і профілактика епізодів кровотеч у пацієнтів з гемофілією В^{БНФ} (вроджений дефіцит фактора ІХ) віком від 6 років; Ріксубіс: лікування і профілактика епізодів кровотеч у пацієнтів, хворих на гемофілію В; періопераційне лікування пацієнтів, хворих на гемофілію В; стандартна профілактика для запобігання кровотеч або зменшення частоти епізодів кровотеч у пацієнтів, хворих на гемофілію В. БЕНЕФІКС: лікування та профілактика кровотеч у пацієнтів з гемофілією В (вроджений дефіцит фактора ІХ).^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: ОКТАНІН Ф: дозування та тривалість замісної терапії залежать від ступеня тяжкості дефіциту фактора ІХ, локалізації та тяжкості кровотечі, а також від клінічного стану пацієнта; потрібна кількість одиниць = маса тіла (кг) × бажане підвищення фактора ІХ (%)(МО/дл) × 0,8; в/в, вводити зі швидкістю не > 2-3 мл/хв.; кількість препарату, яку має бути введено та частота введення повинні бути орієнтовані на клінічну ефективність у кожному випадку, препарати фактора ІХ вводять не частіше, ніж 1 р/добу. Впродовж курсу лікування визначати рівень фактора ІХ для встановлення потрібної дози та частоти введення, у випадку великих хірургічних втручань, обов'язковим є особливо контроль замісної терапії шляхом проведення аналізів коагуляції (визначення активності фактора ІХ плазми крові), тривала профілактика кровотеч у пацієнтів з тяжкою гемофілією В: звичайна доза - 20-40 МО/кг маси тіла (МТ) з інтервалом 3-4 дні; у молодих пацієнтів коротші інтервали між введеннями або вищі дози. ІМУНІН: потрібна кількість одиниць = маса тіла (кг) × бажане збільшення фактора ІХ (%) (МО/дл) × 0,9; в/в, щоб швидкість інфузії не перевищувала 2 мл/хв; частота введення доз (год.)/тривалість терапії (дні): ранній гемартроз, кровотеча у м'язах або кровотеча з рота: повторювати введення кожні 24 год, щонайменше протягом 1 доби, до припинення кровотечі, за відчуттям болю або загоєння (потрібний рівень фактора ІХ - 20-40%); більш розповсюджений гемартроз, кровотеча у м'язах або гематома - повторювати введення кожні 24 год протягом 3 - 4 діб або більше, доки не пройдуть біль та г. стан непрацездатності (потрібний рівень фактора ІХ - 30-60%); кровотеча, що загрожує життю: повторювати введення кожні 8 - 24 год до зникнення загрози життю (потрібний рівень фактора ІХ - 60-100%); мала операція, в т.ч. видалення зуба: кожні 24 год., протягом 1 доби до повного загоєння (потрібний рівень фактора ІХ - 30-60%); велика операція: повторювати введення кожні 8-24 год. до адекватного загоєння рани, потім продовжити терапію 7 діб, підтримуючи рівень активності фактора ІХ 30 %- 60 % (МО/дл); тривала профілактика кровотеч у пацієнтів з тяжкою гемофілією В: звичайна доза 20-40 МО/кг маси тіла з інтервалом від 3-4-х дні; в окремих випадках, особливо у молодих пацієнтів, можуть знадобитися коротші інтервали між введеннями або вищі дози. РІКСУБІС: в/в болюсно; початкова доза розраховується на основі емпіричних висновків, що у разі застосування однієї МО на 1 кг маси тіла очікується збільшення циркулюючого рівня фактора ІХ на 0,9 МО/дл плазми крові (на 0,9 % норми): початкова доза препарату = маса тіла (кг) × бажаний приріст рівнів фактора ІХ (у % норми або у МО/дл) × зворотна величина спостережуваного відновлення (МО/кг у перерахунку на МО/дл). У разі покрокового відновлення на 0,9 МО/дл плазми крові (на 0,9 % норми) доза препарату розраховується: доза препарату (МО) = маса тіла (кг) × бажаний приріст рівнів фактора ІХ (у % норми або у МО/дл) × 1,1 дл/кг; тривала профілактика кровотеч у пацієнтів з тяжкою формою гемофілії В: рекомендована доза для раніше лікованих пацієнтів - від 40 до 60 МО на 1 кг/маси тіла 2 р/тижд. БЕНЕФІКС: необхідна доза - необхідна кількість одиниць фактора ІХ (МО) = маса тіла (кг) × бажане збільшення кількості фактора ІХ (% або МО/дл) × зворотна величина поступового відновлення, яке зазвичай спостерігається після інфузії фактора; для відновлення на рівні 0,8 МО/дл (середнє підвищення фактора ІХ) використовують таку формулу: необхідна кількість одиниць фактора ІХ (МО) = маса тіла (кг) × бажане збільшення кількості фактора ІХ (% або МО/дл) × 1,3 МО/кг; для тривалої профілактики геморагічних явищ пацієнтам з тяжкою формою гемофілії В: середня доза препарату для звичайної вторинної профілактики у ПЛП 40 МО/кг (від 13 до 78 МО/кг) з інтервалами введення від 3 до 4 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: підвищена чутливість або АР, до яких можуть належати ангіоневротичний набряк, пекучий і г. біль у місці інфузії, озноб, припливи, загальна кропив'янка, головний біль, нисип, гіпотонія, летаргія, неспокій, стиснення у грудях, поколювання, розвиток нефротичного с-му, розвиток нейтралізуючих антитіл (інгібіторів) до фактора ІХ, пригнічення фактора ІХ, ІМ, с-му дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ-с-м), розвиток інгібіторів, запалення підшкірної клітковини в місці інфузії, анафілактична р-ція, сироваткова хвороба, р-ція підвищеної чутливості, с-м верхньої порожнистої вени, тромбоз глибоких вен, тромбоз, тромбофлебіт, інфаркт нирки, недостатня відповідь на лікування, недостатній рівень відновлення фактора ІХ, пірексія, кашель, дискомфорт в ділянці грудної клітки, р-ція в місці інфузії, поколювання, тахікардія, тромбоемболічні епізоди (в т. ч. легенева емболія, венозний тромбоз, артеріальний тромбоз, тромбоз церебральних артерій), припливи, подразнення горла, біль у роті і глотці, сухий кашель, свистяче дихання, задишка, нудота, блювання, свербіж, гіпертермія, застуда, запаморочення, дисгевзія, сонливість, тремор,

погіршення зору, пірекісія, біль у кінцівках, позитивні результати тесту на антитіла до фурину, антитіла до фактора IX або фурину з невизначеною специфічністю.

Противпоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якої допоміжної речовини, а також до білка хом'яка, відома алергія, пов'язана зі зменшенням кількості тромбоцитів під час лікування гепарином (тромбоцитопенія, спричинена застосуванням гепарину, тип II); с-м дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ-с-м); ознаки фібринолізу.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АІМАФІКС	КЕДРІОН С.П.А./ФАЛОРНІ С.Р.Л./АЛЬФАСІГМА С.П.А., Італія/Італія/Італія/Італія	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл. з розч. по 10мл та набір д/розчин. і введ.	500 МО	№1	4699,27	29,37/€
	АІМАФІКС	КЕДРІОН С.П.А./ФАЛОРНІ С.Р.Л./АЛЬФАСІГМА С.П.А., Італія/Італія/Італія/Італія	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл. з розч. по 10мл та набір д/розчин. і введ.	1000МО	№1	9398,54	29,37/€
	АІМАФІКС	КЕДРІОН С.П.А., Італія	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл. з розч. по 10мл та набір д/розчин. і введ.	500 МО	№1	4762,88	29,77/€
	АІМАФІКС	КЕДРІОН С.П.А., Італія	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл. з розч. по 10мл та набір д/розчин. і введ.	1000МО	№1	9525,76	29,77/€
	БЕНЕФІКС	Ваєт Фарма С.А. (виробництво ліофілізату за повним циклом; контроль якості розчинника (крім тесту "Сила тертя поршня"); пакування розчинника у набір; контроль якості, зберігання, пакування та випуск набору; відповідальний за випуск серії)/БіоЛаб, С.Л. (ал, Іспанія/Іспанія/Німеччина/США	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. та стер. набором	250МО	№1	5635,57	25,91/\$
	БЕНЕФІКС	Ваєт Фарма С.А. (виробництво ліофілізату за повним циклом; контроль якості розчинника (крім тесту "Сила тертя поршня"); пакування розчинника у набір; контроль якості, зберігання, пакування та випуск набору; відповідальний за випуск серії)/БіоЛаб, С.Л. (ал, Іспанія/Іспанія/Німеччина/США	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. та стер. набором	500МО	№1	11271,14	25,91/\$
	БЕНЕФІКС	Ваєт Фарма С.А. (виробництво ліофілізату за повним циклом; контроль якості розчинника (крім тесту "Сила тертя поршня"); пакування розчинника у набір; контроль якості, зберігання, пакування та випуск набору; відповідальний за випуск серії)/БіоЛаб, С.Л. (ал,	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. та стер. набором	1000МО	№1	22542,29	25,91/\$

	Іспанія/Іспанія/Німеччина/США					
БЕНЕФІКС	Ваєт Фарма С.А. (виробництво ліофілізату за повним циклом; контроль якості розчинника (крім тесту "Сила тертя поршня"); пакування розчинника у набір; контроль якості, зберігання, пакування та випуск набору; відповідальний за випуск серії)/БіоЛаб, С.Л. (ал, Іспанія/Іспанія/Німеччина/США	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. та стер. набором	2000МО	№1	45084,57	25,91/\$
БЕНЕФІКС	Ваєт Фарма С.А. (виробництво ліофілізату за повним циклом; контроль якості розчинника (крім тесту "Сила тертя поршня"); пакування розчинника у набір; контроль якості, зберігання, пакування та випуск набору; відповідальний за випуск серії)/БіоЛаб, С.Л. (ал, Іспанія/Іспанія/Німеччина/США	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. та стер. набором	3000МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ІМУНІН	Бакстер АГ/хамельн фармацевтикалс гмбх, Австрія/Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'єк та інфуз. у фл. з розч. та набір д/розчин. і введ.	600МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ІМУНІН	Бакстер АГ/хамельн фармацевтикалс гмбх, Австрія/Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'єк та інфуз. у фл. з розч. та набір д/розчин. і введ.	1200МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ІМУНІН	Бакстер АГ (первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії ГЛЗ, пакування та випуск серії розчинника; контроль якості ГЛЗ; виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування ГЛЗ, вторинне пакування розчинника, контроль яко, Австрія/Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'єк та інфуз. у фл. з розч. та набір д/розчин. і введ.	600МО	№1	4052,60	27,02/\$
ІМУНІН	Бакстер АГ (первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії ГЛЗ, пакування та випуск серії розчинника; контроль якості ГЛЗ; виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування ГЛЗ, вторинне пакування розчинника, контроль яко, Австрія/Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'єк та інфуз. у фл. з розч. та набір д/розчин. і введ.	1200МО	№1	8105,19	27,02/\$
ОКТАНІН Ф 1000 МО	Октафарма Дессау ГмбХ (Виробник (альтернативний), відповідальний за вторинне	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. та компл. д/розч. та в/в введ.	1000МО	№1	9270,81	30,90/€

	пакування та візуальний огляд лікарського засобу, виробленого на інших виробничих дільницях)/Октафарма Фармацевтика Продуктiонсгес м.б.Х. (Виробник, відповідальний за виробництво, Німеччина/Австрія/Франція					
ОКТАНІН Ф 250 МО	Октафарма Дессау ГмбХ (виробник (альтернативний), відповідальний за вторинне пакування)/Октафарма Фармацевтика Продуктiонсгес м.б.Х. (виробник, відповідальний за виробництво за повним циклом)/Октафарма (виробник, відповідальний за виробництво за повним ци, Німеччина/Австрія/Франція	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч. та компл. д/розч. та в/в введ.	250МО	№1	2317,70	30,90/€
ОКТАНІН Ф 500 МО	Октафарма Дессау ГмбХ (Виробник (альтернативний), відповідальний за вторинне пакування та візуальний огляд лікарського засобу, виробленого на інших виробничих дільницях)/Октафарма Фармацевтика Продуктiонсгес м.б.Х. (Виробник, відповідальний за виробництво, Німеччина/Австрія/Франція	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч. та компл. д/розч. та в/в введ.	500МО	№1	4635,41	30,90/€
РІКСУБІС	Бакстер Хелскеа Корпорейшн (виробництво порошку ліофілізованого для розчину для інфузій, відповідальний за випуск серії)/Хамельн Фармацевтикалс ГмбХ (виробництво розчинника), США/Німеччина	пор. ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл. з розчин. та прист. д/розч. Вахґест II	250МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РІКСУБІС	Бакстер Хелскеа Корпорейшн (виробництво порошку ліофілізованого для розчину для інфузій, відповідальний за випуск серії)/Хамельн Фармацевтикалс ГмбХ (виробництво розчинника), США/Німеччина	пор. ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл. з розчин. та прист. д/розч. Вахґест II	500МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РІКСУБІС	Бакстер Хелскеа Корпорейшн (виробництво порошку ліофілізованого для розчину для інфузій, відповідальний за випуск серії)/Хамельн Фармацевтикалс ГмбХ (виробництво розчинника), США/Німеччина	пор. ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл. з розчин. та прист. д/розч. Вахґест II	1000МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РІКСУБІС	Бакстер Хелскеа Корпорейшн (виробництво порошку ліофілізованого для розчину для інфузій, відповідальний за випуск	пор. ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл. з розчин. та прист. д/розч. Вахґест II	2000МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

	серії)/Хамельн Фармацевтикалс ГмбХ (виробництво розчинника), США/Німеччина				
РІКСУБІС	Бакстер Хелскеа Корпорейшн (виробництво порошку ліофілізованого для розчину для інфузій, відповідальний за випуск серії)/Хамельн Фармацевтикалс ГмбХ (виробництво розчинника), США/Німеччина	пор. ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл. з розчин. та прист. д/розч. Вахјест II	3000МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
РІКСУБІС	Баксалта Бельджіум Мануфактурінг СА (маркування, вторинне пакування та випуск серії ГЛЗ та розчинника)/Баксалта ЮС Інк (виробництво, контроль якості та первинне пакування ГЛЗ)/Бакстер АГ (частковий контроль якості ГЛЗ)/Офі Технолоджи енд Інновейшіон ГмбХ , Бельгія/США/Австрія/Австрі я/Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч. та пристос. д/розвед. БАКСДЖЕКТ II	250МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
РІКСУБІС	Баксалта Бельджіум Мануфактурінг СА (маркування, вторинне пакування та випуск серії ГЛЗ та розчинника)/Баксалта ЮС Інк (виробництво, контроль якості та первинне пакування ГЛЗ)/Бакстер АГ (частковий контроль якості ГЛЗ)/Офі Технолоджи енд Інновейшіон ГмбХ , Бельгія/США/Австрія/Австрі я/Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч. та пристос. д/розвед. БАКСДЖЕКТ II	500МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
РІКСУБІС	Баксалта Бельджіум Мануфактурінг СА (маркування, вторинне пакування та випуск серії ГЛЗ та розчинника)/Баксалта ЮС Інк (виробництво, контроль якості та первинне пакування ГЛЗ)/Бакстер АГ (частковий контроль якості ГЛЗ)/Офі Технолоджи енд Інновейшіон ГмбХ , Бельгія/США/Австрія/Австрі я/Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч. та пристос. д/розвед. БАКСДЖЕКТ II	1000МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
РІКСУБІС	Баксалта Бельджіум Мануфактурінг СА (маркування, вторинне пакування та випуск серії ГЛЗ та розчинника)/Баксалта ЮС Інк (виробництво, контроль якості та первинне пакування ГЛЗ)/Бакстер АГ (частковий контроль якості ГЛЗ)/Офі Технолоджи енд Інновейшіон ГмбХ , Бельгія/США/Австрія/Австрі я/Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч. та пристос. д/розвед. БАКСДЖЕКТ II	2000МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ

РІКСУБІС	Баксалта Бельджіум Мануфактурінг СА (маркування, вторинне пакування та випуск серії ГЛЗ та розчинника)/Баксалта ЮС Інк (виробництво, контроль якості та первинне пакування ГЛЗ)/Бакстер АГ (частковий контроль якості ГЛЗ)/Офі Технологіє енд Інновейшійн ГмбХ, Бельгія/США/Австрія/Австрія/Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. та пристос. д/розвед. БАКСДЖЕКТ ІІ	3000МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
РІКСУБІС/РІХ UBIS	Баксалта Белджіум Мануфактурінг СА/Бакстер СА/Бакстер АГ/офі Технологіє енд Інновейшійн ГмбХ/хамельн фармацевтикалс гмбх/Баксалта ЮС Інк., Бельгія/Бельгія/Австрія/Австрія/Німеччина/США	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. та пристос. д/розвед. БАКСДЖЕКТ ІІ	250МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
РІКСУБІС/РІХ UBIS	Баксалта Белджіум Мануфактурінг СА/Бакстер СА/Бакстер АГ/офі Технологіє енд Інновейшійн ГмбХ/хамельн фармацевтикалс гмбх/Баксалта ЮС Інк., Бельгія/Бельгія/Австрія/Австрія/Німеччина/США	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. та пристос. д/розвед. БАКСДЖЕКТ ІІ	500МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
РІКСУБІС/РІХ UBIS	Баксалта Белджіум Мануфактурінг СА/Бакстер СА/Бакстер АГ/офі Технологіє енд Інновейшійн ГмбХ/хамельн фармацевтикалс гмбх/Баксалта ЮС Інк., Бельгія/Бельгія/Австрія/Австрія/Німеччина/США	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. та пристос. д/розвед. БАКСДЖЕКТ ІІ	1000МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ

● **Ептаког альфа (Eptacog alfa) ***

Фармакотерапевтична група: V02BD08 - гемостатичні засоби. Фактори згортання крові

Основна фармакотерапевтична дія: механізм дії полягає у зв'язуванні фактора VIIa з тканинним фактором; цей комплекс переводить фактори IX і X в активну форму - IXa і Xa, що спричинює перетворення невеликих кількостей протромбіну в тромбін; тромбін у місці ушкодження активує тромбоцити, V і VIII фактори, що спричинюють перетворення фібриногену у фібрин і утворення гемостатичного згустку.

Показання для застосування ЛЗ: лікування кровотеч та їх профілактика^{БНФ} при хірургічних втручаннях або інших інвазивних процедурах у хворих з уродженою гемофілією^{БНФ} з рівнем інгібіторів до факторів коагуляції VIII або IX > 5 BU, уродженою гемофілією з вираженою р-цією на введення факторів VIII або IX в анамнезі, набутою гемофілією^{БНФ}, уродженим дефіцитом VII фактора^{БНФ}, тромбастенією Гланцмана^{БНФ} з а/т до GP IIb-IIIa і/або HLA і резистентністю до переливання тромбоцитів у минулому або на даний час.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: у вигляді в/в болюсної ін'єкції^{БНФ} протягом 2-5 хв.; гемофілія А або В з наявністю інгібіторів або набута гемофілія - вводити якнайшвидше після початку кровотечі, початкову рекомендовану дозу вводять в/в (болюсно) із розрахунку 90 мкг (4,5 КМО)/кг; після введення початкової дози може виникнути потреба у повторних введеннях; тривалість лікування та інтервали між введеннями варіюють залежно від тяжкості кровотечі, виду інвазивної процедури або оперативного втручання; спочатку для досягнення гемостазу повторно вводять через 2-3 год, при необхідності продовження лікування після досягнення ефективного гемостазу введення повторюють ч/з 4, 6, 8 або 12 год стільки, скільки буде потрібно для лікування; легкі чи помірні кровотечі (у тому числі при амбулаторному лікуванні) - в амбулаторних умовах раннє введення виявляється ефективним при лікуванні слабких або помірних крововиливів у суглобах, м'язах, шкірі та слизових оболонках; можна рекомендувати дві схеми введення препарату: 1) введення від 2-х до 3-х доз з розрахунку 90 мкг/кг з інтервалом у 3-4 год і потім введення ще однієї дози для підтримки гемостазу, 2) введення одноразової дози з розрахунку 270 мкг/кг; клінічного досвіду застосування одноразової дози 270 мкг/кг пацієнтам літнього віку немає; тривалість амбулаторного лікування не повинна перевищувати 24 год; при тяжких кровотечах вводити початкову дозу із розрахунку 90 мкг/кг під час транспортування хворого до лікарні, де він звичайно лікується; величина наступних доз залежить від типу і тяжкості кровотечі; спочатку вводять кожну другу годину до досягнення поліпшення клінічного стану хворого, при необхідності продовження лікування інтервал між введеннями збільшують до 3 год. на 1-2 доби; після чого на наступний період лікування інтервал між введеннями послідовно збільшують до 4, 6, 8 або 12 год; тяжкі кровотечі іноді приходиться лікувати протягом 2-3 тижнів і довше (залежно від клінічного стану хворого); інвазивні процедури/оперативні втручання - початкову дозу із

розрахунку 90 мкг/кг вводять безпосередньо перед втручанням, введення цієї дози повторюють ч/з 2 год, а потім протягом перших 24-48 год - через 2-3 год (залежно від обсягу втручання і клінічного стану хворого); при великих хірургічних втручаннях вводять через 2-4 год протягом 6-7 днів, далі протягом 2-3 тижн. інтервал між введеннями збільшують до 6-8 год; хворих, які перенесли великі оперативні втручання, лікують 2-3 тижні до загоєння рани; дефіцит VII фактора - діапазон доз, що рекомендується для лікування кровотеч та їх профілактики у хворих, яким мають проводити оперативне втручання або інвазивні процедури, становить 15-30 мкг/кг кожні 4-6 год до досягнення гемостазу, дозу та інтервал введення підбирають індивідуально; тромбастенія Гланцмана - діапазон доз, що рекомендується для лікування кровотеч та їх профілактики у хворих, яким мають проводити оперативне втручання або інвазивні процедури, становить 90 мкг (від 80 до 120 мкг)/ кг кожні 2 год (1,5-2,5 год.); для підтримання ефективного гемостазу ввести як мінімум 3 дози; рекомендується робити болюсні ін'єкції, оскільки повільне вливання може виявитися неефективним; для лікування тромбастенії Гланцмана хворим, в яких немає резистентності, насамперед вводять тромбоцити.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: дисеміноване внутрішньосудинне згортання (ДВЗ) та пов'язані з цим лабораторні відхилення, включаючи підвищення рівня D-димеру та зниження рівня АТ-III, коагулопатія, гіперчутливість, анафілактичні р-ції, головний біль, артеріальні тромбоемболічні явища (ІМ, церебральний інфаркт, ішемія головного мозку, оклюзія судин головного мозку, інсульт, тромбоз артерії нирки, ішемія периферичних судин, периферичний ішемічний тромбоз та інтестинальна ішемія), стенокардія, тромбоз порожнин серця, венозні тромбоемболічні явища (тромбоз глибоких вен, тромбоз у місці в'єнного введення, легенева емболія, тромбоемболічні явища печінки, включаючи тромбоз портальної вени, тромбоз вени нирки, тромбофлебіт, тромбофлебіт поверхневих вен та інтестинальна ішемія), зупинка серця, нудота, висипання (включаючи алергічний дерматит та еритематозні висипання), свербіж та кропив'янка, припливи, ангіоневротичний набряк, зниження терапевтичної відповіді, гарячка, р-ції у місці ін'єкції, включаючи біль у місці ін'єкції, підвищення рівня продуктів розпаду фібрину, підвищення рівня аланінамінотрансферази, лужної фосфатази, лактатдегідрогенази, а також рівня протромбіну.

Протипоказання до застосування ЛЗ: Підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якої допоміжної речовини, а також до білків мишей, хом'яків або корів.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	НОВОСЕВЕН®	А/Т Ново Нордск (виробник діючої речовини, готового продукту та виробник, відповідальний за випуск серій готового продукту; дільниця виробництва, на якій проводиться контроль/випробування серії готового продукту; дільниця виробництва, на якій проводиться, Данія/Німеччина	пор. ліоф. д/приг. р-ну д/ін'ек. у скл.фл. з розч.	5мг (250КМО)	№1	42722,13	25,66/\$
	НОВОСЕВЕН®	А/Т Ново Нордск (виробник діючої речовини, готового продукту та виробник, відповідальний за випуск серій готового продукту; дільниця виробництва, на якій проводиться контроль/випробування серії готового продукту; дільниця виробництва, на якій проводиться, Данія/Німеччина	пор. ліоф. д/приг. р-ну д/ін'ек. у скл. фл. з розч.	2мг (100КМО)	№1	109050,48	25,66/\$

• **Губка гемостатична з амбеном**

Визначена добова доза (DDD): місцево - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГУБКА ГЕМОСТАТИЧНА®	ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" (виробництво, первинне та вторинне пакування, випуск серій; вторинне пакування,	суха речов. у пл. або фл.	0,8г	№1	131,70	

	випуск серій), Україна				
--	------------------------	--	--	--	--

• **Антиінгібіторний коагулянтний комплекс (Factor VIII inhibitor bypassing activity) ***

Фармакотерапевтична група: B02BD03 - фактори згортання крові. Білки з активністю, шунтуючою інгібітори до фактора VIII.

Основна фармакотерапевтична дія: контролює кровотечу шляхом індукції та сприяння утворенню тромбіну; в механізмі дії відзначається роль специфічних компонентів активованого протромбінового комплексу - протромбіну (Фактора II) і активованого Фактора X (Фактора Xa); містить інші білки протромбінового комплексу, що сприяють підтриманню гемостазу у пацієнтів з гемофілією з наявністю інгібіторів.

Показання для застосування ЛЗ: лікування кровотеч у пацієнтів з гемофілією A та інгібіторами до фактора VIII^{БНФ}; лікування кровотеч у пацієнтів з гемофілією B та інгібіторами до фактора VIII за відсутності іншого специфічного лікування; лікування кровотеч у пацієнтів, не хворих на гемофілію з набутими інгібіторами до фактора VIII^{БНФ}; профілактика кровотеч у пацієнтів з інгібіторною формою гемофілії A, які пережили значну кровотечу або мають високий ризик значної кровотечі.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: розчинити (для розчинення використовують лише воду для ін'єкцій і пристрій для розчинення, що знаходиться в упаковці) і повільно вливати в/в; швидкість інфузії не повинна перевищувати 2 Од/кг/хв.; доза та тривалість лікування залежить від тяжкості порушення гемостазу, локалізації і сили кровотечі, а також клінічного стану хворого; вводити в дозі 50-100 одиниць/кг; не перевищувати разову дозу 100 Од/кг і МДД 200 Од/кг, окрім випадку, коли тяжкість кровотечі не виправдовує використання вищих доз; спонтанні кровотечі: крововиливи в суглоби, м'язи і м'які тканини - у випадках кровотеч малої та середньої інтенсивності рекомендуються дози 50-75 Од/кг кожні 12 год; лікування необхідно продовжувати до отримання чітких ознак клінічного покращення (зменшення болю, зниження припухлості, підвищення рухливості суглоба); у випадках сильних крововиливів в м'язи і м'які тканини, при заочеревинних гематомах - рекомендована доза 100 Од/кг кожні 12 год; кровотечі із слизових оболонок - 50 Од/кг кожні 6 год при ретельному спостереженні за пацієнтом (візуальний контроль кровотечі, визначення динаміки гематокриту); якщо кровотеча не припиняється, дозу збільшити до 100 Од/кг, але не перевищувати МДД 200 Од/кг; інші тяжкі кровотечі - при тяжкій кровотечі (крововиливи в ЦНС) - доза 100 Од/кг кожні 12 год; при хірургічних втручаннях перед операцією - початкова доза 100 Од/кг, а через 6-12 год - ще одна доза 50-100 Од/кг; в якості післяопераційної підтримуючої дози, може вводитися 50-100 Од/кг з інтервалом 6- 12 год; дозування, інтервали введення доз і тривалість лікування під час і після операції визначаються видом хірургічного втручання, загальним станом пацієнта і клінічною ефективністю у кожному окремому випадку (при цьому не дозволяється перевищувати МДД в 200 Од/кг маси тіла); профілактика кровотеч у пацієнтів з високими титрами інгібіторів і частими кровотечами після невдалої індукції імунної толерантності (ИТ) або коли ИТ не розглядається: рекомендується доза 70-100 Од/кг ч/з день, за необхідності дозу можна збільшити до 100 Од/кг/добу або поступово зменшувати; профілактика кровотеч у пацієнтів з високими титрами інгібіторів під час індукції імунної толерантності (ИТ): може вводитися разом з Фактором VIII в дозі 50-100 Од/кг 2р/добу, поки титр інгібіторів до Фактора VIII не знизиться до <2 БО.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції підвищеної чутливості алергічного типу, що включають кропив'янку, ангіоневротичний набряк, шлунково-кишкові розлади, бронхоспазм і падіння АТ, ДВЗ-с-м, підвищення титру інгібіторів (анамнестична відповідь), р-ція підвищеної чутливості, парестезії, гіпестезія, тромботичний інсульт, емболічний інсульт, сонливість, дисгевзія, головний біль, часті запаморочення, ІМ, тахікардія, тромбоз, венозний тромбоз, артеріальний тромбоз, емболія (тромбоемболічні ускладнення), гіпертензія, приплив крові, гіпотонія, легенева емболія, бронхоспазм, свистяче дихання, кашель, задишка, блювання, діарея, відчуття дискомфорту в животі, нудота, відчуття оніміння обличчя, ангіоневротичний набряк, кропив'янка, свербіж, висип, біль у місці введення, нездужання, відчуття жару, озноб, гіпертермія, біль у грудях, відчуття дискомфорту у грудній клітці, падіння АТ, позитивні антитіла до поверхневого антигену ВГВ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до препарату або будь-яких його компонентів; с-м дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ-синдром); г. тромбоз або емболія (включаючи ІМ).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ФЕЙБА	Бакстер АГ/Зігфрід Хамельн ГмБХ, Австрія/Німеччина	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл. з розч. та набір д/розч. і введ.	500МО	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФЕЙБА	Бакстер АГ/Зігфрід Хамельн ГмБХ, Австрія/Німеччина	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл. з розч. та набір д/розч. і введ.	1000МО	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФЕЙБА	Бакстер АГ (Випуск серії; біологічне тестування, стерилізація, контроль якості, первинне пакування, вторинне пакування, виробництво готового лікарського засобу)/Зігфрід Хамельн Гмбх (Виробництво розчинника), Австрія/Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч., прист. д/розвед. ВАХЖЕСТ II Хай Флоу і набір. д/введ.	500МО	№1	16504,42	28,21/\$
	ФЕЙБА	Бакстер АГ (Випуск серії;	пор. д/р-ну	1000МО	№1	33008,	28,21/\$

	біологічне тестування, стерилізація, контроль якості, первинне пакування, вторинне пакування, виробництво готового лікарського засобу)/Зігфрід Хамельн Гмбх (Виробництво розчинника), Австрія/Німеччина	д/ін`ек. у фл. з розч., прист. д/розвед. ВАХЈЕСТ ІІ Хай Флоу і набор. д/введ.			83	
ФЕЙБА	Бакстер АГ (Випуск серії; біологічне тестування, стерилізація, контроль якості, первинне пакування, вторинне пакування, виробництво готового лікарського засобу)/Зігфрід Хамельн Гмбх (Виробництво розчинника), Австрія/Німеччина	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл. з розч., прист. д/розвед. ВАХЈЕСТ ІІ Хай Флоу і набор. д/введ.	2500МО	№1	66017,66	28,21/\$

Комбіновані препарати

- **Фібриноген + тромбін (Fibrinogen + thrombinum)**

Визначена добова доза (DDD): місцево - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ТАХОКОМБ	Такеда Австрія ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ББФ Стерилізаціонсервіс ГмбХ/Лабор ЛС СЕ та Ко. КГ (контроль якості серії "Стерильність")/Австрійське агенство охорони здоров'я та продовольчої безпеки (AGES) ГмбХ Інститут медичної мікробіології та гігіє, Австрія/Німеччина/Німеччина /Австрія	пластина, в/о розміром 2,5смх3см, у бл. в пак.	5,5мг/2МО/кв.см	№1	1353,82	29,08/€
	ТАХОКОМБ	Такеда Австрія ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ББФ Стерилізаціонсервіс ГмбХ/Лабор ЛС СЕ та Ко. КГ (контроль якості серії "Стерильність")/Австрійське агенство охорони здоров'я та продовольчої безпеки (AGES) ГмбХ Інститут медичної мікробіології та гігіє, Австрія/Німеччина/Німеччина /Австрія	пластина, в/о розміром 4,8смх4,8см, у бл. в пак.	5,5мг/2МО/кв.см	№2	5414,53	29,08/€
	ТАХОКОМБ	Такеда Австрія ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ББФ Стерилізаціонсервіс ГмбХ/Лабор ЛС СЕ та Ко. КГ (контроль якості серії "Стерильність")/Австрійське агенство охорони здоров'я та продовольчої безпеки (AGES) ГмбХ Інститут медичної мікробіології та гігіє, Австрія/Німеччина/Німеччина /Австрія	пластина, в/о розміром 9,5смх4,8см, у бл. в пак.	5,5мг/2МО/кв.см	№1	5551,43	29,08/€

13.7.2. Препарати вітаміну К

- **Менадіон (Menadione)**

Фармакотерапевтична група: В02ВА02 - вітамін К та інші гемостатичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: сприяє синтезу протромбіну і проконвертину, підвищує згортання крові за рахунок посилення синтезу II, VII, IX, X чинників згортання; має гемостатичну дію; стимулює К-вітамінредуктазу, що активує вітамін К і забезпечує його участь у печінковому синтезі К-вітамінзалежних плазмових чинників гемостазу.

Показання для застосування ЛЗ: призначають при кровоточивості і на фоні гіпопротромбінемії, зумовлених жовтяницею, при г. гепатитах, капілярних і паренхіматозних кровотечах; після хірургічних втручань і поранень, при кровотечах при виразковій хворобі шлунка і ДПК, виражених симптомах г. променевої хвороби, тривалих носових і гемороїдальних кровотечах; при геморагічних явищах у недоношених дітей, маткових передклімактеричних та оперативних кровотечах, при спонтанній кровоточивості, підготовці до оперативних втручань, якщо є небезпека кровотечі у післяопераційний період, легеневих кровотечах, при геморагічних явищах на фоні септичних захворювань; кровотечі та гіпопротромбінемії, зумовлені передозуванням феніліну, неодикумарину, інших антикоагулянтів - антагоністів вітаміну К.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/м; дорослим разова доза - 10 мг, максимальна разова доза - 15 мг; МДД- 30 мг; тривалість лікування - 3-4 дні, після 4-денної перерви курс у разі необхідності повторюють; при хірургічних втручаннях з можливою сильною кровотечею призначають протягом 2-3 днів перед операцією; дітям: до 1 року - 2-5 мг/добу, 1-2 років - 6 мг/добу, 3-4 років - 8 мг/добу, 5-9 років - 10 мг/добу, 10-18 років - 15 мг/добу, дозу розподіляють на 2 введення; тривалість лікування для дітей встановлює лікар.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпербілірубінемія, жовтяниця (у т. ч. ядерна жовтяниця у грудних дітей), транзиторне зниження АТ, тахікардія, слабе наповнення пульсу, гемолітична анемія, гемоліз у новонароджених дітей з вродженим дефіцитом глюкозо-6-фосфатдегідрогенази або у пацієнтів з недостатністю вітаміну Е, тромбоемболія, гіперемія обличчя, шкірний висип (у т. ч. еритематозний, кропив'янка), свербіж шкіри, бронхоспазм, запаморочення, профузний піт, зміна смакових відчуттів, відчуття жару, біль і набряк у місці введення, зміна кольору шкіри у вигляді плям при повторних ін'єкціях в одне і те ж місце, локальна склеродермія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперкоагуляція, тромбоемболія, гемолітична хвороба новонароджених, гіперчутливість до компонентів препарату, тяжка ПН, дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 2 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ВІКАСОЛ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у конт.чар.уп.	10 мг/мл	№5	1,35	

● **Фітоменадіон (Phytomenadione)**

Фармакотерапевтична група: В02ВА01 - вітамін К та інші гемостатичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: гемостатична; впливає на біосинтез фактора II (протромбін), фактора VII (проконвертин), фактора IX (фактор Крістмаса) і фактора X (фактор Стюарта).

Показання для застосування ЛЗ: профілактика та лікування кровотеч, що зумовлені зниженим згортанням крові, спричиненим гіповітамінозом або авітамінозом К₁; а також пригніченням факторів згортання крові II, VII, IX та X різної етіології; лікування геморагічних ускладнень; гіпокоагуляція після тривалої обструкції жовчних шляхів та на ранніх стадіях цирозу печінки; кишкові захворювання, що пов'язані з порушенням всмоктування, після тривалого лікування а/б, сульфаніламідом і саліцилатами; геморагічні явища у новонароджених ^{ВООЗ, БНФ}, маткові кровотечі; у хірургії при довготривалих жовчних дренажах та при передопераційній підготовці пацієнтів зі зниженим згортанням крові.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: кровотечі після терапії непрямими антикоагулянтами: дорослим у тяжких випадках 10-20 мг (1-2 амп.), розведеного у 5-10 мл води д/ін'єк. або 5% р-ну глюкози, вводити повільно в/в; якщо кровотеча не зупиняється, то ч/з 3-4 год повторне введення; у невідкладних ситуаціях обов'язкове вливання свіжої крові; в легших випадках застосовують р/ос (крап.) або в/м в дозі 10 мг; профілактика та лікування кровотеч при хворобах жовчних шляхів та печінки: при незначному зниженні факторів згортання дорослим 5-10 мг в/м 3 р/тижд.; при більш тяжкому зниженні згортання крові та при відкритих кровотечах -1-2 мл в/м 1-2 р/добу до нормалізації рівня протромбінового комплексу; при менш розвинених стадіях цирозу печінки - в/м 20-30 мг 3 р/тижд.; профілактика кровотеч перед хірургічними втручаннями у пацієнтів зі зниженим рівнем коагуляційних факторів: перед ургентними хірургічними втручаннями дорослим в/в від 5 мг до 20 мг (0,5-2 амп.), у менш екстрених випадках - в/м 10-20 мг/добу за 4-6 год до планового хірургічного втручання; інші кровотечі: при зниженому рівні факторів II, VII та X, при кровотечах різного походження 10-20 мг в/м до коригування коагуляції; найвища разова доза 20 мг, вища добова доза 40 мг; кровотечі у новонароджених: 10-20 мг в/м вводять породиці за 48 год. до очікуваних пологів, але не пізніше ніж за 2 год. до пологів, або новонародженому відразу після народження в/м в дозі, яка не перевищує 1 мг. ^{ВООЗ, БНФ} у випадках, якщо новонародженому показано введення препарату вдруге чи втретє, застосовувати у вигляді оральних крап. з молоком; рекомендовані дози для дітей: новонароджені - не більше 1 мг; до 1 р. - 1-2,5 мг; 1-6 р. - 2,5-5 мг; 6-15 р. - 5-10 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперчутливість (шкірні висипання); запалення; пекучий біль; пітливість; ціаноз; у поодиноких випадках серцево-судинний колапс; бронхоспазм; гемолітична анемія при дефіциті глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази, гіпербілірубінемія в новонароджених; у недоношених дітей і новонароджених може виникнути ядерна жовтяниця, жовтяниця та гемолітична анемія при повільній біотрансформації фітоменадіону в печінці.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до компонентів препарату; дефіцит глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази; гіперкоагуляція; тромбоемболія; гемолітична хвороба новонароджених; тяжка ПН.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 20 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	КАНАВІТ	ЕйчБіЕм Фарма с.р.о., Словацька Республіка	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у пласт. уп.	10мг/мл	№5	200,88	34,63/€

13.7.3. Інші гемостатичні засоби системного застосування

- **Етамзилат (Etamsylate)**

Фармакотерапевтична група: В02ВХ01 - антигеморагічні засоби. Інші гемостатичні засоби для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: впливає на першу стадію механізму гемостазу (взаємодія між ендотелієм та тромбоцитами); підвищує адгезивність тромбоцитів, нормалізує стійкість стінок капілярів, знижуючи т.ч. їх проникність, інгібує біосинтез простагландинів, які спричиняють дезагрегацію тромбоцитів, вазодилатацію та підвищену проникність капілярів; у результаті цього час кровотечі значно зменшується.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика і контроль крововиливів у поверхневих і внутрішніх капілярах різної етіології, особливо якщо кровотеча зумовлена ураженням ендотелію, зокрема: профілактика та лікування кровотеч під час та після хірургічних операцій в отоларингології, гінекології, акушерстві, урології, стоматології, офтальмології та пластичній хірургії; профілактика і лікування капілярних кровотеч різної етіології і локалізації: гематурія, метрорагія, первинна гіперменорея^{БНФ}, гіперменорея у жінок з внутрішньоматковими протизаплідними засобами, носова кровотеча, кровотеча ясен; неонатологія (тільки р-н): профілактика перивентрикулярної кровотечі у недоношених немовлят.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н в/в (повільно) або в/м; оптимальна добова доза для дорослих 10-20 мг/кг, вводиться за 3-4 прийоми (у більшості випадків вводять вміст 1-2 амп. 3-4 р/добу); добова доза для дітей = 1/2 дози для дорослих; оперативні втручання: за 1 год до оперативного втручання - в/в або в/м 1-2 амп.; під час операції - в/в 1-2 амп.; введення цієї дози можна повторити; після операції вводити 1-2 амп. кожні 4-6 год до зникнення ризику кровотечі; неонатологія: в/м у дозі 10 мг/кг (0,1 мл = 12,5 мг); лікування розпочати протягом перших 2-х год. після народження; вводити кожні 6 год 4 діб до сукупної дози 200 мг/кг; можна застосовувати місцево (шкірний трансплантат, видалення зуба) за допомогою змоченої стерильної марлевої серветки; можливе комбіноване застосування р/ос форми з парентеральним введенням; табл. приймати під час або після їди, запиваючи невеликою кількістю води; добова доза для дорослих 1000-1500 мг 2-3 р/добу; перед операцією - 250-500 мг/год до операції; після операції - по 250-500 мг кожні 4-6 год. до зникнення ризику кровотечі; при менорагії призначати по 500 мг 3 р/добу^{БНФ} (1500 мг) 10 днів, починаючи з 5-го дня від очікуваного початку менструації до 5-го дня наступного менструального циклу; добова доза для дітей = 1/2 дози для дорослих.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, запаморочення, припливи, парестезії нижніх кінцівок, тромбоемболія, артеріальна гіпотензія, зниження перфузії тканин, що самостійно відновлюється через деякий час, нудота, блювання, діарея, абдомінальний біль, АР, гіперчутливість, висипи на шкірі, кропив'янка, свербіж, анафілактичний шок, загострення перебігу БА, описано випадок ангіоневротичного набряку, агранулоцитоз, нейтропенія, тромбоцитопенія, артралгія, астенія, підвищена температура, бронхоспазм, г. порфірія, свербіж, почервоніння,

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до етамзилату або до будь-якого іншого інгредієнта препарату (особливо до натрію метабісульфіту); БА; г. порфірія; підвищене згортання крові; тромбози; тромбоемболії; гемобластоз (лімфатична і мієлоїдна лейкемія, остеосаркома) у дітей.

Визначена добова доза (DDD): перорально/парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕТАМЗИЛАТ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у пач.та бл.	12,5%	№10x1, №5x2	42,59	
	ЕТАМЗИЛАТ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у конт. чар/уп.	125 мг/мл	№5x2	33,98	
	ЕТАМЗИЛАТ-КВ	АТ "КІЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	250мг	№10x5	69,30	
II.	ДИЦИНОН	Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп.	250мг/2мл	№50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДИЦИНОН	Лек фармацевтична компанія д.	табл. у бл.	250мг	№10x10	відсутня у	

	д., Словенія			реєстри ОБЦ
--	--------------	--	--	-------------

• **Ельтромбопаг (Eltrombopag)**

Фармакотерапевтична група: V02BX05 - антигеморагічні засоби, системні гемостатики.

Основна фармакотерапевтична дія: є основним цитокином, що бере участь у регуляції мегакаріопоезу та утворенні тромбоцитів і є ендogenous лигандом для рецепторів тромбопоетину; взаємодіє з трансмембранним доменом рецепторів тромбопоетину людини і ініціює каскад сигналів, схожих, але не ідентичних за тими, що запускаються ендogenous тромбопоетином, індукуючи проліферацію та диференціацію мегакаріоцитів із клітин-попередників у кістковому мозку; на відміну від тромбопоетину, ельтромбопаг не посилює агрегації нормальних тромбоцитів людини, індукованої аденозиндифосфатом (АДФ), або індукує Р-селективну експресію; ельтромбопаг не є антагоністом агрегації тромбоцитів, індукованої АДФ або колагеном.

Показання для застосування ЛЗ: лікування пацієнтів із хр.імунною (ідіопатичною) тромбоцитопенічною пурпурою, які не піддаються лікуванню іншими ЛЗ(кортикостероїдами, Іг^{ВНФ}); лікування тромбоцитопенії у дорослих пацієнтів із хр.ВГС, якщо ступінь тромбоцитопенії є головним чинником, що заважає розпочати або обмежує можливість продовжувати оптимальну терапію на основі інтерферону; Іг^{ВНФ} лікування дорослих пацієнтів з набуту апластичною анемією тяжкого ступеня (ТАА), які не піддавалися попередній імуносупресивній терапії або важко піддавалися попередньому лікуванню та не підходять для трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин Іг^{ВНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос; приймати щонайменше за 4 год до або після прийому таких продуктів, як антациди, молочні продукти або мінеральні добавки, що містять полівалентні катіони (наприклад алюміній, кальцій, залізо, магній, селен, цинк); режим дозування є індивідуальним і базується на кількості тромбоцитів у кожного пацієнта; метою лікування ельтромбопагом є не нормалізація кількості тромбоцитів; лікування пацієнтів із хр. ІТП: для досягнення та підтримки кількості тромбоцитів ≥ 50000 /мкл - мінімальна ефективна доза, дорослі пацієнти та діти від 6 до 17 років - рекомендована початковою дозою є 50 мг 1 р/добу, лікування пацієнтів східноазійського походження розпочинати зі зменшеної дози 25 мг 1 р/добу Іг^{ВНФ}, діти від 1 до 5 років - 25 мг 1 р/добу; корекція дозування ельтромбопагу: кількість тромбоцитів < 50000 /мкл після щонайменше 2 тижн. терапії - збільшити добову дозу на 25 мг до досягнення максимальної дози у 75 мг/добу Іг^{ВНФ}; кількість тромбоцитів ≥ 50000 /мкл та ≤ 150000 /мкл - застосовувати найменшу ефективну дозу ельтромбопагу та/або супутнього ЛЗ для лікування ІТП для підтримки рівня тромбоцитів, що запобігає кровотечі або зменшує її; кількість тромбоцитів > 150000 /мкл та ≤ 250000 /мкл - зменшити добову дозу на 25 мг, зачекати 2 тижн. для оцінки ефекту від цього та подальшого відповідного коригування дози; кількість тромбоцитів > 250000 /мкл - припинити застосування ельтромбопагу, збільшити частоту підрахунку тромбоцитів до 2 р/тижд., при рівні тромбоцитів ≤ 100000 /мкл повторно призначити ельтромбопаг у зменшеній на 25 мг добовій дозі; лікування тромбоцитопенії у дорослих пацієнтів із ХГС: початкова доза 25 мг 1 р/добу, дозу збільшують на 25 мг кожні 2 тижня Іг^{ВНФ} до досягнення кількості тромбоцитів оптимальної для початку противірусної терапії; корекція дозування: кількість тромбоцитів < 50000 /мкл після щонайменше 2 тижнів терапії - збільшити добову дозу на 25 мг, але не більше 100 мг/добу; ≥ 50000 /мкл та ≤ 100000 /мкл - найменша доза ельтромбопагу, що дозволяє уникнути зменшення дози пегінтерферону; ≥ 100000 /мкл та ≤ 150000 /мкл - зменшити добову дозу до 25 мг, ч/з 2 тижн. оцінити ефект нової дози та прийняти рішення про подальше коригування дози; > 150000 /мкл - припинити лікування ельтромбопагом; підвищити частоту контролю кількості тромбоцитів до 2 р/тиждень, як тільки кількість тромбоцитів становитиме ≤ 100000 /мкл, відновити терапію у добовій дозі, зменшеній на 25 мг; апластична анемія тяжкого ступеня: початкова доза 50 мг 1 р/добу, лікування пацієнтів східноазійського походження розпочинати зі зменшеної дози 25 мг 1 р/добу Іг^{ВНФ}, дозу ельтромбопагу коригувати з кроком 50 мг кожні 2 тижні для досягнення необхідної кількості тромбоцитів $\geq 50\ 000$ /мкл, для пацієнтів, що приймають 25 мг 1 р/добу, дозу спочатку збільшити до 50 мг на добу, а вже потім збільшувати дозу на 50 мг, дозу 150 мг/добу не перевищувати Іг^{ВНФ}. Якщо жодної гематологічної відповіді не спостерігається ч/з 16 тижнів терапії Іг^{ВНФ}, застосування ельтромбопагу припинити, застосування припинити при надмірних змінах кількості тромбоцитів або значних відхиленнях значень печінкових проб від нормальних.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: лікування ІТП: назофарингіт, інфекції ВДШ, риніт, фарингіти, ІСШ, грип, оральний герпес, пневмонія, синусит, тонзиліт, гінгівіт, шкірні інфекції, ректосигмоїдний рак, анемія, анізоцитоз, еозинофілія, гемолітична анемія, лейкоцитоз, мієлоцитоз, тромбоцитопенія, підвищення Нв, збільшення рівня паличкоядерних нейтрофілів, зменшення Нв, наявність мієлоцитів, тромбоцитоз, зменшення рівня лейкоцитів, гіперчутливість, анорексія, гіпокаліємія, зниження апетиту, подагра, гіпокальціємія, підвищення рівня сечової кислоти в крові, порушення сну, депресія, апатія, зміни настрою, плаксивість, парестезії, гіпестезія, сонливість, мігрень, тремор, порушення балансу, дизестезія, геміпарез, мігрень з аурую, периферична нейропатія, периферична сенсорна нейропатія, порушення мовлення, токсична нейропатія, судинний головний біль, сухість очей, нечіткість зору, лентикулярне помутніння, астигматизм, кортикальна катаракта, біль в очах, підвищена сльозотеча, ретинальні геморагії, ретинальна пігментна епітеліопатія, зниження гостроти зору, погіршення зору, порушення тестів з гостроти зору, блефарит та сухий кератокон'юнктивіт, біль у вухах, вертиго, тахікардія, г. ІМ, кардіоваскулярні порушення, ціаноз, синусова тахікардія, подовження інтервалу QT на електрокардіограмі, тромбоз глибоких вен, емболія, припливи жару, тромбофлебіт поверхневих вен, почервоніння обличчя, гематома, кашель, біль у ротоглотці, ринорея, легенева емболія, інфаркт легенів, неприємні відчуття у носовій порожнині, поява пухирців та біль у ротоглотці, ускладнення з боку назальних синусів, с-м нічного апное, нудота, діарея, виразковий стоматит, зубний біль, сухість у роті, блювання, біль у животі, глосодінія, кровотеча у ротовій порожнині, болісність живота, знебарвлення випорожнень, здуття, харчове отруєння, часта дефекація, гематемезис, дискомфорт у роті, збільшення рівня АЛТ, АСТ та білірубину крові, порушення ф-ції печінки, холестаза, ураження печінки, гепатит, висипання, алопеція, гіпергідроз, генералізований свербіж, кропив'янка, дерматоз, петехії, холодний піт, еритема, меланоз, порушення пігментації, знебарвлення шкіри, лущення шкіри, міалгія, судоми м'язів, біль у кістках, біль у спині, скелетно-м'язовий біль, м'язова слабкість, НН, лейкоцитурія, вовчаковий нефрит, ніктурія, протеїнурія, збільшення рівня сечовини та креатиніну в крові, збільшення співвідношення протеїн/креатинін у сечі, менорагії, пірексія, біль у грудях, відчуття жару, геморагії у місці пункції судин, астенія, відчуття тривожності, запалення ран, нездужання, пірексія, відчуття стороннього тіла, збільшення рівня альбуміну крові, збільшення рівня лужної фосфатази крові, збільшення

загального рівня білків, зменшення рівня альбуміну крові, збільшення рівня рН сечі, сонячні опіки; лікування ХГС: ІСШ, інфекції ВДШ, бронхіт, назофарингіт, грип, оральний герпес, гастроентерит, фарингіт, злякисні новоутворення печінки, анемія, лімфопенія, гемолітична анемія, знижений апетит, гіперглікемія, надмірна втрата маси тіла, безсоння, депресія, неспокій, порушення сну, порушення свідомості, збудження, головний біль, запаморочення, порушення уваги, зміна смакових відчуттів, печінкова енцефалопатія, летаргія, порушення пам'яті, парестезії, катаракта, ексудати сітківки, сухість очей, жовтяниця очей, геморагії сітківки, посилене серцебиття, кашель, задишка, біль у ротоглотці, задишка при фізичному навантаженні, кашель з мокротою, нудота, діарея, блювання, асцити, біль у животі, біль у верхній частині живота, диспепсія, сухість у роті, запори, здуття живота, зубний біль, стоматит, ГЕРХ, геморої, дискомфорт у животі, гастрит, варикоз стравоходу, атрофічний стоматит, геморагії варикозного стравоходу, збільшення рівня білірубину крові, жовтяниця, тромбоз портальної вени, порушення ф-ції печінки, свербіж, алопеція, висипи, сухість шкіри, екзема, свербіж з висипами, еритема, гіпергідроз, генералізований свербіж, нічні потовиділення, ураження шкіри, артралгія, судоми м'язів, біль у спині, біль у кінцівках, скелетно-м'язовий біль, біль у кістках, гіпертермія, втома, гриппоподібні захворювання, астения, озноб, периферичний набряк, дратівливість, біль, нездужання, реакція у місці ін'єкції, біль у грудях не серцево-судинного походження, набряк, висипи у місці ін'єкції, дискомфорт у грудях, свербіж у місці ін'єкції, збільшення рівня білірубину крові, зниження маси тіла, лейкопенія, зниження Нb, нейтропенія, підвищений міжнародний нормалізований індекс, подовжений час активованого парціального тромбoplastину, підвищений рівень глюкози крові, знижений рівень альбуміну крові, подовження інтервалу QT на електрокардіограмі,

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до ельтромбопагу або будь-якого іншого компонента препарату.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 50 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	РЕВОЛАД™	Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед (виробництво, контроль якості)/Глаксо Веллком С.А. (виробник для первинного та вторинного пакування та випуск серії), Велика Британія/Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№7x4	375,23	26,27/\$
	РЕВОЛАД™	Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед (виробництво за повним циклом)/Глаксо Веллком С.А. (додатковий виробник для первинного та вторинного пакування та випуск серії), Велика Британія/Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№7x2	375,23	26,27/\$

13.7.4. Інгібітори фібринолізу

13.7.4.1. Амінокислоти

- **Кислота амінокапрова (Aminocaproic acid)**

Фармакотерапевтична група: B02AA01 - антигеморагічні засоби. Інгібітори фібринолізу.

Основна фармакотерапевтична дія: гемостатична, антифібринолітична дія при кровотечах, зумовлених підвищеним фібринолізом; дія пов'язана з блокадою активаторів плазміногену і частковим пригніченням впливу плазміну; інгібує біогенні поліпептиди кініни; сприяє стабілізації фібрину та його відкладенню у судинному руслі, індукує агрегацію тромбоцитів та еритроцитів.

Показання для застосування ЛЗ: хірургічні операції і патологічні процеси, що супроводжуються підвищенням фібринолітичної активності крові і тканин, для запобігання вторинній гіпофібриногенемії при масивних переливаннях консервованої крові; профілактика і лікування паренхіматозних кровотеч, геморагій зі слизових оболонок, менорагій, кровотеч з ерозій і виразок шлунка та кишечника, як симптоматичний засіб - кровоточивість, зумовлена тромбоцитопенією та якісною неповноцінністю тромбоцитів (дисфункціональна тромбоцитопенія), різні види гіперфібринолізу, у т. ч. пов'язані з застосуванням тромболітичних препаратів та масивного переливання консервованої крові.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н в/в; при необхідності досягнення швидкого ефекту (г. гіпофібриногенемія) дорослим в/в крап. не більше 100 мл 5 % р-ну зі швидкістю 50-60 крап./хв. 15-30 хв.; протягом першої год 4-5 г, а при тривалій кровотечі - до її повної зупинки - щогодини по 1 г, але не більше 8 г; при повторній кровотечі введення повторювати з проміжками 4 год., проте не більше 8 год.; дітям при помірному підвищенні фібринолітичної активності одноразово у дозі 0,05 г/кг/добу; доза залежно від віку становить: до 1 року: разова - до 2,5 мл, добова - 15 мл; від 2 до 6 р.: разова - 2,5-5 мл, добова - 15-30 мл; від 7 до 10 р.: разова - 5-7 мл, добова - 30-45 мл, від 11 до 18 р.: разова - 7-14 мл, добова - 45-90 мл; при г. кровотечах дози становлять: дітям до 1 р.: разова - 5 мл, добова - 30 мл; віком від 2 до 4 р.: разова - 5-7,5 мл, добова - 30-45 мл; від 5 до 8 р.: разова - 7,5-10 мл, добова - 45-60 мл; від 9 до 10 р.: разова - 15 мл, добова - 90 мл; від 11 до 14 р.: разова - 20 мл, добова - 120 мл; від 15 до 18 р.: разова - 28 мл, добова - 160 мл; курс лікування - від 3 до 14 днів; табл.: залежно від стану згортальної системи крові дорослим призначають по 1-10 табл. на прийом 4-5 р/добу; при помірно вираженому підвищенні фібринолітичної активності крові разова доза 2-3 г, добова доза -10-15 г, дітям 50 мг/кг; при г. кровотечі разова доза дорослим 5 г, добова - 30 г; для дітей разова доза 50 -100 мг/кг маси тіла, добова - 600 мг/кг; зазвичай дози в табл. дітям становлять: віком 3 - 4 р. - разова - 1 - 1,5 г, добова - 6 - 9 г; 5 - 8 р. - разова - 1,5

- 2 г, добова - 9 - 12 г; 9 - 10 р. - разова - 3 г, добова - 18 г; 11-18 р. - разова - 3-5 г, добова - 18-30 г; порошок призначають р/ос, під час або після їди, розчинивши у солодкій воді або запиваючи нею; добову дозу для дорослих ділять на 3-6 прийомів, для дітей - на 3-5 прийомів; при помірно вираженому підвищенні фібринолітичної активності дорослим призначають у добовій дозі 5-24 г; добова доза для дітей до 1 р. 3 г, 2-6 р.- 3-6 г, 7-10 р. - 6-9 г, для підлітків МДД - 10-15 г; при г. кровотечах (у т.ч. гастроінтестинальних) дорослим - 5 г, потім по 1 г щогодини (не > 8 год.) до повної зупинки кровотечі; добова доза для дітей до 1 року - 6 г, 2-4 р. - 6-9 г, 5-8 р. - 9-12 г, 9-10 р. - 18 г; субарахноїдальний крововилив - дорослим 6-9 г/добу; травматична гіфема - 0,1 г/кг маси тіла кожні 4 год., (але не більше 24 г/добу) протягом 5 діб; метрорагії, асоційовані з внутрішньоматковими протизаплідними засобами - по 3 г кожні 6 год.; профілактика і зупинка кровотечі при стоматологічних втручаннях - дорослим по 2-3 г 3-5 р/добу; для дорослих середня добова доза 10-18 г, МДД - 24 г; курс лікування - 3-14 днів; з метою профілактики і лікування грипу та ГРВІ застосовують р/ос та місцево; для р/ос застосування порошок попередньо розчиняють з розрахунку 1 г у 2-х ст. л. підсолодженої кип'яченої води, одержуючи т.ч. 5 % р-н; р/ос: дітям до 2-х років життя - 1-2 г/добу - по 1-2 ч. л. 4 р/день (0,02-0,04 г/кг - разова доза), можна додавати до їжі або напоїв; дітям у віці 2-6 р.- 2-4 г/на добу - 1-2 ст. л. 4 р/день; дітям у віці 7-10 р.- 4-5 г/добу; підліткам та дорослим - 5-8 г/добу - по 1-2 пакети 4-5 р/день, запиваючи водою, або приймати з їжею чи напоями; місцево: рекомендовано кожні 3-4 год. закладати у носові ходи на 5-10 хв. ватні турунди, зволожені 5 % р-ном, або у вказані строки закапувати по 3-5 крап. р-ну у кожен носовий хід; тривалість р/ос застосування при грипі та ГРВІ становить 3-7 днів; табл. призначають р/ос; залежно від стану згортальної системи крові дорослим по 1-10 табл. на прийом 4-5 р/добу; при помірно вираженому підвищенні фібринолітичної активності крові: дітям р/ос в дозі 50 мг/кг маси тіла; при г. кровотечі: дітям разова доза 50 -100 мг/кг, добова - 600 мг/кг; тривалість лікування 3-14 днів; при консервативному лікуванні захворювань крові, печінки, г. панкреатитів, холецистопанкреатитів, алергічних захворювань дорослим по 1-3 табл. 4-5 р/день; тривалість лікування від 14 до 30 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР, можливі р-ції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання, закладеність носа, катаральні явища ВДШ; зміни у місці введення; ортостатична гіпотензія, субендокардіальний крововилив, брадикардія, аритмії; нудота, діарея, блювання; рабдоміоліз, міоглобінурія, порушення згортання крові, геморагії; головний біль, запаморочення, шум у вухах, судоми, нудота, блювання, діарея; ГНН.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до амінокапронової кислоти; схильність до тромбозів і тромбоемболічних захворювань; коагулопатія внаслідок ДВЗ крові; захворювання нирок із порушенням їх ф-ції; НН, гематурія, порушення мозкового кровообігу, с-м дисемінованого внутрішньосудинного згортання, макрогематурія, період вагітності, пологів та годування груддю.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 16 г., парентерально - 16 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АКК®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н по 2мл або 5мл у конт.	50 мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМІНОКАПРОНОВА КИСЛОТА	ТОВ "Исток-Плюс", Україна	пор. д/орал. застос. у саше	1г	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМІНОКАПРОНОВА КИСЛОТА	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл. в пач.	50 мг/мл	№1	176,00	
	АМІНОКАПРОНОВА КИСЛОТА	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	пор. д/орал. застос. у пак. з комб. матер. у пак. та спар. пак. з п/е покр.	1г	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМІНОКАПРОНОВА КИСЛОТА	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	пор. д/орал. застос. у пак. з комб. матер. у пак. та спар.пак. з п/е покр.	1г	№2x5	563,00	
	АМІНОКАПРОНОВА КИСЛОТА	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	табл. у бл	500мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМІНОКАПРОНОВА КИСЛОТА	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	табл. у конт.	500мг	№20	80,78	
	КИСЛОТА АМІНОКАПРОНОВА	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл., у конт. полім., по 2мл, 4мл у конт. однодоз.	50 мг/мл	№1 , №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КИСЛОТА АМІНОКАПРОНОВА	Приватне акціонерне товариство "Інфузія",	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	5%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	Україна					
КИСЛОТА АМІНОКАПРОНОВА-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у фл. в пач.	50 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Кислота транексамова (Tranexamic acid)**

Фармакотерапевтична група: B02AA02 -антигеморагічні засоби, антифібринолітичні амінокислоти. Інгібітори фібринолізу.

Основна фармакотерапевтична дія: антифібринолітичний засіб; специфічно інгібує активацію профібринолізину (плазміногену) та його перетворення на фібринолізин (плазмін), має місцеву та системну гемостатичну дію при кровотечах, пов'язаних із підвищенням фібринолізу; ч/з стримування утворення кінинів та ін. активних пептидів, що беруть участь в алергічних та запальних р-ціях, чинить протиалергічну та протизапальну дію.

Показання для застосування ЛЗ: кровотеча або ризик кровотечі при посиленні фібринолізу як генералізованого БНФ (кровотеча під час операції на передміхуровій залозі і в післяопераційний період, геморагічні ускладнення фібринолітичної терапії), так і місцевого БНФ (маткова, шлунково-кишкова, носова кровотеча БНФ, посттравматична гифема, кровотеча після простатектомії або втручання на сечовому міхурі, тонзилектомії, конізації шийки матки, екстракції зуба у хворих на гемофілію), торакальні, абдомінальні та інші великі хірургічні оперативні втручання, наприклад, серцево-судинна хірургія; спадковий ангіоневротичний набряк БНФ, контроль крововиливів у зв'язку з введенням фібринолітичного лікарського засобу; лікування тяжких менструальних кровотеч БНФ.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл. р/ос незалежно від прийому їжі, р-н вводять в/в крап. або струминно; при генералізованому фібринолізі вводять в/в у разовій дозі 15 мг/кг маси тіла кожні 6 - 8 год^{БНФ}, швидкість введення - 1 мл/хв; місцевий фібриноліз: в/в повільно від 0,5 г до 1 г 2-3 р/добу, рекомендована доза в табл. 1-1,5 г 2-3 р/добу^{БНФ}; простатектомія: разова доза 1 г, потім по 1 г кожні 8 год. 3 дні, для профілактики і лікування геморагій у пацієнтів з підвищеним ризиком перед або після операцій транексамову к-ту призначати в/в, після чого призначати у вигляді табл. по 1 г 3-4 р/добу до зникнення макроскопічної гематурії; менорагія: рекомендована доза 1г 3 р/добу, не > 4 днів, при тривалій менструальній кровотечі дозу збільшувати, але не вище МДД: 4 г/добу^{БНФ}; носові кровотечі: при періодичних кровотечах 1г 3 р/добу 7 днів^{БНФ}; конізація шийки матки: 1,5 г 3 р/добу до 12 днів; посттравматична гифема: 1 г 3 р/добу; екстракція зубів у пацієнтів з гемофілією: рекомендована доза 25 мг/кг р/ос ч/з кожні 8 год, починаючи за 1 день до операції і продовжуючи протягом 2-8 днів після неї; спадковий ангіоневротичний набряк: деяким пацієнтам, обізнаним про перебіг загострень хвороби, зазвичай достатньо 1-1,5 г 2-3 р/добу протягом кількох днів^{БНФ}; діти: призначати дітям від 12 р. у дозі 20-25 мг/кг; тривалість лікування - 2-8 днів, разова в/в доза - 10 мг/кг, 2 р/добу^{БНФ}, МДД до 20 мг/кг маси тіла.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота, блювання, печія, діарея, біль у животі; висип, шкірний свербіж, АР; зниження апетиту, сонливість, запаморочення; нездужання, викликане гіпотонією, з або без втрати свідомості, порушення кольоросприйняття; порушення зору; оклюзія артерії сітківки, застійна ретинопатія, тромбоз, тромбоемболія; судоми; р-ції гіперчутливості, включаючи анафілаксію; артеріальна гіпотензія, алергічні дерматити, тахікардія, біль у грудній клітці, тромбоемболічні ускладнення, артеріальний або венозний тромбоз будь-якої локалізації; г. некроз коркового шару нирок, головний біль, головний біль напруги, мігрень, закладеність носа, дихальних шляхів і навколосових пазух, синусит, г. синусит, синусний головний біль, алергічний синусит і біль у навколосових пазухах, а також поліалергічні р-ції та сезонні алергії, біль у спині, кістково-м'язовий біль, кістково-м'язовий дискомфорт, м'язові судоми та спазми, міалгія, артралгія, скутість і набряки суглобів, біль у животі, включаючи біль у м'язах передньої черевної стінки та неприємні відчуття в животі, анемія, втома.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до транексамової кислоти або до інших компонентів препарату, НН тяжкого ступеня (через ризик кумуляції), макроскопічна гематурія, г. тромбоемболічні захворювання, г. венозний або артеріальний тромбоз, тромбофлебіт, артеріальні чи венозні тромбози в анамнезі, високий ризик тромбоутворення, ІМ, субарахноїдальний крововилив, судоми в анамнезі; фібринолітичні стани внаслідок коагулопатії споживання, за винятком надмірної активації фібринолітичної системи при г. тяжкій кровотечі; порушення сприйняття кольорів. Протипоказано застосування у вигляді інтратекальних та інтравентрикулярних ін'єкцій, інтрацеребральне введення (ризик розвитку набряку мозку та судом).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 2 г., парентерально - 2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АТРАКСАН	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. в кас.	100 мг/мл	№5x1		відсутня у реєстрі ОВЦ
	ГЕМАКСАМ	ТОВ "ФАРМАСЕЛ" (контроль, випуск серії)/ХОЛОПАК Ферпакунгстехнік ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль),	р-н д/ін'єк. по 5мл у пач.	50мг/мл	№10	280,80	

	Україна/Німеччина					
ГЕМАКСАМ	ТОВ "ФАРМАСЕЛ" (контроль, випуск серії)/ХОЛОПАК Ферпакунгстехнік ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль), Україна/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 10мл у пач.	50мг/мл	№10	330,00	
ГЕМАКСАМ	ТОВ "ФАРМАСЕЛ" (контроль, випуск серії)/ХОЛОПАК Ферпакунгстехнік ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль), Україна/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 5мл у пач.	50мг/мл	№50	377,60	
ГЕМОТРАН®	АТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у бл.	50мг/мл	№5х2	192,00	
ГЕМОТРАН®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у бл.	50мг/мл	№5х1, №5х2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ГЕМОТРАН®	АТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у бл.	100мг/мл	№5х1	58,64	
ГЕМОТРАН®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 10мл в амп. у бл.	100мг/мл	№5х1	52,88	
ГЕМОТРАН®	ПАТ "Фармак", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10х3	44,00	
МАКСІТРАН®	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МІКРОХІМ" (відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (відповідальний за виробництво та контроль/випробування се, Україна/Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у кас.	100 мг/мл	№5х1, №5х2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МАКСІТРАН®	ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл. або у бан.	500мг	№10х3, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
САНГЕРА	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл, 10мл у амп.; по 5 мл у фл.; 10мл у фл.	100мг/мл	№5, №1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
САНГЕРА	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл у амп.; по 5 мл у фл.; 10мл у фл.	100мг/мл	№5	293,20	
САНГЕРА	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 10мл у амп.; по 5 мл у фл.; 10мл у фл.	100мг/мл	№5	528,80	
ТРАМІКС®	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	100мг/мл	№5х1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ТРАМІКС®	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	100мг/мл	№5х2	184,80	
ТРАНЕКСАМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	50мг/мл	№5х1, №5х2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ТРАНЕКСАМОВ А КИСЛОТА	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у бл.	100мг/мл	№5х2, №5х10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ТРАНЕКСАМОВ	Приватне акціонерне	р-н д/ін'єк. по	100мг/мл	№5х1	192,00	

	А КИСЛОТА	товариство "Лекхім-Харків", Україна	5мл в амп. у бл.				
	ТРАНЕКСАМОВ А КИСЛОТА	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у бл.	50мг/мл	№5x1, №5x 10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТРАНЕКСАМОВ А КИСЛОТА	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у бл.	50мг/мл	№5x2	192,00	
	ЦИКЛОКАПРОН -ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у бл. та кор.	50мг/мл	№5x1, №5x 2, №5, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЦИКЛОКАПРОН -ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у бл. та кор.	100мг/мл	№5x2, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЦИКЛОКАПРОН -ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у бл. та кор.	100мг/мл	№5	269,99	
	ЦИКЛОКАПРОН -ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у бл. та кор.	100мг/мл	№5x1	69,37	
	ЦИКЛОКАПРОН -ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x2	57,35	
II.	АЗЕПТИЛ	Медокемі ЛТД (Ампульний Ін'єкційний Завод), Кіпр	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у бл.	500мг/5мл	№5x2	168,06	30,01/€
	АЦЕМІК	Тулп Лаб Пвт. Лтд./Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x1	53,08	24,85/\$
	ВИДАНОЛ®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл., в/о у бл.	500мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ВИДАНОЛ®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл., в/о у бл.	500мг	№10x6	39,58	24,92/\$
	ГЕМОАКТИВ	ПТ. НОВЕЛЛ ФАРМАСЬЮТІКАЛ ЛАБОРАТОРІЗ, Індонезія	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп.	100 мг/мл	№5	225,62	28,20/\$
	ГЕМОАКТИВ- МБ	ІММАКУЛ ЛАЙФСАЙЄНСІЗ ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД, Індія	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп.	100 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЄВРОНЕКС	Стеріл-Джен Лайф Сайнсїс (Пі) Лімітед, Індія	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп.	100 мг/мл	№5x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НЕОТРАНЕКС	Біоіндастріа Лабораторіо Італіано Медіціналі С.П.А., Італія	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп.	500мг/5мл	№5x1	268,89	23,87/\$
	ТАФІКСИЛ	Лабіана Фармацевтікалс, С.Л.У., Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x2, №1 0x3, №10x6, №10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТРАНЕСТАТ	Нанг Куанг Фармасьютікал Ко. Лтд., Тайвань	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	100мг/мл	№3x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТРАНЕСТАТ	Нанг Куанг Фармасьютікал Ко. Лтд., Тайвань	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	100мг/мл	№6x1	301,99	22,65/\$
	ТРАНСТОП	Ауробіндо Фарма Лімітед - Юніт ІV, Індія	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у кор.	100мг/мл	№6	89,49	26,67/\$
	ТРЕНАКСА	Лабіана Фармацевтікалс, С.Л.У., Іспанія	р-н д/ін'єк. по 5мл або 10мл в амп. у чар.уп. в кор.	100мг/мл	№1, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТРЕНАКСА	Лабіана Фармацевтікалс,	р-н д/ін'єк. по	100мг/мл	№5	120,30	27,00/\$

		С.Л.У., Іспанія	10мл в амп. у чар.уп. в кор.				
	ТРЕНАКСА	Лабіана Фармацевтікалс, С.Л.У., Іспанія	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у чар.уп. в кор.	100мг/мл	№5	146,84	27,00/\$
	ТРЕНАКСА 250	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., в/о у стрип.	250мг	№6x2	120,69	24,48/\$
	ТРЕНАКСА 500	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., в/о у стрип.	500мг	№6x2	76,69	24,48/\$
	ТУГІНА-500	Тулп Лаб Пвт. Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

13.7.4.2. Інгібітори протеїназ

● Апротинін (Aprotinin)

Фармакотерапевтична група: В02АВ01 - Інгібітори протеїнази.

Основна фармакотерапевтична дія: інгібітор протеаз широкого спектра дії, володіє антифібринолітичною активністю; утворюючи оборотний стехіометричний комплекс фермент-інгібітор, апротинін у людини інгібує трипсин, плазмін, калікреїн у плазмі крові і тканинах, що призводить до інгібування фібринолізу; також інгібує контактну фазу активації згортання крові, яка є фактором запуску процесу коагуляції і стимуляції фібринолізу.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика з метою зниження післяопераційної крововтрати і потреби у гемотрансфузії у дорослих пацієнтів, які мають високий ризик великих крововтрат при проведенні ізольованого серцево-легеневого шунтування (шунтування коронарних артерій, яке не комбінується з іншими серцево-судинними втручаннями),

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в ін'єкційно або коротко- чи довготривала інфузія; вміст фл. розчинити в 0,9 % р-ні натрію хлориду (у співвідношенні 1:1); 1 АТрОд еквівалентна 1,33 КІО (каліккреїнінактивуючих одиниць); тест-доза: унаслідок ризику розвитку алергічної (анафілактичної) р-ції всім пацієнтам ввести в/в 10000 КІОД (каліккреїн-інгібуючих одиниць) апротиніну (1 мл) як мінімум за 10 хв до введення початкової дози, якщо початкова доза 1 мл не викликала АР, то можна ввести терапевтичну дозу. Під час операцій на відкритому серці (з апаратом штучного кровообігу) для зниження крововтрати і потреби в гемотрансфузії: після введення в наркоз (але до проведення стернотомії) ввести навантажувальну дозу від 1 000 000 до 2 000 000 КІОД в/в протягом 20-30 хв. Наступні 1 000 000-2 000 000 КІОД вводити після включення апарату штучного кровообігу. З метою уникнення фізичної несумісності апротиніну та гепарину, який додається до р-ну первинного заповнення насоса, кожен препарат додавати до р-ну первинного заповнення насоса у процесі рециркуляції, для того щоб забезпечити достатнє розведення обох препаратів до того, як вони змішуються один з одним. Після початкової болюсної інфузії у високій дозі вводити від 250 000 до 500 000 КІОД/год шляхом безперервної інфузії до закінчення операції. У цілому загальна кількість апротиніну, введеного протягом лікувального циклу, не повинно перевищувати 7 000 000 КІОД; для в/в введення вводити ч/з центральний венозний катетер, який не використовувати для введення будь-якого іншого ЛЗ, вводити тільки пацієнтам, які знаходяться у положенні лежачи; введення проводити повільно (максимальна швидкість - від 5 до 10 мл/хв) шляхом в/в ін'єкції або короткострокової інфузії.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: с-м дисемінованого внутрішньосудинного зсідання, коагулопатія, лейкоцитоз, тромбоцитопенія, зниження протромбіну; АР, в тому числі анафілактичні та анафілактоїдні р-ції, анафілактичний шок (що потенційно загрожує життю), шкірні прояви (еритема, кропив'янка), ниткоподібний частий пульс, тахікардія, блідість, артеріальна гіпотензія, ціаноз, задишку, підвищене потовиділення, неприємні відчуття у ділянці серця, з розвитком повної клінічної картини шоку, аритмія, шлуночкова тахікардія, фібриляція передсердь, зниження АТ, задишка, біль за грудиною, ішемія міокарда, ІМ, тромбоз/оклюзія коронарних артерій, тромбоз, підвищення АТ, перикардит, артеріальний тромбоз (та його форми, характерні для життєво важливих органів), тромбоемболія легеневої артерії, психотичні р-ції, галюцинації, сплутаність свідомості, тремор, збудження, запаморочення, судоми, БА(бронхоспазм), кашель, біль у грудній клітці, набряк легень, свербіж, висипання, зміна кольору шкіри, нудота, блювання, порушення ф-ції печінки, жовтяниця, печінкова недостатність, гіперглікемія, гіпокаліємія, ацидоз, гіперволемія, анурія, некроз ниркових каналців, олігурія, НН (оборотна), підвищення КлКр сироватки крові, артралгія, міалгія, загальна слабкість, гіпертермія, зміни в місці введення, флебіт, тромбофлебіт в місці ін'єкції (при довготривалому введенні),

Противопоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активної речовини або до будь-якого з компонентів препарату; гіперчутливість до білка крупної рогатої худоби; пацієнти зі штучним кровообігом під час проведення операції з аортокоронарного шунтування; пацієнти, які застосовували препарат протягом останніх 12 міс.; пацієнти з позитивним результатом тесту на визначення апротинін-специфічних IgG а/т належать до групи підвищеного ризику розвитку анафілактичної р-ції при введенні апротиніну.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КОНТРИВЕН	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл, по 5мл в амп. у бл. та 50мл у фл.	10000КІО/мл	№5x2	241,00	
	КОНТРИВЕН	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл, по 5мл в амп. у бл. та	10000КІО/мл	№5x1	540,00	

			50мл у фл.				
II.	ГОРДОКС	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	р-н д/ін'єк. по 10мл в амп. у пласт. форм.	10000 КЮД/мл	№5x5	4096,1 1	28,01/\$

13.8. Антитромботичні засоби

13.8.1. Антикоагулянти

13.8.1.1. Антагоністи вітаміну К

- **Феніндіон (Phenindione)**

Фармакотерапевтична група: B01AA02 - антитромботичні засоби. Антагоністи вітаміну К.

Основна фармакотерапевтична дія: антикоагулянтна; механізм дії обумовлений конкурентним антагонізмом з вітаміном К; блокує К-вітамінредуктазу, порушує утворення у печінці активної форми вітаміну К, необхідної для синтезу протромбіну та інших факторів згортання крові (VII, IX і X); викликає гіпопротромбінемію; знижує толерантність плазми до гепарину, вміст ліпідів у крові і покращує проникність судин; гіпокоагулянтний ефект розвивається поступово, виявляється через 8-10 год. і досягає максимуму через 24-36 год. після прийому; тривалість дії - 1-4 дні після відміни.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика і лікування тромбозів (особливо глибоких вен нижніх кінцівок), тромбоемболічних ускладнень (тромбоемболія легеневої артерії, емболічні інсульти, ІМ) і тромбоутворення у післяопераційному періоді, у пацієнтів з механічними протезами клапанів серця.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим і дітям (старше 14 років) р/ос після їди; дорослим - у перший день лікування в добовій дозі 120 - 180 мг за 3-4 прийоми, у другий день - у добовій дозі 90 - 150 мг, потім - по 30 - 60 мг в 1-2 прийоми, залежно від рівня протромбіну в крові; дітям старше 14 років (маса тіла не менше 45 кг) - у перший і другий дні лікування в добовій дозі 90 - 150 мг за 3 - 4 прийоми, потім - по 30 - 60 мг в 1-2 прийоми, залежно від рівня протромбіну в крові; разова доза, частота і тривалість застосування встановлюються індивідуально лікарем залежно від значення протромбінового індексу крові, який підтримують на рівні 40 - 60 %; при рівні протромбіну < 40 - 50 % негайно відмінити; для профілактики тромбоемболічних ускладнень по 30 мг 1-2 р/добу; вищі дози для дорослих: разова 50 мг, МДД 200 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: мікро- і макрогематурія, кровотеча із порожнини рота і носоглотки, шлунково-кишкові кровотечі, крововилив у м'язи; пригнічення кістково-мозкового кровотворення; нудота, блювання, діарея, біль у горлі, розлади смаку, стоматит, токсичний гепатит, жовтяниця, виразковий коліт, паралітичний ілеус зі здуттям живота; міокардит; АР - шкірне висипання (еритематозне, макулярне, папульозне), ексфолюативний дерматит, еозинофілія, гіпертермія, масивний набряк, некроз шкіри, альбумінурія; порушення ф-ції нирок, забарвлення сечі в рожевий колір; головний біль, забарвлення долонь у оранжевий колір.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату, гемофілія; загроза переривання вагітності; великі післяопераційні рани; кровотечі з органів травлення, дихання, сечостатевої системи; нещодавно перенесені хірургічні втручання або травми головного/спинного мозку, очей; нещодавно проведені люмбальна анестезія, біопсія печінки або нирок; тяжка ПН або НН; геморагічні діатези; гіпокоагуляція (початковий рівень протромбіну <70 %); ерозивно-виразкові ураження ШКТ; тяжка АГ; пацієнти, які не співпрацюють з лікарем.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ФЕНІЛІН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	30мг	№20x1	9,05	

- **Варфарин (Warfarin) *** [ПМД]

Фармакотерапевтична група: B01AA03 - антитромботичні засоби. Антагоністи вітаміну К.

Основна фармакотерапевтична дія: антикоагулянтна; блокує вітамін К-залежний синтез факторів згортання крові.

Показання для застосування ЛЗ: лікування і профілактика тромбозів глибоких вен і емболії легеневої артерії ^{ВООЗ,БНФ}; вторинна профілактика ІМ і профілактика тромбоемболічних ускладнень (інсульт або системна емболія) після ІМ; профілактика тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів з фібриляцією передсердя, ураженнями серцевих клапанів або з протезованими клапанами серця ^{ВООЗ,БНФ}; профілактика швидкоминучих ішемічних атак та інсульту ^{ВООЗ,БНФ,ПМД}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: цільовий рівень МНІ (Міжнародний Нормалізаційний Індекс) р/ос для антикоагулянтної терапії профілактики тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів з протезованими клапанами серця: 2,5-3,5, інші показання: 2,0-3,0; дорослі: пацієнтам з нормальною масою тіла і спонтанним МНІ нижче 1,2 призначати 10 мг ^{БНФ} протягом 3-х послідовних днів, потім дозу розраховувати відповідно вимірюванні МНІ на 4 день. При амбулаторному лікуванні і у пацієнтів зі спадковою недостатністю протеїну С або S рекомендована початкова доза 5 мг протягом 3-х послідовних днів, потім дозу розраховувати відповідно вимірюванні МНІ на 4 день. Для пацієнтів літнього віку, пацієнтів з невеликою масою тіла, зі спонтанним МНІ >1,2, або тих, які мають супутні захворювання або одержують будь-які ЛЗ, що впливають на ефективність антикоагулянтної терапії, рекомендована початкова доза 5 мг ^{БНФ} протягом двох наступних днів. Вимірювання МНІ проводити щодня, поки

не буде досягнутий стабільний цільовий рівень, який зазвичай встановлюється на 5-6-й день лікування. Потім вимірювання МНІ проводити щотижня, досягаючи 4-тижневого інтервалу. Якщо доза вимагає корекції, то наступне вимірювання МНІ слід проводити через 1 або 2 тижні після корекції. Після цього вимірювання тривають до досягнення 4-тижневих інтервалів. Планові операції: припинити прийом варфарину за 1-5 днів до операції, у разі високого ризику тромбозу пацієнтові для профілактики п/ш вводити низькомолекулярний гепарин. Тривалість паузи у прийомі варфарину залежить від МНІ. Прийом варфарину припинити: за 5 днів до операції, якщо МНІ > 4,0; за 3 дні до операції, якщо МНІ = від 3,0 до 4,0; за 2 дні до операції, якщо МНІ = від 2,0 до 3,0. Визначити МНІ увечері перед операцією і ввести 0,5-1,0 мг вітаміну К₁ р/ос або в/в, якщо МНІ > 1,8. Взяти до уваги необхідність інфузії нефракціонованого гепарину або профілактичного введення низькомолекулярного гепарину у день операції. Продовжити прийом варфарину зі звичайної підтримуючої дози того ж дня увечері після невеликих операцій і в день, коли пацієнт починає отримувати ентеральне харчування після великих операцій.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: геморагія, анемія, кумариновий некроз, с-м пурпурових пальців, еозинофілія, васкуліт, кальцифікація, холестероловий емболізм, кальцифікація трахеї, нудота, блювання, діарея, біль у ділянці живота, оборотне підвищення рівня печінкових ферментів, холестатичний гепатит, жовтяниця, оборотна алопеція, висипання, екзема, кропив'янка, некроз шкіри, оборотна алопеція, висипання, екзема, кропив'янка, некроз шкіри, пріапізм, нефрит, уролітіаз, тубулярний некроз, АР (зазвичай висипання), свербіж, гарячка, субдуральна гематома, гемоторакс, носова кровотеча, шлунково-кишкова кровотеча, кровотеча з прямої кишки, блювання кров'ю, панкреатит, мелена, пурпура, еритематозний набряк шкіри, що призводить до екхімозу, інфаркту та некрозу шкіри, гематурія, зниження гематокриту.

Протипоказання до застосування ЛЗ: схильність до кровотеч (хвороба Віллебрандта, гемофілія, тромбоцитопенія і порушення ф-цій тромбоцитів), г. кровотеча, для уникнення ризику розвитку тяжких кровотеч протягом 72 год після обширних оперативних втручань, протягом 48 год у післяпологовому періоді, вагітність, тяжка НН, тяжка ПН, цироз печінки, нелікована або неконтрольована АГ, недавній внутрішньочерепний крововилив, стан здоров'я, що зумовлює внутрішньочерепний крововилив, наприклад аневризма мозкових артерій, аневризма аорти, тенденція до падіння, люмбальна пункція, операції ЦНС, очні операції, шлунково-кишкові або ниркові кровотечі, їх ускладнення, дивертикульоз, злоякісні пухлини, варикозне розширення вен стравоходу, інфекційний ендокардит, ексудативний перикардит, деменція, психози, алкоголізм, інші ситуації, коли комплаєнтність може бути недостатньою і терапію антикоагулянтами неможливо проводити досить безпечно, гіперчутливість до варфарину або до будь-якої з допоміжних речовин.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 7,5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ВАРФАРИН-ФС	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	2,5мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАРФАРИН-ФС	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	2,5мг	№10x10	2,08	
	ВАРФАРИН-ФС	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	3мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАРФАРИН-ФС	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл. у бл.	3мг	№10x10	1,97	
II.	ВАРФАРЕКС®	АТ "Гріндекс", Латвія	табл. у конт.	3мг	№100	2,25	28,65/€
	ВАРФАРЕКС®	АТ "Гріндекс", Латвія	табл. у конт.	3мг	№30	4,42	28,65/€
	ВАРФАРЕКС®	АТ "Гріндекс", Латвія	табл. у конт.	5мг	№100	1,67	31,87/€
	ВАРФАРЕКС®	АТ "Гріндекс", Латвія	табл. у конт.	5мг	№30	3,15	31,87/€
	ВАРФАРИН НІКОМЕД	Такеда Фарма Сп. з о.о., Польща	табл. у фл.	2,5мг	№100	3,03	29,08/€
	ВАРФАРИН ОРІОН	Оріон Корпорейшн/Оріон Корпорейшн (Альтернативний виробник, що здійснює первинне та вторинне пакування), Фінляндія/Фінляндія	табл. у фл.	3мг	№100	3,92	31,45/€
	ВАРФАРИН ОРІОН	Оріон Корпорейшн/Оріон Корпорейшн (Альтернативний виробник, що здійснює первинне та вторинне пакування), Фінляндія/Фінляндія	табл. у фл.	3мг	№30	5,22	31,45/€
	ВАРФАРИН ОРІОН	Оріон Корпорейшн/Оріон Корпорейшн (Альтернативний виробник, що здійснює первинне та вторинне пакування), Фінляндія/Фінляндія	табл. у фл.	5мг	№100	2,24	31,45/€
	ВАРФАРИН	Оріон Корпорейшн/Оріон	табл. у фл.	5мг	№30	2,97	31,45/€

	ОПІОН	Корпорейшн (Альтернативний виробник, що здійснює первинне та вторинне пакування), Фінляндія/Фінляндія				
--	-------	---	--	--	--	--

13.8.1.2. Нефракціонований гепарин

- **Гепарин (Heparin)** * [ПМД] [гель]

Фармакотерапевтична група: В01АВ01 - антитромботичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: антикоагулянт прямої дії; уповільнює згортання крові, активує процес фібринолізу, пригнічує активність деяких ензимів (гіалуронідази, фосфатази, трипсину), уповільнюючи дію простагліцину на агрегацію тромбоцитів, спричинену дією аденозиндифосфату.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика та лікування тромбоемболічних захворювань^{ВООЗ, БНФ} та їх ускладнень (г. коронарний синдром^{БНФ, ПМД}, тромбози та емболії магістральних вен^{ВООЗ, БНФ} та артерій, судин мозку, очей, I фаза с-му дисемінованого внутрішньосудинного згортання, постійна форма мерехтіння передсердь з емболізацією); для попередження післяопераційних венозних тромбозів та емболій легеневої артерії^{ВООЗ, БНФ} (у режимі низького дозування) у пацієнтів, які перенесли хірургічні втручання, або у тих, хто ч/з будь-які інші причини має ризик розвитку тромбоемболічної хвороби; для попередження згортання крові при лабораторних дослідженнях, діалізі, екстракорпоральному кровообігу^{БНФ}, операціях на серці та судинах, прямому переливанні крові.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в та п/ш^{ВООЗ, БНФ}, перед призначенням визначити час згортання крові, тромбіновий та активований парціальний тромбoplastиновий час, кількість тромбоцитів; для розведення використовувати тільки 0,9 % р-н натрію хлориду; дорослим при г. тромбозі лікування розпочинати з в/в введення 10000^{БНФ}-15000 МО під контролем згортання венозної крові, тромбінового та активованого парціального тромбoplastинового часу; після цього по 5000-10000 МО вводити в/в кожні 4-6 год.; адекватною вважається доза, при якій час згортання крові подовжується у 2,5-3 р., а активований парціальний тромбoplastиновий час - у 1,5-2 р.; для профілактики г. тромбозу п/ш по 5000 МО кожні 6-8 год.; при першій фазі с-му дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові (ДВЗ) у дорослих призначати п/ш тривалий час 2500-5000 МО/добу під контролем тромбінового часу; за 1-2 доби до відміни гепарину добову дозу поступово знижувати; під час операції на відкритому серці з підключенням апарату екстракорпорального кровообігу пацієнтам вводити у початковій дозі не менше 150 МО/кг; коли процедура триває < 60 хв., призначати дозу 300 МО/кг, а коли процедура триває > 60 хв., призначати 400 МО/кг; для профілактики п/ш 5000 МО за 2 год. до операції^{ВООЗ}, потім по 5000 МО кожні 8 год. протягом 7 днів^{ВООЗ, БНФ}; як доповнення до стрептокінази по 5000 МО 3 р/добу або 10000-12500 МО 2 р/добу може бути показаний при підвищеному ризику розвитку тромболітичних ускладнень у хворих: при повторному ІМ; з постійною формою мерехтіння передсердь з емболізацією; при г. коронарному с-мі (нестабільній стенокардії або ІМ) спочатку струминно в/в вводити 5000 МО, потім перейти на в/в крап. введення зі швидкістю 1000 МО/год.; швидкість інфузії підбирати так, щоб протягом перших 2-3 діб підтримувати активований парціальний тромбoplastиновий час на рівні у 1,5-2 р. більшому, ніж його нормальне значення; дітям: початкова доза 50 МО/кг (в/в ін'єкція/інфузія)^{БНФ}, підтримуюча доза - 100 МО/кг кожні 4 год.; середня добова доза для дітей 300 МО/кг; немовлятам призначати від 2 до 10 МО/кг/год в/в (постійно або переривчасто); п/ш немовлятам вводити у добовій дозі 200-300 МО/кг, розподіляючи її на 4-6 ін'єкцій; у всіх випадках при застосуванні гепарину на 1-3 дні до його відміни призначати непрямі антикоагулянти.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тромбоцитопенія I типу; II типу; епідуральні та спинномозкові гематоми, депресія, головний біль, нудота, блювання, діарея, підвищення рівня печінкових трансаміназ (АЛТ і АСТ), лактатдегідрогенази, глутамілтрансферази та гіперліпідемія (дані порушення є оборотними і зникають при відміні препарату), висипання (еритематозні, макулопапульозні), кропив'янка, свербіж, свербіж і печіння шкіри стоп, некроз шкіри, мультиформна еритема, алопеція, остеопороз, демінералізація кісток, пріапізм, шкірні висипання, кон'юнктивіт, слъозотеча, риніт, бронхоспазм, астма, тахіпное, ціаноз, кропив'янка, алергічний ангіоспазм у кінцівках, анафілактоїдні р-ції, анафілактичний шок, гіпоальдостеронізм, гіперкаліємія, підвищення рівня тироксину, зниження рівня холестерину, підвищення рівня глюкози в крові, крововиливи та гематоми у будь-якому органі чи системі органів (п/ш, в/м, заочеревинні, носові, внутрішньокишкові, шлункові, маткові), подразнення, виразки, болючість, крововиливи, гематоми та атрофія у місцях ін'єкції, нежить, гарячка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до гепарину та/або до спирту бензилового; гемофілія; тромбоцитопенія; геморагічні діатези; підозра на гепариніндуковану імунну тромбоцитопенію; пептична виразка шлунка та ДПК; тяжка АГ; цироз печінки, що супроводжується варикозним розширенням вен стравоходу; тяжка НН та ПН; бактеріальний ендокардит; менструація; нещодавно проведені хірургічні втручання, особливо нейрохірургічні та офтальмологічні; виразковий коліт; злоякісні новоутворення; геморагічний інсульт (перші 2-3 доби); ЧМТ; ретинопатія; крововилив у тканини ока; деструктивний туберкульоз легень; енцефаломаліяція; геморагічний панкреонекроз; кровотечі будь-якої локалізації (відкрита виразка шлунка, внутрішньочерепна кровотеча), за винятком геморагії, що виникла на ґрунті емболічного інфаркту легень (кровохаркання) або нирок (гематурія); повторні кровотечі в анамнезі, незалежно від локалізації; підвищення проникності судин (наприклад, при хворобі Верльгофа); стан шоку; загроза аборту; не можна застосовувати: пацієнтам, які вжили високі дози алкоголю; у вигляді внутрішньом'язових ін'єкцій; при г. і хр. лейкозах; апластичних і гіпопластичних анеміях; при г. аневризмі серця та аорти; в ході проведення операцій на головному або спинному мозку, очному яблуці, вухах; після проведення хірургічних операцій на ділянках, де розвиток кровотечі є небезпечним для життя пацієнта; при ЦД, при проведенні епідуральної анестезії в ході пологів; пацієнтам, яким застосовують гепарин з лікувальною метою, при проведенні планових хірургічних операцій протипоказана провідникова анестезія, оскільки застосування гепарину у рідкісних випадках може спричинити епідуральні або спинномозкові гематоми, у результаті чого може розвинути тривалий або необоротний параліч.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 10 тис ОД.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	ГЕПАРИН-БІОЛІК	АТ "БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в ампл. та 4мл, 5мл в фл.	5000МО/мл	№5, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЕПАРИН-БІОЛІК	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в ампл. та 4мл, 5мл в фл.	5000 МО/мл	№5, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЕПАРИН-БІОЛІК	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в фл.	5000МО/мл	№5	16,00	
	ГЕПАРИН-ІНДАР	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл у фл.	5000МО/мл	№1	46,90	
	ГЕПАРИН-ІНДАР	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл у фл.	5000МО/мл	№100	46,90	
	ГЕПАРИН-ІНДАР	ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл у фл.	5000МО/мл	№5	46,90	
	ГЕПАРИН-НОВОФАРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл, 4мл у фл.	5000 МО/мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЕПАРИН-НОВОФАРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл у фл.	5000 МО/мл	№5	56,00	
	ГЕПАРИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл у фл. в конт. чар/уп	5000МО/мл	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЕПАРИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл у фл. в конт. чар/уп	5000МО/мл	№5x1	47,84	

13.8.1.3. Низькомолекулярні гепарини

● *Надропарин (Nadroparin)*

Фармакотерапевтична група: V01AB06 - антитромботичні засоби. Група гепарину.

Основна фармакотерапевтична дія: являє собою глікозаміноглікан із середньою молекулярною масою 4300 дальтон; виявляє високий рівень зв'язування з білком плазми антитромбіном III, що зумовлює прискорену інгібіцію Ха-фактора, і є головним внеском у його високу антитромботичну активність, стимулює інгібітор шляху тканинного фактора, активує фібрinolіз шляхом прямого вивільнення тканинного активатора плазміногена з клітин ендотелію, модифікує гемореологічні параметри; має високий рівень співвідношення між анти-Ха- і анти-IIa-активністю; чинить негайну і пролонговану антитромботичну дію; порівняно з нефракціонованим гепарином меншою мірою впливає на функцію і агрегацію тромбоцитів і дуже мало впливає на первинний гемостаз.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика тромбоемболічних ускладнень у результаті загальних або ортопедичних хірургічних втручань; у хворих із високим ризиком тромбоемболічних ускладнень (ДН і/або інфекційні захворювання дихальних шляхів, і/або СН), госпіталізованих у відділення інтенсивної терапії; лікування тромбоемболічних ускладнень, профілактика згортання крові при ГД, лікування нестабільної стенокардії та ІМ без патологічного зубця Q на ЕКГ.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: п/ш, профілактика тромбоемболічних ускладнень: загальна хірургія - рекомендована доза 0,3 мл (2 850 МО анти-Ха-факторної активності), що вводиться за 2-4 год до хірургічного втручання, подальші дози вводяться 1р/добу протягом наступних днів не менше 7 діб. Ортопедичні хірургічні втручання- препарат вводиться п/ш у дозах, що залежать від маси тіла пацієнта, дози призначають з розрахунку 38 МО анти-Ха-факторної активності на 1 кг маси тіла хворого, збільшуючи на 50 % на 4-ий післяопераційний день, початкова доза вводиться за 12 год до операції, друга доза - ч/з 12 год після операції, наступні дози-1 р/добу протягом усього періоду ризику до переведення хворого на амбулаторне лікування, мінімальна тривалість лікування - 10 діб. Хворі з високим ризиком тромбоемболічних ускладнень (ДН і/або інфекційні захворювання дихальних шляхів, і/або СН): п/ш 1 р/день, доза розраховується відповідно до маси тіла пацієнта, лікування має тривати весь період ризику виникнення тромбоемболії. Лікування тромбоемболічних ускладнень - п/ш 2 р/добу (кожні 12 год), зазвичай протягом 10 днів. Доза розраховується згідно з масою тіла хворого, з розрахунку 86 МО анти-Ха-факторної активності на 1 кг маси тіла хворого. Профілактика згортання крові при ГД: добирається індивідуально, враховуючи також технічні умови проведення ГД, застосовує у вигляді одноразового інтраваскулярного введення в артеріальний кровопривідник екстракорпорального контуру на початку кожного сеансу ГД, для хворих без підвищеного ризику виникнення кровотеч початкова доза розраховується згідно з масою тіла і є достатньою для сеансу ГД тривалістю до 4 год, при підвищеному ризику виникнення кровотеч дозу зменшити наполовину, при тривалості сеансу ГД понад 4 год додатково може бути введена менша доза

препарату, ця доза встановлюється залежно від індивідуальної р-ції хворого, який весь час має знаходитись під наглядом для виявлення ознак кровотечі або згортання крові у діалізній системі. Лікування нестабільної стенокардії та ІМ без патологічного зубця Q на ЕКГ - п/ш 2 р/добу (кожні 12 год), тривалість лікування - 6 дб. Початкову дозу вводять у вигляді в/в болюсної ін'єкції, наступні дози вводять п/ш. Розрахунок дози базується на масі тіла хворого з розрахунку 86 МО анти-Ха-факторної активності на 1 кг маси тіла хворого.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кровотечі різних локалізацій, що виникають частіше у пацієнтів із факторами ризику, тромбоцитопенія (включаючи гепариніндуковану тромбоцитопенію), тромбоцитоз, еозинофілія, оборотна при припиненні лікування, р-ції гіперчутливості (включаючи ангіоневротичний набряк і шкірні р-ції), анафілактоїдна р-ція, оборотна гіперкаліємія, пов'язана з гепариніндукованим пригніченням альдостерону, головним чином у хворих із факторами ризику, підвищення рівня трансаміназ, зазвичай оборотне, пріапізм, висипання, кропив'янка, еритема, свербіж, некроз шкіри, головним чином у місці введення, невеликі гематоми у місці введення, р-ції у місці введення, кальциноз у місці введення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до надропарину або до будь-якого іншого компонента препарату; тромбоцитопенія, пов'язана із застосуванням надропарину, в анамнезі; ознаки кровотечі або підвищений ризик кровотеч, пов'язаних із порушенням гемостазу, за винятком ДВС-синдрому, не спричиненого гепарином; органічні ураження зі схильністю до кровоточивості (наприклад, г. виразкова хвороба шлунка або ДПК), геморагічні цереброваскулярні травми, г. інфекційний ендокардит, тяжка ниркова недостатність (КлКр < 30 мл/хв) у хворих при лікуванні тромбоемболічних ускладнень, нестабільної стенокардії та ІМ без патологічного зубця Q на ЕКГ; діабетична або геморагічна ретинопатія.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 2,85 тис ОД (анти-Ха)

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НАДРОПАРИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	р-н д/ін'єк. по 0,3мл, 0,4мл, 0,6мл, 0,8мл у шпр. в конт. чар/уп. або бл.	9500МО анти-Ха/мл	№2x5, №1x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НАДРОПАРИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	р-н д/ін'єк. по 0,3мл у шпр. в конт. чар/уп. або бл.	9500МО анти-Ха/мл	№2x5	81,90	
	НАДРОПАРИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	р-н д/ін'єк. по 0,6мл у шпр. в конт. чар/уп. або бл.	9500МО анти-Ха/мл	№2x5	82,75	
	НАДРОПАРИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	р-н д/ін'єк. по 0,4мл у шпр. в конт. чар/уп. або бл.	9500МО анти-Ха/мл	№2x5	87,75	
II.	ФРАКСИПАРИН®	Аспен Нотер Дам де Бондевіль, Франція	р-н д/ін'єк. по 0,3мл, у шпр. в бл.	9500МО анти-Ха/мл	№2x5	77,20	26,91/\$
	ФРАКСИПАРИН®	Аспен Нотер Дам де Бондевіль, Франція	р-н д/ін'єк. по 0,4мл, у шпр. в бл.	9500МО анти-Ха/мл	№2x5	83,78	26,91/\$
	ФРАКСИПАРИН®	Аспен Нотер Дам де Бондевіль, Франція	р-н д/ін'єк. по 0,8мл у шпр. в бл.	9500МО анти-Ха/мл	№2x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФРАКСИПАРИН®	Аспен Нотер Дам де Бондевіль, Франція	р-н д/ін'єк. по 0,6мл у шпр. в бл.	9500МО анти-Ха/мл	№2x5	72,15	27,13/\$

• **Еноксапарин (Епохарагін)**

Фармакотерапевтична група: B01AB05 - антитромботичні засоби. Група гепарину.

Основна фармакотерапевтична дія: низькомолекулярний гепарин, у якого антитромботична та антикоагулянтна активність стандартного гепарину не пов'язані між собою; йому властиве більш високе співвідношення анти-Ха до анти-IIa (антитромбінної) активності.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика венозної тромбоемболії при хірургічних втручаннях, які супроводжуються помірним та високим тромбогенним ризиком^{БНФ}; профілактика тромбозу глибоких вен у пацієнтів^{БНФ}, які перебувають на постільному режимі у зв'язку із г.терапевтичними захворюваннями: СН (III або IV клас за класифікацією NYHA); г. ДН, г. інфекційним або ревматичним захворюванням при наявності принаймні ще одного фактора ризику венозної тромбоемболії; профілактика тромбоутворення в екстракорпоральному контурі кровообігу^{БНФ} у під час проведення ГД, лікування діагностованого тромбозу глибоких вен, який супроводжується або не супроводжується тромбоемболією легеневої артерії та не має тяжких клінічних симптомів, за винятком тромбоемболії легеневої артерії^{БНФ}, яка вимагає лікування тромболітичним засобом або хірургічного втручання; лікування нестабільної стенокардії та г. ІМ без зубця Q^{БНФ} у комбінації з ацетилсаліциловою к-тою; лікування г. ІМ з підйомом/елевациєю сегмента ST^{БНФ} у комбінації з тромболітичним засобом у хворих, яким можливе подальше застосування коронарної ангіопластики, а також у хворих, яким цю процедуру не проводять.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: п/ш; профілактика венозних тромбоемболій у хірургії: ^{БНФ} 1 ін'єкція/добу, дозу визначається на основі індивідуального ризику у конкретного пацієнта залежно від виду хірургічного втручання; хірургічні операції, які супроводжуються помірним тромбогенним ризиком: ефективна профілактика забезпечується щоденним введенням еноксапарину у дозі 2000 анти-Ха МО (0,2 мл) препарату, режим дозування

- введення першої ін'єкції за 2 год до операції. Операції на кульшовому та колінному суглобах - 4000 анти-Ха МО (0,4 мл) 1 р/добу, режим дозування - введення першої ін'єкції еноксапарину у дозі 4000 анти-Ха МО (повна доза) за 12 год перед операцією або першої ін'єкції у дозі 2000 анти-Ха (половина доза) за 2 год перед операцією.^{БНФ}
Профілактика тромбозу глибоких вен при г. терапевтичних захворюваннях - 40 мг або 4000 анти-Ха МО/0,4 мл і вводиться п/ш 1 р/добу.^{БНФ} тривалість становить від 6 до 14 діб. Профілактика згортання крові в системі екстракорпорального кровообігу при проведенні ГД - в/судинний шлях введення (в артеріальну лінію діалізного контуру), максимальна рекомендована доза - 100 анти-Ха МО/кг, для гемодіалізних пацієнтів з групи високого ризику кровотечі (особливо при діалізі у передопераційному- і постопераційномутивному періоді) або з активною кровотечею, під час сеансів діалізу можна застосувати дозу 50 анти-Ха МО/кг (подвійний судинний доступ) або 75 анти-Ха МО/кг (один судинний доступ). Лікування діагностованого тромбозу глибоких вен, який супроводжується або не супроводжується тромбоемболією легеневої артерії та не має тяжких клінічних симптомів - 2 р/добу у дозі 100 анти-фактор Ха МО/кг кожні 12 год, може бути менш ефективним у пацієнтів з масою тіла >100 кг та призводити до підвищеного ризику виникнення кровотечі у пацієнтів з масою тіла < 40 кг. Лікування нестабільної стенокардії та ІМ без зубця Q:рекомендована разова доза препарату -1 мг/кг (100 анти-фактор Ха МО/кг) п/ш ч/з кожні 12 год; одночасно призначати ацетилсаліцилову к-ту р/ос (рекомендовані дози: від 75 до 325 мг р/ос після початкової навантажувальної дози 160 мг). Тривалість лікування - щонайменше 2-8 діб, до клінічної стабілізації стану пацієнта. Лікування г. ІМ з підйомом сегмента ST у комбінації з тромболітичним засобом у хворих, яким проводять подальшу коронарну ангіопластику, а також у хворих, яким цю процедуру не проводять - початкову в/в болюсну ін'єкцію проводити у дозі 30 мг (0,3 мл; 3000 анти-фактор Ха МО). Після чого п/ш вводити 1 мг/кг (100 анти-фактор Ха МО/кг) протягом 15 хв, потім кожні 12 год (для перших двох п/ш ін'єкцій максимальна сумарна доза становить 10000 анти-фактор Ха МО). Першу дозу препарату вводити у будь-який час за 15 хв до або через 30 хв після початку тромболітичної терапії. Рекомендована тривалість лікування становить 8 днів або поки пацієнта не випишуть зі стаціонару, якщо госпіталізація триває менше 8 днів. Супутня терапія: після появи симптомів якнайшвидше розпочинати прийом ацетилсаліцилової к-ти і продовжувати у дозі 75-325 мг/день протягом не менше 30 днів, якщо не показано інакше. Хворі, яким проводять коронарну ангіопластику: якщо з часу останнього п/ш введення препарату до роздування балона пройшло > 8 годин, необхідно провести в/в болюсну ін'єкцію 0,3 мг/кг (30 анти-фактор Ха МО/кг) препарату. Для забезпечення точності об'ємів, що вводяться ін'єкційно, рекомендується розвести препарат до 300 анти-фактор Ха МО/мл (0,3 мл (3000 анти-фактор Ха МО) розвести у 10 мл розчинника (0,9 % розчину натрію хлориду або 5 % р-ну глюкози))

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР, що в деяких випадках може призвести до припинення лікування препаратом; анафілактична або анафілактоїдна р-ція, підвищення рівнів печінкових ферментів, кропив'янка, свербіння, еритема, бульозний дерматит, гематома у місці ін'єкції, біль у місці ін'єкції, інша р-ція у місці ін'єкції (набряк, крововилив, АР, запалення, утворення вузликів, інші р-ції), некроз шкіри у місці ін'єкції, що може розвинути після появи пурпури чи інфільтративних болючих еритематозних бляшок, що вимагає негайного припинення лікування препаратом; місцеве подразнення, гіперкаліємія, головний біль, виникнення тромбозитопенії, гепатоцелюлярне або холестатичне ураження печінки, розвиток остеопорозу при лікуванні протягом тривалого часу, гематоми у місці введення препарату, вузлики у місці ін'єкції, які зникають протягом декількох днів.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до еноксапарину, гепарину або його похідних, у тому числі інших низькомолекулярних гепаринів; наявність в анамнезі тяжкої гепарин-індукованої тромбоцитопенії (ГІТ) типу II, що була спричинена нефракційним гепарином або низькомолекулярним гепарином, кровотеча або схильність до кровотечі, пов'язана з порушенням гемостазу, органічні ураження, які можуть спричинити кровотечу; активна клінічно значуща кровотеча; пацієнти з тяжкою НН (КлКр 30 мл/хв); протипоказано упродовж перших 24 год після внутрішньомозкового крововиливу; внутрішньомозковий крововилив. Спинальна або епідуральна анестезія: ці процедури не застосовувати у пацієнтів, які застосовують лікувальні дози НМГ, хворим, які отримують гепарин для лікування, а не для профілактики, місцево-регіонарна анестезія при планових хірургічних втручаннях заборонена; г. обширний ішемічний інсульт із втратою свідомості або без; г. інфекційний ендокардит (крім деяких ембологенних серцевих ускладнень).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 2 тис ОД (анти-Ха)

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕНОКСАПАРИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	р-н д/ін'єк. у шпр. по 0,2мл, 0,4мл, 0,6мл, 0,8мл в конт. чар/уп. або бл.	10000МО анти-Ха/мл	№1x1, №5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕНОКСАПАРИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	р-н д/ін'єк. у шпр. по 0,8мл, в конт.чар/уп. або бл.	10000МО анти-Ха/мл	№2x1	43,63	
	ЕНОКСАПАРИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	р-н д/ін'єк. у шпр. по 0,6мл, в конт.чар/уп. або бл.	10000МО анти-Ха/мл	№10x1	46,64	
	ЕНОКСАПАРИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	р-н д/ін'єк. у шпр. по 0,6мл, в конт.чар/уп. або бл.	10000МО анти-Ха/мл	№5x2	46,64	
	ЕНОКСАПАРИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	р-н д/ін'єк. у шпр. по 0,8мл, в конт. чар/уп. або бл.	10000МО анти-Ха/мл	№1x1	49,69	
	ЕНОКСАПАРИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	р-н д/ін'єк. у шпр. по 0,6мл, в конт. чар/уп. або бл.	10000МО анти-Ха/мл	№1x1	53,13	
	ЕНОКСАПАРИН-	ТОВ "ФАРМЕКС	р-н д/ін'єк. у шпр. по 0,4мл,	10000МО	№5x2	56,30	

	ФАРМЕКС	ГРУП", Україна	в конт. чар/уп. або бл.	анти-Ха/мл			
	ЕНОКСАПАРИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	р-н д/ін'єк. у шпр. по 0,4мл, в конт. чар/уп. або бл.	10000МО анти-Ха/мл	№1x1	64,44	
	ЕНОКСАПАРИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	р-н д/ін'єк. у шпр. по 0,2мл, в конт. чар/уп. або бл.	10000МО анти-Ха/мл	№10x1	77,34	
	ЕНОКСАПАРИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	р-н д/ін'єк. у шпр. по 0,2мл, в конт. чар/уп. або бл.	10000МО анти-Ха/мл	№5x2	77,34	
	ЕНОКСАПАРИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	р-н д/ін'єк. у шпр. по 0,2мл, в конт. чар/уп. або бл.	10000МО анти-Ха/мл	№1x1	88,09	
	ЕНОКСАПАРИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	р-н д/ін'єк. по 3мл у багатодоз. фл. в конт. чар/уп.	10000МО анти-Ха/мл	№1	109,43	
	ФЛЕНОКС®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк по 0,2мл, 0,4мл, 0,6мл, по 0,8мл у шпр. в бл.	10000МО анти-Ха/мл	№1x1, №1x2, №1x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФЛЕНОКС®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк по 0,2мл, 0,4мл, 0,6мл, по 0,8мл у шпр. в бл.	10000МО анти-Ха/мл	№1x1, №1x2, №2x25	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФЛЕНОКС®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк по 0,6мл, у шпр. в бл.	10000МО анти-Ха/мл	№2x5	23,72	
	ФЛЕНОКС®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк по 0,8мл, у шпр. в бл.	10000МО анти-Ха/мл	№2x1	24,12	
	ФЛЕНОКС®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк по 0,4мл, у шпр. в бл.	10000МО анти-Ха/мл	№2x5	26,96	
	ФЛЕНОКС®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк по 0,2мл, у шпр. в бл.	10000МО анти-Ха/мл	№2x5	28,97	
II.	КЛЕКСАН®	САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА, Франція	р-н д/ін'єк. по 0,8мл у шпр.-дозі із захист. сист. голк. у бл.	10000МО анти-Ха/мл	№2x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛЕКСАН®	САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА, Франція	р-н д/ін'єк. по 0,2мл,0,4мл у шпр.-дозі із захист.сист. голк. у бл.	10000МО анти-Ха/мл	№2x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛЕКСАН® 300	ФАМАР ХЕЛС КЕАР СЕРВІСІЗ МАДРИД, С.А.У./Санofi-Авентіс Дойчланд ГмбХ, Іспанія/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 3мл у багатодоз. фл.	10000МО анти-Ха/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НОВОПАРИН®	Шенджен Текдоу Фармасьютикал Ко., Лтд, Китай	р-н д/ін'єк по 0,2мл, 0,4мл, 0,6мл, по 0,8мл,1,0мл у шпр. в бл.	10000МО анти-Ха/мл	№2x1.№2x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Далтепарин (Dalteparin)**

Фармакотерапевтична група: В01АВ04 - антитромботичні засоби. Група гепарину.

Основна фармакотерапевтична дія: антитромботична, протизгортальна.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика тромбоемболії в перед- і післяопераційний період^{БНФ}; профілактика проксимального тромбозу глибоких вен^{БНФ} у пацієнтів із захворюваннями, що вимагають постільного режиму, включаючи серед інших застійну СН (III або IV класу за класифікацією NYHA), г. ДН або г. інфекції, за наявності провокуючого фактора ризику венозної тромбоемболії (вік від 75 років, ожиріння, рак або венозна тромбоемболія (ВТЕ) в анамнезі); лікування тромбозу глибоких вен, а також тривала профілактика рецидивуючих венозних тромбоемболічних процесів у хворих на рак^{БНФ}; профілактика згортання крові в системі екстракорпорального кровообігу^{БНФ} під час ГД або гемофільтрації у пацієнтів з ХНН або ГНН; лікування венозної тромбоемболії з клінічними проявами тромбозу глибоких вен (ТГВ), легеневої емболії або обох цих захворювань^{БНФ}; нестабільна стенокардія та ІМ без зубця Q^{БНФ} (нестабільний перебіг ІХС), застосовують одночасно з к-тою ацетилсаліциловою.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: п/ш або в/в^{БНФ}; р-н д/ін'єкцій в амп., сумісний з 0,9 % р-ном натрію хлориду або 5 % р-ном глюкози; профілактика тромбоемболії при хірургічних втручаннях у пацієнтів з помірним ризиком тромбозу: 2 500 МО п/ш за 1-2 год до хірургічного втручання, а потім по 2 500 МО п/ш щоранку впродовж усього періоду^{БНФ}, поки пацієнт дотримується постільного режиму 5-7 днів або більше; профілактика тромбоемболії при хірургічних втручаннях у пацієнтів з високим ризиком тромбозу: 2 500 МО п/ш за 1-2 год до хірургічного втручання та ще 2 500 МО п/ш ч/з 8-12 год^{БНФ}; надати по 5 000 МО п/ш щоранку; як альтернативу вводять 5 000 МО п/ш ввечері напередодні хірургічного втручання та по 5000 МО п/ш щовечора після хірургічного втручання^{БНФ}; застосовують упродовж усього періоду, поки пацієнт дотримується постільного режиму 5-7 днів або більше; тривала профілактика тромбоемболії при ендопротезуванні кульшового суглоба: 5 000 МО п/ш увечері напередодні операції і по 5 000 МО п/ш щовечора після операції; застосовують упродовж 5 тижнів після операції;

профілактика проксимального тромбозу глибоких вен у пацієнтів із захворюваннями, що вимагають постільного режиму - рекомендована доза 5 000 МО 1 р/добу^{БНФ}, застосування - до 14 днів; лікування тромбозу глибоких вен, а також тривала профілактика рецидивуючих венозних тромбоемболічних процесів у хворих на рак: венозні тромбоемболічні процеси - рекомендовані дози: 200 МО/кг п/ш 1 р/добу, одноразова доза не повинна перевищувати 18 000 МО^{БНФ}, тривалість лікування 5-10 днів; тривала профілактика рецидивуючих тромбоемболічних процесів у пацієнтів з онкопатологією: 1-ий міс.: протягом перших 30 днів лікування - по 200 МО/кг п/ш 1 р/добу^{БНФ}, МДД не повинна перевищувати 18 000 МО; 2-ий - 6-ий міс.: рекомендована доза 150 МО/кг п/ш 1 р/добу, яку вводять, використовуючи попередньо наповнені шприци; рекомендована тривалість лікування 6 міс.; пацієнти з ХНН без відомого додаткового ризику кровотечі: ГД/гемофільтрація тривалістю > 4 год: застосовують в/в болюсно 30-40 МО/кг з подальшим в/в інфузійним введенням по 10-15 МО/кг/год; ГД/гемофільтрація тривалістю <4 год: застосовують як зазначено вище, або у вигляді одноразової болюсної ін'єкції в дозі 5 000 МО (анти-Ха); як у разі тривалого, так і в разі короткого ГД та гемофільтрації рівні анти-Ха у плазмі повинні знаходитися в межах 0,5-1,0 МО (анти-Ха)/мл; пацієнти з ГНН або ХНН з високим ризиком кровотечі: застосовують в/в болюсно 5-10 МО/кг з подальшим в/в інфузійним введенням із розрахунку 4-5 МО/кг/год, рівні анти-Ха у плазмі повинні знаходитися в межах 0,2-0,4 МО (анти-Ха)/мл; лікування венозної тромбоемболії з клінічними проявами тромбозу глибоких вен (ТГВ), легеневої емболії або обох цих захворювань: 200 МО/кг п/ш 1 р/добу^{БНФ}, моніторинг антикоагулянтної активності не є необхідним, одноразова добова доза не повинна перевищувати 18 000 МО^{БНФ}; доза 100 МО/кг п/ш 2 р/добу може бути застосована для пацієнтів з підвищеним ризиком кровотечі^{БНФ}; нестабільна стенокардія та ІМ без зубця Q (нестабільний перебіг ІХС): 120 МО/кг п/ш кожні 12 год^{БНФ} протягом 8 днів, якщо, на думку лікаря, такий режим застосування чинить сприятливу терапевтичну дію, максимальна доза 10 000 МО/12 год; пацієнти, які потребують застосування більше ніж 8 днів в очікуванні ангіографії/реваскуляризації, повинні отримувати фіксовану дозу 5 000 МО (жінки з масою тіла < 80 кг і чоловіки з масою тіла < 70 кг) або 7 500 МО (жінки з масою тіла ≥ 80 кг і чоловіки з масою тіла ≥ 70 кг) кожні 12 год^{БНФ}. Препарат рекомендується застосовувати до дня проведення процедури реваскуляризації (черезшкірної транслюмінальної коронарної ангіопластики (ЧТКА) або аорто-коронарного шунтування (АКШ)), але не довше ніж 45 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: легка форма тромбоцитопенії (I типу), яка в разі отримання лікування зазвичай має оборотний характер, тяжка імуноопосередкована тромбоцитопенія (II типу), що може бути асоційована з тромбозом, тромбоемболією або дисемінованим внутрішньосудинним згортанням та зменшенням антикоагулянтного ефекту, гіперчутливість, анафілактичний шок, анафілактичні р-ції; АР з такими проявами, як нудота, головний біль, підвищення температури, біль у кінцівках, блювання, риніт, слезотеча, задишка, бронхоспазм, гіпотензія; внутрішньочерепні кровотечі, деякі - з летальним наслідком, тромбоз штучного клапана серця, кровотеча, брадикардія, поодинокі випадки пріапізму та вазоспазму, метаболічний ацидоз, ретроперитонеальні кровотечі, деякі - з летальним наслідком, мінуща підвищення активності трансаміназ, мелена, кропив'янка, свербіж, некроз шкіри, мінуща алопеція, висипання, петехія, пурпура, кровотеча уrogenітального тракту, п/ш гематома в місці ін'єкції, біль у місці ін'єкції, локальні р-ції в місці ін'єкції, такі як склероз, почервоніння, зміна кольору шкіри, кровотеча у місці введення, можливе підвищення рівня тироксину, оборотна затримка калію, хибні показники рівнів холестеролу, глюкози крові та результатів бромсульфалеїнового тесту, спінальна або епідуральна гематома.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату або інших низькомолекулярних гепаринів і/або гепаринів, наприклад спричинена гепарином імунна тромбоцитопенія (II типу) в анамнезі (підтверджена або підозрювана); алергія на свинину; г. гастродуоденальна виразка; крововилив у мозок; крововилив у скловидне тіло; встановлений геморагічний діатез або інша активна кровотеча; тяжкі порушення згортання крові, тяжкі захворювання печінки, нирок, підшлункової залози; тяжка тромбоцитопенія, гіперменорея; виразка кишечника; г. або підгострий септичний ендокардит; геморагічний перикардит і геморагічний плеврит; травми або оперативні втручання на органах ЦНС, органах зору та слуху; аневризма судин мозку; неконтрольована тяжка АГ; ретинопатія; загроза викидня; легенева кровотеча або туберкульоз в активній стадії; пацієнтам, які отримують дальтепарин з метою лікування, а не профілактики, протипоказана місцева та/або регіональна анестезія під час проведення планових хірургічних процедур (це стосується високих доз далтепарину, необхідних для лікування г. тромбозу глибоких вен, легеневої емболії та нестабільного перебігу ІХС); застосування епідуральної анестезії під час пологів суворо протипоказано вагітним, яким проводять лікування антикоагулянтами; пацієнтам з онкологічними захворюваннями та масою тіла < 40 кг на момент розвитку венозної тромбоемболії не застосовувати для тривалого лікування симптоматичної ВТЕ та профілактики її рецидиву ч/з відсутність відповідних даних; пацієнтам, які нещодавно (менше ніж 3 міс. тому) перенесли інсульт, окрім випадків, коли інсульт розвинувся внаслідок системної емболії.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 2,5 тис ОД (анти Ха)

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ФРАГМІН®	Пфайзер Менюфектуринг Бельгія НВ (виробництво, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії, вивчення стабільності)/Ветер Фарма-Фертгунг ГмБХ & Ко. КГ (виробництво та контроль якості (візуальний контроль, контроль на стерильність та контроль об'єму,, Бельгія/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 0,2мл в однораз. шпр. у бл.	5000МО антиХа/0,2 мл	№5x2	80,31	26,77/\$
	ФРАГМІН®	Пфайзер Менюфектуринг Бельгія НВ	р-н д/ін'єк.	2500МО	№5x2	120,46	26,77/\$

	(виробництво, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії, вивчення стабільності)/Ветер Фарма-Фертигунг ГмБХ & Ко. КГ (виробництво та контроль якості (візуальний контроль, контроль на стерильність та контроль об'єму,, Бельгія/Німеччина	по 0,2мл в однораз. шпр. у бл.	антиХа/мл			
ФРАГМІН®	Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ, Бельгія	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у кор.	10000МО анти-Ха/мл	№10	62,91	26,77/\$

• **Беміпарин (Vemiparin)**

Фармакотерапевтична група: В01А В12 - Антитромботичні засоби. Група гепарину.

Основна фармакотерапевтична дія: низькомолекулярний гепарин, отриманий в результаті деполімеризації гепарину натрію, що був виділений із слизової оболонки кишечника свині; анти-Ха-факторна активність беміпарину від 80 до 120 анти-Ха МО на 1 мг сухої речовини, а анти-IIa-факторна активність становить від 5 до 20 анти-IIa МО на 1 мг сухої речовини; співвідношення анти-Ха-факторна активність/анти-IIa-факторна активність - приблизно 8:1; має протизгортальну активність і помірний геморагічний ефект; при дотриманні рекомендовано дозування не подовжує значно час тесту на згортання крові.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика венозної тромбоемболії з високим ступенем ризику при оперативних втручаннях; профілактика венозної тромбоемболії з помірним ступенем ризику при оперативних втручаннях; профілактика згортання крові в системі екстракорпорального кровообігу при проведенні ГД; профілактика венозної тромбоемболії у нехірургічних пацієнтів з високим ризиком розвитку венозної тромбоемболії; вторинна профілактика рецидивів венозної тромбоемболії у пацієнтів з тромбозом глибоких вен і перехідними факторами ризику; лікування встановленого тромбозу глибоких вен, що супроводжується або не супроводжується емболією легеневої артерії, у тяжкій фазі.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: п/ш; дорослі: у день проведення хірургічного втручання з високим ризиком виникнення венозної тромбоемболії п/ш 3500 МО антифактора-Ха за 2 год до початку або ч/з 6 год після операції, а в наступні дні - по 3500 МО антифактора-Ха кожні 24 год; профілактичне лікування проводиться за рішенням лікаря у період існування у пацієнта не менше 7-10 діб після хірургічного втручання - до зниження ризику розвитку тромбоемболії; у пацієнтів, яким виконуються великі ортопедичні операції, профілактику продовжувати до 35 днів; у пацієнтів, які оперуються з приводу раку на органах черевної порожнини або органах тазу профілактику продовжувати до 28 днів, якщо у пацієнтів спостерігається підвищений ризик розвитку тромбоемболії та низький ризик розвитку. Хірургічні втручання з помірним ризиком виникнення венозної тромбоемболії: у день проведення п/ш 2500 МО анти-Ха фактора за 2 год до початку або ч/з 6 год після операції, в наступні дні - по 2500 МО анти-Ха фактора кожні 24 год, вважається, що профілактичне лікування проводиться не менше 7-10 діб після хірургічного втручання. У пацієнтів, яким проводяться багаторазові сеанси ГД тривалістю не більше 4 год та у яких відсутній ризик розвитку кровотеч, попередження коагуляції крові в екстракорпоральному контурі під час процедури досягається шляхом одноразового болюсного введення в артеріальне русло на початку сеансу: для пацієнтів з масою тіла < 60 кг - 2500 МО, а для пацієнтів з масою тіла > 60 кг - 3500 МО; профілактика тромбоемболії у нехірургічних пацієнтів з високим ризиком розвитку венозної тромбоемболії (пацієнти із г. захворюваннями): 3500 МО п/ш; профілактика венозної тромбоемболії у нехірургічних пацієнтів з помірним ризиком розвитку венозної тромбоемболії - рекомендована доза - 2500 МО анти-Ха фактора на добу п/ш; вторинна профілактика рецидивів венозної тромбоемболії у пацієнтів з тромбозом глибоких вен та перехідними факторами ризику: 3500 МО/добу (максимальна тривалість лікування - до 3 міс.) пацієнтам, що отримують лікування антикоагулянтами з приводу тромбозу глибоких вен з легеневою емболією або без неї, в якості терапевтичної альтернативи лікуванню пероральними антикоагулянтами або у тих випадках, коли вони протипоказані; лікування тромбозу глибоких вен: п/ш, в дозі 115 МО антифактора-Ха на кг маси тіла 1р/добу, рекомендована тривалість лікування 7±2 доби, денна доза відповідає дозуванням та об'ємам заповнених шприців (залежно від маси тіла): <50 кг - 0,2 мл (5000 МО анти-Ха фактора); 50-70 кг - 0,3 мл (7500 МО антифактора-Ха); 70 кг - 0,4 мл (10000 МО антифактора-Ха); для пацієнтів з масою тіла > 100 кг дозу визначати з розрахунку 115 МО антифактора-Ха на кг маси тіла/добу, беручи до уваги к-цію антифактора-Ха 25000 МО/мл. За відсутності протипоказань застосування оральних антикоагулянтів починати ч/з 3-5 діб після початку застосування препарату, причому дозування підбирати так, щоб Міжнародне Нормалізоване Відношення (МНВ) було в 2-3 рази вище контрольної величини.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ускладнені кровотечі (у ділянці шкіри, слизових оболонок, ран, травного тракту, сечостатевого тракту), легка оборотна тромбоцитопенія (ГІТ тип I), тяжка тромбоцитопенія (тип II), шкірні АР (кропив'янка, свербіж), анафілактичні р-ції (нудота, блювання, пропасниця, задишка, бронхоспазм, набряк голосової щілини, гіпотензія, кропив'янка, свербіж), гіперкаліємія, незначне минуле підвищення рівня трансаміназ (АСТ, АЛТ) та гамма-ГТ, некроз шкіри у місці введення, екхімоз у місці ін'єкції; гематома та біль у місці ін'єкції, епідуральна та спинномозкова гематома після епідуральної або спинномозкової анестезії або люмбальної пункції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до беміпарину натрію, гепарину або до речовин свинячого походження; наявність в анамнезі підтвердженої імунологічно зумовленої гепариніндукованої тромбоцитопенії (ГІТ) чи підозра на неї; активні кровотечі або підвищений ризик кровотеч, зумовлений порушенням згортання крові; тяжкі порушення ф-ції печінки і підшлункової залози; ушкодження або оперативні втручання у ділянці ЦНС, органів зору або органів слуху протягом останніх 2-х місяців; с-м дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові (ДВЗ), що супроводжує гепариніндуковану тромбоцитопенію; г. бактеріальний ендокардит та підгострий бактеріальний ендокардит; будь-які органічні порушення з високим ризиком кровотеч (активна пептична виразка, геморагічний інсульт, церебральна аневризма або неоплазія).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 2,5 тис ОД.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЦИБОР	РОВІ КОНТРАКТ МЕНЮФЕКЧЕРІНГ, С.Л. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій), Іспанія	р-н д/ін'єк. по 0,2мл, у шпр. в бл.	25000МО анти-Ха/мл	№2x5, №2x50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦИБОР	РОВІ КОНТРАКТ МЕНЮФЕКЧЕРІНГ, С.Л. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій), Іспанія	р-н д/ін'єк. по 0,4мл у шпр. в бл.	25000МО анти-Ха/мл	№2x1	51,07	31,43/€
	ЦИБОР	РОВІ КОНТРАКТ МЕНЮФЕКЧЕРІНГ, С.Л. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій), Іспанія	р-н д/ін'єк. по 0,3мл у шпр. в бл.	25000МО анти-Ха/мл	№2x1	57,62	31,43/€
	ЦИБОР 2500	РОВІ КОНТРАКТ МЕНЮФЕКЧЕРІНГ, С.Л. (виробництво лікарського засобу "in bulk", кінцеве пакування, контроль та випуск серій), Іспанія	р-н д/ін'єк. по 0,2мл у шпр. в бл.	12500МО анти-Ха/мл	№2x1, №2x50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦИБОР 2500	РОВІ КОНТРАКТ МЕНЮФЕКЧЕРІНГ, С.Л. (виробництво лікарського засобу "in bulk", кінцеве пакування, контроль та випуск серій), Іспанія	р-н д/ін'єк. по 0,2мл у шпр. в бл.	12500МО анти-Ха/мл	№2x5	80,20	32,08/€
	ЦИБОР 3500	РОВІ КОНТРАКТ МЕНЮФЕКЧЕРІНГ, С.Л. (виробництво лікарського засобу "in bulk", кінцеве пакування, контроль та випуск серій), Іспанія	р-н д/ін'єк. по 0,2мл у шпр. в бл.	17500МО анти-Ха/мл	№2x1, №2x50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦИБОР 3500	РОВІ КОНТРАКТ МЕНЮФЕКЧЕРІНГ, С.Л. (виробництво лікарського засобу "in bulk", кінцеве пакування, контроль та випуск серій), Іспанія	р-н д/ін'єк. по 0,2мл у шпр. в бл.	17500МО анти-Ха/мл	№2x5	82,49	32,08/€

13.8.1.4. Похідні синтетичних пентасахаридів

- **Фондапаринукс (Fondaparinux) ****

Фармакотерапевтична група: V01AX05 - антитромботичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: антитромботична активність його є результатом селективного пригнічення фактора Ха, опосередкованого антитромбіном III (AT III); вибірково зв'язуючись з AT III, потенціює (приблизно в 300 разів) початкову нейтралізацію фактора Ха антитромбіном III; нейтралізація фактора Ха перериває ланцюг коагуляції та інгібує як створення тромбіну, так і формування тромбів; не інактивує тромбін (активований фактор IIa) та не діє на тромбоцити.

Показання для застосування ЛЗ: лікування г.тромбозу глибоких вен, лікування г.тромбоемболії легеневої артерії, крім як у гемодинамічно нестабільних пацієнтів або пацієнтів, яким необхідний тромболіз або легенева емболектомія^{БНФ}, профілактика венозних тромбоемболій після великих ортопедичних операцій на нижніх кінцівках, у т. ч. при переломі стегна (включаючи подовжену профілактику), та операціях ендопротезування кульшового та колінного суглобів, профілактика венозних тромбоемболій у пацієнтів після операцій на органах черевної порожнини, які мають високий ризик тромбоемболічних ускладнень^{БНФ}; профілактика венозних тромбоемболій у пацієнтів з високим ризиком виникнення таких ускладнень у зв'язку з тривалим обмеженням рухливості у період г. фази захворювання^{БНФ}; лікування нестабільної стенокардії або ІМ без підйому сегмента ST^{БНФ}, яким не показано невідкладне (< 120 хв) інвазивне втручання (ЧКВ), лікування ІМ з підйомом сегмента ST у пацієнтів^{БНФ}, які лікуються тромболітиками, або у тих, хто первинно не отримував інших форм реперфузійної терапії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: п/ш або в/в ін'єкції^{БНФ}; г. тромбоз глибоких вен та г. тромбоемболія легеневої артерії: п/ш для пацієнтів з масою тіла < 50 кг - 5 мг, для пацієнтів з масою тіла 50 - 100 кг - 7,5 мг, для пацієнтів з масою тіла понад 100 кг - 10мг, ін'єкцію вводити 1 р/добу, тривалість лікування має становити не < 5 днів^{БНФ}, припиняти його можна не раніше, ніж буде можливим переведення на адекватну терапію r/os антикоагулянтами. Профілактика венозних тромбоемболій: обширні ортопедичні та абдомінальні втручання - рекомендована доза для дорослих 2,5 мг 1 р/добу після операції у формі п/ш ін'єкції^{БНФ}. Початкову дозу вводити не раніше ніж ч/з 6 год після завершення операції за умови досягнення гемостазу^{БНФ}. Лікування проводити до зниження ризику розвитку тромбоемболії, зазвичай до переведення хворого на амбулаторне лікування, не менше 5-9 діб після операції. Хворі з високим ризиком виникнення тромбоемболічних ускладнень за результатами індивідуальної оцінки ризику - рекомендована доза 2,5 мг 1 р/добу у вигляді п/ш ін'єкції^{БНФ}, тривалість лікування - від 6 до 14

дiб. Нестабiльна стенокардiя/IM без пiдйому сегмента ST - рекомендована доза 2,5 мг 1 р/добу у виглядi п/ш iн'екцiї, тривалiсть лiкування - щонайбiльше 8 дiб або до виписки пацiєнта iз лiкарнi, якщо це вiдбудеться ранiше ^{БНФ}. IMз пiдйомом сегмента ST - рекомендована доза 2,5 мг 1 р/добу у виглядi п/ш iн'екцiї, першу дозу вводять в/в, наступнi дози п/ш ^{БНФ}, лiкування розпочинати якнайшвидше пiсля встановлення дiагнозу i продовжувати щонайбiльше 8 дiб або до виписки iз лiкарнi ^{БНФ}.

Побiчна дiя та ускладнення при застосуваннi ЛЗ: пiсляоперацiйнi рановi iнфекцiї, пiсляоперацiйна кровотеча, анемiя, носова кровотеча, ШК кровотеча, кровохаркання, гематурiя, гематома, тромбоцитопенiя, пурпура, тромбоцитемiя, поява аномальних тромбоцитiв, порушення коагуляцiї, AP, повiдомлення про ангiоневротичний набряк, анафiлактоїдну/анафiлактичну р-цiю;гiпокалiємiя, тривога, сонливість, вертиго, запаморочення, головний бiль, сплутанiсть свiдомостi, артерiальна гiпотензiя, задишка, кашель, нудота, блювання, абдомiнальний бiль, диспепсiя, гастрит, запор, дiарея, збiльшення рiвня печiнкових ферментiв, порушення функцiональних печiнкових тестiв, поодинокi: збiльшення рiвня бiлiрубiну у сироватцi кровi, висипання, свербiж, набряк, периферичний набряк, гарячка, видiлення з рани, бiль у грудях, пiдвищена втомлюванiсть, гiперемiя, бiль у ногах, набряк генiталiй, вiдчуття припливiв, втрата свiдомостi

Протипоказання до застосування ЛЗ: встановлена алергiя до дiючої речовини або будь-якої з допомiжних речовин препарату; iнтенсивна клiнiчно значима кровотеча; г. бактерiальний ендокардит; тяжка HH (КлКр < 30 мл/хв).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 2,5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кiлькiсть в упаковцi	Цiна DDD, грн.	Офiцiйний курс обмiну, у.о.
I.	ФРЕЛСi®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/iн'ек. по 0,5мл у шпр.	12,5 мг/мл	№2x1	вiдсутня у реестрi ОБЦ	
	ФРЕЛСi®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/и'ек. по 0,5мл у шпр.	12,5 мг/мл	№2x5	150,00	
II.	АРИКСТРА®	Аспен Нотер Дам де Бондевiль, Францiя	р-н д/и'ек. по 0,5мл у шпр.	2,5мг/0,5мл	№10	153,00	26,50/\$
	АРИКСТРА®	Аспен Нотер Дам де Бондевiль, Францiя	р-н д/и'ек. по 0,4мл, 0,8мл у шпр.	12,5 мг/мл	№10	вiдсутня у реестрi ОБЦ	
	АРИКСТРА®	Аспен Нотер Дам де Бондевiль, Францiя	р-н д/и'ек. по 0,6мл, у шпр.	12,5 мг/мл	№10	105,00	26,50/\$

13.8.1.5. Iншi антитромботичнi засоби

- **Ривароксабан (Rivaroxaban)** ^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: B01AF01 - антитромботичнi засоби.

Показання для застосування ЛЗ: профiлактика венозної тромбоемболiї (ВТЕ) у дорослих пацiєнтiв, яким проводять оперативнi втручання з ендопротезування кульшового чи колiнного суглобiв ^{БНФ}

Спосiб застосування та дози ЛЗ: для профiлактики венозної тромбоемболiї у дорослих пацiєнтiв, яким проводять оперативнi втручання з ендопротезування кульшового чи колiнного суглобiв: рекомендована доза 10 мг 1 р/добу, незалежно вiд прийому їжi, першу дозу слiд приймати ч/з 6 - 10 год. пiсля операцiї ^{БНФ}, за умови ефективного гемостазу; тривалiсть лiкування визначається iндивiдуально; пiсля втручання з приводу заміни кульшового суглоба рекомендована тривалiсть лiкування 5 тижн.; пiсля заміни колiнного суглоба - 2 тижн.; у випадку пропуску прийому табл. пацiєнтiвi прийняти табл. негайно, i наступного дня продовжити лiкування по 10 мг/добу, як до пропуску прийому табл.; при застосуваннi для профiлактики ВТЕ у дорослих пацiєнтiв, яким проводять оперативнi втручання з ендопротезування кульшового чи колiнного суглобiв МДД 10 мг.

13.8.2. Антиагреганти

- **Клопiдогрель (Clopidogrel)** ^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: B01AC04 - антитромботичнi засоби. Iнгiбитори агрегацiї тромбоцитiв, крiм гепарину

Основна фармакотерапевтична дiя: антитромботична, антиагрегантна; селективно пригнiчує зв'язування аденозиндифосфату (АДФ) з рецептором на поверхнi тромбоцита та подальшу активацiю комплексу GPIIb/IIIa пiд дiєю АДФ i таким чином пригнiчує агрегацiю тромбоцитiв; пригнiчує агрегацiю тромбоцитiв, iндувану iншими агонiстами, шляхом блокування пiдвищення активностi тромбоцитiв вивiльненням АДФ; необоротно модифiкує АДФ-рецептори тромбоцитiв, отже, тромбоцити, що увiйшли у взаємодiю з клопiдогрелем, змiнюються до кiнця їх життєвого циклу; нормальна ф-цiя тромбоцитiв вiдновлюється зi швидкiстю, що вiдповiдає швидкостi оновлення тромбоцитiв.

Показання для застосування ЛЗ: вторинна профiлактика проявiв атеротромбозу у дорослих: у хворих, якi перенесли IM (початок лiкування - ч/з кiлька днiв, але не пiзнiше нiж ч/з 35 днiв пiсля виникнення) ^{БНФ}, iшемiчний iнсульт ^{БНФ, ГМД} (початок лiкування - ч/з 7 днiв, але не пiзнiше нiж ч/з 6 мiс. пiсля виникнення) ^{БНФ}, або у яких дiагностовано захворювання периферичних артерiй ^{БНФ} (ураження артерiй i атеротромбоз судин нижнiх кiнцiвок); у хворих iз г. коронарним с-мом: iз г. коронарним с-мом без пiдйому сегмента ST ^{БНФ} (нестабiльна стенокардiя або IM без зубця Q), у т.ч. у пацiєнтiв, яким було встановлено стент у ходi проведення черезшкiрної коронарної англiопластики, у комбiнацiї з ацетилсалiциловою к-тою (АСК ^{БНФ}); iз г. IM з пiдйомом сегмента ST ^{БНФ, ГМД} у

комбінації з АСК^{БНФ} (у хворих, які отримують стандартне медикаментозне лікування та яким показана тромболітична терапія); профілактика атеротромботичних та тромбоемболічних подій при фібриляції передсердь: у комбінації з АСК показаний дорослим пацієнтам з фібриляцією передсердь^{БНФ}, які мають щонайменше один фактор ризику виникнення судинних подій, у яких існують протипоказання до лікування антагоністами вітаміну К (АВК)^{БНФ} і які мають низький ризик виникнення кровотеч, для профілактики атеротромботичних та тромбоемболічних подій, у т.ч. інсульту^{ТМД}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі та хворі літнього віку: по 75 мг 1 р/добу^{БНФ}, незалежно від прийому їжі; у хворих із г. коронарним с-мом без підйому сегмента ST (нестабільна стенокардія або ІМ без зубця Q на ЕКГ) розпочинати з одноразової навантажувальної дози 300 мг, потім продовжувати дозою 75 мг 1 р/добу (з АСК^{БНФ} у дозі 75-325 мг/добу); оскільки застосування більш високих доз АСК підвищує ризик кровотечі, рекомендується не перевищувати дозу АСК 100 мг; оптимальна тривалість лікування формально не встановлена; результати клінічних досліджень свідчать на користь застосування препарату до 12 міс., а максимальний ефект спостерігався ч/з 3 місяці лікування; хворим із г. ІМ з підйомом сегмента ST призначати по 75 мг 1 р/добу, починаючи з одноразової навантажувальної дози 300 мг у комбінації з АСК^{БНФ}, з застосуванням тромболітичних препаратів або без них; лікування хворих віком від 75 років починати без навантажувальної дози клопідогрелю^{БНФ}; комбіновану терапію розпочинати якомога раніше після появи симптомів і продовжувати принаймні 4 тижні; пацієнтам з фібриляцією передсердь застосовувати в однократній добовій дозі 75 мг^{БНФ}; разом із клопідогрелем розпочати та продовжувати застосування АСК (у дозі 75-100 мг/добу); у випадку пропуску дози: якщо з моменту, коли потрібно було приймати чергову дозу, минуло менше 12 год.: пацієнт має негайно прийняти пропущену дозу, а наступну дозу вже приймати у звичний час; якщо минуло більше 12 год., пацієнт має приймати наступну чергову дозу у звичний час та не подвоювати дозу з метою компенсування пропущеної дози.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кровотеча, тромбоцитопенія, лейкоцитопенія, еозинофілія, нейтропенія, включаючи тяжку нейтропенію, тромботична тромбоцитопенічна пурпура (ТТП), апластична анемія, панцитопенія, агранулоцитоз, тяжка тромбоцитопенія, набута гемофілія А, гранулоцитопенія, анемія, сироваткова хвороба, анафілактоїдні р-ції, перехрестна гіперчутливість поміж тієнопіридинів (таких як тиклопідин, прасугрель), галюцинації, сплутаність свідомості, внутрішньочерепні кровотечі (у деяких випадках - з летальним наслідком), головний біль, парестезія, запаморочення, зміна смакового сприйняття, кровотеча в ділянку ока (кон'юнктивальна, окулярна, ретинальна), запаморочення, гематома, тяжкий крововилив, кровотеча з операційної рани, васкуліт, АГ, носова кровотеча, кровотечі респіраторного шляху (кровохаркання, легеневі кровотечі), бронхоспазм, інтерстиціальний пневмоніт, еозинофільна пневмонія, шлунково-кишкові кровотечі, діарея, абдомінальний біль, диспепсія, виразка шлунка та ДПК, гастрит, блювання, нудота, запор, метеоризм, ретроперитонеальний крововилив, шлунково-кишкові та ретроперитонеальні кровотечі з летальним наслідком, панкреатит, коліт (зокрема виразковий або лімфоцитарний), стоматит, г. ПН, гепатит, аномальні результати показників ф-ції печінки, підшкірний крововилив, висипання, свербіж, внутрішньошкірні крововиливи (пурпура), бульозний дерматит (токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівена-Джонсона, мультиформна еритема), ангіоневротичний набряк, еритематозне висипання, кропив'янка, медикаментозний с-м гіперчутливості, медикаментозний висип з еозинофілією та системними проявами (DRESS-с-м), екзема, плесканий лишай, кістково-м'язові крововиливи (гемартроз), артрит, артралгія, міалгія, кровотечі у місці ін'єкції, гарячка, подовження часу кровотечі, зниження кількості нейтрофілів і тромбоцитів.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого компонента; г. кровотеча (при пептичній виразці або внутрішньочерепному крововиливі); тяжка ПН.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 75 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	АТЕРОКАРД	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АТЕРОКАРД	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x3	1,18	
	АТЕРОКАРД	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x7	1,18	
	АТЕРОКАРД	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x1	1,48	
	АТРОГРЕЛ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" виробництво із продукції in bulk препарату ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна), Україна	табл., в/о у бл.	75мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АТРОГРЕЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

АТРОГРЕЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x6	1,36	
АТРОГРЕЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x3	1,75	
КЛОПІДОГРЕЛЬ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk, випуск серії)/ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (виробництво продукції in bulk), Україна/Україна	табл., в/о у бл.	75мг	№10x1,№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КЛОПІДОГРЕЛЬ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю"ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою в, Україна/Україна/Україна	табл., в/о у бл.	75мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КЛОПІДОГРЕЛЬ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю"ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою в, Україна/Україна/Україна	табл., в/о у бл.	75мг	№10x3	5,39	
КЛОПІДОГРЕЛЬ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю"ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою в, Україна/Україна/Україна	табл., в/о у бл.	75мг	№10x1	6,21	
КЛОПІДОГРЕЛЬ-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	табл., в/о у бл.	75мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КЛОПІДОГРЕЛЬ-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	табл., в/о у бл.	75мг	№10x3	6,05	
ПЛАТОГРІЛ®	ТОВ "Кусум Фарм", Україна	табл., в/о у бл.	75мг	№14x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПЛАТОГРІЛ®	ТОВ "Кусум Фарм", Україна	табл., в/о у бл.	75мг	№14x6	1,19	
ПЛАТОГРІЛ®	ТОВ "Кусум Фарм", Україна	табл., в/о у бл.	75мг	№14x2	1,93	
ТРОМБОНЕТ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x8	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ТРОМБОНЕТ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x6	1,67	
ТРОМБОНЕТ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x3	6,00	

			у бл.				
	ТРОМБОНЕТ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x1	7,50	
	ТРОМБОНЕТ®-ФАРМАК	ПАТ "Фармак", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x1, №10x8	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТРОМБОНЕТ®-ФАРМАК	ПАТ "Фармак", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x6	3,33	
	ТРОМБОНЕТ®-ФАРМАК	ПАТ "Фармак", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x3	6,00	
II.	АГРЕЛЬ 75 МГ	Асіно Фарма АГ (виробництво нерозфасованої продукції, пакування, контроль якості та випуск серії), Швейцарія	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№14x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АГРЕЛЬ 75 МГ	Асіно Фарма АГ (виробництво нерозфасованої продукції, пакування, контроль якості та випуск серії), Швейцарія	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№14x2	2,99	31,63/€
	ЗИЛТ®	КРКА-ФАРМА д.о.о. (відповідальний за виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії)/КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій, відповідальний за контроль серій)/Юні, Хорватія/Словенія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№7x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛОДІЯ	ФАРМАТЕН С.А. (виробництво, первинне, та вторинне пакування)/ФАРМАТЕН ІНТЕРНЕСНЛ СА (виробництво, первинне, та вторинне пакування, випуск серії), Греція/Греція	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x9	1,19	27,04/€
	КЛОДІЯ	ФАРМАТЕН С.А. (виробництво, первинне, та вторинне пакування)/ФАРМАТЕН ІНТЕРНЕСНЛ СА (виробництво, первинне, та вторинне пакування, випуск серії), Греція/Греція	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x10	1,39	26,75/€
	КЛОДІЯ	ФАРМАТЕН С.А. (виробництво, первинне, та вторинне пакування)/ФАРМАТЕН ІНТЕРНЕСНЛ СА (виробництво, первинне, та вторинне пакування, випуск серії), Греція/Греція	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x3	1,61	27,04/€
	КЛОПІДАЛ®	АЛКАЛОЇД АД Скоп'є, Республіка Північна Македонія	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛОПІДОГРЕЛ-РІХТЕР	Гедеон Ріхтер Румунія А.Т. (виробництво за повним циклом)/ВАТ "Гедеон Ріхтер" (випуск серії), Румунія/Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№14x1, №14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛОПІДОГРЕЛ-ТЕВА	Актавіс ЛТД, Мальта	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x3, №10x9, №7x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛОПІДОГРЕЛ-ТЕВА	Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд., Ізраїль	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x3, №10x9	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛОПІДОГРЕЛЬ	Актавіс Лтд, Мальта	табл., вкриті п/о	75мг	№10x3	відсутня у	

АЙКОР®		у бл.				реєстрі ОБЦ	
КЛОПІДОГРЕЛЬ-САНОФІ	Санофі Вінтроп Індастрія, Франція	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№14, №30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ		
МЕДОГРЕЛЬ	Актавіс ЛТД/Медокемі ЛТД (Центральний Завод) (виробництво нерозфасованого продукту, контроль якості, дозвіл на випуск серії)/Медокемі ЛТД (Завод AZ) (первинне та вторинне пакування), Мальта/Кіпр/Кіпр	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ОНЕКЛАПЗ	Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт III), Індія	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x3	1,41	26,95/\$	
ПЛАВІКС®	САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА, Франція	табл., в/о у бл.	75мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ПЛАВІКС®	САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА, Франція	табл., вкриті п/о у бл.	300мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ПЛАГРИЛ®	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ПЛАЗЕП	МСН Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x3	1,93	25,52/\$	
ФЛАМОГРЕЛЬ 75	Фламінго Фармасьютикалс Лтд./Артура Фармасьютикалз Пвт. Лтд., Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ФЛАМОГРЕЛЬ 75	Фламінго Фармасьютикалс Лтд./Артура Фармасьютикалз Пвт. Лтд., Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x3	1,14	28,14/\$	
ФЛАМОГРЕЛЬ 75	Фламінго Фармасьютикалс Лтд./Артура Фармасьютикалз Пвт. Лтд., Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	75мг	№10x10	1,49	26,17/\$	

• **Тиклопідин (Ticlopidine)**

Фармакотерапевтична група: В01АС05 - антитромботичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: пригнічує агрегацію та адгезію тромбоцитів і вивільнення тромбоцитарних факторів, подовжує час кровотечі, зменшує ретракцію кров'яного згустку, знижує рівень фібриногену та в'язкість крові, збільшує фільтраційну здатність цільної крові та еритроцитів; завдяки цим ефектам зменшує ризик розвитку артеріальних тромбозів, головним чином при порушеннях мозкового кровообігу та судинних захворюваннях нижніх кінцівок; не впливає на згортання крові та фібриноліз; блокує агрегацію тромбоцитів шляхом пригнічення АДФ-залежного зв'язування фібриногену з глікопротеїнами ІІв/ІІІа, специфічними рецепторами мембран тромбоцитів, не впливає на ф-цію тромбоцитів, опосередковану циклооксигеназою та АМФ.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика цереброваскулярних та СС г. ішемічних ускладнень у пацієнтів з порушеннями мозкового та периферичного артеріального кровообігу; запобігання та корекція порушень ф-ції тромбоцитів, спричинених штучним кровообігом під час хірургічних втручань та тривалого ГД; запобігання підгострій оклюзії коронарного стента після його імплантації; застосування при вищевказаних показаннях рекомендується насамперед пацієнтам з гіперчутливістю до ацетилсаліцилової к-ти або у разі неефективності лікування нею.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймати під час їди; звичайна доза для дорослих 250 мг 2 р/добу; з метою запобігання підгострій оклюзії після імплантації коронарного стента лікування рекомендується розпочинати безпосередньо перед або відразу після імплантації стента з прийому 250 мг 2 р/добу у комбінації з 100-325 мг ацетилсаліцилової к-ти на добу; комбіноване лікування повинно тривати щонайменше 1 міс.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нейтропенія, включаючи тяжку нейтропенію, агранулоцитоз, аплазія кісткового мозку, панцитопенія, тромбоцитопенія, тромботична тромбоцитопенічна пурпура (ТТП, с-м Мошковича), гемолітична анемія асоційована з тромбоцитопенією; сепсис, внаслідок розвитку тяжкої нейтропенії; септичний шок, що може мати фатальні наслідки; гіпонатріємія, імунологічні р-ції різних типів, у тому числі АР, анафілактичні р-ції, набряк Квінке, артралгія, васкуліт, вовчакоподібний с-м, нефропатія, алергічний інтерстиціальний пневмоніт, еозинофілія, сонливість, запаморочення, головний біль, біль з іншою локалізацією, слабкість; шум у вухах, нервозність, зниження к-ції уваги, периферична нейропатія, пальпітація, тахікардія, гіперемія, гематоми, кровотечі, носові кровотечі, пері- та постопераційні кровотечі; синці, гематурія; крововиливи під кон'юнктиву; внутрішньомозкові крововиливи, коліти (у т. ч. лімфоцитарний коліт), що супроводжуються тяжкою діареєю, нудота та діарея, зниження апетиту, пептична виразка, гепатити (гемолітична та/або холестатична жовтяниця), підвищення рівня печінкових ферментів (підвищення активності ізольованої або неізольованої лужної фосфатази і трансаміназ в сироватці крові у два рази від норми), незначне підвищення рівня білірубину в сироватці крові, шкірні висипання (макулопапульозні висипання або кропив'янка, що часто супроводжуються свербежем), мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, с-м Лайелла, лихоманка, підвищення рівня холестерол-ЛПВЩ, холестерол-ЛПНЩ, холестерол-ЛПДНЩ та тригліцеридів у сироватці крові, пропасниця, фарингіт, біль у горлі, виразки на слизовій оболонці ротової порожнини, нефротичний с-м, артропатія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до тиклопідину або до інших інгредієнтів; геморагічний діатез; органічні ураження, пов'язані зі схильністю до кровотеч, наприклад загострення виразкової хвороби шлунка та ДПК, г. фаза геморагічного інсульту; захворювання крові, що супроводжуються подовженням часу кровотечі; тяжка ПН; лейкопенія, тромбоцитопенія, агранулоцитоз в анамнезі; нейтропенія (к-ть нейтрофілних гранулоцитів <1500/мм³) або тромбоцитопенія (к-ть тромбоцитів <100000/мм³); за жодних обставин препарат не повинен застосовуватись для первинної профілактики тромбоемболії у здорових осіб.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ІПАТОН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл., в/о у бл.	250мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Дипіридамо́л (Dipyridamole)**

Фармакотерапевтична група: В01AC07 - антитромботичні засоби. Антиагреганти.

Основна фармакотерапевтична дія: антиагрегаційна, антитромботична; гальмує агрегацію тромбоцитів та покращує мікроциркуляцію, а також має м'яку судинорозширювальну дію.

Показання для застосування ЛЗ: р-н: для профілактики післяопераційних тромбозів, порушення мозкового кровообігу; табл.: лікування і профілактика порушень мозкового кровообігу за ішемічним типом^{БНФ}; дисциркуляторна енцефалопатія; профілактика артеріальних та венозних тромбозів, а також їх ускладнень; профілактика тромбоемболії після операції протезування клапанів серця^{БНФ}; профілактика плацентарної недостатності при ускладненій вагітності; у складі комплексної терапії при порушеннях мікроциркуляції.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим та дітям від 12 років; р-н в/м та в/в повільно, по 1-2 мл/добу 0,5 % р-ну, тривалість лікування визначається індивідуально; табл. приймати натще, не розкушувати та не розламувати, запиваючи рідиною, 75-225 мг/добу, розподілені на кілька прийомів; при тяжких захворюваннях дозу можна підвищити до 600 мг/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: відчуття серцебиття, брадикардія, аритмії, артеріальна гіпотензія, відчуття жару та тахікардія, особливо в осіб, які застосовують вазодилататори, загострення ІХС, (стенокардія та аритмія), с-м коронарного обкрадання, зниження АТ при швидкому в/в введенні, нудота, блювання, діарея, епігастральний біль, диспепсія, тромбоцитопенія, зміни функціональних властивостей тромбоцитів, кровотеча; підвищення схильності до кровотеч під час або після хірургічних втручань, головний біль, слабкість, запаморочення судинного ґенезу, втрата свідомості, тремор, АР, включаючи короточасні шкірні висипання, кропив'янку, можливі виражений бронхоспазм та набряк Квінке, біль у м'язах, артрит, міалгія, були повідомлення про те, що дипіридамо́л входить до складу каменів жовчного міхура, загальна слабкість, відчуття закладеності вуха, шум у голові, гіперемія шкіри обличчя, риніт, зміни у місці введення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до компонентів препарату, розповсюджений стенозуючий атеросклероз коронарних артерій, г. ІМ, декомпенсована СН, аритмії, артеріальна гіпотензія (колапс), тяжкі порушення серцевого ритму; нестабільна стенокардія, субаортальний стеноз, НН, БА, обструктивні захворювання легень, виражена ПН, геморагічні діатези, захворювання зі схильністю до кровотеч (виразкова хвороба шлунка та ДПК).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,4 г., парентерально - 0,2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДИПІРИДАМОЛ	АТ "Лубнифарм", Україна	р-н д/ін'ек. по 2мл в амп. у бл. та пач.	5мг/мл	№5x1, №5x2, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДИПІРИДАМОЛ	АТ "Лубнифарм", Україна	р-н д/ін'ек. по 2мл в амп. у бл. та пач.	5мг/мл	№5	72,00	
	ДИПІРИДАМОЛ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	р-н д/ін'ек. по 2мл в амп. у бл.	5мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДИПІРИДАМОЛ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії	р-н д/ін'ек. по 2мл в амп. у бл.	5мг/мл	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна					
ДИПІРИДАМОЛ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	табл., в/о у бан., конт. табл. в пач. та без	25мг	№40		відсутня у реєстрі ОВЦ
ДИПІРИДАМОЛ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	табл., в/о у бан., конт. табл. в пач. та без	25мг	№50	8,64	
ДИПІРИДАМОЛ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	табл., в/о у бан., конт. табл.	75мг	№40	9,78	
ДИПІРИДАМОЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"/Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофарм", Україна/Україна	табл. у бл.	25мг	№20x2	8,64	

• **Ептіфібамід (Eptifibatide)**

Фармакотерапевтична група: B01AC16 - антитромботичні засоби. Антиагреганти, блокатори глікопротеїнових IIb/IIIa рецепторів тромбоцитів.

Основна фармакотерапевтична дія: антиагрегант; є інгібітором агрегації тромбоцитів, що належить до класу RGD (аргінін-гліцин-аспартат)-міметиків; оборотно та дозозалежно пригнічує агрегацію тромбоцитів, запобігаючи взаємодії фібриногену, фактора фон Віллібрандта та інших лігандів із глікопротеїновими IIb/IIIa рецепторами; не чинить явного впливу на протромбіновий час або активований частковий тромбoplastиновий час (АЧТЧ).

Показання для застосування ЛЗ: рання профілактика ІМ у пацієнтів з нестабільною стенокардією або ІМ без зубця Q, які мали останній больовий напад протягом 24 год.^{БНФ} зі змінами на ЕКГ та/або підвищенням активності кардіоспецифічних ферментів; лікування пацієнтів з високим ризиком розвитку ІМ протягом 3-4 днів після появи симптомів г. стенокардії, включаючи тих, яким планується проведення черезшкірної транслюмінальної коронарної ангіопластики (ЧТКА); призначений для застосування з ацетилсаліциловою к-тою та нефракціонованим гепарином.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для в/в струминного (болюсного) та для в/в крап. (інфузійного) введення^{БНФ}; дорослі пацієнти з нестабільною стенокардією або ІМ без зубця Q: одразу після встановлення діагнозу в/в струминно вводять 180 мкг/кг, а потім розпочинають крап. введення 2 мкг/кг/хв^{БНФ} (при рівні КлКр ≥ 50 мл/хв) або 1 мкг/кг/хв (при рівні КлКр $\geq 30 < 50$ мл/хв), котре продовжують до 72 год аж до початку проведення операції з аортокоронарного шунтування^{БНФ} або до виписки зі стаціонару, якщо вона відбувається раніше; якщо при цьому хворому починають проводити черезшкірну транслюмінальну коронарну ангіопластику (ЧТКА) за невідкладними показаннями, інфузію продовжують ще протягом 18-24 год після втручання (максимальна загальна тривалість терапії - 96 год); хворим із масою тіла понад 121 кг вводять не більше 22,6 мг у вигляді болюсу і не більше 15 мг/год (при рівні КлКр ≥ 50 мл/хв) або 7,5 мг/год (при рівні КлКр $\geq 30 < 50$ мл/хв) у вигляді інфузії; ЧТКА: безпосередньо перед початком маніпуляції в/в у вигляді болюсу вводять 180 мкг/кг, потім - безперервна інфузія 2 мкг/кг/хв (при КлКр ≥ 50 мл/хв) або 1 мкг/кг/хв (при КлКр $\geq 30 < 50$ мл/хв); ч/з 10 хв після першого болюсу - повторно болюс 180 мкг/кг, інфузію продовжують 18-24 год або до виписки хворого зі стаціонару, якщо вона відбувається раніше; мінімальна тривалість введення - 12 год; хворим із масою тіла понад 121 кг - не > 22,6 мг у вигляді болюсу і не більше 15 мг/год (при рівні КлКр ≥ 50 мл/хв) або 7,5 мг/год (при рівні КлКр $\geq 30 < 50$ мл/хв) у вигляді інфузії.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: масивні кровотечі (внутрішньочерепні кровотечі, або клінічно значущі локальні кровотечі, асоційовані зі зниженням рівня гематокриту $\geq 15\%$ або $Hb \geq 5$ г/дл) чи малі кровотечі (кровотечі зі статевих органів, кровотечі з місця пункції стегнової артерії, ротоглоткові та шлунковокишкові кровотечі, макрогематурія чи гематомезис, або спостережувана втрата крові, асоційована зі зниженням рівня гематокриту $\geq 10\%$ або $Hb \geq 3$ г/дл); летальні кровотечі (у більшості випадків пов'язані з порушеннями центральної або периферичної нервової системи - церебральні або внутрішньочерепні крововиливи), легеневі кровотечі, гостра тяжка тромбоцитопенія, гематома.фібриляція передсердь, артеріальна гіпотензія, СН, зупинка серця, шок, тахікардія чи фібриляція шлуночків серця; фатальні кровотечі, легеневі кровотечі, г. тяжка тромбоцитопенія, гематома, анемія; АР, висипи, р-ції у місці введення, такі як кропив'янка, анафілактичні р-ції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого компонента; ШКК, серйозні генітальні та урологічні кровотечі або ін. виражені патологічні кровотечі протягом попередніх до лікування 30 днів; г. порушення мозкового кровообігу протягом попередніх до лікування 30 днів або геморагічний інсульт в анамнезі; внутрішньочерепні захворювання в анамнезі (новоутворення, артеріовенозні вади розвитку, аневризми); велике оперативне втручання або тяжка травма у період 6 тижн. напередодні; геморагічний діатез в анамнезі; тромбоцитопенія (< 100000 кл/мм³); протромбінний час в 1,2 р. більше контрольного або показник INR ≥ 2 ; виражена АГ(систолический тиск >200 мм рт. ст. або діастолічний тиск >110 мм рт. ст.) на тлі антигіпертензивної терапії; клінічно виражене порушення ф-ції печінки; тяжка НН (КлКр < 30 мл/хв) або необхідність проведення пацієнту ниркового діалізу; одночасне або заплановане парентеральне застосування іншого блокатора глікопротеїнових IIb/IIIa рецепторів для парентерального введення.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0.2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ІНТЕГРИЛІН	Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Велика Британія	р-н д/інфуз. по 100мл у фл.	0,75мг/мл	№1	3396,54	26,69/\$
	ІНТЕГРИЛІН	Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Велика Британія	р-н д/ін'єкц. по 10мл у фл.	2мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

13.8.3. Фібринолітики

- **Стрептокіназа (Streptokinase) ***

Фармакотерапевтична група: B01AD01 - антитромбінні засоби. Ферменти.

Основна фармакотерапевтична дія: проявляє фібринолітичну активність; препарат стрептокінази, отриманої з фільтрату культури β -гемолітичних стрептококів, яка сприяє перетворенню плазміногену у плазмін, що руйнує згустки фібрину та призводить до деградації фібриногену та інших білків плазми крові; після в/в або в/артеріального введення та нейтралізації індивідуального титру антитіл до стрептокінази вона починає системно або місцево активувати фібринолітичні процеси; фібринолітичний ефект досягає максимуму ч/з 45 хв і зберігається протягом кількох год., а тромбінний час залишається пролонгованим ще протягом 24 год внаслідок одночасного зниження рівня фібриногену і збільшення кількості циркулюючих продуктів деградації фібрину та фібриногену.

Показання для застосування ЛЗ: г. коронарний синдром зі стійким підйомом сегмента ST чи нещодавньою блокадою лівої ніжки передсердно-шлуночкового пучка, г. ІМ^{ВООЗ, БНФ} із зубцем Q - не пізніше ніж ч/з 12 год. від початку захворювання (при застосуванні препарату після закінчення вищезазначеного періоду результат терапії не можна передбачити); масивні тромбози глибоких вен^{ВООЗ, БНФ} з ризиком виникнення гангрен; тромбоемболія легеневої артерії^{ВООЗ, БНФ}; г. підгострі та хр. тромбози периферичних артерій^{ВООЗ, БНФ} із загрозою ішемії; тромбоз центральної артерії або центральної вени сітківки^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять в/в або в/артеріально після розчинення вмісту фл. у стерильному р-ні натрію хлориду 9 % або 5 % р-ні глюкози; г.ІМ - шляхом короткотермінового лізису 1500000 МО у 100 мл розчинника вводять 60 хв^{БНФ, ВООЗ}; дорослим з оклюзіями периферичних венозних і артеріальних судин - короткотерміновий тромболізис, початкова доза 250000 МО в 100-300 мл розчинника протягом 30 хв^{ВООЗ, БНФ}, після цього - підтримуючу дозу 1200000 МО в 500 мл розчинника кожну годину протягом 6 год. 6-годинну інфузію можна повторити наступної доби залежно від терапевтичного ефекту; тривалий лізис при лікуванні периферичних оклюзій: початкову дозу 250000 МО вводять протягом 30 хв, після чого призначають підтримуючу дозу 100000 МО кожну годину^{БНФ, ВООЗ}, тривалість терапії залежить від поширеності та локалізації оклюзії судини, максимальна тривалість курсу лікування - 5 діб. При тромбозах центральних судин сітківки лізис артеріальних оклюзій повинен тривати не > 24 год., венозних - не > 72 год.^{БНФ} Локальний тромболізис: г.ІМ - в/коронарне болюсне введення у середньому 20000 МО і підтримуючу терапію в дозі від 2000 до 4000 МО/хв протягом 30-90 хв; г., підгострі і хр. периферичні тромбози та емболії - від 1000 до 2000 МО з інтервалами від 3 до 5 хв, тривалість введення залежить від поширеності ураження та локалізації оклюзії судини і становить до 3 год загальною дозою максимально 120000 МО, при необхідності одночасно можна виконати перкутанну транслюмінальну ангіопластику. Контроль терапії: короткотерміновий лізис (протягом 6 год) - гепарин під час або після інфузії препарату, якщо рівні тромбінового часу або часткового тромбопластинного часу відповідно зросли менше ніж удвічі або у півтора раза від нормальних контрольних величин, тривалий лізис контролюють за показником тромбінового часу, 2-4-разова пролонгація показника тромбінового часу ч/з 6-8 год від початку лізису є вірогідним критерієм антикоагулянтного захисту; у разі збільшення показника тромбінового часу більше ніж у 4 рази дозу препарату зменшити у 2 рази; локальний тромболізис - успіх лікування локальним тромболізисом можна оцінити за даними ангіографії, якщо понад 15 хв після проведення тромболізису зберігається достатній кровотік, лікування вважають успішним і його можна припинити.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний, м'язовий біль, біль у спині, астенія, гарячка, нездужання; крововиливи (кровотечі) у місці ін'єкції, екхімози, шлунково-кишкові, сечостатеві, носові кровотечі;

ускладнені церебральні крововиливи з можливим летальним наслідком, печінкові крововиливи, розрив селезінки, ретроперитонеальні кровотечі, крововиливи в суглоби, сітківку; крововиливи в перикард у хворих на г. ІМ, розриви міокарда; зростання рівня антитіл до стрептокінази; алергічні анафілактичні р-ції (висипання, в т. ч. у вигляді пухирців, почервоніння обличчя та шкіри, свербіж, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, диспное, бронхоспазм); артрит, васкуліт, біль у спині, нефрит і нейроалергічні с-ми (полінейропатії - с-м Гійєна-Барре, сироваткова полінейропатія), неврологічна симптоматика (сироваткова хвороба; запаморочення, сплутаність свідомості, параліч, геміпараліч, збудження, судоми) як прояв церебрального крововиливу або кардіоваскулярного порушення з гіперперфузією мозку; ірит, увеїт, іридоцикліт; артеріальна гіпотензія, тахікардія, брадикардія; холестеринова емболія, екстрасистолія, біль у серці, СН, повторний ІМ, кардіогенний шок, перикардит, набряк легень; зупинка серця, недостатність мітрального клапана, крововилив у перикард, тампонада серця, розрив міокарда, легенева або периферична емболія; некардіогенний набряк легень після інтракоронарної тромболітичної терапії у пацієнтів з поширеним ІМ; задишка, бронхоспазм; нудота, діарея, біль в епігастрії, блювання; транзиторне підвищення рівня трансаміназ та білірубину.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату; наявні або нещодавно перенесені кровотечі; перенесені в попередні 10 днів операція (у т. ч. імплантація судинних протезів), травма (особливо голови), біопсія, пункція судини, яка не спадається (підключичної чи яремної вени), спинномозкова пункція, тампонада серця, ендотрахеальна інтубація; усі форми зниженої здатності крові до згортання, особливо спонтанний фібриноліз; інтракраніальні та інтраспінальні хірургічні втручання; ураження артерій мозку, що можливе при тяжкій артеріальній гіпертензії, гіпертонічній чи діабетичній ретинопатії, нещодавно (до 2 місяців) перенесеному інсульті чи іншій цереброваскулярній патології, аневризмах; високий ризик виникнення кровотечі (геморагічні діатези, тромбоцитопенія); тяжка ниркова і/або печінкова недостатність; ерозивно-виразкові ураження травного тракту в попередні 6 міс.: пептична виразка, неспецифічний виразковий коліт, дивертикуліт; менструальні кровотечі; стан після пологів; активна форма туберкульозу; наявність новоутворень з ризиком кровотечі; г. панкреатит; лікування стрептокіназою (від 5 дн. до 6 міс., з попереднім визначенням високого титру нейтралізуючих антитіл); неконтрольована АГ із систолічним тиском понад 200 мм рт. ст. та/або діастолічним тиском понад 100 мм рт. ст.; гіпертензивні зміни сітківки III-IV ступеня; одночасний прийом пероральних антикоагулянтів (міжнародне нормалізоване співвідношення > 1,3); мітральні вади серця з мерехтінням передсердь, септичний ендокардит чи перикардит; період вагітності або годування груддю; дитячий вік (до 18 р.); інвазивні хірургічні втручання (біопсія органів, довготривалий (травматичний) закритий масаж серця).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 1,5 млн ОД.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	СТРЕПТОКІНАЗА-БІОФАРМА	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл. в бл.	1500000 МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	ТРОМБОФЛЮКС	Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед, Індія	ліоф. пор. д/приг. р-ну д/ін'ек. у фл.	750000 МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТРОМБОФЛЮКС	Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед, Індія	ліоф. пор. д/приг. р-ну д/ін'ек. у фл.	1500000 МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• Урокіназа (Urokinase)

Фармакотерапевтична група: B01AD04 - антитромботичні засоби. Ферменти.

Основна фармакотерапевтична дія: має специфічну спорідненість з плазміногеном і перетворює плазміноген безпосередньо на плазмін шляхом гідролізу зв'язку аргінін-валін; тромби, що містять фібрин, можуть розчинитися завдяки тромболітичному ефекту плазміну; індукована урокіназою фібринолітична активність плазми призводить до дозозалежного зниження рівня плазміногену і фібриногену та підвищує рівень продуктів гідролізу фібрину і фібриногену, які чинять пряму антикоагуляційну дію та потенціюють дію гепарину; ці ефекти урокінази тривають протягом 12-24 год після завершення введення.

Показання для застосування ЛЗ: тромбоз периферичних артерій^{БНФ}; г. та підгострий тромбоз глибоких вен^{БНФ}; г. діагностично підтверджена легенева емболія^{БНФ}, якщо вона супроводжується нестабільним гемодинамічним статусом; тромбоз артеріовенозного шунта^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в^{БНФ}, в/артеріально; застосовувати як у монотерапії, так і при комбінованій тромболітичній терапії з гепарином; тромбоз периферичних артерій: системний лізис - початкова доза 250000-600000 МО в/в 10-20 хв, підтримуюча доза - 80000-150000 МО/год; одночасне введення гепарину необхідне для того, щоб забезпечити адекватний захист від рецидивуючого тромбозу, початок і тривалість терапії гепарином залежить від часткового активного протромбінового часу, який має перевищувати норму в 1,5-2,5 раза; в/в введення гепарину у дозі 500-1000 МО/год зазвичай є достатнім; тривалість лікування залежить від клінічних показників і результатів діагностичних процедур, у середньому 4-5 днів; місцевий лізис - спочатку проводять інфільтрацію тромбу р-ном урокінази, доза не має перевищувати 100000-120000 МО/год для пацієнтів із масою тіла 70 кг; лікування триває до досягнення позитивного клінічного ефекту, але не довше 48 год; тромбоз глибоких вен: початкова доза 250000-600000 МО в/в 10-20 хв, підтримуюча доза 40000-100000 МО/год, одночасне введення гепарину необхідне для того, щоб протидіяти виникненню рецидивуючого тромбозу; в/в введення гепарину у дозі 500-1000 МО/год є достатнім; тривалість лікування 7-14 днів; тромбоемболія легеневої артерії: початкова доза 2000 МО або 4400 МО урокінази/кг, в/в крап. протягом 10-20 хв.^{БНФ} підтримуюча доза 2000 МО урокінази/кг/год. з одночасним введенням гепарину або 4400 МО урокінази/кг/год.^{БНФ} без застосування гепарину; початок і тривалість інфузії гепарину буде залежати від активного протромбінового часу, зазвичай достатньо введення 500-1000 МО нефракціонованого гепарину/год в/в; тромбоз артеріовенозних шунтів: р-н урокінази з к-

цією 5000-25000 МО/мл^{БНФ} вводити в обидві трубки, встановлені у шунт, у разі необхідності процедуру повторювати кожні 30 хв; тривалість лікування не має перевищувати 2 год; фібринолітичне лікування критичної ішемії нижніх кінцівок при с-мі діабетичної стопи: в/в крап. 30 хв 1 р/день; не більше 21 дня; дозу визначати щоденно відповідно до показника фібриногену: > 2,5 г/л: 1000000 МО урокінази; < 1,6-2,5 г/л: 250000-500000 МО урокінази; < 1,6 г/л: урокіназу не застосовувати.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: мікрогематурія, кровотеча з ушкоджених судин, гематом, кровотечі після пункцій та інших інвазивних маніпуляцій, в/м ін'єкцій, травм чи свіжих ран; загрозливі для життя кровотечі (наприклад, в/черепні, ретроперитонеальні, шлунково-кишкові, внутрішньопечінкові); тимчасове підвищення рівня трансаміназ, що виявляється клінічно; емболії; гарячка, АР (еритема, шкірна екзантема, диспное, артеріальна гіпотензія); внаслідок відриву тромбів можуть виникати емболії; випадки тимчасового підвищення t° тіла, припливи; диспное, ціаноз, гіпоксемія, ацидоз, біль у спині, нудота та /або блювання, випадки летальної анафілактичної р-ції, зниження гематокриту без клінічного прояву кровотечі, крововилив у скловидне тіло, позачеревна кровотеча; ниркова кровотеча, кровотечі сечовивідних шляхів; загрозливі для життя кровотечі сечостатевих шляхів; кропив'янка, носові кровотечі, кровоточивість ясен; загрозливі для життя кровотечі у паренхіматозні органи або м'язи.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до урокінази або до будь-якого з компонентів препарату; усі форми пригнічення системи згортання крові, особливо при підвищеній схильності до геморагій (спонтанний фібриноліз і геморагічний діатез); лікування пероральними антикоагулянтами; г. цереброваскулярні явища (наприклад інсульт, швидкоминуче ішемічне порушення мозкового кровообігу), особливо в/черепний крововилив; в/черепні пухлини, аневризми або артеріовенозне порушення розвитку мозкових артерій; інтрамуральна аневризма аорти, що розшаровується; прояви кровотечі; підвищена схильність до кровотеч внаслідок шлунково-кишкових захворювань (злаякісні пухлини, виразки шлунка та ДПК, г. неспецифічний виразковий коліт), порушень сечостатевої системи (злаякісні пухлини, СКХ), порушень легеневої системи (кавернозний туберкульоз або бронхоектази), тяжких печінкових порушень (цироз печінки, езофагеальний варикоз), тяжких ниркових порушень; протягом 3 міс. після тяжкої кровотечі (шлунково-кишкової або в/черепної), після тяжкої травми або ускладнених хірургічних втручань (коронарне шунтування, в/черепні або інтраспінальні операції або травми); перші 4 тижн. після пологів; аборт; загроза викидня; підозра на передлежання плаценти; пункція судини, яку не можна затиснути; протягом 10 днів після біопсії органа, поперекової пункції, зовнішнього масажу серця протягом тривалого періоду або одразу після в/м ін'єкції; тяжка АГ, що не піддається лікуванню (систолический тиск понад 200 мм рт. ст., діастолічний - понад 100 мм рт. ст.; гіпертензивна ретинопатія III-IV ступеня); геморагічна ретинопатія або інші захворювання очей з підвищеною схильністю до кровотеч; г. панкреатит; перикардит; септичний ендокардит; сепсис; тяжка тромбоцитопенія.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 3 млн ОД.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	УРОКІНАЗА МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за пакування, маркування та за випуск серії)/Грін Кросс Корпорейшн (виробник готової лікарської форми in bulk), Німеччина/Корея	пор. д/р-ну д/ін'єк. та інфуз. у скл. фл.	10000 МО	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	УРОКІНАЗА МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за пакування, маркування та за випуск серії)/Грін Кросс Корпорейшн (виробник готової лікарської форми in bulk), Німеччина/Корея	пор. д/р-ну д/ін'єк. та інфуз. у скл. фл.	500000 МО	№1	40282,56	31,97/€

● **Альтеплазе (Alteplase)**

Фармакотерапевтична група: B01AD02 - антитромботичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: рекомбінантний людський активатор плазміногену тканинного типу, глікопротеїн, який перетворює плазміноген безпосередньо у плазмін; при в/в введенні альтеплазе залишається відносно неактивною речовиною у кровоносній системі; після зв'язування з фібрином альтеплазе активується, викликаючи перетворення плазміногену в плазмін, що призводить до розчинення фібринового згустка.

Показання для застосування ЛЗ: тромболітичне лікування при г. ІМ^{БНФ} - 90-хвилинний (прискорений) режим введення для пацієнтів, лікування яких можна розпочати протягом перших 6 год після виникнення симптомів; 3-годинний режим введення для пацієнтів, лікування яких можна розпочати протягом 6 - 12 год після виникнення симптомів; тромболітичне лікування при г. поширеній тромбоемболії легеневої артерії^{БНФ} з гемодинамічною нестабільністю; по можливості діагноз повинен бути підтверджений такими об'єктивними засобами, як легенева ангіографія, або таким неінвазивним втручанням, як сканування легенів; тромболітичне лікування г. ішемічного інсульту^{БНФ}: лікування необхідно починати якомога раніше, протягом перших 4,5 год. після виникнення симптомів інсульту і після виключення в/черепного крововиливу за допомогою методів, що передбачають візуальне спостереження (таких як, комп'ютерна томографія або інший метод діагностики з візуалізацією, який дає можливість виявити наявність крововиливу).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати якомога раніше після виникнення симптомів захворювання; ІМ - 90-хвилинний (прискорений) режим введення для хворих на ІМ, лікування яких можна розпочати протягом 6 год після виникнення симптомів - 15 мг як в/в болюс, 50 мг як інфузія протягом 30 хв, потім інфузія 35 мг протягом 60 хв до максимальної дози 100 мг^{БНФ}; для пацієнтів, маса тіла яких < 65 кг, загальну дозу відрегулювати щодо маси - 15 мг як в/в болюс та 0,75 мг/кг маси тіла протягом 30 хв (максимум 50 мг), потім інфузія 0,5 мг/кг протягом 60 хв^{БНФ} (максимум 35 мг); 3-годинний режим введення для пацієнтів, лікування яких може початися протягом 6-12 год після виникнення симптомів - 10 мг як в/в болюс, 50 мг як в/в інфузія протягом першої год, з подальшою інфузією 10 мг протягом 30 хв, до досягнення максимальної дози 100 мг протягом 3 год.^{БНФ}; для пацієнтів з масою тіла менше 65 кг загальна доза не повинна перевищувати 1,5 мг/кг^{БНФ}; максимально допустима доза при г. ІМ -100 мг; допоміжна терапія - антитромботична супутня терапія рекомендується відповідно чинним міжнародним рекомендаціям щодо лікування пацієнтів з ІМ з елевацією сегменту ST; тромбоемболія легеневої артерії - загальну дозу 100 мг ввести протягом 2 год.; найбільш поширеним є такий досвід застосування в такому режимі - 10 мг в/в струминно протягом 1-2 хв, 90 мг як в/в інфузія протягом 2 год; для пацієнтів з масою тіла < 65 кг загальна доза не повинна перевищувати 1,5 мг/кг^{БНФ}; допоміжна терапія - після застосування альтеплазе почати (або продовжити) лікування гепарином, коли значення АЧТЧ є меншими подвійної верхньої межі норми; інфузію регулювати відповідно до АЧТЧ протягом 50-70 секунд (в 1,5-2,5 рази більше від вихідного рівня); г. ішемічний інсульт - рекомендована доза 0,9 мг/кг (максимум 90 мг), яка вводиться інфузійно протягом 60 хв; 10% загальної дози початково призначається в/в струминно^{БНФ}; терапію розпочати якомога раніше протягом перших 4,5 год, після виникнення симптомів^{БНФ}; допоміжна терапія - безпека та ефективність цього режиму із супутнім застосуванням гепарину і ацетилсаліцилової к-ти в перші 24 год після виникнення симптомів достатньою мірою не досліджувалися; тому в перші 24 год після терапії альтеплазе при ішемічному інсульті уникати призначення ацетилсаліцилової к-ти або гепарину в/в; якщо гепарин необхідно застосовувати за іншими показаннями (наприклад запобігання тромбозу глибоких вен), доза не повинна перевищувати 10 000 МО/добу п/ш.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кровотеча: кровотечі з місця пошкодження кровоносних судин (гематома), кровотеча з місця пункції, гематома чи кровотеча у місці введення катетера); в/черепна кровотеча (церебральна кровотеча чи гематома, геморагічний інсульт, геморагічна трансформація інсульту, в/черепна гематома, субарахноїдальна кровотеча) на фоні лікування г. ішемічного інсульту, клінічно виражена в/мозкова кровотеча на фоні лікування г. ішемічного інсульту (до 10 % пацієнтів, без підвищення загального коефіцієнта смертності та без будь-якого підвищення загального коефіцієнта захворюваності та втрати хворим спроможностей за шкалою Ренкіна (ст. тяжкості 5-6)); кровотечі з дихальних шляхів (глоткова кровотеча; кровохаркання; носова кровотеча); кровотеча зі ШКТ (блювання кров'ю, шлункова кровотеча, кровотечі з виразки шлунка, з прямої кишки, мелена; кровотечі з ротової порожнини, з ясен, підшкірна кровотеча; урогенітальні кровотечі (гематурія; кровотечі з сечовивідних шляхів), необхідність в переливанні крові; р-ції гіперчутливості /анафілактоїдні р-ції; АР, висипи, кропив'янка, бронхоспазм, ангіоневротичний набряк, гіпотензію, шок, будь-які інші симптоми, пов'язані з алергічними р-ми, епілептичний напад, судоми, афазія, порушення мовлення, делірій, г. мозковий с-м, збудження, сплутаність свідомості, депресія, психоз; рецидивуюча ішемія/стенокардія, гіпотензія та СН, набряк легень, реперфузійна аритмія (аритмія, екстрасистолія, предсердно-шлуночкова блокада (аж до повної), мерехтіння (фібриляція) передсердя, брадикардія, шлуночкова аритмія, шлуночкова фібриляція, шлуночкова тахікардія, електромеханічна дисоціація (ЕМД)); зупинка серця, кардіогенний шок та повторний інфаркт; мітральна регургітація, легенева емболія, інші форми системної емболії/церебральна емболія, дефект міжшлуночкової перегородки; емболія; нудота, блювання, необхідність у переливанні крові, жирова емболія (емболізація кристалами холестерину), яка може призвести до відповідних наслідків в уражених органах.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини - альтеплазе, а також гентаміцину; додаткові протипоказання при г. ІМ, г. масивній легеневій емболії та г. ішемічному інсульті: значні порушення згортання крові, кровотеча, існуюча або та, що сталася протягом останніх півроку; відомий геморагічний діатез; одночасний прийом пероральних антикоагулянтів, наприклад натрію варфарину; виражена або нещодавно перенесена тяжка або небезпечна кровотеча; наявність в анамнезі будь-якого захворювання ЦНС (такого як новоутворення, аневризма, в/черепне або спинномозкове хірургічне втручання); наявність в анамнезі або підозрюваний в/черепний крововилив; підозрюваний субарахноїдальний крововилив або стан після субарахноїдального крововиливу на фоні аневризми; тяжка форма неконтрольованої АГ; нещодавно перенесені (<10 днів) травматичний зовнішній масаж серця при реанімації, пологи, нещодавня пункція кровоносних судин, що не можуть бути здавлені (пункція підключичної або яремної вени); тяжкі форми порушень ф-цій печінки, включаючи ПН, цироз, портальну гіпертензію (варикозне розширення вен стравоходу) та гепатит в активній стадії; бактеріальний ендокардит, перикардит; г. панкреатит; підтверджені виразкові шлунково-кишкові захворювання протягом останніх 3 міс., варикоз вен стравоходу, аневризма артерій, вади розвитку артерій і вен; новоутворення з підвищеним ризиком кровотечі; значна хірургічна операція або значна травма за останні 3 міс.; додаткові протипоказання при г. ІМ та г. масивній легеневій емболії: геморагічний інсульт або інсульт невідомого походження в анамнезі; ішемічний інсульт або транзиторна ішемічна атака (ТІА) протягом останніх 6 міс., за винятком г. ішемічного інсульту, що стався протягом останніх 3 год.; додаткові протипоказання при г. ішемічному інсульті: симптоми г. ішемії почалися більше, ніж за 4,5 год. до початку інфузії, або час виникнення симптомів невідомий або міг бути більше, ніж 4,5 год.; незначний неврологічний дефіцит або швидке полегшення симптомів до початку інфузії; тяжкий інсульт за клінічними оцінками (наприклад NIHSS > 25) та/або визначений за допомогою належних методів візуалізації; судоми на початку інсульту; наявність попереднього інсульту протягом останніх 3 міс.; відомості про в/черепну кровотечу (ВЧК) за результатами комп'ютерної томографії; симптоми, що мають відношення до субарахноїдального крововиливу, навіть якщо результати комп'ютерної томографії знаходяться в межах норми; перенесений інсульт в анамнезі на фоні ЦД; введення гепарину протягом останніх 48 год., активований частковий тромбoplastиновий час (АЧТЧ) перевищує верхню межу норми відповідно до лабораторних показників; кількість тромбоцитів становить менше 100 000/ мм³; систолічний АТ > 185 або діастолічний АТ > 110 мм рт.ст., або активне медикаментозне втручання (в/в), що необхідне для зниження АТ до цих меж; рівень глюкози в крові < 50 або > 400 мг/дл (< 2,8 ммоль або > 22,2 ммоль);

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АКТИЛІЗЕ®	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмБХ і Ко. КГ, Німеччина	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл. з розч.	50мг	№1	25154,88	31,03/€

● **Тенектеплаза (Tenecteplase)**

Фармакотерапевтична група: B01AD11 - антитромботичні засоби. Ферменти.

Основна фармакотерапевтична дія: є рекомбінантним фібринспецифічним активатором плазміногена, одержаним із природного тканинного активатора плазміногена (t-PA) шляхом модифікації у трьох місцях структури білка; зв'язується з фібриновими компонентами тромбу (згусток крові) та селективно перетворює зв'язаний із тромбом плазміноген на плазмін, що розщеплює фібринову основу тромбу; порівняно з нативним t-PA тенектеплаза має більшу специфічність до фібрину і більшу стійкість до інактивації під впливом ендogenous інгібітору (PAI-1).

Показання для застосування ЛЗ: тромболітична терапія при підозрі на ІМ зі стійким підйомом сегмента ST або недавньої блокади лівої ніжки п.Гіса протягом 6 год після початку симптомів г. ІМ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначати з урахуванням маси тіла пацієнта^{БНФ}, максимальна доза 10 000 Од (50 мг тенектеплази^{БНФ}); об'єм, необхідний для одержання ефективної дози: при масі тіла < 60 кг - 6 000 Од (30 мг, 6 мл); при масі тіла 60 < 70кг - 7 000 Од (35 мг, 7 мл); при масі тіла 70 - 80 кг - 8 000 Од (40 мг, 8 мл); при масі тіла 80- 90 кг - 9 000 Од (45 мг, 9 мл); при масі тіла > 90 кг - 10 000 Од (50 мг, 10 мл); необхідну дозу призначати у вигляді одноразового в/в болюсного введення^{БНФ} протягом приблизно 10 сек.; для введення тенектеплази може бути використана система для в/в вливання, що застосовувалася лише для вливання 0,9% р-ну натрію хлориду; антитромботична супутня терапія інгібіторами тромбоцитів та антикоагулянтами повинна здійснюватись відповідно до чинних рекомендацій щодо лікування пацієнтів з ІМ з підйомом сегмента ST

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анафілактичні р-ції (включаючи висипання, кропив'янку, бронхоспазм, набряк гортані); внутрішньочерепний крововилив (крововилив у мозок, гематома мозку, геморагічний інсульт, геморагічна трансформація інсульту, внутрішньочерепна гематома, субарахноїдальний крововилив), включаючи пов'язані симптоми, такі як сонливість, афазія, геміпарез, судоми; очний крововилив; реперфузійні аритмії (асистолія, прискорена ідіовентрикулярна аритмія, аритмія, екстрасистолія, фібриляція передсердь, передсердно-шлуночкова блокада від першої стадії до повної, брадикардія, тахікардія, шлуночкова екстрасистолія, шлуночкова фібриляція, шлуночкова тахікардія); емболія (тромбоемболія); епітаксис; легенева кровотеча; кровотеча в ШКТ (шлункова, виразкова, ректальна кровотеча, гематемезис, мелена, кровотеча ротової порожнини); ретроперитонеальна кровотеча (ретроперитоніальна гематома); нудота, блювання; екхімоз; урогенітальна кровотеча (гематурія, кровотеча сечовивідних шляхів); кровотеча в місці введення ін'єкції, кровотеча в місці пункції; зниження АТ; підвищення t°; жирова емболія, що може призвести до певних наслідків у відповідних органах; артеріальна гіпотензія, порушення частоти серцебиття та серцевого ритму, стенокардія; рецидивуюча ішемія, СН, ІМ, кардіогенний шок, перикардит, набряк легенів; зупинка серця, недостатність лівого мітрального клапана, ексудативний перикардит, тромбоз вен, тампонада серця, розрив міокарда; емболія легеневої артерії.

Противпоказання до застосування ЛЗ: анафілактичні р-ції в анамнезі до тенектеплази або до будь-якого з компонентів допоміжної речовини або гентаміцину; значна кровотеча в цей час або протягом останніх 6 міс.; ефективна р/ос антикоагулянтна терапія (МНВ>1,3); наявність в анамнезі будь-яких порушень ЦНС (пухлини, аневризми, внутрішньочерепне або спинномозкове оперативне втручання); відомий геморагічний діатез; тяжка АГ, що не піддається контролю; серйозне оперативне втручання, біопсія паренхіматозного органу, значна травма протягом останніх 2 міс. (включаючи будь-яку травму, супутню наявному ІМ); нещодавня травма голови, у т.ч. черепа; тривала серцево-легенева реанімація (> 2 хв) протягом останніх 2 тижнів; г. перикардит та/або підгострий бактеріальний ендокардит; г. панкреатит; тяжке порушення ф-ції печінки (ПН, цироз, портальна гіпертензія (езофагеальний варикоз) та активний гепатит; активна пептична виразка; аневризма артерій та відома артеріальна/венозна мальформація; пухлина з підвищеним ризиком кровотечі; геморагічний інсульт або інсульт невідомого походження в анамнезі; ішемічний інсульт або транзиторна ішемічна атака протягом останніх 6 міс.; деменція.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 40 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	МЕТАЛІЗЕ®	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмБХ і Ко. КГ, Німеччина	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. у шпр., перех. прист. та голк.	10000ОД (50мг)	№1	27545,61	35,35/€

14. НЕОНАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

14.1. Антимікробні засоби

14.1.1. Антибіотики

14.1.1.1. Пеніциліни

14.1.1.2. Цефалоспорини

14.1.1.3. Аміноглікозиди

14.1.1.4. Глікопептиди

14.1.1.5. Оксазолідини

14.1.1.6. Інші антибіотики

14.1.2. Протигрибкові засоби

14.1.3. Противірусні засоби

14.1.3.1. Противірусні препарати прямої дії

14.1.3.2. Імуноглобуліни специфічні

14.1.4. Інші антимікробні засоби

14.2. Анестезуючі засоби

14.2.1. Анестезуючі засоби загальної дії

14.3. Протисудомні та протиепілептичні лікарські засоби

14.4. Гормональні лікарські засоби

14.5. Діуретики

14.6. Лікарські засоби для парентерального живлення

14.7. Розчини електролітів

14.8. Серцево-судинні лікарські засоби

14.8.1. Адреноміметики

14.8.2. Допамінергічні агоністи

14.8.3. Серцеві глікозиди

14.8.4. Блокатори кальцієвих каналів

14.8.5. Блокатори М-холінорецепторів

14.9. Лікарські засоби коагуляційної дії

14.9.1. Синтетичний аналог вітаміну К

14.9.2. Інгібітор фібрinolізу

14.10. Препарати крові, плазми та плазмозамінники

14.11. Вітаміни

14.12. Засоби еритропоетичної дії

14.13. Засоби для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту

14.14. Засоби для пероральної регідратації

14.14.1. Пероральні регідратаційні солі

14.15. Замісна сурфактантна терапія

14.16. Пробиотики

14.17. Антидоти

14.18. Офтальмологічні лікарські засоби

14.19. Курареподібні лікарські засоби

14.1. Антимікробні засоби

14.1.1. Антибіотики

14.1.1.1. Пеніциліни

- **Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin)** * (див. п. 17.2.1.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: інфекційні захворювання, спричинені пеніцилінчутливими м/о^{БНФ}: сепсис^{ВООЗ,БНФ}, ранові інфекції та інфекції шкіри, дифтерія^{БНФ}, пневмонія^{ВООЗ,БНФ} емпієма, еризипелоїд, перикардит, бактеріальний ендокардит^{БНФ,ВООЗ}, медіастеніт, перитоніт, менінгіт^{БНФ,ВООЗ}, абсцеси мозку^{ВООЗ}, артрит, остеомієліт^{ВООЗ}, інфекції статевих шляхів, спричинені фузобактеріями, а також специфічні інфекції: сибірська виразка^{ВООЗ}, інфекції, спричинені клостридіями, включаючи правець, лістеріоз, пастерельоз, пропасницю, спричинену укусами щурів, фузоспірохетоз, актиномікоз^{ВООЗ}; лікування ускладнень, спричинених гонореею та сифілісом^{ВООЗ}, бореліоз Лайма^{ВООЗ} після першої стадії захворювання.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в або в/м^{ВООЗ,БНФ}: добова доза для дітей віком до 1 року - 50 000-100 000 ОД/кг, віком від 1 року - 50 000 ОД/кг, при необхідності добову дозу можна збільшити до 200 000-300 000 ОД/кг, за життєвими показаннями - до 500 000 ОД/кг. Кратність введення препарату - 4-6 р/добу.

- **Ампіцилін (Ampicillin)** * ^[ГПМД] (див. п. 17.2.1.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: сепсис^{ВООЗ}, септичний ендокардит, менінгіт^{ВООЗ}, інфекції дихальних шляхів (пневмонія, хр. бронхіт^{БНФ}, абсцес легенів); сечо^{БНФ} - і жовчовидільних^{ВООЗ} шляхів^{БНФ} (пієліт, пієлонефрит, цистит, холангіт, холецистит); інфекції шкіри і м'яких тканин та захворювання, спричинені чутливими до дії а/б м/о (спричинені β-гемолітичними стрептококами групи А або коагулазо-позитивними стафілококами, чутливими до пеніциліну).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити в/в та в/м^{ВООЗ,БНФ}; новонародженим препарат призначати у добовій дозі 20-40 мг/кг, дітям інших вікових груп - 50-100 мг/кг, при тяжкому перебігу інфекції вказані дози можуть бути подвоєні; добову дозу вводити у 4-6 прийомів з інтервалом у 4-6 год; при менінгітах у дітей: дітям віком до 1 міс - добова доза 100-500 мг/кг, дітям віком від 1 міс - добова дозі 200-300 мг/кг за 6-8 введень, добову дозу вводити у 4-6 прийомів.

- **Амоксицилін (Amoxicillin)** * ^[ГПМД] (див. п. 17.2.1.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: г. бактеріальний синусит; г. отит середнього вуха; г. стрептококовий тонзиліт і фарингіт; загострення хр. бронхіту; негоспітальна пневмонія; г. цистит^{ВООЗ}; г. пієлонефрит^{ВООЗ}; тифоїдна і паратифоїдна лихоманка; дентальні абсцеси з поширеним целюлітом^{ВООЗ}; ерадикація *Helicobacter pylori* (у складі комбінованої терапії); хв. Лайма^{ВООЗ}; лікування та профілактика^{ВООЗ} ендокардитів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: діти з масою тіла <40 кг: г. бактеріальний синусит, г. отит середнього вуха, негоспітальна пневмонія, г. синусит, г. пієлонефрит, дентальні абсцеси з поширеним целюлітом - 20 - 90 мг/кг/добу (не перевищувати дозу 3 г/добу), точні добові дози розраховуються відповідно до маси тіла дитини, а не її віку; г. стрептококовий тонзиліт і фарингіт - 40 -90 мг/кг/добу (не перевищувати дозу 3 г/добу); тифоїдна і паратифоїдна лихоманка - 100 мг/кг/добу за 3 прийоми; профілактика ендокардиту - 50 мг/кг, разова доза за 30-60 хв. до проведення процедури; хв. Лайма: початкова стадія - 25 - 50 мг/кг/добу за 3 прийоми протягом 10-21 дня, пізня стадія (системні ураження) - 100 мг/кг/добу за 3 прийоми протягом 10-30 днів.

Комбіновані препарати

- **Амоксицилін + Кислота клавуланова (Amoxicillin + Clavulanic acid)** * ^[ГПМД] (див. п. 17.2.1.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: лікування бактеріальних інфекцій, спричинених чутливими до м/о: г. бактеріальний синусит (підтверджений); г. середній отит; загострення хр. бронхіту^{ВООЗ БНФ} (після підтвердження діагнозу); негоспітальна пневмонія^{ВООЗ БНФ}; цистит; пієлонефрит^{ВООЗ БНФ}; інфекції шкіри та м'яких тканин, у т.ч. бактеріальний целюліт^{ВООЗ БНФ}, укуси тварин^{ВООЗ БНФ}, тяжкі дентоальвеолярні абсцеси^{ВООЗ БНФ} з поширеним целюлітом^{ВООЗ БНФ}; інфекції кісток і суглобів^{БНФ}, у т.ч. остеомієліт; внутрішньочеревні інфекції^{БНФ}; інфекції статевих органів у жінок^{ВООЗ БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дітям віком до 3 місяців призначають тільки у вигляді в/в^{БНФ} інфузії; дітям віком до 3 місяців або масою тіла менше 4 кг - 25/5 мг/кг маси тіла кожні 12 год.

- **Ампіцилін + Сульбактам (Ampicillin + Sulbactam)**

Фармакотерапевтична група: J01CR01 - АБЗ для системного застосування. Ампіцилін та інгібітор ферменту.

Основна фармакотерапевтична дія: механізм дії ампіциліну ґрунтується на інгібуванні синтезу бактеріальної клітинної стінки (у фазі росту) шляхом блокування пеніцилінзв'язуючих білків (ПЗБ), наприклад, транспептидаз, це призводить до бактерицидного ефекту; інактивування ампіциліну, що здійснюється певними бета-лактамазами, інгібується при його застосуванні у комбінації з сульбактамом; сульбактам захищає ампіцилін від розщеплення більшістю β-лактамаз стафілококів, а також деякими β-лактамазами, що кодуються плазмідами (наприклад, TEM, OXA, SHV, CTX-M), та певними β-лактамазами, що кодуються хромосомами Gr.(-) бактерій; ці β-лактамази присутні, наприклад, у *Escherichia coli*, видів роду *Klebsiella*, *Proteus mirabilis* та *Haemophilus influenzae*; спектр а/б дії ампіциліну поширюється на бактерії, β-лактамази яких можуть інгібуватися сульбактамом.

Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій, спричинених чутливими до препарату м/о: інфекції ВДШ та НДШ, синусит, середній отит та епіглотит та бактеріальні пневмонії, інфекції сечових шляхів та пієлонефрит, внутрішньочеревні інфекції, у т.ч. перитоніт, холецистит, ендометрит та запалення органів таза; бактеріальна септицемія; інфекції шкіри, м'яких тканин, кісток та суглобів, гонококові інфекції; у періопераційному періоді з метою зниження частоти виникнення післяопераційних інфекцій у пацієнтів, які перенесли операції у черевній та тазовій порожнинах та у яких може бути зараження у черевній порожнині.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дітям, немовлятам та новонародженим (віком від 1 тижня) добова доза -150 мг/кг маси тіла (що відповідає 100 мг/кг/добу ампіциліну та 50 мг/кг/добу сульбактаму) у поділених дозах кожні 6 або 8 год; новонародженим під час першого тижня життя (особливо недоношеним) препарат, як правило, призначати у дозі 75 мг/кг/добу (що відповідає 25 мг/кг/добу сульбактаму і 50 мг/кг/добу ампіциліну) у поділених дозах кожні 12 годин.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анемія, тромбоцитопенія, еозинофілія, лейкопенія, нейтропенія, мієлосупресія, панцитопенія, подовження часу згортання крові, подовження протромбінового часу, гемолітична анемія, агранулоцитоз, тромбоцитопенічна пурпура, р-ції гіперчутливості, включаючи анафілактичний шок, анафілактоїдна р-ція, набряк обличчя, припухлість язика, внутрішня припухлість гортані зі звуженням дихальних шляхів, уртикарні висипання, макулопапульозні висипання, кореподібні висипання, тахікардія, ускладнення дихання, медикаментозна гарячка, сироваткова хвороба, алергічний васкуліт, зниження АТ, підвищена втомлюваність, головний біль, сонливість, епілептичний напад, запаморочення, флебіт, діарея, відчуття тяжкості в епігастральній ділянці, втрата апетиту, блювання, нудота, глосит, псевдомембранозний коліт, ентероколіт, стоматит, зміна кольору язика, метеоризм, гіпербілірубінемія, холестатичний гепатит, холестаза, печінковий холестаза, дисфункція печінки, жовтяниця, висипання на шкірі (екзантема), висипання, свербіж, запалення слизових оболонок, інші р-ції шкіри, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз (с-м Лаелла), багатоформна ексудативна еритема, генералізований екзантематозний пустульоз (ГГЕП), ексфолювативний дерматит, ангіоневротичний набряк, еритема, кропив'янка, тубулоінтерстиціальний нефрит, затримка сечі, дизурія, біль у місці ін'єкції (після в/м введення), р-ція у місці ін'єкції, біль у грудній клітці, субстернальний біль, носова кровотеча, кровотеча зі слизових оболонок, підвищення рівня АЛТ, АСТ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до пеніцилінів та цефалоспоринів в анамнезі; інфекційний мононуклеоз або лімфатичний лейкоз.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АМПІСУЛЬБІН®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	1г/0,5г	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АМПІСУЛЬБІН®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	1г/0,5г	№10x1	59,66	
II.	УНАЗИН®	Хаупт Фарма Латіна С.р.л. (стерильне наповнення, пакування, контроль якості, випуск серії)/Пфайзер Глобал Сепплай Джапан Інк. Нагоя Планта (виробництво стерильної суміші сульбактаму натрію та ампіциліну натрію), Італія/Японія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. по 0,75г	0,5г/0,25г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	УНАЗИН®	Хаупт Фарма Латіна С.р.л. (стерильне наповнення, пакування, контроль якості, випуск серії)/Пфайзер Глобал Сепплай Джапан Інк. Нагоя Планта (виробництво стерильної суміші сульбактаму натрію та ампіциліну натрію), Італія/Японія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. по 1,5г	1г/0,5г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	УНАЗИН®	Хаупт Фарма Латіна С.р.л. (стерильне наповнення, пакування, контроль якості, випуск серії)/Пфайзер Глобал Сепплай Джапан Інк. Нагоя Планта (виробництво стерильної суміші сульбактаму натрію та ампіциліну натрію), Італія/Японія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. по 3г	2г/1г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	УНАЗИН®	Хаупт Фарма Латіна С.р.л. (стерильне наповнення, пакування, контроль якості, випуск серії)/Пфайзер Глобал Сепплай Джапан Інк. Нагоя Планта (виробництво стерильної суміші сульбактаму натрію та ампіциліну натрію), Італія/Японія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. по 3г	2г/3г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

14.1.1.2. Цефалоспорини

- **Цефуроксим (Cefuroxime)** (див. п. 17.2.1.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій БНФ у дітей: г. стрептококовий тонзиліт і фарингіт, г. бактеріальний синусит, г. середній отит, загострення хр. бронхіту, спричинене збудниками, чутливими до цефуроксиму ацетилу БНФ, негоспітальна пневмонія БНФ, цистит БНФ, ускладнені інфекції сечовивідних шляхів БНФ, у т.ч. пієлонефрит БНФ, неускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин, інфекції черевної порожнини, профілактика виникнення інфекційних ускладнень після операцій на ШКТ включаючи стравохід, після ортопедичних, гінекологічних операцій та операцій на ССС.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: діти з масою тіла < 40 кг: негоспітальна пневмонія, ускладнені інфекції сечовивідних шляхів, у т.ч. пієлонефрит, інфекції м'яких тканин: целюліти, еризипілоїд, раневі інфекції, інфекції черевної порожнини - немовлята та діти віком > 3 тижнів та діти з масою тіла < 40 кг: від 30 до 100 мг/кг/добу (в/в) розділених на 3 або 4 дози; для більшості інфекцій оптимальною дозою є 60 мг/кг/добу, немовлята (від народження до 3 тижнів) - від 30 до 100 мг/кг/добу (в/в) розділених на 2 або 3 дози

- **Цефоперазон (Cefoperazone)** (див. п. 17.2.1.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій, спричинених чутливими м/о - інфекції ВДШ та НДШ; інфекції верхніх та нижніх відділів сечовивідних шляхів; перитоніт, холецистит, холангіт та інші інтраабдомінальні інфекції; септицемія; менінгіт; інфекція шкіри та м'яких тканин; інфекції кісток та суглобів; запальні захворювання тазових органів, інфекції статевих шляхів; для профілактики інфекційних післяопераційних ускладнень під час операцій.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для лікування дітей призначати у добових дозах 50 мг - 200 мг/кг маси тіла; дозу застосовують за 2 введення (кожні 8-12 год); максимальна доза не повинна перевищувати 12 г/добу, добові дози до 300 мг/кг застосовували для лікування дітей з тяжкими інфекціями, включаючи кількох пацієнтів з бактеріальним менінгітом, що не спричиняло ускладнень; новонароджені (до 8 днів) - вводити ч/з кожні 12 год.

- **Цефотаксим (Cefotaxime)** * (див. п. 17.2.1.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: інфекції, спричинені чутливими до дії ЛЗ м/о БНФ: бактеріальна пневмонія (не діє проти бактерій, що викликають атипову пневмонію, або проти різних інших бактеріальних штамів, які можуть викликати атипову пневмонію, включаючи *P. aeruginosa*), ускладнені інфекції нирок та верхніх сечовивідних шляхів, серйозні інфекції шкіри та м'яких тканин, інфекції статевих органів, спричинені гонококами БНФ, особливо коли застосування пеніциліну виявилось неефективним або не підходить, внутрішньочеревні інфекції (включаючи перитоніт), г. бактеріальний менінгіт БНФ (особливо викликаний *H. Influenzae*, *N. Meningitis*, *S. pneumoniae*, *E. coli*, *Klebsiella spp.*), бактеріємії, пов'язані або імовірно пов'язані з однією з перерахованих інфекцій, ендокардит (якщо інфекція спричинена Гр (-) бактеріями, потрібно поєднувати з іншим відповідним а/б).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/м та в/в; тривалість курсу лікування встановлюють індивідуально БНФ; МДД - 12 г БНФ; немовлята та діти (від 28 днів до 11 років) - 50-100 мг/кг маси тіла/добу, залежно від тяжкості інфекції (до 150 мг), розділені на 2-4 рівні дози (кожні 12-6 год); недоношені та доношені новонароджені (0-27 днів) - 50 мг/кг маси тіла/добу, розділені на 2-4 рівні дози (кожні 12-6 год), при серйозних інфекціях - 150 мг/кг маси тіла/добу; бактеріальний менінгіт БНФ - дітям: добові дози 150-200 мг/кг маси тіла на добу, розділені на рівні дози, кожні 6-8 год.; новонародженим від 1-го до 7-го днів життя: 50 мг/кг маси тіла цефотаксиму кожні 12 год, новонародженим від 7-го до 28-го днів життя - 50 мг/кг маси тіла кожні 8 год; періопераційна профілактика: разова доза -1-2 г за 30-60 хв до початку операції, якщо операція триває довше 90 хв потрібна додаткова доза.

- **Цефтриаксон (Ceftriaxone)** * (ПМД) (див. п. 17.2.1.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: для лікування у дітей, у т.ч. доношених новонароджених (від народження): бактеріальний менінгіт; позалікарняна пневмонія; госпітальна пневмонія^{ВООЗ, БНФ}; г. середній отит БНФ; внутрішньочеревні інфекції БНФ; ускладнені інфекції сечовивідних шляхів (включаючи пієлонефрит) БНФ; інфекції кісток і суглобів^{ВООЗ, БНФ}; ускладнені інфекції шкіри і м'яких тканин БНФ; гонорея^{ВООЗ, БНФ}; сифіліс БНФ; бактеріальний ендокардит^{ВООЗ, БНФ}; можливо застосовувати для лікування дисемінованого бореліозу Лайма (раннього (II ст.) і пізнього (III ст.) у дорослих і дітей, включаючи новонароджених віком від 15 днів; передопераційна профілактика інфекцій у місці хірургічного втручання; для ведення пацієнтів із нейтропенією, у яких розвинулася пропасниця з підозрою на бактеріальну інфекцію; для лікування пацієнтів з бактеріємією, яка виникла у зв'язку з будь-якою із зазначених інфекцій або якщо є підозра на будь-яку із вищезазначених інфекцій.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: діти від 15 днів до 12 років (< 50 кг): 50 - 80 мг/кг 1 р/добу при внутрішньочеревних інфекціях, ускладнених інфекціях сечовивідних шляхів (включаючи пієлонефрит), позалікарняній та госпітальній пневмонії; 50 - 100 мг/кг (максимально 4 г) 1 р/добу при ускладнених інфекціях шкіри і м'яких тканин, інфекціях кісток і суглобів, веденні пацієнтів з нейтропенією, у яких розвилася лихоманка і є підозрою на бактеріальну інфекцію; 80 - 100 мг/кг (максимально 4 г) 1 р/добу при бактеріальному менінгіті; 100 мг/кг (максимально 4 г) 1 р/добу при бактеріальному ендокардиті; застосування продовжувати 48-72 год. після зникнення лихоманки або підтвердження досягнення ерадикації бактеріальної інфекції; новонароджені віком 0-14 днів: внутрішньочеревні інфекції, ускладнені інфекції шкіри і м'яких тканин, ускладнені інфекції сечовивідних шляхів (включаючи пієлонефрит), позалікарняна пневмонія, госпітальна пневмонія, інфекції кісток і суглобів, ведення пацієнтів з нейтропенією, у яких розвинулася гарячка і є підозра на бактеріальну інфекцію - 20-50 мг/кг 1р/добу, бактеріальний менінгіт, бактеріальний ендокардит - 50 мг/кг 1р/добу, г. середній отит - для початкового лікування в/м одноразово 50 мг/кг, передопераційна профілактика інфекцій у місці хірургічного втручання - 20-50 мг/кг одноразово перед операцією, сифіліс -50 мг/кг 1 р/добу 10-14 днів.

- **Цефтазидим (Ceftazidime)** * (див. п. 17.2.1.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: інфекції у новонароджених: внутрішньолікарняна пневмонія БНФ; інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз^{ВООЗ, БНФ, ПМБ}; бактеріальний менінгіт^{ВООЗ, БНФ}; хр. середній отит;

злюкисний зовнішній отит; ускладнені інфекції сечовивідних шляхів^{БНФ}; ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин; ускладнені інфекції черевної порожнини; інфекції кісток і суглобів; перитоніт, пов'язаний з проведенням ГД у хворих, які знаходяться на безперервному амбулаторному перитонеальному діалізі; лікування бактеріємії^{БНФ}, що виникає у пацієнтів у результаті будь-якої з наведених вище інфекцій; лікування хворих із нейтропенією та гарячкою, що виникає у результаті бактеріальної інфекції; для профілактики інфекційних ускладнень при операціях на передміхуровій залозі (трансуретральна резекція)^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять в/м, в/в ін'єкційно або інфузійно^{БНФ}; діти < 40 кг: немовлята та діти віком > 2 міс.^{ВООЗ} та масою тіла < 40 кг - інтермітуюче введення: ускладнені інфекції сечовивідних шляхів, хр. середній або злюкисний зовнішній отит: 100-150 мг/кг/добу у 3 прийоми, МДД- 6 г; нейтропенія у дітей, інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз, бактеріальний менінгіт^{ВООЗ}, бактеріємія: 150 мг/кг/добу у 3 прийоми, МДД - 6 г^{ВООЗ}; інфекції кісток і суглобів, ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин, ускладнені інтраабдомінальні інфекції, перитоніт, пов'язаний з безперервним амбулаторним ПД: 100-150 мг/кг/добу у 3 прийоми, МДД - 6 г; як постійна інфузія: фебрильна нейтропенія, внутрішньолікарняна пневмонія, інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз, бактеріальний менінгіт, бактеріємія, інфекції кісток і суглобів, ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин, ускладнені інтраабдомінальні інфекції, перитоніт, пов'язаний з безперервним амбулаторним ПД: навантажувальна доза 60-100 мг/кг з наступним постійним інфузійним введенням 100-200 мг/кг/добу, МДД - 6 г.; інтермітуюче введення для лікування більшості інфекцій немовлятам та дітям віком ≤ 2 міс.: 25-60 мг/кг/добу у 2 прийоми^{ВООЗ}.

Комбіновані препарати

- **Цефоперазон + Сульбактам (Cefoperazone + Sulbactam)** (див. п. 17.2.1.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: інфекції ВДШ та НДШ; інфекції сечовивідних шляхів (верхніх і нижніх відділів); перитоніт, холецистит, холангіт та інші інфекції черевної порожнини; септицемія; менінгіт; інфекції шкіри та м'яких тканин; інфекції кісток та суглобів; запальні захворювання органів малого тазу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/м та в/в; МДД для немовлят не повинна перевищувати 80 мг/кг/добу, вводити кожні 12 год.; у випадках, коли є необхідною доза цефоперазону, що перевищує 80 мг/кг маси тіла/добу, додаткову дозу застосовувати окремо.

14.1.1.3. Аміноглікозиди

- **Амікацин (Amikacin)** * (див. п. 17.2.3. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: інфекції, спричинені чутливими до амікацину штамми м/о, резистентними до інших аміноглікозидів^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: недоношеним новонародженим призначають у початковій дозі 10 мг/кг, а потім кожні 18-24 год. по 7,5 мг/кг протягом 7-10 днів; доношеним новонародженим та дітям до 12 років - спочатку призначають 10 мг/кг, потім 7,5 мг/кг кожні 12 год протягом 7-10 днів.

14.1.1.4. Глікопептиди

- **Ванкомицин (Vancomycin)** * (див. п. 17.2.6. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій, спричинених Гр (+) м/о, які є чутливими до препарату^{ВООЗ БНФ}, у т. ч. у пацієнтів з алергією до пеніцилінів і цефалоспоринів в анамнезі: ендокардит^{ВООЗ БНФ}; сепсис^{ВООЗ БНФ}; остеомієліт^{ВООЗ БНФ}; інфекції ЦНС^{ВООЗ БНФ}; інфекції нижніх відділів дихальних шляхів (пневмонія)^{ВООЗ БНФ}; інфекції шкіри та м'яких тканин^{БНФ}; псевдомембранозний коліт^{ВООЗ} (для застосування внутрішньо); запобігання ендокардиту у пацієнтів з підвищеною чутливістю до пеніцилінових а/б^{ВООЗ БНФ}; запобігання інфекціям після хірургічних процедур^{БНФ} у порожнині рота і ЛОР-органів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: новонароджені віком до 7 днів: початкова доза - 15 мг/кг маси тіла, а потім - 10 мг/кг маси тіла кожні 12 год, новонароджені віком від 7 днів до 1 міс.: початкова доза - 15 мг/кг маси тіла, а потім - по 10 мг/кг маси тіла кожні 8 год, новонароджені віком від 7 днів до 1 місяця: початкова доза - 15 мг/кг маси тіла, а потім - по 10 мг/кг маси тіла кожні 8 год, максимальна разова доза для дітей - 15 мг/кг маси тіла, МДД- 2 г.

14.1.1.5. Оксазолідини

- **Лінезолід (Linezolid)** (див. п. 17.2.7. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій, що спричинені чутливими анаеробними і аеробними Гр(+) м/о, включаючи інфекції, що супроводжуються бактеріємією: госпітальна пневмонія^{БНФ}; негоспітальна пневмонія; ускладнені інфекції шкіри та її структур^{БНФ}, спричинені St. aureus, Str. pyogenes або Str. agalactiae; неускладнені інфекції шкіри та її структур^{БНФ}, спричинені St. aureus (тільки метицилінчутливими ізолятами) або Str. pyogenes; інфекції, спричинені ентерококами, включаючи резистентні до ванкомицину штами Enterococcus faecium та faecalis.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в^{БНФ}; недоношеним новонародженим у віці < 7 днів (< 34 тижнів гестації) - лікування таких новонароджених починають з дози 10 мг/кг кожні 12 год., для новонароджених з недостатньою клінічною відповіддю на препарат можна розглянути можливість застосування дози 10 мг/кг кожні 8 год.; доношені новонароджені та діти до 12 років - 10 мг/кг кожні 8 год.^{БНФ}. Усі пацієнти віком до 7 днів повинні отримувати дозу 10 мг/кг кожні 8 год.

14.1.1.6. Інші антибіотики

- **Колістим (Colistin)**

Фармакотерапевтична група: J01XB01 - а/б засоби для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: циклічний поліпептидний АБЗ, який належить до групи поліміксинів, які пошкоджують клітинні мембрани, внаслідок чого виникають фізіологічні ефекти, які є летальними для бактерій; поліміксини діють вибірково на аеробні Гр (-) бактерії, які мають гідрофобну зовнішню мембрану, допускається

перехресна резистентність між колістином (поліміксин Е) та поліміксином В, оскільки механізм дії поліміксинів відрізняється від механізму дії інших а/б, резистентність до колістину та поліміксину шляхом вищезгаданого механізму не передбачає резистентності до інших груп препаратів; зазвичай чутливі види: *Acinetobacter baumannii*, *Haemophilus influenzae*, *Klebsiella* spp, *Pseudomonas aeruginosa*; види, для яких набута резистентність може бути проблемною: *Stenotrophomonas maltophilia*, *Achromobacter xylosoxidans* (раніше відомий як *Alcaligenes xylosoxidans*); природно резистентні організми: *Burkholderia cepacia* і споріднені види, *Proteus species*, *Providencia species*, *Serratia species*

Показання для застосування ЛЗ: В/в застосування препарату показане дорослим і дітям, у тому числі новонародженим, для лікування тяжких інфекцій, викликаних окремими аеробними Гр (-) патогенами ^{БНФ}, у пацієнтів з обмеженими варіантами лікування. Препарат у вигляді інгаляцій також показаний дорослим і дітям з муковісцидозом для лікування хр. легеневих інфекцій, викликаних *Pseudomonas aeruginosa* ^{БНФ}. Дотримуватись офіційних рекомендацій щодо належного застосування АБЗ.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі та підлітки: підтримуюча доза - 9 млн МО/добу, розділена на 2-3 прийоми, тяжкохворим пацієнтам застосовувати навантажувальну дозу 9 млн МО; пацієнтам із нормальною нирковою функцією в деяких випадках можуть бути потрібні навантажувальні і підтримуючі дози до 12 млн МО; діти ≤ 40 кг: 75 000-150 000 МО/кг/добу, розділені на 3 введення, для дітей із масою тіла > 40 кг дотримуватися рекомендацій із дозування для дорослих, повідомлялось про застосування доз > 150 000 МО/кг/добу дітям із муковісцидозом; ЛЗ застосовують в/в у вигляді повільної інфузії упродовж 30-60 хв, пацієнти з повністю імплантованим пристроєм венозного доступу (TIVAD) можуть переносити болюсну ін'єкцію в дозі до 2 млн МО у 10 мл, яку вводять протягом не менше 5 хв; застосування шляхом інгаляції: дорослі, підлітки та діти віком ≥ 2 років - 1-2 млн МО 2-3 р/добу ^{БНФ} (максимальна доза - 6 млн МО/добу ^{БНФ}), діти віком < 2 років - 0,5-1 млн МО 2 р/добу (максимальна доза - 2 млн МО/добу).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: неврологічні реакції; апное, транзиторні порушення чутливості (такі як парестезія обличчя та запаморочення), свербіж, кропив'янка, атаксія, гіпотензія, вазомоторна нестійкість, нерозбірливе мовлення, порушення зору, сплутаність свідомості чи психоз, порушення функції нирок, р-кції підвищеної чутливості, які включали висипання на шкірі та медикаментозну лихоманку, кашель або бронхоспазм, біль у горлі та ротовій порожнині, що міг бути викликаний інфекцією *Candida albicans* або підвищеною чутливістю

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до колістиметату натрію (колістину) або до поліміксину В.

Визначена добова доза (DDD): Парентерально/інгаляційно - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	КОЛІСТИН АЛВОГЕН	Кселлія Фармасьютікалс АпС (повний цикл виробництва)/Кселлія Фармасьютікалс Лтд (тестування), Данія/Угорщина	пор. д/р-ну д/ін'єк. або інфуз. у фл.	1000000МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КОЛІСТИН АЛВОГЕН	Кселлія Фармасьютікалс АпС (повний цикл виробництва)/Кселлія Фармасьютікалс Лтд (тестування), Данія/Угорщина	пор. д/р-ну д/ін'єк. або інфуз. у фл.	1000000МО	№10	2500,00	34,72/€
	КОЛІСТИН АЛВОГЕН	Кселлія Фармасьютікалс АпС (повний цикл виробництва)/Кселлія Фармасьютікалс Лтд (тестування), Данія/Угорщина	пор. д/р-ну д/ін'єк. або інфуз. у фл.	2000000МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КОЛІСТИН АЛВОГЕН	Кселлія Фармасьютікалс АпС (повний цикл виробництва)/Кселлія Фармасьютікалс Лтд (тестування), Данія/Угорщина	пор. д/р-ну д/ін'єк. або інфуз. у фл.	2000000МО	№10	4100,00	34,72/€
	КОЛОМІЦИН ІН'ЄКЦІЯ	Пен Фармасьютікал Сервісез Лімітед (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії)/Кселія Фармасьютікелз АпС (виробництво нерозфасованого	пор. д/р-ну д/ін'єк., інфуз. або інгал. у фл.	1000000МО	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	

	продукту, первинна упаковка, контроль серії)/Кселія Фармасьютікелз Лтд. (контроль серії), Велика Британія/Данія/Угорщина						
КОЛОМІЦИН ІН'ЄКЦІЯ	Пен Фармасьютікелз Сервісез Лімітед (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії)/Кселія Фармасьютікелз АпС (виробництво нерозфасованого продукту, первинна упаковка, контроль серії)/Кселія Фармасьютікелз Лтд. (контроль серії), Велика Британія/Данія/Угорщина	пор. д/р-ну д/ін'єк., інфуз. або інгал. у фл.	2000000МО	№10	1507,52	26,38/\$	

14.1.2. Протигрибкові засоби

- **Амфотерицин В (Amphotericin B) *** (див. п. 17.4.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Флуконазол (Fluconazole) * ** [окрім розчину]** (див. п. 17.4.3. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: застосовують дітям від народження для лікування кандидозів слизових оболонок (кандидоз ротоглотки, кандидоз стравоходу), інвазивних кандидозів, криптококового менінгіту та для профілактики кандидозних інфекцій у пацієнтів зі зниженим імунітетом^{ВООЗ, БНФ}; можна застосовувати як підтримуючу терапію для попередження рецидиву криптококового менінгіту^{ВООЗ, БНФ} дітей із високим ризиком його розвитку.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: у новонароджених флуконазол виводиться з організму повільно; кандидози слизових оболонок: діти віком від народження до 27 днів: доношені новонароджені віком від 0 до 14 днів: початкова доза становить 6 мг/кг/добу^{ВООЗ, БНФ}, підтримуюча доза - 3 мг/кг/добу^{БНФ}, застосовувати кожні 72 год.^{ВООЗ, БНФ}; не перевищувати максимальну дозу, що становить 12 мг/кг кожні 72 год.^{ВООЗ, БНФ}; доношені новонароджені віком від 15 до 27 днів: початкова доза - 6 мг/кг/добу^{ВООЗ, БНФ}, підтримуюча доза - 3 мг/кг/добу^{БНФ}, застосовувати кожні 48 год.^{ВООЗ, БНФ}; не перевищувати максимальну дозу, що становить 12 мг/кг кожні 48 год.^{ВООЗ, БНФ}.

14.1.3. Противірусні засоби

14.1.3.1. Противірусні препарати прямої дії

- **Ацикловір (Aciclovir) *** (див. п. 17.5.2.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій, спричинених вірусом простого герпесу у новонароджених^{ВООЗ, БНФ} та немовлят віком до 3 місяців.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендований режим лікування для новонароджених та немовлят віком до 3 місяців з інфекцією, спричиненою вірусом простого герпесу, є 20 мг/кг/маси тіла кожні 8 год. протягом 21 днів при десимінованій формі та ураженні ЦНС або 14 днів при захворюванні, що обмежується шкірою та слизовими оболонками^{ВООЗ, БНФ}.

- **Зидовудин (Zidovudine) *** (див. п. 17.5.3.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: профілактика трансплацентарного інфікування плода^{БНФ, ВООЗ} та первинна профілактика ВІЛ інфекції у новонароджених^{ВООЗ}; в комбінації з іншими антиретровірусними препаратами для лікування ВІЛ-інфекції у дітей та дорослих.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: попередження трансмісії вірусу від матері до плода: новонародженим 2 мг/кг маси тіла р/ос, кожні 6 год, починаючи з перших 12 год. після народження і до досягнення віку 6 тижнів^{ВООЗ}; немовлятам, яким неможливо давати препарат р/ос, призначати в/в у дозі 1,5 мг/кг маси тіла протягом 30 хв. кожні 6 год.^{ВООЗ}.

- **Ламівудин (Lamivudine) *** (див. п. 17.5.3.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Невірапін (Nevirapine) *** (див. п. 17.5.3.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини^{ВООЗ}; для первинної профілактики ВІЛ-інфекції у новонароджених (у вигляді одноразової р/ос дози для дитини після народження); лікування ВІЛ-1-інфікованих пацієнтів у комбінації з іншими протиретровірусними засобами^{ВООЗ, БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування ВІЛ-1-інфікованих (в комбінації з іншими АРВ засобами): діти старше 6 тижнів, вагою 3-5,9 кг-початкова доза протягом 2-х тижнів 50 мг 1 р/добу, підтримуюча доза - 50 мг 2 р/добу; діти з масою 6-9,9 кг - початкова доза протягом 2-х тижнів 80 мг 1 р/добу, підтримуюча доза - 80 мг 2 р/добу; діти з масою 10-13,9 кг - початкова доза протягом 2-х тижнів 100 мг 1 р/добу, підтримуюча доза - 100 мг 2 р/добу; діти з масою 14-19,9 кг - початкова доза протягом 2-х тижнів 130 мг 1 р/добу, підтримуюча доза - 130 мг 2 р/добу; діти з масою 20-24,9 кг - початкова доза протягом 2-х тижнів 150 мг 1 р/добу, підтримуюча доза - 150 мг 2 р/добу; діти з

масою тіла 25 кг та більше - початкова доза протягом 2-х тижнів 200 мг 1 р/добу, підтримуюча доза - 200 мг 2 р/добу. Запобігання передачі ВІЛ від матері до дитини: матері рекомендована одноразова доза 200 мг якомога раніше на початку пологів^{ВООЗ}, немовлята - одноразово протягом 6 годин після народження, потім продовжуючи протягом 6-и тижнів дітям віком від народження до 6-и тижнів з масою тіла до 25 кг - 10 мг/день; дітям віком від народження до 6-и тижнів з масою тіла > 25 кг - 15 мг/день; у випадку вигодовування немовлята матерів, які не продовжували отримувати потрібну терапію після народження, повинні продовжувати отримувати невірапін до 1 тижня після припинення грудного вигодовування.

14.1.4. Інші антимікробні засоби

- **Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення (Immunoglobulin human normale ad usum intravascular) *** (див. п. 18.1.1.1. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: замісна терапія^{БНФ} : с-ми первинного імунодефіциту: вроджена агамаглобулінемія і гіпогаммаглобулінемія^{БНФ} ; загальний варіабельний імунодефіцит; тяжкий комбінований імунодефіцит; с-м Віскотта-Олдрича; транзиторна гіпогаммаглобулінемія у дітей; с-ми вторинного імунодефіциту: тяжкі рецидивуючі бактеріальні інфекції у дітей з ВІЛ/СНІД^{БНФ} ; цитопенії різного генезу (г. та хр.лейкоз, апластична анемія, стан після терапії цитостатиками); тяжкі форми бактеріально-токсичних та вірусних інфекцій у дітей^{БНФ} (включаючи хірургічні ускладнення, що супроводжуються бактеріемією і септикопемічними станами та при підготовці хірургічних хворих до операції); профілактика та лікування інфекцій у недоношених дітей із малою масою тіла при народженні; імуномодуюча терапія: ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура^{БНФ} ; с-м Гієна-Барре^{ВООЗ БНФ} ; с-м Кавасаки^{ВООЗ БНФ} ; гранулематоз Вегенера; дерматоміозит.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: швидкість введення для дітей повинна становити від 0,08 до 0,5 мл/хв залежно від маси тіла, при вродженій агамаглобулінемії або гіпогаммаглобулінемії, інших с-мах первинного дефіциту, включаючи тяжкий комбінований імунодефіцит, с-м Віскотта-Олдрича, загальний варіабельний імунодефіцит, транзиторну гіпогаммаглобулінемію у дітей - по 8-10 мл (0,4-0,5 г)/кг (мінімальна доза - 4 мл (0,2 г)/кг, максимальна - 16 мл (0,8 г)/кг) кожні 3-4 тижні, підбір дози здійснюється індивідуально залежно від вираженості інфекційного с-му; при замінній терапії при вторинному імунодефіциті - 4-8 мл (0,2-0,4 г)/кг кожні 3-4 тижні; при тяжких рецидивуючих бактеріальних інфекціях у дітей з ВІЛ/СНІД - 8 мл (0,4 г)/кг кожні 3-4 тижні; при цитопеніях різного генезу (г.та хр. лейкоз, апластична анемія, стан після терапії цитостатиками) - 4-8 мл (0,2-0,4 г)/кг/добу 4-5 дб або 20 мл (1 г)/кг/добу 2 доби; тяжкі форми бактеріально-токсичних та вірусних інфекцій у дорослих та дітей - 8 мл (0,4 г)/кг/добу 1-4 доби, ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура - 4-8 мл (0,2-0,4 г)/кг/добу 2-5 дб або 16-20 мл (0,8-1 г)/кг/добу в 1-шу добу та в разі необхідності на 3-тю добу; с-м Гієна-Барре, хр. запальна нейропатія (що демієлізує), загальна міопатія, гранулематоз Вегенера - 8 мл (0,4 г)/кг/добу 3-7 дб, при необхідності 5-денні курси лікування повторюються з інтервалами у 4 тижні, дерматоміозит - 20 мл (1 г) кг/добу 3-5 дб; с-м Кавасаки - 20-40 мл (1-2 г)/кг у рівних дозах за 2-5 дб або 40 мл (2 г)/кг одноразово; при профілактиці та лікуванні інфекцій у недоношених дітей з малою масою тіла при народженні - по 3-8 мл (0,15-0,4 г)/кг на 2-у-3-ю добу життя (на першому етапі) та на 2-й-3-й тиждень життя (на другому етапі).

14.2. Анестезуючі засоби

14.2.1. Анестезуючі засоби загальної дії

- **Тіопентал натрію (Thiopental) *** (див. п. 10.1.2.1. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: індукційний наркоз; у якості додаткового засобу для базисного наркозу^{ВООЗ,БНФ} (з подальшим використанням анальгетиків та міорелаксантів); у якості додаткового засобу для купірування судомних станів^{БНФ} різної етіології, у т.ч. зумовлених використанням засобів для місцевої анестезії; для зниження внутрішньочерепного тиску у пацієнтів з підвищеним внутрішньочерепним тиском під час проведення ШВЛ.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: середня доза р-ну 25 мг/мл становить 2^{БНФ}-7 мг/кг маси тіла, вводиться в/в повільно^{БНФ} за 10-15 сек.; при необхідності можливе повторне введення дози 2-7 мг/кг маси тіла через 1 хв.; максимальна доза не повинна перевищувати 7 мг/кг.

- **Кетамін (Ketamine) *** (див. п. 10.1.2.2. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: анестезуючий засіб (монотерапія) при проведенні нетривалих (короткочасних) діагностичних процедур і хірургічних втручань у дітей^{ВООЗ,БНФ}; проведення наркозу хворим, у яких перевага надається в/м введенню (наприклад, дітям).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: індивідуальна реакція залежить від дози, шляху введення та віку пацієнта; в/в введення: початкова доза 0,7-2 мг/кг, яка забезпечує хірургічну анестезію протягом 5-10 хв.^{ВООЗ, БНФ} приблизно ч/з 30 секунд після введення (хворим з високим ризиком, хворим, які знаходяться у стані шоку, рекомендована доза 0,5 мг/кг^{БНФ} маси тіла); в/м введення: початкова доза 4^{БНФ}-8 мг/кг маси тіла, яка забезпечує хірургічну анестезію протягом 12 - 25 хв. ч/з кілька хв. після введення; в/в крапл.500 мг кетаміну додати до 500 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду або 5 % р-ну глюкози, початкова доза: 80-100 крап./хв., підтримуюча доза: 20-60 крап./хв (2-6 мг/кг маси тіла на год).

14.3. Протисудомні та протиепілептичні лікарські засоби

- **Кислота вальпроєва (Valproic acid) *** (див. п. 6.2.2.5. розділу "НЕВРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: для тимчасового лікування епілепсії^{БНФ} у дітей як заміна р/ос застосування у разі тимчасової неможливості приймати ЛЗ р/ос; у вигляді монотерапії або в комбінації з іншими протиепілептичними препаратами для лікування генералізованої епілепсії^{БНФ ВООЗ} при таких типах нападів: клонічні, тонічні, тоніко-клонічні, абсанси, міоклонічні, атонічні та с-м Леннокса-Гасто; лікування фокальної епілепсії:^{БНФ} фокальні напади із вторинною генералізацією або без неї; профілактика повторних нападів після одного або більше нападів, ускладнених фебрильних судом, коли переривчаста профілактика бензодіазепінами неефективна.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: бажано приймати під час їжі, розділивши добову дозу на 2 прийоми - для дітей віком до 1 року, на 3 прийоми - для дітей віком від 1 року; середня добова доза для немовлят та дітей до 12 років: 30 мг/кг (перевагу при застосуванні слід надавати сиропу, оральному р-ну або гранулам пролонгованої дії); дітям віком до 3 років застосовувати вальпроат виключно у вигляді монотерапії; у разі неможливості прийому препарату р/ос рекомендоване в/в введення натрію вальпроату, розведеного 0,9 % р-ном натрію хлориду д/ін'єкцій:

- **Натрію оксибутират (Sodium oxybate) (див. п. 10.1.2.2. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")**

Показання для застосування ЛЗ: неінгаляційний наркоз, ввідний та базисний наркоз в хірургії, гінекології; інтоксикації, травматичні ураження ЦНС.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для наркозу дітям вводити в/в у дозі 100 мг/кг у 30-50 мл 5 % р-ну глюкози протягом 5-10 хв. або внутрішньо для ввідного наркозу у дозі 150 мг/кг у 20-30 мл 5 % р-ну глюкози за 40-60 хв. до операції.

- **Тіопентал натрію (Thiopental) * (див. п. 10.1.2.1. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")**

Показання для застосування ЛЗ: у якості додаткового засобу для купірування судомних станів^{БНФ} різної етіології, у т.ч. зумовлених використанням засобів для місцевої анестезії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: середня доза р-ну 25 мг/мл - 2^{БНФ}-7 мг/кг, вводиться в/в повільно^{БНФ} за 10-15 сек.; при необхідності можливе повторне введення дози 2-7 мг/кг через 1 хв.; максимальна доза не повинна перевищувати 7 мг/кг^{БНФ}; купірування судомних станів: середня доза - 75-125 мг (3-5 мл р-ну 25 мг/мл), препарат ввести якомога скоріше після початку судом, повторне введення може знадобитися з метою купірування судомних станів, спричинених застосуванням засобів для місцевої анестезії.

14.4. Гормональні лікарські засоби

- **Дексаметазон (Dexamethasone) * [ПМД] (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")**

Показання для застосування ЛЗ: замісна терапія первинної або вторинної (гіпофізарної) недостатності надниркових залоз, г. недостатність надниркових залоз^{БНФ}, перед операціями та у випадках серйозних травм або захворювань у пацієнтів зі встановленою наднирковою недостатністю або при невизначеному адренкортикальному запасі; вроджена гіперплазія надниркових залоз^{БНФ}; пухирчатка; тяжка мультиформна еритема (с-м Стівенса-Джонсона); ексфоліативний дерматит; кропив'янка, що не піддається стандартному лікуванню; фунгійний мікоз; дерматоміозити, БА; контактний дерматит; сироваткова хвороба; алергія на ліки; кропив'янка після переливання крові^{БНФ}, запальні захворювання очей, системні імунні захворювання, проліферативні зміни в очниці, імуносупресорна терапія при пересадці рогівки, г.токсичний бронхіоліт; вогнищевий або дисемінований туберкульоз легенів, набута або вроджена хр. апластична анемія; аутоімунна гемолітична анемія; г. лейкемія у дітей; набряк головного мозку внаслідок первинної або метастатичної пухлини головного мозку, трепанація черепа та ЧМТ, шок, туберкульозний менінгіт із^{БНФ} субарахноїдальною блокадою, трихінельоз із неврологічними симптомами або трихінельоз міокарда; кістозна пухлина апоневрозу або сухожилля (ганглія).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: діти: рекомендована доза при замісній терапії в/м 0,02 мг/кг маси тіла або 0,67 мг/м² площі поверхні тіла, розподілена на 3 дози, що вводиться кожного третього дня, або 0,008-0,01 мг/кг маси тіла або 0,2-0,3 мг/м² площі поверхні тіла/добу, діапазон початкових доз дексаметазону - 0,08-0,3 мг/кг/добу або 2,5 мг-10 мг/м² площі поверхні тіла/добу у 3-4 прийоми, недоношені новонароджені: наявні дані свідчать про тривалі неврологічні побічні ефекти після раннього лікування (до 96 год) недоношених дітей із хр. захворюванням легень при початкових дозах 0,25 мг/кг 2 р/день.

- **Гідрокортизон (Hydrocortisone) * [ПМД] (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")**

Показання для застосування ЛЗ: первинна або вторинна недостатність кори надниркових залоз^{ВООЗ БНФ}; г. недостатність кори надниркових залоз^{БНФ}; шок, нечутливий до традиційної терапії, коли є або підозрюється недостатність кори надниркових залоз; вроджена гіперплазія надниркових залоз^{БНФ}; негнійний тиреоїдит; г. неінфекційний набряк гортані^{БНФ}; ексфоліативний дерматит; пухирчатка, тяжка форма себореїного дерматиту, atopічний дерматит; БА; ПМД^{БНФ} контактний дерматит; р-ції гіперчутливості до ЛЗ; трансфузійні р-ції типу кропив'янки; тяжкі г. і хр. алергічні та запальні процеси з ураженням очей; колагенози^{БНФ}, під час загострення або як підтримуюча терапія в окремих випадках; аспіраційний пневмоніт; вроджена (еритроїдна) гіпопластична анемія; еритробластопенія (еритроцитарна анемія); г. лейкоз у дітей; г. алергічні стани (астматичний статус, анафілактичні р-ції^{ВООЗ}, укуси комах тощо), які не проходять після застосування епінефрину^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дітям, у т.ч. немовлятам, дозу ЛЗ можна зменшити, при визначенні дози керуватися більшою мірою тяжкістю стану і відповіддю пацієнта на лікування, а не його віком або масою тіла; добова доза повинна становити не < 25 мг.

- **Глюкагон (Glucagon) * (див. п. 7.2. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")**

Показання для застосування ЛЗ: лікування тяжких гіпоглікемічних р-цій, що можуть виникати у дітей, хворих на інсулінозалежний ЦД, які отримують інсулін^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять п/ш або в/м^{БНФ}; дітям з масою тіла до 25 кг або віком до 6-8 років вводять 0,5 мг; застосування дітям залежить від віку або/та маси тіла дитини.

- **Левотироксин натрію (Levothyroxine sodium) * (див. п. 7.3.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")**

Показання для застосування ЛЗ: як замісна терапія при гіпотиреозі^{ВООЗ БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: немовлятам добову дозу давати за один прийом за 30 хв. до першого годування; табл. розчинити у воді до отримання сусп., яку готувати безпосередньо перед прийомом препарату, та застосовувати після додавання ще невеликої кількості рідини.; для новонароджених і немовлят із вродженим

гіпотиреозом початкова рекомендована доза від 10 до 15 мкг/кг /добу^{ВООЗ,БНФ} протягом перших 3 міс., після цього доза коригується індивідуально залежно від клінічних показників та рівня ТТГ щитовидної залози; при замісній терапії гіпотиреозу у дітей: початкова доза - 12,5-50 мкг/добу; підтримуюча доза - 100-150 мкг/м² поверхні тіла.

- **Інсулін людини (Insulin human) *** (див. п. 7.1.1.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: ЦД^{ВООЗ, БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дозування інсуліну індивідуальне і визначається лікарем відповідно до потреб хворого; добова потреба в інсуліні залежить від стадії хвороби, маси тіла, віку, дієти, ступеню інсулінорезистентності та динаміки рівня глікемії.

14.5. Діуретики

- **Фуросемід (Furosemide) *** [ПМД] (див. п. 2.9.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: набряки при застійній СН^{ВООЗ,БНФ}, хр. застійній СН (якщо необхідне лікування із застосуванням діуретиків набряки), при ХНН, г. ниркова недостатність, набряки при захворюваннях печінки, підтримка форсованого діурезу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять в/в^{ВООЗ,БНФ}; для дітей рекомендована доза для парентерального введення складає 1 мкг/кг ваги тіла^{ВООЗ,БНФ}, але МДД не повинна перевищувати 20 мг.

- **Манітол (Mannitol) *** (див. п. 10.7. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: набряк мозку^{ВООЗ,БНФ}, церебральна гіпертензія, інтенсивна терапія судомного статусу, асцит^{БНФ}, г. печінкова та ниркова недостатність зі збереженою фільтраційною здатністю нирок та інші стани, які потребують посилення діурезу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати тільки за життєвими показаннями; дітям як діуретичний засіб вводять в/в краплинно з розрахунку 0,25 - 1 г/кг^{ВООЗ,БНФ} або 30 г/1 м² поверхні тіла протягом 2-6 год., при набряку мозку, підвищеному внутрішньочерепному тиску або глаукомі - 0,5 - 1 г/кг^{ВООЗ,БНФ} або 15 - 30 г/1 м² поверхні тіла протягом 30-60 хв.^{ВООЗ}, у дітей з низькою масою тіла достатньою є доза 0,5 г/кг.; при отруєннях у дітей проводять в/в інфузію в дозі до 2 г/кг маси тіла або 60 г/1 м² поверхні тіла; при нирковій недостатності з олігурією контрольна доза 0,2 г/кг вводиться протягом 3-5 хв.^{ВООЗ}, далі спостерігати за діурезом упродовж 1-2 год; якщо він становить понад 30 мл/год або підвищиться на 50 %, продовжувати введення препарату в/в повільно так, щоб діурез утримувався на рівні 40 мл/год.

14.6. Лікарські засоби для парентерального живлення

- **Глюкоза (Glucose) *** (див. п. 7.2. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: гіпоглікемія^{ВООЗ,БНФ}; парентеральне харчування; порушення, пов'язані з підвищеним розпадом білка внаслідок гіпоергозу; для запобігання порушенням водно-електролітного балансу під час оперативних втручань; інтоксикація; гіпер- та ізотонічна дегідратація; як розчинник інших сумісних розчинів ЛЗ.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в крап.^{ВООЗ,БНФ}; дітям доза залежить від віку, маси тіла, стану та лабораторних показників.

- **Олія соєва (Soybean oil) (див. п. 10.6.2. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")**

Показання для застосування ЛЗ: парентеральне харчування^{БНФ} (як джерело енергії і незамінних жирних кислот), поповнення дефіциту незамінних жирних кислот у хворих, не здатних до самостійного поповнення нормального балансу есенціальних жирних кислот шляхом р/ос споживання.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза - 0,5 - 4 г тригліцеридів/кг маси тіла на добу, що відповідає 2,5 - 20 мл/кг/добу, швидкість інфузії не повинна перевищувати 0,17 г тригліцеридів/кг на год (4 г/кг за 24 год), недоношеним новонародженим та новонародженим з низькою масою тіла бажано проводити інфузію 20% р-ном безперервно протягом доби; початкова доза, що становить 0,5-1 г тригліцеридів/кг/добу, може бути поступово збільшена до дози 2 г/кг/добу; при застосуванні новонародженим та дітям до 2 років р-н (у флак.) захищати від впливу світла до завершення введення.

14.7. Розчини електролітів

- **Кальцію глюконат (Calcium gluconate) *** [тільки таблетки] (див. п. 7.7.1.5. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: недостатність ф-ції паращитовидних залоз; підвищене виведення кальцію^{БНФ} з організму; як допоміжний засіб при алергічних захворюваннях та алергічних ускладненнях медикаментозної терапії; для зменшення проникності судин при патологічних процесах будь-якого генезу; паренхіматозний гепатит; токсичні ураження печінки; нефрит; гіперкаліємія^{ВООЗ, БНФ}; гіперкаліємічна форма пароксизмальній міоплеїї; шкірні захворювання (свербіж шкіри, екзема, псоріаз); як кровоспинний засіб; як антидот при отруєннях солями магнію, щавлевою кислотою або її розчинними солями, розчинними солями фтористої к-ти.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дітям застосовують тільки в/в^{ВООЗ,БНФ}; віком до 6 міс. - 0,1-1 мл; препарат перед введенням підігрівають до t°тіла, для введення р-ну у кількості < 1 мл разову дозу препарату доводять до відповідного об'єму (об'єм шприца) 0,9 % р-ном натрію хлориду або 5 % р-ном глюкози.

- **Натрію хлорид (Sodium chloride) *** (див. п. 10.5.5. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ", п. 16.2.1.1.7. розділу "ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: дітям при шоківій дегідратації^{ВООЗ,БНФ} (без визначення лабораторних показників); режим дозування коригується залежно від лабораторних показників; загальна добова доза залежить від водно-електролітного балансу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають в/в^{ВООЗ, БНФ}, ректально та зовнішньо^{БНФ}; дітям при шоківій дегідратації (без визначення лабораторних показників) вводять 20 - 30 мл/кг, у подальшому режим дозування

коригується залежно від лабораторних показників; загальна добова доза залежить від водно-електролітного балансу.

- **Натрію бікарбонат (Sodium bicarbonate) *** (див. п. 7.9.2.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: некомпенсований метаболічний ацидоз^{ВООЗ} при інтоксикаціях різної етіології, тяжкому перебігу післяопераційного періоду, поширених та/або глибоких опіках, шоку, діабетичній комі, тривалій діареї, нестримному блюванні, г.масивних крововтратах, тяжкому ураженні печінки та нирок, тривалих гарячкових станах, тяжкій гіпоксії новонароджених. Абсолютним показанням є зниження рН крові нижче 7,2.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: 40 мг/мл р-н/для інфузій: дітям - в/в краплинно. Залежно від ступеня вираженості ацидозу препарат застосовувати нерозведеним або розведеним р-ном глюкози 5 % у співвідношенні 1:1; новонародженим вводити в/в у дозі 4-5 мл на 1 кг маси тіла, дітям інших вікових груп - у дозі 5-7 мл на 1 кг маси тіла.

- **Магнію сульфат (Magnesium sulfate) *** [ПМД] (див. п. 10.5.5. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Калію хлорид (Potassium chloride)** (див. п. 10.5.5. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

14.8. Серцево-судинні лікарські засоби

14.8.1. Адреноміметики

- **Епінефрин (Epinephrine) *** (див. п. 2.13.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: АР негайного типу: анафілактичний шок^{ВООЗ,БНФ}, що розвинувся при застосуванні ЛЗ чи сироваток або при контакті з алергенами; БА^{ВООЗ} - купірування нападу; артеріальна гіпотензія різного генезу (постгеморагічна, інтоксикаційна, інфекційна), гіпоглікемія унаслідок передозування інсуліну, асистолія, зупинка серця, подовження дії місцевих анестетиків, АВ-блокада III ступеня, що гостро розвинулась

Спосіб застосування та дози ЛЗ: асистолія у немовлят: в/в повільно 10-30 мкг/кг маси тіла кожні 3-5 хв.; анафілактичний^{БНФ} шок: п/ш або в/м 10 мкг/кг маси тіла (максимально - до 0,3 мг); при необхідності введення повторюють ч/з кожні 15 хв. (до 3 разів); бронхоспазм: п/ш 10 мкг/кг маси тіла (максимально - до 0,3 мг), при необхідності введення повторюють кожні 15 хв. (до 3-4 разів) чи кожні 4 год.

- **Добутамін (Dobutamine)** (див. п. 2.13.2. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: СН з низьким серцевим викидом, пов'язана з інфекційно-алергічним шоком, кардіогенним шоком та операціями на серці^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: можна застосовувати для лікування дітей будь-якого віку; починати введення рекомендовано з дози 2,5-5 мкг/кг/хв^{БНФ}, поступово підвищуючи її максимально до 15 мкг/кг/хв залежно від ефекту; є свідчення про те, що мінімальна ефективна доза для дітей вища, а максимальна переносима доза - нижча, ніж для дорослих, тому бути обережними при призначенні дітям високих доз.

14.8.2. Допамінергічні агоністи

- **Допамін (Dopamine) *** (див. п. 2.13.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

14.8.3. Серцеві глікозиди

- **Дигоксин (Digoxin) *** [ПМД] (див. п. 2.12. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: застійна СН^{БНФ, ВООЗ}, мерехтіння та тріпотіння передсердь (для регуляції ЧСС); суправентрикулярна пароксизмальна тахікардія^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в; недоношеним новонародженим - 0,02-0,03 мг/кг^{ВООЗ,БНФ}; доношеним новонародженим - 0,03-0,04 мг/кг^{ВООЗ,БНФ}.

14.8.4. Блокатори кальцієвих каналів

- **Верапаміл (Verapamil) *** ** (див. п. 2.3.3. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: пароксизмальна надшлуночкова тахікардія^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в^{БНФ}; при тахікардії, пов'язаній із СН, перед в/в введенням необхідно провести дигіталізацію; лікування призначати тільки за життєвими показаннями, якщо немає альтернативного лікування; рідко після в/в застосування у новонароджених та грудних дітей спостерігалися тяжкі гемодинамічні порушення, деякі з них були летальними; доза для новонароджених - 0,75-1 мг, дітям грудного віку - 0,75 - 2 мг.

14.8.5. Блокатори М-холінорецепторів

- **Атропін (Atropine) *** (див. п. 3.3.3. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ", п. 15.4.1. розділу "ОФТАЛЬМОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: пілороспазм, г.панкреатит, спазми кишечника, сечовивідних шляхів, БА, брадикардії,^{ВООЗ, БНФ} як наслідок підвищення тонузу блукаючого нерва, для зменшення секреції слинних^{ВООЗ}, шлункових, бронхіальних, іноді - потових залоз; перед наркозом і операцією та під час хірургічної операції; як специфічний антидот при отруєннях холіноміметичними сполуками і антихолінергічними^{ВООЗ, БНФ} (у тому числі фосфорорганічними) речовинами.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: п/ш, в/м, в/в; для дітей віком до 6 місяців вища разова доза 0,02 мг.

14.9. Лікарські засоби коагуляційної дії

14.9.1. Синтетичний аналог вітаміну К

- **Фітоменадіон (Phytomenadione) *** (див. п. 13.7.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: геморагічні явища у новонароджених^{ВООЗ, БНФ}, профілактика та лікування кровотеч, що зумовлені зниженням згортанням крові, спричиненим гіповітамінозом або авітамінозом К₁, лікування геморагічних ускладнень; гіпокоагуляція після тривалої обструкції жовчних шляхів, кишкові захворювання, що пов'язані з порушенням всмоктування, після тривалого лікування а/б, сульфаніламидами і саліцилатами.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: здорові новонароджені 36 тижнів гестаційного віку або старші – 1 мг ^{ВООЗ БНФ} ін'єкції в/м при народженні або незабаром після народження ^{ВООЗ БНФ}; або 2 мг р/ос при народженні або незабаром після народження, після р/ос дози вводити додаткову дозу 2 мг у віці 4 - 7 днів, ще 2 мг р/ос дози вводити ч/з 1 міс. після народження, у винятково формульній групі немовлят третя р/ос доза може бути відмінена; недоношені новонароджені (< 36 тижн. гестаційного віку та масою тіла 2,5 кг або >) та особливо схильні до ризику народження у термін (родова асфіксія, обструкційна жовтяниця, нездатність ковтати, введення антикоагулянтів або протиепілептичних засобів матері) 1 мг ін'єкції в/м або в/в при народженні або незабаром після народження ^{ВООЗ БНФ}, кількість подальших доз та їх частота повинні бути визначені на основі стану коагуляції; недоношені новонароджені (< 36 тижнів гестаційного віку та масою тіла <2,5 кг): 0,4 мг/кг (еквівалентно 0,04 мл/кг) ін'єкції в/м або в/в при народженні або незабаром після народження, ця парентеральна доза не повинна бути перевищена; кількість подальших доз та їх частота повинні бути визначені на основі стану коагуляції.

14.9.2. Інгібітор фібринолізу

- **Кислота амінокапронова (Aminocaproic acid)** (див. п. 13.7.4.1. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: різні види гіперфібринолізу, у т. ч. пов'язані із застосуванням тромболітичних препаратів та масивним переливанням консервованої крові, як симптоматичний засіб при кровоточивості, зумовленій тромбоцитопенією та якісною неповноцінністю тромбоцитів (дисфункціональна тромбоцитопенія); профілактика і лікування паренхіматозних кровотеч, геморагій зі слизових оболонок, профілактика кровотеч при операціях на печінці, легенях, підшлунковій залозі.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: діти: помірно підвищення фібринолітичної активності - для дітей віком до 1 року разова доза - 0,05 г/кг маси тіла (але не більше 1 г), добова доза для дітей: віком до 1 року - 3 г, г. кровотечі (у т.ч. гастроінтестинальні): добова доза для дітей при г. крововтратах: віком до 1 року - 6 г.

14.10. Препарати крові, плазми та плазмозамінники

- **Фактор коагуляції крові людини VIII (Human Blood Coagulation Factor VIII)** * (див. п. 13.7.1. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Фактор IX коагуляції крові людини (Coagulation factor IX)** * (див. п. 13.7.1. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

14.11. Вітаміни

- **Кислота аскорбінова (Ascorbic acid)** ^[ПМД] [тільки таблетки] (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")

Показання для застосування ЛЗ: гіповітаміноз С ^{БНФ}; цинга ^{ВООЗ БНФ}, кровотечі, геморагічні діатези, різні інтоксикації та інфекційні захворювання, передозування антикоагулянтів, різні дистрофії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дітям до 12 років - в/в по 50-100 мг/добу (1-2 мл 5 % р-ну), в добовій дозі 5-7 мг/кг маси тіла у вигляді 5 % р-ну (0,5-2 мл), добова доза для дітей віком до 6 місяців - 30 мг, МДД для дітей до 12 років - 100 мг.

- **Холекальциферол (Colecalciferol)** ^[ПМД] (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")

Показання для застосування ЛЗ: профілактика рахіту ^{БНФ}; профілактика рахіту, у тому числі у недоношених новонароджених дітей; лікування рахіту ^{БНФ, ВООЗ} та остеомаліції; профілактика дефіциту вітаміну D₃ при мальабсорбції.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосувати р/ос, профілактика рахіту: рекомендована доза - 500 МО/добу, немовлятам в перший рік життя: 400-1000 МО/добу; профілактика рахіту у недоношених новонароджених дітей: близько 1000 МО вітаміну D₃/добу; профілактика дефіциту вітаміну D₃ при мальабсорбції - 3000-5000 МО/добу (р-н олійний - 2800-5000 МО/добу); лікування рахіту та остеомаліції - близько 1000-5000 МО віт D₃/добу; профілактичне призначення вітаміну D₃ з метою профілактики рахіту дітям раннього віку: доношені діти з групи ризику рахіту - рекомендована профілактична доза 500-1000 МО/добу, починаючи з 2-3-го тижня життя щоденно; недоношені діти - рекомендована профілактична доза 500-1000 МО/добу, починаючи з 2-3-го тижня життя; загальна рекомендована доза для лікування дефіциту вітаміну D₃ у дітей, у т. ч. немовлят становить 2-10 крап. (близько 1000-5000 МО вітаміну D₃/добу).

- **Ергокальциферол (Ergocalciferol)** ^[ПМД] (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")

Показання для застосування ЛЗ: профілактика та лікування гіповітамінозу D ^{ВООЗ, БНФ}, рахіту ^{ВООЗ, БНФ}; при порушеннях функцій паращитовидних залоз ^{ВООЗ} (тетанія).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо під час їжі; лікування рахіту - 1400-5600 МО/добу 30-45 днів; для профілактики рахіту (у новонароджених та дітей грудного віку) ЛЗ призначають вагітним та матерям-годувальницям, при вагітності з 30-32 тижнів препарат приймати у дозі 1400 МО/добу 6-8 тижнів, матерям-годувальницям приймати ергокальциферол у добовій дозі 500-1000 МО з перших днів годування і до початку призначення дитині; профілактика рахіту: фізіологічний метод - щоденно доношеним дітям, протягом 3-х років, за винятком 3-х літніх міс., по 500 МО/добу (курсова доза на рік - 180000 МО); курсовий метод - щоденно дитині призначати ергокальциферол по 1400 МО протягом 30 днів на 2-6-10-му місяці життя, у подальшому - до 3-річного віку по 2-3 курси на рік з інтервалами між ними у 3 місяці (курсова доза на рік - 180000 МО); недоношені діти: профілактична доза вітаміну D - 1000 МО, яку призначати щоденно протягом першого півріччя життя, у подальшому - по 1400-2800 МО на добу протягом місяця 2-3 р/крі з інтервалами між курсами 3-4 міс.

- **Піридоксин (Pyridoxine)** (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")

Показання для застосування ЛЗ: гіпо- та авітаміноз B₆ ^{ВООЗ, БНФ}; анемії (у т.ч. сидеробластна), лейкопенії, комплексне лікування ексудативного діатезу; себорейного та несеборейного дерматиту, оперізувального лишая, нейродерміту, неврити, невралгії, паркінсонізм, хв. Літгла, псоріаз, піридоксинзалежні судоми ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: гіповітаміноз B₆: 1-2 мг/кг/добу ^{ВООЗ, БНФ}, курс лікування - 2 тижні; піридоксинзалежні судоми: в/м або в/в струминно 50-100 мг (1-2 мл)/добу ^{БНФ}; в/в вводять зі швидкістю 50 мг/хв;

максимальні дози для дітей не встановлені; передозування препаратів групи ізоніазиду: на кожен 1 г передозованого препарату в/в 1 г (20 мл) піридоксину; якщо доза ізоніазиду невідома - 70 мг/кг маси тіла; максимальна доза - 5 г (100 мл).

14.12. Засоби еритропоетичної дії

- **Заліза гідроксид з полімальтозою (Ferric oxide polymaltose complexes)** ^[ПМД] (див. п. 13.1.1.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: лікування дефіциту заліза без анемії (латентного дефіциту заліза) та залізодефіцитної анемії (клінічно вираженого дефіциту заліза). ^{ПМД}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: крапл. оральн., сироп: немовлята віком до 1 року: залізодефіцитна анемія - 25-50 мг, латентний дефіцит заліза без анемії - 15-25 мг; тривалість лікування клінічно вираженого дефіциту заліза складає в середньому 3–5 місяців до нормалізації рівня Hb, тривалість лікування латентного дефіциту заліза без анемії - 1-2 міс; недоношені діти: 2,5-5 мг заліза/кг маси тіла/добу 3-5 міс.

- **Ціанокобаламін (Cyanocobalamin)** * (див. п. 20. розділу "ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ")

Показання для застосування ЛЗ: апластичні анемії у дітей, анемії аліментарного характеру, а також спричинені токсичними речовинами і ЛЗ, анемії, пов'язані з дефіцитом вітаміну В12, незалежно від причин дефіциту, ДЦП, захворювання печінки, хвороба Дауна; при дистрофії у дітей після перенесених інфекційних захворювань, при захворюваннях печінки, нейродермітах, фотодерматозах.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: тільки п/ш (застосовувати дозування 0,2 мг/мл), призначати по 15-30 мкг ч/з день.

- **Епоетин бета (Epoetin beta)** (див. п. 19.5. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛЮЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")

Показання для застосування ЛЗ: профілактика анемії у недоношених новонароджених, що народилися з масою тіла 750 - 1500 г до 34-го тижня вагітності. ^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: п/ш по 250 МО/кг маси тіла 3 р/тижд.; рекомендована тривалість лікування 6 тижнів ^{БНФ}; у недоношених новонароджених, яким проводились трансфузії до початку лікування епоетином бета, ефект лікування може бути менш вираженим, ніж у недоношених новонароджених, яким трансфузії не проводились.

14.13. Засоби для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту

- **Симетикон (silicones)** (див. п. 3.4. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування порушень ШКТ, що супроводжуються газоутворенням, при коліках ^{БНФ} у немовлят; в якості піногасника при інтоксикаціях поверхнево активними речовинами (пральні порошки або миючі засоби).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: 1 мл крапель оральних, емульсії містить симетикону 100 мг; симптоматичне лікування розладів ШКТ - немовлятам: 5-10 крап. на пляшку при кожному годуванні або 5-10 крап. перед кожним годуванням груддю (за допомогою ч. л.); в якості антидота при отруєнні поверхнево-активними речовинами - 1-4 мл одноразово; суспензія: дітям до 1 року при газоутворенні 20 мг (0,5 мл) ^{БНФ} застосовують перед годуванням, при необхідності дозу можна підвищити до 40 мг (1 мл).

14.14. Засоби для пероральної регідратації

14.14.1. Пероральні регідратаційні солі

Комбіновані препарати

- **Натрію хлорид + глюкоза + натрію цитрат + калію хлорид (Sodium chloride + glucose + sodium citrate + potassium chloride)** * ** ^[ПМД]

Показання для застосування ЛЗ: відновлення водно-електролітної рівноваги, корекція ацидозу при г. діареї легкого та помірного ступеню дегідратації (наприклад, втрата маси тіла у дітей 3-9%), при теплових ураженнях, що супроводжуються порушеннями водно-електролітного обміну; з профілактичною метою: теплові та фізичні навантаження, що призводять до інтенсивного потовиділення

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н приймати р/ос або вводити під наглядом лікаря ч/з назогастральний зонд; терапію препаратом розпочинати після початку діареї; готовий р-н приймати після кожного рідкого випорожнення, невеликими ковтками; лікування легкого та помірного зневоднення (замісна терапія): доза р-ну ЛЗ може становити 30–60 мл/кг маси тіла, доза залежить від маси тіла пацієнта і міри зневоднення та становить 50–100 мл р-ну препарату на 1 кг маси тіла, профілактика дегідратації (підтримуюча терапія) - необхідно розпочинати на початку діареї, діти з масою тіла до 10 кг: 50–100 мл р-ну препарату після кожного рідкого випорожнення; корекція дегідратації - ЛЗ приймати протягом перших 6–10 год у кількості, що вдвічі перевищує втрату маси при діареї, тобто якщо втрати становлять 400 г, кількість ЛЗ становить 800 мл, протягом терапії ЛЗ немає потреби у застосуванні інших рідин.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	РЕГІСОЛ ІС	Товариство з	пор. д/орал. р-ну у саше	3,5г/10г/2,9г/2,5г	№10	121,00	

		додатково відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	по 18,9г				
	РЕ-СОЛЬ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	пор. д/орал. р-ну по 18,9г у пак.	3,5г/10г/2,9г/2,5г	№10, №20	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	ІОНІКА	ФДС Лімітед, Індія	пор. д/орал. р-ну по 4,4г у пак.	0,52г/2,7г/0,58г/0,3г	№20	194,45	25,86/\$
	ІОНІКА	ФДС Лімітед, Індія	пор. д/орал. р-ну по 4,4г у пак.	0,52г/2,7г/0,58г/0,3г	№5	62,06	25,86/\$
	РЕГІДРОН	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює контроль якості і випуск серій)/ТОВ Рецифарм Паретс (виробник, що здійснює виробництво, пакування, контроль якості і випуск серій), Фінляндія/Іспанія	пор. д/орал. р-ну по 18,9г у пак.	3,5г/10г/2,9г/2,5г	№20	194,70	28,76/€
	РЕГІДРОН ОПТІМ	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює контроль якості і випуск серій)/Ой Медфайлз Лтд (виробник, що здійснює контроль якості)/ТОВ Рецифарм Паретс (виробник, що здійснює виробництво, пакування, контроль якості та випуск серій), Фінляндія/Фінляндія/Іспанія	пор. д/орал. р-ну по 10,7г у пак.	1,3г/6,75г/1,45г/0,75г	№20	відсутня у реєстрі ОБЦ	

14.15. Замісна сурфактантна терапія

- **Природні фосфоліпиди (Natural phospholipids)**

Фармакотерапевтична група: R07AA02- Легеневі сурфактанти. Природні фосфоліпиди.

Основна фармакотерапевтична дія: легеневий сурфактант поповнює недостатність ендogenous легеневого сурфактанта екзогенним, вкриває внутрішню поверхню альвеол; знижує поверхневий натяг у легенях, стабілізує альвеоли, попереджуючи їх злипання наприкінці експіраторної фази, сприяє адекватному газообміну, що підтримується протягом усього дихального циклу; рівномірно розподіляється у легенях і розповсюджується на поверхні альвеол; у недоношених немовлят відновлюється рівень оксигенації, що потребує зниження концентрації вдихуваного кисню у газовій суміші; знижує рівень смертності і респіраторних захворювань.

Показання для застосування ЛЗ: лікування респіраторного дистрес-синдрому (РДС) або захворювання гіалінових мембран у новонароджених^{БНФ}; профілактичне застосування недоношеним новонародженим з ризиком розвитку РДС^{БНФ} або з встановленою недостатністю сурфактанта.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: сусп д/інтратрах.введ. 80 мг/мл: вводять ендотрахіопульмонарним шляхом^{БНФ} новонародженим, у яких здійснюється контроль серцевого ритму, концентрації та сатурації кисню; вводиться із від'єднанням/без від'єднання дитини від апарату ШВЛ досвідченим спеціалістом; невідкладне лікування: початкова доза 100-200 мг/кг^{БНФ} (1,25-2,5 мл/кг), яку застосовують як разову дозу одразу, як тільки встановлено діагноз РДС; додаткові дози по 100 мг/кг (1,25 мл/кг) з інтервалом кожні 12 год.^{БНФ} можна вводити, якщо РДС є причиною подальшого погіршення дихальної функції новонародженого (максимальна загальна доза - 300-400 мг/кг); профілактика: разову дозу від 100 до 200 мг/кг^{БНФ} вводять якомога скоріше після народження (бажано в термін до 15 хв.), подальші дози по 100 мг/кг можна ввести через 6-12 год. після першої дози, потім пізніше, ч/з 12 год., якщо у новонародженого залишаються симптоми РДС та залежність від апарату ШВЛ (максимальна загальна доза - 300-400 мг/кг)^{БНФ}; сусп д/інтратрах.введ. 27 мг/мл: рекомендована доза - 5 мг/кг при 27 мг фосфоліпідів/мл, що еквівалентно 135 мг фосфоліпідів/кг, не більше, ніж 3 додаткові дози препарату можна вводити в перші 5 днів життя; немовлята можуть отримати не більше, ніж 3 додаткові дози препарату протягом перших п'яти днів життя.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сепсис, інтракраніальні геморагії, пневмоторакс; брадикардія, артеріальна гіпотензія, бронхопульмональна дисплазія, легеневі геморагії, зниження оксигенації; гіпероксія, неонатальний ціаноз, апное, відхилення від норми результатів електроенцефалограми, ускладнення ендотрахеальної інтубації, крововилив у шлуночки головного мозку, загальний; крововилив у шлуночки головного мозку, III та IV ступінь; перивентрикулярна лейкомаляція, судоми, гідроцефалія, ретролентальна фіброплазія, відкрита артеріальна протока, легенева інтерстиціальна емфізема, пневмоторакс, легенева кровотеча, перешкоди в ендотрахеальній трубці, респіраторний ацидоз, апное, пневмонія, некротичний ентероколіт, порушення функції легень, неонатальні розлади коагуляції, жовтяниця новонароджених, тромбоцитопенія, гіперкальціємія, гіпоглікемія, ацидоз, гіперкаліємія, ішемічний інсульт, енцефалопатія, епендиміт, менінгіт, зупинка серця, кардіомегалія, легеневе серце, гіпертрофована кардіоміопатія, пневмоперикард, набряк легень, стеноз клапана легеневої артерії, суправентрикулярна тахікардія, крововиливи, гіпертензія, асфіксія, бронхопульмональна дисплазія, гіпоксія, легенева гіпертензія, ентерит, кровотеча зі шлунково-кишкового тракту, шлунково-кишковий рефлюкс, заворот кишок, прорив кишечнику, пневмоперитонеум, збільшення печінки, целюліт, анурія, гідронефроз, гідроуретер, нефрокальциноз, затримка росту, неонатальна гіпотермія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату; застосування протипоказано для новонароджених з активною легеневою кровотечею.

Визначена добова доза (DDD): інтратрахеально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	КУРОСУРФ®	К'езі Фармацеутиці С.п.А. (виробництво in bulk, пакування, контроль та випуск серії)/К'езі Фармас'ютікелз ГмбХ (випуск серії)/Фідіа Фармацеутиці С.п.А./Г.Л. Фарма ГмбХ (вторинне пакування), Італія/Австрія/Італія/Австрія	сусп. д/інтратрах. введ. по 1,5мл у фл.	80мг/мл	№1	14506,47	32,24/€
	СУРФАКТАНТ-МБ	БЛЕС БІОЧЕМІКАЛС ІНК, Канада	сусп. д/інтратрах. введ. по 4мл у фл.	27мг/мл	№1	10896,53	25,94/\$
	СУРФАКТАНТ-МБ	БЛЕС БІОЧЕМІКАЛС ІНК, Канада	сусп. д/інтратрах. введ. по 5мл у фл.	27мг/мл	№1	15000,00	27,90/\$
	СУРФАКТАНТ-МБ	БЛЕС БІОЧЕМІКАЛС ІНК, Канада	сусп. д/інтратрах. введ. по 3мл у фл.	27мг/мл	№1	7783,24	25,94/\$

• **Берактант (Beractant)**

Фармакотерапевтична група: R07AA30 - легеневі сурфактанти. Комбінації.

Основна фармакотерапевтична дія: натуральний легеневий сурфактант, який отримано з легенів биків; знижує поверхневий натяг альвеолярних поверхонь протягом вдиху і стабілізує альвеоли проти спадання при зниженні транспульмонарного тиску; поповнює депо сурфактанту і відновлює поверхневу активність легень у дітей; поліпшує параметри тиску та об'єму легенів, еластичність легенів, а також оксигенацію.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика та лікування (невідкладна допомога) респіраторного дистрес-синдрому (РДС) (хвороби гіалінових мембран) у недоношених новонароджених ^{БНФ}: лікування РДС, підтвердженого рентгенологічно, у недоношених новонароджених, які потребують проведення ШВЛ; профілактика РДС у недоношених новонароджених з масою тіла < 1250 г з ризиком розвитку РДС. ^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: тільки інтратрахеальне введення; профілактика РДС: застосовують якнайшвидше, бажано у перші 15 хв життя ^{БНФ}; лікування (невідкладна допомога) РДС: застосовують якнайшвидше після початку проведення ШВЛ, бажано у перші 8 год. життя; протягом 48 год. може бути введено 4 ^{БНФ} дози з інтервалом не менше, ніж 6 год.; кожна доза - 100 мг фосфоліпідів (4 мл суспензії)/кг маси тіла дитини при народженні ^{БНФ}; застосовують інтратрахеально за допомогою катетера з отвором на дистальному кінці; катетер вставляють в інтубаційну трубку, швидко від'єднавши її від апарату ШВЛ, або через клапан для аспірації, не від'єднуючи інтубаційну трубку від апарату ШВЛ; або інстиляція здійснюється через додатковий просвіт двопросвітної інтубаційної трубки.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: коагулопатія, тромбоцитопенія, дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові; крововилив у надниркові залози, неадекватна секреція АДГ; гіперфосфатемія, непереносимість їжі; судоми; тахікардія, шлуночкова тахікардія, СН, зупинка серцевої діяльності, збільшений апікальний пульс, персистуючий фетальний кровообіг, повний аномальний дренаж легневих вен; артеріальна гіпотензія, артеріальна гіпертензія, аортальний тромбоз, повітряна емболія; консолідація легенів, виткання крові з інтубаційної трубки, погіршення стану після відлучення від апарату ШВЛ, респіраторна декомпенсація, підглоточний стеноз, параліч діафрагми, ДН, абдомінальне розтягнення, шлунково-кишкова кровотеча, перфорації кишечнику, заворот кишок, інфаркт кишки, стресова виразка, пахова грижа; печінкова недостатність; ниркова недостатність, гематурія; лихоманка, зрив компенсаторних р-цій.

Протипоказання до застосування ЛЗ: невідомі.

Визначена добова доза (DDD): Інтратрахеально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.
Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	СУРВАНТА	Еббві Інк., США	сусп. д/інтратрах. введ. по 8мл у фл.	25мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СУРВАНТА	Еббві Інк., США	сусп. д/інтратрах. введ. по 4мл у фл.	25мг/мл	№1	11111, 48	27,05/\$

14.16. Пробиотики

- **Біфідумбактерин (Bifidumbacterinum)**

Фармакотерапевтична група: A07FA - антидіарейні мікробні препарати.

Основна фармакотерапевтична дія: терапевтичний ефект визначають живі біфідобактерії, які мають антагоністичну активність проти широкого спектра патогенних і умовно патогенних м/о; нормалізує діяльність ШКТ, поліпшує обмінні процеси, стимулює функціональну діяльність травної системи, попереджає розвиток затяжних форм кишкових захворювань, підвищує неспецифічну резистентність організму.

Показання для застосування ЛЗ: для комплексного лікування дисбіозу кишечника, для попередження та лікування діареї, спричиненої: вірусними або бактеріальними інфекціями травного тракту, застосуванням протимікробних засобів (а/б або інших синтетичних протимікробних препаратів).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: немовлята і діти віком до 2 років: по 1 капс. 3 р/добу, якщо дитина не може проковтнути цілу капс., її необхідно розкрити і змішати вміст капс. з чайною ложкою рідини (чай, сік, підсолоджена вода), отримана суміш зберіганню не підлягає.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: реакції підвищеної чутливості, висипання, свербіж.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до компонентів препарату.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЛІНЕКС®	Лек Фармацевтична компанія д.д. (виробництво in bulk, пакування; випуск серії), Словенія	капс.тв. у фл., у бл.	1,2?107 КУО	№32, №8x2, №8x4, №8x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	

14.17. Антидоти

- **Налоксон (Naloxone) *** (див. п. 5.7.2. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЛІКУВАННІ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ")

Показання для застосування ЛЗ: передозування опіоїдів^{ВООЗ, БНФ}; для усунення пригнічення дихального центру^{ВООЗ, БНФ}, спричиненого опіоїдами; для відновлення дихання у новонароджених після введення породиці опіоїдних анальгетиків^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: відновлення дихання у новонароджених, матері яких отримували опіоїди: звичайна доза - 0,01 мг/кг маси тіла в/в^{ВООЗ, БНФ}, якщо при застосуванні цієї дози дихальна функція не відновлюється, введення можна повторити ч/з 2-3 хв, при неможливості в/в введення, вводять в/м у початковій дозі 0,01 мг/кг маси тіла^{БНФ}; діти: повне або часткове усунення пригнічення дихального центру, спричиненого опіатами: початкова доза - 0,01^{ВООЗ, БНФ} - 0,02 мг/кг маси тіла в/в протягом 2-3 хв до повного відновлення дихання і свідомості, г. передозування опіатів: ^{БНФ} рекомендована початкова доза - 0,1 мг/кг маси тіла в/в^{БНФ}, якщо бажаного ефекту не досягнуто, додатково у вигляді ін'єкції - 0,1 мг/кг маси тіла^{БНФ}, залежно від стану пацієнта може бути показана в/в інфузія; якщо в/в неможливе, препарат вводять в/м у початковій дозі 0,01 мг/кг маси тіла, розподілений на кілька введень.

14.18. Офтальмологічні лікарські засоби

- **Ацикловір (Aciclovir) *** (див. п. 15.1.3. розділу "ОФТАЛЬМОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")^{ВООЗ, БНФ.}

Показання для застосування ЛЗ: лікування кератитів, спричинених вірусом простого герпесу^{ВООЗ, БНФ.}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: видавлену стрічку мазі завдовжки 1 см закладати у нижній кон'юнктивальний мішок 5 р/добу^{ВООЗ, БНФ} з інтервалом приблизно у 4 год; лікування має продовжуватися принаймні ще 3 дні після загоєння оболонки^{БНФ}.

- **Декаметоксин (Decamethoxin) ^[ПМД]** (див. п. 16.1.2.2. розділу "ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: г. та хр. кон'юнктивіт, блефарокон'юнктивіт, гонобленорея, хламідіозне ураження слизової оболонки ока; для профілактики бленореї у новонароджених, призначають у передопераційний період і після офтальмологічних операцій для профілактики гнійно-запальних ускладнень.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для профілактики бленореї у новонароджених в очі закапують по 2 крап. безпосередньо після народження і через 2 год. після пологів; в інших випадках - 2-3 крап. у кон'юнктивальний мішок 4-6 р/добу до повного одужання.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ОФТАЛЬМОДЕК	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	крап. оч. по 5 мл, 10 мл у фл. у компл. з кришк.-крап.	0,2 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Мірамістин (Myramistin)** * ** [ГІМД] (див. п. 15.1.1.3. розділу "ОФТАЛЬМОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: профілактика офтальмії новонароджених, у тому числі гонококової і хламідійної; у комплексному лікуванні інфекційних процесів переднього відділу ока (блефарити, кон'юнктивіти, кератити, кератоувеїти), спричинених Гр(+) і Гр(-) бактеріями, хламідіями, грибами та вірусами, чутливими до мірамістину, травми ока, опіки очей (термічні і хімічні)

Спосіб застосування та дози ЛЗ: профілактика офтальмії у новонароджених - відразу після народження закапують по 1 крап. у кожне око 3 р. з інтервалом 2-3 хв.; лікування інфекційних процесів переднього відділу ока - 1-2 крап. 4-6 р/добу; тривалість лікування звичайно не перевищує 2 тижнів; лікування опіків очей дітям віком до 12 років - по 1-2 крап. 4-6 р/добу; лікування г. і хр. зовнішніх отитів дітям віком до 12 років - по 2-3 крап. 4-6 р/добу; лікування г. ринітів, інфекції слизової оболонки носа закапують дітям віком до 12 років - по 1-2 крап. у кожний носовий хід 4-6 р/добу, курс лікування - 7-14 днів.

14.19. Курареподібні лікарські засоби

- **Піпекуронію бромід (*Pipecuronium bromide*)** (див. п. 10.4.1. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: міорелаксація на фоні загальної анестезії для полегшення ендотрахеальної інтубації та проведення хірургічних втручань, що вимагають більш ніж 20-30-хв. міорелаксацію.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують в/в, безпосередньо перед введенням розчинити в 0,9 % р-ні натрію хлориду; для новонароджених та дітей віком до 1 року - 0,04-0,06 мг/кг маси тіла; зазначені дози забезпечують релаксацію при 25-35-хв. хірургічному втручанні; при необхідності подовження міорелаксації ще на 25-35 хв. препарат вводити повторно у дозі, що становить 1/3 від початкової дози.

15. ОФТАЛЬМОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

15.1. Протимікробні засоби

15.1.1. Антибактеріальні засоби

15.1.1.1. Антибіотики

15.1.1.2. Сульфаніламідні

15.1.1.3. Інші засоби

15.1.2. Протигрибкові засоби

15.1.3. Протівірусні засоби

15.2. Протизапальні засоби

15.2.1. Глюкокортикоїди

15.2.2. Нестероїдні протизапальні засоби

15.2.3. Комбіновані антибактеріальні засоби

15.3. Протиглаукомні засоби

15.3.1. Засоби, що покращують відтік внутрішньоочної рідини

15.3.1.1. Холіноміметики

15.3.1.2. Препарати простагландинів

15.3.2. Засоби, що пригнічують продукцію внутрішньоочної рідини

15.3.2.1. β -адреноблокатори

15.3.2.2. Інгібітори карбоангідази

15.4. Мідріатичні та циклоплегічні засоби

15.4.1. М-холіноблокатори

15.4.2. Адреноміметики

15.5. Деконгестанти та протиалергічні засоби

15.5.1. Антигістаміні засоби (H1-блокатори)

15.5.2. Стабілізатори мембран опасистих клітин

15.6. Місцеві анестетики

15.7. Інші лікарські засоби, що використовуються для лікування очних хвороб

15.7.1. Стимулятори регенерації рогівки

15.7.2. Зволожуючі та в'яжучі очні засоби (штучні сльози)

15.7.3. Засоби, що застосовуються при катаракті

15.7.4. Інші лікарські засоби, які використовуються в офтальмології

15.1. Протимікробні засоби

Більшість г. інфекційних захворювань ока, таких як блефарит, кон'юнктивіт, епісклерит, склерит, кератит та передній увеїт піддається місцевому лікуванню очними краплями та мазями. У ряді випадків може виникнути необхідність у додатковому загальному лікуванні. Для підвищення ефективності лікування необхідне виділення збудників шляхом посіву виділень або зішкрябу з боків повік та кон'юнктиви на поживні середовища з наступним визначенням чутливості мікроорганізмів до ЛЗ.

15.1.1. Антибактеріальні засоби

Бактеріальні інфекції зазвичай лікують із застосуванням очних крапель та мазей. При середньотяжкій та тяжкій формах внутрішньоочної інфекції можна застосовувати інші шляхи введення ЛЗ – підкон'юнктивальний, парабульбарний, ретробульбарний, інтравітреальний, парентеральний. Як правило, об'єм ЛЗ, який вводиться у такий спосіб, не перевищує 0,5-1 мл. Після ін'єкції терапевтична концентрація ЛЗ в порожнині ока значно перевищує концентрацію, що досягається при інстиляціях. Підкон'юнктивальні та парабульбарні ін'єкції показані для лікування захворювань та травм переднього відділу ока (склериту, кератиту, іридоцикліту, периферичного увеїту), ретробульбарні – для лікування патології заднього відділу (захворювань сітківки, судинної оболонки, зорового нерву, скловидного тіла).

15.1.1.1. Антибіотики

Хлорамфенікол має широкий спектр АБ-активності, тому його вважають препаратом вибору для лікування поверхневих інфекцій ока. Хлорамфенікол в краплях добре переноситься й при місцевому застосуванні не викликає токсичної дії на кровотворення. За протимікробною дією він порівнюється з тетрацикліном. Проте останніми роками у світовій практиці тетрацикліни поступилися місцем ефективнішим антибіотикам. Тетрацикліни активні до багатьох грампозитивних організмів, грамнегативних коків, кишкової палички, ентеробактеру, клібсієли. До них високочутливі збудники трахоми, спірохети, актиноміцети. Стійкі до тетрациклінів збудники

гонореї, синегнійна паличка, що продукують лактамазу. Широкий спектр дії мають також аміноглікозиди (гентаміцин, тобраміцин) та такі АБЗ, як фторхінолони (див. 15.1.1.3). Гентаміцин та фторхінолони також ефективні при інфекціях, викликаних синегнійною паличкою.

- **Хлорамфенікол (Chloramphenicol) *** (див. п. 17.2.8. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: S01AA01 - засоби, що застосовуються в офтальмології. Антибіотики. Хлорамфенікол.

Основна фармакотерапевтична дія: а/б широкого спектру дії: ефективний відносно багатьох Гр(+) та Гр(-) бактерій, рикетсій, спірохет, збудників трахоми, пситакозу, венеричної лімфогранульоми; діє на штами бактерій, стійких до пеніциліну, стрептоміцину, сульфаніламідів; слабоактивний відносно кислотостійких бактерій, синьогнійної палички, простіших та клостридій; стійкість м/о до препарату розвивається відносно повільно; у звичайних дозах діє бактеріостатично; механізм антимікробної дії препарату пов'язаний з порушенням синтезу білків м/о.

Показання для застосування ЛЗ: кон'юнктивіти, кератити, блефарити, викликані чутливими до препарату м/о БНФ

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим та дітям по 1 крап. в кожне око 3 р/день; курс лікування - 5-15 днів(залежить від характеру і вираженості захворювання, досягнутого терапевтичного ефекту)

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: місцеві р-ції, включаючи набряк повік, свербіж, подразнення очей та сльозотечу; АР, включаючи висипання, ангіоневротичний набряк, кропив'янку, свербіж; головний біль, запаморочення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: індивідуальна гіперчутливість до компонентів препарату .Захворювання шкіри (псоріаз, екзема, грибові ураження).

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	ЛЕВОМИЦЕТИН	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	крап. оч. по 10мл у фл.	0,25%	№1	15,74	
	ЛЕВОМИЦЕТИН	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	крап. оч. по 10мл у фл.	0,25%	№1	25,62	
	ЛЕВОМИЦЕТИН-ОЗ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	крап. оч. по 5мл у фл. з кр.-крап.	2,5мг/мл	№1	11,19	
	ЛЕВОМИЦЕТИН-ОЗ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	крап. оч. по 10мл у фл. з кр.-крап.	2,5мг/мл	№1	18,32	

- **Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) *** (див. п. 17.2.11. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: S03AA07 - засоби для застосування в офтальмології та отології; протимікробні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: група фторхінолонів; діє бактерицидно:впливає на синтез ДНК бактерій, шляхом пригнічення ДНК-гірази.; має високу активність *in vitro* відносно аеробних грампозитивних мікроорганізмів: Staphylococcus aureus (включаючи штами, чутливі або резистентні до метициліну); Staphylococcus epidermidis; Staphylococcus spp., інші коагулазо-негативні види Staphylococcus spp., включаючи S. haemolyticus та S. hominis; Corynebacterium spp.; Streptococcus pneumoniae; Streptococcus групи Viridans, аеробних грампозитивних мікроорганізмів виду Bacillus та аеробних грамнегативних мікроорганізмів: Acinetobacter spp.; Haemophilus influenzae; Pseudomonas aeruginosa; Moraxella spp. (включаючи M. catarrhalis), Acinetobacter calcoaceticus; Enterobacter aerogenes; Escherichia coli; Haemophilus parainfluenzae; Klebsiella pneumoniae; Neisseria gonorrhoeae;

Proteus mirabilis; *Proteus vulgaris*; *Serratia marcescens*. та інші : *Peptococcus spp.*, *Peptostreptococcus spp.*, *Propionibacterium acnes*, та *Clostridium perfringens* ; після місцевого застосування в око людини добре всмоктуються у тканини ока; системна абсорбція ципрофлоксацину після місцевого застосування в око низька.

Показання для застосування ЛЗ: виразки рогівки та поверхневі інфекції ока^{БНФ} та його придатків, викликані штамми бактерій, чутливими до ципрофлоксацину.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при виразці рогівки повинен застосовуватися з такими інтервалами, включаючи нічний час: у 1-й день - по 2 крап. у кон'юнктивальний мішок ураженого ока кожні 15 хв. протягом перших 6 год., потім - по 2 крап. кожні 30 хв. протягом першої доби; 2-й день - по 2 крап. у кон'юнктивальний мішок ураженого ока щогодини; з 3-го до 14-го дня - по 2 крап. кожні 4 год^{БНФ}; бактеріальні поверхневі інфекції ока та його придатків: стандартна доза 1-2 крап. у кон'юнктивальний мішок ураженого ока 4 р/день^{БНФ}; при тяжких інфекціях по 1-2 крап. кожні 2 год. у перші два дні протягом денного часу^{БНФ}; лікування триває 7 - 14 днів, залежно від тяжкості інфекції; дозування для дітей віком від 1 року є таким же, як і для дорослих.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ячмінь, риніт, гіперчутливість, дисгевзія, головний біль, запаморочення, відкладення на рогівці, відчуття дискомфорту в оці, гіперемія ока, кератопатія, інфільтрати рогівки, забарвлення рогівки, світлобоязнь, зниження гостроти зору, набряк повік, затуманення зору, біль в оці, сухість ока, припухлість очей, свербіж ока, відчуття стороннього тіла в оці, підвищена слезоточка, виділення з ока, утворення лусочок по краях повік, лущення повік, набряк кон'юнктиви, еритема повік, токсичність ока, точковий кератит, кератит, кон'юнктивіт, порушення ф-ції рогівки, дефект епітелію рогівки, диплопія, гіпестезія ока, астенія, подразнення ока, запалення ока, гіперемія кон'юнктиви, біль у вусі, гіперсекреція приносних пазух, нудота, діарея, біль у животі, дерматит, непереносимість препарату, відхилення від норми результатів лабораторних досліджень, дерматит, генералізований висип, токсичний епідермоліз, ексfolіативний дерматит, с-м Стівенса-Джонсона, кропив'янка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату або інших хінолонів або до будь-якого з компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ФЛОКСИМЕД	К.О. Ромфарм Компані С.Р.Л., Румунія	крап. оч./вуш., р-н, по 5мл у фл.-крап.	3мг/мл	№1	72,74	26,95/\$
	ФЛОКСИМЕД	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	крап. оч./вуш., р-н, по 5мл у фл.-крап.	3мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЦИПРОНЕКС®	Варшавський фармацевтичний завод Польфа АТ, Польща	крап. оч./вуш., р-н, по 5мл у фл.-крап.	0,3%	№1	58,58	27,90/\$
	ЦІЛОКСАН®	Алкон-Куврьюр, Бельгія	крап. оч./вуш. по 5мл у фл.-крап. "Дроп-тейнер®"	0,35%	№1	108,00	26,47/\$

- **Офлоксацин (Ofloxacin)** * [11МД] (див. п. 17.2.11. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: S01AE01 - засоби, що застосовуються в офтальмології. Протимікробні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: бактерицидна синтетична хімотерапевтична речовина, належить до групи фторхінолонів; у бактеріальних клітинах офлоксацин пригнічує ДНК-гіразу-фермент, потрібний для дуплікації і транскрипції бактеріальної ДНК; активний щодо грамегативних мікроорганізмів: *Acinetobacter calcoaceticus*; вид *Enterobacter*, включаючи *E. cloacae*; вид *Haemophilis*, включаючи *H. influenzae* та *H. aegyptius*; вид *Klebsiella*, включаючи *K. Pneumoniae*; вид *Moraxella*, *Morganella morganii*; вид *Proteus*, включаючи *P. Mirabilis*; вид *Pseudomonas*, включаючи *P. Aeruginosa*, *P. cepacia*, *P. fluorescens*; вид *Serratia*, включаючи *S. Marcescens* та грампозитивних мікроорганізмів: види *Bacillus*, *Corynebacterium*, *Micrococcus*, *Staphylococcus*, включаючи *S. aureus* та *S. Epidermidis*, *Streptococcus*, включаючи *S. Pneumoniae* (див. вище), *S. viridans* та *S. beta-haemolytic*, не піддається дегідратації ферментами бета-лактамазами та не змінюється ферментами хлорамфенікол-ацетилтрансферазою, аміноглікозид-аденілілазою та аміноглікозид-фосфорилазою.

Показання для застосування ЛЗ: оч. крап.: інфекції переднього сегмента ока, спричинені чутливими до офлоксацину патогенними м/о, такі як бактеріальні запалення кон'юнктиви, рогівки ока, країв повік і слізного мішка; ячмінь і виразка рогівки; як складова загальної терапії для лікування бактеріального ендофтальміту; оч. мазь: інфекції переднього сегмента ока, спричинені чутливими до офлоксацину патогенними м/о: хронічний кон'юнктивіт, кератит, виразка рогівки і хламідійні інфекції

Спосіб застосування та дози ЛЗ: крап. оч.: вводити в кон'юнктивальний мішок ураженого ока по 1 крап. 4 р/добу; мазь оч.: вводять у кон'юнктивальний мішок ураженого ока смужку мазі довжиною 1 см (еквівалентно 0,12 мг офлоксацину) 3 р/добу (при хламідійних інфекціях - 5 р/добу); лікування не повинно перевищувати 2 тижнів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперчутливість, у т. ч. ангіоневротичний набряк, задишка, анафілактичні реакції/шок, набряк ротоглотки і язика; запаморочення, парестезія; подразнення очей; дискомфорт в очах; свербіж або підвищена чутливість у місці застосування; випадки відкладень на рогівці відзначалися у зв'язку з використанням очних крапель, що містять фосфат, особливо при наявності в анамнезі захворювань

рогівки; кератит, кон'юнктивіт, затуманення зору, фотофобія, набряк очей, почервоніння ока, відчуття стороннього тіла, посилена сльозотеча, сухість очей, біль в очах, свербіж очей; свербіж повік; гіперемія ока, періорбітальний набряк (включаючи набряк повіки); нудота, сухість у роті; шлуночкова аритмія, пароксизмальна шлуночкова тахікардія типу «пірует», подовження QT на ЕКГ; набряк обличчя, періорбітальний набряк, с-м Стівенса - Джонсона, токсичний епідермальний некроліз; свербіж або підвищена чутливість у місці застосування; шум у вухах, вушний біль.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини або інших фторхінолонів чи до інших компонентів препарату; хронічні кон'юнктивіти небактеріального походження; інфекційні запалення переднього і заднього сегмента ока або допоміжних структур ока, а також зовнішнього слухового проходу або внутрішнього вуха, спричинені стійкими до офлоксацину штамми бактерій.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ОФЛОКСАЦИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	крап. оч. по 5мл у фл.-крап	3 мг/мл	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
II.	ОФЛОКСАЦИН ШТУЛЬН ЮД	Фарма Штульн ГмБХ, Німеччина	крап. оч. по 0,5мл у туб.-крап.	3 мг/мл	№5, №5x2, №5x6		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ФЛОКСАЛ®	Др. Герхард Манн, Хем.-фарм. Фабрик ГмБХ, Німеччина	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	0,3%	№1	121,00	
	ФЛОКСАЛ®	Др. Герхард Манн, Хем.-фарм. Фабрик ГмБХ, Німеччина	мазь оч. по 3г у тубі	0,3%	№1	127,00	
	ФЛОКСАНЕКСТ	ФАРМІГЕА С.П.А. (виробництво готової продукції, контроль якості, первинне та вторинне пакування, випуск серії)/Фарма Партнерс С.Р.Л. (альтернативне вторинне пакування)/Стерігенікс Італія С.П.А. (місце стерилізації первинної упаковки (за допомогою гамма-ви, Італія/Італія/Італія	крап. оч. по 10мл у фл.-крап.	3 мг/мл	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ

- **Левофлоксацин (Levofloxacin)** ^[ГМД] (див. п. 17.2.11. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: S01AE05 - Засоби, що застосовуються в офтальмології. Протимікробні засоби. Левофлоксацин.

Основна фармакотерапевтична дія: L-ізомер офлоксацину; а/б-активність має переважно L-ізомер; пригнічує активність бактеріальних топоізомераз II типу (ДНК-гіраз) та IV типу; дія левофлоксацину у Гр(-) бактерій спрямована переважно на ДНК-гіразу, а у Гр(+) бактерій - на топоізомеразу IV.

Показання для застосування ЛЗ: місцеве лікування бактеріальних зовнішніх оч. інфекцій, спричинених м/о, чутливими до левофлоксацину ^{БНФ, ГМД}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: по 1-2 крап. в уражене око (очі) кожні 2 год до 8 р/добу ^{БНФ}, протягом перших двох днів, а потім 4 р/добу ^{БНФ} з 3-го по 5-й день; зазвичай термін лікування становить 5 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: реакції гіперчутливості, включаючи зовнішні алергічні реакції, у тому числі висипання на шкірі; анафілаксія, включаючи анафілактичні реакції та анафілактичний шок; головний біль; печіння в очах, послаблення зору та поява тяжів слизу; матування повік, хемоз, папілярна реакція кон'юнктиви, блефарит із симптомами набряку та еритеми повік, дискомфорт в очах, свербіж в очах, біль в очах, кон'юнктивальна інфекція, гіперемія кон'юнктиви, кон'юнктивальні фолікули, сухість очей та фотофобія; подразнення ока, сльозотеча, поверховий точковий кератит; риніт, фарингіт; набряк гортані

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до левофлоксацину, підвищена чутливість до інших хінолонів або до будь-яких інших компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЛЕВОКСИМЕД	К.О. Ромфарм Компані	крап. оч., р-н,	5мг/мл	№1	126,35	28,57/\$

	С.Р.Л., Румунія	по 5мл у фл.-крап.				
ЛЕВОКСИМЕД	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	крап. оч., р-н, по 5мл у фл.-крап.	5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛЕВОНЕКСТ	РАФАРМ СА, Греція	крап. оч., р-н, по 5мл у фл.-крап.	5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
Л-ОПТИК РОМФАРМ	К.Т. РОМФАРМ КОМПАНІ С.Р.Л., Румунія	крап. оч., р-н, по 5мл у фл.	5мг/мл	№1	94,94	31,65/€
ОФТАКВІКС®	Сантен АТ (виробник, відповідальний за випуск серії)/НекстФарма АТ (виробник відповідальний за виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль якості), Фінляндія/Фінляндія	крап. оч. по 0,3мл у туб.-крап.	5 мг/мл	№10	191,16	32,29/€
ОФТАКВІКС®	Сантен АТ (виробник відповідальний за випуск серії)/Сантен Фармасьютикал (Китай) Ко. Лтд (виробник, відповідальний за виробництво in-bulk, первинне пакування)/НекстФарма АТ (виробник відповідальний за виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, к, Фінляндія/Китай/Фінляндія	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	5 мг/мл	№1	151,77	32,29/€
СИГНІЦЕФ	СЕНТІСС ФАРМА ПВТ. ЛТД., Індія	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	0,5 %	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Тобраміцин (Tobramycin)**

Фармакотерапевтична група: S01AA12 - засоби, що застосовуються в офтальмології. Протимікробні засоби. Антибіотики.

Основна фармакотерапевтична дія: швидкодіючий бактерицидний а/б з групи аміноглікозидів, що протидіє як Gr(+), так і Gr(-) м/о; виявляє бактерицидну дію за рахунок пригнічення комплексу поліпептидів і синтезу у рибосомах бактерій; під час клінічних досліджень продемонстровано, що тобраміцин є ефективним при поверхневих інфекціях ока проти Gr(+) бактерій: Bacillus megaterium, Bacillus pumilus, Corynebacterium accolens, Corynebacterium bovis, Corynebacterium macginleyi, Corynebacterium pseudodiphtheriticum, Kocuria kristinae, Staphylococcus aureus (чутливі до метициліну), Staphylococcus aureus (чутливі до метициліну); Gr(-) бактерій: Acinetobacter junii, Acinetobacter ursingii, Citrobacter koseri, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Moraxella osloensis, Neisseria perflava, Morganella morganii, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Serratia liquifaciens

Показання для застосування ЛЗ: лікування поверхневих бактеріальних інфекцій ока, таких як кон'юнктивіти, спричинені чутливими або умовно чутливими до препарату м/о.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: краплі: дорослі та діти від 1 року^{БНФ}, літні люди: по 1 крап. у кон'юнктивальний мішок ураженого ока кожні 4 год.; при важкому перебігу захворювання закапувати по 1-2 крап. у кон'юнктивальний мішок(-ки) ураженого ока (очей) кожну годину до поліпшення стану, частоту застосування препарату слід поступово зменшувати до повного припинення.; мазь: смужку довжиною 1,5 см у кон'юнктивальний мішок (мішки) 2 або 3 р/добу, при тяжкому перебігу кожні 3-4 год. протягом перших 2 днів і потім 2-3 р/добу до повного вилікування. Зазвичай лікування триває 7-10 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: підвищена чутливість, головний біль, відчуття дискомфорту в очах, гіперемія очей, кератит, абразія рогівки, погіршення зору, затуманення зору, еритема повік, набряк кон'юнктиви, набряк повік, біль в очах, сухість очей, виділення з очей, свербіж очей, підвищена сльозотеча, кропив'янка, дерматит, мадароз, лейкодерма, свербіж, сухість шкіри; анафілактичні р-ції; очна алергія, подразнення очей, свербіж повік; с-м Стівенса-Джонсона, мультиформна еритема, висипання.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до тобраміцину або до будь-якого з компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ТОБРАМІЦИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	3 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	ТОБРЕКС®	Алкон-Куврьюр, Бельгія	крап. оч. по 5мл у фл.-крап. "Дроп-Тейнер"	0,3%	№1	93,00	26,47/\$
	ТОБРЕКС® 2X	Алкон Кузі, С.А./Алкон-Куврьюр, Іспанія/Бельгія	крап. оч. по 5мл у фл.-крап. "Дроп-Тейнер"	3мг/мл	№1	93,00	26,47/\$
	ТОБРОСОПТ®	Варшавський фармацевтичний завод Польфа АТ, Польща	крап. оч., р-н, по 5мл у фл.-крап.	3 мг/мл	№1	66,79	26,72/\$
	ТОБРОЦИМ-НЕКСТ	БАЛКАНФАРМА-РАЗГРАД АД, Болгарія	мазь оч. по 5г у тубі	3 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Моксифлоксацин (Moxifloxacin) ** [ПМД]**

Фармакотерапевтична група: S01AE07- засоби, що застосовуються в офтальмології. Антибактеріальні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: фторхінолон IV покоління, активний проти широкого спектру Гр(+) та Гр(-) патогенних м/о, атипичних, та анаеробних м/о, що викликають інфекційні захворювання очей; пригнічує ДНК-гіразу і топоізомеразу IV, які необхідні для реплікації, відновлення та рекомбінації ДНК бактерій; резистентність до фторхінолонів, включаючи моксифлоксацин, виникає при хромосомних мутаціях у генах, що кодують ДНК-гіразу та топоізомеразу IV; у Гр(-) бактерій резистентність до моксифлоксацину може виникнути через мутації у *mar* (мультирезистентність) та *qnr* (резистентність до хінолонів) системах генів; перехресна резистентність з бета-лактамами, макролідами та аміноглікозидами малоімовірна через різницю у способі дії; ЧУТЛИВІ ВИДИ: аеробні Гр(+) м/о: види *Corynebacterium*, включаючи *Corynebacterium diphtheriae*, *Staphylococcus aureus* (чутливі до метициліну) *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus* групи *viridans*; аеробні Гр(-) м/о: *Enterobacter cloacae*, *Haemophilus influenzae*, *Klebsiella oxytoca*, *Moraxella catarrhalis*, *Serratia marcescens*, анаеробні мікроорганізми: *Propionibacterium acnes*, інші мікроорганізми: *Chlamydia trachomatis*; УМОВНО РЕЗИСТЕНТНІ ВИДИ: аеробні Гр(+) м/о: *Staphylococcus aureus* (стійкі до метициліну), *Staphylococcus*, коагулазо-негативні види (стійкі до метициліну); аеробні Гр(-) м/о : *Neisseria gonorrhoeae*; РЕЗИСТЕНТНІ МІКРООРГАНІЗМИ: аеробні Гр(-) м/о: *Pseudomonas aeruginosa*

Показання для застосування ЛЗ: бактеріальні кон'юнктивіти,^{БНФ, ПМД} спричинені чутливими штамми м/о.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: закапувати по 1 крап. в уражене око 3 р/добу^{БНФ}; зазвичай стан покращується протягом 5 днів, після чого лікування продовжувати ще наступні 2-3 дні^{БНФ}; тривалість лікування залежить від ступеня тяжкості захворювання.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: зменшення рівня Нв, головний біль, парестезія, біль в оці, подразнення ока, точковий кератит, с-м сухого ока, кон'юнктивальний крововилив, гіперемія кон'юнктиви, гіперемія ока, свербіж ока, аномальна чутливість очей, набряк повік, відчуття дискомфорту в оці, дефект епітелію рогівки, порушення з боку рогівки, забарвлення рогівки, кон'юнктивіт, блефарит, припухлість ока, біль у повіках, набряк кон'юнктиви, затуманення зору, зниження гостроти зору, астенія, порушення з боку повік, еритема повік, відчуття дискомфорту в носі, фаринголарингеальний біль, відчуття стороннього тіла (у горлі), дизгезія, блювання, підвищення рівня аланін-амінотрансферази, підвищення рівня гамма-глутамілтрансферази, запаморочення, підвищена чутливість, виразковий кератит, кератит, підвищена слюзотеча, фотофобія, виділення з очей, прискорене серцебиття, диспное, нудота, еритема, свербіж, висип, кропив'янка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до активної речовини, інших хінолонів або до будь-якого з компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МОКСИФЛОКСАЦИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	5мг/мл	№1	124,76	
	ЦИТОМОКСАН	ПАТ "Фармак", Україна	крап. оч., р-н по 5мл у фл.	5мг/мл	№1	100,00	
II.	ВІГАМОКС®	Алкон-Куврьюр, Бельгія	крап. оч. по 5мл у фл.-крап. "Дроп-Тейнер®"	5мг/мл	№1	138,00	27,19/\$
	МОНАФОКС	Фамар А.В.Е. Алімос Планта (пов. ц. вир-ва)/Фарматен С.А.(втор. пак., контр. і вип. серії), Греція	крап. оч., р-н по 5мл у фл.	5мг/мл	№1	102,14	26,67/\$

15.1.1.2. Сульфаніламід

Найбільш відомий протимікробний сульфаніламідний препарат сульфацетамід (сульфацил натрію) використовують як для монотерапії, так і в комбінації з антибіотиками для лікування інфекційних захворювань допоміжного апарату та переднього відділу ока. Сульфаніламіді також використовують при непереносності антибіотиків або стійкості до них мікробної флори. За активністю вони значно поступаються антибіотикам, проте більш ефективні відносно грампозитивних та грамнегативних коків, кишкової палички, шигел, клостридій, деяких простіших та інших. АБ-активність сульфаніламідів різко знижена при великій кількості гнійного виділення, тобто в присутності високих концентрацій параамінобензойної кислоти.

- **Сульфацетамід (Sulfacetamide)**

Фармакотерапевтична група: S01AB04 - засоби, що застосовуються в офтальмології. Сульфаніламіді.

Основна фармакотерапевтична дія: має бактериостатичний ефект щодо Gr(+) і Gr(-) бактерій - стрептококів, пневмококів, гонококів, кишкової палички, хламідій, актиноміцетів; механізм дії препарату зумовлений конкурентним антагонізмом з параамінобензойною кислотою (ПАБК) і конкурентним пригніченням дигідропротоатсинтези, що призводить до порушення синтезу тетрагідрофолієвої кислоти, необхідної для синтезу пуринових і піримідинових основ; внаслідок цього порушується синтез нуклеїнових к-т (ДНК та РНК) бактеріальних клітин і гальмується їх розмноження.

Показання для застосування ЛЗ: інфекційно-запальні захворювання очей, спричинені чутливими до дії препарату бактеріями: кон'юнктивіти, блефарити, гнійні виразки рогівки.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим - р-н 300 мг/мл по 2-3 крап. в уражене око 5-6 р/добу (через кожні 4-5 год); дітям від 2 міс. - р-н 200 мг/мл по 1-2 крап. в уражене око 4-5 р/добу. Курс лікування визначає лікар залежно від характеру та тяжкості захворювання; у середньому курс становить 7-10 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: бактеріальні та грибові виразки рогівки, місцеве подразнення, поколювання і печіння; неспецифічний кон'юнктивіт, гіперемія кон'юнктиви, приєднання вторинної інфекції і АР; рідкі летальні випадки через важкі реакції на сульфаніламіді, включаючи с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, фульмінантний гепатонекроз, агранулоцитоз, апластичну анемію та інші порушення крові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату та сульфациламідів в анамнезі.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	СУЛЬФАЦИЛ	ПАТ "Фармак", Україна	крап. оч. по 5мл у фл.	200мг/мл, 300мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СУЛЬФАЦИЛ	ПАТ "Фармак", Україна	крап. оч. по 10мл у фл.	200мг/мл	№1	17,50	
	СУЛЬФАЦИЛ	ПАТ "Фармак", Україна	крап. оч. по 10мл у фл.	300мг/мл	№1	18,50	
	СУЛЬФАЦИЛ-НАТРИЮ	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	крап. оч. по 10мл у фл.	300мг/мл	№1	15,74	

15.1.1.3. Інші засоби

- **Мірамістин (Miramistin) ***

Фармакотерапевтична група: Засоби, які застосовують в офтальмології та отології. Код АТХ S03D. Протинабрякові та інші препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа. Код АТХ R01A

Основна фармакотерапевтична дія: катіонна поверхнево-активна речовина з антисептичною дією; в основі дії лежить пряма гідрофобна взаємодія молекули з ліпідами мембран м/о, що призводить до їх фрагментації і руйнування; частина молекули мірамістину, занурюючись у гідрофобну ділянку мембрани, руйнує надмембранний шар, розпушує мембрану, підвищує її проникність для високомолекулярних речовин, змінює ензиматичну активність мікробної клітини, інгібує ферментні системи, що спричиняє пригнічення життєдіяльності м/о і їхній цитоліз; має високу вибірковість дії відносно м/о, оскільки не діє на мембрани клітин людини; цей ефект пов'язаний з іншою структурою клітинних мембран людини (значно більшою довжиною ліпідних радикалів, що різко обмежують можливість гідрофобної взаємодії мірамістину з клітинами); має виражену антимікробну дію відносно Gr(+) і Gr(-), аеробних і анаеробних, споруутворюючих і аспорогенних бактерій у вигляді монокультур і мікробних асоціацій, включаючи госпітальні штами з полірезистентністю до а/б; діє згубно на збудників захворювань, що передаються статевим шляхом, гонококи, бліди трепонеми, трихомонади, хламідії, а також на віруси герпеса, імунодефіциту людини; протирибкову дію на аскоміцети роду *Aspergillus* і роду *Penicillium*, дріжджові (*Rhodotorula rubra*, *Torulopsis gabrata* і т.д.) і дріжджеподібні (*Candida albicans*, *Candida tropicalis*, *Candida krusei* і т.д.) гриби, на дерматофіти (*Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton schoenleinii*, *Trichophyton violaceum*, *Epidermophyton Kaufman-Wolf*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporium gypseum*, *Microsporium canis* і т.д.), а також на інші патогенні гриби (наприклад *Pityrosporum orbiculare* (*Malassezia furfur*)) у вигляді монокультур і мікробних асоціацій, включаючи грибову мікрофлору з резистентністю до хіміотерапевтичних препаратів; під дією препарату знижується стійкість м/о до а/б; під дією мірамістину знижується стійкість м/о до а/б; має протизапальну і імуноад'ювантну дію, підсилює місцеві захисні р-ції, регенераторні процеси, активізує механізми неспецифічного захисту внаслідок модуляції клітинної і місцевої гуморальної імунної відповіді, чим прискорює одужання.

Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекційних процесів переднього відділу ока (блефарити, кон'юнктивіти, кератити, кератоувеїти), спричинених Gr(+) і Gr(-) бактеріями, хламідіями, грибами та вірусами, чутливими до ЛЗ, травми ока, опіки очей (термічні і хімічні), профілактика офтальмії новонароджених, у тому числі

гонококової і хламідійної, профілактика і лікування гнійно-запальних уражень очей у перед- і післяопераційному періоді.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування інфекційних процесів переднього відділу ока дорослим та дітям від 12 р. - закапують у кон'юнктивальний мішок по 2-3 крап., дітям до 12 р. - по 1-2 крап. 4-6 р/добу, тривалість лікування- не більше 2 тижн.; профілактика ускладнень у перед- і післяопераційному періоді - по 2-3 крап. 3 р/добу за 2-3 дні до операції; після операції - 3-5 днів по 1-2 крап. 3 р/добу; лікування опіків очей - після промивання ока великою кількістю води, проводять часті інстиляції (кожні 5-10 хв) протягом 1-2 год, для подальшого лікування препарат застосовують дорослим та дітям від 12 років - по 2-3 крап., дітям до 12 р. - по 1-2 крап. 4-6 р/добу; профілактика офтальмії у новонароджених - відразу після народження дитині закапують по 1 крап. препарату у кожне око 3 рази з інтервалом 2-3 хв.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості, короткочасне відчуття печіння, що зникає саме по собі через 5-20 секунд і не потребує припинення лікування.

Протипоказання до застосування ЛЗ: індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ОКОМІСТИН®	АТ "Фармак", Україна	крап. оч./вуш./наз. р-н по 5мл, 10мл у фл.	0,1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОФТАКЛІН	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	крап. оч. р-н по 5мл у фл.-крап.	0,1 мг/мл	№1	34,00	
	ОФТАМІРИН	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	крап. оч./вуш./наз. р-н по 5мл у фл.	0,1 мг/мл	№1	44,26	

Комбіновані препарати

- **Цинку сульфат + кислота борна (Zinc sulfat + boric acid) ****

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЦИБОРАТ-ОФТАН	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	крап. оч. по 10мл у фл.	2,5мг/20мг	№1	14,94	

15.1.2. Протигрибкові засоби

Грибкова інфекція рогівки зустрічається рідко, як правило, після перенесених сільськогосподарських травм, особливо в умовах жаркого та вологого клімату. Мікози з ураженням очної впадини розвиваються при розповсюдженні інфекції з навколоносових пазух. Розмноженню збудників сприяють похилий вік, ослаблення організму, імуносупресивні стани, тривалий прийом антибіотиків та гормонівмісних лікарських засобів. Розповсюдження інфекції гематогеним шляхом інколи призводить до метастатичного ендоефтальміту. ЛЗ для місцевого застосування в офтальмології не зареєстровані в Україні станом на 01.09.19 р.

15.1.3. Протівірусні засоби

Протівірусна терапія в офтальмології традиційно включає стимулятори імунітету (ІНФ, інтерфероногени) та протівірусні лікарські засоби (ацикловір).

- **Інтерферон альфа (Interferon alfa) ****

Фармакотерапевтична група: S01 - засоби, що застосовують в офтальмології.

Основна фармакотерапевтична дія: проявляє імуномодулюючу та антивірусну активність; взаємодіє з відповідними рецепторами на поверхні клітини, таким чином активуються процеси, які перешкоджають реплікації вірусів всередині клітини, уповільнюють проліферацію клітин; імуномодулююча дія: стимулює фагоцитарну активність макрофагів, а також цитотоксичну активність Т-клітин та природних клітин-кілерів.

Показання для застосування ЛЗ: вірусні ураження очей (герпетична інфекція).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: перед застосуванням розчиняють у 5 мл розчинника (0,1 % р-н ніпагіну): 1 мл готового р-ну містить 200 000 МО; закапують по 2 крап. у кон'юнктивальний мішок ураженого ока кожні 2 год., але не менше 6 р/добу; зі зменшенням симптомів захворювання об'єм інстиляцій можна зменшити до 1 крап.; курс лікування становить 7-10 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: у рідкісних випадках можливі місцеві р-ції, включаючи місцеві АР, набряк та гіперемія повік, свербіж, гіперемія обличчя, які зникають після відміни препарату.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ОКОФЕРОН®	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	крап. оч., пор. у фл. з розч. в пач.	1000000 МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ОКОФЕРОН®	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	крап. оч., пор. у фл. з розч. в бл.	1000000 МО	№1	135,74	

- **Ацикловір (Aciclovir) *** (див. п. 17.5.2.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: S01AD03 - засоби, що застосовуються в офтальмології. Противірусні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: антивірусний препарат, який має високу ефективність відносно вірусів простого герпесу I та II типів, та щодо вірусу вітряної віспи/оперізувального герпесу; токсична дія відносно клітин організму господаря низька; при потрапленні в інфіковану вірусом герпесу клітину ацикловір фосфорилується з утворенням активної сполуки - трифосфату ацикловіру, який діє як інгібітор субстрату вірусної ДНК-полімерази, що запобігає подальшому синтезу вірусної ДНК без впливу на нормальні процеси життєдіяльності клітини.

Показання для застосування ЛЗ: лікування кератитів, спричинених вірусом простого герпесу^{БНФ, ВООЗ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: у нижній кон'юнктивальний мішок закладають 1-см стрічку оч. мазі 5 р/добу^{БНФ, ВООЗ} ч/з кожні 4 год; лікування продовжувати ще 3 дні після загоєння оболонки^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: реакції гіперчутливості негайного типу, включаючи ангіоневротичний набряк, кропив'янка.; поверхнева точкова кератопатія; скороминуще пощипування в оці відразу після нанесення мазі, кон'юнктивіт; блефарит; місцеві подразнення і запалення (блефарит і кон'юнктивіт).

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до ацикловіру, валацикловіру або до інших компонентів препарату..

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЗОВІРАКС™	Джубілет ХоллістерСтіер Дженерал Партнершіп, Канада	мазь оч., по 4,5г у тубі	30 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

15.2. Протизапальні засоби

15.2.1. Глюкокортикоїди

Глюкокортикоїди (ГК) в офтальмології застосовують місцево та системно. Вони ефективні при лікуванні склериту, увеїту та захворювань очного дна, а також з успіхом застосовуються для зменшення проявів післяопераційного запалення.

Необхідно обережно відноситись до застосування місцевих ГК у випадках неуточненого діагнозу (наприклад, «почервоніння ока»), оскільки це може призвести до появи небезпечних ускладнень. По-перше почервоніння ока може бути викликане вірусом простого герпесу, який, в свою чергу, призводить до розвитку кератиту з дефектом поверхні рогівки. В цьому випадку застосування ГК приведе до погіршення його стану та зниження зору. По-друге, при тривалому застосуванні (>декількох тижнів) ГК в формі очних крапель розвивається стероїдна глаукома у хворих із схильністю до первинної відкритокутової форми глаукоми. Інстиляції ГК >3 міс можуть викликати розвиток помутніння в кришталіку – стероїдна катаракта. Найчастіше виникають наступні побічні ефекти: АР сповільненого типу, у схильних хворих – витончення рогівки та склери з наступною перфорацією.

Застосування комбінованих препаратів, що включають ГК та АБЗ, в окремих випадках недоцільне. Застосування цих лікарських засобів виправдане в післяопераційному періоді (екстракція кришталіка, антиглаукомні операції, травми ока), при лікуванні деяких видів неінфекційних кон'юнктивітів.

При системному застосуванні ГК ризик розвитку глаукоми невеликий, але існує висока імовірність (75%) виникнення стероїдної катаракти при щоденному прийомі протягом декількох місяців преднізолону в дозі ≥ 15 мг (та інших системних ГК в еквівалентних дозах). Такий ризик зростає при збільшенні тривалості прийому ГК.

- **Гідрокортизон (Hydrocortisone) *** ^[ГІМД] (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: S01BA02 - засоби, що застосовуються в офтальмології. Протизапальні засоби. Кортикостероїди.

Основна фармакотерапевтична дія: кортикостероїди взаємодіють з білковими рецепторами у цитоплазмі чутливих клітин з утворенням комплексу стероїд-рецептор, який після відповідних конформаційних змін потрапляє у ядро, інгібує синтез певних білків, відповідальних за хемотаксис та імунологічні реакції; за рахунок функціональних змін у лейкоцитах та макрофагах, відбувається інгібування запальних та АР; протизапальна ефективність гідрокортизону зумовлена інгібуванням фосфоліпази А2 - ферменту, необхідного для синтезу арахідонової кислоти, яка є попередником флогогенних речовин - простагландинів та лейкотрієнів; ступінь проникності гідрокортизону ацетату, яка значною мірою залежить від стану рогівки, суттєво зростає при запаленні

або ушкодженні слизових оболонок ока; абсорбується водянистою вологою, рогівкою, райдужкою, судинною оболонкою, циліарним тілом та сітківкою

Показання для застосування ЛЗ: гормональне лікування алергічних, неінфекційних, запальних захворювань кон'юнктиви, рогівки та переднього сегмента очей, а також повік (наприклад, блефариту).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: смужку мазі довжиною приблизно 1 см закладають в кон'юнктивальний мішок 2-3 р/добу; після досягнення бажаного ефекту достатньо 1-2 нанесень на добу; тривалість курсу лікування повинна бути не більше 2 тижнів; залежно від клінічної картини слід періодично контролювати ефективність лікування, внутрішньоочний тиск та стан рогівки для того, щоб визначити доцільність подовження або зміни терапії.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР, включаючи контактний дерматит, дерматокон'юнктивіт та екзему повік; у деяких пацієнтів, чутливих до дії кортикостероїдів, тривале лікування офтальмологічними препаратами кортикостероїдів без регулярної перевірки внутрішньоочного тиску може спричинити зростання внутрішньоочного тиску з пошкодженням зорового нерва, погіршенням гостроти зору або звуженням поля зору; екзофтальм, катаракта, розвиток додаткових інфекцій ока (наприклад вірусних, грибкових або бактеріальних інфекцій), поколювання, печіння, мокнучі пухирці після хірургічного видалення катаракти, трофічне ураження рогівки; під час місцевого застосування кортикостероїдів при захворюваннях, які призводять до потоншення рогівки або склери, можуть спостерігатися випадки перфорації. Існує інформація про уповільнення загоєння ран, птоз, мідріаз, затуманення зору.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-яких допоміжних речовин ЛЗ; епітеліальний герпетичний кератит або інші вірусні захворювання ока; бактеріальні інфекції ока; рани та виразкові ураження рогівки; відкрито- та закритокутова глаукома; оч. туберкульоз або грибкові інфекції ока.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ГІДРОКОРТИЗОН	ТОВ "Арпімед", Республіка Вірменія	мазь оч. по 3г у тубі	5 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГІДРОКОРТИЗОН	Фармзавод Ельфа А.Т., Польща	мазь оч. по 3г у тубі	5мг/г	№1	66,00	
	ГІДРОКОРТИЗОН-ПОС®	УРСАФАРМ Арцнайміттель ГмбХ, Німеччина	мазь оч. по 2,5г у тубі	10мг/г, 25мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Дексаметазон (Dexamethasone)** ^[ПМД] (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: S01BA01 - протизапальні засоби, що застосовуються в офтальмології. Кортикостероїди.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить протизапальну дію шляхом пригнічення адгезії молекул до клітин ендотелію судин, циклооксигенази I або II, та виділення цитокінів; в результаті цього зменшується утворення медіаторів запалення та пригнічується адгезія лейкоцитів до судинного ендотелію, запобігаючи т. ч. їх проникненню у запалені тканини ока; має виражену протизапальну дію зі зменшеними мінералокортикоїдними ефектами

Показання для застосування ЛЗ: лікування чутливих до стероїдів, неінфекційних запальних та алергічних станів кон'юнктиви, рогівки та переднього сегмента ока ^{БНФ, ПМД}, включаючи реакції запалення у післяопераційному періоді ^{ПМД}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при тяжкому або г. запаленні закапувати 1 - 2 крап. у кон'юнктивальний мішок(-ки) ураженого ока(очей) кожні 30-60 хв. у якості початкової терапії ^{БНФ}; у разі позитивного ефекту дозу зменшити до 1-2 крап. кожні 2-4 год.; далі дозу зменшити до 1 крап. 3-4 р/ день, якщо цієї дози достатньо, щоб контролювати запалення; при хр. запаленнях доза становить 1 - 2 крап. у кон'юнктивальний мішок(-ки) кожні 3-6 год. або частіше, якщо це необхідно; при алергії або незначному запаленні доза - 1-2 крап. кожні 3-4 год. до досягнення бажаного ефекту.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекція очей (загострення або вторинна); підвищена чутливість; с-м Кушинга, пригнічення функції надниркових залоз; дисгевзія; запаморочення, головний біль; відчуття дискомфорту в очах; кератит, кон'юнктивіт, сухість очей, забарвлення рогівки, фотофобія, затуманення зору, свербіж очей, відчуття стороннього тіла в очах, підвищена сльозотеча, незвичне відчуття в очах, утворення лусочок по краях повік, подразнення очей, гіперемія очей; субкапсулярна катаракта, глаукома, розлади поля зору; виразковий кератит, підвищення ВТ, зниження гостроти зору, ерозія рогівки, птоз повік, біль у очах, мідріаз; перфорація рогівки.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого з компонентів лікарського засобу; г. неліковані бактеріальні інфекції; коров'яча та вітряна віспа та інші вірусні інфекції рогівки та кон'юнктиви (крім кератиту, спричиненого *Herpes zoster*); грибкові захворювання структури ока або неліковані паразитарні інфекції ока; мікобактеріальні інфекції ока; г. епітеліальний кератит, спричинений *Herpes zoster* (дендритний кератит); г. неліковані гнійні бактеріальні інфекції ока; інфекції або травми, обмежені поверхневим епітелієм рогівки; не слід застосовувати після видалення стороннього тіла з рогівки без ускладнень.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДЕКСАМЕТАЗОН-БІОФАРМА	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	крап. оч. по 10мл у фл.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДЕКСАМЕТАЗОН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	крап. оч. по 5мл у фл.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДЕКСАМЕТАЗОН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	крап. оч. по 10мл у фл.	1 мг/мл	№1	18,64	
	ФАРМАДЕКС	ПАТ "Фармак", Україна	крап. оч. по 5мл у фл.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФАРМАДЕКС	ПАТ "Фармак", Україна	крап. оч. по 10мл у фл.	1 мг/мл	№1	30,00	
II.	ДЕКСАМЕТАЗОН ВФЗ	Варшавський фармацевтичний завод Польфа АТ, Польща	крап. оч., сусп. по 5мл у фл.-крап.	1 мг/мл	№1	46,29	27,72/\$
	ДЕКСАПОС	УРСАФАРМ Арцнайміттель ГмбХ, Німеччина	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДЕКСАФРІ	ЕКСЕЛВІЗІОН, Франція	крап. оч. по 0,4мл в однораз. конт. у саше	1 мг/мл	№5x4, №5x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МАКСИДЕКС®	Алкон-Куврьюр, Бельгія	крап. оч. по 5мл у фл.-крап. "Дроп-Тейнер®"	1 мг/мл	№1	76,50	26,47/\$
	МЕДЕКСОЛ	К.О. Ромфарм Компані С.Р.Л., Румунія	крап. оч., сусп. по 10мл у фл.-крап.	1 мг/мл	№1	53,40	24,60/\$
	ОФТАН® ДЕКСаМЕТАЗОН	Сантен АТ (виробник, відповідальний за випуск серії)/Мануфактурінг Пакагінг Фармака (МПФ) Б.В. (Альтернативний виробник, відповідальний за вторинне пакування)/НекстФарма АТ (виробник відповідальний за виробництво in bulk, первинну та вторинну упаковку, ко, Фінляндія/Нідерланди/Фінляндія	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОФТАН® ДЕКСаМЕТАЗОН	Сантен АТ (виробник, відповідальний за випуск серії)/Сантен Фармасьютикал (Китай) Ко. Лтд (виробник, відповідальний за виробництво in bulk, первинну упаковку)/НекстФарма АТ (виробник відповідальний за виробництво in bulk, первинну та вторинну упаковку, ко, Фінляндія/Китай/Фінляндія	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

15.2.2. Нестероїдні протизапальні засоби

В офтальмологічній практиці України з НПЗЗ використовують диклофенак та індометацин як альтернативні до ГК засоби. Ці ЛЗ не спричиняють характерних для ГК побічних ефектів, у зв'язку з чим їх застосовують у хворих з дефектом поверхні рогівки після перенесених травм ока та кератиту. У порівнянні з ГК мають менш виражену протизапальну дію.

- **Диклофенак (Diclofenac)** ^[ГМД] (див. п. 8.7.1.1. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: S01BC03 - засоби, які застосовують в офтальмології. Протизапальні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: НПЗЗ з вираженою протизапальною і анальгетичною дією; механізм дії пов'язаний з інгібуванням синтезу простагландинів; інгібує міоз під час операції з приводу катаракти; має протизапальну дію після хірургічних процедур, посттравматичних уражень та інших неінфекційних запальних станів; зменшує частоту та інтенсивність можливого цистоїдного макулярного набряку перед операцією з хірургічного видалення кришталика, ураженого катарактою та імплантації штучного кришталика.

Показання для застосування ЛЗ: Післяопераційний запальний процес після видалення катаракти та інших хірургічних втручань^{БНФ}. Профілактика перед- та післяопераційного кістозного набряку макули при видаленні кришталика та імплантації інтраокулярної лінзи^{БНФ}. Післятравматичні запальні процеси при непроникаючих травмах очного яблука (в комбінації з місцевими протиінфекційними засобами).^{БНФ} Зниження больового с-му після офтальмологічних операцій, напр., після рефракційної фототерапевтичної терапії або радіальної кератотомії.^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: тільки для закапування у кон'юнктивальний мішок ока; офтальмологічні операції та післяопераційні ускладнення- перед операцією: по 1 крап. до 5 разів протягом 3 год. до операції; після операції: у 1й день після операції - по 1 крап. 3 р/добу, з 2ї доби після операції - по 1 крап. 3-5 р/добу. Тривалість лікування визначає лікар. Зниження больового с-му після хірургічних втручань: за 30-60 хв. до операції - по 1 крап. в око, що оперується, у перші 10 хв. після операції - по 1 крап. 1-2 рази, у подальшому - 1 крап. 4 р/добу протягом 2 днів. Інші показання: застосовувати по 1 крап. 4-5 р/добу залежно від ступеня ураження. Загальна тривалість застосування очних крап. не повинна перевищувати 1-2 тижнів. Досвід застосування протягом більш тривалих періодів часу в даний час обмежений.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: риніт; р-ції гіперчутливості (місцеві або системні); крапчастий/виразковий кератит, біль в очах, подразнення слизової оболонки очей/повік, свербіж очей, гіперемія кон'юнктиви; підвищення ВОТ, набряк рогівки, набряк кон'юнктиви, нашарування на рогиці, фолікулярний кон'юнктивіт, відчуття стороннього тіла в оці, виділення з очей, утворення кірочок на краях повік, підвищене слъозовиділення, гіперемія повік; відчуття печіння в очах, перфорація рогиці, дефекти епітелію рогиці, помутніння рогиці, потоншення рогиці, алергічний кон'юнктивіт, алергічні захворювання очей, еритема повік, набряк та свербіж повік, нечіткість зору; загострення БА, задишка, кашель; кропив'янка, висипання, екзема, еритема, свербіж; порушення загоєння/рубцювання.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин; пацієнтам із нападами БА, кропив'янкою, г. ринітами, пов'язаними із застосуванням ацетилсаліцилової к-ти або інших препаратів, які інгібують синтез простагландинів; існує можливість перехресної чутливості до ацетилсаліцилової к-ти, похідних фенілоцтової к-ти й інших НПЗЗ.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДИФТАЛЬ®	ПАТ "Фармак", Україна	крап. оч. по 5мл у фл.	1мг/мл	№1	70,00	
II.	ДИКЛО-Ф	СЕНТІСС ФАРМА ПБТ. ЛТД., Індія	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛОДИФЕН	Е.І.П.І.Ко., Єгипет	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	1мг/мл	№1	66,45	27,02/\$
	КЛОДИФЕН	К.О. Ромфарм Компані С.Р.Л., Румунія	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	1мг/мл	№1	72,68	28,05/\$
	УНІКЛОФЕН	ТОВ "УНІМЕД ФАРМА", Словацька Республіка	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	1мг/мл	№1	77,70	33,00/€

• **Індометацин (Indometacin)**

Фармакотерапевтична група: S01BC01 - засоби, що застосовуються в офтальмології. Нестероїдні протизапальні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: знеболювальна і протизапальна дія; пригнічує простагландинсинтезу.

Показання для застосування ЛЗ: інгібування міозу під час хірургічного втручання; запобігання запальним процесам після хірургічних втручань з приводу катаракти або після операції на передній камері ока; усунення болю в очах після фоторефракційної кератектомії протягом перших декількох днів після операції.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: інгібування міозу під час операції: по 1 кр. 4 р./добу за день до операції і 4 р. по 1 кр. за 3 год. до операції; запобігання запаленню після оперативного втручання з приводу катаракти або після операції на передній камері ока: по 1 кр. 4-6 р./добу до повного зникнення симптомів захворювання, починаючи закапування за 24 год. до операції; усунення очного болю після фоторефракційної кератектомії: по 1 кр. 4 р./добу протягом перших декількох днів після операції.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: відчуття болю, печіння, світлочутливість, точковий кератит, слъозотеча, порушення чіткості зору, кератит, кон'юнктивальна гіперемія, очна гіперемія, набряк рогиці, набряк повік, перфорація рогиці, виразковий кератит, р-ції гіперчутливості, що супроводжуються свербіжем і почервонінням.

Протипоказання до застосування ЛЗ: Останній триместр вагітності, зареєстрована алергія на індометацин або препарати з подібною дією, наявні в анамнезі напади астми, спричинені аспірином або іншими НПЗЗ, активна пептична виразка шлунку та ДПК, тяжкі гепатоцелюлярні порушення, тяжка ниркова недостатність.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ІНДОКОЛЛІР® 0,1 %	Лабораторія Шовен/Др. Герхард Манн, Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ, Франція/Німеччина	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	1 мг/мл	№1	100,00	

15.2.3. Комбіновані антибактеріальні засоби

• **Дексаметазон + Гентаміцин (Dexamethasone + Gentamicin)**

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДЕКСА-ГЕНТАМІЦИН	УРСАФАРМ Арцнайміттель ГмбХ, Німеччина	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	1мг/5мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Тобраміцин + Дексаметазон (Tobramycin + Dexamethasone)**

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ТОБІФЛАМІН	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" (виробництво з продукції in bulk РАФАРМ С.А., Греція), Україна	крап. оч., сусп., по 5мл у фл.-крап.	3мг/1мг/мл	№1	75,00	
II.	МЕДЕТРОМ	К.О. РОМФАРМ КОМПАНІ С.Р.Л., Румунія	крап. оч., сусп., по 5мл у фл.-крап.	3мг/1мг/мл	№1	101,22	24,24/\$
	ТОБРАДЕКС®	Алкон-Куврьюр, Бельгія	крап. оч. по 5мл у фл.-крап. «Дроп Тейнер®»	3мг/1мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТОБРАДЕКС®	Алкон-Куврьюр, Бельгія	мазь оч. по 3,5г у тубі	3мг/1мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТОБРОСОПТ®-ДЕКС	Варшавський фармацевтичний завод Польфа АТ, Польща	крап. оч., сусп., по 5мл у фл.-крап.	3мг/1мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТОБРОЦИМ-НЕКСТ КОМБІ	РАФАРМ СА, Греція	крап. оч., сусп., по 5мл у фл.-крап.	3мг/1мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТОБРОЦИМ-НЕКСТ КОМБІ	БАЛКАНФАРМА-РАЗГРАД АД, Болгарія	мазь оч. по 5г у тубі	3мг/1мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Дексаметазон + Неоміцину сульфат + Поліміксин В (Dexamethasone + Neomycin sulphate + Polymyxin B)**

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДЕКСАПОЛ	Варшавський фармацевтичний завод Польфа АТ, Польща	крап. оч., сусп. по 5мл у фл.-крап.	1мг/3500МО/6000МО/мл	№1	69,29	27,72/\$
	МАКСИТРОЛ®	Алкон-Куврьюр,	крап. оч. по 5мл у фл.-	1мг/3500МО/	№1	102,00	26,47/\$

	Бельгія	крап. "Дроп Тейнер®"	6000МО/мл			
НЕЛАДЕКС	Е.І.П.І.Ко., Єгипет	крап. оч./вуш., сусп. по 5мл у фл.-крап.	1мг/3,5мг/6000МО/мл	№1	78,27	28,57/\$

15.3. Протиглаукомні засоби

Глаукома – група хр. захворювань ока, що характеризується підвищеним внутрішньочним тиском, атрофією зорового нерву та прогресуючим погіршенням зору. ЛЗ, що застосовуються для лікування глаукоми, за впливом на гідродинаміку ока можна поділити на дві групи: ЛЗ, що покращують відтік внутрішньочної рідини, та ЛЗ, що пригнічують її продукцію.

15.3.1. Засоби, що покращують відтік внутрішньочної рідини

15.3.1.1. Холіноміметики

ЛЗ цієї групи покращують відтік ВР через натяг трабекулярної сітки за рахунок скорочення війчатого м'язу. При цьому побічним ефектом даної групи ЛЗ є звуження зіниці (міоз).

- **Пілокарпін (Pilocarpine) ***

Фармакотерапевтична група: S01EB01 - засоби, що застосовують в офтальмології. Протиглаукомні та міотичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: належить до М-холіноміметичних засобів; механізм дії зумовлений збудженням периферичних М-холінорецепторів, що сприяє скороченню кругового м'язу райдужки та ціліарного м'язу, супроводжується звуженням зіниці і відкриттям кута передньої камери ока, покращенням відтоку ВР, що загалом спричиняє зниження ВТ та покращує трофічні процеси у тканинах ока; зниження офтальмотонуся сягає 3-4 мм рт. ст.

Показання для застосування ЛЗ: первинна та хр.відкритокутова глаукома^{ВООЗ}; г. напад закритокутової глаукоми^{ВООЗ}; хр.закритокутова глаукома^{БНФ} (до хірургічного втручання); вторинна глаукома^{БНФ} (в результаті тромбозу центральної вени сітківки, г. непрохідності артерії сітківки, атрофії зорового нерва, пігментної дегенерації сітківки, крововиливу в склоподібне тіло); необхідність звуження зіниці при передозуванні мідріатики, з діагностичною метою та під час хірургічних втручань^{ВООЗ, ПМД} (крім осіб з міопією високого ступеня).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: закапувати в кожне око по 1-2 крап. 2-4 р/добу^{БНФ}; при г. нападі закритокутової глаукоми призначають: протягом першої год - кожні 15 хв. по 1 крап.; протягом 2-3 год. - кожні 30 хв. по 1 крап.; протягом 4-6 год. - кожні 60 хв. по 1 крап^{ВООЗ}; далі - 3-6 р/добу до купірування нападу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: дисконфорт та печіння в оці; міоз, спазм акомодатії як наслідок стійкого міозу (у нічний період доби); зниження гостроти зору; нетривалий біль в оці; почервоніння; посилена сльозотеча; алергічний кон'юнктивіт та дерматит шкіри повік; спазм ціліарного м'язу; поверхневий кератит; відшарування сітківки; свербіж у ділянці очей; міопія; фотофобія; гіперемія кон'юнктиви; набряк та ерозія рогівки; посилення блоку зіниць; крововилив у склоподібне тіло, тривале лікування може призвести до фолікулярного кон'юнктивіту, контактного дерматиту повік, кератопатії, катаракти, оборотного помутніння кристалика, змін кон'юнктивальної тканини, головний біль у скронях та параорбітальних ділянках, тремор, запаморочення, гіперсалівація, нудота, блювання, діарея, підвищення АТ, артеріальна гіпотензія, брадикардія, зміни серцевого ритму, судинні порушення, підвищена пітливість, бронхоспазм, набряк легень, ринорея; при використанні систем з тривалим вивільненням препарату - розвиток толерантності.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до компонентів препарату, ірит, іридоцикліт, іридоциклічний криз, увеїт, цикліт, кератит та інші захворювання ока, при яких звуження зіниці небажане (після хірургічних втручань на оці для запобігання виникнення задніх синехій), г. запальні захворювання тканин ока, БА в анамнезі; парадоксальна р-ція на препарат при хронічній формі глаукоми.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	ПІЛОКАРПІН	АТ "Фармак", Україна	крап. оч. по 5мл у фл.	10мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПІЛОКАРПІН	АТ "Фармак", Україна	крап. оч. по 10мл у фл.	10мг/мл	№1	45,00	
	ПІЛОКАРПІНУ ГІДРОХЛОРИД	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	10мг/мл	№1	28,94	
	ПІЛОКАРПІНУ ГІДРОХЛОРИД	Товариство з обмеженою відповідальністю	крап. оч. по 10мл у фл.-	10мг/мл	№1	52,05	

	"Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	крап.				
--	--	-------	--	--	--	--

15.3.1.2. Препарати простагландинів

- **Латанопрост (Latanoprost)** ** [ПМД]

Фармакотерапевтична група: S01EE01 - протиглаукомні препарати та міотичні засоби. Аналоги простагландинів.

Основна фармакотерапевтична дія: ізопропіловий ефір активної речовини (проліки, які самі по собі є неактивними, але після гідролізу з утворенням кислоти латанопросту він стає біологічно активним); аналог простагландину F_{2α}, селективний агоніст проранітного рецептора FP, який знижує ВОТ, збільшуючи відтік водянистої вологи ока; зниження ВОТ починається приблизно ч/з 3-4 год після введення препарату, а максимальний ефект досягається ч/з 8-12 год; гіпотензивна дія триває протягом 24 годин.; ефективний як монотерапія, дія латанопросту є адитивною при застосуванні у комбінації з адренергічними агоністами (дипіваліл епінефрину), пероральними інгібіторами карбоангідази (ацетазоламід) та щонайменше частково адитивною при застосуванні з холінергічними агоністами (пілокарпін).; не впливає на продукування внутрішньоочної рідини, на гематофтальмологічний бар'єр, не спричиняє витікання флуоресцеїну в задньому сегменті псевдофакічних очей людини протягом короткострокового лікування.

Показання для застосування ЛЗ: зниження підвищеного ВТ у хворих з відкритокутовою глаукомою^{БНФ, ПМД} та підвищеним ВТ^{БНФ}; зниження підвищеного ВТ у дітей з підвищеним ВТ і дитячою глаукомою^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: по 1 крап. у кожне уражене око 1 р/добу, оптимально ввечері^{БНФ}; у разі пропуску дози продовжити лікування, прийнявши наступну дозу у звичайний час; частота введення не повинна перевищувати 1 р/добу, оскільки встановлено, що при частішому введенні ефективність препарату відносно його впливу на ВОТ знижується; можна застосовувати дітям з таким самим дозуванням, як і для дорослих^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: герпетичний кератит; головний біль; запаморочення; гіперпігментація райдужної оболонки; легка або помірна гіперемія кон'юнктиви; подразнення ока (печіння з відчуттям піску в очах, свербіж, печіння та відчуття стороннього тіла в оці); зміни у віях та пушковому волоссі повік (збільшення довжини, товщини, пігментації та кількості вій); точковий кератит, переважно безсимптомний; блефарит; біль в очах; фотофобія; кон'юнктивіт; набряк повік; сухість очей; кератит; нечіткість зору; макулярний набряк, включаючи кістозний макулярний набряк; увеїт; ірит; набряк рогівки; ерозія рогівки; періорбітальний набряк; трихіаз; дистихіаз; кіста райдужної оболонки; місцева шкірна реакція на повіках; потемніння пальпебральної шкіри повік; псевдопемфігоїд очної кон'юнктиви; періорбітальні зміни та зміни повік, що призводять до поглиблення складки повік; стенокардія; прискорене серцебиття; нестабільна стенокардія; бронхіальна астма; задишка; загострення бронхіальної астми; висипання на шкірі; свербіж; міалгія, артралгія; біль у грудях.

Противпоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЛАНОТАН®	ПАТ "Фармак", Україна	крап. оч., р-н по 2,5мл у фл.-кр.	0,05мг/мл	№1	160,00	
II.	АКІСТАН	Брусшеттіні С.Р.Л. (виробництво, пакування, контроль серії)/Стерідженікс Італія С.П.А. (стерилізація первинної упаковки)/Фармаселект Інтернешнл Бетелігангз ГмбХ (випуск серії), Італія/Італія/Австрія	крап. оч., р-н, по 2,5мл в п/е фл.-кр.	50 мкг/мл	№1, №3, №6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВІЗІЛАЙТ	Брусшеттіні с.р.л., Італія	крап. оч., р-н по 2,5мл у фл.	0,05 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЛАУМАКС®	АТ "Кевельт", Естонія	крап. оч., р-н по 2,5мл у фл.-крап.	50 мкг/мл	№1, №3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КСАПАТАН®	Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ, Бельгія	крап. оч., р-н по 2,5мл у п/е фл.	50 мкг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

КСАЛОПТИК	Таежун ФАРМ. Ко. Лтд (виробництво ГЛЗ, первинне пакування, контроль якості)/Фармацевтичний Завод "Польфарма" С. А. (вторинне пакування, контроль якості ГЛЗ та випуск серії), Корея/Польща	крап. оч., р-н по 2,5мл у фл.-кр.	50мкг/мл	№1	176,33	26,72/\$
ЛАПРОНЕКСТ	РАФАРМ СА (повний цикл виробництва)/ББФ Стерилізаційна сервіс (стерилізація первинної упаковки), Греція/Німеччина	крап. оч., р-н по 2,5мл у фл.-кр.	50 мкг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛАТАНОКС®	Ядран-Галенський Лабораторій д.д., Хорватія	крап. оч. по 2,5мл у фл.-кр.	50 мкг/мл	№1, №3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛАТАСОПТ	К.О. Ромфарм Компані С.Р.Л., Румунія	крап. оч., р-н по 2,5мл у фл.-кр.	0,05мг/мл	№1	139,97	28,05/\$
ЛАТОПРОСТ РТ	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд., Індія	крап. оч. по 2,5мл у фл.	50 мкг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МОНОПРОСТ	ЕКСЕЛВІЗІОН, Франція	крап. оч., р-н, по 0,2мл в однодоз. конт. у саше	50мкг/мл	№5x6	211,47	29,37/€
ПРОЛАТАН	СЕНТІСС ФАРМА ПВТ. ЛТД., Індія	крап. оч. по 2,5мл у фл.-кр.	50 мкг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
УНІЛАТ	ТОВ "Унімед Фарма", Словацька Республіка	крап. оч., р-н по 2,5мл у фл.-кр.	50 мкг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Травопрост (Travoprost)** ^(ГМД)

Фармакотерапевтична група: S01EE04 - засоби для застосування в офтальмології. Протиглаукомні препарати та міотичні засоби. Аналоги простагландинів.

Основна фармакотерапевтична дія: аналог F_{2a} простагландину, є його повним агоністом, який має високу селективність та високий ступінь спорідненості з FP-рецепторами простагландину, знижує ВТ, збільшуючи відтік ВР; зниження ВТ починається ч/з 2 год після введення препарату, а максимальний ефект досягається ч/з 12 год; зниженн ВОТ зберігається більше 24 год; належить до ефірних проліків, абсорбується через рогівку, де ізопропіловий ефір гідролізується до активної вільної к-ти.

Показання для застосування ЛЗ: для зниження підвищеного ВТ у хворих на очну гіпертензію або при відкритокутовій глаукомі ^{БНФ, ГМД} для зниження підвищеного ВОТ у дітей віком від 2 місяців до 18 років з очною гіпертензією або дитячою глаукомою.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: по 1 крап. в кон'юнктивальний мішок ураженого ока (очей) 1 р/добу; оптимальний ефект досягається при введенні дози ввечері ^{БНФ} якщо дозу пропущено, лікування продовжити з наступної запланованої дози; доза не повинна перевищувати 1 крап. в уражене око(очі) 1 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперчутливість, сезонна алергія; депресія, відчуття тривожності, безсоння; головний біль, запаморочення, порушення поля зору; гіперемія ока; гіперпігментація райдужної оболонки ока, біль в оці, відчуття дискомфорту в оці, сухість ока, свербіж ока, подразнення ока; ерозія рогівки, увеїт, ірит, запалення у передній камері ока, кератит, точковий кератит, світлобоязнь, виділення з ока, блефарит, еритема повік, періорбітальний набряк, свербіж повік, зниження гостроти зору, затуманення зору, підвищена сльозотеча, кон'юнктивіт, ектропіон, катаракта, утворення лусочок по краях повік, ріст вій; іридоцикліт, простий герпес, запалення ока, фотопсія, екзема повік, набряк кон'юнктиви, виникнення ореолу навколо джерела світла, фолікули кон'юнктиви, гіпестезія ока, трихіаз, мейбомейт, пігментація передньої камери, мідріаз, астенія, гіперпігментація вій, потовщення вій; макулярний набряк, періорбітопатія/ поглиблення борозни навколо повік дисгевзія; вертиго, шум у вухах; прискорене серцебиття; нерегулярність серцевого ритму; зниження частоти серцевих скорочень; біль у грудній клітці, брадикардія, тахікардія, аритмія; зниження діастолічного артеріального тиску, підвищення систолічного артеріального тиску, гіпотензія, гіпертензія; кашель, закладання носа, подразнення горла, диспное, астма, респіраторні порушення, біль у глотці, дисфонія, алергічний риніт, сухість носа, загострення астми, носова кровотеча; загострення пептичної виразки, розлади шлунково-кишкового тракту, запор, сухість у роті, діарея, біль у шлунку, нудота, блювання; гіперпігментація шкіри (навколо ока), знебарвлення шкіри, порушення структури волосся, гіпертрихоз, алергічний дерматит, контактний дерматит, еритема, висип, зміни кольору волосся, мадароз, свербіж, аномальний ріст волосся; м'язово-скелетний біль, артралгія; дизурія, нетримання сечі; астенія; підвищення рівня ПСА (простат-специфічного антигену)

Противпоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до інших компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЛАУТАН	АТ "Фармак", Україна	крап. оч. по 2,5мл у фл.	0,04 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ГЛАУТАН	ПАТ "Фармак", Україна	крап. оч. по 2,5мл у фл.	0,04 мг/мл	№1	205,00	
	ТРАВИНОР®	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" (виробництво з продукції in bulk " Рафарм С.А.", Греція), Україна	крап. оч. по 2,5мл у фл.-крап.	40мкг/мл	№1	160,50	
II.	ДАВЕРІС	К.О. Ромфарм Компані С.Р.Л., Румунія	крап. оч., р-н по 2,5мл у фл.-крап.	40мкг/мл	№1	190,09	28,17/\$
	ДАВЕРІС	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	крап. оч., р-н по 2,5мл у фл.-крап.	40 мкг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ІЗБА®	Алкон-Куврьор, Бельгія	крап. оч., по 2,5мл у фл.-крап.	30 мкг/мл	№1, №3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТРАВАПРЕСС РОМФАРМ	К.Т.Ромфарм Компані С.Р.Л., Румунія	крап. оч., р-н по 2,5мл у фл.	0,04мг/мл	№1	158,23	31,65/€
	ТРАВАТАН®	Алкон-Куврьор, Бельгія	крап. оч. по 2,5мл у фл.-крап.	40мкг/мл	№3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТРАВАТАН®	Алкон-Куврьор, Бельгія	крап. оч. по 2,5мл у фл.-крап.	40мкг/мл	№1	243,00	26,47/\$
	ТРАВОНЕКСТ	РАФАРМ СА, Греція	крап. оч. по 2,5мл у фл.-крап.	40 мкг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТРАВОПРОСТ	Алкон Парентералс (Індія) Лімітед, Індія	крап. оч., р-н по 2,5мл у фл.	0,04 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

15.3.2. Засоби, що пригнічують продукцію внутрішньоочної рідини

15.3.2.1. β-адреноблокатори

- **Бетаксолोल (Betaxolol)** ^(ГМД) (див. п. 2.1.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: S01ED02 - засоби, що застосовуються в офтальмології. Протиглаукомні препарати і міотичні засоби. Блокатори бета-адренорецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: кардіоселективний блокатор бета-1-адренорецепторів, не має значної мембрано-стабілізуючої (місцевої анестезуючої) і вираженої симпатоміметичної дії; здатний знижувати як підвищений, так і нормальний ВОТ, незалежно від того супроводжується це глаукомою, чи ні; механізм його гіпотензивної дії пов'язаний із зменшенням продукції ВОР; починає діяти ч/з 30 хв, а максимальний ефект досягається ч/з 2 год після місцевого застосування; разова доза забезпечує зниження ВОТ протягом 12 год; чинить незначну дію або зовсім не впливає на звуження зіниці; підтримує або поліпшує очний кровообіг/перфузію; негативно не впливає на кровопостачання очного нерва; не впливає на легеневу та СС функції.

Показання для застосування ЛЗ: зниження ВТ у пацієнтів, хворих на хр.відкритокутову глаукому або оч. гіпертензію ^{БНФ, ПМД} (як монотерапія, так і в комбінації з іншими ЛЗ).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі (у тому числі пацієнти похилого віку): рекомендована доза 1 крап. у кон'юнктивальний мішок ураженого ока(очей) 2 р/добу ^{БНФ}, у деяких пацієнтів для стабілізації гіпотензивної дії препарату потрібно декілька тижнів, рекомендується ретельне спостереження за хворими з глаукомою, можна застосовувати комбіновану терапію з іншими протиглаукомними ЛЗ.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: брадикардія, тахікардія, головний біль, синкопе; відчуття дискомфорту в оці; затуманення зору, посилена сльозотеча, відчуття стороннього тіла в очах; кератит, кератит, кон'юнктивіт, блефарит, зниження гостроти зору, порушення зору, світлобоязнь, біль в очах, сухість очей, астенопія, блефароспазм, незвичне відчуття в очах, свербіж очей, виділення з очей, утворення лусочок по краях повік, запалення очей, подразнення очей, кон'юнктивальні порушення, кон'юнктивальний набряк, очна гіперемія; катаракта, офтальмологічні порушення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до активної субстанції або до будь-якого з компонентів препарату; синусова брадикардія, с-м дисфункції синусового вузла, дисфункція синусо-передсердного вузла, АВ-блокада II або III ступеня, неконтрольована водієм ритму; виражена СН або кардіогенний шок; реактивне захворювання дихальних шляхів, включаючи БА тяжкого ступеня або БА тяжкого ступеня в анамнезі, ХОЗЛ тяжкого ступеня.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БЕТОФТАН®	ПАТ "Фармак", Україна	крап. оч., сусп. по 5мл у фл.	2,5мг/мл	№1	87,00	
II.	БЕТАЛМІК 0,5 %	ТОВ "УНІМЕД ФАРМА", Словацька Республіка	крап. оч., р-н по 5мл у фл.-крап.	5мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БЕТАЛМІК 0,5 %	ТОВ "УНІМЕД ФАРМА", Словацька Республіка	крап. оч., р-н по 10мл у фл.-крап.	5мг/мл	№1	72,75	33,00/€
	БЕТОПТИК® S	Алкон-Куврьюр, Бельгія	крап. оч. по 5мл у фл.-крап. "Дроп-Тейнер®"	5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Тимолол (Timolol) *** [ПМД]

Фармакотерапевтична група: S01ED01 - Засоби, які застосовуються в офтальмології. Протиглаукомні препарати та міотичні засоби. Блокатори бета-адренорецепторів.

Основна фармакотерапевтична дія: неселективний (бета₁ і бета₂) бета-адреноблокатор, який не має внутрішньої симпатоміметичної або мембрано-стабілізуючої активності, безпосередньої пригнічувальної дії на міокард; ефективно знижує нормальний та підвищений ВОТ; зменшує утворення внутрішньоочної рідини, не впливаючи значною мірою на відтік рідини; не впливає на акомодацию, розмір зіниць та гостроту зору, тому нечіткість, затуманення зору чи погіршення зору при яскравому світлі не виникають; у пацієнтів з катарактою вдається уникнути порушень зору при звуженні зіниць, викликані помутнінням кришталика; дія препарату розпочинається швидко; ВОТ знижується вже через 30 хв. після закапування; максимальне зниження досягається протягом 1-5 годин і зберігається протягом 24 годин після застосування однократної дози.

Показання для застосування ЛЗ: очна гіпертензія, хронічна відкритокутова глаукома^{ВООЗ,БНФ, ПМД} і в деяких випадках вторинної глаукоми^{ВООЗ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: закапувати по 1 краплі 0,25 % розчину 2 рази^{БНФ} на добу^{ВООЗ} в уражене око; після стабілізації ВТ можливе зниження дози до 1 крап. 1 р/добу; у разі неефективності слід застосовувати 0,5 % розчин^{ВООЗ}; якщо ВОТ не контролюється адекватно можна розпочати супутню терапію із застосуванням міотичних засобів, епінефрину, системних інгібіторів карбоангідрази; при належному зниженні ВОТ, необхідно продовжувати підтримуюче лікування - 1 крап. препарату на добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ангіоневротичний набряк, підвищена чутливість, системний червоний вовчак; гіпоглікемія; депресія, безсоння, втрата пам'яті, кошмарні сновидіння; головний біль, ішемія головного мозку, запаморочення, мігрень, інсульт, непритомність, парестезія; затуманення зору, біль в оці, подразнення ока, дискомфорт в очах, гіперемія ока, ерозія рогівки, точковий кератит, кератит, ірит, кон'юнктивіт, блефарит, зниження гостроти зору, світлобоязнь, сухість очей, підвищена сльозотеча, виділення з очей, свербіж очей, утворення лусочок по краях повік, запалення передньої камери ока, набряк повік, кон'юнктивальна гіперемія, увеїт, захворювання рогівки, диплопія, астенія, екзема повік, еритема повік, свербіж повік, набряк кон'юнктиви, пігментація рогівки, відшарування судинної оболонки (після трабекулотомії), опущення повіки; брадикардія, інфаркт міокарда, зупинка серця, атріовентрикулярна блокада (повна, неповна або погіршення протікання), застійна серцева недостатність (погіршення протікання), аритмія, прискорене серцебиття; артеріальна гіпотензія, підвищення АТ, периферичні набряки, похолодіння кінцівок, хвороба Рейно, переміжна кульгавість; астма, бронхіт, диспное, хронічне обструктивне захворювання легень, бронхоспазм, кашель, стридорозне дихання, закладеність носа, респіраторна недостатність; зміна смакових відчуттів, розлади травлення, неприємні відчуття у ділянці живота, сухість у роті, блювання, діарея, нудота; набряк обличчя, почервоніння, кропив'янка, псоріаз (погіршення протікання), висипання, випадання волосся; втома, загальна слабкість, дискомфорт у ділянці грудної клітки; артропатія; статеві дисфункції, хвороба Пейроні; кальцифікації рогівки; обмежені та генералізовані висипання, свербіж, анафілактична р-ція; зниження лібідо.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого з допоміжних компонентів препарату; захворювання, які супроводжуються гіперреактивністю дихальних шляхів, у тому числі БА або БА в анамнезі, тяжке ХОЗЛ; синусова брадикардія, синдром слабкості синусового вузла, синоатріальна блокада, атріовентрикулярна блокада II або III ступеня, що не контролюється кардіостимулятором, виражена СН або кардіогенний шок, тяжкий алергічний риніт, тяжкий алергічний риніт.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ОФТИМОЛ®	АТ "Фармак", Україна	крап. оч. по 5мл у фл.	2,5мг/мл, 5мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОФТИМОЛ®	ПАТ "Фармак", Україна	крап. оч. по 10мл у фл.	2,5 мг/мл	№1	40,00	
	ОФТИМОЛ®	ПАТ "Фармак", Україна	крап. оч. по 10мл у фл.	5мг/мл	№1	40,00	
	ТИМОЛОЛ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	крап. оч., р-н по 5мл, 10мл у фл.	2,5мг/мл, 5мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	ТИМОЛОЛ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	крап. оч., р-н по 5мл у фл.	5мг/мл	№1	14,20	
II.	АРУТИМОЛ®	Др. Герхард Манн, Хем.-фарм. Фабрик ГмБХ (виробництво балку, первинне пакування, вторинне пакування, аналітичні випробування, випуск серії)/Лабораторія Шовен (виробництво балку, первинне пакування, аналітичні випробування), Німеччина/Франція	крап. оч., р-н по 5мл у фл.-крап. Bottelpack	2,5мг/мл, 5мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АРУТИМОЛ®	Др. Герхард Манн, Хем.-фарм. Фабрик ГмБХ (виробництво балку, первинне пакування, вторинне пакування, аналітичні випробування, випуск серії)/Лабораторія Шовен (виробництво балку, первинне пакування, аналітичні випробування), Німеччина/Франція	крап. оч., р-н по 5мл у фл.-крап.	2,5мг/мл	№1	57,00	
	АРУТИМОЛ®	Др. Герхард Манн, Хем.-фарм. Фабрик ГмБХ (виробництво балку, первинне пакування, вторинне пакування, аналітичні випробування, випуск серії)/Лабораторія Шовен (виробництво балку, первинне пакування, аналітичні випробування), Німеччина/Франція	крап. оч., р-н по 5мл у фл.-крап.	5мг/мл	№1	79,00	
	КУЗИМОЛОЛ®	Алкон Кузі, С.А, Іспанія	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	5мг/мл	№1	60,00	26,47/\$
	НОРМАТИН	"Е.І.П.І.Ко.", Єгипет	крап. оч., р-н по 5мл у фл.-крап.	5мг/мл	№1	49,11	28,57/\$
	ОФТАН® ТИМОЛОЛ	Сантен АТ (виробник, відповідальний за випуск серії)/НекстФарма АТ (виробник відповідальний за виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль якості), Фінляндія/Фінляндія	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	5мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

Комбіновані препарати

- **Латанопрост + Тимолол (Latanoprost + Timolo)** ^[ГМД]

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КСАЛО-ФАРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	крап. оч., р-н по 5мл у фл.-крап.	0,05мг/5мг/мл	№1	218,80	
	ЛАНОТАН® Т	ПАТ "Фармак", Україна	крап. оч., р-н по 2,5мл у фл.	0,05мг/5мг/мл	№1	222,00	
II.	ДУОПРОСТ	К.Т. Ромфарм Компані С.Р.Л., Румунія	крап. оч., р-н по 2,5мл у фл.	0,05мг/5мг/мл	№1	117,00	32,31/€

КСАЛОПТИК КОМБІ	Таежун ФАРМ. Ко. Лтд (виробництво ГЛЗ, первинне пакування, контроль якості)/Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. (вторинне пакування, контроль якості ГЛЗ та випуск серії), Південна Корея/Польща	крап. оч., р-н по 2,5мл у фл.-кр.	50мкг/5мг/мл	№3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КСАЛОПТИК КОМБІ	Таежун ФАРМ. Ко. Лтд (виробництво ГЛЗ, первинне пакування, контроль якості)/Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. (вторинне пакування, контроль якості ГЛЗ та випуск серії), Південна Корея/Польща	крап. оч., р-н по 2,5мл у фл.-кр.	50мкг/5мг/мл	№1	200,57	27,90/\$
ЛАПРОНЕКСТ КОМБІ	РАФАРМ СА, Греція	крап. оч., р-н по 2,5мл у фл.-кр.	50мкг/5мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛАТАМЕД	К.О. Ромфарм Компані С.Р.Л., Румунія	крап. оч., р-н по 2,5мл у фл.-кр.	0,05мг/5мг/мл	№1	219,16	28,12/\$
РОЗАМАКС®	Рафарм АТ (відповідальний за виробництво, за виключенням випуску серії)/АТ "Адамед Фарма", Греція/Польща	крап. оч., р-н по 2,5мл у фл.-кр.	0,05мг/5мг/мл	№1	139,47	26,67/\$

● **Пілокарпін + Тимолол (Pilocarpine + Timolol)** ^[ГПМД]

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ФОТИЛ®	Сантен АТ (виробник відповідальний за випуск серії)/Мануфактурінг Пакагінг Фармака (МПФ) Б.В. (Альтернативний виробник, відповідальний за вторинне пакування)/НекстФарма АТ (виробник відповідальний за виробництво in bulk, первинну та вторинну упаковку, кон, Фінляндія/Нідерланди/Фінляндія)	крап. оч. по 5мл у фл.-кр.	20мг/5мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФОТИЛ®	Сантен АТ (виробник відповідальний за випуск серії)/Сантен Фармасьютикал (Китай) Ко. Лтд (виробник відповідальний за виробництво in bulk, первинну та вторинну упаковку)/НекстФарма АТ (виробник відповідальний за виробництво in bulk, первинну та вторинну уп, Фінляндія/Китай/Фінляндія)	крап. оч. по 5мл у фл.-кр.	20мг/5мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФОТИЛ® ФОРТЕ	Сантен АТ (виробник відповідальний за випуск серії)/Мануфактурінг Пакагінг Фармака (МПФ) Б.В. (Альтернативний виробник, відповідальний за вторинне	крап. оч. по 5мл у фл.-кр.	40мг/5мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	пакування)/НекстФарма АТ (виробник відповідальний за виробництво in bulk, первинну та вторинну упаковку, кон, Фінляндія/Нідерланди/Фінляндія)					
ФОТИЛ® ФОРТЕ	Сантен АТ (виробник відповідальний за випуск серії)/Сантен Фармасьютикал (Китай) Ко. Лтд (виробник відповідальний за виробництво in bulk, первинну та вторинну упаковку)/НекстФарма АТ (виробник відповідальний за виробництво in bulk, первинну та вторинну уп, Фінляндія/Китай/Фінляндія)	крап. оч. по 5мл у фл.-кр.	40мг/5мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЛЦ	

• **Тимолол + травопрост (Timolol + travoprost)**^[ГМД]

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЛЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДУОТРАВ®	Алкон-Куврьюр, Бельгія	крап. оч. по 2,5мл у фл.-кр.	5мг/40мг/мл	№1	265,35	25,75/\$

• **Бринзоламід + тимолол (Brinzolamide + timolol)**^{** [ГМД]}

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЛЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БРИЗОТОН	ПАТ "Фармак", Україна	крап. оч. по 5мл у фл.	10мг/5мг/мл	№1	195,00	
	БРИЗОТОН®	АТ "Фармак", Україна	крап. оч. по 5мл у фл.	10мг/5мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЛЦ	
II.	АЗАРГА®	Алкон-Куврьюр, Бельгія	крап. оч. по 5мл у фл.-крап. "Дроп-Тейнер®"	10мг/5мг/мл	№1	234,72	25,75/\$

15.3.2.2. Інгібітори карбоангідрази

Зменшують ВТ за рахунок зменшення продукції ВОР шляхом пригнічення активності карбоангідрази, яка міститься в відростках війчатого тіла.

• **Бринзоламід (Brinzolamide)**^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: S01EC04 - засоби, які застосовуються в офтальмології. Протиглаукомні препарати та міотичні засоби. Інгібітори карбоангідрази.

Основна фармакотерапевтична дія: інгібітор карбоангідрази II (КА-II), знижує секрецію внутрішньоочної рідини, головним чином уповільнюючи утворення іонів бікарбонату з наступним зменшенням транспорту натрію та рідини; що проявляється зниженням внутрішньоочного тиску (ВОТ), який є головним фактором ризику у патогенезі ураження зорового нерва та втрати поля зору внаслідок глаукоми

Показання для застосування ЛЗ: зниження підвищеного ВОТ при очній гіпертензії та відкритокутовій глаукомі, як монотерапія для пацієнтів, нечутливих до β-блокаторів, або для пацієнтів, яким β-блокатори протипоказані, або як додаткова терапія при застосуванні β-блокаторів або аналогів простагландинів^{БНФ, ГМД}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в якості монотерапії або додаткової терапії - по 1 крап. в кон'юнктивальний мішок ураженого ока (очей) 2 р/день^{БНФ} - вранці та ввечері; у деяких пацієнтів - по 1 крап. 3 р/добу^{БНФ}; тривалість лікування визначається лікарем; доза не повинна перевищувати 1 крап. в уражене око (очі) 3 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ринофарингіт, фарингіт, синусит, риніт, зменшення кількості еритроцитів, підвищення рівню хлоридів у крові, підвищена чутливість, апатія, депресія, пригнічення настрою, зменшення лібідо, нічні кошмари, нервозність, безсоння, зниження апетиту, порушення координації рухів, амнезія, запаморочення, парестезія, головний біль, погіршення пам'яті, сонливість, тремор, гіпестезія, агевзія, затуманення зору, подразнення ока, біль в оці, відчуття стороннього тіла в оці, гіперемія очей, ерозія рогівки, кератит, точковий кератит, кератопатія, преципітати в оці, забарвлення рогівки, дефект епітелію рогівки, порушення з боку епітелію рогівки, блефарит, свербіж очей, кон'юнктивіт, набряк ока, мейбоміт, підвищена чутливість до яскравого світла, світлобоязнь, сухість очей, алергічний кон'юнктивіт, птеригіум, пігментація склери, астенія, відчуття дискомфорту, аномальна чутливість очей, сухий кератокон'юнктивіт, субкон'юнктивальна

кіста, гіперемія кон'юнктиви, свербіж повік, виділення з очей, утворення лусочок по краях повік, підвищена слъзотеча, набряк рогівки, диплопія, зниження гостроти зору, фотопсія, гіпестезія ока, періорбітальний набряк, підвищення ВТ, збільшення екскавації диску зорового нерва, порушення з боку рогівки, порушення зору, алергічні прояви з боку очей, мадароз, порушення з боку повік, еритема повік, шум у вухах, вертиго, кардіореспіраторний дистрес, брадикардія, прискорене серцебиття, стенокардія, нерегулярність ЧСС, аритмія, тахікардія, гіпертонія, підвищений АТ, зниження АТ, підвищена ЧСС, задишка, носова кровотеча, біль у ротоглотці, біль у глотці та гортані, подразнення горла, надлишкова секреція носоглоткового слизу, нежить, чхання, гіперреактивність бронхів, застійні прояви у верхніх дихальних шляхах, набряк слизової оболонки придаткових пазух носа, закладеність носа, кашель, сухість у носі, астма, дисгевзія, езофагіт, діарея, нудота, блювання, диспепсія, біль у верхній частині живота, неприємні відчуття у животі, дискомфорт у шлунку, метеоризм, посилення перистальтики кишечника, розлади ШКТ, гіпестезія ротової порожнини, парестезія ротової порожнини, сухість у роті, відхилення від норми показників печінкових проб, висип, макулопапульозний висип, ущільнення шкіри, кропив'янка, алопеція, генералізований свербіж, дерматит, еритема, біль у спині, спазми м'язів, міалгія, артралгія, біль у кінцівках, біль у ділянці нирок, полакіурія, порушення ерекції, біль, дискомфорт у грудній клітці, відчуття втоми, дискомфорт, біль у грудях, відчуття тривоги, астенія, дратівливість, периферичний набряк, нездужання, відчуття стороннього тіла в оці.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої р-ни або до будь-якого іншого компонента препарату; відома гіперчутливість до сульфонамідів; ниркова недостатність тяжкого ступеня; гіперхлоремічний ацидоз.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БРИЗАЛЬ®	АТ "Фармак", Україна	крап. оч., сусп. по 5мл у фл.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БРИЗАЛЬ®	ПАТ "Фармак", Україна	крап. оч., сусп. по 5мл у фл.	10 мг/мл	№1	160,00	
II.	АЗОПТ®	Алкон-Кувр'юр, Бельгія	крап. оч. по 5мл у фл.-кр. «Дроп-Тейнер®»	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БРИНЕКС	СЕНТІСС ФАРМА ПВТ. ЛТД., Індія	крап. оч., сусп. по 5мл, 10мл у фл.-крап.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОПТИЛАМІД®	Лузомедікамента Сосьєдаде Текніка Фармaceutіка, С.А., Португалія	крап. оч., сусп. по 5мл у фл.-крап.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

15.4. Мідріатичні та циклоплегічні засоби

Мідріатичні ЛЗ поділяються на 2 групи: М-холіноблокатори та адреноміметики. М-холіноблокатори розширяють зіницю (мідріаз) і паралізують цилиарний м'яз (циклоплегія). Їх диференціюють по силі та тривалості дії – мідріатики короткої (діагностичної) та тривалої (лікувальної) дії. ЛЗ короткої дії (тропікамід, циклопентолат) застосовують при обстеженні очного дна. Атропін, що діє значно триваліше, застосовують для лікування спазмів акомодатії стійкого характеру у дітей, а також для лікування запальних захворювань переднього відділу ока з метою попередження розвитку синехій. Адреноміметики розширяють зіницю, при виклакаючи циклоплегії та підвищення внутрішньоочного тиску.

15.4.1. М-холіноблокатори

- **Атропін (Atropine)** * [П] [ПМД]

Фармакотерапевтична група: S01FA01 - засоби, що діють на органи чуття, мідріатичні та циклоплегічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: вибірково блокує м-холінорецептори; зменшує секрецію залоз, спричиняє тахікардію, виражено розширює зіниці (при цьому можливе підвищення ВОТ), спричиняє параліч акомодатії; зіниця, розширена атропіном, не звужується при інстиляції холіноміметичних засобів; максимальний мідріаз настає через 30 - 40 хв і зберігається протягом 7 - 10 днів, параліч акомодатії відповідно ч/з 1 - 3 год і зберігається 8 - 12 днів; системний ефект атропіну обумовлений його антихолінергічною (холінолітичною) дією, що проявляється пригніченням секреції слинних, шлункових, бронхіальних, потових залоз, підшлункової залози, почастішанням серцевих скорочень (зменшується гальмівна дія n.vagus на серце), зниженням тонуусу гладкої мускулатури органів (бронхіальне дерево, органи черевної порожнини та ін.); проникаючи через гематоенцефалічний бар'єр, впливає на ЦНС; зменшує м'язовий тонус і тремор у хворих на паркінсонізм (центральна холінолітична дія), у терапевтичних дозах атропін збуджує дихальний центр, великі дози атропіну спричиняють рухові і психічні порушення, судоми, галюцинаторні явища, параліч дихання.

Показання для застосування ЛЗ: діагностичне розширення зіниці при дослідженні очного дна, для досягнення паралічу акомодатії з метою визначення істинної рефракції ока^{ВООЗ, БНФ, ПМД}, у комплексній терапії запальних захворювань^{ВООЗ}, травм ока і емболій, спазму центральної артерії сітківки.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: з лікувальною метою дорослим і дітям старше 7 років призначають по 1 - 2 крап. 2 - 6 р/добу; максимальне розширення зіниць атропіном, що сприяє розслабленню м'язів ока і прискорює

регресію патологічного процесу, спостерігається ч/з 30 - 40 хв і зберігається протягом 7-10 днів, параліч акомодатії - відповідно через 1-3 год і зберігається 8-12 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: місцева дія: гіперемія шкіри повік, гіперемія і набряк кон'юнктиви, повік і очного яблука, свербіж, фотофобія, мідріаз, параліч акомодатії, підвищення ВТ; системна дія: сухість у роті, відчуття спраги, порушення смакових відчуттів, дисфагія, зменшення моторики кишечника аж до атонії, запор, затримка сечі, атонія сечового міхура, тахікардія, аритмія, включаючи екстрасистолію, ішемія міокарда, почервоніння обличчя, відчуття припливів, головний біль, запаморочення, сонливість, нервозність, безсоння, дизартрія, порушення зору; зменшення секреторної активності та тону бронхів, що призводить до утворення в'язкого мокротиння, яке тяжко відкашлюється; шкірні висипання, кропив'янка, ексфоліативний дерматит, сухість шкіри, гіперемія шкіри, набряк, АР, р-ції гіперчутливості, анафілактичні р-ції, анафілактичний шок, порушення тактильного сприйняття, підвищення температури тіла, зменшення потовиділення; можливий розвиток алергічних реакцій через вміст натрію метабісульфіту.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до компонентів препарату, захворювання ССС, при яких збільшення ЧСС може бути небажаним: миготлива аритмія, тахікардія, хр. СН, ІХС, мітральний стеноз, тяжка АГ; г. кровотеча; тиреотоксикоз, гіпертермічний с-м, захворювання ШКТ, що супроводжуються непрохідністю (ахалазія стравоходу, стеноз ворота, атонія кишечника), глаукома, печінкова і ниркова недостатність, miastenia gravis, затримка сечі або схильність до неї, пошкодження мозку.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I. АТРОПІНУ СУЛЬФАТ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	крап. оч. по 10мл у фл.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АТРОПІНУ СУЛЬФАТ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	крап. оч. по 5мл у фл.	10 мг/мл	№1	58,64	

• **Циклопентолат (Cyclopentolat)** ^(ПМД)

Фармакотерапевтична група: S01FA04 - мідріатичні та циклоплегічні засоби. Антихолінергічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: блокуючи М-холінорецептори, запобігає дії медіатору холінергічних синапсів - ацетилхоліну; у результаті блокування холінергічних синапсів, що розташовані у сфінктері зіниці та у циліарному м'язі, відбувається розширення зіниці за рахунок переважання тону м'яза, що розширює зіницю, та розслаблення м'яза, що звужує зіницю; одночасно за рахунок розслаблення циліарного (акомодатійного) м'яза виникає параліч акомодатії (циклоплегія); розширення зіниці настає протягом 15-30 хв. після одноразового закапування; мідріаз зберігається протягом 6-12 год.; має слабку спазмолітичну дію, зменшує секрецію слинних, шлункових, бронхіальних, потових залоз та підшлункової залози; підвищує ВОТ; зменшує тону блукаючого нерва, що призводить до збільшення ЧСС при незначному підвищенні АТ; у середніх терапевтичних дозах справляє помірний стимулюючий вплив на ЦНС, збуджує дихання.

Показання для застосування ЛЗ: Препарат використовується для досягнення мідріазу та **циклоплегії** ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі та діти від 1 року: закапувати у кон'юнктивальний мішок по 1-2 крап. За необхідності можна повторити інстиляцію через 5-10 хв. Максимальний ефект настає ч/з 30-60 хв.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: підвищення ВОТ, швидкоминуче відчуття печіння, подразнення, гіперемія кон'юнктиви, фотофобія, затуманений зір, кон'юнктивіт, блефарокон'юнктивіт, точковий кератит, синехії, набряк, біль в очах, мідріаз, сльозотеча; психотичні р-ції та поведінкові порушення, у тому числі атаксія, некогерентність мовлення, тривожність, галюцинації, гіперактивність, судоми, дезорієнтація, прозопагнозія, сплутаність свідомості, агітація; ретроградна амнезія, запаморочення, головний біль, сонливість, (у дітей можуть спостерігатися: атаксія, епілептичні напади, розлади мовлення, збудження, незв'язне мовлення, галюцинації, дезорієнтація у часі та просторі, порушення впізнавання навколишніх людей, амнезія, дизартрія, церебральні прояви або дисфункції, підвищена активність, тривожність, страх, центральний антихолінергічний с-м, сонливість, плаксивість); тахікардія, брадикардія, що змінюється тахікардією, артеріальна гіпотензія/гіпертензія, тахіаритмія, аритмія, вазодилатація, почервоніння обличчя та кінцівок, відчуття серцебиття (пальпітації); нудота, блювання, сухість у роті, зниження моторики травного тракту, здуття живота (у дітей раннього віку), розлади шлунка, непрохідність кишечника, непереносимість їжі, некротичний ентероколіт, запор, слинотеча; р-ції гіперчутливості, у тому числі тяжкі анафілактичні р-ції, дихальна недостатність; висипання, еритема, кропив'янка (у тому числі контактна), контактний дерматит, відчуття жару та сухості шкіри; затримка

сечовипускання, імперативні позиви до сечовипускання, утруднення сечовипускання; лихоманка, порушення ходи, втомлюваність, зниження секреції слинних і потових залоз, глотки, бронхів та носових проходів.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підозра на глаукому, закритокутова глаукома, кишкова непрохідність, підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату, органічні ураженнями ЦНС у дітей.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЦИКЛОМЕД	СЕНТІСС ФАРМА ПВТ. ЛТД., Індія	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦИКЛОПЕНТОЛАТУ ГІДРОХЛОРИД	Алкон Парентералс (Індія) Лімітед, Індія	крап. оч. по 5мл у фл.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦИРЕЛАКС	К.О. Ромфарм Компані С.Р.Л., Румунія	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	10мг/мл	№1	120,13	24,60/\$

● **Тропікамід (Tropicamide)** * [ГМД]

Фармакотерапевтична група: S01FA06 - засоби, що застосовуються в офтальмології. Антихолінергічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: антихолінергічний засіб, який блокує М - холінорецептори сфінктера зіниці і циліарного м'яза, викликаючи мідріаз; спричиняючи розширення зіниці (мідріаз) та параліч акомодатії.

Показання для застосування ЛЗ: для досягнення мідріазу і циклоплегії при проведенні обстеження у офтальмології ^{БОУЗ, БНФ, ПМД}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: *Скіаскопічне обстеження:* закапати в око 1-2 крап. 1% р-ну препарату та повторити через 5 хв. (рефракція); якщо немає можливості обстежити пацієнта протягом 20-30 хвилин, слід закапати додатково ще 1 крап. для пролонгації мідріатичного ефекту; для пацієнтів із надто пігментованими райдужними оболонками може виникнути потреба підвищити дозу. *Фундоскопія:* закапати 1-2 крап. 0,5 % розчину за 15-20 хв. до обстеження.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: брадикардія, тахікардія, аритмія, психотичні розлади, галюцинації, аномальна поведінка, дезорієнтація, головний біль, порушення координації, запаморочення, фотофобія, біль в очах, затуманення зору, відчуття дискомфорту в очах, порушення акомодатії, підвищення ВТ, подразнення очей, очна гіперемія, кон'юнктивіт, набряк очей, точковий кератит, свербіж очей, припливи, збліднення, синкопе, артеріальна гіпотензія, сухість у носі, блювання, нудота, запор, сухість у роті, висипання, сухість шкіри, дизурія, затримка сечовиділення, подовження дії препарату.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої допоміжної речовини; закритокутова глаукома або підозра на закритокутову глаукому.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ТРОПІКАМІД-ФАРМАК	ПАТ "Фармак", Україна	крап. оч. по 5мл, 10мл у фл.	5мг/мл, 10мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТРОПІКАМІД-ФАРМАК	ПАТ "Фармак", Україна	крап. оч. по 10мл у фл.	10мг/мл	№1	75,00	
II.	МІДРІАТІКУМ-ШТУЛЬН ПУ	Фарма Штульн ГмбХ, Німеччина	крап. оч. по 0,4мл у туб.-крап.	5 мг/мл	№5x1, №5x6, №5x12, №300	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МІДРІАЦИЛ	Алкон-Куврьюр, Бельгія	крап. оч. по 15мл у фл.-кр. "Дроп-Тейнер"	10мг/мл	№1	97,50	26,63/\$

15.4.2. Адреноміметики

● **Фенілефрин (Phenylephrine)** [ГМД]

Фармакотерапевтична група: S01FB01 - засоби, що застосовуються в офтальмології. Мідріатичні і циклоплегічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: має виражену стимулюючу дію на постсинаптичні альфа-адренорецептори, при цьому вплив на бета-адренорецептори серця майже не виражений; виявляє вазоконстрикторну дію, подібну дії норадреналіну, але при цьому у нього практично відсутня хронотропна та інотропна дія на серце; вазопресорний ефект препарату менш виражений, ніж у норадреналіну, але значно триваліший; у звичайних дозах не виявляє значного стимулюючого впливу на ЦНС; після інстиляції скорочує дилататор зіниці (спричиняє її розширення) і гладкі м'язи артеріол кон'юнктиви; не впливає на циліарний м'яз, тому мідріаз виникає без циклоплегії.

Показання для застосування ЛЗ: іридоцикліт, передній увеїт (з метою лікування та профілактики виникнення задніх синехій та зменшення ексудації з райдужної оболонки ока); діагностичне розширення зіниці під час офтальмоскопії або інші діагностичні процедури, необхідні для визначення стану заднього відрізка ока; проведення провокаційного тесту у пацієнтів з вузьким профілем кута передньої камери та підозрою на закритокутову глаукому; диференціальна діагностика типу ін'єкції очного яблука; розширення зіниці при проведенні лазерних втручань на очному дні та вітрео-ретинальній хірургії; синдром «червоного ока» (для

зменшення гіперемії та подразнення оболонок ока); комплексна терапія спазму акомодативної у дітей шкільного віку; лікування та профілактика астенопії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при проведенні офтальмоскопії застосовувати одноразову інстиляцію 2,5 % р-ну ^{БНФ}, для досягнення мідріазу досить введення 1 крап. 2,5 % р-ну препарату в кон'юнктивальний мішок; максимальний мідріаз досягається ч/з 15-30 хв і зберігається на достатньому рівні протягом 1-3 год; у разі необхідності підтримки мідріазу протягом тривалого часу ч/з 1 год можлива повторна інстиляція; для проведення діагностичних процедур ^{БНФ} як провокаційний тест у пацієнтів з вузьким профілем кута передньої камери і підозрою на закритокутову глаукому одноразова інстиляція 2,5 % розчину використовується: якщо різниця між значеннями ВТ до закапування і після розширення зіниці становить від 3 до 5 мм рт. ст., провокаційний тест вважається позитивним; для диференціальної діагностики типу ін'єкції очного яблука: якщо через 5 хв після інстиляції відзначається звуження судин очного яблука, ін'єкція класифікується як поверхнева; при збереженні почервоніння ока необхідно ретельно обстежити пацієнта на наявність іридоцикліту або склериту, тому що це свідчить про розширення судин у більш глибоких шарах тканин ока; при іридоцикліті, передньому увеїті використовується для лікування та запобігання розвитку задніх синехій; для зниження ексудації у передню камеру ока: з цією метою 1 крап.препарату інстилюється в кон'юнктивальний мішок хворого ока (очей) 2-3 р/добу. Комплексна терапія спазму акомодативної та астенопії у дітей шкільного віку: при легкому ступені короткозорості призначати по 1 крап. 2,5 % р-ну препарату перед сном, у дні високих зорових навантажень; при середньому ступені короткозорості по 1 крап. 2,5 % р-ну 3 р/тижд. перед сном, а у разі еметропії (відсутність міопії) – щодня, незалежно від зорового навантаження; пацієнтам з далекозорістю, у яких спостерігається тенденція до виникнення спазму, застосовувати 2,5 % р-н препарату в комбінації з 1 крап.1 % циклопентолата перед сном, у період важких зорових навантажень, а в звичайний час застосовувати 3 р/тижд. Крап. оч.р-н 10% -для максимально швидкого та вираженого розширення зіниці закапувати по 1 крап. 1 раз в кон'юнктивальний мішок; для руйнування синехій по 1 крап. ЛЗ наносити на кон'юнктиву ока або обох очей 1 раз на добу; тривалість лікування не має перевищувати 5 днів; необхідний медичний нагляд при тривалому лікуванні; перед хірургічним втручанням ЛЗ застосовувати за 30-60 хв до хірург. втручання.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперчутливість, алергічний кон'юнктивіт; біль в очах, печіння (на початку застосування), реактивна гіперемія, затуманення зору, подразнення очей, відчуття дискомфорту, фотофобія, слъозотеча, збільшення ВОТ у пацієнтів з вузькокутовою або закритокутовою глаукомою, реактивний міоз (наступного дня після застосування; при цьому повторні інсталяції можуть давати менш виражений мідріаз, ніж напередодні; ефект частіше проявляється у пацієнтів літнього віку); у недоношених новонароджених можлива періорбітальна блідість; тахікардія, серцеві аритмії, у т. ч. шлуночкові, АГ, рефлекторна брадикардія, оклюзія коронарних артерій, емболія легеневої артерії, ІМ; головний біль, збудження, запаморочення, тремор, парестезія, безсоння; блідість шкіри обличчя, слабкість, задишка, диспептичні явища.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого компонента препарату; вузькокутова або закритокутова глаукома; значні порушення з боку серцево-судинної системи (хвороби серця, артеріальна гіпертензія, аневризма, тахікардія), особливо у пацієнтів літнього віку; інсулінозалежний цукровий діабет; тиреотоксикоз; гіпертиреоз; одночасне застосування з інгібіторами моноаміноксидази (МАО) та застосування протягом 2 тижнів після припинення лікування інгібіторами МАО; додаткове розширення зіниці під час хірургічного втручання у хворих з порушенням цілісності очного яблука або при порушенні функції слъозовиділення; одночасне застосування з трициклічними антидепресантами; антигіпертензивними препаратами (у т. ч. бета-блокаторами); вроджений дефіцит глюкозо-6-фосфатгідрогепази; печінкова порфірія; протипоказано: новонародженим з низькою масою тіла, новонародженим та немовлятам з кардіо- або цереброваскулярними розладами і пацієнтам літнього віку з важкими артеріосклеротичними, серцево-судинними або цереброваскулярними захворюваннями.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МЕЗАТОН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	25мг/мл	№1	78,57	
II.	ІРИФРИН	СЕНТИСС ФАРМА ПВТ. ЛТД., Індія	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	25 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МЕЗАНЕКСТ	БАЛКАНФАРМА-РАЗГРАД АД, Болгарія	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	25 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФЕНЕФРИН 10 %	ТОВ "УНІМЕД ФАРМА", Словацька Республіка	крап. оч., р-н по 5мл у фл.-крап.	10%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФЕНЕФРИН 10 %	ТОВ "УНІМЕД ФАРМА",	крап. оч., р-н по	10%	№1	165,32	33,00/€

	Словацька Республіка	10мл у фл.-крап.			
--	----------------------	------------------	--	--	--

15.5. Деконгестанти та протиалергічні засоби

15.5.1. Антигістаміні засоби (H1-блокатори)

При г. алергічних станах (кон'юнктивіт та інші) швидко зменшують свербіж та набряк повік, слезотечу, гіперемію та набряк тканин. Найбільш ефективні – комплексні препарати, що включають два компоненти: з антигістаміним та судинозвужуючим ефектом.

15.5.2. Стабілізатори мембран опасистих клітин

- **Кислота кромогліцеєва (Cromoglicic acid) ****

Фармакотерапевтична група: S01GX01 - засоби, що застосовують в офтальмології. Протинабрякові та антиалергічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: стабілізує мембрани тучних клітин після того, як вони піддавалися дії антигенів, запобігає дегрануляції і вивільненню різних запальних медіаторів; блокує кальцієві канали, пов'язані з IgE-рецепторами, і таким чином блокує проникнення кальцію у тучні клітини, внаслідок чого запобігає їх дегрануляції; механізм дії є однаковим для усіх слизових оболонок (бронхів, носа, очей та кишечника).

Показання для застосування ЛЗ: г. та хр. алергічні кон'юнктивіти; сезонні кератокон'юнктивіти

Спосіб застосування та дози ЛЗ: 20мг: дорослим та дітям від 4 років закапують по 1 крап. препарату в кон'юнктивальний мішок кожного ока 4 р/добу; при покращанні стану частоту закапування можна зменшити, але лікування продовжувати, поки триває контакт пацієнта з алергенами (пилкок, побутовий пил, спори плісняви та харчові алергени); іноді - по 1 крап. у кожне око до 6-8 р/добу; 40 мг: по 1-2 краплі в кожне око 2 р/добу; іноді - по 1 крап. у кожне око до 6-8 р/добу; при сезонному алергічному кон'юнктивіті або кератокон'юнктивіті лікування розпочинати одразу ж після появи перших симптомів або з профілактичною метою – до початку контакту з алергеном.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: печіння, відчуття чужорідного тіла, хемоз, кон'юнктивальна гіперемія, подразнення, слезотеча, тимчасове затуманення зору та р-ції гіперчутливості, існують окремі повідомлення про випадки тяжких генералізованих анафілактичних р-цій з бронхоспазмом, які були пов'язані із застосуванням кромоглікату натрію; містить бензалконію хлорид, який може спричиняти алергічні реакції або розлади смакових відчуттів

Противпоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-яких інших компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КРОМОФАРМ®	ПАТ "Фармак", Україна	крап. оч. по 10мл у фл.	20мг/мл	№1	70,00	
II.	АЛЕРГОКРОМ	УРСАФАРМ Арцнайміттель ГмбХ, Німеччина	крап. оч. по 10мл у фл.-крап.	20 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КРОМОДРОПС®	Мікро Лабс Лімітед, Індія	крап. оч. по 5мл, 10мл у фл.-крап.	20 мг/мл 20 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛЕКРОЛІН®	Сантен АТ (виробник, відповідальний за випуск серії)/Мануфактурінг Пакагінг Фармака (МПФ) Б.В.(альтернативний виробник, відповідальний за вторинне пакування)/НекстФарма АТ (виробник відповідальний за виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, ко, Фінляндія/Нідерланди/Фінляндія)	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	40 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛЕКРОЛІН®	Сантен АТ (виробник, відповідальний за випуск серії)/Сантен Фармасьютикал Чайна Ко. Лтд (виробник, відповідальний за виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування)/НекстФарма АТ (виробник відповідальний за виробництво in bulk, первинне та вторинне п, Фінляндія/Китай/Фінляндія)	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	40 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

- **Олопатадин (Olopatadine) ****

Фармакотерапевтична група: S01GX09 - засоби для застосування в офтальмології. Протинабрякові та антиалергічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: сильнодіючий селективний протиалергічний/антигістамінний засіб, що має декілька механізмів дії; протидіє вивільненню гістаміну (основного медіатора АР) та запобігає, індукованому гістаміном, виділенню цитокінів епітеліальними клітинами кон'юнктиви; препарат діє на опасисті (тучні) клітини кон'юнктиви людини, пригнічуючи вивільнення медіаторів запалення; місцеве офтальмологічне застосування препарату у пацієнтів зі збереженою прохідністю носослізного каналу зменшує назальні ознаки та симптоми, які часто супроводжують сезонний алергічний кон'юнктивіт; препарат не спричиняє клінічно значущих змін діаметра зіниці

Показання для застосування ЛЗ: сезонні алергічні кон'юнктивіти^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в кон'юнктивальний мішок ураженого ока(очей) закапувати по 1 крап. 2 р/добу^{БНФ} (з інтервалом у 8 год); у разі необхідності лікування може тривати до 4-х міс.^{БНФ}; може застосовуватися в педіатрії (діти від 3 років і старше) з дозуванням таким же, як і у дорослих^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: риніт; підвищена чутливість, припухлість обличчя; головний біль, дисгевзія; запаморочення, гіпестезія; сонливість; біль в оці, подразнення ока, сухість ока, аномальна чутливість очей; ерозія рогівки, ушкодження епітелію рогівки, порушення з боку епітелію рогівки, точковий кератит, кератит, забарвлення рогівки, виділення з ока, світлобоязнь, затуманення зору, зниження гостроти зору, блефароспазм, відчуття дискомфорту в оці, свербіж ока, кон'юнктивальні фолікули, порушення з боку кон'юнктиви, відчуття стороннього тіла в оці, посилена сльозотеча, еритема повік, набряк повік, порушення з боку повік, гіперемія ока; Набряк рогівки, набряк ока, припухлість ока, кон'юнктивіт, мідріаз, порушення зору, утворення лусочок по краях повік; сухість у носі; диспное, синусит; нудота, блювання; контактний дерматит, відчуття печіння на шкірі, сухість шкіри; дерматит, еритема; підвищена втомлюваність; астенія, нездужання.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до олопатадину або до будь-якої допоміжної речовини ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ОЛОПАТАДИН	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	крап. оч., р-н по 5мл у фл. з кр.-крап.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	ВІЗАЛЛЕРГОЛ	СЕНТИСС ФАРМА ПВТ. ЛТД., Індія	крап. оч. по 2,5мл у фл.-крап.	2 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ОЛОДРОПС	Мікро Лабс Лімітед, Індія	крап. оч., р-н по 5мл у фл.-крап.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ОПАТАНОЛ®	Алкон-Куврьор/Алкон Кузі, С.А., Бельгія/Іспанія	крап. оч., р-н по 5мл у фл.-крап. "Дроп-Тейнер®"	1мг/мл	№3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ОПАТАНОЛ®	Алкон-Куврьор/Алкон Кузі, С.А., Бельгія/Іспанія	крап. оч., р-н по 5мл у фл.-крап. "Дроп-Тейнер®"	1мг/мл	№1	195,00	26,47/\$
	ОФТАХІСТ	АТ "Адамед Фарма" (випуск серії)/Сентісс Фарма Прайвет Лімітед (виробництво, пакування), Польща/Індія	крап. оч., р-н по 5мл у фл.	1 мг/мл	№1, №4, №5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПАЛЛАДА	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	крап. оч., р-н по 5мл у фл.-крап.	1мг/мл	№1	171,74	26,38/\$

15.6. Місцеві анестетики

• Проксіметакан (Proxymetacain)

Фармакотерапевтична група: S01HA04 - місцеві анестетики.

Основна фармакотерапевтична дія: поверхневий анестетик групи складних ефірів, тимчасово блокує провідність нервових волокон, що призводить до виникнення місцевої анестезії; легко проникає у слизові оболонки, після місцевого введення абсорбується в системний кровотік та швидко розкладається у плазмі крові, проте, високі дози можуть викликати небажані ефекти; після введення анестезуюча дія починається, як правило, ч/з 30 секунд та триває протягом відносно короткого періоду часу (приблизно 15 хв.)

Показання для застосування ЛЗ: проведення хірургічних операцій, які потребують швидкої й короткотривалої анестезії^{БНФ}; екстракція катаракти, зняття швів з рогівки, та при проведенні тонометрії, гоніоскопії, видаленні сторонніх тіл, зіскобі епітелію кон'юнктиви з метою діагностики та при проведенні будь-яких інших процедур, при яких показана місцева анестезія.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для проведення офтальмологічного обстеження закапати в око 1-2 крап. до початку процедури; якщо необхідно, кількість крап. можна збільшити; при проведенні незначних операцій, таких як видалення стороннього тіла або зняття швів, закапувати по 1-2 крап. кожні 5-10 хв. від 1 до 3 разів; для

тривалої анестезії, що необхідна при таких операціях, як екстракція катаракти, закапувати по 1-2 крап. кожні 5-10 хв. від 3 до 5 разів; місцева анестезуюча дія починається як правило ч/з 30 сек. та може тривати до 15 хв.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперчутливість, втрата свідомості, депресія, ерозія рогівки, помутніння рогівки, кератит, затуманення зору, світлобоязнь, мідріаз, біль в очах, подразнення ока, набряк ока, дискомфорт в оці, гіперемія очей, підвищена сльозотеча, ірит, десцеметит, набряк рогівки, інтоксикація ЛЗ, місцеві симптоми з боку очей, контактний дерматит шкіри, або в окремих випадках як тяжкі р-ції негайного типу з боку рогівки, потенційно проявляючись у формі іриту або десцеметиту, або погіршення с-му Стівенса-Джонсона. Тривале застосування ЛЗ призвести до ерозії епітелію рогівки, уповільнення або перешкоджання загоєння рогівки, ерозії, кератиту і помутніння рогівки, як наслідок, до втрати зору.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої допоміжної речовини.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АЛКАЇН®	Алкон-Куврьор, Бельгія	крап. оч. по 15мл у фл.-крап. "Дроп-Тейнер®"	5мг/мл	№1	123,00	26,63/\$

• **Оксибупрокаїн (Охувіпрокаїн)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: S01HA02 - засоби, що застосовуються в офтальмології. Місцеві анестетики.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний місцевий анестетик, що належить до групи складних ефірів; сильнодіючий поверхневий анестетик, що має швидко наростаючий ефект та короткострокову місцевоанестезуючу дію (10-20 хв); потрапляючи у терапевтичних дозах в чутливі нервові закінчення призводить до оборотного блокування виникнення та передачі імпульсів і, таким чином, спричиняє тимчасову анестезію в місці введення; не впливає на ширину зіниці ока та здатність до акомодатції; після закінчення місцевоанестезуючої дії чутливість зіниці повертається до початкового стану; in vitro виявляє слабку антибактеріальну дію.

Показання для застосування ЛЗ: місцева короткотривала анестезія в офтальмології ^{ПМД БНФ} при видаленні сторонніх частинок з рогівки та кон'юнктиви; проведенні очної тонометрії, гоніоскопії та інших діагностичних обстежень; підготовці до субкон'юнктивальних та ретробульбарних ін'єкцій.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Препарат призначений для дорослих та дітей віком від 2 років; закапувати в кон'юнктивальний мішок; між послідовними закапуваннями препарату очі повинні бути закриті; *анестезія рогівки та кон'юнктиви:* для видалення сторонніх частинок, що містяться на поверхні закапують 3 рази по 1 краплі з інтервалом 5 хвилин; видалення сторонніх частинок, що містяться глибоко - 5-10 разів по 1 краплі з інтервалами у 30-60 секунд; *перед проведенням субкон'юнктивальної або ретробульбарної ін'єкції:* 3 рази по 1 краплі з інтервалом 5 хвилин; *очна тонометрія, гоніоскопія та інші дослідження:* 1-2 краплі одноразово.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: після закапування препарату може виникнути тимчасове відчуття поколювання і печіння, почервоніння, дискомфорт, що зазвичай швидко зникають; алергічні р-ції повік та кон'юнктиви; у результаті тривалого або частого застосування можуть розвинутися: стромальна інфільтрація, набряк, помірне ураження рогівкового епітелію, кератити (у тому числі токсичний, поверхневий дрібноплямистий, дискондний, суперінфекційний кандидозний), фібриноз райдуужної оболонки, періорбітальний контактний дерматит (у тому числі алергічний), пригнічення прекорніальної плівки (тільки для блакитних очей), зміна товщини рогівки, зниження чутливості рогівки, кератопатії (у тому числі смугаста, бульозна, кератопатія, токсична кератопатія, некротична виразкова кератопатія, післяопераційна кератопатія), зморщування десцеметової оболонки ока, збільшення у розмірах ендотеліальних клітин, обмеження просвічування райдуужки ока, зниження щільності ендотеліальних клітин, позаклітинна меланосома, наступне зниження нормальної цитокінетичної та мітотичної активності у клітинах ока, утворення периферичних кілець на рогівці, розвиток толерантності, ушкодження епітеліальних клітин, необоротне поверхнєве пошкодження клітин на рівні клітин ендотелію рогівки, пряма цитотоксична дія на клітини рогівки (у тому числі суттєве зниження споживання кисню епітелієм рогівки), хемоз, розвиток гіпопіону або перфорації рогівки, некроз рогівки або кон'юнктиви; можлива поява виразок рогівки, рецидивних виразок рогівки, сповільнення загоєння рогівки, її необоротне помутніння, зниження внутрішньоочного тиску, зниження частоти спонтанного кліпання, спонтанні рухи очей, псевдопозитивні реакції, зменшення стабільності слізної плівки, катаракта; випадки фібринозного іриту; брадикардія; седація, сплутаність свідомості, збудження, ейфорія, дезорієнтація, порушення слуху, зору або мови, парестезія, м'язові судоми, непритомність, а при сильному передозуванні - судоми, зупинка дихання, кома; нудота, блювання, дисфагія; алергічні реакції, включаючи свербіж, гіперемію, набряк повік, контактну алергію, кропив'янку, набряк Квінке, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини чи до будь-яких компонентів препарату, до інших місцевих анестетиків групи складних ефірів параамінобензойної кислоти чи до місцевих анестетиків групи амідів; виражена СН; АР; тиреотоксикоз; відкриті проникаючі рани ока; інфекція очей.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БЕНОКСІ	ТОВ "УНІМЕД ФАРМА",	крап. оч., р-н по	4мг/мл	№1	61,83	33,00/€

	Словацька Республіка	10мл у конт.- крап.				
--	----------------------	------------------------	--	--	--	--

15.7. Інші лікарські засоби, що використовуються для лікування очних хвороб

15.7.1. Стимулятори регенерації рогівки

При захворюваннях рогової оболонки ока з порушенням цілісності її поверхні, травмах та опіках ока необхідне прискорення процесу її регенерації.

- **Декспантенол (Dexpanthenol) ****

Фармакотерапевтична група: S01XA12 - засоби, які застосовуються в офтальмології.

Основна фармакотерапевтична дія: біологічний прекурсор пантотенової кислоти (вітаміну B₅), який має, завдяки проміжним перетворенням, таку ж саму біологічну активність, що й пантотенова кислота, однак він краще резорбується при місцевому застосуванні; пантотенова кислота є водорозчинним вітаміном, що бере участь у різних метаболічних процесах у вигляді коензиму А; пантотенова кислота необхідна для формування і регенерації шкіри і слизових оболонок; оскільки при uszkodженні епітелію та глибоких тканин спостерігається локальна нестача коензиму А, місцеве застосування декспантенолу є особливо ефективним; завдяки своїм протизапальним та протисвербіжним властивостям, а також здатності прискорювати грануляцію та реепітелізацію, декспантенол сприяє швидкому загоєнню запалення очей небактеріального генезу.

Показання для застосування ЛЗ: очний гель: неінфекційні кератопатії, в тому числі дистрофії рогівки, дегенерації рогівки, рецидивні ерозії рогівки та профілактика пошкодження рогівки при використанні контактних лінз; комплексне лікування пошкоджень рогівки та кон'юнктиви, хімічних та термічних опіків; у комплексній терапії інфекційних уражень рогівки бактеріального, вірусного та грибового походження; **очні краплі:** симптоматичне лікування сухості рогівки та кон'юнктиви, спричиненої зниженням слізної секреції, що може бути пов'язано з місцевими чи системними захворюваннями або механічною нездатністю заплющити повіки; зволоження ока при носінні жорстких контактних лінз.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: очний гель : залежно від тяжкості і вираженості симптомів призначати: по 1 крап. у кон'юнктивальний мішок ураженого ока 4 р/добу та перед сном; **очні краплі :** дорослим закапують у кон'юнктивальний мішок по 1 крап. в кожне око до 6 р/добу, у тяжких випадках можна закапувати щогодини (крап.очні); тривалість курсу лікування залежить від клінічної картини і встановлюється індивідуально.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості, у т.ч. свербіж, висип, кропив'янка, відчуття легкого печіння або слъзотеча, подразнення очей, біль в очах, підвищена слъзотеча, свербіж, набряк кон'юнктиви; гель містить консервант цетримід, що може спричинити подразнення очей (почервоніння, відчуття печіння та чужорідного тіла в оці) та пошкодити епітелій рогівки.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	КОРНЕРЕГЕЛЬ®	Др. Герхард Манн, Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ, Німеччина	гель оч. по 5г у тубі	50мг/г	№1	125,00	
	СІКАПРОТЕКТ	УРСАФАРМ Арцнайміттель ГмбХ, Німеччина	крап. оч. по 10мл у фл.-крап.	30 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

- **Таурин (Taurin)**

Фармакотерапевтична група: S01XA - засоби, що застосовуються в офтальмології. Інші офтальмологічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: містить таурин - сірковмісну амінокислоту, яка утворюється в організмі у процесі перетворення цистеїну; таурин бере участь у синтезі пластичного матеріалу, внаслідок чого стимулює репаративні і регенеративні процеси при захворюваннях очей дистрофічного характеру та/або патологічних процесах, що супроводжуються різким порушенням метаболізму очних тканин, у тому числі - при травмах очей; сприяє нормалізації ф-цій клітинних мембран, оптимізації енергетичних і обмінних процесів, підтримці сталості електролітного складу цитоплазми клітин, гальмуванню синаптичної передачі

Показання для застосування ЛЗ: дистрофічні ураження рогівки та сітківки ока, включаючи спадкові тапеторетинальні дегенерації; старечі, діабетичні, травматичні і променеві катаракти; як засіб стимуляції репаративних процесів при травмах рогівки; як додатковий засіб при лікуванні відкритокутової глаукоми.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для лікування катаракти призначати по 2-3 краплі 2-4 рази на добу щодня; термін лікування - 3 місяці. Курс повторити з інтервалом в 1 місяць; **при травмах** застосовувати по 2-3 краплі 2-4 рази на добу протягом 1 місяця; **для лікування тапеторетинальної дегенерації та інших дистрофічних захворювань сітківки, проникаючих травм рогівки** лікарський засіб вводити під кон'юнктиву по 0,3 мл 4 % розчину 1 раз на добу протягом 10 днів; курс лікування повторити через 6-8 місяців; **при відкритокутовій глаукомі** лікарський засіб закапувати по 2-3 краплі у кон'юнктивальний мішок 2 рази на добу за 20-30 хвилин до застосування тимололу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: можливий розвиток АР, гіперемії кон'юнктиви, свербіжу, печіння та різі в очах.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до таурину або до інших компонентів лікарського засобу.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	ТАУФОН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	крап. оч. по 10мл у фл. з кр.-крап.	40мг/мл	№1	18,40	
	ТАУФОН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	крап. оч. по 5мл у фл. з кр.-крап.	40мг/мл	№3	29,33	
	ТАУФОН	ПАТ "Фармак", Україна	крап. оч. по 5мл у фл.	40мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТАУФОН	ПАТ "Фармак", Україна	крап. оч. по 10мл у фл.	40мг/мл	№1	16,00	
	ТАУФОН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	крап. оч. по 5мл у фл.	40мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТАУФОН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	крап. оч. по 10мл у фл.	40мг/мл	№1	16,39	

● **Тіотриазолін (Thiotriazolin)**

Фармакотерапевтична група: S01XA - офтальмологічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: ефект обумовлений активацією антиоксидантної системи ферментів і гальмуванням процесів перекисного окислення ліпідів в ішемізованих ділянках тканин ока, зменшенням тяжкості нервово-трофічних порушень, збільшенням інтенсивності і швидкості репаративних процесів, зниженням запальної р-ції тканин, поліпшенням кровотоку в мікроциркуляторному руслі ока; сприяє ранньому відновленню чутливості рогівки, утворенню більш ніжного помутніння, значному зниженню кількості різних ускладнень, зменшує прояви зорової астенії, поліпшує функціональні показники акомодційного м'яза і центральних відділів сітківки, що поліпшує функціональну здатність очей.

Показання для застосування ЛЗ: травми і опікові ушкодження очного яблука, запальні дистрофічні захворювання рогівки, вірусні кон'юнктивіти; профілактика запалень очей, зменшення прояву зорової астенії в осіб, які працюють з персональними комп'ютерами.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають з перших днів захворювання у вигляді інстиляції по 2 крап. 3 - 4 р/добу в кон'юнктивальний мішок ураженого ока; при тяжких ураженнях інстиляції рекомендується поєднувати з підкон'юнктивальними або парабульбарними ін'єкціями 0,5 мл 1% р-ну 1 р/добу протягом 7 - 12 днів; інстиляції препарату здійснюють протягом 14 - 15 днів; при необхідності курс лікування можна продовжити до 30 днів; для осіб, що працюють з персональними комп'ютерами, препарат призначають у вигляді інстиляцій по 2 крап. безпосередньо перед початком роботи, а потім ч/з кожні 2 год.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: можливі р-ції у місці введення, при підвищеній індивідуальній чутливості можливі АР, у т. ч. свербіж, гіперемія, повідомлялося про випадки нежитю.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	ТІОТРИАЗОЛІН	Товариство з обмеженою відповідальністю	крап. оч. по 5мл у фл. з кр.-крап.	10мг/мл	№1	90,09	

		"Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна					
--	--	--	--	--	--	--	--

15.7.2. Зволожуючі та в'язуючі очні засоби (штучні сльози)

• Гіпромелоза (Hypromellose) **

Фармакотерапевтична група: S01XA20 - штучні замінники слізної рідини та інші індіферентні препарати.

Основна фармакотерапевтична дія: гіпромелоза - частково метильована і гідроксипропільована целюлоза; в нормі рогівка зволожується муцином, що продукується кон'юнктивою, муцин адсорбується на роگیвці і формує гідрофільну поверхню; при с-мі сухого ока, і особливо у випадку дефіциту муцину, призначається застосування штучної слізної рідини; гіпромелоза особливо підходить для такого застосування завдяки поверхневій активності та адсорбційній здатності; у водному р-ні знижує поверхневий натяг, підвищує в'язкість, добре фіксується на роگیвці і кон'юнктиві та забезпечує нормальне зволоження; симптоми подразнення, викликані кліпанням, спричиненим дефіцитом слізної рідини, зменшуються, що запобігає висиханню епітелію.

Показання для застосування ЛЗ: для симптоматичного лікування явищ пересихання роگیвки та слизової оболонки ока (с-м сухого ока)^{БНФ}, спричинених порушенням слізної секреції та сльозовидільної ф-ції внаслідок локальних або системних захворювань, а також у разі недостатнього або неповного змикання повік; для змочування та додаткового зволоження твердих контактних лінз

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування с-му сухого ока вимагає індивідуального дозування, зазвичай, слід закапувати у кон'юнктивальний мішок по 1 крап. від 3-х до 5-ти або більше р/день; особи, які носять м'які контактні лінзи, мають зняти їх перед застосуванням препарату і зачекати протягом 15 хв. перед тим, як вставити їх знову; також можна використовувати для повторного зволоження твердих контактних лінз.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: печіння, почервоніння, відчуття стороннього тіла в оці, затуманення зору, сльозотеча, набряк, свербіж, біль в оці; рідкісні випадки кальцифікації роگیвки під час лікування фосфатовмісними оч. крап. у пацієнтів з вираженими вадами роگیвки.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АРТЕЛАК®	Др. Герхард Манн, Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ, Німеччина	крап. оч. по 10мл у фл.-крап.	3,2мг/мл	№1	88,00	

• Карбомер (Carbomer)

Фармакотерапевтична група: S01XA20 - засоби, що застосовують в офтальмології. Штучні замінники слізної рідини та інші нейтральні препарати.

Основна фармакотерапевтична дія: високомолекулярний карбоксивінілполімер, що збільшує в'язкість слізної рідини; крапля препарату утворює захисну, прозору та зволожуючу плівку на роگیвці.

Показання для застосування ЛЗ: замісна терапія при зниженій секреції слізної рідини, лікування с-му «сухого ока», симптоматичне лікування сухого кератокон'юнктивіту^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування станів сухого ока вимагає індивідуального режиму введення; залежно від тяжкості та інтенсивності симптомів; гель оч. (2 мг/г): вводять 1 крап. у кон'юнктивальний мішок 3^{БНФ}-5 р/день або частіше та перед сном; гель оч. (2,5 мг/г): по 1 крап. в кожне око 1-4 р./добу через рівні проміжки часу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: після закапування може спостерігатися тимчасова нечіткість (затуманення) зору, незначне печіння, короточасне відчуття поколювання або місцеве подразнення очей, біль в очах, гіперемію, місцеві р-ції гіперчутливості, печіння, почервоніння, відчуття чужорідного тіла, а також пошкодження епітелію роگیвки.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ВІДІСІК	Др. Герхард Манн, Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ, Німеччина	гель оч. по 10г у тубі	2мг/мл	№1	101,00	
	ОФТАГЕЛЬ®	УРСАФАРМ	гель оч. по 10г	2,5 мг/г	№1	відсутня у	

		Арцнайміттель ГмБХ (виробник, відповідальний за виробництво in-bulk, первинне та вторинне пакування, контроль якості)/Сантен АТ (виробник, відповідальний за випуск), Німеччина/Фінляндія	у фл.			реєстрі ОБЦ
--	--	---	-------	--	--	-------------

15.7.3. Засоби, що застосовуються при катаракті

Препарати цієї групи застосовуються місцево для профілактики прогресування катаракти. Вони недостатньо ефективні при помутніннях в задній капсулі та глибоких відділах кришталика, однак дають певний позитивний ефект при тривалому прийомі.

- **Азапентацен (Azapentacen) ****

Фармакотерапевтична група: S01XA - Офтальмологічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: має велику спорідненість з SH-радикалом розчинного протеїну, пригнічуючи дію хіноїдної речовини на протеїн, який міститься у кришталику ока; здатний стимулювати дію протеолітичного ферменту, присутнього у внутрішньоочній рідині передньої камери ока; має профілактичну дію проти утворення катаракти та може уповільнювати дегенерацію кришталика

Показання для застосування ЛЗ: катаракта (вікова, травматична, вроджена, вторинна).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: ЛЗ призначений тільки для офтальмологічного застосування; закапувати по 2 крап. ЛЗ у кон'юнктивальний мішок ураженого ока (очей) 3-5 р/добу

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль в очах, подразнення очей, підвищена сльозотеча, гіперемія очей

Протипоказання до застосування ЛЗ: реакції гіперчутливості до діючої речовини або до інших компонентів ЛЗ

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	КАТАКСОЛ	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	крап. оч., р-н, по 15мл у фл.- кр.	0,15мг/мл	№1	138,03	27,05/\$

- **Калію йодид (Potassium iodide) *** (див. п. 7.3.3. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: S01XA04 - засоби, що застосовуються в офтальмології.

Основна фармакотерапевтична дія: є офтальмологічним антисклеротичним і резорбційним ЛЗ; діюча речовина йодних крапель - йод, що міститься у мікродозах, за рахунок цього препарат активує метаболічні процеси і впливає на метаболізм білків і ліпідів, внаслідок чого підвищуються вміст ліпопротеїнів в крові та фібринолітична активність; іони йоду спричиняють підвищення дисперсності колоїдів, що призводить до зниження в'язкості крові; знижена дисперсність колоїдів корелює з ознаками старіння та атеросклерозу, солі йоду перешкоджають розвитку атеросклеротичних процесів або зменшують їхню інтенсивність; вплив іонів йоду на колоїди пов'язаний з розширенням кровоносних судин, що призводить до підвищення перфузії тканин.

Показання для застосування ЛЗ: підтримання процесів резорбції в очах, зокрема у разі наявності запальних ексудатів, крововиливу та помутніння склоподібного тіла різної етіології (вік, високий АТ, ЦД), при міопічних та атеросклеротичних змінах судин сітківки та судинної оболонки очного яблука, дегенеративних процесах сітківки, катарактах на початковій стадії, атрофії зорового нерва (внаслідок сифілісу), а також як допоміжний лікувальний засіб при лікуванні грибоквих кон'юнктивітів та кератитів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза для дорослих, осіб літнього віку і дітей зазвичай 1-2 крап. 2-4 р/день у нижній кон'юнктивальний мішок ока; препарат не можна застосовувати новонародженим.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: при захворюваннях щитоподібної залози може спостерігатися негативний вплив на її ф-цію; легке відчуття печіння після введення препарату, довготривале та неконтрольоване застосування (у надмірних дозах) може спричинити стан йодизму у чутливих пацієнтів, подразнення і гіперемія кон'юнктиви, підвищена секреція сліз, набряк повік (ангіоневротичний набряк), слізної залози, еритема шкіри, акне, дерматит і пурпура, р-ції гіперчутливості, включаючи висипання, свербіж.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до йоду або будь-яких компонентів препарату; хр. піодермія шкіри обличчя; геморагічний діатез, порушення ф-ції щитовидної залози.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КАЛІУ ЙОДИД	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості,	крап. оч., р-н по 10мл у конт.-крап.	20мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

		випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна					
	КАЛІЮ ЙОДИД	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	крап. оч., р-н по 5мл у конт.-крап.	20мг/мл	№1	48,00	
II.	КАЛІЮ ЙОДИД	ТОВ "УНІМЕД ФАРМА", Словацька Республіка	крап. оч. по 10мл у фл.-крап.	20мг/мл	№1	52,90	33,00/€

Комбіновані препарати

- **Цитохром С + Аденозин + Нікотинамід (Cytochrom C + Adenosin + Nicotinamid)**

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ОФТАХРОМ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна	крап. оч. по 5мл у фл.-крап.	0,675мг/2мг/20мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	ОФТАН® КАТАХРОМ	Сантен АТ (виробник відповідальний за випуск серії)/НекстФарма АТ (виробник, відповідальний за виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль якості), Фінляндія/Фінляндія	крап. оч. по 10мл у фл.-крап.	0,675мг/2мг/20мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОФТАН® КАТАХРОМ	Сантен АТ (виробник відповідальний за випуск серії)/НекстФарма АТ (виробник, відповідальний за виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль якості)/Мануфактурінг Пакагінг Фармака (МПФ) Б.В. (Альтернативний виробник, відповідальний за втор, Фінляндія/Фінляндія/Нідерланди	крап. оч. по 10мл у фл.-крап.	0,675мг/2мг/20мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

15.7.4. Інші лікарські засоби, які використовуються в офтальмології

- **Емоксипін (Емохурін)**

Фармакотерапевтична група: C05CX - капіляростабілізуючі засоби

Основна фармакотерапевтична дія: стабілізує клітинну мембрану, інгібує агрегацію тромбоцитів і нейтрофілів, знижує загальний індекс коагуляції, подовжує час згортання крові, знижує в'язкість крові, має фібринолітичну активність, збільшує вміст циклічних нуклеотидів у тканинах, зменшує проникність судинної стінки; має ангіопротекторні властивості, захищає сітківку від пошкодження при дії світла високої інтенсивності, покращує мікроциркуляцію.

Показання для застосування ЛЗ: субкон'юнктивальні та внутрішньоочні крововиливи різного генезу; ангіоретинопатії (включаючи діабетичну ретинопатію); центральні та периферичні хореоретинальні дистрофії; тромбоз центральної вени сітківки та її гілок; ускладнена міопатія; ангіосклеротична макулодистрофія (суха форма); відшарування судинної оболонки у хворих на глаукому у післяопераційний період; дистрофічні захворювання рогівки; травми, опіки рогівки; захист рогівки (при застосуванні контактних лінз) та сітківки ока від дії світла високої інтенсивності (сонячні промені, випромінювання лазера при лазерокоагуляції).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять субкон'юнктивально або парабульбарно, а при необхідності ретробульбарно: субкон'юнктивально по 0,2 - 0,5 мл (2 - 5 мг), парабульбарно - 0,5 - 1 мл (5 - 10 мг) 1 % розчину

протягом 10 - 30 діб 1 раз на добу або через добу; при необхідності лікування можна повторювати 2 - 3 рази на рік; ретробульбарно вводять 0,5 - 1 мл препарату 1 раз на добу протягом 10 - 15 діб; для захисту сітківки при лазерокоагуляції (особливо при лазерокоагуляції, яка обмежує або руйнує пухлину) 0,5 - 1 мл вводять парабульбарно або ретробульбарно за 24 години і за 1 годину до процедури, а потім - у тих самих дозах (по 0,5 мл 1 % розчину) 1 раз на добу протягом 2 - 10 діб.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: короткочасне збудження, сонливість, підвищення артеріального тиску, АР (шкірні висипання, свербіж, почервоніння), місцеві реакції - біль, відчуття печіння та ущільнення параорбітальних тканин (розсмоктується саме по собі)

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена індивідуальна чутливість до препарату

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	ЕМОКСИПІН®	ПрАТ "Лекхім – Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл. та пач.	10мг/мл	№5x2, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕМОКСИПІН®	ПрАТ "Лекхім – Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл. та пач.	10мг/мл	№10	120,32	
	ОФТАЛЕК	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у пач.	10мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОФТАЛЕК	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у пач.	10мг/мл	№5x2	175,00	
	ОФТАЛЕК	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у пач.	10мг/мл	№100	1750,00	

• **Ранібізумаб (Ranibizumab)**

Фармакотерапевтична група: S01LA04 - Засоби, що застосовуються при судинних захворюваннях очей. Антинеоваскуляризаційні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: фрагмент рекомбінантного гуманізованого моноклонального антитіла проти людського судинного ендотеліального фактора росту А (VEGF-A); має високу спорідненість з ізоформами VEGF-A (наприклад VEGF110, VEGF121 та VEGF165) і, таким чином, запобігає прикріпленню VEGF-A до його рецепторів VEGFR-1 та VEGFR-2; прикріплення VEGF-A до його рецепторів призводить до проліферації ендотеліальних клітин та неоваскуляризації, а також проникності судин, що, як вважається, сприяє розвитку неоваскулярної форми вікової макулярної дегенерації (ВМД) та діабетичного макулярного набряку, вторинного відносно тромбозу вен сітківки.

Показання для застосування ЛЗ: лікування неоваскулярної (ексудативної) вікової макулярної дегенерації (ВМД)^{БНФ}; лікування порушення зору при діабетичному макулярному набряку (ДМН)^{БНФ}; лікування порушення зору при макулярному набряку, вторинному відносно тромбозу вен сітківки^{БНФ} (тромбоз центральної вени сітківки або тромбоз гілок центральної вени сітківки), лікування порушення зору внаслідок хоріоїдальної неоваскуляризації (ХНВ), вторинної відносно до патологічної міопії (ПМ)^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для інтравітреального введення^{БНФ} (введення повинен виконувати лише кваліфікований лікар-офтальмолог, який має досвід проведення інтравітреальних ін'єкцій); рекомендована доза - 0,5 мг у вигляді одноразової інтравітреальної ін'єкції^{БНФ}, ця доза відповідає об'єму ін'єкції в 0,05 мл; інтервал між введеннями 2-х доз в одне око повинен становити щонайменше 4 тижні; розпочинають з 1 ін'єкції на місяць і продовжують, доки не буде досягнута максимальна гострота зору та/або не зникнуть ознаки активності захворювання, тобто зміни гостроти зору та інші ознаки та симптоми захворювання; пацієнтам з ексудативною ВМД, ДМН та тромбозом вен сітківки може бути потрібно 3 або більше щомісячних ін'єкцій поспіль,^{БНФ} якщо показники гостроти зору або анатомічні параметри вказують на відсутність користі від продовження лікування для пацієнта, застосування препарату припинити; якщо пацієнти отримують лікування за схемою "treat-and-extend" ("лікування та продовження"), після досягнення максимальної гостроти зору та (або) відсутності ознак активності захворювання інтервали між введеннями препарату можна поступово збільшувати до рецидиву ознак активності захворювання або погіршення зору. Інтервал між введеннями препарату продовжувати не більше як на два тижні за один раз у випадку ексудативної ВМД, і можна продовжувати максимум на 1 міс. за 1 раз у випадку ДМН; у випадку тромбозу вен сітківки інтервали між введеннями препарату також можна поступово збільшувати, однак наявні дані є недостатніми, щоб зробити остаточні висновки стосовно тривалості цих інтервалів; у разі рецидиву активності захворювання інтервали між введеннями препарату відповідно скоротити; застосування ранібізумаба та лазерної фотокоагуляції при ДМН та макулярному набряку, спричиненому тромбозом гілок центральної вени сітківки^{БНФ}: був отриманий невеликий досвід введення ранібізумаба одночасно з лазерною фотокоагуляцією; при застосуванні в один і той самий день ранібізумаб потрібно вводити щонайменше через 30 хв. після лазерної фотокоагуляції;^{БНФ} можна застосовувати пацієнтам, яким лазерна фотокоагуляція проводилася раніше.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ринофарингіт, інфекція сечових шляхів, анемія, гіперчутливість, тривожність, головний біль, запалення склистого тіла, відшарування склистого тіла, крововиливи в сітківку ока, порушення зору, біль в оці, плаваючі помутніння склистого тіла, крововиливи в кон'юнктиву, подразнення ока, відчуття стороннього тіла в оці, підвищене сльозовиділення, блефарит, сухість очей, гіперемія ока, відчуття свербіжу в оці, дегенерація сітківки, порушення функцій сітківки ока, відшарування сітківки ока, розрив сітківки, відшарування пігментного епітелію сітківки, відрив пігментного епітелію сітківки, зниження

гостроти зору, крововиливи в склисте тіло, порушення функції склистого тіла, увеїт, ірит, іридоцикліт, катаракта, субкапсулярна катаракта, помутніння задньої капсули, точковий кератит, ушкодження рогівки, запалення передньої камери ока, нечіткий зір, геморагія в місці ін'єкції, крововилив в око, кон'юнктивіт, алергічний кон'юнктивіт, виділення з ока, фотопсія, фотофобія, відчуття дискомфорту в оці, набряк повіки, біль у повіці, гіперемія кон'юнктиви, сліпота, ендoftальміт, гіпопійон, гіфема, кератопатія, спайки райдужки, відкладення на рогиці, набряк рогики, утворення стрій на рогиці, біль у ділянці ін'єкції, подразнення в місці ін'єкції, патологічне відчуття в оці, подразнення повіки, кашель, нудота, АР (висипання, кропив'янка, свербіж, еритема), артралгія, підвищення ВТ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до активної речовини чи будь-якого іншого інгредієнта препарату; активний/підозрюваний окулярний чи періокулярний інфекційний процес; активний тяжкий інтраокулярний запальний процес.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЛУЦЕНТИС	Новартис Фарма Штейн АГ, Швейцарія	р-н д/ін'єк. по 0,23мл у фл. з голк.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Афліберсепт (Aflibercept)**

Фармакотерапевтична група: S01LA05 - засоби, які застосовують при розладах судин ока.

Основна фармакотерапевтична дія: рекомбінантний гібридний білок, що складається із частин позаклітинних доменів 1-го та 2-го рецепторів до судинного ендотеліального фактора росту (Vascular Endothelial Growth Factor - VEGF) людини, злитих з Fc-ділянкою людського IgG1; виробляється клітинами K1 яєчника китайського хом'ячка за технологією рекомбінантної ДНК; діє як розчинний рецептор-пастка, який зв'язує судинний ендотеліальний фактор росту-A (VEGF-A) та плацентарний фактор росту (Placental Growth Factor - PlGF) зі значно вищою спорідненістю, ніж при зв'язуванні з природними рецепторами і, таким чином, може інгібувати зв'язування і активацію цих споріднених VEGF-рецепторів. Механізм дії. VEGF-A та PlGF є членами VEGF-сімейства ангіогенних факторів, які можуть впливати на ендотеліальні клітини як сильнодіючі мітогенні та хемотаксичні фактори, а також фактори проникності судин. VEGF реалізує свою дію через два тирозинкіназні рецептори VEGFR-1 та VEGFR-2, присутні на поверхні ендотеліальних клітин. PlGF зв'язується лише з VEGFR-1, що також присутній на поверхні лейкоцитів. Надмірна активація цих рецепторів з боку VEGF-A може призвести до патологічної неоваскуляризації та надмірної проникності судин. PlGF може діяти синергічно з VEGF-A у вказаних процесах та сприяти лейкоцитарній інфільтрації і запаленню судин.

Показання для застосування ЛЗ: неоваскулярна (волога) вікова макулодистрофія (ВМД); порушення зору ч/з набряк макули, що розвинувся внаслідок тромбозу вен сітківки (тромбозу гілки центральної вени сітківки (ТЦВС) або тромбозу центральної вени сітківки (ТЦВС)); порушення зору внаслідок діабетичного набряку макули (ДНМ), порушень зору внаслідок міопічної хоріоїдальної неоваскуляризації (МХНВ) ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: волога вікова макулодистрофія (ВМД): рекомендована доза 2 мг ^{БНФ} (50 мікролітрів); лікування розпочинати з 1 ін'єк. 1 р/міс. впродовж перших 3 міс. Потім інтервал між ін'єкціями подовжується до 2х міс.; на підставі оцінки лікарем результатів дослідження ф-ції зору та/або об'єктивного дослідження інтервал між ін'єкціями, що становить 2 міс., можна підтримувати або подовжити із використанням режиму терапії «лікування та подовження» («treat-and-extend») зі збільшенням інтервалів між введенням доз лікарського засобу на 2 або 4 тижні для підтримання стабільних показників ф-ції зору та/або відповідних результатів об'єктивного дослідження; при погіршенні ф-ції зору та/або відповідних результатів об'єктивного дослідження інтервал між застосуванням препарату слід відповідним чином зменшити мінімум до 2 місяців протягом перших 12 місяців лікування; набряк макули, що розвинувся внаслідок ТЦВС або ТЦВС: рекомендована доза 2 мг ^{БНФ} (50 мікролітрів); після першої ін'єкції лікування проводити 1 р/міс.; інтервал між застосуванням 2х доз повинен становити щонайменше 1 міс ^{БНФ}; діабетичний набряк макули: рекомендована доза 2 мг ^{БНФ} (50 мікролітрів); лікування розпочинати з 1 ін'єк. 1 р/міс. 5 міс. , після чого застосовувати по 1 ін'єк. 1 р/2 міс. ^{БНФ}; ч/з 12 міс. від початку лікування можна подовжити інтервали між ін'єк., виходячи з показників ф-ції зору та об'єктивного дослідження ^{БНФ}; графік здійснення моніторингу стану пацієнта визначає особистий лікар; якщо показники функції зору та результати об'єктивного дослідження свідчать про відсутність користі для пацієнта від продовження лікування, препарат відмінити; міопічна хоріоїдальна неоваскуляризація: рекомендована доза 2 мг ^{БНФ}; якщо показники ф-ції зору та/або відповідні результати дослідження свідчать, що захворювання зберігається, може бути введена додаткова доза, рецидиви лікуються як нові прояви захворювання; інтервал між введенням 2-х доз повинен становити не менше 1-го міс.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: зниження гостроти зору, крововилив у кон'юнктиву, біль в оці, розрив пігментного епітелію сітківки, відшарування пігментного епітелію сітківки, дегенеративні зміни сітківки, крововилив у склисте тіло, катаракта, ядерна катаракта, субкапсулярна катаракта, ерозія рогики, абразія рогики, підвищення ВТ, порушення чіткості зору, деструкція склистого тіла, відшарування склистого тіла, біль у місці ін'єкції, відчуття стороннього тіла в очах, посилена сльозотеча, набряк повіки, крововилив у місці ін'єкції, точковий кератит, гіперемія кон'юнктиви, гіперемія очей, ендoftальміт, відшарування сітківки, розрив сітківки, ірит, увеїт, іридоцикліт, помутніння кришталіка, ушкодження епітелію рогики, подразнення у місці ін'єкції, незвичні відчуття в оці, подразнення повіки, клітинна опалесценція у передній камері ока, набряк рогики, сліпота, травматична катаракта, вітрил, гіпопійон.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин; активна або підозрювана окулярна чи періокулярна інфекція; активне т. запалення інтраокулярних структур.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АЙЛІЯ®	Байер АГ (виробництво (включаючи стерильну фільтрацію, наповнення - первинна упаковка), вторинна упаковка, контроль серії, відповідальний за випуск серії для флаконів, контроль серії для попередньо заповнених шприців; контроль якості для флаконів)/ГП Грен, Німеччина/Німеччина/США/Німеччина/США	р-н д/ін'єк. по 0,165мл у шпр.	40мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЙЛІЯ®	Байер АГ (виробництво (включаючи стерильну фільтрацію, наповнення - первинна упаковка), вторинна упаковка, контроль серії, відповідальний за випуск серії для флаконів, контроль серії для попередньо заповнених шприців; контроль якості для флаконів)/ГП Грен, Німеччина/Німеччина/США/Німеччина/США	р-н д/ін'єк. по 0,278мл у скл. фл. з фільтр. голк. 18G;р-н	40мг/мл	№1	21338,00	31,43/€

16. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

16.1. Засоби, що застосовуються при захворюваннях вуха

16.1.1. Засоби для видалення сірчаної пробки

16.1.2. Засоби для лікування зовнішнього отиту

16.1.2.1. Комбінації глюкокортикоїдів з антибактеріальними або протигрибковими засобами

16.1.2.2. Антибактеріальні та антисептичні засоби

16.1.2.3. Протигрибкові засоби

16.1.2.4. Комбінації протигрибкових, антибактеріальних засобів, місцевих анестетиків та глюкокортикоїдів

16.1.3. Засоби для лікування середнього отиту

16.1.4. Засоби для лікування кохлеовестибулярних розладів

16.2. Лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях носа та навколоносових синусів

16.2.1. Засоби для лікування ринітів та синуситів

16.2.1.1. Лікарські засоби для місцевого застосування

16.2.1.1.1. Антибактеріальні лікарські засоби для місцевого застосування

16.2.1.1.2. Комбінації антибактеріальних засобів з глюкокортикоїдами та адреноміметиками

16.2.1.1.3. Симпатоміметики для місцевого застосування

16.2.1.1.3.1. Прості лікарські засоби

16.2.1.1.4. Антигістамінні засоби для місцевого застосування

16.2.1.1.5. Глюкокортикоїди для місцевого застосування

16.2.1.1.6. Стабілізатори мембран опасистих клітин

16.2.1.1.7. Засоби елімінаційної терапії при захворюваннях носа

16.2.1.2. Лікарські засоби для системного застосування

16.2.1.2.1. Антигістамінні засоби

16.2.1.2.2. Глюкокортикоїди для системного застосування

16.2.1.2.3. Імуномодулятори

16.2.2. Засоби для лікування поліпозної риносинусопатії

16.2.3. Засоби для лікування носової кровотечі

16.2.4. Засоби для лікування атрофічного риніту

16.3. Лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях глотки

16.3.1. Антисептичні засоби

16.3.1.1. Прості антисептичні засоби

16.3.1.2. Комбіновані антисептичні засоби

16.3.2. Рослинні лікарські засоби

16.4. Засоби, що застосовуються при захворюваннях гортані

16.4.1. Засоби для лікування ларингіту

16.4.2. Засоби для лікування набряку гортані

16.1. Засоби, що застосовуються при захворюваннях вуха

16.1.1. Засоби для видалення сірчаної пробки

Вушна сірка – нормальний продукт життєдіяльності сірчаних залоз, що містяться в зовнішньому слуховому ході. Зазвичай вушна сірка евакуюється з вуха самостійно. При порушенні самостійного видалення сірки утворюються сірчані пробки. Коли сірчана пробка призводить до порушення слуху, її або видаляють за допомогою вимивання, або з допомогою інструментів. Для вимивання використовують шприц Жане, воду, підігріту до t° тіла або р-н 0,02% фурациліну, 0,1% р-н калію перманганату. У хворих з перфорацією барабанної перетинки та у пацієнтів, які перенесли операції на вусі, сірчані пробки видаляють лише інструментально. За необхідності пробку розм'якшують перед промиванням за допомогою вушних крапель: 5% р-ну гідрокарбонату

натрію, 3% р-ну перекису водню. Для розм'якшення щільних пробок краплі можна застосовувати протягом кількох днів.

16.1.2. Засоби для лікування зовнішнього отиту

Після збирання анамнезу проводять огляд вушної раковини, зовнішнього слухового проходу та барабанної перетинки. За необхідності виконують туалет зовнішнього слухового проходу з видаленням патологічних виділень та беруть мазок для мікробіологічного дослідження.

ЛЗ вводять у зовнішній слуховий прохід шляхом вливання крап. з наступним їх нагнітанням у глибокі відділи за рахунок натиснення на козелець (хворий при цьому нахиляє голову в бік, протилежний хворому вуху, або ж крап. вводять в положенні лежачи на боці), інсуфляції – вдування порошку, змазування шкіри мазями за допомогою зонду з ватою. Подовження дії ЛЗ можна досягнути за рахунок введення у зовнішній слуховий прохід марлевої турунди, просоченої р-ном препарату, або маззю.

Для лікування зовнішнього отиту бактеріального походження застосовують місцеві АБЗ, частіше їх комбінують із системними АБЗ. Якщо має місце перфорація барабанної перетинки, ототоксичні антибіотики протипоказані. Щоб запобігти розвитку грибкової флори, курс лікування АБЗ для місцевого застосування не повинен перевищувати 7-10 діб. При вираженому запаленні шкіри слухового проходу й особливо екзематозних змінах доцільне застосування місцево комбінації АБЗ та ГК.

Препарати 3-5% р-ни срібла протейнату або срібла нітрату застосовують для зменшення запалення шкіри. Грануляції та поліпи припікають згаданими препаратами, але у вищих їх концентраціях.

З метою знеболення додатково призначають неопіоїдні анальгетики, наприклад парацетамол.

При інфекції, викликаній резистентними стафілококами, препаратами вибору є мупіроцин, стафілококовий бактеріофаг. У хворих з імунодефіцитом та ЦД збудником часто є *P.aeruginosa*, тому їм показані ципрофлоксацин, місцево – хлоргексидин.

При опіках вушної раковини і зовнішнього слухового проходу призначають вісмуту субгалат з ланоліном та вазеліном по 5,0 г; ацетат алюмінію з дистильованою водою 2:100.

При екземі шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового проходу призначають ГК-креми та мазі (див. розділ «Дерматовенерологія. Лікарські засоби»), при цьому віддається перевага комбінованим ЛЗ, що містять преднізолон, кліохінол, проте не слід допускати довготривалого його застосування.

При відмороженні вушної раковини місцево застосовують іхітол з ланоліном 1:1, алюмінію ацетату 8% р-н (1 ч. л. на 50 мл води).

При підозрі на грибкове ураження шкіри зовнішнього слухового проходу беруть матеріал для мікологічного дослідження. При ураженні плісневими грибами (наприклад, *Aspergillus*) основу місцевої терапії складають чутливі до аспергіл протигрибкові препарати для місцевого застосування. Якщо висіваються гриби *Candida*, ефективними є клотримазол, біфоназол, кетоконазол, міконазол; при поєднаному грибковому та бактеріальному ураженні застосовують ізоконазол, ЛЗ у складі яких містяться *хлорамфенікол*, *клотримазол*, *беклометазон*. За недостатньої ефективності місцевого протигрибкового лікування призначають системну терапію протягом 10 діб.

16.1.2.1. Комбінації глюкокортикоїдів з антибактеріальними або протигрибковими засобами

(також див. розділ «ОФТАЛЬМОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»)

16.1.2.2. Антибактеріальні та антисептичні засоби

- **Офлоксацин (Ofloxacin)** (див. п. 17.2.11. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: S03AA - засоби, що застосовуються в офтальмології та отології. Протимікробні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: належить до групи фторхінолонів; у клітинах бактерій він пригнічує ДНК-гіразу-фермент, необхідний для дуплікації та транскрипції ДНК бактерій; має широкий антибактеріальний спектр дії: *St. aureus* (включаючи штами, які продукують пеніциліназу, і деякі метицилінорезистентні штами), *Streptococcus pneumoniae*, *St. faecalis*, *St. pyogenes*, види *Corynebacterium*, види *Micrococcus*, види *Bacillus*, *Enterobacteriaceae* (*Escherichia coli*, *Citrobacter*, *Enterobacter*, *Klebsiella*, *Proteus*, *Salmonella*, *Serratia*, *Shigella* і т. д.), *Pseudomonas aeruginosa* і види *Pseudomonas*, *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus ducreyi*, *Branhamella catarrhalis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria meningitis*, види *Acinetobacter*, види *Campylobacter*, *Gardenerella vaginalis*, *Helicobacter pylori*, *Brucella*. Також ефективний проти *Chlamydia trachomatis*, *Chlamydia pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae* і деяких інших мікоплазм.

Показання для застосування ЛЗ: лікування бактеріальних інфекцій, спричинених патогенами, чутливими до офлоксацину, у дорослих і дітей віком від 12 років, для лікування зовнішнього отиту, хр. гнійного середнього отиту (з перфорацією барабанної перетинки), та у дорослих - для профілактики при проведенні вушної хірургії; для лікування дітей віком від 1 до 11 років застосовують при зовнішньому отиті і г. середньому отиті з тимпаностомією.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: крап. треба вводити у зовнішній слуховий прохід вуха у положенні пацієнта лежачи, хворим вухом догори, у такому положенні пацієнт повинен перебувати протягом 5 хв. після введення препарату, введення холодного р-ну слід уникати, бо це може спричинити термічну р-цію (запаморочення), рекомендується перед застосуванням зігріти фл., потримавши його у долоні впродовж 1-2 хв, для успішного введення крап. до середнього вуха потрібно під час введення відтягнути козелок вуха назовні, у напрямку обличчя; дорослі і діти віком від 12 р.: звичайно при лікуванні зовнішнього отиту вводять 10 крап. двічі на день протягом 10 днів, при лікуванні хр. гнійного середнього отиту з хр. перфорацією барабанної перетинки рекомендована доза становить 10 крап. двічі на день протягом 14 днів; діти віком від 1 до 11 р.: спосіб застосування і дозування для дітей повинні спеціально призначатися отоларингологом, а весь період лікування повинен проводитися під його наглядом в амбулаторному відділенні, рекомендована доза при лікуванні зовнішнього отиту і г. середнього отиту з тимпаностомією становить 5 крап. двічі на день впродовж 10 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперчутливість, у т. ч. ангіоневротичний набряк, задишка, анафілактичні р-ції/шок, набряк ротоглотки і язика; запаморочення, парестезія; подразнення очей; дискомфорт в очах; свербіж або підвищена чутливість у місці застосування; випадки відкладень на рогівці відзначалися у зв'язку

з використанням очних крапель, що містять фосфат, особливо при наявності в анамнезі захворювань рогівки; кератит, кон'юнктивіт, затуманення зору, фотофобія, набряк очей, почервоніння ока, відчуття стороннього тіла, посилена слюзотеча, сухість очей, біль в очах, свербіж очей; свербіж повік; гіперемія ока, періорбітальний набряк (включаючи набряк повіки); нудота, сухість у роті; шлуночкова аритмія, пароксизмальна шлуночкова тахікардія типу «пірует», подовження QT на ЕКГ; набряк обличчя, періорбітальний набряк, синдром Стівенса - Джонсона, токсичний епідермальний некроліз; свербіж або гіперчутливість у місці застосування; шум у вухах, вушний біль.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або інших фторхінолонів чи до інших компонентів препарату; хр. кон'юнктивіти небактеріального походження; інфекційні запалення зовнішнього слухового проходу чи внутрішнього вуха, спричинені стійкими до офлоксацину штамми бактерій.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	УНІФЛОКС	ТОВ "УНІМЕД ФАРМА", Словацька Республіка	крап. оч./вуш., р-н по 5мл у конт.-кр.	3мг/мл	№1	66,13	33,00/€

- **Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) *** (див. п. 17.2.11. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: S03AA07 - Засоби для застосування в офтальмології та отології. Протимікробні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: група фторхінолонів; бактерицидна дія, впливає на синтез ДНК бактерій, шляхом пригнічення ДНК-гірази; має високу активність in vitro відносно більшості грамнегативних мікроорганізмів, включаючи *Pseudomonas aeruginosa*; види *Bacillus*; види *Corynebacterium*; *Enterococcus faecalis*; *Staphylococcus aureus*; *Staphylococcus epidermidis*; *Staphylococcus caprae*; *Staphylococcus capitis*; *Staphylococcus haemolyticus*; *Streptococcus pneumoniae*; *Streptococcus* групи *Viridans*; ефективний in vitro відносно аеробних грампозитивних мікроорганізмів: *Achromobacter xylosoxidans subsp. xylosoxidans*; *Acinetobacter baumannii*; *Acinetobacter junii*; *Acinetobacter Iwoffii*; *Acinetobacter radioresistans*; геновиди *Acinetobacter 3*; *Citrobacter freundii*; *Citrobacter koseri*; *Enterobacter aerogenes*; *Enterobacter cloacae*; *Escherichia coli*; *Haemophilus influenzae*; *Klebsiella oxytoca*; *Klebsiella pneumoniae*; *Moraxella catarrhalis*; *Proteus mirabilis*; *Pseudomonas stutzeri*; *Serratia marcescens*.

Показання для застосування ЛЗ: г.отит зовнішнього вуха^{БНФ}, г.отит середнього вуха з дренажем ч/з тимпаностомічну трубку, спричинені штамми бактерій, чутливими до препарату.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим, включаючи пацієнтів літнього віку, 4 крап. у вушний прохід 2 р/день; для пацієнтів, яким потрібне застосування вушних тампонів, дозу можна подвоїти тільки при першому застосуванні, тривалість лікування 5-10 днів, у деяких випадках лікування можна подовжити, але рекомендується перевірити чутливість місцевої флори

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: плаксивість, головний біль, порушення з боку органів слуху та лабіринту: біль у вусі, закладеність вуха, оторея, свербіж у вусі, дзвін у вухах; дерматит; гіпертермія; ймовірність виникнення алергічної р-ції на будь-який з компонентів препарату; дуже рідко виникали такі р-ції як (генералізований) висип, токсичний епідермоліз, ексфолювативний дерматит, с-м Стівенса-Джонсона та кропив'янка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до ципрофлоксацину, інших хінолонів або до будь-якого компоненту препарату.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЦИПРОФАРМ®	ПАТ "Фармак", Україна	крап. оч./вуш. по 5мл у фл.	0,3%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦИПРОФАРМ®	ПАТ "Фармак", Україна	крап. оч./вуш. по 10мл у фл.	0,3%	№1	66,00	
	ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск	крап. оч./вуш. по 10мл у фл. з кр.-крап.	3мг/мл		відсутня у реєстрі ОБЦ	

		серії), Україна/Україна					
	ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	крап. оч./вуш. по 5мл у фл. з кр.-крап.	3мг/мл	№1	43,56	
II.	ЦИПРОФЛОКСОФАРМ	К.Т. Ромфарм Компані С.Р.Л., Румунія	крап. оч./вуш., р-н, по 5мл у фл. крап.	0,3%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Норфлоксацин (Norfloxacin)** (див. п. 17.2.11. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: S03AA - засоби, що застосовуються в офтальмології та отології. Протимікробні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: антимікробний засіб групи фторхінолонів; пригнічує активність ДНК-гіраз бактерійної клітини та реплікацію ДНК бактерій; має широкий спектр антимікробної дії щодо переважної більшості Гр(-) м/о. До дії препарату нечутливі анаеробні бактерії, малочутливі *Enterococcus* і *Acinetobacter*.

Показання для застосування ЛЗ: інфекції зовнішнього та середнього вуха (зовнішні отити, хр. гнійні середні отити).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим і дітям віком від 15 р. у вухо по 5 крап. 3 р/добу, крап. повинні мати t° тіла, перед застосуванням провести санацію зовнішнього слухового проходу, пацієнтові слід лягти на бік або нахилити голову, щоб полегшити закапування, після інстиляції голову тримати у цьому положенні 2 хв, у зовнішній слуховий прохід можна покласти ватну турунду, коли симптоми захворювання зникають, застосування продовжити протягом наступних 48 год.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР (висипання, гіперемія шкіри, свербіж, набряк Квінке, дерматит); свербіж у вусі, дзвін у вухах; неприємний присмак у роті.

Противпоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до фторхінолонів; вагітність і лактація; дити віком до 15 років.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НОРФЛОКСАЦИН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	крап. оч./вуш., р-н по 5мл у фл. з кр.-крап.	3мг/мл	№1	47,65	
II.	НОРМАКС	Алкон Парентералс (I) Лімітед, Індія	крап. оч./вуш. по 5мл у фл.-крап. або скл. фл. з крап.	3 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Декаметоксин (Decamethoxin)**

Фармакотерапевтична група: S02AA - засоби для застосування в отології. Протимікробні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: антисептична, бактерицидна, спороцидна, фунгіцидна дії; широкий спектр антимікробної дії відносно Гр (+) і Гр (-) м/о (гноетворні коки, у тому числі стафілококи з множинною антибіотикостійкістю, ентеробактерії, коринебактерії дифтерії), найпростіших, дріжджоподібних грибів роду *Candida*, дерматомицетів та вірусів; підвищує чутливість бактерій до АБ, потенціує дію традиційних антимікробних засобів при комплексному лікуванні.

Показання для застосування ЛЗ: лікування бактеріальних і грибкових г. і хр. зовнішніх і середніх перфоративних отитів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: у кожне вухо закапують по 2-3 крап. 3-4 р/добу; тривалість курсу лікування залежить від тяжкості захворювання і досягнутого ефекту.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: швидкоминуче відчуття печіння, р-ція місцевого подразнення шкіри вуха (зовнішнього слухового проходу, вушної раковини) при підвищеній індивідуальній чутливості до препарату.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату або етанолу, діти до 12 р.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АУРІДЕКСАН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	крап. вуш. по 10мл у фл. з кр.-крап.	0,5мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АУРІДЕКСАН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	крап. вуш. по 5мл у фл. з кр.-крап.	0,5мг/мл	№1	56,65	

16.1.2.3. Протигрибкові засоби

Для лікування зовнішнього отиту грибової етіології застосовуються традиційні протигрибкові ЛЗ – біфоназол, клотримазол, еконазол, хлорнітрофенол - (див. розділ «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»).

16.1.2.4. Комбінації протигрибкових, антибактеріальних засобів, місцевих анестетиків та глюкокортикоїдів

- **Хлорамфенікол + клотримазол + беклометазон + лідокаїн (Chloramphenicol + clotrimazol + beclometazon + lidocain)**

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	КАНДИБІОТИК	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія	крап. вуш. по 5мл у фл.	50мг/10мг/0, 25мг/20мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

16.1.3. Засоби для лікування середнього отиту

При г. середньому отиті у дітей найчастіше етіологічне значення мають пневмококи, гемофільна паличка, моракселла, у дорослих – також β-гемолітичні стрептококи, стафілококи, змішана флора. Під час епідемічного спалаху грипу можлива вірусна етіологія захворювання.

Основу лікування становлять АБЗ, які значно знижують ризик порушення слуху та ймовірність переходу процесу в хр. форму. Засоби лікування г. середнього отиту бактеріального походження залежать від стадії захворювання, віку хворого, інших чинників та застосовуються місцево, системно або місцево і системно одночасно. На стадії ексудації застосовують хірургічне лікування – парацентез. При захворюванні середньої тяжкості у дітей протягом перших діб призначають симптоматичне лікування (неопіоїдні анальгетики та топічні деконгестанти, якщо порушене носове дихання). За відсутності позитивної динаміки протягом 24 год необхідне призначення АБЗ. *Діти до 2 років практично завжди потребують їх призначення.* Препарати місцевої дії (краплі в вухо) чинять виражену знеболюючу дію при отитах.

Вибір АБЗ відбувається з урахуванням даних про поширеність клінічно значимих збудників та їх резистентність (див. розділ «Протимікробні та антигельмінтні засоби»). Для системної терапії зазвичай застосовують амоксицилін, амоксицилін/клавуланат, рокситроміцин, азитроміцин, цефуроксим, цефтриаксон, метронідазол. Якщо з'явилась перфорація барабанної перетинки, місцево застосовують рифаміцин. Застосування ототоксичних а/б категорично протипоказане. З метою відновлення або покращення функцій слухової труби застосовують судинозвужуючі засоби (оксиметазолін та ін.) у вигляді крап. в ніс 2-3 р/добу. При

вірусній етіології є доцільним призначення інтерферону людського рекомбінантного альфа-2b у вигляді крап. в ніс. Хворого слід попередити, щоб він сякався з відкритим ротом, не сильно й не одночасно через обидві ніздрі. Нормалізації функції слухової труби сприяє також її продування за Політцером (можливе лише після усунення запалення в носі та носоглотці) або за допомогою вушного катетера з введенням через просвіт катетера лікарської суміші, яка містить р-н а/б та ГК (наприклад, гідрокортизону або дексаметазону).

Для місцевого лікування при г. середньому отиті застосовують вушні крап. або вводять в зовнішній слуховий прохід марлеві турунди, просочені р-н ЛЗ.

Вибір ЛЗ залежить від форми та стадії захворювання. У перфоративній стадії з метою видалення гною із слухового проходу та барабанної порожнини необхідно 2-3 р/добу проводити туалет вуха (краще – після закапування 2-3 крап. 3% р-ну перекису водню, який через 1-2 хв видаляють). Потім у вухо вливають р-ни, попередньо підігріті до 37 °С. Більш ефективним буде транстимпанальне нагнітання ЛЗ, що сприяє їх кращому проникненню у барабанну порожнину і контакту зі слизовою оболонкою середнього вуха.

Коли оторея припиняється та закривається перфорація барабанної перетинки, з метою попередження утворення спайок та рубців у барабанній порожнині починають продування слухової труби за Політцером або через катетер та пневмомасаж барабанної перетинки. З тією ж метою призначають протеолітичні ферменти (гіалуронідаза, трипсин, хімотрипсин), які застосовують місцево методом електрофорезу або вводять у вигляді р-ну через просвіт слухової труби при її катетеризації. Ферментні препарати застосовують також при ексудативному та адгезивному середньому отиті. Їх ефект більше виражений у початковій стадії патологічного процесу.

При хр. гнійному середньому отиті провідним є хірургічний метод лікування, проведення якого є ефективнішим у ранні строки з метою попередження розвитку прогресуючої приглуховатості та тяжких внутрішньочерепних ускладнень. Медикаментозне лікування показано в період загострення з метою попередження затримки гною у середньому та зовнішньому вусі. Перед початком місцевого та системного застосування АБЗ визначають чутливість мікрофлори. Місцево можна використовувати 0,5-1% р-н діоксидину, 0,05% р-н хлоргексидину.

В разі виникнення АР підбирають інші АБЗ та ГЛ. ЛЗ вводять шляхом вливання або транстимпанального нагнітання крап. у вухо.

Протипоказане використання ототоксичних АБЗ. Для розрідження в'язкого секрету перед застосуванням ЛЗ вводять ферментні препарати (трипсин, хімотрипсин). Великі грануляції та поліпи видаляють за допомогою вушного конхотому, кюретки або вушної петлі.

При повторному мікотичному ураженні середнього вуха місцево застосовують натаміцин у вигляді крему, що містить поліміксину В сульфат, неоміцину сульфат, хлорнітрофенол, діоксидин, хлоргексидин (0,05% р-н).

• **Рифаміцин (Rifamycin)**

Фармакотерапевтична група: S02AA12 - препарат для застосування в отології. Протимікробні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: антимікробна активність відносно більшості Гр (+) та Гр (-) м/о, що спричиняють розвиток інфекційно-запальних захворювань середнього вуха; механізм дії пов'язаний з утворенням стабільного комплексу з ДНК-залежною РНК-полімеразою, який перешкоджає росту бактерій; активний відносно *Bacillus anthracis*, *Listeria monocytogenes*, *R. equi*, *Staphylococcus*, *Streptococci A, B, C, G, Streptococcus, V. catarrhalis, Brucella, H. ducreyi, H. influenzae, N. gonorrhoeae, N. meningitidis, Pasteurella, Bacteroides, C. difficile, C. perfringens, Fusobacterium, Peptostreptococcus, Propionibacterium acnes, Chlamydia, Coxiella burnetii, Legionella, Mycobacterium, Enterococci*.

Показання для застосування ЛЗ: місцево лікування певних видів гнійної отореї при таких станах: застосування тимпаностомічної трубки; гнійне ураження барабанної порожнини; загострення хронічного середнього отиту з перфорацією барабанної перетинки.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим закапують у зовнішній слуховий прохід в уражене вухо по 5 крап. 2 р/добу; дітям закапують у зовнішній слуховий прохід по 3 крап. 2 р/добу; середня тривалість лікування - 7 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: через вмістит сульфатів, існує ризик АР (анафілаксія, бронхоспазм, висипання, екзема) можливе рожеве забарвлення барабанної перетинки (можна побачити при отоскопії).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ОТОФА	Лабораторії Бушара Рекордаті, Франція	крап. вуш., р-н по 10мл у фл.	26 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

16.1.4. Засоби для лікування кохлеовестибулярних розладів

Лікування сенсоневральної приглуховатості (СНП) має проводитися з урахуванням відомих ланок патогенезу і стану органів і систем, пов'язаних зі слуховою системою, а при можливості - впливом на етіологічні чинники, з залученням, при необхідності, відповідних спеціалістів, а також обов'язковим системним і індивідуальним підходом. При цьому, обов'язковим є врахування стану церебральної гемодинаміки, серцевої діяльності і ЦНС.

При лікуванні СНП застосовуються: дезінтоксикаційна терапія (з цих заходів починається курс лікування при наявності ознак інтоксикації – натрію лактат + натрію хлорид + кальцію хлорид + калію хлорид + магнію хлорид), р-н глюкози та ін. (див. розділ «НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУСННЯХ», «АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»); спазмолітичні препарати (при наявності спазму та підвищеного тону мозкових судин, наприклад, папаверину гідрохлорид, бендазол гідрохлорид (див. розділ «НЕВРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»); препарати, які стабілізують АТ; протизапальні, десенсибілізуючі, протівірусні та АБЗ (у разі наявності запального процесу, розвитку СНП на фоні ГРВІ); препарати, які покращують мозковий кровообіг; оскільки порушення мозкового кровообігу мають місце у переважній більшості хворих на СНП незалежно від етіології та стадії (г. чи хр.), препарати цієї групи входять у базисний курс; в залежності від виявлених змін у

церебральній гемодинаміці застосовуються: при підвищеному тонусі мозкових судин - папаверину гідрохлорид, цинаризин, при утрудненні венозного відтоку – ніцерголін (*див.розділ «НЕВРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»*); при запамороченні, підвищенні внутрішньо-лабіринтного тиску застосовуються бетагістин, цинаризин; ЛЗ, які сприяють покращенню функціонального стану ЦНС (застосовуються у базисному курсі, особливо при наявності змін у центральних відділах слухового аналізатору) - ноотропні препарати та препарати, що стимулюють метаболізм мозкової тканини; антиоксиданти (аскорбінова к-та - *див.розділ «НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ»*); заспокійливі засоби (при цьому враховується АТ); ЛЗ, які покращують реологічні властивості крові; препарати метаболічної, нейропротекторної дії (триметазидин – *див. розділ «КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»*); у випадку г. та загострення хр. СНП – ендауральний електрофорез з стрептокіназою, гепарином (за показаннями); стероїди.

- **Bemagistin (Betahistine)** (*див. п. 6.5.5. розділу "НЕВРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ"*)

16.2. Лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях носа та навколоносових синусів

16.2.1. Засоби для лікування ринітів та синуситів

Підхід до лікування різних форм ринітів залежить від їх етіопатогенетичних особливостей. Вибір ЛЗ ґрунтується перед усім на визначенні наявності алергічної або інфекційної природи захворювання та має певні відмінності у дорослих та дітей.

Г. інфекційний риніт зазвичай є одним із проявів ГРВІ, що передбачає застосування препаратів з протівірною дією (інтерферон людський лейкоцитарний у вигляді крап. водного р-ну, римантадин - *див. розділ «Антимікробні та антигельмінтні ЛЗ»*), які є найбільш ефективними на ранній стадії захворювання; протизапальних засобів (НПЗЗ - *див. розділ «Ревматологія.ЛЗ»*, ЛЗ, які підвищують імунний захист організму (*див. розділ «Імуномодулятори та протиалергічні ЛЗ»*). При появі герпетичних висипань призначають ацикловір (*див. розділ «Антимікробні та антигельмінтні ЛЗ»*). Високу детоксикаційну та протівірну активність має поліоксидоній, гепон. При інфекційних ринітах бактеріального походження та бактеріальному ускладненні риніту при ГРВІ застосовують місцеві (фраміцетін, мупіроцин) та системні АБЗ (*див. розділ «Протимікробні та антигельмінтні ЛЗ»*)

Найважливіший фактор лікування при г. риніті у грудних дітей – відновлення носового дихання на періоди годування груддю. Перед годуванням груддю необхідно аспірувати балончиком слиз із кожної половини носа. За 5 хв до годування слід ввести в ніс по 2 крап. р-ну епінефрину в розведенні 1:5000 й по 2 крап. 2% водного р-ну борної к-ти. Між годуваннями 4 р/добу в ніс дитині вливають по 4 крап. 2% р-ну колоїдного срібла.

Оскільки затруднення носового дихання є однією з основних ознак різних форм риніту в терапії даної патології широко застосовуються топічні та системні деконгестанти. Назальні крап. та спреї, які містять деконгестанти у вигляді монопрепаратів та їх комбінацій застосовують протягом нетривалого часу (зазвичай 3-7 днів). При частому та тривалому застосуванні топічних деконгестантів створюються умови для розвитку медикаментозного риніту. Системні деконгестанти чинять виражену судиннозвужуючу дію на слизові оболонки ВДШ, але застосування їх обмежується порівняно частими випадками побічної дії на нервову та СС системи. Призначення системних деконгестантів протипоказане особам, які мають супутню патологію СС системи, гіпертиреоз, ЦД, закритокутову глаукому, доброякісну гіперплазію передміхурової залози, при наявності феохромоцитоми та дітям у віці до 12 років.

Медикаментозна терапія алергічного риніту включає в себе застосування:

- антигістаміних препаратів місцевої та системної дії;
- гормональних препаратів місцевої та системної дії;
- препаратів групи натрію кромоглікату;
- топічних та системних деконгестантів.

Найефективнішим методом лікування атопічних захворювань є специфічна імунотерапія (СІТ) або алерговакцинація. СІТ – єдиний метод лікування, здатний зупинити формування тяжких форм захворювання, знизити потребу в протиалергічних ЛЗ, зберегти ефект ремісії на протязі тривалого часу після закінчення лікування, а також попередити розширення спектру алергенів, до яких може розвинути сенсibiliзація (*див. розділ «Імуномодулятори та протиалергічні засоби»*).

При г. риніті, хр. атрофічному та алергічному ринітах для гігієни порожнини носа та як елімінаційні засоби застосовують ЛЗ, що містять 0,9% р-н натрію хлориду або очищену морську воду.

Ефективність застосування деяких ЛЗ при певних формах риніту наведено у таблиці: Ефективність застосування при різних формах риніту

Група препаратів	Інфекційний риніт	Нейровегетативна форма	Алергічна форма	Алергічна форма
			сезонний (поліноз)	цілорічний
ГК	Неефективні	Помірна	Дуже висока	Дуже висока
H ₁ -блокатори	Помірна	Помірна	Висока	Низька
Місцеві деконгестанти	Помірна	Низька	Помірна	Помірна
Кромогліциєва кислота	Неефективна	Помірна	Висока	Помірна

Основою лікування г. та загострення хр. синуситу є місцеве та системне застосування АБЗ. При первинному призначенні АБЗ вибирають емпірично з урахуванням даних про переважання та резистентність мікрофлори, яка має етіологічне значення при захворюваннях ВДШ у даному регіоні. Вибір певного АБЗ також ґрунтується на важкості перебігу захворювання та інформації щодо застосування хворим ЛЗ протягом 4-6 тижнів, які передували даній патології. Найбільш поширеними збудниками синуситу є *S.pneumoniae*, *H.influenzae* та *M. catarrhalis*, яким

властива висока чутливість до амінопеніцилінів, цефалоспоринів та респіраторних фторхінолонів (гатифлоксацин, моксифлоксацин). При катаральному синуситі можливе застосування *місцево* а/б. При легкому перебігу захворювання препаратами вибору є ампіцилін, амоксицилін, амоксицилін/клавуланат, цефуроксиму аксетил, які призначаються перорально. У випадку наявності алергії до вище згаданих АБЗ або інших протипоказань до їх застосування призначають а/б групи макролідів, які також доцільно використовувати за наявності ознак хламідійної або мікоплазмової інфекції. Курс лікування – 7-10 діб. При середньотяжкому синуситі, окрім вказаних вище препаратів, доцільно призначити респіраторні фторхінолони III та IV поколінь (левофлоксацин, моксифлоксацин, гатифлоксацин).

При тяжкому синуситі й розвитку риногенних ускладнень показане в/м або в/в введення цефотаксиму, цефтриаксону, цефепіму, амоксициліну/клавуланату, в/в інфузії а/б з групи фторхінолонів III та IV поколінь. Фторхінолони не рекомендують призначати дітям й людям похилого віку, а також пацієнтам з порушенням функції печінки й нирок (високий ризик побічних реакцій). За відсутності покращення в перші 3 доби від початку застосування АБЗ необхідна корекція терапії. З метою локалізації інфекційного запалення додатково до системних антибактеріальних засобів доцільно застосовувати а/б місцево.

У дітей а/б-терапія синуситу будується за тими ж принципами, що й у дорослих (див. таблицю доз а/б для дітей віком старше 1 місяця). Препарати вибору: амоксицилін/клавуланат або цефуроксиму аксетил. Макроліди (азитроміцин, кларитроміцин) рекомендують при АР на β-лактами та при доведеній пневмококової етіології синуситу.

При тяжкій нозокоміальній інфекції використовують карбапенеми (іміпенем/циластатин та меропенем) і фторхінолони III та IV поколінь (левофлоксацин, моксифлоксацин, гатифлоксацин). При клінічних ознаках анаеробної інфекції у навколоносових синусах доцільно застосовувати амоксицилін/клавуланат, до комплексної АБ-терапії слід включати метронідазол або фторхінолони IV покоління (моксифлоксацин, гатифлоксацин). Часто можливе призначення ступеневої терапії, при якій лікування починають з в/в або в/м введення АБ засобів протягом 3-4 діб, а потім переходять на довший (10-14 діб) пероральний прийом того ж або подібного за спектром активності препарату.

Тривалість АБ-терапії рецидивуючого та загострень хр. синуситу може бути збільшена до 3 тижнів, особливо у хворих, які раніше приймали ГК або цитотоксичні засоби. Після отримання результатів мікробіологічного дослідження проводять відповідну корекцію а/б-терапії.

Для покращення дренажу навколоносових пазух призначають адреноміметики для місцевого застосування. Вливання судинозвужуючих крапель в ніс або змазування слизової оболонки в області середнього носового ходу забезпечує розкриття сполучень синусів з носом та кращий дренаж вмісту. Також застосовують назальні спреї, які містять АБЗ (неоміцину сульфат, поліміксину В сульфат, дексаметазон із фенілефрином). Для евакуації патологічного секрету із навколоносових пазух виконують їх пункцію (найчастіше пунктують верхньощелепну та лобну пазухи) з промиванням р-ном антисептика (фурацилін 1:50000, 5% р-н діоксидину) або 0,9% р-ном хлориду натрію. Разом з антисептиками в пазуху вводять протеолітичні ферменти (трипсин, хімотрипсин), які розщеплюють некротизовані тканини, розріджують в'язкий секрет, ексудат, згустки крові.

16.2.1.1. Лікарські засоби для місцевого застосування

16.2.1.1.1. Антибактеріальні лікарські засоби для місцевого застосування

- **Мупіроцин (Mupirocin)** (див. п. 9.1.3.1. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: D06AX09 - Антибіотики для місцевого застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: є головним антибактеріальним компонентом групи структурно залежних метаболітів, що продукується шляхом ферментації *Pseudomonas fluorescens*. Механізм дії мупіроцину полягає у пригніченні бактеріальної ізолейцил-трансфер-РНК-синтетази, завдяки чому перехресна резистентність з іншими а/б не очікується; має бактеріостатичні властивості при мінімальних інгібуючих концентраціях та бактерицидні властивості при вищих концентраціях, що досягаються при місцевому застосуванні; спектр антибактеріальної активності включає: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* spp, Метицилінрезистентний *Staphylococcus aureus* (MRSA), Метицилінрезистентний коагулазонегативний *Staphylococci* (MRCoNS), Резистентні мікроорганізми, *Staphylococcus epidermidis*, *Micrococcus* spp.

Показання для застосування ЛЗ: місцеве лікування інфекційно-запальних захворювань порожнини носа, які викликані *Staphylococcus aureus*, включаючи метицилінрезистентні штами ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі, діти старше 12 років та пацієнти літнього віку: невелику кількість мазі вводять у кожний носовий хід 2-3 р/добу на протязі 5 днів ^{БНФ}; після застосування мазі закрити ніс пальцями, притискаючи декілька разів крила носа з обох боків, та м'яко потираючи його для кращого розподілення мазі всередині носа; звільнення порожнини носа від збудників зазвичай відбувається ч/з 3-5 днів лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: шкірні р-ції гіперчутливості; системні алергічні р-ції: анафілаксія, генералізований висип, кропив'янка, ангіоневротичний набряк; р-ції з боку слизової оболонки носа: свербіж, відчуття печіння, почервоніння, нежить, чхання, закладеність носа, кашель, фарингіт; головний біль, зміна смакових відчуттів.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до мупіроцину або іншого компоненту препарату.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БАКТРОБАН™	Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Велика Британія	мазь наз. по 3г у тубі	20 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

16.2.1.1.2. Комбінації антибактеріальних засобів з глюкокортикоїдами та адреноміметиками

Препарати застосовують у II-III стадії г. риніту при затяжному перебігу захворювання, наявності алергічного компоненту та при супутньому синуситі.

16.2.1.1.3. Симпатоміметики для місцевого застосування

Сприяють зменшенню набряку слизової оболонки та покращують дренажу навколоносових синусів. Краплі в ніс вводять у положенні хворого лежачи зі злегка закинutoю й повернутою в бік головою. Після вливання крапель необхідно зберігати горизонтальне положення ≥ 30 -60 секунд. При введенні аерозолі голову слід тримати прямо з невеликим нахилом вперед.

16.2.1.1.3.1. Прості лікарські засоби

- **Оксиметазолін (Охуметазолін) ****

Фармакотерапевтична група: R01AA05 - проти набрякові та інші назальні препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа. Симпатоміметики, прості препарати.

Основна фармакотерапевтична дія: належить до групи місцевих судинозвужувальних засобів; чинить симпатоміметичну та судинозвужувальну дію, усуваючи набряк слизової оболонки носа; звужує судини у місці нанесення, зменшує набряк слизової оболонки носа та ВДШ, зменшує виділення з носа, відновлює носове дихання; сприяє відновленню аерації придаткових пазух, порожнини середнього вуха, що запобігає розвитку бактеріальних ускладнень; чинить протівірусну, протизапальну, імуномодулюючу та антиоксидантну дію; більш швидко та ефективно усуває симптоми гострого риніту (закладеності носа, ринореї, чхання, погіршеного самопочуття); дія препарату починається ч/з декілька хвилин (краплі назальні) або ч/з 20-25 секунд (спрей назальний); максимальна тривалість дії препарату - до 12 годин.

Показання для застосування ЛЗ: г. респіраторні захворювання, що супроводжуються закладеністю носа; алергічний риніт; вазомоторний риніт; відновлення дренажу та носового дихання при захворюваннях придаткових пазух порожнини носа, евстахіїту; усунення набряку перед діагностичними маніпуляціями у носових ходах.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: крап. наз. 0,01 %: призначають немовлятам віком до 4 тижнів по 1 крап. у кожний носовий хід по 2-3 р/добу; дітям з 5-го тижня життя до 1 року - 1-2 крап. у кожний носовий хід 2-3 р/добу; 0,025 % р-н застосовують дітям віком від 1 року до 6 років; дорослим і дітям від 6 років - 0,05 % р-н по 1-2 крап. у кожний носовий хід 2-3 р/добу; застосовують 5-7 днів; спрей наз. (0,05 %) : призначають дорослим та дітям старше 6 років по 1 впорскуванню у кожний носовий хід 2-3 р/день; спрей наз. (0,025 %) призначають дітям від 1 року до 6 років по 1 впорскуванню у кожний носовий хід 2-3 р/день; вказані разові дози не застосовувати більше 3 разів на добу; застосовують дози, вищі рекомендованих; препарат застосовують не довше 7 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: неспокій, безсоння, втома (сонливість, седація), головний біль, галюцинації (особливо в дітей); пальпітація (відчуття серцебиття), тахікардія, АГ; аритмії; дискомфорт у носі (печіння або сухість слизової оболонки носа), чхання; після припинення застосування препарату - відчуття сильноної закладеності (збільшення набряку слизової оболонки) носа та носова кровотеча; апное у немовлят та новонароджених; судоми (особливо в дітей); р-ції гіперчутливості (ангіоневротичний набряк, висип, свербіж)

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату, атрофічний риніт; сухий риніт; при застосуванні та після припинення лікування на протязі 2 тижн. інгібіторів MAO та інших препаратів, що сприяють підвищенню АТ; підвищений ВТ, закритокутова глаукома; виражений атеросклероз, тахісistolічні порушення серцевого ритму, стенокардія, тяжкі СС захворювання (ІХС, АГ); ниркова недостатність; метаболічні порушення (гіпертиреоз, ЦД, порфірія); гіпертрофія простати; феохромоцитома; дитячий вік до 1 р. - для крап. наз., спрей наз. (0,025%); дитячий вік до 6 р. - для крап. наз., спрей наз. (0,05%).

Визначена добова доза (DDD): назально - 0.4 мг., назально - дитяча добова доза не визначена, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АКВА СПРЕЙ ОКСІ	Публічне акціонерне товариство "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	спрей наз. по 10мл у фл. з доз. пр.	0,05%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЛОРАТЕК®	ТОВ "Мікрофарм", Україна	спрей наз. по 10г у фл.	0,05%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НАЗАЛОНГ®	ТОВ "Мікрофарм", Україна	спрей наз. доз. по 10г у фл.	0,05%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НАЗО БЕБІ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	крап. наз., р-н по 8мл у фл.-крап.	0,1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НАЗО КРАПЛІ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	крап. наз. по 8мл у фл.	0,25мг/мл, 0,5мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НАЗО-СПРЕЙ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з	спрей наз. по 15мл у конт. з розпил.	0,5мг/мл	№1	2,84	

		обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна					
	НАЗО-СПРЕЙ БЕБІ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	спрей наз., р-н по 20мл у полім. фл. з розпил.	0,25мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НАЗО-СПРЕЙ БЕБІ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	спрей наз., р-н по 15мл у скл. фл. з розпил.	0,25мг/мл	№1	51,43	
	НАЗО-СПРЕЙ З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	спрей наз., по 20мл у скл. фл. з розпил.	0,5мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НАЗО-СПРЕЙ З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	спрей наз., по 15мл у скл. фл. з розпил.	0,5мг/мл	№1	3,36	
	НОКСПРЕЙ	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна	наз. спрей по 10мл, 15мл 20мл у конт.	0,05%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НОКСПРЕЙ АКТИВ	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна	наз. спрей по 10мл у конт.	0,05%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НОКСПРЕЙ ДИТЯЧИЙ	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна	спрей наз. по 15мл у конт. з пр.-розпил.	0,025%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НОКСПРЕЙ МАЛЮК	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна	крап. наз. по 5мл у скл. конт. з кр.-піпет.	0,01%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РИНАЗОЛІН®	ПАТ "Фармак", Україна	крап. наз. по 10мл у фл. з пр.-крап. або у фл. з дозат	0,5мг/мл	№1	3,20	
	РИНАЗОЛІН®	ПАТ "Фармак", Україна	крап. наз. по 10мл у фл. з пр.-крап.	0,25мг/мл	№1	40,00	
	РИНАЗОЛІН®	ПАТ "Фармак", Україна	крап. наз. по 10мл у фл.	0,1 мг/мл	№1	40,00	
	РИНАЗОЛІН®	ПАТ "Фармак", Україна	спрей наз. по 15мл у фл.	0,5мг/мл	№1	2,40	
	РИНТ НАЗАЛЬНИЙ СПРЕЙ® З МЕНТОЛОМ	ПАТ "Фармак", Україна	спрей наз. по 10мл у фл. з розпил.	0,5мг/мл	№1	5,28	
	РИНТ НАЗАЛЬНИЙ СПРЕЙ® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ	ПАТ "Фармак", Україна	спрей наз. по 10мл у фл. з розпил.	0,5мг/мл	№1	5,28	
	РІНАЗАЛ® ЕКСТРА	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	спрей наз. по 10мл у фл. з розпил.	0,5мг/мл	№1	3,36	
	СІНУМАКС	ТОВ "Мікрофарм", Україна	спрей наз. по 10г у фл.	0,05%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	ВІКС АКТИВ СИНЕКС	Тева Чех Індастріз с.р.о., Чеська Республіка	спрей наз. по 15мл у фл. з доз. пр.	0,5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НАЗИВІН®	Софарімекс - Індустрія Кіміка е Фармацеутіка, С.А., Португалія	спрей наз. по 10мл у фл. з доз. пр.	0,05%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НАЗИВІН®	Дельфарм Бладель Б.В./Софарімекс-Індустрія	крап. наз. по 5мл, 10мл у фл	0,025%, 0,01%,	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	Кіміка е Фармацеутика, С.А., Нідерланди/Португалія		0,05%		
НАЗИВІН®	Мерк КГаА/Софарімекс-Індустрія Кіміка е Фармацеутика, С.А./Фамар Недерланд Б.В., Німеччина/Португалія/Нідерланди	крап. наз. по 5мл, 10мл у фл.	0,025%, 0,01%, 0,05%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
НАЗИВІН®	Мерк КГаА, Німеччина	спрей наз. по 10мл у фл.	0,05%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
НАЗИВІН® СЕНСИТИВ	Мерк КГаА і Ко. Верк Шпітталъ (дозвіл на випуск серії)/Урсафарм Арцнеіміттель ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування)/Фамар Хелс Кеар Сервісіз Мадрид, С.А.У. (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне п, Австрія/Німеччина/Іспанія	крап. наз. по 5мл у фл.	0,01%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
НАЗИВІН® СЕНСИТИВ	Пі енд Джі Хелс Острія ГмбХ енд Ко. ОГ (дозвіл на випуск серії)/Фамар Хелс Кеар Сервісіз Мадрид, С.А.У. (виробництво за повним циклом), Австрія/Іспанія	крап. наз. по 5мл у фл.	0,01%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
НАЗИВІН® СЕНСИТИВ	Мерк КГаА і Ко. Верк Шпітталъ (дозвіл на випуск серії)/Софарімекс-Індустрія Хіміка е Фармацеутика, С.А. (виробництво за повним циклом)/Фамар Хелс Кеар Сервісіз Мадрид, С.А.У. (виробництво за повним циклом), Австрія/Португалія/Іспанія	спрей наз. по 10мл, 15мл у фл.	0,025%, 0,05%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
НАЗИВІН® СЕНСИТИВ	Пі енд Джі Хелс Острія ГмбХ енд Ко. ОГ (дозвіл на випуск серії)/Софарімекс-Індустрія Хіміка е Фармацеутика, С.А. (виробництво за повним циклом)/Фамар Хелс Кеар Сервісіз Мадрид, С.А.У. (виробництво за повним циклом), Австрія/Португалія/Іспанія	спрей наз. по 10мл, 15мл у фл.	0,025%, 0,05%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
НАЗОЛ®	Істітуто Де Анжелі С.р.л., Італія	спрей наз. по 10мл у фл.	0,05%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
НАЗОЛ® АДВАНС	Істітуто де Анжелі С.р.л., Італія	спрей наз. по 10мл у фл. з розпил.	0,05%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
НОКСИВІН®	ТОВ "Фармтехнологія", Республіка Білорусь	спрей наз по 10мл у п/е фл.	0,5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ

16.2.1.4. Антигістамінні засоби для місцевого застосування

- **Азеластин (Azelastine) ****

Фармакотерапевтична група: R01AC03 -Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа. Антиалергічні засоби, за винятком кортикостероїдів.

Основна фармакотерапевтична дія: антагоніст Н₁-рецепторів, є антиалергічною речовиною з відносно тривалим періодом напіввиведення (t_{1/2} @ 20 годин); пригнічує бронхіальний спазм, що спричиняється

лейкотрієнами та інгібіторами тромбоцитоактивного фактора; здатен пригнічувати запалення у дихальних шляхах, спричинене р-ціями гіперчутливості.

Показання для застосування ЛЗ: сезонні і щорічні алергічні риніти^{БНФ}, несезонні (цілорічні) алергічні риніти.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендовано впорскувати по одній дозі у кожную ніздрю 2 р/добу^{БНФ}, що відповідає добовій дозі 0,56 мг; тривалість терапії визначається лікарем індивідуально.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: подразнення слизової оболонки носа (печіння, свербіж), кропив'янка, чхання, носова кровотеча; втомлюваність, слабкість, р-ції гіперчутливості; вертиго, дисгевзія, нудота, поява гіркого присмаку у роті; сонливість, головний біль, сухість у роті; запаморочення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активної речовини, етилендіамінтетраоцтової кислоти (EDTA) чи до будь-якого іншого компонента препарату; вагітність, лактація; діти до 6 років.

Визначена добова доза (DDD): назально - 0,56 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АЛЕРГОДИЛ®	МЕДА Менюфекчеринг ГмБХ (виробник, відповідальний за виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, контроль якості)/МЕДА Фарма ГмБХ енд Ко. КГ (виробник, відповідальний за випуск серії)/МАДАУС ГмБХ (Альтернативний виробник відповіді, Німеччина/Німеччина/Німеччина	спрей наз., доз. по 10мл у фл. з розпил.	1мг/мл	№1	5,54	29,08/€
	САНОРИН-АЛЕРГО	САГ Манюфекчурінг, С.Л.Ю. (виробництво готової лікарської форми, первинне та вторинне пакування, контроль серії, випуск серії)/Галенікум Хелс, С.Л. (фізико-хімічний контроль серії, випуск серії)/Єврофінс Біофарма Продакт Тестінг Спейн, С.Л.Ю. (мікробіолог, Іспанія/Іспанія/Іспанія	спрей наз., доз. по 10мл у фл. з розпил.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

16.2.1.1.5. Глюкокортикоїди для місцевого застосування

ГК є найбільш ефективними засобами для лікування алергічного риніту та вискоєфективними при неалергічному еозинофільному риніті. Топічні ГК зменшують набряк слизової оболонки та її секрецію, знижують обструкцію, викликану носовими поліпами, подовжують період ремісії після їх хірургічного видалення. Застосування для лікування алергічного риніту у хворих на БА дозволяє досягати зменшення вираженості симптомів БА.

За здатністю зменшувати симптоми закладеності носа, ринореї, чхання та свербіння очей мають перевагу над антигістамінними засобами *п/о*. Не дивлячись на відмінності фармакокінетики та фармакодинаміки, у порівняльних дослідженнях не вдалося виявити достовірної різниці у клінічній ефективності різних препаратів з групи *ін* ГК. На основі даних про безпеку для довготривалого застосування можна рекомендувати мометазон і флутиказон (*див. розділ «ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ»*). Їхній ефект починає розвиватися, в середньому, ч/з 12 год після першого введення. Максимальний ефект – ч/з 7-14 днів.

При сезонній алергії вприскування ГК для місцевого застосування рекомендують починати за 1-2 тижні до ймовірного контакту з алергеном. Препарати слід застосовувати регулярно. Після отримання ефекту інтервали між введеннями збільшують до досягнення мінімальної добової дози, яка дозволяє контролювати симптоми риніту.

Ефективність терапії залежить від дотримання правильної техніки застосування спрею. Пацієнту слід нахилити голову вперед й направити струмінь спрею від перегородки носа на носові раковини. При такому методі введення рідше виникає подразнення слизової оболонки та свербіж.

Побічна дія. Найчастіше: подразнення слизової оболонки, закладення носа, сухість в носі та роті, носова кровотеча, чхання, відчуття дискомфорту в горлі, нудота, головний біль, запаморочення. Рідко: підвищення ВТ, порушення смаку та нюху, риніт та фарингіт, викликані *S.albicans*, виразкування слизової оболонки носа, перфорація носової перегородки. Є повідомлення про АР, які проявляються набряком обличчя, висипом, бронхоспазмом та ін. При застосуванні нових препаратів системна побічна дія (*див. розділ «Ендокринологія. Лікарські засоби»*) не спостерігаються.

Запальні захворювання носа, післяопераційний період при хірургічних втручаннях в порожнині носа (до загоєння), легеневий туберкульоз. У пацієнтів, які застосовують ГК системно, після переходу на парентеральне

введення можливе загострення симптомів. У дітей при довготривалому застосуванні необхідно спостерігати за ростом, а у випадку його сповільнення слід звернутися до педіатра.

Характеристика ЛЗ, що містять ГК для місцевого застосування – беклометазону, флютиказону, будесоніду, мометазону – див. розділи «ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ» та «ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ».

- **Беклометазон (Beclometasone) **** ^[ПМД] (див. п. 4.2.1. розділу "ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ")

Фармакотерапевтична група: R01AD01 - Протинабрякові та інші препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа. Кортикостероїди.

Основна фармакотерапевтична дія: проявляє потужну протизапальну та судинозвужувальну дію, є попередником активної речовини зі слабкою спорідненістю з глюкокортикоїдними рецепторами, гідролізується естеразами з утворенням активного метаболіту беклометазону-17-монопропіонату, який має високу місцеву протизапальну активність, забезпечує профілактичне базове лікування синної гарячки при застосуванні перед дією алергену, при регулярному застосуванні попереджує повторні прояви симптомів алергії.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика та лікування цілорічного та сезонного алергічного риніту ^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають лише для інтраназального застосування; перед застосуванням збовтати; рекомендована доза - 1-2 розпилення у кожний носовий хід 4 р/добу; МДД не повинна перевищувати 8 розпилень (400 мкг) ^{БНФ}; для повного терапевтичного ефекту необхідне регулярне застосування препарату; після перших кількох розпилень не можна досягти максимального полегшення стану; не застосовувати довше 3 міс. без консультації лікаря.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості, включаючи висипання, кропив'янку, свербіж, почервоніння та набряк очей, обличчя, губ і горла, анафілактоїдні р-ції, бронхоспазм, анафілактичні р-ції, відчуття неприємного смаку, запаху, підвищення ВТ, глаукома або катаракта, сухість і подразнення носа та горла, носова кровотеча, кашель, парадоксальний бронхоспазм, диспное; випадки перфорації носової перегородки, при довготривалому застосуванні беклометазону, особливо у великих дозах, можливий кандидоз, зниження ф-ції кори надниркових залоз, остеопороз, затримка росту у дітей.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату; туберкульоз, кандидомікоз, тяжкі напади БА, дитячий вік.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БЕКОНАЗЕ	Глаксо Веллком С.А. (виробництво за повним циклом)/Ріхард Біттнер АГ (виробництво за повним циклом), Іспанія/Австрія	спрей наз. сусп. по 100доз, 180доз у фл.	50 мкг/доза	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Будесонід (Budesonide) *** ^[ПМД] (див. п. 4.2.1. розділу "ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ")

Фармакотерапевтична група: R01AD05 - Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа. Кортикостероїди.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний глюкокортикостероїдний препарат з вираженою місцевою протизапальною, протиалергічною, антиексудативною дією; протизапальна дія зумовлена впливом на метаболізм арахідонової кислоти, а саме пригніченням утворення медіаторів запалення; препарат інгібує вивільнення біологічно активних речовин, що зумовлюють розвиток і підтримують запальну р-цію; підвищує кількість бета-адренорецепторів гладкої мускулатури; має вазоконстрикторну дію, зменшує запальний набряк слизової оболонки; інгібує синтез гістаміну, що призводить до зменшення його рівня в опасистих клітинах; при застосуванні у терапевтичних дозах майже не чинить резорбтивної дії; властива потужна місцева протизапальна дія та слабка системна активність, що важливо при довготривалій терапії.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика та лікування сезонного та цілорічного алергічного риніту ^{БНФ}, неалергічних ринітів ^{ПМД}, назальні поліпи ^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі та діти віком від 6 років: початкова доза становить 400 мкг/добу: 2 дози по 50 мкг будесоніду (2 натискування) у кожну ніздрю 2 р/добу ^{БНФ}; звичайна підтримуюча доза становить 200 мкг/добу: 1 дозу по 50 мкг будесоніду у кожну ніздрю 2 р/добу або 2 дози в кожну ніздрю 1 р/добу; підтримуюча доза повинна бути найнижчою ефективною дозою, що усуває симптоми риніту; максимальна разова доза - 200 мкг (по 100 мкг в кожну ніздрю), МДД - 400 мкг ^{БНФ}, курс лікування - не більше 3 місяців ^{БНФ}; якщо прийом дози був пропущений, її слід прийняти якомога скоріше, але не менш як за 1 год. до прийому наступної дози; при припиненні прийому препарату дозу знижують поступово.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості, у тому числі кропив'янка, висипання, свербіж, дерматит, набряк Квінке, анафілактична р-ція; утворення синців, гематом; порушення зору; глаукома, катаракта (при тривалому лікуванні); виділення з носа та утворення кірок на початку лікування; біль у носі, подразнення слизової оболонки носа (чхання, печіння і сухість), незначна геморагічна секреція, носова кровотеча (одразу після застосування), кашель; поодинокі - утворення виразки слизової оболонки носа, перфорація носової перегородки, задишка, свистяче дихання, охриплість голосу, кандидоз та атрофія слизової оболонки,

бронхоспазм; дисфонія, втомлюваність, запаморочення; неспокій, нервозність, депресія, зміни у поведінці (переважно у дітей); частота невідома - порушення сну, тривожний стан, психомоторна гіперактивність, агресія; сухість у роті, сухість у горлі, нудота і втрата нюху; м'язові спазми, остеопороз (при довготривалому застосуванні), зниження мінеральної щільності кісткової тканини; ознаки та симптоми побічних ефектів, типові для системних кортикостероїдів, у тому числі пригнічення ф-ції кори надниркових залоз та затримка росту у дітей та підлітків, симптоми гіперкортицизму (гіперфункції кори надниркових залоз), с-ром Кушинга, серцебиття; у рідкісних випадках можуть виникати побічні р-ції, типові для системних ГКС, такі як с-ром Кушинга, кушингоїдні ознаки, психомоторна гіперактивність, порушення сну, неспокій, депресія або агресія (особливо у дітей), залежно від дози, періоду застосування, одночасного та попереднього лікування кортикостероїдами, а також індивідуальної чутливості.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; нелікована грибова, бактеріальна та вірусна інфекція дихальної системи; активна форма туберкульозу легенів; субатрофічний риніт; діти до 6 років.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ТАФЕН® НАЗАЛЬ	Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія	спрей наз. сусп. по 200доз у фл.	50 мкг/доза	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Мометазон (Mometasone)** ^[ПМД] (див. п. 4.2.1. розділу "ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ", п. 9.1.2. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: R01AD09 - Протинабрякові та інші препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа. Кортикостероїди.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний кортикостероїд для місцевого застосування; чинить виражену протизапальну дію; локальна протизапальна дія мометазону фууроату виявляється в дозах, при яких не виникає системних ефектів; в основному механізм протизапальної та протиалергічної дії мометазону фууроату пов'язаний з його здатністю пригнічувати виділення медіаторів АР; зменшує синтез/вивільнення лейкотрієнів із лейкоцитів пацієнтів, які страждають на алергічні захворювання.

Показання для застосування ЛЗ: лікування сезонного або цілорічного алергічного риніту у дорослих ^{БНФ} та дітей віком від 2 років; профілактичне лікування алергічного риніту ^{БНФ} середнього і тяжкого перебігу рекомендується за 4 тижні до передбачуваного початку сезону пилкування; як допоміжний терапевтичний засіб при лікуванні а/б г. епізодів синуситів у дорослих (у тому числі літнього віку) і дітей віком від 12 років; лікування симптомів г. риносинуситу ^{ПМД} без ознак тяжкої бактеріальної інфекції у дорослих і дітей віком від 12 років; лікування назальних поліпів ^{БНФ} та пов'язаних з ними симптомів, включаючи закладеність носа та втрату нюху, у пацієнтів віком від 18 років ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування сезонного або цілорічного алергічного риніту: дорослим і підліткам віком від 12 років рекомендована профілактична і терапевтична доза препарату 2 впорскування (по 50 мкг) у кожен ніздрю 1 р/добу (загальна добова доза - 200 мкг) ^{БНФ}; після досягнення лікувального ефекту для підтримуючої терапії доцільне зменшення дози до 1 впорскування у кожен ніздрю 1 р/добу ^{БНФ} ЗДД- (загальна добова доза)- 100 мкг; якщо послаблення симптомів не відбувається - рекомендовано добову дозу збільшити до максимальної: по 4 впорскування у кожен ніздрю 1 р/добу (ЗДД - 400 мкг); після послаблення симптомів захворювання рекомендується зниження дози; початок дії ЛЗ клінічно відзначається протягом 12 год після першого застосування; для дітей віком 2 - 11 років рекомендована терапевтична доза 1 впорскування (50 мкг) у кожен ніздрю 1 р/добу (ЗДД - 100 мкг); допоміжне лікування г. епізодів синуситів - дорослим (у тому числі літнього віку) і дітям віком від 12 років рекомендована терапевтична доза 2 впорскування (по 50 мкг) у кожен ніздрю 2 р/добу (ЗДД - 400 мкг); якщо послаблення симптомів не відбувається - добова доза може бути збільшена до 4 впорскувань у кожен ніздрю 2 р/добу (ЗДД - 800 мкг); після послаблення симптомів захворювання рекомендується зниження дози; лікування г. риносинуситу - дорослим і дітям віком від 12 років рекомендована терапевтична доза 2 впорскування (по 50 мкг) у кожен ніздрю 2 р/добу (ЗДД - 400 мкг); назальні поліпи - для пацієнтів віком від 18 років рекомендована доза 2 впорскування (по 50 мкг) у кожен ніздрю 2 р/добу ^{БНФ} (ЗДД - 400 мкг); після досягнення клінічного ефекту рекомендовано зменшити дозу до 2 впорскувань у кожен ніздрю 1 р/добу (ЗДД - 200 мкг).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, носові кровотечі, фарингіт, відчуття печіння та подразнення в носі, виразки у носі; АР негайного типу (бронхоспазм, диспное), анафілактична р-ція та ангіоневротичний набряк; порушення смаку та нюху; випадки перфорації носової перегородки, нечіткість зору, глаукоми чи підвищення ВОТ; біль у животі; діарея; нудота; подразнення горла; інфекції верхніх дихальних шляхів.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активної речовини або до будь-якого неактивного компонента препарату.

Визначена добова доза (DDD): назально - 0,2 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ФОРІНЕКС	АТ "Фармак" (пакування із форми in bulk фірми-	спрей наз. сусп. по 140доз у фл.	50мкг/доза	№1	6,43	

		виробника Апотекс Інк., Канада), Україна					
II.	АЛЛЕРТЕК® НАЗО	"Фармеа", Франція	спрей наз., сусп. по 60доз, 120доз, 140доз в ПЕТ-фл.	50 мкг/доза	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ГЛЕНСПРЕЙ	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія	спрей наз., сусп. по 60доз, 120доз у п/е фл.	50 мкг/доза	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕТАЦИД	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	спрей наз., сусп. по 140доз у фл.	50мкг/доза	№1	5,59	28,12/\$
	МОМЕТАЗОН-ТЕВА	Тева Чех Індастріз с.р.о. (виробництво за повним циклом)/Мельбурн Сайнтифік Лімітед (контроль серії за показником "Визначення мометазону фууроату у малих краплях/частках"), Чеська Республіка/Велика Британія	спрей наз., сусп. по 60доз у фл.	50 мкг/доза	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МОМІКСОН	Фармеа, Франція	спрей наз., сусп. по 60доз, 120доз у п/е фл.	50мкг/доза	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МОМІКСОН	Фармеа, Франція	спрей наз., сусп. по 140доз у п/е фл.	50мкг/доза	№1	3,81	26,67/\$
	НАЗЕХАЛЕР	Ципла Лтд., Індія	спрей наз., сусп. по 140доз у фл.	50 мкг/доза	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НАЗОНЕКС®	Шерінг-Плау Лабо Н.В./МСД Інтернешнл ГмбХ (філія Сінгапур), Бельгія/Сінгапур	спрей наз., доз. по 140доз сусп. у п/е фл.	50 мкг/доза	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НАЗОНЕКС® СИНУС	Шерінг-Плау Лабо Н.В./МСД Інтернешнл ГмбХ (філія Сінгапур), Бельгія/Сінгапур	спрей наз., доз. по 60доз сусп. у п/е фл.	50 мкг/доза	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	САНОМЕН	Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія	спрей наз., сусп. по 60доз, 120доз, 140доз у конт.	50 мкг/доза	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФЛІКС	АБДІ ІБРАХІМ Ілач Санаї ве Тіджарет А.Ш., Туреччина	спрей наз., сусп. по 18г, 9г у фл.	50 мкг/доза	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

● **Флютиказон (Fluticasone)** ^[ПМД] [окрім спрею наз. водн. доз.]

Фармакотерапевтична група: R01AD08 - Лікарські засоби для лікування органів дихання. Засоби для лікування захворювань носа. Протинабрякові та інші засоби для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа. Глюкокортикостероїди, флютиказон.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить виражену протизапальну дію; при інтраназальному застосуванні його системна активність є мінімальною; не пригнічує або пригнічує дуже малою мірою гіпоталамо-гіпофізарну наднирковозалозну ф-цію.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика та лікування алергічного риніту, включаючи поліноз та алергічний риніт, викликаний інгаляційними алергенами, такими як домашній пиловий кліщ та шерсть тварин; симптоматичне полегшення чхання, свербіж у носі та нежитю, свербіж в очах та сльозотечі, закладеності носа та пов'язаного з цим відчуття дискомфорту в пазухах.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі та діти від 12 років: по 2 уприскування у кожную ніздрю 1 р/добу, ^{БНФ} бажано вранці; у деяких випадках - 2 уприскування у кожную ніздрю 2 р/добу ^{БНФ}; МДД - по 4 уприскування в кожную ніздрю; дітям 4 -11 років - 1 уприскування у кожний носовий хід 1 р/добу ^{БНФ}, бажано вранці, МДД - 1 уприскування в кожную ніздрю; для отримання повного терапевтичного ефекту необхідно регулярне застосування препарату; максимальний терапевтичний ефект настає через 3-4 дні від початку лікування, цим пояснюється відсутність негайного терапевтичного ефекту.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості, анафілаксія/анафілактичні р-ції, бронхоспазм, шкірний висип, набряк обличчя або язика; головний біль, неприємний присмак і запах; глаукома, підвищення ВОТ, катаракта; носові кровотечі, сухість носа, подразнення носа, сухість горла, подразнення горла, перфорація носової перетинки, виразки у носі. при застосуванні інтраназальних кортикостероїдів можлива поява системних ефектів, особливо при застосуванні високих доз протягом тривалого часу.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого компонента препарату; одночасне застосування з лікарськими засобами для лікування ВІЛ; діти до 4 років.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	НАЗОФАН	Тева Чех Індастріз с.р.о., Чеська Республіка	спрей наз., сусп. по 120доз, 150доз у фл.	50 мкг/доза	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФЛІКСОНАЗЕ	Глаксо Веллком С.А. (виробництво, контроль якості, випуск серій, первинне та вторинне пакування)/Спрінгдью Лімітед (вторинне пакування)/СІТ С.Р.Л. (вторинне пакування), Іспанія/Велика Британія/Італія	спрей наз., вод. по 60доз у фл.	50 мкг/доза	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Флютиказону фууроат (Fluticasone furoate)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: R01AD12 - протинабрякові препарати для місцевого застосування при захворюваннях носа. Кортикостероїди.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний фторований кортикостероїд з дуже високим рівнем спорідненості до рецепторів глюкокортикостероїдів та сильною протизапальною дією.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування алергічних ринітів ^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лише для інтраназального застосування; дорослі та діти віком від 12 років: рекомендована початкова доза - по 2 впорскування (27,5 мкг на одне впорскування) у кожному ніздрю 1 р/добу ^{БНФ} (загальна добова доза - 110 мкг); підтримуюча доза препарату може бути зменшена до 1 впорскування у кожному ніздрю 1 р/добу ^{БНФ} (загальна добова доза - 55 мкг); діти віком від 6 до 11 років: рекомендована початкова доза - по 1 впорскуванню у кожному ніздрю 1 р/добу (загальна добова доза - 55 мкг); у разі недостатнього контролю за симптомами риніту при впорскуванні в кожному ніздрю 1 р/добу (загальна добова доза - 55 мкг) доза може бути збільшена до 2 впорскувань у кожному ніздрю 1 р/добу (загальна добова доза - 110 мкг) ^{БНФ}; після досягнення контролю за симптомами риніту рекомендується зменшувати дозу до 1 впорскування у кожному ніздрю 1 р/добу (загальна добова доза - 55 мкг) ^{БНФ}; початок дії спостерігається через 8 год. після першого застосування, а максимальний терапевтичний ефект настає через декілька днів від початку лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: носові кровотечі, поява виразок у носі, р-ції гіперчутливості, включаючи анафілаксію, ангіоневротичний набряк, висипання та кропив'янку, біль у носі, дискомфорт (включаючи печіння, подразнення, болісність у носі), сухість у носі, головний біль, транзиторні порушення зору, порушення чіткості зору; у дітей затримка росту.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого компонента препарату, дітям до 6 років.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АВАМІС™	Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Велика Британія	спрей наз., сусп. по 30доз, 120доз у фл.	27,5мкг/доза	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

16.2.1.1.6. Стабілізатори мембран опасистих клітин

Ринорею, чхання та свербіж зменшує кромогліциєва кислота. Для отримання максимального ефекту препарат слід призначати до виникнення алергічних виявів й застосовувати регулярно протягом усього періоду ймовірного контакту з алергеном. Ефект розвивається через 2-4 тижні після початку лікування.

16.2.1.1.7. Засоби елімінаційної терапії при захворюваннях носа

● **Натрію хлорид (Sodium chloride)** ** ^[ПМД] (див. п. 10.5.5. розділу "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: R01AX10 - Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа.

Основна фармакотерапевтична дія: ефективно зволожує слизову оболонку носа, розріджує густий слиз, розм'якшує сухі кірочки в носі і сприяє їх легкому видаленню; високоочищений стабілізований 0,65% р-н натрію хлориду максимально відповідає природному назальному секрету; буферні речовини, що входять до складу препарату, наближують рН розчину до рН природної секреторної рідини слизової оболонки носа і підтримують цей показник на постійному рівні покращує нюх та транспортну ф-ції миготливого епітелію, сприяє відновленню

носового дихання, скорочує період реабілітації і дозволяє знизити дозу і частоту використання судинозвужуючих засобів місцевої дії.

Показання для застосування ЛЗ: застосовується для немовлят, дітей та дорослих: для гігієнічного догляду за порожниною носа, профілактики й комплексного лікування захворювань слизової оболонки носа та придаткових пазух, що супроводжуються сухістю слизової оболонки носа або утворенням слизу (атрофічний, алергічний, інфекційний, медикаментозний риніти) ^{ГПМД}, як допоміжний засіб при застосуванні локальних судинозвужувальних засобів; для усунення сухості слизової оболонки носа, зумовленої роботою кондиціонерів, у тому числі автомобільних, або радіаторів центрального опалення, під час повітряних перельотів; після операційних втручань у порожнині носа та носових пазухах.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: краплі назальні: дорослим - по 2 крап.; дітям віком від 1 р. - по 1-2 крап.; дітям до 1 р. - по 1 крап. у кожен носовий хід 3-4 р./добу з лікувальною метою, з гігієнічною метою - 1-4 р./добу; спрей назальний: немовлятам і дітям застосовувати по одному, дорослим - по два розпилення в кожен ніздрю, 3-4 рази протягом доби; спрей назальний: Дорослим - по 2 впорскування, дітям віком від 1 р. - по 1-2 впорскування; дітям віком до 1 р.- по 1 впорскуванню у кожен носовий хід 3-4 рази н/добу з лікувальною метою, з гігієнічною метою - 1-4 рази н/добу. Курс лікування становить до 4 тижн. При необхідності можна повторити курс лікування через місяць.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: у осіб з індивідуальною непереносимістю компонентів препарату можливі АР.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): назально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АКВАМАКС	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	крап. наз. по 20мл у фл.-крап. з піпет	6,5мг/мл	№1	44,86	
	АКВАМАКС	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	спрей наз. по 50мл у фл. з клап.-насос. та розпил.	6,5мг/мл	№1	123,05	
	АКВАМАКС	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	спрей наз. по 100мл у фл. з клап.-насос. та розпил.	6,5мг/мл	№1	171,08	
	АКВАМАКС	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	спрей наз. по 150мл у фл. з клап.-насос. та розпил.	6,5мг/мл	№1	205,31	
	АКВАМАКС	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	спрей наз. по 20мл у фл. з клап.-насос. та розпил.	6,5мг/мл	№1	61,82	
	НО-СОЛЬ® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ	ПАТ "Фармак", Україна	крап. наз. по 10мл у фл.	6,5мг/мл	№1	18,00	
	НО-СОЛЬ® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ	ПАТ "Фармак", Україна	спрей наз. по 15мл у п/е фл. з дозат.	6,5мг/мл	№1	31,00	
	НО-СОЛЬ® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ	ПАТ "Фармак", Україна	спрей наз. по 10мл у п/е фл. з дозат.	6,5мг/мл	№1	36,00	

16.2.1.2. Лікарські засоби для системного застосування

16.2.1.2.1. Антигістамінні засоби

Див. також розділи «ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ» та «ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ». Антигістамінні препарати для перорального прийому усувають свербіж, чхання, ринорею і симптоми алергічного кон'юнктивіту, який часто є супутником алергічного риніту. Практично не впливають на закладеність носа, окрім дезлоратадину.

Основна перевага антигістамінних препаратів – швидкий розвиток ефекту, що дозволяє зменшити симптоми вазомоторного риніту. Для отримання максимального ефекту їх слід призначати для профілактики перед контактом із алергеном й застосовувати регулярно в період загострення захворювання. Препарати можна призначати для лікування алергічного риніту хворим на БА, проте у зв'язку із підвищенням в'язкості мокроти їх не слід приймати в період нападу.

Недоліками антигістамінних препаратів є низька ефективність у багатьох хворих, зниження ефективності при довготривалому застосуванні, приєднання вторинної інфекції та поліпоз носа. При зниженні ефективності можлива заміна на H₁-блокатор з іншої групи.

Антигістамінні препарати для ін'єкційного введення не мають багатьох побічних ефектів пероральних препаратів.

16.2.1.2.2. Глюкокортикоїди для системного застосування

Див. також розділ «ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ». Застосовуються при тяжкому перебігу алергічного риніту, якщо симптоми захворювання не вдається контролювати за допомогою антигістамінних пероральних засобів, симпатоміметиків та ін'єкційних ГК. Призначають курсами по 10-14 днів у розпал сезону алергії. Короткий курс преднізолону 30 мг/добу з наступним зниженням дози через 10 діб може бути рекомендований додатково до ін'єкційних ГК на початковому етапі лікування неалергічного запального риніту у хворих із вираженою набряковістю слизової оболонки.

16.2.1.2.3. Імуномодулятори

див. також розділ «ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ».

Для підвищення ефективності лікування, профілактики рецидивів захворювання та загострень хр. риносинуситу застосовують імуномодулятори, як синтезовані, так і природного походження.

16.2.2. Засоби для лікування поліпозної риносинусопатії

Місцеві та системні кортикостероїди на сьогодні є основними препаратами в лікуванні поліпозу носа. Клінічний ефект кортикостероїдів при поліпозній риносинусопатії обумовлений їх вираженою протизапальною дією. При наявності у хворого з назальними поліпами алергічного риніту слід застосовувати відповідні схеми протиалергічного лікування (*див. також розділ «Імуномодулятори та протиалергічні засоби» та п.2.1. даного розділу*). Враховуючи певну роль мікроорганізмів в етіопатогенезі хр. гнійно-поліпозного риносинуситу, до комплексної їх терапії залучають антимікробні та антибактеріальні засоби (*див. також розділ «Протимікробні та антигельмінтні засоби» та п.2.1. даного розділу*).

У випадку поліпів, які обтурують порожнину носа, на початку лікування застосовують системні кортикостероїди у вигляді короткого курсу. Ендоназальне застосування кортикостероїдів у формі дозованих аерозолів (беклометазон, флутиказон, мометазон) дозволяє досягти значного зменшення розміру поліпів. Для попередження рецидивів поліпозу носа після хірургічного лікування проводять довготривалі (до 4 місяців) повторні курси інгаляцій ГК.

16.2.3. Засоби для лікування носової кровотечі

Носова кровотеча у більшості випадків є симптомом системних захворювань, рідше розвиток цієї патології обумовлен різними порушеннями в порожнині носа та навколоносових синусах. Для зупинки кровотечі використовують різні маніпуляції:

- притискання крил носа до носової перегородки;
- припалювання зони кровотечі;
- передня, задня тампонада порожнини носа;
- перев'язка зовнішньої сонної артерії;
- ендovasкулярні методи.

Припалювання здійснюється трихлороцтовою кислотою чи проводиться кріодеструкція. Залишки кислоти нейтралізують 2-5% р-ном натрію гідрокарбонату.

З гемостатичною метою застосовують етамзилат, амінокапронову кислоту (*див. розділ «Гематологія. Лікарські засоби»*), р-н хлориду кальцію. При захворюваннях крові використовують різні фактори згортання, в залежності від патології. У хворих з носовою кровотечею, що мають підвищений АТ застосовують антигіпертензивну терапію, поряд з іншими заходами (*див. розділ «Кардіологія. Лікарські засоби»*).

16.2.4. Засоби для лікування атрофічного риніту

Основне значення в лікуванні атрофічного риніту має постійне застосування різноманітних ендоназальних засобів, дія яких направлена на зволоження та пом'якшення слизової оболонки носа, стимуляцію її регенерації, зменшення запальних проявів. Для видалення кірок з носа роблять промивання порожнини носа 0,9% р-ном хлориду натрію з додаванням у нього на 200 мл 6-8 крап. 10% йоду. Застосовують місцево олію шипшини, оливкову або персикову олію, р-н Люголю з гліцерином (йоду 1 частина, калію йодиду 2 частини, гліцерину 94 частини, води 3 частини), р-н ретинолу ацетату в олії. З метою зволоження й туалету слизової оболонки носа застосовують засоби елімінаційної терапії (*див. п. 16.2.1.1.7.*). Окрім місцевої терапії застосовуються системні муколітичні засоби.

16.3. Лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях глотки

Запальні захворювання глотки поділяють у зв'язку з переважним ураженням її слизової оболонки або мигдаликів. Запальний процес слизової оболонки глотки визначають як фарингіт (г. або хр.); захворювання лімфоїдних утворень глотки (у більшості випадків піднебінних мигдаликів) – як тонзиліт, котрий також може бути г. (ангіна) або хр.

Засоби для лікування фарингіту

Г. фарингіт часто пов'язаний з г. запаленням ВДШ. Хр. фарингіт пов'язаний з довготривалим місцевим подразненням слизової оболонки глотки. Нерідко причиною є захворювання СС системи, ШКТ, захворювання печінки та ін. Лікування залежить від форми хр. фарингіту (катаральна, гіпертрофічна або атрофічна).

Лікування при г. фарингіті та загостренні хр. фарингіту починають з обмеження подразливої їжі. Назначають інгаляції, пульверизацію або полоскання теплими лужними та антибактеріальними р-нами. Широко використовують антисептичні засоби для місцевого застосування (гексетидин та ін.), протизапальні засоби (флурбіпрофен).

При хр. гіпертрофічному фарингіті для зм'ясування задньої стінки глотки або обробки гранул на ній використовують в'язучі та припікаючі засоби (р-н колоїдного срібла, срібла протеїнату, 5-10% р-н срібла нітрату)

Засоби для лікування тонзиліту

Основними ЛЗ для лікування ангіни є АБ-засоби. При катаральній ангіні застосовують протизапальні засоби (флурбіпрофен та ін.). При фолікулярній, лакунарній та більш важких формах ангіни одночасно призначається системна АБ-терапія. Частіше призначають пеніциліни (амоксцилін, амоксицилін/клавуланат), а також макроліди, тетрацикліни, цефалоспорини I-II покоління (див. розділ «Протимікробні та антигельмінтні лікарські засоби»). Курс лікування триває не менше 10-12 днів. Перевагу віддають пероральним препаратам, в/м вводять лише при тяжкому та ускладненому протіканні ангіни. Якщо має місце виражена температурна реакція (вище 39°C), застосовують жарознижуючі засоби (див. розділ «Ревматологія. Лікарські засоби»). Місцево призначають полоскання р-нами антисептиків в певній пропорції, настоянками календули, ромашки, використовують повідон йодований з алантоїном, гексетидин. При утворенні паратонзиллярного абсцесу або парафарингіта показано хірургічне лікування - розкриття абсцесу, за наявності показів - абсцестонзилектомія. Призначають також протизапальні засоби (флурбіпрофен та ін.).

Для стимуляції захисних сил організму та підвищення місцевого імунітету слизової оболонки ВДШ у хворих на ангіну та хр. тонзиліт використовують комплексні рослинні препарати, імуномодулятори. Важливим елементом комплексного лікування хр. тонзиліту є промивання тонзиллярних лакун р-нами діоксидина, хлорофіліпта (див. нижче).

16.3.1. Антисептичні засоби

16.3.1.1. Прості антисептичні засоби

- **Гексетидин (Hexetidine) ****

Фармакотерапевтична група: R02AA20. - Лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики.

Основна фармакотерапевтична дія: дезінфікуючий засіб із помірною анестезуючою дією; виявляє бактерицидний та фунгіцидний ефект; антимікробна дія досягається шляхом конкурентного пригнічення продукції тіамініпрофосфату, ко-ферменту, необхідного для життєвих процесів м/о; дією на гліколітичний процес зменшує окиснення залишків їжі у порожнині рота

Показання для застосування ЛЗ: дезінфекція порожнини рота і гортані при запальних та інфекційних захворюваннях: тонзиліт, фарингіт, гінгівіт, пародонтоз, стоматит, глосит і афти; дезінфекція перед та після тонзилектомії, екстракції зубів та інших хірургічних втручань у порожнині рота; усунення неприємного запаху з рота; додатковий лікарський засіб при лікуванні антибіотиками ангіни, спричиненої стрептококами.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Спрей д/рот. порожн.: препарат розприскується дозовано з флакона із механічним розпилювачем та аплікатором для ротової порожнини; ввести трубочку аплікатора в ротову порожнину, затримати дихання та натиснути по 1 разу, спрямовуючи струмінь препарату на відповідну ділянку порожнини горла справа та зліва; під час застосування флакон потрібно тримати вертикально; процедуру повторювати 2-3 рази на добу; препарат слід застосовувати після їди або у проміжках між вживаннями їжі; тривалість лікування визначає лікар індивідуально залежно від ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання.; р-н д/рот. порожн.: промивати порожнину рота або горло протягом 30 сек. 10 - 20 мл нерозведеного гексетидина для полоскання ротової порожнини або наносити препарат, застосовуючи ватний тампон, від 2 до 3 хв., не більше 3 р. н/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості, включаючи ангіоневротичний набряк, ларингоспазм, набряк гортані, що разом із бронхоспазмом може призвести до порушення дихання; шкірні висипання, алергічний контактний дерматит, ангіоедема, свербіж, кропив'янка; агевзія, дисгевзія, зміна нюхових відчуттів, зміна смакових відчуттів протягом 48 годин (відчуття солодкого може двічі змінюватися на відчуття гіркого), парестезія слизової оболонки; запалення, гіперемія, набряк, наліт у вигляді дифтерійної плівки, пухирці, виразки та крововиливи, подразнення язика та/або слизової оболонки ротової порожнини, болючість, відчуття жару, відчуття печіння у ротовій порожнині, зниження чутливості; сухість у роті, біль при ковтанні, збільшення слинних залоз, дисфагія, оборотна зміна кольору зубів і язика, при випадковому проковтуванні препарату можуть виникнути шлунково-кишкові розлади, насамперед нудота і блювання; кашель, задишка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до гексетидину, олії евкаліптової, левоментолу, олії м'яти перцевої або до будь-якого іншого компонента препарату; сухий фарингіт атрофічного типу; ларингіт (через імовірність ларингоспазму); пацієнти з бронхіальною астмою або з будь-якими іншими захворюваннями дихальних шляхів, пов'язаними з наявною гіперчутливістю дихальних шляхів.

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЕКСОСЕПТ®	АТ "Стома", Україна	спрей д/рот. порож. по 25г у бал.	2 мг/г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СТОМОЛІК	ПрАТ "Технолог", Україна	р-н д/рот. порож. по 125мл в бан.	1 мг/мл	№1	60,30	
II.	ГЕКСОРАЛ®	ФАМАР ОРЛЕАН, Франція	спрей д/рот. порож. по 40мл в бал.	2 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЕКСОРАЛ®	ФАМАР ОРЛЕАН, Франція	р-н д/рот. порож. по	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

			200мл у фл.			
	СТОМАТИДИН®	Босналек д.д., Боснія і Герцеговина	р-н д/рот. порож. по 200мл у фл.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ
	СТОПАНГІН	Тева Чех Індастріз с.р.о., Чеська Республіка	спрей д/рот. порож. по 30мл у фл.	1,92 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ

● **Фенол (Phenol) ****

Фармакотерапевтична група: R02AA19 - Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики. Фенол.

Основна фармакотерапевтична дія: у концентрації 0,25-1,5 % (водно-гліцериновий розчин) має місцеву антисептичну (бактерицидна і протигрибкова), а також місцеву анестезуючу дію на слизові оболонки порожнини рота та глотки; гліцерин чинить пом'якшувальну дію на слизову оболонку ротової порожнини.

Показання для застосування ЛЗ: при інфекційно-запальних захворюваннях ротової порожнини та глотки (ангіна, фарингіт, тонзиліт, стоматит, гінгівіт, пародонтит); після проведених маніпуляцій у порожнині рота та глотки, стоматологічних операцій; при користуванні зубними протезами або ортодонтичними апаратами.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим та дітям віком старше 12 років разова доза становить 5 аерозольні випуски; дітям від 2 до 12 років разова доза - 3 аерозольні випуски під наглядом дорослих; повторювати розпилення необхідно кожні 2-4 год. або відповідно до рекомендацій лікаря; тривалість лікування визначає лікар індивідуально, враховуючи клінічний ефект та переносимість препарату.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: AP у вигляді шкірних висипань, кропив'янка, свербіж, ангіоневротичний набряк, місцевий набряк горла; хроматурія (забарвлення сечі у темно-коричневий або зелений колір).

Протипоказання до застосування ЛЗ: діти до 2-х років; гіперчутливість до препарату; запальні захворювання з поширеним ураженням слизових оболонок; значні порушення ф-ції печінки або нирок; не слід застосовувати фенол у вигляді спрею для горла хворим із запаленням надгортаника.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	OPASEPT®	Фамар А.В.Е. Авлон Планта, Греція	спрей орал. по 177мл у пласт. фл.	14 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФАРМАСЕПТИК	Фармасайнс Інк., Канада	р-н по 120мл у фл.	14 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Флурбіпрофен (Flurbiprofen) ****

Фармакотерапевтична група: R02AX01 - Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Флурбіпрофен.

Основна фармакотерапевтична дія: нестероїдний протизапальний засіб, який виявляє потужну протизапальну, знеболювальну та жарознижувальну дію через його здатність пригнічувати синтез простагландинів; зменшує больові відчуття та набряк в горлі через 30 хв. після розсмоктування льодяника; тривалість дії становить 2-3 години; анальгетична та протизапальна активність зумовлена інгібуванням ферменту циклооксигенази та пригніченням синтезу простагландинів; препарат має місцеву дію; пригнічує однаковою мірою дію PGE2 та PGE2a завдяки інгібуванню ендопероксидази, яка каталізує перетворення арахідонової кислоти у циклічний ендопероксид.

Показання для застосування ЛЗ: для короткотривалого симптоматичного полегшення болю в горлі.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: *льодяники:* розсмоктувати до повного розчинення; дорослим та дітям віком від 12 років приймати по 1 льодянику кожні 3 - 6 годин до полегшення болю; максимальна добова доза становить 5 льодяників; застосовувати не більше 3 дб; *спрей:* дорослим 1 доза (3 розпилення) на задню стінку ротової порожнини кожні 3 - 6 годин за потреби, але не більше 5 доз на добу; не вдихати під час розпилення; не рекомендується застосовувати препарат більше 3 дб.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: неспецифічна алергічна р-ція та анафілаксія; БА, бронхоспазм, задишка; свербіж, оніміння, кропив'янка, набряк Квінке, ексфолюативні та бульозні дерматити (включаючи епідермальний некроліз та мультиформну еритему); анемія, тромбоцитопенія; безсоння; набряки, АГ та СН; запаморочення, головний біль, парестезія; безсоння, сонливість; подразнення в горлі; задишка, свистяче дихання, пухирі в ротоглотці, фарингальна гіпестезія; діарея, виразки у ротовій порожнині, нудота, біль у ротовій порожнині, парестезія порожнини рота, біль у ротоглотці, дискомфорт порожнини рота (відчуття тепла, печіння або поколювання в роті); здуття живота, біль у животі, запор, сухість у роті, диспепсія, метеоризм, глосодинія, дисгевзія, дизестезія порожнини рота, блювання; гепатит; різні шкірні висипи, свербіж; тяжкі форми шкірних р-цій, таких як р-ції бульозного типу, в тому числі с-м Стівенса - Джонсона та токсичний епідермальний некроліз; пірексія, біль, лихоманка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого з компонентів; гіперчутливість до флурбіпрофену (напр., БА, бронхоспазм, риніт, ангіоневротичний набряк або кропив'янка), після прийому ацетилсаліцилової к-ти або інших НПЗЗ; рецидивна виразкова хвороба/кровотеча в анамнезі або у фазі загострення (два або більше епізодів, підтверджених характерними клінічними проявами) та виразки кишечника; шлунково-кишкочової кровотечі або перфорації в анамнезі, коліт з тяжким перебігом, геморагічний або гемопоетичний розлад, пов'язані з попередньою терапією НПЗЗ; т. СН, ниркова недостатність, печінкова недостатність; останній триместр вагітності; для спрею: дитячий вік (до 18 років).

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСІВ	Рекітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед (випуск серії)/Рекітт Бенкізер Хелскер Мануфекчурінг (Таїланд) Лімітед (виробництво, пакування та первинний випуск готового лікарського засобу), Велика Британія/Таїланд	спрей оромук., р-н по 15мл у фл.	8,75 мг/доза	№1		відсутня у реєстрі ОВЦ
	СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСІВ 3 МЕДОМ ТА ЛИМОНОМ	Рекітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Велика Британія	льодяники у бл.	8,75 мг/доза	№8x2		відсутня у реєстрі ОВЦ
	ФЛУБРИКС®	П'єр Фабр Медикамент Продакшн-Еньян (виробництво готової продукції, контроль серії, випуск серії та первинне і вторинне пакування)/ІНФАРМЕЙД, С.Л. (контроль серій)/ЛАБОРАТОРІО ДР. Ф. ЕЧІВАРНЕ, АНАЛІЗІС, С.А. (контроль серій), Франція/Іспанія/Іспанія	льодяники у бл.	8,75 мг/доза	№8x2, №12x2		відсутня у реєстрі ОВЦ

16.3.1.2. Комбіновані антисептичні засоби

Одиниця будь-якої лікарської форми містить амілметакрезолу – 0.6 мг, 2,4-дихлорбензилового спирту – 1.2 мг.

- **Йод + Гліцерин + Калію йодид (Iodine + Glycerol + Potassium iodide) ****

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН	Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України", Україна	р-н д/зовн. застос. по 25г у фл.	1г/94г/2г/100г	№1		відсутня у реєстрі ОВЦ
	ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН 3 ГЛІЦЕРИНОМ	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	р-н д/рот. порож. по 25г у фл.	0,01г/0,83г/0,02г/г	№1	15,17	

- **Біклотимол + лізоцим + еноксолон (Biclothymol+Lysozyme + enoxolone) ****

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ГЕКСАЛІЗ	Лабораторії Бушара Рекордаті, Франція	табл. д/розсмук. у бл.	5мг/5мг/5мг	№10x3		відсутня у реєстрі ОВЦ

- **Стрептоцид + норсульфазол + тимол + олія евкаліптова + олія м'яту перцевої (Streptocide + norsulphasol + timol + eucalyptus vitalinalis + mentha piperita) ****

Визначена добова доза (DDD): не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ІНГАЛІПТ	АТ "Стома", Україна	аер. по 30мл у бал. з розпил.	0,75г/0,75г/0,015г/0,015г/0,015г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНГАЛІПТ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	спрей д/рот. порож. по 30мл у бал. з розпил.	0,75г/0,54г/0,015г/0,015г/0,015г	№1	39,81	
	ІНГАЛІПТ-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	спрей д/рот. порож. по 30мл у бал. з розпил; спрей д/рот. порож. по 50мл у фл. з розпил.	0,75г/0,54г/0,015г/0,015г/0,015г/1,26г; 1,25г/0,9г/0,025г/0,025г/2,1г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНГАЛІПТ-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ З РОМАШКОЮ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	спрей д/рот. порож. по 30мл у бал. з розпил; спрей д/рот. порож. по 50мл у фл. з розпил.	0,75г/0,54г/0,015г/0,015г/0,015г/1,26г/1,26г; 1,25г/0,9г/0,025г/0,025г/2,1г/2,1г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНГАЛІПТ-КМ	АТ "СТОМА", Україна	спрей по 30мл у бал. з розпил.	0,75г/0,75г/0,015г/0,015г/0,015г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Хлорбутанол + камфора + ментол + олія евкаліптова (Chlorambutanol + camphora + menthole + eucalyptus vitalinalis) ****

Визначена добова доза (DDD): назально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КАМЕТОН	АТ "Стома", Україна	аер. по 30г у бал. з розпил.	0,1г/0,1г/0,1г/0,1г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАМЕТОН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	спрей наз. та оромук. по 25г у бал. з розпил.	0,01г/0,01г/0,01г/0,01г	№1	39,33	

16.3.2. Рослинні лікарські засоби

- **Хлорофіліпт (Chlorophyllipt) ****

Фармакотерапевтична група: R02AA20 - Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики.

Основна фармакотерапевтична дія: сумішнь хлорофілів з листя евкаліпта; чинить антибактеріальну (бактеріостатичну і бактерицидну) активність щодо стафілококів, а також проявляє антисептичну та протизапальну дію.

Показання для застосування ЛЗ: таблетки: захворювання верхніх дихальних шляхів (тонзиліти, фарингіти, ларингіти), а також афтозні та виразкові стоматити; спрей: лікування захворювань, спричинених антибіотикостійкими стафілококами: гострі респіраторні захворювання (ГРЗ), ангіни.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: таблетки: по 12,5 мг або 25 мг залежно від ступеня тяжкості патологічного процесу, а також віку хворого; табл. не ковтати і не розжовувати, а тримати у порожнині рота до повного розсмоктування; добова доза для дорослих - 25 мг 5 р/добу; кратність прийому - 1 табл. (12,5 мг або 25 мг) кожні 4 - 5 год.; курс лікування - 7 днів; спрей: дорослим оприскувати зів 2 натисканнями на клапан контейнера 3-4 р./добу протягом 3-4 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР (свербіж, висипання, ангіоневротичний набряк, гіперемія); подразнення слизової оболонки ротової порожнини, нудота, блювання; головний біль, запаморочення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): перорально/зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГРИПОЦИТРОН ФІТО	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	табл. у бл	12,5мг	№10x2	15,78	
	ГРИПОЦИТРОН ФІТО	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	табл. у бл	12,5мг	№20x1	15,78	
	ГРИПОЦИТРОН ФІТО	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	табл. у бл	25мг	№20x1	38,73	
	ГРИПОЦИТРОН ФІТО	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	табл. у бл	25мг	№10x2	39,51	
	ХЛОРОФІЛІПТ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії),	табл. у бл	25мг	№20x1	19,65	

	Україна/Україна					
ХЛОРОФІЛІПТ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	табл. у бл	25мг	№10x2	30,12	
ХЛОРОФІЛІПТ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	табл. у бл	25мг	№40	44,11	
ХЛОРОФІЛІПТ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	табл. у бл	12,5мг	№20x1	15,78	
ХЛОРОФІЛІПТ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	табл. у бл	12,5мг	№10x2	24,19	

16.4. Засоби, що застосовуються при захворюваннях гортані

16.4.1. Засоби для лікування ларингіту

Ларингіти – запалення слизової оболонки гортані, що, як правило, вражається вторинно і рідко буває самостійним захворюванням. Розрізняють г. та хр. форми ларингіту. У свою чергу г. ларингіт розподіляється на катаральну, набряково-інфільтративну та флегмонозну форми. Хронічний – на катаральну, гіперпластичну та атрофічну форми. Основними симптомами ларингітів є кашель, біль у горлі, відчуття стороннього тіла, осиплість голосу, що нерідко призводить до афонії.

Незалежно від форми ларингіту всім хворим рекомендується голосовий режим, дієта, що виключає гостру, кислу, а також гарячу та холодну їжу. Забороняється прийом алкогольних та тютюнових виробів.

Медикаментозна терапія, в залежності від етіологічного чинника, складається з антибактеріальної (захиснені пеніциліни, цефалоспорини II-III покоління, макроліди), протинабрякової (кортикостероїдні, діуретичні препарати), муколітичної (амброксол, ацетилцистеїн та інш.), антигістамінної (II покоління) терапії.

Застосовують вливання в гортань лікарських речовин (суміші антибіотиків, масляні суміші, гідрокортизон, епінефрин) які проводяться гортанним шприцем. Дуже широко використовується фізіотерапевтичні методи лікування - фонофорез з гідрокортизоном, УВЧ на ділянку гортані, інгаляції: лужні, лужно-олійні чи інгаляції індивідуальним інгалятором.

16.4.2. Засоби для лікування набряку гортані

Набряк гортані може призводити до розвитку стенозу гортані, при швидкому його розвитку може виникати загроза життю хворого. В такій ситуації необхідно вживати екстрених заходів, аж до виконання конікотомії, трахеотомії. Набряк гортані, який не викликає тяжкого стенозу (I та II ступеня), в умовах стаціонару лікують із застосуванням ЛЗ – **медикаментозне дестенозування**. При запальній природі набряку призначають інтенсивну а/б-терапію (парентеральне введення). Для зменшення набряку використовують дегідратуючі та сечогінні засоби: в/в 40% р-н глюкози з аскорбіновою кислотою, 10% р-н кальцію хлориду або глюконату кальцію, фуросемід, манітол. Виражені протизапальні, гіпосенсибілізуючі та протинабрякові засоби мають ГК. Преднізолон вводять в/м або в/в в дозі від 30 до 120 мг одномоментно, ін'єкцію можна повторити через 5-6 год. При наявності кашлю, вираженій густій мокроті або кірках в гортані й трахеї призначають муколітики - ацетилцистеїн, карбоцистеїн і бромгексин; в гортань вливають суміш а/б (пеніцилін на 0,9% р-ні NaCl) та суспензію гідрокортизону.

17. ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ

17.1. Принципи раціонального використання протимікробних (антимікробних) засобів

17.1.1. Принципи застосування протимікробних засобів у лікарській установі

17.1.2. Загальні принципи вибору протимікробних засобів

17.2. Антибактеріальні засоби

17.2.1. β -лактамі антибіотики

17.2.1.1. Пеніциліни

17.2.1.2. Цефалоспорини

17.2.1.3. Карбапенеми

17.2.2. Тетрацикліни

17.2.3. Аміноглікозиди

17.2.4. Макроліди

17.2.5. Лінкозаміди

17.2.6. Глікопептиди

17.2.7. Оксазолідинони

17.2.8. Інші антибіотики

17.2.9. Нітроїмідазоли

17.2.10. Сульфаніламідни і триметоприм

17.2.11. Хінолони

17.2.12. Нітрофуранни

17.3. Протитуберкульозні засоби

17.3.1. Протитуберкульозні лікарські засоби I ряду

17.3.2. Протитуберкульозні лікарські засоби II ряду

17.3.3. Фторхінолони

17.3.4. Комбіновані протитуберкульозні засоби

17.4. Протигрибкові засоби

17.4.1. Полієнові антибіотики

17.4.2. Імідазоли

17.4.3. Триазоли

17.4.4. Інші антимікотичні лікарські засоби для системного застосування

17.5. Противірусні засоби

17.5.1. Засоби, що застосовуються для профілактики та лікування грипу

17.5.2. Засоби, що застосовуються для лікування герпетичних інфекцій

17.5.2.1. Засоби, що застосовуються для лікування інфекцій, викликаних вірусами ВПГ і ВВЗ

17.5.2.2. Засоби, що застосовуються для лікування ЦМВ-інфекції

17.5.3. Засоби, що застосовуються для лікування ВІЛ-інфекції (протиретровірусні засоби – ПРВЗ)

17.5.3.1. Нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази ВІЛ (НІЗТ)

17.5.3.2. Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази ВІЛ (ННІЗТ)

17.5.3.3. Інгібітори протеаз

17.5.3.4. Інгібітори інтегрази

17.6. Протипротозойні засоби

17.6.1. Засоби для лікування та профілактики малярії

17.6.2. Засоби для лікування амебіазу

- 17.6.3. Засоби для лікування трихомоніазу
- 17.6.4. Засоби для лікування токсоплазмозу
- 17.6.5. Засоби для лікування лямбліозу
- 17.6.6. Засоби для лікування лейшманіозу
- 17.7. Антигельмінтні засоби
 - 17.7.1. Засоби, що застосовуються при нематодозах
 - 17.7.1.1. Ентеробіоз
 - 17.7.1.2. Аскаридоз, трихоцефальоз, анкілостомідоз, некатороз
 - 17.7.1.3. Дірофіляріоз, токсокароз, трихінельоз, стронгілоїдоз
 - 17.7.2. Засоби, що застосовуються при цестодозах
 - 17.7.2.1. Гіменолепідоз, теніоз, теніархоз, діфілоботріоз.
 - 17.7.2.2. Ехінококоз (основний метод лікування – хірургічний)
 - 17.7.2.3. Цистіцеркоз (основний метод лікування – хірургічний)
- 17.8. Загальні принципи вибору антибіотиків в лікуванні пневмонії

17.1. Принципи раціонального використання протимікробних (антимікробних) засобів

17.1.1. Принципи застосування протимікробних засобів у лікарській установі

В кожному стаціонарі з метою підвищення ефективності терапії та стримування розвитку антибіотикорезистентності необхідно розробити *політику застосування ПМЗ*, яку повинен проводити міждисциплінарний комітет, який складається з представників адміністрації, провідних клініцистів, клінічного провізора та мікробіолога. ПМЗ, які входять до формуляру лікувального закладу, слід розділити на дві групи: 1) ЛЗ, які може призначати будь-який лікар самостійно; 2) ЛЗ, які можуть бути дозволені до застосування лише після консультації з клінічним провізором, мікробіологом або іншим компетентним у сфері антимікробної хіміотерапії спеціалістом.

17.1.2. Загальні принципи вибору протимікробних засобів

При виборі ПМЗ необхідно враховувати дві групи факторів: 1) фактори пацієнта; 2) фактори збудника інфекції.

Фактори пацієнта: алергологічний анамнез, стан функції печінки та нирок, імунної системи, супутні захворювання інших органів та систем, застосування інших ЛЗ та харчових добавок, здатність приймати препарат *п/о*, тяжкість хвороби, вік, локалізація патологічного процесу. У жінок необхідно враховувати ймовірну В, КГ або прийом контрацептивів *п/о*.

Фактори збудника: найбільш імовірний за даної інфекції Staph. та його чутливість до ПМЗ. Емпіричний вибір одного або кількох ЛЗ є результатом комплексної оцінки вищеперерахованих факторів. Кінцевий вибір визначається мікробіологічними, фармакокінетичними та токсичними якостями ПМЗ. Режим дозування, спосіб введення (введ.) препарату та тривалість лікування залежать від локалізації, типу й тяжкості інфекційного процесу та ефективності лікування.

Застосування принципів доказової медицини при виборі ПМЗ. В даній праці рекомендації з вибору ПМЗ для лікування інфекцій базуються як на даних систематичних оглядів рандомізованих контрольованих досліджень, так і на думці експертів. Більшість рандомізованих клінічних досліджень ПМЗ проводять до початку їх широкого застосування, коли рівень резистентності до них є мінімальним; також слід враховувати, що, як правило, ціль таких досліджень - довести, що досліджуваний ЛЗ «не гірший» за препарат для порівняння, тому важко показати реальні переваги нової терапії. В той же час вибір ЛЗ повинен проводитися з урахуванням сучасних даних про резистентність збудників, приймаючи до уваги регіональні особливості.

Види протимікробної терапії:

- 1) емпірична;
- 2) цілеспрямована;
- 3) профілактична.

Початок протимікробної терапії. Як правило, спочатку ПМЗ призначають *емпірично*, тобто на основі припущення про найімовірнішого збудника та його чутливість. При призначенні емпіричної терапії необхідно дотримуватися наступних положень:

- Не застосовувати *а/б* для лікування неускладнених вірусних інфекцій (!).
- Перед початком терапії отримати зразки для мікробіологічного дослідження; «сліпе» призначення ПМЗ при лихоманці незрозумілого генезу утруднює діагностику.
- До отримання результатів мікробіологічного дослідження вибирати *а/б* із урахуванням даних моніторингу **локальної резистентності збудників**.
- Підбирати дозу ПМЗ з урахуванням віку, МТ, функції нирок, локалізації й тяжкості інфекції. Призначення в «стандартній», а не в максимальній дозі при тяжких інфекціях може призвести до неефективності лікування. При застосуванні ЛЗ із невеликою терапевтичною широтою (наприклад, аміноглікозидів) не слід перевищувати максимальні дози, бажано проводити моніторинг $C_{пл}$ ЛЗ.

– Визначати шлях введення препарату залежно від тяжкості та локалізації інфекційного процесу. Стани, що загрожують життю, вимагають в/в введ. препарату. По можливості уникати болючих в/м ін'єкцій, особливо у дітей.

– Визначати тривалість терапії з урахуванням типу інфекції, терапевтичної ефективності, характеру протимікробної дії (загибель або пригнічення розмноження м/о) та біологічної доступності збудника. Занадто довгі курси сприяють розвитку резистентності та виникненню небажаних реакцій, призводять до збільшення вартості терапії.

– Враховувати, що при застосуванні ПМЗ, особливо широкого спектру дії, можливі селекція резистентних м/о та розвиток суперінфекції.

Корекція протимікробної терапії. Після отримання результатів мікробіологічного дослідження у випадку виділення м/о, резистентного до ЛЗ, що приймається, та при клінічній неефективності лікування необхідно призначити інший препарат, активний стосовно збудника (цілеспрямована протимікробна терапія). При отриманні негативного результату мікробіологічного дослідження питання про тривалість або завершення протимікробної терапії вирішується на основі клінічних даних. Перевагу (при інших рівних умовах) віддають препарату з вузьким спектром дії та нижчою вартістю. Як правило, оцінити ефективність протимікробної терапії можна через ≥ 2 -3 доби від початку лікування. Слід врахувати, що при тяжких інфекціях відсутність явного клінічного ефекту може бути не пов'язано з неефективністю етіотропної терапії.

17.2. Антибактеріальні засоби

17.2.1. β -лактамі антибіотики

β -лактамі а/б (в першу чергу пеніциліни та цефалоспорини) складають основу сучасної хіміотерапії. Бактерицидний ефект пов'язаний з порушенням утворення клітинної стінки. Найпоширеніший механізм формування резистентності – вироблення м/о β -лактамаз (ферментів, що руйнують β -лактаміне кільце). Основні небажані реакції – АР, які можуть носити пережесний характер з іншими β -лактамами. Можна комбінувати з аміноглікозидами та фторхінолонами через синергізм відносно грам(-) флори. Проте їх не можна змішувати в одному шприці або інфузійній системі (фізико-хімічна несумісність).

17.2.1.1. Пеніциліни

Пеніциліни чинять антибактеріальну (бактерицидну) дію шляхом порушення синтезу пептидоглікану клітинної стінки, що приводить до її руйнування і припинення процесу ділення бактерій. Препарати руйнуються під дією пеніциліназ, отже, всі м/о, що виділяють ферменти цього класу є нечутливими. Препарати активні відносно грам (+) м/о: *Staph. spp.* (штами, що не продукують пеніциліназу), *Str. spp.*, *Corynebacterium diphtheriae*; грам(-) м/о: *Bacillus anthracis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *N. meningitidis*, *Treponema spp.*, *Borrelia spp.*, *Leptospira spp.*; анаеробів: *Clostridium spp.* Пеніциліни (табл. 18-1.) добре проникають в тканини та рідини організму, за винятком СМР, внутрішніх середовищ ока та передміхурової залози. При запаленні мозкових оболонок та введ. у великих дозах створюють терапевтичні концентрації у СМР. Екскретуються, в основному, з сечею. Найсуттєвішою небажаною реакцією є ГЧ негайного типу, що має різні клінічні вияви – від висипу до анафілактичного шоку (часто носить пережесний характер з іншими β -лактамами). Можуть викликати (частіше – ампіцилін та цефалоспорини) антибіотикоасоційовану діарею. Через ризик тяжких нейротоксичних реакцій не можна вводити ендоліумбально (за винятком бензилпеніциліну натрієвої солі, яку вводять дуже обережно за життєвими показаннями). При призначенні пацієнтам з нирковою недостатністю слід враховувати вміст у препаратах калію та натрію. Бензилпеніцилін залишається важливим препаратом для лікування інфекцій, викликаних стрептококами, в тому числі пневмококами та β -гемолітичними стрептококами, а також менінгококами та спірохетами. Є а/б вибору при лікуванні дифтерії, газової гангрени, лептоспірозу, кліщового бореліозу (хвороба Лайма). Гонококи, як правило, є резистентними. Застосовують лише парентерально (в/в, в/м). Інші похідні (феноксиметилпеніцилін, бензатину бензилпеніцилін) мають той же спектр, але вони менше активні. Особливості фармакокінетики дозволяють приймати їх п/о (феноксиметилпеніцилін) або забезпечувати пролонг. ефект при в/м введ. (бензатину бензилпеніцилін).

Таблиця 17.1. Класифікація пеніцилінів

Природні	Бензилпеніцилін (пеніцилін G) Феноксиметилпеніцилін (пеніцилін V) Бензатину бензилпеніцилін Бензилпеніцилін прокаїну Бензатину феноксиметилпеніцилін
Антистафілококові	Оксацилін
Розширеного спектру (амінопеніциліни)	Ампіцилін Амоксицилін
Активні по відношенню до <i>P. aeruginosa</i> : карбокспеніциліни уреїдопеніциліни	Тікарцилін Азлоцилін Піперацилін
Комбіновані з інгібіторами β -лактамаз (інгібіторозахищені)	Амоксицилін/клавуланат Ампіцилін/сульбактам Тікарцилін/клавуланат

• **Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: J01CE01 - протимікробні засоби для системного застосування., пеніциліни, чутливі до дії β -лактамаз.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить б/ц дію на чутливі м/о шляхом пригнічення біосинтезу клітинної стінки; спектр дії бензилпеніциліну поширюється на стрептококи груп А, В, С, G, H, L та M, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus viridans*, ентерококи, пеніциліназонепродукуючі штами стафілококів, а також *Neisseriae*, коринебактерії, *Bacillus anthracis*, актиноміцети, *Pasteurella multocida*, різновиди спірохет, наприклад *Leptospira*,

Теронета, Borrelia та інші спірохети, а також численні м/о (пептококи, пептострептококи, фузобактерії, клостридії); у високих концентраціях активний щодо інших Гр (-) м/о (Escherichia coli, Proteus mirabilis, сальмонел, шигел, Enterobacter aerogenes та Alcaligenes faecalis).

Показання для застосування ЛЗ: інфекційні захворювання ПМД, спричинені пеніцилінчутливими м/о: сепсис, ранові інфекції та інфекції шкіри, дифтерія (як додаток до антитоксину), пневмонія ВООЗ, БНФ емпієма, еризипелоїд, перикардит, бактеріальний ендокардит ВООЗ, БНФ, медіастеніт, перитоніт, менінгіт ВООЗ, БНФ, абсцеси мозку ВООЗ, артрит, остеомиєліт ВООЗ, інфекції статевих шляхів, спричинені фузобактеріями, а також при специфічних інфекціях: сибірка БНФ, інфекції, спричинені клостридіями, включаючи правець, лістеріоз, пастерельоз, пропасницю, спричинену укусами щурів, фузоспірохетоз, актиномікоз ВООЗ; лікування ускладнень, спричинених гонореєю БНФ та сифілісом ВООЗ, бореліоз Лайма ВООЗ, БНФ після першої стадії захворювання.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в, в/м, п/ш, інтратекально, у порожнини організму. В/в: дорослі - інфекції середньої тяжкості разова доза препарату 250000-500000 ОД, добова - 1000000-2000000 ОД, тяжкі інфекції - до 10000000-20000000 ОД/добу, при газовій гангрені - до 40000000-60000000 ОД; добова доза для дітей до 1 року - 50000-100000 ОД/кг, віком від 1 року - 50000 ОД/кг, при необхідності добову дозу можна збільшити до 200000-300 000 ОД/кг, за життєвими показаннями - до 500000 ОД/кг, кратність введення - 4-6 р/добу; р-н готувати безпосередньо перед його застосуванням; для в/в струминного введення разову дозу (1 000 000-2 000 000 ОД) препарату розчинити у 5-10 мл стерильної води для ін'єкцій або у 0,9 % р-ну натрію хлориду і вводити повільно протягом 3-5 хв, для в/в крапл. введ. 2 000 000-5 000 000 ОД а/б розчиняти у 100-200 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду або 5 % р-ну глюкози і вводити зі швидкістю 60-80 кр/хв. В/в вводити 1-2 р/добу, поєднуючи з в/м введеннями. В/м: при інфекціях середньої тяжкості разова доза для дорослих -250 000-500 000 ОД, добова - 1 000 000-2 000 000 ОД, при тяжких інфекціях - до 10 000 000-20 000 000 ОД/добу, при газовій гангрені - до 40 000 000-60 000 000 ОД, добова доза для дітей віком до 1 року - 50 000-100 000 ОД/кг, віком від 1 року - 50 000 ОД/кг, при необхідності добову дозу можна збільшити до 200 000-300 000 ОД/кг, за життєвими показаннями - до 500 000 ОД/кг, кратність введення - 4-6 р/добу. П/ш: застосувати для обколювання інфільтратів у концентрації 100 000-200 000 ОД у 1 мл 0,25-0,5 % р-ну новокаїну; у порожнини (черевну, плевральну) дорослим вводити у концентрації 10 000-20 000 ОД в 1 мл, дітям - 2 000-5 000 ОД у 1 мл, тривалість лікування - 5-7 днів з наступним переходом на в/м введення. Інтратекально: вводити при гнійних захворюваннях головного, спинного мозку, мозкових оболонок, дорослим - 5 000-10 000 ОД, дітям від 1 року - 2 000-5 000 ОД, вводити повільно - 1 мл/хв 1 р/добу, залежно від форми та тяжкості захворювання, застосовувати від 7-10 днів до 2 міс.і більше (сепсис, септичний ендокардит). Перед ін'єкцією зі спинномозкового каналу видалити 5-10 мл спинномозкової рідини і додати її до р-ну а/б у рівній пропорції, ін'єкції повторювати 2-3 дні, після чого переходити на в/м введення.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: еозинofilія, лейкопенія, нейтропенія, гранулоцитопенія, тромбоцитопенія, агранулоцитоз, панцитопенія, гемолітична анемія, порушення згортання крові та позитивний результат тесту Кумбса, подовження часу кровотечі і протромбінового часу, АР, включаючи кропив'янку, мультиформну еритему, ексfolіативний дерматит, контактний дерматит, ангіоневротичний набряк, гарячку, біль у суглобах, анафілактичні або анафілактоїдні р-ції (БА, тромбоцитопенічна пурпура, симптоми з боку ШКТ), сироваткова хвороба, р-ція Яриша - Герксгеймера у поєднанні зі спірохетною інфекцією (сифіліс і кліщовий бореліоз), при інфузі високої дози (понад 20 млн МО для дорослих) особливо високий ризик виникнення судом у пацієнтів із тяжкими порушеннями фу-ції нирок, епілепсією, менінгітом, набряком головного мозку або при використанні апарату для екстракорпорального кровообігу, нейротоксичні р-ції, включаючи гіперрефлексію, міоклонічні посмикування; кома, симптоми менінгізму, парестезії, нейропатія, порушення балансу електролітів, яке можливе при швидкому введенні дози понад 10 млн МО, підвищення рівня азоту у сироватці крові, стоматит, глосит, забарвлення язика у чорний колір, нудота, блювання, діарея, пемфігоїд, гепатит, застій жовчі, інтерстиціальний нефрит, нефропатія, альбумінурія, циліндрурія, гематурія, олігурія, анурія; при в/в введенні можливий розвиток флєбіту або тромбофлєбіту; тривале застосування а/б може призвести до розвитку вторинних суперінфекцій, спричинених резистентними м/о; кандидоз; р-ції гіперчутливості (свербіж, ларингоспазм, бронхоспазм, артеріальна гіпотензія, васкулярний колапс); сироваткова хвороба, включаючи такі прояви, як гарячка, слабкість, артралгія, біль у животі, висипання (усіх типів); високі дози препарату можуть призвести до розвитку застійної СН.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість бензилпеніциліну або до інших β-лактамних а/б (пеніцилінів, цефалоспоринів, карбапенемів); новонароджені, матері яких мають підвищену чутливість до а/б групи пеніцилінів; епілепсія (при інтралямбальному введенні), тяжкі АР або БА чи кропив'янка, сінна гарячка в анамнезі.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	500000 ОД	№10x1	5,84	
	БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	1000000 ОД	№10x1	8,02	
II.	ПЕНІЦИЛІН G НАТРІЄВА СІЛЬ САНДОЗ®	Сандоз ГмбХ-ТехОпс, Австрія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000000 МО	№100	2999,30	27,09/\$

• **Бензатину бензилпеніцилін (Benzathine benzylpenicillin) ***

Фармакотерапевтична група: J01CE08 - β-лактамні а/б, пеніциліни.

Основна фармакотерапевтична дія: β-лактамний а/б з групи пеніцилінів типу G пролонгованої дії; виявляє б/ц дію відносно чутливих м/о за рахунок пригнічення синтезу мукопептидів клітинної стінки; активний щодо Гр (+)

збудників: Staphylococcus spp. (пеніциліназоутворюючих), Streptococcus spp., у т. ч. Streptococcus pneumoniae, Corynebacterium diphtheriae, анаеробних спороутворюючих паличок, Bacillus anthracis, Clostridium spp., Actinomyces israelii; Гр (-) м/о: Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, а також щодо Treponema spp; до дії препарату стійкі штами Staphylococcus spp., що продукують пеніциліназу, яка руйнує бензилпеніцилін; у зв'язку з тривалою дією застосовується для лікування інфекцій, спричинених Streptococcus spp. і Treponema pallidum.

Показання для застосування ЛЗ: інфекції, спричинені чутливими до бензатину бензилпеніциліну м/о: г. тонзиліт; скарлатина; хр. бешиха, еризипелюїд; інфіковані рани та від укусів; сифіліс^{ВООЗ, БНФ} та інші захворювання, спричинені трепонемами (фрамбезія, ендемічний сифіліс^{БНФ}, пінта^{ВООЗ}); профілактика: ревматичні захворювання^{ВООЗ} (хорея, ревмокардит); постстрептококовий гломерулонефрит; скарлатина (після контакту з хворим); бешихи; сифіліс^{БНФ} (після контакту з хворим).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати тільки в/м; перед введенням зібрати у пацієнта анамнез переносимості ЛЗ та провести попередню в/ш пробу на його переносимість; лікування сифілісу: первинний - 2,4 млн МО (розподілити на 2 місця введення); вторинний - 2,4 млн МО (розподілити на 2 місця введення), якщо клінічні прояви повторюються або результати лабораторних досліджень залишаються позитивними - лікування повторити; пізній (серопозитивний латентний сифіліс) - 2,4 - 4,8 млн МО щотижня протягом 3-5 тижнів; лікування фрамбезії - 1,2 - 2,4 млн МО одноразово (особам, які мали контакт з хворими або хворими з латентною формою інфекції, вводити половину дози); пінти - 2,4 млн МО одноразово; лікування інших інфекцій (г. тонзиліт, скарлатина, бешиха, еризипелюїд, інфіковані та рани від укусів) - 2,4 млн МО щотижня; профілактика ревматичної лихоманки, ендокардиту, хореї, пост-стрептококового гломерулонефриту та бешихи - 1,2 - 2,4 млн МО 1 раз на 4 тижні, тривалість профілактики встановлюється індивідуально; профілактика скарлатини в осіб, що мали контакт з хворими - 2,4 млн МО одноразово, при стрептококових захворюваннях курс лікування не менше 10 днів для запобігання ускладнень, як правило, достатньо однієї ін'єкції 2 400 000 МО.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: резистентна бактеріальна та грибкова інфекція (у т. ч. кандидоз), гемолітична анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія, агранулоцитоз, еозинофілія, р-ції гіперчутливості, включаючи висипання; кропив'янка, набряк Квінке, мультиформна еритема, ексфолюативний та контактний дерматит, пропасниця, біль у суглобах, ларингоспазм, бронхоспазм, анафілактичний шок, іноді з колапсом та летальним наслідком, анафілактоїдні р-ції (астма, пурпура, симптоми з боку травного тракту); сироваткова хвороба; при терапії сифілісу ч/з вивільнення ендотоксинів може розвинути р-ція Яриша-Герксгеймера, для якої характерні симптоми: підвищення т° тіла, озноб, міалгія, головний біль, загострення шкірних симптомів, тахікардія, вазодилатація зі зміною АТ (р-ція може бути небезпечною при СС сифілісі або станах, при яких існує серйозний ризик підвищеного локального пошкодження, наприклад, атрофія зорового нерва), при дерматомикозі можливий розвиток параалергічних р-цій у результаті можливої спільної антигенності між пеніцилінами і метаболітами дерматофітів, с-м Стівена-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайелла), нейропатія, діарея, нудота; стоматит, глосит, блювання; псевдомембранозний коліт, забарвлення язика у чорний колір; гепатит, холестаза, пемфігоїд, нефропатія, інтерстиційний нефрит, біль, інфільтрація у місці введення, с-м Уанье, с-м Хойне (Hoigne) та Ніколау (Nicolau), позитивний тест Кумбса, хібно-позитивний результат тесту на наявність білка у сечі при р-ції преципітації (метод Фоліна-Чокальтеу-Лоурі, біуретний метод), хібно-позитивний результат тесту на виявлення амінокислот у сечі (нінгідринний метод), симуляція псевдобісальбумінемії при використанні електрофорезу для визначення альбуміну, хібнопозитивний результат визначення глюкози та уробіліногену неферментативним методом, підвищений рівень при визначенні 17-кетостероїдів у сечі (при використанні р-ції Циммермана).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого компонента ЛЗ, до β-лактаміних а/б (пеніцилінів і цефалоспоринів), сої, арахісу; перехресна чутливість до цефалоспоринів (5-10 % випадків) в анамнезі; лікування захворювань, що потребують високих концентрацій пеніциліну в сироватці крові та цереброспінальній рідині (тяжкі пневмонії, емпієма, сепсис, перикардит, менінгіт, перитоніт, артрит, вроджений нейросифіліс), використовувати водорозчинну натрієву сіль бензилпеніциліну; кропив'янка, поліноз, тяжкі АР та БА в анамнезі.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	РЕТАРПЕН	Сандоз ГмБХ–ТехОпс (наповнення, пакування, контроль, випуск серії)/ФРЕЗЕНІУС КАБІ Анти-Інфективес С.р.л. (виробництво in bulk (стерильної суміші)), Австрія/Італія	пор. д/сусп. д/ін'єк. у фл.	2400000 МО	№50	відсутня у реєстрі ОВЦ	

● **Ампіцилін (Ampicillin) ***

Фармакотерапевтична група: J01CA01 - β-лактаміні а/б; пеніциліни широкого спектра дії.

Основна фармакотерапевтична дія: має широкий спектр антибактеріальної (б/ц) дії; активний відносно Гр (+) м/о: Staphylococcus spp., за винятком штамів, які продукують пеніциліназу; Streptococcus spp., (S. pneumoniae; Corynebacterium diphtheriae, Bacillus anthracis, Clostridium spp., більшість ентерококів); Гр (-) м/о: (Escherichia coli, Shigella spp., Salmonella spp., Neisseria meningitidis, N. gonorrhoeae, Proteus mirabilis, деякі штами Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae); не діє на пеніциліназоутворюючі штами бактерій; інгібує полімераза пептидоглікану і транспептидазу, перешкоджає утворенню пептидних зв'язків і порушує пізні етапи синтезу клітинної стінки м/о, що діляться; дефекти оболонки, що виникають, знижують осмотичну стійкість бактеріальної клітини, що призводить до її загибелі.

Показання для застосування ЛЗ: сепсис, септичний ендокардит^{БНФ}, менінгіт^{ВООЗ, БНФ}, інфекції дихальних шляхів і ЛОР-органів (пневмонія^{БНФ}, хр. бронхіт^{БНФ}, абсцес легенів, синусит^{БНФ}, фарингіт, отит^{БНФ}, тонзиліт); сечостатевої системи^{БНФ} (пієліт, пієлонефрит, цистит, уретрит, гонорея) і жовчовидільних шляхів (холангіт,

холецистит); перитоніт; інфекції шкіри і м'яких тканин та захворювання, спричинені чутливими до дії а/б м/о (спричинені β-гемолітичними стрептококами групи А або коагулазо-позитивними стафілококами, чутливими до пеніциліну); санація носіїв тифу (які переносять *Salmonella typhi* та *paratyphi*).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують р/ос, в/м та в/в (краплинно і струминно)^{БНФ}; при внутрішньому застосуванні рекомендована разова стандартна доза для дорослих^{ВООЗ, БНФ} і дітей віком від 14 років - 250-1000 мг кожні 6 год^{ВООЗ, БНФ}; тривалість лікування встановлюється індивідуально (від 5 днів до 3 тижнів і більше), після зникнення клінічних ознак захворювання ампіцилін приймати ще 2-3 дні; інфекції сечових шляхів - 500 мг кожні 8 год.; черевний тиф і паратиф - 1-2 г кожні 6 год.; при г. перебігу захворювання - впродовж 2 тижнів, якщо пацієнт є бацилоносієм - 4-12 тижнів; неускладнена гонорея - одноразово 2 г у комплексі з 1 г пробенециду, для жінок курс лікування повторити; інфекції дихальних шляхів і ЛОР-органів - 250 мг кожні 6 год.; пневмонія - 500 мг кожні 6 год.; дітям, починаючи з 6-річного віку внутрішньо р/ос із розрахунку 100 мг/кг/добу, добову дозу розподіляють на 4-6 прийомів; в/м та в/в: рекомендована доза для дорослих - 250 - 500 мг 4 р/добу^{ВООЗ, БНФ}; добова - 1-3 г; тяжкі інфекції - добова доза може бути збільшена до 10 г і більше; добова доза для новонароджених - 20-40 мг/кг, дітям інших вікових груп - 50-100 мг/кг; при тяжкому перебігу інфекції вказані дози можуть бути подвоєні; добову дозу вводити у 4-6 прийомів з інтервалом у 4-6 год.; менінгіти у дітей: дітям віком до 1 міс. у добовій дозі 100-500 мг/кг, дітям віком від 1 міс. у добовій дозі 200-300 мг/кг за 6-8 введень; добову дозу вводити у 4-6 прийомів; тривалість лікування становить 7-14 днів і більше; лікування продовжувати впродовж не менше 48-72 год. після нормалізації т° тіла і зникнення симптомів захворювання; при інфекціях, спричинених гемолітичним стрептококом, тривалість лікування не менше 10 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР, висипи (уртикарний, макулопапульозний), свербіж, гіперемія, кропив'янка, риніт, кон'юнктивіт, пропасниця, біль у суглобах, еозинофілія, ексфолиативний дерматит, пурпура, мультиформна ексудативна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, набряк Квінке, анафілактичний шок; нудота, блювання, діарея, зміни смаку, біль у животі, стоматит, глосит, сухість у роті, кишковий дисбактеріоз, гастрит, ентероколіт, геморагічний коліт; псевдомембранозний коліт; гепатит, холестатична жовтяниця; запаморочення, тремор, судоми, головний біль, нейропатія; помірне підвищення активності «печінкових» трансаміназ, ЛДГ, ЛФ, креатиніну, псевдопозитивні результати неферментативних глюкозуричних тестів та р-ції Кумбса; оборотні порушення гемопоезу (лейкопенія, тромбоцитопенія, гемолітична анемія, агранулоцитоз), інтерстиціальний нефрит, суперінфекція, кандидоз; у хворих з бактеріємією (сепсис) - бактеріоліз (р-ція Яриша-Геркстеймера); набряк, свербіж, гіперемія у місці введення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до ампіциліну та інших β-лактамних а/б (пеніцилінів, цефалоспоринів, карбапенемів), до допоміжних компонентів ЛЗ; тяжкі порушення функції печінки та нирок; інфекційний мононуклеоз; лейкемія; ВІЛ-інфекція; захворювання ШКТ/коліт, пов'язаний із застосуванням а/б.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 2 г., парентерально - 6 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	АМПІЦИЛІН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	250мг	№10x1	13,23	
	АМПІЦИЛІН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	250мг	№10x2	13,67	
	АМПІЦИЛІН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. в конт. чар/уп.	0,5г; 1г	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АМПІЦИЛІН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	0,5г	№1	64,08	
	АМПІЦИЛІН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	1г	№1	50,40	

● **Амоксицилін (Amoxicillin) *** [ПМД]

Фармакотерапевтична група: J01CA04 - протимікробні ЛЗ для системного застосування; β-лактамі а/б; пеніциліни широкого спектру дії.

Основна фармакотерапевтична дія: напівсинтетичний амінопеніциліновий а/б широкого спектра дії; інгібує один або кілька ферментів (а саме: пеніцилін-зв'язуючих білків (ПЗБ)) у процесі біосинтетичного метаболізму бактеріального пептидоглікану, що є невід'ємним структурним компонентом клітинної стінки бактерій; інгібування синтезу пептидоглікану призводить до послаблення клітинної стінки, наслідком чого є лізис і загибель клітин; має широкий спектр антимікробної дії; чутливі Гр (+) м/о: *Streptococci* групи А, *Streptococci* групи В, *Str. pneumoniae*, *Cl. welchii*, *Cl. Tetani*, *Staph. Aureus*, (β-лактамазонегативні штами), *B. Anthracis*, *L. subtilis*, *L. Monocytogenes*, *Str. faecalis*; чутливі Гр (-) м/о: *N. gonorrhoeae*, *N. Meningitidis*, *H. Influenzae*, *Bordetella pertussis*, *E. Coli*, *P. Mirabilis*, *S. Typhi*, *Sh. Sonnei*, *V. cholerae*. Неактивний до м/о, які виробляють β-лактамази, таких як *Pseudomonas*, *Klebsiella*, індол-(+) штаміє *Proteus* та штаміє *Enterobacter*; рівень резистентності чутливих м/о може бути варіабельним на різних територіях.

Показання для застосування ЛЗ: інфекції шкіри та м'яких тканин, сечостатевої системи^{БНФ БНФ}, спричинені чутливими до ЛЗ м/о: г. бактеріальний синусит^{БНФ}; г. отит^{ВООЗ БНФ} середнього вуха; г. стрептококовий тонзиліт і фарингіт; загострення хр. бронхіту^{БНФ}; негоспітальна пневмонія^{ВООЗ БНФ}; гострий цистит^{ВООЗ}; безсимптомна бактеріурія у період вагітності; г. пієлонефрит^{ВООЗ}; тифоїдна і паратифоїдна лихоманка; дентальні абсцеси з поширенням целюлітом^{БНФ ВООЗ}; інфекції протезованих суглобів; ерадикація *Helicobacter pylori* (у складі комбінованої терапії);^{ВООЗ} хвороба Лайма^{ВООЗ БНФ}; лікування та профілактика ендокардитів^{ВООЗ БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: інфекційно-запальні захворювання легкого та середнього ступеня: дорослі і діти від 12 р. (маса тіла > 40 кг) - 500-750 мг 2 р/добу або 500 мг 3 р/добу; хр. захворювання, у разі рецидиву, інфекції тяжкого перебігу - дозу препарату збільшити і розподілити на 3 прийомів: дорослим - по 750-1000 мг 3 р/добу^{ВООЗ БНФ}; дітям від 12 років - до 60 мг/кг/добу за 3 прийомів; пор.д/ ор. сусп.: дорослі та підлітки з масою

тіла \geq 40 кг: г. бактеріальний синусит - від 250 мг до 500 мг кожні 8 год^{БНФ} або від 750 мг до 1 г кожні 12 год; безсимптомна бактеріурія у період вагітності г. пієлонефрит, дентальні абсцеси з поширеним целюлітом, тяжкі інфекції - від 750 мг до 1 г кожні 8 год^{БНФ}, г. цистит - 3 г 2р/добу протягом 1 дня^{БНФ}; г. отит середнього вуха, г. стрептококовий тонзиліт і фарингіт, загострення хр. бронхіту - 500 мг кожні 8 год^{БНФ} або від 750 мг до 1 г кожні 12 год, у разі тяжких інфекцій - від 750 мг до 1 г кожні 8 год 10 днів; негоспітальна пневмонія - від 500 мг до 1 г кожні 8 год^{ВООЗ}; тифоїдна і паратифоїдна лихоманка - від 500 мг до 2 г кожні 8 год; інфекції протезованих суглобів - від 500 мг до 1 г кожні 8 год^{БНФ}; профілактика ендокардиту - 2 г р/ос^{БНФ}, разова доза за 30-60 хв до проведення процедури; ерадикація *Helicobacter pylori* - від 750 мг до 1 г 2р/добу^{БНФ} в комбінації з інгібітором протонної помпи (омепразолом, лансопразолом) та іншим а/б (кларитроміцином, метронідазолом) 7 днів; хв. Лайма - початкова стадія - від 500 мг до 1 г кожні 8 год, максимальна доза - 4 г/добу за кілька прийомів 14 днів. Діти з масою тіла < 40 кг: г. бактеріальний синусит, г. отит середнього вуха, негоспітальна пневмонія, г. синусит, г. пієлонефрит^{БНФ}, дентальні абсцеси з поширеним целюлітом - від 20 до 90 мг/кг/добу за кілька прийомів, МДД - 3 г/добу^{БНФ}, дітям від 3 до 12 р. - 250 мг 3 р/добу^{БНФ}; г. стрептококовий тонзиліт і фарингіт - від 40 до 90 мг/кг/добу за кілька прийомів; тифоїдна і паратифоїдна лихоманка - 100 мг/кг/добу за 3 прийоми, профілактика ендокардиту - 50 мг/кг р/ос, разова доза за 30-60 хв до проведення процедури, хв. Лайма - початкова стадія - від 25 до 50 мг/кг/добу за 3 прийоми 10-21 днів, пізня стадія (системні ураження) - 100 мг/кг/добу за 3 прийоми 10-30 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: суперінфекції, надмірний рост нечутливих м/о або дріжджів, що спричиняють кандидоз шкіри та слизових оболонок; еозинofilія, гемолітична анемія, лейкопенія, тяжка нейтропенія, агранулоцитоз, тромбоцитопенія, панцитопенія, мієлосупресія, гранулоцитопенія, збільшення часу кровотечі та протромбінового індексу; тяжкі АР, ангіоневротичний набряк (набряк Квінке), анафілаксія, сироваткова хвороба, алергічний васкуліт, набряк гортані, анафілактичний шок; гіперкінезія, гіперактивність, запаморочення, судоми, асептичний менінгіт; діарея, нудота, блювання, метеоризм, м'які випорожнення, свербіж у ділянці ануса, втрата апетиту, енантема, сухість у роті, порушення смаку; зміна кольору поверхні зубів; антибіотикоасоційований коліт (псевдомембранозний і геморрагічний коліт), кандидоз кишечника, забарвлення язика у чорний колір; гепатит, холестатична жовтяниця, помірне і короточасне підвищення рівня печінкових ферментів (АСТ, АЛТ); шкірні висипання, кропив'янка, свербіж, мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, бульозний та екзофоліативний дерматит, г. генералізований екзантематозний пустульоз, с-м Лайєлла, р-ція Яриша-Герксгеймера; г. інтерстиціальний нефрит, кристалурія; гарячка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до амоксициліну, до інших пеніцилінів або до допоміжних речовин ЛЗ, наявність в анамнезі тяжких р-цій гіперчутливості (у т. ч. анафілаксії) до β -лактамних а/б (у т. ч. цефалоспоринів, карбапенемів або монобактамів).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1,5 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АМОКСИЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	250мг	№10x2	14,62	
	АМОКСИЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	500мг	№10x2	10,18	
	АМОКСИЛ® ДТ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. що дисперг. у бл.	500мг	№10x2	10,18	
	АМОКСИЦИЛІН-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	капс. у бл.	250мг, 500мг	№7x1, №7x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	ОСПАМОКС	Сандоз ГмБХ - ТехОпс, Австрія	пор. д/орал. сусп. у фл. по 60мл, 100мл	125мг/5мл; 250мг/5мл; 500мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ОСПАМОКС ДТ	Сандоз ГмБХ – Виробнича дільниця Антиінфекційні ГЛЗ та Хімічні Операції Кундль (АІХО ГЛЗ Кундль), Австрія	табл. що дисперг. у бл.	250мг, 500мг, 1000мг	№10x2, №6x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ОСПАМОКС ДТ	Сандоз ГмБХ – Виробнича дільниця Антиінфекційні ГЛЗ та Хімічні Операції Кундль (АІХО ГЛЗ Кундль), Австрія	табл. що дисперг. у бл.	500мг	№12x1	29,20	27,09/\$
	ОСПАМОКС®	Сандоз ГмБХ - Виробнича дільниця Антиінфекційні ГЛЗ та Хімічні Операції Кундль (АІХО ГЛЗ Кундль), Австрія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг, 1000мг	№12x1, №6x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ОСПАМОКС®	Сандоз ГмБХ – ТехОпс, Австрія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№12x1	27,60	27,09/\$
	ОСПАМОКС®	Сандоз ГмБХ – ТехОпс, Австрія	табл., вкриті п/о у бл.	1000мг	№6x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ®	Астеллас Фарма Юроп Б.В. (всі стадії виробництва, пакування, контроль серій), Нідерланди	табл. що дисперг. у бл.	125мг	№5x4	57,98	29,20/€

ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ®	Астеллас Фарма Юроп Б.В. (всі стадії виробництва, пакування, контроль серій), Нідерланди	табл. що дисперг. у бл.	250мг	№5x4	35,55	29,20/€
ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ®	Астеллас Фарма Юроп Б.В. (всі стадії виробництва, пакування, контроль серій), Нідерланди	табл. що дисперг. у бл.	500мг	№5x4	22,58	29,20/€
ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ®	Астеллас Фарма Юроп Б.В. (всі стадії виробництва, пакування, контроль серій), Нідерланди	табл. що дисперг. у бл.	1000мг	№5x4	15,34	29,20/€
ХІКОНЦИЛ	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за контроль та випуск серії; відповідальний за вторинне пакування; відповідальний за контроль серії (хімічні та фізичні методи контролю))/Юнічем Лабораторіес Лімітед (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне, Словенія/Індія	пор. д/приг. 100мл сусп. д/перор. заст. у фл. з мірн. лож.	250мг/5мл	№1	17,61	27,55/€
ХІКОНЦИЛ	Сандоз ГмбХ (відповідальний за виробництво "in bulk", первинну упаковку, вторинну упаковку)/Юнічем Лабораторіес Лімітед (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне пакування, вторинне пакування)/КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за контроль се, Австрія/Індія/Словенія	капс. у бл.	250мг	№8x2	20,67	27,55/€
ХІКОНЦИЛ	Сандоз ГмбХ (відповідальний за виробництво "in bulk", первинну упаковку, вторинну упаковку)/Юнічем Лабораторіес Лімітед (відповідальний за виробництво "in bulk", первинне пакування, вторинне пакування)/КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за контроль се, Австрія/Індія/Словенія	капс. у бл.	500мг	№8x2	14,57	27,55/€

Комбіновані препарати

- **Бензатину бензилпеніцилін + бензилпеніциліну натрієва сіль + бензилпеніциліну новокаїнова сіль (Benzathine benzylpenicillin + benzylpenicillin sodium + benzylpenicillinumnovocainum)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.
Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БІЦИЛІН®-3	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/сусп. д/ін'єк. у фл.	600000 ОД	№1	42,40	

- **Бензатину бензилпеніцилін + бензилпеніциліну новокаїнова сіль (Benzathine benzylpenicillin + benzylpenicillinumnovocainum)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.
Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БІЦИЛІН®-5	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/сусп. д/ін'єк. у фл.	1500000 ОД	№1	54,50	

- **Амоксицилін + Кислота клавуланова (Amoxicillin + Clavulanic acid) ***

Фармакотерапевтична група: J01CR02 - АБЗ для системного застосування. β-лактамі а/б, пеніциліни. Комбінації пеніцилінів з інгібіторами β-лактамази.

Основна фармакотерапевтична дія: амоксицилін напівсинтетичний пеніцилін (β-лактамі а/б), який інгібує один або кілька ферментів (часто іменованих пеніцилінзв'язуючими білками, ПЗБ) у процесі біосинтетичного метаболізму бактеріального пептидоглікану, що є невід'ємним структурним компонентом клітинної стінки бактерій, інгібування синтезу пептидоглікану призводить до послаблення клітинної стінки, наслідком чого є лізис і загибель клітин, є чутливим до розщеплення β-лактамазами, що продукуються резистентними бактеріями, отже, спектр активності амоксициліну як монотерапії не включає організми, які продукують ці ферменти. Клавуланова кислота деактивує деякі ферменти β-лактамази, тим самим запобігаючи інактивації амоксициліну.

Показання для застосування ЛЗ: лікування бактеріальних інфекцій, спричинених чутливими м/о^{ВООЗ, БНФ}: г. бактеріальний синусит (підтверджений); г. середній отит; загострення хр. бронхіту^{ВООЗ, БНФ} (після підтвердження діагнозу); негоспітальна пневмонія^{ВООЗ, БНФ}; цистит; пієлонефрит^{ВООЗ, БНФ}; інфекції шкіри та м'яких тканин, у т.ч. бактеріальні целюліти, укуси тварин, тяжкі дентоальвеолярні абсцеси з поширеним целюлітом^{ВООЗ}; інфекції кісток і суглобів, у т.ч. остеомиєліт^{ВООЗ, БНФ}; пор. для р-ну для ін'єк./інф.: внутрішньочеревні інфекції^{ВООЗ}; інфекції статевих органів у жінок^{ВООЗ, БНФ}; профілактика бактеріальних інфекцій при великих оперативних втручаннях^{ВООЗ} у таких зонах: ШКТ; органи малого таза; голова та шия; жовчні шляхи; пор. д/оральн. сусп.: інфекції у дітей віком від 3 міс.^{ВООЗ} до досягнення дитьми маси тіла 40 кг, спричинені або імовірно спричинені пеніцилінрезистентними штамми Str. pneumoniae, такі як: г. середній отит; негоспітальна пневмонія.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл. (500 мг/125 мг) дорослим та дітям з масою тіла ≥ 40 кг - 500 мг/125 мг 3 р/добу; діти віком від 6 років з масою тіла від 25 до 40 кг: від 20 мг/5 мг/кг/добу до 60 мг/15 мг/кг/добу, розділена на 3 прийоми; табл. (875 мг/125 мг): дорослим та дітям з масою тіла ≥ 40 кг у дозуванні 875 мг/125 мг 2 р/добу; для дітей з масою тіла < 40 кг: від 25 мг/3,6 мг/кг/добу до 45 мг/6,4 мг/кг/добу, розділена на 2 прийоми; при деяких інфекціях (таких як середній отит, синусит та інфекції НДШ) МДД не може перевищувати 70 мг/10 мг/кг/добу, порошок для р/ос сусп.: дітям від 3 міс. до досягнення маси тіла 40 кг: рекомендована доза 90/6,4 мг/кг/добу, розподілена на 2 прийоми з 12-год. інтервалом протягом 10 днів; порошок д/р-ну д/ін'єкц. дорослим та дітям з масою тіла ≥ 40 кг: стандартна доза складає 1000/200 мг кожні 8 год.^{ВООЗ}; при операціях тривалістю менше 1 год. рекомендована доза -1000/200 мг - 2000/200 мг при введенні в наркоз, при операціях тривалістю понад 1 год. рекомендована доза -1000/200 мг до 2000/200 мг при введенні в наркоз, дозу 1000/200 мг можна ввести 3 рази протягом 24 год.; дозування для дітей з масою тіла < 40 кг: діти від 3 міс.: 25/5 мг/кг маси тіла кожні 8 год.; діти до 3 міс. або масою тіла < 4 кг: 25/5 мг/кг маси тіла кожні 12 год.^{ВООЗ};

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кандидоз шкіри та слизових оболонок; надмірне збільшення нечутливих м/о; оборотна лейкопенія (нейтропенія), надмірне збільшення нечутливих м/о, тромбоцитопенія, оборотний агранулоцитоз, гемолітична анемія, збільшення часу кровотечі та протромбінового індексу; ангіоневротичний набряк, анафілаксія, сироваткоподібний с-м, алергічний васкуліт; запаморочення, головний біль; оборотна гіперактивність, асептичний менінгіт, судоми; діарея, нудота, блювання, порушення травлення; а/б-асоційований коліт (псевдомембранозний, геморагічний коліт), чорний «волосатий» язик; помірне підвищення рівня АСТ, АЛТ; гепатити, холестатична жовтяниця; шкірне висипання, свербіж, кропив'янка, поліморфна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, пухирчастий ексфоліативний дерматит, г. генералізований екзантематозний пустульоз; інтерстиціальний нефрит, кристалурія; р-ція на ліки з еозинофілією та системними симптомами (DRESS).

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до будь-яких компонентів ЛЗ, до будь-яких АБЗ групи пеніцилінів; наявність в анамнезі тяжких р-цій гіперчутливості (в т.ч. анафілаксії), пов'язаних із застосуванням інших β-лактамічних агентів (у т.ч. цефалоспоринів, карбапенемів або монобактамів); наявність в анамнезі жовтяниці або дисфункції печінки, пов'язаних із застосуванням амоксициліну/клавуланату.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1,5 г (відноситься до амоксициліну), парентерально - 3 г (відноситься до амоксициліну)

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АМОКСИЛ-К	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	1г/0,2г	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АМОКСИЛ-К	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1г/0,2г	№1	128,16	
	АМОКСИЛ-К 1000	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	875мг/125мг	№7x2	14,01	
	АМОКСИЛ-К 625	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	500мг/125мг	№7x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АМОКСИЛ-К 625	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	500мг/125мг	№7x2	15,85	
II.	АБИКЛАВ®	Ауробіндо Фарма	табл., вкриті п/о у бл.	875мг/125мг	№5x2	21,08	24,59/\$

	Лімітед, Юніт-ХІІ, Індія					
АБИКЛАВ®	Ауробіндо Фарма Лімітед, Юніт-ХІІ, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг/125мг	№5x4	20,29	24,59/\$
АМОКСИКЛАВ®	Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія	пор. для 100мл орал. сусп. у фл. з піпет.	250мг/62,5мг/5мл	№1	52,11	27,09/\$
АМОКСИКЛАВ®	Лек Фармацевтична компанія д. д. (виробництво за повним циклом; випуск серії), Словенія	пор. для 100мл орал. сусп. у фл. з піпет.	125мг/31,25мг/5мл	№1	59,64	27,22/\$
АМОКСИКЛАВ®	Сандоз ГмБХ - Виробнича дільниця Антиінфекційні ГЛЗ та Хімічні Операції Кундль (АІХО ГЛЗ Кундль), Австрія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	500мг/125мг, 1000мг/200мг	№5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АМОКСИКЛАВ® 2S	Лек фармацевтична компанія д.д. (випуск серії; виробництво за повним циклом), Словенія	пор. д/орал. сусп. у пл. по 8,75г, 17,5г з доз. піпет.	400мг/57мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АМОКСИКЛАВ® 2X	Лек фармацевтична компанія д.д. (виробництво за повним циклом; випуск серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг/125мг	№7x2	16,80	27,22/\$
АМОКСИКЛАВ® 2X	Лек фармацевтична компанія д.д. (виробництво за повним циклом; випуск серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	875мг/125мг	№7x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АМОКСИКЛАВ® КВІКТАБ	Лек Фармацевтична компанія д.д. (дозвіл на випуск серії, виробництво за повним циклом), Словенія	табл., що дисперг. у бл.	875мг/125мг, 500мг/125мг	№10, №14, №20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АМОКСИКОМБ	Ауробіндо Фарма Лімітед, Юніт - ХІІ, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг/125мг, 875мг/125мг	№5x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АУГМЕНТИН™	СмітКляйн Бічем Фармасьютикалс (виробник нерозфасованої продукції; виробник для первинного, вторинного пакування, контролю якості та випуску серії)/Сандоз Індастріал Продактс С.А.	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	1000мг/200мг	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	

	(виробник нерозфасованої продукції)/Біофарма С.Р.Л. (виробник для первинно, Велика Британія/Іспанія/Італія)					
АУГМЕНТИН™	СмітКляйн Бічем Фармасьютікалс/Глаксо Веллком Продакшн, Велика Британія/Франція	табл., в/о у бл.	500мг/125мг	№7x2	26,88	26,69/\$
АУГМЕНТИН™	СмітКляйн Бічем Фармасьютікалс/Глаксо Веллком Продакшн, Велика Британія/Франція	пор. для 70мл орал. сусп. у фл.	200мг/28,5мг/5мл, 400мг/57мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
АУГМЕНТИН™ (BD)	СмітКляйн Бічем Фармасьютікалс/Глаксо Веллком Продакшн, Велика Британія/Франція	табл., вкриті п/о у бл.	875мг/125мг	№7x1, №7x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
АУГМЕНТИН™ ES	СмітКляйн Бічем Фармасьютікалс/Глаксо Веллком Продакшн, Велика Британія/Франція	пор. д/орал. сусп. у фл. з мірн. ложк.	600мг/42,9мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
БАКТОКЛАВ	Мікро Лабс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у стрип.	500мг/125мг	№10x1	22,50	28,54/\$
БЕТАКЛАВ®	Мікро Лабс Лімітед (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування)/КРКА, д.д., Ново место (вторинне пакування, контроль та випуск серії), Індія/Словенія	табл., вкриті п/о у стрип. та бл.	500мг/125мг, 875мг/125мг	№10, №21, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
БЕТАКЛАВ®	Мікро Лабс Лімітед (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування)/КРКА, д.д., Ново место (вторинне пакування, контроль та випуск серії), Індія/Словенія	табл., вкриті п/о у стрип. або бл.	500мг/125мг	№14	20,82	30,33/€
БЕТАКЛАВ®	Мікро Лабс Лімітед (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування)/КРКА, д.д., Ново место (вторинне пакування, контроль та випуск серії), Індія/Словенія	табл., вкриті п/о у стрип. або бл.	875мг/125мг	№14	13,42	30,33/€
БЕТАКЛАВ®	Мікро Лабс Лімітед (виробництво "in bulk", первинне та вторинне	пор. д/орал. сусп. у фл. по 30мл, 60мл, 100мл з доз. шпр.	400мг/57мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	пакування)/КРКА, д.д., Ново место (вторинне пакування, контроль та випуск серії), Індія/Словенія					
БЕТАКЛАВ®	Мікро Лабс Лімітед (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування)/КРКА, д.д., Ново место (вторинне пакування, контроль та випуск серії), Індія/Словенія	пор. д/орал. сусп. у фл. по 70мл з доз. шпр.	400мг/57мг/5мл	№1	23,72	30,33/€
КЛАВАМ	Алкем Лабораторіз Лтд, Індія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	500мг/100мг, 1000мг/200мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КЛАВАМ	Алкем Лабораторіз Лтд, Індія	пор. д/орал. сусп. у фл.	125мг/31,25мг/5мл, 200мг/28,5мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КЛАВУКСИЦИН	АСТРАЛ СТЕРІТЕК ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД, Індія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	500мг/100мг, 1000мг/200мг	№1, №5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КОАКТ	Ауробіндо Фарма Лімітед, Юніт-ХІІ, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг/125мг	№5x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КОАКТ	Ауробіндо Фарма Лімітед, Юніт-ХІІ, Індія	пор. д/орал. сусп. у фл.	125мг/31,25мг/5мл, 250мг/62,5мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КОАКТ	Ауробіндо Фарма Лімітед, Юніт-ХІІ, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	875мг/125мг	№5x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МАЙКЛАВ	Юнікем Лабораторіз Лімітед, Індія	пор. д/орал. сусп. у фл.	125мг/31,25мг/5мл, 200мг/28,5мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МАЙКЛАВ 625	Юнікем Лабораторіз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у стрип.	500мг/125мг	№60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МЕДОКЛАВ	Медокемі ЛТД (Завод В), Кіпр	пор. д/орал. сусп. 70 мл, 140 мл у фл.	400мг/57мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МЕДОКЛАВ	Медокемі ЛТД (Завод В), Кіпр	табл., вкриті п/о у бл.	500мг/125мг	№8x2	20,03	31,43/€
МЕДОКЛАВ	Медокемі ЛТД (Завод В), Кіпр	табл., вкриті п/о у бл.	875мг/125мг	№7x2	16,55	31,43/€
МЕДОКЛАВ	Медокемі ЛТД (Завод В), Кіпр	пор. д/р-ну д/ін'ек. або інфуз. у фл.	1г/0,2г	№10	154,31	30,26/€
РАПІКЛАВ-625	Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у стрип.	500мг/125мг	№3x7	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ®	Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нідерланди	табл., що дисперг. у бл.	125мг/31,25мг	№4x5	77,21	29,20/€
ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ®	Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нідерланди	табл., що дисперг. у бл.	250мг/62,5мг	№4x5	54,48	29,20/€
ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ®	Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нідерланди	табл., що дисперг. у бл.	500мг/125мг	№4x5	25,79	29,20/€
ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ®	Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нідерланди	табл., що дисперг. у бл.	875мг/125мг	№7x2	22,92	29,20/€

17.2.1.2. Цефалоспори́ни

Залежно від особливостей антимікробного спектру, виділяють 4 покоління цефалоспоринів (табл.17.2).

Таблиця 17.2. Класифікація цефалоспоринів

Цефалоспори́ни I покоління Парентеральні П/о	<i>Цефазолін</i> <i>Цефалексин</i> <i>Цефадроксил</i>
Цефалоспори́ни II покоління Парентеральні П/о	<i>Цефуроксим</i> <i>Цефуроксиму аксетил</i> <i>Цефаклор</i>
Цефалоспори́ни III покоління Парентеральні П/о	<i>Цефотаксим</i> <i>Цефтриаксон</i> <i>Цефоперазон</i> <i>Цефоперазон/сульбактам</i> <i>Цефтазидим</i> <i>Цефіксим</i> <i>Цефтибутен</i>
Цефалоспори́ни IV покоління Парентеральні	<i>Цефепім</i>

Цефалоспори́ни. Бактерицидна дія препаратів зумовлена пригніченням синтезу бактеріальної стінки м/о. Препарати I покоління мають переважачу активність відносно грам(+) коків – стафілококів (коагулазопозитивні, коагулазонегативні та пеніциліназопродукуючі штами), стрептококів, пневмококів. Грам(-) бактерії є резистентними, виняток складають *E.coli* та *P.mirabilis*. До препаратів резистентна більшість штамів ентерококів, наприклад: *Enterococcus faecalis*, і стафілококи, які резистентні до метициліну. Застосовують при інфекціях шкіри та м'яких тканин, кісток та суглобів, для періопераційної профілактики. Як альтернативні засоби застосовують при ендокардиті та сепсисі, викликаних метициліночутливими стафілококами та *Str. viridans* стрептококами. Цефазолін погано проникає через ГЕБ. Виводиться переважно з сечею, $T_{1/2}$ – 2 год, вводять 2-3 р/добу. Цефалексин має високу біодоступність при перорального прийомі. Основні показання до застосування цефалексину та цефадроксилу: стрептококовий фарингіт, стрептококові та стафілококові позалікарняні інфекції шкіри та м'яких тканин, кісток, суглобів легкого та середньотяжкого ступеню.

- **Цефазолін (Cefazolin) ***

Фармакотерапевтична група: J01DB04 - Протимікробні засоби для системного застосування. Цефалоспори́ни першої генерації.

Основна фармакотерапевтична дія: напівсинтетичний а/б групи цефалоспоринів I покоління для парентерального введення; пригнічує фермент транспептидазу, блокує біосинтез мукопептиду у клітинній стінці бактерії; має широкий спектр бактерицидної дії, ефективний відносно Гр (-) і Гр (+) м/о, що утворюють і не утворюють пеніциліназу; до нього чутливі Гр (+) м/о: *Staphylococcus aureus* (включаючи штами, що продукують пеніциліназу), *Staphylococcus epidermidis* (стафілококи, резистентні до метициліну, також стійкі до цефазоліну), б-гемолітичні стрептококи групи А та інші штами стрептококів (багато штамів ентерококів, резистентні до лікарського засобу), *Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Bacillus anthracis*; а також Гр (-) м/о: *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella spp.*, *Enterobacter aerogenes*, *Haemophilus influenzae*, *Neisseria meningitidis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Shigella spp.*, *Salmonella spp.*, *treponema spp.*, *Leptospira spp.* Більшість індолпозитивних штамів *Proteus (Proteus vulgaris)*, також *Enterobacter cloacae*, *Morganella morganii*, *Providencia rettgeri*, *Serratia*, *Pseudomonas spp.*, *Acinetobacter spp.*, а також анаеробні коки *Peptococcus*, *Peptostreptococcus*, у т.ч. *B. fragilis*, резистентні до цефазоліну. Рикетсії, віруси, гриби та найпростіші стійкі до його дії.

Показання для застосування ЛЗ: інфекції, спричинені чутливими до цефазоліну м/о: інфекції дихальних шляхів; сечостатевої системи; шкіри та м'яких тканин; кісток і суглобів; сепсис; ендокардит; інфекції жовчовивідних шляхів; профілактика хірургічних інфекцій^{BOO3}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують в/м та в/в (краплинно та струминно); середня добова доза для дорослих - 1-4 г, МДД - 6 г; разова доза для дорослих при інфекціях, спричинених Гр (+) м/о становить 0,25-0,5 г кожні 8 год.; при інфекціях дихальних шляхів середньої тяжкості, спричинених пневмококами та інфекціях сечостатевої системи - 1 г кожні 12 год.; при пневмококовій пневмонії - 0,5 г кожні 12 год; при захворюваннях, спричинених чутливими Гр (-) м/о - по 0,5-1 г кожні 6-8 год.; при тяжких інфекційних захворюваннях (сепсис, ендокардит, перитоніт, деструктивна пневмонія, г. гематогенний остеомієліт, ускладнені урологічні інфекції) - по 1-1,5 г кожні 6-8 год.; для профілактики післяопераційних інфекційних ускладнень у дорослих: 1 г за 0,5-1 год. до початку хірургічного втручання^{BOO3}; при тривалих операціях (2 год. і більше) – додатково 0,5-1 г у процесі операції; після операції – у дозі 0,5-1 г кожні 6-8 год. протягом перших 24 год.; у деяких випадках (операції на відкритому серці, протезування суглобів) профілактичне застосування цефазоліну може тривати 3-5 днів після операції; дітям від 1 міс.- у дозі 25-50 мг/кг на добу (у тяжких випадках - 90-100 мг/кг на добу) на 3-4 прийомі; середня тривалість лікування - 7-10 діб.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: мікози геніталій, вагініти, мікози порожнини рота, надмірне зростання нечутливих м/о, катар, лейкопенія, гранулоцитопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія, лейкоцитоз, гранулоцитоз, моноцитоз, лімфоцитопенія, базофілія та еозинофілія, порушення коагуляції, кровотечі, лихоманка, анафілактичний шок (набряк гортані зі звуженням дихальних шляхів, швидке серцебиття, задишка, низький кров'яний тиск, набряклий язик, анальний свербіж, генітальний свербіж, набряк обличчя), гіперглікемія, гіпоглікемія, судоми, запаморочення, тромбофлебії, плевральний випіт, задишка або дихальний дистрес, кашель, нудота, блювота, діарея, анорексія, псевдомембранозний коліт, збільшення рівнів аланінамінотрансферази (АЛТ), аспартатамінотрансферази (АСТ), ЛФ, гамма-глутамілтрансферази, білірубину та/або ЛДГ, перехідний гепатит та транзиторна холестатична жовтяниця, висипання, еритема, мультиформна

еритема, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса - Джонсона, нефротоксичність, інтерстиціальний нефрит, нефропатія, протеїнурія, тимчасове підвищення рівня азоту сечовини в крові, свербіж вульви та піхви, біль у місці ін'єкції, іноді з ущільненням, нездужання, втома, біль у грудях, сильна діарея, псевдомембранозний коліт, зниження рівня Hb та/або гематокриту, анемія, агранулоцитоз, апластична анемія, панцитопенія та гемолітична анемія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до а/б цефалоспоринового ряду та інших β-лактамних а/б.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	ЦЕФАЗОЛІН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	0,5г	№10x1	60,00	
	ЦЕФАЗОЛІН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	1г	№10x1	39,54	
	ЦЕФАЗОЛІН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Квілу Фармацевтікал Ко., Лтд., Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач. та у бл. з розч.	1г	№1, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦЕФАЗОЛІН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Квілу Фармацевтікал Ко., Лтд., Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1г	№5	43,68	
	ЦЕФАЗОЛІН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Квілу Фармацевтікал Ко., Лтд., Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1г	№1	50,40	
	ЦЕФАЗОЛІН-БХФЗ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач. та касет. з розч. та без	500мг, 1000мг	№1, №5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦЕФАЗОЛІН-БХФЗ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в касеті в панелі	1000мг	№5	35,94	
	ЦЕФАЗОЛІН-БХФЗ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1000мг	№1	45,90	
	ЦЕФАЗОЛІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач., кор. та конт. чар/уп. з розч. та без	0,5г	№1, №40	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦЕФАЗОЛІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	0,5г	№5	57,47	
	ЦЕФАЗОЛІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	1г	№5	44,50	

● **Цефалексин (Cefalexin)**

Фармакотерапевтична група: J01DB01 - АБЗ для системного застосування; β-лактамі а/б; цефалоспорино І покоління.

Основна фармакотерапевтична дія: напівсинтетичний цефалоспориновий а/б широкого спектра дії, до нього чутливі Gr (+) м/о: стафілококи (коагулазопозитивні та пеніциліназопродукуючі штами), стрептококи (за винятком ентерококів), пневмококи, діє також на *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*, *Proteus mirabilis*, *Haemophilus influenza* та *Moraxella catarrhalis*.

Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій, спричинених чутливими до цефалексину м/о ^{БНФ}: ЛОР-органів і дихальних шляхів (фарингіт, середній отит, синусит, ангіна, бронхіт, пневмонія); сечостатевої системи ^{БНФ} (пієлонефрит, цистит, уретрит, простатит, епідидиміт, ендометрит, вульвовагініт); шкіри та м'яких тканин (фурункульоз, абсцес, флегмона, піодермія, лімфаденіт); кісткової тканини і суглобів (остеомиєліт).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос за 30-60 хвилин до їди, дорослі: звичайна добова доза - 1-4 г, розподілена на 2-4 прийоми, зазвичай застосовують 500 мг кожні 8 годин; при інфекціях шкіри та м'яких тканин, стрептококовому фарингіті та неускладнених інфекціях сечовивідних шляхів ^{БНФ} - 250 мг кожні 6 год або 500 мг кожні 12 год ^{БНФ}; при тяжкому перебігу захворювання або у разі інфекцій, викликаних менш чутливими м/о, можуть бути потрібні більші дози, якщо необхідна добова доза перевищує 4-6 г, застосовувати парентеральні цефалоспорины у відповідному дозуванні; діти: звичайна добова доза ^{БНФ} - (з масою тіла < 40 кг) - 25 ^{БНФ} - 50 мг/кг маси тіла (залежно від тяжкості перебігу і локалізації інфекції), на 2-4 прийоми ^{БНФ}; при тяжкому перебігу захворювання дозу можна подвоїти, при лікуванні г. середнього отиту рекомендована доза - 75-100 мг/кг маси тіла, розподілена на 2-4 прийоми, у більшості випадків курс лікування 7-10 днів, для попередження ускладнень стрептококових інфекцій приймати 10 днів, звичайна добова доза для дітей від 14 років та дорослих 1-4 г, розподілена на 2-4 прийоми, при інфекціях шкіри та м'яких тканин, стрептококових фарингітах та неускладнених інфекціях сечовивідних шляхів звичайна доза - 250 мг кожні 6 год або 500 мг кожні 12 год, при тяжкому перебігу захворювання дозу можна подвоїти.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР, у тому числі з боку шкіри - висипання, включаючи еритематозні, поліморфна еритема, свербіж, гіперемія, кропив'янка; гіпертермія, медикаментозна лихоманка, анафілаксія, с-м Стівенса-Джонсона, с-м Лайелла, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок; нудота, блювання, діарея; втрата апетиту, стоматит, диспепсія (розлади травлення), біль у животі, гастрит, коліт, надмірний ріст нечутливої до препарату мікрофлори, псевдомембранозний коліт; транзиторне підвищення печінкових трансаміназ, холестатична жовтяниця, токсичний гепатит; нейтропенія, тромбоцитопенія, лейкопенія, еозинофілія, гемолітична анемія, агранулоцитоз, панцитопенія, апластична анемія, геморагії; запаморочення, головний біль, збудження, галюцинації, сплутаність свідомості, судоми, слабкість; вагініт, виділення з піхви, свербіж у ділянці заднього проходу та геніталій, інтерстиціальний нефрит, кандидамікоз статевих органів, вагінальний кандидоз, оборотні порушення ф-ції нирок, токсична нефропатія, розвиток г. тубулярного некрозу, артралгія, артрит, ураження суглобів, г. генералізований екзантематозний пустульоз (ГТЕП), підвищення рівня креатиніну, лужної фосфатази, білірубину, лактатдегідрогенази, збільшення протромбінового часу, позитивна р-ція Кумбса, отримання хибнопозитивного результату при дослідженні сечі на цукор.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до цефалоспоринов, пеніцилінів або до інших β-лактамних а/б, а також до допоміжних речовин ЛЗ; порфірія; інфекції головного або спинного мозку; початкова терапія тяжких генералізованих інфекцій, лікування яких потребує застосування парентеральних форм цефалоспоринов.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЦЕФАЛЕКСИН	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	капс. у бл.	250мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	ЛЕКСИН® 125	Джазіра Фармасьютикал Індастріз (виробництво лікарського засобу та первинне пакування)/Хікма Фармасьютикалз Ко. Лтд. (вторинне пакування; випуск серії), Саудівська Аравія/Йорданія	пор. для 60мл орал. сусп. у фл.	125мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛЕКСИН® 250	Джазіра Фармасьютикал Індастріз (виробництво лікарського засобу та первинне пакування)/Хікма Фармасьютикалз Ко. Лтд. (вторинне пакування; випуск серії), Саудівська Аравія/Йорданія	пор. для 60мл орал. сусп. у фл.	250мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛЕКСИН® 500	Хікма Фармасьютикалз Ко. Лтд. (вторинне пакування, випуск серії)/Джазіра Фармасьютикал Індастріз (виробництво нерозфасованого продукту та первинне пакування), Йорданія/Саудівська Аравія	капс. у бл.	500мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОСПЕКСИН®	Сандоз ГмБХ – ТехОпс, Австрія	гран. для 60мл орал. сусп. у фл.	125мг/5мл, 250мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

ЦЕФАЛЕКСИН	"Хемофарм" АД (виробник контроль та випуск серії)/Хемомонт д.о.о. (виробник готового лікарського засобу, первинне та вторинне пакування, контроль серії), Сербія/Чорногорія	гран. для 100мл орал. сусп. у фл.	250мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ
ЦЕФАЛЕКСИН АЛКАЛОЇД®	Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія	пор. для 100мл орал. сусп. у фл.	250мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ

• **Цефуросим (Cefuroxime)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: J01DC02 - АБЗ для системного застосування; β-лактами а/б; цефалоспорины II генерації.

Основна фармакотерапевтична дія: є стійким до дії більшості β-лактамаз та проявляє активність проти широкого спектра Гр (+) та Гр (-) м/о; пригнічує синтез клітинної оболонки м/о шляхом прикріплення до пеніцилінзв'язуючих білків (ПЗБ), це зупиняє біосинтез клітинної стінки (пептидоглікану), що призводить до лізису та загибелі бактеріальних клітин; має активність щодо таких м/о: Гр (+) м/о - *Staphylococcus aureus* (метицилінчутливі), коагулазонегативний стафілокок (метицилінчутливий), *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus agalactiae*, Гр (-) м/о - *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus parainfluenzae*, *Moraxella catarrhalis*; спірохети: *Borrelia burgdorferi*; м/о, набула резистентності яких може становити проблему: Гр (+) аероби - *Streptococcus pneumoniae*, Гр (-) аероби - *Citrobacter freundii*, *Enterobacter aerogenes*, *Enterobacter cloacae*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*, штами *Proteus* (інші ніж *P. vulgaris*), штами *Providencia*, Гр (+) анаероби - штами *Neomicrobium*, штами *Propionibacterium*, Гр (-) анаероби - штами *Fusobacterium*, штами *Bacteroides*.

Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій ^{БНФ} у дорослих та дітей: г. стрептококовий тонзиліт і фарингіт, г. бактеріальний синусит, г. середній отит, загострення хр. бронхіту, спричинене збудниками, чутливими до цефуросиму ацетилу ^{БНФ}, негоспітальна пневмонія ^{БНФ}, цистит ^{БНФ}, ускладнені інфекції сечовивідних шляхів ^{БНФ}, у т.ч. пієлонефрит ^{БНФ}, неускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин, ранні прояви хв. Лайма ^{БНФ}, інфекції черевної порожнини, профілактика виникнення інфекційних ускладнень після операцій на ШКТ включаючи стравохід, після ортопедичних, гінекологічних операцій (у т.ч. кесарів розтин) та операцій на ССС.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі та діти з масою тіла >40 кг в/м, в/в ^{БНФ}: негоспітальна пневмонія, загострення хр. бронхіту, інфекції м'яких тканин: целюліт, еризиполоїд, раневі інфекції, інфекції черевної порожнини - 750 мг кожні 8 год ^{БНФ}, ускладнені інфекції сечовивідних шляхів, у т.ч. пієлонефрит - 1,5 г кожні 8 год ^{БНФ}, тяжкі інфекції - в/в 750 мг кожні 6 год ^{БНФ}, в/в 1,5 г кожні 8 год, профілактика виникнення інфекцій після операцій на ШКТ, після ортопедичних, гінекологічних операцій (у т.ч. кесарів розтин) - 1,5 г під час введення анестезії, доповнити двома дозами по 750 мг (в/м) ч/з 8 год і 16 год. ^{БНФ} профілактика виникнення інфекцій після СС операцій та операцій на стравоході - 1,5 г під час введення анестезії, а потім 750 мг (в/м) кожні 8 год протягом ще 24 год; р/ос дорослі та діти (> 40 кг): г. тонзиліт і фарингіт, г. бактеріальний синусит - 250 мг 2 р/добу ^{БНФ}, г. середній отит, загострення хр. бронхіту - 500 мг 2 р/добу ^{БНФ}, цистит, пієлонефрит, неускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин - 250 мг 2 р/добу ^{БНФ}, хвороба Лайма - 500 мг 2 р/добу 14 днів (терапія може тривати від 10 до 21 дня). ^{БНФ}

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: надмірний ріст *Candida* або *Clostridium difficile*, нейтропенія, еозинофілія, зниження рівня Нb, лейкопенія, позитивний тест Кумбса, тромбоцитопенія, гемолітична анемія, медикаментозна лихоманка, інтерстиціальний нефрит, анафілаксія, шкірний васкуліт, дискомфорт у травному тракті, псевдомембранозний коліт, гастроентерологічні розлади, включаючи діарею, нудоту, біль у животі, транзиторне підвищення рівня печінкових ферментів, транзиторне підвищення рівня білірубину, жовтяниця (головним чином холестатична), гепатит, блювання, інтерстиціальний нефрит, анафілаксія, шкірний васкуліт, шкірний висип, кропив'янка й свербіж, мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона, ангіоневротичний набряк, збільшення рівня креатиніну сироватки крові, азоту сечовини крові та зменшення рівня КлКр, р-ції в місці введення, що можуть включати біль і тромбофлебіт, головний біль, запаморочення, р-ція Яриша - Герксгеймера

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до цефуросиму або до інших компонентів препарату, підвищена чутливість до цефалоспоринових а/б, наявність в анамнезі тяжкої гіперчутливості (анафілактичні р-ції) до інших β-лактамних а/б (пеніциліни, монобактами та карбапенеми).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,5 г., парентерально - 3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КИМАЦЕФ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1,5г	№1	95,62	
	КИМАЦЕФ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	0,75г	№1	120,00	
	ЦЕФУРОКСИМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Квілу Фармацевтікал Ко., Лтд., Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач. та бл.	0,75г; 1,5г	№1, №5, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ	

ЦЕФУРОКСИМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Квілу Фармацевтікал Ко., Лтд., Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. в пач.	0,75г	№1	145,60	
ЦЕФУРОКСИМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Квілу Фармацевтікал Ко., Лтд., Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. в пач.	1,5г	№1	112,00	
ЦЕФУРОКСИМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім – Харків" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника Реюнг Фармасьютикал Ко., Лтд., Китайська Народна Республіка), Україна	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	0,75г; 1,5г	№5, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФУРОКСИМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім – Харків" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника Реюнг Фармасьютикал Ко., Лтд., Китайська Народна Республіка), Україна	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	0,75г	№1	145,60	
ЦЕФУРОКСИМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім – Харків" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника Реюнг Фармасьютикал Ко., Лтд., Китайська Народна Республіка), Україна	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	1,5г	№1	112,00	
ЦЕФУРОКСИМ-БХФЗ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. в пач. та касет.	250мг	№1, №5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФУРОКСИМ-БХФЗ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. в пач. з розч.	750мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФУРОКСИМ-БХФЗ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. в касеті	750мг	№5	100,84	
ЦЕФУРОКСИМ-БХФЗ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. в пач.	750мг	№1	115,88	
ЦЕФУРОКСИМ-БХФЗ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод",	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. в касеті	1,5г	№5	64,42	

	Україна						
ЦЕФУРОКСИМ-БХФЗ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1,5г	№1	96,08		
ЦЕФУРОКСИМ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	0,75г; 1,5г	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЦЕФУРОКСИМ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	0,75г	№1	146,16		
ЦЕФУРОКСИМ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1,5г	№1	108,10		
II. АКСЕТИН	Медокемі ЛТД (Завод С) (виробництво за повним циклом)/Медокемі (Фа Іст) ЛТД., (Асептік Цефалоспорин Фасіліті) (виробництво готового лікарського засобу, первинне та вторинне пакування), Кіпр/В'єтнам	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	0,75г; 1.5г	№100	відсутня у реєстрі ОБЦ		
АКСЕТИН	Медокемі ЛТД (Завод С) (виробництво за повним циклом)/Медокемі (Фа Іст) ЛТД., (Асептік Цефалоспорин Фасіліті) (виробництво готового лікарського засобу, первинне та вторинне пакування), Кіпр/В'єтнам	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	0,75г	№10	163,38	30,26/€	
АКСЕТИН	Медокемі ЛТД (Завод С) (виробництво за повним циклом)/Медокемі (Фа Іст) ЛТД., (Асептік Цефалоспорин Фасіліті) (виробництво готового лікарського засобу, первинне та вторинне пакування), Кіпр/В'єтнам	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1,5г	№10	127,08	30,26/€	
АКСЕТИН	Медокемі ЛТД (Завод С), Кіпр	табл., вкриті п/о у стрип.	250мг	№10x1	18,15	30,26/€	
АКСЕТИН	Медокемі ЛТД (Завод С), Кіпр	табл., вкриті п/о у стрип.	500мг	№10x1	14,83	30,26/€	
АКСЕФ®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл., в/о у бл.	250мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ		
АКСЕФ®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл., в/о у бл.	250мг	№10x1	17,00	24,46/\$	
АКСЕФ®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл., в/о у бл.	500мг	№10x2	22,07	21,80/\$	
АКСЕФ®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл., в/о у бл.	500мг	№10x1	23,54	21,80/\$	
АКСЕФ®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	750мг	№1	183,68	28,20/\$	
АУРОКСЕТИЛ	Ауробіндо Фарма Лтд. Юніт VI, Блок D, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг, 500мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЄВРОКСИМ	ЕйСіЕс Добфар С.П.А., Італія	пор. д/ін'єк. у фл.	750мг, 1,5г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЄВРОКСИМ	ЕйСіЕс Добфар С.П.А., Італія	пор. д/ін'єк. у фл.	750мг	№10	279,15	27,69/\$	

ЄВРОКСИМ	ЕйСіЕс Добфар С.П.А., Італія	пор. д/ін'ек. у фл.	1,5г	№10	203,02	27,69/\$
ЗИНАЦЕФ™	ГлаксоСмітКляйн Мануфактуринг С.п.А., Італія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	750мг; 1,5г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЗІННАТ™	Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Велика Британія	гран. д/приг. 100мл сусп. у фл.	125мг/5мл, 250мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЗІННАТ™	Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Велика Британія	табл., в/о у бл.	125мг, 250мг, 500мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЗОЦЕФ	Алкем Лабораторіз Лтд, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№6x1, №10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЙОКЕЛЬ	БРОС ЛТД, Греція	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	750мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
САНФУР - 1500	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	1500мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
САНФУР - 750	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	750мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ФУРОЦЕФ	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за вторинну упаковку, контроль та випуск серії, відповідальний за вторинну упаковку, відповідальний за контроль серії)/Алкем Лабораторіз Лімітед (відповідальний за виробництво "in bulk", первинну упаковку, вторинну у, Словенія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг, 500мг	№10x1, №7x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦЕТИЛ	Люпін Лімітед, Індія	табл., в/о у бл.	250мг, 500мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦЕФУААР 0.750 Г	Зейсс Фармас'ютікелс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	750мг	№1, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦЕФУААР 1.5 Г	Зейсс Фармас'ютікелс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	1500мг	№1, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦЕФУРОКСИМ 1.5 Г	Зейсс Фармас'ютікелс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	1500мг	№1, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦЕФУРОКСИМ 750 МГ	Зейсс Фармас'ютікелс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	750мг	№1, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦЕФУРОКСИМ САНДОЗ®	Сандоз ГмбХ – ТехОпс/ПенЦеф Фарма ГмбХ (виробник ін балк, контроль серії, пакування), Австрія/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	250мг. 500мг	№7x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦЕФУТИЛ®	Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг, 500мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Цефотаксим (Cefotaxime)**

Фармакотерапевтична група: J01DD01 - протимікробні ЛЗ для системного застосування; β-лактамі а/б; цефалоспорины III покоління.

Основна фармакотерапевтична дія: бактерицидна дія; має широкий спектр дії; до нього чутливі: Streptococci (за виключенням групи D), включаючи Streptococcus pneumoniae; Staphylococcus aureus, у т. ч. пеніциліназоутворюючі та пеніцилінаzoneутворюючі штами; Bacillus subtilis і Mycoides; Neisseria gonorrhoeae (пеніциліназоутворюючі та пеніцилінаzoneутворюючі штами), Neisseria meningitidis, інші види Neisseria, Escherichia coli, Klebsiella sp., включаючи Klebsiella pneumonia, Enterobacter spp. (деякі штами резистентні), Serratia spp., Proteus (індолпозитивні та індолнегативні види), Salmonella, Citrobacter spp., Providencia, Shigella, Yersinia, Haemophilus influenzae і Parainfluenzae (пеніциліназоутворюючі та пеніцилінаzoneутворюючі штами, у т. ч. стійкі до ампіциліну), Bordetella pertussis, Moraxella, Aeromonas hydrophilia, Veillonella, Clostridium perfringens, Eubacterium, Propionibacterium, Fusobacterium, Bacteroides spp. і Morganella; непостійно чутливі: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Helicobacter pylori, Bacteroides fragilis і Clostridium difficile; стійкі: Streptococcus групи D, Listeria і метициліностійкі стафілококи.

Показання для застосування ЛЗ: інфекції, спричинені чутливими до дії ЛЗ м/о ^{БНФ}: бактеріальна пневмонія (не діє проти бактерій, що викликають атипову пневмонію, або проти різних інших бактеріальних штамів, які можуть

викликати атипичну пневмонію, включаючи *P. aeruginosa*), ускладнені інфекції нирок та верхніх сечовивідних шляхів, серйозні інфекції шкіри та м'яких тканин, інфекції статевих органів, спричинені гонококами ^{БНФ}, особливо коли застосування пеніциліну виявилось неефективним або не підходить, внутрішньочеревні інфекції (включаючи перитоніт), г. бактеріальний менінгіт ^{БНФ} (особливо викликаний *H. Influenzae*, *N. Meningitis*, *S. pneumoniae*, *E. coli*, *Klebsiella spp.*), хв. Лайма, або кліщовий бореліоз ^{БНФ} (зокрема II та III стадії), бактеріємії, пов'язані або імовірно пов'язані з однією з перерахованих інфекцій, ендокардит (якщо інфекція спричинена Гр (-) бактеріями, потрібно поєднувати з іншим відповідним а/б). Для періопераційної профілактики інфекційних ускладнень ^{БНФ} (до/після хірургічних операцій, зокрема на товстій і прямій кишках (колоректальна хірургія), на ШКТ, передміхуровій залозі, у сечостатевої системі, акушерсько-гінекологічних операцій у пацієнтів із вираженим ризиком післяопераційних інфекцій).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/м та в/в; тривалість курсу лікування встановлюють індивідуально ^{БНФ}, дорослим і дітям від 12 до 16-18 років - 1 г кожні 12 год.; МДД - 12 г ^{БНФ}; типові інфекції, де була продемонстрована або очікується чутливість м/о - 1г 2р/д, ^{БНФ} інфекції, де була продемонстрована або очікується висока або помірна чутливість різних м/о - 2г 2р/д, бактеріальні захворювання неясної етіології, які неможливо локалізувати і стан хворого є критичним - 2-3 г 3-4 р/добу ^{БНФ}; немовлята та діти (від 28 днів до 11 років) - 50-100 мг/кг маси тіла/добу, залежно від тяжкості інфекції (до 150 мг), розділені на 2-4 рівні дози (кожні 12-6 год); недоношені та доношені новонароджені (0-27 днів) - 50 мг/кг маси тіла/добу, розділені на 2-4 рівні дози (кожні 12-6 год), при серйозних інфекціях - 150 мг/кг маси тіла/добу; гонорея - одноразове введення (в/м або в/в) у дозі від 0,5 г ^{БНФ} до 1 г цефотаксиму, неускладнені інфекції сечовивідних шляхів: у дозі 1 г кожні 12 год; бактеріальний менінгіт ^{БНФ} - дорослим: добові дози 6-12 г/добу, розділені на рівні дози, кожні 6-8 год, дітям: добові дози 150-200 мг/кг маси тіла на добу, розділені на рівні дози, кожні 6-8 год.; новонародженим від 1-го до 7-го днів життя: 50 мг/кг маси тіла цефотаксиму кожні 12 год, новонародженим від 7-го до 28-го днів життя - 50 мг/кг маси тіла кожні 8 год; періопераційна профілактика: разова доза -1-2 г за 30-60 хв до початку операції, якщо операція триває довше 90 хв потрібна додаткова доза; хвороба Лайма (кліщовий бореліоз) - 6 г (14-21 дня).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: суперінфекція, лейкопенія, еозинофілія, тромбоцитопенія, пригнічення діяльності кісткового мозку, панцитопенія, нейтропенія, агранулоцитоз, гемолітична анемія, анафілактичні р-ції, ангіоневротичний набряк, бронхоспазм, загальне нездужання, анафілактичний шок, судоми, головний біль, запаморочення, енцефалопатія, аритмія після швидкої болюсної інфузії через центральний венозний катетер, діарея, нудота блювання, біль у животі, псевдомембранозний коліт, підвищення рівня печінкових ферментів АЛТ, АСТ, ЛДГ, γ-ГТ та/або ЛФ та/або білірубину, висипання, свербіж, кропив'янка, мультиформна еритема, с-м Стивенса -Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, г. генералізований екзантематозний пустульоз, зниження функції нирок/збільшення концентрації креатиніну (особливо при одночасному застосуванні аміноглікозидів), лихоманка, запальні р-ції у місці введення, такі як флебіт/тромбофлебіт, біль у місці введення (при в/м введенні)

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до цефалоспоринових а/б та інших β-лактамних а/б, підвищена чутливість до лідокаїну або іншого місцевого анестетика амідного типу; кровотеча, АВ-блокада без встановленого водія серцевого ритму, тяжка СН, в/в введення;

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 4 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЦЕФОТАКСИМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Qilu Pharmaceutical Co., Ltd., Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач. та бл. з розч. та без	1г	№1, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦЕФОТАКСИМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Qilu Pharmaceutical Co., Ltd., Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1г	№5	66,00	
	ЦЕФОТАКСИМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Qilu Pharmaceutical Co., Ltd., Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1г	№1	67,20	
	ЦЕФОТАКСИМ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. у конт. чар/уп.	1г	№10x1	62,40	
	ЦЕФОТАКСИМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника Реюнг Фармасьютикал Ко., Лтд., Китайська Народна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. у пач.	1г	№50	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	Республіка), Україна					
ЦЕФОТАКСИМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім – Харків" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника Реюнг Фармасьютикал Ко., Лтд., Китайська Народна Республіка), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. у пач.	1г	№5	66,00	
ЦЕФОТАКСИМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім – Харків" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника Реюнг Фармасьютикал Ко., Лтд., Китайська Народна Республіка), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. у пач.	1г	№1	67,20	
ЦЕФОТАКСИМ КОМБІ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (виробництво та первинне пакування розчинників; вторинне пакування, контроль та випуск серії готового лікарського засобу)/Реюнг Фармасьютикал Ко., Лтд. (виробництво та первинне пакування порошку), Україна/Китайська Народна Республіка	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. у пач. та бл. з розч. та без	0,5г; 1г	№1, №10, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФОТАКСИМ-БХФЗ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. у кор. та пач. з розч.	500мг, 1000мг	№1, №55	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФОТАКСИМ-БХФЗ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. у пач.	1000мг	№1	62,40	
ЦЕФОТАКСИМ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач., кор. та конт. чар/уп. з розч. та без	0,5г; 1г	№1, №5, №40	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФОТАКСИМ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1г	№1	57,60	
ЦЕФОТАКСИМ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	1г	№5x1	59,39	
II. ЛОРАКСИМ	Ексір Фармасьютикал Компані, Іран	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	500мг, 1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ФАГОЦЕФ	БРОС ЛТД, Греція	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФОКСИМ-О	Нітін Лайфсаєнсез Лтд., Індія	пор. д/приг. р-ну д/ін'єк. у скл. фл.	1г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Цефтазидим (Ceftazidime) *** [ПМД]

Фармакотерапевтична група: J01DD02 - АБЗ для системного застосування; цефалоспорины III покоління.

Основна фармакотерапевтична дія: бактерицидна дія; механізм дії пов'язаний з порушенням синтезу стінок бактеріальної клітини; чутливі м/о Гр (+) аероби: Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae; Гр (-) аероби: Citrobacter koseri, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitides, Proteus mirabilis, Proteus spp., Providencia spp.; штами з можливою набутою резистентністю: Гр (-) аероби: Acinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Morganella morgani; Гр (+) аероби: Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae; Гр (+) анаероби: Clostridium perfringens, Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.; Гр (-) анаероби: Fusobacterium spp.; нечутливі м/о; Гр (+) аероби: Enterococcus spp., включаючи E. faecalis та E. faecium, Listeria spp.; Гр (+) анаероби: Clostridium difficile; Гр (-) анаероби: Bacteroides spp., включаючи B. fragilis; інші: Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Legionella spp.

Показання для застосування ЛЗ: інфекції у дорослих та дітей, включаючи новонароджених: внутрішньолікарняна пневмонія^{БНФ}; інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз^{ВООЗ, БНФ, ПМБ}; бактеріальний менінгіт^{ВООЗ, БНФ}; хр. середній отит; злосликий зовнішній отит; ускладнені інфекції сечовивідних шляхів^{БНФ}; ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин; ускладнені інфекції черевної порожнини; інфекції кісток і суглобів; перитоніт, пов'язаний з проведенням ГД у хворих, які знаходяться на безперервному амбулаторному перитонеальному діалізі; лікування бактеріємії^{БНФ}, що виникає у пацієнтів у результаті будь-якої з наведених вище інфекцій; лікування хворих із нейтропенією та гарячкою, що виникає у результаті бактеріальної інфекції; для профілактики інфекційних ускладнень при операціях на передміхуровій залозі (трансуретральна резекція)^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять в/м, в/в ін'єкційно або інфузійно^{БНФ}; дорослі та діти ≥ 40 кг - інтермітуюче введення: інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз: 100-150 мг/кг/добу^{ВООЗ, БНФ} кожні 8 год., МДД - 9 г^{БНФ}; фебрильна нейтропенія^{ВООЗ, БНФ}, внутрішньолікарняна пневмонія, бактеріальний менінгіт, бактеріємія^{БНФ}: 2 г кожні 8 год.^{ВООЗ, БНФ}; інфекції кісток і суглобів, ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин, ускладнені інтраабдомінальні інфекції, перитоніт, пов'язаний з безперервним амбулаторним ПД: 1-2 г кожні 8 год.; ускладнені інфекції сечовивідних шляхів: 1-2 г кожні 8-12 год.^{БНФ}; профілактика інфекційних ускладнень при операціях на передміхуровій залозі (трансуретральна резекція): 1 г під час індукції в анестезію, 1 г у момент видалення катетера^{БНФ}; хр. середній або злосликий зовнішній отит: 1-2 г кожні 8 год.; як постійна інфузія: фебрильна нейтропенія, внутрішньолікарняна пневмонія, інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз, бактеріальний менінгіт, бактеріємія, інфекції кісток і суглобів, ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин, ускладнені інтраабдомінальні інфекції, перитоніт, пов'язаний з безперервним амбулаторним ПД: навантажувальна доза 2 г з наступним постійним інфузійним введенням 4-6 г кожні 24 год.; діти < 40 кг: немовлята та діти віком > 2 міс.^{ВООЗ} та масою тіла < 40 кг - інтермітуюче введення: ускладнені інфекції сечовивідних шляхів, хр. середній або злосликий зовнішній отит: 100-150 мг/кг/добу у 3 прийоми, МДД- 6 г; нейтропенія у дітей, інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз, бактеріальний менінгіт^{ВООЗ}, бактеріємія: 150 мг/кг/добу у 3 прийоми, МДД - 6 г^{ВООЗ}; інфекції кісток і суглобів, ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин, ускладнені інтраабдомінальні інфекції, перитоніт, пов'язаний з безперервним амбулаторним ПД: 100-150 мг/кг/добу у 3 прийоми, МДД- 6 г; як постійна інфузія: фебрильна нейтропенія, внутрішньолікарняна пневмонія, інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз, бактеріальний менінгіт, бактеріємія, інфекції кісток і суглобів, ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин, ускладнені інтраабдомінальні інфекції, перитоніт, пов'язаний з безперервним амбулаторним ПД: навантажувальна доза 60-100 мг/кг з наступним постійним інфузійним введенням 100-200 мг/кг/добу, МДД - 6 г.; інтермітуюче введення для лікування більшості інфекцій немовлятам та дітям віком ≤ 2 міс.: 25-60 мг/кг/добу у 2 прийоми^{ВООЗ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кандидоз (включаючи вагініт і афтозний стоматит), еозинофілія, тромбоцитоз, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія, лімфоцитоз, гемолітична анемія, агранулоцитоз, анафілаксія (включаючи бронхоспазм та/або артеріальну гіпотензію), запаморочення, головний біль, парестезії; тремор, міоклонія, судоми, енцефалопатія та кома у хворих із НН, для яких доза ЛЗ не була зменшена; флебіт або тромбоз флебіт у місці введення препарату; діарея; нудота, блювання, біль у животі, коліт, псевдомембранозний коліт, порушення смаку, інтерстиціальний нефрит, ГНН, транзиторне підвищення рівня одного або кількох печінкових ферментів (АЛТ, АСТ, ЛДГ, ГГТ, лужна фосфатаза), жовтяниця, макулопапульозний висип, кропив'янка, свербіж, ангіоневротичний набряк, поліморфна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, біль та/або запалення у місці в/м ін'єкції, гарячка, позитивний тест Кумбса, інколи спостерігалось транзиторне підвищення рівня сечовини крові, азоту сечовини крові та/або креатиніну у сироватці крові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до цефтазидиму або до інших компонентів ЛЗ, до цефалоспоринових а/б; наявність в анамнезі тяжкої гіперчутливості (анафілактичні р-ції) до інших β -лактамних а/б (пеніциліни, монобактами та карбапенеми).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 4 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЗАЦЕФ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЗАЦЕФ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в касеті	1г	№5	228,00	
	ЗАЦЕФ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1г	№1	288,40	
	ЗЕДАН	ТОВ "Авант" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Зейсс Фармас'ютікелс Пвт. Лтд., Індія), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	355,60	
	ЗЕДАН	ТОВ "Авант" (пакування із форми in bulk фірми виробника	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№25	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані Лімітед, Китай), Україна					
ЗЕДАН	ТОВ "Авант" (пакування із форми in bulk фірми виробника НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані Лімітед, Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	448,00	
ЦЕФТАЗИДИМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Квілу Фармацеутікал Ко., Лтд., Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач. та бл. з розч. та без	1г	№1, №5, №50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦЕФТАЗИДИМ	ТОВ "Авант" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Зейсс Фармас'ютікалс Пвт. Лтд., Індія), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№25, №50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦЕФТАЗИДИМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (виробництво з продукції in bulk фірми-виробника Реюнг Фармасьютікал Ко., Лтд., Китайська Народна Республіка), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1г	№1	319,20	
ЦЕФТАЗИДИМ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦЕФТАЗИДИМ ЮРІЯ-ФАРМ	ТОВ "Юрія-Фарм" (пакування із форми in bulk НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані Лімітед, Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	320,00	
ЦЕФТАЗИДИМ ЮРІЯ-ФАРМ	ТОВ "Юрія-Фарм" (пакування із форми in bulk НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані Лімітед, Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№10	320,00	
ЦЕФТУМ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	1г	№10x1	294,16	
II.						
АУРОМІТАЗ	Ауробіндо Фарма Лімітед, Юніт-VI, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
БАКТОЛОКС	Астрал СтеріТек Прайвіт Лімітед, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	0,5г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
БАКТОЛОКС	Астрал СтеріТек Прайвіт Лімітед, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	757,48	27,05/\$
ДЕНІЗИД	Свісс Перентералс Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	428,20	26,76/\$
ЕМЗИД®	Нектар Лайфсайнсіз Лімітед, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	500мг, 1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЄВРОЗИДИМ	ЕйСіЕс Добфар С.П.А., Італія	пор. д/ін'єк. у фл.	1г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЄВРОЗИДИМ	ЕйСіЕс Добфар С.П.А., Італія	пор. д/ін'єк. у фл.	1г	№10	520,24	27,12/€
ЗІДААР	Зейсс Фармас'ютікелс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛОРАЗИДИМ	Ексір Фармасьютікал Компані, Іран	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	500мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛОРАЗИДИМ	Ексір Фармасьютікал Компані, Іран	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	446,36	27,90/\$
МЕДАЦЕТ - 1000	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РУМІД ФАРМЮНІОН	Антибіотіке С.А.(Виробник, відповідальний за вторинне пакування, тестування та випуск	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	523,36	25,10/\$

	серій кінцевого продукту)/Сінофарм Жиюн (Шеньчжен) Фармасьютикал Ко., Лтд. (виробник, відповідальний за виробництво та первинне пакування), Румунія/Китай					
РУМІД ФАРМЮНІОН	Антибіотіке С.А. (виробник, відповідальний за вторинне пакування, тестування та випуск серій кінцевого продукту)/Сінофарм Жиюн (Шеньчжен) Фармасьютикал Ко., Лтд. (виробник, відповідальний за виробництво та первинне пакування), Румунія/Китай	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	2г	№1	282,00	25,10/\$
САНЗИДИМ 1000	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	459,80	
ТУЛІЗИД	Зейсс Фармас'ютікелс Пвт. Лтд./Свісс Парентералз Лтд., Індія/Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	463,76	24,79/\$
ФЛОРАЗІД	Свісс Перентералс Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	556,00	28,14/\$
ФЛОРАЗІД	Свісс Перентералс Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	2г	№1	408,00	28,14/\$
ФОРТУМ™	ГлаксоСмітКляйн Мануфактуринг С.п.А., Італія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	500мг, 1г, 2г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ФТАЗИД 1000 МГ	Нітін Лайфсаєнсез Лтд., Індія	пор. д/приг. р-ну д/ін'єк. у скл. фл.	1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФТАЗИДИМ	Свісс Перентералс Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	321,16	26,76/\$
ЦЕФТАЗИДИМ	НСПС Хебей Хуамін Фармасьютикал Компані Лімітед, Китай	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№10	243,20	28,14/\$
ЦЕФТАЗИДИМ	НСПС Хебей Хуамін Фармасьютикал Компані Лімітед, Китай	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг, 2000мг	№1, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФТАЗИДИМ	Зейсс Фармас'ютікелс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФТАЗИДИМ	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФТАЗИДИМ МДЖ	ЛАБОРАТОРІО ФАРМАСЬЮТІКО Сі.Т. С.Р.Л., Італія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФТАЗИДИМ-ВІСТА	АЦС ДОБФАР С.П.А. (виробництво готового лікарського засобу та випуск серії)/ХАНМІ ФАЙН КЕМІКАЛ КО., ЛТД. (виробництво та контроль якості стерильної суміші), Італія/Корея	пор. д/р-ну д/ін'єк. у скл. фл.	1г	№1	380,00	32,78/€

• **Цефтриаксон (Ceftriaxone)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: J01DD04 - АБЗ для системного застосування; інші β-лактамі а/б; цефалоспорини III покоління.

Основна фармакотерапевтична дія: пригнічує синтез клітинної стінки бактерій після приєднання до пеніцилінозв'язуючих білків, у результаті припиняється біосинтез клітинної стінки (пептидоглікану), що, у свою чергу, призводить до лізису бактеріальної клітини та її загибелічутливі; **чутливі види:** Гр (+) аероби: Staphylococcus aureus (метициліночутливий), коагулазонегативні стафілококи (метициліночутливі), Streptococcus pyogenes (β-гемолітичний, групи А), Streptococcus agalactiae (β-гемолітичний, групи В), β-гемолітичні стрептококи (групи ні А, ні В), Streptococcus pneumoniae, Streptococci групи Viridans; Гр (-) аероби: Borrelia burgdorferi, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Proteus mirabilis, Providencia spp., Treponema pallidum; які можуть набувати резистентності: Гр (+) аероби: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis; Гр (-) аероби: Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Serratia marcescens; анаероби: Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp., Clostridium perfringens; резистентні м/о: Гр (+) аероби: Enterococcus spp., Listeria monocytogenes; Гр (-) аероби: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia;

анаероби: Clostridium difficile; інші: Chlamydia spp., Chlamydomydia spp., Mycoplasma spp., Legionella spp., Ureaplasma urealyticum.

Показання для застосування ЛЗ: наступні інфекції у дорослих і дітей, у т.ч. доношених новонароджених (від народження): бактеріальний менінгіт^{БНФ, ВООЗ}; позалікарняна, госпітальна пневмонія^{ВООЗ, БНФ}; г. середній отит^{ПМД}; внутрішньочеревні інфекції^{БНФ, ВООЗ}; ускладнені інфекції сечовивідних шляхів^{ВООЗ, БНФ} (включаючи пієлонефрит); інфекції кісток і суглобів^{БНФ, ВООЗ}; ускладнені інфекції шкіри і м'яких тканин^{БНФ}; гонорея; сифіліс; бактеріальний ендокардит^{БНФ}; г. ускладнення ХОЗЛ^{БНФ} у дорослих; дисемінований бореліоз Лайма (II та III стадія)^{ВООЗ} у дорослих і дітей, включаючи новонароджених віком від 15 днів; передопераційна профілактика інфекцій при хірургічних втручаннях^{БНФ}; пацієнтам з нейтропенією, у яких розвилася пропасниця з підозрою на бактеріальну інфекцію^{БНФ}; бактеріємія, яка виникла у зв'язку з будь-якою з зазначених інфекцій або з підозрою на будь-яку із вищезазначених інфекцій.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: доза препарату залежить від тяжкості, чутливості, локалізації і типу інфекції та від віку і функції печінки та нирок пацієнта; застосовують в/м, в/в ін'єкційно або інфузійно^{БНФ}; дорослим і дітям старше 12 років (≥ 50 кг): по 1^{БНФ}-2 г 1 р/добу^{БНФ, ВООЗ} (кожні 24 год.) при позалікарняній пневмонії, г. ускладненнях ХОЗЛ, внутрішньочеревних інфекціях, ускладнених інфекціях сечовивідних шляхів (включаючи пієлонефрит); по 2 г 1 р/добу^{БНФ, ВООЗ} (кожні 24 год.) при госпітальній пневмонії, ускладнених інфекціях шкіри і м'яких тканин, інфекціях кісток і суглобів; передопераційна профілактика інфекцій в місці хірургічного втручання 2 г одноразово перед операцією (дітям до 12 років - 50 - 80 мг/кг); дисемінований бореліоз Лайма (II - III стадія) - по 2 г 1 р/добу (дітям - 50 - 80 мг/кг) протягом 14 - 21 дня; по 2- 4 г 1 р/добу (кожні 24 год.) при веденні пацієнтів з нейтропенією, у яких розвилася лихоманка і є підозра на бактеріальну інфекцію, бактеріальному ендокардиті, бактеріальному менінгіті^{БНФ}; гонорея - разова доза 500 мг в/м, сифіліс - 500 мг - 1 г 1 р/добу^{БНФ} із збільшенням дози до 2 г 1 р/добу при нейросифілісі протягом 10 - 14 днів; новонародженим, немовлятам та дітям віком від 15 днів до 12 років (<50 кг): 50 - 80 мг/кг 1 р/добу при внутрішньочеревних інфекціях, ускладнених інфекціях сечовивідних шляхів (включаючи пієлонефрит), позалікарняній та госпітальній пневмонії; 50 - 100 мг/кг (максимально 4 г) 1 р/добу при ускладнених інфекціях шкіри і м'яких тканин, інфекціях кісток і суглобів, веденні пацієнтів з нейтропенією, у яких розвилася лихоманка і є підозрою на бактеріальну інфекцію; 80 - 100 мг/кг (максимально 4 г) 1 р/добу при бактеріальному менінгіті; 100 мг/кг (максимально 4 г) 1 р/добу при бактеріальному ендокардиті; застосування продовжувати 48-72 год. після зникнення лихоманки або підтвердження досягнення ерадикації бактеріальної інфекції; новонароджені віком 0-14 днів: внутрішньочеревні інфекції, ускладнені інфекції шкіри і м'яких тканин, ускладнені інфекції сечовивідних шляхів (включаючи пієлонефрит), позалікарняна пневмонія, госпітальна пневмонія, інфекції кісток і суглобів, ведення пацієнтів з нейтропенією, у яких розвинулася гарячка і є підозра на бактеріальну інфекцію - 20-50 мг/кг 1р/добу, бактеріальний менінгіт, бактеріальний ендокардит - 50 мг/кг 1р/добу, г. середній отит - для початкового лікування в/м одноразово 50 мг/кг, передопераційна профілактика інфекцій у місці хірургічного втручання - 20-50 мг/кг одноразово перед операцією, сифіліс - рекомендована доза - 50 мг/кг 1 р/добу 10-14 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: грибкові інфекції статевих органів; псевдомембранозний коліт; суперінфекції; еозинофілія, лейкопенія, тромбоцитопенія; гранулоцитопенія, анемія, розлади коагуляції; гемолітична анемія, агранулоцитоз, анафілактичний шок, анафілактичні р-ції, анафілактоїдні р-ції, підвищена чутливість, р-ція Яриша-Геркxхаймера, головний біль, запаморочення; судоми, вертиго, бронхоспазм, рідкі випорожнення, діарея; нудота, блювання; панкреатит, стоматит, глосит, підвищення рівня печінкових ферментів; преципітати у жовчному міхурі, ядерна жовтяниця, висипання; свербіж; кропив'янка; с-м Стівенса-Джонсона, мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайєлла), лікарські р-ції з еозинофілією та системними проявами (DRESS-с-м), багатформна еритема, г. генералізований екзантематозний пустульоз, гематурія, глюкозурія; олігурія, утворення преципітатів у нирках (оборотні), флебіт, біль у місці ін'єкції, пропасниця; набряк, озноб, підвищення рівня креатиніну у крові; хибнопозитивні результати тесту Кумбса, хибнопозитивні результати аналізу на галактоземію, хибнопозитивні результати неферментних методів визначення глюкози, ризик утворення преципітатів кальцієвої солі цефтриаксону.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до цефтриаксону або будь-якого іншого цефалоспорину; наявність в анамнезі тяжких р-цій гіперчутливості (анафілактичних р-цій) до будь-якого іншого типу β-лактамних АБЗ (пеніцилінів, монобактамів та карбапенемів); недоношеним новонародженим віком ≤ 41 тиждень із урахуванням строку внутрішньоутробного розвитку (гестаційний вік + вік після народження); доношеним новонародженим (віком ≤ 28 днів): із гіпербілірубінемією, жовтяницею, гіпоальбумінемією або ацидозом; які потребують (або очікується, що потребуватимуть) в/в введення ЛЗ кальцію або інфузій кальцієвмісних р-нів (ризик утворення преципітатів кальцієвої солі цефтриаксону); перед в/м введенням цефтриаксону виключити наявність протипоказань до застосування лідокаїну, якщо його застосовують в якості р-ника; р-ни цефтриаксону, що містять лідокаїн, не вводити в/в.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ПРОМОЦЕФ®	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (виробництво із форми in bulk фірми-виробника Квілу Фармацевтікал Ко., Лтд., Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1, №5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТРИМЕК	ТОВ "АВАНТ" (пакування із	пор. д/р-ну д/ін'єк. у	1000мг	№1	144,10	

	форми in bulk фірми-виробника НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані Лімітед, Китай), Україна	фл.				
ЦЕФТРИАКСОН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Qilu Pharmaceutical Co., Ltd, Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. (вода д/ін'єк.)	1г	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
ЦЕФТРИАКСОН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Qilu Pharmaceutical Co., Ltd, Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1г	№50	34,80	
ЦЕФТРИАКСОН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Qilu Pharmaceutical Co., Ltd, Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1г	№5	35,84	
ЦЕФТРИАКСОН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Qilu Pharmaceutical Co., Ltd, Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1г	№1	36,40	
ЦЕФТРИАКСОН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Qilu Pharmaceutical Co., Ltd, Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. (лідокаїн)	1г	№1	64,00	
ЦЕФТРИАКСОН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd., Китайська Народна Республіка), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1г	№50	34,80	
ЦЕФТРИАКСОН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd., Китайська Народна Республіка), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1г	№5	35,84	
ЦЕФТРИАКСОН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd., Китайська Народна Республіка), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1г	№1	36,40	
ЦЕФТРИАКСОН КОМБІ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (виробництво та первинне пакування розчинників; вторинне пакування, контроль та випуск серії готового лікарського засобу)/Реюнг Фармасьютікал Ко., Лтд. (виробництво та первинне пакування порошку), Україна/Китайська Народна Республіка	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. та без	0,5г	№1, №10, №50		відсутня у реєстрі ОБЦ

ЦЕФТРИАКСОН КОМБІ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (виробництво та первинне пакування розчинників; вторинне пакування, контроль та випуск серії готового лікарського засобу)/Реюнг Фармасьютикал Ко., Лтд. (виробництво та первинне пакування порошку), Україна/Китайська Народна Республіка	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. (вода д/ін'єк.)	1г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФТРИАКСОН КОМБІ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (виробництво та первинне пакування розчинників; вторинне пакування, контроль та випуск серії готового лікарського засобу)/Реюнг Фармасьютикал Ко., Лтд. (виробництво та первинне пакування порошку), Україна/Китайська Народна Республіка	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. (лідокаїн)	1г	№1	64,00	
ЦЕФТРИАКСОН ЮРІЯ-ФАРМ	ТОВ "Юрія-Фарм" (пакування із форми in bulk НСПС Хебей Хуамін Фармасьютикал Компані Лімітед, Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	38,00	
ЦЕФТРИАКСОН ЮРІЯ-ФАРМ	ТОВ "Юрія-Фарм" (пакування із форми in bulk НСПС Хебей Хуамін Фармасьютикал Компані Лімітед, Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№10	38,00	
ЦЕФТРИАКСОН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп. та кор. з розч. та без	0,5г; 1г	№1, №40	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФТРИАКСОН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	0,5г	№5x1	48,93	
ЦЕФТРИАКСОН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	0,5г	№1	49,92	
ЦЕФТРИАКСОН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в кор.	1г	№40	33,26	
ЦЕФТРИАКСОН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	1г	№5x1	33,58	
ЦЕФТРИАКСОН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1г	№1	33,94	
ЦЕФТРИАКСОН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	0,5г	№10x1	45,72	
ЦЕФТРИАКСОН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	1г	№10x1	31,42	
ЦЕФТРИАКСОН-БХФЗ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в з розч. та без	500мг, 1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФТРИАКСОН-БХФЗ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	500мг	№1	46,40	

	ЦЕФТРИАКСОН-БХФЗ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1000мг	№1	31,76	
II.	АБИТРАКС	ТОВ "ЛАБОРАТОРІО ФАРМАСЬЮТИКО Сі.Ті.", Італія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	500мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АБИТРАКС	ТОВ "ЛАБОРАТОРІО ФАРМАСЬЮТИКО Сі.Ті."/ТОВ "ЕССЕТІ ФАРМАЧЕУТИЧІ", Італія/Італія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АЛВОБАК	Лабораторіо Реіг Жофре, С.А., Іспанія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	161,00	32,39/€
	АЛЬЦИЗОН	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АЛЬЦИЗОН	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	138,00	27,93/\$
	АЛЬЦИЗОН	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	2г	№1	114,00	27,93/\$
	АУРОКСОН	Ауробіндо Фарма Лтд, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. або інфуз. у фл.	500мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АУРОКСОН	Ауробіндо Фарма Лтд, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. або інфуз. у фл.	1000мг	№1	104,00	25,94/\$
	АУРОКСОН	Ауробіндо Фарма Лтд, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. або інфуз. у фл.	2000мг	№1	78,00	25,94/\$
	БЕЛЦЕФ	СТЕРИЛ-ДЖЕН ЛАЙФ САЙЄНСІЗ (П) ЛТД, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	104,64	26,16/\$
	БЕЛЦЕФ	СТЕРИЛ-ДЖЕН ЛАЙФ САЙЄНСІЗ (П) ЛТД, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№10	104,64	26,16/\$
	БЛИЦЕФ	Ілдонг Фармас'ютікал Ко., Лтд./Зейсс Фармас'ютікелс Пвт. Лтд., Республіка Корея/Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у скл. фл.	1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БЛИЦЕФ	Ілдонг Фармас'ютікал Ко., Лтд./Зейсс Фармас'ютікелс Пвт. Лтд., Республіка Корея/Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у скл. фл.	1000мг	№10	166,74	27,79/\$
	БРЕСЕК	АНФАРМ ХЕЛЛАС С.А, Греція	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г, 2г	№1, №10, №20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДЕНИЦЕФ	Свісс Перентералс Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	160,58	26,76/\$
	ДЕНИЦЕФ	Свісс Перентералс Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. або інфуз. у фл.	2г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДІАЦЕФ	МАЙЛАН ЛАБОРАТОРІЗ ЛІМІТЕД - Дільниця цефалоспоринових лікарських засобів, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у скл. фл.	1000мг	№1	202,06	28,87/\$
	ДІАЦЕФ 1 Г	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	220,80	27,60/\$
	ДІАЦЕФ 1000	АСТРАЛ СТЕРІТЕК ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДІАЦЕФ 1000	АСТРАЛ СТЕРІТЕК ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	166,64	27,77/\$
ДІАЦЕФ 2 Г	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	2000мг	№1	197,28	28,18/\$	
ДІАЦЕФ 2000	АСТРАЛ СТЕРІТЕК ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	2г	№1	138,87	27,77/\$	
ДІАЦЕФ 2000	АСТРАЛ СТЕРІТЕК ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	2г	№10	160,13	26,69/\$	
ЕМСЕФ®	Нектар Лайфсайдс Лімітед, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ		

ЕМСЕФ® 1000	Нектар Лайфсайнсіз Лімітед-Юніт-VI, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	172,12	24,59/\$
ЕФМЕРИН	"Венус Ремедіс Лімітед", Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	190,04	28,11/\$
ЕФМЕРИН	"Венус Ремедіс Лімітед", Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	2г	№1	137,75	28,11/\$
ЛАВАКСОН	Астрал СтеріТек Прайвіт Лімітед, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г, 2г	№1, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛАВАКСОН	Астрал СтеріТек Прайвіт Лімітед, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	2г	№1	160,00	27,05/\$
ЛОРАКСОН	Ексір Фармасьютикал Компані, Іран	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	500мг	№12	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛОРАКСОН	Ексір Фармасьютикал Компані, Іран	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№12	131,74	27,98/\$
МЕДАКСОН	Медокемі ЛТД (Завод С) (виробництво за повним циклом)/Медокемі (Фа Іст) ЛТД., (Асептік Цефалоспорин Фасіліті) (виробництво готового лікарського засобу, первинне та вторинне пакування), Кіпр/В'єтнам	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№10	60,51	30,26/€
МЕДАКСОН	Медокемі ЛТД (Завод С) (виробництво за повним циклом)/Медокемі (Фа Іст) ЛТД., (Асептік Цефалоспорин Фасіліті) (виробництво готового лікарського засобу, первинне та вторинне пакування), Кіпр/В'єтнам	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	2г	№10	48,41	30,26/€
МЕСОЛ®	Свісс Перентералс Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ОНТАЗЕН – 1000	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	154,04	
РОТАЦЕФ	ФармаВіжн Сан. ве Тідж. А.Ш., Туреччина	пор. д/р-ну д/ін'єк. у скл. фл. з розч. (вода д/ін'єк.)	1г	№1, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РОТАЦЕФ	ФармаВіжн Сан. ве Тідж. А.Ш., Туреччина	пор. д/р-ну д/ін'єк. у скл. фл. з розч. (лідокаїн)	1г	№1	147,62	28,57/\$
РОТАЦЕФ	ФармаВіжн Сан. ве Тідж. А.Ш., Туреччина	пор. д/р-ну д/ін'єк. у скл. фл. з розч. та без	0,5г	№1, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РУМІКСОН ФАРМЮНІОН	Антибіотіке С.А. (виробник, відповідальний за вторинне пакування, тестування та випуск серій кінцевого продукту)/Сінофарм Жиюн (Шеньчжен) Фармасьютикал Ко., Лтд. (виробник, відповідальний за виробництво та первинне пакування), Румунія/Китай	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	156,60	25,10/\$
РУМІКСОН ФАРМЮНІОН	Антибіотіке С.А. (Виробник, відповідальний за вторинне пакування, тестування та випуск серій кінцевого продукту)/Сінофарм Жиюн (Шеньчжен) Фармасьютикал Ко., Лтд. (виробник, відповідальний за виробництво та первинне пакування), Румунія/Китай	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	2г	№1	131,00	25,10/\$
САНАКСОН - 1000	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

САНАКСОН - 2000	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	2000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТУЛОН 1 Г	Зейсс Фармас'ютікелс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦЕФ 1000 МГ	Нітін Лайфсаенсез Лтд., Індія	пор. д/приг. р-ну д/ін'єк. у скл. фл.	1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦЕФАКСОН	Люпін Лімітед, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦЕФТРИАКСОН	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	2г	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦЕФТРИАКСОН	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	2г	№1	69,00	27,93/\$
ЦЕФТРИАКСОН	НСПС Хебей Хуамінь Фармас'ютікал Компані Лімітед, Китай	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	0,5г; 1г	№1, №10, №50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦЕФТРИАКСОН	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦЕФТРИАКСОН	Зейсс Фармас'ютікелс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦЕФТРИАКСОН	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦЕФТРИАКСОН	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1г	№1	114,00	27,93/\$ 1г
ЦЕФТРИАКСОН	НСПС Хебей Хуамін Фармас'ютікал Компані Лімітед, Китай	пор. д/приг. р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦЕФТРИАКСОН	НСПС Хебей Хуамін Фармас'ютікал Компані Лімітед, Китай	пор. д/пригот. р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№5	21,81	2482,84 /100\$
ЦЕФТРИАКСОН АНАНТА	Свісс Перентералс Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	44,98	28,11/\$
ЦЕФТРИАКСОН АНАНТА	Свісс Перентералс Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	2г	№1	28,14	28,14/\$
ЦЕФТРИАКСОН ЮРІЯ-ФАРМ	НСПС Хебей Хуамін Фармас'ютікал Компані Лімітед, Китай	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦЕФТРИАКСОН ЮРІЯ-ФАРМ	НСПС Хебей Хуамін Фармас'ютікал Компані Лімітед, Китай	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	37,18	27,75/\$
ЦЕФТРИАКСОН ЮРІЯ-ФАРМ	НСПС Хебей Хуамін Фармас'ютікал Компані Лімітед, Китай	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№10	37,18	27,75/\$
ЦЕФТРИАКСОН-ВІСТА	АЦС ДОБФАР С.П.А. (виробництво готового лікарського засобу, випуск серії; виробництво та контроль якості стерильної суміші)/ФРЕЗЕНІУС КАБІ ІПСУМ С.р.Л. (виробництво та контроль якості стерильної суміші), Італія/Італія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	56,00	30,40/€

● **Цефіксим (Cefixime) ***

Фармакотерапевтична група: J01DD08 - АБЗ для системного застосування; інші β-лактамі а/б; цефалоспорины III покоління.

Основна фармакотерапевтична дія: а/б групи цефалоспоринів III покоління для прийому внутрішньо; має бактерицидну дію, механізм дії пов'язаний із пригніченням синтезу клітинної стінки бактерій; проявляє значну бактерицидну активність відносно широкого спектра Гр (+) і Гр (-) м/о: Гр (+) м/о: *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus agalactiae*; Гр (-) м/о: *Neisseria gonorrhoeae*, *Moraxella catarrhalis*, *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus parainfluenzae*, *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella oxytoca*, *Pasteurella multocida*, *Providencia* spp., *Shigella* spp., *Citrobacter amalonaticus*, *Citrobacter diversus*; стійкі: *Pseudomonas* spp., *Enterococcus* spp., *Listeria monocytogenes*, більшість стафілококів (у т.ч. метицилінорезистентні штами), *Bacteroides fragilis* і *Clostridium* spp.; активність щодо *Enterobacter* spp. і *Serratia marcescens* варіабельна

Показання для застосування ЛЗ: інфекційно-запальні захворювання, спричинені чутливими до препарату м/о БНФ: інфекції дихальних шляхів; інфекції ЛОР-органів, г. та хр. інфекції сечовивідних шляхів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос; звичайна доза для дорослих та дітей віком від 12 років - 400 мг/добу, одноразово ^{ВОСЗ, БНФ} або по 200мг 2 р/добу з інтервалом 12 год. ^{БНФ}; лікування запалення середнього вуха триває 10-14 днів, при інфекціях, спричинених β-гемолітичним стрептококом групи А, з метою запобігання виникнення пізніх ускладнень (г. суглобового ревматизму, гломерулонефриту) лікування повинно тривати не менше 10 днів, при неускладнених інфекціях нижніх сечових шляхів у жінок препарат можна застосовувати протягом 1-3 днів, сусп.: дітям від 6 міс. до 10 р. з масою тіла до 50 кг - 8 мг/кг/добу за 1 прийом або 4 мг/кг кожні 12 год залежно від тяжкості захворювання; дорослим та дітям віком від 10 років (або з масою тіла > 50 кг): рекомендована доза - 400 мг/добу за 1 прийом або 200 мг кожні 12 год залежно від тяжкості захворювання.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: глотит, нудота, блювання, печія, біль у животі, діарея, порушення травлення, кандидоз слизової оболонки рота, стоматит, метеоризм, протипоказано застосовувати ЛЗ, які знижують перистальтику кишечника; реакції, що нагадують сироваткову хворобу, анафілаксія, артралгія та медикаментозна гарячка, інтерстиціальний нефрит; транзиторна лейкопенія, агранулоцитоз, панцитопенія, транзиторна нейтропенія, гранулоцитопенія, тромбоцитопенія, еозинofilія, у пацієнтів, які застосовували цефалоспорини, також відзначалися випадки гемолітичної анемії, відзначалися ізольовані випадки порушення згортання крові; жовтяниця, транзиторне підвищення рівня трансаміназ (АСТ, АЛТ), ЛФ, загального білірубіну, ізольовані випадки гепатиту; транзиторне підвищення рівня сечовини та креатиніну в сироватці крові; ГНН, включаючи тубулоінтерстиціальний нефрит, задишка; кропив'янка, шкірні висипання, свербіж шкіри, мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, с-м медикаментозних висипань з еозинofilією та системними проявами (DRESS); головний біль, запаморочення, дисфорія; втрата слуху; підвищення t° тіла, набряк обличчя; анорексія, вагініт, спричинений *Candida*, генітальний свербіж.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до цефіксиму або до будь-якого з компонентів ЛЗ; гіперчутливість до цефалоспоринів або пеніцилінів; порфірія.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,4 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ОПТИЦЕФ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофарм" (випуск серії, пакування із in bulk виробника Алкалоїд АД Скоп'є, Республіка Македонія)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Натур+" (контроль якості), Україна/Україна	гран. для 60мл, 100мл орал. сусп. у скл. фл.	100мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОПТИЦЕФ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофарм" (пакування із in bulk виробника Алкалоїд АД Скоп'є, Республіка Македонія та випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Натур+" (контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№7x1, №7x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	ІКЗИМ	Люпін Лімітед, Індія	пор. для 50мл орал. сусп. у фл. з мірн. стак.	100мг/5мл	№1	63,86	27,23/\$
	ІКЗИМ	Люпін Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№6x1	14,69	25,27/\$
	ЛОПРАКС	Ексір Фармасьютикал Компані, Іран	пор. для 50мл, 100мл орал. сусп. у фл.	100мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛОПРАКС	Ексір Фармасьютикал Компані, Іран	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№10x2, №6x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СОРЦЕФ®	Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія	гран. для 100мл орал. сусп. у фл. з мірн. ложк.	100мг/5мл	№1	62,06	29,10/€
	СОРЦЕФ®	Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія	гран. для 60мл орал. сусп. у фл. з мірн. ложк.	100мг/5мл	№1	85,15	29,10/€
	СОРЦЕФ®	Алкалоїд АД-Скоп'є, Республіка Македонія	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СОРЦЕФ®	Алкалоїд АД-Скоп'є, Республіка Македонія	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№5x2	36,49	29,10/€
СОРЦЕФ®	Алкалоїд АД-Скоп'є, Республіка Македонія	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№7x1	36,49	29,10/€	

СУПРАКС® СОЛЮТАБ®	А. Менаріні Меньюфекчуринг Лоджистикс енд Сервісіз С.р.л., Італія	табл., що дисперг. у бл.	400мг	№5x1, №1x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
СУПРАКС® СОЛЮТАБ®	А. Менаріні Меньюфекчуринг Лоджистикс енд Сервісіз С.р.л., Італія	табл., що дисперг. у бл.	400мг	№5x2	52,25	29,20/€
СУПРАКС® СОЛЮТАБ®	А. Менаріні Меньюфекчуринг Лоджистикс енд Сервісіз С.р.л., Італія	табл., що дисперг. у бл.	400мг	№7x1	52,25	29,20/€
ФЛАМІФІКС 200	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	200мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФИНАК	Нектар Лайфсайнсіз Лімітед- Юніт-VI, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	200мг	№10x1	36,88	24,59/\$
ЦЕФИНАК	Нектар Лайфсайнсіз Лімітед- Юніт-VI, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№10x1	22,13	24,59/\$
ЦЕФИНАК	Нектар Лайфсайнсіз Лімітед- Юніт-VI, Індія	пор. для 100мл орал. сусп. у фл. з мірн. лож.	100мг/5мл	№1	34,42	24,59/\$
ЦЕФИНАК	Нектар Лайфсайнсіз Лімітед- Юніт-VI, Індія	пор. для 50мл орал. сусп. у фл. з мірн. лож.	100мг/5мл	№1	59,01	24,59/\$
ЦЕФІКС	Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія	капс. у бл.	400мг	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФІКС	Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія	пор. для 30мл, 60мл орал. сусп. у фл.	100мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Цефоперазон (Cefoperazone)**

Фармакотерапевтична група: J01DD12 - цефалоспорины III покоління.

Основна фармакотерапевтична дія: бактерицидна дія зумовлена уповільненням синтезу стінки клітини бактерії; активний відносно великої кількості клінічно значущих м/о, але виявляє резистентність до дії багатьох β-лактамаз; чутливі Гр (+) м/о: Staphylococcus aureus (штами, що продукують та штами, що не продукують пеніциліназу), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae (Diplococcus pneumoniae), Streptococcus pyogenes (β-гемолітичний стрептокок групи А), Streptococcus agalactiae (β-гемолітичний стрептокок групи В), Streptococcus faecalis (ентерокок), β-гемолітичний стрептокок; Гр (-): Escheria coli, під Klebsiella, під Enterobacter, під Citrobacter, Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii (Proteus morganii), Providencia rettgeri (Proteus rettgeri), під Providencia, під Serratia (включаючи S. Marcescens), під Salmonella та Shigella, Pseudomonas aeruginosa та деякі інші Pseudomonas, Acinetobacter calcoaceticus, Neisseria gonorrhoeae (штами, що продукують і не продукують β-лактамази), Neisseria meningitidis, Bordetella pertussis, Yersinia enterocolitica; анаеробні м/о: Гр (+) та Гр (-) коки (включаючи під Peptococcus, Peptostreptococcus та Velionella); Гр (+) палички (включаючи під Clostridium, Eubacterium та Lactobacillus); Гр (-) (включаючи під Fusobacterium, багато штамів Bacteroides fragilis та інших представників роду Bacteroides).

Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій, спричинених чутливими до препарату м/о: інфекції ВДШ та НДШ; інфекції верхніх та нижніх відділів сечовивідних шляхів; перитоніт, холецистит, холангіт та інші інтраабдомінальні інфекції; септицемія; менінгіт; інфекції шкіри та м'яких тканин; інфекції кісток та суглобів; запальні захворювання тазових органів, ендометрит, гонорея та інші інфекції статевих шляхів; профілактика післяопераційних ускладнень під час абдомінальних, гінекологічних, СС та ортопедичних операцій.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в, в/м; звичайна доза для дорослих - 2-4 г/добу, кожні 12 год.; особливо тяжкі інфекції - дозу можна збільшити до 8 г/добу, яку вводять кожні 12 год.; при введенні препарату у добовій дозі 12-16 г, розподіленій на 3 рівні дози (з інтервалом введення 8 год), не було виявлено жодних ускладнень, лікування розпочинати до одержання результатів дослідження чутливості м/о; неускладнений гонококовий уретрит: рекомендована доза - в/м, 500 мг одноразово; застосовувати і для комбінованого лікування у поєднанні з іншими а/б; лікування дітей - 50-200 мг/кг/добу, дозу вводити у 2 прийоми (кожні 8-12 год.), МДД - не > 12 г; тяжкі інфекції, включаючи бактеріальний менінгіт у дітей - до 300 мг/кг/добу; новонародженим (до 8 днів) вводити ч/з кожні 12 год.; для а/б-профілактики післяопераційних ускладнень - в/в по 1-2 г за 30-90 хв. до початку операції, дозу можна повторювати ч/з кожні 12 год., у більшості випадків - протягом не > 24 год.; при операціях з підвищеним ризиком інфікування (операції у колоректальній зоні) та коли інфікування може завдати особливо великої шкоди (при операціях на відкритому серці або протезуванні суглобів), профілактичне застосування може тривати протягом 72 год. після закінчення операції.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: зниження рівня Нb, зниження рівня гематокриту, нейтропенія, позитивна пряма проба Кумбса, тромбоцитопенія, еозинфілія, гіпопротромбінемія, коагулопатія, анафілактичний шок, анафілактоїдна р-ція (включаючи шок), гіперчутливість, геморагія, діарея, блювання, псевдомембранозний коліт, підвищення рівня АСТ, АЛТ, підвищення рівня лужної фосфатази в крові, жовтяниця, свербіж, кропив'янка, макулопапульозні висипання, токсичний епідермальний некроліз, с - м Стівенса - Джонсона, ексфолювативний дерматит, біль у місці введення, гарячка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до цефоперазону або будь-якого з а/б цефалоспоринового ряду.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 4 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЕПАЦЕФ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	1г	№10x1	233,60	
	ЦЕФОБОЦИД	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в касет.	1г	№5x1	175,44	
	ЦЕФОБОЦИД	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1г	№1	212,20	
II.	МЕДОЦЕФ	Медокемі ЛТД (Завод С)/Медокемі (Фа Іст) ЛТД.,(Асептік Цефалоспорин Фасіліті) (виробництво готового лікарського засобу, первинне та вторинне пакування), Кіпр/В'єтнам	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МЕДОЦЕФ	Медокемі ЛТД (Завод С)/Медокемі (Фа Іст) ЛТД.,(Асептік Цефалоспорин Фасіліті) (виробництво готового лікарського засобу, первинне та вторинне пакування), Кіпр/В'єтнам	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№10	217,85	30,26/€
	ЦЕФОБІД®	Хаупт Фарма Латіна С.р.л., Італія	пор. д/приг. р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦЕФОПЕРАЗОН	НСПС Хебей Хуамін Фармасьютикал Компані Лімітед, Китай	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в кор.	1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦЕФОПЕРАЗОН	НСПС Хебей Хуамін Фармасьютикал Компані Лімітед, Китай	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в кор.	1000мг	№10	200,40	27,75/\$

• **Цефподоксим (Cefprozime)** ^{ПМД}

Фармакотерапевтична група: J01DD13 - АБЗ для системного застосування; інші β-лактамі а/б; цефалоспорины III покоління.

Основна фармакотерапевтична дія: бактерицидний ефект зумовлений пригніченням синтезу компонентів бактеріальної стінки м/о; активний щодо багатьох Гр (+), Гр (-), аеробних та анаеробних м/о; чутливі Гр (+) бактерії: *Streptococcus pneumoniae*, стрептококи групи А (*S. pyogenes*), В (*S. agalactiae*), С, F, G, а також *S. mitis*, *S. sanguis*, *S. salivarius* і *Corynebacterium diphtheriae*.; чутливі Гр (-) бактерії: *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus parainfluenzae*, *Moraxella (Branhamella) catarrhalis* (штами, що продукують і не продукують β-лактамазу), *Neisseria meningitidis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp. (*K. pneumoniae*; *K. oxytoca*), *Proteus mirabilis*.; помірно чутливі бактерії: метицилінчутливі стафілококи, штами, що продукують та не продукують пеніциліназу (*S. aureus* та *S. epidermidis*); стійкі: ентерококи, метицилін-стійкі стафілококи (*S. aureus* і *S. epidermidis*), *Staphylococcus saprophyticus*, *Pseudomonas aeruginosa* і *Pseudomonas* spp., *Clostridium difficile*, *Bacteroides fragilis*.

Показання для застосування ЛЗ: інфекції ЛОР-органів (г. середній отит; синусит; тонзиліт, фарингіт; тонзиліт та фарингіт), призначати для лікування хр. або рецидивуючих інфекцій, а також у випадках відомої або підозрюваної нечутливості збудника до широкозастосовуваних а/б; дихальних шляхів (включаючи г. бронхіт, рецидиви або загострення хр. бронхіту, бактеріальну пневмонію); неускладнені інфекції верхніх і нижніх сечовивідних шляхів (включаючи г. цистит ^{ПМД} і пієлонефрит); інфекції шкіри та м'яких тканин (абсцеси, целюліт, інфіковані рани, фурункули, фолікуліт, пароніхія, карбункули і виразки); г. неускладнена цервікальна та уретральна гонорея.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: добова доза для дорослих та дітей віком від 12 р.: табл. - синусити: 200 мг 2 р/добу 5 -10 днів; тонзиліт і фарингіт: 100 мг 2 р/день 5 -10 днів; г. бронхіт, загострення хр. бронхіту, бактеріальна пневмонія: 100-200 мг 2 р/день 10 - 14 днів; г. пієлонефрит: 200 мг 2 р/день 7 днів; цистит: 100 мг 2 р/день ^{ПМД} 7 днів; інфекції шкіри та м'яких тканин (абсцеси, целюліт, інфіковані рани, фурункули, фолікуліт, пароніхія, карбункули, виразки): 200 мг 2 р/день 7-14 днів; неускладнена гонорея у чоловіків та жінок: 200 мг одноразово; сусп.: застосовують дітям віком від 5 місяців до 12 років: по 8 мг/кг/добу, МДД - 400 мг, максимальна разова доза - 200 мг; термін лікування залежить від тяжкості захворювання та визначається індивідуально, сусп. дитяч. діти (від 4 тижнів до 12 р.): рекомендована доза для дітей - 8 мг/кг/добу, вводити в два прийоми з інтервалами в 12 год,

дітям з масою тіла принаймні 25 кг можна приймати 12,5 мл 2р/день, не застосовувати немовлятам віком до 15 днів, оскільки досвіду застосування у цій віковій групі немає.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: суперінфекція, спричинена деякими грибками роду *Candida*, нечутливими до цефподоксиму, коліт, пов'язаний із застосуванням а/б, еозінофілія; лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія, тромбоцитоз, агранулоцитоз, зниження концентрації Hb, гемолітична анемія, гіперчутливість, анафілактичні р-ції, зневоднення, подагра, периферичний набряк, збільшення маси тіла, міалгія, цефалгія; вертиго; запаморочення, безсоння, сонливість, невроз, роздратованість, нервозність, незвичні сновидіння, погіршення зору, сплутаність свідомості, нічні жахи, парестезія, астма, кашель, носова кровотеча, риніт, свистяче дихання, бронхіт, ядуха, плевральний випіт, пневмонія, синусит, діарея; біль у животі, нудота; відчуття спраги, тенезми, здуття живота, блювання, диспепсія, сухість у роті, зменшення апетиту, запор, кандидозний стоматит, анорексія, відрижка, гастрит, виразки у роті, псевдомембранозний коліт, холестатичне ураження печінки, висипання, свербіж, кропив'янка, підвищена пітливість, макульозні висипання, грибовий дерматит, злущування, сухість шкіри, випадання волосся, везикульозні висипання, сонячна еритема, пурпура, бульозні р-ції (включаючи с-м Стівенса-Джонсона), токсичний епідермальний некроліз, мультиформна еритема, гематурія, інфекції сечових шляхів, метрорагія, дизурія, часті сечовиділення, протеїнурія, вагінальний кандидоз, застійна СН, мігрень, прискорене серцебиття, вазодилатація, гематома, АГ або гіпотензія, порушення смакових відчуттів, подразнення очей, шум у вухах, дискомфорт, втомлюваність, астенія, медикаментозна гарячка, біль у грудях (біль може віддавати у попереk), гарячка, генералізований біль, кандидоз, абсцес, алергічна р-ція, набряк обличчя, бактеріальні інфекції, паразитарні інфекції, підвищення показників функціональних печінкових тестів АсАТ, АлАТ, рівня лужної фосфатази, білірубину, сечовини і креатиніну, псевдопозитивна р-ція Кумбса.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена гіперчутливість до цефподоксиму, до групи цефалоспоринів, пеніцилінів або до інших компонентів препарату, спадкова непереносимість галактози, дефіцит лактази або с-м мальабсорбції глюкози/галактози, пор.д/оральн. сусп.(дит.) - не застосовується дітям, що страждають на фенілкетонурію; для новонароджених до 28 днів та немовлят від 4 тижнів до 3 міс. з нирковою недостатністю не рекомендується.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0.4 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АУРОПОДОКС	Ауробіндо Фарма Лтд. Юніт VI, Блоки D та E, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	100мг, 200мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДОКЦЕФ	Люпін Лімітед, Індія	табл., в/о у бл.	100мг, 200мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПЕЦЕФ	Медрайк Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	100мг, 200мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПЕЦЕФ	Медрайк Лімітед Юніт-V, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	100мг, 200мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФОКСЕРО®	Алкалоїд АД-Скоп'є (вторинне пакування; випуск серії)/Люпін Лімітед (виробництво нерозфасованого продукту, первинне пакування, вторинне пакування), Республіка Македонія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	100мг, 200мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФОКСЕРО®	Алкалоїд АД - Скоп'є (вторинне пакування; випуск серії)/Люпін Лімітед (виробництво нерозфасованого продукту, первинне пакування, вторинне пакування), Республіка Македонія/Індія	пор. д/орал. сусп. у фл.	40мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦЕДОКСИМ®	Ауробіндо Фарма Лтд. Юніт VI, Блок D, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x1	35,19	25,14/\$
	ЦЕДОКСИМ®	Ауробіндо Фарма Лтд. Юніт VI, Блок D, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	200мг	№10x1	22,62	25,14/\$
	ЦЕДОКСИМ®	Ауробіндо Фарма Лтд. Юніт VI, Блок D, Індія	пор. д/орал. сусп. по 100мл у фл.	40мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦЕФМА	Сандоз ГмБХ-ТехОпс, Австрія	табл., вкриті п/о у бл.	100мг, 200мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦЕФМА	Сандоз ГмБХ-Виробнича дільниця Антиінфекційні ГЛЗ та Хімічні Операції Кундль (АІХО ГЛЗ Кундль), Австрія	табл., вкриті п/о у бл.	200мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦЕФМА	Салютас Фарма ГмБХ (вторинне	пор. д/орал.	40мг/5мл	№1	відсутня у	

ДИТЯЧА СУСПЕНЗІЯ	пакування)/Сандоз ГмбХ - Виробнича дільниця Антиінфекційні ГЛЗ та Хімічні Операції Кундль (АІХО ГЛЗ Кундль) (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, тестування, випуск серії), Німеччина/Австрія	сусп. по 50мл, 100мл у фл.				реєстрі ОВЦ
ЦЕФОДОКС	Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія	пор. для 50мл орал. сусп. у фл.	50мг/5мл, 100мг/5мл	№1		відсутня у реєстрі ОВЦ
ЦЕФОДОКС	Фарма Інтернешенал Компані, Йорданія	табл., вкриті п/о у бл.	100мг, 200мг	№10x1		відсутня у реєстрі ОВЦ
ЦЕФПОТЕК® 200	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл., в/о у бл.	200мг	№5x2	39,80	26,30/\$
ЦЕФПОТЕК® 200	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл., в/о у бл.	200мг	№5x4	49,22	22,07/\$
ЦЕФПОТЕК® 200	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл., в/о у бл.	200мг	№7x2	53,29	22,07/\$

• **Цефепім (Cefepime)**

Фармакотерапевтична група: J01DE01 - АБЗ для системного застосування; інші β-лактамі а/б; цефалоспори́ни четвертого покоління.

Основна фармакотерапевтична дія: пригнічує синтез ферментів стінки бактерії; проявляє бактерицидну дію; має широкий спектр дії щодо Гр (+) та Гр (-) бактерій, високу стійкість до гідролізу більшістю β-лактамаз, має малу спорідненість відносно β-лактамаз, що кодується хромосомними генами, швидко проникає у Гр (-) бактеріальні клітини; активний відносно Гр (+) аеробів: *Staphylococcus aureus* (в т.ч. штами, що продукують β-лактамазу); *Staphylococcus epidermidis* (в т.ч. штами, що продукують β-лактамазу); інші штами стафілококів, включаючи *S. hominis*, *S. saprophyticus*; *Streptococcus pyogenes* (стрептококи групи А); *Streptococcus agalactiae* (стрептококи групи В); *Streptococcus pneumoniae* (включаючи штами із середньою стійкістю до пеніциліну); інші β-гемолітичні стрептококи (групи С, G, F), *S. bovis* (група D), стрептококи групи Viridans; Гр (-) аероби: *Pseudomonas* spp., включаючи *P. aeruginosa*, *P. putida*, *P. stutzeri*; *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., включаючи *K. pneumoniae*, *K. oxytoca*, *K. ozaenae*; *Enterobacter* spp., включаючи *E. cloacae*, *E. aerogenes*, *E. sakazakii*; *Proteus* spp., включаючи *P. mirabilis*, *P. vulgaris*; *Acinetobacter calcoaceticus* (subsp. *anitratus*, Iwoffi); *Aeromonas hydrophila*; *Capnocytophaga* spp.; *Citrobacter* spp., включаючи *C. diversus*, *C. freundii*; *Campylobacter jejuni*; *Gardnerella vaginalis*; *H. ducreyi*; *H. influenzae* (включаючи штами, що продукують β-лактамазу); *H. parainfluenzae*; *Hafnia alvei*; *Legionella* spp.; *Morganella morganii*; *Moraxella catarrhalis* (*Branhamella catarrhalis*) (включаючи штами, що продукують β-лактамазу); *Neisseria gonorrhoeae* (включаючи штами, що продукують β-лактамазу); *Neisseria meningitidis*; *Providencia* spp. (включаючи *P. rettigeri*, *P. stuartii*); *Salmonella* spp.; *Serratia* (включаючи *S. marcescens*, *S. liquefaciens*); *Shigella* spp.; *Yersinia enterocolitica*; неактивний відносно штамів *Xanthomonas maltophilia* (*Pseudomonas maltophilia*); анаероби: *Bacteroides* spp., включаючи *B. melaninogenicus* та інші м/о ротової порожнини *Bacteroides*; *Clostridium perfringens*; *Fusobacterium* spp.; *Mobiluncus* spp.; *Peptostreptococcus* spp.; *Veillonella* spp. (неактивний щодо *Bacteroides fragilis* і *Clostridium difficile*).

Показання для застосування ЛЗ: дорослі: інфекції, спричинені чутливою до препарату м/о: дихальних шляхів, у т. ч. пневмонія, бронхіт; шкіри та підшкірної клітковини; інтраабдомінальні інфекції, в т. ч. перитоніт та інфекції жовчовивідних шляхів; гінекологічні; септицемія, емпірична терапія хворих із нейтропенічною гарячкою, профілактика післяопераційних ускладнень в інтраабдомінальній хірургії; діти: пневмонія; інфекції сечовивідних шляхів, у т. ч. пієлонефрит; інфекції шкіри та підшкірної клітковини; септицемія; емпірична терапія хворих із нейтропенічною гарячкою; бактеріальний менінгіт.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують в/в або в/м; при інфекціях сечовивідних шляхів (легкого та середнього ступеня тяжкості): в/в або в/м по 500 мг -1 г кожні 12 год.; при інших інфекціях (легкого та середнього ступеня тяжкості): в/в або в/м по 1 г кожні 12 год.; при тяжких інфекціях: в/в по 2 г кожні 12 год.; при дуже тяжких та загрозливих життю інфекціях: в/в по 2 г кожні 8 год.; профілактика можливого інфікування при проведенні хірургічних втручань: за 60 хв до початку хірургічної операції дорослим вводять 2 г препарату в/в протягом 30 хв, по закінченні вводять додатково 500 мг метронідазолу в/в, р-ни метронідазолу не вводити одночасно з цефепімом, систему для інфузії перед введенням метронідазолу промити; під час тривалих (понад 12 год) хірургічних операцій ч/з 12 год після першої дози рекомендується повторне введення рівної дози цефепіму з наступним введенням метронідазолу; дітям 1-2 міс. застосовувати тільки за життєвими показаннями по 30 мг/кг кожні 12 або 8 год, стан дітей з масою тіла до 40 кг, які отримують лікування цефепімом потрібно постійно контролювати; дітям від 2 міс з масою тіла до 40 кг (ускладнені або неускладнені інфекції сечовивідних шляхів, включаючи пієлонефрит, неускладнені інфекції шкіри, пневмонії, емпіричне лікування фебрильної нейтропенії) рекомендована доза - 50 мг/кг кожні 12 год (пацієнтам на фебрильну нейтропенію та бактеріальний менінгіт - кожні 8 год), тривалість терапії - 7-10 днів, тяжкі інфекції можуть вимагати тривалішого лікування; дітям з масою тіла > 40 кг призначати як дорослим.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості, включаючи анафілаксію, анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк, кашель, біль у горлі, задишка, розлади дихання; тахікардія, вазодилатація; нудота, блювання, диспепсія, кандидоз ротової порожнини, зміна відчуття смаку, діарея, коліт (у тому числі псевдомембранозний), біль у животі, запор; головний біль, безсоння, неспокій, судоми, запаморочення, парестезія, епілептиморфні напади, енцефалопатії (втрата свідомості, галюцинації, ступор, кома), міоклонія; гепатит, холестатична жовтяниця; висипання, свербіж, кропив'янка; висипання, свербіж,

кропив'янка; астения, пітливість, гарячка, вагініт, еритема, біль у грудях, біль у спині, периферичні набряки, генітальний свербіж, кандидоз, ниркова недостатність, флебіт та запалення; біль, запалення, збільшення рівня АЛТ, АСТ, ЛФ, загального білірубіну, анемія, еозинофілія, збільшення протромбінового часу або парціального тромбoplastинового часу (ПТЧ) і позитивний результат тесту Кумбса без гемолізу, тимчасове збільшення азоту сечовини крові та/або креатиніну сироватки крові, транзиторна лейкопенія, нейтропенія, агранулоцитоз, транзиторна тромбоцитопенія, с-м Стивенса-Джонсона, мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз, токсична нефропатія, апластична анемія, гемолітична анемія, кровотечі, порушення ф-ції печінки, холестаза, панцитопенія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до цефепіму, L-аргініну, а/б цефалоспоринового класу, пеніцилінів або інших β-лактамних а/б.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 4 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КВАДРОЦЕФ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	528,00	
	ЦЕБОПІМ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з роз. та без	500мг, 1г, 2г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦЕБОПІМ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з в пач.	1г	№1	479,60	
	ЦЕБОПІМ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	2г	№1	399,60	
	ЦЕФЕПІМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Квілу Фармацевтікал Ко., Лтд., Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. та без.	1г	№5, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦЕФЕПІМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Квілу Фармацевтікал Ко., Лтд., Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1г	№1	480,00	
	ЦЕФЕПІМ ЮРІЯ-ФАРМ	ТОВ "Юрія-Фарм" (пакування із форми in bulk НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані Лімітед, Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	480,00	
	ЦЕФЕПІМ ЮРІЯ-ФАРМ	ТОВ "Юрія-Фарм" (пакування із форми in bulk НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані Лімітед, Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№10	480,00	
	ЦЕФІМЕК	ТОВ "Авант" (пакування із форми in bulk фірми-виробника "Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд.", Індія), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№25, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦЕФІМЕК	ТОВ "Авант" (пакування із форми in bulk фірми-виробника "Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд.",	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	553,72	

		Індія), Україна					
	ЦЕФІМЕК	ТОВ "АВАНТ" (пакування із форми in bulk фірми-виробника НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані Лімітед, Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	500мг, 1000мг	№25	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЦЕФІМЕК	ТОВ "АВАНТ" (пакування із форми in bulk фірми-виробника НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані Лімітед, Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	500мг	№1	808,00	
	ЦЕФІМЕК	ТОВ "АВАНТ" (пакування із форми in bulk фірми-виробника НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані Лімітед, Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	1000мг	№1	553,72	
II.	АБИПИМ®	Нектар Лайфсайнсіз Лімітед-Юніт-VI, Індія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	500мг, 1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БЛІПІМ	Зейсс Фармас'ютікелс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	1000мг	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БЛІПІМ	Зейсс Фармас'ютікелс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	1000мг	№1	612,00	25,54/\$
	БРОДІПІМ 1 Г	Зейсс Фармас'ютікелс Пвт. Лтд./Свісс Парентералз Лтд., Індія/Індія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДЕНІПІМ	Свісс Перентералс Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	1000мг	№1	556,68	26,76/\$
	ЕКСИПІМ	Ексір Фармасьютікал Компані, Іран	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	500мг, 2000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕКСИПІМ	Ексір Фармасьютікал Компані, Іран	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	1000мг	№1	675,04	28,13/\$
	ЕКСТЕНЦЕФ	АСТРАЛ СТЕРІТЕК ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД, Індія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	500мг, 1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕСПІМ	СТЕРИЛ-ДЖЕН ЛАЙФ САЙЄНСИЗ (П) ЛТД, Індія	пор. д/приг. р-ну д/ін'ек. у скл. фл.	1г	№10	523,22	26,16/\$
	ЕСПІМ	СТЕРИЛ-ДЖЕН ЛАЙФ САЙЄНСИЗ (П) ЛТД, Індія	пор. д/приг. р-ну д/ін'ек. у скл. фл.	1г	№1	523,24	26,16/\$
	ЕФІПІМ®	Астрал Стерітеч Прайвет Лімітед, Індія	пор. д/ін'ек. у фл.	1г	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КЕФПІМ	Астрал Стерітех Приват Лімітед, Індія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	1000мг	№1	756,72	24,46/\$
	ПОЗИНЕГ	Ауробіндо Фарма Лімітед, Юніт-VI, Індія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	1000мг	№1	780,00	26,31/\$
	ПОЗИНЕГ	Ауробіндо Фарма Лімітед, Юніт-VI, Індія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	2000мг	№1	560,00	26,31/\$
	РОКСИПІМ	ФармаВіжн Сан. ве Тідж. А.Ш., Туреччина	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч.	1г	№1	672,32	28,05/\$
	САНПІМ-1000	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	1000мг	№1	440,00	24,72/\$
	СЕПТІПІМ	АСТРАЛ СТЕРІТЕК ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД, Індія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	500мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СЕПТІПІМ	АСТРАЛ СТЕРІТЕК ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД, Індія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	1000мг	№1	1044,00	27,05/\$
	СЕПТІПІМ 1000	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	УКПІМ-1000	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	1000мг	№1	324,00	27,02/\$
	ФОРТАЦЕФ	НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	500мг, 1000мг	№1, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	

	Лімітед, Китай					
ЦЕПІМ	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1г	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕПІМ	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1г	№1	648,00	27,93/\$
ЦЕФЕПІМ	АСТРАЛ СТЕРІТЕК ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	500мг, 1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФЕПІМ	СТЕРИЛ-ДЖЕН ЛАЙФ САЙЄНСИЗ (П) ЛТД, Індія	пор. д/приг. р-ну д/ін'єк. у скл. фл.	1г	№1, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФЕПІМ	Свісс Перентералс Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	200,36	27,07/\$
ЦЕФЕПІМ	Зейсс Фармас'ютікелс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФЕПІМ	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФЕПІМ	Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	396,00	27,93/\$
ЦЕФЕПІМ	Нектар Лайфсайнсіз Лімітед-Юніт-VI, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	500мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФЕПІМ	Нектар Лайфсайнсіз Лімітед-Юніт-VI, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	196,68	24,59/\$
ЦЕФЕПІМ АНАНТА	Свісс Перентералс Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	269,40	28,14/\$
ЦЕФЕПІМ АНАНТА	Свісс Перентералс Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	2г	№1	225,10	28,14/\$
ЦЕФЕПІМ АУРОБІНДО	Ауробіндо Фарма Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	500мг, 1000мг, 2000мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФЕПІМ-О	Нітін Лайфсаєнсез Лтд., Індія	пор. д/приг. р-ну д/ін'єк. у скл. фл.	1г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦЕФІКАД 1000	Каділа Фармас'ютікалз Лімітед, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	520,00	27,90/\$
ЦЕФОТРИН	"Венус Ремедіс Лімітед", Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	668,56	28,14/\$

Комбіновані препарати

- **Цефоперазон + сульбактам (Cefoperazone + sulbactam)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 4 г (віднос. до цефоперазону)

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЕПАЦЕФ КОМБІ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. по 2г у фл. в конт. чар/уп.	1г/1г	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЕПАЦЕФ КОМБІ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. по 2г у фл. в пач.	1г/1г	№1	422,40	
	ЛАКСЕРС	ТОВ "Юрія-Фарм" (пакування із форми in bulk фірми-виробника НСПС Хебей Хуамін Фармас'ютікал Компані Лімітед, Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг/1000мг	№1, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦЕФОПЕКТАМ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. без пач. та касет.	500мг/500мг; 1г/1г	№1, №5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦЕФОПЕКТАМ	Публічне акціонерне товариство "Науково-	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	500мг/500мг	№1	519,04	

		виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна					
	ЦЕФОПЕКТАМ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1г/1г	№1	415,24	
	ЦЕФОПЕРАЗОН ПЛЮС	ТОВ "АВАНТ" (пакування із форми in bulk фірми-виробника НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані Лімітед, Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	500мг/500мг	№1	960,00	
	ЦЕФОПЕРАЗОН ПЛЮС	ТОВ "АВАНТ" (пакування із форми in bulk фірми-виробника НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані Лімітед, Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг/1000 мг	№1	660,00	
	ЦЕФОПЕРАЗОН-СУЛЬБАКТАМ	ТОВ "Авант" (пакування із форми in bulk фірми-виробника НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані Лімітед, Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	500мг/500мг; 1000мг/1000 мг	№1, №25, №50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	ЗОНТАМ	Свісс Перентералс Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	500мг/500мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МАКРОЦЕФ	НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані Лімітед, Китай	пор. д/приг. р-ну д/ін'єк. у фл.	500мг/500мг; 1000мг/1000 мг	№1, №5, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СУЛЬПЕРАЗОН®	Хаупт Фарма Латіна С.р.л. (виробництво (наповнення флаконів та упаковка), контроль якості та випуск серії)/Пфайзер Фармасьютікал Лімітед (виробництво стерильної суміші цефоперазону натрію та сульбактаму натрію), Італія/Китай	пор. д/р-ну д/ін'єк. по 1г, 2г у фл. в кор.	500мг/500мг; 1000мг/1000 мг	№5, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СУЛЬПЕРАЗОН®	Хаупт Фарма Латіна С.р.л. (виробництво (наповнення флаконів та упаковка), контроль якості та випуск серії)/Пфайзер Фармасьютікал Лімітед (виробництво стерильної суміші цефоперазону натрію та сульбактаму натрію), Італія/Китай	пор. д/р-ну д/ін'єк. по 1г у фл. в кор.	500мг/500мг	№1	1108,48	25,66/\$
	СУЛЬПЕРАЗОН®	Хаупт Фарма Латіна С.р.л. (виробництво (наповнення флаконів та упаковка), контроль якості та випуск серії)/Пфайзер Фармасьютікал	пор. д/р-ну д/ін'єк. по 2г у фл. в кор.	1000мг/1000 мг	№1	839,32	25,66/\$

		Лімітед (виробництво стерильної суміші цефоперазону натрію та сульбактаму натрію), Італія/Китай					
СУЛЬЦЕФ	Медокемі ЛТД (Завод С), Кіпр	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г/1г	№10, №50, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ		
СУЛЬЦЕФ	Медокемі ЛТД (Завод С), Кіпр	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г/1г	№1	754,20	31,43/€	
ФАЙТОБАКТ 1 Г	Каділа Фармасьютикалз Лімітед, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	0,5г/0,5г	№1	880,00	25,16/\$	
ФАЙТОБАКТ 2 Г	Каділа Фармасьютикалз Лімітед, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г/1г	№1	560,00	27,90/\$	
ЦЕФОСУЛЬБІН®	Хаупт Фарма Латіна С.р.л., Італія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	0,5г/0,5г; 1г/1г	№1, №5	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЦЕФОСУЛЬБІН®	Хаупт Фарма Латіна С.р.л., Італія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г/1г	№1	412,56	29,72/€	

• **Цефтриаксон + Сульбактам (Ceftriaxone + Sulbactam)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЦЕФТРАКТАМ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач. та касет.	500мг/250мг; 1000мг/500мг	№1, №5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦЕФТРАКТАМ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач.	1000мг/500мг	№1	57,69	
II.	СУЛЬБАКТОМ АКС	Венус Ремедіс Лімітед/Свісс Перентералс Лтд., Індія/Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. по 10мл	500мг/250мг	№1	89,61	26,12/\$
	СУЛЬБАКТОМ АКС	Венус Ремедіс Лімітед/Свісс Перентералс Лтд., Індія/Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. по 20мл	1000мг/500мг	№1	107,11	26,12/\$
	ТРИЦЕФ-С	Зейсс Фармас'ютікелс Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг/500мг	№1, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТУЛІКСОН	Зейсс Фармас'ютікелс Пвт. Лтд./Свісс Парентералс Лтд., Індія/Індія	пор. д/приг. р-ну д/ін'єк. у фл.	1г/500мг	№1	84,72	24,79/\$

• **Цефепім + Амікацин (Cefepime + Amikacin)**

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ПОТЕНТОКС	Венус Ремедіс Лімітед, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг/250мг	№1	142,00	26,70/\$

17.2.1.3. Карбапенеми

Мають найширший серед β -лактамів спектр активності, який включає аеробні та анаеробні, грам(+) та грам(-) м/о. Неактивні відносно MRSA, іміпенем діє на *E.faecalis*. На відміну від іміпенему та меропенему, ертапенем не активний проти *P.aeruginosa* та *Acinetobacter spp*. Не інактивуються більшістю β -лактамаз, в т.ч. β -лактамазами розширеного спектру, які руйнують пеніциліни та цефалоспорини. Препарати вводять лише парентерально, добре розповсюджуються в організмі, при менінгіті проходять через ГЕБ. Іміпенем й меропенем у печінці не метаболізуються, ертапенем метаболізується частково. Виводяться нирками: $T_{1/2}$ іміпенему й меропенему приблизно 1 год, ертапенему приблизно 4 год. Застосовують при тяжких інфекціях різної локалізації, викликаних полірезистентною мікрофлорою, при змішаних інфекціях, інфекціях у пацієнтів з імунодефіцитом. Застосовують, як правило, у вигляді монотерапії. Зазвичай вони добре переносяться, але можливі АР, в т.ч. перехресна алергія

до пеніцилінів. Імпінем може підвищувати судомну готовність у пацієнтів із факторами ризику (менінгіт, епілепсія), тому при інфекціях ЦНС слід призначати меропенем.

• **Меропенем (Меропенем)** ^(ГІМД)

Фармакотерапевтична група: J01DH02 - протимікробні ЛЗ для системного застосування; карбапенеми.

Основна фармакотерапевтична дія: бактерицидна дія шляхом інгібування синтезу стінок бактеріальних клітин у Гр (+) і Гр (-) бактерій шляхом зв'язування з білками, що зв'язують пеніцилін; чутливі Гр (+) аероби: Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus (метицилін чутливий), Staphylococcus species (метицилін чутливий), у т. ч. Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae (група В), група Streptococcus milleri (S. anginosus, S. constellatus та S. intermedius), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (група А); Гр (-) аероби: Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Neisseria meningitidis, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Serratia marcescens; Гр (+) анаероби, Clostridium perfringens, Peptoniphilus asaccharolyticus, Peptostreptococcus species (у т. ч. P. micros, P. anaerobius, P. magnus); Гр (-) анаероби: Bacteroides caccae, група Bacteroides fragilis, Prevotella bivia, Prevotella disiens; види, для яких набула резистентність може бути проблемою: Гр (+) аероби: Enterococcus faecium; Гр (-) аероби: Acinetobacter species, Burkholderia cepacia, Pseudomonas aeruginosa; резистентні м/о: Гр (-) аероби: Stenotrophomonas maltophilia, Legionella species; інші м/о: Chlamydomphila pneumoniae, Chlamydomphila psittaci, Coxiella burnetii, Mycoplasma pneumoniae. Перехресна резистентність між меропенемом і ЛЗ, що належать до класів хінолонів, аміноглікозидів, макролідів та тетрациклінів, з урахуванням цільових мікроорганізмів відсутня.

Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій у дорослих і дітей віком від 3 міс.: пневмонії (негоспітальної та госпітальної пневмонії ^{БНФ}); бронхолегеневих інфекцій при муковісцидозі ^{ПМД}, ускладнених інфекцій сечовивідних шляхів ^{БНФ}; ускладнених інтраабдомінальних інфекцій ^{БНФ}; інфекцій під час пологів і післяпологових інфекцій; ускладнених інфекцій шкіри і м'яких тканин ^{БНФ}; г. бактеріального менінгіту; лікування пацієнтів з нейтропенією і лихоманкою при підозрі на бактеріальну інфекцію.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують в/в інфузійно та болюсно ін'єкц. ^{БНФ}; доза та тривалість лікування залежать від виду збудника хвороби, тяжкості захворювання та індивідуальної чутливості пацієнта; у дозі до 2 г 3 р/добу у дорослих та дітей з масою тіла > 50 кг та у дозі до 40 мг/кг 3 р/добу у дітей підходить для лікування деяких видів інфекцій, таких як госпітальні інфекції, викликані Pseudomonas aeruginosa або Acinetobacter spp.; дорослим та дітям з масою тіла > 50 кг при пневмонії (негоспітальної, госпітальної): 500 мг-1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год ^{БНФ}; бронхолегеневій інфекції при муковісцидозі: 2 г як одноразова доза для введення кожні 8 год ^{БНФ}; ускладнених інфекціях сечовивідних шляхів: 500 мг-1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год ^{БНФ}; ускладнених інтраабдомінальних інфекціях: 500 мг-1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год ^{БНФ}; інфекціях під час пологів і післяпологових інфекціях: 500 мг-1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год; ускладнених інфекціях шкіри і м'яких тканин: 500 мг-1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год ^{БНФ}; г. бактеріальному менінгіту: 2 г як одноразова доза для введення кожні 8 год ^{БНФ}; для лікування пацієнтів з фібрильною нейтропенією: 1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год ^{БНФ}; тривалість введення в/в інфузії - 15-30 хв., болюсної ін'єкції - 5 хв.; для дітей 3 міс.-11 років і з масою тіла до 50 кг при пневмонії (негоспітальної чи госпітальної): 10-20 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год ^{БНФ}; бронхолегеневій інфекції при муковісцидозі: 40 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год ^{БНФ}; ускладнених інфекціях сечовивідних шляхів: 10-20 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год; ускладнених інтраабдомінальних інфекціях: 10-20 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год; ускладнених інфекціях шкіри і м'яких тканин: 10-20 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год ^{БНФ}; г. бактеріальному менінгіту: 40 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год ^{БНФ}; для лікування пацієнтів з фібрильною нейтропенією: 20 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год.; дітям застосовувати у вигляді в/в інфузії тривалістю 15-30 хв., дози меропенему до 20 мг/кг можуть бути введені у вигляді в/в болюсної ін'єкції протягом приблизно 5 хв.; дітям з масою тіла > 50 кг застосовувати дозу, як для дорослих пацієнтів ^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: оральний та вагінальний кандидоз; тромбоцитемія, еозинофілія, тромбоцитопенія, лейкопенія, нейтропенія; головний біль, парестезії, судоми; діарея, блювання, нудота, біль у животі; підвищення рівнів трансаміназ, ЛФ, ЛДГ, білірубину в крові, висип, свербіж, кропив'янка; підвищення рівнів креатиніну та сечовини в крові, запалення, біль, тромбофлебіт; агранулоцитоз, гемолітична анемія; ангіоневротичний набряк, анафілактична р-ція; коліт, асоційований із застосуванням а/б; токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона, мультиформна еритема; біль у місці ін'єкції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин, до будь-якого іншого АБЗ групи карбапенемів, тяжка підвищена чутливість (анафілактичні р-ції, тяжкі р-ції з боку шкіри) до будь-якого іншого типу β-лактамного АБЗ (пеніцилінів або цефалоспоринів).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МЕПЕНАМ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	872,64	
	МЕПЕНАМ	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	0,5г	№1	840,00	
	МЕРОБОЦИД	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	500мг, 1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

		фармацевтичний завод", Україна					
	МЕРОБОЦИД	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл. в пач.	1000мг	№1	806,70	
	МЕРОБОЦИД	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл. в пач.	500мг	№1	967,92	
	МЕРОПЕНЕМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Шеньчжень Хайбинь Фармасьютікел Ко., Лтд., Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл.	0,5г; 1г	№50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МЕРОПЕНЕМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Шеньчжень Хайбинь Фармасьютікел Ко., Лтд., Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл.	0,5г	№1	1488,00	
	МЕРОПЕНЕМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Шеньчжень Хайбинь Фармасьютікел Ко., Лтд., Китай), Україна	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл.	1г	№50	1215,00	
	МЕРОПЕНЕМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (виробництво з продукції in bulk фірми-виробника Факта Фармасьютічі С.п.А., Італія), Україна	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл.	500мг, 1000мг	№10, №50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МЕРОПЕНЕМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (виробництво з продукції in bulk фірми-виробника Факта Фармасьютічі С.п.А., Італія), Україна	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл.	500мг	№1	1470,00	
	МЕРОПЕНЕМ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (виробництво з продукції in bulk фірми-виробника Факта Фармасьютічі С.п.А., Італія), Україна	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл.	1000мг	№1	1215,00	
II.	АРІС	Сан Фармасьютікал Індастріз Лімітед, Індія	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	500мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АРІС	Сан Фармасьютікал Індастріз Лімітед, Індія	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	1г	№1	860,58	27,19/\$
	БРЕНЕМ 1000	Брукс Лабораторіс Лімітед, Індія	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл.	1000мг	№1	750,00	23,50/\$
	ДЕМОПЕНЕМ ®	ДЕМО С.А. Фармасьютікал Індастрі, Греція	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл.	1000мг	№1	842,19	27,27/\$
	ДЕМОПЕНЕМ ®	ДЕМО С.А. Фармасьютікал Індастрі, Греція	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл.	500мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДІАПЕНЕМ	АНФАРМ ХЕЛЛАС С.А. (виробник, що відповідає за випуск серії)/ЕйСіЕс ДОБФАР С.П.А. (виробник проміжного продукту лікарського засобу - стерильної суміші меропенему тригідрату і натрію карбонату (in bulk))/САВІОР ЛАЙФТЕК КОРПОРЕЙШН (виробник проміжного прод, Греція/Італія/Тайвань	пор. д/р-ну д/ін`ек. та інфуз. у фл.	500мг, 1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДІАПЕНЕМ	АНФАРМ ХЕЛЛАС С.А. (виробник, що відповідає за випуск серії)/ЕйСіЕс ДОБФАР	пор. д/р-ну д/ін`ек. та інфуз. у фл.	500мг	№10	2262,00	27,05/\$

	С.П.А. (виробник проміжного продукту лікарського засобу - стерильної суміші меропенему тригідрату і натрію карбонату (in bulk))/САВІОР ЛАЙФТЕК КОРПОРЕЙШН (виробник проміжного прод, Греція/Італія/Тайвань					
ДІАПЕНЕМ	АНФАРМ ХЕЛЛАС С.А. (виробник, що відповідає за випуск серії)/ЕйСіЕс ДОБФАР С.П.А. (виробник проміжного продукту лікарського засобу - стерильної суміші меропенему тригідрату і натрію карбонату (in bulk))/САВІОР ЛАЙФТЕК КОРПОРЕЙШН (виробник проміжного прод, Греція/Італія/Тайвань	пор. д/р-ну д/ін`ек. та інфуз. у фл.	1000мг	№10	1050,23	25,74/\$
ЕКСИПЕНЕМ	Ексір Фармасьютикал Компані, Іран	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл.	1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЄВРОПЕНЕМ	ЕйСіЕс Добфар С.П.А., Італія	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл.	500мг, 1г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЄВРОПЕНЕМ	ЕйСіЕс Добфар С.П.А., Італія	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл.	500мг	№10	1617,81	27,69/\$
ЄВРОПЕНЕМ	ЕйСіЕс Добфар С.П.А., Італія	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл.	1г	№10	1199,08	27,69/\$
ІФЕМ	Ауронекст Фарма Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл.	1г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МАКПЕНЕМ	ЕйСіЕс Добфар С.П.А., Італія	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл.	1000мг	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МАКПЕНЕМ	ЕйСіЕс Добфар С.П.А., Італія	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл.	1000мг	№1	1161,24	24,46/\$
МЕДОПЕНЕМ	Медокемі ЛТД (Завод С), Кіпр	пор. д/р-ну д/ін`ек. або інфуз. у фл.	1г	№1	1131,39	31,43/€
МЕРОБАК	АЦС ДОБФАР С.П.А. (виробництво готового лікарського засобу та випуск серії; виробництво та контроль якості стерильної суміші), Італія	пор. д/приг. р-ну д/ін`ек. у фл.	1000мг	№1	660,00	30,40/€
МЕРОБАК	АЦС ДОБФАР С.П.А. (виробництво готового лікарського засобу та випуск серії; виробництво та контроль якості стерильної суміші), Італія	пор. д/приг. р-ну д/ін`ек. у фл.	1000мг	№10	660,00	30,40/€
МЕРОБАК	АЦС ДОБФАР С.П.А. (виробництво готового лікарського засобу та випуск серії; виробництво та контроль якості стерильної суміші), Італія	пор. д/приг. р-ну д/ін`ек. у фл.	500мг	№1	840,00	30,40/€
МЕРОБАК	АЦС ДОБФАР С.П.А. (виробництво готового лікарського засобу та випуск серії; виробництво та контроль якості стерильної суміші), Італія	пор. д/приг. р-ну д/ін`ек. у фл.	500мг	№10	840,00	30,40/€
МЕРОГРАМ	Ауронекст Фарма Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл.	500мг, 1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МЕРОНЕМ	ЕйСіЕс Добфар Спа (виробник "in bulk")/АстраЗенека ЮК Лімітед (виробник, відповідальний за вторинну упаковку, випуск серії)/Сумітомо Дейніппон Фарма Ко., Лтд. (виробник "in bulk")/Замбон Свіццерланд Лтд (виробник,	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл.	500мг	№10	1332,82	27,09/\$

	відповідальний за первинну упаковку, втор, Італія/Велика Британія/Японія/Швейцарія					
МЕРОНЕМ	ЕйСіЕс Добфар Спа (виробник "in bulk")/АстраЗенека ЮК Лімітед (виробник, відповідальний за вторинну упаковку, випуск серії)/Сумітомо Дейніппон Фарма Ко., Лтд. (виробник "in bulk")/Замбон Свіццерланд Лтд (виробник, відповідальний за первинну упаковку, втор, Італія/Велика Британія/Японія/Швейцарія	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл.	1000мг	№10	1032,13	27,09/\$
МЕРОПЕНЕМ - ВІСТА	АЦС ДОБФАР С.П.А. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії; виробництво та контроль якості стерильної суміші), Італія	пор. д/приг. р-ну д/ін`ек. у фл.	500мг, 1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МЕРОПЕНЕМ - ВІСТА	АЦС ДОБФАР С.П.А. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії; виробництво та контроль якості стерильної суміші), Італія	пор. д/приг. р-ну д/ін`ек. у фл.	500мг	№10	1386,00	32,78/€
МЕРОПЕНЕМ - ВІСТА	Факта Фармасьютісі С.П.А., Італія	пор. д/приг. р-ну д/ін`ек. у фл.	500мг	№1	1200,00	30,14/€
МЕРОПЕНЕМ - ВІСТА	Факта Фармасьютісі С.П.А., Італія	пор. д/приг. р-ну д/ін`ек. у фл.	500мг	№10	1386,00	35,35/€
МЕРОПЕНЕМ - ВІСТА	АЦС ДОБФАР С.П.А. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії; виробництво та контроль якості стерильної суміші), Італія	пор. д/приг. р-ну д/ін`ек. у фл.	1000мг	№10	1005,00	32,78/€
МЕРОПЕНЕМ - ВІСТА	Факта Фармасьютісі С.П.А., Італія	пор. д/приг. р-ну д/ін`ек. у фл.	1000мг	№10	1005,00	35,35/€
МЕРОПЕНЕМ - ВІСТА	Факта Фармасьютісі С.П.А., Італія	пор. д/приг. р-ну д/ін`ек. у фл.	1000мг	№1	870,00	30,14/€
РОНЕМ	Венус Ремедіс Лімітед, Індія	пор. д/р-ну д/ін`ек. у фл.	125мг, 250мг, 500мг, 1000мг	№1, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Доріпенем (Doripenem)**

Фармакотерапевтична група: J01DH04 - АБЗ для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний карбапенемовий а/б; чинить б/ц дію шляхом інгібування біосинтезу бактеріальної клітинної стінки; інактивує багато важливих пеніцилінз'язуючих білків, що призводить до інгібування синтезу клітинної стінки і подальшої загибелі клітин; слабо пригнічує дію інших а/б, не пригнічується іншими а/б; чутливі Гр (+) аероби: Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus (штами, чутливі до метициліну), види роду Staphylococcus (штами, чутливі до метициліну), Streptococcus pneumoniae, види роду Streptococcus; Гр (-) аероби: Citrobacter diversus, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, види роду Salmonella, Serratia marcescens, види роду Shigella; анаероби: Bacteroides fragilis, Bacteroides caccae, Bacteroides ovatus, Bacteroides uniformis, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides vulgatus, Bilophora wadsworthia, Peptostreptococcus magnus, Peptostreptococcus micros, види роду Porphyromonas, види роду Prevotella, Sutterella wadsworthensis; види, для яких набула резистентність може бути проблемною: Acinetobacter baumannii, види роду Acinetobacter, Burkholderia cepacia, Pseudomonas aeruginosa; м/о, резистентні від природи Гр (+) аероби: Enterococcus faecium; Гр (-) аероби Stenotrophomonas maltophilia; види роду Legionella.

Показання для застосування ЛЗ: нозокоміальна пневмонія, включаючи пневмонію, пов'язану зі ШВЛ; ускладнені інтраабдомінальні інфекції; ускладнені інфекції сечового тракту.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: нозокоміальна інфекція, включаючи пневмонію, пов'язану з ШВЛ: 500 мг -1 г кожні 8 год., (тривалість інфузії - 1-4 год.), тривалість лікування 10-14 днів; ускладнена інтраабдомінальна інфекція та інфекція сечового тракту, включаючи пієлонефрит: 500 мг кожні 8 год (тривалість інфузії - 1 год.); тривалість лікування 5-14 днів та визначається тяжкістю, локалізацією інфекції та клінічною відповіддю пацієнта.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кандидоз ротової порожнини, грибові інфекції вульви; тромбоцитопенія, нейтропенія; р-ції гіперчутливості; головний біль, судоми; флебіт; нудота, діарея; коліт,

спричинений Clostridium difficile; підвищення рівня печінкових ферментів; свербіж, висипання; анафілактичні р-ції, токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до доріпенему чи карбопенемів; тяжка гіперчутливість (анафілактична р-ція, тяжка шкірна р-ція) до будь-яких β-лактамних а/б (пеніцилінів чи цефалоспоринів).

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДОРИПУР	Ауронекст Фарма Пвт. Лтд., Індія	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	250мг, 500мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Ертапенем (Ertapenem)**

Фармакотерапевтична група: J01DH03 - АБЗ для системного застосування; β-лактамні а/б; карбапенеми.

Основна фармакотерапевтична дія: пригнічує синтез бактеріальної клітинної стінки через зв'язування ертапенему з пеніцилінзв'язуючими білками; стійкий до гідролізу більшістю класами β-лактамаз, включаючи пеніцилінази, цефалоспоринози і β-лактамази розширеного спектра, але не метало-β-лактамази; помірно чутливі штами анаеробні Гр (+) м/о: стафілококи, стійкі до метициліну (включаючи Staphylococcus aureus), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes; анаеробні Гр (-) м/о: Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Morganella morganii, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Serratia marcescens; анаеробні м/о: Bacteroides fragilis та інші види групи B. fragilis, штами Clostridium (окрім C. difficile), Eubacterium, Fusobacterium, Peptostreptococcus, Porphyromonas, asaccharolytica та Prevotella; штами, для яких набута резистентність може стати проблемою: стафілококи, стійкі до метициліну; сильно чутливі анаеробні Гр (+) м/о: Corynebacterium jeikeium; ентерококи, включаючи Enterococcus faecalis та Enterococcus faecium; анаеробні Гр (-) м/о: штами Aeromonas, Acinetobacter, Burkholderia cepacia, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia; анаеробні м/о: штами Lactobacillus; інші: штами Chlamydia, Mycoplasma, Rickettsia, Legionella.

Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій, спричинених чутливими штамми м/о: ускладнені інтраабдомінальні інфекції^{БНФ}; негоспітальна пневмонія^{БНФ}; г. гінекологічні інфекції^{БНФ}; ускладнені інфекції шкіри та шкірних структур, включаючи інфекції нижніх кінцівок при ЦД ("діабетична" стопа)^{БНФ}; ускладнені інфекції сечового тракту, включаючи пієлонефрит; бактеріальна септицемія; профілактика хірургічних інфекцій, спричинених елективним колоректальним хірургічним втручанням у дорослих^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/м та в/в; лікування інфекції у дорослих та дітей від 13 років і старше: в/в, звичайна доза - 1 г 1 р/добу^{БНФ}; у дітей 3 міс.-12 років: в/в інфузійно, звичайна доза - 15 мг/кг 2 р/добу, МДД - 1 г^{БНФ}; при в/в інфузії вводити протягом 30 хв., в/м введення - альтернатива в/в; звичайна тривалість лікування - 3-14 днів, але залежить від типу інфекції та причинного збудника або збудників; для профілактики хірургічних інфекцій, спричинених елективним колоректальним хірургічним втручанням у дорослих, рекомендоване одноразове в/в введення 1 г за 1 год. до хірургічного втручання^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кандидоз ротової порожнини, кандидоз, грибкова інфекція, псевдомембранозний ентероколіт, вагініт; пневмонія, дерматомікоз, нагноєння післяопераційної рани, інфекція сечових шляхів; нейтропенія, тромбоцитопенія; АР, анафілаксія, включаючи анафілактоїдні р-ції; анорексія, гіпоглікемія; безсоння, сплутаність свідомості; тривога, неспокій, депресія; зміна психічного статусу (включаючи агресію, делірії, дезорієнтацію, зміну психіки); головний біль, запаморочення, сонливість, безсоння, зміни смаку, судоми, порушення свідомості, тремор, синкопе, знижений рівень свідомості, галюцинації, дискінезія, міоклонус, порушення ходи; аномалії розвитку склери; синусова брадикардія, аритмія, тахікардія; венозні ускладнення у місці введення, флебіт/тромбофлебіт; артеріальна гіпертензія/гіпотензія, екстравазація, геморагії, приплив крові; диспное, дискомфорт при ковтанні, закладеність носа, кашель, носова кровотеча, хрипи/хрипіння, свистяче дихання; діарея, обумовлена C. difficile, нудота, блювання, запор, відригування кислим, сухість у роті, розлад травлення, біль у животі, диспепсія, анорексія, дисфагія, нетримання калу, пельвіоперитоніт, зміна кольору калу, мелена; холецистит, жовтяниця, захворювання печінки; висипання, свербіж, еритема, кропив'янка, дерматит, пелюшковий дерматит, петехії, десквамація, г. генералізований екзантематозний пустульоз, медикаментозне висипання з еозинofilією та системними с-ми (DRESS-с-м); м'язові судоми, біль у плечовому суглобі, м'язова слабкість; ниркова недостатність, ГНН; аборт; вагінальний свербіж чи кровотеча; синці, екстравазація, астения/втомлюваність, гарячка, набряк, біль у грудях, зміни у місці введення (затвердіння, біль, еритема, печіння); нездужання; біль у місці інфузії, печіння у місці інфузії, свербіж у місці інфузії, еритема у місці інфузії, еритема у місці ін'єкції, відчуття тепла у місці інфузії, підвищення рівня АЛТ, АСТ, ЛФ, ЛДГ, концентрації фосфору або калію в сироватці крові, кількості загального білірубину (прямого і непрямого), концентрації креатиніну, глюкози в сироватці крові; зниження концентрації бікарбонатів, креатиніну, калію в сироватці крові; збільшення кількості тромбоцитів, еозинofilів, активованого часткового тромбoplastинового часу, протромбінового часу, кількості сегментоядерних нейтрофілів, лімфоцитів, лейкоцитів, метаміелоцитів, моноцитів, міелоцитів, атипових лімфоцитів; зниження кількості лейкоцитів крові, тромбоцитів, сегментоядерних нейтрофілів, Нв та гематокриту, кількості лімфоцитів; збільшення кількості бактерій, лейкоцитів, епітеліальних клітин та еритроцитів у сечі; наявність дріжджових грибів у сечі; збільшення виділення уробіліногену зі сечею; позитивний тест на токсини Clostridium difficile; збудження, міастенія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: встановлена раніше гіперчутливість до будь-якого компонента ЛЗ або до інших препаратів цього ж класу, тяжкі р-ції гіперчутливості (анафілактичні р-ції, тяжкі р-ції з боку шкіри) до будь-якого іншого типу β-лактамних препаратів (до пеніцилінів або цефалоспоринів), при використанні лідокаїну гідрохлориду як розчинника ЛЗ, що вводиться в/м, протипоказаний пацієнтам з гіперчутливістю до місцевих анестетиків амідного типу та пацієнтам з тяжким шоком або блокадою серця.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ІНВАНЗ®	Лабораторії Мерк Шарп і Доум Шибре (нерозфасована продукція, первинне пакування, вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Мерк Шарп і Доум Б.В. (вторинне пакування (альтернативний виробник)), Франція/Нідерланди	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у скл. фл.	1г	№1	991,40	26,79/\$

17.2.2. Тетрацикліни

А/б широкого спектру дії, значення яких загалом втрачено через ріст резистентності. Залишаються препаратами вибору при інфекціях, викликаних хламідіями (трахома, пситаккоз, сальпінгіт, уретрит, венерична лімфогранульоза), рикетсіями (в т.ч. Ку-лихоманка), бруцелями, спірохетами, в т.ч. *B.burgdorferi* (кліщовий бореліоз, або хвороба Лайма). Застосовують також при респіраторних та генітальних інфекціях, викликаних мікоплазмами, при вугровому висипі, інфекціях ротової порожнини, загостренні хр. бронхіту, лептоспірозу у пацієнтів з алергією до пеніциліну. Накопичуються у кістковій тканині, викликають забарвлення та пошкодження зубів. Тетрацикліни не можна призначати дітям до 8 років, вагітним та жінкам, що годують, пацієнтам з нирковою недостатністю (окрім доксицикліну), при ГЧ. Доксициклін, порівняно з тетрацикліном, має вищу біодоступність при прийомі *п/о* (знижується при одночасному прийомі препаратів заліза), більш довготривалий $T_{1/2}$ (призначають 1-2 р/добу) й він краще переноситься.

- **Доксициклін (Дохусуcline) ***

Фармакотерапевтична група: J01AA02 - АБЗ для системного застосування; тетрацикліни.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить бактеріостатичну дію; антимікробний ефект реалізується шляхом пригнічення синтезу білків, є ефективним щодо широкого спектра Гр (+) і Гр (-) бактерій та деяких інших м/о; застосовують для лікування інфекцій, спричинених такими м/о: *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Pneumococcus*, *Salmonella typhi*, *Klebsiella*, *Morganella morganii*, *Escherichia coli*, *Haemophilus influenzae*, *Clostridium*, *Bacteroides*, *Fusobacterium*, *Legionella pneumophila*; особлива активність відмічена стосовно наступних м/о: *Brucella*, *Pasteurella*, *Chlamydia*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Rickettsia*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Treponema*, *Spirocheta*, *Vibrio cholerae*, *Corynebacterium acnae*.

Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій, спричинених чутливими штамми Гр (+) та Гр (-) м/о, та деякими іншими м/о: інфекції дихального тракту: пневмонія та інші захворювання НДШ, спричинені чутливими штамми *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Klebsiella pneumoniae* та ін.; пневмонія, спричинена *Mycoplasma pneumoniae*; хр. бронхіти, синусити^{БНФ}; інфекції сечовивідного тракту: інфекції, спричинені чутливими штамми *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Escherichia coli*, *Streptococcus faecalis*; інфекції, що передаються статевим шляхом: інфекції, спричинені *Chlamydia trachomatis*^{БНФ}, включаючи неускладнені уретральні та ендоцервікальні інфекції, інфекції прямої кишки; негонококові уретрити^{БНФ}, спричинені *Ureaplasma urealyticum* (*T-mycoplasma*); м'який шанкр, пахова гранульома, венерична гранульома; як альтернатива для лікування гонореї та сифілісу^{БНФ}; акне при необхідності застосування а/б-терапії^{БНФ}; офтальмологічні інфекції: інфекції, спричинені чутливими бактеріями *gonococci*, *staphylococci* та *Haemophilus influenzae*; лікування паратрахоми (як монотерапія чи у комбінації з іншими ЛЗ); рикетсійні інфекції: плямиста гарячка скелястих гір, висипні тифи, гарячка Ку, ендокардит, спричинений *Coxiella*, кліщова гарячка; інші інфекції: орнітоз, бруцельоз (при застосуванні у комбінації із стрептоміцином), холера, бубонна чума, епідемічний зворотний тиф; кліщова зворотна гарячка; туляремія, меліоїдоз, тропічна малярія^{ВООЗ, БНФ}, резистентна до хлороквіну, та г. кишковий амебіаз (у комбінації з амебіцидом); як альтернатива для лікування лептоспірозу, газової гангрені та правця; для профілактики: японської річкової лихоманки, діареї мандрівників (спричиненої *Escherichia coli*), лептоспірозу, малярії; профілактика малярії^{ВООЗ, БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують *р/ос*; звичайна доза для дорослих для лікування г. інфекцій становить 200 мг у 1-й день лікування^{БНФ} (за 1 прийом або по 100 мг кожні 12 год.) та 100 мг/добу у наступні дні^{БНФ}; при лікуванні тяжких інфекцій - 200 мг/добу протягом усього періоду лікування^{БНФ}; терапію продовжувати 24-48 год після зникнення симптомів захворювання та гарячки; при стрептококових інфекційних захворюваннях - застосовувати 10 днів; рекомендована доза дітям від 12 років з масою тіла до 45 кг становить 4,4 мг/кг (у 1-й день лікування рекомендовану дозу застосовувати за 1 або 2 прийоми), у наступні дні доза - 2,2 мг/кг (за 1 або 2 прийоми); при більш тяжких інфекційних захворюваннях можна призначити до 4,4 мг/кг; дітям з масою тіла ≥ 45 кг призначається звичайна доза для дорослих; лікування окремих інфекцій, акне: рекомендована доза - 50 мг/добу протягом 6-12 тижн.; неускладнені гонококові інфекції (виняток - аноректальні інфекції у чоловіків), неускладнені уретральні і ендоцервікальні інфекції та інфекції прямої кишки, спричинені *Chlamydia trachomatis*, негонококові уретрити, спричинені *Ureaplasma urealyticum*: рекомендована доза 100 мг 2 р/добу протягом 7 днів; для лікування г. епідидимоорхіту, спричиненого *Chlamydia trachomatis* або *Neisseria gonorrhoeae*: по 100 мг 2 р/добу протягом 10 днів; для лікування первинного та вторинного сифілісу: рекомендована доза для пацієнтів без підтвердженої вагітності та з АР на пеніциліни - 200 мг 2 р/добу протягом 2 тижн. (як альтернатива терапії пеніцилінами); епідемічний зворотний тиф, кліщовий зворотний тиф: рекомендована доза - 100-200 мг одноразово залежно від ступеня тяжкості захворювання; тропічна малярія, резистентна до хлороквіну: рекомендована доза 200 мг/добу^{ВООЗ} протягом щонайменше 7 днів; профілактика малярії: рекомендована доза для дорослих - 100 мг/добу^{ВООЗ, БНФ}, дітям віком від 12 років рекомендована доза - від 2 мг/кг/добу до загальної дози, що становить 100 мг/добу; профілактику можна розпочати за 1-2 дні до подорожі у регіон з малярією; профілактичне застосування продовжувати кожен день під час перебування у регіоні з малярією та протягом 4 тижн. після того, як було залишено регіон з малярією^{ВООЗ}; профілактика японської річкової гарячки: рекомендована доза - 200 мг одноразово; профілактика діареї мандрівника у дорослих: рекомендована доза - 200 мг у 1-й день подорожі (застосовується у вигляді єдиної дози 200 мг або по 100 мг кожні 12 год.) та по 100 мг/добу протягом наступних

днів подорожі; профілактика лептоспірозу: рекомендована доза - 200 мг 1 р/тижд. протягом усього часу перебування у регіоні з лептоспірозом та 200 мг у кінці подорожі.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: припливи, суперінфекція, що може зумовити кандидоз, глосит, стоматит, ентероколіт, псевдомембранозний коліт (зі збільшенням росту *Clostridium difficile*), г. запалення зовнішніх статевих органів та піхви у жінок (вульвовагініт), проктит, свербіж в анальній зоні (анальний свербіж), розлади коагуляції крові, зниження активності протромбіну, гемолітична анемія, лейкоцитопенія, лейкоцитоз, тромбоцитопенія, анемія, лімфоцитопенія, лімфаденопатія, наявність атипичних лімфоцитів та токсичної зернистості у гранулоцитах, нейтропенія, еозинофілія, фоточутливість; р-ції гіперчутливості (у тому числі анафілактичний шок, анафілаксія, ангіоневротичний набряк, диспное, сироваткова хвороба, периферичні набряки, тахікардія, кропив'янка), анафілактоїдні р-ції, анафілактоїдна пурпура, псевдоанафілактична р-ція, генералізована екзантема, еритема, свербіж, поліморфна ексудативна еритема, оборотний локальний набряк шкіри, слизових оболонок або суглобів (ангіоедема), БА, локальна екзантема геніталій та інших зон, злаякісна ексудативна еритема, набряк обличчя, набряк язика, набряк гортані зі звуженням дихальних шляхів, тахікардія, артеріальна гіпотензія, що може прогресувати до шоку; тяжкі шкірні р-ції із загальними реакціями (такі як ексфолювативний дерматит та с-м Лайелла), перикардит, загострення перебігу СЧВ, р-ція Яриша-Герксгеймера, АР на протеїни сої, страх, неспокій, збудження, судоми, головний біль, парестезії, доброякісна внутрішньочерепна гіпертензія (*Pseudotumor cerebri*), що зникає після припинення лікування і характеризується головним болем, нудотою, блюванням, можливими розладами зору (розпливчастий зір, скотома, диплопія, необоротна втрата зору) внаслідок набряку зорового нерву, припливи, оборотна часткова втрата нюхової та смакової чутливості, довготривала втрата зору, дзвін у вухах, шум у вухах, вертиго, тахікардія, нудота, діарея, диспепсія, печія, біль у животі, зміна кольору зубної емалі, блювання, дисфагія, глосит, «ворсинчастий» язик, почорніння язика, езофагіт, панкреатит, гіпоплазія емалі, здуття живота, метеоризм, стеаторея, стоматит, фарингіт, дисфонія, утруднення ковтання, псевдомембранозний ентероколіт, анорексія, необоротна зміна кольору зубів та ушкодження емалі, гепатит, жовтяниця, печінкова недостатність, гепатотоксичність із тимчасовим підвищенням значень показників функції печінки, ексфолювативний дерматит, мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, висипання, включаючи макулопапульозні та еритематозні висипання, р-ції фоточутливості шкіри (почервоніння, набряк, формування пухирів та знебарвлення шкіри), фотооніхолісис, АР може захопити нігті (відкремлення та знебарвлення нігтів), с-м медикаментозної гіперчутливості з еозинофілією та системними симптомами (DRESS), міалгія, артралгія, гематурія, інтерстиціальний нефрит, ГНН, анурія, підвищення рівня сечовини у крові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до доксицикліну та тетрациклінів або до будь-якої допоміжної речовини препарату; поєднання тяжкого ступеня ниркової та/або печінкової недостатності; тяжка печінкова дисфункція, вагітність або період годування груддю, дитячий вік до 12 років.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0.1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДОКСИЦИКЛІН	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	капс. у бл.	100мг	№10x1	1,22	
	ДОКСИЦИКЛІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	капс. у конт. чар/уп. та конт.	100мг	№10x1, №10x2, №1000	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДОКСИЦИКЛІН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	капс. у конт. чар/уп.	100мг	№10x1	1,21	
	ДОКСИЦИКЛІНУ ГІДРОХЛОРИД	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фарма, Україна/Україна/Україна	капс. у бл.	100мг	№10x1	1,51	
II.	ДОКСИЦИКЛІН-ТЕВА	Меркле ГмБХ (виробництво нерозфасованої продукції та дозвіл на випуск серії; первинна та вторинна упаковка, контроль серії), Німеччина	табл. у бл.	100мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

ЮНІДОКС СОЛЮТАБ®	Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нідерланди	табл., що дисперг. у бл.	100мг	№10	14,26	31,49/€
------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------	-----	-------	---------

• **Тетрациклін (Tetracyclin)**

Фармакотерапевтична група: J01AA07 - АБЗ для системного застосування; тетрацикліни.

Основна фармакотерапевтична дія: бактеріостатичний а/б групи тетрациклінів широкого спектра дії; пригнічує синтез білка блокуванням зв'язування аміноацил-транспортної РНК з комплексом інформаційна РНК-рибосома; активний відносно Гр (+): Staphylococcus spp., у т. ч., що продукують пеніциліназу; Streptococcus spp., у т. ч. Streptococcus pneumoniae; Haemophilus influenzae, Listeria spp., Bacillus anthracis; Гр (-) м/о: Neisseria gonorrhoeae, Bordetella pertussis, Escherichia coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Shigella spp., Rickettsia spp., Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Treponema spp.; стійкі: Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Serratia spp., більшість штамів Bacteroides spp., грибів, дрібні віруси.

Показання для застосування ЛЗ: інфекційно-запальні захворювання^{БНФ}: бронхіт, пневмонія, гнійний плеврит, підгострий септичний ендокардит, бактеріальна і амебна дизентерія, коклюш, ангіна, скарлатина, гонорея, бруцельоз, туляремія, висипний і поворотний тиф, пситакоз, орнітоз, інфекції жовчних і сечовивідних шляхів, гнійний менінгіт, гнійні інфекції шкіри^{БНФ} і м'яких тканин, холера; профілактика післяопераційних інфекцій.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі і діти від 12 років: разова доза - 200 мг кожні 6 год.; при тяжких інфекціях доза може бути збільшена до 500 мг кожні 6 год^{БНФ}; МДД - 2 г; всі інфекції, спричинені β-гемолітичними стрептококами групи А лікувати не менше 10 діб; дозування та тривалість курсу лікування встановлювати індивідуально залежно від характеру та перебігу захворювання; лікування продовжувати ще впродовж 3 діб після зникнення симптомів захворювання.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості (кропив'янка, ангіоневротичний набряк, в т.ч. обличчя та язика, анафілаксія, перикардит, бронхоспазм); анафілактоїдні р-ції (анафілактоїдна пурпура, загострення СЧВ, фіксована медикаментозна еритема, ексфолиативний дерматит, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз); АР, БА; свербіж, гіперемія шкіри, висипання (макулопапульозні, еритематозні), р-ції фотосенсибілізації, бульозні дерматози, порушення пігментації шкіри та слизових оболонок; гемолітична анемія, тромбоцитопенія, нейтропенія, еозинофілія, агранулоцитоз, апластична анемія, хвороба Мошкович; поява в тканині щитовидної залози мікроскопічних ділянок коричнево-чорного забарвлення, без порушень щитовидної залози; вибухання тім'ячка у немовлят та доброякісна внутрішньочерепна гіпертензія у підлітків та дорослих; тимчасова/постійна втрата зору; анорексія, нудота, блювання, сухість у роті, дискомфорт/біль у животі, диспепсія (в т.ч. печія/гастрит), дисфагія, діарея/запор, кишковий дисбактеріоз, панкреатит, езофагіт та утворення виразок стравоходу; гепатотоксичність з транзитним підвищенням рівня печінкових трансаміназ, ЛФ, білірубину в крові, порушенням ф-ції печінки, гепатити, жовтяниця, жирова дистрофія печінки, печінкова недостатність; розвиток суперінфекції, що спричиняє розвиток кандидозу, глоситу з гіпертрофією сосочків, глосифіті, стоматиту, стафілококового ентероколіту, псевдомембранозного коліту, свербіжу в анальній зоні, запального ураження аногенітальної зони, вульвовагініту, баланіту, проктиту; м'язова слабкість у пацієнтів з міастенією гравіс; азотемія, гіперкреатиніємія, нефрит, ГНН; біль у горлі, хриплий голос, фарингіт, гіповітаміноз, постійна зміна кольору зубів, гіпоплазія зубної емалі у дітей, порушення утворення кісткової тканини, уповільнення лінійного росту кісток у дітей.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до тетрацикліну та споріднених а/б, до будь-якого компонента ЛЗ, грибові захворювання; хр. печінкова/ниркова дисфункція; ниркова недостатність, особливо при тяжкому перебігу; СЧВ; одночасне застосування з вітаміном А або ретиноїдами (ризик розвитку доброякісної внутрішньочерепної гіпертензії).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ТЕТРАЦИКЛІНУ ГІДРОХЛОРИД	АТ "ВІТАМІНИ", Україна	табл., в/о у бл.	100мг	№10, №20	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕТРАЦИКЛІНУ ГІДРОХЛОРИД	ПАТ "ВІТАМІНИ", Україна	табл., в/о у бл.	100мг	№10, №20	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕТРАЦИКЛІНУ ГІДРОХЛОРИД	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№20x1	8,46	

• **Тайгециклін (Tigecycline)**

Фармакотерапевтична група: J01AA12 - АБЗ для системного застосування; тетрацикліни.

Основна фармакотерапевтична дія: а/б гліцилциклінового ряду, який інгібує трансляцію білка у бактеріях шляхом приєднання до рибосомної субодиниці 30S та блокування входу молекул аміно-ацил-тРНК в сайт А рибосоми, що перешкоджає включенню амінокислотних залишків у нарощувані пептидні ланцюги; бактеріостатична дія; переважно чутливі Гр (+) аероби: Enterococcus spp., Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Streptococcus agalactiae, група Streptococcus anginosus (S. anginosus, S. intermedius, S. constellatus), Streptococcus pyogenes, стрептококи групи Viridans; переважно чутливі Гр (-) аероби: Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca; переважно чутливі анаероби: Clostridium perfringens, Peptostreptococcus spp., Prevotella spp.; Гр (-) аероби, яким може бути притаманна набута стійкість: Acinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae,

Morganella morganii, Proteus spp., Providencia spp., Serratia marcescens, Stenotrophonas maltophilia; анаероби, яким може бути притаманна набута стійкість: група Bacteroides fragilis; природно стійкі Гр (-) аероби: Pseudomonas aeruginosa.

Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій дорослим та дітям віком від 8 років: ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин за винятком інфекцій діабетичної стопи; ускладнені інтраабдомінальні інфекції^{БНФ}; застосовувати у випадках, коли інші а/б не прийнятні до застосування.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: початкова доза для дорослих - в/в 100 мг, надалі - по 50 мг кожні 12 год впродовж 5-14 днів^{БНФ}, тривалість лікування обирати залежно від тяжкості захворювання, локалізації інфекції та клінічної відповіді пацієнта; діти від 8 до 12 років: 2 мг/кг кожні 12 год в/в, максимальна доза – 50 мг кожні 12 год протягом 5-14 днів; підлітки від 12 до 18 років: 50 мг кожні 12 год протягом 5-14 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сепсис/септичний шок, пневмонія, абсцес, інфекції, подовження активованого часткового тромбoplastинового часу, подовження протромбінового часу, тромбоцитопенія, підвищення міжнародного нормалізованого співвідношення, гіпофібриногенемія, анафілактичні/анафілактоїдні р-ції, гіпоглікемія, гіпопротеїнемія, запаморочення, флебіт, тромбофлебіт, нудота, блювання, діарея, біль у черевній порожнині, диспепсія, анорексія, г. панкреатит, підвищення рівня АсАТ в сироватці крові, підвищення рівня АлАТ в сироватці крові, гіпербілірубінемія, жовтяниця, ураження печінки, здебільшого холестатичні, ПН, свербіж, висипання, тяжкі шкірні р-ції, включаючи с-м Стівенса – Джонсона, погіршення загоєння, р-ції у місці ін'єкції, головний біль, запалення у місці ін'єкції, біль у місці ін'єкції, набряк у місці ін'єкції, флебіт у місці ін'єкції, підвищення рівня амілази в сироватці крові, підвищення рівня азоту сечовини в крові, псевдомембранозний коліт від незначного ступеня тяжкості до такого, що становить загрозу для життя, надмірний ріст нечутливих до а/б м/о, включаючи гриби, підвищена фоточутливість, доброякісна в/черепна гіпертензія, панкреатит та антианаболічна дія, яка призводила до підвищення рівня азоту сечовини в крові, азотемії, ацидозу та гіперфосфатемії, застосування в період розвитку зубів може призвести до стійкої зміни забарвлення зубів.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активної речовини чи до будь-якої з допоміжних речовин ЛЗ; пацієнти, які мають гіперчутливість до а/б тетрациклінового ряду.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ТИГАЦИЛ	Патеон Італія С.п.А. (виробництво продукції in bulk, первинне пакування, контроль якості)/Ваєт Ледерле С.р.Л. (виробництво продукції in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль якості та випуск серії)/Юрофінс - Байолаб С.р.л. (дослідження стерильнос, Італія/Італія/Італія	пор. д/р-ну д/інф. у фл.	50мг	№10	1801,85	28,88/\$

17.2.3. Аміноглікозиди

Мають бактерицидну дію, активні переважно відносно аеробної грам(-) флори сімейства Enterobacteriaceae, причому до амікацину можуть бути чутливими багато штамів бактерій, резистентних до інших аміноглікозидів. Анаероби є резистентними. Стрептоміцин та канаміцин є активними відносно туберкульозних мікобактерій; гентаміцин, тобраміцин, нетилміцин і амікацин – відносно P.aeruginosa. Враховуючи резистентність пневмококів, аміноглікозиди (в т.ч. гентаміцин) не можна застосовувати для лікування позаликарняної П. Активність аміноглікозидів знижується при гіпоксії та ацидозі. Практично не всмоктуються у ЖКТ, вводять парентерально. Погано проникають через тканинні бар'єри, в легені, спино-мозкову рідину, жовч. Не метаболізуються, виводяться нирками. При нирковій недостатності кумулюються, необхідна корекція доз. Фармакокінетика є варіабельною, тому слід проводити терапевтичний лікарський моніторинг. Основними небажаними реакціями є нефротоксичність і ототоксичність, які найчастіше зустрічаються у дітей, людей похилого віку та при вихідному порушенні функції нирок і слуху. Можуть погіршувати нервово-м'язову передачу, не повинні призначатися пацієнтам з міастенією, на фоні та після введ. міорелаксантів. Застосовують при різноманітних інфекціях, в т.ч. нозокоміальних, викликаних аеробною грам(-) флорою; при підозрі на змішану етіологію – у поєднанні з β-лактамами і антианаеробними препаратами (лінкозаміди). Гентаміцин і стрептоміцин використовують також при бактеріальному ендокардиті (у поєднанні з пеніциліном чи ампіциліном).

• Амікацин (Amikacin) *

Фармакотерапевтична група: J01GB06 - АБЗ для системного застосування; аміноглікозиди.

Основна фармакотерапевтична дія: напівсинтетичний а/б широкого спектра дії; проявляє бактерицидну дію; активно проникає через мембрану бактерій, необоротно зв'язується з 30S субодиноцею бактеріальних рибосом, що пригнічує синтез білка збудника; високоактивний відносно аеробних Гр (-) бактерій (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Shigella spp., Salmonella spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Providencia stuartii); активний також щодо деяких Гр (+) бактерій (Staphylococcus spp. (у т.ч. штамів, стійких до пеніциліну, метициліну, деяких цефалоспоринів), деяких штамів Streptococcus spp.); неактивний щодо анаеробних бактерій.

Показання для застосування ЛЗ: інфекції, спричинені чутливими до амікацину штамми м/о, резистентних до інших аміноглікозидів^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати в/м або в/в^{БНФ}; звичайні дози для дітей від 12 років і дорослих: по 5 мг/кг кожні 8 год або по 7,5 мг/кг кожні 12 год; МДД для дорослих - 15 мг/кг/добу^{БНФ}; у тяжких випадках та при

інфекціях, спричинених *Pseudomonas*, добову дозу розподілити на 3 введення: МДД - 1,5 г^{БНФ}, максимальна курсова доза - 15 г; тривалість лікування при в/в введенні - до 7 днів, при в/м - 7 - 10 днів; для недоношених новонароджених: початкова доза 10 мг/кг^{БНФ}, а потім кожні 18-24 год. по 7,5 мг/кг протягом 7-10 діб; для доношених новонароджених і дітей до 12 років: початкова доза 10 мг/кг, потім 7,5 мг/кг кожні 12 год. протягом 7-10 діб; вводити в/в інфузійно дорослим і дітям, використовуючи об'єм рідини, достатній для крапл. вливання, протягом 60-90 хв (зі швидкістю 50 крап. за 1 хв.), а новонародженим - протягом 1-2 год.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: суперінфекції або колонізація резистентними бактеріями чи дріжджами, анемія, лейкопенія, гранулоцитопенія, тромбоцитопенія, нудота, блювання, порушення ф-ції печінки (підвищення активності печінкових трансаміназ, гіпербілірубінемія), гіпомагніємія, шкірні висипи, свербіж, кропив'янка, гіперемія шкіри, гарячка, набряк Квінке, анафілактичний шок, р-ції гіперчутливості, анафілактичні р-ції, анафілактичні р-ції, артеріальна гіпотензія, головний біль, тремор, парестезії, порушення координації, сонливість, нейротоксична дія (посмикування м'язів, відчуття оніміння, поколювання, епілептичні напади), порушення нервово-м'язової передачі (зупинка дихання), параліч, ототоксичність (зниження слуху, шум у вухах, вестибулярні і лабіринтні порушення, оборотна глухота), глухота, нейросенсорна глухота токсична дія на вестибулярний апарат (дискоординація рухів, запаморочення, нудота, блювання), сліпота, інфаркт сітківки, апное, бронхоспазм, артралгії, м'язові тремтіння, порушення ф-ції нирок (олігурія, протеїнурія, гематурія, альбумінурія, гіперазотемія, підвищення рівня креатиніну крові, лейкоцитурія), ГНН, токсична нефропатія, циліндрурія, р-ції у місці введення, біль у місці введення ін'єкції, гіпертермія

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до амікацину, до інших компонентів ЛЗ або до будь-якого іншого а/б аміноглікозидної групи та їх похідних; ниркова недостатність; неврит слухового нерва; азотемія (залишковий азот вище 150 мг %); міастенія гравіс; порушення ф-ції вестибулярного апарату; попереднє лікування ото- або нефротоксичними ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АМІКАЦИД	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл у фл. в конт. чар/уп.	250 мг/мл	№5x2	111,42	
	АМІКАЦИД	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл у фл. в пач.	250 мг/мл	№1	111,42	
	АМІКАЦИД	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/ін'єк. по 4мл у фл. в конт. чар/уп.	250 мг/мл	№5x2	89,14	
	АМІКАЦИД	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/ін'єк. по 4мл у фл. в пач.	250 мг/мл	№1	89,14	
	АМІКАЦИНУ СУЛЬФАТ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у бл.	50мг/мл; 250мг/мл	№1, №5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМІКАЦИНУ СУЛЬФАТ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у однобіч. бл.	250 мг/мл	№1	111,20	
	АМІКАЦИНУ СУЛЬФАТ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 4мл в амп. у однобіч. бл.	250 мг/мл	№1	89,10	
	АМІЦИЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	250мг	№1	132,00	
	АМІЦИЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	0,5г	№1	96,60	
	АМІЦИЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	72,60	
II.	ФЛЕКСЕЛІТ	БРОС ЛТД, Греція	р-н д/ін'єк. по 1мл, 2мл, 4мл в амп. у бл.	250 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Гентаміцин (Gentamicin) ***

Фармакотерапевтична група: J01GB03 - АБЗ для системного застосування; аміноглікозиди.

Основна фармакотерапевтична дія: а/б групи аміноглікозидів II покоління з широким спектром дії; активно проникаючи через клітинну мембрану бактерій, необоротно зв'язується з 30S субодиницею, перешкоджаючи утворенню комплексу транспортної і матричної РНК, що порушує синтез білка збудника.; високоактивний відносно різних видів Гр (+) і Гр (-) м/о: *Escherichia coli*, *Proteus* spp. (індолпозитивний та індолнегативний), *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella* spp., *Enterobacter* spp., *Citrobacter* spp., *Salmonella* spp., *Shigella* spp. і *Staphylococcus* spp. (включаючи пеніцилін- і метицилінстійкі штами); до нього стійкі: *Streptococcus pneumoniae*, більшість інших видів стрептококів, ентерококів, *Neisseria meningitidis*, *Treponema pallidum* та анаеробні м/о (*Bacteroides* spp. або

Clostridium spp.); є одним з основних засобів боротьби з тяжкою гнійною інфекцією, особливо зумовленою резистентною *Gr (-)* флорою.

Показання для застосування ЛЗ: застосовувати у випадках, коли м/о резистентні до більш безпечних а/б; призначати для лікування інфекцій, спричинених чутливими до нього збудниками: септицемія^{ВООЗ, БНФ} (включаючи неонатальний сепсис); ускладнені уrogenітальні інфекційні захворювання; інфекційні захворювання нижніх відділів дихальних шляхів^{ВООЗ, БНФ}, інфекційні захворювання шкіри^{ВООЗ}, кісток, суглобів, м'яких тканин^{ВООЗ}, інфіковані опікові рани, інфекційні захворювання ЦНС (включаючи менінгіт)^{ВООЗ, БНФ} у комбінації з β-лактамами а/б, інфекції черевної порожнини (включаючи перитоніт)^{ВООЗ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують в/м або в/в; дозовий режим розраховується, виходячи з маси тіла пацієнта; дорослі і діти від 14 років: для пацієнтів із помірним/тяжким перебігом інфекційного процесу добова доза - 3 мг/кг в/м або в/в (розподілена на 2-3 введення)^{БНФ}, МДД - 5 мг/кг. (розподілена на 3-4 введення)^{ВООЗ}; тривалість застосування для всіх пацієнтів - 7-10 діб; при тяжких та ускладнених інфекціях курс терапії може бути продовжений; дозу розраховують на фактичну масу тіла (ФМТ), якщо у пацієнта немає надлишкової маси тіла (тобто додатково не більше 20% до ідеальної маси тіла (ІМТ)); якщо пацієнт має надлишок маси тіла, доза розраховується за формулою: $ІМТ + 0,4 (ФМТ - ІМТ)$; дітям до 3 років призначають винятково за життєвими показаннями; добові дози для новонароджених і дітей до 1 року - 2-5 мг/кг^{ВООЗ, БНФ}, дітям 1-5 років - 1,5-3 мг/кг, 6-14 років - 3 мг/кг; МДД для дітей всіх вікових груп - 5 мг/кг; вводять 2-3 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ототоксичність (ушкодження восьмої пари черепно-мозкових нервів): може розвиватися зниження гостроти/втрата слуху та ураження вестибулярного апарату, запаморочення або вертиго, шум у вухах, втрата слуху, ураження нирок проявляється протеїнурією, азотемією, олігурією, і, як правило, має оборотний характер, можливі інтерстиціальний нефрит, НН, нирковий тубулярний некроз, головний біль, сплутаність свідомості, сонливість, периферична нейропатія, м'язовий біль, біль у суглобах, блокада нервово-м'язової провідності, загальна слабкість, судоми, енцефалопатія, депресія, галюцинації, летаргія, блювання, підвищення рівня АЛТ, АСТ, гіпербілірубінемія, нудота, підвищене слиновиділення, втрата апетиту/маси тіла, стоматит, псевдомембранозний коліт, тромбоцитопенія, гранулоцитопенія, анемія, лейкопенія, пурпура, гіпомагніємія, гіпокаліємія, гіпокальціємія, р-ції гіперчутливості, включаючи шкірний свербіж/висипання, кропив'янка, пропасниця, анафілактичні р-ції (у т. ч. зниження АТ, задишка), набряк Квінке, у місці в/м введення можливі біль, атрофія/некроз підшкірної клітковини; при в/в введенні - розвиток флебітів і перифлебітів.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до компонентів препарату/антибіотиків групи аміноглікозидів, ХНН з азотемією та уремією, неврит слухового нерва, міастенія, паркінсонізм, ботулізм (гентаміцин може спричинити порушення нервово-м'язової передачі, що може призвести до подальшого ослаблення скелетної мускулатури), літній вік, попереднє лікування ототоксичними препаратами, обмеженням до застосування є ГНН.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,24 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЕНТАМІЦИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл, 2мл в амп. у кор. та бл.	40 мг/мл	№10, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЕНТАМІЦИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у кор. або бл.	40 мг/мл	№10, №10x1	14,21	
	ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у конт. чар/уп. запаян. папер.	40 мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у конт. чар/уп. в пач.	40 мг/мл	№10x1	9,00	
	ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у конт. чар/уп.	40 мг/мл	№5x2	10,55	

• **Канаміцин (Kanamycin)** * [ГМД]

Фармакотерапевтична група: J01GB04 - протимікробні ЛЗ для системного застосування; аміноглікозиди.

Основна фармакотерапевтична дія: а/б широкого спектра дії; чинить бактерицидну дію на *Gr (+)* та *Gr (-)* м/о, а також на кислотостійкі бактерії; діє на штами МБТ, на стійкі до стрептоміцину, ПАСК, ізоніазиду; зв'язується з 30S субодиницею рибосомальної мембрани, порушує синтез білка в мікробній клітині; ефективний відносно м/о, резистентних до тетрацикліну, еритроміцину, левоміцетину; не діє на анаеробні м/о, дріжджі, віруси та більшість найпростіших.

Показання для застосування ЛЗ: тяжкі гнійно-септичні захворювання (сепсис, менінгіт, перитоніт, септичний ендокардит); інфекційно-запальні захворювання органів дихання (пневмонія, емпієма плеври, абсцес легенів); інфекції нирок і сечовивідних шляхів; гнійні ускладнення у післяопераційному періоді; інфіковані опіки, туберкульоз^{ВООЗ, ПМД} легенів і туберкульозні ураження інших органів, спричинені м/о, резистентними до ПТП I та II ряду та чутливими до канаміцину.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають в/м, готують *ex tempore*, додаючи до вмісту флакона (1 г) 4 мл стерильної води д/ін'єкцій або 0,25-0,5 % р-ну новокаїну, для дітей як розчинник застосовують лише воду д/ін'єкцій; лікування інфекцій нетуберкульозної етіології: для дорослих разова доза - 0,5 г кожні 8-12 год., добова доза - 1-1,5 г, максимальна разова доза - 1 г з інтервалом між введеннями 12 год., МДД - 2 г, тривалість лікування - 5-7 днів, залежно від тяжкості захворювання, ефективності лікування та перебігу захворювання тривалість лікування може бути змінена; дітям до 1 року при інфекціях нетуберкульозної етіології (у виняткових випадках) - середня добова доза 0,1 г; віком 1-5 років - 0,1-0,3 г; віком від 5 років - 0,3-0,5 г; МДД - 15 мг/кг, кратність введення - 2-3 р/добу, тривалість лікування - 5-7 днів; при лікуванні туберкульозу: дорослим - по 1 г 1 р/добу, дітям - по 15 мг/кг 6 днів на тиждень з перервою на 7-й день; кількість циклів і загальна тривалість лікування визначаються стадією та особливостями перебігу захворювання.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ототоксичність (ураження VIII пари черепно-мозкових нервів), розвиток неврити слухового нерва (шум, дзвін або відчуття закладеності у вухах, зниження гостроти слуху); порушується сприйняття високих частот (що виявляється при аудіометрії); необоротне порушення розпізнавання мовлення, помітне для пацієнта; ураження вестибулярного апарату (запаморочення, вертиго, порушення координації рухів); нейротоксичність (енцефалопатія, сплутаність свідомості, летаргія, галюцинації, депресія); периферична нейропатія; нервово-м'язова блокада (проявляється пригніченням дихання внаслідок паралічу дихальних м'язів, головний біль, загальна слабкість, сонливість, посмикування м'язів, парестезія, судоми); нефротоксичність, г. тубулярний некроз, інтерстиціальний нефрит, зниженням ШКФ, підвищенням рівня креатиніну в сироватці крові, мікрогематурія, альбумінурія, циліндрурія; гіпомагніємія, гіпокальціємія, гіпокаліємія; нудота, блювання, діарея, дисбактеріоз; артеріальна гіпотензія; стоматит; висипання, свербіж, набряк, гіперемія шкіри, анафілактоїдні р-ції; подразнення та біль у місці введення, гіперемія, синці, гематома, ущільнення, атрофія або некроз п/ш клітковини; пурпура; підвищення рівня амінотрансфераз сироватки крові, підвищення рівня білірубіну; анемія, лейкопенія, гранулоцитопенія, тромбоцитопенія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до канаміцину та інших аміноглікозидів в анамнезі; міастенія; неврит слухового нерва; паркінсонізм; ботулізм; непрохідність кишечника; тяжкі порушення ф-ції нирок (КлКр <10 мл/хв).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КАНАМІЦИН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	1г	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАНАМІЦИН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	12,18	
II.	КАНАМАК-1000	МАКЛЕОДС ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛІМІТЕД, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	45,07	27,16/\$

- **Тобраміцин (Tobramycin)** (див. п. 4.8. розділу "ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ")

Комбіновані препарати

- **Цефепім + Амікацин (Cefepime + Amikacin)** (див. п. 17.2.1.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

17.2.4. Макроліди

Мають бактеріостатичну дію й переважно активні відносно грам(+) коків (крім MRSA і ентерококів) та внутрішньоклітинних збудників (хламідії, мікоплазми, леґіонели, кампілобактери). Грам(-) м/о сімейства Enterobacteriaceae *P.aeruginosa* і *B.fragilis* є резистентними. Серед макролідів помірну активність проти *H.influenzae* мають кларитроміцин і азитроміцин. Задовільно всмоктуються при пероральному прийомі (їжа знижує біодоступність) та розподіляються у багатьох тканинах і секретах (погано проникають через гематоенцефалічний бар'єр). Створюють високі тканинні й внутрішньоклітинні концентрації. Метаболізуються в печінці, виводяться, в основному, через ШКТ. При нирковій недостатності корекцію доз не проводять (виняток – кларитроміцин). Найчастіші небажані реакції – диспепсичні явища. АР спостерігаються рідко. При в/в введ. може розвиватися флебіт.

Більшість ЛЗ (особливо еритроміцин і кларитроміцин) є сильними інгібіторами цитохрому Р-450, тому на фоні їх застосування ослаблюється біотрансформація й підвищується $C_{пл}$ ЛЗ, які метаболізуються у печінці (теофіліну, варфарину, циклоспорину та ін.). Також можливе подовження інтервалу Q – T. Застосовують при інфекціях верхніх та нижніх дихальних шляхів, шкіри і м'яких тканин, урогенітальних інфекціях та інфекціях ротової порожнини. Еритроміцин – препарат вибору при леґіонельозі, для профілактики г. ревматичної лихоманки (при алергії до пеніциліну) і для деконтамінації кишечника перед колоректальними операціями. Кларитроміцин застосовують для лікування і профілактики опортуністичних інфекцій при СНІДі, викликаних деякими атипичними мікобактеріями, а також для ерадикації *H.pylori* при виразковій хворобі ДПК. Спіраміцин застосовують для лікування токсоплазмозу, в т.ч. у вагітних.

Перевагами спіроміцину, кларитроміцину, азитроміцину, рокситроміцину, мідекаміцину і джозаміцину перед еритроміцином є покращена фармакокінетика, переносимість та менша кратність застосування.

- **Еритроміцин (Erythromycin)** *

Фармакотерапевтична група: J01FA01 - АБЗ для системного застосування; макроліди, еритроміцин.

Основна фармакотерапевтична дія: макролідний а/б бактеріостатичної дії; у великих концентраціях і відносно високочутливих м/о може мати бактерицидний ефект; проникає крізь клітинну мембрану бактерій і оборотно

зв'язується з субодиноцею 50S бактеріальних рибосом; гальмує транслокацію пептидів з акцепторної ділянки рибосоми до донорської, перешкоджаючи подальшому синтезу білка; активний відносно Gr (+) бактерій: *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus viridans*, *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Listeria monocytogenes*; Gr (-) бактерій: *Neisseria meningitidis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Bordetella pertussis*, *Legionella pneumophila*, *Moraxella catarrhalis*, *Campylobacter* spp., деяких штамів *Haemophilus influenzae*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Ureaplasma urealyticum*, а також відносно *Chlamydia trachomatis*, *Treponema pallidum*; до еритроміцину стійкі Gr (-) палички: кишкова, синьогнійна, а також шигели, сальмонели; неефективний при лікуванні інфекцій, спричинених грибами, вірусами, дріжджами.

Показання для застосування ЛЗ: інфекції дихальних шляхів, у т. ч. атипова пневмонія^{БНФ} вооз, інфекції ЛОР-органів^{БНФ} (отит, синусит, тонзиліт^{вооз}), гнійно-запальні захворювання шкіри та її придатків^{вооз} БНФ; дифтерія^{вооз} БНФ, гонорея, сифіліс^{вооз}, лістеріоз, хвороба леґіонерів^{вооз} БНФ, інфекції у стоматології та офтальмології, інфекції, спричинені м/о, стійкими до β-лактамних антибіотиків, пеніциліну, вооз БНФ тетрацикліну, левоміцетину, хлорамфеніколу, стрептоміцину.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують р/ос, дозу встановлюють індивідуально, залежно від локалізації та тяжкості перебігу інфекції, чутливості збудника; призначають дорослим по 200-500 мг 4 р/добу^{вооз} (1-2 г/добу); вища разова доза - 500 мг, МДД - 2 г; дітям: 3-6 років - по 500-700 мг/добу; 6-8 років - по 700 мг/добу; 8-14 років - до 1 г/добу (розділивши добову дозу на 4 приййоми); понад 14 років - у дозі для дорослих^{БНФ}; курс лікування - 5-14 днів, після зникнення симптомів захворювання застосовують ще протягом 2 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: подовження інтервалу QT на ЕКГ, відчуття серцебиття, шлуночкові аритмії, в тому числі шлуночкова тахікардія, шлуночкова фібриляція та аритмія типу «torsade de pointes», зупинка серця, зниження слуху та/або шум у вухах, який зникає після відміни препарату, оборотна втрата слуху, головним чином у пацієнтів з нирковою недостатністю та у пацієнтів, які отримували високі дози еритроміцину (понад 4 г/добу), біль в епігастрії, нудота, блювання, діарея, панкреатит, анорексія, гіпертрофічний пілоростеноз у дітей, рідко повідомлялося про виникнення псевдомембранозного коліту біль у грудях, лихоманка, нездужання, холестатичний гепатит, жовтяниця, печінкова дисфункція, гепатомегалія, печінкова недостатність, гепатоцелюлярний гепатит, АР, включаючи реакції анафілаксії, у т.ч. анафілактичний шок, підвищення рівня «печінкових» ферментів у сироватці крові, окремі повідомлення про транзиторні побічні реакції ЦНС, включаючи сплутаність свідомості, судоми, запаморочення, кошмарні сновидіння, галюцинації, мітохондріальна оптична нейропатія, інтертерстиціальний нефрит, висипання на шкірі, свербіж, кропив'янка, екзантема, ангіоневротичний набряк, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, мультиформна еритема; г. генералізований екзантематозний пустульоз, : гіпотензія, суперінфекція, спричинена стійкими до препарату бактеріями, кандидоз порожнини рота, кандидоз піхви; поява симптомів міастенічного с-му/загострення існуючої *myasthenia gravis*.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до еритроміцину або до будь-якого компонента ЛЗ, до макролідів; тяжка печінкова недостатність; наявність в анамнезі пацієнта подовження інтервалу QT (вродженого або набутого, підтверженого документально) або шлуночкової аритмії серця, включаючи «torsade de pointes»; порушення електролітного балансу (гіпокаліємія, гіпомагнезіємія - через ризик подовження інтервалу QT); одночасне застосування з симвастатином, домперидоном, толтероїдином, мізоластіном, амісульпридом, терфенадином, астемином, пімозидом або цизапридом, ерготаміном та дигідроерготаміном.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕРИТРОМІЦИН	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл. у бл.	100мг	№20x1	10,37	
	ЕРИТРОМІЦИН	АТ "ВІТАМІНИ", Україна	табл., в/о к/р у бл.	100мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕРИТРОМІЦИН	ПАТ "ВІТАМІНИ", Україна	табл., в/о к/р у бл.	100мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Азитроміцин (Azithromycin)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: J01FA10 - АБЗ для системного застосування; макроліди, лінкозаміди та стрептограміни.

Основна фармакотерапевтична дія: макролідний а/б, належить до групи азалідів; інгібує синтез бактеріального білка за рахунок зв'язування з 50 S-субодиноцею рибосом і пригнічення транслокації пептидів; повна перехресна резистентність існує серед *Streptococcus pneumoniae*, β-гемолітичного стрептококу групи А, *Enterococcus faecalis* та *Staphylococcus aureus*, включаючи метицилін-резистентний золотистий стафілокок (MRSA), до еритроміцину, азитроміцину, інших макролідів і лінкозамідів; зазвичай чутливі види: аеробні Gr (+) бактерії - *Staphylococcus aureus* метицилін-чутливий, *Streptococcus pneumoniae* пеніцилін-чутливий, *Streptococcus pyogenes*; аеробні Gr (-) бактерії - *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus parainfluenzae*, *Legionella pneumophila*, *Moraxella catarrhalis*, *Pasteurella multocida*; анаеробні бактерії - *Clostridium perfringens*, *Fusobacterium* spp., *Prevotella* spp., *Porphyromonas* spp.; інші м/о - *Chlamydia trachomatis*, *Chlamydia pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae*; види, для яких набула резистентність може бути проблемою: аеробні Gr (+) бактерії - *Streptococcus pneumoniae* з проміжною чутливістю до пеніциліну і пеніцилін-резистентний; вродженорезистентні організми: аеробні Gr (+) бактерії - *Enterococcus faecalis*, стафілококи MRSA, MRSE, анаеробні бактерії - група бактероїдів *Bacteroides fragilis*.

Показання для застосування ЛЗ: інфекції, спричинені м/о чутливими до азитроміцину: р/ос при інфекціях ЛОР-органів^{БНФ} (бактеріальний фарингіт/тонзиліт, синусит, середній отит^{БНФ}); інфекціях дихальних шляхів^{БНФ, ГМД} (бактеріальний бронхіт, негоспітальна пневмонія^{БНФ}); інфекціях шкіри та м'яких тканин (мігруюча еритема - початкова стадія хвороби Лайма^{БНФ}, бешиха, імпетиго, вторинні піодерматози, акне вульгаріс (вугрі звичайні) середнього ступеня тяжкості; інфекціях, що передаються статевим шляхом (неускладнені генітальні інфекції, спричинені *Chlamydia trachomatis*^{ВООЗ, БНФ}); парентерально при інфекціях спричинені м/о чутливими до азитроміцину, які потребують початкової інфузійної терапії: негоспітальна пневмонія^{БНФ}, запалення тазових органів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос та в/в; при інфекціях ЛОР-органів і дихальних шляхів, шкіри та м'яких тканин^{БНФ} (окрім хр. мігруючої еритеми): тривалість лікування 3 дні, для дітей з масою тіла ≥ 45 кг та дорослих по 500 мг 1 р/добу^{БНФ}; при інфекціях, що передаються статевим шляхом: 1 г одноразово, курсова доза - 1 г^{ВООЗ, БНФ}; мігруюча еритема - загальна доза 3 г, приймати за схемою: 1000 мг у перший день, після чого - по 500 мг 1 р/добу^{БНФ} з 2-го по 5-й день; діти інфекції ЛОР-органів, дихальних шляхів, шкіри та м'яких тканин (окрім хр. мігруючої еритеми^{БНФ}) - 10 мг/кг маси тіла 1 р/добу 3 дні^{БНФ}; мігруюча еритема - тривалість лікування 5 днів, у 1-й день прийняти 20 мг/кг маси тіла азитроміцину, з 2 по 5 день приймати по 10 мг/кг маси тіла, загальна курсова доза становить 60 мг/кг; негоспітальна пневмонія: дорослим парентерально в/в по 500 мг 1 р/день щонайменше протягом 2 днів, у подальшому терапія р/ос по 500 мг 1 р/добу, загальна тривалість лікування 7-10 днів^{БНФ}; при запалення тазових органів: в/в 500 мг 1 р/день, у подальшому р/ос терапія по 250 мг 1 р/день у вигляді одноразової добової дози, загальна тривалість лікування 7 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кандидоз, оральний кандидоз, піхвові інфекції, пневмонія, грибова інфекція, бактеріальна інфекція, фарингіт, гастроентерит, порушення ф-ції дихання, риніт, псевдомембранозний коліт, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія, гемолітична анемія, еозинофілія, ангіоневротичний набряк, р-ції гіперчутливості, анафілактична р-ція, анорексія, нервозність, безсоння, ажитація, агресивність, неспокій, делірій, галюцинації, головний біль, запаморочення, сонливість, дисгевзія, парестезія, непритомність, судоми, гіпестезія, психомоторна підвищена активність, аносмія, агевзія, паросмія, міастенія гравіс, порушення зору, розлади з боку органів слуху, порушення слуху, включаючи глухоту та/або дзвін у вухах вертиго, пальпітація, тріпотіння-мерехтіння шлуночків (torsade de pointes), аритмія, включаючи шлуночкову тахікардію, подовження QT-інтервалу на ЕКГ, припливи, артеріальна гіпотензія, диспное, носова кровотеча, діарея, блювання, біль у животі, нудота, запор, метеоризм, диспепсія, гастрит, дисфагія, сухість у роті, відрижка, виразки у ротовій порожнині, гіперсекреція слини, панкреатит, зміна кольору язика, порушення ф-ції печінки, холестатична жовтяниця, ПН (яка рідко призводила до летального наслідку), фульмінантний гепатит, некротичний гепатит, висипання, свербіж, кропив'янка, дерматит, сухість шкіри, гіпергідроз, фоточутливість, г.генералізований екзантематозний пустульоз, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, поліморфна еритема, р-ція на ЛЗ з еозинофілією та системними симптомами, остеоартрит, міалгія, біль у спині, біль у шиї, артралгія, дизурія, біль у нирках, ГНН, інтерстиціальний нефрит, маткова кровотеча, тестикулярні порушення, набряк, астенія, нездужання, втома, набряк обличчя, біль у грудях, гіпертермія, біль, периферичний набряк, знижена кількість лімфоцитів, підвищена кількість еозинофілів, знижений рівень бікарбонату крові, підвищення рівня базофілів, підвищення рівня моноцитів, підвищення рівня нейтрофілів, підвищений рівень АСТ, підвищений рівень АЛТ, підвищений рівень білірубину в крові, підвищений рівень сечовини в крові, підвищений рівень креатиніну в крові, зміни показників калію у крові, підвищення рівня лужної фосфатази, підвищення рівня хлориду, підвищення рівня глюкози, підвищення рівня тромбоцитів, зниження рівня гематокриту, підвищення рівня бікарбонату, відхилення рівня натрію.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до азитроміцину, еритроміцину або до будь-якого макролідного чи кетолідного а/б або до будь-якого іншого компонента ЛЗ, не призначати одночасно з похідними ріжків.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0.3 г., парентерально - 0.5 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	АЗИМЕД®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	капс. у бл.	250мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЗИМЕД®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	капс. у бл.	250мг	№6x1	18,40	
	АЗИМЕД®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЗИМЕД®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№3x1	17,25	
	АЗИМЕД®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. для 30мл орал. сусп. у фл. з калібр. шпр. та мір. ложк.	200мг/5мл	№1	32,78	
	АЗИМЕД®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. для 20мл орал. сусп. у фл. з калібр. шпр. та мір. ложк.	100мг/5мл	№1	63,00	
	АЗИТРОМІЦИН-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	капс. у бл.	250мг	№6x1	12,00	

АЗИТРОМІЦИН-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	капс. у бл.	500мг	№3x1	12,60	
АЗИТРОМІЦИН-БХФЗ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	капс. у бл.	250мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
АЗИТРОМІЦИН-БХФЗ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	капс. у бл.	250мг	№6x1	10,39	
АЗИТРОМІЦИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	капс. у бл.	125мг	№6x1	20,11	
АЗИТРОМІЦИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	капс. у бл.	250мг	№6x1	17,94	
АЗИТРОМІЦИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	капс. у бл.	500мг	№3x1	19,85	
АЗИТРОМІЦИН-КР	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	капс. у бл.	0,25г	№6x1	8,00	
АЗИТРОМІЦИН-КР	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	капс. у бл.	0,5г	№3x1	10,00	
АЗИТРОМІЦИН-КР	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	пор. гран. д/орал. сусп. у бан. по 25,4г	200мг/ 5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
АЗИТРОМІЦИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	500мг	№1	182,52	
АЗИЦИН®	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	капс. у конт. чар/уп.	250мг	№6x1	13,14	
АЗИЦИН®	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., в/о у конт. чар/уп.	500мг	№3x1	14,73	
ЗИОМІЦИН®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД/ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Індія/Україна	табл., в/о у бл.	250мг	№21x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЗИОМІЦИН®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД/ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Індія/Україна	табл., в/о у бл.	250мг	№6x1	15,86	
ЗИОМІЦИН®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД/ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Індія/Україна	табл., в/о у бл.	500мг	№3x1	15,86	26,97/\$
ОРМАКС	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна	капс. у конт.	250мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ОРМАКС	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна	капс. у конт.	250мг	№6x1	26,58	
ОРМАКС	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна",	пор. для 20мл орал. сусп. у	100мг/ 5мл	№1	74,93	

		Україна	конт. з доз. лож. та шпр.				
	ОРМАКС	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна	пор. для 30мл орал. сусп. у конт. з доз. лож. та шпр.	200мг/5мл	№1	36,15	
	ОРМАКС	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна	пор. для 20мл орал. сусп. у конт. з доз. лож. та шпр.	200мг/5мл	№1	49,83	
II.	АЗАКС®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл., в/о у бл.	500мг	№3x1	20,72	26,42/\$
	АЗИБІОТ®	КРКА, д.д., Ново место/КРКА, Польща Сп.з.о.о., Словенія/Польща	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№3x1	27,36	30,27/€
	АЗИБІОТ®	КРКА, д.д., Ново место (первинне та вторинне пакування, контроль серії, випуск серії; контроль серії)/Саншайн Лейк Фарма Ко., Лтд. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування)/ТАД Фарма ГмбХ (вторинне пакування), Словенія/Китай/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№6x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЗИБІОТ®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", контроль серії та випуск серії; первинне та вторинне пакування), Словенія	пор. для 15мл, 22,5мл, 30мл, 37,5мл орал. сусп. у скл. фл.	40мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЗИБІОТ®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", контроль серії та випуск серії, первинне та вторинне пакування), Словенія	пор. для 15мл, 20мл орал. сусп. у скл. фл.	20мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЗИПОЛ	АТ "Адамед Фарма", Польща	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№3x2	15,02	28,22/\$
	АЗИПОЛ	АТ "Адамед Фарма", Польща	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№2x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЗИПОЛ	АТ "Адамед Фарма", Польща	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№3x1	14,40	26,67/\$
	АЗИТРО САНДОЗ®	Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С. (виробництво нерозфасованої продукції)/Салютас Фарма ГмбХ (первинна та вторинна упаковка, контроль серії, дозвіл на випуск серії)/С.К. Сандоз С.Р.Л. (виробництво за повним циклом), Туреччина/Німеччина/Румунія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг, 500мг	№3x1, №6x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЗИТРО САНДОЗ®	С. К. Сандоз С. Р. Л., Румунія	пор. для 20мл, 30мл орал. сусп. у фл.	100мг/5мл, 200мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЗИТРОКС® 500	ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№3x1	24,31	27,08/\$
	АЗИТРОМАКС	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у фл.	250мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЗИТРОМАКС	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у бл.	250мг	№6x1	18,72	26,44/\$
	АЗИТРОМАКС	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у фл.	600мг	№30	19,66	26,81/\$
	АЗИТРОМІЦИН	Джубілант Дженерікс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг, 500мг	№6x1, №3x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЗИТРОМІЦИН 1000	Фламініго Фармасьютикалс Лтд./Артура Фармасьютикалз Пвт. Лтд., Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	1000мг	№4x1	5,04	25,84/\$
	АЗИТРОМІЦИН 250	Фламініго Фармасьютикалс Лтд./Артура Фармасьютикалз Пвт. Лтд./Копран Лімітед, Індія/Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№6x1	5,98	25,54/\$
	АЗИТРОМІЦИН 500	Фламініго Фармасьютикалс Лтд./Артура Фармасьютикалз Пвт. Лтд./Артура Фармасьютикалз Пвт.	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№3x1	9,56	28,11/\$

	Лтд./Копран Лімітед, Індія/Індія/Індія						
АЗИТРОМИЦИН ГРІНДЕКС	Блуфарма-Індустрія Фармацевтика, С.А., Португалія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№3x1	17,47	30,65/€	
АЗИТРОМИЦИН ЄВРО	Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	табл., в/о у бл.	125мг	№6x1	відсутня у реєстрі ОВЦ		
АЗИТРОМИЦИН ЄВРО	Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	табл., в/о у бл.	250мг	№6x1	7,75	27,60/\$	
АЗИТРОМИЦИН ЄВРО	Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	табл., в/о у бл.	500мг	№3x1	8,85	27,60/\$	
АЗІААР	ІММАКУЛ ЛАЙФСАЙЄНСИЗ ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД, Індія	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	500мг	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ		
АЗО	Туліп Лаб Пвт. Лтд., Індія	табл., в/о у бл.	500мг	№3x1	відсутня у реєстрі ОВЦ		
АЗТЕК	ФДС Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг, 500мг	№6x1, №3x1	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ЗИБАКС	Бафна Фармасьютикалс Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг; 500мг	№3x1; №6x1	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ЗИБАКС	Бафна Фармасьютикалс Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№6x1	16,42	28,12/\$	
ЗИБАКС	Бафна Фармасьютикалс Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№3x1	19,29	28,12/\$	
ЗИРОМИН	Біофарма Ілач Сан.ве Тідж. А.Ш./УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина/Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№3x1	17,90	28,05/\$	
ЗИТРОКС	Іммакул Лайфсайєнсиз Приват Лімітед, Індія	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	500мг	№1, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ЗИТРОКС	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., в/о у стрип.	250мг	№6x1	15,23	23,95/\$	
ЗИТРОКС	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., в/о у стрип.	500мг	№3x1	15,23	23,95/\$	
ЗОКСІ	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг, 500мг	№3x1, №3x2	відсутня у реєстрі ОВЦ		
МІТРОЗИД	ІММАКУЛ ЛАЙФСАЙЄНСИЗ ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД, Індія	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	500мг	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ		
СУМАМЕД®	ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія	пор. д/орал. сусп. у фл. по 20мл (зі смак. полун.)	100мг/ 5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ		
СУМАМЕД®	ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія	табл., що дисперг. у бл.	125мг, 250мг, 500мг, 1000мг	№1, №3, №6	відсутня у реєстрі ОВЦ		
СУМАМЕД®	ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія	табл., вкриті п/о у бл.	125мг, 500мг	№2, №3, №6	відсутня у реєстрі ОВЦ		
СУМАМЕД®	ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія	капс. у бл.	250мг	№6x1	відсутня у реєстрі ОВЦ		
СУМАМЕД®	ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія	пор. для 20мл орал. сусп. у фл.	100мг/ 5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ		
СУМАМЕД® ФОРТЕ	ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія	пор. для 15мл, 30мл, 37,5мл орал. сусп. у фл. (зі смак. бан., полун. та малин.)	200мг/ 5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ		
СУМАМЕД® ФОРТЕ	ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія	пор. для 15мл, 30мл, 37,5мл орал. сусп. у фл.	200мг/ 5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ХЕМОМИЦИН®	"Хемофарм" АД, Вршац, відділ виробнича дільниця Шабац	капс. тверді у бл.	250мг	№6x1	17,20	30,72/€	

	(виробництво нерозфасованої продукції)/"Хемофарм" АД (первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії), Сербія/Сербія					
ХЕМОМІЦИН®	"Хемофарм" д.о.о. (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості)/"Хемофарм" АД (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості, дозвіл на випуск серії), Боснія і Герцеговина/Сербія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№3х1	18,43	30,72/€

● **Кларитроміцин (Clarithromycin)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: J01FA09 - протимікробні ЛЗ для системного застосування; макроліди.

Основна фармакотерапевтична дія: напівсинтетичний а/б групи макролідів; антибактеріальна дія визначається його зв'язуванням з 50S-рибосомальною субодиноцею чутливих бактерій і пригніченням біосинтезу білка; виявляє високу ефективність проти широкого спектра аеробних та анаеробних Гр (+) та Гр (-) м/о, у т. ч. госпітальних штамів; активний відносно аеробних Гр (+) м/о: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Listeria monocytogenes; аеробних Гр (-) м/о: Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Legionella pneumophila; інших м/о: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae (TWAR); мікобактерій: Mycobacterium leprae, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium avium complex (MAC), які включають Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellulare; β-лактамази м/о не впливають на ефективність кларитроміцину; більшість метицилін- та оксацилінрезистентних штамів стафілококів не чутливі до кларитроміцину.

Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій, спричинених чутливими до кларитроміцину м/о: інфекції ВДШ ^{БНФ}: носоглотки (синусит, тонзиліт, фарингіт), додаткових пазух носа; інфекції НДШ (бронхіт, г. крупозна пневмонія та первинна атипова пневмонія) ^{БНФ, ПМД}; інфекції шкіри та м'яких тканин ^{БНФ} (імпетиго, фолікуліт, еризипелоїд, фурункульоз, інфіковані рани, бешиха); г. та хр. одонтогенні інфекції; дисеміновані або локалізовані мікобактеріальні інфекції, спричинені Mycobacterium avium або Mycobacterium intracellulare; локалізовані інфекції, спричинені Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum або Mycobacterium kansasii, зокрема у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, ерадикація H. pylori у пацієнтів з виразкою ДПК при пригніченні секреції соляної к-ти ^{БНФ, ПМД}; г. середній отит ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос та парентерально (тільки в/в інфузійно); у р/ос рекомендована доза для дорослих та дітей від 12 років - 250 мг кожні 12 год., при більш тяжких інфекціях - 500 мг кожні 12 год., тривалість лікування залежить від ступеня тяжкості інфікування та становить 6-14 днів ^{БНФ}; одонтогенні інфекції: рекомендована доза - 250 мг кожні 12 год 5 днів; мікобактеріальна інфекція: початкова доза для дорослих - 500 мг 2 р/день, якщо протягом 3-4 тижнів не спостерігається покращення клінічних ознак або бактеріологічних показників, дозу підвищити до 1000 мг 2 р/день, лікування дисемінованих інфекцій, спричинених МАК, у хворих на СНІД продовжується стільки, скільки триває клінічна та мікробіологічна ефективність кларитроміцину, можна застосовувати у комплексі з іншими АБЗ; ерадикація H. pylori у пацієнтів із виразкою ДПК (дорослі): потрібна терапія (7-10 днів) - по 500 мг 2 р/день ^{БНФ} + амоксицилін 1000 мг 2 р/день + омепразол 20 мг/день 7-10 днів; потрійна терапія (10 днів) - по 500 мг 2 р/день + ланзопразол 30 мг 2 р/день + амоксицилін 1000 мг 2 р/день упродовж 10 днів; подвійна терапія (14 днів) - по 500 мг 3 р/день + омепразол 40 мг 1 р/день р/ос упродовж 14 днів, далі омепразол 20 мг або 40 мг 1 р/день р/ос упродовж наступних 14 днів; подвійна терапія (14 днів) - 500 мг 3 р/день + ланзопразол 60 мг 1 р/день р/ос упродовж 14 днів; у формі р/ос суспенз. рекомендована доза для лікування немікобактеріальних інфекцій у немолят та дітей від 6 міс. до 12 років - 7,5 мг/кг 2 р/добу, максимальна доза - 500 мг 2 р/добу, тривалість лікування - 5-10 днів залежно від виду збудника та тяжкості перебігу захворювання; рекомендована доза для лікування мікобактеріальних інфекцій у дітей - 7,5-15 мг/кг 2 р/добу, лікування продовжують доки спостерігається клінічна ефективність від застосування кларитроміцину (може бути потрібним додавання інших АБЗ); в/в інфузійно для пацієнтів від 12 років середня доза становить 500 мг 2 р/день з інтервалом 12 год ^{БНФ}; для лікування хворих з локалізованими і дисемінованими мікобактеріальними інфекціями, що спричинені M.avium, M.intracellulare M.chelonae, M.fortuitum, M.kansasii рекомендована доза для дорослих 1 г/добу у вигляді 2 інфузій; лікування 2-5 днів залежно від тяжкості стану, а потім переходять на р/ос прийом.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: целюліт, кандидоз, гастроентерит, інфекція, вагінальна інфекція; псевдомембранозний коліт, бешихове запалення, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитемія, еозинфілія; агранулоцитоз, тромбоцитопенія, анафілактоїдні реакції, гіперчутливість; анафілактичні реакції, ангіоневротичний набряк, анорексія, зменшення апетиту; гіпоглікемія, безсоння, тривожність, нервозність, психози, сплутаність свідомості, деперсоналізація, депресія, дезорієнтація, галюцинації, кошмарні сновидіння, манія, часто - дисгевзія (порушення смакової чутливості), головний біль; свідомості, дискінезія, запаморочення, сонливість, тремор; судоми, агевізія (втрата смакової чутливості), паросмія, аносмія, парестезія, вертиго, погіршення слуху, дзвін у вухах; втрата слуху, зупинка серця, фібриляція передсердь, подовження інтервалу QT, екстрасистоли, відчуття серцебиття; torsades de pointes, шлуночкова тахікардія, вазодилатація; крововилив, астма, носова кровотеча, емболія судин легенів, діарея, блювання, диспепсія, нудота, біль у животі; езофагіт, ГЕРХ, гастрит, прокталгія, стоматит, глосит, здуття живота, запор, сухість у роті, відрижка, метеоризм; г. панкреатит, зміна кольору язика, зміна кольору зубів, відхилення від норми функціональних тестів печінки; холестаза, гепатит, підвищення рівня АЛТ, АСТ, ГГТ; печінкова недостатність, гепатоцелюлярна жовтяниця, висипання, гіпергідроз; бульозний дерматит, свербіж, кропив'янка, макулопапульозний висип; тяжкі шкірні побічні реакції (г. генералізований екзантематозний пустульоз, с-м Стивенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, медикаментозна шкірна

реакція, що супроводжується еозинофілією та системними проявами (DRESS)), акне, хвороба Шенляйна-Геноха, м'язові спазми, скелетно-м'язова ригідність, міалгія; рабдоміоліз, міопатія, підвищення креатиніну крові, підвищення сечовини крові; ниркова недостатність, інтерстиціальний нефрит, флебіт у місці введення; біль у місці введення, запалення у місці введення; нездужання⁴, гарячка, астения, біль у грудях, озноб, стомленість, зміна співвідношення альбумін-глобулін, підвищення рівня ЛФ в крові, підвищення рівня ЛФ в крові; міжнародного нормалізованого співвідношення, збільшення протромбінового часу, зміна кольору сечі.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до макролідних а/б або до будь-яких допоміжних компонентів препарату, супутнє застосування кларитроміцину та будь-якого з таких препаратів: астемізол, цизаприд, пімозид, терфенадин (оскільки це може призвести до подовження інтервалу QT та розвитку серцевих аритмій, включаючи шлуночкову тахікардію, фібриляцію шлуночків та torsades de pointes), алкалоїди ріжків, наприклад ерготамін, дигідроерготамін (оскільки це може призвести до ерготоксичності), інгібітори ГМГ-КоА-редуктази (статиї), що значною мірою метаболізуються СYP3A4 (ловастатин або симвастатин), ч/з підвищений ризик виникнення міопатії, включаючи рабдоміоліз, одночасне застосування кларитроміцину та р/ос мідазоламу, вроджене або встановлене набуте подовження інтервалу QT або шлуночкові серцеві аритмії в анамнезі, включаючи torsades de pointes, гіпокаліємія (ризик подовження інтервалу QT), тяжка печінкова недостатність та супутня ниркова недостатність, одночасне застосування кларитроміцину (та інших сильних інгібіторів СYP3A4) з колхіцином, одночасне застосування кларитроміцину з тикагрелором або ранолазином; КлКр < 30 мл/хв (табл.500 мг).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,5 г., парентерально - 1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КЛАРИТРОМІЦИН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№10x1	8,97	
	КЛАРИТРОМІЦИН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x1	6,39	
	КЛАРИТРОМІЦИН-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№7x1, №7x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛАРИТРОМІЦИН-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№7x2	8,00	
	КЛАРИТРОМІЦИН-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№7x1	8,86	
	КЛАРИТРОМІЦИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., в/о у конт. чар/уп.	250мг	№7x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛАРИТРОМІЦИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., в/о у конт. чар/уп.	500мг	№7x2	9,58	
	КЛАРИТРОМІЦИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№7x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛАРИТРОМІЦИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№10x1	13,86	
КЛАРИТРОМІЦИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x1	10,91		

		виробництва, контроль якості), Україна/Україна					
	КЛАРИТРОМІЦИН- ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№7x1	10,95	
	КЛАРИТРОМІЦИН- ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№7x2	9,96	
II.	АЗИКЛАР 250	Фламінго Фармасьютикалс Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЗИКЛАР 500	Фламінго Фармасьютикалс Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x1	16,87	28,11/\$
	КЛАБАКС	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	табл., в/о у бл.	500мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛАБАКС OD	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	табл., прол. дії, в/о у бл.	500мг	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛАБЕЛ® 500	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл., в/о у бл.	500мг	№7x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛАРИТРОМІЦИН АНАНТА	Копран Лімітед/Артура Фармасьютикалз Пвт. Лтд., Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг, 500мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛАРИТРОМІЦИН ГРІНДЕКС	Блуфарма-Індустрія Фармацевтика, С.А., Португалія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг, 500мг	№7, №14, №8, №16	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛАРИТРОМІЦИН ГРІНДЕКС	Блуфарма-Індустрія Фармацевтика, С.А., Португалія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№7x2	9,59	26,85/€
	КЛАРИТРОМІЦИН- МБ	ІММАКУЛ ЛАЙФСАЙЄНСИЗ ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД, Індія	пор. ліоф. д/приг. р-ну д/інфуз. у фл.	500мг	№1	340,02	24,18/\$
	КЛАЦИД В.В.	Фамар Легль, Франція	пор. ліоф. д/приг. р-ну д/інфуз. у фл.	500мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛАЦИД®	Аббві С.р.л., Італія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛАЦИД®	Аббві С.р.л., Італія	гран. д/орал. сусп. у фл. по 60мл, 100мл	125мг/5м л, 250мг/5м л	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛАЦИД® СР	Аббві С.р.л., Італія	табл., вкриті п/о прол. дії у бл.	500мг	№5, №7, №14	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛЕРИМЕД 500	Медокемі ЛТД (Центральний Завод), Кіпр	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№7x2	12,93	32,91/€
	МЕРИСТАТ- САНОВЕЛЬ	Сановель Іляч Санаї ве Тиджарет А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	250мг, 500мг	№7x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МЕРИСТАТ- САНОВЕЛЬ ЛОНГ	Сановель Іляч Санаї ве Тиджарет А.Ш., Туреччина	табл. з м/в у бл.	500мг	№7x1, №7x2	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ОРАДРО	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№7x2, №14x1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ОРАДРО	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№7x2	11,79	23,83/\$	

ФРОМІЛІД® УНО	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. з м/в у бл.	500мг	№7x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ФРОМІЛІД® УНО	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. з м/в у бл.	500мг	№7x1	17,64	30,27/€
ФРОМІЛІД® УНО	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. з м/в у бл.	500мг	№5x1	21,49	30,27/€
ФРОМІЛІД®	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за контроль серії та випуск серії; відповідальний за виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування), Словенія	гран. д/орал. сусп. по 60мл у скл. фл. зі шпр. д/введ.	125мг/5м л	№1	56,32	35,35/€
ФРОМІЛІД®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія	гран. д/приг. 60мл орал. сусп. у фл. зі шпр. д/введ.	250мг/5м л	№1	29,76	30,27/€
ФРОМІЛІД®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№7x2	16,94	30,33/€
ФРОМІЛІД®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№7x2	14,10	30,33/€

• **Джозаміцин (Josamycin)**

Фармакотерапевтична група: J01FA07 - АБЗ для системного застосування; макроліди.

Основна фармакотерапевтична дія: бактеріостатична активність обумовлена інгібуванням синтезу білка бактерій; високоактивний щодо в/клітинних м/о (*Chlamydia trachomatis* та *Chlamydia pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Mycoplasma hominis*, *Ureaplasma urealyticum*, *Legionella pneumophila*); Гр (+) бактерій (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes* та *Streptococcus pneumoniae* (*pneumococcus*), *Corynebacterium diphtheriae*); Гр (-) бактерій (*Neisseria meningitidis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Haemophilus influenzae*, *Bordetella pertussis*); проти деяких анаеробних бактерій (*Peptococcus*, *Peptostreptococcus*, *Clostridium perfringens*); незначно впливає на ентеробактерії; ефективний при резистентності до еритроміцину; резистентність до джозаміцину розвивається рідше, ніж до інших а/б групи макролідів.

Показання для застосування ЛЗ: інфекційні захворювання, спричинені чутливими до джозаміцину м/о інфекції ЛОР-органів та дихальних шляхів, стоматологічні інфекції, інфекції шкірного покриву та м'яких тканин, інфекції сечостатевої системи; для застосування пацієнтам з АР на пеніцилін.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза для дорослих -1-2 г за 2-3 прийоми; у тяжких випадках - до 3 г і більше; рекомендована доза для дітей віком від 5 років - 40-50 мг/кг/день, розділена на кілька прийомів; тривалість лікування визначається індивідуально, лікування стрептококових інфекцій становить не менше 10 днів; продовжувати терапію ще 48 год. після зникнення с-мів захворювання та нормалізації t° тіла.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: здуття живота, стоматит, запор, нудота, блювання, дискомфорт у животі, діарея, гастралгія, біль в животі, анорексія, зниження апетиту, набряк обличчя, псевдомембранозний коліт, реакції гіперчутливості, такі як шок, ангіоневротичний набряк Квінке та анафілактичні реакції, задишка, сироваткова хвороба, кропив'янка та свербіж, пурпура, бульозний дерматит, мультиформна еритема, шкірний васкуліт, с-м Стівенса-Джонсона, кропив'янка та інші реакції з боку шкіри, такі як еритематозні та макулопапульозні висипи; ангіоневротичний набряк (набряк Квінке), токсичний епідермальний некроліз, порушення з боку печінки та жовтяниця, що типово характеризується, але не обмежується холестатичними реакціями з помірним ураженням печінки, підвищення активності печінкових трансаміназ та лужної фосфатази, холестатичний гепатит та цитолітичний гепатит.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини чи до компонентів препарату або до інших речовин подібних за хімічною структурою; тяжкі порушення ф-ції печінки і жовчовивідних шляхів; фенілкетонурія; одночасне застосування з ерготаміном, дигідроерготаміном, цизапридом, пімозидом, івабрадином, колхіцином; жінкам під час годування груддю дитини, яка отримує цизаприд.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ВІЛЬПРАФЕН СОЛЮТАБ	Фамар Ліон (виробник нерозфасованого продукту (bulk), пакувальник, контроль якості,	табл., що дисперг. у бл.	1000мг	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	випуск серії), Франція						
ВІЛЬПРАФЕН®	Драгенофарм Апотекер Пюшл ГмБХ (виробник за повним циклом), Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x1	94,00	30,50/€	

• **Спіраміцин (Spiramycin)**

Фармакотерапевтична група: J01FA02 - АБЗ для системного застосування; макроліди.

Основна фармакотерапевтична дія: а/б групи макролідів, чинить б/ц дію; чутливі Гр (+) аероби: Bacillus cereus, Corynebacterium diphtheriae, Enterococci, Rhodococcus equi, Staphylococcus метицилінчутливі, Staphylococcus метицилінрезистентні, Streptococcus B, некласифіковані streptococcus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes; чутливі Гр (-) аероби: Bordetella pertussis, Branhamella atarrhalis, Campylobacter, Legionella, Moraxella; чутливі анаероби: Actinomyces Bacteroides, Eubacterium, Mobiluncus, Peptostreptococcus, Porphyromonas, Prevotella, Propionibacterium acnes; різні види: Borrelia burgdorferi, Chlamydia, Coxiella, Лептоспіри, Mycoplasma pneumoniae, Treponema pallidum; помірно чутливі Гр (-) аероби: Neisseria gonorrhoeae; помірно чутливі анаероби: Clostridium perfringens; помірно чутливі різні види: Ureaplasma urealyticum; резистентні Гр (+) аероби: Corynebacterium jeikeium, Nocardia asteroides; резистентні Гр (-) аероби: Acinetobacter, ентеробактерії, Haemophilus, Pseudomonas; резистентні анаероби: Fusobacterium; різні: Mycoplasma hominis.

Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій, спричинених м/о, чутливими до спіраміцину; підтверджений тонзилофарингіт, спричинений β-гемолітичним стрептококом А (як альтернатива лікуванню β-лактамами а/б або якщо вони не можуть бути застосовані); г. синусит (коли лікування β-лактамами а/б є неможливим); суперінфекція при г. бронхіті; загострення хр. бронхіту; негоспітальна пневмонія у пацієнтів, які не мають факторів ризику, тяжких клінічних симптомів, клінічних факторів, які свідчать про пневмококову етіологію захворювання (у разі підозри на атипову пневмонію застосування макролідів є доцільним незалежно від тяжкості захворювання та анамнезу); інфекції шкіри з доброякісним перебігом - імпетиго, імпетиґізація, ектіма, інфекційний дермо-гіподерміт (особливо бешиха), еритразма; інфекції ротової порожнини; негонококові генітальні інфекції; хіміопрофілактика рецидивів г. ревматичної гарячки у хворих, у яких алергія на β лактамі а/б; токсоплазмоз у вагітних жінок; профілактика менінгококового менінгіту у осіб, яким протипоказане застосування рифампіцину: з метою ерадикації м/о (Neisseria meningitidis) у носоглотці; як профілактика: пацієнтам після лікування та перед поверненням до суспільного життя; у пацієнтів, які контактували з особою з виділенням мокротиння протягом 10 днів, що передують його/її госпіталізації; не призначений для лікування менінгококового менінгіту.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим - по 6-9 млн МО (за 2-3 прийоми); дітям старше 6 років - 1,5-3 млн МО на 10 кг/добу за 2-3 прийоми, тривалість терапії при тонзилофарингіті - 10 днів; при профілактиці менінгококових менінгітів дорослим призначають по 3 млн МО кожні 12 год. протягом 5 днів; дітям - 75 000 МО/1 кг кожні 12 год. протягом 5 дн. Табл., вкриті оболонкою, дрібнити та ділити не можна!

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: диспепсія, біль у животі, нудота, блювання, біль у шлунку, діарея, псевдомембранозний коліт, висипання, кропив'янка, свербіж, почервоніння шкіри; ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок; г.генералізований екзантематозний пустульоз, транзиторна парестезія, головний біль, запаморочення, загальна слабкість, відхилення від норми показників функціональних проб печінки, холестатичний, змішаний або цитолітичний гепатит, поодинокі випадки васкуліту, включаючи пурпуру Шенляйна-Геноха, що можуть супроводжуватись тромбоцитопенією, подовження інтервалу QT, шлуночкова аритмія, шлуночкова тахікардія, двонаправлена (поліморфна) шлуночкова тахікардія (torsades de pointes), які можуть призвести до зупинки серця.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість на спіраміцин або однієї з допоміжних речовин ЛЗ; пацієнти, які належать до групи ризику подовження QT-інтервалу: пацієнти, які мають в особистому або сімейному анамнезі вроджене подовження інтервалу QT (окрім випадків, коли цей діагноз був виключений за допомогою ЕКГ); пацієнти з подовженням інтервалу QT, яке викликане ЛЗ або має метаболічне чи СС походження; не застосовувати в комбінації з ЛЗ, які викликають шлуночкову тахікардію типу «пірует», такими як: антиаритмічні препарати класу Ia (хінідин, гідрохінідин, дизопірамід); антиаритмічні препарати класу III (аміодарон, соталол, дофетилід, ібутилід); сультоприд (нейролептик групи бензамідів); інші: препарати миш'яку, дифеманіл, доласетрон в/в, мізоластин, левофлоксацин, моксифлоксацин, прукралоприд, тореміфен, вінкамін в/в, еритроміцин в/в, дронедарон, мехітазин, циталопрам, дизопірамід, дофетилід, домперидон, есциталопрам, гідрохінідин, вандетаніб.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДОРАМІЦИН	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	3000000 МО	№10x1	156,54	28,05/\$
	РОВАМІЦИН®	САНОФІ С.П.А., Італія	табл., в/о у бл.	1500000МО, 3000000МО	№8x2, №10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СПІРАМІЦИН-ФТ	ТОВ "Фармтехнологія", Республіка Білорусь	табл., в/о у бан.	1,5млн.МО; 3млн.МО	№16, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СПІРАЦИН	Сімпекс Фарма Пвт. Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	1500000МО, 3000000МО	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Мідекаміцин (Midecamycin)**

Фармакотерапевтична група: J01FA03 - протимікробні ЛЗ для системного застосування; макроліди, лінкозаміди, стрептограміни.

Основна фармакотерапевтична дія: макролідний а/б широко спектра дії, активний проти Гр (+) бактерій (стафілококів, стрептококів, пневмококів, *Bacillus anthracis*, *Corynebacterium diphtheriae* та *Listeria monocytogenes*), деяких Гр (-) бактерій (*Bordetella pertussis*, *Campylobacter* spp., *Moraxella catarrhalis* та *Neisseria* spp.), анаеробних бактерій (*Clostridium* spp. та *Bacteroides* spp.) та інших бактерій (мікоплазми, уреоплазми, хламідії, легіонели); пригнічує синтез РНК-залежних білків у стадії пролонгації протеїнового ланцюга шляхом зворотного зв'язування з субодиницею 50S та блокує р-ціі транспептидації та/чи транслокації; проявляє бактеріостатичну дію, однак може проявляти б/ц дію залежно від типу бактерії, концентрації ЛЗ у місці дії, розміру інкуляту та репродуктивної стадії м/о.

Показання для застосування ЛЗ: інфекції респіраторного і сечостатевого тракту, спричинені мікоплазмами, легіонелами, хламідіями та *Ureaplasma urealyticum*; інфекції респіраторного тракту, шкіри і м'яких тканин та інші інфекції, спричинені чутливими до мідекаміцину і пеніциліну бактеріями у пацієнтів з гіперчутливістю до пеніциліну; ентерити, викликані *Campylobacter* spp.; лікування і профілактика дифтерії та кашлюку.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим та дітям з масою тіла > 30 кг - 400 мг 3 р/добу; МДД для дорослих - 1600 мг; лікування триває від 7 до 14 днів; лікування хламідійної інфекції продовжувати 14 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: еозинофілія, нудота, зниження апетиту, блювання, діарея, стоматит, біль у животі, псевдомембранозний коліт, висипання, кропив'янка та свербіж, ангіоневротичний набряк, с-м Стівенса-Джонсона, підвищення рівня трансаміназ та жовтяниця, р-ціі гіперчутливості, включаючи гіперемію; загальна слабкість; запаморочення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до мідекаміцину або до будь-якого іншого компонента ЛЗ; тяжкі порушення функцій печінки.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1,2 г.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II. МАКРОПЕН®	КРКА, д.д., Ново место (вир-к, відпов. за вир-во, перв. та втор. пак., контр. якості та випуск серії)/ П&Г Хелс Австрія ГмбХ & Ко. ОГ (вир-к, відпов. за вир-во, перв. та втор. пак., контр. якості), Словенія/Австрія	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№8x2	19,49	35,35/€

17.2.5. Лінкозаміди

Діють бактеріостатично переважно відносно грам(+) коків (крім MRSA та ентерококів) і анаеробної флори, в т.ч. *B.fragilis*. Резистентність має перехресний характер. У групі, іноді – і з макролідами. Лінкоміцин обмежено всмоктується із ШКТ, біодоступність при прийомі натще – 30%, після їди – 5%. Біодоступність кліндаміцину – близько 90%, не залежить від прийому їжі. Добре розподіляються (погано проходять через ГЕБ), накопичуються у кістках та суглобах. Екскретуються переважно через ШКТ, $t_{1/2}$ лінкоміцину приблизно = 4-6 год, кліндаміцину приблизно = 2,5-3 год ($t_{1/2}$ не змінюються при порушенні функції нирок). Найпоширеніші небажані реакції – диспепсичні, можливий розвиток антибіотикоасоційованої діареї та псевдомембранозного коліту. Використовують як а/б резерву при інфекціях, викликаних стафілококами, стрептококами, і неспорують анаеробами; кліндаміцин – також при токсоплазмозі й хлорохінорезистентній малярії, зумовленої *P.falciparum*. Не застосовують при тяжких стафілококових інфекціях (сепсис, ендокардит) у зв'язку з бактеріостатичною дією.

● Лінкоміцин (*Lincomycin*)

Фармакотерапевтична група: J01FF02- АБЗ для системного застосування; лінкозаміди.

Основна фармакотерапевтична дія: проявляє бактерицидну та бактеріостатичну дію; чутливі анаеробні Гр (+) бактерії, що не утворюють спори, у т.ч. *Propionibacterium* spp., *Eubacterium* spp., а також *Actinomyces* spp.; анаеробні і мікроаерофільні Гр (+) коки, у т.ч. *Peptococcus* spp., *Peptostreptococcus* spp. та мікроаерофільні стрептококи; аеробні Гр (+) м/о, у т.ч. стафілококи, стрептококи (за винятком *S. faecalis*) та пневмококи; м/о з помірною чутливістю: анаеробні Гр (-) бактерії, що не утворюють спори, у т.ч. *Bacteroides* spp., *Fusobacterium* spp.; анаеробні Гр (+) бактерії, що утворюють спори, у т.ч. *Clostridium* spp.; резистентні м/о або м/о з низькою чутливістю, у т.ч. *Streptococcus faecalis*, *Neisseria*, більшість штамів *Haemophilus influenzae*, *Pseudomonas* та інші Гр (-) м/о.

Показання для застосування ЛЗ: лікування серйозних інфекцій, спричинених чутливими до лінкоміцину штамми Гр(+) аеробних м/о, таких як стрептококи, пневмококи та стафілококи, або чутливими до ЛЗ анаеробними бактеріями: інфекції ВДШ (хр. синусит, спричинений анаеробними штамми; лікування окремих випадків гнійного середнього отиту або у вигляді ЛЗ для додаткової терапії разом з а/б, що ефективно діє проти аеробних Гр(-) збудників); інфекції НДШ (загострення хр. бронхіту та інфекційна пневмонія); серйозні інфекції шкіри і м'яких тканин, спричинені чутливими м/о, коли призначення а/б в пеніцилінової групи не показано; інфекції кісток та суглобів, у тому числі остеомиєліт та септичний артрит; септицемія та ендокардит. Даний ЛЗ застосовувати пацієнтам з алергією на пеніцилін або кому застосування пеніциліну є недоцільним.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос та парентерально (в/м та в/в); р/ос дорослим по 500 мг 3-4 р/добу, дітям від 6 років по 30-60 мг/кг/добу, у 3-4 прийоми; при в/м введенні звичайна доза для дорослих становить 600 мг кожні 24 год., при більш тяжких інфекціях - по 600 мг кожні 12 год. (або частіше), що визначається тяжкістю інфекції; при в/м введенні звичайна доза для дітей віком від 1 міс. при тяжких інфекціях 10 мг/кг у вигляді 1 в/м ін'єкції кожні 24 год, при більш тяжких формах інфекцій - 10 мг/кг кожні 12 год або частіше; при в/в введенні звичайна доза для дорослих при тяжких інфекціях становить 600 мг-1 г кожні 8-12 год, при більш тяжких інфекціях дози можуть бути підвищені, при станах, що загрожують життю, добова доза - до 8 г; при в/в введенні звичайна доза для дітей віком від 1 міс. - 10-20 мг/кг/добу, залежно від тяжкості інфекції.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: діарея, нудота, блювання, глосит, стоматит, біль у животі, дискомфорт у животі, анальний свербіж, токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса – Джонсона, г.генералізований екзантематозний пустульоз, бульозний дерматит, ексфолюативний дерматит, мультиформна еритема, висипання, кропив'янка, свербіж, вагінальні інфекції; псевдомембранозний коліт; коліт асоційований з *Clostridium difficile*, панцитопенія, агранулоцитоз, апластична анемія, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенічна пурпура, анафілактичні р-ції, ангіоневротичний набряк, сироваткова хвороба, жовтяниця, відхилення від норми показників функціонального стану печінки, підвищення рівнів трансаміназ, порушення функції нирок, олігурія, протеїнурія, азотемія, кардіореспіраторна зупинка, гіпотензія, вертиго, дзвін у вухах, головний біль, запаморочення, сонливість, стерильні абсцеси у місці ін'єкції, ущільнення у місці ін'єкції, біль у місці ін'єкції, подразнення у місці ін'єкції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до лінкоміцину, кліндаміцину або будь-якого іншого компонента ЛЗ; капс.: міастенія gravis; коліт у стадії загострення; менінгіт.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1,8 г., парентерально - 1,8 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЛІНКОМІЦИН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	капс. у бл.	250мг	№10x3	7,44	
	ЛІНКОМІЦИН - ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 2мл у конт. чар/уп.	300 мг/мл	№5x2	19,05	
	ЛІНКОМІЦИН - ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у конт. чар/уп.	300 мг/мл	№5x2	24,78	
	ЛІНКОМІЦИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл, 2мл в амп. у бл.	300 мг/мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛІНКОМІЦИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у кор. або бл.	300 мг/мл	№10, №10x1	26,23	
	ЛІНКОМІЦИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у кор. або бл.	300 мг/мл	№10, №10x1	33,95	
	ЛІНКОМІЦИНУ ГІДРОХЛОРИД	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	капс. у бл.	250мг	№10x2	25,42	
II.	ЛІНКОЦИН	Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ, Бельгія	р-н д/ін'єк. по 2мл у фл.	300 мг/мл	№1	341,34	27,09/\$

• **Кліндаміцин (Clindamycin) ***

Фармакотерапевтична група: J01FF01 - АБЗ для системного застосування; макроліди, лінкозаміди та стрептограміни.

Основна фармакотерапевтична дія: напівсинтетичний а/б, який синтезується з лінкоміцину шляхом заміщення 7-(R)-гідроксильної групи на 7-(S)-хлор; зв'язується з субодиноцею 50S бактеріальної рибосоми та пригнічує синтез білка; бактерицидна і бактериостатична дія; активний до аеробних Гр (+) коків: *Actinomyces israelii*; *Staphylococcus aureus* (метицилін-чутливий); *Streptococcus agalactiae*; стрептококи групи Viridans; анаеробних м/о: види *Bacteroides* (за винятком *B. fragilis*); види *Fusobacterium*; види *Peptococcus*; види *Prevotella*; види *Veillonella*; інших мікроорганізмів: *Chlamydia trachomatis*; *Chlamydia pneumoniae*; *Gardnerella vaginalis*; *Mycoplasma hominis*.

Показання для застосування ЛЗ: для лікування тяжких інфекцій, спричинених чутливими до нього штамми Гр (+) аеробних м/о, таких як стрептококи, пневмококи та стафілококи, або чутливими анаеробними бактеріями ^{BOO3} ^{БНФ}: інфекції ВДШ - хр.синусит, спричинений анаеробними штамми; хр. гнійний середній отит, як допоміжна терапію в комбінації з а/б, активними проти аеробних Гр (-) м/о; для лікування рецидивів фаринготонзиліту, інфекції НДШ, включаючи інфекційне загострення хр. бронхіту та пневмонії ^{BOO3} ^{БНФ}; тяжкі інфекції шкіри та м'яких тканин, спричинені чутливими м/о, ^{БНФ} інфекції кісток і суглобів, включаючи остеомієліт і септичний артрит ^{BOO3} ^{БНФ}, тяжкі гінекологічні інфекції, включаючи запальні захворювання органів малого таза ^{BOO3}, монотерапію кліндаміцином також можна застосовувати при цервіцитах, спричинених *Chlamydia trachomatis*, в/черевні інфекції, включаючи перитоніти та абдомінальні абсцеси ^{БНФ}; септицемія та ендокардит ^{BOO3}; стоматологічні інфекції, включаючи періодонтальний абсцес і періодонтит; токсоплазмозний енцефаліт у хворих на СНІД (із непереносимістю стандартного лікування кліндаміцин можна застосовувати в комбінації з піриметаміном), пневмонія, спричинена *Pneumocystis jirovecii*, у хворих на СНІД, (пацієнтам із непереносимістю стандартного лікування кліндаміцин можна застосовувати в комбінації з примахіном ^{БНФ}); тяжка малярія ^{БНФ}; профілактика ендокардиту ^{BOO3} у пацієнтів із алергією/гіперчутливістю до пеніциліну; профілактика ранової інфекції при оперативних втручаннях у ділянці голови та шиї; попередження перитоніту та інтраабдомінальних абсцесів після перфорації і посттравматичної контамінації при одночасному застосуванні з аміноглікозидними а/б (гентаміцином або тобраміцином).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують р/ос та парентерально; звичайна доза для в/м та в/в застосування у дорослих для лікування в/черевних інфекцій, інфекцій органів малого таза в жінок та інших тяжких

інфекцій стандартна доза - 2400-2700 мг/добу^{БНФ} (розподілені на 2-4 застосування); для лікування менш ускладнених інфекцій - 1200-1800 мг/добу (розподілені на 3 або 4 введення); МДД -4800 мг^{БНФ}; максимальна разова доза - 600 мг^{ВООЗ, БНФ}; лікування запальних захворювань органів малого таза: кліндаміцину фосфат 900 мг в/в кожні 8 год у комбінації з прийнятним а/б^{ВООЗ}, активним щодо Гр (-) м/о 4 доби, з появою клінічних ознак покращення продовжити лікування ще на 2 доби, далі перейти до р/ос застосування в дозі 1800 мг/добу (розподілені на кілька прийомів) до закінчення повного курсу лікування, що становить 10-14 діб; діти від 1 міс.: 20-40 мг/кг на добу на 3 або 4 введення; токсоплазмозний енцефаліт у хворих на СНІД - 600-1200 мг кожні 6 год упродовж 2 тижн., потім - 300-600 мг р/ос у вигляді капс. кожні 6 год., курс лікування - від 8-10 тижн., упродовж 8-10 тижн. застосовувати піриметамін р/ос в дозі 25-75 мг/добу, із високими дозами піриметаміну застосовувати фолієву кислоту в дозі 10-20 мг/добу, пневмонія, спричинена *Pneumocystis jirovecii*, у хворих на СНІД - в/в 600^{БНФ} -900 мг кожні 6 год або 900 мг кожні 8 год 21 добу в комбінації з примахіном у дозі 15-30 мг/добу р/ос упродовж 21 доби; тяжка малярія: дорослі - якщо пацієнт не може застосовувати ЛЗ р/ос, ввести навантажувальну дозу кліндаміцину, 10 мг діючої речовини/кг в/в, потім 5 мг діючої речовини/кг в/в кожні 8 год, уникати швидкого в/в введення, перейти на р/ос застосування кліндаміцину (доза 20 мг діючої речовини/кг/день) як тільки пацієнт зможе застосовувати ЛЗ р/ос, курс лікування - 7 днів; діти: глюконат хінідину: така сама доза в мг/кг та рекомендації, як для дорослих, і кліндаміцин для р/ос: 20 мг діючої речовини/кг/день (дозу розділено на 3 застосування на добу упродовж 7 днів), якщо пацієнт не може застосовувати ЛЗ р/ос, вводити навантажувальну дозу кліндаміцину 10 мг діючої речовини/кг в/в, а потім 5 мг діючої речовини/кг в/в кожні 8 год.; профілактика ендокордиту у пацієнтів, чутливих до пеніциліну: 600 мг кліндаміцину фосфату в/в за 1 год до процедури^{ВООЗ}; профілактика інфекцій при хірургічних втручаннях у ділянці голови та шиї: 900 мг кліндаміцину фосфату, розчиненого в 1000 мл фізіологічного р-ну, застосовувати для промивання ураженої ділянки під час хірургічного втручання в ділянці голови та шиї перед закриттям рани.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: псевдомембранозний коліт, коліт, викликаний *Clostridium difficile*, вагінальні інфекції, еозинофілія, агранулоцитоз, нейтропенія, тромбоцитопенія, лейкопенія, анафілактичний шок, анафілактоїдна р-ція, анафілактична р-ція, гіперчутливість, дисгевзія, зупинка дихання та серцевої діяльності, тромбоз, артеріальна гіпотензія, діарея, нудота, коліт, біль у животі, блювання, відхилення від норми показників ф-ції печінки, жовтяниця, макулопапульозний висип, кропив'янка, мультиформна еритема, свербіж, токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса - Джонсона, медикаментозна р-ція з еозинофілією та системними симптомами (DRESS-с-м), ангіоневротичний набряк, г. генералізований екзантематозний пустульоз, ексфолиативний дерматит, бульозний дерматит, короподібний висип, біль, абсцес у місці введення, подразнення у місці ін'єкції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до кліндаміцину, лінкоміцину або до будь-якого компонента ЛЗ; інфекційний менінгіт.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1,2 г., парентерально - 1,8 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КЛІНДАМІЦИН-М	ПАТ "Монфарм", Україна	капс. у бл.	0,15г	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	ДАЛАЦИН Ц	Фарева Амбуаз, Франція	капс. у бл.	150мг	№8x2	116,43	25,87/\$
	ДАЛАЦИН Ц	Фарева Амбуаз, Франція	капс. у бл.	300мг	№8x2	77,62	25,87/\$
	ДАЛАЦИН Ц ФОСФАТ	Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ, Бельгія	р-н д/ін'єк. по 4мл в амп. у бл. або кор.	150 мг/мл	№1	812,70	27,09/\$
	ДАЛАЦИН Ц ФОСФАТ	Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ, Бельгія	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у бл. або кор.	150 мг/мл	№1	975,24	27,09/\$
	ПУЛКСИПРОН	Рівофарм СА, Швейцарія	капс. у бл.	150мг, 300мг	№8x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	

17.2.6. Глікопептиди

Мають бактерицидну активність відносно аеробних та анаеробних грам(+) бактерій (на ентерококи діють бактериостатично). Застосовують при тяжких інфекціях, викликаних полірезистентними грам(+) коками, включаючи MRSA (метилен резистентний *S.aureus*), ентерококи та пеніцилінорезистентні пневмококи.

• Ванкомицин (*Vancomycin*) *

Фармакотерапевтична група: J01XA01 - протимікробні ЛЗ для системного застосування; глікопептидні а/б.

Основна фармакотерапевтична дія: трициклічний глікопептидний а/б, отриманий з *Amycolatopsis orientalis*, активний щодо Гр (+), бактерицидна дія ванкомицину полягає у пригніченні синтезу бактеріальної стінки за рахунок гальмування полімеризації глікопептидів та селективного інгібування синтезу РНК-бактерій, перехресної резистентності між ванкомицином та іншими а/б не виникає, особливо ефективний відносно: стафілококів, включаючи *Staphylococcus aureus* та *S. epidermidis* (включаючи метицилінрезистентні штами); стрептококів, включаючи *Streptococcus pyogenes*, *S. agalactiae*, *Enterococcus faecalis* (головним чином *Streptococcus faecalis*), *S. bovis*, груп гемолітичних стрептококів, *Streptococcus pneumoniae* (включаючи пеніцилінрезистентні штами); *Clostridium difficile* (у т. ч. токсигенних штамів - збудників псевдомембранозного ентероколіту); дифтероїдів, чутливі *Listeria monocytogenes*, *Lactobacillus species*, *Actinomyces species*, *Clostridium species* та *Bacillus species*, неактивний відносно Гр (-) бактерій, грибів та мікобактерій.

Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій, спричинених Гр (+) м/о, які є чутливими до препарату^{ВООЗ БНФ}, у т. ч. у пацієнтів з алергією до пеніцилінів і цефалоспоринів в анамнезі: ендокордит^{ВООЗ БНФ}; сепсис^{ВООЗ}

БНФ; остеомієліт ^{ВООЗ БНФ}; інфекції ЦНС ^{ВООЗ БНФ}; інфекції нижніх відділів дихальних шляхів (пневмонія ^{ВООЗ}); БНФ
інфекції шкіри та м'яких тканин ^{БНФ}; псевдомембранозний коліт ^{ВООЗ} (для застосування внутрішньо); запобігання
ендокардиту у пацієнтів з підвищеною чутливістю до пеніцилінових а/б ^{ВООЗ}; БНФ запобігання інфекціям після
хірургічних процедур ^{БНФ} у порожнині рота і ЛОР-органів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі: вводити не > 5 мг/мл та зі швидкістю не > 10 мг/хв, деяким пацієнтам, які потребують обмеження рідини, можна використовувати концентрацію до 10 мг/мл; дорослі: 500 мг кожні 6 год або 1000 мг кожні 12 год, р-н вводити в/в інфузійно не < 60 хв. максимальна разова доза - 1000 мг, МДД- 2 г; новонароджені віком до 7 днів: початкова доза - 15 мг/кг маси тіла, а потім - 10 мг/кг маси тіла кожні 12 год, новонароджені віком від 7 днів до 1 міс.: початкова доза - 15 мг/кг маси тіла, а потім - по 10 мг/кг маси тіла кожні 8 год, новонароджені віком від 7 днів до 1 місяця: початкова доза - 15 мг/кг маси тіла, а потім - по 10 мг/кг маси тіла кожні 8 год, максимальна разова доза для дітей - 15 мг/кг маси тіла, МДД- 2 г. Концентрація приготовленого р-ну ванкомицину для дітей не має перевищувати 2,5-5 мг/мл. Р-н вводити протягом не < 60 хв. Р-н д/застосування внутрішньо готувати додаванням до вмісту флакона ванкомицину по 500 мг 30 мл води, отриманий р-н можна застосовувати р/ос або вводити ч/з назальний зонд; для поліпшення смаку до р-ну можна додати солодкий сироп зі смаковими добавками; дорослі: звичайна добова доза- 500-1000 мг, розподілених на 3-4 прийоми, 7-10 днів. МДД не має перевищувати 2 г; діти: звичайна добова доза - 40 мг/кг маси тіла, розподілених на 3-4 прийоми, 7-10 днів. МДД не має перевищувати 2 г.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анафілактичні р-ції (артеріальна гіпотензія, задишка, диспное, кропив'янка або свербіж), розлади серцевої діяльності (СН, аж до зупинки серця), нейтропенія, агранулоцитоз, тромбоцитопенія, еозинofilія, оборотна нейтропенія, СН, артеріальна гіпотензія, флебіт, васкуліт, зупинка серця, диспное, задишка, : нудота, блювання, діарея, біль у животі, псевдомембранозний коліт, свербіж, кропив'янка, екзантема, с-м Стівенса-Джонсона, ексофоліативний дерматит, с-м Лайєлла, IgA-бульозний дерматит, токсичний епідермальний некроліз, шум або дзвін у вухах, зниження гостроти слуху, вертиго, анафілактоїдна р-ція (р-ція, пов'язана з інфузією), р-ції гіперчутливості, анафілактоїдний шок, псевдомембранозний коліт, збільшення рівня креатиніну в сироватці крові, збільшення рівня сечовини в сироватці крові, підвищення рівнів АСТ, АЛТ, ЛФ, лактатдегідрогенази, γ-глутамілтранспептидази, білірубину, лейцин-амінопептидази, м'язові спазми (р-ція, пов'язана з інфузією), запаморочення, парестезія, : інтерстиціальний нефрит, азотемія, ГНН, : медикаментозна лихоманка, озноб, зміни у місці ін'єкції, включаючи біль, запалення, подразнення, некроз тканин, біль та спазми м'язів грудей та спини, ріст резистентних бактерій та грибів, медикаментозна висипання з еозинofilією та системними симптомами (DRESS-с-м), слъозотеча, запалення слизових оболонок, почервоніння верхньої частини тіла та обличчя.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до ванкомицину або будь-якого іншого компонента препарату.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ВАНКОМІЦИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл. в конт. чар/уп.	500мг	№1	838,44	
	ВАНКОМІЦИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл. в конт. чар/уп.	1000мг	№1	743,18	
II.	ВАНКОМІЦИН-ВІСТА	ВЕМ Ілач Сан. ве Тік. А.С., Туреччина	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у скл. фл. по 10мл	500мг	№1	1040,00	32,60/€
	ВАНКОМІЦИН-ВІСТА	ВЕМ Ілач Сан. ве Тік. А.С., Туреччина	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у скл. фл. по 20мл	1000мг	№1	880,00	32,60/€
	ВАНКОМІЦИН-ВОКАТЕ	АНФАРМ ХЕЛЛАС С.А., Греція	ліоф. д/приг. р-ну д/інфуз. у фл.	500мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАНКОМІЦИН-ВОКАТЕ	АНФАРМ ХЕЛЛАС С.А., Греція	ліоф. д/приг. р-ну д/інфуз. у фл.	500мг	№10	892,42	25,44/\$
	ВАНКОТЕКС	ФІСІОФАРМА С.Р.Л., Італія	пор. для в/в та перор. введ. у фл.	500мг	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАНСТАФ	Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕДИЦИН®	Лек Фармацевтична компанія д.д., Словенія	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	0,5г; 1г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Тейкопланін (Teicoplanin)**

Фармакотерапевтична група: J01XA02 - АБЗ для системного застосування. Глікопептидні АБЗ: тейкопланін.

Основна фармакотерапевтична дія: пригнічує ріст чутливих м/о, перешкоджаючи біосинтезу клітинної мембрани в місці, відмінному від місця дії β-лактамних а/б, синтез пептидоглікану блокується шляхом специфічного зв'язування з D-аланіл-D-аланіновими залишками; ряд резистентних до ванкомицину ентерококів є чутливими до тейкопланіну (фенотип Van-B).

Показання для застосування ЛЗ: інфекції, спричинені Gr (+) бактеріями ^{БНФ}, у т. ч. чутливими або резистентними до метициліну, а також хворим з алергією до β-лактамних а/б: у дорослих та дітей інфекцій шкіри та м'яких тканин ^{БНФ}; інфекцій верхніх та нижніх сечових шляхів з ускладненнями; інфекцій дихальних шляхів ^{БНФ}; інфекцій кісток і суглобів ^{БНФ}; септицемії ^{БНФ}; ендокардит ^{БНФ}; перитоніт, пов'язаного із постійним ПД в амбулаторних умовах ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі та діти від 12 років та пацієнтів літнього віку: ускладнені інфекції шкіри і м'яких тканин, пневмонія, ускладнені інфекції сечовивідних шляхів ^{БНФ} - навантажувальна доза в/м або в/в 400 мг (що відповідає 6 мг/кг маси тіла) кожні 12 год ^{БНФ}, цільова остаточна концентрація на 3-5 добу - >15 мг/л, підтримувальна доза - 6 мг/кг маси тіла в/в або в/м 1р/добу, цільова остаточна концентрація - 15 мг/л 1 р/тижд.; інфекції кісток та суглобів ^{БНФ} - навантажувальна доза в/в 800 мг (що відповідає приблизно 12 мг/кг маси тіла) кожні 12 год 3-5 введень ^{БНФ}, цільова остаточна концентрація на 3-5 добу - >20 мг/л, підтримувальна доза - 12 мг/кг маси тіла ^{БНФ} в/в або в/м 1р/добу, цільова остаточна концентрація - >20 мг/л; інфекційний ендокардит: навантажувальна доза - 3-5 введень в/в ^{БНФ} по 800 мг (відповідає 12 мг/кг маси тіла) кожні 12 год ^{БНФ}, цільова остаточна концентрація на 3-5 добу - 30-40 мг/л, підтримувальна доза - 12 мг/кг маси тіла в/в або в/м 1р/добу, цільова остаточна концентрація - >30 мг/л. Для інфекційного ендокардиту належна тривалість терапії - мінімум 21 день, тривалість терапії не повинна перевищувати 4 міс.; діти від 2 місяців до 12 років: навантажувальна доза - 10 мг/кг маси тіла в/в кожні 12 год загалом 3 введення, підтримувальна доза: 6-10 мг/кг маси тіла в/в 1р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: абсцес, суперінфекція (надмірний ріст нечутливих організмів), лейкопенія, тромбоцитопенія, еозинофілія, агранулоцитоз, нейтропенія, анафілактична р-ція (анафілаксія), лікарська р-ція з еозинофілією і системними симптомами (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms, DRESS), анафілактичний шок, запаморочення, головний біль, глухота, втрата слуху, відчуття шуму/дзвону у вухах, вестибулярні розлади, флебіт, тромбоз, тромбоз, бронхоспазм, діарея, блювання, нудота, висипання, еритема, свербіння, псевдоалергічна р-ція (почервоніння верхньої частини тіла), токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона, поліморфна еритема, ангіоневротичний набряк, ексфолюативний дерматит, кропивниця, підвищення рівня креатиніну в крові, НН (в тому числі ГНН), біль, пірексія, абсцес у місці ін'єкції, озноб (тремтіння), збільшення рівня трансаміназ (транзиторні порушення з боку трансаміназ), збільшення рівня лужної фосфатази в крові (транзиторні порушення з боку лужної фосфатази), збільшення рівня креатиніну в крові (транзиторне підвищення рівня креатиніну сироватки крові).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до тейкопланіну або до будь-якої з допоміжних речовин.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,4 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЛІТЕЙК	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. в конт. чар/уп.	400мг	№1	375,00	
	ТЕЙКОПЛАНІН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. в конт. чар/уп.	400мг	№1	585,00	
	ТЕЙКОПЛАНІН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. в конт. чар/уп.	200мг	№1, №15	відсутня у реєстрі OBLЦ	
II.	ТАРГОЦИД®	САНОФІ С.П.А, Італія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з амп. розч.	400мг	№1	відсутня у реєстрі OBLЦ	

17.2.7. Оксазолідинони

- **Лінезолід (Linezolid)**

Фармакотерапевтична група: J01XX08 - АБЗ для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний АБЗ; селективно інгібує синтез білка в бактеріях; безпосередньо зв'язується із рибосомами бактерій (23S з 50S субодиниць) та перешкоджає утворенню функціонального ініціюючого комплексу 70S (важливого компонента процесу трансляції); активний відносно аеробних Гр (+): *Enterococcus faecalis*, *Enterococcus faecium*, *Staphylococcus aureus*, коагулазонегативні стафілококи, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes*, *Group C streptococci*, *Group G streptococci*, деяких Гр (-) та анаеробних м/о: *Clostridium perfringens*, *Peptostreptococcus anaerobius*, *Peptostreptococcus species*; резистентні м/о: *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis*, *Neisseria species*, *Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas species*.

Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій, спричинених чутливими штамми анаеробних або аеробних Гр (+) м/о ^{БНФ}, включаючи інфекції, що супроводжуються бактеріємією: нозокоміальна пневмонія ^{БНФ}; негоспітальна пневмонія ^{БНФ}; ускладнені інфекції шкіри та її структур ^{БНФ}, зокрема інфекції на фоні діабетичної стопи без супутнього остеомієліту, спричинені *Staphylococcus aureus* (метицилінчутливими та метицилінрезистентними ізолятами), *Streptococcus pyogenes* або *Streptococcus agalactiae*; неускладнені інфекції шкіри та її структур, спричинені *Staphylococcus aureus* ^{БНФ} (тільки метицилінчутливими ізолятами) або *Streptococcus pyogenes*; інфекції, спричинені ентерококами, включаючи резистентні до ванкоміцину штамми *Enterococcus faecium* та *faecalis*; якщо збудники інфекції включають Гр (-) м/о, клінічно показане призначення комбінованої терапії ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: пацієнти, лікування яких було розпочато з призначення в/в інфузії, можуть бути переведені на р/ос лікування; для лікування госпітальної та негоспітальної пневмонії, ускладнених інфекцій шкіри та її структур дорослим та дітям (віком від 12 років і старше) призначають в/в або р/ос по 600 мг кожні 12 год ^{БНФ}; дітям (від народження до 11 років) в/в по 10 мг/кг ^{БНФ}, тривалість лікування - 10-14 дб; лікування інфекції, спричиненої *Enterococcus faecium*, резистентної до ванкоміцину (інфекції, які супроводжуються бактеріємією) дорослим та дітям (віком від 12 років і старше) - в/в або р/ос по 600 мг кожні 12 год; дітям (від народження до 11 років) в/в по 10 мг/кг, тривалість лікування - 14-28 дб; для лікування неускладнених інфекцій шкіри та її структур дорослим та дітям від 12 років призначають р/ос по 600 мг кожні 12 год ^{БНФ}, дітям 5-11 років - 10 мг/кг ^{БНФ} кожні 12

год; < 5 років - 10 мг/кг кожні 8 год, тривалість лікування - 10-14 діб; МДД для дорослих і дітей - не вище 600 мг 2 р/добу; в/в інфузія здійснюється протягом 30-120 хв^{БНФ}

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кандидоз, оральний кандидоз, вагінальний кандидоз, грибові інфекції; вагініт; а/б - асоційовані коліти, включаючи псевдомембранозний коліт; анемія, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія, еозинofilія; панцитопенія; мієлосупресія, сидеробластна анемія, анафілаксія, гіпонатріємія; лактоацидоз; безсоння; головний біль, перверсії смаку (металічний присмак), запаморочення; судоми, гіпестезія, парестезія; серотоніновий с-м, периферична нейропатія, затуманений зір; дефект поля зору; зорова нейропатія, неврит зорового нерва, втрата зору, зміна зорового відчуття, зміна сприйняття кольору, дзвін у вухах, аритмія (тахікардія), АГ; транзиторна ішемічна атака, флебіт, тромбофлебіт, діарея, нудота, блювання, локальний або генералізований біль у животі, запор, диспепсія; панкреатит, гастрит, здуття живота, сухість у роті, глосит, часті рідкі випорожнення, стоматит, розлади або зміна кольору язика; знебарвлення поверхні зубів, відхилення від норм показників функціональних печінкових проб, збільшення рівнів АЛТ, АСТ або лужної фосфатази; підвищення загального білірубіну, свербіж, висип; кропив'янка, дерматит, надмірне потовиділення; бульозні ураження шкіри, такі як с-м Стівенса - Джонсона та токсичний епідермальний некроліз, ангіоедема, алопеція, підвищення азоту сечовини крові; ниркова недостатність, підвищення креатиніну, поліурія, вильвовагінальні порушення, гарячка, локалізований біль; озноб, втома, біль у місці ін'єкції, спрага.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до лінезоліду або до будь-якого іншого компонента ЛЗ; пацієнти, які приймають будь-які ЛЗ, що пригнічують MAO A та B (фенелзин, ізокарбоксазид, селегілін, моклобемід) або протягом 2 тижн. після прийому таких ЛЗ; пацієнти з супутніми клінічними станами або супутнім прийомом ЛЗ: неконтрольованою АГ, феохромоцитомою, карциноїдом, тиреотоксикозом, біполярною депресією, шизоафективним розладом, г. епізодами запаморочення; інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, трициклічних антидепресантів, агоністів 5-НТ₁ рецепторів серотоніну (триптани), прямих та непрямих симпатоміметиків (адренергічні бронходилататори, псевдоефедрин, фенілпропаноламін), вазопресорів (епінефрин, норепінефрин), допамінергічних сполук (допамін, добутамін), петидинів або бупіпрону.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 1,2 г., перорально - 1,2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ІНФУЗОЛІД®	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 300мл у пак.	2 мг/мл	№1	1400,00	
	ЛІНЕЗОЛІДИН	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/інфуз. по 300мл у пл.	2 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛІНЕЗОЛІДИН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	600мг	№10x1	155,40	
	ЛІНЕЛІД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 300мл у конт.	2 мг/мл	№1	1509,68	
II.	ЗИВОКС	Пфайзер Фармасютікалз ЛЛС (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)/Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ (первинне, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії), США/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	600мг	№10x1	1202,39	25,31/\$
	ЗИВОКС	Фрезеніус Кабі Норге АС, Норвегія	р-н д/інфуз. по 300мл в сист. для в/в введ.	2 мг/мл	№1	1988,64	6,17/\$
	ЗИВОКС	Фрезеніус Кабі Норге АС, Норвегія	р-н д/інфуз. по 100мл в сист. для в/в введ.	2 мг/мл	№1	4238,94	6,17/\$
	ЛАЕН®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	600мг	№4x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛАЕН®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	600мг	№10x1	132,01	27,01/\$
	ЛІЗОЛІД-600	Гленмарк Фармасьютікалз Лтд., Індія	табл., в/о у стрип.	600мг	№10x1	189,40	27,06/\$
	ЛІЗОЛІД-600	Гленмарк Фармасьютікалз Лтд., Індія	табл., в/о у стрип.	600мг	№4x1	198,86	22,10/\$
	ЛІЗОМАК 600	Маклеодс Фармасьютікалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у стрип.	600мг	№4, №60, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛІЗОМАК 600	Маклеодс Фармасьютікалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у стрип.	600мг	№10x1	190,40	26,86/\$
	ЛІНЕЗІД	Бафна Фармасьютікалс Лтд./Вівімед Лабс Лтд, Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	600мг	№5x1	127,66	25,53/\$

ЛІНЕЗОЛІД КРКА	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії; контроль серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	600мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛІНЕЗОЛІД КРКА	С.К. Інфомед Флюїдз С.р.л. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, третинне пакування)/КРКА, д.д., Ново место (третинне пакування, контроль серії та випуск серії), Румунія/Словенія	р-н д/інфуз. по 300мл в сист. для в/в введ.	2 мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛІНЕЗОЛІД КРКА	С.К. Інфомед Флюїдз С.р.л. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, третинне пакування)/КРКА, д.д., Ново место (третинне пакування, контроль серії та випуск серії), Румунія/Словенія	р-н д/інфуз. по 300мл в сист. для в/в введ.	2 мг/мл	№1	963,38	30,11/€
ЛІНЕЗОЛІД- ГЕТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	600мг	№10x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛІНЕЗОЛІД- ГЕТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	600мг	№10x1	180,00	26,76/\$
ЛІНЕССА	Євролайф Хелткеар Пвт. Лтд., Індія	р-н д/інфуз. по 300мл у конт.	2 мг/мл	№1	997,16	26,95/\$
ЛІНТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	600мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛІНОЗИД	Мефар Ілач Сан. А.Ш., Туреччина	р-н д/інфуз. по 300мл у фл.	2 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
НЕЗОЛІД	Зім Лабораторіз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	600мг	№4x1, №10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

17.2.8. Інші антибіотики

- **Хлорамфенікол (Chloramphenicol) ***

Фармакотерапевтична група: J01BA01 - АБЗ для системного застосування; амфеніколи.

Основна фармакотерапевтична дія: а/б широкого спектра дії; дія пов'язана з порушенням процесу синтезу білка у мікробній клітині на стадії переносу амінокислот Т-РНК на рибосоми, механізм дії зумовлений пригніченням синтезу білка у клітинах м/о, у терапевтичних концентраціях проявляє бактеріостатичну дію, стійкість м/о до препарату розвивається повільно і, як правило, при цьому не виникає перехресна стійкість до інших хіміотерапевтичних засобів, у зв'язку з високою токсичністю; застосовують для лікування тяжких інфекцій, при яких менш токсичні а/б-засоби неефективні або протипоказані, ефективний щодо багатьох Гр (+) та Гр (+) бактерій: *Escherichia coli*, *Shigella flexneri* spp., *Shigella boydii* spp., *Shigella sonnei* spp., *Salmonella* spp., (у т. ч. *Salmonella typhi*), діє на *Streptococcus* spp. (у т. ч. на *Streptococcus pneumoniae*), *Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria meningitidis*, ряд штамів *Proteus* spp., на деякі штами *Pseudomonas aeruginosa*; активний відносно *Rickettsia* spp., *Treponema* spp., *Chlamydia* spp. (у тому числі *Chlamydia trachomatis*), збудників гнійних інфекцій, черевного тифу, дизентерії, менінгококової інфекції, бруцел, рикетсій, хламідій, спірохет; не діє на *Mycobacterium tuberculosis*, на патогенні найпростіші та на гриби; активний відносно штамів бактерій, стійких до пеніциліну, тетрациклінів, сульфаніламідів; стійкість м/о розвивається повільно, препарат малоактивний відносно кислотостійких бактерій, синьогнійної палички, кластридій та найпростіших

Показання для застосування ЛЗ: інфекційно-запальні захворювання, спричинені чутливими до препарату м/о: черевний тиф^{БНФ}, паратифи^{ВООЗ}, ієрсиніоз, бруцельоз^{ВООЗ}, шигельоз, сальмонельоз, туляремія^{ВООЗ}, рикетсіози^{ВООЗ}, хламідіози, гнійний перитоніт, бактеріальний менінгіт^{ВООЗ}, інфекції жовчовивідних шляхів, дизентерія, висипний тиф, трахома; інфекційні процеси, спричинені збудниками, чутливими до дії ЛЗ у випадку неефективності інших хіміотерапевтичних препаратів або коли їх застосування неможливе; не можна застосовувати для лікування легких форм інфекцій або з метою профілактики, а також при будь-яких інфекціях, для лікування яких доступні менш токсичні а/б, виражені порушення функцій печінки і/або нирок; дефіцит ферменту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази; порфірія.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос дорослим по 250-500 мг 3-4 р/день, добова доза - 2 г, в особливо тяжких випадках МДД - 4 г (під суворим контролем стану крові та ф-ції печінки та нирок), добову дозу розподіляють на 3-4 прийоми; для дітей 3-8 років разова доза - 125 мг, для дітей старше 8 років - 250 мг, кратність прийому - 3-4 р/добу; курс лікування 7-10 днів; парентеральну форму дорослим застосовують в/в та в/м, дітям - тільки в/м; добова доза для дорослих при загальних інфекціях становить 1-3 г; вводять по 0,5-1 г 2-3 р/добу з проміжком 8-12 год.; у разі необхідності добову дозу збільшують до 4 г; дітям до 1 року в/м у добовій дозі - 25-30 мг/кг, дітям від 1 року - 50 мг/кг, розподіливши на 2 введення з інтервалом 12 год..

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: апластична анемія, пригнічення діяльності кісткового мозку, «сірий с-м»; психомоторні розлади, депресія, делірій, сплутаність свідомості, периферичний неврит, неврит зорового нерва (параліч очних яблук), зорові та слухові галюцинації, зниження гостроти зору та слуху, розлади смаку, головний біль, енцефалопатія; диспепсія, здуття живота, сухість у роті, нудота, блювання, діарея, дерматит (періанальний дерматит), пригнічення мікрофлори кишечника, дисбактеріоз, ентероколіт, стоматит, глосит; порушення ф-цій печінки; пригнічення кісткового мозку, ретикулоцитопенія, зменшення Hb в крові, лейкопенія, гранулоцитопенія, тромбоцитопенія, еритроцитопенія, панцитопенія, апластична чи гіпопластична анемія, агранулоцитоз, цитоплазматична вакуолізація ранніх еритроцитарних форм; р-ції гіперчутливості (дерматози, свербіж, шкірні висипи, пропасниця, ангіоневротичний набряк, кропив'янка, анафілаксія); розвиток суперінфекції (грибкової, гіпертермія, р-ція бактеріолізу (р-ція Яриша-Герксгеймера), колапс - у дітей; гіпертермія, випадки пароксизмальної нічної гемоглобінурії.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до хлорамфеніколу, інших амфеніколів та до інших компонентів ЛЗ; захворювання крові, пригнічення кровотворення; захворювання шкіри (псоріаз, екзема, грибкові ураження); виражені порушення ф-цій печінки та/або нирок; дефіцит ферменту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази; порфірія; не призначати при ГРВІ, ангіні, з метою профілактики бактеріальної інфекції.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 3 г., парентерально - 3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	ЛЕВОМИЦЕТИН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	250мг	№10	19,44	
	ЛЕВОМИЦЕТИН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	500мг	№10	14,70	
	ЛЕВОМИЦЕТИН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	0,5г	№1	138,24	
	ЛЕВОМИЦЕТИН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	103,68	
	ЛЕВОМИЦЕТИН	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл. у бл.	500мг	№10x1	16,43	
	ЛЕВОМИЦЕТИН	ПАТ "Монфарм", Україна	табл. у стрип. та бл.	0,5г	№10, №20, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛЕВОМИЦЕТИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп. в пач.	250мг, 500мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛЕВОМИЦЕТИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	250мг	№10	22,00	
	ЛЕВОМИЦЕТИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	500мг	№10	17,13	

● **Рифампіцин (Rifampicin)** * [ПІМД]

Фармакотерапевтична група: J04AB02 - протитуберкульозні засоби. Антибіотики.

Основна фармакотерапевтична дія: а/б широкого спектра дії з найбільш вираженою активністю відносно МБТ, є напівсинтетичним а/б групи рифаміцину, ПТП І ряду, чинить бактерицидну дію, механізм якої обумовлений інгібуванням активності ДНК-залежної РНК-полімерази шляхом утворення з нею комплексів, що призводить до зниження синтезу РНК м/о, активний відносно атипичних мікобактерій різних видів (за винятком *M. fortuitum*), Гр (+) коків (стафілококів, стрептококів), паличок сибірської виразки, клостридій тощо, Гр (-) коки - *N. meningitidis* і *N. gonorrhoeae* (у тому числі β-лактамазотвірні) чутливі, однак швидко набувають стійкості, активний відносно *H. influenzae* (у т. ч. стійких до ампіциліну та хлорамфеніколу), *H. ducreyi*, *B. pertussis*, *B. antracis*, *L. monocytogenes*, *F. tularensis*, *Legionella pneumophila*, *Rickettsia prowazekii*, *Mycobacterium leprae*, рифампіцин має віруліцидну дію відносно вірусу сказу, пригнічує розвиток рабичного енцефаліту, представники сімейства Enterobacteriaceae та неферментуючі Гр (-) (*Pseudomonas* spp., *Acinetobacter* spp., *Stenothrophomonas* spp. тощо) – нечутливі, не діє на анаеробні м/о та гриби.

Показання для застосування ЛЗ: у комплексній терапії туберкульозу різної локалізації^{ВООЗ, БНФ, ПМД}, туберкульозного менінгіту, а також атипичних мікобактеріозів; інфекційно-запальних захворювань нетуберкульозної природи, спричинених чутливими до рифампіцину збудниками (у т. ч. тяжких форм стафілокової інфекції, лепри^{ВООЗ, БНФ}, легіонельозу, бруцельозу^{БНФ}, безсимптомного носійства *N. meningitidis*^{ВООЗ} для елімінації менінгококів з носоглотки^{ВООЗ} і профілактики менінгокового менінгіту^{ВООЗ, БНФ}; пораш. ліоф. д/приготування р-ну д/інфузій: лікування г. випадків захворювань при неможливості р/ос застосування препарату (післяопераційний або коматозний стан пацієнтів), а також для лікування пацієнтів з порушеннями шлунково-кишкового всмоктування; використовується в комбінації з іншими ПТП, призначений для лікування усіх форм туберкульозу^{БНФ ПІМД}; включаючи початкові, тяжкі, хр. та стійкі до інших а/б випадки; також ефективний проти більшості атипичних штамів м/о; лепра: використовувати у комбінації щонайменше з ще одним протилепрозним засобом; призначений для лікування бруцельозу, хвороби легіонерів та тяжких стафілококових уражень, щоб попередити появу стійких штамів інфекційних організмів, рифампін використовувати у комбінації з іншим а/б.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують р/ос та парентерально; для лікування туберкульозу^{ВООЗ, БНФ} дорослим - р/ос по 8-12 мг/кг/добу; пацієнтам з масою тіла < 50 кг - 450 мг/добу^{БНФ}, 50 кг та > - 600 мг/добу^{ВООЗ}; дітям від 6 до 12 років - 10-20 мг/кг/добу; МДД - не вище 600 мг^{ВООЗ}; тривалість терапії ПТП індивідуальна, зумовлена терапевтичним ефектом та може становити 1 рік і більше; щоб уникнути розвитку стійкості МБТ до рифампіцину, призначати його з іншими ПТП I та II ряду у їхній звичайних дозах; в/в інфузійно дорослим - 600 мг протягом 2-3 год 1 р/добу, дітям - 20 мг/кг/добу, МДД - не вище 600 мг; для лікування інфекційно-запальних захворювань нетуберкульозної природи (бруцельоз, легіонельоз, тяжкі форми стафілококової інфекції^{БНФ}; разом з іншим відповідним а/б для запобігання появи резистентних штамів) дорослим - внутрішньо р/ос по 900-1200 мг/добу за 2-3 прийоми^{БНФ}, МДД - 1200 мг, в/в - 600-1200 мг за 2-4 прийоми, після зникнення симптомів захворювання приймати ще протягом 2-3 днів; лепра: (у комплексі з імуностимулюючими ЛЗ)^{ВООЗ} - внутрішньо р/ос 600 мг/добу^{ВООЗ} за 1-2 прийоми протягом 3-6 міс. (можливі повторні курси з інтервалом в 1 міс.), за іншою схемою (на фоні комбінованої терапії ПТП) - у добовій дозі 450 мг, розподілений на 3 прийоми протягом 2-3 тижн. з інтервалом 2-3 міс. протягом 1-2 років; в/в - 10 мг/кг/добу (звичайна добова доза становить 450 мг у пацієнтів з масою тіла <50 кг, у пацієнтів з масою тіла 50 кг і > - 600 м^{БНФ} г); для лікування N. meningitidis - внутрішньо р/ос дорослим у добовій дозі - 600 мг^{БНФ}; дітям - 10-12 мг/кг/добу; протягом 4 діб.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота, блювання, діарея, біль у животі, зниження апетиту, анорексія, ерозивний гастрит, псевдомембранозний коліт, відчуття дискомфорту, гіпербілірубінемія, гепатит, припливи, свербіж, висипання, кропив'янка, екзантема, ексфоліативний дерматит, пемфігоїдна (пухирчаста) р-ція, мультиформна еритема, включаючи с-м Стівенса-Джонсона, с-м Лайєлла і васкуліт, DRESS-с-м, р-ції гіперчутливості, включаючи ангіоневротичний набряк, бронхоспазм, анафілактичний шок, анафілаксію, артралгія, гарячка, герпес, слъзотеча, лейкопенія, гемолітична анемія, тромбоцитопенія з/без пурпури (частіше при інтермітуючій терапії, проте є оборотною, якщо при перших проявах пурпури припинити застосування препарату), еозинофілія; агранулоцитоз, с-м внутрішньосудинної коагуляції, головний біль, запаморочення, порушення зору/зниження гостроти зору, порушення координації рухів, атаксія, дезорієнтація, психоз, порушення менструального циклу, недостатність надниркових залоз у хворих із порушеннями функції надниркових залоз, г. ураження нирок ч/з нефронекроз або інтерстиціальний нефрит, хроматурія, післяпологові геморагії, ембріональні геморагії, підвищення в крові рівня білірубіну, АСТ та АЛТ, печінкових ферментів, зниження АТ, підвищення рівня креатиніну в крові, забарвлення в оранжево-червоний колір сечі, калу, слини, мокротиння, поту, слизу, може стійко забарвлювати м'які контактні лінзи, індукція порфірії, міастенія, міопатія, загострення подагри, задишка і свистяче дихання, крововиливи у мозок, можливі грипоподібні симптоми (головний біль, запаморочення, епізоди гарячки, озноб, артралгія), розвиток АР, у тому числі відстрочених.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до рифампіцину, інших рифаміцинів або до інших компонентів препарату; тяжкі порушення функції печінки та нирок; жовтяниця (у т. ч. механічна); нещодавно перенесений (<1 року) інфекційний гепатит; тяжка легенево-серцева недостатність; одночасне застосування саквінавіру/ритонавіру.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,6 г., парентерально - 0,6 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	РИФАМПІЦИН	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	капс. у конт. плат. з контр. відкр.	150мг	№90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РИФАМПІЦИН	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	капс. у конт.	150мг	№1000	6,24	
	РИФАМПІЦИН	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	капс. у бл.	150мг	№10x2	7,03	
II.	МАКОКС 150	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	капс. у стрип.	150мг	№10x10	4,01	26,63/\$
	МАКОКС 150	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	капс. у бл.	150мг	№10x10	7,21	27,00/\$
	МАКОКС 300	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед,	капс. у бл.	300мг	№10x10	7,20	27,00/\$

	Індія					
МАКОКС 300	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	капс. у стрип.	300мг	№10x10	7,20	27,00/\$
РИФАМПІН	МАЙЛАН ЛАБОРАТОРІЗ ЛІМІТЕД - дільниця стерильних лікарських засобів, Індія	пор. ліоф. д/приг. р-ну д/інфуз. у фл.	600мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РИФАМПІН	МАЙЛАН ЛАБОРАТОРІЗ ЛІМІТЕД - ДІЛЬНИЦЯ СТЕРИЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, Індія	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	600мг	№1	273,42	24,86/\$
РИФАМПІН	Майлан Лаборагорізі Лімітед, Індія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. по 20мл	600мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
Р-ЦИН	Люпін Лімітед, Індія	капс. у бан.	150мг, 300мг	№100, №1000	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Фосфоміцин (Fosfomicin)** ^[ГІМД]

Фармакотерапевтична група: J01XX01 - протимікробні ЛЗ для системного застосування. Інші протимікробні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: а/б широкого спектра дії; ефективний відносно більшості Гр (+) (*Enterococcus spp.*, у т. ч. *Enterococcus faecalis*, *Staphylococcus spp.*, у т. ч. *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus saprophyticus*, *Staphylococcus epidermidis*; *Streptococcus spp.*, в т.ч. *Streptococcus faecalis*) та Гр (-) збудників (*Escherichia coli*, *Citrobacter spp.*, у т. ч. *Citrobacter diversus*, *Citrobacter freundii*; *Enterobacter spp.*, у т. ч. *Enterobacter aerogenes*; *Klebsiella spp.*, у т. ч. *Klebsiella pneumoniae*; *Morganella morganii*, *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*; *Serratia spp.*, у т. ч. *Serratia marcescens*; *Pseudomonas spp.*, у т. ч. *Pseudomonas aeruginosa*).

Показання для застосування ЛЗ: р/ос: г. неускладнені інфекції нижніх сечовивідних шляхів, спричинених чутливими до фосфоміцину м/о ^{БНФ, ГІМД}, у чоловіків та у дівчат віком від 12 років та дорослих жінок; профілактика інфекційних захворювань під час діагностичних процедур та хірургічних втручань у дорослих пацієнтів; порошок д/р-ну д/ін'єкц.: бактеріальні інфекції різної локалізації, спричинені чутливими до фосфоміцину м/о (при тяжкому перебігу інфекцій у комбінаціях з іншими а/б, частіше з β-лактамами): інфекції дихальних шляхів ^{БНФ} (пневмонія); інфекції сечостатевої системи ^{БНФ} (пієлонефрит); інфекції травного тракту та черевної порожнини (перитоніт); гінекологічні інфекції (ендометрит); хірургічні інфекції; сепсис.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують р/ос та парентерально ^{БНФ}; звичайна р/ос разова доза для дорослих у г. фазі захворювання 3 г одноразово ^{БНФ}; з метою профілактики інфікування сечовивідних шляхів при хірургічному втручанні, трансуретральних діагностичних дослідженнях внутрішньо р/ос 3 г (1-й пакет) за 3 год. до втручання і 3 г (2-й пакет) - ч/з 24 год після втручання; при парентеральному застосуванні звичайна добова доза для дорослих - 2-4 г; для дітей старше 5 років - 100-200 мг/кг ^{БНФ}; курс лікування становить 7-10 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: вульвовагініт, АР, головний біль, запаморочення, парестезія, судоми (при застосуванні великих доз), гіпестезія, заціпеніння, парестезія, тахікардія, артеріальна гіпотензія, відчуття дискомфорту у грудях, відчуття стискання у грудній клітці, прискорене серцебиття, астма, діарея, нудота, розлади травлення, біль у животі, блювання, псевдомембранозний коліт, стоматит, анорексія, висип, кропив'янка, свербіж, ангіоневротичний набряк, еритема, анафілактичний шок, втома, порушення з боку печінки, включаючи транзиторне підвищення активності АЛТ, АСТ, лужної фосфатази, лактатдегідрогенази і білірубину в сироватці крові, жовтяниця, панцитопенія, агранулоцитоз, анемія, гранулоцитопенія, лейкопенія, тромбоцитопенія, еозинфілія, порушення ф-ції нирок, у т.ч. підвищення концентрації сечовини в плазмі крові, протеїнурія, зниження або підвищення концентрації електролітів (натрію і калію), кашель, бронхоспазм, риніт, слабкість, приливи, нездужання, спрага, гарячка, периферичні набряки, вагініт, дисменорея, біль у горлі, біль у спині, зміни у місці введення, включаючи біль та інфільтрат, флебіт, відчуття болю по ходу вени.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до фосфоміцину або до компонентів ЛЗ, виражена НН (КлКр < 10 мл/хв); гранули, порошок для р/ос р-ну: ГД, дитячий вік до 12 років.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 3 г., парентерально - 8 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	УРОФОСЦИН®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	гран. д/орал. р-ну по 8г у пак.- саше	3г	№1	132,00	
	ФОСФОМІЦИН	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	гран. д/орал. р-ну у саше	3г	№1	134,00	
	ФОСФОМІЦИН	Публічне акціонерне товариство "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	гран. д/орал. р-ну по 8г у саше	3г	№1, №2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦИСТОРАЛ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія	гран. д/орал. р-ну по 8г у пак.	3г/пак.	№1	225,56	

		"Здоров'я", Україна					
II.	БЕРНІ	Спешл Продакт'с Лайн С.П.А., Італія	гран. д/орал. р-ну у пак.	3г, 8г	№1, №2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БЕРНІ	Спешл Продакт'с Лайн С.П.А., Італія	гран. д/орал. р-ну у пак.	3г	№2	131,13	30,85/€
	ЕСПА-ФОЦИН®	Ліндофарм ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)/еспарма Фарма Сервісез ГмбХ (вторинне пакування), Німеччина/Німеччина	пор. д/орал. р-ну по 8г у пак.	3000мг/пак	№1	260,00	29,56/€
	МОНУРАЛ	Замбон Світцербанд Лтд., Швейцарія	гран. д/орал. р-ну по 8г у пак.	3г/пак.	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФОСМІЦИН	Мейджі Сейка Фарма Ко., Лтд., Одавара Плант, Японія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№10	2386,62	27,12/\$
	ФОСМІЦИН	Мейджі Сейка Фарма Ко., Лтд., Одавара Плант, Японія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	2г	№10	2386,62	27,12/\$
	ФОСФОМЕД	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	гран. д/орал. р-ну у саше	3г	№2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФОСФОМЕД	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	гран. д/орал. р-ну у саше	3г	№1	139,97	26,38/\$
	ФОСФОРАЛ	Лабіана Фармасьютікалс, С.Л.У., Іспанія	гран. д/орал. р-ну по 8г у пак.	3г/пак.	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФОСФОЦИН	Лабіана Фармасьютікалс, С.Л.У., Іспанія	гран. д/орал. р-ну у саше	3г	№2	175,11	35,66/€

• **Спектиноміцин (Spectinomycin) ***

Фармакотерапевтична група: J01XX04 - АБЗ для системного застосування. Інші АБЗ. Спектиноміцин.

Основна фармакотерапевтична дія: а/б, який належить до аміноциклітолів і продукується м/о *Streptomyces spectabilis*, що містяться у ґрунті; інгібує синтез білків бактеріями шляхом впливу на рибосомну субодиночку 30S; активний щодо більшості штамів *Neisseria gonorrhoeae*, *Treponema pallidum* і *Chlamydia* не чутливі до цього препарату.

Показання для застосування ЛЗ: г. гонорейний уретрит і проктит у чоловіків та г. гонорейний цервіцит і проктит у жінок, що спричинені чутливими штамми *Neisseria gonorrhoeae*^{BOO3} та у випадках, коли β-лактамі а/б не показані; статевих партнерів пацієнтів з гонореєю також необхідно лікувати.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для в/м введення; рекомендована доза для дорослих (для чоловіків та жінок) - 2 г^{BOO3}; така ж доза рекомендована і для лікування пацієнтів, у яких попередня а/б-терапія була неефективною; у випадках, що тяжко піддаються лікуванню, а також у регіонах, де є дані про резистентність до а/б, рекомендовані дози для дорослих до 4 г^{BOO3}

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анафілаксія, анафілактичні р-ції; запаморочення, безсоння, нудота; кропив'янка, макулярні висипання; зміни у місці введення (біль у місці введення), озноб, підвищення t° тіла; холестатична жовтяниця; зниження діурезу (без порушення ф-ції нирок, що свідчить про ниркову токсичність), зниження КлКр, рівнів Нв, гематокриту та збільшення рівня ЛФ, азоту сечовини крові та АЛТ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до спектиноміцину або до будь-якої з допоміжних речовин

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	КІРИН	Медокемі ЛТД (Ампульний Ін'єкційний Завод)/Лабораторіо Італіано Біокіміко Фармасьютіко Лізафарма С.П.А., Кіпр/Італія	пор. д/супс. д/ін'єк. у фл. з розч. у бл.	2г	№1	211,73	30,69/€

17.2.9. Нітроїмідазоли

Дуже активні відносно анаеробів та найпростіших. Ефективні для лікування антибіотикоасоційованого коліту, викликаного *S.difficile*. Метронідазол і тинідазол застосовують для ерадикації *H.pylori* при ВХШДК. Лікарські форми для місцевого застосування використовують при лікуванні вугрового висипу. Добре всмоктуються із ШКТ, метронідазол за неможливості прийому п/о можна вводити в/в. Добре розподіляються в організмі, проходять через ГЕБ. Метаболізуються в печінці, виводяться переважно з сечею, t_{1/2} метронідазолу приблизно = 8,5 год, тинідазолу приблизно = 11-12 год, орнідазолу приблизно = 12-14 год (t_{1/2} не змінюються при нирковій

недостатності, у новонароджених можуть збільшуватися до ≥ 1 доби). В цілому добре переносяться, небажані реакції виникають при призначенні у високих дозах. Орнідазол, на відміну від метронідазолу і тинідазолу, не викликає дисульфірамоподібну реакцію, оскільки не інгібує ацетальдегіддегідрогеназу.

- **Метронідазол (Metronidazole)** * ^[ПМД] (див. п. 11.1.3. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: J01XD01 - АБЗ для системного застосування, похідні імідазолу; P01AB01- ЛЗ для лікування амебіази та інших протозойних захворювань, антипротозойні ЛЗ.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний (нітро-5-імідазол) антимікробний, антипротозойний ЛЗ; чутливі м/о: Peptostreptococcus spp., Clostridium spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Porphyromonas, Bilophila, Helicobacter pylori, Prevotella spp., Veilonella; стримує розвиток найпростіших: Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis (Lambliа intestinalis); неопосередковано чутливі: Bifidobacterium spp., Eubacterium spp.; нечутливі штами м/о: Propionibacterium, Actinomyces, Mobiluncus.

Показання для застосування ЛЗ: амебіаз ^{БНФ} ^{ВООЗ}; урогенітальний трихомоніаз ^{БНФ}; неспецифічні вагініти ^{ВООЗ}, лямбліоз ^{ВООЗ}; лямбліоз; хірургічні інфекції, спричинені чутливими до метронідазолу анаеробними м/о ^{БНФ};

заміна в/в лікування інфекцій, спричинених чутливими до метронідазолу анаеробними м/о; р-н д/інф.: лікування та профілактика інфекцій, спричинених м/о, чутливими до метронідазолу (в основному анаеробними бактеріями ^{ВООЗ} ^{БНФ});

інфекції ЦНС(включаючи абсцес мозку, менінгіт); інфекції легенів і плеври (включаючи некротизуючу пневмонію, аспіраційну пневмонію, абсцес легенів); ендокардит; інфекції травного тракту і черевної порожнини (включаючи перитоніт, абсцес печінки, інфекції після операції на товстій або прямій кишці, гнійні ураження абдомінальної або тазової порожнини ^{БНФ}); гінекологічні інфекції (включаючи ендометрит після гістеректомії або кесаревого розтину, пологову гарячку, септичний аборт); інфекції ЛОР-органів і ротової порожнини ^{БНФ} (включаючи ангіну Сімановського - Плаута - Вінсента); інфекції кісток і суглобів (включаючи остеомиєліт); газова гангрена; септицемія з тромбофлебітом; профілактичне застосування перед операціями з високим ризиком анаеробних інфекцій, при змішаних аеробних та анаеробних інфекціях застосовувати додатково до препарату відповідні а/б для лікування аеробних інфекцій.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують р/ос та парентерально; в/в: дорослим та дітям від 12 р.: звичайна доза препарату становить 500 мг кожні 8 год ^{ВООЗ} ^{БНФ}; при наявності медичних показань на початку лікування можна призначити навантажувальну дозу 15 мг/кг маси тіла, діти від 2 до 12 років: звичайна доза - 7-10 мг/кг маси тіла кожні 8 год, перед- і післяопераційна профілактика: дорослим та дітям від 11 років: 500 мг, введення завершувати приблизно за 1 год перед операцією, препарат ввести повторно у тій же самій дозі ч/з 8 і 16 год; дітям від 2 до 11 років - звичайна доза - 15 мг/кг маси тіла. введення метронідазолу завершувати приблизно за 1 год перед операцією, препарат ввести повторно у дозі 7,5 мг/кг маси тіла ч/з 8 і 16 год; амебіаз: р/ос приймати протягом 7 днів, дорослим: 1,5 г/добу (за 3 прийоми); діти (з масою тіла ≥ 20 кг): 30-40 мг/кг на добу, розділені на 3 прийоми, у випадку виникнення абсцесу печінки при амебіазі, дренажування або аспірація гною здійснюються одночасно з терапією метронідазолом; інвазійні кишкові захворювання у ^{БНФ} схильних до них пацієнтів - дорослі та діти віком від 10 років - 800 мг 3 р/добу, від 7 до 10 років - 400 мг 3р/добу, лямбліоз - діти від 10 років - 2000 мг за 1 прийом 3 дн. або 400 мг 3р/добу 5 дн ^{БНФ}, діти від 7 до 10 років - 1000 мг за 1 прийом 3 дні ^{БНФ}, діти від 6 до 7 років - 600-800 мг за 1 прийом 3 дні ^{БНФ}; трихомоніаз у жінок (уретрит і вагініт, зумовлені трихомонадами) - курс лікування протягом 10 днів, комбінуючи по 250 мг 2 р/добу та 1 вагін.супоз.(500 мг)/добу; статевий партнер повинен лікуватись одночасно, незважаючи на наявність або відсутність у нього клінічних ознак трихомонадної інфекції ^{БНФ}; трихомоніаз у чоловіків (уретрит, зумовлений трихомонадами): курс лікування 10 днів: по 250 мг 2 р/добу; у виняткових випадках може бути необхідно підвищити добову дозу до 0,750 г або 1 г, урогенітальний трихомоніаз (для попередження повторного зараження необхідно провести лікування партнера): дорослі та діти віком від 10 років - 2000 мг за 1 прийом або по 200 мг 3 р/добу 7 дн, 400 мг 2р/добу 5-7 днів ^{БНФ}; при неспецифічних вагінітах ^{БНФ} призначати по 500 мг 2 р/добу протягом 7 днів ^{ВООЗ} ^{БНФ}; анаеробні інфекції ^{ВООЗ} (терапія першої лінії або замісне лікування): дорослим -1,0-1,5 г/добу, дітям від 6 років (з масою тіла ≥ 16 кг) - із розрахунку 20-30 мг/кг/добу).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: розлади зору, двоїння в очах, короткозорість, окулогірний криз (окремі випадки), синусит, фарингіт, ядуха, нудота, блювання, діарея, глосит і стоматит, відрижка з гірким смаком, біль та відчуття важкості в епігастральній ділянці, втрата апетиту, металевий присмак у роті, обкладений язик, панкреатит (окремі випадки), оральний мукозит, абдомінальний спазм, запор, гепатобіліарні розлади, аномальні показники печінкових ензимів і білірубину, відхилення від норми показників функцій печінки, гепатит, жовтяниця, темний колір сечі (через виділення метаболіту метронідазолу), дизурія, цистит і нетримання сечі, дратівливість, головний біль, запаморочення, сонливість або безсоння, судоми, периферична нейропатія (симптомами якої є парестезії, біль, відчуття важкості та поколювання у кінцівках), енцефалопатія, розвиток підгострого мозочкового с-му (симптомами якого є атаксія, дизартрія, порушення ходи, ністагм, тремор), стан сплутаності свідомості, дратівливість, депресія, психотичні розлади, включаючи галюцинації, пригнічений настрій, зниження лібідо, зміни на електрокардіограмі, подібні до вирівнювання зубця Т, гіпотензія, лейкопенія, гранулоцитопенія, тромбоцитопенія, агранулоцитоз, апластична анемія, р-ції гіперчутливості від легкого до помірного ступеня, включаючи шкірні р-ції (свербіж, кропив'янка, мультиформна еритема), ангіоневротичний набряк, медикаментозна гарячка, тяжкі системні р-ції гіперчутливості (анафілаксія аж до анафілактичного шоку); с-м Стівенса-Джонсона (окремі повідомлення), с-м Лайелла (окремі повідомлення), артралгія, міалгія, дисменорея, гіперемія, подразнення вен (аж до тромбофлебіту) після в/в введення, свербіж, біль, пустульозний висип; слабкість, генітальні суперінфекції (спричинені *Candida*), псевдомембранозний коліт, що може виникати під час або після терапії та проявляється у формі тяжкої персистуючої діареї.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до метронідазолу, інших нітроімідазольних похідних або до інших компонентів ЛЗ, органічні ураження ЦНС, захворювання системи крові, печінкова недостатність (якщо необхідно призначити високі дози препарату), табл.:перший триместр вагітності, одночасне застосовування у комбінації з дисульфірамом чи алкоголем, дитячий вік до 6 років.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 1,5 г., перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МЕТРОНІДАЗОЛ	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. у пл. по 100мл	0,5%	№1	51,75	
	МЕТРОНІДАЗОЛ	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	0,5%	№1	42,96	
	МЕТРОНІДАЗОЛ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МЕТРОНІДАЗОЛ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	5 мг/мл	№1	49,38	
	МЕТРОНІДАЗОЛ	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл.	250мг	№10	18,47	
	МЕТРОНІДАЗОЛ	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл. в пач.	250мг	№10x2	43,47	
	МЕТРОНІДАЗОЛ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у фл. в пач. або без	5 мг/мл	№1	61,71	
	МЕТРОНІДАЗОЛ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл. у бл.	250мг	№10x2	49,36	
	МЕТРОНІДАЗОЛ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл. у бл.	250мг	№20x1	49,36	
	МЕТРОНІДАЗОЛ-НОВОФАРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл, 200мл у скл. пл. в пач. та без	5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МЕТРОНІДАЗОЛ-НОВОФАРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у скл. пл.	5 мг/мл	№1	44,25		
II.	ЕФЛОРАН	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у фл.	400мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕФЛОРАН	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	р-н д/інфуз. у фл. по 100мл	500мг/100мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МЕТРЕССА	Євролайф Хелткеар Пвт. Лтд., Індія	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	0,5%	№1	129,87	28,11/\$
	МЕТРОГІЛ®	Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	табл., вкриті п/о у бл.	200мг, 400мг	№10x2, №10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МЕТРОГІЛ®	"Юнік Фармасьютикал	р-н д/інфуз. у фл.	5 мг/мл	№1	120,00	24,56/\$

	Лабораторізі" (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	по 100мл				
МЕТРОНІДАЗОЛ	Євролайф Хелткеар Пвт. Лтд., Індія	р-н д/інфуз. по 100мл в конт.	0,5%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ТРИКАСАЙД	Фармасайнс Інк., Канада	капс. у бл.	500мг	№15x1	48,60	27,00/\$
ТРИКАСАЙД	Фармасайнс Інк., Канада	капс. у фл.	500мг	№30	96,39	27,00/\$
ТРИХОПОЛ®	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польща	табл. у бл.	250мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Тинідазол (Tinidazole)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: J01XD02 - АБЗ для системного застосування. Похідні імідазолу.

Основна фармакотерапевтична дія: активний щодо протозойних мікроорганізмів і облигатно-анаеробних бактерій, спричиняє внутрішньоклітинну редукцію специфічного метаболізму анаеробних м/о, впливає на структуру ДНК мікробної клітини, спричиняючи її руйнування або пригнічення синтезу, спектр дії поширюється на *Trichomonas vaginalis*, *Entamoeba histolytica* та *Giardia lamblia*, активний проти *Helicobacter pylori*, *Gardnerella vaginalis* та більшості облигатних анаеробних бактерій, у тому числі *Bacteriodes fragilis*, *Bacteriodes melaninogenicus*, *Bacteriodes* spp., *Clostridium* spp., *Eubacterium* spp., *Fusobacterium* spp., *Peptococcus* spp., *Peptostreptococcus* spp. та *Veillonella* spp.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика післяопераційних інфекцій, спричинених анаеробними бактеріями ^{БНФ}, особливо після операцій на товстому кишечнику, ШКТ та після гінекологічних операцій; ерадикація *Helicobacter pylori* ^{БНФ, ПМД}, асоційованого з виразками ДПК, разом з а/б та ЛЗ, що пригнічує продукування к-ти; лікування анаеробних інфекцій ^{БНФ}: інтраперитонеальних (перитоніт, абсцес); гінекологічних (ендометрит, ендоміометрит, тубооваріальний абсцес); бактеріальної септицемії; післяопераційних інфекцій ран; інфекції шкіри та м'яких тканин; інфекції ВДШ та НДШ (пневмонія, емпієма, абсцес легенів); неспецифічний вагініт; г. виразковий гінгівіт; уrogenітальний трихомоніаз у чоловіків та жінок; лямбліоз; кишковий амебіаз; амебне ураження печінки ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують р/ос; ерадикація *H. pylori*, асоційованого з виразками ДПК та шлунка: дорослі - 500 мг 2 р/добу разом з омепразолом по 20 мг 2 р/добу та кларитроміцином по 250 мг 2 р/добу 7 днів; анаеробні інфекції: початкова доза для дорослих та дітей старше 12 років - 2 г (день 1-й) з подальшим застосуванням по 1 г 1 р/добу або по 500 мг 2 р/добу, тривалість терапії становить 5 - 6 днів ^{БНФ}, за необхідності можна продовжити понад 7 днів, дітям до 12 років - не застосовують; неспецифічний вагініт: дорослі - разовий прийом 2 г ^{БНФ}, ефективність лікування підвищувалась при застосуванні 2 г 1 р/добу протягом 2-х послідовних днів (загальна доза - 4 г); г. виразковий гінгівіт: дорослі - 2 г одноразово ^{БНФ}; уrogenітальний трихомоніаз ^{БНФ} (при підтвердженні інфікування *Trichomonas vaginalis* рекомендовано одночасне лікування партнера), лямбліоз: рекомендована доза для дорослих - 2 г одноразово, для дітей від 3 років - 50-75 мг/кг одноразово ^{БНФ}, може знадобитись повторення цієї дози; кишковий амебіаз: дорослі - 2 г/добу одноразово, протягом 2-3 днів, діти - 50-60 мг/кг одноразово, протягом 3 послідовних днів ^{БНФ}; амебне ураження печінки: загальна доза для дорослих - 4,5-12 г ^{БНФ}, залежно від вірулентності *Entamoeba histolytica*; може знадобитись проведення аспірації гною в доповнення до застосування тинідазолу, лікування розпочинають у дозі 1,5-2 г 1 р/добу протягом 3-х днів ^{БНФ}, коли 3-денний курс лікування неефективний, лікування можна продовжувати до 6 днів; для дітей від 3 років - 50-60 мг/кг 1 р/добу протягом 5 послідовних днів ^{БНФ}; профілактика післяопераційних інфекцій: рекомендована доза для дорослих та дітей старше 12 років - 2 г одноразово, приблизно за 12 год. до проведення оперативного втручання ^{БНФ}; не застосовують дітям віком до 12 років.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: підвищення т° тіла, підвищена втомлюваність, гіперемія шкірних покривів, АР, транзиторна лейкопенія, нудота, блювання, анорексія, біль у животі, металевий присмак у роті, блювання, діарея, наліт на язиці, глосит, забарвлення сечі у темний колір, стоматит, вертиго (системне запаморочення), головний біль, атаксія, судороги, несистемне запаморочення, гіпестезія, парестезія, периферична невропатія, порушення чутливості, р-ції гіперчутливості, іноді тяжкі, включаючи шкірні висипання, свербіж, кропив'янку, дерматит, ангіоневротичний набряк.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до тинідазолу та інших похідних 5-нітроімідазолу, або до будь-якого допоміжного компонента ЛЗ; органічні ураження НС; пацієнти із захворюваннями крові (або з такими в анамнезі); тяжкі порушення функції печінки, I триместр вагітності та в період годування груддю.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ТИНІДАЗОЛ-ТЕВА	Балканфарма-Дупниця АТ/Балканфарма-Разград АТ, Болгарія/Болгарія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№4x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Орнідазол (Ornidazole)**

Фармакотерапевтична група: J01XD03 - АБЗ для системного застосування, похідні імідазолу. P01AB03 - засоби, що застосовуються у разі амебіазу та інших протозойних інфекцій. Похідні нітроімідазолу

Основна фармакотерапевтична дія: похідний 5-нітроімідазолу а/б, чинить антибактеріальну дію, подібну до дії метронідазолу та інших 5-нітроімідазолів; ДНК-тропний із вибірковою активністю щодо м/о, які мають ферментні системи, здатні відновлювати нітрогрупу і каталізувати взаємодію білків групи феридоксинів із нітросполуками;

після проникнення в мікробну клітину відновлює нітрогрупи під впливом нітроредуктаз м/о та активністю вже відновленого нітроїмідазолу; продукти відновлення утворюють комплекси з ДНК, спричиняючи її деградацію, порушують процеси реплікації і транскрипції ДНК; продукти метаболізму мають цитотоксичні властивості та порушують процеси клітинного дихання; ефективний щодо *Trichomonas vaginalis*, *Entamoeba histolytica*, *Giardia lamblia* (*Giardia intestinalis*), деяких анаеробних бактерій (*Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides*, *Clostridium* spp., *Fusobacterium*), анаеробних коків; чинить протипротозойну дію проти *Balantidium coli*, *Blastocystis hominis*, *Trichomonas vaginalis*, *Trichomonus foetus*, *Giardia intestinalis* і *Entamoeba histolytica*.

Показання для застосування ЛЗ: анаеробні системні інфекції, спричинені чутливою до орнідазолу мікрофлорою: септицемія, менінгіт, перитоніт, післяопераційні ранові інфекції, післяпологовий сепсис, септичний аборт та ендометрит; профілактика інфекцій, спричинених анаеробними бактеріями, при хірургічних втручаннях (особливо при операціях на ободовій та прямій кишці), при гінекологічних операціях; амевна дизентерія з тяжким перебігом, лямбліоз, трихомоніаз (сечостатевої інфекції у жінок і чоловіків, спричинені *Trichomonas vaginalis*), амєбіаз (усі кишкові інфекції, спричинені *Entamoeba histolytica*, у т. ч. амевна дизентерія, всі позакишкові форми амєбіази, особливо амєбний абсцес печінки).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують р/ос чи в/в; в/в, трихомоніаз: разова терапевтична доза - 1500 мг приймають ввечері, 5-денна терапія: 500мг вранці, 500 мг ввечері; одноразова добова доза для дітей - 25 мг/кг; амєбіаз: 3-денний курс лікування хворих з амєбною дизентерією: дорослі і діти з масою тіла > 35 кг - 1500 мг на 1 прийом ввечері, > 60 кг: 2000 мг(1000 мг вранці і 1000 мг ввечері), діти з масою тіла до 35 кг - 40 мг/кг маси тіла разова доза, 35 кг - 1500 мг на 1 прийом, 25 кг - 1000 мг на 1 прийом, 13 кг - 500 мг на 1 прийом; 5-10-денний курс лікування: дорослі і діти з масою тіла > 35 кг - 1000 мг (500 мг вранці і 500 мг ввечері), діти з масою тіла до 35 кг - 25 мг/кг маси тіла разова доза, 35 кг -1000 мг на 1 прийом, 20 кг - 500 мг на 1 прийом; лямбліоз: 1-2-денний курс лікування: дорослі і діти з масою тіла > 35 кг - 1500 мг за 1 прийом ввечері, діти з масою тіла до 35 кг - 40 мг/кг разова доза; в/в: анаеробні системні інфекції: дорослим і дітям від 12 років - в початковій дозі 500-1000 мг, потім по - 500 мг кожні 12 год або по 1000 мг кожні 24 год протягом 5-10 днів (ступенева доза), після того, як стан пацієнта стабілізувався, перейти на р/ос прийом орнідазолу; дітям до 12 років з масою тіла > 6 кг добову дозу призначати з розрахунку 20 мг/кг маси тіла, розподілену на 2 введення, протягом 5-10 діб; профілактика анаеробних інфекцій при хірургічних втручаннях дорослим і дітям від 12 років: в/в 500-1000 мг за півгодини перед оперативним втручанням; амевна дизентерія з тяжким перебігом, усі позакишкові форми амєбіази, лямбліоз, абсцес печінки - для дорослих і дітей від 12 років перше введення - 500-1000 мг, далі по - 500 мг кожні 12 год, протягом 3-6 діб; дітям до 12 років з масою тіла > 6 кг вводити із розрахунку 20-30 мг/кг маси тіла, розподілені на 2 введення.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: прояви впливу на кістковий мозок, помірна лейкопенія, нейтропенія; р-ції гіперчутливості (анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк); шкірні висипання, кропив'янка, гіперемія шкіри, свербіж; запаморочення, сонливість, головний біль, тремор, ригідність м'язів, порушення координації, атаксія, судоми, тимчасова втрата чи сплутаність свідомості, ознаки сенсорної або змішаної периферичної нейропатії, збудження; порушення смаку, металевий присмак у роті, сухість у роті, обкладеність язика, нудота, блювання, диспепсія, відчуття тяжкості і болючості в епігастральній ділянці; жовтяниця, гепатотоксичність, зміни печінкових функціональних проб; підвищення t°; озноб; загальна слабкість; втомлюваність; задишка; зміни в місці введення (біль, почервоніння, відчуття печіння у місці введення); потемніння кольору сечі, СС розлади (зниження АТ), загострення кандидомікозу

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до компонентів препарату або до інших похідних нітроїмідазолу; органічні захворювання ЦНС; епілепсія, розсіяний склероз, розсіяний склероз; порушення кровообігу, патологічні ураження крові або інші гематологічні аномалії; хр. алкоголізм.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 1 г., перорально - 1,5 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ОРНІГІЛ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл, 200мл у конт.	5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОРНІГІЛ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	5 мг/мл	№1	139,52	
	ОРНІГІЛ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	5 мг/мл	№1	151,80	
	ОРНІДАЗОЛ	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	0,5%	№1	180,00	
	ОРНІДАЗОЛ-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	капс. у бл.	500мг	№10x1	22,80	
	ОРНІДАЗОЛ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у фл.	5 мг/мл	№1	162,30	
	ОРНІДАЗОЛ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл., в/о у бл.	500мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОРНІДАЗОЛ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю	табл., в/о у бл.	500мг	№10x1	23,22	

		"Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна					
	ОРНІДАЗОЛ-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x1	18,39	
	ОРНІДАЗОЛ-НОВОФАРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	5 мг/мл	№1	259,20	
	ОРНІЗОЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x1	19,08	
	ОРНІЗОЛ®	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	5 мг/мл	№1	170,10	
	ОРНІМАК®	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	0,5%	№1	292,04	
II.	МЕРАТИН	Мепро Фармасьютикалс Приват Лімітед, Індія	табл., в/о у бл.	500мг	№10x1	45,60	26,70/\$
	ОРГІЛ®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл., в/о у бл.	500мг	№10x1	21,97	24,25/\$
	ОРНІВАГ 250	АБДІ ІБРАХІМ Ілач Санаі ве Тіджарет А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№10, №20, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОРНІВАГ 500	АБДІ ІБРАХІМ Ілач Санаі ве Тіджарет А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10, №20, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТИБЕРАЛ®	ВАТ Сандоз Груп Саглік Урунлери Ілачлари Сан. ве Тік., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

17.2.10. Сульфаніламіді і триметоприм

Клінічне значення сульфаніламідів знизилось через ріст резистентності та витіснення їх активнішими й менш токсичними АБЗ. Найширше застосовують комбіновані препарати, які містять сульфаніламіді і триметоприм. Ко-тримоксазол складається із сульфаніаміду середньої тривалості дії сульфаметоксазолу і триметоприму, на відміну від сульфаніламідів, має бактерицидні якості. Обидва компоненти мають $T_{1/2}$ близько 12 год.

Сульфаніламіді та ко-тримоксазол добре всмоктуються із ШКТ при прийомі натще, розповсюджуються в більшість органів та тканин, проникають через гематоенцефалічний бар'єр, частково метаболізуються в печінці, виділяються, в основному, нирками. При нирковій недостатності піддаються кумуляції.

Небажані реакції сульфаніламідів: висип, с-м Стівенса-Джонсона, с-м Лайела (найчастіше виникають при використанні препаратів довготривалої та наддовготривалої дії), кристалурія із можливим розвитком ГПН (особливо при застосуванні погано розчинних препаратів), порушення з боку системи крові (переважно у вигляді анемії та агранулоцитозу) та ін. Триметоприм менш токсичний, ніж сульфаніламіді.

• Сульфафадимідин (Sulfadimidine)

Фармакотерапевтична група: J01EB03 - протимікробні ЛЗ для системного застосування; сульфонаміди короткої дії.

Основна фармакотерапевтична дія: сульфаніламід короткої дії; активний відносно Гр (+) та Гр (-) коків, кишкової палички, шигел, клебсієл, холерного вібриона, збудників газової гангрені, сибірської виразки, дифтерії, катаральної пневмонії, чуми, хламідій, актиноміцетів, збудників токсоплазмозу; діє бактериостатично; механізм дії пов'язаний з ПАБК та конкурентним пригніченням дигідропротеоатсинтетази, що призводить до порушення синтезу тетрагідрофолієвої к-ти, необхідної для синтезу пуринів та піримідинів.

Показання для застосування ЛЗ: інфекції, спричинені чутливими до препарату м/о: інфекції ДШ та ЛОР-органів (бронхіт, пневмонія, ангіна, гайморит, отит); запальні захворювання жовчо- та сечовивідних шляхів; інфекції шкіри та м'яких тканин (ранова інфекція, піодермія, бешиха); гонорея, трахома; шигельоз; токсоплазмоз.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо р/ос; середні дози для дорослих - 2 г на 1-й прийом, потім - по 1 г 4-6 р/добу; вищі дози для дорослих: разова - 2 г, МДД - 7 г; дітям віком від 3 років - 0,1 г/кг на 1-й прийом, потім по 0,025 г/кг кожні 4-6-8 год.; шигельоз за схемою: по 1 г 6 р/добу кожні 4 год. (1-2-й день); по 1 г 4 р/добу кожні 6 год. (3-4-й день); по 1 г 3 р/добу кожні 8 год. (5-6-й день); на курс лікування - 25-30 г; після 5-6-денної перерви - 2-й курс терапії: по 1 г 5 р/добу кожні 4 год., вночі - через 8 год. (1-2-й день); по 1 г 4 р/добу, вночі не приймають (3-4-й день); по 1 г 3 р/добу (5-й день); протягом другого курсу приймають 21 г сульфафадимезину; при легкому перебігу шигельозу дозу можна зменшити до 18 г; лікування шигельозу у дітей віком від 3 років: разова доза - 0,4-0,75 г 4 р/добу; протягом 5-7 днів; при більшості інфекційних хвороб лікування триває як мінімум ще 48-72 год. після зникнення симптомів захворювання і підтвердження одужання результатами бактеріологічного аналізу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль у ділянці живота, диспептичні явища, у т. ч. нудота, блювання, діарея, анорексія; стоматит, сіалоаденіт, панкреатит, псевдомембранозний коліт, підвищення сироваткових рівнів печінкових трансаміназ, гепатомегалія, жовтяниця, гепатит, можливий гепатонекроз, головний біль, неврологічні р-кції, включаючи асептичний менінгіт, атаксію, доброякісну внутрішньочерепну гіпертензію, судоми, запаморочення, вертиго, сонливість/безсоння, відчуття втоми, периферичні або оптичні нейропатії, шум у вухах, депресія, психози, галюцинації, р-ції гіперчутливості, в т.ч. свербіж, шкірні висипання (включаючи кропив'янку), медикаментозна гарячка, озноб, р-ції фотосенсибілізації, ексфолиативний дерматит, токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайєлла), вузлувата еритема, мультиформна еритема, еритродермія, фіксована медикаментозна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, сироваткоподібний с-м, періорбітальний набряк, анафілактичні р-ції, в т.ч. ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок, випадки розвитку алергічного міокардиту, вузликового періартеріїту, СЧВ/вовчакоподібного с-му, агранулоцитоз, апластична анемія,

тромбоцитопенія, лейкопенія, нейтропенія, еозинofilія, г. гемолітична анемія при дефіциті глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, пурпура, гіпопротромбінемія, метгемоглобінемія, кристалурія (можливо, з поперековим болем, гематурією, олігурією, анурією), нефротоксичні р-ції: інтерстиціальний нефрит, тубулярний некроз, ниркова недостатність, збільшення рівнів сечовини, креатиніну в сироватці крові, гіпотиреоїдизм, гіпоглікемія, кашель, біль у горлі, задишка, легеневі еозинofilні інфільтрати, фіброзуючий альвеоліт, тахікардія, артеріїти, васкуліти, болі в суглобах, м'язові болі.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до сульфадимідину або до іншого компонента ЛЗ; наявність в анамнезі токсико-АР на інші сульфаніламідні або їх похідні; системні захворювання крові, пригнічення кістково-мозкового кровотворення, в т.ч. анемія, лейкопенія; виражені порушення ф-ції печінки та/або нирок; ниркова та/або печінкова недостатність; г. порфірія; гіпертиреоз; азотемія; дефіцит 1-глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (можливий гемоліз).

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	СУЛЬФАДИМЕЗИН	ТОВ "Агрофарм", Україна	табл. у бл.	500мг	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Сульфаніламід (Sulfanilamide)**

Фармакотерапевтична група: J01EB06 - протимікробні засоби для системного застосування; сульфаніламідні короткої дії.

Основна фармакотерапевтична дія: порушує утворення у м/о т. з. «росткових факторів» - фолієвої, дигідрофолієвої к-т, інших сполук, що містять у своїй молекулі параамінобензойну кислоту (ПАБК), сульфаніламід як конкурентний антагоніст кислоти включається у метаболічний ланцюг м/оі порушує у ньому процеси обміну, що призводить до бактеріостатичного ефекту, проявляє бактеріостатичний ефект щодо стрептококів, менінгококів, пневмококів, гонококів, кишкової палички, збудників токсоплазмозу та малярії, не впливає на анаеробні м/о.

Показання для застосування ЛЗ: інфекційно-запальні захворювання, спричинені чутливими до сульфаніламіду м/о: інфекційні захворювання шкіри та слизових оболонок (рани, виразки, пролежні), ентероколіт, пієліт, цистит.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос; дорослим та дітям віком від 12 років - разова доза 0,6-1,2 г, всього на добу - 3-6 г. Максимальна доза для дорослих - разова - 2 г, МДД - 7 г; дітям віком від 3 до 6 років - по 0,3 г 4-6 р/добу, від 6 до 12 років - по 0,3-0,6 г 4-6 р/добу. Максимальна доза для дітей - 0,9-2,4 г; тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально залежно від тяжкості і перебігу захворювання, локалізації процесу, ефективності терапії.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: лейкопенія, агранулоцитоз, апластична анемія, тромбоцитопенія, гіпопротромбінемія, еозинofilія, гемолітична анемія при дефіциті глюкозо-6-фосфатдегідрогенази; тахікардія, міокардит; головний біль, неврологічні р-ції, включаючи асептичний менінгіт, атаксію, незначна внутрішньочерепна гіпертензія, судоми, запаморочення, сонливість/безсоння, відчуття втоми, депресія, периферичні або оптичні невропатії, порушення зору, психоз, пригнічений стан, парестезії; легеневі інфільтрати, фіброзуючий альвеоліт; спрага, сухість у роті, диспептичні явища, нудота, блювання, діарея, анорексія, панкреатит, псевдомембранозний коліт; підвищення активності печінкових ферментів (АЛТ, АСТ, лужної фосфатази), холестатичний гепатит, гепатонекроз, гепатомегалія, жовтяниця, холестаза; зміна кольору сечі (насичений жовто-коричневий колір), кристалурія при кислій р-ції сечі; нефротоксичні р-ції: інтерстиціальний нефрит, тубулярний некроз, НН, гематурія, шокова нирка з анурією; гіперемія шкіри, шкірні висипання (у т. ч. еритематозно-сквамозні, папульозні), свербіж, кропив'янка, алергічний дерматит, фотосенсибілізація, ексфолювативний дерматит, вузликова еритема, ціаноз; р-ції гіперчутливості, включаючи токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайелла), с-м Стівена - Джонсона, СЧВ, сироваткоподібний с-м, анафілактичні р-ції, набряк Квінке, нежить; медикаментозна гарячка, біль у правому підребер'ї та попереку; утруднення дихання, вузликовий періартеріїт, гіпотиреоз, гіпоглікемія, гіпотиреоїдизм.

Протипоказання до застосування ЛЗ: індивідуальна чутливість до сульфаніламідів, сульфонів або до інших компонентів ЛЗ; наявність в анамнезі виражених токсико-алергічних р-цій на сульфаніламідні; пригнічення кровотворення у кістковому мозку; некомпенсована СН; захворювання кровотворної системи; анемія; лейкопенія; базедова хвороба; захворювання нирок та печінки (нефрози, нефрити, ПН, тяжка НН, г. гепатити); гіпертиреоз; уроджений дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази; азотемія; порфірія.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	СТРЕПТОЦИД	ТОВ "Тернофарм", Україна	табл. у бл.	0,5г	№10	8,05	
	СТРЕПТОЦИД	ТОВ "Тернофарм", Україна	табл. у бл.	0,3г	№10	5,94	
	СТРЕПТОЦИД	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл.	300мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СТРЕПТОЦИД	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. у бл.	300мг	№10	4,88	
	СТРЕПТОЦИД	ПАТ "Монфарм", Україна	табл. у стрип. та бл.	0,5г	№10, №20, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СТРЕПТОЦИД	ПАТ "Київмедпрепарат"/ПАТ	табл. у стрип. та бл.	300мг	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	"Галичфарм", Україна/Україна					
СТРЕПТОЦИД- ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар. уп. в пач. або без	300мг	№10, №10x1	5,14	

• **Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxine)**

Фармакотерапевтична група: J01ED01 - протимікробні ЛЗ для системного застосування; сульфаніламід тривалої дії.

Основна фармакотерапевтична дія: бактериостатичний засіб, сульфаніламід тривалої дії, механізм дії пов'язаний з конкурентним антагонізмом із параамінобензойною кислотою, пригніченням дигідропротоатсинтетаз, порушенням синтезу тетрагідрофолієвої кислоти, необхідної для синтезу пуринів та піримідинів виявляє а/б-активність відносно Гр (+) та Гр (-) м/о: пневмококів, стафілококів, стрептококів, кишкової палички, палички Фрідлендера, збудників дизентерії; менш активний відносно протея; активний відносно збудника трахоми; не впливає на штами бактерій, стійких до інших сульфаніламідів.

Показання для застосування ЛЗ: Інфекційно-запальні захворювання, спричинені чутливою до дії препарату мікрофлорою: тонзиліт, бронхіт, пневмонія, гайморит, отит, дизентерія, запальні захворювання жовчних та сечовивідних шляхів, гонорея, бешиха, піодермія, менінгіт, інфекція ран, трахома, токсоплазмоз, шигельоз, резистентні форми малярії (у поєднанні з протималярійними препаратами).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують р/ос 1 р/день з інтервалами між прийомами 24 год.; дорослим: 1-2 г (день 1-й), у наступні дні - по 500 мг-1 г/добу; дітям від 12 років: 1 г (день 1-й), у наступні дні - по 500 мг/добу; дітям 3-12 років: 25 мг/кг (день 1-й), у наступні дні - по 12,5 мг/кг/добу; після нормалізації т° тіла у підтримуючих дозах застосовують ще протягом 2-3 днів; курс лікування залежно від тяжкості захворювання становить 7-14 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: лейкопенія, агранулоцитоз, апластична анемія, тромбоцитопенія, гіпопротромбінемія, еозинофілія, гемолітична анемія при дефіциті глюкозо-6-фосфатдегідрогенази; головний біль, неврологічні р-ції, включаючи асептичний менінгіт, атаксію, незначна в/черепна гіпотензія, судоми, запаморочення, сонливість, безсоння, відчуття втоми, депресія, периферичні або оптичні невротії, психоз; легеневі інфільтрати, фіброзуючий альвеоліт; спрага, сухість у роті, диспепсичні явища, нудота, блювання, діарея, анорексія, панкреатит, псевдомембранозний коліт; зміна кольору сечі (насичений жовто-коричневий колір), кристалурія; можливі нефротоксичні р-ції - інтерстиціальний нефрит, тубулярний некроз, ниркова недостатність; шкірні висипання, кропив'янка, алергічний дерматит, фотосенсибілізація, екзофоліативний дерматит, вузликова еритема; токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайелла), с-м Стівена-Джонсона, СЧВ, сироваткоподібний с-м, анафілактичні р-ції, набряк язика, верхньої губи, порушення ковтання; медикаментозна гарячка, біль у правому підбер'ї та попереку; підвищення активності печінкових ферментів (АЛТ, АСТ, ЛФ), холестатичний гепатит, гепатонекроз, гепатомегалія, жовтяниця; міокардит, вузликівий періартеріїт, гіпотиреоз, гіпоглікемія.

Противіказання до застосування ЛЗ: індивідуальна гіперчутливість до компонентів препарату; наявність в анамнезі виражених токсико-алергічних р-цій на сульфаніламід, пригнічення кістково-мозкового кровотворення, хр. СН, ниркова і/або печінкова недостатність, гепатит, дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, порфірія, азотемія, агранулоцитоз, гемолітична анемія, медикаментозна пропасниця, тяжкий дерматит.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,5 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	СУЛЬФАДИМЕТОКСИН	ТОВ "Агрофарм", Україна	табл. у бл.	500мг	№10	1,40	
	СУЛЬФАДИМЕТОКСИН	ПАТ "Монфарм", Україна	табл. у стрип. та бл.	0,5г	№10, №20, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СУЛЬФАДИМЕТОКСИН	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	табл. у бл.	0,5г	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СУЛЬФАДИМЕТОКСИН	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	табл. у бл.	0,5г	№10	1,07	
	СУЛЬФАДИМЕТОКСИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп. в пач. або без	500мг	№10, №10x1	1,61	
	СУЛЬФАДИМЕТОКСИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл. у бл.	500мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СУЛЬФАДИМЕТОКСИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва,	табл. у бл. в пач. або без	500мг	№10, №10x1	2,05	

		контроль якості, випуск серії)/ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна					
--	--	--	--	--	--	--	--

Комбіновані препарати

- **Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim) ***

Визначена добова доза (DDD): перорально: для дози 200мг/40мг – 40мл, перорально: для дози 400мг/80мг - 4 табл., перорально - дитяча добова доза не визначена, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БАКТИСЕПТОЛ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	сусп. по 100мл у фл. з мірн. лож.	200мг/40мг/5 мл	№1	38,82	
	БІ-СЕПТ-ФАРМАК®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	400мг/80мг	№20x1	9,20	
	БІ-ТОЛ	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	сусп. орал. по 100г у фл. або бан.	200мг/40мг/5 мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТРИСЕПТОЛ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	табл. у бл.	100мг/20мг	№10x2	11,62	
	ТРИСЕПТОЛ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна	табл. у бл.	400мг/80мг	№10x2	9,94	
II.	БІСЕПТОЛ	МЕДАНА ФАРМА Акціонерне Товариство, Польща	сусп. орал. у фл. по 80мл з дозат.	200мг/40мг/5 мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БІСЕПТОЛ 480	Варшавський фармацевтичний завод Польфа АТ, Польща	конц. д/приг. р-ну д/інфуз. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	80мг/16мг/5мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БІСЕПТОЛ®	АТ "Адамед Фарма", Польща	табл. у бл. та конт.	100мг/20мг, 400мг/80мг	№1000	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БІСЕПТОЛ®	АТ "Адамед Фарма", Польща	табл. у бл. та конт.	100мг/20мг	№20x1	36,00	26,67/\$
	БІСЕПТОЛ®	АТ "Адамед Фарма", Польща	табл. у бл. та конт.	400мг/80мг	№20x1	14,99	26,67/\$
	БІСЕПТОЛ®	АТ "Адамед Фарма", Польща	табл. у бл. та конт.	400мг/80мг	№14x1	16,00	26,67/\$
	СУМЕТРОЛІМ®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	сусп. орал. по 100мл у фл. з мірн. ємкіс.	25мг/5мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СУМЕТРОЛІМ®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл. у бл.	400мг/80мг	№10x2	11,50	25,56/\$

17.2.11. Хінолони

Їх поділяють на 4 покоління: нефторовані (I покоління) та фторовані (фторхінолони) хіноліни (II-IV покоління):
Класифікація хінолонів

I покоління	II покоління	III покоління	IV покоління
Налідиксова кислота Піпемідова кислота Оксолінова кислота	Норфлуксацин Ципрофлоксацин Офлоксацин Пефлоксацин Ломефлоксацин	Левовфлоксацин Спарфлоксацин	Моксифлоксацин Геміфлоксацин Гатифлоксацин

Хінолони I є активними переважно відносно грам(-) флори, застосування налідиксової кислоти обмежується неускладненими інфекціями нижніх відділів сечових шляхів та кишковими інфекціями (особливо шигельоз у дітей). Ципрофлоксацин діє на грам(+) м/ои. Важливе значення має активність відносно кишкової палички, сальмонел, шигел, кампілобактеру, нейсерії, *P.aeruginosa* та ін. Серед грам(+) флори найчутливіші стафілококи (крім MRSA). Є активним відносно легіонел та *M.tuberculosis*, помірно активний відносно пневмококів, ентерококів, хламідій. При лікуванні хламідійних інфекцій спостерігають високий рівень невдач, тому рекомендують застосовувати лише офлоксацин. Більшість анаеробів є резистентними. Добре розміщується в організмі, створює

високі внутрішньоклітинні концентрації, виділяється переважно з сечею, $t_{1/2} = 3-4$ год. Застосовують для лікування тяжких системних інфекцій (включаючи нозокоміальні), гонореї та туберкульозу (резервний препарат). *Офлоксацин* поступається ципрофлоксацину своєю активністю відносно синегнійної палички, але є активнішим відносно пневмококів та хламідій. Має майже 100% біодоступність при прийомі *п/о*. *Пефлоксацин* дещо поступається ципрофлоксацину і офлоксацину з АБ-активності, краще проникає через ГЕБ. Показання до застосування: як у ципрофлоксацина (крім туберкульозу), можна застосовувати при менінгіті. *Норфлоксацин* переважає за активністю налідиксову кислоту, але поступається ципрофлоксацину. Застосування обмежене інфекціями сечових шляхів, кишковими інфекціями та простатитом. *Ломефлоксацин* має довготривалий $T_{1/2}$ (95-100 год), не взаємодіє з метилксантинами і непрямыми антикоагулянтами, відносно часто викликає фотосенсибілізацію. Застосовують у комплексній терапії лікарсько-резистентного туберкульозу. *Левоефлоксацин* («респіраторний» хінолон) і *моксифлоксацин* переважають хіноліни II по активності відносно пневмококу (в т.ч. пеніцилінорезистентні штами) та внутрішньоклітинних патогенів (мікоплазми, хламідії). *Моксифлоксацин* є активним відносно неспорутворюючих анаеробів, у т.ч. *B.fragilis*, поступається ципрофлоксацину в активності відносно синегнійної палички. Не має фототоксичності, менше за інші хінолони впливає на довготривалість інтервалу Q – T. *Геміфлоксацин* близький до моксифлоксацину, але діє вираженіше на грам(-) флору та є найактивнішим серед фторхінолонів відносно пневмококів.

Протипоказання до застосування усіх ЛЗ – гіперчутливість Нефторовані хінолони також протипоказані при тяжкій нирковій та/або ПєН, тяжкому церебральному атеросклерозі; фторхінолони – при годуванні груддю, дітям до 18 років (окрім інфекцій, що загрожують життю, за відсутності альтернативи).

Небажані реакції. Анорексія, нудота, блювання, розлад смаку, рідко – діарея, головний біль, запаморочення, порушення сну, дуже рідко – судоми. Подовження інтервалу Q – T на ЕКГ (ризик розвитку аритмії); висип, кропивниця, АО, васкуліт, фотосенсибілізація; тендіт (ризик розриву ахілового сухожилля).

Застереження. Дефіцит Г-6-ФД; захворювання, які супроводжуються подовженням інтервалу Q – T; одночасний прийом ЛЗ, які потенційно сповільнюють серцеву провідність (антиаритмічні засоби класів Ia, II та III, ТЦА; АПС та ін.). Прийом ГК (ризик розривів сухожиль, особливо у людей похилого віку); надмірна інсоляція. При довготривалості лікування > 2 тижні необхідно контролювати аналізи крові, функції нирок та печінки. При появі болів у сухожиллях слід перестати вживати й забезпечити спокій ураженому суглобові до зникнення симптомів. В/в вводити лише крапельно.

- **Кислота піпемідинова (Pipemidic acid)**

Фармакотерапевтична група: J01MB04 - АБЗ групи хінолонів.

Основна фармакотерапевтична дія: уроантисептик хінолонового ряду з широким спектром антибактеріальної дії; чинить бактериостатичну і бактерицидну дію; інгібує бактеріальну ДНК-топоізомеразу II (ДНК-гіразу), яка бере участь у реплікації, транскрипції, репарації бактеріальної ДНК, призводить до руйнування бактеріальної ДНК; діє на Гр (-) бактерії; ефективна проти ентеробактерій, має бактерицидну активність проти більшості видів *Proteus* spp. (*Proteus mirabilis*), *Escherichia coli*, *Citrobacter* spp., *Haemophilus influenzae*, *Morganella morganii* і *Serratia* spp.; помірно ефективна проти *Klebsiella* spp., *Alcaligenes* spp., *Acinetobacter* spp. і *Providencia stuartii*; неактивна проти *Pseudomonas* spp., *Chlamydia trachomatis*, *Mycobacterium marinum* і проти Гр (+) бактерій- *Coccobacilli* та *bacilli*.

Показання для застосування ЛЗ: інфекційно-запальні захворювання, спричинені чутливими до піпемідової кислоти м/о, у т.ч. пієлонефрит, уретрит, цистит, простатит, неспецифічний кольпіт.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати по 1 супоз. (200 мг) вагінально або ректально 2 р/добу 10 днів; при необхідності добову дозу збільшити до 3 супоз., тобто по 1 супоз. 3 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: подразнення, біль, свербіж у місці введення препарату, еозинфілія, а у пацієнтів літнього віку і пацієнтів із порушеннями функції нирок спостерігалася оборотна тромбоцитопенія, в осіб із дефіцитом глюкозо-6-фосфатдегідрогенази можлива гемолітична анемія, збудження, депресія, сплутаність свідомості, галюцинації, тремор, порушення сну, сенсорні порушення, запаморочення; судоми, вертиго, головний біль; порушення зору; р-ції гіперчутливості, що включають висипання на шкірі, свербіж, фотосенсибілізацію, с-м Стівенса-Джонсона; ангіоневротичний набряк, шкірні реакції оборотні, анафілактичні реакції, у зв'язку з можливістю перехресної чутливості до інших хінолонів вимагає обережності лікування пацієнтів, які мали анафілактичну реакцію на будь-який хінолон; г. артропатія, тендіт; анорексія, біль в епігастральній ділянці, печія, нудота, блювання, метеоризм, абдомінальний біль, діарея або запор; псевдомембранозний коліт; слабкість, розвиток резистентності, суперінфекція.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до піпемідової кислоти, хінолонів або до будь-якого іншого компонента препарату, виражені порушення нирок (КлКр < 10 мл/хв), виражені порушення функції печінки, цироз печінки, порфірія, захворювання ЦНС (епілепсія, неврологічні стани зі зниженим судомним порогом).

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	УРОСЕПТ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	супоз. у бл.	0,2г	№5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	

- **Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) * [ГМД]**

Фармакотерапевтична група: J01MA02 - АБЗ для системного застосування; фторхінолони.

Основна фармакотерапевтична дія: бактерицидна дія зумовлена здатністю пригнічувати топоізомеразу II типу (ДНК-гіразу та топоізомеразу IV), які є необхідними в багатьох процесах життєвого циклу ДНК (реплікація, транскрипція, репарація і рекомбінація); чутливі аеробні Гр (+) м/о: *Bacillus anthracis*; аеробні Гр (-) м/о: *Aeromonas* spp., *Brucella* spp., *Citrobacter koseri*, *Francisella tularensis*, *Haemophilus ducreyi*, *Haemophilus influenzae*, *Legionella* spp., *Moraxella catarrhalis*, *Neisseria meningitidis*, *Pasteurella* spp., *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Vibrio* spp., *Yersinia pestis*; анаеробні м/о: *Mobiluncus*; інші м/о: *Chlamydia trachomatis*, *Chlamydia pneumoniae*, *Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma pneumoniae*; до видів, для яких можливий розвиток набутої резистентності відносяться: Гр (+) м/о:

Enterococcus faecalis, Staphylococcus spp.; аеробні Гр (-) м/о: Acinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia, Campylobacter spp., Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia spp., Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Serratia marcescens; анаеробні м/о: Peptostreptococcus spp., Propionibacterium acnes; м/о початково резистентні до ципрофлоксацину: аеробні Гр (+) м/о: Actinomyces, Enterococcus faecium, Listeria monocytogenes; аеробні Гр (-) м/о: Stenotrophomonas maltophilia; інші анаеробні м/о; інші м/о: Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum.

Показання для застосування ЛЗ: дорослі: інфекції НДШ^{БНФ БНФ}, спричинені Гр (-) бактеріями: загострення ХОЗЛ; bronхо-легеневі інфекції при кістозному фіброзі або при бронхоектазах^{ВООЗ БНФ}; пневмонія, загострення хр. синуситу, особливо якщо він спричинений Гр (-) бактеріями, інфекції сечового тракту, інфекційні ураження статевої системи:^{ВООЗ БНФ} орхоепідиміт, зокрема спричинений *Neisseria gonorrhoeae*; запальні захворювання органів малого тазу^{ВООЗ}, зокрема спричинені *Neisseria gonorrhoeae*, інфекції ШКТ (діарея мандрівників)^{ВООЗ} інтраабдомінальні інфекції, інфекції шкіри та м'яких тканин^{ВООЗ}, спричинені Гр (-) бактеріями, тяжкий перебіг отиту зовнішнього вуха^{ВООЗ}, інфекції кісток та суглобів^{ВООЗ}, легенева форма сибірської виразки (профілактика після контакту і радикальне лікування^{БНФ ВООЗ}); при лікуванні пацієнтів із нейтропенією, якщо існує підозра, що підозрюється т^о тіла спричинене бактеріальною інфекцією; діти та підлітки: легенева форма сибірської виразки (профілактика після контакту і радикальне лікування бронхолегеневі інфекції при кістозному фіброзі^{ВООЗ БНФ}, спричинені синьогнійною паличкою (*Pseudomonas aeruginosa*); ускладнені інфекції сечового тракту^{ВООЗ БНФ} та пієлонефрит; можна застосовувати для лікування тяжких інфекцій у дітей та підлітків, коли лікар вважає це необхідним.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують р/ос та парентерально; дорослим для лікування інфекції НДШ: р/ос - 500 мг- 750 мг 2 р/добу 7-14 днів; в/в - 400 мг 2 р/день^{БНФ} або 3р/день 7-14 днів; інфекції ВДШ^{БНФ}: загострення хр. синуситу, хр. гнійний отит середнього вуха р/ос - 500 мг - 750 мг 2 р/добу 7-14 днів^{БНФ}; в/в - 400 мг 2 р/день^{БНФ} 3р/день 7-14 днів; важкий перебіг отиту зовнішнього вуха р/ос - 750 мг 2 р/добу^{БНФ}; в/в - 400 мг 3 р/день 28 днів - 3 міс.; інфекції сечового тракту^{БНФ}: неускладнений цистит р/ос 250 мг - 500 мг 2 р/добу 3 дні^{БНФ}, жінкам перед менопаузою застосовувати одноразову дозу 500 мг; ускладнений цистит^{БНФ}, неускладнений пієлонефрит р/ос - 500 мг 2 р/добу 7 днів^{БНФ}; ускладнений пієлонефрит р/ос - 500 мг- 750 мг 2 р/добу не менше 10 днів, при деяких випадках (абсцесах) понад 21 день; простатит р/ос - 500 мг^{БНФ} - 750 мг 2 р/добу від 2 до 4 тижнів (г. стан) і від 4 до 6 тижнів (хр.); в/в - 400 мг 2 - 3 р/день^{БНФ} 2-4 тижні (загострення); ускладнений та неускладнений пієлонефрит в/в - 400 мг 2 р/день^{БНФ} або 3р/день 7-21 дні (може тривати більше 21 дня за особливих обставин); інфекції статевої системи: гонококовий уретрит, цервіцит: р/ос 500 мг одноразово^{БНФ, ВООЗ}; орхоепідиміт та запальні захворювання органів малого тазу: р/ос - 500 мг- 750 мг 2 р/добу або в/в - 400 мг 2 - 3 р/день 14 днів; інфекції ШКТ та інтраабдомінальні інфекції: діарея, спричинена бактеріальними патогенами, зокрема Shigella spp., крім Shigella dysenteriae, тип 1, і тяжка діарея мандрівників р/ос - 500 мг 2 р/день протягом 1-го дня^{ВООЗ} або в/в 400 мг 2 р/день протягом 1-го дня; діарея, спричинена Shigella dysenteriae, тип 1: р/ос - 500 мг 2 р/день 5 днів^{ВООЗ} або в/в 400 мг 2 р/день 5 днів; діарея, спричинена Vibrio cholerae: р/ос - 500 мг 2 р/день 3 дні або в/в 400 мг 2 р/день 3 дні; тифоїдна лихоманка: р/ос - 500 мг 2 р/день 7 днів; інтраабдомінальні інфекції, спричинені Гр(-) бактеріями: р/ос - 500 мг - 750 мг 2 р/добу 5-14 днів або в/в 400 мг 2 - 3 р/день 5-14 днів; черевний тиф: в/в - 400 мг 2 р/добу 7 днів; інфекції шкіри та м'яких тканин: р/ос - 500 мг - 750 мг 2 р/добу або в/в 400 мг 2 - 3 р/день 7-14 днів; інфекції кісток та суглобів: р/ос - 500 мг - 750 мг 2 р/добу або в/в 400 мг 2 - 3 р/день максимум 3 місяці; пацієнтам із нейтропенією та гіпертермією у разі підозри щодо бактеріального інфекційного генезу лихоманки (застосовувати одночасно з відповідними АЗБ згідно з офіційними рекомендаціями): р/ос - 500 мг - 750 мг 2 р/добу або в/в 400 мг 2 - 3 р/день впродовж всього періоду нейтропенії; профілактика інвазивних інфекцій, спричинених Neisseria meningitidis: р/ос - 500 мг одноразово^{БНФ, ВООЗ}; профілактика після контакту і лікування легеневої форми сибірської виразки (застосовувати якомога скоріше після підозрюваного або підтвердженого контакту): р/ос - 500 мг 2 р/день або в/в 400 мг 2 р/день протягом 60 днів з дня підтвердженого контакту з *Bacillus anthracis*^{БНФ}; дітям при кістозному фіброзі: р/ос - 20 мг/кг 2 р/добу 10-14 днів, максимальна разова доза - 750 мг^{ТМД}; в/в - 10 мг/кг 3 р/день 10-14 днів, максимум 400 мг на дозу; дітям при ускладнених інфекціях сечового тракту та пієлонефриті: р/ос - 10-20 мг/кг 2 р/добу 10-21 день, максимальна разова доза - 750 мг; в/в - 6 - 10 мг/кг 3 р/день 10-14 днів, максимум 400 мг/дозу; дітям профілактика після контакту і лікування легеневої форми сибірської виразки у пацієнтів, які можуть отримувати лікування р/ос (якщо це клінічно необхідно), застосовувати якомога скоріше після підозрюваного або підтвердженого контакту: р/ос - 10-15 мг/кг 2 р/добу 60 днів з дня підтвердженого контакту з *Bacillus anthracis*, при максимальній разовій дозі 500 мг; в/в - 10-15 мг/кг 2 р/добу 60 днів з дня підтвердженого контакту з *Bacillus anthracis*, максимум 400 мг/дозу; при інших тяжких інфекціях дітям: р/ос - 20 мг/кг 2 р/добу, максимальна разова доза - 750 мг, в/в - 10 мг/кг 3 р/день, максимум 400 мг/дозу, тривалість лікування залежить від типу інфекції.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: грибові суперінфекції, а/б-асоційований коліт (з можливим летальним наслідком), еозинофілія, лейкопенія, лейкопенія, анемія, нейтропенія, лейкоцитоз, тромбоцитопенія, тромбоцитемія, анемія, нейтропенія, анемія, лейкоцитоз, тромбоцитопенія, тромбоцитемія, гемолітична анемія, агранулоцитоз, панцитопенія (що загрожує життю пацієнта), пригнічення ф-ції кісткового мозку (що загрожує життю пацієнта), АР, алергічний/ангіоневротичний набряк, анафілактичні р-ції, анафілактичний шок (що загрожує життю пацієнта); р-ції, подібні до сироваткової хвороби; зниження апетиту, гіперглікемія, гіпоглікемія, психомоторна збудливість/ тривожність, сплутаність свідомості і дезорієнтація, стривоженість, патологічні сновидіння, депресія (з можливими суїцидальними ідеями/думками або спроби/вчинення самогубства), психотичні р-ції (з можливими суїцидальними ідеями/думками або спроби/вчинення самогубства), головний біль, запаморочення, розлади сну, порушення смаку, парестезії та дизестезії, гіпестезії, тремор, судоми (включаючи епілептичний статус), запаморочення, мігрень, порушення координації, порушення ходи, порушення нюху, в/черепна гіпертензія, псевдопухлини мозку, периферична нейропатія, полінейропатія, порушення зору (диплопія), порушення сприйняття кольорів, дзвін у вухах, втрата слуху/ порушення слуху, тахікардія, шлуночкова аритмія, піруетна тахікардія (torsades de pointes), вазодилатація, артеріальна гіпотензія, синкопальний стан, васкуліт, диспное (включаючи астматичні стани), нудота, діарея, блювання, біль у ділянці шлунка та по ходу

кишківника, абдомінальний біль, диспепсія, флатуленція, панкреатит, підвищення рівнів трансаміназ та білірубину, порушення ф-ції печінки, холестаична жовтяниця, гепатит, некроз печінки, висипання, свербіж, кропив'янка, р-ції фоточутливості, петехії, мультиформна еритема, вузликова еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, г. генералізований екзантематозний пустульоз (ГГЕП), м'язово-скелетний біль, міалгія, артрит, підвищення м'язового тону, судоми м'язів, м'язова слабкість, тендиніт, розриви сухожиль (переважно ахіллових), загострення симптомів міастенії гравіс, порушення ф-ції нирок, НН, гематурія, кристалурія, тубулоінтерстиціальний нефрит, р-ції чутливості у місці введення (для в/в введення), астенія, гарячка, набряки, підвищена пітливість (гіпергідроз), підвищення активності ЛФ крові, підвищення активності амілази, підвищення активності ліпази, збільшення рівня МНВ (у пацієнтів, які одночасно застосовують антагоністи вітаміну К).

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до ципрофлоксацину, до інших ЛЗ групи фторхінолонів, або до будь-якої з допоміжних речовин ЛЗ; одночасне застосування з тизанідіном.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1 г., парентерально - 0.8 г.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I. ЦИПРОФЛОКСАЦИН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл, 200мл у пл. в пач. та конт.	2 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦИПРОФЛОКСАЦИН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	2 мг/мл	№1	109,80	
ЦИПРОФЛОКСАЦИН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	2 мг/мл	№1	83,30	
ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна	табл., в/о у бл.	250мг	№10x1	11,01	
ЦИПРОФЛОКСАЦИН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	250мг	№10x90	6,66	
ЦИПРОФЛОКСАЦИН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	250мг	№10x1	8,43	
ЦИПРОФЛОКСАЦИН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	500мг	№10x90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦИПРОФЛОКСАЦИН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	500мг	№10x1	9,24	
ЦИПРОФЛОКСАЦИН-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x1	12,40	
ЦИПРОФЛОКСАЦИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., в/о у конт. чар/уп.	500мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦИПРОФЛОКСАЦИН-НОВОФАРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл, 200мл у пл. в пач. або скл. пл.	2 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦИПРОФЛОКСАЦИН-НОВОФАРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у скл. пл.	2 мг/мл	№1	87,40	
II МЕДОЦИПРИН	Медокемі ЛТД (Завод AZ), Кіпр	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x1	17,77	32,91/€
ФЛАПРОКС	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x1	16,97	24,60/\$
ЦИПРИНОЛ®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	р-н д/інфуз. по 50мл, 200мл у фл.	2 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦИПРИНОЛ®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	р-н д/інфуз. по 100 мл у фл.	2 мг/мл	№1	504,84	30,27/€
ЦИПРИНОЛ®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; контроль серії)/НЛЗОХ	табл., вкриті п/о у бл.	750мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	(Національні лабораторія за здоров'є, окремо ін харно) (контроль серії), Словенія/Словенія					
ЦИПРИНОЛ®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№10x1	41,15	35,35/€
ЦИПРИНОЛ®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x1	25,03	35,35/€
ЦИПРИНОЛ®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	конц. д/р-ну д/інфуз. в амп. по 10мл	10 мг/мл	№5	197,95	35,35/€
ЦИПРОБЕЛ®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл., в/о у бл.	500мг	№4x1, №14x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦИПРОБЕЛ®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл., в/о у бл.	500мг	№7x2	13,37	25,99/\$
ЦИПРОЛЕТ®	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Виробнича дільниця – ІІ/Д-р Редді'с Лабораторіс Лімітед, Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№10x1	17,10	21,26/\$
ЦИПРОЛЕТ®	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Виробнича дільниця – ІІ/Д-р Редді'с Лабораторіс Лімітед, Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x1	14,67	21,26/\$
ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Євролайф Хелткеар Пвт. Лтд., Індія	р-н д/інфуз. по 100мл в конт.	200мг/10 Омл	№1	117,16	27,90/\$
ЦИПРОФЛОКСАЦИН ЄВРО	Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг, 500мг	№10x1, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦИПРОФЛОКСАЦИН ЄВРО	Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x1	7,75	27,60/\$
ЦИФРАН	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	табл., в/о у бл.	250мг, 500мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦИФРАН ОД	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	табл. прол. дії, вкриті п/о у бл.	500мг, 1000мг	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Норфлоксацин (Norfloxacin)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: J01MA06 - АБЗ групи хінолонів.

Основна фармакотерапевтична дія: бактерицидна дія; пригнічує синтез бактеріальної ДНК за рахунок впливу на фермент ДНК-гіразу, запобігає суперспіралізації ланцюга ДНК, руйнує ДНК на більш дрібні фрагменти; має широкий спектр антибактеріальної активності; чутливі до норфлоксацину: Гр (-) аеробні патогенні м/о: *Aeromonas hydrophila*, *Proteus vulgaris*, *Providencia rettgeri*, *Salmonella* spp., *Shigella* spp.; штами, до яких може існувати набута резистентність: Гр (+) аеробні м/о: *Enterococcus faecalis*, *Staphylococcus aureus* (в т. ч. штами, що продукують пеніциліназу), *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus saprophyticus*, *Streptococcus agalactiae*; Гр (-) аеробні м/о: *Citrobacter freundii*, *Enterobacter aerogenes*, *Enterobacter cloacae*, *Escherichia coli*, *Klebsiella oxytoca*, *Klebsiella pneumoniae*, *Morganella morganii*, *Proteus mirabilis*, *Providencia stuartii*, *Pseudomonas aeruginosa* та *Serratia marcescens*.

Показання для застосування ЛЗ: лікування ускладнених та неускладнених, г. ^{ПМД} та хр. інфекцій верхніх і нижніх відділів сечовивідних шляхів ^{БНФ, ПМД} (цистит ^{ПМД}, пієліт, пієлонефрит, хр. простатит ^{БНФ} та інфекції, пов'язані з урологічною операцією, нейрогенний сечовий міхур або нефролітаз, спричинений бактеріями, чутливими до норфлоксацину).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для р/ос застосування; неускладнені інфекції нижніх сечовивідних шляхів (наприклад, цистит): 400 мг 2 р/добу 3 дні ^{БНФ, ПМД}; інфекції сечовивідних шляхів - 400 мг 2 р/добу 7 ^{БНФ} - 10 днів; хр. рецидивуючі інфекції сечовивідних шляхів - 400 мг 2 р/добу до 12 тижнів ^{БНФ}; якщо у межах перших 4 тижнів лікування досягається адекватне пригнічення інфекції, то дозу можна зменшити до 400 мг/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості, анафілаксія, ангіоневротичний набряк, задишка, васкуліт, кропив'янка, артрит, міалгія, артралгія, інтерстиціальний нефрит, світлочутливість, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, ексофоліативний дерматит, поліформна еритема, свербіж, екзантема, петехії, геморагічні булли, папули з утворенням кірки як прояву задіяння судин (васкуліт), анорексія, блювання, псевдомембранозний коліт, панкреатит, гепатит, жовтяниця, в т. ч. холестатична жовтяниця, підвищені показники проб ф-ції печінки, тендиніт (запалення ахіллового сухожилля, яке може призвести до розриву ахіллового сухожилля), загострення тяжкої міастенії, підвищення рівня креатинінази, поліневропатія, в т. ч. с-м Гійєна-Барре, затьмарення свідомості (епілептиформні напади), парестезія, гіпестезія, психічні порушення, в т. ч. психотичні р-ції, конвульсії, тремор, міоклонія, непритомність, сонливість, безсоння, зміна настрою, збентеженість, агранулоцитоз, гемолітична анемія, яка іноді пов'язується з дефіцитом глюкозо-6-фосфат

дегідрогенази, зниження рівня гематокриту, вагінальний кандидоз, ниркова недостатність, кристалурія, гломерулонефрит, дизурія, поліурія, альбумінурія, уретральні кровотечі, гіперкреатиніємія, дисгевзія, дизопія, посилена сльозотеча, втрата слуху, підвищена втомлюваність, тахікардія, зниження АТ, шлуночкова аритмія і тріпотіння-мерехтіння (переважно у пацієнтів з факторами ризику подовження інтервалу QT), ЕКГ збільшення інтервалу QT, підвищення рівня лужної фосфатази, лактатдегідрогенази, рівня креатиніну в сечі і крові, зниження рівня гематокриту, лейкопенія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до норфлуксацину, до будь-якого іншого інгредієнта цього препарату або до інших хінолонових препаратів; наявність в анамнезі тендинітів або розривів сухожиль, пов'язаних з лікуванням похідними хінолону, вагітність та період годування груддю, протипоказаний дітям.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0.8 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НОРФЛОКСАЦИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№10x1	22,95	
II.	НОЛІЦИН	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№10x1, №10x2		відсутня у реєстрі ОБЦ
	НОРБАКТИН	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№10x1, №10x10		відсутня у реєстрі ОБЦ

● **Офлоксацин (Ofloxacin)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: J01MA01 - АБЗ засоби для системного застосування; група хінолонів; фторхінолони.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний протимікробний засіб фторованого хінолону широкого спектра дії як щодо Гр (-), так і щодо Гр(+) м/о; у концентраціях, ідентичних з мінімальною пригнічувальною концентрацією (MIC) або в дещо вищих він чинить бактерицидну дію (шляхом пригнічення ДНК-гірази – ферменту, необхідного для реплікації та транскрипції бактеріальної ДНК); протимікробний спектр охоплює: Гр (-) і Гр (+) бактерії, чутливі до офлоксацину: Enterobacteriaceae (Escherichia coli, види Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Providencia, Salmonella, Serratia, Shigella, Yersinia), Pseudomonas spp, в тому числі Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Haemophilus ducreyi, Branhamella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Acinetobacter spp., Campylobacter spp., Gardnerella vaginalis, Helicobacter pylori, Pasteurella multocida, Vibrio spp, Brucella melitensis; стафілококи, в тому числі штами, що продукують пеніциліназу та деякі штами, резистентні до метициліну; також він має активність щодо Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum (при граничних значеннях MIC), Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae та деяких інших мікобактерій, чутливість стрептококів групи А, В і С є граничною, більшість анаеробів, за винятком Clostridium perfringens, є резистентними, неактивний щодо Treponema pallidum.

Показання для застосування ЛЗ: інфекційно-запальні захворювання, спричинені чутливими до офлоксацину збудниками: загострення ХОЗЛ (включно із хр. бронхітом), негоспітальна пневмонія ^{БНФ}, неускладнений г. цистит, уретрит, г. пієлонефрит ^{БНФ} та ускладнені інфекції сечового тракту ^{БНФ}; бактеріальний простатит ^{БНФ}, епідидимоорхіт; ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин ^{БНФ}; інфекції верхніх і нижніх сечовивідних шляхів ^{БНФ} ^{ПМД}; негонококовий уретрит ^{БНФ}, запальні захворювання органів малого таза в комбінації з іншими АБЗ.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в краплинно: загострення ХОЗЛ (включно із хр. бронхітом) негоспітальна пневмонія - по 200 мг 2р/добу ^{БНФ}, неускладнений г.цистит, уретрит, г. пієлонефрит та ускладнені інфекції сечового тракту: 200 мг 2р/добу ^{БНФ}, ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин: по 400 мг 2р/добу ^{БНФ}, час інфузії повинен становити не менше 30 хв на кожні 200 мг, дозу 400 мг 2р/добу можна застосовувати при тяжких або ускладнених інфекціях; р/ос: ускладнені інфекції сечовивідних шляхів - 200 - 400 мг 2р/добу ^{БНФ}; загострення ХОЗЛ, включаючи бронхіт, позалікарняна пневмонія ^{БНФ}: 400 мг/добу, за необхідності збільшити до 400 мг 2 р/добу, ^{БНФ} гонококовий уретрит: одноразово 400 мг, ^{БНФ} негонококовий уретрит - 300 мг 2 р/добу ^{БНФ}, інфекції шкіри і м'яких тканин: 400 мг 2 р/добу, ^{БНФ} г.пієлонефрит - 200-400 мг 2 р/добу ^{БНФ}, г. простатит - 200-400 мг 2 р/добу ^{БНФ} 2-4 тижні, хр. простатит - 200-400 мг 2 р/добу ^{БНФ} 4-8 тижнів, епідидимоорхіт - 200-400 мг 2 р/добу ^{БНФ} 14 днів, запальні захворювання органів малого таза - 400 мг 2 р/добу 14 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: мікоз; резистентність патогенних м/о, анемія, гемолітична анемія; лейкопенія, еозинофілія; тромбоцитопенія; агранулоцитоз, порушення функції кісткового мозку, реакції гіперчутливості, включаючи анафілактичні/анафілактоїдні р-ції, анафілактичний/ анафілактоїдний шок, анорексія; гіпоглікемія у хворих на діабет, які приймають цукрознижувальні препарати, гіперглікемія, гіпоглікемічна кома, збудження, розлади сну, безсоння, психотичні розлади (наприклад, галюцинації); неспокій, сплутаність свідомості, кошмарні сновидіння, депресія; психотичні розлади і депресія з самодеструктивною поведінкою, включаючи суїцидальні думки або спроби самогубства, нервозність, запаморочення, головний біль; сонливість, парестезія, дисгевзія, паросмія; периферична сенсорна нейропатія, периферична сенсомоторна нейропатія, судоми м'язів, екстрапірамідальні симптоми або інші порушення м'язової координації; тремор, дискінезія, агевзія (втрата

смакових відчуттів), синкопе, доброякісна внутрішньочерепна гіпертензія, подразнення слизової оболонки очей; розлади зору; увеїт, вертиго; шум у вухах, втрата слуху; зниження слуху, тахікардія, шлуночкові аритмії, поліморфна шлуночкова тахікардія типу «пірует», флєбіт; артеріальна гіпотензія; кашель, назофарингіт; задишка, бронхоспазм, алергічний пневмоніт, тяжка задишка, біль у животі, діарея, нудота, блювання; ентероколіт, іноді геморагічний; псевдомембранозний коліт, диспепсія, метеоризм, запор, панкреатит, підвищення рівнів печінкових ферментів (АСТ, АЛТ, ЛДГ, γ-глутаматтрансферази і/або ЛФ), підвищення рівня білірубіну в крові; холестатична жовтяниця; гепатит, тяжкі ураження печінки, у т. ч. випадки розвитку летальної г. печінкової недостатності, насамперед у пацієнтів з тяжкими основними захворюваннями печінки; свербіж, висипання; кропив'янка, припливи, посилене потовиділення, пустульозне висипання; мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз, р-ції фоточутливості; медикаментозний дерматит, судинна пурпура, васкуліт, який у виняткових випадках може призвести до некрозу шкіри; с-м Стівенса-Джонсона, г. генералізований екзантематозний пустульоз, медикаментозне висипання, стоматит, ексфолюативний дерматит, тендиніт; артралгія, міалгія, розриви сухожиль, рабдоміоліз і/або міопатія, м'язова слабкість, розтягнення м'язів, розриви м'язів, розрив зв'язок, артрит, підвищення сироваткового рівня креатиніну; ГНН; г.інтерстиційний нефрит, напади порфірії у хворих на порфірію, реакція у місці інфузії (біль, почервоніння); астенія, пірексія, біль (в т. ч. біль у спині, грудній клітці та кінцівках).

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до офлоксацину та до інших компонентів ЛЗ або інших ЛЗ групи фторхінолонів; епілепсія; ураження ЦНС зі зниженим судинним порогом (після ЧМТ, інсульту, запальних процесів мозку та мозкових оболонок); тендиніти в анамнезі; дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази; діти або підлітки у фазі росту, а також жінки у період вагітності або годування груддю, не призначати пацієнтам з подовженням інтервалу QT, пацієнтам з некомпенсованою гіпокаліємією, а також пацієнтам, які приймають протиаритмічні засоби класу ІА (хінідин, прокаїнамід) або класу ІІІ (аміодарон, соталол).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,4 г., парентерально - 0,4 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ОФЛОКСАЦИН	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	0,2%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОФЛОКСАЦИН	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	0,2%	№1	150,00	
	ОФЛОКСАЦИН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл, 200мл у пл. в пач.	2 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОФЛОКСАЦИН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	2 мг/мл	№1	56,95	
	ОФЛОКСАЦИН	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	2 мг/мл	№1	85,40	
	ОФЛОКСАЦИН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	табл. у бл.	0,2г	№10x1	4,62	
	ОФЛОКСАЦИН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	табл. у бл.	0,2г	№10x100	4,62	
	ОФЛОКСАЦИН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	табл. у бл.	0,2г	№10x50	4,62	
	ОФЛОКСАЦИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	200мг	№10x1	4,24	
II.	ОФЛОКСАЦИН	Євролайф Хелткеар Пвт. Лтд., Індія	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	200мг/100мл	№1	80,48	28,14/\$
	ОФЛОКСАЦИН ЄВРО	ФДС Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	200мг, 400мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОФЛОКСИН® 200	ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка	табл., в/о у бл.	200мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Левофлоксацин (Levofloxacin)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: J01MA12 - АБЗ групи хінолонів; фторхінолони.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний антибактеріальний ЛЗ групи фторхінолонів, S-енантіомер рацемічної суміші офлоксацину; діє на комплекс ДНК-ДНК-гірази та топоізомеразу IV; зазвичай чутливі аеробні Гр (+) бактерії: Staphylococcus aureus, метицилінчутливий, Staphylococcus saprophyticus, Streptococci, група C і G, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes; аеробні Гр (-) бактерії: Burkholderia cepacia, Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae, Haemophilus para-influenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri; анаеробні бактерії: Peptostreptococcus; інші: Chlamydomphila pneumoniae, Chlamydomphila psittaci, Chlamidia trachomatis, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum.

Показання для застосування ЛЗ: г. бактеріальний риносинусит ^{БНФ}; загострення хр. обструктивного захворювання легень включаючи бронхіт ^{БНФ ПМД}; негоспітальна пневмонія ^{БНФ}; ускладнені інфекції шкіри і м'яких тканин ^{БНФ}; неускладнений цистит ^{БНФ}; г. пієлонефрит та ускладнені інфекції сечових шляхів ^{БНФ ПМД}; хр. бактеріальний простатит ^{БНФ}; легенева форма сибірської виразки (постконтактна профілактика та лікування ^{БНФ}); для завершення курсу терапії у пацієнтів, у яких відзначене покращення під час початкового лікування левофлоксацином в/в (для табл.).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос та парентерально; продовжувати лікування протягом 48-72 год після нормалізації t° тіла або підтверженої мікробіологічними тестами відсутності збудників; г. бактеріальний риносинусит - р/ос по 500 мг 1 р/добу протягом 10-14 днів; загострення ХОЗЛ, включаючи бронхіт - р/ос 500 мг 1 р/добу 7-10 днів ^{БНФ}; негоспітальна пневмонія - р/ос 500 - 1000 мг чи в/в інфузійно 500 мг 1-2 р/добу 7-14 днів ^{БНФ}; неускладнений цистит - р/ос 250 мг 1 р/добу 3 дні ^{ПМД}; ускладнені інфекції сечовивідних шляхів - р/ос 500 мг 1 р/добу 7-14 днів, в/в інфузійно 500 мг 1 р/добу 7-14 днів ^{БНФ}; ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин - р/ос 500 мг чи в/в інфузійно 500 мг 1-2 р/добу 7-14 днів ^{БНФ}; хр. бактеріальний простатит - р/ос чи в/в інфузійно 500 мг ^{БНФ} 1 р/добу 28 днів; легенева форма сибірської виразки - р/ос чи в/в інфузійно 500 мг 1 р/добу 8 тижнів ^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: грибові інфекції, включаючи гриби роду *Candida*, проліферація інших резистентних м/о, порушення нормальної мікрофлори кишечника та розвиток вторинної інфекції, лейкопенія, еозинофілія, тромбоцитопенія, нейтропенія, панцитопенія, агранулоцитоз, гемолітична анемія, ангіоневротичний набряк, гіперчутливість, анафілактичний /анафілактоїдний шок, анорексія, гіпоглікемія, в основному у пацієнтів, хворих на діабет; гіперглікемія, гіпоглікемічна кома, безсоння, тривожність, неспокій, стани страху, сплутаність свідомості, нервовість, психотичні р-ції (в т. ч. галюцинації, параноя), депресія, ажитація, незвичайні сновидіння, нічні кошмари, психотичні р-ції з самодеструктивною поведінкою, включаючи суїцидальну спрямованість мислення або дій, головний біль, запаморочення, сонливість, тремор, дисгевзія, судоми, периферична сенсорна або сенсомоторна нейропатія, парестезія, порушення нюху (паросмія), включаючи аносмію (відсутність нюху), дискінезія (порушення координації рухів), екстрапірамідні розлади, агевзія, синкопе (непритомність), доброякісна в/черепна гіпертензія, затуманення зору, нечіткість зору, вертиго, шум у вухах, втрата слуху, порушення слуху, тахікардія, відчуття серцебиття, артеріальна гіпотензія, шлуночкова тахікардія, що може призводити до зупинки серця, шлуночкова аритмія типу *torsade de pointes* (переважно у пацієнтів з факторами ризику подовження інтервалу QT), подовження інтервалу QT на ЕКГ, задишка (диспноє), бронхоспазм, алергічний пневмоніт, діарея, блювання, нудота, абдомінальний біль, диспепсія, метеоризм/здуття живота, запор, діарея геморагічна, що може свідчити про ентероколіт, включаючи псевдомембранозний коліт, панкреатит, підвищення показників печінкових ензимів (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП), підвищення рівня білірубіну в крові, жовтяниця та тяжке ураження печінки, включаючи випадки г.печінкової недостатності (іноді летальні), переважно у пацієнтів з тяжкими основними захворюваннями; гепатит; висипання; свербіж; кропив'янка; гіпергідроз; токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайелла), с-м Стівенса - Джонсона, мультиформна еритема, р-ції фоточутливості, лейкоцитопластичний васкуліт, стоматит, артралгія, міалгія, ураження сухожиль, у т. ч. їх запалення (тендиніт), м'язова слабкість, рабдоміоліз, розрив сухожилля, розрив зв'язок, розрив м'язів, артрит, підвищені показники креатиніну в сироватці крові, ГНН, астенія, підвищення t° тіла (пірексія), біль (включаючи біль у спині, грудях та кінцівках).

Противпоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до левофлоксацину, інших компонентів ЛЗ або до інших хінолонів; епілепсія; наявність побічних реакцій з боку сухожиль після попереднього застосування хінолонів; дитячий вік, вагітність, період годування груддю.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,5 г., парентерально - 0,5 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЛЕВІНОР	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	0,5%	№1	150,00	
	ЛЕВОМАК В/В	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	500мг/100мл	№1	155,12	23,26/\$
	ЛЕВОПРО	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 150мл у пл.	500мг/100мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛЕВОПРО	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	500мг/100мл	№1	131,86	
	ЛЕВОПРО®	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 150мл у конт.	500мг/100мл	№1	123,33	
	ЛЕВОПРО®	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	500мг/100мл	№1	135,00	
	ЛЕВОФЛОКСАЦИН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	250мг	№10x1	28,00	
	ЛЕВОФЛОКСАЦИН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	500мг	№10x1	20,00	
	ЛЕВОФЛОКСАЦИН	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 150мл у пл.	0,5%	№1	102,67	

ЛЕВОФЛОКСАЦИН	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	0,5%	№1	96,67	
ЛЕВОФЛОКСАЦИН	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	500мг/100мл	№1	97,00	
ЛЕВОФЛОКСАЦИН ЄВРО	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	500мг/100мл	№1	115,00	
ЛЕВОФЛОКСАЦИН-АСТРАФАРМ	ТОВ "Астрафарм", Україна	табл., в/о у бл.	500мг	№7x2	12,29	
ЛЕВОФЛОКСАЦИН-АСТРАФАРМ	ТОВ "Астрафарм", Україна	табл., в/о у бл.	500мг	№7x1	14,71	
ЛЕВОФЛОКСАЦИН-АСТРАФАРМ	ТОВ "Астрафарм", Україна	табл., в/о у бл.	250мг	№7x1, №7x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛЕВОФЛОКСАЦИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/інфуз. у фл. по 100мл	5 мг/мл	№1	90,05	
ЛЕВОФЛОКСАЦИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., в/о у бл.	250мг	№10x1	22,67	
ЛЕВОФЛОКСАЦИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., в/о у бл.	500мг	№7x1	20,06	
ЛЕВОФЛОКСАЦИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., в/о у бл.	500мг	№10x1	20,46	
ЛЕВОФЛОКСАЦИН-НОВОФАРМ	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	5 мг/мл	№1	155,25	
ЛЕВОФЛОЦИН 250	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛЕВОФЛОЦИН 500	ТОВ "Фарма Старт", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№5x1	15,24	
ЛЕВОЦИН-Н	БІОСЕР С.А. ПАРЕНТЕРАЛ СОЛЮШНС ІНДАСТРІ (нерозфасований продукт, первинна упаковка,	р-н д/інфуз. по 150мл у фл.	500мг/100мл	№1	140,00	

	вторинна упаковка, контроль)/ТОВ "ФАРМАСЕЛ" (контроль, випуск серії), Греція/Україна						
ЛЕВОЦИН-Н	ВІОСЕР С.А. ПАРЕНТЕРАЛ СОЛЮШНС ІНДАСТРІ (нерозфасований продукт, первинна упаковка, вторинна упаковка, контроль)/ТОВ "ФАРМАСЕЛ" (контроль, випуск серії), Греція/Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у фл.	500мг/100мл	№1	160,00		
ЛЕФЛОК	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., вкриті п/о у конт. чар/уп.	250мг, 500мг	№5x1, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЛЕФЛОК	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., вкриті п/о у конт. чар/уп.	500мг	№5x1	22,93		
ЛЕФЛОК-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/інфуз. у фл. по 100мл в пач. або без	5 мг/мл	№1	128,54		
ЛЕФЛОЦИН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 50мл, 100мл, 150мл, 200мл у пл. та конт.	5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЛЕФЛОЦИН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	5 мг/мл	№1	89,90		
ЛЕФЛОЦИН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 150мл у пл.	5 мг/мл	№1	90,53		
НОВОКС®	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл, 150мл у пл.	0,5%	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
СУПРАЛЕВ	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	500мг/100мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ФЛОКСІУМ®	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	5 мг/мл	№1	100,80		
ФЛОКСІУМ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x1	12,60		
ФЛОКСІУМ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№5x1	17,60		
II. АБИФЛОКС®	Ауробіндо Фарма Лімітед - Юніт VII, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№10X1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
АБИФЛОКС®	Ауробіндо Фарма Лімітед - Юніт VII, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10X1	11,15	24,78/\$	
АБИФЛОКС®	ДЕМО С.А. Фармасьютикал Індастрі, Греція	р-н д/інфуз. у фл. по 100мл	500мг/100мл	№1	177,27	27,27/\$	
ГЛЕВО	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія	табл., в/о у бл.	250мг, 500мг	№5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ГЛЕВО	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія	табл., в/о у бл.	500мг	№5x1	29,76	27,06/\$	
ЗОЛЕВ-250	ФДС Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЗОЛЕВ-500	ФДС Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЗОЛЕВ-500	ФДС Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№5x1	18,00		
ЗОЛЕВ-750	ФДС Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	750мг	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЗОЛЕВ-750	ФДС Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	750мг	№5x1	16,67		
ЛАМІН 500	МСН Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЛАМІН 500	МСН Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	табл., вкриті п/о	500мг	№10x3	6,30	27,93/\$	

	Індія	у бл.				
ЛАМІН 750	МСН Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	750мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛАМІН 750	МСН Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	750мг	№10x3	5,73	27,93/\$
ЛЕВАКСЕЛА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії, контроль серії), Словенія	р-н д/інфуз. у фл. по 100мл	5 мг/мл	№5, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛЕВАКСЕЛА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії, контроль серії), Словенія	р-н д/інфуз. у фл. по 100мл	5 мг/мл	№1	110,46	27,68/€
ЛЕВАКСЕЛА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг, 500мг	№1, №5, №7, №10, №14	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛЕВАКСЕЛА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№7x1	13,94	35,35/€
ЛЕВАКСЕЛА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії), Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№5x1	16,40	5,35/€
ЛЕВАСЕПТ	Євролайф Хелткеар Пвт. Лтд., Індія	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	500мг/100мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛЕВОААР	Зім Лабораторіз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг, 500мг	№6x1, №10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛЕВОААР В/В	Євролайф Хелткеар Пвт. Лтд., Індія	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	500мг/100мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛЕВОКІЛЗ	Ауробіндо Фарма Лімітед – Юніт VII, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг, 500мг	№5x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛЕВОКІЛЗ	Ауробіндо Фарма Лімітед – Юніт IV, Індія	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛЕВОКС-500	Тулп Лаб Пвт. Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛЕВОКС-750	Тулп Лаб Пвт. Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	750мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛЕВОКСИМЕД	Біофарма Ілач Сан. ве Тідж. А.Ш./УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина/Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№7x1	20,15	28,12/\$
ЛЕВОКСИМЕД	Мефар Ілач Сан. А.Ш., Туреччина	р-н д/інфуз. у фл. по 100мл	500мг/100мл	№1	119,64	28,67/\$
ЛЕВОЛЕТ	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Виробнича діляниця – II, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг, 500мг, 750мг	№5x1, №10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛЕВОМАК	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг, 500мг	№5x1, №5x2, №5x4x5, №10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛЕВОМАК	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№5x1	24,01	28,17/\$
ЛЕВОМАК 750	Маклеодс Фармасьютикалс	табл., вкриті п/о	750мг	№10x10	відсутня у	

	Лімітед, Індія	у бл.			реєстрі ОВЦ	
ЛЕВОМАК 750	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	750мг	№10x1	10,54	28,17/\$
ЛЕВОСТАД®	СТАДА Арцнайміттель АГ (випуск серій)/Лабораторіс Медікаментос Інтернаціонес, С.А. (випуск серій; виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування, контроль серій), Німеччина/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№5x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛЕВОСТАД®	СТАДА Арцнайміттель АГ (випуск серій)/Лабораторіс Медікаментос Інтернаціонес, С.А. (випуск серій; виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування, контроль серій), Німеччина/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№5x1	17,45	31,74/€
ЛЕВОФЛОКС	Бафна Фармасьютикалс Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x1	20,00	24,45/\$
ЛЕВОФЛОКС	Бафна Фармасьютикалс Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№5x1	20,00	24,45/\$
ЛЕВОФЛОКСАЦИН	Євролайф Хелткеар Пвт. Лтд., Індія	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	500мг/100мл	№1	70,35	28,14/\$
ЛЕВОФЛОКСАЦИН	ПТ. НОВЕЛЛ ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРІЗ, Індонезія	р-н д/інфуз. у фл. по 100мл	5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛЕВОФЛОКСАЦИН	"Юнік Фармасьютикал Лабораторіс" (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд."), Індія	р-н д/інфуз. у фл. по 100мл	5 мг/мл	№1	50,00	25,86/\$
ЛЕВОФЛОКСАЦИН	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг, 500мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛЕВОФЛОКСАЦИН	ІНФОМЕД ФЛЮІДС Ес. Ер. Ель., Румунія	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	5 мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛЕВОФЛОКСАЦИН	Мікро Лабс Лтд, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛЕВОФЛОКСАЦИН	Люпін Лімітед, Індія	табл., в/о у бл.	500мг	№5, №50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛЕВОФЛОКСАЦИН 250	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№10x10	12,00	26,02/\$
ЛЕВОФЛОКСАЦИН 250	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№10x9	12,00	26,02/\$
ЛЕВОФЛОКСАЦИН 250	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№20x5	12,01	26,02/\$
ЛЕВОФЛОКСАЦИН 500	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x10	20,00	26,02/\$
ЛЕВОФЛОКСАЦИН 500	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x9	20,00	26,02/\$
ЛЕВОФЛОКСАЦИН 500	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№20x5	20,00	26,02/\$
ЛЕВОФЛОКСАЦИН 750	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	750мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛЕВОФЛОКСАЦИН-ТЕВА	Актавіс ЛТД, Мальта	табл., вкриті п/о у бл.	250мг, 500мг	№5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛЕВОЦЕЛ	Лабораторіос Нормон С.А., Іспанія	р-н д/інфуз. по 100мл у пак. в бл.	5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛЕФЛОКАД	Джубілант Дженераікс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг, 500мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	

ЛЕФСАН	ПТ. НОВЕЛЛ ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРІЗ, Індонезія	р-н д/інфуз. у фл. по 100мл	5 мг/мл	№1	161,94	26,99/\$
ЛОКСОФ	Сан Фармасьютікал Індастріз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№5х1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛЮФІ-500	Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№5х1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
НОВОКС®-500	Евертоджен Лайф Саенсиз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№5х1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
НОВОКС®-750	Евертоджен Лайф Саенсиз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	750мг	№5х1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РЕМЕДІЯ	Сімпекс Фарма Пвт. Лтд., Індія	табл., в/о у бл.	250мг, 500мг	№5х1, №10х1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТАЙГЕРОН®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл., в/о у бл.	500мг	№10х1	15,39	26,41/\$
ТАЙГЕРОН®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл., в/о у бл.	500мг	№5х1	18,11	26,41/\$
ТАЙГЕРОН®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл., в/о у бл.	750мг	№10х1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТАЙГЕРОН®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл., в/о у бл.	750мг	№5х1	16,19	26,41/\$

• **Моксифлоксацин (Moxifloxacin) ***

Фармакотерапевтична група: J01MA14 - протимікробні ЛЗ для системного застосування; АБЗ групи хінолонів.

Основна фармакотерапевтична дія: пригнічує бактеріальні топоізомерази типу II (ДНК-гіраза та топоізомераза IV), необхідні для реплікації, транскрипції та репарації бактеріальної ДНК; чутливі аеробні Гр (+) м/о: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae* (група В), *Streptococcus milleri* group (*S. anginosus*, *S. constellatus* та *S. intermedius*), *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes* (група А), *Streptococcus viridans* група (*S. viridans*, *S. mutans*, *S. mitis*, *S. sanguinis*, *S. salivarius*, *S. thermophilus*); аеробні Гр (-) м/о: *Acinetobacter baumannii*, *Haemophilus influenzae*, *Legionella pneumophila*, *Moraxella (Branhamella) catarrhalis*; анаеробні м/о: *Prevotella* spp.; інші м/о: *Chlamydia (Chlamydia) pneumoniae*, *Coxiella burnetii*, *Mycoplasma pneumoniae*; види, для яких можливий розвиток резистентності: аеробні Гр (+) м/о: *Enterococcus faecalis*, *Enterococcus faecium*; аеробні Гр (-) м/о: *Enterobacter cloacae*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella oxytoca*, *Proteus mirabilis*; анаеробні м/о: *Bacteroides fragilis*; резистентні м/о: аеробні Гр (-) м/о: *Pseudomonas aeruginosa*, метицилін *S. aureus*.

Показання для застосування ЛЗ: негоспітальна пневмонія, ускладнені інфекційні захворювання шкіри та підшкірних тканин^{БНФ}; г. бактеріальний синусит, загострення хр. бронхіту^{БНФ}; запальні захворювання органів малого таза помірного та середнього ступеня^{БНФ} (інфекційне ураження верхнього відділу статеві системи у жінок, сальпінгіт, ендометрит), не асоційованих з тубооваріальним абсцесом чи абсцесами органів малого таза, може застосовуватися в комбінації з іншими відповідними АБЗ (наприклад цефалоспоринами) ч/з зростаючу резистентність моксифлоксацину до *Neisseria gonorrhoeae* (за винятком моксифлоксацинрезистентних штамів *N. gonorrhoeae*).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим р/ос або в/в інфузійно по 400 мг/добу^{БНФ} при будь-яких інфекціях; тривалість р/ос терапії визначається тяжкістю інфекції та клінічним ефектом: загострення хр. бронхіту - 5-10 днів; негоспітальна пневмонія - 10 днів; г. синусит - 7 днів^{БНФ}; запальні захворювання органів малого таза помірного та середнього ступеня - 14 днів; загальна тривалість в/в та р/ос лікування становить 7-14 днів для негоспітальних пневмоній та 7-21 день для ускладнених інфекційних захворювань шкіри та підшкірних тканин.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: суперінфекції, пов'язані з резистентними бактеріями або грибами (оральний та вагінальний кандидоз); анемія, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія, тромбоцитемія, еозинофілія, подовження протромбінового часу/збільшення МНВ; АР, анафілаксія (включаючи шок, що загрожує життю), алергічний набряк/ангіоневротичний набряк (набряк гортані, що загрожує життю); гіперліпідемія, гіперглікемія, гіперурикемія; р-ції стривоженості, підвищення психомоторної активності/ збудження, лабільність настрою, депресія (з самоагресією, суїцидальні ідеї/ думки або спроби самогубства), деперсоналізація, психотичні р-ції (з можливою самоагресією, що проявляється як суїцидальні ідеї/ думки або спроби самогубства), галюцинації; парестезії/ дизестезії, порушення смаку (агевзія), сплутаність свідомості та втрата орієнтації, розлади сну (інсомнія), тремор, вертиго, сонливість, гіпестезія, порушення нюху (втрата нюху), патологічні сновидіння, порушення координації (розлад ходи внаслідок запаморочення або вертиго), судомні напади («grand mal» напади), порушення уваги, розлад мовлення, амнезія, периферична нейропатія та полінейропатія; порушення зору, транзиторна втрата зору (особливо під час р-цій з боку ЦНС), диплопія та розмитість зору; дзвін у вухах, порушення слуху включаючи глухоту; подовження інтервалу QT у хворих із гіпокаліємією, посилене серцебиття, тахікардія, фібриляція передсердь, стенокардія, шлуночкові тахіаритмії, непритомність (г. та короткотривала втрата свідомості); вазодилатація, АГ, артеріальна гіпотензія; неспецифічні аритмії, піруетна шлуночкова тахікардія (*torsade de pointes*), задишка (астматичний стан); нудота, блювання, біль у ШКТ та у черевній порожнині, діарея; зниження апетиту та зменшення вживання їжі, запор, диспепсія, флатуленція, гастрит, підвищення рівня амілази; дисфагія, стоматит, асоційований із застосуванням а/б коліт (псевдомембранозний коліт); підвищення рівня трансаміназ, порушення функції печінки (підвищення рівня ЛДГ, підвищення рівня білірубину, ГГТП, ЛФ); жовтяниця, гепатит (холестатичний); фульмінантний гепатит, що може призвести до розвитку небезпечної для життя ПН, свербіж, висипання, кропив'янка, сухість шкіри; бульозні шкірні р-ції, такі як с-м Стівенса-Джонсона або токсичний епідермальний некроліз, артралгія, міалгія; тендиніт,

підвищення м'язового тонусу, судоми м'язів, м'язова слабкість; розрив сухожилків, артрити, посилення ригідності м'язів як симптому *myasthenia gravis*, дегідратація, порушення ф-ції нирок (збільшення рівня азоту сечовини крові та креатиніну), НН; р-ції у місці ін'єкц. та інфузії; погане самопочуття (астенія або втомлюваність), болі (біль у спині, грудній клітці, у ділянці таза та у кінцівках), посилене потовиділення, (тромбо-) флебіт у місці інфузії.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до моксифлоксацину, інших а/б групи хінолонів або будь-якої з допоміжних речовин ЛЗ; період вагітності або годування груддю; вік до 18 років; захворювання/патологія сухожиль в анамнезі, пов'язані із застосуванням хінолонів; пацієнтам із: вродженим або набутим подовженням інтервалу QT, порушенням балансу електролітів (особливо у випадку нескоригованої гіпокаліємії), клінічно значущою брадикардією, клінічно значущою СН зі зниженням фракції викиду лівого шлуночка, симптоматичними аритміями в анамнезі; одночасне застосування з ЛЗ, які подовжують інтервал QT; пацієнтам із порушенням ф-ції печінки (клас С за класифікацією Чайлда-П'ю) та підвищенням рівнів трансаміназ у 5 разів і більше.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0.4 г., парентерально - 0.4 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АТОВАКС®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№10x1, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МОКСИМАК	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 250мл у конт.	400мг/250мл	№1	580,00	
	МОКСИФЛОКСАЦИН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	400мг	№10x1	25,00	
	МОКСИФЛОКСАЦИН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	400мг	№7x1	25,71	
	МОКСИФЛОКСАЦИН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	400мг	№5x1	26,00	
	МОКСИФЛОКСАЦИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	табл., в/о у бл.	400мг	№5x2, №10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МОКСИФЛОКСАЦИН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	табл., в/о у бл.	400мг	№5x1	31,20	
	МОКСИФЛОКС-ІНФУЗІЯ	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 250мл у полім. пак.	400мг/250мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МОКСИФЛОКС-ІНФУЗІЯ	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 250мл у пл.	400мг/250мл	№1	700,00	
II.	АВЕЛОКС®	Байер АГ, Німеччина	табл., в/о у бл	400мг	№5x1	77,00	30,79/€
	АВЕЛОКС®	Байер АГ (весь цикл виробництва (виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка, вторинна упаковка, контроль якості, випуск серії))/Фрезеніус Кабі Італія С.Р.Л. (альтернативний виробник (виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка, вт, Німеччина/Італія/Німеччина	р-н д/інфуз. у фл. по 250мл	400мг/250мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МАКСІЦИН	Саншайн Лейк Фарма Ко., Лтд., Китай	табл., в/о у бл.	400мг	№5, №7, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МОКСЕТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№10x1	38,00	26,76/\$
	МОКСИВАР	Ауробіндо Фарма Лімітед – Юніт VII, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МОКСИКУМ	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ.	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№7x1	26,35	27,12/\$

	А.Ш., Туреччина					
МОКСИМАК	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№5, №10, №100	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МОКСИН	Бафна Фармасьютикалс Лтд./Вівімед Лабс Лтд, Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№5x1	60,00	26,02/\$
МОКСИФЛОКСАЦИН САНДОЗ®	С. К. Сандоз С. Р. Л., Румунія	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№5x2, №7x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МОКСИФЛОКСАЦИН-ТЕВА	АТ ФАРМАТЕН, Греція	р-н д/інфуз. у фл. по 250мл	400мг/250мл	№5, №12	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МОКСИФЛОКСАЦИН-ТЕВА	АТ ФАРМАТЕН, Греція	р-н д/інфуз. у фл. по 250мл	400мг/250мл	№1	547,81	27,71/\$
МОКСИФЛОКСАЦИНУ ГІДРОХЛОРИД ТАБЛЕТКИ, ЩО ДИСПЕРГУЮТЬСЯ 100 МГ	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., що дисперг. у бл.	100мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МОКСИФТОР 400	Торрент Фармасьютикалс Лтд, Індія	табл., в/о у бл.	400мг	№5x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МОКСОФТ 400	МСН Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№5x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МОКСОФТ 400	МСН Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№5x1	70,00	27,93/\$
МОФЛАКСА®	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за повний цикл виробництва, включаючи випуск серії, відповідальний за контроль серії)/КРКА-ФАРМА д.о.о. (відповідальний за первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/ТАД Фарма ГмБХ (відповідальни, Словенія/Хорватія/Німеччина/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№7x1, №7x2, №10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МОФЛАКСА®	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за повний цикл виробництва, включаючи випуск серії, відповідальний за контроль серії)/КРКА-ФАРМА д.о.о. (відповідальний за первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/ТАД Фарма ГмБХ (відповідальни, Словенія/Хорватія/Німеччина/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№5x1	24,88	30,27/€
МОФЛАКСА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії; контроль серії),	р-н д/інфуз. у фл. по 250мл	400мг/250мл	№5, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	

	Словенія					
МОФЛАКСА®	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії; контроль серії), Словенія	р-н д/інфуз. у фла. по 250мл	400мг/250мл	№1	126,21	30,27/€
МОФЛОКСИН ЛЮПІН	Люпін Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл. та бан.	400мг	№50x1x10, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ТИМОКСІ	АЛКАЛОЇД АД Скоп'є, Республіка Македонія	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№5x1, №7x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ФЛОКСЕЙФ 400	МСН Лабораторіс Прайвіт Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№5, №7, №15	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Гатифлоксацин (Gatifloxacin)**

Фармакотерапевтична група: J01MA16 - АБЗ для системного застосування; фторхінолони.

Основна фармакотерапевтична дія: 8-метоксифлороквінолон, що має а/б - активність проти широкого діапазону Гр (-) і Гр (+) аеробних м/о, анаеробів і в/клітинних збудників; протибактеріальна дія гатифлоксацину забезпечується завдяки пригніченню ДНК-гірази та топоізомерази IV, ДНК-гіраза є важливим ферментом, який бере участь у редуплікації ДНК-збудників, топоізомераза IV є ферментом, який відіграє провідну роль у реплікації хромосом ДНК при редуплікації бактеріальної клітини, до гатифлоксацину чутливі такі м/о: Гр (+) м/о – *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus milleri*, *Streptococcus mitior*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Staphylococcus cohnii*, *Staphylococcus epidermidis* (включаючи метицилінрезистентні штами), *Staphylococcus haemolyticus*, *Staphylococcus hominis*, *Staphylococcus saprophyticus*, *Staphylococcus simulans*, *Corynebacterium diphtheriae*; Гр (-) м/о - *Haemophilus influenzae* (включаючи штами, що продукують β-лактамази), *Haemophilus parainfluenzae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Moraxella catarrhalis* (включаючи штами, що продукують β-лактамази), *Escherichia coli*, *Enterobacter cloacae*, *Neisseria gonorrhoeae* (включаючи штами, що продукують β-лактамази); *Bordetella pertussis*, *Klebsiella oxytoca*, *Enterobacter aerogenes*, *Enterobacter agglomerans*, *Enterobacter intermedius*, *Enterobacter sakazaki*, *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Morganella morganii*, *Providencia rettgeri*, *Providencia stuartii*; анаероби – *Bacteroides distasonis*, *Bacteroides eggerthii*, *Bacteroides fragilis*, *Bacteroides ovatus*, *Bacteroides thetaiotaomicron*, *Bacteroides uniformis*, *Fusobacterium spp.*, *Porphyromonas spp.*, *Porphyromonas anaerobius*, *Porphyromonas asaccharolyticus*, *Porphyromonas magnus*, *Prevotella spp.*, *Propionibacterium spp.*, *Stomatobacterium perfringens*, *Clostridium ramosum*; збудники атипичної форми *Chlamydia pneumoniae*, *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Mycoplasma hominis*, *Legionella pneumophila*, *Ureaplasma*; *Saxiella burnettii*, чутливі такі збудники як мікобактерії туберкульозу, *Helicobacter Pylori*, ефективний відносно бактерій, резистентних до β-лактамініх і макролідних а/б.

Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекційно-запальних процесів, спричинених чутливими до гатифлоксацину м/о: інфекції дихальних шляхів (г. бронхіт, загострення хр. бронхіту, г. синусит, негоспітальна пневмонія); інфекції нирок і ускладнені та неускладнені інфекції сечовидільної системи (г. пієлонефрит; цистит); неускладнена уретральна гонорея у чоловіків; ендоцервікальна, вагінальна гонорея у жінок, ректальна гонорея без ускладнень у жінок.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в краплинно та р/ос; дозування та тривалість лікування залежать від виду та ступеня тяжкості інфекції; г. бронхіт та загострення хр. бронхіту - 400 мг 1 р/добу протягом 5-7 діб; г. синусит - 400 мг 1 р/добу протягом 10 діб; негоспітальна пневмонія - 400 мг 1 р/добу 7-14 діб; неускладнені інфекції сечовидільних шляхів (цистит) - 400 мг 1 р/добу протягом 3 діб; ускладнені інфекції сечовидільних шляхів, г. пієлонефрит - 400 мг 1 р/добу 7-10 діб; неускладнена уретральна гонорея у чоловіків та ендоцервікальна, вагінальна гонорея у жінок, ректальна гонорея у жінок - 400 мг одноразово.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості, сироваткова хвороба, анафілактоїдні р-ції, анафілактичний шок, васкуліт, екзема, ангіоневротичний набряк; шкірні висипання, кропив'янка, еритема, свербіж, фотосенсибілізація, фототоксичність, екзема, алергічний дерматит, підвищена пітливість, сухість шкіри, с-м Стивенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз; ажитація, збудження, порушення/втрата свідомості, депресія, нервозність, неспокій, тривожність, кошмари або параноя, порушення сну, безсоння, сонливість, неспокійний сон, парестезія, порушення смакових відчуттів, запаморочення, головний біль, тремор, судоми, порушення зору, дзвін у вухах, ототоксичність, нейропатія; тахікардія, брадикардія, відчуття серцебиття, АГ, артеріальна гіпотензія, периферичні набряки, розширення судин, подовження інтервалу QT на ЕКГ, синкопе, torsades de pointes; біль у животі, анорексія, запор, диспепсія, здуття живота, глосит, гастрит, кандидоз ротової порожнини, стоматит, виразка ротової порожнини, печія, діарея, порушення апетиту, блювання, нудота, спрага, сухість у роті, панкреатит, шлунково-кишкова кровотеча; артропатія, артралгія, міалгія, судоми м'язів, порушення суглобового хряща, тендиніти, тендовагініти, розриви сухожилля; підвищення рівня печінкових ферментів, холестатична жовтяниця, гепатит, біль у правому підребер'ї, г. некроз гепатоцитів, печінкова недостатність; коливання рівня цукру у крові, гіпоглікемія (гіпоглікемічна кома), гіперглікемія (гіперосмолярна некетонемічна гіперглікемія); порушення функції нирок, ГНН, кристалурія, транзиторний нефрит, дизурія, гематурія, вагініт; диспное, задишка, фарингіт; нейтропенія, анемія (гемолітична, апластична), тромбоцитопенія, агранулоцитоз, панцитопенія, тромбоцитопенічна пурпура, лейкопенія або інші порушення з боку крові; підвищення рівня АЛТ, АСТ, ЛФ, білірубину, алілази, порушення рівня електролітів, підвищення міжнародного нормалізованого відношення/протромбінового часу; лихоманка, жар, озноб, астенія (слабкість), біль у спині чи у грудях; порушення мислення, порушення толерантності до алкоголю, артрит, БА (бронхоспазм), атаксія, біль у кістках, брадикардія, біль у спині, хейліт, коліт, ціаноз, деперсоналізація, дисфагія, біль у вухах, екхімози, носова кровотеча, ейфорія, біль в очах, фоточутливість очей, ШК геморагії, генералізовані набряки, гінгівіт, ворожість, галюцинації, маткові кровотечі, гематурія, гіперстезія, гіпервентиляція, гіпоглікемія, лімфаденопатія, макулопапульозні висипання,

метрорагія, мігрень, набряк губ, міалгія, міастенія, біль у шиї, панічні атаки, параноя, параосмія, фотофобія, псевдомембранозний коліт, психоз, птоз, ректальні геморагії, стрес, субстернальний біль, везикулобульозні висипання.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до гатифлоксацину та до інших фторхінолонів в анамнезі або до будь-яких інших компонентів ЛЗ; ЦД; захворювання ЦНС (епілепсія, знижений судомний поріг).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0.4 г., парентерально - 0,4 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БІГАФЛОН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл, 200мл у конт.	4 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БІГАФЛОН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 200мл у пл.	4 мг/мл	№1	193,12	
	БІГАФЛОН®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	4 мг/мл	№1	278,81	
II.	ГАТИЛИН	Євролайф Хелткеар Пвт. Лтд., Індія	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	200мг/100мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГАТИЛИН	Євролайф Хелткеар Пвт. Лтд., Індія	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	400мг/100мл	№1	182,73	28,11/\$
	ГАТИМАК	МАКЛЕОДС ФАРМАСЬЮТИКАЛ С ЛІМІТЕД, Індія	табл., в/о у бл.	400мг	№5	32,51	27,02/\$
	ОЗЕРЛІК®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл., в/о у бл.	400мг	№10x1x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОЗЕРЛІК®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл., в/о у бл.	400мг	№10x1	18,63	27,00/\$

17.2.12. Нітрофурани

Нітрофурантоїн (фурадонін) та фуразолідон активні відносно ряду грам(+) (стафілококи та ентерококи) та грам(-) (нітрофурантоїн активний відносно *E.coli*, більшість інших *Enterobacteriaceae* є стійкими або помірно стійкими) м/о. Фуразолідон, окрім цього, діє на лямблії та трихомонади. Із клінічно значимих збудників до нітрофуранів не чутливі MRSA, *P.aeruginosa* та більшість анаеробів. У зв'язку з особливостями фармакокінетики й високою частотою небажаних реакцій, нітрофурани обмежено застосовують у клінічній практиці.

- **Нітрофурантоїн (Nitrofurantoin)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: J01XE01 - АБЗ для системного застосування; похідні нітрофурантоїну.

Основна фармакотерапевтична дія: протимікробний ЛЗ групи нітрофурану, уроантисептик; впливає на різні ферментні системи м/о; бактеріостатична дія (бактерицидний при високих концентраціях); чутливі м/о: Enterococci, Escherichia coli, Citrobacter spp., Streptococci групи В, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis; Salmonella spp., Bacteroides spp., Streptococcus pneumoniae; помірно чутливі: Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp., Proteus spp., Providencia spp.; резистентні до препарату: Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Proteus mirabilis, Pseudomonas cepacia, Acinetobacter spp.

Показання для застосування ЛЗ: бактеріальні інфекції сечовивідних шляхів (пієліт, пієлонефрит^{ВООЗ, БНФ}, цистит^{ПМД, ВООЗ, БНФ}, уретрит), у т. ч. для тривалої терапії рецидивів, а також для попередження інфекцій при урологічних операціях, катетеризації, цистоскопії^{ВООЗ, БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос; г. інфекції: дорослим та дітям віком від 12 років - 100 мг 2 р/добу протягом 7 днів^{ВООЗ, БНФ}; тяжкі хр. рецидивуючі інфекції: дорослим - 100 мг 4 р/добу протягом 7 днів^{ВООЗ, БНФ}, для дорослих вища разова доза - 300 мг, МДД - 600 мг; хірургічна профілактика: дорослим - 100 мг^{БНФ} 2 р/добу^{ВООЗ, БНФ} в день процедури та 3 дні після процедури^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота, блювання, відсутність апетиту, частота та вираженість яких дозозалежна, біль у животі, діарея, панкреатит; головний біль, сонливість, запаморочення, депресія, ейфорія, ністагм, сплутаність свідомості, психотичні р-ції, невгамовність (збудженість), астенія, підвищення внутрішньочерепного тиску; необоротні периферичні поліневропатії; р-ції гіперчутливості (аутоімунні р-ції, асоційовані з хр. змінами в печінці та легенях); г. легеневої р-ції підвищеної чутливості (гарячка, еозинофілія, кашель, біль у грудях, задишка, легеневої інфільтрат або ущільнення та плевральний випіт); фіброз легень; БА; гепатит, холестатична жовтяниця, холестатичні порушення ф-ції печінки; гіперемія, циркуляторний колапс; шкірні висипи, макулопапульозні висипання, кропив'янка, свербіж, зворотне випадання волосся, ангіоневротичний набряк, анафілаксія, запалення слинних залоз, екзема, ексфолювативний дерматит, мультиморфна еритема (с-м Стівенса-Джонсона), вовчакоподібний с-м; мегалобластна анемія, лейкопенія, гранулоцитопенія/агранулоцитоз, тромбоцитопенія, апластична анемія, гемолітична анемія у пацієнтів з дефіцитом глюкозо-6-фосфатдегідрогенази; подагра, міалгія, біль у суглобах; псевдомембранозний коліт, грибова суперінфекція; порушення зору; транзиторне порушення сперматогенезу, можлива резистентність до таких м/о як *Pseudomonas*.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до нітрофурантоїну, інших нітрофуранів або до допоміжних речовин ЛЗ; легеневої фіброз; пієлонефрит при наявності супутнього паренхіматозного запалення нирок або паранефрального абсцесу; анурія; олігурія; г. порфірія; НН (КлКр < 60 мл/хв); цироз печінки; хр. гепатит; ХСН; проведення ГД; недостатність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (загроза гемолітичної анемії); неврит і поліневропатія.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ФУРАДОНІН	АТ "Олайнфарм", Латвія	табл. у бл.	100мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Ніфуроксазид (Nifuroxazide)**

Фармакотерапевтична група: А07АХ03 - антидіарейні препарати; засоби, що застосовуються для лікування інфекційно-запальних захворювань кишечника. Протимікробні ЛЗ, які застосовуються для лікування кишкових інфекцій.

Основна фармакотерапевтична дія: протимікробний ЛЗ, похідний нітрофурану; чинить антимікробні та протипаразитарні властивості, що зумовлено наявністю аміногрупи; локальна активність та відсутність проникнення в органи та тканини організму зумовлює його унікальність у порівнянні з іншими похідними нітрофурану; відсутня системна дія; ефективний відносно Гр (+) та ГР (-) м/о: Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Yersinia spp., Escherichia spp., Citobacter spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Salmonella spp

Показання для застосування ЛЗ: г. діарея інфекційної етіології.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос; дітям віком від 6 років по 200 мг 3-4 р/добу; дорослим та дітям віком від 15 років по 200 мг 4 р/добу; суспензію р/ос застосовують дітям віком від 2 років по 200 мг (5 мл) 3 р/добу, дорослим - по 200 мг (5 мл) 4 р/добу; МДД - 800 мг; тривалість лікування - не більше 7 діб.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР, ангіоневротичний набряк, кропив'янка, набряк Квінке, анафілактичний шок, шкірний свербіж, задишка; біль у животі, нудота, блювання, загострення діареї; гранулоцитопенія, пустулоз, вузликовий свербчак.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до ніфуроксазиду, інших похідних 5-нітрофурану або інших компонентів ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0.6 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НІФУРОЗИД-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	капс. у бл.	100мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НІФУРОЗИД-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	капс. у бл.	100мг	№10x2	16,76	
	НІФУРОЗИД-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	капс. у бл.	200мг	№10x2	12,49	
	НІФУРОЗИД-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	капс. у бл.	200мг	№10x1	16,04	
	НІФУРОЗИД-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	сусп. орал.у фл. по 50мл з мірн. ложк.	200мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НІФУРОЗИД-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	сусп. орал.у фл. по 100мл з мірн. ложк.	200мг/5мл	№1	15,24	
	НІФУРОКСАЗИД	ТОВ "Тернофарм", Україна	сусп. орал. по 90мл у бан. з мірн. ложк.	200мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НІФУРОКСАЗИД	ТОВ "Тернофарм", Україна	сусп. орал. по 90мл у фл. з мірн. ложк.	200мг/5мл	№1	20,40	
	НІФУРОКСАЗИД	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	сусп. орал. по 90мл у фл. або бан. з доз. скл.	220мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НІФУРОКСАЗИД	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	200мг	№10x2	12,29	
	НІФУРОКСАЗИД	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	200мг	№10x1	19,80	
	НІФУРОКСАЗИД	ТОВ "Тернофарм", Україна	табл., в/о у бл.	0,1г	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

НІФУРОКСАЗИД	ТОВ "Тернофарм", Україна	табл. в/о у бл.	0,1г	№10x3	19,30	
НІФУРОКСАЗИД	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	сусп. орал. по 100мл у фл. полім. або скл. з доз. ложк.	220мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НІФУРОКСАЗИД	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	сусп. орал. по 100мл у бан. полім. з доз. ложк.	220мг/5мл	№1	12,58	
НІФУРОКСАЗИД	ПАТ "Галичфарм", Україна	сусп. орал. по 100мл у фл.	220мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НІФУРОКСАЗИД-СПЕРКО	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна	сусп. орал. по 100мл у конт. з доз. ложк.	200мг/5мл	№1	14,30	
НІФУРОКСАЗИД-ВІШФА	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	сусп. орал. по 90мл у фл. або бан. з доз. скл. або мірн. ложк.	220мг/5мл	№1	19,65	
НІФУРОКСАЗИД-СПЕРКО	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості), Україна	капс. у конт.	200мг	№12x1	16,03	
II. ЕНТЕРОФУРИЛ®	Босналек д.д., Боснія і Герцеговина	капс. тверді у бл.	100мг	№10x3	17,60	26,39/€
ЕНТЕРОФУРИЛ®	Босналек д.д., Боснія і Герцеговина	капс. тверді у бл.	200мг	№8x2	15,75	26,39/€
ЕНТЕРОФУРИЛ®	Босналек д.д., Боснія і Герцеговина	капс. тверді у бл.	200мг	№8x1	19,50	26,39/€
ЕНТЕРОФУРИЛ®	Босналек д.д., Боснія і Герцеговина	сусп. орал. у фл. по 90мл з ложк.-доз.	200мг/5мл	№1	16,00	26,39/€
МИРОФУРИЛ	АВС Фармачеутічі С.п.А., Італія	сусп. орал. у фл. по 90мл з марн. стак.	200мг/5мл	№1	18,10	29,05/€
МИРОФУРИЛ	АВС Фармачеутічі С.п.А., Італія	капс. у бл.	200мг	№5x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МИРОФУРИЛ	АВС Фармачеутічі С.п.А., Італія	капс. у бл.	200мг	№5x2	22,53	29,05/€
НІФУРОКСАЗИД АЛКАЛОЇД	АЛКАЛОЇД АД Скоп'є, РЕСПУБЛІКА МАКЕДОНИЈА, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛІКА	капс. тверді у бл.	100мг, 200мг	№10x1, №10x2, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НІФУРОКСАЗИД АЛКАЛОЇД	АЛКАЛОЇД АД Скоп'є, РЕСПУБЛІКА МАКЕДОНИЈА, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛІКА	сусп. орал. по 90мл у фл.	200мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НІФУРОКСАЗИД РІХТЕР	ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща" (контроль якості, дозвіл на випуск серії; виробництво нерозфасованого продукту, первинна упаковка, вторинна упаковка), Польща	табл. в/о у бл.	100мг	№24x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НІФУРОКСАЗИД РІХТЕР	Гедеон Ріхтер Румунія А.Т. (виробництво нерозфасованого продукту, первинна упаковка, вторинна упаковка, контроль якості)/ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща"	сусп. орал. по 90мл у фл.	220мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	(контроль якості, дозвіл на випуск серії), Румунія/Польща					
СТОПДІАР	ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща" (контроль якості, дозвіл на випуск серії, виробництво нерозфасованого продукту, первинна упаковка, вторинна упаковка), Польща	капс. тверді у бл.	200мг	№12x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Фуразидин (Furazidin)**

Фармакотерапевтична група: J01XE03 - протимікробні ЛЗ для системного застосування. Похідні нітрофурану.

Основна фармакотерапевтична дія: нітрофурановий а/б з бактеріостатичною дією; ефективний щодо Гр (+) (*Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus faecalis*), Гр (-) (*Enterobacteriaceae*, *Klebsiella spp.*, *Escherichia coli*) бактерій. Висока бактеріостатична активність пов'язана з наявністю ароматичної нітрогрупи. Резистентність розвивається повільно. Пригнічує ферментні системи м/о та інші біохімічні процеси у бактеріальній клітині, що спричиняє порушення цитоплазматичної мембрани і клітинної оболонки бактерії.

Показання для застосування ЛЗ: г. та хр. інфекції сечовивідних шляхів: пієлонефрит, цистит, уретрит, простатит, післяопераційні інфекції сечостатевої системи; як протирецидивна терапія інфекцій сечовивідних шляхів; для профілактики інфекційних ускладнень при урологічних операціях, цистоскопії, катетеризації тощо.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймати внутрішньо, одразу після їди, запиваючи великою кількістю води; табл.: дорослі -100-200 мг (2-4 табл.) 2-3 р/добу, курс лікування 7-10 днів залежно від тяжкості захворювання, ефективності лікування, а також від функціонального стану нирок; у разі необхідності курс лікування повторити через 10-15 днів. МДД - 600 мг; капс.: дорослі - 50-100 мг (2-4 капс.) 3 р/добу, МДД 300 мг; дітям віком від 3-х років до 10 років (з масою тіла до 30 кг) - до 5 мг/кг маси тіла/добу, розподіливши добову дозу на 3 прийоми; дітям з масою тіла 30 кг і більше - 50 мг 3 р/добу; курс лікування від 5 до 10 днів, у разі необхідності ч/з 10-15 днів курс можна повторити (за призначенням лікаря); з метою протирецидивної терапії інфекцій сечовивідних шляхів дорослим та дітям - по $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{4}$ частині добової дози препарату на ніч протягом 3-6 міс.; для профілактики інфекції при урологічних операціях, цистоскопії, катетеризації тощо: дорослим — по 50 мг 3 р/добу; дітям — по 25 мг 3 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: порушення кровотворення (агранулоцитоз, тромбоцитопенія, апластична анемія), р-ції гіперчутливості, включаючи свербіж, висип, кропив'янку, ангіоневротичний набряк, запаморочення, сонливість; периферична невропатія; головний біль, слабо виражена інтракраніальна гіпертензія, неврит, поліневрит, порушення зору, г. легенева р-ція, хр. легенева р-ція, задишка, гарячка, біль у грудній клітці, кашель з/без мокроти, еозинофілія (підвищення кількості еозинофільних гранулоцитів у крові), висипання на шкірі, міалгія (м'язовий біль), наростання задишки, прискорене дихання, нестабільна гарячка, прогресуючий кашель, інтерстиціальний пневмоніт та/або фіброз легенів, зниження апетиту, метеоризм, нудота; папульозні висипання, дерматит, мультиформна еритема, артралгія (біль у суглобах), слабкість, підвищення t° тіла, тимчасове випадання волосся, холестатична жовтяниця, гепатит, порушення функції печінки, забарвлює сечу у темно-жовтий або коричневий колір.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до похідних групи нітрофурану або до допоміжних речовин препарату; тяжка ПН та НН (КлКр < 30 мл/хв), поліневропатія (у т. ч. діабетична), недостатність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (ризик розвитку гемолізу), порфірія, рідкісна вроджена непереносимість галактози, Lapp/лактазний дефіцит або глюкозо-галактозна мальабсорбція; дефіцит сахарози/ізомальтази/лактази, непереносимість фруктози/лактози; пацієнти, які перебувають на ГД або ПД.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ФУРАГІН	ПАТ "Галичфарм"/ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	50мг	№10x3	13,28	
II.	УРОФУРАГІН	АТ "Адамед Фарма", Польща	табл. у бл.	50мг	№30x1	13,33	26,67/\$
	ФУРАГІН	АТ "Олайнфарм", Латвія	табл. у бл.	50мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФУРАМАГ®	АТ "Олайнфарм", Латвія	капс. у бл.	25мг, 50мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Фуразолідон (Furazolidone)**

Фармакотерапевтична група: G01AX06 - протимікробні та антисептичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: проявляє бактеріостатичний або бактерицидний ефект; порушує процес клітинного дихання бактерій, пригнічує біосинтез нуклеїнових кислот; активний щодо Гр (-) паличок (ешерихія, сальмонели, шигели, протей, клебсієла, цитробактер), Гр (+) коків (стрептококи, стафілококи), найпростіших (лямблії, трихомонади); серед збудників кишкових інфекцій найбільш чутливими є збудники дизентерії, черевного тифу і паратифів, слабо впливає на збудників гнійної та анаеробної інфекції; активує фагоцитоз, не пригнічує імунну систему

Показання для застосування ЛЗ: бацилярна дизентерія, паратиф, харчова токсикоінфекція, ентероколіти, лямбліоз, трихомонадний кольпіт.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим і дітям старше 8 р. - внутрішньо після їди, запиваючи великою кількістю рідини (100 - 200 мл); при бацилярній дизентерії, паратифі, харчовій токсикоінфекції дорослим 2 табл. (0,1 г) 4 р/добу 5-7 дн. або циклами по 3-6 дн. з інтервалом 3-4 дні; дітям старше 8 р. - із розрахунку 6-7 мг/кг/добу; добову дозу розподіляють на 4 прийоми (при необхідності прийому дози < 50 мг призначають інші препарати фуразолідону у відповідній лікарській формі та дозуванні); тривалість курсу - 5-7 днів залежно від тяжкості захворювання, ефективності та чутливості до терапії; лямбліоз: дорослим - 2 табл. (0,1 г) 4 р/добу; дітям старше 8 р.- із розрахунку 6 мг/кг/добу у 3-4 прийоми, курс лікування -5-7 днів; терапія трихомонадних інфекцій: дорослим - 2 табл. (0,1 г) 3-4 р/добу 3-4 дні, кольпіти - лікування проводять комбіновано, внутрішньо 2 табл. (0,1 г) 3-4 р/добу 3 дні; одночасно в піхву вводять порошок, що містить фуразолідон з лактозою, в пряму кишку - супоз. з ЛЗ; вищі дози для дорослих: разова - 4 табл. (0,2 г), добова - 16 табл. (0,8 г); не рекомендують приймати довше 7 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль у животі, нудота, гіркота у роті, відсутність апетиту, блювання, діарея, анорексія, холестази, головний біль, запаморочення, периферичні нейропатії, лейкопенія, агранулоцитоз, гемоліз в осіб з дефіцитом глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, свербіж шкірних покривів, кропив'янка, висипання на шкірі обличчя, тулуба і нижніх кінцівок, у т. ч. плямисто-папульозні, гіпоглікемія, ортостатична гіпотензія, темно-жовте забарвлення сечі, гарячка, слабкість, г.легеневі р-ції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: термінальна стадія ХНН, порушення ф-ції печінки, дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, підвищена чутливість до компонентів препарату і нітрофуранів.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ФУРАЗОЛІДОН	ПАТ "Монфарм", Україна	табл. у бл.	0,05г	№20, №100, №200	відсутня у реєстрі ОВЦ	

17.3. Протитуберкульозні засоби

Метою лікування хворих на туберкульоз є вилікування захворювання з максимально можливим відновленням стану організму, функцій враженого органу, працездатності, покращанням якості життя. В більшості випадків вдається досягти вилікування туберкульозу.

Критеріями вилікування туберкульозу є:

- завершений та повноцінно проведений основний курс хіміотерапії;
- відсутність або зникнення клінічних та лабораторних ознак туберкульозного запалення;
- стійке припинення бактеріовиділення, яке підтверджене мікроскопічним та культуральним дослідженням матеріалу;
- загоєння каверн в легенях та розсмоктування (або ущільнення) інфільтрації та вогнищ; відсутність рентгенологічних ознак туберкульозу легень або інших органів у результаті завершення його інволюції, що відображено припиненням процесу розсмоктування (ущільнення) туберкульозних змін у легенях, плеврі, або інших органах;
- відновлення функціональних можливостей та працездатності.

Вилікування хворих на туберкульоз залежить від 2 взаємопов'язаних факторів: пригнічення мікобактеріальної популяції за допомогою протитуберкульозних препаратів та регресії туберкульозних змін в уражених органах і репаративних процесів в них.

Основним методом лікування туберкульозу є антимікобактеріальна хіміотерапія. Терапевтичний ефект обумовлений безпосереднім бактерицидним або бактериостатичним впливом протитуберкульозних препаратів на МБТ. Регресія туберкульозних змін в уражених органах і репаративні процеси в них також відбуваються за допомогою протитуберкульозних препаратів, а також за допомогою патогенетичних препаратів, які впливають на запалення, процеси регенерації або покращують переносимість протитуберкульозної хіміотерапії.

Основними принципами протитуберкульозної хіміотерапії є:

- комбіноване застосування протитуберкульозних препаратів (не менше 3), до яких МБТ чутливі і які приймають протягом тривалого часу (не менше 6 міс); при цьому добову дозу кожного препарату, за окремими випадками, слід приймати в один прийом (добова доза хіміотерапії);
- застосування стандартних комбінацій протитуберкульозних препаратів для лікування хворих з новими випадками та рецидивами захворювання;
- контроль за прийомом протитуберкульозних препаратів з боку медичних працівників;
- недопустимість приєднання 1 протитуберкульозного препарату до режиму хіміотерапії, який призвів до невдачі лікування.

Основний курс протитуберкульозної хіміотерапії поділяють на два етапи.

Перший етап – інтенсивна фаза - застосовують 4-5 протитуберкульозних препарати з метою для припинення розмноження і значного зменшення бактеріальної популяції МБТ в організмі хворого. Проведена терапія усуває г. прояви хвороби, припиняє бактеріовиділення й у більшій частині хворих приводить до загоєння каверн у легенях.

Другий етап лікування – підтримуюча фаза – застосовують 2-3 протитуберкульозні препарати з метою забезпечення стійкого клінічного ефекту та повного припинення розмноження МБТ у вогнищах ураження для попередження загострення процесу.

Методика лікування хворих на туберкульоз органів дихання залежить від морфологічних змін в легенях і виявлення МБТ в харкотинні. У хворих із деструктивним процесом і бактеріовиділенням вона більш інтенсивна у порівнянні з хворими туберкульозом без бактеріовиділення і деструктивних змін в легенях (3 місяці інтенсивна фаза, 5 місяців підтримуюча фаза).

Також для лікування хворих на туберкульоз застосовують інші ЛЗ в якості патогенетичної протизапальної терапії, для профілактики та усунення побічних реакцій прийому протитуберкульозних препаратів. В якості патогенетичного протизапального ЛЗ системно, ендобронхіально, інтраплеврально застосовують глюкокортикоїди (ГК) у якості ад'ювантної терапії для зменшення запальних змін ексудативного характеру в легенях, бронхах, набряку головного мозку та мозкових оболонок, попередження накопичення ексудату в плевральній порожнині при плевритах (після плевральної пункції, накопичення синовіальної рідини).

З метою профілактики побічних неврологічних реакцій від прийому ізоніазиду патогенетично усім хворим на туберкульоз призначають піридоксин (вітамін В6). Нейротоксичність ізоніазиду обумовлена його антагонізмом з піридоксином. Метаболіти ізоніазиду пригнічують процес утворення основної коферментної форми вітаміну В₆ – піридоксальфосфату, що є коenzимом, який бере участь у різноманітних перетвореннях амінокислот (трансамінуванні, дезамінуванні, декарбоксілюванні).

Для усунення побічних реакцій від протитуберкульозних препаратів застосовують майже усі класи ЛЗ залежно від виду побічної реакції, що розвинулась. АР, що можуть розвинути від будь-якого протитуберкульозного ЛЗ, усувають за допомогою антигістамінних препаратів та глюкокортикоїдів. Неврологічні побічні реакції у вигляді полінейропатії, невритів, розладів з боку ЦНС, у тому числі психозів, від ізоніазиду, аміноглікозидів, етамбутолу, циклосерину, етіонаміду, протіонаміду, фторхінолонів усувають за допомогою вітамінів, протиепілептичних, антипсихотичних, ноотропних ЛЗ, антидепресантів. Диспепсичні прояви, які виникають при прийомі більшості протитуберкульозних препаратів, у вигляді нудоти, блювоти, діареї, печії, болі у шлунку лікують шляхом призначення антацидів, інгібіторів протонного насоса, стимуляторів перистальтики, антиперистальтичних, антидіарейних ЛЗ, ферментів, антидіарейних мікробних препаратів. Гепатотоксичні реакції від ізоніазиду, рифампіцину, піразинаміду лікують за допомогою гепатотропних лікарських засобів, р-нів для в/в введення. Гіпотиреоїдизм, що виникає при прийомі ПАСК, особливо у комбінації з етіонамідом, протіонамідом, усувають за допомогою гормональних ЛЗ. Електролітний дисбаланс (гіпокаліємія, гіпомagneмія) від застосування аміноглікозидів лікують за допомогою мінеральних добавок та р-нів для в/в введення. Болі в суглобах при прийомі фторхінолонів, піразинаміду лікують за допомогою НПЛЗ. ЛЗ для лікування побічних реакцій застосовують до повного усунення клінічних та лабораторних проявів побічних реакцій. При виникненні серйозних побічних реакцій, які не усуваються патогенетичним ЛЗ, відмінюють протитуберкульозний препарат, що викликав цю побічну реакцію.

Для лікування хворих на туберкульоз застосовують 2 групи протимікробних засобів: протитуберкульозні, антимікробні. Протитуберкульозні препарати використовують виключно для лікування хворих на туберкульоз, не зважаючи на те, що вони включають антибактеріальні засоби, які, окрім МБТ, діють також на інші збудники. Виділення цих препаратів в окрему групу обумовлено особливостями збудника та швидким розвитком резистентності МБТ до протимікробних препаратів при монотерапії. Протитуберкульозні препарати за показаннями до їх призначення поділяють на препарати I і II ряду. Основним принципом проведення протимікробної терапії у хворих на туберкульоз є комбіноване застосування протитуберкульозних препаратів під безпосереднім наглядом медичних працівників за прийомом препаратів. Ефективність лікування хворих на туберкульоз із застосуванням протитуберкульозних лікарських засобів I та II ряду доведена в рандомізованих клінічних дослідженнях (рівень доказовості А).

З групи антибактеріальних препаратів для лікування хворих на туберкульоз застосовують фторхінолони, кларитроміцин, амоксицилін/клавуланову кислоту, лінезолід. Фторхінолони II-IV генерацій мають бактерицидну дію відносно МБТ і використовуються у хворих на мультирезистентний туберкульоз, у випадку виділення штамів, резистентних одночасно до ізоніазиду та рифампіцину – основних протитуберкульозних препаратів. Ефективність лікування хворих на туберкульоз із застосуванням фторхінолонів доведена в рандомізованих контрольованих дослідженнях (рівень переконливості доказів А).

Кларитроміцин, амоксицилін/клавуланову кислоту, лінезолід належать до групи препаратів, яку ВООЗ не рекомендує застосовувати в рутинній практиці лікування хворих на туберкульоз. Ці препарати призначають тільки у разі розширеної резистентності МБТ (резистентності одночасно до ізоніазиду, рифампіцину, аміноглікозидів, фторхінолонів), коли в режим хіміотерапії не можливо включити 4 протитуберкульозних препарати разом з фторхінолонами. Ефективність лікування хворих на туберкульоз із застосуванням кларитроміцину, амоксицилін/клавуланової кислоти, лінезоліду, доведена в окремих рандомізованих контрольованих дослідженнях (рівень переконливості доказів D).

17.3.1. Протитуберкульозні лікарські засоби I ряду

Протитуберкульозні препарати I ряду є основними протитуберкульозними препаратами, які призначають хворим на вперше діагностований туберкульоз та рецидиви захворювання, які виділяють чутливі *Mycobacterium tuberculosis* (МБТ) (хворі I – III клінічних категорій). Протитуберкульозні препарати II ряду є резервними, їх використовують тільки в індивідуалізованих/індивідуальних схемах хіміотерапії у хворих на туберкульоз IV категорії, у яких визначають медикаментозну резистентність МБТ до ПТП I ряду, а також у хворих інших категорій при резистентності МБТ до препаратів I ряду або поганій їх переносимості. Розподіл протитуберкульозних препаратів на препарати I і II ряду забезпечує дотримання стандартних схем хіміотерапії туберкульозу для профілактики розвитку медикаментозної резистентності МБТ.

● *Ізоніазид (Isoniazid)* * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: J04AC01 - протитуберкульозні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: інгібує ДНК-залежну РНК-полімеразу, гальмує синтез міколевих кислот клітинної стінки МБТ, виявляє високу бактеріостатичну активність щодо МБТ, затримуючи їх ріст, у концентрації 0,03 мкг/мл, активний щодо м/о, які швидко розмножуються, слабо впливає на збудників інших інфекційних хвороб.

Показання для застосування ЛЗ: у комбінації з 3-4 іншими ПТП – для лікування активного туберкульозу усіх форм і локалізацій (р-н для ін'єк.-як засіб першого ряду); як монотерапія – для лікування латентної туберкульозної інфекції та профілактики туберкульозу в осіб, які були або є у близькому контакті з хворими на туберкульоз^{ВООЗ, БНФ, ПМД}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос до їди або через 30-40 хв після прийому їжі; дорослим і дітям старше 4 років призначають у добовій дозі 5 мг/кг маси тіла 1 р/добу при щоденному застосуванні^{ВООЗ} або 10 мг/кг маси

тіла при інтермітуючому прийомі (3 р/тиждень), ^{ВООЗ БНФ} або 15 мг/кг маси тіла ^{БНФ} при прийомі 2 р/тиждень; МДД для дорослих - 600 мг, для дітей - 500 мг; лікування активного туберкульозу триває 6-8 міс., з метою профілактики: дорослі: 300 мг 1 р/добу ^{ВООЗ БНФ}, діти: 10 мг/кг 1 р/добу ^{БНФ}, максимальна доза 300 мг ^{ВООЗ БНФ}, приймають 2-3 міс. (табл.) або 6-12 міс. (сироп); в/в добова доза: дорослі- 200-300 мг, для дітей - 100-300 мг (10-20 мг/кг маси тіла), для новонароджених - 3-5 мг/кг, але не більше ніж 10 мг/кг маси тіла/добу; в/м дорослим та дітям вводять у вигляді готового нерозведеного 10 % р-ну по 5-12 мг/кг 1 р/добу протягом 2-5 міс.; інгаляційно у вигляді готового нерозведеного 10 % р-ну; добова доза - 0,005-0,01 г (5-10 мг)/кг за 1-2 прийоми; інгаляції щоденно протягом 1-6 міс.; хворим при фіброзно-кавернозній формі туберкульозу при бактеріовиділенні і в передопераційний період призначають у вигляді готового нерозведеного 10 % р-ну в добовій дозі 10-15 мг/кг 1 р/добу; вводять переважно в/кавернозно, шляхом інтратрахеальних вливань.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота, блювання, сухість у роті, дискомфорт в ділянці живота, анорексія, запор, метеоризм, г. панкреатит, АР, в т.ч. р-ції гіперчутливості, такі як медикаментозна гарячка, шкірні висипи (короподібний, макулопапульозний дерматити, пурпура або ексфоліативний дерматит), шкірний свербіж, інтерстиціальний пневмоніт, лімфаденопатія і васкуліт; можливе загострення симптомів СЧВ або поява вовчакоподібного с-му, мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, головний біль, запаморочення, роздратованість, нервозність, порушення сну, безсоння, парестезії, периферична нейропатія/неврити, порушення чутливості, психотичні р-ції (токсичні психози), починаючи від незначних змін особистості до значних психічних розладів, які, як правило, зникали при відміні препарату, збільшення частоти нападів у хворих на епілепсію, м'язові посмикування, судоми, гіперрефлексія, токсична енцефалопатія, розлади пам'яті, сплутаність свідомості, дезорієнтація, галюцинації, неврит зорового нерва, атрофія зорового нерва, дзвін у вухах та втрата слуху у пацієнтів з термінальною стадією ниркової недостатності, пневмоніт (алергічний), АГ, відчуття серцебиття, біль за грудниною та в ділянці серця, посилення ішемії міокарда у осіб літнього віку, утруднене сечовивипускання, затримка сечі; нефротоксичність, включаючи інтерстиціальний нефрит, ушкодження печінки, підвищення рівня сироваткових трансаміназ (АЛТ, АСТ), жовтяниця, гепатит, ізоніазид-асоційований гепатит (особливо в осіб з хр. захворюваннями печінки або у тих, хто зловживає алкоголем), фульмінантна печінкова недостатність, що може призвести до розвитку некрозу печінки (пацієнти від 35 років), білірубінемія, білірубінурія, дефіцит піридоксину, що впливає на перетворення триптофану в нікотинову кислоту, пелагра, с-м Кушинга, гіперглікемія, метаболічний ацидоз, гінекомастія у чоловіків, менорагії у жінок, гемолітична та апластична анемії, сидеробластична анемія, тромбоцитопенія, агранулоцитоз, еозинофілія, лейкопенія, нейтропенія, ревматоїдний с-м, м'язові посмикування, нездужання, слабкість; «с-м відміни», що включає головний біль, безсоння, дратівливість, нервозність, набряк слизової оболонки бронхів.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до ізоніазиду або до допоміжних речовин препарату, епілепсія та схильність до судомних нападів, тяжкі психози (в т.ч. в анамнезі), поліомієліт (у т.ч. в анамнезі), токсичний гепатит в анамнезі внаслідок застосування похідних гідразиду ізонікотинової кислоти (фтивазид), г. печінкова і/або ниркова недостатність, виражений атеросклероз; в дозі вище 10 мг/кг/добу протипоказаний при легенево-серцевій недостатності III ст., АГ II-III ст., ІХС, захворюваннях нервової системи, ХНН, гепатиті в період загострення, цирозі печінки, БА, псоріазі, екземі у фазі загострення, гіпотиреозі, мікседемі, у період вагітності.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,3 г., парентерально - 0,3 г.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I. БІТУБ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл у фл. в пач.	100 мг/мл	№10, №30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
БІТУБ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	100 мг/мл	№5x2	3,88	
ІЗОНІАЗИД	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл. у бл.	100мг	№10x5	1,26	
ІЗОНІАЗИД	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл. у бл.	200мг	№10x5	0,73	
ІЗОНІАЗИД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	сироп у фл. по 100мл, 200мл, 500мл у фл.	100мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ІЗОНІАЗИД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	сироп у фл. по 100мл у фл. в пач.	100мг/5мл	№1	11,09	
ІЗОНІАЗИД	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	сироп у фл. по 200мл у фл. в	100мг/5мл	№1	9,21	

			пач.				
	ІЗОНІАЗИД-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт.	300мг	№1000, №1500, №2500	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІЗОНІАЗИД-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	300мг	№10x5	0,62	
	ІЗОНІАЗИД-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у конт. чар/уп.	100 мг/мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	ІЗОНІАЗИД	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл. у бл.	100мг, 300мг	№30, №84, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІЗОНІАЗИД	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл. у бл.	100мг	№28x24	2,41	26,86/\$
	ІЗОНІАЗИД	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл. у п/е пак. в конт.	100мг	№1000x1	2,43	26,86/\$
	ІЗОНІАЗИД	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл. у бл.	100мг	№10x10	2,70	27,16/\$
	ІЗОНІАЗИД	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл. у бл.	300мг	№28x24	1,52	26,86/\$
	ІЗОНІАЗИД	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл. у п/е пак. в конт.	300мг	№1000x1	1,56	26,86/\$
	ІЗОНІАЗИД	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл. у бл.	300мг	№10x10	2,10	27,16/\$

- **Рифампіцин (Rifampicin)** * [ПМД] (див. п. 17.2.8. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: у комплексній терапії: туберкульозу різної локалізації, туберкульозного менінгіту, а також атипівних мікобактеріозів^{ВООЗ БНФ}; для лікування усіх форм туберкульозу, включаючи початкові, тяжкі, хр. та стійкі до інших а/б випадки^{ВООЗ БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос^{ВООЗ,БНФ}, натще; приймають за 30 хв до їжі або через 2 год після прийому їжі; дорослим призначати у дозі 8-12 мг/кг маси тіла на добу, пацієнтам з масою тіла < 50 кг - 450 мг/добу, 50 кг та >- 600 мг/добу^{БНФ}, дітям від 6 до 12 років призначати у дозі 10-20 мг/кг маси тіла на добу; МДД не має перевищувати 600 мг^{БНФ}.

- **Рифабутин (Rifabutin)** *

Фармакотерапевтична група: J04AB04 - протитуберкульозні засоби. Антибіотики.

Основна фармакотерапевтична дія: напівсинтетичний а/б широкого спектра дії; має високу активність відносно кислотостійких бактерій, включаючи атипів та полірезистентні м/о; in vitro проявляє високу активність відносно лабораторних штамів і клінічно виділених культур M.tuberculosis; дослідження in vitro показали, що від 30 % до 50 % штамів M.tuberculosis, резистентних до рифампіцину, чутливі до рифабутину (тобто існує неповна перехресна резистентність між цими а/б); активність рифабутину in vitro при інфікуванні M.tuberculosis була у 10 раз вищою за активність рифампіцину; активний відносно нетуберкульозних (атипівних) бактерій, включаючи M. avium intracellulare complex.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика інфекцій, спричинених *Mycobacterium avium*-внутрішньоклітинним комплексом (МАС-інфекції)^{БНФ}, у пацієнтів з імунодепресією з кількістю CD4-лімфоцитів^{БНФ} 200/мкл і менше; у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією; лікування легеневого туберкульозу як хр. резистентного, так і вперше діагностованого^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі: профілактика МАС-інфекції у пацієнтів з імунодепресією: 300 мг 1 р/добу^{БНФ}; у комбінації з іншими препаратами: при нетуберкульозній мікобактеріальній інфекції: 450 - 600 мг 1 р/добу 6 міс.^{БНФ} з моменту отримання негативного посіву; при хр. полірезистентному туберкульозі легенів - по 300-450 мг/добу до 6 міс. з моменту отримання негативного результату; при вперше діагностованому легеневому туберкульозі - по 150 мг/добу протягом від 6 міс. або протягом 6 міс. з моменту отримання негативного посіву. МДД - 450 мг. Термін лікування - 6 міс. і більше. Пацієнтам, схильним до шлунково-кишкових розладів (нудота, блювання) можливе призначення рифабутину по 150 мг 2 р/добу під час прийому їжі.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота, блювання, підвищення рівнів активності печінкових ферментів, жовтяниця, гепатит, анорексія, біль у животі, діарея, диспепсія, відрижка, метеоризм, спостворення смаку; коліт, спричинений *Clostridium difficile*; тромбоцитопенія і анемія, панцитопенія, агранулоцитоз, лімфопенія, гранулоцитопенія, нейтропенія, зменшення нейтрофільних лейкоцитів; артралгія, міалгія, пропасниця, висип і у поодиноких випадках інші р-ції гіперчутливості, такі як еозинофілія, бронхоспазм і шок, ангіоневротичний набряк, кропив'янка, оборотний увеїт, ступінь тяжкості якого варіював від легкого до тяжкого; головний біль, астенія, безсоння; підвищення ЛФ, АСТ, АЛТ; міозит, біль, знебарвлення шкіри, знебарвлення сечі, кон'юнктивіт, інші р-ції гіперчутливості, такі як еозинофілія, бронхоспазм і шок, оборотний увеїт, псевдожовтяниця (жовтушний колір шкіри при нормальному рівні білірубину в крові); грипоподібний с-м, відчуття стиснення чи болю у грудях із задишкою, з гепатитом і гемолізом, випадки діареї, асоційованої з *C. difficile*.

Протипоказання до застосування ЛЗ: клінічно значима підвищена чутливість до рифабутину або до інших рифаміцинів в анамнезі, порфірія.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	РИФАБУТИН	Люпін Лімітед, Індія	капс. у бл.	150мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	РИФАБУТИН 150	Люпін Лімітед, Індія	капс. у бан.	150мг	№100	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Піразинамід (Pyrazinamide)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: J04AK01 - АБЗ для системного застосування. Протитуберкульозні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: туберкулоостатична; перетворюється у фармакологічно активну піразиноєву кислоту з участю мікобактеріальних піразинамідаз у кислому середовищі макрофагів, залежно від к-ції піразинамідів та чутливості МБТ проявляє бактеріостатичний або бактерицидний ефект, активний тільки щодо МБТ.

Показання для застосування ЛЗ: лікування всіх форм туберкульозу (в комбінації з іншими туберкулоостатичними препаратами)^{ВООЗ, БНФ, ПМД.}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл. приймають цілими запиваючи водою у вигляді разової дози після їди; для розрахунку добової дози завжди використовують ідеальну масу тіла; добова доза для дорослих та дітей віком від 15 років - 20 - 30 мг/кг^{ВООЗ, БНФ}; приймають 1-3 р/день залежно від переносимості; МДД не повинна перевищувати 1,5 г^{БНФ}. Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання, переносимості препарату і визначається лікарем (зазвичай 6-8 місяців).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: диспептичні явища, біль в епігастрії, шлунку, відсутність апетиту, нудота, блювання, діарея, пептична виразка, металевий присмак у роті, порушення функції печінки, підвищення рівня печінкових трансаминаз, білірубину, тимолової проби; гепатомегалія; виникнення г.атрофії печінки, що залежить від дози; жовтяниця, інтерстиціальний нефрит; міоглобінурічна ниркова недостатність внаслідок рабдоміолізу, дизурія, біль при сечовипусканні, запаморочення, головний біль, порушення сну, підвищена збудливість, депресія; галюцинації, судоми, сплутаність свідомості, периферична нейропатія, парестезії, тромбоцитопенія, еозінофілія, анемія, сидеробластна анемія, вакуолізація еритроцитів, порфірія, підвищення концентрації сироваткового заліза, гіперкоагуляція, схильність до утворення тромбів, спленомегалія, зниження АТ, неприємні відчуття у ділянці серця, відчуття жару, гіперемія обличчя, утруднене дихання, задишка, сухий кашель, артралгія, припухлість суглобів, скутість у суглобах, міалгія, рабдоміоліз, подагричні напади, гіперемія, шкірні висипи, кропив'янка, свербіж, фотосенсибілізація, акне, токсико-алергічний дерматит, анафілактоїдні р-ції, ангіоневротичний набряк, гарячка; анафілактичний шок, загальна слабкість, нездужання, гіперурикемія, пелагра, гіпертермічний с-м.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до активної речовини, інших інгредієнтів ЛЗ або до інших близьких за хімічною структурою ЛЗ (етіонамід, ізоніазид, ніацин); тяжкі порушення функції печінки, г. подагра, безсимптомна гіперурикемія.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1.5 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ПІРАЗІНАМІД	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (виробництво за повним циклом)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофарм" (виробництво, пакування, випуск серій)/Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна/Україна/Україна	табл. у бл.	500мг	№10х5	2,84	
	ПІРАЗІНАМІД-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп. та конт.	500мг	№10х5, №1000	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	МАКРОЗИД 500	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл. у бл.	500мг	№10х10	4,50	27,02/\$
	ПАЙЗИНА	Люпін Лімітед, Індія	табл. у бан.	500мг	№100, №1000	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПІРАЗІНАМІД	Мікро Лабс Лімітед, Індія	табл., що дисперг. у стрип.	150мг	№10х10	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Етамбутол (Ethambutol)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: J04AK02 - протимікробні засоби для системного застосування, засоби, що діють на мікобактерії, протитуберкульозні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить виражену бактеріостатичну дію щодо *Mycobacterium tuberculosis*, а також деяких атипичних мікобактерій (*M.avium*, *M.kansasii*, *M.xenopi*), пригнічує розмноження мікобактерій, стійких до стрептоміцину, ізоніазиду, парааміносаліцилової кислоти (ПАСК), етіонаміду, канаміцину та до інших протитуберкульозних засобів. Механізм дії етамбутолу після його проникнення в мікобактерію пов'язують із пригніченням синтезу РНК і білків, здатністю взаємодіяти з іонами двовалентних біометалів (мідь, магній), порушенням структури рибосом та пригніченням інтенсивності ліпідного обміну. Первинну стійкість до препарату має близько 1 % пацієнтів. При монотерапії туберкульозу розвивається швидко толерантність.

Показання для застосування ЛЗ: лікування усіх форм легеневого та позалегенового туберкульозу ^{пмд вооз бнф} (в комбінації з іншими протитуберкульозними засобами), лікування всіх форм і локалізації активного туберкульозу, особливо при вперше виявлених г. процесах.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим: внутрішньо 15 мг/кг 1 р/добу ^{вооз}, при проведенні повторного курсу препарат призначати 1 р/добу в дозі 25 мг/кг 2 міс, потім призначати дозу 15 мг/кг протягом усього періоду лікування, при застосуванні препарату у дозі 25 мг/кг маси тіла рекомендується щомісячний огляд окуліста, МДД - 2 г; дітям від 13 років - внутрішньо в дозі 15-25 мг/кг/добу, МДД для дітей - 1 г, тривалість курсу лікування залежить від форми туберкульозу і становить від 6 до 12 міс.; в/венно: оптимальна доза для дорослих при застосуванні етамбутолу при лікуванні туберкульозу становить 15-20 мг/кг маси ^{бнф} тіла на добу при щоденному застосуванні або 20-35 мг/кг маси тіла на добу при застосуванні препарату ч/з день; при поширеному процесі з масивним бактеріовиділенням і при лікуванні туберкульозного менінгоенцефаліту дозу препарату можна збільшити до 30-35 мг/кг маси тіла на добу, МДД дорослим - 1-1,6 г залежно від маси тіла, дітям віком від 5 років призначати у дозі 15-20 мг/кг маси тіла на добу, при інтермітуючому застосуванні - до 25 мг/кг маси тіла/добу, МДД дітям - 1-1,2 г залежно від маси тіла. Курс лікування залежить від ефективності терапії і сприйняття препарату і становить у середньому 2-4 місяці.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ретробульбарне запалення зорового нерва, зорова невротія, однобічне або двобічне зниження гостроти зору, включаючи необоротну сліпоту, порушення кольоросприйняття (переважно зеленого та червоного кольорів), розвиток центральної або периферичної скотоми, обмеження полів зору, крововилив у сітківку, анафілактичні/анафілактоїдні реакції, включаючи анафілактичний шок, висипання, свербіж, гіперемія, дерматит, відчуття пощипування, с-м Стівенса-Джонсона, с-м Лайелла (токсичний епідермальний некроліз), васкуліт, головний біль, запаморочення, сплутаність свідомості, порушення орієнтації, галюцинації, судоми, дезорієнтація, депресія, периферичні неврити, парестезії у кінцівках, відчуття оніміння, парези, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія, еозінофілія, лімфаденопатія, інфільтрати у легенях з або без еозінофілії, пневмоніт, бронхоспазм, перикардит, міокардит, артеріальна гіпотензія, тахікардія, відсутність апетиту, металевий присмак у роті, нудота, блювання, диспепсія, печія, біль у животі, діарея, анорексія, псевдомембранозний коліт (при сумісному застосуванні з рифампіцином та ізоніазидом), підвищення активності печінкових трансаміназ, гепатит, жовтяниця, підвищення КлКр, підвищення рівня сечовини, інтерстиціальний нефрит, зниження кліренсу сечової кислоти у сироватці крові, явища сечокислового діатезу, загострення подагри; гіперурикемія, підвищення t° тіла, озноб, загальна слабкість, набряки.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до компонентів препарату; неврит зорового нерва; катаракта; діабетична ретинопатія; запальні захворювання очей; подагра; тяжка ниркова недостатність; ХНН, ситуації, коли неможливо перевірити стан зору (тяжкий стан, психічні розлади).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1.2 г., парентерально - 1.2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕТАМБУТОЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл. у конт. в пач.	400мг	№120	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕТАМБУТОЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл. у конт.	400мг	№1000	2,67	
	ЕТАМБУТОЛ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл. у бл. в пач.	400мг	№10x5	3,53	
	ЕТАМБУТОЛ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп. та конт.	400мг	№10x5, №1000	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНБУТОЛ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 20мл, у фл.	100 мг/мл	№1	57,36	

	ІНБУТОЛ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 10мл у фл.	100 мг/мл	№1	76,14	
	ІНБУТОЛ®	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	концен. д/р-ну д/інфуз. по 10мл, 20 у фл. скл.	100мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	ЕКОКС 400	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., в/о у бл.	400мг	№10x10	5,40	27,16/\$
	ЕТАМБУТОЛ	СВІЗЕРА ЛАБС ПРАЙВЕТ ЛІМІТЕД, Індія	табл., в/о у бан.	400мг	№1000	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕТАМБУТОЛ ТАБЛЕТКИ, ЩО ДИСПЕРГУЮТЬСЯ 100 МГ ETHAMBUTOL DISPERSIBLE TABLETS 100 MG	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед/Оксаліс Лабс, Індія/Індія	табл., що диперг. у бл.	100мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Стрептоміцин (Streptomycin)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: J01GA01 - протимікробні засоби для системного застосування. Аміноглікозиди.

Основна фармакотерапевтична дія: має широкий спектр антимікробної (бактерицидної) дії; активний відносно *M.tuberculosis*, більшості *Гр(-): E.coli, Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp., Klebsiella spp.* (у т. ч. *Klebsiella pneumoniae*), *Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Yersinia pestis, Francisella tularensis, Brucella spp.* та деяких *Гр (+) m/o: Staph. spp., Corynebacterium diphtheriae*; менш активний відносно *Str. spp.* (у т. ч. *Str. pneumoniae*), *Enterobacter spp.*; не активний відносно анаеробних бактерій, *Spirochaetaceae, Rickettsia spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa*; бактерицидну дію виявляє внаслідок зв'язування з 30S-субодиницею бактеріальної рибосоми, що в подальшому призводить до пригнічення синтезу білка.

Показання для застосування ЛЗ: лікування вперше виявленого туберкульозу легень та туберкульозних уражень інших органів; хворим, що лікувались раніше, препарат доцільно призначати після лабораторного підтвердження чутливості до нього виділених хворим МБТ^{ВООЗ,БНФ, ПМД}; інфекційно-запальні процеси різної локалізації, що спричинені *Гр+* та *Гр-м/о*, чутливими до препарату: при пневмонії, спричиненій клебсієлами, при ендокардиті^{БНФ}, чумі, туляремії^{ВООЗ}, бруцельозі^{ВООЗ,БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять в/м^{ВООЗ,БНФ}, у вигляді аерозолей, інтратрахеально; дорослим застосовують також і в/кавернозно; перед початком терапії виключити наявність у пацієнта підвищеної чутливості до а/б, зробивши шкірну пробу, та до новокаїну (при його використанні у якості розчинника); в/м разова доза дорослим 0,5-1 г, вища добова доза - 2 г, для хворих з масою тіла < 50 кг та осіб старше 60 років добова доза не перевищує 0,75 г; при лікуванні туберкульозу добову дозу вводять одноразово^{ВООЗ}; добова доза для дітей віком 1-3 місяці - 10 мг/кг маси тіла, 3-6 місяців - 15 мг/кг^{БНФ}, від 6 місяців до 2 років - 20 мг/кг; добова доза для дітей від 2 років до 18 років визначається із розрахунку 15^{ВООЗ}-20 мг/кг маси тіла, але не більше 0,5 г/добу дітям (до 12 років) і не > 1 г/добу підліткам^{БНФ} (12-18 років); при поганій переносимості добову дозу можна розділити на 2 введення; тривалість лікування залежить від форми та фази захворювання та складає 2-3 міс.; при лікуванні інфекцій нетуберкульозної етіології добову дозу вводять у 3-4 прийоми з інтервалом 6-8 год., тривалість лікування - 7-10 днів (не повинна перевищувати 14 днів); для в/м введення розчиняють у воді для ін'єкцій, 0,9 % р-ні натрію хлориду або 0,25-0,5 % р-ні новокаїну із розрахунку 4 мл розчинника на 1 г препарату; р-н готують ex tempore; інтратрахеально дорослим вводять по 0,5-1 г у 5-7 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду або 0,5 % р-ну новокаїну 2-3 р/тижд.; для застосування у вигляді аерозолей дорослим вводять 0,5-1 г стрептоміцину, для такого введення ЛЗ розчиняють у 4-5 мл (при тепловолігій інгаляції - в 25-100 мл) 0,9% р-ну натрію хлориду; в/кавернозно вводять шляхом інсуфляції у вигляді дрібнодисперсного порошку або інстиляції 10 % р-ну (розчинник - 0,9 % р-н натрію хлориду) в умовах хірургічного стаціонару 1 р/добу в сумарній дозі не > 1 г незалежно від числа каверн та способу введення; у хворих на ГБ та ІХС лікування незалежно від шляху введення починають зі зменшених (до 0,25 г) доз, при добрій переносимості дози можуть бути збільшені до звичайних.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості, включаючи шкірне висипання (у т.ч. кропив'янка), гіперемія, свербіж, дерматит (у т.ч. ексфоліативний), лихоманку, біль у суглобах і м'язах, еозінофілію, набряк Квінке, анафілактичні р-ції, в т. ч. анафілактичний шок, блокада VIII пари черепних нервів та пов'язані з цим вестибулярні розлади (включаючи запаморочення, нудоту, блювання, нестійку ходу), порушення слуху (включаючи шум і дзвін у вухах, зниження слуху, глухоту); головний біль, периферичний неврит, неврит зорового нерва, амбліопія, поява скотоми, пригнічення нервово-м'язової передачі (включаючи утруднення дихання, апное, слабкість, сонливість, втрату свідомості), периферична полінейропатія, парестезії (включаючи парестезію обличчя) судомні скорочення м'язів, блокада нервово-м'язової провідності аж до зупинки дихання, особливо у хворих із нервово-м'язовими захворюваннями (міастенією), або в післяопераційному періоді на тлі залишкової дії недеполяризуючих м'язевих релаксантів, можливі порушення ф-цій нирок, включаючи протеїнурію, гематурію, азотемія, біль стискаючого характеру в ділянці серця, тахікардія, гіпотензія, діарея, можливі р-ції у місці введення, включаючи почервоніння, свербіж і біль, підвищена кровоточивість, апластична анемія, агранулоцитоз, панцитопенія, лейкопенія, тромбоцитопенія, гемолітична анемія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: захворювання слухового та вестибулярного апаратів, пов'язаних з невритом VIII пари черепних нервів і стан після перенесеного отоневриту; тяжкі форми серцево-судинної недостатності та ниркової недостатності; порушення мозкового кровообігу, облітеруючий ендартеріїт, гіперчутливість до стрептоміцину та/або інших аміноглікозидів; міастенія, ботулізм; вагітність та лактація; схильність до кровотеч; внутрішньокавернозне введення протипоказане при незарощенні плевральної порожнини у місці введення катетера та при прикореневій локалізації каверни.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	СТРЕПТОМІЦИН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	0,5г; 1г	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

17.3.2. Протитуберкульозні лікарські засоби II ряду

- **Канаміцин (Kanamycin) *** ^[ГМД] (див. п. 17.2.3. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Основна фармакотерапевтична дія: має бактерицидну дію по відношенню до МБТ, що активно розмножуються та розташовані позаклітинно, за рахунок пригнічення синтезу білка в мікробній клітині; активний також по відношенню до більшості Гр(-) м/о та деяких Гр (+) м/о.

Показання для застосування ЛЗ: туберкульоз легенів і туберкульозні ураження інших органів, спричинені м/о, резистентними до ПТП I та II ряду та чутливими до канаміцину. ^{ВООЗ, ГМД}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/м; для лікування туберкульозу ^{ВООЗ} призначають дорослим по 1 г 1 р/добу, дітям - 15 мг/кг 1 р/добу 6 днів на тиждень з перервою на 7-й день.

- **Амікацин (Amikacin) *** ^[ГМД] (див. п. 17.2.3. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Основна фармакотерапевтична дія: має бактерицидну дію по відношенню до МБТ, що активно розмножуються та розташовані позаклітинно, за рахунок пригнічення синтезу білка в мікробній клітині; активний також по відношенню до більшості Гр(-) м/о та деяких Гр (+) м/о.

Показання для застосування ЛЗ: інфекції, спричинені чутливими до амікацину штамми мікроорганізмів, резистентних до інших аміноглікозидів. ^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/м по 15 мг/кг маси тіла при щоденному прийомі і також 15 мг/кг маси тіла при інтермітуючому прийомі 2-3 /добу в комплексі з іншими ПТП (даний спосіб застосування ЛЗ відповідає останнім рекомендаціям ВООЗ (2005 р.)

- **Етіонамід (Ethionamide) *** ^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: J04AD03 - засоби, що впливають на мікобактерії. Протитуберкульозні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: тіамід ізоніотинової кислоти, чинить бактериостатичну дію відносно *Mycobacterium tuberculosis*, не впливає на інші м/о, за антибактеріальними властивостями близький до ізоніазиду, але менш активний, разом з тим діє на стійкі до ізоніазиду штами МБТ, пригнічує синтез пептидів МБТ, ріст і розмноження МБТ, діє на поза- і внутрішньоклітинно розташовані МБТ (у т. ч. рефрактерні та атипівні форми), активніший у кислому середовищі, етіонамід також підсилює фагоцитоз у вогнищі туберкульозного запалення, що сприяє його розсмоктуванню, у процесі лікування туберкулоостатична активність може знижуватися.

Показання для застосування ЛЗ: лікування туберкульозу (легеневий і позалегеневий) у випадку непереносимості або неефективності інших ПТП, завжди у складі комплексної туберкулоостатичної терапії. ^{ВООЗ, ГМД}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос під час їди; дорослим - початкова доза 250 мг 1-2 р/добу; залежно від терапевтичного ефекту дозу можна збільшити до МДД 1 г/добу; хворим старше 60 років і при масі тіла менше 50 кг - 250 мг 2 р/добу, МДД 500 мг/добу; дітям від 14 років призначати у добовій дозі з розрахунку 20-40 мг/кг вранці і увечері, але не більше 750 мг/добу; препарат застосовувати завжди у комбінації з основними ПТП, якщо до них збережена чутливість МБТ, а також разом з циклосерином або піразинамідом.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперсалівація, металевий присмак у роті, анорексія, стоматит, нудота, блювання, втрата маси тіла, болі в епігастральній ділянці, діарея; присмак гіркоти у роті, підвищення білірубину, АЛТ, АСТ, гепатит з або без жовтяниці, головний біль, периферичний неврит, периферична нейропатія, неврит зорового нерва, диплопія, затуманення зору, запаморочення, слабкість, безсоння, сонливість, депресія, психоз, інші психічні порушення, ортостатична гіпотензія, тромбоцитопенія, пурпура, гіпоглікемія, гіпотиреоз, підвищення рівня ТТГ, гінекомастія, порушення менструального циклу - дисменорея, імпотенція, симптоми пелагри, дефіцит піридоксину (гіповітаміноз В₆), акне; можуть виникати ускладнення при лікуванні пацієнтів з ЦД, АР, включаючи шкірні висипання, кропив'янка, ексфоліативний дерматит, фотосенсибілізація.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до етіонаміду та інших компонентів препарату, виражені порушення функції печінки; ЦД, тяжкі порушення ф-ції травного тракту, епілепсія.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕТІОНАМІД ТАБЛЕТКИ, ЩО ДИСПЕРГУЮТЬСЯ 125 МГ / ETHIONAMIDE DISPERSIBLE TABLETS 125 MG	Маклеодс Фармасьютікалс Лімітед, Індія	табл., що дисперг. у стрип.	125мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕТОМІД	Маклеодс Фармасьютікалс Лімітед, Індія	табл., в/о у стрип.	250мг	№10x5, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Протіонамід (Protionamide) *** ^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: J04AD01 - засоби, що впливають на мікобактерії. Протитуберкульозні засоби. Похідні тіокарбаміду.

Основна фармакотерапевтична дія: резервний ПТП групи похідних тіокарбаміду, за хімічною структурою близький до ізоніазиду; препарат діє бактеріостатично, а в більш високих к-ціях бактерицидно на певні види мікобактерій; виявляє туберкулостатичну дію за рахунок блокування синтезу міколієвої кислоти в мікобактеріях; мінімальна пригнічувальна к-ція щодо МБТ становить 0,6 мг/л; для лікування туберкульозу протіонамід застосовують завжди в поєднанні з іншими ПТП, щоб попередити утворення резистентних мікобактерій.

Показання для застосування ЛЗ: лікування у складі комбінованої терапії з іншими ПТП будь-яких форм туберкульозу при неефективності терапії препаратами 1-го ряду^{ГМД}; застосовується також як альтернатива клофазиміну при лікуванні прокази.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування починають з дози 250 мг 1-2 р/день; доза може бути збільшена до 750 - 1000 мг/добу залежно від терапевтичного ефекту; МДД для дорослих - 1 г, для дітей віком від 14 років не повинна перевищувати 750 мг; у комбінації з ізоніазидом доза препарату може бути зменшена наполовину; добова доза для пацієнтів літнього віку (понад 60 р.) або для хворих із масою тіла < 50 кг не повинна перевищувати 750 мг; зазвичай призначають 250 мг 2 р/добу; курс лікування - 8 - 9 міс.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: випадки анемії, метгемоглобінемії, гіпопротромбінемії та гіпофібриногенемії, тромбоцитопенія, пурпура, можливі порушення з боку кісткового мозку, шкірні р-ції у вигляді висипань, гінекомастія (збільшення грудних залоз у чоловіків), дисменорея, аменорея та гіпотиреоз (дисфункція щитовидної залози), імпотенція, коливання рівня цукру в крові, розвиток гіпоглікемії у хворих на ЦД, порушення концентрації уваги, порушення психіки, психоз, сплутаність свідомості, збудження, депресія, тривожний стан, астенія; схильність до суїциду, запаморочення, головний біль; судомні напади, параксизмальні судоми; можливе виникнення полінейропатії з парестезією, м'язовою слабкістю та атаксією, порушення сну (безсоння або сонливість), периферична нейропатія, полінейропатія, альгодистрофія, неврит зорового нерва, параліч зорового нерва, затуманення зору, порушення зору, включаючи диплопію, шум у вухах, порушення слуху, кровохаркання, металевий або сірчаний присмак у роті, сухість у роті, слиновиділення, втрата апетиту, анорексія, нудота; блювання, печія, біль у животі, відчуття переповнення шлунка, діарея або запор, метеоризм, зростання рівня трансамінази, що знижується при припиненні прийому; виражені порушення функції печінки з ознаками гепатиту та жовтяниці, пелагроподібні р-ції, фотодерматит, тріщини шкіри в куточках губ, стоматит, вугрові висипання, хейліт, глосит, облісіння, артралгія, артрит, слабкість м'язів, уролітіаз, постуральна гіпотензія, тахікардія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до протіонаміду або до інших компонентів препарату; г. та хр. тяжкі захворювання печінки (зокрема, г. гепатит, цироз печінки); г. гастрит; виразкова хвороба шлунка і ДПК у ст. загострення; ерозивно-виразковий коліт; ЦД; хр.алкоголізм; порфірія, судоми, психози.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0.75 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ПРОТЕХ	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	250мг	№10x50, №10x100	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПРОТЕХ	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	250мг	№10x5	18,33	
II.	ПРОТІОНАМІД ТАБЛЕТКИ 250 МГ (PROTHIONAMIDE TABLETS 250 MG)	Люпін Лтд, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПРОТОМІД	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., в/о у стрип.	250мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Натрію аміносалицилат (Sodium aminosalicylate)** *^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: J04AA02 - протитуберкульозні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: має бактеріостатичну активність до МБТ, його комбінують з іншими ПТП (ізоніазид та інші препарати гідразиду ізонікотинової кислоти, циклосерин, канаміцин); комбінована терапія затримує розвиток звикання до препаратів та посилює дію ПТП; туберкулостатичний ефект обумовлений його конкурентними взаємовідносинами з параамінобензойною і пантотеновою кислотами і біотином, які є факторами росту мікобактерій; у великих дозах препарат чинить антитиреоїдальну дію.

Показання для застосування ЛЗ: активні прогресуючі форми туберкульозу, головним чином хр. фіброзно-кавернозного туберкульозу легень.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дітям із масою тіла від 10 до 40 кг - 200 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла на добу, дозу розподіляти на 3-4 прийоми; дітям з масою тіла > 40 кг та дорослим - 5 г 2 р/добу; при поганий переносимості препарату дозу зменшити; мінімальний курс лікування - 3-5 міс., при необхідності курс можна продовжити.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, запаморочення, печінкова енцефалопатія, у т.ч. сплутаність свідомості, сонливість, неврит зорового нерва, нейтропенія, лейкопенія, тромбоцитопенія, агранулоцитоз, порушення синтезу протромбіну, В₁₂-дефіцитна мегалобластна анемія, гемолітична анемія (у пацієнтів із дефіцитом глюкозо-6-фосфатдегідрогенази) з позитивною пробою Кумбса, р-ції підвищеної чутливості, включаючи підвищення т° тіла; бронхоспазм; астматичні явища; еозинофільний інфільтрат у легенях/еозинофільна пневмонія; с-м Леффлера, гіпотиреоз, перикардит, васкуліт, погіршення і втрата апетиту/анорексія, метеоризм, диспепсія, нудота, блювання, біль у ділянці шлунка/живота, діарея, запор, металевий присмак у роті, збільшення активності трансаміназ печінки, гіпербілірубінемія, поява болю та збільшення розміру печінки,

гепатоспленомегалія, жовтяниця, гепатит (у т.ч. числі летальний), : кристалурія, шкірні висипання, свербіж, дерматит, кропив'янка, пурпура, екзантема, енантема, ексфолювативний дерматит, артралгія, міалгія, гіпокаліємія, **Протипоказання до застосування ЛЗ:** підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату, виражена патологія нирок (нефрит), печінки (гепатит, цироз), амілоїдоз, виразкова хвороба, серцева декомпенсація, виражена гіпертрофія міокарда лівого шлуночка, гіпофункція щитовидної залози, мікседема.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 14 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НАТРІЮ АМІНОСАЛІЦИЛАТ	ПрАТ "Технолог", Україна	гран. к/р по 100г у пак. з доз. прист.	0,8г/1г	№1	69,82	
II.	ПАС	Вівімед Лабс Лтд., Індія	гран. к/р по 100г у пак. у компл. з мірн. ложк.	80г/100г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПАСК НАТРІЄВА СІЛЬ	АТ "Олайнфарм", Латвія	пор. д/орал. р-ну у пак.	5,52г	№25, №300	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Капреоміцин (Capreomycin)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: J04AB30 - протитуберкульозні засоби. А/б. Капреоміцин.

Основна фармакотерапевтична дія: інгібує синтез білка у бактеріальній клітині, чинить сильну бактеріостатичну дію; вибірково активний щодо МБТ, що локалізуються поза та усередині клітини; при монотерапії швидко спричиняє появу резистентних штамів, характеризується наявністю перехресної стійкості до канаміцину; спостерігається перехресна резистентність між капреоміцином і біоміцином, канаміцином, неоміцином.

Показання для застосування ЛЗ: комбіноване лікування туберкульозу легень, спричиненого чутливими до капреоміцину мікобактеріями у випадку неефективності або непереносимості препаратів I ряду ^{БНФ, ВООЗ, ПМД}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити в/м, ^{БНФ} глибоко, дорослим - 1 г 1 р/добу (не перевищувати дозу 20 мг/кг/добу) 60-120 днів, потім продовжувати лікування, вводячи по 1 г 2 -3 р/тижд ^{БНФ}, загальна тривалість лікування - від 12 до 24 міс.; для приготування р-ну необхідно вміст флакона розчинити у 2 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду або у воді д/ін'єкц.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: токсичний нефрит, ушкодження нирок з некрозом канальців, дизурія (збільшення/зменшення частоти сечовипускання або кількості сечі), ниркова недостатність, підвищення рівня азоту сечовини і креатиніну в сироватці крові, поява у сечі аномального осадку або формених елементів кров, незвична втомлюваність, слабкість, сонливість; ототоксичність - зниження слуху, у т. ч. необоротне, шум, дзвін, гудіння або відчуття «закладання» у вухах; вестибулотоксичність - порушення координації рухів, нестійкість ходи, запаморочення; нервово-м'язова блокада, нудота, блювання, анорексія, спрага, гепатотоксичність із порушенням функціональних показників печінки (особливо при захворюваннях печінки в анамнезі), підвищення рівня печінкових ферментів, білірубіну, зниження екскреції бромсульфалеїну без зміни сироваткових ферментів, р-ції гіперчутливості, включаючи шкірні висипи, кропив'янку, макулопапульозні висипи, свербіж, почервоніння шкіри, набряки, порушення серцевого ритму, лейкоцитоз, лейкопенія, еозинофілія, тромбоцитопенія, гіпокаліємія, гіпомагніємія, гіпокальціємія, біль, інфільтрація у місці введення, розвиток стерильних абсцесів або посилена кровоточивість у місці введення, міалгія, утруднення дихання, (внаслідок зниження тону дихальних м'язів); підвищення t° тіла (відзначалося при комплексній терапії).

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до капреоміцину.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КАПРЕОМІЦИН	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	134,20	

• **Циклосерин (Cycloserine)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: J04AB01 - засоби, що діють на мікобактерії. Антибіотики.

Основна фармакотерапевтична дія: має бактеріостатичну та бактерицидну дію залежно від к-ції препарату у місці запалення та чутливості м/о. Механізм дії полягає в інгібуванні синтезу клітинної стінки чутливих штамів Гр(+) і Гр(-) бактерій та *Mycobacterium tuberculosis*. Циклосерин використовувати у комбінації з іншими ПТП.

Показання для застосування ЛЗ: туберкульоз легень в активній формі, позалегенові форми туберкульозу (включаючи ураження нирок) за умови чутливості до циклосерину, після невідлого лікування основними препаратами (рифампіцином, ізоніазидом, стрептоміцином, етамбутолом ^{ПМД, ВООЗ, БНФ}); г. інфекції сечовивідних шляхів, спричинені чутливими штамми Гр (+) та Гр (-) бактерій, особливо видами *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Escherichia coli*, застосовувати тільки у разі неефективності звичайних засобів лікування та коли визначена чутливість м/о до даного препарату.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо ^{БНФ}, дорослі: звичайна доза - від 500 мг до 1000 мг/добу за кілька прийомів: початкова доза для дорослих 250 мг 2р/добу з 12-годинним інтервалом протягом 2 тижнів ^{БНФ}, МДД 1 г ^{БНФ}; діти віком від 5 років: звичайна доза від 10 мг/кг маси тіла/добу, розподілена на 2 прийоми ^{БНФ}, після цього її корегують залежно від к-ції препарату в плазмі крові та терапевтичного ефекту; бажана пікова концентрація в плазмі - 15 - 40 мг/мл, МДД 750 мг; пацієнти літнього віку: пацієнтам від 60 років, а також з масою тіла < 50 кг рекомендована доза 250 мг циклосерину 2р/добу; тривалість лікування залежить від перебігу захворювання, лабораторних, радіологічних даних та переносимості.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, запаморочення, парестезії, парез, гіперрефлексія, тремор, периферичні неврити, атаксія, великі та малі клонічні напади, судоми, кома, тривожність, підвищена дратівливість, нервозність, агресія, подразливість, порушення сну, сонливість, погіршення пам'яті, дезорієнтація, психоз, депресія, спроби суїциду, параноя, зміна характеру, відчуття страху, порушення мовлення, дизартрія, шум у вухах, психомоторне збудження, галюцинації, сплутаність свідомості, втрата свідомості, блювання, нудота, сухість у роті, втрата апетиту, біль у животі, підвищення рівня трансаміназ крові, гепатит, особливо у пацієнтів із захворюваннями печінки, шкірні висипи, свербіж, петехіально-папульозні висипи, фоточутливість, артралгія, міалгія, р-ції гіперчутливості/алергічні р-ції, анемія, фолієво- і В₁₂-дефіцитна анемія, сидеробластна анемія, підвищення t° тіла, зниження цукру в крові, загострення порфірії, випадки серцевих аритмій та раптового розвитку ХСН у пацієнтів, які отримували від 1 до 1,5 г циклосерину/добу.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до циклосерину або до інших компонентів препарату; органічні захворювання ЦНС; епілепсія, депресія, порушення психіки, виражені стани збудження або психозу, тяжка НН (КлКр < 250 мл/хв), схильність до судомних нападів, психічні захворювання в анамнезі, зловживання алкоголем, СН.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0.75 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЦИКЛОСЕРИН	ПрАТ "Технолог", Україна	капс. тверді у конт.	250мг	№60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦИКЛОСЕРИН	ПрАТ "Технолог", Україна	капс. тверді у бл.	250мг	№10x3	46,00	
II.	КОКСЕРИН	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	капс. у стрип. та бл.	250мг	№90, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ХЕЛПОСЕРИН	Хелп С.А., Греція	капс. у бл. та пл.	250мг	№10x5, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	Циклосерин капсули Ph. Int. 250 мг	Страйдс Шасун Лімітед, Індія	капс. тверді у бл.	250мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦИКЛОСЕРИН КАПСУЛИ Ф.США 125 МГ (CYCLOSERINE CAPSULES USP 125 MG)	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	капс. тверді у бл.	125мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Теризидон (Terizidone)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: J04AK03 - протитуберкульозні засоби. Інші протитуберкульозні препарати.

Основна фармакотерапевтична дія: препарат повністю блокує фермент, який перетворює аланін в аланіл-аланіндіпептид, основний компонент мікробної стінки МБТ; не існує перехресної резистентності з іншими ПТП, має виражені і широкі протимікробні властивості і значно впливає не тільки на штами, що спричиняють туберкульоз або інфекції сечового тракту, але й на штами, резистентні до інших відомих а/б, МІК (мінімальна інгібуюча к-ція) до чутливих штамів становить 4-130 мг/мл, чутливі до теризидону штами *Mycobacterium tuberculosis*, *Bacillus subtilis*, *Candida albicans*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Staphylococcus epidermis*, *Pasteurella multocida*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Shigella*, *Salmonella enteritidis*, *Staphylococcus aureus*, різні штами *Streptococcus*, включаючи *S. pyogenes* і рикетсії, що спричиняють тиф, паратиф, ендемічний висипний тиф.

Показання для застосування ЛЗ: легневий і позалегневий туберкульоз, включаючи туберкульоз нирок і сечостатевої системи (при резистентності МБТ до основних протитуберкульозних засобів і неефективності іншої протитуберкульозної терапії) [ПМД].

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі: 250 мг 3 р/добу; МДД не повинна перевищувати 15-20 мг/кг маси тіла; хворі старше 60 років з масою тіла < 60 кг приймають по 250 мг 2 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: судоми, сонливість, безсоння, головний біль, тремор, дизартрія, запаморочення, периферичний парез, гіперрефлексія, великі та малі напади клонічних судом та кома, сплутаність свідомості, що супроводжується втратою пам'яті, психоз, навіть зі спробами самогубства, зміна настрою, зміна поведінки, манія, депресія, підвищена дратівливість, агресивність, анемія, включаючи мегалобластну та сидеробластну анемію, порушення ф-ції печінки, підвищення рівня амінотрансфераз печінки, нудота, печія, діарея, особливо у пацієнтів із захворюваннями печінки, г. СН, загострення хр. СН у хворих, які приймали 1-1,5 г теризидону на добу.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до теризидону або до інших компонентів препарату; ниркова недостатність; епілепсія, психози, алкоголізм.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
--	-------------------	-----------------	---------------	-----------	----------------------	----------------	-----------------------------

I.	ТЕРИЗИДОН	ПрАТ "Технолог", Україна	капс. тверді у бл.	250мг	№10x1	704,60	
II.	ТЕРІЗ	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	капс. у стрип.	250мг	№10x10	6000,07	26,86/\$

Комбіновані препарати

- **Цефепім + Амікацин (Cefepime + Amikacin)** (див. п. 17.2.1.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

17.3.3. Фторхінолони

- **Офлоксацин (Ofloxacin)** * ^[ПМД] (див. п. 17.2.11. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: J01MA01 - протимікробні засоби для системного застосування. Фторхінолони.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний протимікробний засіб фторованого хінолону широкого спектра дії. У концентраціях, ідентичних з мінімальною пригнічувальною концентрацією (MIC) або в дещо вищих він чинить бактерицидну дію (шляхом пригнічення ДНК-гірази – ферменту, необхідного для реплікації та транскрипції бактеріальної ДНК), протимікробний спектр охоплює: Гр (-) і Гр (+) бактерії, чутливі до офлоксацину: Enterobacteriaceae (Escherichia coli, види Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Providencia, Salmonella, Serratia, Shigella, Yersinia), Pseudomonas spp, в тому числі Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Haemophilus ducreyi, Branhamella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Acinetobacter spp., Campylobacter spp., Gardnerella vaginalis, Helicobacter pylori, Pasteurella multocida, Vibrio spp, Brucella melitensis; стафілококи, в тому числі штами, що продукують пеніциліназу та деякі штами, резистентні до метициліну; також він має активність щодо Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum (при граничних значеннях MIC), Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae та деяких інших мікобактерій. Чутливість стрептококів групи А, В і С є граничною. Більшість анаеробів, за винятком Clostridium perfringens, є резистентними, неактивний щодо Treponema pallidum.

Показання для застосування ЛЗ: Інфекційно-запальні захворювання, спричинені чутливими до офлоксацину збудниками: загострення ХОЗЛ (включно із хр. бронхітом), негоспітальна пневмонія, неускладнений г. цистит, уретрит, г. пієлонефрит та ускладнені інфекції сечового тракту; простатит, епідидимоорхіт; ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин, запальні захворювання органів малого таза в комбінації з іншими АБЗ.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в по 200 мг 2р/добу, при тяжких або ускладнених інфекціях можна вводити у дозі 400 мг 2р/добу, час інфузії повинен становити не менше 30 хв на кожні 200 мг, індивідуальні дози застосовувати з рівними інтервалами; якщо КлКр - 50-20 мл/хв, доза повинна бути зменшена до 100-200 мг кожні 24 год, при КлКр < 20 мл/хв, у т.ч. для хворих, які перебувають на ГД або ПД, доза повинна становити 100 мг кожні 24 год, загальна тривалість лікування офлоксацином у парентеральній та р/ос формах не повинна перевищувати 2 міс; р/ос доза для дорослих може становити від 400 мг до 800 мг/добу; у пацієнтів з тяжкими порушеннями функції печінки (при цирозі печінки з асцитом) виведення офлоксацину може знижуватися, тому не рекомендується перевищувати МДД 400 мг.

- **Гатифлоксацин (Gatifloxacin)** ^[ПМД] (див. п. 17.2.11. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: J01M A16 - АБЗ для системного застосування. Фторхінолони.

Основна фармакотерапевтична дія: дії препарату пов'язаний з інгібуванням ДНК-гірази та топоізомерази IV, відноситься до 8-метоксифторхінолонів, активний проти широкого діапазону Гр (+) і Гр (-) м/о, тому він показаний для лікування захворювань, спричинених такими збудниками, до гатифлоксацину чутливі такі збудники, як мікобактерії туберкульозу, протибактеріальна дія забезпечується завдяки пригніченню ДНК-гірази та топоізомерази IV, ДНК-гіраза є важливим ферментом, що бере участь у редуплікації ДНК збудників, топоізомераза IV є ферментом, що відіграє провідну роль у розподілі хромосом при поділі бактеріальної клітини, ефективний відносно бактерій, резистентних до β-лактамних і макролідних а/б.

Показання для застосування ЛЗ: інфекційно-запальні процеси, спричинені чутливими до препарату м/о: інфекції дихальних шляхів (у т.ч. г. бронхіт, загострення хр. бронхіту, г. синусит, негоспітальна пневмонія); інфекції нирок і сечовидільної системи (у тому числі ускладнені інфекції сечовивідних шляхів, г. пієлонефрит, неускладнені інфекції сечовивідних шляхів (цистит)).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: доза препарату незалежно від ваги - 400мг/добу за один прийом; препарат застосовують як р/ос, так і в/в інфузії тривалістю 60 хв.

17.3.4. Комбіновані протитуберкульозні засоби

- **Рифампіцин + етамбутол + ізоніазид (Rifampicin + ethambutol + isoniazid)** *

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АКУРИТ-3	Люпін Лімітед, Індія	табл., в/о у бл.	150мг/275мг/75мг	№28x24	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РИФАМПІЦИН+ІЗОНІАЗИД+ЕТАМБУТОЛУ ГІДРОХЛОРИД	Люпін Лімітед, Індія	табл., в/о у бл.	150мг/275мг/75мг	№28x24	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Рифампіцин + ізоніазид + піразинамід + етамбутол (Rifampicin + isoniazid + pyrazinamide + ethambutol)** *

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АКУРИТ-4	Люпін Лімітед, Індія	табл., в/о у бл.	150мг/75мг/40 0мг/275мг	№28x24, №6x15	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	РИФАМПІЦИН 150 МГ/ ІЗОНІАЗИД 75 МГ / ПІРАЗИНАМІД 400 МГ / ЕТАМБУТОЛУ ГІДРОХЛОРИД 275 МГ	СВІЗЕРА ЛАБС ПРАЙВЕТ ЛІМІТЕД, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	150мг/75мг/40 0мг/275мг	№28x24	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	РИФАМПІЦИН+ІЗОНІАЗИД+ПІРАЗИНАМІД+ЕТАМБУТОЛУ ГІДРОХЛОРИД	Люпін Лімітед, Індія	табл., в/о у бл.	150мг/75мг/40 0мг/275мг	№28x24	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФОРЕКОКС ТРЕК	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., в/о у стрип. та бл.	150мг/75мг/40 0мг/275мг	№6x10, №28x24	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Натрію аміносалицилат + ізоніазид (Sodium aminosalicylate + isoniazid)**

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ПАС-ІЗО	ПрАТ "Технолог", Україна	гран. к/р по 100г у пак.	0,8г/0,0233г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Рифампіцин + ізоніазид (Rifampicin + isoniazide)**

Визначена добова доза (DDD): перорально - 150мг/75мг - 4 табл., перорально - 75мг/50мг - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	РИФАМПІЦИН 150 МГ/ ІЗОНІАЗИД 75 МГ	СВІЗЕРА ЛАБС ПРАЙВЕТ ЛІМІТЕД, Індія	табл. у бл.	150мг/75мг	№28x24	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	РИФАМПІЦИН 75 МГ ТА ІЗОНІАЗИД 50 МГ	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл. що дисперг. у стрип. та п/е пак.	75мг/50мг	№28x3, №100	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	РИФАМПІЦИН 75 МГ ТА ІЗОНІАЗИД 50 МГ	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл. що дисперг. у стрип.	75мг/50мг	№10x10	150,01	26,99/\$
	РИФАМПІЦИН/ІЗОНІАЗИД	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у пак. та бл.	150мг/75мг	№500; №84, №672	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	РИФАМПІЦИН/ІЗОНІАЗИД	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	150мг/75мг	№10x10	9,00	26,99/\$
	РИФАМПІЦИН/ІЗОНІАЗИД	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у пак. в конт.	150мг/75мг	№1000	9,00	26,99/\$

17.4. Протигрибкові засоби

Грибкові захворювання (мікози) поділяють на *поверхові* та *системні*. До поверхових відносять висівкоподібний лишай, обумовлені дерматоміцетами мікози шкіри та її придатків (епідермофітія, трихофітія та мікроспорія), кандидоз слизових оболонок та шкіри, а також деякі інші інфекції, які зустрічаються рідше. Системні (інвазивні) мікози частіше розвиваються у пацієнтів з імунodefіцитом й представлені опортуністичними системними захворюваннями, збудниками яких є дріжджові або міцеліальні (плісневі) гриби. Для ефективного лікування системних мікозів необхідне адекватне застосування протигрибкових засобів, корекція дефектів імунітету та усунення джерел інфекції, наприклад, контамінованих внутрішньосудинних катетерів. Класифікацію протигрибкових засобів див. у табл. 4.

Таблиця 17.3. Класифікація протигрибкових засобів

Хімічна група	ЛЗ
Полієни	Амфотерцин В, ністатин, натаміцин
Імідазоли	Кетоконазол, міконазол, клотримазол, ізоконазол, еконазол, біфоназол
Триазоли	Флуконазол, ітраконазол, вориконазол
Аліламіни	Тербінафін, нафтифін
Ехінокандини	Каспофунгін
ЛЗ інших груп	Гризеофульвін, аморолфін, циклопірокс

17.4.1. Полієнові антибіотики

Взаємодіють з ергостеролом клітинної мембрани грибів, викликаючи її пошкодження.

● **Амфотерицин В (Amphotericin B) ***

Фармакотерапевтична група: J02AA01 - протигрибкові засоби для системного застосування. Антибіотики.

Основна фармакотерапевтична дія: поліненасичений протигрибковий а/б широкого спектра дії, отриманий із *Streptomyces nodosus*; проявляє фунгістатичні або фунгіцидні властивості залежно від концентрації а/б та чутливості грибка; зв'язується з ергостеролом у клітинній мембрані грибка, пошкоджуючи останню, що зумовлює витікання клітинного вмісту та загибель грибової клітини; *in vitro* активний відносно багатьох грибових агентів - *Candida spp.*, *Cryptococcus neoformans*, *Aspergillus spp.*, *Mucor spp.*, *Sporothrix schenckii*, *Blastomyces dermatitidis*, *Coccidioides immitis*, *Histoplasma capsulatum*; має незначну активність або неактивний проти бактерій та вірусів.

Показання для застосування ЛЗ: лікування системних грибових інфекцій^{БНФ} у пацієнтів, резистентних до звичайної терапії амфотерицином В або при непереносимості останнього^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим: тяжкі системні інфекції - введення 5 мг/кг/добу не < 14 діб^{БНФ}, вводити в/в інфузійно зі швидкістю 2,5 мг/кг/год, початкову пробну дозу 1 мг ввести шляхом в/в інфузії протягом 15 хв^{БНФ}, розводити 5 % р-ном глюкози для ін'єкцій до к-ції 1 мг/мл; дітям: вводити у вигляді емульсії в к-ції 2 мг/мл після розведення 5 % р-ном глюкози для ін'єкцій, при введенні визначати рівень креатиніну в сироватці крові для моніторингу ренальної токсичності, корекцію дозування проводити після визначення індивідуальних особливостей клінічного стану пацієнта; МДД - 5 мг/кг^{БНФ}; без суттєвих ознак токсичності вводили протягом 11 місяців, при цьому сумарна курсова доза препарату становила 56,6 г; дітям від 5 міс.: в/в, дозування відповідає рекомендованим дозам для дорослих у перерахуванні на 1 кг маси тіла, МДД - 5 мг/кг^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гарячка (іноді супроводжується сильним ознобом, протягом 15-20 хв від початку вливання); нездужання, зменшення маси тіла, глухота, припливи, грипозні симптоми, мукозити, анорексія, нудота, блювання, діарея, диспепсія, епігастральний біль спазматичного характеру, відхилення показників функціональних печінкових тестів від норми, жовтяниця, гепатит, холангіт, холецистит, гепатомегалія, г.печінкова недостатність, геморагічний гастроентерит, мелена, запор, геморої, шлунково-кишкова кровотеча, ректальні розлади, сухість у роті, стоматит, виразковий стоматит, мукозити, метеоризм, холестаза, нормохромна анемія, нормоцитарна анемія, агранулоцитоз, порушення згортання крові, тромбоцитопенія, лейкопенія, еозинофілія, лейкоцитоз, гіпер/гіпомагніємія, гіперкаліємія, гіперглікемія, гіпер/гіпонатріємія, гіпер/гіпофосфатемія, збільшення рівня амілази крові, гіперволемія, гіпокальціємія, гіперхлоремія, гіпопротеїнемія, респіраторний алкалоз, розлади коагуляції, збільшення рівня протромбіну, гіпербілірубінемія, збільшення екскреції сечової кислоти, гіпоксія, підвищення показників АЛТ, АСТ, лужної фосфатази, ЛДГ, біль у місці ін'єкції при наявності чи відсутності флебіту або тромбофлебіту, генералізований біль, включаючи біль у м'язах і суглобах, рабдоміоліз, міастенія, головний біль, судоми, втрата слуху, тиніт, транзиторні явища шуму у вухах, периферична нейропатія, минуше запаморочення, диплопія, г. церебральні судинні розлади, енцефалопатія, екстрапірамідні розлади та інші неврологічні симптоми, депресія, лейкоенцефалопатія, галюцинації, парестезії, сонливість, епілепсія, тремор, вертиго, безсоння, вагінальна кровотеча, геморагічний цистит, гематурія, зниження та порушення ф-ції нирок, включаючи азотемію, підвищення креатиніну сироватки крові, гіпокаліємію, гіпостенурію, ацидоз, зумовлений ф-цією ниркових каналців, нефрокальциноз, ГНН, анурія, олігурія, імпотенція, анафілактоїдні та інші АР у вигляді висипань, зокрема плямисто-пухирчастого характеру, свербіж, еритема, екзофоліативний дерматит; зупинка серця, аритмії, включаючи фібриляцію шлуночків, СН, АГ/гіпотензія, шок, ІМ, біль у грудях, тахікардія, кардіомегалія, емболія легеневої артерії, задишка, бронхоспазм, свистяче дихання, шок, кровохаркання, тахіпноє, набряк легень некардіогенного походження, пневмоніт, пов'язаний з гіперчутливістю, ателектази, гіпервентиляція, гіпоксія, ДН, БА, гикавка, фарингіт, плеврит, сухість у носі, риніт, синусит, носова кровотеча, генералізований набряк, виразки шкіри, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, с-м Стівенса-Джонсона, алопеція, сухість шкіри, везикулобульозні висипання, пурпура, порушення пігментації шкіри, екхімози, петехії, кон'юнктивіт, сухість в очах, порушення гостроти зору або диплопія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: індивідуальна підвищена чутливість до амфотерицину В або до будь-якого з компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 35 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АМФОЛІП	Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед, Індія	сусп. д/р-ну д/інфуз. у скл. фл. по 2мл, 20мл	5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АМФОЛІП	Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед, Індія	сусп. д/р-ну д/інфуз. у скл. фл. по 10мл	5 мг/мл	№1	2264,79	26,96/\$

● **Ністатин (Nystatin) *** (див. п. 9.1.3.2. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: A07AA02 - протимікробні засоби, що застосовуються при кишкових інфекціях.

Основна фармакотерапевтична дія: фунгістатична дія, а у великих дозах - фунгіцидна дія; продукується актиноміцетом *Streptomyces noursei*, проявляє протигрибковий ефект, зв'язується зі стеринами клітинної

мембрани грибків, внаслідок чого мембрана стає нездатною функціонувати як селективний бар'єр, що призводить до втрати основних компонентів клітини, вибірково діє на патогенні дріжджоподібні грибки роду *Candida* та *Aspergillus*, стійкість у грибків роду *Candida* та інших чутливих видів розвивається повільно, неактивний відносно бактерій, актиноміцетів і вірусів, неефективний відносно *Trichomonas vaginalis* та *Gardnerella vaginalis* (*Haemophilus vaginalis*).

Показання для застосування ЛЗ: лікування захворювань травного тракту, викликаних грибками роду *Candida* (*Candida albicans*)^{БНФ^{БООЗ}}; супоз. ректальні: кандидоз нижніх відділів кишечника, профілактика грибкових уражень у до- та післяопераційний період при хірургічних втручаннях на нижніх відділах кишечника.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо дорослим по 500 000 ОД 3 - 4 р/добу^{БООЗ}; добова доза - 1,5 - 3,0 млн ОД; у тяжких випадках - до 4-6 млн ОД; дітям після 6 років (дози такі ж самі як для дорослих)^{БООЗ}; середня тривалість лікування 10 - 14 днів (залежно від тяжкості захворювання та чутливості до ЛЗ); при хр. рецидивуючих кандидозах проводять повторні курси терапії з перервами між ними 2 - 3 тижні; МДД для дітей віком від 6 років - 2 000 000 ОД; від 13 років - 4 000 000 ОД; у тяжких випадках - 6 000 000 ОД; супоз. рект.: дорослим та дітям віком від 13 років по 1 супоз. (500 000 ОД) 2 р/добу або по 1 супоз. (250 000 ОД) 4 р/добу; МДД - 1000000 ОД; тривалість застосування становить 10-14 днів; при необхідності курс повторити через 2-3 тижні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: присмак гіркоти в роті, диспептичні прояви, нудота, блювання, діарея, біль у животі, втрата апетиту, підвищення т^о тіла, озноб, р-ції гіперчутливості, в т.ч. свербіж, шкірний висип, кропив'янка, анафілактичні р-ції, наприклад, ангіоедема, в т.ч. набряк обличчя, бронхоспазм, с-м Стівенса-Джонсона, фотосенсибілізація, тахікардія, неспецифічні міалгії; можливий ризик поширення резистентних форм грибків, що потребує відміни препарату

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату; виразкова хвороба шлунка та ДПК.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1,5 млн ОД.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I. НІСТАТИН	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	500000 ОД	№20x1	3,53	
НІСТАТИН	ПАТ "Монфарм", Україна	супоз. рект. у стрип.	250000ОД, 500000ОД	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НІСТАТИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл., в/о у бл.	500000 ОД	№10x2	4,43	

• **Натаміцин (Natamycin)**

Фармакотерапевтична група: А07АА03 - засоби, які застосовуються при кишкових інфекціях. Антибіотики.

Основна фармакотерапевтична дія: фунгістатична дія; полієновий а/б широкого спектра дії, активний щодо патогенних грибків, включно з дріжджовими грибками та особливо *Candida albicans*; не має сенсibiliзуючої здатності; завдяки кишковорозчинній оболонці діє тільки в кишечнику.

Показання для застосування ЛЗ: грибкові захворювання кишечника.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: кандидоз кишечника: дорослим - 1 табл.(100 мг) 4 р/добу протягом 1 тижня; дітям старше 3 років - по 1 табл.(100 мг) 2 р/добу протягом 1 тижня.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота, діарея, р-ції гіперчутливості.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-яких компонентів препарату.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II. ПІМАФУЦИН®	Астеллас Фарма Юроп Б.В. (виробник готової лікарської форми, дозвіл на випуск серії)/Хаупт Фарма Берлін ГмБХ (первинна, вторинна упаковки), Нідерланди/Німеччина	табл. к/р у бан.	100мг	№20	відсутня у реєстрі ОБЦ	

17.4.2. Імідазоли

Порушують синтез ергостеролу клітинної мембрани грибів за рахунок інгібування 14 α -деметилази. Препарати для місцевого застосування – міконазол, ізоконазол, еконазол, біфоназол – не мають принципових відмінностей від клотримазолу (див. розділ «Дерматовенерологія. Лікарські засоби»).

17.4.3. Триазоли

Порушують синтез ергостеролу клітинної мембрани за рахунок інгібування 14 α -деметилази.

● **Флуконазол (Fluconazole)** * ** [окрім розчину]

Фармакотерапевтична група: J02AC01 - протигрибкові засоби для системного застосування. Похідні триазолу.

Основна фармакотерапевтична дія: фунгістатична дія; протигрибковий засіб класу триазолів; первинним механізмом його дії є пригнічення грибкового 14-альфа-ланостерол-деметилування, опосередкованого цитохромом P450, що є невід'ємним етапом біосинтезу грибкового ергостеролу, акумуляція 14-альфа-метил-стеролів корелює з подальшою втратою ергостеролу мембраною грибкової клітини та може відповідати за протигрибкову активність; є більш селективним до грибкових ферментів цитохрому P450, ніж до різних систем ферментів цитохрому P450; демонструє протигрибкову активність стосовно видів *Candida*, що зустрічаються найчастіше (включаючи *C. albicans*, *C. parapsilosis*, *C. tropicalis*), *C. glabrata* демонструє широкий діапазон чутливості до флуконазолу, тоді як *C. krusei* є до нього резистентною; демонструє активність як проти *Cryptococcus neoformans* та *Cryptococcus gattii*, так і проти ендемічних пліснявих грибів *Blastomices dermatitidis*, *Coccidioides immitis*, *Histoplasma capsulatum* та *Paracoccidioides brasiliensis*.

Показання для застосування ЛЗ: лікування таких захворювань у дорослих, як: криптококовий менінгіт ^{БНФ}, кокцидіодоз ^{БНФ}, інвазивні кандидози ^{БНФ}, кандидози слизових оболонок, включаючи кандидоз ротоглотки та кандидоз стравоходу ^{БНФ}, кандидурія ^{БНФ}, хр. кандидоз шкіри і слизових оболонок; хр.атрофічний кандидоз ротової порожнини (кандидоз, спричинений використанням зубних протезів ^{БНФ}) при неефективності гігієни ротової порожнини або місцевої терапії; вагінальний кандидоз ^{БНФ}, г. чи рецидивний, коли місцева терапія не є доцільною; кандидозний баланіт ^{БНФ}, коли місцева терапія не є доцільною; дерматомікози ^{БНФ}, включаючи мікоз стоп, мікоз гладенької шкіри, паховий дерматомікоз, різнобарвний лишай та кандидозні інфекції шкіри, коли показано застосовувати системну терапію; дерматомікози ^{БНФ}, спричинені дріжджами та дерматофітами, а саме: епідермофітії стоп, трихофітії гладкої шкіри, пахові епідермофітії, різнобарвний лишай, інфекції, спричинені *Candida*; дерматофітний оніхомікоз, коли застосування інших ЛЗ не є доцільним; для профілактики таких захворювань у дорослих ^{БНФ}, як: рецидив криптококового менінгіту у пацієнтів з високим ризиком його розвитку; рецидив кандидозу ротоглотки або стравоходу у пацієнтів з ВІЛ з високим ризиком його розвитку; для зниження частоти рецидивів вагінального кандидозу ^{БНФ} (4 або більше випадки на рік); профілактика кандидозних інфекцій у пацієнтів із тривалою нейтропенією (пацієнтів зі злякисними захворюваннями крові, які отримують хіміотерапію або пацієнтів при трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин) ^{БНФ}; дітям для лікування кандидозів слизових оболонок ^{БНФ} (кандидоз ротоглотки, кандидоз стравоходу), інвазивних кандидозів, криптококового менінгіту та для профілактики кандидозних інфекцій у пацієнтів зі зниженим імунітетом ^{БНФ}; як підтримувальну терапію для попередження рецидиву криптококового менінгіту у дітей із високим ризиком його розвитку ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: криптококовий менінгіт: рекомендована навантажувальна доза 400 мг у 1-й день, підтримуюча доза - 200-400 мг/добу, при загрозі життю добова доза може досягати 800 мг ^{БНФ}; тривалість лікування залежить від клінічної картини, у випадку криптококового менінгіту не менш 6-8 тижнів; підтримуюча терапія для попередження рецидиву криптококового менінгіту у пацієнтів з високим ризиком його розвитку: рекомендована доза 200 мг/добу ^{БНФ} протягом необмеженого часу; кокцидіодоз: рекомендована доза - 200-400 мг/добу ^{БНФ}; тривалість лікування 11-24 міс. чи довше залежно від стану пацієнта; для лікування деяких форм інфекції, особливо менінгіту, може бути доцільна доза 800 мг/добу ^{БНФ}; інвазивні кандидози: навантажувальна доза - 800 мг у 1-й день, підтримуюча доза - 400 мг/добу, рекомендована тривалість лікування кандидемії - 2 тижні після перших негативних результатів культури крові та зникнення ознак і симптомів кандидемії; кандидоз ротоглотки: ^{БНФ} навантажувальна доза 200-400 мг ^{БНФ} у 1-й день, підтримуюча доза - 100-200 мг/добу ^{БНФ}, тривалість лікування становить 7-21 день (до досягнення ремісії), але може бути збільшена для пацієнтів із тяжким імунodefіцитом; кандидоз стравоходу: навантажувальна доза - 200-400 мг у 1-й день, підтримуюча доза - 100-200 мг/добу ^{БНФ}, тривалість лікування - 14-30 днів (до досягнення ремісії), але може бути збільшена для пацієнтів із тяжким імунodefіцитом; кандидурія: рекомендована доза - 200-400 мг/добу ^{БНФ} 7-21 день, для пацієнтів із тяжким імунodefіцитом тривалість лікування можна збільшити; хр.атрофічний кандидоз: рекомендована доза 50 мг/добу 14 днів; хр. кандидоз шкіри та слизових оболонок: рекомендована доза 50 ^{БНФ} -100 мг/добу, тривалість лікування - до 28 днів, але може бути збільшена залежно від тяжкості та виду інфекції або зниження імунітету; попередження рецидиву кандидозу слизових оболонок у пацієнтів з ВІЛ, які мають високий ризик його розвитку: ^{БНФ} кандидоз ротоглотки, кандидоз стравоходу: рекомендована доза 100-200 ^{БНФ} мг/добу або 200 мг 3 р/тижд., тривалість лікування необмежена; профілактика кандидозних інфекцій у пацієнтів із тривалою нейтропенією, рекомендована доза 200-400 мг; генітальні кандидози: 150 мг 1 р ^{БНФ} / 3 дні, всього 3 дози (1 день, 4 день та 7 день), після цього - підтримуюча доза 150 мг 1 р/тижд. 6 міс ^{БНФ}; дерматомікози: 150 мг 1 р/тижд., або 50 мг 1 р/добу 2-4 тижні ^{БНФ}, лікування мікозу стоп може тривати до 6 тижнів; різнобарвний лишай: 300 - 400 мг 1 р/тижд. 1 - 3 тижнів або 50 мг/добу 2 - 4 тижнів; дерматофітний оніхомікоз: 150 мг 1 р/тижд., лікування продовжувати доти, доки інфікований ніготь не буде змінено здоровим, зазвичай необхідно 3-6 міс. та 6-12 міс. на руках та великих пальцях ніг відповідно; діти від 12 років: застосування доз 100, 200 та 400 мг дорослим та доз 3, 6 та 12 мг/кг дітям призводить до досягнення співставної системної експозиції, підліткам (віком від 12 до 17 років), застосовувати звичайні дози для дорослих, діти віком від 5 до 11 р. - кандидози слизових оболонок: початкова доза - 6 мг/кг/добу, підтримуюча доза - 3 мг/кг/добу; початкову дозу можна застосовувати у 1-й день з метою швидшого досягнення рівноважної концентрації; інвазивні кандидози, криптококовий менінгіт: доза препарату - 6-12 мг/кг/добу залежно від ступеня тяжкості захворювання, підтримуюча терапія для попередження рецидиву криптококового менінгіту у дітей із високим ризиком його розвитку: доза - 6 мг/кг/добу залежно від ступеня тяжкості захворювання, кандидозів у пацієнтів з імунodefіцитом: доза препарату - 3-12 мг/кг/добу залежно від вираженості та тривалості індукованої нейтропенії.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анемія, агранулоцитоз, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія, анафілаксія, зниження апетиту, гіпертригліцеридемія, гіперхолестеринемія, гіпокаліємія,

безсоння, сонливість, головний біль, судоми, запаморочення, парестезії, порушення смаку, тремор, вертиго, пароксизмальна шлуночкова тахікардія типу «пірует», подовження інтервалу QT, біль у черевній порожнині, діарея, нудота, блювання, запор, диспепсія, метеоризм, сухість у роті, підвищення рівня АЛТ, АСТ, лужної фосфатази, холестази, жовтяниця, підвищення рівня білірубину, ПН, гепатоцелюлярний некроз, гепатити, гепатоцелюлярне ураження, висипання, свербіж, медикаментозний дерматит, кропив'янка, підвищене потовиділення, токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона, г. генералізований екзантематозний пустульоз, ексфолюативний дерматит, ангіоневротичний набряк, набряк обличчя, алопеція, міалгія, підвищена втомлюваність, нездужання, астенія, гарячка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до флуконазолу, інших азольних сполук або до будь-якої з допоміжних речовин препарату; одночасне застосування флуконазолу та терфенадину пацієнтам, які застосовують флуконазол багаторазово у дозах 400 мг/добу та вище (згідно з результатами дослідження взаємодії багаторазового застосування); одночасне застосування флуконазолу та інших ЛЗ, що подовжують інтервал QT та метаболізуються за допомогою ферменту CYP3A4 (цизаприду, астемізолу, пімозиду, хінідину, аміодарону та еритроміцину).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,2 г., парентерально - 0,2 г., місцево - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДИФЛЮЗОЛ®	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл. скл.	2 мг/мл	№1	37,07	
	ДИФЛЮЗОЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	капс. у бл.	50мг	№7x1	22,80	
	ДИФЛЮЗОЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	капс. у бл.	100мг	№7x1	17,09	
	ДИФЛЮЗОЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	капс. у бл.	150мг	№1x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДИФЛЮЗОЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	капс. у бл.	150мг	№2x1	37,07	
	ДИФЛЮЗОЛ®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	капс. у бл.	150мг	№1x1	42,00	
	ФЛУКОНАЗОЛ	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	50мг	№10x1	24,00	
	ФЛУКОНАЗОЛ	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	50мг	№10x100	8,32	
	ФЛУКОНАЗОЛ	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	100мг	№10x1	20,00	
	ФЛУКОНАЗОЛ	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	100мг	№10x100	7,36	
	ФЛУКОНАЗОЛ	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	150мг	№1x2	44,00	
	ФЛУКОНАЗОЛ	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	150мг	№2x1	44,00	
	ФЛУКОНАЗОЛ	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	150мг	№1x1	45,33	
	ФЛУКОНАЗОЛ	Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	0,2%	№1	91,20	
	ФЛУКОНАЗОЛ	Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	2мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФЛУКОНАЗОЛ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. у пл. по 50мл, 100мл в пач.	2 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФЛУКОНАЗОЛ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. у пл. по 200мл	2 мг/мл	№1	54,47	
	ФЛУКОНАЗОЛ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. у пл. по 100мл	2 мг/мл	№1	93,46	
	ФЛУКОНАЗОЛ	ТОВ "Юрія-Фарм", Україна	р-н д/інфуз. у пл. по 50мл	2 мг/мл	№1	97,60	
	ФЛУКОНАЗОЛ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	капс. у бл.	50мг; 150мг	№7; №3, №4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФЛУКОНАЗОЛ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	капс. у бл.	50мг	№10x1	14,40	
	ФЛУКОНАЗОЛ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	капс. у бл.	100мг	№10x1	12,00	
	ФЛУКОНАЗОЛ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	капс. у бл.	150мг	№1x2	24,00	
ФЛУКОНАЗОЛ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	капс. у бл.	150мг	№1x1	29,33		
ФЛУКОНАЗОЛ -ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	капс. у конт. чар/уп.	50мг	№10x1	12,87		
ФЛУКОНАЗОЛ -ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	капс. у конт. чар/уп.	100мг	№10x1	11,08		
ФЛУКОНАЗОЛ	ПрАТ "Фармацевтична фірма	капс. у конт.	150мг	№1x3	21,22		

-ДАРНИЦЯ	"Дарниця", Україна	чар/уп.				
ФЛУКОНАЗОЛ -ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	капс. у конт. чар/уп.	150мг	№1х2	22,09	
ФЛУКОНАЗОЛ -ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	капс. у конт. чар/уп.	150мг	№1х1	25,89	
ФЛУКОНАЗОЛ -ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/інфуз. у фл. по 100мл	2 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ФЛУКОНАЗОЛ -ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/інфуз. у фл. по 100мл в пач.	2 мг/мл	№1	112,44	
ФЛУКОНАЗОЛ -ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	капс. тверді у бл.	50мг, 100мг, 150мг	№7х1, №1х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ФЛУКОНАЗОЛ -ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	капс. тверді у бл.	50мг	№10х1	37,09	
ФЛУКОНАЗОЛ -ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	капс. тверді у бл.	100мг	№10х1	36,01	
ФЛУКОНАЗОЛ -ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	капс. тверді у бл.	150мг	№1х1	50,40	
ФЛУКОНАЗОЛ -ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	капс. тверді у бл.	150мг	№1х2	50,40	
ФЛУКОНАЗОЛ -ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	капс. тверді у бл.	150мг	№3х1	55,44	
ФЛУКОНАЗОЛ -ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	капс. тверді у бл.	200мг	№1х1, №3х1, №10х1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ФЛУКОНАЗОЛ -ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	капс. тверді у бл.	200мг	№7х1	37,86	
ФЛУКОНАЗОЛ -ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	капс. тверді у бл.	200мг	№4х1	41,13	
ФЛУКОНАЗОЛ -ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	капс. тверді у бл.	200мг	№2х1	44,21	
ФЛУКОНАЗОЛ -КР	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	капс. у бл.	100мг	№10х1	7,36	
ФЛУКОНАЗОЛ -КР	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	капс. у бл.	100мг	№7х1	8,11	
ФЛУКОНАЗОЛ -КР	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	капс. у бл.	150мг	№1х4	23,00	
ФЛУКОНАЗОЛ -КР	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	капс. у бл.	150мг	№1х2	24,00	
ФЛУКОНАЗОЛ -КР	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	капс. у бл.	150мг	№1х1	26,40	
ФЛУКОНАЗОЛ -КР	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	капс. у бл.	50мг	№10х1	7,73	
ФЛУКОНАЗОЛ -КР	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	капс. у бл.	50мг	№7х1	8,00	
II. ДИФЛАЗОН®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	капс. у бл.	50мг,	№7, №28;	відсутня у	

			100мг; 150мг	№1, №2, №4	реєстрі ОВЦ	
ДИФЛАЗОН®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	р-н д/інфуз. у фл. по 100мл	2 мг/мл	№1	349,96	35,35/€
ДИФЛЮКАН®	Фарева Амбуаз, Франція	р-н д/інфуз. у фл. по 100мл	2 мг/мл	№1	610,90	26,56/\$
ДИФЛЮКАН®	Фарева Амбуаз, Франція	р-н д/інфуз. у фл. по 50мл	2 мг/мл	№1	956,20	26,56/\$
ДИФЛЮКАН®	Фарева Амбуаз, Франція	капс. у бл.	50мг	№7x1	336,34	26,56/\$
ДИФЛЮКАН®	Фарева Амбуаз, Франція	капс. у бл.	100мг	№10x1	228,42	26,56/\$
ДИФЛЮКАН®	Фарева Амбуаз, Франція	капс. у бл.	150мг5	№1x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ДІАФЛУ	СТРАЙДС ФАРМА САЙЕНС ЛІМІТЕД, Індія	капс. у бл.	50мг, 100мг, 150мг	№10x1, №1x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
МЕДОФЛЮКО Н	Медокемі ЛТД (Центральний Завод), Кіпр	капс. у бл.	50мг	№7x1	96,77	31,36/€
МЕДОФЛЮКО Н	Медокемі ЛТД (Центральний Завод), Кіпр	капс. у бл.	150мг	№1x1	171,43	31,36/€
МІКОМАКС® 150	ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка	капс. у бл.	150мг	№1, №3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ФЛУЗАМЕД	К.О. Ромфарм Компані С.Р.Л., Румунія	капс. тверді у бл.	150мг	№1x1, №1x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ФЛУКОААР В/В	Євролайф Хелткеар Пвт. Лтд., Індія	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	200мг/100м л	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ФЛУКОНАЗОЛ	Євролайф Хелткеар Пвт. Лтд., Індія	р-н д/інфуз. по 100мл у конт.	200мг/100м л	№1	72,60	28,14/\$
ФЛУКОНАЗОЛ -ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина	капс. тверді у бл.	50мг, 100мг, 150мг, 200мг	№1, №4, №7, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ФЛУКОНАКС®	Ауробіндо Фарма Лімітед - Юніт ІІІ, Індія	капс. у бл.	50мг, 100мг, 150мг, 200мг	№1, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ФЛУНОЛ®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	капс. у бл.	50мг	№3x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ФЛУНОЛ®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	капс. у бл.	50мг	№7x1	100,89	21,80/\$
ФЛУНОЛ®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	капс. у бл.	150мг	№2x1	117,71	21,80/\$
ФЛУНОЛ®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	капс. у бл.	150мг	№1x1	127,88	21,80/\$
ФЛЮЗАК	ФДС Лімітед, Індія	табл. у бл.	50мг, 150мг, 200мг	№1, №2, №3, №4	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ФЛЮЗАК-50 ДТ	ФДС Лімітед, Індія	табл., що дисперг. у стрип.	50мг	№4, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ФЛЮКОРИК	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	капс. у бл.	150мг	№1x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ФУЦИС®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл. у бл.	50мг, 100мг, 200мг	№4x1, №10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ФУЦИС®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл. у бл.	50мг	№10x1	10,86	24,25/\$
ФУЦИС®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл. у бл.	100мг	№10x1	8,24	24,25/\$
ФУЦИС®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл. у бл.	150мг	№4x1	17,83	27,77/\$
ФУЦИС®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл. у бл.	150мг	№2x1	19,36	24,25/\$

ФУЦИС®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл. у бл.	150мг	№1x1	32,32	24,25/\$
ФУЦИС®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл. у бл.	200мг	№4x1	21,09	24,25/\$
ФУЦИС®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	гель у тубі по 30г	5 мг/г	№1	89,78	24,25/\$
ФУЦИС® ДТ	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл. що дисперг. у стрип.	50мг	№4x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ФУЦИС® ДТ	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл. що дисперг. у бл.	50мг	№4x1	29,99	27,77/\$

● **Ітраконазол (Itraconazole)**

Фармакотерапевтична група: J02AC02 - протигрибкові засоби для системного застосування. Похідні триазолу.

Основна фармакотерапевтична дія: протифунгіозна дія; похідний триазолу; пригнічує синтез ергостеролу у клітинах грибків, ергостерол є важливим компонентом клітинної мембрани грибка, пригнічення його синтезу забезпечує протигрибковий ефект, пригнічує ріст широкого спектра грибків, патогенних для людини у концентраціях зазвичай ≤ 1 мкг/мл: дерматофіти (*Trichophyton spp.*, *Microsporum spp.*, *Epidermophyton floccosum*); дріжджі (*Candida spp.*, включаючи *C. albicans*, *C. tropicalis*, *C. parapsilosis* та *C. krusei*, *Cryptococcus neoformans*, *Malassezia spp.*, *Trichosporon spp.*, *Geotrichum spp.*), *Aspergillus spp.*; *Histoplasma spp.*, включаючи *H. capsulatum*; *Paracoccidioides brasiliensis*; *Sporothrix schenckii*; *Fonsecaea spp.*; *Cladosporium spp.*; *Blastomyces dermatitidis*; *Coccidioides immitis*; *Pseudallescheria boydii*; *Penicillium marneffeii* та інші різновиди дріжджів та грибків; найменш чутливі види *Candida*: *Candida krusei*, *Candida glabrata* та *Candida tropicalis*, резистентні організми: *Rhizopus spp.*, *Rhizomucor spp.*, *Mucor spp.* та *Absidia spp.*, *Fusarium spp.*, *Scedosporium proliferans* та *Scopulariopsis spp.*

Показання для застосування ЛЗ: вульвовагінальний кандидоз; висівкоподібний лишай; дерматомікози ^{БНФ}, спричинені чутливими до ітраконазолу збудниками (*Trichophyton spp.*, *Microsporum spp.*, *Epidermophyton floccosum*): дерматомітія стоп, паховий дерматомікоз, дерматомітія тулуба, дерматомітія кистей рук; орофарингеальний кандидоз; оніхомікози ^{БНФ}, спричинені дерматофітами та/або дріжджами; гістоплазмоз; системні мікози ^{БНФ} (у випадках, коли протигрибкова терапія першої лінії не може бути застосована або в разі неефективності лікування іншими протигрибковими препаратами, що може бути зумовлено наявною патологією, нечутливістю патогена або токсичністю препарату): аспергіллез та кандидоз; криптококоз (включно з криптококовим менінгітом); лікування імуноослаблених пацієнтів з криптококозом та усіх пацієнтів з криптококозом ЦНС; підтримувальна терапія у пацієнтів із СНІДом з метою запобігання рецидиву наявної грибкової інфекції; для профілактики грибкової інфекції у пацієнтів із тривалою нейтропенією у випадках, коли стандартна терапія є недостатньою ^{БНФ}; лікування кандидозу порожнини рота і/або стравоходу у ВІЛ-позитивних хворих і пацієнтів з імунодефіцитом; профілактика системних грибкових інфекцій, чутливих до ітраконазолу, коли стандартна терапія неприйнятна, у пацієнтів зі злоскісними захворюваннями крові або у разі пересадки кісткового мозку з високою ймовірністю нейтропенії ^{БНФ} (<500 клітин/мкл).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н приймати натще, прополоскати рот р-ном і потім проковтнути його; кандидоз порожнини рота і/або стравоходу: 200 мг/добу (2 мірні чашки) в 1 або 2 прийоми 1 тижд., за відсутністю позитивного ефекту ч/з 1 тижд. лікування продовжувати ще 1 тижд ^{БНФ}; лікування кандидозу порожнини рота і/або стравоходу, при резистентності до флуконазолу: 200-400 мг/добу (2-4 мірні чашки) в 1-2 прийоми протягом 2 тижнів, за відсутністю позитивного ефекту ч/з 2 тижні лікування продовжувати ще 2 тижні ^{БНФ}; профілактика системних грибкових інфекцій: внутрішньо 5 мг/кг маси тіла/добу за 2 прийоми, прийом починають одразу перед лікуванням цитостатиками або за тиждень до пересадки кісткового мозку, прийом продовжують до відновлення числа нейтрофілів (не менше 1000 клітин/мкл); діти: безпечним є дозуванням 5 мг/кг 2 р/добу; вульвовагінальний кандидоз - 200 мг 2 р/добу (1 день) ^{БНФ}; висівкоподібний лишай - 200 мг 1 р/добу 7 днів; паховий дерматомікоз, дерматомітія тулуба - 200 мг 1 р/добу 7 дн. або 100 мг 1 р/добу 15 днів; дерматомітія кистей рук та ступнів - 100 мг/добу 30 днів ^{БНФ}; орофарингеальні кандидози - 100 мг 1 р/добу 15 днів; збільшити дозу до 200 мг 1 р/добу впродовж 15 днів у пацієнтів із нейтропенією або СНІДом через порушення абсорбції препарату в цих пацієнтів; оніхомікози ^{БНФ} (ураження нігтьових пластинок на пальцях ніг як з ураженням нігтів на руках, так і без нього) - 200 мг 1 р/добу 3 місяці ^{БНФ}; оптимальні клінічні та мікологічні ефекти досягаються через 1-4 тижні після закінчення лікування інфекцій шкіри, вульвовагінальних та орофарингеальних кандидозів, та через 6-9 місяців після завершення лікування інфекції нігтьових пластинок ^{БНФ}; аспергіллез: 200 мг 1-2 р/добу ^{БНФ}; кандидоз - 100-200 мг 1-2 р/добу; криптококоз (без ознак менінгіту) - 200 мг 1 р/добу; криптококовий менінгіт - 200 мг 2 р/добу ^{БНФ}; гістоплазмоз - 200 мг 1-2 р/добу; підтримувальне лікування пацієнтів із СНІДом - 200 мг 1 р/добу; профілактика у пацієнтів з нейтропенією - 200 мг 1 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: синусит, інфекції ВДШ, риніт, лейкопенія, гіперчутливість, сироваткова хвороба, ангіоневротичний набряк, анафілактичні реакції, гіпертригліцеридемія, головний біль, парестезія, гіпоестезія, дисгевзія, порушення зору (у т.ч. диплопія та помутніння зору), тимчасова чи стійка втрата слуху, шум у вухах, застійна СН, диспное, біль у животі, нудота; діарея, блювання, запор, диспепсія, метеоризм; панкреатит, порушення функцій печінки; тяжка гепатотоксичність (у т.ч. декілька випадків тяжкої г. печінкової недостатності з летальним наслідком), гіпербілірубінемія, кропив'янка, висипання, свербіж; токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона, г. генералізований екзантематозний пустульоз, мультиформна еритема, ексфолюативний дерматит, лейкоцитокластичний васкуліт, алопеція, світлочутливість, полакіурія, розлада менструального циклу; еректильна дисфункція, набряк, підвищення рівня креатинфосфокінази у крові, гранулоцитопенія, тромбоцитопенія, анафілактоїдні р-ції, гіперглікемія, гіперкаліємія, гіпомагніємія, сплутаність свідомості, периферична нейропатія, запаморочення, сонливість, тремор, СН, недостатність лівого шлуночка, тахікардія, АГ, артеріальна гіпотензія, набряк легенів, дисфонія, кашель, шлунково-кишкові розлади, печінкова недостатність, гепатит, жовтяниця, еритематозні висипання, гіпергідроз, міалгія, артралгія, порушення функцій нирок, нетримання сечі, генералізований набряк, набряк обличчя, біль у грудній клітці, гарячка, біль, втомленість, озноб, підвищення рівня АЛТ, підвищення рівня АСТ, підвищення рівня ЛФ, підвищення рівня

лактатдегідрогінази, підвищення рівня гамма-глутамілтрансферази, підвищення рівня печінкових ферментів, відхилення в результатах аналізу сечі.

Протипоказання до застосування ЛЗ: протипоказаний пацієнтам із відомою гіперчутливістю до діючої речовини або будь-якої з допоміжних речовин, одночасне застосування препарату та субстратів СYP3A4, пацієнтам зі шлуночковою дисфункцією, такою як застійна СН, або застійною СН в анамнезі, за винятком лікування інфекцій, що загрожують життю, не застосовувати під час вагітності, за винятком лікування станів, що загрожують життю вагітної, жінкам репродуктивного віку застосовувати ефективні методи контрацепції під час лікування, а також до кінця менструального циклу після закінчення лікування, протипоказане одночасне застосування з такими препаратами: терфенадин, астемізол, мізоластин, бепридил, фелодипін, лерканідипін, нісолдипін, цизаприд, домперидон, дизопірамід, дофетилід, дронедарон, хінідин, левацетилметадол (левометадил), метадон, пімозид, сертиндол, луразидон, тикагрелор, галофантрин, ізавуконазол, налоксегол, ломітапід, аванафіл, дапоксетин, еліглустат, іринотекан, івабрадин, ранолазин, еплеренон, інгібітори ГМГ-КоА-редуктази, що метаболізуються за участю СYP3A4, такі як симвастатин і ловастатин, пероральний мідазолам, триазолам та алкалоїди ріжків, такі як дигідроерготамін, ергометрин (ергоновін), ерготамін та метилергометрин (метилергоновін), нісолдипін, фезотеродин (у пацієнтів із нирковою недостатністю помірного або важкого ступеня або з печінковою недостатністю помірного або важкого ступеня), соліфенацин (у пацієнтів із нирковою недостатністю важкого ступеня або з печінковою недостатністю помірного або важкого ступеня), колхіцин (у пацієнтів із нирковою або печінковою недостатністю), телітроміцин (у пацієнтів із нирковою недостатністю важкого ступеня або з печінковою недостатністю важкого ступеня).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ІПРАКОН®	ПАТ "Фармак", Україна	капс. у бл.	100мг	№4x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІПРАКОН®	ПАТ "Фармак", Україна	капс. у бл.	100мг	№6x1	33,33	
	ІПРАКОН®	ПАТ "Фармак", Україна	капс. у бл.	100мг	№5x3	34,00	
	ІПРАКОНАЗОЛ	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМА ЛАЙФ", Україна	капс. у бл.	100мг	№4, №15, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СПОРАГАЛ	ТОВ "Фарма Старт", Україна	капс. у бл. в пач. та без	100мг	№10, №10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СПОРАГАЛ	ТОВ "Фарма Старт", Україна	капс. у бл.	100мг	№10x3	24,18	
II.	ЕСЗОЛ	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД., Індія	табл., в/о у бл.	100мг	№4x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕСЗОЛ	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД., Індія	табл., в/о у бл.	100мг	№10x1	29,51	23,98/\$
	ІТРУНГАР	Марксанс Фарма Лтд./Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Індія/Індія	капс. у бл.	100мг	№15x1	28,11	28,11/\$
	ІТРУНГАР	Марксанс Фарма Лтд./Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Індія/Індія	капс. у бл.	100мг	№4x1	30,95	28,14/\$
	КАНДІФОРС-100	РА ЧЕМ ФАРМА ЛІМІТЕД, Індія	капс. тверді у бл.	100мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОРУНГАЛ®	Янссен Фармацевтика НВ, Бельгія	р-н орал. у фл. по 150мл з дозат.	10 мг/мл	№1	190,68	24,65/\$
	ОРУНГАЛ®	Янссен-Сілаг С.п.А., Італія	капс. у бл.	100мг	№4x7	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОРУНГАЛ®	Янссен-Сілаг С.п.А., Італія	капс. у бл.	100мг	№5x3	112,24	24,25/\$
	СПОРАКСОЛ	Лабораторіос Ліконса, С.А., Іспанія	капс. у стрип.	100мг	№6x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СПОРАКСОЛ	Лабораторіос Ліконса, С.А., Іспанія	капс. у стрип.	100мг	№6x5	30,00	30,43/€
	СПОРАКСОЛ	Лабораторіос Ліконса, С.А., Іспанія	капс. у стрип.	100мг	№5x2	34,00	30,43/€
	ФУНІТ®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	капс. у бл.	100мг	№5x6, №15x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФУНІТ®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	капс. у бл.	100мг	№15x2	30,88	26,02/\$

ФУНІТ®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	капс. у бл.	100мг	№5x3	37,47	26,02/\$
ФУНІТ®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	капс. у бл.	100мг	№4x1	51,80	26,42/\$

● **Вориконазол (Voriconazole)**

Фармакотерапевтична група: J02AC03 - протигрибкові засоби для системного застосування. Похідні триазолу.

Основна фармакотерапевтична дія: антимікотична дія; є триазольною протигрибковою речовиною, первинний механізм дії полягає у пригніченні р-ції деметилування 14 α -ланостеролу, опосередкованої грибовим цитохромом P450, що є головною ланкою біосинтезу ергостеролу, кумуляція 14 α -метилстеролу корелює з подальшою втратою ергостеролу мембранами грибових клітин та може відповідати за протигрибкову активність; є більш селективним до грибових ферментів цитохрому P450, ніж до ферментних систем цитохрому P450; має широкий спектр антимікотичної активності проти видів *Candida*, а також фунгіцидної активності проти всіх досліджених видів *Aspergillus*, *Scedosporium* або *Fusarium*, які є малочутливими до існуючих протигрибових засобів; клінічна ефективність доведена щодо видів *Aspergillus*, включаючи *A. fumigatus*, *A. terreus*, *A. niger*, *A. nidulans*; видів *Candida*, включаючи *C. albicans*, *C. glabrata*, *C. krusei*, *C. parapsilosis*, *C. tropicalis* та *C. dubliniensis*, *C. inconspicua*, *C. guilliermondii*, видів *Scedosporium*, включаючи *S. apiospermum*, *S. Prolificans*, та видів *Fusarium*; поодинокі випадки часткової або повної ефективності проти *Alternaria*, *Blastomyces dermatitidis*, *Blastoschizomyces capitatus*, *Cladosporium*, *Coccidioides immitis*, *Conidiobolus coronatus*, *Cryptococcus neoformans*, *Exserohilum rostratum*, *Exophiala spinifera*, *Fonsecaea pedrosoi*, *Madurella mycetomatis*, *Paecilomyces lilacinus*, видами *Penicillium*, включаючи *P. marneffeii*, *Phialophora richardsiae*, *Scopulariopsis brevicaulis*, та видами *Trichosporon*, включаючи *T. Beigelii*, патогенні штами видів *Acremonium*, *Alternaria*, *Bipolaris*, *Cladophialophora*, *Histoplasma capsulatum*, *Curvularia* та *Sporothrix*.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика інвазивних грибових інфекцій при алогенній трансплантації кісткового мозку у пацієнтів з високим ризиком такого ускладнення; дорослим і дітям для лікування: інвазивного аспергілїозу ^{БНФ}; кандидемії, що не супроводжується нейтропенією; тяжких інвазивних інфекцій, спричинених Candida (включаючи C. krusei) ^{БНФ}, резистентних до флуконазолу; тяжких грибових інфекцій, спричинених видами Scedosporium і Fusarium ^{БНФ}; пацієнтам із прогресуючими інфекціями та інфекціями, що потенційно загрожують життю, препарат застосовувати у якості стартової терапії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити із максимальною швидкістю 3 мг/кг/год 1-3 год.; навантажувальні дози (перші 24 год лікування): p/os 400 мг 2 р/добу пацієнтам вагою 40 кг і більше, або 200 мг 2 р/добу пацієнтам вагою менше 40 кг ^{БНФ}; в/в - 6 мг/кг 2 р/добу ^{БНФ}; підтримуючі дози (через 24 год від початку лікування), в/в - 4 мг/кг 2 р/добу ^{БНФ}, p/os 200 мг 2 р/добу для пацієнтів вагою 40 кг і більше, або 100 мг 2 р/добу для пацієнтів вагою менше 40 кг ^{БНФ}; якщо пацієнти не здатні переносити в/в застосування в дозі 4 мг/кг 2 р/добу, зменшити дозу до 3 мг/кг 2 р/добу ^{БНФ}; якщо у пацієнта адекватна відповідь на лікування відсутня, підтримуючу дозу можна збільшити до 300 мг 2 р/добу p/os, пацієнтам із масою тіла менше 40 кг дозу можна збільшити до 150 мг 2 р/добу p/os ^{БНФ}; пацієнтам із непереносимістю застосування збільшених доз поступово зменшувати дозу на 50 мг до досягнення підтримуючої дози 200 мг 2р/добу p/os (чи 100 мг 2р/добу p/os пацієнтам із масою тіла менше, ніж 40 кг); діти віком 2-12 років та діти віком 12-14 років із масою тіла < 50 кг: навантажувальна доза (протягом перших 24 год.) - 9 мг/кг кожні 12 год в/в; p/os - не рекомендується, підтримуюча доза (після першої 24 год.) 8 мг/кг 2 р/добу в/в, p/os - 9 мг/кг 2р/добу (максимальна доза - 350 мг 2 р/добу), якщо відповідь на терапію недостатня, дозу можна збільшувати по 1 мг/кг, якщо пацієнт не переносить лікування, дозу знижувати по 1 мг/кг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: синусит, псевдомембранозний коліт, плоскоклітинна карцинома, агранулоцитоз, панцитопенія, тромбоцитопенія, лейкопенія, анемія, недостатність кісткового мозку, лімфаденопатія, еозинофілія, ДВЗ-с-м, гіперчутливість, анафілактоїдні р-ції, недостатність надниркових залоз, гіпотиреоз, периферичні набряки, гіпоглікемія, гіпокаліємія, гіпонатріємія, депресія, галюцинації, тривога, безсоння, ажитація, сплутаність свідомості, головний біль, судоми, синкопе, тремор, гіпертонія, парестезія, сонливість, запаморочення, набряк головного мозку, енцефалопатія, екстрапірамідні розлади, периферична невропатія, атаксія, гіпестезія, дисгевзія, печінкова енцефалопатія, с-м Гійєна-Барре, ністагм, погіршення зору, крововиливи в сітківку, розлади з боку зорового нерва, набряк диска зорового нерва, окулогірний криз, диплопія, склерит, блефарит, атрофія зорового нерва, помутніння рогівки, зниження слуху, вертиго, шум у вухах, надшлуночкова аритмія, тахікардія, брадикардія, фібриляція шлуночків, шлуночкова екстрасистолія, подовження інтервалу QT на електрокардіограмі, шлуночкова тахікардія типу «пірует», повна AV-блокада, блокада ніжки пучка Гіса, вузловий ритм, артеріальна гіпотензія, флебіт, тромбофлебіт, лімфангіт, утруднене дихання, г. респіраторний дистрес-с-м, набряк легенів, діарея, блювання, біль у животі, нудота, хейліт, диспепсія, запор, гінгівіт, перитоніт, панкреатит, набряк язика, дуоденіт, гастроентерит, глосит, відхилення від норми результатів печінкових проб, жовтяниця, холестатична жовтяниця, гепатит, ПН, гепатомегалія, холецистит, ЖКХ, висипання, ексфолиативний дерматит, алопеція, макулопапульозні висипання, свербіж, еритема, с-м Стівенса-Джонсона, фототоксичність, пурпура, кропив'янка, алергічний дерматит, папульозні висипання, макульозні висипання, екзема, токсичний епідермальний некроліз, медикаментозна р-ція з еозинофілією і системними проявами (DRESS), ангіоневротичний набряк, актинічний кератоз, псевдопорфірія, мультиформна еритема, псоріаз, токсидермія, шкірний червоний вовчак, веснянки, лентиго, біль у спині, артрит, періостит, ГНН, гематурія, некроз ниркових каналців, протеїнурія, нефрит, пірексія, біль у грудях, набряк обличчя, астенія, озноб, р-ція в місці введення, грипopodobні захворювання, підвищення рівня креатиніну в крові, підвищення рівня сечовини в крові, підвищення рівня холестерину в крові,

Противопоказання ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої допоміжної речовини препарату; одночасне застосування субстратів CYP3A4, терфенадину, астемізолу, цизапридом, пімозидом або хінідином, оскільки підвищення концентрацій цих ЛЗ у плазмі крові може призвести до подовження інтервалу QT, та зрідка - до розвитку шлуночкової тахікардії типу «пірует» (torsades de pointes); одночасне застосування із рифампіцином, карбамазепіном та фенобарбіталом, оскільки ці ЛЗ здатні суттєво знижувати концентрації вориконазолу у плазмі крові; одночасне застосування стандартних доз вориконазолу з ефавірензом у дозі 400 мг/добу або вище, оскільки застосування ефавірензу у таких дозах значно знижує концентрації вориконазолу у

плазмі крові; одночасне застосування з високими дозами ритонавіру (400 мг або вище 2 р/добу), оскільки застосування таких доз ритонавіру призводить до суттєвого зниження концентрації вориконазолу у плазмі крові; одночасне застосування з алкалоїдами ріжків (ерготамін, дигідроерготамін), які є субстратами СYP3A4, оскільки підвищення концентрацій цих ЛЗ у плазмі крові може призвести до ерготизму; одночасне застосування із сиролімумом, оскільки вориконазол може суттєво підвищувати концентрації сиролімуму у плазмі крові; одночасне застосування із препаратами звіробою.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,4 г., парентерально - 0,4 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ВІЗЕАЛОТ	ТОВ "Юрія-Фарм" (пакування з продукції in bulk виробника Анфарм Еллас С.А., Греція), Україна	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	200мг	№1	3640,00	
II.	ВІФЕНД	Р-Фарм Джермані ГмБХ (виробництво препарату in bulk, контроль якості при випуску, пакування, контроль якості (стабільність), випуск серії)/Пфайзер Італія С.р.л. (виробництво препарату in bulk, контроль якості при випуску, пакування, контроль якості (стабі, Німеччина/Італія	табл., вкриті п/о у бл.	200мг	№7x2	1610,56	25,16/\$
	ВІФЕНД	Р-Фарм Джермані ГмБХ (виробництво препарату in bulk, контроль якості при випуску, пакування, контроль якості (стабільність), випуск серії)/Пфайзер Італія С.р.л. (виробництво препарату in bulk, контроль якості при випуску, пакування, контроль якості (стабі, Німеччина/Італія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ВІФЕНД	Фарева Амбуаз (вторинне пакування, дослідження стабільності, випуск серії)/Патеон Менюфекчуринг Сервісез ЛЛС (виробництво, дослідження стабільності, контроль якості)/Фармація і Апджон Компані ЛЛС (виробництво, первинне пакування, контроль якості), Франція/США/США	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	200мг	№1	6063,24	25,26/\$
	ВОРИКАЗ	Гленмарк Фармасьютикалз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг, 200мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ВОРИКОНАЗОЛ - ВІСТА АС	Актавіс Італія С.п.А., Італія	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	200мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ВОРИКОНАЗОЛ АЛВОГЕН	ФАРМАТЕН С.А. (вторинне пакування, контроль серії, відповідає за випуск серії)/ФАРМАТЕН ІНТЕРНЕСНЛ СА (вторинне пакування, контроль серії)/Анфарм Еллас С.А. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії, відповідає за випуск серії, Греція/Греція/Греція	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	200мг	№1	8000,00	34,72/€
	ВОРИКОНАЗОЛ АЛВОГЕН	ФАРМАТЕН С.А. (первинне та вторинне пакування, контроль серії, відповідає за випуск серії)/ФАРМАТЕН ІНТЕРНЕСНЛ СА (виробництво "in bulk",	табл., вкриті п/о у бл.	50мг, 200мг	№14, №28, №30	відсутня у реєстрі ОВЦ	

	первинне та вторинне пакування, контроль серії, відповідає за випуск), Греція/Греція					
ВОРИКОНАЗОЛ АЛВОГЕН	ФАРМАТЕН С.А. (первинне та вторинне пакування, контроль серії, відповідає за випуск серії)/ФАРМАТЕН ІНТЕРНЕСНЛ СА (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії, відповідає за випуск), Греція/Греція	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10x3	735,94	34,72/€
ВОРИКОНАЗОЛ АЛВОГЕН	ФАРМАТЕН С.А. (первинне та вторинне пакування, контроль серії, відповідає за випуск серії)/ФАРМАТЕН ІНТЕРНЕСНЛ СА (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії, відповідає за випуск), Греція/Греція	табл., вкриті п/о у бл.	200мг	№7x2	434,86	34,72/€
ВОРИКОНАЗОЛ- ВІСТА	Сінтон Хіспанія, С.Л. (випуск серії)/Майлан Фармас'ютікелс Сп. з о.о. (виробництво, первинне і вторинне пакування)/Мефар Ілач Санаі А.С. (виробництво, первинне і вторинне пакування)/Джи І Фармас'ютікелс Лтд. (вторинне пакування), Іспанія/Польща/Туреччина/Болгарія	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	200мг	№1	3200,00	31,44/€
ВОРИКОНАЗОЛ- ВІСТА	Сінтон Хіспанія, С.Л. (випуск серії)/Фармацевтичний завод "Польфарма" С.А. (виробник, первинне та вторинне пакування)/Джи І Фармас'ютікелс Лтд. (первинне та вторинне пакування), Іспанія/Польща/Болгарія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10x1	1920,00	31,44/€
ВОРИКОНАЗОЛ- ВІСТА	Сінтон Хіспанія, С.Л. (виробник, первинне та вторинне пакування, випуск серії)/Фармацевтичний завод "Польфарма" С.А. (виробник, первинне та вторинне пакування)/Джи І Фармас'ютікелс Лтд. (первинне та вторинне пакування), Іспанія/Польща/Болгарія	табл., вкриті п/о у бл.	200мг	№10x1	720,00	31,44/€
ВОРИОЛ 200	МСН Лабораторіс Прайвіт Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	200мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ВОРИОЛ 50	МСН Лабораторіс Прайвіт Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ВОРИТАБ®-200	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	200мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ВОРИТАБ®-50	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
КАНДИВОР	Аспіро Фарма Лімітед, Індія	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	200мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
РИКОНРЕД	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Виробнича дільниця - II, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг, 200мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Посаконазол (Posaconazole)**

Фармакотерапевтична група: J02AC04 - протигрибкові засоби для системного застосування. Похідні триазолу.
Основна фармакотерапевтична дія: потужний інгібітор ферменту ланостеролу 14а-деметилази, що каталізує важливий етап біосинтезу ергостеролу, внаслідок цього посаконазол має широкий спектр протигрибкової активності проти дріжджових і пліснявих грибів, активний відносно таких м/о: гриби роду *Aspergillus* (*Aspergillus fumigatus*, *A. flavus*, *A. terreus*, *A. nidulans*, *A. niger*, *A. ustus*), гриби роду *Candida* (*Candida albicans*, *C. glabrata*, *C. krusei*, *C. parapsilosis*, *C. tropicalis*, *C. dubliniensis*, *C. famata*, *C. inconspicua*, *C. lipolytica*, *C. norvegensis*, *C.*

pseudotropicalis), Coccidioides immitis, Fonsecaea pedrosoi, а також відносно Fusarium, Rhizomucor, Mucor та Rhizopus.

Показання для застосування ЛЗ: лікування грибкових інфекцій у дорослих: інвазивний аспергіллез у пацієнтів із резистентністю до амфотерицину В^{БНФ} або ітраконазолу або у пацієнтів з непереносимістю цих ЛЗ; фузаріоз у пацієнтів із резистентністю до амфотерицину В або у пацієнтів з непереносимістю амфотерицину В; БНФ хромобластомікоз та міцетома у пацієнтів із резистентністю до ітраконазолу або у пацієнтів з непереносимістю ітраконазолу; кокцидіоїдомікоз у пацієнтів із резистентністю до амфотерицину В, ітраконазолу або флуконазолу або у пацієнтів з непереносимістю цих ЛЗ^{БНФ}; орофарингеальний кандидоз: як терапія першої лінії у пацієнтів зі зниженим імунітетом, з можливою низькою ефективністю препаратів місцевої дії^{БНФ}; для профілактики інвазивних грибкових інфекцій у таких пацієнтів: пацієнти, які отримують хіміотерапію для індукції ремісії при лікуванні г. мієлогенного лейкозу або мієлодиспластичного с-му, що може призвести до тривалої нейтропенії, та у яких високий ризик розвитку інвазивних грибкових інфекцій; реципієнти трансплантатів кровотворних стовбурових клітин, які отримують високі дози імунодепресантів для попередження р-ції «трансплантат проти хазяїна» та у яких високий ризик розвитку інвазивних грибкових інфекцій; профілактика інвазивних грибкових інфекцій, спричинених дріжджовими або пліснявими грибами, у дорослих і дітей віком від 13 років, які мають підвищений ризик розвитку таких інфекцій (пацієнти з тривалою нейтропенією або реципієнти трансплантатів кровотворних стовбурових клітин).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати дорослим та дітям віком від 13 років внутрішньо під час їди або з 240 мл рідких нутрицевтиків (ентеральне харчування); резистентні інвазивні грибкові інфекції/пацієнти з непереносимістю інших ЛЗ^{БНФ}: 200 мг (5 мл) 4 р/день, крім того, пацієнти, які можуть вживати їжу або рідкі нутрицевтики, можуть приймати 400 мг (10 мл) 2 р/день^{БНФ} під час їди або прийому рідких нутрицевтиків чи безпосередньо після цього; тривалість терапії залежить від тяжкості перебігу основного захворювання, періоду відновлення після імуносупресивної терапії та клінічної відповіді на лікування; орофарингеальний кандидоз: 200 мг (5 мл) 1 р/добу у перший день лікування, потім по 100 мг (2,5 мл) 1 р/добу протягом 13 днів^{БНФ}; приймати під час або безпосередньо після їди або прийому рідких нутрицевтиків (для пацієнтів, які не переносять їжу) для підвищення пероральної абсорбції та забезпечення адекватного впливу; профілактика інвазивних грибкових інфекцій: 200 мг (5 мл) 3 р/добу^{БНФ}; приймати під час або безпосередньо після їди або прийому рідких нутрицевтиків (для пацієнтів, які не переносять їжу) для підвищення пероральної абсорбції та забезпечення адекватного впливу; тривалість терапії визначають, виходячи з успішності лікування нейтропенії або відновлення мунітету; для пацієнтів з г. мієлогенним лейкозом або мієлодиспластичним с-мом профілактичне лікування починають за кілька днів до очікуваної нейтропенії і продовжують протягом 7 днів після збільшення числа нейтрофілів понад 500 клітин на 1 мм³.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нейтропенія, тромбоцитопенія, лейкопенія, анемія, еозинofilія, лімфаденопатія, інфаркт селезінки, гемолітико-уремічний с-м, тромботична тромбоцитопенічна пурпура, панцитопенія, коагулопатія, геморагії, недостатність надниркових залоз, зменшення рівня гонадотропіну, АР, р-ції гіперчутливості, дисбаланс електролітів, анорексія, зниження апетиту, гіпокаліємія, гіпомангіємія, гіперглікемія, гіпоглікемія, патологічні сні, психічні розлади, депресія сплутаність свідомості, порушення сну, сплутаність свідомості, парестезії, запаморочення, сонливість, головний біль, дисгезія, судоми, нейропатія, гіпестезія, тремор, афазія, безсоння, порушення мозкового кровообігу, енцефалопатія, периферична нейропатія, втрата свідомості, затуманення зору, фотофобія, зниження гостроти зору, диплопія, скотома, порушення слуху, с-м подовження інтервалу QT, зміна ЕКГ, відчуття серцебиття, брадикардія, надшлуночкова екстрасистолія, тахікардія, шлуночкова тахікардія torsade de pointes, шлуночкова тахікардія, дихально-серцева недостатність, СН, ІМ, раптова смерть, АГ, артеріальна гіпотензія, васкуліт, тромбоемболія легеневої артерії, тромбоз глибоких вен, кашель, носова кровотеча, закладеність носа, гикавка, плевральний біль, тахіпноє, легенева гіпертензія, інтерстиціальна пневмонія, пневмоніти, нудота, блювання, нудота, біль у животі, діарея, диспепсія, сухість у роті, метеоризм, запор, аноректальний дискомфорт, панкреатит, здуття живота, ентерит, епігастральний дискомфорт, відрижка, GERX, набряк рота, гастроінтестинальні кровотечі, кишкова непрохідність, підвищення рівнів функціональних проб печінки (АЛТ, АСТ, білірубину, лужної фосфатази, ГГТ), пошкодження гепатоцитів, гепатит, жовтяниця, гепатомегалія, холестаза, гепатотоксичність, порушення ф-цій печінки, печінкова недостатність, холестатичний гепатит, холестаза, гепатоспленомегалія, біль у ділянці печінки, астерикусис, висипання, свербіж, утворення виразок у роті, алопеція, дерматит, еритема, петехії, с-м Стівенса - Джонсона, везикулярні висипання, біль у спині, біль у кінцівках, біль в шиї, біль в кістково-м'язовій системі, біль в кінцівках, ГНН, НН, підвищення рівня креатиніну, нирковий каналцевий ацидоз, інтерстиціальний нефрит, порушення менструального циклу, біль у молочних залозах, підвищення t° тіла (лихоманка), слабкість, втома, набряк, біль, озноб, нездужання, дискомфорт в грудях, непереносимість ЛЗ, відчуття нервозності, запалення слизової оболонки, набряк язика та обличчя, зниження рівня фосфору в крові, патологічний рентген грудної клітки.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до посаконазолу або будь-якого іншого компонента препарату, одночасне застосування з: субстратами CYP3A4 - терфенадином, астемізолом, цизапридом, пімозидом або хінідином (оскільки підвищені плазмові концентрації цих ЛЗ можуть спричинити подовження інтервалу QT і розвиток двонаправленої веретеноподібної шлуночкової тахікардії (torsades de pointes); алкалоїдами ріжків (у зв'язку з ризиком підвищення концентрації алкалоїдів ріжків у плазмі крові та розвитку ерготизму); інгібіторами ГМГ-КоА-редуктази, симвастатином, ловастатином та аторвастатином.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	НОКСАФІЛ®	Патевон Інк. (виробник)	сусп. орал. у фл.	40 мг/мл	№1	1207,01	26,79/\$

	нерозфасованої продукції, первинне пакування)/Шерінг-Плау Лабо Н.В. (вторинне пакування, випуск серії)/СЕНЕКСІ НС-ЕРУВІЛЬ СЕНТ КЛЕР (вторинне пакування, випуск серії), Канада/Бельгія/Франція	по 105мл з мірн. ложк.				
--	--	------------------------	--	--	--	--

17.4.4. Інші антимікотичні лікарські засоби для системного застосування

• Каспофунгін (Caspofungin)

Фармакотерапевтична група: J02AX04 - протигрибкові засоби для системного застосування. Інші протигрибкові засоби для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: напівсинтетична ліпопептидна сполука (ехінокандин), синтезована з продукту ферментації *Glarea lozoyensis*; пригнічує синтез б-(1,3)-D-глюкану - найважливішого компонента клітинної стінки багатьох рифоміцетів і дріжджів; виявляє фунгіцидну активність проти різних патогенних грибів *Aspergillus* і *Candida* sp.

Показання для застосування ЛЗ: інвазивний кандидоз у дорослих та дітей ^{БНФ}, інвазивний аспергільоз у дорослих та дітей ^{БНФ} при рефрактерності або непереносимості до амфотерицину В, ліпідних форм амфотерицину В та/або ітраконазолу (рефрактерність визначена як прогресування інфекції або недостатнє покращання стану після як мінімум 7 днів проведення ефективної протигрибкової терапії у терапевтичних дозах); емпірична терапія при підозрі на грибові інфекції (*Candida* або *Aspergillus*) у дорослих та дітей з фебрильною нейтропенією ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в повільно інфузійно ^{БНФ}; дорослим пацієнтам у 1-й день ввести разову навантажувальну дозу 70 мг з подальшим щоденним введенням по 50 мг; для пацієнтів із масою тіла > 80 кг - у 1-й день - разову навантажувальну дозу 70 мг з подальшим щоденним введенням по 70 мг/добу ^{БНФ}; для дітей 12 міс. ^{БНФ} - 17 років дозування залежить від площі поверхні тіла, для всіх показань: у 1-й день разова навантажувальна доза - 70 мг/м² (МДД - 70 мг), з подальшим введенням 50 мг/м²/добу (МДД - 70 мг), якщо доза 50 мг/м²/добу переноситься добре, але не спостерігається достатньої клінічної відповіді, то добову дозу збільшити до 70 мг/м² (МДД - 70 мг) ^{БНФ}; ефективність та безпека застосування у новонароджених та немовлят у віці до 12 міс. вивчена недостатньо, може розглядатися для лікування новонароджених та немовлят (у віці до 3 міс.) у дозі 25 мг/м²/добу ^{БНФ}, та для лікування маленьких дітей (у віці від 3 ^{БНФ} до 11 міс.) у дозі 50 мг/м²/добу ^{БНФ}; тривалість емпіричної терапії залежить від клінічної відповіді пацієнта, лікування продовжувати протягом 72 год. після зникнення нейтропенії (абсолютна кількість нейтрофілів ≥ 500); пацієнтів із виявленою грибовою інфекцією лікувати мінімум 14 днів, і після зникнення нейтропенії та клінічних с-мів лікування продовжувати принаймні 7 днів; лікування інвазивного кандидозу продовжувати принаймні 14 днів після останнього позитивного результату аналізу культури; лікування інвазивного аспергільозу визначається індивідуально у кожному окремому випадку, але терапію продовжувати принаймні 7 днів після зникнення с-мів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: зниження рівня Нв, зменшення гематокриту, зменшення гематокриту, зменшення кількості лейкоцитів, анемія, тромбоцитопенія, коагулопатія, лейкопенія, збільшення кількості еозинофілів, зменшення кількості тромбоцитів, збільшення кількості тромбоцитів, зменшення кількості лімфоцитів, збільшення кількості лейкоцитів, зменшення кількості нейтрофілів, гіпокаліємія, затримка рідини, гіпомагніємія, анорексія, електролітний дисбаланс, гіперглікемія, гіпокальціємія, метаболічний ацидоз, тривожність, дезорієнтація, безсоння, головний біль, запаморочення, дисгевзія, парестезії, сонливість, тремор, гіпестезія, жовтушність склер, нечіткість зору, набряк повік, посилене слюзовиділення, пальпітація, тахікардія, аритмія, фібриляція передсердь, застійна СН, флебіт, тромбоз, припливи крові до обличчя, припливи крові, АГ, артеріальна гіпотензія, задишка, закладеність носа, фаринголарингеальний біль, тахіпное, бронхоспазм, кашель, нічна пароксизмальна задишка, гіпоксія, хрипи, свистяче дихання, нудота, діарея, блювання, абдомінальний біль, біль у верхній ділянці живота, сухість у роті, диспепсія, відчуття дискомфорту в шлунку, здуття живота, асцит, запор, дисфагія, метеоризм, підвищення показників функції печінки - АЛТ, АСТ, ЛФ крові, зв'язаного білірубину, білірубину крові, холестаза, гепатомегалія, гіпербілірубінемія, жовтяниця, порушення функції печінки, гепатотоксичність, захворювання печінки, підвищення рівня гамма-глутамілтрансферази, висипання, свербіж, еритема, гіпергідроз, мультиформна еритема, макулоярне висипання, макуло-папульозне висипання, сверблячий висип, кропив'янка, алергійний дерматит, генералізований свербіж, еритематозне висипання, генералізований висип, кореподібне висипання, ураження шкіри, токсичний епідермальний некроліз та с-м Стівенса-Джонсона, артралгія, біль у спині, біль у кінцівках, біль у кістках, м'язова слабкість, міалгія, ниркова недостатність, ГНН, підвищення t° тіла, озноб, свербіж у місці інфузії, біль, біль у місці введення катетера, слабкість, відчуття холоду, відчуття жару, еритема у місці інфузії, індурація у місці інфузії, біль у місці інфузії, припухлість у місці інфузії, флебіт у місці введення, периферичні набряки, болючість, дискомфорт у грудній клітці, біль у грудній клітці, набряк обличчя, відчуття зміни t° тіла, індурація, крововилив у місці інфузії, подразнення у місці інфузії, флебіт у місці інфузії, висипання у місці інфузії, кропив'янка у місці інфузії, еритема у місці введення, набряк у місці введення, біль у місці введення, припухлість у місці введення, недомагання, набряки, зниження рівня калію у крові, зниження рівня альбуміну в крові, підвищення рівня креатиніну у крові, позитивний аналіз сечі на кров, зниження рівня загального білка, білок у сечі, подовження протромбінового часу, скорочення протромбінового часу, зменшення рівня натрію у крові, збільшення рівня натрію у крові, зменшення рівня кальцію у крові, збільшення рівня кальцію у крові, зменшення рівня хлору в крові, збільшення рівня глюкози в крові, зменшення рівня магнію у крові, зменшення рівня фосфору в крові, збільшення рівня фосфору в крові, збільшення рівня сечовини крові, подовження активованого часткового тромбoplastинового часу, зменшення рівня бікарбонату крові, збільшення рівня хлору в крові, збільшення рівня калію у крові, підвищення АТ, зменшення рівня сечової кислоти у крові, кров у сечі, патологічні дихальні шуми, зменшення рівня вуглекислого газу, збільшення рівня імуносупресорних препаратів у крові, збільшення міжнародного нормалізованого співвідношення, циліндри у сечі, позитивний аналіз сечі на лейкоцити, підвищення рН сечі.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до каспофунгіну або до будь-якої допоміжної речовини препарату.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 50 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	КАНСИДАЗ®	Мерк Шарп і Доум Б.В. (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії)/Лабораторії Мерк Шарп і Доум Шибре (за повним циклом), Нідерланди/Франція	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	50мг	№1	9914,04	26,79/\$
	КАНСИДАЗ®	Мерк Шарп і Доум Б.В. (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії)/Лабораторії Мерк Шарп і Доум Шибре (за повним циклом), Нідерланди/Франція	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	70мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Мікафунгін (Micasungin)**

Фармакотерапевтична група: J02AX05 - антимікотичні засоби для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: неконкурентно інгібує синтез 1,3-β-D-глюкану, важливого компонента клітинної стінки грибів., у клітинах ссавців 1,3- β -D-глюкану немає, виявляє фунгіцидну активність відносно грибів роду *Candida* і чинить виражену фунгістатичну дію проти *Aspergillus spp.*, *in vitro* активний відносно різних видів *Candida spp.*, у т.ч. *Candida albicans*, *Candida glabrata*, *Candida tropicalis*, *Candida krusei*, *Candida kefyr*, *Candida parapsilosis*, *Candida guilliermondii*, *Candida lusitanae* та *Aspergillus spp.*, у т.ч. *Aspergillus fumigatus*, *Aspergillus flavus*, *Aspergillus niger*, *Aspergillus terreus*, *Aspergillus nidulans*, *Aspergillus versicolor*, а також диморфних грибів (*Histoplasma capsulatum*, *Blastomyces dermatitidis*, *Coccidioides immitis*). Препарат *in vitro* не активний проти *Cryptococcus spp.*, *Pseudallescheria spp.*, *Scedosporium spp.*, *Fusarium spp.*, *Trichosporon spp.* і зигоміцетів, імовірність розвитку вторинної резистентності до препарату є дуже низькою.

Показання для застосування ЛЗ: дорослі та діти віком від 16 років: лікування інвазивного кандидозу^{БНФ}; лікування кандидозу стравоходу^{БНФ} у пацієнтів, яким необхідна в/в антимікотична терапія; профілактика кандидозу^{БНФ} у пацієнтів, яким проводиться аlogenна трансплантація гематопоетичних стовбурових клітин або у яких прогнозується нейтропенія^{БНФ} (кількість нейтрофілів < 500 клітин/мкл) протягом 10 або > днів; діти (включаючи немовлят) віком до 16 років: лікування інвазивного кандидозу^{БНФ}; профілактика інфікування збудником *Candida* у пацієнтів, яким проводиться аlogenна трансплантація гематопоетичних стовбурових клітин або у яких прогнозується нейтропенія^{БНФ} (кількість нейтрофілів < 500 клітин на 1 мкл) протягом 10 або більше днів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі, діти віком від 16 р. та особи літнього віку- лікування інвазивного кандидозу: маса тіла > 40 кг -100 мг/добу, маса тіла < 40 кг - 2 мг/кг/добу^{БНФ}; лікування кандидозу стравоходу: маса тіла > 40 кг -150 мг/добу, маса тіла < 40 кг - 3 мг/кг/добу^{БНФ}; профілактика кандидозу: маса тіла > 40 кг - 50 мг/добу, маса тіла < 40 кг - 1 мг/кг/добу^{БНФ}; при відсутності позитивної клінічної динаміки або персистенції збудника доза може бути збільшена до 200 мг/добу для пацієнтів з масою тіла > 40 кг або до 4 мг/кг/добу для пацієнтів з масою тіла < 40 кг^{БНФ}; лікування кандидозу потрібно продовжувати мінімум 14 днів; при лікуванні кандидозу стравоходу варто застосовувати щонайменше протягом одного тижня після усунення клінічних симптомів; для профілактики грибкових інфекцій роду *Candida* застосовувати протягом 1 тижня після відновлення нормальної кількості нейтрофілів^{БНФ}; для дітей від ≥4 міс. до <16 р.: лікування інвазивного кандидозу: маса тіла > 40 кг -100 мг/добу, маса тіла < 40 кг - 2 мг/кг/добу^{БНФ}; профілактика кандидозу: маса тіла > 40 кг -50 мг/добу, маса тіла < 40 кг - 1 мг/кг/добу^{БНФ}; при відсутності позитивної клінічної динаміки або персистенції збудника доза може бути збільшена до 200 мг/добу для пацієнтів з масою тіла > 40 кг або до 4 мг/кг/добу для пацієнтів з масою тіла < 40 кг^{БНФ}; діти (включаючи новонароджених) віком до 4 міс.: лікування інвазивного кандидозу - 4-^{БНФ} 10 мг/кг/добу; профілактика кандидозу - 2 мг/кг/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: лейкопенія, нейтропенія, анемія, панцитопенія, тромбоцитопенія, еозинофілія, гіпоальбумінемія, гемолітична анемія, гемоліз, дисемінована внутрішньо-судинна коагуляція, анафілактичні/анафілактоїдні реакції, гіпергідроз, гіпокаліємія, гіпомagneмія, гіпокальціємія, гіпонатріємія, гіперкаліємія, гіпофосфатемія, анорексія, безсоння, тривожність, сплутаність свідомості, головний біль, сонливість, тремор, запаморочення, дисгевзія, тахікардія, відчуття серцебиття, брадикардія, флебіт, артеріальна гіпотензія, артеріальна гіпертензія, припливи крові, шок, задишка, нудота, блювання, діарея, біль у животі, диспепсія, запори, підвищення рівнів лужної фосфатази, АСТ, АЛТ, білірубину в сироватці крові (включаючи гіпербілірубінемію), зміна функціональних печінкових тестів, печінкова недостатність, підвищення рівня у-глутамілтрансферази, жовтяниця, холестаза, збільшення печінки, гепатит, гепатоцелюлярні ураження, включаючи летальні випадки, висипання, кропив'янка, свербіж, еритема, токсичні шкірні висипання, мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, підвищення рівня креатиніну, сечовини у сироватці крові, загострення ниркової недостатності, порушення ф-цій нирок, ГНН, гіпертермія, озноб, тромбоз у місці ін'єкції, запалення в місці інфузії, біль у місці ін'єкції, периферичний набряк, підвищений рівень лактатдегідрогенази у сироватці крові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активної речовини, до будь-якої з допоміжних речовин, до інших ехінокандинів.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	МІКАМІН	Астеллас ФармаТех Ко., Лтд, завод Такаока (виробник готової лікарської форми (всі стадії виробництва, фасування у первинну упаковку)/Астеллас Ірланд Ко. Лтд (пакувальник (вторинна упаковка), випускаючий контроль), Японія/Ірландія	пор. д/приг. р-ну д/інфуз. у фл.	50мг	№1	9957,30	32,00/€
	МІКАМІН	Астеллас ФармаТех Ко., Лтд, завод Такаока (виробник готової лікарської форми (всі стадії виробництва, фасування у первинну упаковку)/Астеллас Ірланд Ко. Лтд (пакувальник (вторинна упаковка), випускаючий контроль), Японія/Ірландія	пор. д/приг. р-ну д/інфуз. у фл.	100мг	№1	9957,30	32,00/€

• **Анідулафунгін (Anidulafungin)**

Фармакотерапевтична група: J02AX06 - противірусні засоби для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: напівсинтетичний ехінокандин, ліпопептид, синтезований при ферментації продуктів *Aspergillus nidulans*; вибірково пригнічує синтазу 1,3-β-D глюкану - важливого фермента грибової клітини, що відсутній у клітинах ссавців; це призводить до порушення формування 1,3-β-D-глюкану, основного компонента стінки грибової клітини; має фунгіцидну активність проти різних видів грибів роду *Candida* й активність у ділянках активного росту клітин гіфів гриба *Aspergillus fumigatus*.

Показання для застосування ЛЗ: інвазивний кандидоз^{БНФ} у дорослих пацієнтів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують в/в крапл.^{БНФ}; не повинен застосовуватись у вигляді болюсної ін'єкції; лікування розпочинають з разової навантажувальної дози в перший день – 200 мг з наступним введенням 100 мг/щодня^{БНФ}; тривалість лікування залежить від клінічної відповіді пацієнта на терапію, загалом противірусна терапія має бути продовжена протягом щонайменше 14 днів після отримання лабораторних результатів, що підтверджують відсутність грибів; перед застосуванням він має бути відновлений водою для ін'єкцій до концентрації 3,33 мг/мл і потім розведений до концентрації 0,77 мг/мл; недостатньо даних щодо застосування довше, ніж 35 днів із дозуванням у 100 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: коагулопатія, анафілактичний шок, анафілактична р-ція, гіпокаліємія, гіперглікемія, судоми, головний біль, артеріальна гіпотензія, АГ; патологічний рум'янець, припливи, бронхоспазм, диспное, діарея, нудота; блювання; біль у верхній частині живота, підвищення рівня АЛТ, підвищення рівня ЛФ крові, підвищення рівня АСТ, підвищення рівня білірубіну крові, холестази; підвищення рівня γ-глутамілтрансферази, висипання, свербіж; кропив'янка, кропив'янка, підвищення рівня креатиніну в крові, біль у місці введення препарату.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до активної речовини або до інших компонентів препарату та інших ЛЗ класу ехінокандинів.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕРАКСИС	Фармація і Апджон Компані ЛЛС, США	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	100мг	№1	10060,15	26,00/\$

17.5. Противірусні засоби

У комплексній терапії вірусних інфекцій, окрім противірусних засобів, застосовують імуномодулятори (див. розд. «ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ»).

17.5.1. Засоби, що застосовуються для профілактики та лікування грипу

Найефективнішим засобом профілактики грипу є вакцинація. З профілактичною та терапевтичною метою застосовують римантадин. При призначенні у перші 2 дні хвороби є ефективним для лікування грипу, викликаного усіма відомими штамми вірусу типу А, як противірусний засіб ефективним є озельтамівір.

• **Римантадин (Rimantadine) ****

Фармакотерапевтична група: J05AC02 - противірусні засоби для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: противірусна дія; ефективний по відношенню до різних вірусів грипу типу А, а також проявляє антитоксичну дію при грипі, спричиненому вірусом типу В; інгібує реплікацію вірусу на ранніх стадіях циклу за рахунок порушення формування вірусної оболонки; важливе значення у противірусній дії відносно вірусу грипу А має специфічний білок гену М2 віріона; римантадин інгібує реплікацію всіх трьох

виявлених у людини антигенних підтипів (H1N1, H2N2, H3N3) вірусу грипу; не впливає на імунотенні властивості інактивованої вакцини грипу А.

Показання для застосування ЛЗ: раннє лікування захворювання, викликаного вірусами грипу типу А у дорослих та дітей віком від 10 років (пор.- дітей від 1 року.), профілактика грипу типу А під час епідемії у дорослих і дітей віком від 10 років

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування: при грипі: дорослим та дітям віком від 10 років - по 100 мг 2 р/добу, пацієнтам похилого віку (понад 65 років) - 100 мг 1 р/добу, тривалість курсу лікування - 5 днів, профілактика грипу: дорослим та дітям віком від 10 років - по 100 мг 2 р/добу, пацієнтам похилого віку або з високим ризиком ускладнень - 100 мг 1 р/добу; прийом препарату розпочати на початку епідемії грипу та застосовувати під час епідемії, але не довше 2 тижнів; порошок: вміст пакетика розчинити у ½ склянки теплої води і приймати внутрішньо після їди; дітям від 1 до 10 років - по 5 мг/кг маси тіла на добу у 2-3 прийоми, але не > 100 мг/добу; дітям від 11 до 14 років - 140-160 мг/ добу за кілька прийомів; дітям від 14 років - дози для дорослих (застосовувати табл. у дозуванні 50 мг); тривалість курсу лікування – 5 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: диспепсія (нудота, блювання), біль у животі, діарея, порушення травлення, сухість у роті, анорексія, безсоння, порушення концентрації уваги, запаморочення, головний біль, підвищена втомлюваність, тремор, галюцинації, судороги, сплутаність свідомості, атаксія (порушення координації рухів), сонливість, підвищене збудження, депресія, ейфорія, гіперкінез (спонтанні рухи), зміна/втрата смаку, паросмія, серцебиття, СН, набряки, порушення провідності серця (блокади), тахікардія, артеріальна гіпертензія, церебросудинні розлади, синкопе, галакторея, шум/дзвін у вухах, кашель, диспноє (задишка), бронхоспазм, висип, свербіж, кропив'янка, блідість шкірних покривів, можливі р-ції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання, свербіж, кропив'янку, астенія (слабкість), загострення супутніх хр. захворювань, підвищення сечовипускання, сльозоточивість, озноб, запор, потовиділення, стоматит, гіпестезія, біль в очах.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до римантадину, похідних групи адамантану або допоміжних речовин ЛЗ, тяжкі порушення функції печінки та нирок, .г. та хр. захворювання печінки та нирок, тиреотоксикоз, фенілкетонурія, вагітність та годування груддю.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	РЕМАНТАДИН-КР	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	табл. у бл.	0,05г	№10x2	6,08	
	РИМАНТАДИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	50мг	№10x2	6,23	
II.	РЕМАВІР	АТ "Олайнфарм", Латвія	табл. у бл.	50мг	№10x2	відсутня у реєстрі OBLЦ	
	РЕМАВІР	АТ "Олайнфарм", Латвія	капс. у бл.	100мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі OBLЦ	
	РЕМАВІР 20 мг	АТ "Олайнфарм", Латвія	пор. доз. у пак. по 1г	20 мг/доза	№15	відсутня у реєстрі OBLЦ	

• **Озельтамівір (Oseltamivir)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: J05AH02 - протівірусні засоби для системного застосування. Протівірусні засоби прямої дії. Інгібітори нейрамінідази.

Основна фармакотерапевтична дія: протівірусна дія; пропрепарат активного метаболіту (озельтамівіру карбоксилату), який вибірково інгібує нейрамінідазу вірусів грипу; інгібує нейрамінідазу вірусів грипу типів А та В; пригнічує реплікацію вірусу та його патогенність *in vitro*; пригнічує реплікацію вірусів грипу типів А та В та його патогенність на моделях грипозної інфекції у тварин *in vivo* при антивірусній експозиції, що досягалася у людини при застосуванні дози 75 мг 2р/добу.

Показання для застосування ЛЗ: лікування грипу^{БНФ,ПМД} (тип А): для дорослих та дітей віком від 1 року^{БНФ}, у яких наявні симптоми грипу, під час циркуляції вірусу грипу; профілактика грипу^{БНФ,ПМД}: у дорослих та дітей віком старше 1 року^{БНФ} після контакту з особою з клінічно діагностованим грипом під час циркуляції вірусу грипу; у виняткових ситуаціях (у разі розбіжностей між циркулюючим вірусом грипу та вірусом грипу, проти якого проводилася вакцинація, та під час пандемії) сезонна профілактика може проводитись у осіб віком від 1 року; профілактика грипу у дітей до 1 року після контакту з особою з клінічно діагностованим грипом під час пандемії грипу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: капс. застосовують р/ос; дорослі, підлітки або діти (1 рік та старше), які не можуть проковтнути капс., можуть отримувати відповідні дози препарату у вигляді сусп.; дорослі та підлітки віком від 13 років: по 75 мг 2 р/добу р/ос 5 днів дорослим та підліткам (13-17 років) з масою тіла >40 кг^{БНФ}; лікування розпочинати у перший або другий день появи симптомів грипу; рекомендована доза для профілактики грипу після контакту з хворим на грип - 75 мг 1 р/добу р/ос 10 днів дорослим та підліткам (13-17 років) з масою тіла > 40 кг^{БНФ}; прийом розпочинати не пізніше ніж у перші 2 дні після контакту; рекомендована доза для профілактики під час сезонної епідемії грипу - 75 мг 1 р/добу 6 тижнів^{БНФ}; діти від 1 до 12 років: лікування рекомендованою дозою залежно від маси тіла протягом 5 днів: 10-15 кг -30 мг 2 р/добу, > 15 кг до 23 кг- 45 мг 2 р/добу, >23 кг до 40 кг - 60 мг 2 р/добу, > 40 кг - 75 мг 2 р/добу; рекомендована доза для профілактики після контакту з хворим на грип залежно від маси тіла протягом 10 днів: 10-15 кг - 30 мг 1 р/добу, > 15 кг до 23 кг- 45 мг 1 р/добу, > 23 кг до 40 кг- 60 мг 1 р/добу, > 40 кг-75 мг 1 р/добу^{БНФ}; лікування дітей до 1 року: 3 мг/кг 2 р/добу; профілактика дітей до 1 року:

рекомендована доза для профілактики грипу у дітей до 12 місяців під час пандемії грипу становить половину добової дози для лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: бронхіт, простий герпес, інфекції верхніх дихальних шляхів, назофарингіт, пневмонія, синусит; середній отит; тромбоцитопенія; р-ція гіперчутливості; анафілактичні та анафілактоїдні р-ції; ажитація, патологічна поведінка, тривожність, сплутаність свідомості, марення, делірій, галюцинації, нічні кошмари, самотравмування; головний біль; безсоння; порушення свідомості, судоми; порушення зору; серцеві аритмії; кашель, ринорея, біль у горлі; нудота; блювання, біль у животі (в тому числі у верхніх відділах), диспепсія; шлунково-кишкова кровотеча, геморагічний коліт; підвищення рівня печінкових ферментів; блискавичний гепатит, ПН, гепатит; дерматит (включаючи алергічний та атопічний дерматит), висипання, екзема, кропив'янка; ангіоневротичний набряк, мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз; алергія, набряк обличчя; запаморочення (включаючи вертиго), слабкість, біль, гіпертермія, біль у кінцівках, астма (включаючи загострення), носові кровотечі; біль у вухах; порушення з боку барабанної перетинки; кон'юнктивіт (включаючи почервоніння очей, виділення з очей та біль); лімфаденопатія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до озельтамівіру фосфату або до будь-якого компонента ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,15 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АЗЕЛЬТА	Біофарм Лтд, Польща	табл. у бл.	75мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОЗЕЛЬТАМІВІР	Страйдс Фарма Сайенс Лімітед, Індія	капс. у бл.	75мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РІНІВІР	ЗАТ Сантоніка, Литва	капс. у бл.	75мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СЕЛЬТАВІР	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	капс. тверді у бл.	30мг	№10x1	148,90	27,37/\$
	СЕЛЬТАВІР	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	капс. тверді у бл.	45мг	№10x1	114,77	27,37/\$
	СЕЛЬТАВІР	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	капс. тверді у бл.	75мг	№10x1	85,61	27,37/\$
	ТАМІФЛЮ®	Роттендорф Фарма ГмБХ (виробництво нерозфасованої продукції)/Ф.Хоффманн-ЛяРош Лтд (первинне та вторинне пакування, випробування контролю якості, випуск серії), Німеччина/Швейцарія	пор. д/орал. сусп. в пл. по 13г з адапт., дозат. та мірн. стак.	6 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТАМІФЛЮ®	Сенексі (виробництво нерозфасованої продукції)/Кетелент Джермані Шорндорф ГмБХ (виробництво нерозфасованої продукції, пакування)/Дельфарм Мілано, С.Р.Л. (виробництво нерозфасованої продукції, випробування контролю якості)/Рош Фарма АГ (випробування контро, Франція/Німеччина/Італія/Німеччина/Швейцарія	капс. у бл.	75мг	№10x1	80,00	26,32/\$
	ФЛУКАП	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	капс. у бл.	30мг	№10x1	150,00	27,96/\$
	ФЛУКАП	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	капс. у бл.	45мг	№10x1	106,67	27,96/\$
ФЛУКАП	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	капс. у бл.	75мг	№10x1	73,00	27,96/\$	

● **Занамівір (Zanamivir)** ^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: J05AH01 - протівірусні засоби для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: потужний і високоселективний інгібітор нейрамінідази, ферменту поверхні вірусу грипу; пригнічення цього ферменту як in vitro, так і in vivo призводить до порушення реплікації вірусів грипу А та В, при цьому діючи на всі відомі підтипи нейрамінідази вірусу грипу А; активність занамівіру є позаклітинною, зменшує поширення вірусів грипу А та В через пригнічення вивільнення віріонів грипу з епітеліальних клітин дихального тракту; реплікація вірусів грипу обмежена поверхнею епітелію дихального тракту.

Показання для застосування ЛЗ: лікування та профілактика грипу типів А і В у дорослих і дітей віком від 5 років ^{БНФ, ГМД}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначається лише у вигляді інгаляції через рот із застосуванням дискхалера; лікування грипу - рекомендовано 2 інгаляції (2 x 5 мг) 2 р/добу, добова інгаляційна доза 20 мг.

тривалість лікування - 5 днів^{БНФ}; для максимального позитивного ефекту лікування почати якнайшвидше (по можливості протягом 2 днів) з моменту появи симптомів; профілактика - рекомендовано 2 інгаляції по 5 мг 1 р/добу протягом 10 днів (добова інгаляційна доза - 10 мг)^{БНФ}; період застосування може бути збільшений до 1 міс. у разі збільшення періоду ризику понад 10 днів^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: г. бронхоспазм та/або серйозне зниження дихальної функції, р-ції алергічного типу, включаючи анафілактичні та анафілактоїдні р-ції, набряк ротоглотки та обличчя, бронхоспазм, утруднене дихання, почуття стиснення у горлі, висипання і кропив'янка, поліморфна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, судоми, психічні розлади, пригнічення свідомості, ненормальна поведінка, галюцинації, делірії, лихоманка та дегідратація, бронхоспазм, утруднене дихання, почуття стиснення у горлі, висипання, кропив'янка, тяжкі шкірні реакції, включаючи поліморфну еритему, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, судоми, психічні розлади, такі як пригнічення свідомості, аномальна поведінка, галюцинації, делірії.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого інгредієнта препарату.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	РЕЛЕНЦА	Глаксо Веллком Продакшн/ГлаксоСмітКляйн Австралія Пту Лтд, Франція/Австралія	пор. д/інгал. дозов. в ротадиску з чарунк. в кор.	5мг/доза	№5x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	

17.5.2. Засоби, що застосовуються для лікування герпетичних інфекцій

Герпетична інфекція характеризується довічною персистенцією вірусу, який активується при дії негативних факторів на організм людини; вона є поширеним опортуністичним захворюванням у ВІЛ-інфікованих пацієнтів. До герпесвірусів відносять ВПГ-1 і ВПГ-2 (1-го та 2-го типів), BVZ, ЦМВ, вірус Епштейна-Барра. Клінічно герпесвірусна інфекція проявляється: 1) локально: офтальмогерпесом, генітальним герпесом (ВПГ-2), герпесом шкіри й слизових оболонок; 2) генералізованою герпетичною інфекцією, енцефалітом.

Основні протигерпетичні засоби поділяють за спектром активності на ті, які: 1) діють переважно на ВПГ-1, ВПГ-2 та BVZ; 2) діють на ЦМВ.

17.5.2.1. Засоби, що застосовуються для лікування інфекцій, викликаних вірусами ВПГ і BVZ

Препарат вибору – *ацикловір*, але він не призводить до ерадикації вірусу і є ефективним переважно у продромальному періоді. *Валацикловір* та *фамцикловір* є проліками, які метаболізуються із утворенням відповідно ацикловіру і пенцикловіру та мають вищу біодоступність.

• Ацикловір (Aciclovir) *

Фармакотерапевтична група: J05AB01 - противірусні засоби для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: противірусна дія; синтетичний аналог пуринового нуклеозиду з інгібіторною активністю in vivo та in vitro відносно вірусу герпесу людини, що включає вірус простого герпесу I та II типу, вірус вітряної віспи та оперізувального герпесу, вірус Епштейна-Барра та ЦМВ; інгібіторна активність проти вищезазначених вірусів є високо селективною, результатом якої є припинення синтезу ланцюга вірусної ДНК; більшість клінічних випадків нечутливості пов'язані з дефіцитом вірусної тимідинкінази, однак існують повідомлення про ушкодження вірусної тимідинкінази та ДНК.

Показання для застосування ЛЗ: лікування вірусних інфекцій шкіри та слизових оболонок, спричинених вірусом простого герпесу, включаючи первинний та рецидивуючий генітальний герпес^{ВООЗ, БНФ}; супресія (профілактика рецидивів) інфекцій, спричинених вірусом простого герпесу у хворих з нормальним імунітетом^{БНФ}; лікування інфекцій, спричинених вірусом простого герпесу, у хворих з імунodefіцитом та тяжкого генітального герпесу у хворих без імунodefіциту^{БНФ}; профілактика інфекцій, спричинених вірусом простого герпесу, у хворих з імунodefіцитом^{БНФ}; лікування інфекцій, спричинених вірусом Varicella zoster (вітряна віспа та оперізувальний герпес)^{ВООЗ, БНФ}; герпетичного енцефаліту^{ВООЗ, БНФ}; інфекцій, спричинених вірусом простого герпесу у новонароджених^{БНФ} та немовлят до 3 міс.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: інфекції, спричинені вірусом простого герпесу - 200 мг 5 р/добу; курс лікування - 5 днів^{ВООЗ}, у разі тяжкої первинної інфекції курс може бути продовженим; для хворих зі зниженим імунітетом (після трансплантації кісткового мозку) чи для хворих зі зниженою засвоєністю у кишечнику доза може бути подвоєна до 400 мг^{ВООЗ/БНФ} або застосована відповідна доза для в/в введення; рецидивуючий герпес - починати лікування у продромальний період або після появи перших ознак ураження шкіри; запобігання рецидивам інфекцій, спричинених вірусом простого герпесу, у дорослих - табл. 200 мг 4 р/добу, для зручності більшість пацієнтів можуть приймати 400 мг 2 р/добу^{ВООЗ, БНФ}; лікування буде ефективним навіть після зменшення дози до 200 мг, які приймають 3 р/добу або 2 р/добу; у деяких хворих радикальне поліпшення спостерігається після прийому добової дози 800 мг; для спостереження за змінами природного перебігу захворювання терапія повинна періодично перериватися з інтервалом 6 - 12 міс.; для профілактики інфекцій, спричинених вірусом простого герпесу, у хворих зі зниженим імунітетом - 200 мг 4 р/добу^{ВООЗ, БНФ}; тривалість профілактичного застосування визначається тривалістю періоду ризику; лікування вітряної віспи та оперізувального герпесу у дорослих - 800 мг 5 р/добу^{ВООЗ, БНФ}; лікування повинно тривати 7 днів^{БНФ}; лікування починати після початку захворювання (після появи висипу); у хворих зі значним зниженням імунітету - 800 мг 4 р/добу^{ВООЗ}; лікування дорослих і дітей старше 12 років: інфекції, викликані вірусом Herpes simplex 5 мг/кг - кожні 8 год 5 днів^{БНФ}; герпетичний енцефаліт - 10 мг/кг кожні 8 год 10 днів^{БНФ}; інфекції, викликані вірусом Varicella zoster у хворих з порушеннями імунної системи - 10 мг/кг кожні 8 год 7-10 днів^{БНФ}; діти від 3 міс до 12 років: інфекції, викликані вірусом Herpes simplex - 250 мг/м2

кожні 8 год 5 днів^{БНФ}, герпетичний енцефаліт 500 мг/м2 кожні 8 год 10 днів^{ВООЗ}, інфекції, викликані вірусом *Varicella zoster* у хворих з порушеннями імунної системи 500 мг/м2 кожні 8 год 7-10 днів; для лікування та профілактики інфекцій, спричинених вірусом простого герпесу, у дітей зі зниженим імунітетом у віці 2 років та старших можуть застосовуватись такі ж дози, як для дорослих^{ВООЗ}; лікування інфекції, спричиненою вірусом простого герпесу, новонароджених та немовлят до 3 міс. - 20 мг/кг/маси тіла кожні 8 год протягом 21 днів при десимінованій формі та ураженні ЦНС або 14 днів при захворюванні, що обмежується шкірою та слизовими оболонками^{БНФ}; для лікування вітряної віспи у дітей від 6 років призначається 800 мг 4 р/добу^{БНФ}, діти від 2 до 6 років - 400 мг 4 р/добу^{БНФ}; дозування можна більш точно визначити з розрахунку 20 мг/кг (не більше 800 мг) 4 р/добу; тривалість лікування 5 днів; спеціальних даних щодо застосування для супресії інфекцій, спричинених вірусом простого герпесу, або для лікування інфекцій, спричинених вірусом оперізувального герпесу, у дітей з нормальним імунітетом немає; дози для новонароджених: 20 мг/кг кожні 8 год^{ВООЗ, БНФ}, при профілактиці та лікуванні інфекцій, спричинених вірусом простого герпесу, при тяжкій НН (КлКр < 10 мл/хв) рекомендується 200 мг 2 р/добу з інтервалом приблизно 12 год, при лікуванні інфекцій, спричинених вірусом *Varicella zoster* (вітряна віспа та оперізувальний герпес), для хворих зі значно зниженим імунітетом при тяжкій НН (КлКр < 10 мл/хв) рекомендується 800 мг 2 р/добу з приблизно 12-годинним інтервалом, а для хворих з помірною НН (КлКр в межах 10-25 мл/хв) - 800 мг 3 р/добу з інтервалом приблизно 8 год.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анемія, тромбоцитопенія, лейкопенія; анафілаксія, головний біль, запаморочення, збудженість, сплутаність свідомості, тремор, атаксія, дизартрія, галюцинації, психотичні симптоми, судоми, сонливість, енцефалопатія, кома, флебіт, задишка, нудота, блювання, діарея, біль у животі, оборотне підвищення рівня печінкових ферментів, оборотне підвищення рівня білірубину, жовтяниця, гепатит, свербіж, кропив'янка, висипання (включаючи світлочутливість), прискорене дифузне випадання волосся, ангіоневротичний набряк, збільшення рівня сечовини та креатиніну в крові, порушення фу-ції нирок, ГНН, біль у нирках, стомлюваність, гарячка, місцеві запальні р-ції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до ацикловіру, валацикловіру або до інших компонентів препарату в анамнезі.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 4 г., парентерально - 4 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АЦИКЛОВІР	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	табл. у бл.	0,2г	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЦИКЛОВІР	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	табл. у бл.	0,2г	№10x2	34,86	
	АЦИКЛОВІР-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	200мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЦИКЛОВІР-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	200мг	№10x2	40,00	
	АЦИКЛОВІР-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	200мг	№10x2	34,79	
	АЦИКЛОВІР-ФАРМАК	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	200мг	№10x2	30,00	
	ГЕРПЕВІР®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп.	250мг	№10x1	1092,00	
	ГЕРПЕВІР®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	200мг	№10x2	55,00	
	ГЕРПЕВІР®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	400мг	№10x1	55,00	
II.	АЦИК®	Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина	табл. у бл.	200мг	№5x5	178,24	27,19/\$
	АЦИК®	Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина	табл. у бл.	400мг	№5x7	131,86	27,19/\$
	АЦИКЛОВІР 200 СТАДА®	СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина	табл. у бл.	200мг	№25x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЦИКЛОВІР 200 СТАДА®	СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина	табл. у бл.	200мг	№5x5	91,65	31,74/€
	АЦИКЛОВІР 400 СТАДА®	СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина	табл. у бл.	400мг	№5x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЦИКЛОВІР 400 СТАДА®	СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина	табл. у бл.	400мг	№5x7	67,01	31,74/€
	АЦИКЛОВІР 800	СТАДА Арцнайміттель АГ,	табл. у бл.	800мг	№5x7	відсутня у	

СТАДА®	Німеччина					реєстрі ОБЦ
АЦИКЛОВІР-БЕЛМЕД	РУП "Белмедпрепарати", Республіка Білорусь	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	250мг, 500мг	№1		відсутня у реєстрі ОБЦ
ВІРОЛЕКС	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл. у бл.	200мг	№10x2		відсутня у реєстрі ОБЦ
ВІРОЛЕКС	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за контроль серії та випуск серії)/ГЛАКСОСМІТКЛЯЙН МАНУФАКЧУРИНГ С.П.А. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування), Словенія/Італія	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	250мг	№5	4887,8 1	35,35/€
ГЕВІРАН	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польща	табл., вкриті п/о у бл.	200мг, 400мг, 800мг	№10x3		відсутня у реєстрі ОБЦ
ЗОВІРАКС™	ГлаксоСмітКляйн Мануфактуринг С.п.А., Італія	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл. в конт. чар/уп.	250мг	№5x1	2192,7 0	27,20/\$
ЗОВІРАКС™	Глаксо Веллком С.А./ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А. (пакування та випуск серії), Іспанія/Польща	табл. у бл.	200мг	№5x5	96,44	28,17/\$
МЕДОВІР	Медокемі ЛТД (Ампульний Ін'єкційний Завод), Кіпр	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	250мг, 500мг	№10		відсутня у реєстрі ОБЦ
МЕДОВІР	Медокемі ЛТД (Центральний Завод)/Медокемі ЛТД (Завод AZ)/Медокемі (Фа Іст) ЛТД - Орал Фасіліті (виробник готового лікарського засобу, первинне та вторинне пакування), Кіпр/Кіпр/В'єтнам	табл. у бл.	400мг	№10x1	163,38	30,26/€
МЕДОВІР	Медокемі ЛТД (Центральний Завод)/Медокемі ЛТД (Завод AZ)/Медокемі (Фа Іст) ЛТД - Орал Фасіліті (виробник готового лікарського засобу, первинне та вторинне пакування), Кіпр/Кіпр/В'єтнам	табл. у бл.	800мг	№10x1	148,26	30,26/€

• **Валацикловір (Valaciclovir)**

Фармакотерапевтична група: J05AB11 - противірусні препарати прямої дії.

Основна фармакотерапевтична дія: противірусна дія; в організмі людини повністю перетворюється в ацикловір і валін за допомогою валацикловіргідролази; ацикловір є специфічним інгібітором вірусів герпесу з активністю *in vitro* проти вірусів простого герпесу I та II типу, вірусу *Varicella zoster*, ЦМВ, вірусу Епштейна-Барра та вірусу герпесу людини VI типу, інгібує синтез вірусної ДНК одразу після фосфорилування і перетворення в активну форму трифосфат ацикловіру; активація ацикловіру специфічним вірусним ферментом пояснює його селективність; процес фосфорилування ацикловіру (перетворення з моно- у трифосфат) здійснюється клітинними кіназами, ЛЗ конкурентно інгібує вірусну ДНК-полімеразу та інкорпорується у вірусну ДНК, що призводить до облігатного (повного) розриву ланцюга, припинення синтезу ДНК, і отже до блокування реплікації вірусу.

Показання для застосування ЛЗ: оперізуючий герпес (herpes zoster); інфекції шкіри та слизових оболонок, що спричинені вірусом простого герпесу, включаючи первинний та рецидивний генітальний герпес; лабіальний герпес (губна лихоманка); превентивне лікування (супресія) рецидивів інфекцій шкіри та слизових оболонок, що спричинені вірусом простого герпесу, включаючи генітальний герпес; профілактика ЦМВ інфекції та захворювання після трансплантації органів; зменшення ризику передачі вірусу генітального герпесу здоровому партнеру у якості супресивної терапії у комбінації з дотриманням правил безпечного сексу^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування оперізуючого герпесу - 1 г 3 р/добу протягом 7 днів^{БНФ}; лікування інфекцій, що спричинені вірусом простого герпесу - 0,5 г 2 р/добу; для рецидивних випадків лікування повинно тривати 3 - 5 днів^{БНФ}; при первинному перебігові, який може бути тяжким, лікування треба продовжити до 5 -10 днів; для лікування лабіального герпесу (губної лихоманки) ефективною дозою є 2 г 2 р/добу протягом 1 дня, друга доза повинна бути прийнята приблизно ч/з 12 год після першої дози^{БНФ} (термін лікування повинен бути не більше 1 дня); превентивне лікування рецидивів інфекції, що спричинені вірусом простого герпесу - хворим з нормальним імунітетом призначається 0,5 г 1 р/добу; хворим з імунodefіцитом призначається доза 0,5 г 2 р/добу^{БНФ}; зменшення передачі вірусу генітального герпесу - дорослим гетеросексуалам з нормальним імунітетом, які мають 9 або менше загострень на рік призначається інфікованому партнеру 0,5 г 1 р/добу^{БНФ}; профілактика ЦМВ інфекції та та захворювання після трансплантації органів: дорослим та діти від 12 років - 2,0 г 4 р/добу якомога

раніше після трансплантації: тривалість лікування 90 днів^{БНФ}, але може бути продовжена для пацієнтів з високим ступенем ризику.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, нудота, лейкопенія, тромбоцитопенія, анафілаксія, запаморочення, сплутаність свідомості, галюцинації, зниження розумових здібностей, збудження, тремор, атаксія, дизартрія, психотичні симптоми, судоми, енцефалопатія, кома, задишка, дискомфорт у животі, блювання, діарея, оборотне збільшення рівня печінкових функціональних тестів, висип, включаючи явища фотосенсибілізації, свербіж, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, порушення ф-ції нирок, ГНН, біль у нирках, гематурія (часто асоційована з іншими порушеннями ф-ції нирок), мікроангіопатична гемолітична анемія та тромбоцитопенія у тяжких хворих з імунодефіцитом, утворення преципітатів ацикловіру у каналцях нирок.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до валацикловіру, ацикловіру або до будь-якого компонента препарату.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ВАЛАВІР®	ПАТ "Фармак", Україна	табл., в/о у бл.	500мг	№10x1	117,00	
	ВАЛАВІР®	ПАТ "Фармак", Україна	табл., в/о у бл.	500мг	№6x7	83,57	
	ВАЛЬТРОВІР	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x5	56,63	
	ВАЛЬТРОВІР	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x1	80,40	
II.	ВАЛАЦИКЛОВІР-ГЕТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№5x2, №6x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАЛЦИК	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у бл.	500мг	№10x1	124,81	26,81/\$
	ВАЛЦИК	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у фл.	500мг	№42	96,50	26,81/\$
	ВАЛЬТРЕКС™	Глаксо Веллком С.А. (виробник нерозфасованого продукту)/ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А. (виробник для первинного та вторинного пакування та випуску серії), Іспанія/Польща	табл., в/о у бл.	500мг	№10x1, №6x7	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЕРПАЦИКВІР	Апотекс Інк., Канада	табл., вкриті п/о у бл.	500мг, 1000мг	№8x1, №3x7	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Фамцикловір (Famciclovir)**

Фармакотерапевтична група: J05AB09 - противірусні засоби прямої дії. Нуклеозиди та нуклеотиди.

Основна фармакотерапевтична дія: противірусна дія; пероральна форма пенцикловіру; швидко перетворюється in vivo в пенцикловір, який демонструє in vitro наявність противірусної активності відносно вірусів простого герпесу (типу 1 і 2), вірусу вітряної віспи, вірусу Епштейна-Барра та ЦМВ; у клітинах, які інфіковані вірусом, пенцикловір швидко та ефективно перетворюється в трифосфат (цей процес проходить опосередковано через вірусіндувану тимідинкіназу), цей трифосфат міститься в інфікованих клітинах понад 12 год та пригнічує реплікацію вірусної ДНК; у тимідинкіназдефіцитних штамів спостерігається перехресна резистентність і до пенцикловіру, і до ацикловіру; однак була показана активність пенцикловіру відносно нещодавно виділених ацикловіррезистентних штамів вірусу простого герпесу з ушкодженою ДНК-полімеразою; у хворих на імунодефіцит на фоні СНІДу виявлено, що фамцикловір у дозі 0,5 г 2 р/добу значно знижував величину співвідношення числа днів із проявами симптомів СНІДу до числа безсимптомних днів.

Показання для застосування ЛЗ: інфекції, спричинені вірусами Varicella zoster (VZV): оперізувальний лишай, включаючи оперізувальний лишай з очною локалізацією у імунокомпетентних дорослих пацієнтів^{БНФ}; оперізувальний лишай у дорослих пацієнтів з ослабленим імунітетом^{БНФ}; інфекції, спричинені вірусами Herpes simplex (HSV): лікування перших проявів та рецидивів генітального герпесу у імунокомпетентних дорослих пацієнтів; лікування рецидивів генітального герпесу у дорослих пацієнтів з ослабленим імунітетом; супресія рецидивуючого генітального герпесу в імунокомпетентних дорослих пацієнтів та у дорослих пацієнтів з ослабленим імунітетом^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: оперізувальний лишай у імунокомпетентних дорослих пацієнтів: 500 мг 3 р/добу 7 дн; оперізувальний лишай з очними ускладненнями - 500мг 3 р/добу 7 дн; оперізувальний лишай у дорослих пацієнтів з ослабленим імунітетом: 500 мг 3 р/добу 10 дн; генітальний герпес у імунокомпетентних дорослих пацієнтів, перший прояв генітального герпесу: 250 мг 3 р/добу 5 дн; рецидив генітального герпесу: 125 мг 2 р/добу 5 дн.; рецидив генітального герпесу у дорослих пацієнтів з ослабленим імунітетом: 500 мг 2 р/добу 7 дн.; супресія рецидивуючого генітального герпесу в імунокомпетентних дорослих пацієнтів: по 250 мг 2 р/добу (лікування потрібно припинити після 12 міс безперервної противірусної терапії, для того щоб переоцінити тяжкість рецидивів та їх частоту^{БНФ}, мінімальний період переоцінки повинен охоплювати 2 рецидиви, пацієнти, у яких зберігається значна вираженість хвороби, можуть поновити супресивну терапію); супресія рецидивуючого генітального герпесу у дорослих пацієнтів з ослабленим імунітетом: 500 мг 2 р/добу 7 дн^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тромбоцитопенія, сплутаність свідомості (переважно у пацієнтів літнього віку); галюцинації, запаморочення; сонливість, судоми, посилене серцебиття, нудота, блювання, біль у животі, діарея; панкреатит, змінені показники функціонального стану печінки; холестатична

жовтяниця, анафілактичний шок, анафілактичні р-ції, висипання, свербіж; ангіоневротичний набряк, набряк обличчя, повік, періорбітальний набряк, набряк гортані, кропив'янка; тяжкі шкірні р-ції (поліморфна еритема, с-м Стівенса - Джонсона, токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайєлла), некротизуючий васкуліт), ГНН.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до фамцикловіру чи інших компонентів препарату, гіперчутливість до пенцикловіру.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ВІРАКСА	Спеціфар СА, Греція	табл., вкриті п/о у бл.	125мг, 250мг, 500мг	№10, №14, №21	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФАМВІР®	Новартіс Фармасьютика С. А., Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	125мг, 250мг, 500мг	№10, №14, №21, №30, №56	відсутня у реєстрі ОБЦ	

17.5.2.2. Засоби, що застосовуються для лікування ЦМВ-інфекції

• Ганцикловір (Ganciclovir)

Фармакотерапевтична група: J05AB06 - протівірусні засоби для системного застосування. Нуклеозиди та нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази.

Основна фармакотерапевтична дія: протівірусна дія; синтетичний нуклеозидний аналог 2'-дезоксигуанозину, що пригнічує реплікацію вірусів герпесу як *in vitro*, так і *in vivo*; до препарату чутливі такі віруси людини, як цитомегаловірус (ЦМВ), віруси простого герпесу типів 1 і 2 (HSV-1 і HSV-2), вірус герпесу людини типу 6, 7 і 8 (HHV-6, HHV-7, HHV-8), вірус Епштейна-Барра (ВЕБ), вірус вітряної віспи (Varicella zoster), вірус гепатиту В; вірусостатична дія ганцикловіру обумовлена пригніченням синтезу вірусної ДНК шляхом: конкурентного інгібування вбудовування дезоксигуанозину трифосфату у ДНК під дією ДНК-полімерази; включенням трифосфата ганцикловіру у вірусну ДНК, що призводить до припинення подовження вірусної ДНК чи дуже обмеженому їх подовженню.

Показання для застосування ЛЗ: лікування ЦМВ-інфекції, що загрожує життю чи зору, в осіб з імунодефіцитами^{БНФ}, (синдром набутого імунодефіциту (СНІД), ятрогенна імуносупресія, пов'язана із трансплантацією органів або хіміотерапією пухлин); профілактика ЦМВ - інфекції у хворих, які отримують імуносупресивну терапію після трансплантації органів^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначений виключно для в/в введення^{БНФ}; лікування ЦМВ-інфекції: початкове лікування - інфузія 5 мг/кг із постійною швидкістю протягом 1 год 2 р/добу (10 мг/кг/добу) кожні 12 год 14 - 21 днів у хворих з нормальною ф-цією нирок^{БНФ}; для підтримуючого лікування рекомендована добова доза - 6 мг/кг 5 р/тижд. або по 5 мг/кг/добу^{БНФ} протягом 1 год. щоденно протягом 7 днів; профілактика ЦМВ - інфекції: індукційний режим - в/в інфузія по 5 мг/кг кожні 12 год. (10 мг/кг/добу) протягом 7-14 днів; підтримуючий режим - в/в інфузія по 5 мг/кг одноразово щоденно 7 днів або по 6 мг/кг одноразово щоденно 5 р/тижд.; хворим із нирковою недостатністю дози необхідно коригувати (КлКр, мл/хв - індукційна доза): ≥ 70 - 5 мг/кг кожні 12 год; 50-69 - 2,5 мг/кг кожні 12 год.; 25-49 - 2,5 мг/кг/добу; 10-24 - 1,25 мг/кг/добу; < 10 - 1,25 мг/кг/добу після ГД.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сепсис (бактеріємія, вірусемія), запалення підшкірної клітковини (целюліт), інфекція сечовивідних шляхів, кандидоз ротової порожнини, нейтропенія, анемія; тромбоцитопенія, лейкопенія, панцитопенія; пригнічення кісткового мозку; агранулоцитоз, гранулоцитопенія; анафілактичні р-ції; зниження апетиту, анорексія; депресія, тривога, сплутаність свідомості, порушення мислення, головний біль, безсоння, дисгевзія (порушення смакових відчуттів), гіпестезія, парестезія, периферична нейропатія, судоми, запаморочення (за виключенням вертіго); збудження, психотичні розлади, тремор; набряк рогівки, відшарування сітківки, плаваючі помутніння скловидного тіла, біль в очах; порушення зору, кон'юнктивіт; біль у вухах; глухота; аритмія; аритмія; задишка; кашель; діарея; нудота, блювання, абдомінальний біль, абдомінальний біль у верхній частині живота, запор, метеоризм, дисфагія, диспепсія; відчуття розтягнення живота, виразки у ротовій порожнині, панкреатит; підвищення рівня лужної фосфатази у крові та АСТ, порушення ф-ції печінки; підвищення рівня АЛТ; дерматит, нічне потіння, свербіж; кропив'янка, алопеція, сухість шкіри; біль у м'язах, біль у суглобах, біль у спині, судоми у м'язах; зниження ниркового КлКр, порушення функції нирок; гематурія, ниркова недостатність, чоловіче безпліддя, слабкість, пропасниця, озноб, біль, біль у грудній клітці, нездужання, астенія, р-ції у місці ін'єкції, зменшення маси тіла, підвищення рівня креатиніну у крові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до ганцикловіру, валганцикловіру чи до іншого компонента препарату, протипоказаний для застосування при підвищеній чутливості до ацикловіру чи валацикловіру, абсолютне число нейтрофілів < 500 клітин в 1 мкл, чи число тромбоцитів < 25000 клітин в 1 мкл, період вагітності або годування груддю, а також чоловікам, які планують батьківство.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,5 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГАНЦИКЛОВІР -ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл. в конт. чар/уп.	500мг	№1	949,51	

II.	ТАМОВІР	Мефар Ілач Сан. А.Ш., Туреччина	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	500мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦИМЕВЕН®	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд (виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування, вторинне пакування, випробування контролю якості, випуск серії)/БСП Фармасьютікалз С.п.А. (виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування, випробування контролю яко, Швейцарія/Італія	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	500мг	№1	647,52	25,48/\$
	ЦИМЕВЕН®	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд (Вторинне пакування, випробування контролю якості, випуск серії)/БСП Фармасьютікалз С.п.А. (виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування, випробування контролю якості), Швейцарія/Італія	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	500мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

17.5.3. Засоби, що застосовуються для лікування ВІЛ-інфекції (протиретровірусні засоби – ПРВЗ)

ВІЛ-інфекція – довготривала інфекція, збудником якої є ВІЛ. Прогресуюче ураження імунної системи призводить до СНІДу, при якому у хворого розвиваються «опортуністичні хвороби»: тяжкі форми інфекцій, викликані умовно-патогенними збудниками, й деякі онкологічні захворювання. Метою лікування є максимально довге збереження якості життя і максимальне збільшення його тривалості, для чого необхідно добитися стійкого пригнічення реплікації ВІЛ. Абсолютним показанням для проведення терапії ПРВЗ є наявність клінічних проявів імунодефіциту, за їх відсутності – зниження кількості CD4-лімфоцитів < 200/мкл або рівень РНК ВІЛ > 100 тис. копій у 1 мл крові. Основний принцип підходу до лікування хворих ВІЛ-інфекцією – довічне застосування ПРВЗ. Усі ПРВЗ є дорогими й високотоксичними препаратами, які можуть викликати небажані реакції, загрозливі для життя. Більшість ПРВЗ, може вступати у потенційно небезпечну лікарську взаємодію. Неправильне застосування ПРВЗ призводить до швидкого розвитку резистентності.

На сьогодні застосовують кілька варіантів високоактивної протиретровірусної терапії: а) 3 НІЗТ; б) 2 НІЗТ + 1 або 2 ІВП; в) 2 НІЗТ + 1 ННІЗТ; г) НІЗТ + ННІЗТ + ІВП. Як стартовий режим рекомендують застосування 2 НІЗТ + ІВП або 2 НІЗТ + ННІЗТ.

17.5.3.1. Нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази ВІЛ (НІЗТ)

• **Зидовудин (Zidovudine) ***

Фармакотерапевтична група: J05AF01 - протівірусні препарати прямої дії. Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази.

Основна фармакотерапевтична дія: протівірусна дія; протівірусний препарат, активний відносно ретровірусів, включаючи ВІЛ; потрапляючи у клітину, препарат зазнає ряд послідовних перетворень, які каталізуються ферментами клітини; на останньому етапі утворюється зидовудин-трифосфат, який блокує синтез вірусної ДНК в результаті конкурентної взаємодії із зворотною транскриптазою ВІЛ; потрібна комбінація аналогів нуклеозидів або двох аналогів нуклеозидів з інгібітором протеаз ефективніша для пригнічення ВІЛ-індукованих цитопатичних ефектів, ніж один препарат або поєднання двох препаратів.

Показання для застосування ЛЗ: застосування в комбінації з іншими АРВ-препаратами для лікування ВІЛ-інфекції у дітей та дорослих^{БНФ,ВООЗ}; в/в введення для короткочасного лікування тяжких проявів ВІЛ-інфекції у хворих на СНІД, які не можуть приймати р/ос форми препарату^{БНФ,ВООЗ}; для застосування ВІЛ-позитивними вагітними жінками (вагітність понад 14 тижнів) та новонародженими дітьми з метою попередження трансплацентарної передачі ВІЛ та первинної профілактики ВІЛ у новонароджених^{ВООЗ БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування дорослих і дітей, маса тіла яких становить не <30 кг: доза у комбінації з іншими АРВ-препаратами - 250 або 300 мг 2 р/добу^{БНФ ВООЗ}; діти, маса тіла яких від 9 кг до 30 кг: рекомендована доза - 9 мг/кг маси тіла 2 р/день у комбінації з іншими АРВ-препаратами; максимальна доза не повинна перевищувати 300 мг 2 р/добу; діти, маса тіла яких від 4 кг до 9 кг: рекомендована доза - 12 мг/кг 2 р/добу у комбінації з іншими АРВ-препаратами; діти, маса тіла яких <4 кг: наявні дані не дають можливості рекомендувати спеціальне дозування для цієї групи дітей; діти 3-12 років: дози у межах від 80 до 160 мг/м²^{ВООЗ} поверхні тіла кожні 6 год (320-640 мг/м² / добу); рекомендована доза для вагітних жінок (вагітність понад 14 тижнів) - 500 мг/день р/ос (100 мг 5 р/добу) до початку пологів; під час пологів застосовують в/в у дозі 2 мг/кг^{БНФ} маси тіла протягом 1 год з наступною в/в інфузією по 1 мг/кг/год до моменту перерізання пуповини; новонародженим застосовують у дозі 2 мг/кг маси тіла р/ос, кожні 6 год, починаючи з перших 12 год після народження і до досягнення віку 6 тижнів; немовлятам, яким неможливо давати препарат per os, застосовується шляхом в/в інфузії у дозі 1,5 мг/кг маси тіла протягом 30 хвилин кожні 6 годин.^{ВООЗ}

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анемія (що може потребувати гемотрансфузій), нейтропенія та лейкопенія; тромбоцитопенія та панцитопенія з гіпоплазією кісткового мозку, істинна еритроцитарна аплазія, апластична анемія, гіперлактатемія, лактоацидоз, анорексія, перерозподіл/кумуляція жирових відкладень на тілі, тривога та депресія, головний біль, запаморочення, безсоння, парестезія, сонливість, зниження розумової діяльності, судоми, кардіоміопатія, задишка, кашель, нудота, блювання, біль у животі та діарея, метеоризм, пігментація слизової оболонки рота, порушення смаку та диспепсія, панкреатит, підвищення рівня печінкових

ферментів та білірубину, печінкові дисфункції, такі як тяжка гепатомегалія зі стеатозом, висипання та свербіж, пігментація нігтів та шкіри, кропив'янка, підвищена пітливість, міалгії, міопатії, часте сечовиділення, гінекомастія, нездужання, гарячка, генералізований біль та астенія, озноб, біль у грудях, грипоподібний с-м.

Противопоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до зидовудину або до інших компонентів препарату; зменшення кількості нейтрофілів у крові ($< 0,75 \times 10^9/\text{л}$) або рівня Hb ($< 7,5 \text{ г/дл}$ чи $4,65 \text{ ммоль/л}$), протипоказаний для лікування новонароджених із гіпербілірубінемією, які потребують додаткового відмінного від фототерапії лікування або із підвищенням більше ніж у 5 разів від норми рівня трансаміназ.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,6 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЗИДОВУДИН	ПрАТ "Технолог", Україна	р-н орал. у бан. по 200мл зі шпр.	10 мг/мл	№1	30,00	
	ЗИДОВУДИН	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	капс. у конт. чар/уп.	100мг, 250мг	№10x10, №10x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	ЗИДОВУДИН	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	р-н орал. у фл.	50мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЗИДОВУДИН	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	р-н орал. у фл. по 240мл з 2дозув. шпр. (10мл та 1,5мл)	50мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЗИДОВУДИН	Ауробіндо Фарма Лімітед - Юніт III, Індія	табл., в/о у конт.	300мг	№60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЗИДОВУДИН капсули по 100 мг	Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт III), Індія	капс. тверді желат. у конт.	100мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЗИДОВУДИН капсули по 100 мг	Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія	капс. тверді желат. у конт.	100мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЗИДОВУДИН, РОЗЧИН ОРАЛЬНИЙ, Ф.США, 50 мг/5 мл	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	р-н орал. у фл. по 240мл	50мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	РЕТРОВІР™	Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Велика Британія	р-н д/інфуз. у фл. по 20мл	10 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	РЕТРОВІР™	ГлаксоСмітКляйн Інк., Канада	р-н орал. у фл. по 200мл зі шпр. д/доз.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Диданозин (Didanosine)**

Фармакотерапевтична група: J05AF02 - противірусні засоби для системного застосування. Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази.

Основна фармакотерапевтична дія: противірусний засіб, активний щодо вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).

Показання для застосування ЛЗ: лікування ВІЛ-інфекції типу I (у складі комбінованої терапії з іншими антиретровірусними препаратами), але тільки у разі, коли лікування іншими ЛЗ неможливе.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати внутрішньо, натще, за 2 год. до вживання їжі або ч/з 2 год. після вживання їжі, запиваючи невеликою кількістю води (приблизно 100 мл), не розжовувати та не відкривати; приймати 1-2 р/добу відповідно до рекомендованої дози; рекомендована загальна добова доза залежить від маси тіла пацієнта (кг): $> 60 \text{ кг}$ - 400 мг, $< 60 \text{ кг}$ - 250 мг, діти від 6 років: рекомендована добова доза розраховується відносно площі поверхні тіла і становить 240 мг/м^2 (180 мг/м^2 у комбінації із зидовудином).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сіаладеніт, анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія, анафілактичні р-ції, анорексія, лактатацидоз, ЦД, гіпоглікемія, гіперглікемія, периферична нейропатія, яка зазвичай супроводжується двостороннім симетричним відчуттям оніміння кінцівок: поколювання та біль у ступнях ніг та менше - у кистях рук, головний біль, сухість в очах, депігментація сітківки ока, неврит зорового нерва, діарея, нудота, блювання, абдомінальний біль, метеоризм, сухість у ротовій порожнині, збільшення привушних слинних залоз, гепатит, печінковий стеатоз, печінкова недостатність, нециротична портальна гіпертензія, шкірний висип, облісіння, міалгія (у т. ч. зі збільшенням фотокінази); артралгія; г.некроз скелетних м'язів, ГНН з необхідністю ГД; міопатія, гінекомастія, астенія, озноб, лихоманка та біль, збільшення рівня/змінений рівень амілази, збільшення рівня/змінений рівень креатинфосфокінази, збільшення рівня/змінений рівень лужної фосфатази; відхилення лабораторних показників (шкала 3-4), включаючи підвищення рівня ліпази на 5%, підвищення АЛТ на 6%, підвищення АСТ на 5%, підвищення рівня сечової кислоти на 2%, підвищення рівня білірубину на 1%, нейтропенія (шкала 3-4) - у 2% пацієнтів, анемія і тромбоцитопенія - у $< 1\%$, аутоімунні порушення (такі як хвороба Грейса), перерозподіл (ліподистрофія) жирових відкладень на тілі ВІЛ-інфікованих пацієнтів, включаючи зменшення периферичних та підшкірних жирових відкладень на обличчі, збільшення інтраабдомінальних та вісцеральних жирових відкладень, гіпертрофію молочних залоз та кумуляцію жиру у дорсоцервікальних ділянках (горб бізона), гіпертригліцеридемія, гіперхолестеринемія, резистентність до інсуліну,

гіперглікемія та гіперлактатемія, випадки остеонекрозу, особливо у хворих із загальноновизнаними факторами ризику, прогресуючим захворюванням ВІЛ або довгострокового впливу комбінованої АРВ-терапії; ризик розвитку молочнокислого ацидозу, виражених гепатомегалії зі стеатозом, тяжка необоротна печінкова і ниркова недостатність, що може призвести до летального наслідку.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів, які входять до складу препарату, дитячий вік до 6 років.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	НИЗОНАДИД	МІЛАН Лабораторієс Лімітед, Індія	капс. к/р у конт.	200мг, 250мг, 400мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Ламівудин (Lamivudine) ***

Фармакотерапевтична група: J05AF05 - протівірусні засоби прямої дії, нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази.

Основна фармакотерапевтична дія: протівірусна дія; основний механізм дії - пригнічення зворотної транскриптази ВІЛ, є селективним інгібітором реплікації ВІЛ-1 та ВІЛ-2 *in vitro*, також активний відносно стійких до зидовудину штамів ВІЛ; у комбінації із зидовудином зменшує кількість ВІЛ-1 і збільшує кількість CD4-клітин, а також значно знижує ризик прогресування захворювання та летальності від нього, при виникненні резистентності до ламівудину у стійких до зидовудину штамів вірусу може відновитися чутливість до зидовудину, *in vitro* препарат проявляє слабку цитотоксичну дію на лімфоцити периферичної крові, лімфоцитарні та моноцитарно-макрофагальні клітинні лінії і клітини кісткового мозку, що свідчить про його широкий терапевтичний індекс.

Показання для застосування ЛЗ: у комбінації з іншими антиретровірусними препаратами призначений для лікування ВІЛ-інфекції.^{ВООЗ БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі та підлітки з масою тіла не < 30 кг: 300 мг/добу (або 30 мл)^{ВООЗ БНФ}, діти від 3 міс. та з масою тіла до 30 кг: - 4 мг/кг маси тіла 2 р/добу^{БНФ,ВООЗ} або 8 мг/кг маси тіла 1 р/добу^{БНФ}, (МДД 300 мг/добу)^{ВООЗ,БНФ}; дози для лікування пацієнтів з КЛКр < 50 мл/хв. повинні бути зменшені^{БНФ}; діти з масою тіла від 21 до 30 кг - рекомендована доза - 75 мг вранці та 150 мг ввечері, або 225 мг одночасно 1 р/добу^{БНФ}; діти з масою тіла від 14 до 21 кг - 75 мг 2 р/добу або 150 мг 1р/добу^{БНФ}; діти з масою тіла до 14 кг - у формі р-ну для р/ос застосування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анемія, нейтропенія, тромбоцитопенія, істинна еритроцитарна аплазія, реакції гіперчутливості, ангіоневротичний набряк, гіперлактатемія, лактоацидоз, перерозподіл/акумуляція жирових відкладень на тілі, головний біль, безсоння, парестезії, випадки периферичної нейропатії, кашель, симптоми застуди, нудота, блювання, біль у верхній половині живота, діарея, панкреатит, підвищення рівня амілази сироватки крові, мінуще підвищення рівня печінкових ферментів (АСТ, АЛТ), загострення гепатиту, що первинно діагностоване за підвищенням рівня АЛТ і виникало впродовж лікування, а також після відміни ламівудину, летальний наслідок, висипання, свербіж, алопеція, артралгія, підвищення рівня КФК, м'язові розлади, включаючи міалгії, судоми, рабдоміоліз, втомлюваність, погане самопочуття, гарячка, випадки лактоацидозу, інколи летальні, асоційовані з тяжкою гепатомегалією та печінковим стеатозом, гіпертригліцеридемія, гіперхолестеринемія, інсулінорезистентність, гіперглікемія та гіперлактатемія, запальні реакції на безсимптомні та залишкові опортуністичні інфекції, випадки остеонекрозу, головним чином у пацієнтів з підтвердженими ризик-факторами, запущеною ВІЛ-хворобою або у разі довготривалої антиретровірусної терапії.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до ламівудину або до іншого компонента препарату в анамнезі.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЛАМІВУДИН	ПрАТ "Технолог", Україна	р-н орал. по 240мл у бан. з шпр.	10 мг/мл	№1	12,81	
	ЛАМІВУДИН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у конт.	150мг	№60	4,33	
	ЛАМІВУДИН	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	150мг	№10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	ГЕПТАВІР-150	ГЕТЕРО ЛАБЗ ЛІМІТЕД, Індія	табл., в/о у конт.	150мг	№60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕПІВІР™	ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А./Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Польща/Велика Британія	табл., в/о у фл.	150мг	№60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕПІВІР™	ГлаксоСмітКляйн Інк., Канада	р-н орал. по 240мл у фл.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛАМІВІР	Ципла Лтд., Індія	р-н орал. по 100мл у фл.	50мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛАМІВУДИН	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	р-н орал. по 240мл	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі	

		у фл.			ОВЦ
ЛАМІВУДИН	Мікро Лабс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у фл.	150мг	№60	відсутня у реєстрі ОВЦ
ЛАМІВУДИН	Ауробіндо Фарма Лімітед - Юніт III, Індія	табл., в/о у конт.	150мг	№60	відсутня у реєстрі ОВЦ
ЛАМІВУДИН	Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт III), Індія	р-н орал. по 240мл у фл.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ

• **Абакавір (Abacavir) ***

Фармакотерапевтична група: J05AF06 - протівірусні препарати для системного застосування. Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази.

Основна фармакотерапевтична дія: протівірусна дія; потужний інгібітор ВІЛ-1 і ВІЛ-2, включаючи ВІЛ-1 ізоляти зі зниженою чутливістю до зидовудіну, ламівудіну, залцитабіну, диданозину або невірапіну; у клітині перетворюється на активний метаболіт карбовіру трифосфат, головним механізмом дії якого є гальмування зворотної транскриптази ВІЛ, у результаті чого порушується необхідний зв'язок у ланцюжку вірусної ДНК та зупиняється її реплікація.

Показання для застосування ЛЗ: ВІЛ-інфекції у дітей та дорослих (у складі комбінованої антиретровірусної терапії)^{ВООЗ, БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: перед початком лікування потрібно провести скринінг на носійство HLA В*5701 алелі у будь-якого ВІЛ-інфікованого пацієнта незалежно від його расової приналежності, застосовувати абакавір носіями HLA В*5701 алелі не можна; приймають незалежно від прийому їжі; дорослі та підлітки, маса тіла яких не < 25 кг: 600 мг/добу (або 300 мг 2 р/добу)^{ВООЗ, БНФ}; діти з масою тіла від 20 до 25 кг - 150 мг вранці та 300 мг ввечері або 450 мг 1 р/добу^{БНФ}; діти з масою тіла від 14 до 20 кг - 150 мг 2 р/добу або 300 мг 1 р/добу^{БНФ}; діти з масою тіла до 25 кг - приймають у формі р-ну для р/ос застосування; р-н оральн. - дорослі та діти з масою тіла > 25 кг - 300 мг (15мл) 2 р/добу^{ВООЗ, БНФ} або 600 мг (30 мл) 1 р/добу^{БНФ}; діти з масою тіла до 25 кг: діти від 1 року: - 8 мг/кг 2 р/добу або 16 мг/кг 1 р/добу, МДД - 600 мг (30 мл)^{БНФ, ВООЗ}; діти від 3 міс. до 1 року: разова доза - 8 мг/кг 2 р/добу або 16 мг/кг 1 р/добу^{БНФ}, дані стосовно застосування 1 р/добу є дуже обмеженими для цієї вікової групи; діти до 3 міс.: досвід застосування обмежений.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анорексія, гіперлактатемія, лактоацидоз, головний біль, нудота, блювання, діарея, панкреатит, висипання (без системних симптомів); поліморфна еритема, с-м Стівенса-Джонсона і токсичний епідермальний некроліз, пропасниця, загальмованість, відчуття втоми, гіперчутливість, висипання (зазвичай макулопапульозне або у вигляді кропив'янки), біль у черевній порожнині, виразки у роті, задишка, кашель, біль у горлі, дистрес-с-м у дорослих, ДН, зміни при рентгенологічному дослідженні грудної порожнини (головним чином інфільтрати, що можуть бути локалізованими), пропасниця, загальмованість, нездужання, набряк, лімфаденопатія, артеріальна гіпотензія, кон'юнктивіт, анафілаксія, парестезії, підвищення вище нормального рівня показників функціональних печінкових тестів, гепатит, печінкова недостатність, міалгія, поодинокі випадки міолізу, артралгія, підвищення рівня креатинфосфокінази, підвищення рівня креатиніну, НН, випадки розвитку лактоацидозу, рівні ліпідів сироватки крові та глюкози крові можуть підвищуватися протягом АРВ -терапії, випадки остеонекрозу.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до абакавіру або до будь-якого іншого компонента препарату.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АБАВІР	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у конт.	300мг	№60		відсутня у реєстрі ОВЦ
	АБАВІР	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	р-н орал. у фл. по 240мл	20 мг/мл	№1		відсутня у реєстрі ОВЦ
	АБАКАВІР	Мілан Лабораторієс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у конт.	300мг	№1		відсутня у реєстрі ОВЦ
	АБАКАВІРУ СУЛЬФАТ	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	р-н орал. у фл.	20 мг/мл	№1		відсутня у реєстрі ОВЦ
	ЗІАГЕН™	ГлаксоСмітКляйн Інк., Канада	р-н орал. у фл. по 240мл	20 мг/мл	№1		відсутня у реєстрі ОВЦ
	ЗІАГЕН™	Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед/ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А., Велика Британія/Польща	табл., вкриті п/о у бл.	300мг	№10x6		відсутня у реєстрі ОВЦ

• **Тенофовіру дизопроксил (Tenofovir disoproxil) ***

Фармакотерапевтична група: J05AF07 - протівірусні засоби для системного застосування. Нуклеозидні і нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази.

Основна фармакотерапевтична дія: тенофовіру дизопроксил всмоктується та перетворюється на активну речовину тенофовір, що є аналогом нуклеозид монофосфат; інгібує ВІЛ-1 зворотну транскриптазу та HBV полімеразу шляхом конкуренції прямого зв'язування з природним субстратом деоксирибонуклеотиду та обривом ДНК-ланцюжка після приєднання до ДНК; є слабким інгібітором клітинних полімераз α , β та γ ; є активним проти

ВІЛ-1 підтипів А, С, D, E, F, G та О та проти ВІЛ_{BaL} в основних моноцитах/макрофагах; проявляє активність *in vitro* проти ВІЛ-2 з ЕС₅₀ 4,9 мкмоль/л в клітинах МТ-4

Показання для застосування ЛЗ: для лікування ВІЛ-1-інфікованих пацієнтів призначають у комбінації з іншими антиретровірусними препаратами ^{ВООЗ БНФ}; для лікування ВІЛ-1-інфікованих підлітків віком від 12 до < 18 років з резистентністю до нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази (НІЗТ) або токсичністю, що виключають застосування ЛЗ першої лінії; для лікування ХГВ у дорослих із: компенсованим захворюванням печінки, з ознаками активної реплікації вірусу, постійним підвищенням рівня аланінамінотрансферази (АЛТ) в сироватці крові та гістологічним проявом активного запалення та/або фіброзу; підтвердженням ламівудинорезистентного ХГВ; декомпенсованим захворюванням печінк ^{БНФ} и; для лікування ХГВ у підлітків віком від 12 до < 18 років ^{БНФ} з: компенсованим захворюванням печінки, ознаками активного захворювання імунної системи, тобто активної реплікації вірусу, постійним підвищенням рівня аланінамінотрансферази (АЛТ) в сироватці крові та гістологічним проявом активного запалення та/або фіброзу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза для лікування ВІЛ або для лікування ХГВ 300 мг 1 р/добу р/ос з їжею ^{ВООЗ,БНФ}, діти: ВІЛ-1 - для підлітків від 12 до < 18 років, маса тіла яких ≥ 35 кг, рекомендована доза -300 мг 1р./добу, яку приймають р/ос з їжею; ^{БНФ} ХГВ: для підлітків від 12 до < 18 років, маса тіла яких ≥ 35 кг, рекомендована доза - 300 мг 1 р/добу, яку приймають р/ос з їжею ^{БНФ}

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: випадки ниркових порушень, НН та нечасті випадки проксимальної ниркової тубулопатії (в т. ч. с-м Фанконі), що іноді призводили до кісткових аномалій (рідко - до переломів); панкреатит, нудота, гіпофосфатемія, гіпокаліємія, лактоацидоз, запаморочення, головний біль, діарея, блювання, біль у животі, здуття живота, метеоризм, підвищений рівень трансаміназ, жирова дегенерація печінки, гепатит, висипання, ангіоневротичний набряк, рабдоміоліз, м'язова слабкість, остеомаляція, міопатія, підвищений креатинін, ГНН, г.тубулярний некроз, нефрит (у т. ч. г. інтерстиціальний нефрит), нефрогенний нецукровий діабет, астенія, втома, хвороба Грейвса або аутоімунний гепатит.

Противпоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини чи до будь-якої з допоміжних речовин; дитячий вік до 12 років.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,245 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ВІРЕАД®	Гілеад Сайєнсиз Айєленд ЮС (первинна та вторинна упаковка, контроль серій, випуск серій)/Такеда ГмбХ (виробництво, первинна та вторинна упаковка)/Каталент Джермані Шорндорф ГмбХ (первинна та вторинна упаковка)/Мілмаунт Хелскеа Лтд. (вторинна упаковка), Ірландія/Німеччина/Німеччина/Ірландія	табл., вкриті п/о у фл.	300мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕНОФ	ГЕТЕРО ЛАБЗ ЛІМІТЕД, Індія	табл., в/о у конт.	300мг	№30, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕНОФОВІРУ ДИЗОПРОКСИЛУ ФУМАРАТ	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у конт.	300мг	№30	49,00	26,34/\$
	ТЕНОФОВІРУ ДИЗОПРОКСИЛУ ФУМАРАТ / ТЕНОФОВІРУ ДИЗОПРОКСИЛУ ФУМАРАТ	Лаурус Лабс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у п/е фл.	300мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕНОХОП	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у фл.	300мг	№30	25,73	26,59/\$

Комбіновані препарати

- **Зидовудин + Ламівудин (Zidovudine + Lamivudine) ***

Визначена добова доза (DDD): перорально (300мг/150мг) - 2 табл.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЛАЗИВУДИН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у конт.	300мг/150мг	№60	13,40	
II.	ВІРОКОМБ	Сан Фармасьютикал	табл., в/о у фл.	300мг/150мг	№60	відсутня у	

	Індастріз Лімітед, Індія					реєстрі ОВЦ
ЗОВІЛАМ	Мілан Лабораторієс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у конт.	60мг/30мг, 300мг/150мг	№60		відсутня у реєстрі ОВЦ
КОМБІВІР™	Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед/ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А., Велика Британія/Польща	табл., в/о у фл. та бл.	300мг/150мг	№60, №10x6		відсутня у реєстрі ОВЦ
ЛАМІВУДИН 150 мг І ЗИДОВУДИН 300 мг	Ауробіндо Фарма Лімітед Юніт ІІІ, Індія	табл., в/о у конт.	300мг/150мг	№60		відсутня у реєстрі ОВЦ
ЛАМІВУДИН/ЗИДОВУДИН	ГЕТЕРО ЛАБЗ ЛІМІТЕД, Індія	табл., в/о у конт.	300мг/150мг	№60		відсутня у реєстрі ОВЦ
ЛАМІВУДИНУ ТА ЗИДОВУДИНУ	Ципла Лтд, Індія	табл. д/перор. сусп. у пл.	60мг/30мг	№60		відсутня у реєстрі ОВЦ
ЛАМІХОП 3	Маклеодс Фармасьютикалз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у фл.	300мг/150мг	№60		відсутня у реєстрі ОВЦ

• **Абакавір + ламівудин (Abacavir + lamivudine) ***

Визначена добова доза (DDD): перорально (600мг/300мг) - 1 табл.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
ІІ.	АБАКАВІР І ЛАМІВУДИН	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у фл. в упак. та без	600мг/300мг	№30, №90		відсутня у реєстрі ОВЦ
	АБАКАВІР ЛАМІВУДИН	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у конт. та бл.	60мг/30мг	№30, №10x10		відсутня у реєстрі ОВЦ
	АБАКАВІРУ СУЛЬФАТ 600 МГ ТА ЛАМІВУДИНУ 300 МГ	Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у конт.	600мг/300мг	№30		відсутня у реєстрі ОВЦ
	АБАКАВІРУ СУЛЬФАТ ТА ЛАМІВУДИНУ	Ципла Лтд, Індія	табл. д/перор. сусп. у пл.	60мг/30мг	№60		відсутня у реєстрі ОВЦ
	АБАЛАМ	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у конт.	600мг/300мг	№30	17,27	25,90/\$
	КІВЕКСА™	Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед (виробники нерозфасованої продукції)/Глаксо Веллком С.А. (виробник для пакування та випуску серії)/ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А. (виробник для нерозфасованої продукції), Велика Британія/Іспанія/Польща	табл., вкриті п/о у бл.	600мг/300мг	№30, №90		відсутня у реєстрі ОВЦ

• **Лопінавір + ритонавір (Lopinavir + ritonavir)**

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,8 г (відносно Лопінавіру)

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	АЛУВІА	Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко. КГ (повний цикл виробництва)/ПрАТ "Індар" (альтернативний виробник відповідальний за вторинне пакування та випуск серії),	табл., вкриті п/о у фл.	200мг/50мг	№120	53,78	26,54/\$

		Німеччина/Україна					
II.	АЛУВІА	Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина	табл., вкриті п/о у фл.	200мг/50мг	№120	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АЛУВІА	Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко. КГ (повний цикл виробництва), Німеччина	табл., вкриті п/о у фл.	100мг/25мг	№60	53,81	26,54/\$
	КАЛЕТРА	"АЕСІКА КВІНБОРО ЛТД", Великобританія	р-н д/перор. застос. у фл. по 60мл	80мг/20мг/мл	№5	53,78	26,54/\$
	КАЛЕТРА	ЕСІКА КВІНБОРО ЛТД (повний цикл виробництва)/Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко. КГ (альтернативний виробник відповідальний за тестування та випуск серії)/Еббві Інк. (альтернативний виробник відповідальний за виробництво лікарського засобу, первинне та вторинне пак, Великобританія/Німеччина /США	р-н д/перор. застос. у фл. по 60мл	80мг/20мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	РИТОВІР-Л	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у конт.	200мг/50мг	№120	відсутня у реєстрі ОВЦ	

17.5.3.2. Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази ВІЛ (ННІЗТ)

• *Невірапін (Nevirapine) **

Фармакотерапевтична група: J05AG01 - протівірусні засоби прямої дії, ненуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази.

Основна фармакотерапевтична дія: протівірусна дія; зв'язується безпосередньо зі зворотною транскриптазою й блокує РНК-залежну та ДНК-залежну активність ДНК-полімерази, викликаючи руйнування каталітичної ділянки ферменту; не є інгібітором зворотної транскриптази ВІЛ-2 чи еукаріотної ДНК-полімерази (таких як ДНК-полімерази людини типу α , β , γ або δ).

Показання для застосування ЛЗ: у комбінації з іншими антиретровірусними препаратами для лікування дорослих та дітей будь-якого віку, інфікованих ВІЛ-1. ^{ВООЗ БНФ}, для профілактики передачі ВІЛ-1 від матері до дитини у вагітних жінок, які не приймають антиретровірусної терапії під час пологів, а також у вигляді одноразової р/ос для дитини після народження.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі та підлітки віком від 16 років -200 мг щодня протягом перших 14 днів, після чого приймають 200 мг 2 р/добу у поєднанні принаймні з двома додатковими антиретровірусними засобами ^{БНФ, ВООЗ}; пацієнтам, у яких протягом 14-денного початкового періоду прийому добової дози в 200 мг стався висип, не можна підвищувати дозу доти, поки він не мине; пацієнти, які припинили прийом ЛЗ більше ніж на 7 днів, повинні знову розпочати прийом в рекомендованих дозах, вживаючи 200 мг (4 мг/кг/добу для дітей) 1 р/добу і потім 200 мг (4 або 7 мг/кг 2 р/добу, відповідно до віку - для дітей) 2 р/добу; пацієнтам із порушеннями функції нирок після кожної процедури діалізу рекомендується прийняти дозу 200 мг невірапіну, дозу не потрібно змінювати пацієнтам із КлКр \geq 20 мл/хв

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гранулоцитопенія; анемія, анафілактичні р-ції, ангіоневричний набряк, кропив'янка, анафілактичні р-ції; лікарська р-ція з еозинофілією та системними симптомами, головний біль, нудота, блювання, біль у животі, діарея, жовтяниця; печінкова недостатність/фульмінантний гепатит, висипання, с-м Стівенса-Джонсона / токсичний епідермальний некроліз), ангіоневротичний набряк, кропив'янка, біль у суглобах (артралгія), біль у м'язах (міалгія), підвищена втомлюваність, пропасниця, зміни показників загального тесту ф-ції печінки (збільшення аланін-амінотрансферази (АЛТ), збільшені трансамінази, збільшення аспартат-амінотрансферази (АСТ), збільшення гамма-глутамілтрансферази, підвищення рівня печінкових ферментів, гіпертранзіміназемія); зниження рівня фосфору у крові, підвищення АТ, діарея, біль у животі та міалгія, с-м Стівенса-Джонсона; токсичний епідермальний некроліз; тяжка форма гепатиту; серйозна дисфункція печінки; с-м гіперчутливості, що супроводжувався висипаннями з підвищенням t° тіла, збільшенням лімфатичних вузлів; вісцеральні ураження, такі як гепатит; еозинофілія, гранулоцитопенія і ниркова дисфункція.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої та допоміжних речовин препарату, тяжка дисфункція печінки (клас С за класифікацією Чайлда-П'ю,) або проведення попереднього лікування з метою нормалізації рівня АСТ або АЛТ, що більш ніж у 5 разів перевищує верхню межу норми (ВМН), одночасне застосування з невірапіном препаратів, що містять звиробій (*hypercicum perforatum*), ч/з ризик зниження к-ції у плазмі крові та зниження його ефективності; протипоказане повторне призначення після його відміни через: підвищення рівня АСТ або АЛТ у 5 разів, що супроводжується відхиленням функції печінки; тяжку форму висипань; висипання, що супроводжувалися симптомами, які свідчать про генералізацію процесу або гіперчутливість; клінічні прояви гепатиту, спричиненого невірапіном.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	НЕВІМУН	Ципла Лтд., Індія	сусп. орал. у фл. по 100мл	50мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НЕВІРАПІН	СТРАЙДС ФАРМА САЙЕНС ЛІМІТЕД, Індія	табл. у конт.	200мг	№60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НЕВІРАПІН	Ауробіндо Фарма Лімітед - Юніт III, Індія	табл. у конт.	200мг	№60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НЕВІРАПІН 200 МГ, ТАБЛЕТКИ Ф.США	Мілан Лабораторіес Лімітед, Індія	табл. у конт.	200мг	№60	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Ефавіренз (Efavirenz) ***

Фармакотерапевтична група: J05AG03 - противірусні засоби для системного застосування. Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази.

Основна фармакотерапевтична дія: противірусна дія; ненуклеозидний інгібітор зворотної транскриптази ВІЛ-1, ефавіренз є неконкурентним інгібітором ВІЛ-1 зворотної транскриптази та істотно не інгібує ВІЛ-2 зворотну транскриптазу або клітинні ДНК-полімерази (α , β , γ або δ); вільна концентрація ефавірензу, необхідна для 90-95 % інгібування дикого типу або стійких до зидовудину лабораторних і клінічних ізолятів *in vitro*, перебуває у межах діапазону від 0,46 до 6,8 нм на лімфобластоїдних клітинних лініях, мононуклеарах периферичної крові і культурах макрофагів/моноцитів.

Показання для застосування ЛЗ: у складі комбінованої противірусної терапії для лікування захворювань, спричинених ВІЛ-1 у дорослих ^{БНФ}, з вагою не < 40 кг ^{ВООЗ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі та діти з масою тіла більше 40 кг: рекомендовані дози у комбінації з нуклеозидами-інгібіторами зворотної транскриптази разом, або без них, - 600 мг р/ос1 р/добу ^{БНФ} ^{ВООЗ}; якщо призначати разом з вориконазолом, підтримуючу дозу останнього потрібно збільшити до 400 мг кожні 12 год; дозу ефавірензу потрібно зменшити на 50 %, до 300 мг 1 р/добу; при припиненні терапії вориконазолом початкове дозування ЛЗ відновити; при супутньому введенні ефавірензу з рифампіцином пацієнтам з масою тіла від 50 кг рекомендується підвищення дози ефавірензу до 800 мг 1 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: порушення балансу могової координації, розлад уваги, запаморочення, головний біль, сонливість, збудження, амнезія, атаксія, порушення координації, судоми, патологічне мислення, тремор, розпливчасте бачення, шум у вухах, запаморочення, припливи, тригліцеридемія, холестерінемія, біль у животі, діарея, нудота, блювання, г. панкреатит, висипання, свербіж, еритема, с-м Стівенса-Джонсона, фотоалергічний дерматит, підвищена втомлюваність, алергія, підвищення рівня АСТ, АЛТ, ГГТ, г. гепатит, печінкова недостатність, гінекомастія, занепокоєння, депресія, безсоння, емоційна лабільність, схильність до афекту, агресія, сплутаність свідомості, ейфоричний настрій, галюцинації, манія, параноя, психоз, спроби самогубства, суїцидальне мислення, кататонічний с-м, омана, невроз, завершені самогубства, втома.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до активної речовини або до інших компонентів, які входять до складу препарату; тяжкі порушення функції печінки (стадія С за шкалою Чайлда-П'ю); одночасний прийом з терфенадином, астемізолом, цизапридом, мідазоламом, триазоламом, пімозидом, бепридиллом або алкалоїдами ріжків (ерготамін, дигідроерготамін, ергоновін і метилергоновін), оскільки конкурування ефавірензу за СYP3A4 може призвести до пригнічення метаболізму цих препаратів і появи передумов для виникнення серйозних та/або загрозливих для життя небажаних явищ (таких як серцеві аритмії, тривалий седативний ефект або пригнічення дихання); одночасний прийом із препаратами рослинного походження, що містять звіробій (Hypericum perforatum); пацієнти з: випадками раптового летального випадку у родині, вроджена тривалість інтервалу QT або будь-який інший клінічний стан, який, може подовжувати інтервал QT; історія симптоматичних серцевих аритмій, клінічно значуща брадикардія, застійна СН, що супроводжується зменшенням викиду лівого шлуночка; важкі порушення електролітного балансу, наприклад гіпокаліємія або гіпомagneмія; застосування ліків, які продовжують інтервал QT (проаритмічні лікарські засоби), такі як: антиаритмічні препарати класів IA та III; нейрелептики, антидепресанти; певні а/б, включаючи наступні класи: макроліди, фторхінолони, імідазолів та триазольні протигрибкові засоби; певні антигістамінні препарати (терфенадин, астемізол); цизаприд, флекаїнід, деякі протимікробні препарати, метадон.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,6 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕСТІВА 600	ГЕТЕРО ЛАБЗ ЛІМІТЕД, Індія	табл., в/о у конт.	600мг	№30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕФАВІРЕНЗ	СТРАЙДС ФАРМА САЙЕНС ЛІМІТЕД, Індія	табл., вкриті п/о у конт.	200мг, 600мг	№90, №30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕФАВІРЕНЗ	Ауробіндо Фарма Лімітед – Юніт III, Індія	табл., в/о у конт.	600мг	№30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕФАМАТ	МАЙЛАН ЛАБОРАТОРІЗ	табл., вкриті п/о	200мг, 600мг	№30	відсутня у	

	ЛІМІТЕД, Індія	у конт.			реєстрі ОБЦ
ЕФАМАТ	Мілан Лабораторієс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у конт.	200мг, 600мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ
ЕФЕРВЕН	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	табл., в/о у фл.	600мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ
ЕФФАХОП 600	Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у фл.	600мг	№30	6,00 27,16/\$

17.5.3.3. Інгібітори протеаз

- **Ритонавір (Ritonavir) ***

Фармакотерапевтична група: J05AE03 - протівірусні засоби для системного застосування. Інгібітори протеази.
Основна фармакотерапевтична дія: пептидоміметичний інгібітор ВІЛ-1 та ВІЛ-2 аспартилпротеаз для перорального застосування; гальмування ВІЛ-протеази робить цей фермент нездатним до обробки попередника gag ролі поліпротеїну, що призводить до утворення морфологічно незрілих ВІЛ-часток, нездатних до ініціювання нових циклів інфекції; ритонавір має селективну спорідненість з ВІЛ-протеазою і низьку інгібіторну активність проти людських аспартил-протеаз.

Показання для застосування ЛЗ: у складі комбінованої терапії з іншими антиретровірусними засобами для лікування ВІЛ-1 інфікованих пацієнтів (дорослих і дітей віком від 2 років).^{ВООЗ БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: одночасне застосування з ритонавіром як фармакокінетичним підсилювачем рекомендоване для нижчезазначених інгібіторів протеази ВІЛ-1 у вказаних дозах: ампренавір 600 мг 2 р/добу з ритонавіром 100 мг 2 р/добу^{ВООЗ БНФ}; атазанавір 300 мг 1 р/добу з ритонавіром 100 мг 1 р/добу^{БНФ}; фосампренавір 700 мг 2 р/добу з ритонавіром 100 мг 2 р/добу^{ВООЗ БНФ}; лопінавір у складі комбінованого з ритонавіром препарату (лопінавір/ритонавір) 400 мг/100 мг або 800 мг/200 мг; саквінавір 1000 мг 2 р/добу з ритонавіром 100 мг 2 р/добу^{ВООЗ БНФ}, для пацієнтів, які раніше отримували АРВ-терапію; на початку лікування саквінавіром 500 мг 2 р/добу з ритонавіром 100 мг 2 р/добу^{ВООЗ БНФ} протягом перших 7 днів, після цього саквінавір 1000 мг 2 р/добу з ритонавіром 100 мг 2 р/добу^{ВООЗ БНФ} для пацієнтів, які раніше не отримували АРВ-терапію; типранавір 500 мг 2 р/добу з ритонавіром 200 мг 2 р/добу; комбінацію типранавіру та ритонавіру не застосовувати пацієнтам, які раніше не проходили лікування; дарунавір 600 мг 2 р/добу з ритонавіром 100 мг 2 р/добу^{БНФ} для пацієнтів, які отримували раніше АРВ - терапію, дарунавір 800 мг 1 р/добу з ритонавіром 100 мг 1 р/добу^{БНФ} для пацієнтів, які раніше не отримували АРВ - терапію; діти: ритонавір рекомендований до застосування дітям від 2 років, дозування визначати згідно з інструкцією для медичного застосування інгібітору протеази, що рекомендований для одночасного застосування з ритонавіром; як АРВ - засіб^{БНФ}: дорослі. рекомендована р/ос доза - 600мг 2р/добу^{БНФ} (сумарна денна доза - 1200 мг). Лікування починати з дози 300 мг 2р/добу протягом 3 днів^{БНФ}, а потім поступово збільшувати на 100 мг 2р/добу^{ВООЗ БНФ} упродовж не більше 14 днів до 600 мг 2р/добу^{БНФ}. Ритонавір у дозі 300 мг 2р/добу^{БНФ} не призначати довше 3 днів. Діти (віком від 2 років): рекомендована педіатрична доза - 350 мг/м² р/ос 2р/добу, але не більше 600 мг 2р/добу. Прийом розпочинати з 250 мг/м² і збільшувати по 50 мг/м² 2 р/добу з інтервалом 2-3 дні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: зниження рівня лейкоцитів, гемоглобіну, нейтрофілів, підвищення рівня еозинофілів, тромбоцитопенія, підвищення рівня нейтрофілів, підвищена чутливість, у т. ч. кропив'янка і набряк обличчя, анафілаксія, гіперхолестеринемія, гіпертригліцеридемія, подагра, набряк і периферичні набряки, дегідратація (зазвичай асоційована з гастро-інтестинальними симптомами), ЦД, гіперглікемія, дисгевзія, парестезія слизової оболонки ротової порожнини та периферична парестезія, запаморочення, периферична нейропатія, головний біль, безсоння, занепокоєння, сплутаність свідомості, неухважність, синкопе, судоми, затуманення зору, ІМ, АГ, артеріальна гіпотензія, у т.ч. ортостатична гіпотензія, відчуття холоду на периферії, фарингіт, біль у ротоглотці, кашель, біль у животі (у верхній та нижній частині), нудота, діарея (включаючи тяжку, з електролітним дисбалансом), блювання, диспепсія, анорексія, метеоризм, виразки в ротовій порожнині, шлунково-кишкова кровотеча, ГЕРХ, панкреатит, гепатит (у т. ч. підвищення АСТ, АЛТ, ГГТ), підвищення білірубину в крові (в т.ч. жовтяниця), свербіж, висипання (в тому числі еритематозне і макулопапульозне), акне, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз (ТЕН), артралгія та біль у спині, міозит, рабдоміоліз, міалгія, міопатія/підвищення креатинфосфокінази, збільшення частоти сечовипускання, НН (наприклад олігурія, підвищення рівня креатиніну крові), ГНН, менорагія, втомлюваність, включаючи астенію, припливи, відчуття жару, гарячка, втрата маси тіла, підвищення рівня амілази крові, зниження рівня вільного та загального тироксину, підвищення рівня глюкози, підвищення рівня магнію, підвищення рівня лужної фосфатази.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої або до будь-якої з допоміжних речовин; у разі застосування ритонавіру як фармакокінетичного підсилювача іншого інгібітору протеази необхідно брати до уваги протипоказання до застосування цього інгібітору протеази, зазначені в інструкції для медичного застосування; не застосовувати пацієнтам з декомпенсованими захворюваннями печінки ні як фармакокінетичний підсилювач, ні як антиретровірусний засіб; ритонавір - потужний інгібітор біотрансформацій, медіаторами яких виступають ізоферменти CYP3A і CYP2D6, якщо інше не передбачено окремо, одночасно з ритонавіром протипоказано застосовувати: альфузозин, петидин, піроксикам, пропоксифен, ранолазин, аміодарон, белпрідил, дронедазон, енкаїнід, флеканід, пропafenон, квінідин, фусидова кислота, апалутамід, нератиніб, венетоклак, вориконазол, астемізол, терфенадин, колхіцин, рифабутин, луразидон, силденафіл, аванафіл, варденафіл, клозазепат, діазепам, етазолам, флуразепам, мідазолам р/ос і тріазолам, звіробій продірявлений.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1,2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	НОРВІР	Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина	табл., вкриті п/о у фл.	100мг	№60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НОРВІР	Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина	табл., вкриті п/о у фл.	100мг	№30	272,26	26,54/\$

• **Дарунавір (Darunavir)**

Фармакотерапевтична група: J05AE10 - протівірусні засоби для системного застосування. Інгібітори протеази.

Основна фармакотерапевтична дія: інгібітор протеази вірусу імунодефіциту людини першого типу (ВІЛ-1); вибірково інгібує розщеплення поліпротеїнів Gag-Pol ВІЛ в інфікованих вірусом клітинах та запобігає утворенню повноцінних вірусів; надійно зв'язується з протеазою ВІЛ-1 (KD 4,5 x 10⁻¹² M); стійкий до мутацій, що зумовлюють резистентність до інгібіторів протеази.

Показання для застосування ЛЗ: у комбінації з низькою дозою ритонавіру та іншими АРВ ЛЗ для лікування пацієнтів, інфікованих ВІЛ-1; для лікування інфекції ВІЛ-1 у дорослих пацієнтів, яким раніше вже застосовували АРВ - лікування, включаючи тих пацієнтів, які отримували інтенсивну АРВ - терапію ^{БНФ}; для лікування інфекції ВІЛ-1 у дорослих та дітей віком від 12 років і масою тіла не < 40 кг, яким раніше вже застосовували АРВ - терапію та у яких відсутні мутації ВІЛ-1, що спричиняють резистентність до дарунавіру (DRV-RAMs), при кількості РНК ВІЛ-1 у плазмі крові <100 000 копій/мл та CD4+ ≥ 100 клітин/10⁶/л.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі, яким раніше вже застосовували АРВ лікування: рекомендована доза - 600 мг 2 р/добу в комбінації зі 100 мг ритонавіру 2 р/добу ^{БНФ} під час прийому їжі; для пацієнтів, у яких відсутні мутації ВІЛ-1, що спричиняють резистентність до дарунавіру (DRV-RAMs)¹, при кількості РНК ВІЛ-1 у плазмі крові <100 000 копій/мл та з кількості CD4+ ≥ 100 клітин/10⁶/л - режим дозування 800 мг 1 р/добу в комбінації зі 150 мг кобіцистату або 100 мг ритонавіру 1 р/добу ^{БНФ} під час вживання їжі; дорослі, яким раніше не застосовували АРВ лікування: 800 мг 1 р/добу у комбінації зі 150 мг кобіцистату або 100 мг ритонавіру ^{БНФ}; комбінацію приймають під час вживання їжі; діти, яким раніше не застосовували АРВ лікування від 12 до 17 років та масою тіла не <40 кг) - 800 мг 1 р/добу у комбінації зі 100 мг ритонавіру ^{БНФ}; комбінацію приймають під час вживання їжі; діти, яким раніше вже застосовували АРВ (від 12 до 17 років та масою тіла не < 40 кг) у яких відсутні мутації ВІЛ-1, що спричиняють резистентність до дарунавіру (DRV-RAMs)¹, при кількості РНК ВІЛ-1 у плазмі крові <100 000 копій/мл та з кількістю CD4+ ≥100 клітин/10⁶/л - 800 мг 1 р/добу у комбінації зі 100 мг ритонавіру 1 р/добу ^{БНФ} під час вживання їжі; діти, яким раніше не застосовували АРВ лікування (від 3 до 17 років з масою тіла не < 15 кг): ³ маса тіла 15 кг - < 30 кг, доза 600 мг дарунавіру/100 мг ритонавіру 1 р/добу; маса тіла 30 кг - < 40кг, доза 675 мг дарунавіру/100 мг ритонавіру 1 р/добу; маса тіла < 40кг, доза 800 мг дарунавіру/100 мг ритонавіру 1 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: герпес, тромбоцитопенія, нейтропенія, анемія, підвищення кількості еозинофілів, лейкопенія, с-м імунного відновлення, гіперчутливість (до ЛЗ), гіпотироїдизм, підвищення рівня тиреотропіну в крові, ліподистрофія (включаючи ліпогіпертрофію, ліподистрофію, ліпоатрофію), гіпертригліцеридемія, гіперхолестеринемія, гіперліпідемія, ЦД, подагра, анорексія, зниження апетиту, зниження маси тіла, збільшення маси тіла, гіперглікемія, резистентність до інсуліну, зниження ліпопротеїнів високої щільності, збільшення апетиту, полідипсія, підвищення рівня ЛДГ в крові, безсоння, депресія, сплутаність свідомості, дезорієнтація, тривога, емоційна нестабільність, розлади сну, анормальні сни, нічні кошмари, зниження лібідо, неспокійний стан, головний біль, периферична нейропатія, запаморочення, синкопе, судоми, летаргія, парестезія, гіпоестезія, агевзія, дисгевзія, порушення уваги, погіршення пам'яті, сонливість, порушення ритму фаз сну, розлади зору, гіперемія кон'юнктиви, сухість очей, вертиго, г. ІМ, стенокардія, подовження інтервалу QT, синусова брадикардія, тахікардія, відчуття серцебиття, АГ, припливи крові, диспное, кашель, носова кровотеча, ринорея, подразнення глотки, діарея, нудота, блювання, абдомінальний біль, підвищення рівня амілази крові, диспепсія, абдомінальне розтягнення, метеоризм, панкреатит, гастрит, ГЕРХ, афтозний стоматит, стоматит, позиви до блювання, блювання кров'ю, сухість ротової порожнини, абдомінальний дискомфорт, запор, підвищення рівня ліпаз, відрижка, дизестезія, хейліт, сухість губ, обкладений язик, підвищення рівня аланінамінотрансферази, підвищення рівня аспартатамінотрансферази, гепатит, цитолітичний гепатит, печінковий стеатоз, гепатомегалія, підвищення рівня трансаміназ, підвищення рівня білірубину крові, підвищення рівня лужної фосфатази, підвищення рівня γ-глутамілтрансферази, висипання (включаючи макульозні, макулопапульозні, папульозні, еритематозні та сверблячі висипання), свербіж, ангіоедема, генералізовані висипання, алергічний дерматит, кропив'янка, дерматит, екзема, еритема, гіпергідроз, нічна пітливість, алопеція, акне, себорейний дерматит, ураження шкіри, ксеродерма, сухість шкіри, пігментація нігтів, мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, г. генералізований екзантематозний пустульоз, міалгія, остеонекроз, спазми м'язів, м'язова слабкість, ригідність, артрити, артралгія, скутість рухів у суглобах, біль у кінцівках, остеопороз, підвищення рівня креатинфосфокінази крові, ГНН, нефролітіаз, підвищення рівня креатиніну крові, зниження ниркової КлКр, протеїнурія, білірубінурія, дизурія, ноктурія, полакіурія, еректильна дисфункція, гінекомастія, астенія, стомлюваність, пірексія, біль у грудній клітці, периферичний набряк, нездужання, застуда, погане самопочуття, відчуття жару, роздратованість, біль, сухість шкіри.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до речовин, що входять до складу препарату; тяжка печінкова недостатність (клас С за Чайлдом-П'ю), комбінація рифампіцину та ЛЗ при одночасному застосуванні з низькою дозою ритонавіру; комбінація лопінавіру/ритонавіру протипоказана до одночасного застосування з ЛЗ; одночасне застосування з рослинними препаратами, що містять екстракт звіробію (*Hypericum perforatum*); одночасне застосування ЛЗ з низькою дозою ритонавіру та активними субстанціями, кліренс яких значною мірою визначається активністю ізоферменту CYP3A4 та збільшення концентрації яких у плазмі пов'язано з розвитком серйозних та/або загрозливих для життя побічних ефектів: альфузозин (антагоніст α1-адренорецепторів); аміодарон, бепридил, дронедазон, івабрадин, хінідин, ранолазин (антиаритмічні/антиангінальні ЛЗ); астемізол,

терфенадин (антигістамінні препарати); колхіцин при застосуванні пацієнтам з нирковою та/або печінковою недостатністю (засіб проти подагри); препарати, що містять алкалоїди ріжків (дигідроерготамін, ергометрин, ерготамін та метилергоновін); елбасвір/гразопревір (протівірусні засоби прямої дії проти ВГС); цисаприд (препарати, що збільшують моторику травного тракту); дапоксетин; домперидон; налоксегол; луразидон, пімозид, кветіапін, сертиндол, (антипсихотики/нейролептики); тріазолам, пероральний мідазолам (седативні/снодійні), силденафіл, що застосовується для лікування легеневої артеріальної гіпертензії, аванафіл (інгібітори фосфодієстерази 5-го типу); симвастатин, ловастатин (інгібітори HMG-CoA-редуктази) та ломітапід; дабігатран, тикагрелор (антитромбоцитарні препарати).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1,2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДАНАВІР	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у конт.	400мг	№60	279,55	27,96/\$
	ДАНАВІР	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у конт.	600мг	№60	205,00	27,96/\$
	ДАРУНАВІР КРКА	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; контроль серії (тільки фізичні та хімічні методи контролю)), Словенія	табл., вкриті п/о у фл.	400мг, 800мг	№30x2, №30x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДАРУНАВІР КРКА	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії; контроль серії (тільки фізичні та хімічні методи контролю)), Словенія	табл., вкриті п/о у фл. в кор.	600мг	№30x2	285,31	30,57/€
	ПРЕЗИСТА®	Янссен-Сілаг С.п.А. (первинна та вторинна упаковка, випуск серії)/Янссен Орто ЛЛС (виробництво нерозфасованого продукту), Італія/США	табл., вкриті п/о у фл.	400мг	№60	496,99	24,65/\$
	ПРЕЗИСТА®	Янссен-Сілаг С.п.А. (первинна та вторинна упаковка, випуск серії)/Янссен Орто ЛЛС (виробництво нерозфасованого продукту), Італія/США	табл., вкриті п/о у фл.	600мг	№60	496,99	24,65/\$
	ПРЕЗИСТА®	Янссен-Сілаг С.п.А. (первинне та вторинне пакування, випуск серії)/Янссен Орто ЛЛС (виробництво нерозфасованого продукту), Італія/США	табл., вкриті п/о у фл.	800мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	

17.5.3.4. Інгібітори інтегрази

- **Ралтегравір (Raltegravir)**

Фармакотерапевтична група: J05AX08 - протівірусні засоби для системного застосування. Протівірусні засоби прямої дії.

Основна фармакотерапевтична дія: інгібітор переносу молекулярного ланцюга інтегрази, що активний проти ВІЛ-1, ралтегравір інгібує каталітичну активність інтегрази - ВІЛ-кодованого ферменту, що необхідний для реплікації вірусу; інгібування інтегрази попереджає ковалентне введення (інтеграцію) геному ВІЛ у геном клітини хазяїна; ВІЛ геноми, які не можуть інтегрувати, не здатні продукувати нові вірусні частинки, внаслідок чого відбувається пригнічення процесу інтеграції та попередження подальшого поширення вірусної інфекції в організмі.

Показання для застосування ЛЗ: лікування дорослих та дітей з масою тіла не <25 кг з ВІЛ-1 інфекцією^{БНФ} у комбінації з іншими АРВ препаратами; табл. жув.: лікування дітей та підлітків віком від 2 до 12 р.з ВІЛ-1-інфекцією^{БНФ} у комбінації з іншими АРВ препаратами.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначати у комбінації з іншими антиретровірусними ЛЗ; рекомендована доза для дорослих та дітей з масою тіла не <25 кг - по 400 мг 2 р/добу^{БНФ} незалежно від прийому їжі; жувати, подрібнювати або ділити табл. на частини не рекомендовано; якщо дитина не може проковтнути табл., вкриті п/о, можливе застосування іншої лікарської форми - табл. жув.; табл. жув.: максимальна доза - 300 мг 2 р/день; рекомендована доза залежно від ваги з розрахунку 6 мг/кг/доза 2 р/день: 11-14 кг - 75 мг 2 р/день; 14-20 кг - 100 мг 2 р/день; 20-28 кг - 150 мг 2 р/день; 28-40 кг - 200 мг 2 р/день; 40 кг і більше - 300 мг 2 р/день.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: генітальний герпес, фолікуліт, гастроентерит, простий герпес, інфекція, спричинена вірусом герпесу, оперізувальний лишай, грип, абсцес лімфатичного вузла, контагіозний моллюск, назофарингіт, інфекція верхнього відділу ДШ, папіломи шкіри, анемія, анемія, пов'язана з дефіцитом заліза, біль у лімфатичних вузлах, лімфаденопатія, нейтропенія, тромбоцитопенія, с-м відновлення

імунітету, підвищена чутливість до препарату, підвищена чутливість, зниження апетиту, кахексія, ЦД, дисліпідемія, гіперхолестеринемія, гіперглікемія, гіперліпідемія, гіперфагія, посилення апетиту, полідипсія, розлад обміну жирів в організмі, незвичні сновидіння, безсоння, нічні кошмари, незвична поведінка, незвичні сновидіння, депресія, безсоння, розумові розлади, суїцидальні спроби, відчуття страху, сплутаність свідомості, депресивний настрій, глибока депресія, інтрасомнічний розлад, зміна настрою, напад паніки, розлади сну, суїцидальні думки, суїцидальна поведінка (зокрема у пацієнтів з уже існуючою психіатричною хворобою в анамнезі), запаморочення, головний біль, психомоторна гіперактивність, амнезія, с-м тунелю зап'ястка, розлад когнітивної функції, порушення уваги, постуральне запаморочення, дисгевзія, гіперсомнія, гіпестезія, летаргічний стан, порушення пам'яті, мігрень, периферична невропатія, парестезія, сонливість, головний біль напруження, тремор, погана якість сну, порушення зору, вертиго, дзвін у вухах, прискорене серцебиття, синусова брадикардія, шлуночкові екстрасистоли, припливи, гіпертензія, дисфонія, носові кровотечі, закладеність носа, здуття живота, абдомінальний біль, діарея, метеоризм, нудота, блювання, диспепсія, гастрит, відчуття дискомфорту у животі, біль у верхній частині живота, болючість у животі, відчуття дискомфорту в аноректальній ділянці кишечника, запор, сухість у роті, відчуття дискомфорту в епігастральній ділянці, ерозивний дуоденіт, відрижка, ГЕРХ, гінгівіт, глосит, одинофагія, г. панкреатит, пептична виразка, ректальні крововиливи, гепатит, гепатичний стеатоз, гепатит алкогольний, печінкова недостатність, висип, акне, алопеція, акнеподібний дерматит, сухість шкіри, еритема, кахексія обличчя, гіпергідроз, ліпоатрофія, ліподистрофія набута, ліпогіпертрофія, потовиділення вночі, прурито, свербіж, свербіж генералізований, висип макулярний, висип макуло-папулярний, висип сверблячий, ураження шкіри, кропив'янка, ксеродерма, с-м Стівенса-Джонсона, медикаментозний висип з еозинофілією та системними симптомами, артралгія, артрит, біль у спині, біль у боку, біль у м'язах та кістках, міалгія, біль у шиї, остеопенія, біль у кінцівках, тендиніт, рабдоміоліз, НН, нефрит, нефролітаз, ніктурія, кіста нирок, порушення ф-цій нирок, тубулоінтерстиціальний нефрит, еректильна дисфункція, гінекомастія, симптоми менопаузи, астенія, підвищена втомлюваність, підвищення t° тіла, дискомфорт у грудні, озноб, набряк обличчя, збільшення жирової тканини, відчуття нервозності, нездужання, пухлина під нижньою щелепою, периферичний набряк, біль, підвищений рівень АЛТ, атипова кількість лімфоцитів, підвищений рівень АСТ, підвищений рівень тригліцеридів у крові, підвищений рівень ліпази, підвищений рівень панкреатичної амілази в крові, знижений рівень абсолютної кількості нейтрофілів, підвищення алкалінфосфатази, зниження рівня альбуміну в крові, підвищений рівень амілази в крові, підвищений рівень білірубіну в крові, підвищений рівень холестерину в крові, підвищений рівень креатиніну в крові, підвищений рівень глюкози в крові, підвищений рівень азоту сечовини в крові, підвищений рівень креатинфосфокінази, підвищений рівень глюкози в крові у стані натще, наявність глюкози в сечі, підвищений рівень ліпопротеїнів високої щільності, підвищений рівень міжнародного нормалізованого співвідношення, підвищений рівень ліпопротеїнів низької щільності, знижена кількість тромбоцитів, наявність еритроцитів у сечі, збільшення об'єму талії, збільшення маси тіла, знижена кількість лейкоцитів, випадкове передозування.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якої допоміжної речовини.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,8 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АРТЕГРИС®	ТОВ "ЛЮМ'ЄР ФАРМА" (виробництво з продукції in bulk виробника: Мерк Шарп і Доум Б.В., Нідерланди), Україна	табл., вкриті п/о у фл.	400мг	№60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	ІСЕНТРЕСС	Мерк Шарп і Доум Б.В. (первинне та вторинне пакування, дозвіл на випуск серії)/МСД Інтернешнл ГмбХ (філія Сінгапур) (виробник нерозфасованої продукції та контроль якості)/МСД Інтернешнл ГмбХ / МСД Ірландія (Беллідайн), Нідерланди/Сінгапур/Ірландія	табл., вкриті п/о у фл.	400мг	№60	152,55	27,74/\$
	ІСЕНТРЕСС	Патеон Фармасьютікалз Інк. (виробник нерозфасованої продукції)/Мерк Шарп і Доум Б.В. (первинне та вторинне пакування, дозвіл на випуск серії), США/Нідерланди	табл. жув. у фл.	25мг	№60	342,97	26,79/\$
	ІСЕНТРЕСС	Патеон Фармасьютікалз Інк. (виробник нерозфасованої продукції)/Мерк Шарп і Доум Б.В. (первинне та вторинне пакування, дозвіл на випуск серії), США/Нідерланди	табл. жув. у фл.	100мг	№60	169,09	26,79/\$

- **Долутеґравір (Dolutegravir)**

Фармакотерапевтична група: J05AX12 - противірусні ЛЗ для системного застосування; противірусні ЛЗ прямої дії; інші противірусні ЛЗ.

Основна фармакотерапевтична дія: пригнічує ВІЛ-інтегразу, зв'язуючись з активним центром ферменту інтегрази і блокуючи етап інтеграції ретровірусної ДНК, який є основним для циклу реплікації ВІЛ.

Показання для застосування ЛЗ: показаний в комбінації з іншими антиретровірусними ЛЗ для лікування дорослих та дітей від 12 років, інфікованих ВІЛ^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують р/ос; дорослим пацієнтам, інфікованим ВІЛ-1, без документально підтвердженої або клінічно підозрюваної резистентності до ЛЗ класу інгібіторів інтегрази: рекомендована доза - 50 мг 1 р/день^{БНФ} (можна застосовувати й 2 р/добу при одночасному застосуванні з ефавіренцом, невірапіном, типранавір/ритонавіром або рифампіцином); дорослим пацієнтам, інфікованим ВІЛ-1, з резистентністю до ЛЗ класу інгібіторів інтегрази (документально підтвердженою або клінічно підозрюваною): 50 мг 2 р/добу^{БНФ}; для дітей віком від 12 до 17 років, маса тіла яких щонайменше 40 кг, інфікованих ВІЛ-1, без резистентності до ЛЗ класу інгібіторів інтегрази рекомендована доза - 50 мг 1 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: підвищена чутливість, с-м імунної реактивації; безсоння, патологічні сни, депресія, тривога; суїцидальні думки або спроби самогубства (особливо у пацієнтів з депресією або психічним захворюванням в анамнезі); головний біль; запаморочення; нудота, діарея; блювання, метеоризм, біль у верхній частині живота, біль у животі, відчуття дискомфорту в животі; гепатит; г. печінкова недостатність, висип, свербіж, втомлюваність, підвищення рівнів АЛТ та/або АСТ, підвищення рівня КФК; артралгія; міалгія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до долутегравіру або до будь-якої допоміжної речовини ЛЗ; одночасне застосування з ЛЗ з вузьким терапевтичним вікном, які є субстратами переносника органічних катіонів 2 (ОСТ2), включаючи, проте не обмежуючись, фампридином (також відомим як далфампридин).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 50 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДОЛУТЕГРАВІР	Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія	табл. у конт.	50мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДОЛУТЕГРАВІР	Ауробіндо Фарма Лімітед, Юніт-VII, Індія	табл., вкриті п/о у фл.	50мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДОЛУТЕГРАВІР (У ВИГЛЯДІ НАТРІЮ) 50 МГ ТАБЛЕТКИ DOLUTEGRAVIR (AS SODIUM) 50 MG TABLETS	Майлан Лабораторіз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у фл.	50мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНСТГРА	Емкур Фармасьютикалс Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у конт.	50мг	№30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕГРАД	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10x8	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТЕГРАД	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у конт.	50мг	№30	17,42	26,12/\$
	ТІВІКЕЙ	Глаксо Веллком С.А. (виробник для пакування та випуску серії)/Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед (виробник нерозфасованої продукції), Іспанія/Велика Британія	табл., вкриті п/о у фл.	50мг	№30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	

17.5.4. Засоби для лікування вірусних гепатитів

17.5.4.1. Противірусні засоби для лікування гепатиту С

- **Дасабувір (Dasabuvir) ****

Фармакотерапевтична група: J05A P09 - противірусні засоби для системного застосування. Противірусні засоби прямої дії. Противірусні засоби для лікування гепатиту С.

Основна фармакотерапевтична дія: нуклеозидний інгібітор РНК-залежної РНК-полімерази вірусу гепатиту С, що кодується геном NS5B та відіграє ключову роль у реплікації вірусного геному, одночасне застосування дасабувіру з омбітасвіром/паритапревіром/ритонавіром поєднує три противірусні препарати прямої дії з різними механізмами дії та профілями резистентності, що не перекриваються, мішенню цих препаратів є вірус гепатиту С на багатьох етапах життєвого циклу вірусу.

Показання для застосування ЛЗ: лікування хр. гепатиту С (ХГС) у дорослих, у комбінації з іншими ЛЗ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза дасабувіру - 250 мг 2 р/добу (зранку і ввечері).^{БНФ}, з метою максимізації абсорбції приймати разом з їжею без урахування вмісту жиру або калорій, ЛЗ призначати в комбінації з іншими ЛЗ для лікування ВГС; рекомендовані схеми лікування та їх тривалість залежно від популяції

пацієнтів: генотип вірусу 1b, без цирозу або з компенсованим цирозом - дасабувір + омбітасвір/паритапревір/ритонавір 12- та 8- тижневий курс можна розглянути для раніше не лікованих пацієнтів, інфікованих генотипом вірусу 1b, з фіброзом від мінімального до помірного; генотип вірусу 1a, без цирозу - дасабувір + омбітасвір/паритапревір/ритонавір + рибавірин 12 тижнів; генотип вірусу 1a, з компенсованим цирозом - дасабувір + омбітасвір/паритапревір/ритонавір + рибавірин 24 тижні; у разі пропуску прийому дози дасабувіру призначену дозу прийняти протягом наступних 6 год, якщо від звичайного часу прийому дасабувіру пройшло > 6 год, то пацієнт має прийняти наступну дозу згідно зі звичайною схемою прийому.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анемія, безсоння, нудота, діарея; блювання, свербіж шкіри, ангіоневротичний набряк, зневоднення, астенія, втомлюваність, декомпенсація функції печінки та печінкова недостатність, анафілактичні реакції та інші реакції гіперчутливості (включаючи набряк язика та губ), мультиформна еритема.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до дасабувіру або до будь-якого неактивного компонента препарату, помірне або тяжке порушення функції печінки (класи В та С за Чайлдом - П'ю), одночасне застосування з препаратами, що містять етинілестрадіол, наприклад, такими, що містяться у більшості р/ос контрацептивів або контрацептивних вагінальних кільцях, одночасне застосування з іншими ЛЗ, кліренс яких значною мірою залежить від СYP3A і підвищення плазмових рівнів яких асоціюється з розвитком серйозних та небезпечних для життя небажаних явищ, до таких належать: альфузозину гідрохлорид, апалутамід, аміодарон, астемізол, терфенадин, блонансерин, цизаприд, колхіцин (для пацієнтів з порушенням функції нирок або печінки), дизопірамід, дронедарон, ерготамін, дигідроерготамін, ергоновін, метилергометрин, фузидова кислота, ловастатин, симвастатин, аторвастатин, ломітапід, луразидон, р/ос мідазолам, тріазолам, пімозид, кветіапін, хінідин, ранолоазин, салметерол, силденафіл (для лікування легеневої АГ), тікагрелор; одночасне застосування з препаратами, які є потужними чи помірними індукторами ферментів, призводить до зниження концентрації дасабувіру в плазмі та зменшення його терапевтичного ефекту (карбамазепін, фенітоїн, фенобарбітал, ефавіренз, невірапін, етравірин, ензалутамід, мітотан, рифампіцин, препарати рослинного походження, що містять звіробій продірявлений (*Hypericum perforatum*)), одночасне застосування з препаратами, які є потужними інгібіторами СYP2C8 (гемфіброзил) і можуть підвищувати концентрацію дасабувіру в плазмі; одночасне застосування з препаратами, які є потужними індукторами СYP2C8, може значно знизити концентрацію дасабувіру в плазмі.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,5 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ВІРЕЛАКІР	Еббві Айрленд НЛ Б.В. (виробництво лікарського засобу, тестування)/Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко. КГ (первинне та вторинне пакування, випуск серії), Ірландія/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл. в кор.	250мг	№2x7x4	81,04	26,02/\$

Комбіновані препарати

- **Омбітасвір + паритапревір + ритонавір (Ombitasvir + paritaprevir + ritonavir) ****

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ВІЛЬВІО	Фурньє Лабораторіз Айрленд Лімітед (вир-во лікарського засобу, тестування)/Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко. КГ (перв. та втор. пак., випуск серії), Ірландія/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл. в кор.	12,5мг/75мг/50мг	№2x7x4	25521,28	26,02/\$

17.6. Протипротозойні засоби

17.6.1. Засоби для лікування та профілактики малярії

- **Тетрациклін (Tetracyclin)** (див. п. 17.2.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Доксициклін (Doxycycline)** * (див. п. 17.2.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

17.6.2. Засоби для лікування амебіазу

Для лікування амебіазу рекомендовано призначати похідні імідазолу – метронідазол, тинідазол, орнідазол. Однак необхідно врахувати, що ці ЛЗ не ефективні по відношенню до цист амеби, при безсимптомному носійстві.

- **Метронідазол (Metronidazole)** * (див. п. 17.2.9. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

- **Тинідазол (Tinidazole)** (див. п. 17.2.9. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Орнідазол (Ornidazole)** (див. п. 17.2.9. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Секнідазол (Secnidazole)**

Фармакотерапевтична група: P01AB07 - протипротозойні засоби. Похідні нітроїмідазолу.

Основна фармакотерапевтична дія: антибактеріальна та протипротозойна дія; напівсинтетичне похідне нітроїмідазолу; характеризується бактерицидним (проти Гр (+) та Гр (-) анаеробних бактерій) та амебіцидним (внутрішньо- та зовнішньокишечним) ефектом, особливо активний щодо *Trichomonas vaginalis*, *Entamoeba histolytica*, *Giardia lamblia*, проникаючи всередину клітини мікроорганізму, активується у результаті відновлення 5-нітрогрупи, за рахунок чого взаємодіє з клітинною ДНК, відбувається порушення її спіралеподібної структури та руйнування ниток, інгібування нуклеотидного синтезу та загибель клітини.

Показання для застосування ЛЗ: трихомонадні уретрити та вагініти (спричинені *Trichomonas vaginalis*); бактеріальний вагіноз; амебіаз кишечника (спричинений *Entamoeba histolytica*); амебіаз печінки (спричинений *Entamoeba histolytica*); лямбліоз (спричинений *Giardia lamblia*).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: трихомонадні уретрити та вагініти, бактеріальний вагіноз - 2г одноразово; амебіаз кишечника: г. амебіаз - 2 г одноразово; безсимптомний амебіаз, включаючи осередкову та цистну форми: щоденно по 2 г за 1 прийом протягом 3 днів; амебіаз печінки: щоденно по 1,5 г за 1 або 2 прийоми, протягом 5 днів; лямбліоз: 2 г 1 р/добу протягом 3 днів; діти: амебіаз кишечника: г. амебіаз -30 мг/кг маси тіла одноразово; безсимптомний амебіаз, включаючи осередкову та цистну форми: щоденно за 1 або 2 прийоми в дозі 30 мг/кг маси тіла протягом 3 днів; амебіаз печінки - щоденно за 1 або 2 прийоми у дозі 30 мг/кг маси тіла протягом 5 днів; лямбліоз - з розрахунку 30 мг/кг маси тіла (1-1,5 г) одноразово.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: загальна слабкість; порушення травлення, нудота, біль у ділянці шлунка, металевий присмак у роті, глосит, стоматит, помірна оборотна лейкопенія, оборотна нейтропенія, р-ції гіперчутливості, включаючи гіперемію, висипання, кропив'янку.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до секнідазолу та інших похідних імідазолу; органічні захворювання ЦНС.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	САМІТОЛ®	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№4x1	110,00	24,25/\$
	СЕКНІДОКС	ЛАБОРАТОРІЯ БЕЙЛІ-КРЕАТ - ВЕРНУЙЄ, Франція	табл., вкриті п/о у бл.	1г	№2x1	140,89	28,67/\$

17.6.3. Засоби для лікування трихомоніазу

- **Метронідазол (Metronidazole)** * (див. п. 17.2.9. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: уrogenітальний трихомоніаз^{ВООЗ БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: уrogenітальний трихомоніаз^{БНФ ВООЗ} на курс лікування 10 днів жінкам - 500 мг 2р/добу, жінкам необхідно додатково призначити метронідазол у формі вагінальних свічок; статевий партнер повинен лікуватись одночасно, незважаючи на наявність або відсутність у нього клінічних ознак трихомонадної інфекції, навіть якщо результат лабораторних тестів негативний; чоловіки: на курс лікування протягом 10 днів по 500 мг/добу, у виняткових випадках - підвищити добову дозу до 750 мг-1 г.

- **Тинідазол (Tinidazole)** (див. п. 17.2.9. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: уrogenітальний трихомоніаз^{БНФ} у чоловіків та жінок.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі - 2 г р/ос одноразово; діти старше 3 років - по 50-75 мг/кг маси тіла одноразово; за необхідності прийом препарату можна повторити у тій самій дозі.; при підтвердженні інфікування *Trichomonas vaginalis* рекомендовано одночасне лікування партнера.

- **Орнідазол (Ornidazole)** (див. п. 17.2.9. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: трихомоніаз (сечостатеві інфекції у жінок і чоловіків, спричинені *Trichomonas vaginalis*).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: курс лікування - 1 день: 1500 мг одноразово ввечері; курс лікування - 5 днів: 1000 мг (по 500 мг вранці і ввечері); дітям призначити 1 дозу препарату 25 мг/кг.

- **Секнідазол (Secnidazole)** (див. п. 17.6.2. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: трихомонадні уретрити та вагініти (спричинені *Trichomonas vaginalis*)

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі: трихомонадні уретрити та вагініти - 2г одноразово;

17.6.4. Засоби для лікування токсоплазмозу

- **Спіраміцин (Spiramycin)** (див. п. 17.2.4. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

17.6.5. Засоби для лікування лямбліозу

- **Метронідазол (Metronidazole)** * (див. п. 17.2.9. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Тинідазол (Tinidazole)** (див. п. 17.2.9. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Орнідазол (Ornidazole)** (див. п. 17.2.9. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")
- **Фуразолідон (Furazolidone)** (див. п. 17.2.12. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

17.6.6. Засоби для лікування лейшманіозу

- **Амфотерицин В (Amphotericin B)** * (див. п. 17.4.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

17.7. Антигельмінтні засоби

17.7.1. Засоби, що застосовуються при нематодозах

17.7.1.1. Ентеробіоз

- **Мебендазол (Mebendazole)** *

Фармакотерапевтична група: P02CA01- протигельмінтні засоби. Похідні бензімідазолу.

Основна фармакотерапевтична дія: протигельмінтний засіб широкого спектра дії, діє локально у просвіті кишечника, перешкоджаючи утворенню клітинного тубуліну у гельмінтів, що призводить до порушення процесів утилізації глюкози і травлення та автолізу паразита.

Показання для застосування ЛЗ: лікування інвазій: ентеробіоз, аскаридоз, анкілостомоз, стронгілоїдоз, трихоцефаліоз, теніоз, некатороз^{БНФ, ВООЗ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос: при ентеробіозі дорослим і дітям старше 2 років-100 мг одноразово^{БНФ}; для запобігання повторної інвазії прийом повторюють через 2^{БНФ} або 4 тижні в тій же дозі; при аскаридозі, трихоцефалезі, анкілостомозі та змішаних гельмінтозах незалежно від маси тіла і віку призначають дітям, старшим 2 років та дорослим по 100 мг 2 р/добу (вранці та ввечері) протягом 3 днів^{БНФ}; при теніозі та стронгілоїдозі - дорослим по 200 мг 2 р/добу протягом 3 днів; дітям старше 2 років - по 100 мг 2 р/добу протягом 3 днів^{БНФ}; під час лікування не треба дотримуватися дієти та застосовувати проносні засоби.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: абдомінальний дискомфорт, діарея, метеоризм; висип, гіперчутливість, включаючи анафілактичні та анафілактоїдні реакції; гепатит, підвищення активності печінкових ферментів; нейтропенія; судоми, запаморочення; токсичний епідермальний некроліз, порушення функції печінки, с-м Стівенса-Джонсона, екзантема, набряк Квінке, кропив'янка, алопеція.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до мебендазолу або до будь-якого з компонентів препарату; вагітність; період годування груддю.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ВЕРМОКС	Гедеон Ріхтер Румунія А.Т./ВАТ "Гедеон Ріхтер" (додатковий виробник, відповідальний за випуск серії, оформлення сертифікату якості), Румунія/Угорщина	табл. у бл.	100мг	№6x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВЕРМОКС®	Люсомедикамента Сосьедаде Текніка Фармацеутика, С.А., Португалія	табл. у бл.	100мг	№6x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Албендазол (Albendazole)** *

Фармакотерапевтична група: P02CA03 - антигельмінтні засоби, що застосовуються при нематодозах. Похідні бензімідазолу.

Основна фармакотерапевтична дія: антипротозойна та антигельмінтна; діє як на кишкові, так і на тканинні паразити у формі яєць, личинок та дорослих гельмінтів; антигельмінтна дія альбендазолу зумовлена пригніченням полімеризації тубуліну, що призводить до порушення метаболізму та загибелі гельмінтів; виявляє активність проти таких кишкових паразитів: нематоди - *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, *Enterobius vermicularis*, *Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*, *Strongyloides stercoralis*, *Cutaneous Larva Migrans*; цестоди - *Hymenolepis nana*, *Taenia solium*, *Taenia saginata*; трематоди - *Opisthorchis viverrini*, *Clonorchis sinensis*; протозої - *Giardia lamblia* (*intestinalis* або *duodenalis*); виявляє активність щодо тканинних паразитів, включаючи цистний та альвеолярний ехінокози, що спричиняються інвазією *Echinococcus granulosus* та *Echinococcus multilocularis* відповідно; є ефективним засобом для лікування нейроцистицеркозу, спричиненого личинковою інвазією *Taenia solium*, капіляріозу, спричиненого *Capillaria philippinensis*, та гнатостомозу, спричиненого інвазією *Gnathostoma spinigerum*; знищує цисти або значно зменшує їхні розміри (до 80%) у пацієнтів з гранулярним ехінокозом.

Показання для застосування ЛЗ: кишкові форми гельмінтозів та шкірний с-м *Larva Migrans* (короткострокове лікування малими дозами): ентеробіоз, трихоцефаліоз^{ВООЗ}, анкілостомоз^{БНФ} та некатороз^{ВООЗ}, гіменолепідоз, теніоз, стронгілоїдоз^{БНФ}, аскаридоз^{БНФ}, трихоцефаліоз^{ВООЗ}, клонорхоз, опісторхоз, шкірний с-м *Larva Migrans*^{ВООЗ}, лямбліоз у дітей; системні гельмінтні інфекції (тривале лікування високими дозами): цистний ехінокоз (спричинений *Echinococcus granulosus*): при неможливості хірургічного втручання; перед хірургічним втручанням; після операції, якщо передопераційне лікування було коротким^{ВООЗ БНФ}, якщо спостерігається розповсюдження гельмінтів або під час операції були знайдені живі форми; після проведення черезшкірного дренажу цист з

діагностичною або терапевтичною метою; альвеолярний ехінококоз (спричинений *Echinococcus multilocularis*): при неоперабельному захворюванні, у випадках місцевих або віддалених метастазів: після паліативного хірургічного втручання; після радикального хірургічного втручання ^{вооз БНФ} або пересадження печінки; нейроцистицеркоз ^{вооз} (спричинений личинками *Taenia solium*): при наявності поодиноких або множинних цист або гранулематозного ураження мозку; при рацемозних цистах; капіляріоз ^{вооз} (спричинений *Capillaria philippinensis*), гнатостомоз (спричинений *Gnathostoma spinigerum* та спорідненими видами), трихінельоз ^{вооз} (спричинений *Trichinella spiralis* та *T.pseudospiralis*), токсокароз (спричинений *Toxocara canis* та спорідненими видами).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі та діти від 3 років: ентеробіоз, анкілостомоз, некатороз, аскаридоз, трихоцефальоз - 400 мг 1 р/добу (одноразово), ^{вооз} стронгілоїдоз, теніоз, гіменолепідоз - 400 мг 1 р/добу 3 дні ^{вооз} (при гіменолепідозі - повторний курс лікування в інтервалі з 10-го по 21-й день після попереднього курсу); клонорхоз, опісторхоз - 400 мг 2 р/добу 3 дні, шкірний с-м Larva Migrans - 400 мг 1 р/добу 1-3 дні ^{вооз}; діти від 3 до 12 років: лямбліоз - 400 мг 1 р/добу 5 днів; системні гельмінтні інфекції: застосувати дорослим та дітям від 6 років, дітям до 6 років призначення препарату у високих дозах не рекомендується, режим дозування встановлює лікар індивідуально залежно від віку, маси тіла, а також ступеня тяжкості інфекції; доза для пацієнтів при масі тіла > 60 кг - 400 мг 2 р/добу; при масі тіла <60 кг призначати з розрахунку 15 мг/кг/добу, цю дозу розділити на 2 прийоми, МДД- 800 мг; цистний ехінококоз: 28 днів, 28-денний цикл призначати повторно (загалом 3 рази) після перерви у 14 днів; альвеолярний ехінококоз: 28 днів, другий 28-денний курс після 2-тижн.перерви у застосуванні; нейроцистицеркоз:прийом - від 7 до 30 днів, другий курс повторити після 2-тижн. перерви у застосуванні; капіляріоз - 400 мг 1 р/добу 10 днів; гнатостомоз - 400 мг 1 р/добу 10-20 днів; трихінельоз, токсокароз - 400 мг 2 р/добу 5-10 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості, включаючи висипання, свербіж та кропив'янка; головний біль, запаморочення, симптоми з боку верхніх відділів ШКТ (епігастральний біль, нудота, блювання) та діарея, підвищення рівня печінкових ферментів, поліморфна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, лейкопенія, панцитопенія, апластична анемія, агранулоцитоз, підвищення рівня печінкових ферментів від легкого до помірного ступеня, гепатит, обернена алопеція (потоншення волосся та помірна втрата волосся), гарячка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату, вагітність, період лактації, період планування вагітності, жінкам репродуктивного віку застосовувати ефективні негормональні контрацептивні засоби під час та протягом 1 міс. після лікування препаратом.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,4 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АЛЬБЕЛА®	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	табл. у бл.	400мг	№1x1, №1x3, №3x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЛЬБЕЛА®	ТОВ "Кусум Фарм", Україна	табл. у бл.	400мг	№1x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЛЬБЕЛА®	ТОВ "Кусум Фарм", Україна	табл. у бл.	400мг	№1x1	13,00	
	АЛЬБЕЛА®	ТОВ "Кусум Фарм", Україна	табл. у бл.	400мг	№3x1	18,63	
	АЛЬБЕНДАЗОЛ	ТОВ "Тернофарм", Україна	табл. жув. у бл.	400мг	№3x1	23,93	
	АЛЬДАЗОЛ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№3x1	18,12	
	АНГЕЛЬМЕКС	ТОВ "Агрофарм", Україна	табл. жув. у бл.	400мг	№3x1	16,00	
	ФАРМОКС	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	сусп. орал. у фл. по 10мл	400мг/10мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	АЛЬБЕНЗІ	Індоко Ремедіс Лімітед, Індія	табл. жув. у бл.	400мг	№3x1, №1x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВОРМІЛ	Гракуре Фармасьютикалс ЛТД, Індія	сусп. орал. у фл. по 10мл	200мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВОРМІЛ	Мепро Фармасьютикалс Приват Лімітед, Індія	табл. д/жув. у бл.	400мг	№3x1	21,94	26,12/\$
	ВОРМІЛ	Мепро Фармасьютикалс Приват Лімітед, Індія	табл. д/жув. у бл.	400мг	№1x1	24,03	26,12/\$
	ВОРМСТОП	БАФНА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛІМІТЕД, Індія	табл. жув. у бл.	400мг	№3x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЗЕНТЕЛ™	ГлаксоСмітКляйн Консьюмер Хелскер Південна Африка (Пту) Лтд, Південно-Африканська Республіка	табл. у бл.	400мг	№1x1	34,70	26,69/\$
	ЗЕНТЕЛ™	Фармаклер, Франція	сусп. орал. у фл.	400мг/10мл	№1	відсутня у	

			по 10мл			реєстрі ОВЦ
--	--	--	---------	--	--	-------------

• **Пірантел (Pyrantel) ***

Фармакотерапевтична група: P02CC01 - протипаразитарні засоби, інсектициди та репеленти. Протигельмінтні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: антигельмінтний засіб, що активний проти *Enterobius vermicularis*, *Ascaris lumbricoides*, *Ancylostoma duodenale* та *Necator americanus*, призводить до нейро-м'язової блокади, паралізуючи гельмінтів, внаслідок чого вони виводяться шляхом кишкової перистальтики разом із каловими масами; є активним проти чутливих статевозрілих та статевонезрілих форм гельмінтів; не впливає на личинки гельмінтів, що мігрують через тканини.

Показання для застосування ЛЗ: ентеробіоз, аскаридоз, анкілостомоз^{ВООЗ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: ентеробіоз та аскаридоз зазвичай дозування - 10 мг/кг - ^{ВООЗ} 12 мг/кг одноразово; діти від 6 років: 125 мг/10 кг маси тіла одноразово; дорослі з масою тіла < 75 кг: 750 мг одноразово; дорослим з масою тіла > 75 кг: 1000 мг одноразово; для уникнення повторного самозараження рекомендується прийняти повторну дозу через 3 тижні після першого застосування препарату; анкілостомоз: в ендемічних районах у разі зараження *Necator americanus* чи масивної інвазії *Ancylostoma duodenale* дозування - 20 мг/кг на добу (за 1 чи 2 прийоми) протягом 2-3 днів; дітям від 6 років: 250 мг на 10 кг маси тіла на добу, дорослим з масою тіла < 75 кг: 1500 мг/добу; дорослим з масою тіла > 75 кг: 2000мг/добу; у разі помірного зараження *Ancylostoma duodenale* (що зазвичай спостерігається у неендемічних районах) може бути достатньо прийому 10 мг/кг одноразово ^{ВООЗ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анорексія, нудота, блювання, біль у животі, діарея, зниження або тимчасове підвищення рівня трансаміназ, головний біль, запаморочення, сонливість, безсоння, астенія, слабкість, підвищена втомлюваність, шкірні висипання, кропив'янка, р-ції гіперчутливості.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,75 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ПІРАНТЕЛ	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	сусп. орал. по 15мл у бан.	250мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПІРАНТЕЛ	ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна	сусп. орал. по 15мл у фл.	250мг/5мл	№1	34,12	
	ПІРАНТЕЛ - ВІШФА	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	сусп. орал. по 15мл у фл.	250мг/5мл	№1	40,90	
II.	ГЕЛЬМІНТОКС	Іннотера Шузі, Франція	табл., вкриті п/о у бл.	125мг, 250мг	№6x1, №3x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ГЕЛЬМІНТОКС	Іннотера Шузі, Франція	сусп. орал. по 15мл у фл.	125мг/2,5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПІРАНТЕЛ	Кусум Хелтхкер Пвт Лтд, Індія	табл. у бл.	250мг	№3x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПІРАНТЕЛ	Кусум Хелтхкер Пвт Лтд, Індія	табл. у бл. в упак.	250мг	№3x1x10	10,75	27,00/\$
	ПІРАНТЕЛ ПОЛЬФАРМА	Медана Фарма Акціонерне Товариство, Польща	сусп. орал. по 15мл у фл.	250мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Піперазину адипінат (Piperazine adipinate)**

Фармакотерапевтична група: P02CB01 - антигельмінтні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить протигельмінтну дію на різні види нематод, особливо на аскарид та гостриць, діє як на статевозрілих, так і на нестатевозрілих гельмінтів обох статей, спричиняючи параліч м'язів нематод, які надалі виводяться перистальтичними рухами кишечника, ступінь дегельмінтизації при застосуванні ЛЗ становить 90-95 %, а при повторному застосуванні досягає 100 %, оскільки ЛЗ не вбиває аскарид у просвіті кишечника, а тільки паралізує їхню мускулатуру, завдяки якій вони втримувалися в кишечнику, відсутня небезпека всмоктування біологічних токсичних продуктів їхнього розпаду

Показання для застосування ЛЗ: аскаридоз, ентеробіоз.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: аскаридоз - 2 р/добу протягом 2 днів за 1 год до або через 0,5-1 год після їди, разова доза для дітей 4-5 років - 500 мг, 6-8 років - 750 мг, 9-12 років - 1 г, 13-15 років - 1,5 г, дорослим та дітям від 15 років - 1,5-2 г; для лікування ентеробіозу призначають у тих самих дозах, що й при лікуванні аскаридозу, протягом 5 днів поспіль; проводять 1-3 курси терапії з перервою 7 днів; у перервах між курсами доцільно ставити на ніч клізму (для видалення гостриків із прямої кишки): дорослим із 4-5 склянок води, дітям - з 1-3 склянок з додаванням натрію гідрокарбонату (1/2 чайні ложки на склянку води).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: погіршення зору (у т.ч. затуманення зору), порушення координації рухів, бронхоспазм, біль у животі спастичного характеру, нудота, блювання, діарея, головний біль, запаморочення, сонливість, атаксія, м'язова слабкість, тремор, ейфорія, галюцинації, ністагм, парестезії, хорей, арефлексія, судоми, р-ції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання (у т.ч. кропив'янка, мультиформна еритема, пурпура), свербіж, с-м Стівенса-Джонсона та інші АР, артралгія, гарячка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена індивідуальна чутливість до діючої речовини або до інших компонентів ЛЗ, органічні захворювання ЦНС, епілепсія, нефрит, хронічна печінкова недостатність, ХНН.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 3,5 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ПІПЕРАЗИНУ АДИПІНАТ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	200мг	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПІПЕРАЗИНУ АДИПІНАТ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп. в пач.	200мг	№10x1	17,26	

17.7.1.2. Аскаридоз, трихоцефальоз, анкілостомідоз, некатороз

- **Левамізол (Levamisole) * ****

Фармакотерапевтична група: P02CE01 - протигельмінтні засоби. Засоби, що застосовуються при нематодозах. Похідні імідазотіазолу.

Основна фармакотерапевтична дія: чинить швидку антигельмінтну дію, у гангліоподібних утвореннях нематод левамізол спричиняє деполаризуючий нейром'язовий параліч, т. ч., паралізовані нематоди видалюються з організму внаслідок нормальної перистальтики кишечника протягом 24 год після прийому препарату, незважаючи на те, що левамізол в першу чергу впливає на нервово-м'язову систему нематод, цілком можливо, що в деяких гельмінтів інгібування системи фумаратредуктази також впливає на антигельмінтну ефективність левамізолу.

Показання для застосування ЛЗ: аскаридоз^{ВООЗ, БНФ}, анкілостомідоз^{ВООЗ, БНФ}, некатороз^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймати внутрішньо після їди, запиваючи невеликою кількістю рідини, ввечері; немає потреби у прийомі проносних засобів або спеціальної дієти; для лікування гельмінтозів дорослим призначають по 150 мг однократно^{БНФ}; дітям - 50 мг одноразово (ввечері) у дозі 2,5 мг/кг маси тіла: 3–6 років (10–20 кг) - 25-50 мг; 7–10 років (20–30 кг) - 50–75 мг; 11–18 років (30–60 кг) - 75-100 мг; у разі необхідності лікування повторюють після 7–14-денної перерви.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: відчуття серцебиття, агранулоцитоз, лейкопенія; безсоння; судоми, запаморочення, енцефалопатія, головний біль, абдомінальний біль, діарея, нудота, блювання; р-ції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання, свербіж та ангіоневротичний набряк; безсоння, пірексія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до левамізолу або до допоміжних речовин.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,15 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЛЕВАМІЗОЛ-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна	табл. у бл.	150мг	№1x1	65,07	
II.	ДЕКАРИС	Гедеон Ріхтер Румунія А.Т. (повний цикл виробництва готової продукції, пакування, контроль серії)/ВАТ "Гедеон Ріхтер" (випуск серії, оформлення сертифікатів якості), Румунія/Угорщина	табл. у бл.	50мг, 150мг	№2x1, №1x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

- **Мебендазол (Mebendazole) * (див. п. 17.7.1.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")**

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вживається внутрішньо; при аскаридозі, трихоцефальозі, анкілостомідозі та змішаних гельмінтозах незалежно від маси тіла і віку призначають дітям, старшим 2 років та дорослим по 100 мг (1 табл.) 2 р/добу (вранці та ввечері) протягом 3 днів^{БНФ}.

- **Албендазол (Albendazole) * (див. п. 17.7.1.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")**

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при анкілостомозі^{ВООЗ, БНФ}, некаторозі, аскаридозі, трихоцефальозі^{ВООЗ} дорослі і діти старше 2 років внутрішньо, по 400 мг 1 р/добу одноразово, дітям від 1 до 2 років - 200мг/добу одноразово.

- **Піперазину адипінат (Piperazine adipinate) (див. п. 17.7.1.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")**

Спосіб застосування та дози ЛЗ: аскаридоз - внутрішньо 2 р/добу за 1 год або ч/з 0,5-1 год після їди протягом 2 днів підряд, разова доза для дітей 4-5 років - 500 мг, 6-8 років - 750 мг, 9-12 років - 1 г, 13-15 років - 1,5 г, дорослим та дітям віком від 15 років - 1,5-2 г.

- **Пірантел (Pyrantel)** * (див. п. 17.7.1.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймати внутрішньо; при аскаридозі середня доза -10-12 мг/кг маси тіла на один прийом^{вооз}; дітям (з масою тіла не < 10 кг) - 1 мірна ложка суспенз. (2,5 мл) на 10 кг маси тіла на один прийом; дітям віком від 6 р.: 1 табл. (250 мг) на 20 кг маси тіла одноразово; дорослим із масою тіла до 75 кг - 6 мірних ложок (15 мл) або 3 табл. (250 мг) одноразово; дорослим із масою тіла понад 75 кг - 8 мірних ложок (20 мл) або 4 табл. (250 мг) одноразово; при анкілостомозі у разі тяжкої інвазії або в ендемічних зонах призначають у дозі 20 мг/кг/добу в 1-2 прийоми протягом 2-3 днів; дітям (з масою тіла не < 10 кг) - 2 мірні ложки суспензії (5 мл)/10 кг/добу; дітям віком від 6 р.: 1 табл. (250 мг)/10 кг/добу; дорослим із масою тіла до 75 кг - 12 мірних ложок (30 мл) або 6 табл. (250 мг)/добу; дорослим із масою тіла >75 кг - 16 мірних ложок (40 мл) або 8 табл. (250 мг)/добу; у разі м'якої інвазії *Ankylostoma duodenale* (що виникає у неендемічних зонах) може бути достатньо дози 10 мг/кг маси тіла одноразово^{вооз}.

17.7.1.3. Дірофіляріоз, токсокароз, трихінельоз, стронгілоїдоз

- **Мебендазол (Mebendazole)** * (див. п. 17.7.1.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо; теніоз та стронгілоїдоз: дорослі-по 200 мг 2 р/добу (вранці і ввечері) 3 дні поспіль; діти від 2 років - по 100 мг 2 р/добу (вранці і ввечері) 3 дні поспіль.

- **Албендазол (Albendazole)** * (див. п. 17.7.1.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при стронгілоїдозі застосовують у дорослих та дітей старших 2-х років по 400 мг 1р/добу протягом 3 діб; при трихінельозі та токсокарозі застосовують внутрішньо 400 мг 2 р/добу протягом 5-10 днів, доза для пацієнтів при масі тіла > 60 кг становить 400 мг 2 р/добу; при масі тіла < 60 кг призначати з розрахунку 15 мг/кг/добу; цю дозу розділити на 2 прийоми; МДД - 800 мг;^{вооз} дітям віком до 6 р. призначення у високих дозах не рекомендується.

17.7.2. Засоби, що застосовуються при цестодозах

17.7.2.1. Гіменолепідоз, теніоз, теніархоз, діфілоботріоз.

- **Албендазол (Albendazole)** * (див. п. 17.7.1.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при теніозі та гіменолепідозі 400 мг 1 р/добу протягом 3 днів; при гіменолепідозі рекомендується повторний курс лікування в інтервалі з 10-го по 21-й день після попереднього курсу.

17.7.2.2. Ехінококоз (основний метод лікування – хірургічний)

- **Албендазол (Albendazole)** * (див. п. 17.7.1.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при неможливості хірургічного лікування чи при відсутності показань для його проведення албендазол у пацієнтів з вагою менше 60 кг в дозі 10-15 мг/кг у 2 прийоми, з вагою більше 60 кг - 400мг 2 р/добу, але не більше 800 мг/добу впродовж 28 діб; можливе проведення 3 курсів лікування^{вооз}; повторний курс можна проводити через 2 тижні.

17.7.2.3. Цистіцеркоз (основний метод лікування – хірургічний)

- **Албендазол (Albendazole)** * (див. п. 17.7.1.1. розділу "ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ")

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при неможливості хірургічного лікування чи при відсутності показань для його проведення у пацієнтів з вагою більше 60 кг призначають по 800 мг /добу в 2 прийоми по 400 мг протягом 7-30 діб в залежності від результату, пацієнтам з вагою менше 60 кг - в добовій дозі 15мг/кг двома рівними частинами 2 р/добу (МДД 800 мг) протягом 7-30 діб в залежності від результату^{вооз}; повторний курс можна проводити через 2 тижні.

17.8. Загальні принципи вибору антибіотиків в лікуванні пневмонії

Негоспітальна пневмонія (НП)

Діагноз НП — безумовне показання для застосування а/б, які є основою лікування у таких хворих. Антибактеріальне лікування необхідно починати одразу після встановлення діагнозу, особливо у тих пацієнтів з НП, які потребують госпіталізації. Абсолютно неприйнятне є зволікання з терміновим призначенням а/б пацієнтам із тяжким перебігом захворювання через відсутність результатів бактеріоскопії і посіву мокротиння, оскільки затримка введення першої дози а/б на 4 год і більше зумовлює значне підвищення ризику смерті таких хворих.

З практичних міркувань розрізняють емпіричну а/б-терапію (якщо не визначено етіологію захворювання) і антибіотикотерапію хворих на НП із встановленою етіологією. Оскільки на даний час не існує ефективних методів етіологічної експрес-діагностики НП, в реальних умовах початкова етіотропна а/б-терапія практично завжди є емпіричною.

А/б, які призначають для емпіричного лікування хворих на НП, поділяють на препарати першого ряду (препарати вибору та альтернативні препарати) та другого ряду. Після встановлення діагнозу НП розпочинають лікування препаратами вибору, а за неможливості їх призначення (відсутність, непереносимість або використання впродовж останніх 3-х міс з будь-яких причин) — альтернативними. У випадку неефективності препаратів першого ряду через 48–72 год лікування (критерії див. далі) призначають препарати другого ряду, у якості яких, за певних обставин, можуть бути використані альтернативні препарати.

Таблиця 17.4. Антибактеріальна терапія хворих на НП в амбулаторних умовах

Група хворих	Можливий збудник	Антибіотик першого ряду		Антибіотик другого ряду
		Препарат вибору	Альтернативний препарат	
I група (з нетяжким перебігом НП, без супутньої патології та інших модифікуючих факторів)	<i>S. pneumoniae</i> , <i>M. pneumoniae</i> , <i>C. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i>	Пероральний прийом: амоксцилін або макролід	Пероральний прийом: фторхінолон III–IV покоління	Пероральний прийом: 1. Макролід або доксициклін за неефективності амінопеніциліну 2. Амінопеніцилін або фторхінолон III–IV покоління за неефективності макроліду
II група (з нетяжким перебігом НП, з наявністю супутньої патології та/або інших модифікуючих факторів)	<i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>M. pneumoniae</i> , <i>C. pneumoniae</i> , <i>S. aureus</i> , <i>M. catarrhalis</i> , родина Enterobacteriaceae	Пероральний прийом: амоксцилін/клавуланова кислота або цефуроксиму аксетил	Пероральний прийом: фторхінолон III–IV покоління або цефтриаксон (в/м, в/в) ¹	Пероральний прийом: добавити до β-лактаму макролід або монотерапія фторхінолоном III–IV покоління

Примітка: ¹ — парентеральне введення цефтриаксону призначають за неможливості перорального прийому препаратів вибору.

Таблиця 17.5. Антибактеріальна терапія хворих на НП в умовах стаціонару

Група хворих	Можливий збудник	Антибіотик першого ряду		Антибіотик другого ряду
		Препарат вибору	Альтернативний препарат	
III група (госпіталізовані у терапевтичне відділення з нетяжким перебігом НП)	<i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , атипові збудники, грамнегативні ентеробактерії	Парентеральне застосування (в/м, в/в): амінопеніцилін, переважно захищений (амоксцилін клавуланат, ампіцилін сульбактам) + макролід (<i>per os</i>) або цефалоспорин II–III покоління + макролід (<i>per os</i>)	в/в застосування: фторхінолон III–IV покоління	в/в застосування: фторхінолон III–IV покоління або карбапенем
IV група (госпіталізовані у ВРІТ з тяжким перебігом НП)	<i>S. pneumoniae</i> , <i>Legionella spp.</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>S. aureus</i> , <i>M. pneumoniae</i> , грамнегативні ентеробактерії, <i>Pseudomonas spp.</i> , полімікробні асоціації	в/в застосування: захищений амінопеніцилін (амоксцилін клавуланат, ампіцилін сульбактам) + макролід або цефалоспорин III покоління + макролід.	в/в застосування: лактамфторхінолон III–IV покоління +	в/в застосування: карбапенем + фторхінолон III–IV покоління або карбапенем + макролід
		При підозрі на <i>P. aeruginosa</i> внутрішньовенне застосування: цефалоспорин III–IV покоління, активний у відношенні синьогнійної палички + аміноглікозид + ципрофлоксацин (левофлоксацин)	в/в застосування: цефалоспорин III–IV покоління, активний у відношенні синьогнійної палички, + аміноглікозид + макролід	в/в застосування: меропенем + аміноглікозид + ципрофлоксацин (левофлоксацин)

**Таблиця 17.6. Госпітальна пневмонія
Емпірична антибактеріальна терапія хворих на «ранню» ГП без факторів ризику наявності полірезистентних штамів збудників**

Ймовірний збудник	Препарат вибору
<i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>S. aureus</i> (MSSA), грамнегативні бактерії кишкової групи зі звичайною чутливістю до антибіотиків: <i>E. coli</i> , <i>K. pneumoniae</i> , <i>Enterobacter spp.</i> <i>Proteus spp.</i> , <i>S. marcescens</i>	Цефтриаксон або фторхінолон III–IV покоління, або ампіцилін/сульбактам, або ертапенем

Таблиця 17.7. Емпірична антибактеріальна терапія хворих на «ранню» ГП з факторами ризику наявності полірезистентних штамів збудників та «пізню» ГП

Ймовірний збудник	Препарат вибору
Граммнегативні бактерії: <i>P. aeruginosa</i> , <i>K. pneumoniae</i> (продуценти ESBL) <i>Acinetobacter spp.</i> <i>L. pneumophila</i>	Цефалоспорин з антисиньогнійною активністю (цефепім, цефтазидим) або карбапенем (іміпенем, меропенем), або захищений β-лактам (піперацилін/тазобактам) + фторхінолон із антисиньогнійною

Грампозитивні коки Резистентні до метициллину <i>S. aureus</i> (MRSA)	активністю або аміноглікозид (амікацин, гентаміцин, тобраміцин) + лінезолід або ванкоміцин (за наявності факторів ризику MRSA чи висока частота нозокоміальних інфекцій у даному стаціонарі)
--	--

Таблиця 17.8. «Середні добові дози антибіотиків для дітей»
(Додаток 1 до розділу «ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»)

МНН	Внутрішнє застосування	Парентеральне застосування
	Пеніциліни	
Аксцилін	добова доза препарату для дітей становить 30 - 60 мг/кг розділена на 2-3 прийоми; інфекції тяжкого перебігу - доза же бути збільшена: дітям – 60 мг/кг/добу, розділених на три прийоми	Спеціальних рекомендацій немає
Ампіцилін	30-50 мг/кг 4 р/добу за 1 год до прийому їжі	в/в, в/м 50-100 мг/кг 4 р/добу; при менінгіті – 200-300 мг/кг
Бензатинбензилпеніцилін	Спеціальних рекомендацій немає	в/м одноразово 1,2 млн МО; для профілактики ревматичної гарячки – 600 тис – 1 млн МО 1 раз на місяць в/м
Бензатин бензилпеніцилін	Спеціальних рекомендацій немає	в/в, в/м 50-100 МО/кг 4 р/добу; при менінгіті, ендокардиті – 200-500 МО/кг 6 р/добу
Бензатинфеноксиметилпеніцилін	добові дози 50 000 - 100 000 /кг 2 - 3 р/добу	Спеціальних рекомендацій немає
Біцилін-3	Спеціальних рекомендацій немає	в/м одноразово 1,2 млн МО
Біцилін-5	Спеціальних рекомендацій немає	в/м одноразово 1,5 млн МО
Оксацилін	40-60 мг/кг 3-4 р/добу за 1 год до прийому їжі	недоношеним дітям та новонародженим призначають по 6,25 мг/кг кожні 6 год; дітям з вагою тіла до 40 кг – по 12,5–25 мг/кг кожні 6 год
Феноксиметилпеніцилін	до 1 року добова доза 20 - 30 мг/кг, від 1 року до 6 років - 15 - 30 мг/кг, від 6 до 12 років - 10 - 20 мг/кг 3 - 4 р/добу	Спеціальних рекомендацій немає
Аксцилін/клавуланат	Від 2-х місяців до 12 років або при вазі тіла менше 40 кг -25/3,6 кг/добу – 45/6,4 кг/добу в 2 прийоми в залежності від тяжкості інфекції; 90/6,4 мг/добу в 2 прийоми з 12-годинним інтервалом на протязі 10 днів (діти старше 3-х місяців, з масою тіла до 40 кг)	в/в струминно повільно 3-4 хв або в/в крапельно 30-40 хв; дозування для дітей з масою тіла до 40 кг залежить від маси тіла; мінімальний інтервал між введеннями – 4 год; діти до 3-х місяців – до 4 х кг – 25/5 мг/кг кожні 12 год; більше 4-х кг – до 25/5 мг/кг кожні 8 год; від 3-х місяців до 12 років – 25/5 мг/кг кожні 6-8 год в залежності від важкості інфекції
Цефалоспорины		
Цефазолін	Спеціальних рекомендацій немає	в/м, в/в від 1 року 20–50 мг/кг на 3-4 р/добу, при тяжких інфекціях до 100 мг/кг/добу
Цефадроксил	25 - 50 мг/кг/день (при остеомиєліті і септичному артриті - 50 мг/кг/день) 2 р/добу або за один прийом (при фарингіті, тонзиліті та імпетиго).	Спеціальних рекомендацій немає
Цефалексин	Вік молодше 3 років – протипоказаний; при масі тіла менше 40 кг добова доза 25-50 мг/кг в 4 прийоми, МПД – 0,1 мг/кг/добу; вік від 9 до 12 років та масі тіла більше 40 кг – по 1 г/добу	Спеціальних рекомендацій немає
Цефепім		від 1 до 2 місяців - тільки за життєвими показаннями 30 мг/кг 2-3 р/добу; діти від 2 місяців - 50 мг/кг 2 р/добу (при фебрильній нейтропенії та бактеріальному менінгіті – 3 р/добу)
Цефіксим	молодше 2 років 8 мг/кг/день 1-2 р/добу; 2-4 роки - 5 мл/день, 5-8 років - 10 мл/день, 9-12 років - 15 мл/день.	Спеціальних рекомендацій немає
Цефоперазон	Спеціальних рекомендацій немає	в/в, в/м 50-100 мг/кг 2-3 р/добу
Цефотаксим	Спеціальних рекомендацій немає	з масою тіла до 50 кг 50 - 100 мг/кг 3 - 4 р/добу в/м або в/в; при тяжких інфекціях, в тому числі менінгіті, добову дозу подвоюють ; для недоношених дітей МПД - не вище 50 мг/кг
Цефподоксим	старше 6 років 10 мг/кг (МПД – 400 мг) у 2 прийоми	

Цефтазидим	Спеціальних рекомендацій немає	в/м, в/в добова доза 30-100 мг/кг 2-3 р/добу; при менінгіті – МПД 200 мг/кг/добу
Цефтибутен	9 мг/кг/добу (МПД - 400 мг/добу) в 1-2 прийоми до або після їжі	Спеціальних рекомендацій немає
Цефтриаксон	Спеціальних рекомендацій немає	в/в, в/м недоношені діти добова доза 20 – 50 мг/кг маси тіла, для дітей від 2 тижнів до 12 років - 20 – 80 мг/кг 1 р/добу; лікування починати з дози 100 мг/кг (але не більше 4000 мг) 1 р/добу
Цефокситин	для дітей молодше 2 років рекомендована доза становить 8 мг/кг/день на один прийом або розділити на 2 рівні дози, які приймають кожні 12 год; для дітей 2-4 років - 5 мл/день, 5-8 років - 10 мл/день, 9-12 років - 15 мл/день; для дітей з масою тіла більше 50 кг та старше 12 років рекомендованою є доза для дорослих.	Спеціальних рекомендацій немає
Цефуросим	Спеціальних рекомендацій немає	в/в, в/м 50-100 мг/кг в 3 прийоми; при менінгіті - немовлята та діти: 150 - 250 мг/кг/добу в/в, розділені на 3 або 4 дози; новонароджені – МПД 100 мг/кг/добу в/в
Карбапенеми		
Іміпенем	Спеціальних рекомендацій немає	в/в 15-25 мг/кг в 3-4 прийоми
Меропенем	Спеціальних рекомендацій немає	від 3-х місяців до 12-ти років рекомендована доза - 10 - 20 мг/кг в 3 прийоми в/в
Тетрацикліни		
Доксициклін	старше 8 років з масою тіла до 45 кг - 4,4 мг/кг маси тіла у 1-2 прийоми в перший день лікування, в наступні дні - 2,2 мг/кг у 1-2 прийоми	старше 8 років з масою тіла до 45 кг 4,4 мг/кг маси тіла у 1-2 прийоми
Тетрациклін	старше 8 років 12,5 - 25 мг/кг у 2 прийоми	Спеціальних рекомендацій немає
Аміноглікозиди		
Амікацин	Спеціальних рекомендацій немає	в/в, в/м 15-20 мг/кг в 1-2 введення; при менінгіті – 20-30 мг/кг в 3 прийоми
Гентаміцин	Спеціальних рекомендацій немає	в/в, в/м 3-5 мг/кг в 1-2 введення; при менінгіті – 7,5 мг/кг в 3 прийоми
Канаміцин	Спеціальних рекомендацій немає	дітям до 1 року при інфекціях нетуберкульозної етіології (у виняткових випадках) у середній добовій дозі 0,1 г; з 1 року до 5 років - 0,1 - 0,3 г; старшим 5 років - 0,3 - 0,5 г; МПД - 15 мг/кг, кратність введення - 2 - 3 р/добу курсом лікування - 5 - 7 днів; при туберкульозі - дітям - 15 мг/кг 1 р/добу
Неоміцин	недоношені діти – 7,5 мг/кг 2 р/добу; немовлятам вводиться навантажувальна доза 10 мг/кг, а потім по 7,5 мг/кг кожні 12 год	Спеціальних рекомендацій немає
Нетилміцин	Спеціальних рекомендацій немає	в/м, в/в 4-7,5 мг/кг в 1-2 прийоми
Стрептоміцин	Спеціальних рекомендацій немає	в/м, в/в 15 мг/кг в 1 прийом; при туберкульозі – 20 мг/кг 2 рази на тиждень
Тобраміцин	Спеціальних рекомендацій немає	в/м, в/в 3-5 мг/кг в 1-2 прийоми; при менінгіті – 7,5 мг/кг в 3 прийоми
Макроліди		
Азитроміцин	3-денний курс: 10 мг/кг 1 р/добу або 5-денний курс: 10 мг/кг в перший день, а потім по 5 мг/кг	Спеціальних рекомендацій немає
Джозаміцин	30-50 мг/кг в 3 прийоми за 1 год до їжі	Спеціальних рекомендацій немає
Еритроміцин	40-50 мг/кг в 3-4 прийоми	в/в 40-50 мг/кг в 3-4 прийоми
Кларитроміцин	старше 6 місяців: 5 мг/кг в 2 прийоми незалежно від їжі	Спеціальних рекомендацій немає
Мідекаміцин	30-50 мг/кг в 2-3 прийоми за 1 год до їжі	Спеціальних рекомендацій немає
Рокситроміцин	5-8 мг/кг в 2 прийоми за 15 хв до прийому їжі	Спеціальних рекомендацій немає
Спіраміцин	діти вагою більше 20 кг 1,5 млн на кожні 10 кг ваги тіла на добу в 2-3	в/в протипоказаний дітям

	прийоми; при менінгіті 75 000 2 р/добу протягом 5 днів	
	Лінкозаміди	
Кліндаміцин	10-25 мг/кг в 3-4 прийоми незалежно від їжі	в/м, в/в 20-40 мг/кг в 3-4 прийоми
Лінкоміцин	30-60 мг/кг в 3-4 прийоми за 1 год до прийому їжі	в/м, в/в 10-20 мг/кг в 2 прийоми
	Глікопептиди	
Ванкоміцин	Спеціальних рекомендацій немає	в/в краплино старше 7 днів життя – початкова доза 15 мг/кг, потім по 10 мг/кг 2р/добу; до 1 місяця – 30 мг/кг у 3 прийоми; старше 1 місяця – 40 мг/кг у 4 прийоми
	Оксазолідини	
Лінезолід	10 мг/кг у 3 прийоми незалежно від прийому їжі	Спеціальних рекомендацій немає
	Інші антибіотики	
Хлорамфенікол	старше 1 року – 50-75 мг/кг у 4 прийоми незалежно від прийому їжі	в/в 50-75 мг/кг у 4 прийоми; при менінгіті – 75-100 мг/кг/ добу
Фосфоміцин	Спеціальних рекомендацій немає	дітям старше 5 років - добова доза для дітей 50–80 мг/кг маси тіла, розподілена на 2–3 введення.
Тіамфенікол	Спеціальних рекомендацій немає	дітям до 2 років – в/м по 125 мг 2 р/добу, 3-6 років – по 250 мг 2 р/добу, 7-12 років – по 250 мг 3 р/добу
	Нітроїмідазоли	
Метронідазол	Спеціальних рекомендацій немає	вік до 12 років 7,5 мг/кг 3 р/добу в/в повільно з швидкістю 5 мг/хв
Тинідазол	вік старше 3 років 50-75 мг/кг одноразово	Спеціальних рекомендацій немає
Орнідазол	з масою тіла до 35 кг добова доза 20-40 мг/кг; при амебній дизентерії: діти вагою до 15 кг - 0,5 г один прийом, до 25 кг - 1 г на один прийом, до 35 кг - 1,5 г на один прийом; при лямбліозі: дітям з масою тіла менше 35 кг - одноразовий прийом дози 40 мг/кг маси тіла на добу	при в/в введенні добова доза - 20-30 мг/кг/добу
	Сульфаніламід і триметоприм	
Ко-триксазол	старше 2 місяців: 6-8 мг/добу** в 2 прийоми незалежно від прийому їжі; для профілактики пневмонії – 10 мг/кг/добу в 2 прийоми по 3 дні кожен тиждень	віком старше 2 місяців: при тяжких інфекціях, включаючи пневмонію, менінгіт – в/в 15-20 мг/кг* в 3-4 прийоми
Сульфадимідин	старше 2 місяців 100-200 мг/кг у 4-6 прийомів за 1 год до прийому їжі	Спеціальних рекомендацій немає
	Хінолони	
Налідоксова кислота	старше 3 місяців 55 мг/кг в 4 прийоми після прийому їжі	Спеціальних рекомендацій немає
Ципрофлоксацин	по життєвих показаннях 10-15 мг/кг в 2 прийоми незалежно від прийому їжі; при легеневої формі сибірської виразки профілактика та лікування) – 15 мг/кг 2 р/добу незалежно від прийому їжі	по життєвих показаннях в/в 7,5-10 мг/кг/добу в 2 прийоми
	Нітрофурани	
Нітрофурантоїн	5-7 мг/кг в 4 прийоми під час або після прийому їжі	Спеціальних рекомендацій немає
Фуразолідон	6-7 мг/кг/добу в 4 прийоми після прийому їжі	Спеціальних рекомендацій немає
	Протитуберкульозні засоби	
Етамбутол	15-25 мг/кг/добу в 1 прийом	Спеціальних рекомендацій немає
Етіонамід	старше 14 років 15-20 мг/кг/добу в 1-3 прийоми	Спеціальних рекомендацій немає
Ізоніазид	лікування 5-15 мг/кг/добу у 1-2 прийоми, МПД - 500 мг	в/м, в/в, інгаляційно, внутрішньо кавернозно починаючи з підліткового віку (дози для дорослих)
Капреоміцин	Спеціальних рекомендацій немає	в/м 15-30 мг/кг/добу в 1 прийом
Піразинамід	20-40 мг/кг/добу в 1 прийом	Спеціальних рекомендацій немає
Протіонамід	15-20 мг/кг/добу в 1-3 прийоми	Спеціальних рекомендацій немає

Рифампіцин	10-20 мг/кг/добу в 1-2 прийоми	в/в краплино 10-20 мг/кг/добу в 1 прийом
Стрептоміцин	Спеціальних рекомендацій немає	в/м 20 мг/кг/добу в 1 прийом
Циклосерин	10-20 мг/кг/ в 2 прийоми	Спеціальних рекомендацій немає

18. ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ

18.1. Імуномодулятори

18.1.1. Імуноглобуліни

18.1.1.1. Загальні

18.1.1.2. Специфічні

18.1.2. Цитокіни

18.1.2.1. Інтерферони

18.1.2.1.1. Рекombінантні сполуки

18.1.2.2. Фактори росту

18.1.2.2.1. Рекombінантні сполуки

18.1.3. Індуктори інтерферонів

18.1.4. Лікарські засоби бактеріального походження

18.1.5. Синтетичні імуномодулятори

18.1.5.1. Високомолекулярні

18.2. Імуносупресори

18.2.1. Глюкокортикостероїди

18.2.1.1. Системні

18.2.1.2. Топічні

18.2.2. Природні сполуки

18.2.3. Синтетичні сполуки

18.2.4. Імуносупресори на основі моноклональних антитіл

18.3. Протиалергічні засоби

18.3.1. Антигістамінні лікарські засоби

18.3.1.1. Антигістамінні лікарські засоби I покоління

18.3.1.2. Антигістамінні лікарські засоби II покоління

18.3.1.3. Місцеві селективні антигістамінні лікарські засоби

18.3.2. Стабілізатори мембран тканинних та циркулюючих базофілів

18.3.3. Антагоністи лейкотрієнових рецепторів

18.3.4. Глюкокортикостероїди

18.3.4.1. ГК для системного застосування

18.3.4.2. ГК місцевої дії

18.3.4.2.1. Інгаляційні

18.3.4.2.2. Назальні

18.3.4.2.3. Зовнішні і кон'юнктивальні форми

18.3.5. Імуносупресори

18.3.5.1. Системні

18.3.5.2. Зовнішні

18.3.6. Лікарські засоби для проведення специфічної імунотерапії та імунодіагностики

18.3.6.1. Лікувальні

18.3.7. Лікарські засоби для діагностики туберкульозу

18.3.8. Адренергічні лікарські засоби - невідкладна допомога при анафілаксії

18.1. Імуномодулятори

18.1.1. Імуноглобуліни

18.1.1.1. Загальні

- *Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення (Immunoglobulins, normal human, for extravascular adm.)**

Фармакотерапевтична група: J06BA01 - імуноглобуліни; людини нормальні, для екстравакулярного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: підвищує неспецифічну резистентність організму; містить імуноглобулін і спектр а/т проти збудників інфекційних захворювань.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика інфекцій: гепатиту А, кору ^{БНФ}, лікування гіпо- та агамаглобулінемії, для підвищення резистентності організму в період реконвалесценції після г.інфекцій із

затяжним перебігом, затяжних пневмоній; п/ш:замісна терапія дорослих, дітей і підлітків (від народження до 18 років) при таких станах: с - м первинного імунodefіциту з порушенням продукування а/т^{вооз}, гіпогаммаглобулінемія або рецидивуючі бактеріальні інфекції у пацієнтів із хр. лімфоцитарною лейкемією з тяжкою вторинною гіпогаммаглобулінемією та рецидивуючими інфекціями, для яких профілактичні а/б виявилися неефективними або протипоказані, гіпогаммаглобулінемія та рецидивуючі бактеріальні інфекції у пацієнтів із множинною мієломою, гіпогаммаглобулінемія у пацієнтів до та після трансплантації аlogenних гематопоетичних стовбурових клітин.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовується в/м: профілактика ВГА: дорослим призначати одноразово в дозі 3мл, дітям - залежно від віку: 1-6 років - 0,75 мл; 7-10 років - 1,5 мл; від 10 років та старшим - 3 мл; повторне введення Іg показане не раніше, ніж через 2 міс. після першого застосування; профілактика кору: одноразово, дітям віком від 3-х міс., які не хворіли на кір і не були щеплені проти кору, доза залежно від стану здоров'я та часу, що пройшов з моменту контакту (не пізніше 6 діб після контакту з хворим) становить 1,5-3 мл, дорослим та дітям при контакті з хворими зі змішаними інфекціями - у дозі 3 мл; лікування гіпо- та агамаглобулінемії у дітей: 1 мл/кг, розрахункову дозу можна ввести в 2-3 прийоми з інтервалом 24 год. (подальші введення Іg проводять не раніше, як через 1 міс.); підвищення резистентності організму в період реконвалесценції після г. інфекційних захворювань з тяжким перебігом та при хр. та затяжних пневмоніях: дорослим та дітям у разовій дозі 0,15-0,2 мл/кг маси тіла, кратність введення до 4-х ін'єк., інтервали між ін'єк. - 2-3 доби; після введення Іg щеплення проти кору та епідемічного паротиту здійснюють не раніше, ніж через 2-3 міс. (після вакцинації проти цих інфекцій Іg вводити не раніше, ніж через 2 тижн.); п/ш: режим дозування у разі п/ш введення препарату повинен сприяти досягненню стійкого мінімального рівня ІgG (вимірюється перед наступним введенням) принаймні 5-6 г/л і збереженню показників в межах референтного інтервалу сироваткового Іg для віку, може бути необхідною ударна доза (доза навантаження) 0,2-0,5 г/кг, необхідно поділити її на декілька днів, при цьому МДД повинна становити від 0,1 до 0,15 г/кг, після досягнення стійких рівнів ІgG підтримуючі дози вводять з однаковими інтервалами (приблизно 1 р/тижд.) для досягнення кумулятивної щомісячної дози 0,4-0,8 г/, мінімальні рівні ІgG вимірювати та оцінювати разом із частотою виникнення інфекцій, щоб знизити рівень розповсюдження інфекції, може бути потрібно збільшити дозу та прагнути до більш високих мінімальних рівнів ІgG.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: грипopodobний с-м (озноб, підвищення t° тіла, головний та м'язевий біль, біль у суглобах, відчуття стомленості, млявість, пітливість); нудота, блювання, запаморочення, припливи, можливе виникнення реакцій гіперчутливості до препарату, включаючи анафілактичний шок, набряк Квінке, р-ції у місці введення, а саме: біль та чутливість, у разі шоку застосовувати стандартне лікування, висипи на шкірі (включаючи герпетичні), свербіж, гіперемія, набряк шкіри, кропив'янка, сухість шкіри, артеріальна гіпотензія, тахікардія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або будь-якої допоміжної речовини, забороняється вводити в/м у разі тяжкої тромбоцитопенії та інших порушень гемостазу у зв'язку з небезпекою кровотеч та крововиливів у місці ін'єкції; не застосовувати пацієнтам з дефіцитом Іg А, які мають антитіла проти Іg А, не можна вводити внутрішньосудинно.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ІМУНОГЛОБУЛІН ЛЮДИНИ НОРМАЛЬНИЙ - БІОФАРМА	ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА", Україна	р-н д/ін'єк. по 3мл в амп. у пач.	10%	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ІМУНОГЛОБУЛІН ЛЮДИНИ НОРМАЛЬНИЙ - БІОФАРМА	ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА", Україна	р-н д/ін'єк. по 1,5мл в амп. у пач.	10%	№10	991,31	
	ІМУНОГЛОБУЛІН-БІОЛІК	АТ "БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк. по 1,5мл, 3мл в амп. у пач.	150мг/1,5мл	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ІМУНОГЛОБУЛІН-БІОЛІК	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк. по 1,5мл, 3мл в амп. у пач.	150мг/1,5мл	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	ГАМАНОРМ	Октафарма АБ (виробник, відповідальний за виробництво in bulk, первинну упаковку, випуск серії)/Октафарма Дессау ГмБХ (виробник, відповідальний за візуальну інспекцію, вторинну упаковку та маркування)/Октафарма Фармацевтика Продуктiонсгес. м.б.Х	р-н д/ін'єк. по 10мл у фл.	165 мг/мл	№1	3496,88	32,60/€

	(виробник, Швеція/Німеччина/Австрія)					
ГАМАНОРМ	Октафарма АБ (виробник, відповідальний за виробництво in bulk, первинну упаковку, випуск серії)/Октафарма Дессау ГмБХ (виробник, відповідальний за візуальну інспекцію, вторинну упаковку та маркування)/Октафарма Фармацевтика Продуктiонсгес. м.б.Х (виробник, Швеція/Німеччина/Австрія)	р-н д/ін'ек. по 20мл у фл.	165 мг/мл	№1	6993,75	32,60/€

• **Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення (Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm.) ***

Фармакотерапевтична група: J06BA02 - імуноглобуліни, людини нормальні, для в/в введення.

Основна фармакотерапевтична дія: Іg людини нормальний містить ІgG з широким спектром а/т проти інфекцій; має неспецифічну активність а/т, що проявляється у підвищенні резистентності організму; відповідні дози цього медичного препарату можуть відновити патологічно низький рівень Іg G до нормального значення, механізм дії при показаннях, окрім замісної терапії, визначений не повністю, однак включає імуномодулюючі ефекти.

Показання для застосування ЛЗ: замісна терапія: с-м первинного імунодефіциту ^{БНФ ВООЗ} з порушенням синтезу антитіл, гіпогамаглобулінемія і рецидиви бактеріальних інфекцій у пацієнтів із хр. лімфоцитарною лейкемією, для яких застосування профілактичних а/б не було ефективним; гіпогамаглобулінемія і рецидиви бактеріальних інфекцій у пацієнтів з множинною мієломою у стабільній фазі, для яких імунізація пневмококовою вакциною не була ефективною, гіпогамаглобулінемія у пацієнтів після аlogenної трансплантації кровотворних стовбурових клітин; вроджений СНІД і рецидиви бактеріальних інфекцій; імуномодуляція у дорослих, дітей та підлітків: первинна імунна тромбоцитопенія (ПІТ) у пацієнтів з високим ризиком кровотечі або перед оперативним втручанням з метою корекції показника тромбоцитів; с-м Гійєна – Барре; хвороба Кавасаки ^{ВООЗ}; багатофокальна моторна нейропатія, хр. запальна демієлінізуюча поліневропатія; системні захворювання сполучної тканини (РА), дерматоміозит; загальна міопатія; замісна терапія у дітей та підлітків (0 - 18 років) при: с-мах первинного імунодефіциту ^{ВООЗ БНФ} (ПІД) з порушенням вироблення а/т; ^{БНФ} вторинних імунодефіцитів (ВІД) у пацієнтів, які страждають від тяжких або рецидивуючих інфекцій, неефективного протимікробного лікування, або у разі, якщо введена недостатність специфічних а/т(ДНСА) або рівень ІgG у сироватці <4 г/л.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: замісну терапію проводить під наглядом лікаря, який має досвід лікування імунодефіциту, при замісній терапії доза може бути індивідуальною для кожного пацієнта залежно від фармакокінетичної та клінічної відповіді; замісна терапія при с-мах первинного імунодефіциту ^{БНФ}; ^{ВООЗ} рекомендована початкова доза - 0,4–0,8 г/кг одноразово, потім 0,2 г/кг кожні 3-4 тижні, доза, яка потрібна для досягнення рівня понад 5-6 г/л, становить близько 0,2-0,8 г/кг/міс., інтервал введення доз при досягненні стійкого стану варіює від 3 до 4 тижн ^{ВООЗ}, щоб зменшити рівень інфікування, може бути потрібне збільшення дози та досягнення більш високих мінімальних рівнів ІgG; гіпогамаглобулінемія та рецидивуючі бактеріальні інфекції у хворих з хр. лімфолейкозом, у яких профілактичне лікування а/б не дало результату; гіпогамаглобулінемія та рецидивуючі бактеріальні інфекції у пацієнтів з множинною мієломою у фазі плато, які не реагували на пневмококову імунізацію; вроджений СНІД при рецидивуючих бактеріальних інфекціях: рекомендована доза - 0,2-0,4 г/кг кожні 3–4 тижн., гіпогамаглобулінемія у пацієнтів після трансплантації аlogenних гемопоетичних стовбурових клітин: рекомендована доза - 0,2-0,4 г/кг кожні 3-4 тижн., мінімальні рівні повинні підтримуватися вище 5 г/л; первинна імунна тромбоцитопенія - 0,8-1 г/кг у перший день ^{БНФ}; цю дозу можна повторити 1 раз протягом 3 днів або 0,4 г/кг у день протягом 2 – 5 днів ^{БНФ}, лікування можна повторити при рецидиві; с - м Гієна - Барре ^{БНФ}: 0,4 г/кг/добу 5 днів; хв. Кавасаки ^{БНФ}: 1,6-2,0 г/кг вводить за кілька прийомів протягом 2-5 днів або 2,0 г/кг як одноразову дозу, пацієнтам отримувати супутнє лікування ацетилсаліциловою кислотою, хр.запальна демієлінізуюча поліневропатія: початкова доза 2 г (40 мл)/кг маси тіла за кілька прийомів протягом 5 днів підряд кожні 4 тижні; аlogenна трансплантація кісткового мозку: початкова доза - 0,5 г/кг/тижд.; застосування починають за сім днів до трансплантації та продовжують до 3 міс. після трансплантації; при системних захворюваннях сполучної тканини (РА) - по 4-10 мл (0,2- 0,5 г)/кг/добу 5 діб; при тяжких формах бактеріально-токсичних та вірусних інфекцій у дорослих та дітей (включаючи хірургічні ускладнення, що супроводжуються бактеріємією і септикопемічними станами та при підготовці хірургічних хворих до операції) - по 8 мл (0,4 г)/кг/добу 1-4 доби; при цитопеніях різного генезу (г. та хр. лейкоз, апластична анемія, стан після терапії цитостатиками) - по 4-8 мл (0,2-0,4 г)/кг/добу 4-5 діб ^{БНФ} або 20 мл (1 г)/кг/добу 2 доби.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гемолітична анемія, лейкопенія, анафілактичний шок, анафілактична р-ція гіперчутливості, анафілактоїдна р-ція, ангіоневротичний набряк, набряк обличчя, гіперволемія, (псевдо) гіпонатріємія, сплутаності свідомості, збудження, тривожність, нервозність, порушення мозкового кровообігу, асептичний менінгіт, втрата свідомості, порушення мовлення, мігрень, головний біль, запаморочення, гіпестезія, парестезія, світлобоязнь, тремтіння, порушення зору, ІМ, стенокардія, брадикардія, тахікардія, прискорене серцевиття, ціаноз, тромбоз, СН, недостатність периферичного кровообігу, флебіти, гіпотензія, гіпертонія, блідість, ДН, легенева емболія, набряк легенів, бронхоспазм, гіпоксія, задишка, кашель, блювання, діарея, біль у животі, нудота, відлущування шкіри, кропив'янка, висип, еритематозний висип, дерматит, екзема, свербіж, alopecія, еритема, артралгія міалгія, біль у кінцівках, біль у спині, біль у шиї, спазми м'язів, м'язова слабкість, скелетно-м'язова скутість, ГНН, біль у нирках, біль у грудях, дискомфорт у грудях, набряк, гриппоподібний стан, лихоманка, озноб, приливи жару, почервоніння, відчуття холоду, відчуття жару, гіпергідроз,

астенія, млявість, відчуття печіння, р-ція в місці ін'єкції, стомлюваність, підвищення печінкових ферментів, псевдопідвищення рівня глюкози в крові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини або будь-якої допоміжної речовини, що входить до складу препарату, підвищена чутливість до Ig людини, особливо у пацієнтів з антитілами до IgA.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БІОВЕН	ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" (виробництво, первинне пакування; виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серій), Україна	р-н д/інфуз. по 10мл у фл.	10%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БІОВЕН	ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" (виробництво, первинне пакування; виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серій), Україна	р-н д/інфуз. по 25мл у пл. або фл.	10%	№1	1922,00	
	БІОВЕН	ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" (виробництво, первинне пакування; виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серій), Україна	р-н д/інфуз. по 10мл у пл.	10%	№1	345,35	
	БІОВЕН	ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" (виробництво, первинне пакування; виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серій), Україна	р-н д/інфуз. по 50мл у пл. або фл.	10%	№1	4013,00	
	БІОВЕН	ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" (виробництво, первинне пакування; виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серій), Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл. або фл.	10%	№1	7872,00	
	БІОВЕН МОНО®	ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" (виробництво, первинне пакування; виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серій), Україна	р-н д/інфуз. по 25мл у пл. або фл.	5%	№1	1149,00	
	БІОВЕН МОНО®	ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" (виробництво, первинне пакування; виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серій), Україна	р-н д/інфуз. по 50мл у пл. або фл.	5%	№1	2083,00	
	БІОВЕН МОНО®	ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" (виробництво, первинне пакування; виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серій), Україна	р-н д/інфуз. по 100мл у пл. або фл.	5%	№1	4121,00	
	ІМУНОГЛОБУЛІН-БІОЛІК ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕ ННОГО ВВЕДЕННЯ	АТ "БІОЛІК", Україна	р-н д/інфуз. по 10мл, 20мл, 25мл, 50мл у пл. або фл.	50 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ІМУНОГЛОБУЛІН-БІОЛІК ДЛЯ	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	р-н д/інфуз. по 10мл, 20мл,	50 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

	ВНУТРІШНЬОВЕ ННОГО ВВЕДЕННЯ		25мл, 50мл у пл. або фл.				
II.	Кіовіг	Баксалта Белджіум Мануфактурінг СА/Бакстер АГ/Бакстер С.А., Бельгія/Австрія/Бельгія	р-н д/інфуз. по 10мл, 25мл, 50мл, 100мл, 200мл, 300мл у фл.	100 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КІОВІГ	Баксалта Белджіум Мануфактурінг СА (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості ГЛЗ, випуск серії)/Бакстер АГ (контроль якості ГЛЗ), Бельгія/Австрія	р-н д/інфуз. по 10мл, 25мл, 50мл, 100мл, 200мл, 300мл у фл.	100 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ОКТАГАМ	Октафарма Фармацевтика Продуктiонсгес. м.б.Х./ОКТАФАРМА/ОКТАФА РМА АБ/Октафарма Дессау ГмбХ (альтернативна виробнича ділянка для вторинного пакування), Австрія/Франція/Швеція/Німеч чина	р-н д/інфуз. по 20мл, 200мл у пл.	50 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ОКТАГАМ	Октафарма Фармацевтика Продуктiонсгес. м.б.Х./ОКТАФАРМА/ОКТАФА РМА АБ/Октафарма Дессау ГмбХ (альтернативна виробнича ділянка для вторинного пакування), Австрія/Франція/Швеція/Німеч чина	р-н д/інфуз. по 50мл у пл.	50 мг/мл	№1	4635,41	30,90/€
	ОКТАГАМ	Октафарма Фармацевтика Продуктiонсгес. м.б.Х./ОКТАФАРМА/ОКТАФА РМА АБ/Октафарма Дессау ГмбХ (альтернативна виробнича ділянка для вторинного пакування), Австрія/Франція/Швеція/Німеч чина	р-н д/інфуз. по 100мл у пл.	50 мг/мл	№1	9270,81	30,90/€
	ОКТАГАМ 10 %	Октафарма АБ (виробник, відповідальний за виробництво за повним циклом, за виключенням вторинної упаковки)/Октафарма Фармацевтика Продуктiонсгес м.б.Х. (виробник, відповідальний за виробництво за повним циклом)/Октафарма (виробник, відповідальний за вироб, Швеція/Австрія/Франція/Німеч чина	р-н д/інфуз. по 200мл у фл.	10%	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ОКТАГАМ 10 %	Октафарма АБ (виробник, відповідальний за виробництво за повним циклом, за виключенням вторинної упаковки)/Октафарма Фармацевтика Продуктiонсгес м.б.Х. (виробник, відповідальний за виробництво за повним циклом)/Октафарма (виробник, відповідальний за	р-н д/інфуз. по 100мл у фл.	10%	№1	16730,10	33,46/€

	вироб, Швеція/Австрія/Франція/Німеччина					
ОКТАГАМ 10 %	Октафарма АБ (виробник, відповідальний за виробництво за повним циклом, за виключенням вторинної упаковки)/Октафарма Фармацевтика Продуктiонсгес м.б.Х. (виробник, відповідальний за виробництво за повним циклом)/Октафарма (виробник, відповідальний за вироб, Швеція/Австрія/Франція/Німеччина	р-н д/інфуз. по 20мл у фл.	10%	№1	3346,02	33,46/€
ОКТАГАМ 10 %	Октафарма АБ (виробник, відповідальний за виробництво за повним циклом, за виключенням вторинної упаковки)/Октафарма Фармацевтика Продуктiонсгес м.б.Х. (виробник, відповідальний за виробництво за повним циклом)/Октафарма (виробник, відповідальний за вироб, Швеція/Австрія/Франція/Німеччина	р-н д/інфуз. по 50мл у фл.	10%	№1	8365,05	33,46/€
ПАНЗИГА/PANZY GA®	Октафарма (виробник, відповідальний за виробництво in-bulk, первинне пакування, випуск серії)/Октафарма Фармацевтика Продуктiонсгес м.б.Х. (виробник, відповідальний за первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)/Октафарма Дессау ГмбХ (, Франція/Австрія/Німеччина	р-н д/інфуз. по 10мл, 25мл, 50мл, 100мл у фл. та пл.	100 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

18.1.1.2. Специфічні

- **Імуноглобулін людини антирезус Rho (D) (Anti-D (rh) immunoglobulin) ***

Фармакотерапевтична група: J06BB01 - специфічні імуноглобуліни; анти-D (Rh) імуноглобулін.

Основна фармакотерапевтична дія: Ig, специфічний до а/г D (Rh); запобігає резус-сенсibiliзації резус-негативних жінок, можливу в результаті поступання Rh₀ (D)-позитивної крові плоду у кровотік матері при народженні Rh₀ (D)-позитивних дітей, при перериванні вагітності (як самодовільному, так і штучному), при проведенні амніоцентезу, при травмах черевної порожнини під час вагітності.

Показання для застосування ЛЗ: проведення профілактики в передпологовий період у резус-негативних жінок, які не сенсibiliзовані до антигену Rh₀ (D); ^{БНФ} для проведення профілактики в післяпологовий період у резус-негативних жінок, не сенсibiliзованих до антигену Rh₀ (D), тобто таких, що не виробили резус-антитіл (за умови першої вагітності і народження резус-позитивної дитини, кров якої сумісна з кров'ю матері за групами крові системи АВО) ^{БНФ}; при штучному перериванні вагітності у резус-негативних жінок, також не сенсibiliзованих до Rh₀ (D) антигену, у випадку резус-позитивної належності крові чоловіка; при викидні і загрозі викидня на будь-якій стадії вагітності ^{БНФ}; при проведенні амніоцентезу ^{БНФ}; при травмах органів черевної порожнини під час вагітності.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують в/м; для дозування 300 мкг/дозу: мати повинна бути резус-негативна, не повинна бути вже сенсibiliзована до а/г Rh₀ (D); дитина повинна бути резус-позитивна та мати негативний результат прямого антиглобулінового тесту; якщо вводиться до пологів, важливо, щоб мати отримала ще одну дозу після народження резус-позитивної дитини протягом 72 год. ^{ВООЗ} після пологів; якщо встановлено, що батько - резус-негативний, то вводити його немає потреби; Ig вводять по 1500 МО (300 мкг) (1 ампл.) в/м одноразово: для проведення профілактики в передпологовий період приблизно на 28 тижні вагітності, після цього обов'язково ввести ще одну дозу 1500 МО (300 мкг), бажано протягом 72 год після пологів, якщо народжена дитина виявиться резус-позитивною; для проведення профілактики в післяпологовий період протягом 72 год

після пологів; при штучному аборті, перериванні позаматкової вагітності безпосередньо після закінчення операції, в період вагітності після 13 тижнів рекомендується введення однієї дози; якщо вагітність перервана в період до 13 тижнів, можливе однократне введення міні-дози імуноглобуліну приблизно 250 МО (50 мкг); при викидні та загрозі викидня на будь-якій стадії вагітності; при проведенні амніоцентезу або при травмах органів черевної порожнини протягом другого та/або третього триместру вагітності безпосередньо після закінчення операції рекомендується ввести одну дозу препарату, якщо проведення амніоцентезу або травма органів черевної порожнини потребує введення препарату в період 13-18 тижнів вагітності, ввести ще 1500 МО (300 мкг) (1 амп.) в період 26-28 тижн; для дозування 625 МО/мл: якщо потрібно введення великих загальних доз (> 3125 МО для дорослих), рекомендується розділити їх на менші дози та вводити в різні місця; у випадках геморагічних розладів, коли в/м ін'єк. протипоказані - вводити п/ш, якщо немає ЛЗ для в/в введення; дозу анти-D Ig визначати згідно з рівнем впливу Rh(D)-позитивних еритроцитів, та враховуючи, що для нейтралізації 0,5 мл Rh(D)-позитивної еритроцитарної маси або 1 мл Rh (D)-позитивної крові потрібно приблизно 10 мкг (50 МО) анти-D Ig; антенатальна профілактика Rh(D) імунізації у Rh(D)-негативних жінок: призначати дози 50-330 мкг (250-1650 МО); планова антенатальна профілактика Rh(D) імунізації у Rh(D)-негативних жінок: одноразова доза 250 мкг (1250 МО) у 28-30 тижн. вагітності або 2 дози на 28-му та 34-му тижні вагітності; антенатальна профілактика після ускладнень попередньої вагітності: одноразова доза 125 мкг (625 МО) до 12-го тижня вагітності; та 250 мкг (1250 МО) після 12-го тижня вагітності) вводити якомога швидше впродовж 72 год., у разі необхідності, повторити введення з 6-12 тижневими інтервалами впродовж вагітності; після амніоцентезу та біопсії хоріону вводити одноразову дозу 250 мкг (1250 МО)^{BOO3}; постанатальна профілактика^{BOO3}: призначати 100-300 мкг (500-1500 МО), якщо призначається менша доза 100 мкг (500 МО), тоді визначати кількість ембріональної материнської кровотечі; стандартна доза - 250 мкг (1250 МО); при постанатальному застосуванні призначати матері якомога швидше, впродовж 72 год. після народження Rh-позитивної (D, D^{слабкої}, D^{неповної}) дитини^{BOO3}, навіть якщо минуло 72 год.; вводити постанально навіть у випадку проведення антенатальної профілактики і тоді, коли в сироватці матері присутні залишки активності антенатальної профілактики; коли підозрюється сильна фетоплацентарна кровотеча (> 4 мл), її тяжкість визначити відповідним методом (тест кислотної елюції Кляйнхауера-Бетке) для визначення Hb плода або проточну цитометрію для специфічного визначення Rh D-позитивних клітин: вводити додаткові дози анти-D імуноглобуліну 10 мкг (50 МО)/0,5 мл еритроцитів плода; трансфузії несумісних препаратів крові (еритроцитів): рекомендована доза - 20 мкг (100 МО) анти-D Ig на 2 мл перелитої Rh (D)-позитивної крові^{BOO3} або 1 мл концентрату еритроцитів; відповідні дози визначати при консультації зі спеціалістом із переливання крові; кожні 48 год. робити додаткові тести для визначення Rh D-позитивних еритроцитів і підтримувати введення анти-D Ig, поки всі Rh D-позитивні еритроцити не будуть вилучені з кровообігу; максимальної дози 3000 мкг (15000 МО) достатньо у випадку об'ємних трансфузій несумісної крові незалежно від того, чи перевищує об'єм переливання 300 мл Rh (D)-позитивних еритроцитів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: набряк, біль, еритема, ущільнення, почервоніння, висипання, свербіж; лихоманка, слабкість, озноб; реакції гіперчутливості, анафілактичний шок, головний біль; тахікардія, гіпотонія; нудота, блювання; еритема, свербіж; артралгія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: протипоказаний при селективному дефіциті Ig A за умови наявності антитіл до Ig A; при наявності тяжких АР на введення білкових препаратів крові людини в анамнезі, а також р-ції гіперчутливості до донорських Ig людини, введення препарату протипоказано резус-позитивним породіллям, а також резус-негативним породіллям, сенсibilізованим до антигену Rh₀ (D), у сироватці яких виявлені резус-антитіла, не вводити у разі тяжкої тромбоцитопенії та інших порушень гемостазу.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ІМУНОГЛОБУЛІН АНТИРЕЗУС Rh ₀ (D) ЛЮДИНИ	ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл, 2мл в амп. у пач.	1500 МО	№3, №5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІМУНОГЛОБУЛІН АНТИРЕЗУС Rh ₀ (D) ЛЮДИНИ	ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у пач.	1500 МО	№1	1719,00	
	ІМУНОГЛОБУЛІН АНТИРЕЗУС Rh ₀ (D) ЛЮДИНИ	ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у пач.	1500 МО	№1	1719,00	
II.	РЕЗОНАТИВ	Октафарма АБ (виробник, відповідальний за виробництво за повним циклом, за виключенням вторинної упаковки)/Октафарма Дессау ГмбХ (виробник, відповідальний за вторинне пакування), Швеція/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	625 МО/мл	№1	1173,78	32,60/€
	РЕЗОНАТИВ	Октафарма АБ (виробник, відповідальний за виробництво за повним	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у бл.	625 МО/мл	№1	2347,55	32,60/€

		циклом, за виключенням вторинної упаковки)/Октафарма Дессау ГмБХ (виробник, відповідальний за вторинне пакування), Швеція/Німеччина					
--	--	---	--	--	--	--	--

18.1.2. Цитокіни

18.1.2.1. Інтерферони

18.1.2.1.1. Рекombінантні сполуки

- **Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b)**^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: L03AB05 - імуностимулятори; інтерферон альфа-2b.

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодуюча, антипроліферуюча, противірусна та протимікробна дія; регулює взаємовідносини між ланками клітинного й гуморального імунітету; підвищує диференціацію та активність клітин природних кілерів і Т-лімфоцитів, що визначає активний перебіг реакцій клітинного імунітету; регулює продукцію медіаторів запалення, впливає на міграцію клітин запалення в патологічне вогнище, стимулює фагоцитоз і інші б/ц реакції, нормалізує динаміку запального процесу; інгібує реплікацію і транскрипцію вірусів; впливає на основні етапи реплікації в/клітинних збудників, припиняє їх розмноження, забезпечує ефективний лізис інфекційних агентів.

Показання для застосування ЛЗ: супозит. рект.: для дітей: у комплексній терапії ГРВІ, для дорослих: при папіломавірусних інфекціях (вульгарні бородавки, гострокінцеві кондиломи); при уrogenітальних змішаних інфекціях, які передаються статевим шляхом; при передпухлинних захворюваннях шийки матки; ліоф. д/р-ну д/ін'єкц. у комплексній терапії дорослих при: г.і хр.ВГВ (середньої тяжкості і тяжкі форми); хр.ВГС, г. і хр. септичних захворюваннях вірусної природи; герпетичних інфекціях різної локалізації (оперізувальний лишай, множинні шкірні герпетичні висипання, генітальна герпетична інфекція); папіломатозі гортані; злоякісній меланомі, увеальній меланомі, нирковоклітинній карциномі, поверхнево локалізованому раку сечового міхура, раку яєчника та молочної залози, саркомі Капоші на тлі ВІЛ-інфекції, хр. мієлолейкозі, волосатоклітинному лейкозі, неходжкінських лімфомах, базальноклітинній карциномі, Т-клітинній лімфомі шкіри (грибopodobному мікозі); спрей назальний, краплі назальні: профілактика та лікування ГРВІ: у пацієнтів, що часто та тривало страждають на захворювання верхніх дихальних шляхів; при контакт з хворими на ГРВІ; при переохолодженні; при сезонному підвищенні захворюваності;

Спосіб застосування та дози ЛЗ: суппоз.: у комплексна терапія ГРВІ - новонародженим і недоношеним дітям препарат призначати ректально по 150 000 МО по 2 супоз./добу з 12-годинною перервою, курси лікування і перерви між курсами - по 5 днів, недоношеним новонародженим дітям, гестаційний вік яких < 34 тижнів, призначати препарат per rectum по 150 000 МО 3 р/добу (ч/з 8 год), курс 5 днів, дітям віком від 1 до 14 років - по 500 000 МО 2 р/добу 5 днів; крап.назал.: при перших ознаках захворювання ГРВІ (протягом 5 днів) - дорослим - по 3 крап. в кожний носовий хід 5-6 р/добу (разова доза - 24 000 МО, добова доза - 120 000 - 144 000 МО), новонародженим та дітям віком до 1 року - по 1 крап. в кожний носовий хід 5 р/добу (разова доза - 8 000 МО, добова доза - 40 000 МО), дітям від 1 до 3 років - по 2 крап. в кожний носовий хід 3-4 р/добу (разова доза - 16 000 МО, добова доза - 48 000 - 64 000 МО), дітям від 3 до 14 років - по 2 крап. в кожний носовий хід 4-5 р/добу (разова доза - 16 000 МО, добова доза - 64 000 - 80 000 МО), дітям від 14 до 18 років - по 3 крап. в кожний носовий хід 5-6 р/добу (разова доза - 24 000 МО, добова доза - 120 000 - 144 000 МО); профілактика респіраторних вірусних інфекцій у дорослих: при контакт з хворим та при переохолодженні - по 3 крап. 2 р/добу 5-7 днів, при необхідності профілактичні курси повторюють, при сезонному підвищенні захворюваності - одноразово вранці з інтервалом 1-2 доби; спрей назал.: при перших ознаках захворювання ГРВІ (протягом 5 днів): дорослим - по 3 спрей-дози в кожний носовий хід 5-6 р/день (разова доза - 30 000 МО, добова доза - 150 000 - 180 000 МО), дітям від 1 до 3 років - по 2 спрей-дози в кожний носовий хід 3-4 р/добу (разова доза - 20 000 МО, добова доза - 60 000 - 80 000 МО), дітям від 3 до 14 років - по 2 спрей-дози в кожний носовий хід 4-5 р/добу (разова доза - 20 000 МО, добова доза - 80 000 - 100 000 МО), дітям від 14 до 18 років - по 3 спрей-дози в кожний носовий хід 5-6 разів на добу (разова доза - 30 000 МО, добова доза - 150 000 - 180 000 МО), профілактика респіраторних вірусних інфекцій у дорослих: при контакт з хворим та при переохолодженні - по 3 спрей-дози 2 р/день 5-7 днів, при необхідності профілактичні курси повторюють, при сезонному підвищенні захворюваності - одноразово вранці з інтервалом 1-2 доби; ліоф. д/р-ну д/ін'єкц.: г. ВГВ: в/м по 1 млн МО (у тяжких випадках - по 2 млн МО) 2 р/добу 10 днів; далі з урахуванням клінічного статусу хворого введення препарату може бути продовжене до 2 - 3 тижн. за вище наведеною схемою або по 1 млн МО 2 р/тижд. протягом кількох тижнів; хр. ВГВ: в/м по 3 - 4 млн МО 3 р/тижд. 2 міс.; хр. гепатит С: п/ш по 3 млн МО 3 р/тижд. (ч/з день) у комбінації з рибавірином або як монотерапія (при протипоказаннях або при непереносимості рибавірину); застосовувати протягом 3 - 4 місяців, при монотерапії курс лікування - від 12 до 18 міс., у комбінації з рибавірином - 6 міс.; при генотипі 1 вірусу і високому вмісті ДНК вірусу до початку терапії у разі відсутності у сироватці крові РНК HCV до кінця 6 місяців лікування, комбіновану терапію можна продовжувати ще 6 місяців, однак при цьому брати до уваги такі негативні фактори, як вік від 40 років, чоловіча стать, прогресуючий фіброз; оперізувальний лишай: щоденно 1 млн МО в/м+ 2 млн МО в 5 мл 0,9 % фізіологічного р-ну натрію хлориду п/ш у декілька точок навколо зони висипання; тривалість лікування 5 - 7 днів; шкірні герпетичні висипання: щоденно в/м або п/ш (навколо осередку) у дозі 2 млн МО; лікування можна поєднати з місцевим застосуванням (аплікаціями) на герпетичні папули; курс лікування визначає лікар; генітальна герпетична інфекція: щоденно в/м у дозі 2 млн МО у поєднанні з локальним застосуванням (у вигляді аплікацій) на ділянці висипань; курс лікування визначає лікар; папіломатоз гортані: по 3 млн МО/м² п/ш 3 р/тижд. (ч/з день) 6 міс. та більше; дозу корегувати з урахуванням переносимості препарату, лікування розпочинати після хірургічного (лазерного) видалення пухлинної тканини; злоякісна меланома: на доповнення до хірургічного лікування і для індукції ремісії в/в по 20 млн МО/м² (інфузія протягом 20 хв) 5 р/тижд. 4 тижн.; підтримуюча терапія - п/ш по 10

млн МО/м² 3 р/тижд. (ч/день) 48 тижн.; увеальна меланома (у разі лікування у поєднанні з фотодеструкцією пухлини та β-аплікацією) : парабульбарно по 1 млн МО (розведених в 1 мл води д/ін'єкцій) щоденно протягом 10 днів; повторні 10-денні введення проводять ч/з 20 днів двічі; загальний курс - 48 тижн.; не виключена необхідність повторних курсів через 45 днів; нирковоклітинна карцинома: в/м по 3 млн МО щоденно протягом 10 днів; загальний курс - 30 млн МО, повторні курси проводити з інтервалом 3 - 5 тижн. 6 міс., потім - з інтервалом 1,5 - 2 міс. протягом року; як індукційна терапія по 10 млн МО/м² (до 18 млн МО/м² добу) в/м або п/ш; вказаних доз досягають шляхом підвищення ч/з кожні 3 дні попередньої дози на 3 млн МО/м² (перші 3 дні - по 3 млн МО/м², другі 3 дні - по 6 млн МО/м², треті 3 дні - по 9 млн МО/м² і т. д. до 18 млн МО/м²); дози корегувати з урахуванням переносимості препарату; при гарній переносимості максимальна доза - 36 млн МО/м²; тривалість індукційної терапії - 3 міс., після чого вирішити питання про відміну препарату або продовження лікування при наявності ремісії або стабілізації стану; при підтримуючому лікуванні препарат вводити у тих самих дозах по 3 р/тижд. не < 6 міс.; поверхнево локалізований рак сечового міхура: в/міхурово від 30 млн МО до 50 млн МО щотижнево 8 - 12 тижн.; при карциномі *in situ* по 60 - 100 млн МО на інстиляцію щотижнево 12 тижн.; до введення препарату пацієнт повинен утримуватись від прийому рідини протягом 8 год; перед введенням препарату міхур випорожнити; вводити стерильним шприцом ч/з катетер у порожнину сечового міхура, де він повинен знаходитись 2 год, при цьому кожні 15 хв пацієнт повинен міняти положення тіла (для кращої взаємодії препарату зі слизовою оболонкою сечового міхура); ч/з 2 год сечовий міхур випорожнити; *рак яєчника*: внутрішньочеревно (у дренаж) під час хірургічного втручання та у наступні 5 днів по 5 млн МО; далі - в/м по 3 млн МО 10 днів між курсами хіміотерапії; загальна курсова доза - 90 млн МО; наступні курси (по 3 млн МО щоденно протягом 10 днів) можна призначати з інтервалом 2 - 3 міс. протягом 1-1,5 року; рак молочної залози: в/м по 3 млн МО щоденно протягом 10 днів; повторні курси проводити протягом року з інтервалом 1,5 - 2 місяці, потім 2 - 3 місяці (залежно від клінічного статусу); доцільно чергувати курси лаферобіонотерапії з курсами хіміотерапії (або променевої терапії); саркома Капоші на тлі ВІЛ-інфекції: можливі такі схеми лікування: в/м по 3 млн МО щоденно 10 днів; лікування поєднувати із хіміотерапією прослідіном; повторні курси - 1 р/міс. 6 міс.; в/в краплинно 30 хв по 50 млн МО (30 млн МО/м²) щоденно 5 днів підряд або з інтервалом 1 день, після чого необхідна 9-денна перерва до початку нового 5-денного курсу; хр. мієлолейкоз: п/ш 3 млн МО/м² на добу щоденно або 1 р/2 дні, поступово збільшуючи дозу до 5 млн МО/м² на добу щоденно або 1 раз на 2 дні під наглядом лікаря до досягнення повної гематологічної ремісії, волосатоклітинний лейкоз: внутрішньом'язово або підшкірно по 2-3 млн МО/м² до досягнення ремісії, потім 3 рази на тиждень (через день); середня тривалість лікування - 12 місяців; дозу корегувати з урахуванням переносимості препарату; неходжкінські лімфоми: в/м або п/ш по 3 млн МО/м² (поступово збільшуючи дозу до 5 млн МО/м² під контролем лікаря) 3 р/тижд. (як доповнення до хіміотерапії) або по 3 млн МО 3 р/тижд. протягом 12 - 18 міс. (як підтримуюче лікування при ремісії внаслідок проведеної хіміотерапії); базальноклітинна карцинома: по 10 млн МО (розчинених в 1 мл води для ін'єкцій) - в основу та всередину пухлини (за допомогою шприца об'ємом 1 мл); якщо зона ураження < 2 см², вводити 0,15 мл р-ну препарату (1,5 млн МО) 3 р/тижд. (ч/з день) протягом 3 тижнів; сумарна доза не повинна перевищувати 13,5 млн МО; якщо площа ураження від 2 до 10 см², доза препарату має становити 0,5 млн МО/см² (але не < 1,5 млн МО для першої ін'єкції); вводити 3 р/тижд. (ч/з день) протягом 3 тижнів; одночасно проводити лікування однієї ділянки ураження; при відсутності позитивної динаміки (зовнішній вигляд, розміри ураження, ступінь почервоніння, дані біопсії) після 2 - 3 міс. лікування розглянути питання про хірургічне лікування захворювання; Т-клітинна лімфома (грибopodobний мікоз) у стадії виразкування: інтрадермально (у поверхневий шар дерми нижче плями або виразки) по 1 - 2 млн МО (розчинених в 0,5 мл води для ін'єкцій) 3 р/тижд. 4 тижн.; перед введенням ділянку ураження обробляти ватним тампоном зі спиртом; р-н препарату вводити тонкою голкою (30-го калібру), використовуючи шприц об'ємом 1 мл; під час введення голка повинна знаходитись у майже паралельному положенні до поверхні тіла.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: грипоподібні симптоми (озноб, підвищення t°C, стомлюваність, в'ялість, головний біль, біль у м'язах, суглобах, пітливість); блювання, запаморочення, припливи; реакції гіперчутливості; лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія, носові кровотечі; підвищення рівнів АЛТ, АСТ, ЛФ, втрата апетиту, порушення функції печінки; порушення функції щитовидної залози; запаморочення, порушення сну, сплутаність свідомості, тривожні та депресивні стани, підвищена збудливість, сонливість, атаксія, парестезії; АГ, гіпотензія, тахікардія; АР, висипання (у т. ч. герпетичні), свербіж, гіперемія; кашель; зміни у місці введення, порушення зору, порушення функції нирок, порушення електролітного балансу, фарингіт, вірусна інфекція, бронхіт, синусит, простий герпес, риніт, бактеріальна інфекція, пневмонія, сепсис, реактивація гепатиту В у пацієнтів з коінфекцією HCV/HBV, лейкопенія, тромбоцитопенія, лімфаденопатія, лімфопенія, апластична анемія, істинна еритроцитарна аплазія, ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура, тромбоцитарна тромбоцитопенічна пурпура, саркоїдоз, загострення саркоїдозу, СКВ, васкуліт, РА (виникнення або загострення), с-м Фогта - Коянаги - Харада, г.р-ції підвищеної чутливості, в т. ч. кропив'янка, ангіоневротичний набряк, бронхоспазм, анафілактична р-ція, гіпотиреоз, гіпертиреоз, діабет, загострення діабету, анорексія, гіпокальціємія, зневоднення, гіперурикемія, спрага, гіперглікемія, гіпертригліцеридемія, підвищений апетит, депресія, безсоння, страх, емоційна лабільність, збудження, нервозність, сплутаність свідомості, порушення сну, зниження лібідо, суїцидальні думки, суїцид, спроби самогубства, агресивна поведінка (іноді направлена на оточуючих), психоз, в тому числі галюцинаторний думки про вбивство людини, зміна психічного стану, манія, біполярний розлад, запаморочення, головний біль, порушення концентрації, сухість у роті, тремор, парестезія, гіпестезія, мігрень, припливи, сонливість, порушення смаку, периферична невродія, цереброваскулярний крововилив, цереброваскулярна ішемія, епілептичний напад, с-м порушення свідомості, енцефалопатія, моновродія, кома, зниження гостроти зору, кон'юнктивіт, патології зору, порушення з боку слізних залоз, біль в очних яблуках, крововилив у сітківку ока, ретинопатія (в тому числі макулярний набряк), обструкція вени чи артерії сітківки, неврит зорового нерва, набряк диска зорового нерва, втрата гостроти зору або полів зору, «ватні» плями на сітківці, запаморочення, шум у вухах, погіршення або втрата слуху, серцебиття, тахікардія, перикардит, кардіоміопатія, ІМ, серцева ішемія, застійна СН, перикардальний випіт, аритмія, міалгія, артралгія, м'язово-скелетний біль, артрит, рабдоміоліз, міозит, судоми м'язів ніг, біль у спині, с-м Стівенса - Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, мультиформна еритема, зниження маси тіла, часті сечовипускання, ниркова недостатність, нефротичний с-м, виразковий стоматит, біль у правому верхньому квадранті живота, глосит, гінгівіт, запор, діарея панкреатит, ішемічний коліт, виразковий коліт, кровоточивість ясен, періодонтальні порушення неуточнені, дентальні порушення неуточнені, пігментація язика.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до компонентів препарату; наявність у пацієнта дисфункції щитовидної залози; наявність тяжких вісцеральних порушень у пацієнтів з саркомою Капоші; тяжкі ССЗ; псоріаз; виражені порушення функції печінки та/або нирок; епілепсія та інші захворювання ЦНС (у т.ч функціональні); хр.гепатит на тлі прогресуючого або декомпенсованого цирозу печінки; хр.гепатит у хворих, які отримують або нещодавно отримали терапію імунодепресантами (крім короткого курсу кортикостероїдної терапії); аутоімунний гепатит або інші аутоімунні захворювання в анамнезі, пригнічення міелоїдного ростка кровотворення, вагітність та період годування груддю, комбінована терапія з телбівудином; комбінована терапія з рибавирином у разі застосування ЛЗ в складі комбінованої терапії хр.гепатиту С.

Визначена добова доза (DDD): ректально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ., назально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АЛЬФАРЕКІН®	ТОВ "Науково-виробнича компанія "Інтерфармбіотек", Україна	супоз. рект. у стрип.	250тис.МО, 500тис.МО, 1млн.МО, 3млн.МО	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВІТАФЕРОН®	ТОВ "Науково-виробнича компанія "Інтерфармбіотек", Україна	супоз. рект. в конт. чар/уп.	250000МО, 500000МО, 1000000МО, 3000000МО	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛАФЕРОБІОН	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	крап. наз. по 5мл у фл. з крап.	100000 МО/мл	№1	65,00	
	ЛАФЕРОБІОН	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	спрей наз. по 5мл у фл. з розп.	100000 МО/мл	№1	75,00	
	ЛАФЕРОБІОН	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	пор. наз. у фл. в бл.	100000 МО	№5x2	112,00	
	ЛАФЕРОБІОН®	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	супоз. по 1г у конт. чар/уп.	150000МО, 500000МО	№3x1, №5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛАФЕРОБІОН®	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	супоз. по 1г у конт. чар/уп.	150000 МО	№5x2	128,00	
	ЛАФЕРОБІОН®	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	супоз. по 1г у конт. чар/уп.	500000 МО	№5x2	178,00	
	ЛАФЕРОМАКС	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	супоз. по 1г у конт. чар/уп.	1000000МО, 3000000МО	№3x1, №5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛАФЕРОМАКС	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	супоз. по 1г у конт. чар/уп.	1000000 МО	№5x2	208,00	
	ЛАФЕРОМАКС	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	супоз. по 1г у конт. чар/уп.	3000000 МО	№5x2	343,00	
	ЛАФЕРОН-ФАРМБІОТЕК®	ТОВ "Науково-виробнича компанія "Інтерфармбіотек", Україна	супоз. рект. в конт. чар/уп.	250тис.МО, 500тис.МО, 1млн.МО, 3млн.МО	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛАФЕРОН-ФАРМБІОТЕК® НАЗАЛЬНИЙ	ТОВ "Науково-виробнича компанія "Інтерфармбіотек", Україна	ліоф. д/приг. крап. наз. у фл. з кр.-крап.	1 млн.МО	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НАЗОФЕРОН®	ПАТ "Фармак", Україна	спрей наз. по 5мл у фл. з розпил.	100000 МО/мл	№1	110,00	
	НАЗОФЕРОН®	ПАТ "Фармак", Україна	крап. наз. по 5мл у фл. з крап.	100000 МО/мл	№1	96,00	

• **Інтерферон бета-1а (Interferon beta-1a) ***

Фармакотерапевтична група: L03AB07 - імуностимулятори; інтерферони.

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулююча, протівірусна та антипроліферативна дія; має таку ж саму послідовність амінокислот, що і природний людський інтерферон β; механізм дії при розсіяному склерозі до кінця не вивчений; сприяє обмеженню пошкоджень ЦНС, що лежать в основі захворювання, знижує частоту і тяжкість загострень у хворих з ремітуючою формою розсіяного склерозу.

Показання для застосування ЛЗ: лікування пацієнтів з клінічно ізольованим с-мом (єдиний клінічний епізод демієлінізації) з активним запальним перебігом за умови виключення альтернативного діагнозу та за наявності

високого ризику розвитку клінічно достовірного розсіяного склерозу^{БНФ}; пацієнтів з рецидивним перебігом розсіяного склерозу за наявністю 2-х або більше загострень захворювання у попередні 2 роки^{БНФ}; пацієнтів із вторинно-прогресуючим перебігом розсіяного склерозу при відсутності рецидивів захворювання ефективність препарату не була продемонстрована^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування розпочинати під наглядом лікаря, який має необхідний досвід лікування розсіяного склерозу, на початку лікування для розвитку тахіфілаксії з метою зменшення побічних реакцій пацієнтам рекомендується вводити дозу 8,8 мкг п/ш; протягом наступного 4-тижневого періоду дозу препарату збільшувати до досягнення цільової дози, для лікування пацієнтів після першого клінічного епізоду демієлінізації препарат вводять у дозі 44 мкг 3 р/тижд. п/ш; розсіяний склероз з рецидивним перебігом: рекомендована доза препарату – 44 мкг, яку вводять у вигляді п/ш ін'єкцій 3 р/тижд. Крім того, впродовж першого місяця терапії препарат 22 мкг також можна застосовувати пацієнтам, які лише розпочинають лікування препаратом; вводять у вигляді п/ш ін'єкцій; для зменшення грипоподібних симптомів, пов'язаних із застосуванням препарату, перед ін'єкцією та через 24 год після введення препарату рекомендується застосовувати антипіретичні анальгетики.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: грипоподібний с-м; реакції в місці введення, нейтропенія, лімфопенія, лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія, тромботична мікроангіопатія, включаючи тромботичну тромбоцитопенічну пурпуру і гемолітико-уремічний с-м, розлади функції щитовидної залози, найчастіше представлені гіпотиреозом або гіпертиреозом, анафілактичні реакції, безсимптомне зростання рівня трансаміназ, тяжке зростання рівня трансаміназ, гепатит з жовтяницею або без, печінкова недостатність, аутоімунний гепатит, депресія, безсоння, депресія, безсоння, спроби суїциду, головний біль, судоми, тимчасові неврологічні симптоми (такі як гіпестезія, м'язовий спазм, парестезія, труднощі з пересуванням, м'язово-скелетна скутість), які можуть нагадувати загострення розсіяного склерозу, ретинальні судинні розлади (ретинопатія, «ватні» плями на сітківці та обструкція ретинальної артерії або вени), тромбоемболічні явища, задишка, ЛАГ, діарея, блювання, нудота, ангіоневротичний набряк, поліморфна ексудативна еритема, шкірні реакції, схожі на поліморфну ексудативну еритему, с-м Стівенса – Джонсона, міалгія, артралгія, СЧВ, нефротичний "с-м*", гломерулосклероз, запалення підшкірних жирових тканин у місці ін'єкції, анорексія, запаморочення, розвиток тривожного стану, аритмія, вазодилатація та сильне серцебиття, менорагія та метрорагія, зростання утворення аутоантитіл, випадки легеневої артеріальної гіпертензії.

Протипоказання до застосування ЛЗ: початок лікування у період вагітності; гіперчутливість до природного або рекомбінантного інтерферону β або до будь-яких допоміжних речовин препарату, стан тяжкої депресії та/або суїцидальні думки.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 4,3 мкг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БЕТФЕР 1А ПЛЮС	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. у бл.	6000000 МО (30мкг)	№4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БЕТФЕР 1А ПЛЮС	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. у бл.	6000000 МО (30мкг)	№1	186,33	
	БЕТФЕР®-1А	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	р-н д/ін'єк. у шпр. по 1мл в бл.	12000000 МО (44мкг)	№5x2	97,90	
	БЛАСТОФЕРОН	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (пакування із "in bulk" виробництва БІО СІДУС С.А., Аргентинська Республіка), Україна	р-н д/ін'єк. по 0,5мл у шпр. в бл.	6млн.МО; 12млн.МО	№3x1, №3x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	РЕБІФ®	Мерк Сероно С.п.А./Мерк Сероно С.А., відділення у м. Обонн, Італія/Швейцарія	р-н д/ін'єк. по 0,5мл у шпр. в кор.	22мкг (6млн.МО); 44мкг (12млн.МО)	№12, №3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РЕБІФ®	Мерк Сероно С.п.А./Мерк Сероно С.А., відділення у м. Обонн, Італія/Швейцарія	р-н д/ін'єк. по 0,5мл у шпр. в кор.	22мкг (6млн.МО)	№3	241,01	27,26/\$
	РЕБІФ®	Мерк Сероно С.п.А./Мерк Сероно С.А., відділення у м. Обонн, Італія/Швейцарія	р-н д/ін'єк. по 0,5мл у шпр.	44мкг (12млн.МО)	№12	127,02	27,26/\$

• **Інтерферон бета-1b (Interferon beta-1b) ***

Фармакотерапевтична група: L03AB08 - інтерферони; інтерферон β-1b.

Основна фармакотерапевтична дія: належить до родини цитокінів, які є природними протеїнами; активність інтерферону β-1b видоспецифічна; має противірусну та імунорегулюючу дію; механізм дії інтерферону β-1b при розсіяному склерозі остаточно не з'ясований; відомо, що біологічні властивості щодо модифікування відповідної реакції на інтерферон β-1b опосередковуються його взаємодією зі специфічними рецепторами, виявленими на

поверхні клітин людини; зв'язування інтерферону β -1b з цими рецепторами індукуює експресію низки речовин, які вважаються медіаторами біологічних ефектів інтерферону β -1b; інтерферон β -1b знижує здатність до зв'язування та підвищує інтерналізацію та руйнування рецептора інтерферону гамма; підвищує супресорну активність мононуклеарних клітин периферійної крові.

Показання для застосування ЛЗ: одиничний клінічний прояв демієлінізації, що супроводжується вираженим запальним процесом, тяжкість якого виправдовує в/в призначення КС, за умови виключення альтернативних діагнозів та якщо встановлено, що такі пацієнти мають високий ризик розвитку клінічно достовірного розсіяного склерозу^{БНФ}, рецидивно-ремісивний перебіг розсіяного склерозу за наявності в анамнезі 2-х або більше загострень протягом останніх 2 років (або протягом 3 років для БЕТФЕР-1b); вторинно прогресуючий перебіг розсіяного склерозу з активним перебігом захворювання, що характеризується загостреннями^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: п/ш^{БНФ}, по 0,25 мг (8 млн МО) через день; схема титрування: початкова доза - по 0,0625 мг (0,25 мл) через день; поступово збільшувати до 0,25 мг (1,0 мл) через день; період титрування може бути змінений у разі появи суттєвих небажаних реакцій; для забезпечення необхідної ефективності має бути досягнута доза 0,25 мг (1,0 мл) 1 р/2 дні; тривалість терапії встановлювати індивідуально.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: грипоподібний симптомокомплекс (лихоманка, озноб, артралгія, погане самопочуття, пітливість, головний біль, міалгія); інфекції, абсцес; зниження кількості лімфоцитів (<1500/мм³), зниження абсолютного числа нейтрофілів (<1500/мм³), зниження кількості лейкоцитів крові (<3000/мм³), лімфаденопатія; зниження рівня глюкози в крові (<55 мг/дл); лімфаденопатія, депресія, неспокій; головний біль, запаморочення, безсоння, мігрень, парестезія; кон'юнктивіт, розлади зору; вушний біль; прискорене серцебиття; вазодилатація, АГ; інфекції ВДШ, синусит, посилення кашлю, задишка; відчуття тривоги, деперсоналізація; діарея, запор, нудота, блювання, біль у животі; підвищення рівня АЛТ (СГПТ > 5 разів відносно вихідного рівня), підвищення рівня АСТ (СГОТ > 5 разів відносно вихідного рівня); запалення шкіри, висип; гіпертонус, міалгія, міастенія, біль у спині/ кінцівках; затримка сечопускання, наявність білка у сечі (> 1+), часте сечопускання, нетримання сечі, імперативні позиви до сечопускання; дисменорея, менструальні розлади, метрорагія, імпотенція; анемія, тромбоцитопенія, дисменорея, менструальні розлади, метрорагія, імпотенція, реакції у місці ін'єкції (різного типу), некроз у місці ін'єкції, лихоманка, біль у грудній клітці, периферичні набряки, астенія, озноб, пітливість, погане самопочуття.

Протипоказання до застосування ЛЗ: початок терапії протягом вагітності, підвищена чутливість в анамнезі до природного або рекомбінантного інтерферону β , альбуміну людини або до будь-якої з допоміжних речовин, наявна тяжка депресія та/або суїцидальні настрої, захворювання печінки в стадії декомпенсації.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 4 млн ОД.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БЕТФЕР®-1В	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. в бл.	9600000 МО	№5x2	425,21	
II.	БЕТАФЕРОН®	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко. КГ (нерозфасований продукт, первинна упаковка)/Байер АГ (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії), Німеччина/Німеччина	пор. ліоф. д/приг. р-ну д/ін'єк. у фл. з розч та адапт. з голк., 2спирт. серв. в упак.	9,6 млн.МО	№15	365,82	29,96/€

• **Пегінтерферон альфа-2а (Peginterferon alfa-2a)*** [ГМД]

Фармакотерапевтична група: L03AB11 - імуностимулятори, інтерферони, пегінтерферон α -2а.

Основна фармакотерапевтична дія: пегінтерферон α -2а - являє собою кон'югат ПЕГ (біс-монометоксиполіетиленгліколю) з інтерфероном α -2а зі ступенем заміщення одного моля полімеру одним молям протеїну, є похідним продуктом клонованого гена людського лейкоцитарного інтерферону, введеного і експресованого в клітинах E. coli, чинить протівірусну та антипроліферативну дію.

Показання для застосування ЛЗ: ХГС: у дорослих - у комбінації з іншими ЛЗ показаний для лікування ХГС^{БНФ} у пацієнтів із компенсованим захворюванням печінки; у дітей від 5 років (у комбінації з рибавірином для лікування ХГС у раніше нелікованих дітей і підлітків віком від 5 років із позитивним аналізом сироватки на РНК вірусу гепатиту С, при вирішенні питання про початок лікування педіатричних пацієнтів важливо врахувати пригнічення росту, індуковане комбінованою терапією, невідомо, чи пригнічення росту є оборотним, рішення про призначення лікування приймати індивідуально для кожного пацієнта); ХГВ: лікування НВеАg-позитивного і НВеАg-негативного ХГВ^{БНФ} у дорослих пацієнтів з компенсованим ураженням печінки і ознаками вірусної реплікації, підвищеним рівнем АЛТ і гістологічно підтвердженим запаленням печінки та/або фіброзом; лікування НВеАg-позитивного ХГВ у дітей та підлітків віком від 3 років, які не мають цирозу, з ознаками вірусної реплікації та постійно підвищеним рівнем АЛТ у сироватці крові.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: хронічний гепатит В (ХГВ) у дорослих пацієнтів: при НВеАg-позитивному і НВеАg-негативному ХГВ рекомендована доза -180 мкг 1 р/тижд. п/ш в ділянку передньої черевної стінки чи стегна, тривалість курсу лікування - 48 тижн., ХГС: дорослі пацієнти, які раніше не отримували лікування - при монотерапії або комбінованій терапії з рибавірином рекомендована доза ЛЗ - 180 мкг 1 р/тижд. п/ш в ділянку передньої черевної стінки чи стегна; тривалість терапії пацієнтів з вірусом генотипу 1, у яких на 4 тижні лікування визначається РНК вірусу гепатиту С (РНК ВГС), має становити 48 тижнів незалежно від початкового вірусного навантаження, тривалість терапії 24 тижні можна розглядати для пацієнтів: з генотипом 1 і початковим низьким

вірусним навантаженням (НВН) ($\leq 800\ 000$ МО/мл); з генотипом 4, у яких на 4 тижні результат визначення РНК ВГС негативний і залишається негативним на 24 тижні, остаточний клінічний ефект скорочення початкового курсу лікування до 16 тижнів замість 24 тижнів невідомий, враховуючи потребу у повторному лікуванні пацієнтів, які не відповіли на лікування, та пацієнтів із рецидивом, рекомендована тривалість монотерапії - 48 тижнів; дорослі пацієнти, які раніше отримували лікування: рекомендована доза ЛЗ в комбінації з рибавірином-180 мкг п/ш 1 р/тижд., доза рибавіріну - 1000 мг/добу при масі тіла <75 кг і 1200 мг/добу при масі тіла ≥ 75 кг, незалежно від генотипу, при виявленні вірусу на 12 тижні лікування терапію припинити, рекомендована загальна тривалість лікування 48 тижнів; При вирішенні питання про лікування пацієнтів, інфікованих вірусом генотипу 1, які не відповіли на попереднє лікування пегінтерфероном і рибавірином, рекомендована загальна тривалість терапії -72 тижні; ко-інфекція ВІЛ - ВГС у дорослих пацієнтів: рекомендована доза ЛЗ - 180 мкг 1 р/тижд. п/ш як монотерапія або в комбінації з рибавірином 48 тижнів, доза рибавіріну у пацієнтів з генотипом 1 - 1000 мг/добу при масі тіла <75 кг і 1200 мг/добу при масі тіла ≥ 75 кг, доза рибавіріну у пацієнтів, інфікованих іншими генотипами, крім генотипу 1, 800 мг/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: бронхіт, інфекції ВДШ, кандидоз порожнини рота, простий герпес, грибові, вірусні та бактеріальні інфекції; пневмонія, інфекції шкіри; ендокардит, зовнішній отит; сепсис, новоутворення печінки, тромбоцитопенія, анемія, лімфаденопатія; панцистопенія; апластична анемія; парціальна червоноклітинна аплазія кісткового мозку, саркоїдоз, тиреоїдит; анафілаксія, СЧВ, РА; ідіопатична або тромботична тромбоцитопенічна пурпура; відторгнення трансплантата печінки і нирок, хвороба Вогта - Коянагі - Харада, гіпотиреоз, гіпертиреоз; діабет; діабетичний кетоацидоз, анорексія; дегідратація, депресія, тривожність, безсоння; агресивність, зміна настрою, емоційні розлади, знервованість, зниження лібідо; суїцидальні думки, галюцинації; суїцид, психічні розлади; манія, біполярні розлади, гоміцидальні ідеї, головний біль, запаморочення, порушення концентрації уваги; синкопе, мігрень, порушення пам'яті, слабкість, гіпестезія, гіперестезія, парестезія, тремор, порушення смакових відчуттів, нічні кошмари, сонливість; периферична невропатія; кома, судоми, параліч лицьового нерва; ішемія головного мозку, нечіткість зору, біль в очному яблуці, запальні захворювання очей, ксерофтальмія; крововилив у сітківку; невропатія зорового нерва, набряк диска зорового нерва, розлади судин сітківки, ретинопатія, виразка рогівки; втрата зору; серйозні випадки відшарування сітківки, вертиго, біль у вусі; втрата слуху, тахікардія, периферичні набряки, серцебиття; ІМ, застійна СН, кардіоміопатія, стенокардія, аритмія, фібриляція передсердь, перикардит, суправентрикулярна тахікардія, припливи крові; гіпертензія; крововилив в головний мозок, васкуліт; ішемія периферичних судин, задишка, кашель; задишка при фізичному навантаженні, носова кровотеча, назофарингіт, закладеність носових пазух, закладеність носа, риніт, біль в горлі; стридор; інтерстиціальна пневмонія (у т.ч. з летальним наслідком), емболія легеневої артерії; легенева артеріальна гіпертензія, діарея, нудота, біль в животі; блювання, диспепсія, дисфагія, виразки з локалізацією в ротовій порожнині, кровоточивість ясен, глосит, стоматит, метеоризм, сухість в роті; шлунково-кишкова кровотеча; пептична виразка, панкреатит; ішемічний коліт, пігментація язика, порушення функції печінки; печінкова недостатність, холангіт, жирова інфільтрація печінки, алопеція, дерматит, свербіж, сухість шкіри; псоріаз, кропив'янка, екзема, висипання, підвищене потовиділення, порушення з боку шкіри, реакції фотосенсибілізації, нічне потіння; с-м Стівенса - Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, ангіоневротичний набряк, мультиформна еритема, міалгії, артралгії; біль в спині, артрит, м'язова слабкість, біль в кістках, біль в шиї, кістково-м'язовий біль, м'язові судоми; міозит; рабдоміоліз, ниркова недостатність, імпотенція, гіпертермія, озноб, біль, астенія, втомлюваність, р-ції в місці ін'єкції, дратівливість, болі в грудній клітці, грипозний с-м, нездужання, летаргія, припливи, спрага, зниження маси тіла, передозування речовини, проблеми з навчанням, гіперглікемія, ЦД І типу, виділення з піхви, видалення зуба, холецистектомія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини, інтерферонів α або до будь-якої з допоміжних речовин, аутоімунний гепатит, тяжка печінкова недостатність або декомпенсований цироз печінки, наявність в анамнезі тяжкої хвороби серця, у тому числі нестабільної або неконтрольованої хвороби серця протягом попередніх 6 міс., цироз із сумою балів ≥ 6 за шкалою Чайлда-П'ю у пацієнтів з коінфекцією ВІЛ - ВГС, окрім випадків, коли підвищення даного показника пов'язане з непрямою гіпербілірубінемією внаслідок прийому таких препаратів, як атазанавір та індинавір, комбінація з телбівудином, новонароджені та діти віком до 3 років, оскільки препарат містить як допоміжну речовину спирт бензиловий, діти з наявними тяжкими психічними розладами, особливо тяжкою депресією, суїцидальним настроєм і суїцидальними спробами або наявністю таких розладів в анамнезі.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 26 мкг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ПЕГФЕРОН	ТОВ "ЛЮМ'ЄР ФАРМА" (пакування з форми in bulk виробництва: Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія (Базель); Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія (Кайсераугст)), Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл у фл. в конт. чар/уп.	180 мкг/мл	№4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПЕГФЕРОН	ТОВ "ЛЮМ'ЄР ФАРМА" (пакування з форми in bulk виробництва: Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія (Базель);	р-н д/ін'єк. по 1мл у фл. в кор.	180 мкг/мл	№1	408,78	

		Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія (Кайсераугст)), Україна					
II.	ПЕГАСІС®	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія	р-н д/ін'єк. по 0,5мл у шпр. з голк. в кор.	135мкг/0,5мл	№1	568,78	26,70/\$
	ПЕГАСІС®	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія	р-н д/ін'єк. по 0,5мл у шпр. з голк. в кор.	180мкг/0,5мл	№1	431,58	26,70/\$

• **Пегінтерферон альфа-2b (Peginterferon alfa-2b) *** [ПІМД]

Фармакотерапевтична група: L03AB10 - імуностимулятори; пегінтерферон альфа-2b.

Основна фармакотерапевтична дія: ковалентний кон'югат рекомбінантного інтерферону α -2b та монометоксиполіетиленгліколю, одержаний із клону E.coli, що містить генно-інженерний плазмідний гібрид, що кодує інтерферон α -2b людських лейкоцитів; біологічна активність зумовлена інтерфероном α -2b; клітинні ефекти інтерферонів зумовлені зв'язуванням зі специфічними рецепторами мембрани на поверхні клітин; зв'язуючись з клітинною оболонкою, інтерферон ініціює ланцюг внутрішньоклітинних реакцій та індукцію певних ферментів; цей процес опосередковує різні клітинні ефекти інтерферонів, включаючи пригнічення реплікації вірусу в інфікованих клітинах, інгібування проліферації клітин та імуномодулюючі властивості: посилення фагоцитарної активності макрофагів та специфічної цитотоксичності лімфоцитів відносно клітин-мішеней; пригнічує реплікацію вірусу; має імуномодулюючу, антивірусну та протипухлинну дію.

Показання для застосування ЛЗ: лікування хр. ВГС^{БНФ} у пацієнтів віком від 18 років при відсутності декомпенсованого захворювання печінки; лікування хр. ВГС у комбінації з рибавирином попередньо нелікованим пацієнтам, пацієнтам, у яких попередня комбінована терапія інтерфероном α (будь-яким неpegільованим) і рибавирином або монотерапія інтерфероном α виявилась неефективною.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати п/ш, доза розраховується залежно від маси тіла пацієнта, розчинення проводять таким чином: 0,7 мл води д/ін'єкц. повільно вводять у фл. з ЛЗ, спрямовуючи потік рідини по стінці флакона; ХГС: для лікування застосовують пегінтерферон альфа-2b у вигляді комбінованої терапії з рибавирином, п/ш 1р/день, дозу розраховують індивідуально, залежно від маси тіла пацієнта, з розрахунку 1,5 мкг/кг маси тіла, рибавирин приймають всередину з їжею щодня за 2 прийоми: вранці та ввечері; у пацієнтів, інфікованих вірусом гепатиту С генотипу 1, які не досягли вірусологічної відповіді на 12-му тижні лікування, ймовірність розвитку стійкої вірусологічної відповіді дуже низька; пацієнтам, інфікованим вірусом гепатиту С генотипу 1, які продемонстрували вірусологічну відповідь на 12-му тижні лікування, терапію продовжувати наступні 9 міс. (у цілому 48 тижн.); генотип 2 чи 3: рекомендована тривалість лікування - 24 тижні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: бактеріальна інфекція (включаючи сепсис), грибова інфекція, грип, інфекція ВДШ, бронхіт, простий герпес, синусит, отит, риніт, інфекція у місці ін'єкції, інфекція НДШ, анемія, нейтропенія, гемолітична анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія, лімфаденопатія, апластична коанемія, еритроцитарна аплазія, реакції гіперчутливості на прийом ЛЗ, саркоїдоз, г. реакції гіперчутливості, включаючи ангіоневротичний набряк, анафілаксію, анафілактичні реакції, включаючи анафілактичний шок, ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру, тромботичну тромбоцитопенічну пурпуру, СКВ, бронхоспазм, порушення функції щитовидної залози, зокрема гіпотиреоз або гіпертиреоз, анорексія, гіпокальціємія, гіперурикемія, зневоднення, підвищений апетит, ЦД, гіпертригліцеридемія, діабетичний кетоацидоз, депресія, зниження концентрації уваги, безсоння, агресія, хвилювання, гнів, зміна настрою, неадекватна поведінка, нервозність, порушення сну, зниження лібідо, апатія, кошмари, плач, суїцид, спроба самогубства, суїцидальні думки, психоз, галюцинації, панічні атаки, біполярні розлади, манія, гоміцидальні думки, головний біль, запаморочення, амнезія, погіршення пам'яті, непритомність, мігрень, атаксія, сплутаність свідомості, невралгія, парестезія, гіпестезія, гіперестезія, перитонія, сонливість, порушення уваги, тремор, порушення смаку, нейропатія, периферична нейропатія, судомо, цереброваскулярна кровотеча, цереброваскулярна ішемія, енцефалопатія, параліч лицьового нерва, мононейропатія, порушення зору, нечіткість зору, фоточутливість, кон'юнктивіт, подразнення очей, сльозотеча, біль в очах, сухість очей, патологічні зміни у сітківці (ексудативні випоти), втрата гостроти зору або поля зору, кровотеча сітківки, ретинопатія, оклюзія артерії сітківки, оклюзія вени сітківки, неврит зорового нерва, набряк диска зорового нерва, набряк макули, порушення/втрата слуху, шум у вухах, запаморочення, біль у вухах, прискорене серцебиття, тахікардія, ІМ, застійна СН, кардіоміопатія, аритмія, перикардит, серцева ішемія, ексудативний перикардит, гіпотензія, гіпертензія, почервоніння обличчя, васкуліт, дисфонія, носові кровотечі, порушення дихання, мокротиння в дихальних шляхах, мокротиння в пазухах, закладеність носа, нежить, підвищена секреція ВДШ, біль у горлі, інтерстиціальне захворювання легенів, фіброз легенів, легенева артеріальна гіпертензія, нудота, біль у животі, діарея, диспепсія, ГЕРХ, стоматит, виразки у ротовій порожнині, глосодія, кровотеча ясен, запор, метеоризм, геморої, хейліт, здуття живота, гінгівіт, глосит, дентальні порушення, панкреатит, біль у роті, коліт ішемічний, коліт виразковий, гіпербілірубінемія, гепатомегалія, алопеція, псоріаз, реакція фоточутливості, макуло-папульозний висип, дерматит, еритематозний висип, екзема, нічне потіння, пітливість, вугри, фурункули, еритема, кропив'янка, зміна текстури волосся, захворювання нігтів, шкірний саркоїдоз, с-м Стівенса - Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, мультиформна еритема, міалгія, артралгія, скелетно-м'язовий біль, артрит, біль у спині, судоми м'язів, біль у кінцівках, біль у кістках, слабкість м'язів, рабдоміоліз, міозит, ревматоїдний артрит, часте сечовипускання, поліурія, зміни у показниках сечі, ниркова дисфункція, ниркова недостатність, аменорея, масталгія, менорагія, менструальні розлади, розлади яєчників, вагінальні розлади, сексуальна дисфункція, простатит, еректильна дисфункція, запалення місця ін'єкції, слабкість, астенія, дратівливість, озноб, лихоманка, грипоподібні симптоми, біль, біль у грудях, неприємне відчуття у грудях, біль у місці ін'єкції, нездужання, набряк обличчя, периферичний набряк, ненормальне відчуття, спрага, некроз у місці ін'єкції, зменшення маси тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до інтерферону α -2b або до інших компонентів препарату, тяжка серцева патологія в анамнезі, включаючи нестабільні та неконтрольовані захворювання ССС

протягом останніх 6 міс., тяжкі виснажливі захворювання, хвороби щитовидної залози, за винятком тих, які контролюються традиційною терапією, аутоімунний гепатит або аутоімунне захворювання в анамнезі, захворювання печінки у стадії декомпенсації, епілепсія та/або захворювання ЦНС, застосування у пацієнтів, які мають ВГС/ВІЛ з цирозом печінки ≥ 6 балів за шкалою Чайльда - П'ю, психічні розлади, тяжкі депресії, суїцидальні думки та спроби самогубства в анамнезі, комбінація ЛЗ з тельбівудином, вагітність, дитячий вік.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 7,5 мкг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АЛЬФАПЕГ® - С ПЕГІНТЕРОФЕРОН АЛЬФА-2b	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (пакування з форми in bulk фірми-виробника ТОВ «Науково-виробнича компанія «Інтерфармбіотек», Україна), Україна	ліоф.д/р-ну д/ін'ек. у фл. в кор.	80мкг, 100мкг, 120мкг, 150мкг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЛЬФАПЕГ® - С ПЕГІНТЕРОФЕРОН АЛЬФА-2b	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (пакування з форми in bulk фірми-виробника ТОВ «Науково-виробнича компанія «Інтерфармбіотек», Україна), Україна	ліоф.д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч. в кор.	80мкг	№1	124,69	
	АЛЬФАПЕГ® - С ПЕГІНТЕРОФЕРОН АЛЬФА-2b	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (пакування з форми in bulk фірми-виробника ТОВ «Науково-виробнича компанія «Інтерфармбіотек», Україна), Україна	ліоф.д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч. в кор.	100мкг	№1	103,50	
	АЛЬФАПЕГ® - С ПЕГІНТЕРОФЕРОН АЛЬФА-2b	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (пакування з форми in bulk фірми-виробника ТОВ «Науково-виробнича компанія «Інтерфармбіотек», Україна), Україна	ліоф.д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч. в кор.	120мкг	№1	89,38	
	АЛЬФАПЕГ® - С ПЕГІНТЕРОФЕРОН АЛЬФА-2b	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (пакування з форми in bulk фірми-виробника ТОВ «Науково-виробнича компанія «Інтерфармбіотек», Україна), Україна	ліоф.д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч. в кор.	150мкг	№1	75,00	

18.1.2.2. Фактори росту

18.1.2.2.1. Рекombінантні сполуки

- **Філграстім (Filgrastim)** (див. п. 19.3.1. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Ленограстім (Lenograstim)** (див. п. 19.3.1. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Епоетин альфа (Epoetin alfa)** (див. п. 19.5. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Епоетин бета (Epoetin beta)** (див. п. 19.5. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")

18.1.3. Індуктори інтерферонів

- **Інозин пранобекс (Inosine pranobex)**

Фармакотерапевтична група: J05AX05 - Противірусні засоби для системного застосування; противірусні засоби прямої дії.

Основна фармакотерапевтична дія: противірусний ЛЗ з імуномодулюючими властивостями; нормалізує (до індивідуальної норми) дефіцит або дисфункцію клітинного імунітету, індукуючи дозрівання і диференціювання Т-лімфоцитів і Т1-хелперів, потенціуючи індукцію лімфопроліферативної відповіді у мітогенних або а/г-активних клітинах; моделює цитотоксичність Т-лімфоцитів і натуральних кілерів, функцію Т8-супресорів і Т4-хелперів, кількість IgG та поверхневих маркерів компліменту; збільшує синтез інтерлейкіну-1 (IL-1) та синтез IL-2, регулює експресію рецепторів IL-2; збільшує секрецію ендогенного гамма-інтерферону, зменшує виробництво IL-4 в організмі; підсилює дію нейтрофільних гранулоцитів, хемотаксис та фагоцитоз моноцитів і макрофагів; пригнічує синтез вірусу шляхом вбудовування інозин-оротової кислоти у полірибосоми ураженої вірусом клітини та пригнічує приєднання аденовальної кислоти до вірусної і-РНК.

Показання для застосування ЛЗ: вірусні інфекції, спричинені вірусом простого герпесу типу 1 і 2^{БНФ}, вірусом вітряної віспи, ЦМВ, вірусом Епштейна-Барра, вірусом кору, вірусом паротиту, в т. ч. у хворих з імунодефіцитними станами; ГРВІ; папіломавірусні інфекції шкіри та слизових оболонок: гострокінцеві кондиломи^{БНФ}, папіломавірусна

інфекція вульви, вагіни та шийки матки(у складі комплексної терапії); г. вірусний енцефаліт(у складі комплексної терапії); вірусні гепатити(у складі комплексної терапії); підгострий склерозуючий паненцефаліт^{БНФ} (у складі комплексної терапії).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі та діти від 12 років: 50 мг/кг маси тіла (6-8 табл., розподілених на 3-4 прийоми), МДД - 4 г, діти від 1 до 12 років: 50 мг/кг маси тіла (1 табл. на 10 кг маси тіла для дитини з масою тіла 10-20 кг, при масі тіла > 20 кг призначати дозу, як для дорослих) за 3-4 прийоми на день, МДД - 4 г, для полегшення ковтання табл.можна розтовкти; при захворюваннях з короткочасним перебігом курс лікування становить від 5 до 14 днів, вірусні захворювання з довготривалим перебігом: лікування продовжувати протягом 1-2 тижнів після зниження вираженості симптомів захворювання або довше, залежно від перебігу хвороби та стану хворого, рецидивуючі захворювання: на початковій стадії лікування застосовуються ті ж рекомендації, що і для г.захворювань, в ході підтримуючої терапії дозу можна знизити до 500-1000 мг (1-2 табл.)/день, хр. захворювання: препарат призначати у добовій дозі 50 мг/кг маси тіла, асимптоматичні захворювання - приймати 30 днів із перервою 60 днів; захворювання з помірно вираженими симптомами - приймати 60 днів з перервою 30 днів; захворювання з тяжкими симптомами - застосовувати протягом 90 днів з перервою 30 днів. при інфекціях, спричинених вірусом папіломи людини (зовнішні генітальні бородавки (гострокінцеві кондиломи) або папіломавірусна інфекція каналу шийки матки) - 3 г (2 табл. 3 р/день) 14-28 днів, при підгострому склерозуючому паненцефаліті добова доза - 100 мг/кг маси тіла, МДД- 3-4 г/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: підвищення рівня сечової кислоти у сироватці крові та сечі; ангіоневротичний набряк, підвищена чутливість, кропив'янка, анафілактична реакція, анафілактичний шок; нервозність, підвищена втомлюваність, нездужання; головний біль, вертиго, сонливість, безсоння, запаморочення; блювання, нудота, дискомфорт у епігастрії, діарея, запор, абдомінальний біль (у верхній частині живота); висип, свербіж, еритема; артралгія; поліурія; втома, дискомфорт; підвищення рівня сечовини, трансаміназ, ЛФ у крові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої допоміжної речовини препарату, загострення подагри, гіперурикемія.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 3 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГРОПІВІРІН	АТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	500мг	№10x2, №10x5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ГРОПІВІРІН	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	500мг	№10x5	24,00	
	ГРОПІВІРІН	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	500мг	№10x2	31,50	
	ГРОПІВІРІН®	АТ "Фармак", Україна	сироп по 100мл у фл. зі шпр.-дозат. у пач.	50 мг/мл	№1	60,00	
	ГРОПІВІРІН®	ПАТ "Фармак", Україна	сироп по 100мл у фл. зі шпр.-дозат. у пач.	50 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ГРОПІВІРІН®	АТ "Фармак", Україна	сироп по 100мл у фл. зі шпр.-дозат. у пач.	100 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ГРОПРИМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	500мг	№10x4	26,25	
	ГРОПРИМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл. у бл.	500мг	№10x2	30,30	
	ІМУНОВІР-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	сироп по 100мл, 200мл у фл. скл. або полім.	50 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НЕОПРИНОЗИН	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика" (випуск серії)/ТОВ "Афлофарм Фармація Польська" (повний цикл виробництва, включаючи випуск серії), Україна/Польща	сироп по 100мл, 150мл у фл.	250мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НОВІРИН	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	500мг	№10x4	25,34	
	НОВІРИН	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. у бл.	500мг	№10x2	26,66	

	НОВІРИН®	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" (контроль серії та випуск серії)/Ей.Бі.Сі. Фармасьютіці С.П.А., Україна/Італія	сіроп по 120мл у фл. з мірн. стак.	50 мг/мл	№1	54,16
II.	ГРОПРИНОЗИН®	ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща", Польща	табл. у бл.	500мг	№10x2, №10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ
	ГРОПРИНОЗИН®-РІХТЕР	ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща" (контроль якості, дозвіл на випуск серії)/Гедеон Ріхтер Румунія А.Т. (виробництво нерозфасованого продукту, первинна упаковка, вторинна упаковка, контроль якості), Польща/Румунія	сіроп по 150мл у фл. з доз. прист.	250мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ
	ІЗОПРИНОЗИН	Лузомедікамента Текнікал Фармацевтікал Сосьедаде, С.А. (Виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка, вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії, контроль серій)/АТ Фармацевтичний завод ТЕВА (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії), Португалія/Угорщина	табл. у бл.	500мг	№10, №20, №30, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ
	НОРМОМЕД	АВС Фармачеутіці С.п.А., Італія	сіроп по 120мл, 180мл, 240мл у фл.	50 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ
	НОРМОМЕД	ЗАТ "Обнінська хіміко-фармацевтична компанія", Російська Федерація	табл. у бл.	500мг	№20, №30, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ

18.1.4. Лікарські засоби бактеріального походження Комбіновані препарати

- **Ліофілізований бактеріальний лізат + Гліколь (Lyophilized bacterial lysate + Glicol) ****

Фармакотерапевтична група: L03AX - імуностимулятори.

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулятор на основі бактеріального лізату; підвищує опір організму до інфекцій, завдяки збільшенню сироваткових та секреторних а/т, активації клітинних та гуморальних факторів неспецифічного імунітету; знижує частоту розвитку та тяжкість протікання респіраторних інфекцій, запобігає необхідності застосування АБЗ; має подвійний механізм дії: активує неспецифічну резистентність за рахунок мембранних а/г, що входять до його складу, шляхом активації дендритних клітин, нейтрофілів, макрофагів та НК-клітин; індукує фагоцитоз та клітинний лізис за рахунок стимуляції адгезії макрофагів на бактеріях; активує специфічний імунітет шляхом підвищення рівня продукції ІЛ-2, специфічних сироваткових ІgА, ІgG, ІgМ та sІgА, активації ефекторних CD4 та CD8 Т-лімфоцитів, активації В-лімфоцитів.

Показання для застосування ЛЗ: у складі комплексного лікування: г., підгострих, рецидивних або хр. інфекцій ВДШ (ГРВІ, грип, риніту, у т. ч. алергічного, фарингіту, назофарингіту, тонзиліту, синуситу, ларингіту, епіглотиту, ангіни), г., підгострих, рецидивних чи хр. інфекцій та захворювань НДШ, у т. ч. обструктивні (трахеїт, трахеобронхіт, бронхіт, бронхоектази, ХОЗЛ); знижує кількість та інтенсивність випадків ГРЗ у дітей, що часто та тривало хворіють, а також знижує кількість загострень ХОЗЛ на рік та тяжкість їх перебігу, для лікування інфекцій, резистентних до а/б - терапії, та для лікування ускладнень бактеріальних та вірусних інфекцій; препарат застосовувати в комбінації з іншими ЛС(а/б та муколітичними засобами).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для р/ос застосування дорослим та дітям від 2 років; г. процеси: 50 мг ліофілізованого бактеріального лізату (1 табл.) розсмоктувати під язиком протягом 1-2 хв. 1 р/добу впродовж щонайменше 10 днів до зникнення симптомів, лікувальний курс - 500мг (10 табл.); профілактичне лікування: 50 мг (1 табл.) розсмоктувати під язиком 1-2 хв. 1 р/добу безперервно 10 днів; після 20-денної перерви повторити 10-денний курс прийому на наступний місяць; повний курс - три декадні курси протягом 3-х міс. із двома 20-денними перервами.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: виникнення реакцій гіперчутливості, включаючи свербіж, подразнення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до компонентів препарату.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ІСМІЖЕН	Брусчеттіні с.р.л., Італія	табл. сублін. у бл.	50мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	

18.1.5. Синтетичні імуномодулятори

18.1.5.1. Високомолекулярні

- **Глатирамер ацетат (Glatiramer acetate)**

Фармакотерапевтична група: L03AX13 - протипухлинні та імуномодулюючі ЛЗ; інші імуностимулятори.

Основна фармакотерапевтична дія: механізми, за якими глатирамер ацетат здійснює свій вплив на пацієнтів з розсіяним склерозом, не з'ясовані повністю; вважається, що це відбувається шляхом модифікування імунного процесу, який є відповідальним за патогенез розсіяного склерозу; така гіпотеза підтримується даними досліджень патогенезу експериментального алергічного енцефаломієліту (ЕАЕ), що при його застосуванні на периферії рекрутуються та активуються специфічні супресорні Т-клітини глатирамеру ацетату.

Показання для застосування ЛЗ: лікування пацієнтів з рецидивуючими формами розсіяного склерозу^{БНФ}; не показаний при первинно- або вторинно-прогресуючому розсіяному склерозі.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують п/ш; дорослим та дітям від 12 років рекомендована доза становить 20 мг 1 р/добу^{БНФ} або дорослим - 40 мг 3 р/тижд.; рішення щодо тривалості лікування приймається лікарем окремо для кожного випадку.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: зоб, гіпертиреоз; задишка, кашель, сезонний риніт, апное, відчуття задухи, гіпервентиляція, носова кровотеча, ларингоспазм, порушення з боку легенів; гіперчутливість; артралгія, біль у спині, біль у шії, артрит, біль у боці, бурсит, м'язова атрофія, остеоартрит; лімфаденопатія, лейкоцитоз, лейкопенія, збільшення селезінки, тромбоцитопенія, аномальна морфологія лімфоцитів; анорексія, збільшення маси тіла, непереносимість алкоголю, подагра, гіперліпідемія, підвищення натрію крові, зниження феритину плазми крові; головний біль, дисгевзія, мігрень, гіпертонія, розлади мовлення, синкопе, тремор, зап'ястний тунельний с-м, когнітивні розлади, судоми, дисграфія, дислексія, дистонія, моторна дисфункція, міоклонус, нейром'язова блокада, параліч перонеального нерва, ступор, параліч, дефект поля зору, неврит, ністагм; імперативні позиви до сечовипускання, затримка сечі, полакіурія, гематурія, нефролітіаз, порушення з боку сечовивідних шляхів, порушення показників загального аналізу сечі; диплопія, розлади зору, катаракта, ураження рогівки, сухість очей, крововилив в очне яблуко, опущення верхньої повіки, мідріаз, атрофія зорового нерва; порушення слуху; нагубання молочних залоз, еректильна дисфункція, пріапізм, опущення тазових органів, аномальний мазок із шийки матки, вагінальна кровотеча, порушення з боку передміхурової залози, тестикулярні порушення, вульвовагінальні порушення; відчуття серцебиття, тахікардія, екстрасистолія, синусна брадикардія, пароксизмальна тахікардія; вазодилатація, варикозне розширення вен; висипання, гіпергідроз, свербіж, захворювання шкіри, кропив'янка, екхімоз, ангіоедема, контактний дерматит, вузликова еритема, шкірні вузлики; нудота; зубний карієс, дисфагія, запор, аноректальні розлади, нетримання калу, диспепсія, блювання, коліт, ентероколіт, відрижка, виразка стравоходу, періодонтит, ректальна кровотеча, збільшення слинних залоз, поліп товстої кишки; порушення функціональних печінкових проб, холелітіаз, збільшення печінки; інфекційні захворювання, грип, бронхіт, гастроентерит, герпес сімплекс, середній отит, риніт, зубний абсцес, вагінальний кандидоз; абсцес, целюліт, фурункул, оперізувальний лишай, пієлонефрит; астенія, біль за грудиною, реакція у місці ін'єк., біль, озноб, набряк обличчя, місцеві реакції, атрофія шкіри у місці ін'єк., периферичний набряк, гіпертермія, набряк; реакція після введення, запалення, некроз шкіри у місці ін'єк., кіста, похмільний с-м, гіпотермія, порушення з боку слизових оболонок; неспокій, депресія, знервованість, аномальні сновидіння, сплутаність свідомості, ейфорія, галюцинації, ворожість, манія, розлад особистості, спроба самогубства; аборт; доброякісна пухлина шкіри, новоутворення, рак шкіри; поствакцинальний с-м.

Противпоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 20 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ГЛАТИРАМЕРУ АЦЕТАТ-ВІСТА	Сінтон БВ (відповідальний за випуск серії)/Сінтон Хіспанія, С.Л. (відповідальний за випуск серії)/Рові Контракт Мануфактурінг, С.Л. (виробництво, пакування, контроль якості)/Сінтон Чилі Лтда. (виробництво, пакування)/Бактім Б.В. (Контроль якості (мікробі, Нідерланди/Іспанія/Іспанія/Чилі/Нідерланди	р-н д/ін'єк. по 1мл в шпр. у бл. в кор..	20 мг/мл	№30, №90	відсутня у реєстрі ОВЦ	

ГЛАТИРАМЕРУ АЦЕТАТ-ВІСТА	Сінтон БВ (відповідальний за випуск серії)/Сінтон Хіспанія, С.Л. (відповідальний за випуск серії)/Рові Контракт Мануфактурінг, С.Л. (виробництво, пакування, контроль якості)/Сінтон Чилі Лтда. (виробництво, пакування)/Бактім Б.В. (Контроль якості (мікробі, Нідерланди/Іспанія/Іспанія/Чилі/Нідерланди	р-н д/ін`єк. по 1мл в шпр. у бл. в кор..	20 мг/мл	№1x28	480,00	32,91/€
ГЛАТИРАМЕРУ АЦЕТАТ-ВІСТА	Рові Контракт Мануфактурінг, С.Л. (виробництво, пакування, контроль якості)/Сінтон Чилі Лтда. (виробництво, пакування)/Сінтон Хіспанія, С.Л. (відповідальний за випуск серії)/Сінтон БВ (відповідальний за випуск серії), Іспанія/Чилі/Іспанія/Нідерланди	р-н д/ін`єк. по 1мл в шпр. у бл. в кор.	40 мг/мл	№1x12	560,00	31,59/€
КОПАКСОН 40	Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд.(виробництво за повним циклом, контроль серії (тільки мікробіологічне тестування))/Нортон Хелскеа Лтд. Т/А АЙВЕКС Фармасьютикалз ЮК (виробництво за повним циклом)/Фармахеми Б.В. (контроль серії (повне тестування, включаючи, Ізраїль/Велика Британія/Нідерланди/Ізраїль/Ізраїль/Ізраїль/Угорщина	р-н д/ін`єк. по 1мл у шпр. в бл. у кор.	40 мг/мл	№1x12	264,48	24,12/\$
КОПАКСОН®-ТЕВА	Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд. (виробництво за повним циклом)/Нортон Хелскеа Лімітед Т/А АЙВЕКС Фармасьютикалз ЮК (виробництво за повним циклом)/Азія Кемікал Індастріз Лтд. (контроль серії (аналітичне тестування та вивчення стабільності))/Фармахеми Б.В, Ізраїль/Велика Британія/Ізраїль/Нідерланди/Угорщина/Ізраїль/Ізраїль	р-н д/ін`єк. по 1мл у шпр. в конт. чар/уп. у кор.	20 мг/мл	№1x28	відсутня у реєстрі ОБЦ	

18.2. Імуносупресори

18.2.1. Глюкокортикостероїди

18.2.1.1. Системні

(див. п.7.4.1. розділу «ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»)

18.2.1.2. Топічні

(див.розділи «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ», «ОФТАЛЬМОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ», «ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЛЕГЕНІВ»)

18.2.2. Природні сполуки

- **Такролімус (Tacrolimus) ***

Фармакотерапевтична група: L04AD02 - імуносупресант; інгібітор кальциневрину.

Основна фармакотерапевтична дія: на молекулярному рівні ефекти такролімусу зумовлюються зв'язуванням з цитозольним білком (FKBP12), який відповідає за його внутрішньоклітинну акумуляцію; комплекс FKBP12-

такролімус специфічно та конкурентно зв'язується з кальциневрином та інгібує його, що призводить до кальційзалежного інгібування Т-клітинних сигнальних шляхів трансдукції, запобігає транскрипції дискретної групи лімфокінних генів; є високоактивним імуносупресивним ЛЗ, що пригнічує формування цитотоксичних лімфоцитів, що відповідають за відторгнення трансплантата, знижують активацію Т-клітин, залежну від Т-хелперів проліферацію В-клітин, а також формування лімфокінів (інтерлейкін-2, -3 та g-інтерферон), експресію рецептора інтерлейкіну-2.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика та лікування відторгнення алотрансплантата печінки, нирок та серця; лікування відторгнення алотрансплантата, резистентного до інших режимів імуносупресивної терапії^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовується р/ос та парентерально (в/в); не рекомендоване струминне введення; парентерально вводиться, коли стан пацієнта не дозволяє р/ос прийом, як тільки клінічний стан пацієнта покращиться, перевести його на р/ос прийом; тривалість в/в терапії не має перевищувати 7 діб; рекомендовані дози на початковій стадії лікування мають базуватися на клінічній оцінці ризику відторгнення та індивідуальній переносимості ЛЗ у кожного пацієнта та на даних моніторингу концентрації такролімусу в крові; при появі клінічних показників відторгнення розглянути можливість корекції режиму імуносупресивної терапії; застосовують у комплексі з іншими імуносупресивними ЛЗ на початковому постопераційному етапі, дозування такролімусу може відрізнятися залежно від обраного імуносупресивного режиму; концентрат р-ну д/інфуз. потребує розведення; концентрація р-ну д/інфуз. повинна складати 0,004-0,1 мг/мл, загальний об'єм інфузії за 24 год. - 20-500 мл; **трансплантація печінки:** ^{БНФ} профілактика відторгнення у дорослих: застосування ч/з 12 год. після завершення операції: якщо стан пацієнта не дозволяє приймати препарат р/ос, проводити в/в терапію, розпочинаючи з дозування 0,01-0,05 мг/кг/добу, вводючи ліки у вигляді в/в інфузії протягом 24 год, р/ос: розпочинати з дози 0,1-0,2 мг/кг/добу, розподіливши її на 2 прийоми; **профілактика відторгнення трансплантата печінки** ^{БНФ} у дітей: проводити в/в терапію, розпочинаючи з дозування 0,05 мг/кг/добу у вигляді в/в інфузії 24 год; р/ос: початкова доза -0,3 мг/кг/добу в 2 прийоми; під час підтримуючої терапії дозу такролімусу знижують; лікування епізодів відторгнення - застосування більш високих доз ЛЗ, разом із додатковою КС-терапією та короткими курсами введення моно/поліклональних антитіл; трансплантація нирок: **профілактика відторгнення трансплантата у дорослих** ^{БНФ} - терапію розпочинати протягом 24 год після завершення операції з дози 0,05-0,1 мг/кг/добу, вводючи препарат у вигляді в/в інфузії протягом 24 год; р/ос: розпочинати з дозування 0,2-0,3 мг/кг/добу, розподіливши цю дозу на два прийоми; **профілактика відторгнення трансплантата у дітей** ^{БНФ} : в/в терапію розпочинати з дози 0,075-0,1 мг/кг/добу, вводючи у вигляді в/в інфузії протягом 24 год, р/ос: розпочинати з дозування 0,3 мг/кг/добу, розподіливши цю дозу на 2 прийоми; **трансплантація серця:** ^{БНФ} профілактика відторгнення трансплантата у дорослих - провести в/в терапію, починаючи з дози 0,01-0,02 мг/кг/добу, вводючи ліки у вигляді в/в інфузії протягом 24 год, р/ос: можна застосовувати разом з індукцією антитілами (з урахуванням відкладеного початку терапії такролімусом) або без призначення антитіл у клінічно стабільних хворих, після індукції антитілами р/ос терапію такролімусом починають з 0,075 мг/кг/добу, розподіливши її на 2 прийоми, застосування препарату розпочинати протягом 5 діб після завершення операції, щойно клінічний стан хворого стабілізується, альтернативний підхід - початкова р/ос дозі 2-4 мг/добу комбінується з мопетилу мікофенолатом і КС або сиролімусом і КС; **профілактика відторгнення трансплантата** ^{БНФ} у дітей: в/в у початковій дозі 0,03-0,05 мг/кг/добу, вводючи ліки у вигляді в/в інфузії протягом 24 год до досягнення концентрації такролімусу у нерозведеній крові 15-25 нг/мл, р/ос прийом препарату у початковій дозі 0,3 мг/кг/добу, яку призначають через 8-12 год після закінчення в/в інфузії, під час підтримуючої терапії дози препарату знижуються, **лікування відторгнення у дорослих та дітей:** початкову дозу препарату 0,15 мг/кг/добу розподілити на 2 прийоми, початкову дозу препарату 0,2-0,3 мг/кг/добу розподілити на два прийоми, **лікування відторгнення - трансплантація** ^{БНФ} : легень - розпочинати з 0,1-0,15 мг/кг/добу, для пацієнтів з трансплантацією підшлункової залози - розпочинати з 0,2 мг/кг/добу і при трансплантації підшлункової залози - розпочинати з дози 0,3 мг/кг/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ризик розвитку інфекцій (вірусних, бактеріальних, грибкових, протозойних), погіршення перебігу уже існуючих інфекцій, місцеві/генералізовані інфекції; нефропатія, асоційована з ВК вірусом; прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія, асоційована з JC вірусом; розвиток доброякісних/ злроякісних новоутворень, Епштейна-Барра-асоційовані лімфопроліферативні захворювання та злроякісні новоутворення шкіри; анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія, лейкоцитоз, відхилення у показниках аналізу еритроцитів, коагулопатії, зміни показників коагуляції і кровотечі, панцитопенія, нейтропенія, тромбоцитарна тромбоцитопенічна пурпура, гіпопротромбінемія; алергічні/ анафілактоїдні р-ції; гірсутизм; гіперлікемічні стани, ЦД, гіперкаліємія, гіпомагніємія, гіпофосфатемія, гіпокаліємія, гіпокальціємія, гіпонатріємія, затримка рідини, гіперурикемія, зниження апетиту, анорексія, метаболічний ацидоз, гіперліпідемія, гіперхолестеринемія, гіпертригліцеридемія, порушення електролітів; зневоднення, гіпопротеїнемія, гіперфосфатемія, гіпоглікемія; безсоння, симптоми тривожності, сплутаність свідомості, дезорієнтація, депресія, пригнічений настрій, розлади та порушення настрою, нічні кошмари, галюцинації, психічні розлади, психотичний розлад; тремор, головний біль, судоми, порушення свідомості, парестезії та дизестезії, периферичні нейропатії, запаморочення, порушення почерку, розлади НС; кома, крововиливи у ЦНС і порушення мозкового кровообігу, паралічі і парези, енцефалопатія, порушення мовлення та артикуляції, амнезія; міастенія; затуманення зору, світлобоязнь, розлади з боку очей, катаракта, сліпота; шум у вухах, зниження/ порушення слуху, нейросенсорна глухота; ішемічні коронарні розлади, тахікардія, шлуночкові аритмії та зупинка серця, СН, кардіоміопатії, гіпертрофія шлуночків, суправентрикулярні аритмії, серцебиття, патологічні показники на ЕКГ, порушення ритму, ЧСС та пульсу, перикардит; патологічні показники ехокардіографії, подовження інтервалу QT на ЕКГ, аритмія типу Torsades de Pointes; АГ, кровотечі, тромбоемболічні та ішемічні ускладнення, периферичні судинні розлади, судинні гіпотензивні розлади, ІМ, венозний тромбоз глибоких вен кінцівок, шок; задишка, легеневі паренхіматозні розлади, плевральний випіт, фарингіт, кашель, закладеність носа і риніт, ДН, розлади з боку ДШ, БА, г. респіраторний дистрес-с-м; діарея, нудота, запальні захворювання ШКТ, ШК виразки та перфорації, ШК кровотечі, стоматит і виразки, асцит, блювання, ШК та абдомінальний біль, диспептичні прояви і симптоми, запор, метеоризм, відчуття здуття, розтягнення у животі, рідкі випорожнення, ШК прояви і симптоми; паралітична кишкова непрохідність, перитоніт, г. і хр. панкреатит, підвищений рівень амілази в крові, ГЕРХ, порушення евакуаторної функції шлунка, часткова непрохідність кишечника (субілеус), псевдокісти підшлункової залози;

порушення функції печінки та печінкових ферментів, холестаза, жовтяниця, гепатоцелюлярні ураження, гепатит, холангіт, тромбоз печінкової артерії, венооклюзивні захворювання печінки, печінкова недостатність, стеноз жовчовивідної протоки, свербіж, висипання, алопеція, акне, гіпергідроз; дерматит, світлочутливість, токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайелла), с-м Стівенса-Джонсона; біль у суглобах/кінцівках/спині, судоми м'язів, розлади суглобів; ниркова недостатність, ГНН, олігурія, тубулярний некроз, токсична нефропатія, порушення показників сечі, розлади з боку сечового міхура та уретри, анурія, гемолітичний уремичний с-м, нефропатія, геморагічний цистит; дисменорея, маткова кровотеча; астеничні стани, гарячкові стани, набряки, біль/дискомфорт, підвищення рівня ЛФ у крові, збільшення маси тіла, порушення терморегуляції, поліорганна недостатність, грипоподібний с-м, порушення сприйняття t^0 навколишнього середовища, відчуття тиску у грудях, відчуття тривожності, погіршення самопочуття, підвищення рівня ЛДГ, зниження маси тіла, спрага, падіння, стискаючий біль у грудній клітині, зниження рухливості, виразки, збільшення маси жирової тканини; первинна дисфункція трансплантата; частота невідома: істинна еритроцитарна аплазія, агранулоцитоз, гемолітична анемія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до такролімусу або інших макролідів, до будь-якої з допоміжних речовин ЛЗ; концентр. д/приготув. р-ну для в/в введення: відома гіперчутливість до олії рицинової, гідрогенізованої поліоксіетиленом, або структурно зв'язаних компонентів.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ТАКПАН	ТОВ "ЛЮМ'ЄР ФАРМА" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Панацея Біотек Лтд., Індія), Україна	капс. тверді у бл.	0,5мг; 1мг; 5мг	№10x5, №10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	АДВАГРАФ®	Астеллас Ірланд Ко., Лтд, Ірландія	капс. прол. дії у бл.	0,5мг	№10x5	309,77	29,14/€
	АДВАГРАФ®	Астеллас Ірланд Ко., Лтд, Ірландія	капс. прол. дії у бл.	1мг	№10x5	309,06	29,14/€
	АДВАГРАФ®	Астеллас Ірланд Ко., Лтд, Ірландія	капс. прол. дії у бл.	5мг	№10x5	238,92	29,14/€
	АДВАГРАФ®	Астеллас Ірланд Ко., Лтд, Ірландія	капс. прол. дії у бл.	3мг	№10x5	206,00	29,14/€
	ЕНВАРСУС	Г.Л. Фарма ГмбХ (вторинне пакування, маркування)/К'езі Фармас'ютікелз ГмбХ (випуск серії)/К'езі Фармацеутиці С.п.А. (вторинне пакування, маркування, випуск серії)/Нувісан ГмбХ (контроль якості)/Роттендорф Фарма ГмбХ (контроль якості вихідної сировини та в, Австрія/Австрія/Італія/Німеччина/Німеччина/Німеччина	табл. прол. дії у бл. в кор.	0,75мг; 1мг; 4мг	№30, №60, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЕНВАРСУС	Г.Л. Фарма ГмбХ (вторинне пакування, маркування)/К'езі Фармас'ютікелз ГмбХ (випуск серії)/К'езі Фармацеутиці С.п.А. (вторинне пакування, маркування, випуск серії)/Нувісан ГмбХ (контроль якості)/Роттендорф Фарма ГмбХ (контроль якості вихідної сировини та в, Австрія/Австрія/Італія/Німеччина/Німеччина/Німеччина	табл. прол. дії у бл. в кор.	0,75мг	№10x3x1	354,60	32,23/€	
ЕНВАРСУС	Г.Л. Фарма ГмбХ (вторинне пакування, маркування)/К'езі	табл. прол. дії у бл. в кор.	1мг	№10x3x2	303,02	32,23/€	

	Фармас'ютікелз ГмбХ (випуск серії)/К'езі Фармацеутиці С.п.А. (вторинне пакування, маркування, випуск серії)/Нувісан ГмбХ (контроль якості)/Роттендорф Фарма ГмбХ (контроль якості вихідної сировини та в, Австрія/Австрія/Італія/Німеччина/Німеччина/Німеччина					
ЕНВАРСУС	Г.Л. Фарма ГмбХ (вторинне пакування, маркування)/К'езі Фармас'ютікелз ГмбХ (випуск серії)/К'езі Фармацеутиці С.п.А. (вторинне пакування, маркування, випуск серії)/Нувісан ГмбХ (контроль якості)/Роттендорф Фарма ГмбХ (контроль якості вихідної сировини та в, Австрія/Австрія/Італія/Німеччина/Німеччина/Німеччина	табл. прол. дії у бл. в кор.	4мг	№10х3х1	293,35	32,23/€
ПРОГРАФ®	Астеллас Ірландія Ко., Лтд., Ірландія	конц. д/приг. р-ну для в/в введ. по 1мл в амп. у чар/уп.	5 мг/мл	№10х1	1142,62	31,68/€
ПРОГРАФ®	Астеллас Ірланд Ко., Лтд, Ірландія	капс. тверді у бл.	0,5мг	№10х5	309,77	29,12/€
ПРОГРАФ®	Астеллас Ірланд Ко., Лтд, Ірландія	капс. тверді у бл.	1мг	№10х5	309,06	29,12/€
ПРОГРАФ®	Астеллас Ірланд Ко., Лтд, Ірландія	капс. тверді у бл.	5мг	№10х5	238,92	29,12/€
ТАКНІ	Лабораторієз Цинфа С.А. (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії), Іспанія	капс. тверді у бл.	0,5мг	№10х5	122,12	25,85/\$
ТАКНІ	Лабораторієз Цинфа С.А. (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії), Іспанія	капс. тверді у бл.	1мг	№10х5	121,84	25,85/\$
ТАКНІ	Лабораторієз Цинфа С.А. (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії), Іспанія	капс. тверді у бл.	5мг	№10х5	114,22	25,85/\$
ТАКПАН	Панацея Біотек Лтд., Індія	капс. тверді у бл.	0,5мг; 1мг; 5мг	№10х5, №10х6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТАКПАН	Панацея Біотек Лтд., Індія	капс. тверді у бл.	0,5мг	№10х6	104,15	26,02/\$
ТАКРОЛІМУС САНДОЗ®	САНДОЗ Прайват Лімітед (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, тестування)/С.К. Сандоз	капс. тверді у бл.	0,5мг; 1мг; 5мг	№10х5	відсутня у реєстрі ОВЦ	

		С.Р.Л. (тестування)/Лек фармацевтична компанія д.д. (первинне та вторинне пакування, тестування, дозвіл на випуск серій, первинне та втор, Індія/Румунія/Словенія			
--	--	---	--	--	--

● **Циклоспорин (Ciclosporin)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: L04AD01 - антинеопластичні та імунomodуючі засоби. Імуносупресанти; інгібітори кальциневрину.

Основна фармакотерапевтична дія: циклічний поліпептид до складу якого входять 11 амінокислот; сильнодіючий імуносупресивний ЛЗ; пригнічує розвиток клітинно-опосередкованих реакцій, включаючи імунітет відносно алотрансплантату, шкірну чутливість уповільненого типу, експериментальний алергічний енцефаломієліт, артрит, зумовлений ад'ювантом Фрейнда, хворобу "трансплантат проти хазяїна" і залежне від Т-лімфоцитів утворення а/т; пригнічує утворення і вивільнення лімфокінів, включаючи інтерлейкін 2 (фактор росту Т-лімфоцитів); блокує лімфоцити у стані спокою у фазі G0 або G1 клітинного циклу і пригнічує а/г залежне вивільнення лімфокінів активованими Т-лімфоцитами; діє на лімфоцити специфічно і оборотно; на відміну від цитостатиків, не пригнічує гемопоез і не впливає на функцію фагоцитів.

Показання для застосування ЛЗ: капс., р-н р/ос та конц. д/р-ну д/інфуз.: трансплантація: солідних органів (запобігання відторгненню трансплантатів солідних органів (нирок, печінки, серця, легенів, алотрансплантатів підшлункової залози, а також комбінованого серцево-легеневого трансплантата); лікування відторгнення трансплантата у пацієнтів, які раніше отримували лікування іншими імуносупресивними ЛЗ); кісткового мозку (запобігання відторгненню аlogenного трансплантата кісткового мозку та трансплантата стовбурових клітин; запобігання та лікування р-ції «трансплантат проти хазяїна»)^{БНФ, ВООЗ}; капс. та р-н р/ос: ендогенний увеїт (активний середній або задній увеїт, що загрожує втратою зору, неінфекційної етіології у випадках, коли альтернативне лікування виявилось неефективним або неприйнятним через побічні реакції; увеїт при захворюванні Бехчета з повторними загостреннями запалення із залученням сітківки ока без неврологічної симптоматики); нефротичний с-м^{БНФ, ВООЗ} (стероїдозалежний/ стероїдорезистентний нефротичний с-м внаслідок мінімальних змін при первинному гломерулонефриті, фокальний сегментарний гломерулосклероз або мембранозний гломерулонефрит); індукція або підтримання ремісії, спричиненої ГКС, що уможлиблює їх відміну; тяжкі форми активного РА^{БНФ, ПМД}, тяжкі форми псоріазу^{БНФ} (коли стандартне лікування виявилось неефективним або неприйнятним); тяжкі форми atopічного дерматиту^{БНФ} (при необхідності системної терапії).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: наведені діапазони доз для р/ос застосування розглядати як рекомендовані, добову дозу препарату ділити на 2 прийоми з рівними проміжками часу між прийомами; трансплантація солідних органів: початкова доза - 10-15 мг/кг маси тіла,^{БНФ} яку розподіляють на 2 прийоми і застосовують за 12 год до трансплантації, протягом 1-2 тижн. після операції ЛЗ застосовують щоденно у такій самій дозі, після чого дозу поступово знижують під контролем концентрації циклоспорину у крові згідно з місцевим протоколом проведення імуносупресивної терапії до досягнення підтримуючої дози 2-6 мг/кг/добу^{БНФ} (за 2 прийоми), можна застосовувати у комбінації з іншими імуносупресантами/КС, на початку лікування можна застосовувати нижчі дози (р/ос дозу 3-6 мг/кг/добу, розподілену на 2 прийоми); трансплантація кісткового мозку/ профілактика та лікування реакції «трансплантат проти хазяїна»: на початку терапії рекомендовану дозу застосовувати за 1 добу перед трансплантацією, рекомендована доза для в/в введення - 3-5 мг/кг/добу, інфузійне введення у даній дозі продовжувати протягом раннього посттрансплантаційного періоду до 2 тижнів, після чого переходити на р/ос підтримуючу терапію у добовій дозі 12,5 мг/кг, розподіленій на 2 прийоми, застосовувати 3-6 (переважно 6) місяців;^{БНФ} ендогенний увеїт: рекомендованою початковою дозою є 5 мг/кг/добу р/ос за 2 прийоми до ремісії активного увеального запалення та покращення гостроти зору, у рефрактерних випадках дозу можна не тривалий період збільшити до 7 мг/кг/добу; нефротичний с-м: для сприяння ремісії рекомендована добова доза - 5 мг/кг для дорослих^{БНФ} і 6 мг/кг для дітей, розподілена на 2 прийоми, час до покращення становить від 3 до 6 міс., дози підбирати індивідуально, зважаючи на ефективність (протеїнурія) та безпеку, вони не повинні перевищувати 5 мг/кг/добу для дорослих та 6 мг/кг/добу для дітей, залежно від типу гломерулопатії, РА:^{БНФ} протягом перших 6 тижнів лікування рекомендована доза -3 мг/кг/добу внутрішньо, яку розподіляють на 2 прийоми, у разі недостатнього ефекту добову дозу можна поступово збільшити, якщо дозволяє переносимість, але не перевищуючи 5 мг/кг/добу,^{БНФ} для досягнення максимальної ефективності лікування продовжувати до 12 тижнів; псоріаз: для індукції ремісії рекомендована початкова доза - 5 мг/кг/добу, розподілена на 2 прийоми^{БНФ}; якщо через 1 міс. лікування не спостерігається покращення, дозу поступово збільшують максимум до 5 мг/кг/добу; для підтримуючої терапії дозу потрібно підбирати індивідуально, на мініальному ефективному рівні, і вона не повинна перевищувати 5 мг/кг/добу; atopічний дерматит^{БНФ}: для дорослих та підлітків віком від 16 років рекомендована доза - 2,5-5 мг/кг/добу, яку розподіляють на 2 прийоми, якщо ч/з 2 тижні реакція на лікування при початковій дозі 2,5 мг/кг/добу не є задовільною, добову дозу можна швидко збільшити до максимальної дози 5 мг/кг, у дуже тяжких випадках - початкова доза 5 мг/кг/добу^{БНФ}; в/в: трансплантація органів - якщо ЛЗ застосовують у комбінації з іншими імуносупресивними препаратами (КС або як частина потрійної або четверної лікарської терапії), можна застосовувати більш низькі дози препарату (1-2 мг/кг/добу в/в з наступними дозами 3-6 мг/кг/добу р/ос як початкову терапію), трансплантація кісткового мозку/ профілактика та лікування р-ції «трансплантат проти хазяїна»: рекомендована доза - в/в 3-5 мг/кг/добу.^{БНФ}

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції генералізовані/локальні (вірусні, бактеріальні, грибові, паразитарні), реактивація поліомавірусних інфекцій; порушення функції нирок, нефропатія, пов'язана з поліомавірусом, або прогресуючою мультифокальною лейкоенцефалопатією, пов'язаної з JC-вірусом; новоутворення доброякісні, злоякісні та невизначеної етіології (кісти, поліпи), лімфоми або лімфопроліферативні розлади, злоякісні новоутворення шкіри; лейкопенія, анемія, тромбоцитопенія, мікроангіопатична гемолітична анемія, гемолітичний уремічний с-м; гіперліпідемія, анорексія, гіперурикемія, гіперкаліємія, гіпомангіємія, гіперглікемія; тремор, головний біль, парестезія, судоми, ознаки енцефалопатії (с-м оборотної задньої енцефалопатії), сплутаність свідомості, дезорієнтація, уповільненість реакцій, збудження, безсоння, зорові

розлади, кіркова сліпота, кома, парези, атаксія мозочка, моторна полінейропатія, набряк диска зорового нерва (набряк сосочка, з можливим зниженням зору внаслідок доброякісної внутрішньочерепної гіпертензії; АГ, припливи; нудота, блювання, анорексія, дискомфорт/ біль у животі, діарея, гіперплазія ясен, пептична виразка, панкреатит; порушення функції печінки; гірсутизм; висипання, акне, алергічні висипання; м'язові спазми/слабкість, міалгія, міопатія, біль у кінцівках; порушення менструального циклу, гінекомастія; підвищена втомлюваність, набряки, пірексія, збільшення маси тіла; частота невідома: тромботична мікроангіопатія, тромботична тромбоцитопенічна пурпура, мігрень, гепатотоксичність та ураження печінки (холестази; жовтяниця, гепатит, печінкова недостатність), артеріолярний гіаліноз, тубулярна атрофія, інтерстиціальний фіброз.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до циклоспорину або до будь-яких з допоміжних речовин ЛЗ; одночасне застосування з ЛЗ, що містять Нурерісум перфоратум (звіробій звичайний); одночасне застосування з ЛЗ, що є субстратами мультикарського ефлюксного переносника Р-глікопротеїну (Рgp) або органічних аніонів транспортних білків (ОАТБ), підвищення концентрації у плазмі крові яких пов'язане з розвитком серйозних побічних реакцій та/або побічних реакцій, що загрожують життю (бозентаном, дабігатрану етексилатом та аліскіреном); ниркова недостатність, за винятком хворих з нефротичним с-мом та помірно підвищеними вихідними концентраціями креатиніну максимум до 200 мкмоль/л у дорослих та 140 мкмоль/л у дітей; при нефротичному с-мі дозволяється обережне лікування із застосуванням доз не вище 2,5 мг/кг/добу, лише в тому випадку, коли застосування циклоспорину сприяє нормалізації показників креатиніну, підвищених внаслідок захворювання; недостатньо контрольована гіпертензія; недостатньо контрольована інфекція; наявність в анамнезі відомих або діагностованих злоякісних новоутворень будь-якого виду, за винятком передракового стану або злоякісних уражень шкіри після лікування.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,25 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕКВОРАЛ®	Тева Чех Індастріз с.р.о., Чеська Республіка	капс. м'які у бл.	25мг	№10x5	105,85	27,41/\$
	ЕКВОРАЛ®	Тева Чех Індастріз с.р.о., Чеська Республіка	капс. м'які у бл.	50мг	№10x5	99,25	27,41/\$
	ЕКВОРАЛ®	Тева Чех Індастріз с.р.о., Чеська Республіка	капс. м'які у бл.	100мг	№10x5	82,70	27,41/\$
	САНДІМУН	Новартіс Фарма Штейн АГ, Швейцарія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 1мл в амп. у кор.	50 мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	САНДІМУН НЕОРАЛ®	Каталент Німеччина Ебербах ГмБХ (виробництво нерозфасованої продукції, контроль якості)/Новартіс Фарма Штейн АГ (первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)/Лек Фармасьютикалс д.д., виробнича ділянка Лендава (первинне та вторинне пакув, Німеччина/Швейцарія/Словенія/Німеччина	капс. м'які у бл.	10мг	№10x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	САНДІМУН НЕОРАЛ®	Каталент Німеччина Ебербах ГмБХ (виробництво нерозфасованої продукції, контроль якості)/Новартіс Фарма Штейн АГ (первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)/Лек Фармасьютикалс д.д., виробнича ділянка Лендава (первинне та вторинне пакув, Німеччина/Швейцарія/Словенія/Німеччина	капс. м'які у бл.	25мг	№5x10	172,15	26,08/\$
	САНДІМУН НЕОРАЛ®	Каталент Німеччина Ебербах ГмБХ (виробництво нерозфасованої продукції, контроль якості)/Новартіс Фарма Штейн АГ (первинне та вторинне пакування,	капс. м'які у бл.	50мг	№5x10	153,89	26,08/\$

		контроль якості, випуск серії)/Лек Фармасьютикалс д.д., виробнича дільниця Лендава (первинне та вторинне пакув, Німеччина/Швейцарія/Словенія/Німеччина					
САНДІМУН НЕОРАЛ®	Каталент Німеччина Ебербах ГмБХ (виробництво нерозфасованої продукції, контроль якості)/Новартіс Фарма Штейн АГ (первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)/Лек Фармасьютикалс д.д., виробнича дільниця Лендава (первинне та вторинне пакув, Німеччина/Швейцарія/Словенія/Німеччина	капс. м'які у бл.	100мг	№5x10	153,89	26,08/\$	
САНДІМУН НЕОРАЛ®	Делфарм Хюнінг С.А.С., Франція	р-н орал. по 50мл у фл. з доз. компл.	100 мг/мл	№1	155,20	26,08/\$	
ЦИКЛОСПОРИН АЛКАЛОЇД	Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія	капс. м'які у бл.	25мг, 50мг, 100мг	№5x10	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЦИКЛОСПОРИН АЛКАЛОЇД	АЛКАЛОЇД АД Скоп'є, Республіка Македонія	р-н орал. по 50мл у фл. з 2шпр., 2пласт. пробк. з канюл.	100 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ		

● **Імуноглобулін антитимоцитарний (кролячий) (Immunoglobulin antithymocyte (rabbit))**

Фармакотерапевтична група: L04AA04 - селективні імуносупресори.

Основна фармакотерапевтична дія: селективний імуносупресивний засіб, що діє на Т-лімфоцити; механізм дії пов'язаний з тим, що Т-клітини виводяться з кровообігу за допомогою комплемент-залежного лізису і потім Fc-залежного механізму опсонізації, опосередкованого системою моноцитів та фагоцитів; Ig проти тимоцитів людини кролячого розпізнає більшість молекул, залучених у каскад активації Т-клітин під час відторгнення трансплантата (CD2, CD3, CD4, CD8, CD11a, CD18, CD25, HLA-DR та HLA клас I); виснаження лімфоцитів представляє первинний механізм імуносупресії; також запускає інші функції лімфоцитів, пов'язані з їхньою імуносупресивною активністю; при вищих концентраціях Ig проти тимоцитів людини кролячий інгібує проліферативні відповіді лімфоцитів на інші мітогени із пост-транскрипційним блокуванням синтезу INF -у та CD25, проте не зменшуючи секрецію IL-2; не активує В-клітини.

Показання для застосування ЛЗ: імуносупресія при трансплантації; профілактика та лікування відторгнення трансплантата^{БНФ}; профілактика г. та хр. реакції «трансплантат проти хазяїна» після трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин; лікування резистентної до стероїдів г. реакції «трансплантат проти хазяїна»; лікування апластичної анемії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: імуносупресія при трансплантації, профілактика г. відторгнення трансплантата: 1-1,5 мг/кг/добу протягом 2-9 днів після трансплантації^{БНФ} нирки, підшлункової залози, печінки та протягом 2-5 днів після трансплантації серця, що відповідає загальній дозі 2-7,5 мг/кг при трансплантації серця та 2-13,5 мг/кг для інших органів; імуносупресія при трансплантації, лікування г. відторгнення трансплантата: 1,5 мг/кг/добу протягом 3-14 днів, що відповідає загальній дозі - 4,5-21 мг/кг; профілактика г. та хр. реакції «трансплантат проти хазяїна» після трансплантації кісткового мозку або гемопоетичних стовбурових клітин з периферичної крові: від родинних не-HLA-ідентичних донорів або від неродинних HLA-ідентичних донорів, вводити у якості попередньої терапії дорослим пацієнтам у дозі 2,5 мг/кг/добу, починаючи з дня -4 до дня -2 або -1, що відповідає загальній дозі 7,5-10 мг/кг; лікування резистентної до стероїдів г. реакції «трансплантат проти хазяїна»: звичайна доза - 2-5 мг/кг/добу протягом 5 днів; лікування апластичної анемії: 2,5-3,5 мг/кг/добу протягом 5 днів поспіль, що відповідає загальній дозі 12,5-17,5 мг/кг; розглянути питання про зниження дози, якщо кількість тромбоцитів становить 50000-75000 клітин/мм³, або якщо кількість лейкоцитів — 2000-3000 клітин/мм³; про припинення лікування, якщо розвивається персистуюча та тяжка тромбоцитопенія (<50000 клітин/мм³) або розвивається лейкопенія (<2000 клітин/мм³); лікування можна припинити без поступового зниження дози.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: лімфоцитопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія; диспное (задишка); діарея, дисфагія, нудота, блювання; свербіж, висипання, кропив'янка, анафілактичні реакції; міалгія; інфекція, реактивація інфекції, фебрильна нейтропенія, сепсис; злоякісні новоутворення (посттрансплантаційні лімфопроліферативні захворювання, лімфоми, солідні пухлини); гіпотензія, АГ; лихоманка; тремор, пропасниця, озноб/тремтіння; сироваткова хвороба, артралгія, міалгія; нездужання, головний біль; підвищення рівнів трансаміназ без клінічних ознак чи симптомів; с-м вивільнення цитокінів (с-м г. ДН, набряк легенів, ІМ, тахікардія та/або летальний наслідок); місцеві побічні реакції (біль у місці інфуз., периферичний тромбоз/флебіт).

Протипоказання до застосування ЛЗ: г. або хр. інфекції, які є протипоказанням для будь-якої додаткової імуносупресії; гіперчутливість до кролячих білків або до будь-якої з допоміжних речовин ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ТИМОГЛОБУЛІН®	Джензайм Поліклоналс САС (виробництво нерозфасованого продукту, дозвіл на випуск серії)/Джензайм Ірланд Лімітед (первинна та вторинна упаковка:)/Джензайм Лімітед (вторинна упаковка), Франція/Ірландія /Велика Британія	ліоф. пор. д/приг. конц. д/р-ну д/інфуз. у фл.	25мг	№1	19274,76	24,45/\$

• **Імуноглобулін антилімфоцитарний (кінський) (Antilymphocyte immunoglobulin (horse))**

Фармакотерапевтична група: L04AA03 - антилімфоцитарний імуноглобулін (кінський).

Основна фармакотерапевтична дія: містить а/т, що зв'язуються з різноманітними білками на поверхні лімфоцитів; зв'язується з гранулоцитами, тромбоцитами, клітинами кісткового мозку та іншими типами клітин; в основі механізму лежить виснаження популяції циркулюючих лімфоцитів із переважним впливом на Т-лімфоцити; виснаження лімфоцитів спричиняє комплементзалежний лізис та/або індукований активацією аплоптоз; імуносупресії сприяє приєднання а/т до лімфоцитів, у результаті чого відбувається часткова активація та індуція імунологічної толерантності Т-лімфоцитів; стимулює ріст гемопоетичних стовбурових клітин і вивільнення гемопоетичних факторів росту - інтерлейкіну-3 та гранулоцитарно-макрофагального колоніестимулюючого фактора.

Показання для застосування ЛЗ: трансплантація нирок: для лікування відторгнення алотрансплантата в пацієнтів із пересадженою ниркою, застосування препарату разом зі стандартною терапією в період відторгнення підвищує частоту сприятливого закінчення епізодів г. відторгнення, застосовують у комбінації з іншими імуносупресорами, щоб відстрочити настання першого епізоду відторгнення; апластична анемія: лікування помірної або тяжкої апластичної анемії у хворих, які не підлягають трансплантації кісткового мозку; ефективність не продемонстровано у хворих з апластичною анемією, які є підходящими кандидатами для трансплантації кісткового мозку, та пацієнтів з апластичною анемією, яка супроводжує новоутворення, хвороби накопичення, мієлофіброз, с-м Фанконі, а також у пацієнтів, які зазнали мієлотоксичного впливу від радіації або будь-яких інших чинників.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати в/в інфузійно; застосовується у комбінації з імуносупресорами; реципієнти ниркових алотрансплантатів: рекомендована доза - 10-15 мг/кг/добу впродовж 14 днів, після цього - ч/з день 14 днів, усього - 21 дозу за 28 днів, для відстрочення відторгнення алотрансплантата 1-шу дозу застосовують у межах 24 год. до або після трансплантації; для лікування відторгнення 1-шу дозу призначають після діагностування першого епізоду відторгнення; у дослідженнях діти отримували у дозах 5-25 мг/кг/добу, дорослі отримували 10-30 мг/кг/добу; апластична анемія (помірна або тяжка): рекомендована доза - 10-20 мг/кг/добу 8-14 днів; можна призначити додатковий курс терапії із застосуванням ч/з день, загальна кількість доз не повинна перевищувати 21, пацієнти можуть потребувати профілактичної трансфузії тромбоцитарної маси, щоб підтримувати рівень тромбоцитів у клінічно прийнятному діапазоні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гарячка, озноб, висипання, тромбоцитопенія, лейкопенія, біль у суглобах, кропив'янка, головний біль, свербіж, нудота, інфекційні захворювання, блювання, тромбофлебіт, АГ, діарея, біль у верхній частині живота, біль у грудях, біль у місці інфузії, набряк, брадикардія, біль у спині, лімфаденопатія, тромбоз артеріовенозної фістули, запаморочення, задишка, тахікардія, відхилення показників функціональних проб печінки, судоми, плевральний випіт, нічні припливи, сироваткова хвороба, гіперглікемія, стоматит, відхилення показників функціональних проб нирок, простий герпес, збудження, гикавка, протеїнурія, астения, нездужання, розходження країв рани, анафілактична реакція, енцефаліт, парестезія, тромбоз ниркової артерії, оклюзія клубової вени, ларингоспазм, набряк легень, алергічний дерматит, набряк ділянки навколо очей, токсичний епідермальний некроліз, вірусний гепатит, місцева інфекція, системна інфекція, анемія, еозінофілія, гранулоцитопенія, гемоліз, гемолітична анемія, нейтропенія, панцитопенія, сплутаність свідомості, дезорієнтація, дискінезія, непритомність, тремор, застійна СН, тромбоз глибоких вен, васкуліт, апное, кашель, носова кровотеча, орофарингеальний біль, біль у животі, шлунково-кишкова кровотеча, перфорації ШКТ, біль у ротовій порожнині, гіпергідроз, біль у боці, ригідність м'язів, міалгія, біль у кінцівках, збільшення нирки, розрив нирки, ГНН, аплазія, почервоніння шкіри, набряк у місці інфузії, біль.

Протипоказання до застосування ЛЗ: пацієнти, у яких раніше виникала тяжка системна реакція на введення цього препарату або будь-яких інших препаратів кінського гама-глобуліну.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АТГАМ / АТГАМ ЛІМФОЦИТАРНИЙ	Фармація і Апджон Компані ЛЛС, США	конц. д/приг. р-ну д/інфуз. по	50 мг/мл	№5	83186,57	26,13/\$

ІМУНОГЛОБУЛІН, АНТИТИМОЦИТАРНИЙ ГЛОБУЛІН (КІНСЬКИЙ)		5мл в амп. у пач.				
---	--	----------------------	--	--	--	--

18.2.3. Синтетичні сполуки

- **Лефлуномід (Leflunomide)** ^(ПМД)

Фармакотерапевтична група: L04AA13 - селективні імунодепресивні агенти.

Основна фармакотерапевтична дія: базисний ЛЗ для лікування РА; має антипроліферативні, імуномодулюючі/імуносупресивні, протизапальні властивості; активний метаболіт лефлуноміду, інгібує у людини фермент дегідрооротат-дегідрогеназу.

Показання для застосування ЛЗ: лікування хворобо-модифікуючим антиревматичним ЛЗ активної фази РА у дорослих пацієнтів, лікування активної фази псоріатичного артриту у дорослих ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: повинен призначати і контролювати лікар з досвідом лікування РА і псоріатичного артриту; **РА:** доза насичення - 100мг 1 р/день протягом 3 днів, підтримуюча доза - 10-20мг 1 р/добу ^{БНФ}, доза може бути зменшена до 10мг 1 р/добу; **псоріатичний артрит:** доза насичення - 100мг 1 р/день протягом 3 днів, підтримуюча доза - 20 мг 1 р/добу ^{БНФ}; терапевтичний ефект виявляється через 4-6 тижн. від початку лікування і може посилюватись протягом 4-6 міс.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: незначне підвищення АТ, лейкопенія, парестезія, головний біль, запаморочення, пронос, нудота, блювання, ураження слизової оболонки ротової порожнини (наприклад, афтозний стоматит, виразки в ротовій порожнині), біль у животі, збільшене випадіння волосся, екзема, шкірні висипання (у тому числі макуло-папульозні висипання), свербіж, сухість шкіри, тендовагініт, підвищення рівня КФК, анорексія, зниження маси тіла (зазвичай незначуще), астенія, незначні АР і підвищення рівня печінкових ферментів (трансаміназ (особливо АЛТ), рідше гаммаглутатіонтрансферази і ЛФ, білірубину), тяжкі інфекції, у тому числі сепсис, який може бути летальним, ризик розвитку злоскісних захворювань, особливо лімфопроліферативних, збільшується при застосуванні деяких імуносупресивних ЛЗ, лейкопенія (кількість лейкоцитів > 2 x 10⁹/л), анемія, незначна тромбоцитопенія (тромбоцити < 100 x 10⁹/л), панцитопенія (ймовірно за антипроліферативним механізмом), еозинofilія, агранулоцитоз, помірні АР, тяжкі анафілактичні/анафілактоїдні реакції, васкуліт, у т. ч. шкірний некротичний васкуліт, підвищення рівня КФК, гіпокаліємія, гіперліпідемія, гіпофосфатемія, підвищення рівня ЛДГ, зниження рівня сечової кислоти в крові, тривожність, парестезія, головний біль, запаморочення, периферична невропатія, помірне підвищення АТ, виражене підвищення АТ, інтерстиціальні захворювання легень (включаючи інтерстиціальні пневмонії) з можливим летальним наслідком, легенева гіпертензія, пронос, нудота, блювання, ураження слизової оболонки ротової порожнини (наприклад, афтозний стоматит, виразки в ротовій порожнині), біль у животі коліти (включаючи мікроскопічний коліт, лімфоцитарний коліт та колагенозний коліт), порушення смаку, панкреатит, підвищення показників функції печінки (трансаміназ, особливо АЛТ, гаммаглутатіонтрансферази і ЛФ, білірубину), гепатит, жовтяниця/холестаз, тяжке ушкодження печінки, наприклад, печінкова недостатність і г. некроз печінки, які можуть бути летальними, випадіння волосся, екзема, шкірні висипання (у тому числі макулопапульозні висипання), свербіж, сухість шкіри, кропив'янка, токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона, мультиформна еритема, СЧВ, пустулярний псоріаз або загострення псоріазу, реакція на медикаменти з еозинofilією і системними проявами, тендовагініт, розрив сухожиль, ниркова недостатність, граничне (оборотне) зниження концентрації сперми, показників спермограми та швидкості лінійної прогресивної рухливості, анорексія, зниження маси тіла (зазвичай незначуще), астенія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до активної субстанції (особливо за наявності в анамнезі с-му Стівенса-Джонсона, токсичного епідермального некролізу, поліформної еритеми), до основного активного метаболіту терифлунаміду або до будь-якої з допоміжних речовин препарату; підвищена чутливість до арахісу, сої; порушення функції печінки, тяжкі імунодефіцитні стани (у т. ч. СНІД), виражені порушення функцій кісткового мозку, виражена анемія, лейкопенія, нейтропенія або тромбоцитопенія внаслідок інших причин (окрім ревматоїдного або псоріатичного артриту), тяжкі інфекції, ниркова недостатність помірного або тяжкого ступеня, оскільки недостатньо досвіду застосування лефлуноміду пацієнтам цієї групи, тяжка гіпопротеїнемія, у т.ч. при нефротичному с-мі, прийом препарату протипоказаний вагітним жінкам і жінкам дітородного віку, які не застосовують надійних методів контрацепції в період лікування лефлуномідом і після лікування доти, доки рівень активного метаболіту в плазмі становить більше 0,02 мг/л, необхідно виключити вагітність перед початком лікування лефлуномідом, період годування груддю.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 20 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БАГЕДА	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл. вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг	№10x3	12,08	23,98/\$
	ЛЕФЛЮТАБ	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за маркування, вторинне пакування, контроль/випробування серії та випуск серії)/Хаупт Фарма Мюнстер ГмБХ (виробник, що відповідає за	табл. в/о у конт.	10мг	№15, №30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	виробництво готової лікарські форми, первинне , Німеччина/Німеччина						
ЛЕФЛЮТАБ	Медак Гезельшафт фюр клініше Спеціалпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за маркування, вторинне пакування, контроль/випробування серії та випуск серії)/Хаупт Фарма Мюнстер ГмБХ (виробник, що відповідає за виробництво готової лікарські форми, первинне , Німеччина/Німеччина	табл. в/о у конт.	20мг	№90	19,52	31,38/€	
ЛЕФЛЮТАБ	Медак Гезельшафт фюр клініше Спеціалпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за маркування, вторинне пакування, контроль/випробування серії та випуск серії)/Хаупт Фарма Мюнстер ГмБХ (виробник, що відповідає за виробництво готової лікарські форми, первинне , Німеччина/Німеччина	табл. в/о у конт.	20мг	№30	35,84	30,72/€	
ЛЕФНО®	Кусум Хелтхкер Pvt Лтд, Індія	табл. в/о у бл.	20мг	№10x3	12,08	23,98/\$	

• **Кислота мікофенолова (Mycophenolic acid) ***

Фармакотерапевтична група: L04AA06 - селективні імуносупресивні ЛЗ.

Основна фармакотерапевтична дія: потужний селективний неконкурентний оборотний інгібітор інозинмонофосфатдегідрогенази, що пригнічує синтез гуанозинових нуклеотидів de novo без включення в ДНК; 2-морфоліноетилловий ефір мікофенолової к-ти здійснює більш виражену цитостатичну дію на лімфоцити, ніж на інші клітини, оскільки проліферація Т- і В-лімфоцитів дуже залежить від синтезу пуринів de novo, в той час як клітини інших типів можуть переходити на обхідні шляхи метаболізму.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика г.відторгнення органа у хворих після аlogenної трансплантації нирки, серця, печінки у складі комбінованої терапії з циклоспорином і КС^{ВНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати р/ос; лікування повинні розпочинати та проводити лише кваліфіковані спеціалісти з трансплантації; капс.250мг.: профілактика відторгнення нирки: дорослі - 1 г 2р/добу (добова доза 2 г), діти віком від 2 до 18 років - рекомендована доза мофетилу мікофенолату - 600 мг/м² р/ос 2р/добу (до максимальної добової дози 2 г), профілактика відторгнення серця: дорослі - хворим із трансплантатом серця прийом по 1,5 г 2 р/добу (добова доза - 3 г); табл. 180 мг, 360 мг: рекомендована доза становить 720 мг (4 табл. по 180 мг або 2 табл.по 360 мг) 2 р/добу (добова доза - 1440 мг), ця доза натрію мікофенолату відповідає 1 г мофетилу мікофенолату 2р/добу (добова доза - 2 г) за показником вмісту мікофенолової кислоти.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: бактеріальні інфекції, грибові інфекції, протозойні інфекції, вірусні інфекції, доброякісне новоутворення шкіри, лімфома, лімфопроліферативне захворювання, новоутворення, рак шкіри, анемія, істинна еритроцитарна аплазія, недостатність кісткового мозку, екхімози, лейкоцитоз, лейкопенія, панцитопенія, панцитопенія, псевдолімфома, тромбоцитопенія, ацидоз, гіперхолестеринемія, гіперглікемія, гіперкаліємія, гіперліпідемія, гіпокальціємія, гіпокаліємія, гіпомангіємія, гіпосфатемія, гіперурикемія, подагра, зменшення маси тіла, сплутаність свідомості, депресія, безсоння, збудження, тривожність, порушення мислення, запаморочення, головний біль, парестезія, сонливість, тремор, судоми, порушення смаку, тахікардія, АГ, артеріальна гіпотензія, лімфоцеле, венозний тромбоз, вазодилатація, бронхоектази, кашель, задишка, інтерстиціальне захворювання легенів, плевральний випіт, фіброз легенів, здуття живота, абдомінальний біль, коліт, запор, зниження апетиту, діарея, диспепсія, езофагіт, відрижка, метеоризм, гастрит, шлунково-кишкова кровотеча, виразка ШКТ, гіперплазія ясен, кишкова непрохідність, виразки ротової порожнини, нудота, панкреатит, стоматит, блювання, гіперчутливість,гіпогаммаглобулінемія, підвищення рівня лужної фосфатази в крові, підвищення рівнів печінкових ферментів, гепатит, гіпербілірубінемія, жовтяниця, акне, алопеція, алопеція, висипання, гіпертрофія шкіри, артралгія, м'язова слабкість, підвищення рівня креатиніну в крові, підвищення рівня сечовини в крові, гематурія, порушення функції нирок, астенія, озноб, набряк, грижа, нездужання, болі, підвищення t° тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливістю до мофетилу мікофенолату, мікофенолової кислоти або до будь-якого іншого компонента препарату, жінки репродуктивного віку, які не використовують вискоєфективну контрацепцію, лікування препаратом не розпочинати жінкам репродуктивного віку без отримання результатів тесту на вагітність, щоб виключити ненавмисне застосування під час вагітності, не застосовувати вагітним, крім випадків, коли немає відповідного альтернативного лікування для запобігання відторгнення трансплантата, не застосовувати жінкам, які годують груддю.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	МАЙСЕПТ	Панацея Біотек Лтд., Індія	капс. тверді у бл.	250мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МАЙСЕПТ	Панацея Біотек Лтд., Індія	капс. тверді у бл.	250мг	№10x3	90,25	27,70/\$
	МІКОМЕДА	Апотекс Інк. (виробництво лікарського засобу, контроль якості, випуск та сертифікація серії, пакування), Канада	табл. з відстр. вивіл. у фл.	180мг	№120	244,00	28,03/\$
	МІКОМЕДА	Апотекс Інк. (виробництво лікарського засобу, контроль якості, випуск та сертифікація серії, пакування), Канада	табл. з відстр. вивіл. у фл.	360мг	№120	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МІКОФЕНОЛОВА КИСЛОТА	Апотекс Інк., Канада	табл. вкриті к/р об. у фл.	180мг	№120	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МІФЕНАКС®	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина	капс. тверді у бл.	250мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МІФЕНАКС®	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина	капс. тверді у бл.	250мг	№10x10	93,32	28,64/€
	МІФОРТИК	Новартіс Фарма Штейн АГ/Новартіс Фарма Продакшн ГмбХ, Швейцарія/Німеччина	табл. в/о, к/р у бл.	180мг	№10x12	347,22	27,76/\$
	МІФОРТИК	Новартіс Фарма Штейн АГ/Новартіс Фарма Продакшн ГмбХ, Швейцарія/Німеччина	табл. в/о, к/р у бл.	360мг	№10x12	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СЕЛЛСЕПТ®	Дельфарм Мілано, С.Р.Л. (виробництво нерозфасованої продукції, випробування контролю якості)/Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд (випуск серії; пакування), Італія/Швейцарія	капс. у бл.	250мг	№10x10	122,26	26,22/\$

- **Азатиоприн (Azathioprine) ***

Фармакотерапевтична група: L04AX01 - імуносупресанти.

Основна фармакотерапевтична дія: є проліками 6-меркаптопурину (6-МП); 6-МП - неактивний, але діє як антагоніст пурину і для імуносупресії потребує клітинного поглинання та внутрішньоклітинного анаболізму до нуклеотидів тіоганіну (НТГ); НТГ та інші метаболіти (рибонуклеотиди 6-метил-меркаптопурину) пригнічують de novo синтез пурину та взаємоперетворення нуклеотидів пурину; НТГ також інкорпоровані до нуклеїнових к-т, що сприяє імуносупресивним ефектам азатиоприну; пригнічує шляхи біосинтезу нуклеїнових к-т, затримує проліферацію клітин, що беруть участь у процесі детермінації та ампліфікації імунної відповіді.

Показання для застосування ЛЗ: у комбінації з КС та/або іншими імуносупресивними ЛЗ для профілактики р-ції відторгнення органів при трансплантації нирок, серця, печінки, для зменшення потреби у КС при трансплантації нирок^{БНФ, ВООЗ}; як монотерапія або у комбінації з КС та/або іншими ЛЗ (що може включати зменшення дози або відміну КС) застосовується при: тяжкому РА^{БНФ, ВООЗ}; СЧВ; дерматоміозиті та поліміозиті^{БНФ}; аутоімунному хр. активному гепатиті; вульгарній пухирчатці; вузликовому поліартеріїті; аутоімунній гемолітичній анемії; хр. рефрактерній ідіопатичній тромбоцитопенічній пурпурі; рецидивному переміжному розсіяному склерозі.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дози при трансплантації: у дорослих: залежно від режиму імуносупресії в 1-й день застосовувати до 5 мг/кг/добу у 2-3 прийоми; підтримуюча доза - 1-4 мг/кг/добу і повинна встановлюватись залежно від клінічного стану та гематологічної толерантності; терапія азатиоприном повинна проводитись невизначено довго, навіть при застосуванні низьких доз, через ризик відторгнення трансплантата; розсіяний склероз (рецидивний переміжний): рекомендована доза - 2-3 мг/кг/добу у 2-3 прийоми; лікування - більше року; інші захворювання: початкова доза -1-3 мг/кг/добу, уточнюється у цих межах залежно від клінічної відповіді^{БНФ} (що проявляється через тижні або міс. лікування) та гематологічної толерантності; при появі терапевтичного ефекту підтримуюча доза зменшується до рівня, при якому цей терапевтичний ефект підтримується; при відсутності терапевтичного ефекту через 3 міс. лікування переглянути доцільність призначення азатиоприну; для профілактики у дітей р-ції відторгнення при трансплантації спосіб застосування і дози такі, як для дорослих.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: вірусні, грибові та бактеріальні інфекції (тяжкі та атипичні інфекції, що спричиняються вірусами Varicella, herpes zoster та іншими інфекційними агентами), прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія, асоційована з JC вірусом; новоутворення, неходжкінські лімфоми, рак

шкіри (меланома та інші види), саркома (Капоші та інші види), рак шийки матки, г. мієлолейкоз та мієлодисплазія; пригнічення ф-ції кісткового мозку, лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія, агранулоцитоз, панцитопенія, апластична анемія, мегалобластична анемія, еритроїдна гіпоплазія; р-ції гіперчутливості, с-м Стівенса-Джонсона та токсичний епідермальний некроліз; загальне нездужання, запаморочення, нудота блювання, діарея, гарячка, озноб, екзантема, висип, васкуліт, міалгія, артралгія, гіпотензія, порушення ф-ції нирок/ печінки, холестаза; оборотний пневмоніт; панкреатит, коліт, дивертикуліт та перфорація кишечника у хворих після трансплантації, тяжка діарея у хворих на запальні захворювання кишечника, життєво небезпечне ураження печінки; підвищення рівнів ЛФ, білірубину, трансаміназ сироватки крові; алопеція; аритмія, ураження рота та губ, менінгіт, парестезія, погіршення перебігу міастенії гравіс, погіршення перебігу дерматоміозиту, зміна смакових відчуттів та нюху.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до азатиоприну та інших компонентів ЛЗ; гіперчутливість до 6-меркаптопурину.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,15 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ІМУРАН	Екселла ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина	табл. вкриті п/о у бл.	50мг	№25x4	31,94	25,10/\$

• **Еверолімус (Everolimus)**

Фармакотерапевтична група: L04AA18 - селективні імуносупресанти.

Основна фармакотерапевтична дія: інгібітор сигналу проліферації, чинить імуносупресивну дію шляхом інгібування проліферації Т-клітин, активізованих а/г і клонального збільшення, керованого інтерлейкінами, специфічних Т-клітин (інтерлейкіном-2 і інтерлейкіном-15); інгібує внутрішньоклітинну передачу сигналу, що зазвичай призводить до проліферації клітин у разі зв'язування цих факторів росту Т-клітин з їх рецепторами; блокування цього сигналу еверолімусом викликає пригнічення клітин у стадії G₁-клітинного циклу; на молекулярному рівні утворює комплекс із цитоплазматичним білком FKBP-12; у присутності еверолімусу пригнічується фосфорилування р70 S6-кінази, стимульоване фактором росту; оскільки фосфорилування р70 S6-кінази знаходиться під контролем FRAP (mTOR), комплекс еверолімус-FKBP-12 зв'язується й у такий спосіб впливає на функцію FRAP; дія еверолімусу не обмежується Т-клітинами; еверолімус повністю пригнічує проліферацію кровотворних і некровотворних клітин, стимульованих фактором росту (судинні клітини гладких м'язів); унаслідок проліферації судинних клітин гладких м'язів, стимульованих фактором росту, ушкоджуються ендотеліальні клітини, що призводить до утворення неоінтими, яка відіграє головну роль у патогенезі хр. відторгнення.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика відторгнення трансплантата у дорослих пацієнтів із низьким і помірним імунологічним ризиком після аlogenної трансплантації нирки або серця^{БНФ} (застосовується у комбінації з мікроемальсією циклоспоруину і КС).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: початкова доза для дорослих при трансплантації нирки і серця - 0,75 мг 2 р/добу, якомога швидше після трансплантації^{БНФ}; цільовий мінімальний рівень - 3-8 нг/мл; добову дозу призначати р/ос 2 р/добу; для пацієнтів може бути необхідним коригування дози, що залежить від досягнутих рівнів у крові, переносимості, індивідуальної відповідної реакції, зміни в супутньому лікуванні і клінічній картині; регулювання дози може здійснюватися з 4-5-денними інтервалами^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: вірусні, бактеріальні і грибові інфекції, інфекції ВДШ/ НДШ, у т.ч. пневмонія, сепсис, інфекції сечовивідних шляхів, ранева інфекція; злоякісні або невизначені пухлини, пухлини шкіри, лімфоми, лімфопроліферативні розлади, анемія/ еритропенія, лейкопенія, тромбоцитопенія, панцитопенія, тромботично-мікроангіопатичні розлади (тромботична тромбоцитопенічна пурпура, гемолітичний уремічний с-м, тромботичні мікроангіопатії); гіпогонадизм у чоловіків (знижений рівень тестостерону, підвищення ФСГ і ЛГ), гіперліпідемія (холестерол і тригліцериди), вперше діагностований ЦД, гіпокаліємія; безсоння, тривожність; головний біль, перикардіальний випіт (при трансплантації серця), тахікардія; АГ, венозна тромбоемболія, лімфоцеле, носова кровотеча, тромбоз трансплантата нирки, лейкоцитокластичний васкуліт; плевральний випіт (при трансплантації нирки), кашель (при трансплантації нирки), задишка (при трансплантації нирки), пневмонія, інтерстиціальна хвороба легень, легеневий альвеолярний протеїноз; запор, абдомінальний біль, діарея, нудота, блювання, орофарингеальний біль, панкреатит, стоматит/виразки в ротовій порожнині; неінфекційний гепатит, жовтяниця; акне, висип, еритродермія, реакції гіперчутливості; артралгія, міалгія; протеїнурія, некроз ниркових каналців (при трансплантації нирок), ниркова недостатність; еректильна дисфункція; периферичний набряк, порушення загоєння ран, лихоманка, біль; ангіоневротичний набряк (язика та глотки), грижа післяопераційного рубця; порушення функції печінки (підвищення рівнів гамма-GT, АСТ, АЛТ).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до еверолімусу, сиролімусу або до будь-якої з допоміжних речовин; індукування анти-Т-лімфоцитарним Іg протипоказано, якщо ЛЗ показаний для трансплантації серця.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1,5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	СЕРТИКАН	Новартіс Фарма Штейн АГ,	табл. у бл.	0,75мг	№10x6	325,18	26,08/\$

	Швейцарія					
--	-----------	--	--	--	--	--

18.2.4. Імуносупресори на основі моноклональних антитіл

• **Базиліксімаб (Basiliximab)**

Фармакотерапевтична група: L04A C02. Імуносупресанти. Інгібітори інтерлейкіну. Базиліксімаб.

Основна фармакотерапевтична дія: мишаче/людське химерне моноклональне а/т, дія якого спрямована проти α -ланцюжка рецептора інтерлейкіну-2 (а/г CD25), що експресується на поверхні Т-лімфоцитів у відповідь на а/г провокацію; специфічно і з високим афінитетом зв'язується з а/г CD25 на активованих Т-лімфоцитах, які експресують високоафінитивний рецептор інтерлейкіну-2, запобігаючи зв'язуванню інтерлейкіну-2, що служить сигналом для проліферації Т-клітин; повне і стійке блокування рецептора інтерлейкіну-2 підтримується доки рівень базиліксімабу в сироватці перевищує 0,2 мкг/мл; при зменшенні значення концентрації нижче зазначеної величини, прояв а/г CD25 повертається до початкових величин протягом 1-2 тижн.; не викликає мієлосупресії.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика г. відторгнення органів при аlogenній трансплантації нирок *de novo* у дорослих та дітей (від 1 до 17 р.); застосовують при проведенні імуносупресивної терапії циклоспорином (мікроемальсія) та кортикостероїдами у пацієнтів^{БНФ}, у яких вміст панель-реактивних а/т становить < 80 % або потрібної підтримуючої імуносупресивної терапії циклоспорином (мікроемальсія), кортикостероїдами та азатиоприном чи мікофенолатом мофетилом.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити як в/в болюсну ін'єкцію або як в/в інфузію протягом 20 - 30 хв.; повинен призначати тільки лікар, який має досвід проведення імуносупресивної терапії після трансплантації органа; потрібно застосовувати для імуносупресивної терапії, що базується на циклоспорині (у формі мікроемальсії) та КС або у потрібній схемі імуносупресії на основі циклоспорину (у формі мікроемальсії), КС та азатиоприну чи мікофенолату мофетилу; не вводити, якщо немає абсолютної впевненості, що пацієнт отримає трансплантат та супутню імуносупресію; стандартна сумарна доза становить 40 мг, що вводиться двома дозами по 20 мг кожна (першу дозу 20 мг вводять у межах 2 год. до трансплантаційної операції, другу дозу 20 мг вводять через 4 доби після трансплантації)^{БНФ}; від другої дози відмовитися у разі тяжкої АР на ЛЗ або післяопераційних ускладнень, таких як відторгнення пересаженого органа; дітям 1-17 років з масою тіла < 35 кг сумарна доза становить 20 мг, що вводиться двома дозами по 10 мг кожна^{БНФ}; для дітей з масою тіла > 35 кг рекомендована сумарна доза 40 мг, що вводиться двома дозами по 20 мг кожна.^{БНФ}

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: запор, інфекція сечовивідних шляхів та біль, нудота, периферичний набряк, АГ, анемія, головний біль, гіперкаліємія, гіперхолестеринемія, післяопераційне ускладнення рани, збільшення маси тіла, збільшення рівня креатиніну в крові, гілофосфатемія, діарея та інфекція ВДШ, гіпертрихоз, риніт, підвищення t°, вірусна інфекція, сепсис, лімфома/ лімфопроліферативні розлади, АР/ анафілактоїдні р-ції, кропив'янка, свербіж, чхання, важке дихання, бронхоспазм, задишка, набряк легень, СН, гіпотензія, тахікардія, ДН, с-м підвищеної проникності капілярів, с-м вивільнення цитокіну.

Протипоказання до застосування ЛЗ: відома гіперчутливість до базиліксімабу або будь-якого іншого компонента препарату; вагітність та лактація.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 40мг (курсдова доза)

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	СІМУЛЕКТ®	Новартіс Фарма Штейн АГ (Виробництво лікарського засобу за повним циклом та вторинне пакування, випуск серії розчинника)/Новартіс Фарма АГ (Контроль якості лікарського засобу)/Такеда Австрія ГмбХ (виробництво, контроль якості, первинне пакування розчинник, Швейцарія/Швейцарія/Австрія/Австрія	ліоф. д/р-ну д/ін'єкц./інфуз. у фл. з розч.	20мг	№1	65808,00	26,98/\$

- **Бевацизумаб (Bevacizumab)** (див. п. 19.1.6. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")
- **Інфліксімаб (Infliximab)**^[ПМД] (див. п. 3.13.3. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: L04AB02 - імуносупресанти; інгібітори фактора некрозу пухлини- α (TNF α).

Основна фармакотерапевтична дія: гібридне мишачо-людське (IgG1) моноклональне а/т з високою афінністю як до розчинних, так і трансмембранних форм фактора некрозу пухлини α (TNF α), але не здатне нейтралізувати лімфотоксин α (TNF β).

Показання для застосування ЛЗ: РА (у комбінації з метотрексатом^{БНФ, ПМД} для послаблення симптомів та поліпшення функціонального статусу дорослим пацієнтам: із захворюваннями в активній формі при неефективності лікування базовими протиревматичними ЛЗ, що модифікують перебіг хвороби, включаючи метотрексат; із захворюванням у тяжкій, активній або прогресуючій формі, яким раніше не проводили лікування метотрексатом або іншими базовими протиревматичними ЛЗ, що модифікують перебіг хвороби; хвороба Крона^{БНФ} у дорослих пацієнтів в активній формі від середнього до тяжкого ступеня при відсутності відповіді, непереносимості або медичних протипоказаннях до проведення повного та відповідного курсу терапії із застосуванням КС та/або імунодепресантів; з утворенням фістул^{БНФ} при відсутності відповіді на повний та

відповідний курс стандартної терапії (а/б, дренаж, терапія імунодепресантами)) та у дітей 6-17 років (в тяжкій активній формі при відсутності відповіді, непереносимості чи медичних протипоказаннях до проведення терапії стандартними ЛЗ (КС, імуномодуляторів, первинної дієти), проводиться тільки у комбінації зі стандартною імуносупресивною терапією; активна форма виразкового коліту середнього та тяжкого ст.^{БНФ} у дорослих пацієнтів при відсутності відповіді, непереносимості або медичних протипоказаннях до проведення терапії стандартними ЛЗ (КС, 6-меркаптопурину або азатиоприну); активна форма анкілозивного спондилоартриту^{БНФ} тяжкого ст. у дорослих при відсутності відповіді на терапію стандартними ЛЗ; активна та прогресуюча форма псоріатичного артрити^{БНФ, ПМД} у дорослих пацієнтів при неефективності лікування базовими протиревматичними ЛЗ, які модифікують перебіг хвороби (у комбінації з метотрексатом^{БНФ} або як монотерапія пацієнтам з непереносимістю чи медичними протипоказаннями до застосування метотрексату); псоріаз: лікування бляшкоподібного псоріазу^{БНФ} середнього-тяжкого ст. у дорослих, у яких не спостерігається відповіді або є протипоказання чи непереносимість до інших видів системної терапії (циклоспорину, метотрексату або ПУВА-терапію).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати в/в інфузійно протягом щонайменше 2 год.^{БНФ}; лікування проводити під контролем лікарів із досвідом діагностики та лікування таких захворювань як РА, запальні захворювання кишечника, анкілозивний спондилоартрит, псоріатичний артрит, псоріаз; РА: дорослим по 3мг/кг на 2-й та 6-й тижд. лікування після першої інфузії, далі - ч/з кожні 8 тижн. залежно від перебігу захворювання (у комбінації з метотрексатом)^{БНФ}, терапевтичний ефект досягається протягом 12 тижн. після початку лікування; у разі недостатньої відповіді або при відсутності терапевтичного ефекту після 12 тижн. дозу поетапно збільшити на 1,5-7,5мг/кг кожні 8 тижн.; як альтернатива - 3мг/кг кожні 4 тижн.^{БНФ}; при відсутності відповіді протягом перших 12 тижн. лікування або після корекції дози ретельно оцінити доцільність продовження терапії; активна форма хв. Крона від середнього до тяжкого ст.: дорослим 5 мг/кг, ч/з 2 тижні провести повторну інфузію у тій же дозі, у разі відсутності відповіді після 2-ї дози не проводити подальше лікування^{БНФ}, також не проводити повторне лікування інфліксимабом при відсутності відповіді протягом 6 тижн. після початку лікування; підтримувальна терапія - додаткова інфузія 5 мг/кг на 6 тижн. після 1-го введення, після чого - проведення інфузії кожні 8 тижн.^{БНФ} або повторне призначення - 5 мг/кг при появі ознак рецидиву захворювання; хвороба Крона в активній формі з утворенням фістул: дорослим по 5 мг/кг на 2-й та 6-й тижд. лікування після першого застосування; якщо після введення 3-х доз немає позитивного клінічного ефекту, терапію припинити; пацієнтам з відповіддю підтримувальна терапія - додаткові інфузії по 5 мг/кг кожні 8 тижн. або повторне призначення -5 мг/кг, якщо ознаки або симптоми захворювання виникають знову, подальша терапія дозою 5 мг/кг через кожні 8 тижн.; оцінити доцільність продовження терапії пацієнтів, які не демонструють проявів позитивного терапевтичного ефекту після корекції дози; пацієнтам, яким призначають препарат з коротшими ніж 8 тижн. інтервалами, мають підвищений ризик появи побічних реакцій; виразковий коліт, псоріатичний артрит, псоріаз: дорослим 5 мг/кг на 2-й та 6-й тижд. лікування після першої інфузії, далі - через кожні 8 тижн.; клінічна відповідь досягається протягом 14 тижн. після початку лікування, оцінити доцільність продовження терапії у пацієнтів, які не демонструють проявів позитивного терапевтичного ефекту протягом цього періоду часу^{БНФ}; анкілозивний спондилоартрит: дорослим 5 мг/кг на 2-й та 6-й тижд. лікування після першої інфузії, далі - через кожні 6-8 тижн.; у разі відсутності відповіді на 6-му тижні (після отримання 2-х доз) подальше лікування не проводити^{БНФ}; хв. Крона у дітей віком від 6 років: 5 мг/кг в/в на 2 та 6 тижнях лікування після першої інфузії, далі - ч/з кожні 8 тижнів, виразковий коліт у дітей віком від 6 років - 5 мг/кг в/в на 2 та 6 тижнях лікування після першої інфузії, далі - ч/з кожні 8 тижнів, псоріаз - ефективність та безпека для лікування у дітей не встановлені; ювенільний ідіопатичний артрит, псоріатичний артрит, анкілозивний спондилоартрит: ефективність та безпека для лікування у дітей не встановлені, ЮРА: ефективність та безпека для лікування у дітей не встановлені;

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: вірусні інфекції (грип, герпес); бактеріальні інфекції (абсцес, запалення підшкірної клітковини, сепсис); ТБ, грибові інфекції (кандидоз); менінгіт, опортуністичні інфекції (інвазивні грибові інфекції - пневмоцистоз, гістоплазмоз, аспергілез, кокцидіодомікоз, криптококоз, бластомікоз; бактеріальні інфекції - атипова мікобактеріальна, лістеріоз, сальмонельоз; вірусні інфекції - ЦМВ), паразитарні інфекції, реактивація ВГВ; лімфома, неходжкінська лімфома, хвороба Ходжкіна, лейкемія, меланома, рак шийки матки; нейтропенія, лейкопенія, анемія, лімфаденопатія; тромбоцитопенія, лімфопенія, лімфоцитоз; агранулоцитоз, тромбоцитопенічна тромбогемолітична пурпура, панцитопенія, гемолітична анемія, ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура; АР з боку дихальної системи, анафілактичні реакції, вовчакоподібний с-м, сироваткова хвороба або реакції, що нагадують сироваткову хворобу; анафілактичний шок, васкуліт, саркоїдоподібна реакція; депресія, безсоння, амнезія, збудження, сплутаність свідомості, сонливість, знервованість; апатія; головний біль, вертigo, запаморочення, гіпестезія, парестезія, судоми, нейропатія; поперековий мієліт, демієлінізуючі розлади ЦНС (подібна до розсіяного склерозу хвороба, неврит зорового нерва), периферичні демієлінізуючі розлади (с-м Гійєна-Барре, хр. запальна демієлінізуюча поліневропатія та мультифокальна моторна нейропатія); кон'юнктивіт; кератит, періорбітальний набряк, ячмінь; ендоксальміт; тахікардія, відчуття серцебиття, СН (поява або погіршення), аритмія, втрата свідомості, брадикардія, ціаноз, перикардіальний випіт; артеріальна гіптензія, АГ, екхімози, припливи, почервоніння; периферична ішемія, тромбофлебіт, гематоми, порушення кровообігу, петехії, спазм судин; інфекції ВДШ/ НДШ, синусит, задишка, носова кровотеча; набряк легенів, бронхоспазм, плеврит, плевральний випіт; інтерстиціальне захворювання легенів (у т. ч. швидко прогресуюче, фіброз легенів і пневмонія); біль у животі, нудота; кровотечі ШКТ, діарея, розлади травлення, ГЕРХ, запор, перфорація кишечника, стеноз кишечника, дивертикуліт, панкреатит, хейліт; порушення функцій печінки, збільшення печінкових трансаміназ, гепатит, гепатоцелюлярні пошкодження, холецистит, аутоімунний гепатит, жовтяниця; набутий або прогресуючий псоріаз (пустульозний псоріаз долонь та п'яток), кропив'янка, висипання, свербіж, підвищена пітливість, сухість шкіри, грибовий дерматит, екзема, алопеція, бульозні висипання, оніхомікоз, себорея, розацеа, папілома, гіперкератоз, порушення пігментації шкіри; токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона, мультиформна еритема, фурункульоз; артралгія, міалгія, біль у спині; інфекції сечовивідних шляхів; пієлонефрит; вагініт; інфузійні реакції, біль, біль у грудній клітці, втомлюваність, жар, реакції у місці введення, озноб, набряк; уповільнене загоювання ран; гранулематозні ураження; утворення аутоімунних а/т; зміни фактора комплементу; частота невідома - зараження після вакцинації (немовлята, чиї матері лікувалися інфліксимабом у період вагітності), гепатолієнальна Т-клітинна лімфома (у

підлітків та молодих людей із хворобою Крона та виразковим колітом), меркеліома; мінуща втрата зору; ішемія міокарда/ ІМ; печінкова недостатність; печінкова недостатність; погіршення симптомів дерматоміозиту.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до інфліксимабу, інших мишачих білків або будь-яких допоміжних речовин ЛЗ; ТБ або інші тяжкі інфекції (сепсис, абсцеси, опортуністичні інфекції); СН тяжкої та середньої тяжкості (NYHA III/IV).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 3,75 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	РЕМИКЕЙД®	Янссен Байолоджикс Б.В. (випуск серії)/Сілаг АГ (виробництво за повним циклом), Нідерланди/Швейцарія	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	100мг	№1	361,38	26,77/\$
	ФЛАММЕГІС®	СЕЛЛТРІОН, Інк. (виробництво активного фармацевтичного інгредієнта; виробництво готового препарату, первинне пакування, вторинне пакування, випуск серії)/ЗАТ Фармацевтичний Завод ЕГІС (вторинне пакування), Республіка Корея/Угорщина	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	100мг	№1	371,25	27,74/\$

- **Ритуксимаб (Rituximab) *** (див. п. 19.1.6. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")

Показання для застосування ЛЗ: РА^{БНФ}: лікування тяжкого РА^{БНФ} (активна форма) у дорослих у комбінації з метотрексатом при неефективності або непереносимості лікування іншими хворобо-модифікуючими протиревматичними препаратами у т. ч. лікування одним чи кількома інгібіторами фактора некрозу пухлин; у комбінації з метотрексатом зменшує швидкість прогресування деструктивних змін у суглобах за рентгенологічними даними та покращує фізичну функцію; лікування тяжких форм активного гранулематозу з поліангіїтом (гранулематоз Вегенера) і мікроскопічного поліангіїту^{БНФ} у комбінації з глюкокортикоїдами з метою індукції ремісії у дорослих пацієнтів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: інфузії проводити під ретельним спостереженням досвідченого медичного персоналу у спеціалізованих відділеннях, де можливе надання невідкладної допомоги; хворим на РА премедикацію із застосуванням 100 мг метилпреднізолону в/в завершити за 30 хв до інфузії ЛЗ, щоб знизити частоту та тяжкість інфузійних реакцій; пацієнтам із гранулематозом і поліангіїтом (гранулематозом Вегенера) або мікроскопічним поліангіїтом - в/в введення метилпреднізолону у дозі 1000 мг/добу протягом 1-3 днів перед першою інфузією ЛЗ (останню дозу преднізолону можна ввести у той самий день, що і першу дозу ритуксимабу), надалі пацієнтам р/ос приймати преднізон по 1 мг/кг/добу (не більше 80 мг/добу і зменшувати дозу якомога швидше, виходячи із клінічної потреби) протягом та після застосування препарату ритуксимабу; РА: курс терапії складається з 2 в/в введень по 1000 мг, рекомендована доза становить 1000 мг в/в; наступне введення у дозі 1000 мг проводиться через 2 тижні^{БНФ}; потреба у подальших курсах визначається ч/з 24 тижні після попереднього курсу; клінічна відповідь зазвичай досягається протягом 16-24 тижн. після початкового курсу лікування; питання щодо продовження терапії повторно розглянути стосовно пацієнтів, у яких впродовж цього періоду часу відсутні очевидні докази терапевтичної користі; гранулематоз з поліангіїтом і мікроскопічний поліангіїт: рекомендована доза з метою індукції ремісії гранулематозу з поліангіїтом і мікроскопічного поліангіїту становить 375 мг/м² поверхні тіла, у вигляді в/в інфузії 1 р/тижд. протягом 4 тижн. (всього 4 інфузії); хворим на РА з метою зменшення частоти і вираженості інфузійних реакцій за 30 хв до застосування вводити метилпреднізолон в дозі 100 мг в/в; пацієнтам із гранулематозом і поліангіїтом (гранулематозом Вегенера) або мікроскопічним поліангіїтом рекомендоване в/в введення метилпреднізолону у дозі 1000 мг/добу протягом 1-3 днів перед першою інфузією (останню дозу преднізолону можна ввести у той самий день, що і першу дозу ритуксимабу), надалі пацієнтам р/ос приймати преднізон по 1 мг/кг/добу (не більше 80 мг/добу і зменшувати дозу якомога швидше, виходячи із клінічної потреби) протягом та після застосування ритуксимабу; рекомендована початкова швидкість інфузії складає 50 мг/год, надалі її можна збільшувати на 50 мг/год кожні 30 хв, доводячи до максимальної швидкості 400 мг/год; наступні інфузії - можна починати зі швидкості введення 100 мг/год і збільшувати на 100 мг/год кожні 30 хв до максимальної швидкості 400 мг/год.

- **Цетуксимаб (Cetuximab)** (див. п. 19.1.6. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ")

18.3. Протиалергічні засоби

18.3.1. Антигістамінні лікарські засоби

18.3.1.1. Антигістамінні лікарські засоби I покоління

- **Диметинден (Dimetindene) ****

Фармакотерапевтична група: R06AB03 - антигістамінні засоби для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: антагоніст гістаміну H₁-рецепторів; чинить стимулюючу дію на гістамінметилтрансферазу, що призводить до інактивації гістаміну; виявляє високу спорідненість з H₁-рецепторами та стабілізує опасисті клітини; на H₂-рецептори не впливає; має місцевозанебезуючі властивості; антагоніст брадикініну, серотоніну та ацетилхоліну; знижує гіперпроникиність капілярів, що пов'язана з реакціями

гіперчутливості негайного типу; у поєднанні з антагоністами гістамінових H₂-рецепторів пригнічує практично всі види дії гістаміну на кровообіг.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування алергічних захворювань: кропив'янки, сезонного (сінна гарячка) та цілорічного алергічного риніту, алергії на ЛЗ і продукти харчування; свербіж різного походження, крім пов'язаного з холестаазом; свербіж при захворюваннях із шкірними висипаннями (вітряна віспа); укуси комах; допоміжний засіб при екземі та інших свербіжних дерматозах алергічного генезу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати р/ос; дорослим і дітям старше 12 років рекомендована добова доза становить 3-6 мг, розподілена на 3 прийоми - по 20-40 крап. 3 р/добу; пацієнтам, схильним до сонливості призначати 40 крап. перед сном і 20 крап. вранці; дітям від 1 міс. до 1 року рекомендована добова доза - 0,1 мг/кг/добу (2 крап.), розподілена на 3 прийоми; тривалість застосування препарату без консультації лікаря має становити не більше 14 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сонливість; АР, анафілактичні реакції (набряк обличчя, фарингеальний набряк, висипання); м'язові спазми, задишка; збудження; підвищена втомлюваність, нервозність, головний біль, запаморочення, розлади ШКТ, нудота, сухість у роті та горлі.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до диметиндену або до будь-якого іншого компонента ЛЗ; стеноз ДПК/пілорус; діти віком до 1 місяця, особливо недоношені.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 4 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДИМЕТИНДЕН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. в/о у бл.	1мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДИМЕТИНДЕН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	крап. орал., р-н по 20мл. у фл. скл. з кр.-крап.	1 мг/мл	№1	20,43	
	ЕДЕРМІК	ПАТ "Фармак", Україна	крап. орал., р-н по 20мл у фл.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕДЕРМІК	ПАТ "Фармак", Україна	крап. орал., р-н по 25мл у фл.	1 мг/мл	№1	12,80	
	ФЕНОКІТ	Спільне українсько-іспанське підприємство "СПЕРКО УКРАЇНА", Україна	крап. орал. по 20мл. у конт.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	ФЕНІСТИЛ	ГСК Консьюмер Хелскер С.А., Швейцарія	крап. орал. по 20мл. у фл.-крап.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Гідроксизин (Hydroxyzine)** (див. п. 5.3.4. розділу "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЛІКУВАННІ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ")

• **Клемастин (Clemastine)** ^[ПМД] [окрім розчину для ін'єкцій]

Фармакотерапевтична група: R06AA04 - антигістамінні засоби для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: антагоніст H₁-рецепторів; належить до антигістамінних ЛЗ групи бензгідрильних ефірів; селективно інгібує гістамінні H₁-рецептори та зменшує проникність капілярів; чинить виражену антигістамінну, протисвербіжну дію з швидким початком і значною тривалістю.

Показання для застосування ЛЗ: табл. сінна гарячка^{БНФ}, алергійний риніт, кропив'янка^{БНФ} (у т.ч. дермографічна), свербіж, алергічні дерматози, як допоміжний засіб при г. та хр.екземі, контактний дерматит, а також АР, спричинені ЛЗ^{ПМД} або укусами комах; р-н д/ін'єк.: профілактика та лікування АР та псевдоалергічних реакцій, у т. ч. реакції на введення контрастних речовин, переливання крові, діагностичне застосування гістаміну; вторинне лікування (після в/м введення адреналіну у дозі 0,01 мг/кг) у разі виникнення анафілактичного або анафілактоїдного шоку та ангіоневротичного набряку^{ПМД}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати р/ос та парентерально (в/в повільно протягом 2-3 хв або в/м; внутрішньоартеріальне введення суворо заборонене); дорослим і дітям старше 12 років внутрішньо р/ос по 1 мг (1 табл.) 2 р/добу (вранці і ввечері); в особливо тяжких випадках добову дозу можна збільшити до 6 мг (6 табл.), максимальна разова доза - 2 мг (2 табл.); дітям 6-12 років - по 0,5 -1 мг перед сніданком і на ніч^{БНФ}; парентерально для лікування алергічних захворювань - в/в або в/м в разовій дозі 2 мг (2 мл) 2 р/добу (вранці і ввечері); для профілактики АР - 2 мг (2 мл) повільно в/в перед можливим розвитком анафілактичної р-ції або р-ції на гістамін; р-н можна розводити фізіологічним р-ном або 5% р-ном глюкози у співвідношенні 1 : 5; дітям віком 1-12 років - в/м у добовій дозі 0,025 мг/кг 2 р/добу. Табл.: тривалість застосування препарату без консультації лікаря - не більше 14 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: відчуття втомлюваності, седативний ефект, сонливість, запаморочення; головний біль; збудження; розлади ШКТ, у т. ч. епігастральний біль, нудота, сухість у роті, запор; реакції гіперчутливості, задишка, анафілактичний шок; шкірні висипання; тахікардія, відчуття серцебиття; астенія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до клемастину або до допоміжних р-н ЛЗ, до антигістамінних ЛЗ подібної хімічної структури; порфірія.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ТАВЕГІЛ	Такеда Австрія ГмБХ, Австрія	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у кор.	1 мг/мл	№5, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТАВЕГІЛ	Фамар Італія С.п.А., Італія	табл. у бл.	1мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Хіфенадин (Quifenadine) ****

Фармакотерапевтична група: R06AX31 - антигістамінні засоби для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: похідне хінуклідилкарбінолу, який зменшує вплив гістаміну на органи та системи; конкурентний блокатор H1-рецепторів; активує ензим діаміноксидазу, який розщеплює 30% ендogenous гістаміну, чим пояснюється його ефективність у хворих, нечутливих до інших протигістамінних ЛЗ; погано проникає крізь гематоенцефалічний бар'єр та мало впливає на процеси дезамінування серотоніну у мозку, слабо впливає на активність MAO; антигістамінні якості хіфенадину пов'язані з присутністю циклічного ядра хінуклідину у структурі та відстанню між групою дифенілкарбінолу та атомом азоту; знижує токсичну дію гістаміну, знімає або послаблює його бронхоконстрикторну дію та спазмолітичний вплив на гладкі м'язи кишечника, має помірний протисеротоніновий, слабкий холінолітичний вплив, виражені протисвербіжні та десенсибілізуючі властивості; послаблює гіпотензивну дію гістаміну та його вплив на проникність капілярів, не впливає безпосередньо на серцеву діяльність та АТ, не має захисної дії при аконітинових аритміях; не має пригнічувальної дії на ЦНС, але можливий слабкий седативний ефект.

Показання для застосування ЛЗ: полінози, харчова та медикаментозна алергія, інші алергічні захворювання, г. та хр. кропив'янка, набряк (ангіоневротичний) Квінке, сінна гарячка, алергічна ринопатія, дерматози (екзема, псоріаз, нейродерміт, шкірний свербіж), а також інфекційно-алергічні реакції з бронхоспастичним компонентом.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати р/ос; табл. по 10 мг: дітям 3-7 років - по 10 мг 2 р/добу, МДД - 20 мг; дітям 7-12 років - по 10 мг 2-3 р/добу, МДД - 50 мг; дітям від 12 років - 25 мг 2-3 р/добу, МДД - 100 мг; тривалість курсу лікування - 10-15 днів, при необхідності курс повторити; табл. по 25 мг та 50 мг: одноразова доза для дорослих - по 25-50 мг 2-4 р/добу; при полінозах добова доза < 75 мг неефективна, МДД - 200 мг; тривалість курсу лікування - 10-20 днів; дітям від 12 років - по 25 мг 2-3 р/добу, тривалість курсу лікування - 10-20 днів, при необхідності курс лікування повторити.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: запаморочення, головний біль, слабкий седативний ефект, що проявляється у вигляді слабкості, сонливості, уповільненні відповідних реакцій організму; сухість слизових оболонок ротової порожнини, диспептичні явища (нудота, блювання, гіркота у роті); чихання, ускладнене дихання; занепокоєння; протеїнурія, інтерстиціальний нефрит; біль у суглобах, сльозовиділення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до хіфенадину гідрохлориду або до допоміжних речовин препарату.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ФЕНКАРОЛ®	АТ "Олайнфарм", Латвія	табл. у бл.	10мг, 25мг; 50мг	№10x2; №15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Ципрогептадин (Cyproheptadine)**

Фармакотерапевтична група: R06AX02 - антигістамінні ЛЗ для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: антигістамінний та антисеротоніновий ЛЗ з антихолінергічною та седативною дією; зв'язується з серотоніновими та H1-гістаміновими рецепторами, повністю пригнічує зв'язування з рецепторами серотоніну і гістаміну.

Показання для застосування ЛЗ: алергічні захворювання: г. та хр. кропив'янка^{БНФ}, ангіоневротичний набряк, медикаментозна екзантема, екзема, екзематозний дерматит, контактний дерматит, нейродерміт, алергічний риніт^{БНФ}, вазомоторний риніт, сироваткова хвороба та укуси комах; карциноїдний с-м (симптоматичне лікування); головний біль судинного походження (лікування мігрені та гістамінової цефалгії); для підвищення апетиту та загального стану у виснажених хворих та хворих із втратою апетиту з різних причин (нервова анорексія, ідіопатична анорексія, стани після інфекційних захворювань, хр. захворювання, період реконвалесценції, виснаження).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати р/ос; доза повинна визначатись індивідуально; звичайна початкова добова доза у дорослих - 12 мг (по 1 табл. 3 р/добу)^{БНФ}; хр. кропив'янка: 6 мг/добу (по 1/2 табл. 3 р/добу) до зникнення симптомів захворювання; г. мігрень: 4 мг (1 табл.) одноразово, якщо біль не зникає, через 30 хв прийняти ще 4 мг (1 табл.), проте загальна доза, прийнята протягом 4-6 год., не повинна перевищувати 8 мг (2 табл.), підтримуюче лікування - 12 мг (1 табл. 3 р/добу); МДД - 32 мг; дітям 7-14 років: 8-12 мг/добу (1 табл. 2-3 р/добу); МДД - 16 мг^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: артеріальна гіпотензія, прискорене серцебиття, тахікардія, екстрасистоля; гемолітична анемія, лейкопенія, агранулоцитоз, тромбоцитопенія; сонливість, яка зникає після перших 3-4 днів лікування; седативний ефект, запаморочення, шум у вухах, сплутаність свідомості; порушення координації, атаксія, порушення акомодативної (мідріаз), диплопія, галюцинації; збуджений стан, тремор, колючий біль та оніміння кінцівок, роздратованість, безсоння, парестезії, неврити (симптоми, що включають у себе підвищену больову чутливість, паралічі та парестезії), судоми, головний біль, слабкість, агресивна поведінка, ейфорія, істерія; озноб, втрата свідомості, АР: еритема, пурпура, кропив'янка, набряк Квінке, анафілактичний шок, еритема, пурпура, кропив'янка, набряк Квінке, гіпергідроз, рожеола, шкірні висипи або фоточутливість, утворення густого бронхіального секрету, задишка, застій слизу в носі, носові кровотечі, сухість у носі та горлі; нудота, блювання, дискомфорт в епігастрії, діарея, запор, холестаза, гепатит, жовтяниця, часті позиви до сечовипускання, утруднення сечовипускання, затримка сечі, ранні менструації, анорексія, підвищений апетит, збільшення маси тіла; лабіринтит, вертиго; печінкова недостатність; підвищена пітливість; відчуття стискання у грудях.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до ципрогептадину, до інших фенотазинів або до будь-якого іншого компонента ЛЗ; напади БА, глаукома; наявність порушення евакуації шлунково-кишкового вмісту (стенозована пептична виразка, пілоростеноз); стани, що супроводжуються затримкою сечі (симптоматична гіпертрофія передміхурової залози, контрактура шийки сечового міхура); одночасне застосування інгібіторів MAO (моклобемід, селегілін); особи літнього віку (напад 65 років) та ослаблені пацієнти; новонароджені або недоношені діти; не рекомендується призначати дітям до 2 років; період вагітності та годування груддю.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ПЕРИТОЛ®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл. у бл.	4мг	№10x2	відсутня у реєстрі OBLЦ	

18.3.1.2. Антигістамінні лікарські засоби II покоління

- **Дезлоратадин (Desloratadine) **** ^[ГМД]

Фармакотерапевтична група: R06AX27 - антигістамінні засоби для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: неседативний антигістамінний ЛЗ тривалої дії, селективно блокує периферичні гістамінові H₁-рецептори; має антиалергічні та протизапальні властивості; пригнічує виділення прозапальних цитокінів, включаючи IL-4, IL-6, IL-8, IL-13; виділення прозапальних хемокінів, таких як RANTES; продукцію супероксидного аніону активованими поліморфноядерними нейтрофілами; адгезію і хемотаксис еозинофілів; експресію молекул адгезії, таких як P-селектин; IgE-залежне виділення гістаміну, простагландину D₂ і лейкотрієну C₄; ефективно усуває такі симптоми як чхання, виділення з носа та свербіж, а також подразнення очей, слъозотеча та почервоніння, свербіж піднебіння, майже не проникає в ЦНС, ефективно полегшує тяжкість перебігу сезонного алергічного риніту.

Показання для застосування ЛЗ: усунення симптомів, пов'язаних з: алергічним ринітом (чхання, виділення з носа, свербіж, набряк та закладеність носа, а також свербіж та почервоніння очей, слъозотеча, свербіж піднебіння та кашель); кропив'янкою (свербіж, висипання) ^{БНФ, ГМД}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати р/ос; дорослим та підліткам (віком від 12 років): 5 мг 1 р/день ^{БНФ}, для усунення симптомів, пов'язаних з алергічним ринітом (у т. ч. інтермітуючим і персистуючим) і кропив'янкою; сироп чи р-н для р/ос застосування: дітям 6-11 міс. - по 1 мг 1 р/добу, віком 1-5 років - по 1,25 мг 1 р/добу, віком 6-11 років - 2,5 мг 1 р/добу ^{БНФ}; терапію інтермітуючого алергічного риніту (наявність симптомів менше 4 днів/тижд. або менше 4 тижн.) проводити з урахуванням даних анамнезу: припинити після зникнення симптомів та відновити після повторного їх виникнення; при персистуючому алергічному риніті (наявність симптомів більше 4 днів/тижд. або більше 4 тижд.) продовжувати лікування протягом усього періоду контакту з алергеном.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: підвищення апетиту, галюцинації, аномальна поведінка, агресія, головний біль, безсоння, запаморочення, сонливість, психомоторна гіперактивність, судоми, тахікардія, відчуття серцебиття, подовження інтервалу QT, суправентрикулярна тахіаритмія, сухість у роті, діарея, біль у животі, нудота, блювання, диспепсія, збільшення рівня ферментів печінки, підвищений білірубін, гепатит, міалгія, жовтяниця, фоточутливість, стомлюваність, підвищення t^o, реакції гіперчутливості (анафілаксія, набряк Квінке, задишка, свербіж, висипання, кропив'янка), збільшення маси тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до дезлоратадину або до будь-якої допоміжної речовини чи до лоратадину.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АЛЕРГОМАКС	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№10x1	4,54	

	серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості), Україна/Україна					
АЛЕРГОМАКС	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, ко, Україна/Україна	сіроп по 50мл, 50мл у фл. з доз. шпр.-піпет.	0,5 мг/мл	№1	12,02	
АЛЕРГОМАКС	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, ко, Україна/Україна	сіроп по 50мл, 100мл у фл. з доз. шпр.-піпет.	0,5 мг/мл	№1	7,99	
АЛЕРГОСТОП®	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
АЛЕРГОСТОП®	ПРАТ "ФІТОФАРМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№10x2	2,74	
АЛЕРДЕЗ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	сіроп по 100мл у бан. з доз. прист.	0,5мг/мл	№1	6,18	
АЛЕРДЕЗ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	сіроп по 100мл у фл. з доз. прист.	0,5мг/мл	№1	6,18	
АЛЕРДЕЗ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	сіроп по 50мл у фл. з доз. прист.	0,5мг/мл	№1	9,91	
АЛЕРДЕЗ	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№10x1	3,35	
АСТРІЯ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ДЕЗЛОРАТАДИН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	5мг	№10x3	відсутня у	

						реєстрі ОБЦ	
ДЕЗЛОРАТАДИН	ПрАТ "Технолог", Україна	табл., в/о у бл.	5мг	№10x1	2,93		
ДЕЗЛОРАТАДИН	ПрАТ "Технолог", Україна	сироп по 60мл у бан. з мірн. ложк.	0,5 мг/мл	№1	6,57		
ЕДЕМ®	ПАТ "Фармак", Україна	сироп по 60мл у фл. з доз. ложк. та стак.	0,5 мг/мл	№1	11,00		
ЕДЕМ®	ПАТ "Фармак", Україна	сироп по 100мл у фл. з доз. ложк. та стак.	0,5 мг/мл	№1	8,00		
ЕДЕМ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл., в/о у бл.	5мг	№30x1	2,83		
ЕДЕМ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл., в/о у бл.	5мг	№10x1	4,50		
ЕРІДЕЗ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., в/о у конт. чар/уп.	5мг	№10x2, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЕРІДЕЗ-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл., в/о у конт. чар/уп.	5мг	№10x1	3,62		
II. АЛЕРГОЗАН®	АТ "Софарма", Болгарія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
АЛЕРГОЗАН®	АТ "Софарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка), Болгарія	р-н орал. по 120мл у пл.	0,5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
АЛЕРІК НЕО	ФАМАР А.В.Е. ЗАВОД АВЛОН 49-й км ДЕРЖАВНОЇ ДОРОГИ АФІНИ-ЛАМІЯ (виробництво, контроль якості (фізичні/хімічні), первинне пакування, вторинне пакування, випуск серії)/ФАМАР А.В.Е. ЗАВОД АВЛОН 48-й км ДЕРЖАВНОЇ ДОРОГИ АФІНИ-ЛАМІЯ (мікробіологічний контроль), Греція/Греція/Греція/Польща	р-н орал. по 60мл, 150мл у пл.	0,5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
АЛЕРСІС	Лабораторіос Нормон С.А., Іспанія	р-н орал. по 60мл у фл.	0,5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
АЛЕРСІС	Лабораторіос Нормон С.А., Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
БЛОГІР-3	Белупо, ліки та косметика, д.д. (вторинне пакування, відповідальний за випуск серії)/Дженефарм СА (виробник готового лікарського засобу, первинне пакування), Хорватія/Греція	табл., що диспер. у бл.	5мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		
БЛОГІР-3	ФАМАР А.В.Е. (виробник готового лікарського засобу, первинне, вторинне пакування)/Белупо, ліки та косметика, д.д. (відповідальний за вторинне пакування, випуск серії), Греція/Хорватія	р-н орал. по 60мл, 120мл у фл.	0,5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ДЕЗРАДИН®	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk",	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№10x1, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ		

	первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія					
ЕОЛ	СТАДА Арцнайміттель АГ (випуск серій)/Специфар С.А. (контроль серій)/"БАЛКАНФАРМА-ТРОЯН" АД (виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування, контроль серій)/ФАМАР ОРЛЕАНС (виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне па, Німеччина/Греція/Болгарія/Франція	р-н орал. по 150мл у фл.	0,5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЕРІУС®	Шерінг-Плау Лабо Н.В., Бельгія	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№7, №10, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЕРІУС®	Шерінг-Плау Лабо Н.В., Бельгія	сіроп по 60мл, 120мл у фл.	0,5мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЕСЛОТИН	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЕСЛОТИН	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	5мг	№10x3	4,14	28,12/\$
ЛОРДЕС®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	сіроп по 150мг у фл. з мірн. ложк.	2,5мг/5мл	№1	7,80	25,99/\$
ЛОРДЕС®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл., в/о у бл.	5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛОРДЕС®	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл., в/о у бл.	5мг	№10x2	4,16	26,02/\$
ФРІ-АЛ	Санека Фармасьютікалз АТ, Словацька Республіка	табл. у бл.	5мг	№10, №20, №30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ФРІБРІС	Гракуре Фармасьютікалс ЛТД, Індія	сіроп по 100мг у фл.	2,5мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ХІТАКСА	Фамар А.В.Е. Авлон Плант (виробництво за повним циклом)/АТ "Адамед Фарма" (виробник відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль), Греція/Польща	р-н орал. по 60мл, 120мл, 150мл у фл. з мірн. лож. або доз. шпр.	0,5мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ХІТАКСА	Дженефарм С.А. (виробництво за повним циклом)/АТ "Адамед Фарма" (виробник відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль), Греція/Польща	табл., що диспер. у бл.	2,5мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ХІТАКСА	Дженефарм С.А. (виробництво за повним циклом)/АТ "Адамед Фарма" (виробник відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль), Греція/Польща	табл., що диспер. у бл.	2,5мг	№10x1	10,67	26,67/\$
ХІТАКСА	Дженефарм С.А. (виробництво за повним циклом)/АТ "Адамед Фарма" (виробник відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль), Греція/Польща	табл., що диспер. у бл.	5мг	№10x1	5,33	26,67/\$

		серії, не включаючи контроль), Греція/Польща				
--	--	--	--	--	--	--

• **Фексофенадин (Fexofenadine) ****

Фармакотерапевтична група: R06AX26 - антигістамінні засоби для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: неседативний антигістамінний ЛЗ групи антагоністів специфічних рецепторів H₁; фармакологічно активний метаболіт терфенадину; стабілізує мембрани опасистих клітин, перешкоджає виділенню гістаміну; усуває симптоми алергії (чхання, ринорею, свербіж, почервоніння очей, слезотечу); не чинить седативної дії.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування сезонного алергічного риніту (табл. 120 мг) та хр. ідіопатичної кропив'янки (табл. 180 мг)^{БНФ} у дорослих та дітей віком від 12 років.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати р/ос; табл.120 мг: рекомендована доза фексофенадину гідрохлориду для дорослих та дітей віком від 12 років - 120 мг/добу за 1 прийом^{БНФ}; табл. 180 мг: рекомендована доза фексофенадину гідрохлориду для дорослих та дітей віком від 12 років - 180 мг/добу за 1 прийом, тобто 1 табл. 180 мг 1 р/добу^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, запаморочення, сонливість, нудота, сухість у роті, підвищена втомлюваність; р-ції гіперчутливості (у вигляді ангіоневротичного набряку, відчуття стиснення у грудях, задишки, відчуття приливів та інших системних анафілактичних р-цій), безсоння, нервозність, розлади сну або нічні кошмари/ незвичні сновидіння (хворобливі сновидіння), тахікардія, відчуття серцебиття, діарея, висипання, кропив'янка, свербіж; дисменорея, біль у спині, біль у кінцівках, біль, випадкові травми, лихоманка, отит, інфекції ВДШ, риноррея, назофарингіт, кашель, блювота, диспепсія, міалгія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до фексофенадину або до ін. компонентів ЛЗ; дитячий вік до 12 років.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0.12 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АЛЛЕГРА® 120 МГ	САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА - ТУРЗ, Франція	табл., в/о у бл.	120мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АЛЛЕГРА® 180 МГ	САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА - ТУРЗ, Франція	табл., в/о у бл.	180мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АЛТІВА	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія	табл., в/о у бл.	180мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТИГОФАСТ-120	Фламінго Фармасьютикалс Лтд./Артура Фармасьютикалз Пвт. Лтд., Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	120мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТИГОФАСТ-120	Фламінго Фармасьютикалс Лтд./Артура Фармасьютикалз Пвт. Лтд., Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	120мг	№10x3	3,94	28,11/\$
	ТИГОФАСТ-180	Фламінго Фармасьютикалс Лтд./Артура Фармасьютикалз Пвт. Лтд., Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	180мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТИГОФАСТ-180	Фламінго Фармасьютикалс Лтд./Артура Фармасьютикалз Пвт. Лтд., Індія/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	180мг	№10x3	3,72	28,11/\$
	ФЕКСОФАСТ	Мікро Лабс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	120мг, 180мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФЕКСОФАСТ	Мікро Лабс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	120мг	№10x3	3,30	28,54/\$
	ФЕКСОФАСТ	Мікро Лабс Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	180мг	№10x3	3,44	28,54/\$
	ФЕКСОФЕН-САНОВЕЛЬ	Сановель Іляч Санаі ве Тиджарет А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	120мг, 180мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Ебастин (Ebastine) ****

Фармакотерапевтична група: R06AX22 - Антигістамінні засоби для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: призводить до швидкого і тривалого сповільнення впливу гістаміну і показує сильну спорідненість до поєднання з H₁-рецепторами, ебастин є потужним, тривалим і

високоселективним антагоністом рецепторів гістаміну H₁, вільним від несприятливого впливу на ЦНС і антихолінергічні ефекти.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування алергічних ринітів (сезонних та цілорічних), пов'язаних або не пов'язаних з алергічними кон'юнктивітами; хр. ідіопатична кропив'янка та алергічні дерматити.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі та діти віком від 12 років: рекомендована доза - 10 мг/добу; при вираженій симптоматиці - по 20 мг/добу, приймати незалежно від прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю води.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: реакції гіперчутливості (такі як анафілаксія і ангіоневротичний набряк), нервозність, безсоння, головний біль, сонливість, запаморочення, гіпестезія, дисгезія, серцебиття, тахікардія, сухість у роті, блювання, абдомінальний біль, диспепсія, тошнота, гепатит, холестаза, зміни показників функцій печінки при здачі аналітичних аналізів (збільшення трансаміназ, гамма-глутамілтранспептидази, лужної фосфатази та білірубину), кропив'янка, висип, дерматит, менструальні порушення, набряки, астенія

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активної речовини або до інших компонентів препарату.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕСПА-БАСТИН®	Фарма Вернігероде ГмбХ/Адванс Фарма ГмбХ, Німеччина/Німеччина	табл., що дисперг. у бл.	10мг, 20мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЕСТИН	Індастріас Фармасьютікас Алміралл СА, Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	10мг, 20мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Лоратадин (Loratadine) * ****

Фармакотерапевтична група: R06AX13 - антигістамінний ЛЗ для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: трициклічний селективний блокатор периферичних H₁-гістамінових рецепторів; при застосуванні в рекомендованій дозі не чинить клінічно значущої седативної та антихолінергічної дії; не має значущого впливу на H₂-гістамінові рецептори; не інгібує поглинання норепінефрину і фактично не має впливу на функцію СС систем; антигістамінний ефект виникає через 1-3 год., досягає піку через 8-12 год. і триває більше 24 год.; не відзначається розвиток стійкості до його дії після 28 днів застосування.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування алергічного риніту та хр. ідіопатичної кропив'янки^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати р/ос; дорослим та дітям з 12 років і старше по 10 мг (10 мл) 1 р/добу; дітям 2-12 років з масою тіла > 30 кг - 10 мг (10 мл) 1 р/добу, з масою тіла < 30 кг застосовують у вигляді сиропу - 5 мг (5мл) 1 р/добу^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сонливість, головний біль, посилення апетиту, безсоння, нервозність; анафілаксія (включаючи ангіоедему); запаморочення, судоми; тахікардія, пальпітація; нудота, сухість у роті, гастрит; патологічні зміни функції печінки; висипання, алопеція; втома.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до лоратадину або до будь-якого іншого компонента ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 10 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЛОРАТАДИН	ТОВ "Астрафарм", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x10	0,74	
	ЛОРАТАДИН	ТОВ "Астрафарм", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x1	1,40	
	ЛОРАТАДИН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	табл. у бл.	0,01г	№10x2	1,05	
	ЛОРАТАДИН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	табл. у бл.	0,01г	№10x1	1,06	
	ЛОРАТАДИН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	табл. у бл.	0,01г	№10x50	1,06	
	ЛОРАТАДИН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	табл. у бл.	0,01г	№10x100	44,24	
	ЛОРАТАДИН	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	0,01г	№10x2	1,05	
	ЛОРАТАДИН	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	0,01г	№10x1	1,30	
	ЛОРАТАДИН	ПАТ "Київмедпрепарат",	табл. у бл.	10мг	№10x1	1,14	

	Україна					
ЛОРАТАДИН	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна	сироп по 90мл у фл. або бан. з доз. скл.	1 мг/мл	№1	5,03	
ЛОРАТАДИН-ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	табл. у конт. чар/уп.	10мг	№10x1	1,29	
ЛОРАТАДИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛОРАТАДИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x1	1,70	
ЛОРАТАДИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, ко, Україна/Україна	сироп по 5мл, 10мл у саше	5мг/5мл	№20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛОРАТАДИН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, ко, Україна/Україна	сироп по 100мл у фл. з мірн. ложк.	5мг/5мл	№1	4,02	
ЛОРАТАДИН-СТОМА	АТ "Стома", Україна	табл. у бл. та бан.	10мг	№10x1, №20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛОРИЗАН®	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x1	2,00	
II. АЛЕРІК	ТОВ ЮС Фармація, Польща	табл. у бл.	10мг	№7x1, №30x1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЕРОЛІН®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина	табл. у бл.	10мг	№5, №10, №30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КЛАРИТИН®	Байер Біттерфельд ГмбХ, Німеччина	табл. у бл.	10мг	№7, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КЛАРИТИН®	Шерінг-Плау Лабо Н.В., Бельгія	табл. у бл.	10мг	№7, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КЛАРИТИН®	Шерінг-Плау Лабо Н.В., Бельгія	сироп по 60мл, 120мл у фл. з мірн. ложк.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛОРАНО	Салютас Фарма ГмбХ (виробництво in bulk, пакування, випуск серії)/Лек С. А. (пакування, випуск серії), Німеччина/Польща	табл. у бл.	10мг	№7x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	

ЛОРФАСТ	Каділа Фармасьютикалз Лімітед, Індія	табл. у бл.	10мг	№10x1, №50x2	відсутня у реєстрі ОБЦ
---------	--------------------------------------	-------------	------	--------------	------------------------

• **Цетиризин (Cetirizine) ****

Фармакотерапевтична група: R06AE07 - антигістамінні ЛЗ для системного застосування; похідні піперазину.

Основна фармакотерапевтична дія: метаболіт гідроксизину, є сильнодіючим селективним антагоністом периферичних H₁-рецепторів; чинить протиалергічну дію, інгібує пізню фазу р-ції запалення, індуковану у пацієнтів із хр. кропив'ячкою в/шкірним введенням калікреїну, зменшує вираженість адгезії молекул, таких як ICAM-1 та VCAM-1, що є маркерами алергічного запалення, потужно інгібує виникнення пухирців та почервоніння, спричинених дуже високими концентраціями гістаміну в шкірі.

Показання для застосування ЛЗ: полегшення назальних та очних симптомів сезонного і постійного алергічного риніту та хр. ідіопатичної кропив'янки у дорослих та дітей^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати р/ос; у формі табл. та крап.: дітям 6-12 років - по 5 мг 2 р/добу, дорослим та дітям від 12 років - по 10 мг 1 р/добу^{БНФ}; у формі крап.: дітям 2-6 років - по 2,5 мг 2 р/добу^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сонливість, підвищена втомлюваність, вертиго, парадоксальна стимуляція ЦНС, головний біль, АР, утруднення сечовипускання, порушення акомодатії ока, сухість у роті, порушення функції печінки, що характеризувалися підвищеними рівнями ферментів печінки із підвищенням рівня білірубину, нудота, запалення глотки, фарингіт, діарея, риніт, тахікардія, парестезія, тромбоцитопенія, збільшення маси тіла, тромбоцитопенія, судоми, дисгевзія, дискінезія, дистонія, синкопе, тремор, амнезія, порушення пам'яті, порушення акомодатії кришталика, нечіткість зору, порушення рухів очного яблука, дизурія, енурез, затримка сечі, свербіж, висипання, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, фіксована медикаментозна екзантема, місцеві медикаментозні висипи, г. генералізований екзантематозний пустульоз, астенія, відчуття втоми, набряк, артралгія, гіперчутливість, анафілактичний шок, АР, порушення функції печінки (підвищення рівня трансаміназ, ЛФ, γ-глутамілтрансферази та білірубину), тривожність, агресивність, сплутаність свідомості, депресія, галюцинації, безсоння, нервовий тик, суїцидальні думки, нічні кошмари, підвищений апетит.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої допоміжної речовини, що входить до складу ЛЗ, до гідроксизину або до будь-якої похідної речовини піперазину, тяжке порушення ф-ції нирок з КлКр < 10 мл/хв, рідкісні спадкові форми непереносимості галактози, дефіцит лактази Лапла або мальабсорбція глюкози-галактози (табл.).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 10 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЦЕТИРИЗИН-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл., в/о у бл.	10мг	№10x2	3,00	
	ЦЕТИРИЗИН-АСТРАФАРМ	ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна	табл., в/о у бл.	10мг	№10x1	3,40	
II.	АЛЛЕРТЕК®	Фармацевтичний завод "Польфарма" С.А., Польща	табл., в/о у бл.	10мг	№7x1, №20x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМЕРТИЛ®	Біофарм Лтд, Польща	табл., в/о у бл.	10мг	№7, №10, №20, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РОЛІНОЗ	АВС Фармачеутічі С.п.А., Італія	табл. у бл.	10мг	№10x2	4,47	28,05/\$
	РОЛІНОЗ	АВС Фармачеутічі С.п.А., Італія	крап. орал. по 20мл у скл. фл. з кр.- крап.	10 мг/мл	№1	5,65	28,12/\$
	РОЛІНОЗ	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	крап. орал. по 20мл у фл.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РОЛІНОЗ	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	табл.,вкриті п/о у бл.	10мг	№10x1, №10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦЕТИРИЗИН-ТЕВА	Меркле ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, дозвіл на випуск серії; первинна та вторинна упаковка, контроль якості), Німеччина	табл.,вкриті п/о у бл.	10мг	№7, №10, №20, №30, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦЕТРИН®	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Виробнича дільниця - II, Індія	табл.,вкриті п/о у бл.	10мг	№10x2, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

18.3.1.3. Місцеві селективні антигістамінні лікарські засоби

- **Азеластин (Azelastine) **** (див. п. 16.2.1.1.4. розділу "ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Олопатадин (Olopatadine) **** (див. п. 15.5.2. розділу "ОФТАЛЬМОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

18.3.2. Стабілізатори мембран тканинних та циркулюючих базофілів

- **Кетотифен (Ketotifen)** (див. п. 4.4.1. розділу "ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ")

Фармакотерапевтична група: R06AX17 - антигістамінні ЛЗ для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: належить до групи циклогептотіофенонів, небронходилатуючих протиастматичних ЛЗ; має виражений антигістамінний ефект; гальмує вивільнення гістаміну та інших медіаторів мастацитами, з блокуванням гістамінових Н₁-рецепторів і пригніченням ферменту фосфодіестерази з підвищенням рівню цАМФ в опасистих клітинах; пригнічує ефекти тромбоцито-активуючого фактора; не купірує напади БА, а попереджує їх появу і призводить до скорочення їх тривалості.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика лікування БА, особливо атопічної; симптоматичне лікування алергічних станів, включаючи алергічний риніт^{БНФ} та кон'юнктивіт.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати р/ос; дорослим та дітям понад 3 роки (у табл.) по 1 мг 2р/добу^{БНФ}; пацієнтам зі значним седативним ефектом, що настає у перші дні застосування, приймати кетотифен по 1мг/добу тільки ввечері; при необхідності дорослим добову дозу підвищити до 4 мг (по 2 мг 2 р/добу)^{БНФ}; сироп: дітям 6 міс.- 3 років - у разовій дозі 0,05 мг (0,25 мл)/кг 2 р/добу; дітям старше 3 років - по 5 мл/1 мг (1 дозувальна ложка) 2 р/добу (вранці і ввечері); тривалість лікування не менше 2-3 міс., особливо у пацієнтів, у яких не спостерігалось покращання самопочуття у перші тижні; припиняти лікування поступово, протягом 2-4 тижн., для уникнення рецидивів симптомів БА.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: цистит; шкірні висипання, тяжкі шкірні реакції, мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона; збільшення маси тіла через підвищення апетиту; психомоторне збудження, дратівливість, безсоння, неспокій, нервозність, дезорієнтація, сонливість; запаморочення, седативний ефект, судоми; біль у шлунку, запор, нудота, блювання, диспептичні розлади; підвищення рівня печінкових ферментів, гепатит; дизурія; тромбоцитопенія, сухість у роті.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до кетотифену або до інших компонентів ЛЗ; одночасне застосування кетотифену і р/ос протидіабетичних ЛЗ (ризик розвитку оборотної тромбоцитопенії).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 2 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КЕТОТИФЕН	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	сироп по 100мл у бан. полім. з доз. ложк.	1мг/5мл	№1	3,27	
	КЕТОТИФЕН	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	сироп по 100мл у фл. скл. або полім. з доз. ложк.	1мг/5мл	№1	3,27	
	КЕТОТИФЕН	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна	сироп по 50мл у фл. полім. з доз. ложк.	1мг/5мл	№1	4,42	
	КЕТОТИФЕН	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Тов, Україна/Україна/Україна	табл. у конт.	1мг	№30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КЕТОТИФЕН	Товариство з обмеженою	табл. у бл.	1мг	№10x3	1,32	

	відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Тов, Україна/Україна/Україна					
КЕТОТИФЕН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	табл. у бл.	0,001г	№10x3	1,40	
КЕТОТИФЕН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	табл. у бл.	0,001г	№10x1	1,64	
КЕТОТИФЕН СОФАРМА	АТ "Софарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка або виробництво за повним циклом)/ПАТ "Вітаміни" (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії), Болгарія/Україна	табл. у бл.	1мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	

18.3.3. Антагоністи лейкотрієнових рецепторів

- **Монтелукаст (Montelukast)** (див. п. 4.4.2. розділу "ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ")

18.3.4. Глюкокортикостероїди

18.3.4.1. ГК для системного застосування

- **Бетаметазон (Betamethasone)** * (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Гідрокортизон (Hydrocortisone)** * ^[ПМД] (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Дексаметазон (Dexamethasone)** * ^[ПМД] (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Метилпреднізолон (Methylprednisolone)** (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Преднізолон (Prednisolone)** * (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Тріамцінолон (Triamcinolone)** (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

18.3.4.2. ГК місцевої дії

18.3.4.2.1. Інгаляційні

- **Беклометазон (Beclometasone)** * (див. п. 4.2.1. розділу "ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ")
- **Будесонід (Budesonide)** (див. п. 4.2.1. розділу "ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ")
- **Мометазон (Mometasone)** (див. п. 4.2.1. розділу "ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ")
- **Флутиказон (Fluticasone)** (див. п. 4.2.1. розділу "ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ")

18.3.4.2.2. Назальні

- **Беклометазон (Beclometasone)** (див. п. 16.2.1.1.5. розділу "ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Будесонід (Budesonide)** (див. п. 16.2.1.1.5. розділу "ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Мометазон (Mometasone)** (див. п. 16.2.1.1.5. розділу "ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Флутиказон (Fluticasone)** (див. п. 16.2.1.1.5. розділу "ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

18.3.4.2.3. Зовнішні і кон'юнктивальні форми

- **Бетаметазон (Betamethasone)** * (див. п. 9.1.2. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Гідрокортизон (Hydrocortisone)** * (див. п. 15.2.1. розділу "ОФТАЛЬМОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Дексаметазон (Dexamethasone)** * (див. п. 15.2.1. розділу "ОФТАЛЬМОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Клобетазол (Clobetasol)** (див. п. 9.1.2. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Мометазон (Mometasone)** (див. п. 9.1.2. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Триамцинолон (Triamcinolone)** (див. п. 9.1.2. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")
- **Флутиказон (Fluticasone)** (див. п. 9.1.2. розділу "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

18.3.5. Імуносупресори

18.3.5.1. Системні

- **Циклоспорин (Ciclosporin)** * (див. п. 18.2.2. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")

18.3.5.2. Зовнішні

- **Пімекролімус (Pimecrolimus)**

Фармакотерапевтична група: D11AH02 - дерматологічні ЛЗ, що застосовуються при дерматиті, за винятком КС.
Основна фармакотерапевтична дія: похідне макролактаму аскоміцину з протизапальною дією і вибіркоvim інгібітором утворення і вивільнення медіаторів запалення цитокінів; значною мірою зв'язується з макрофіліном-12 і пригнічує кальційзалежну фосфатазу кальціневрин; пригнічує активацію Т-лімфоцитів, блокуючи транскрипцію раніше вивільнених цитокінів; поєднує високу протизапальну активність і незначний вплив на системні імунні реакції.

Показання для застосування ЛЗ: легкий та помірний atopічний дерматит, якщо лікування місцевими КС небажане чи неможливе^{БНФ}, при: непереносимості місцевих КС; недостатньому ефекті від місцевих КС; потребі використання на обличчі та шиї, де тривале періодичне застосування КС може бути недоречним.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: тривалість лікування залежить від стадії та вираженості захворювання; наносити тонким шаром на уражені ділянки 2 р/добу; якщо після 6 тижн. не спостерігається покращення або у випадку погіршення стану, застосування припинити^{БНФ}; повторно оцінити діагноз atopічного дерматиту та продумати подальші терапевтичні заходи; можна застосовувати на всіх ділянках шкіри (голови, обличчі, шиї та інтертригінозних ділянках), крім слизових; після застосування наносити пом'якшувальні засоби; дітям з 2 років дозування та спосіб застосування - як у дорослих. При довготривалій терапії atopічного дерматиту (екземи) лікування розпочинати при появі перших симптомів atopічного дерматиту, щоб запобігти розповсюдженню та подальшому загостренню захворювання, застосовувати двічі на день.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: контагіозний молюск; анафілактичні реакції (тяжкі форми); нетолерантність до алкоголю (відчуття припливів крові, висипання, печіння, свербіж або опухлість); шкірні інфекції (фолікуліт), фурункул, імпетиго, герпес симплекс, оперізуючий герпес, герпесний дерматит (герпетична екзема), папілома шкіри та погіршення стану, АР (висипання, кропив'янка, ангіоневротичний набряк), зміни кольору шкіри (гіпо-/гіперпігментація); відчуття печіння у місці нанесення крему, реакції в місці нанесення (подразнення, свербіж, еритема, висипання, біль, парестезія, лущення, сухість, набряк); злоякісні новоутворення (включаючи шкірні та інші види лімфом, рак шкіри); лімфаденопатія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до пімекролімусу, інших макролактамів або інших компонентів ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕЛІДЕЛ®	МЕДА Меньюфекчеринг, Франція	крем д/зовн. застос. по 15г у тубі	10 мг/г	№1	342,86	30,95/€

18.3.6. Лікарські засоби для проведення специфічної імунотерапії

18.3.6.1. Лікувальні

- **Мікст-алергени пилкові (Mixt-allergena e pollen)**

Фармакотерапевтична група: V01AA02, V01AA05 - алергени пилку дерев; алергени пилку трав.

Основна фармакотерапевтична дія: активною речовиною алергенів (мікст-алергенів) групи пилку рослин є протеїново-полісахаридний комплекс, багатофакторний вплив якого на імунну систему хворого забезпечує ефект алерген-СІТ (формування толерантності до відповідних алергенів); алерген-СІТ спричиняє терапевтичну дію, яка поширюється на всі етапи алергічного процесу, охоплює його імунологічну фазу і призводить до переключення імунної відповіді з Th2-типу на Th1-тип, гальмує ранню та пізню фази ІgЕ-опосередкованої АР, пригнічує клітинний компонент алергічного запалення та неспецифічну тканинну гіперреактивність; відбувається збільшення продукції блокуючих а/т, зменшення виділення медіаторів алергії, підвищення активності супресорних

клітин та механізмів; збільшення клітин, що продукують ІЛ2, підсилення функції лімфоцитів хелперів Th1 та зниження Th2, переключення CD4+ клітин з Th2- на Th1-фенотип, підвищення функціональної активності Т-лімфоцитів, підсилення функції ізотипічних Т-супресорів, регуляція індукції ІgЕ ідіотипічними а/т, зниження реактивності медіаторпродукуючих клітин; при р/ос або сублінгвальної алерген-СІТ створюється можливість надходження алергенів до імунокомпетентних клітин двома шляхами: через лімфо-глоткове кільце та кишечник при ковтанні алергену зі слиною; ефективність алерген-СІТ обумовлена феноменом р/ос толерантності та контактом алергену, що ковтається, з імунною системою ШКТ; в основі позитивного ефекту р/ос/сублінгвальної алерген-СІТ - вплив алергену на дендритні клітини слизової оболонки рота, які мають властивості алергенпрезентуючих клітин, модулююча дія на Т-хелперні і Т-регуляторні клітини, зміна продукції цитокінів та синтез блокуючих а/т; дія препарату є сукупною дією його білкових компонентів.

Показання для застосування ЛЗ: призначений для алерген-СІТ гіперчутливості до відповідних пилоквих алергенів; проведення алерген-СІТ показано у випадках, коли підтверджено ІgЕ-опосередкований характер захворювання; захворювання має тривалий перебіг з вираженими клінічними проявами; існує чітке підтвердження ролі алергенів групи пилку рослин; неможлива повна елімінація алергену; у наявності є потрібні стандартизовані алергени.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують р/ос або сублінгвально; проведення СІТ мікст-алергенами побутовими у вигляді драже призначається лікарем-алергологом і має проводитись амбулаторно; схема проведення алерген-СІТ: драже з контейнера №1 (вміст алергенів по білковому азоту 0,2 PNU) застосовують таким чином у 1-й день - 1 драже, у 2-й - 2 драже, у 3-й - 3 драже, у 4-й - 4 драже, у 5-й - 5 драже; прийом драже з контейнера №2 (вміст алергенів по білковому азоту 2,0 PNU) починати ч/з день після вживання останніх драже з контейнера №1: у 1-й день - 1 драже, у 3-й день - 2 драже, у 5-й - 3 драже, у 7-й - 4 драже, на 9-й - 5 драже; прийом драже з контейнера №3 (вміст алергенів по білковому азоту 20,0 PNU) починати через 2 дні після вживання останніх драже з контейнера №2: у 1-й день - 1 драже, на 3-й день - 2 драже, на 6-й - 3 драже, на 9-й - 4 драже, на 12-й - 5 драже; прийом драже з контейнера №4 (вміст по білковому азоту 200,0 PNU) починати ч/з тиждень після вживання останніх драже з контейнера №3: в 1-й тижд. - 1 драже, у 2-й тижд. - 2 драже, у 3-й тижд. - 3 драже, у 4-й тижд. - 4 драже, у 5-й тижд. - 5 драже, приймати у понеділок кожного тижня; прийом драже з контейнера №5 (вміст по білковому азоту 1000,0 PNU) починати ч/з 2 тижн. після вживання останніх драже з контейнера №4: по 1 драже 1 р/2 тижн. (у кожний понеділок 2-го тижня); драже з контейнера №5 приймати 1 р/міс. по 2 драже в другий понеділок кожного міс. протягом 3 р. і більше; в сезон пилкування відповідних рослин може бути рекомендований інший прийом драже (по 1 драже з контейнера №5 або інакше); схема проведення алерген-СІТ у дітей відповідає схемі проведення алерген-СІТ у дорослих; тривалість алерген-СІТ визначає лікар-алерголог; максимальний ефект алерген-СІТ розвивається ч/з 1-2 р.після її початку; оптимальним терміном проведення алерген-СІТ вважають 3-5 р.; якщо алерген-СІТ не дає ефекту на протязі року - її припинити.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кашель, утруднене дихання, бронхоспазм, чхання, закладення та свербіж носа, подразнення горла; висип, почервоніння обличчя, кропив'янка, набряки, свербіж; нудота, блювання, біль у шлунку чи животі, діарея; головний біль, сонливість; збудження; почервоніння очей, слъозотеча; артралгії; анафілактичні р-ції; загальна слабкість, підвищення t⁰ тіла, відчуття жару у всьому тілі, свербіж ротової порожнини, набряк слизової оболонки ротової порожнини, язика.

Протипоказання до застосування ЛЗ: важкі імунопатологічні стани та імунодефіцити, онкологічні захворювання, тяжкі психічні розлади, г. інфекції та хр. в фазі загострення, соматичні захворювання з порушенням ф-ції відповідних органів і систем; неможливість дотримання пацієнтом схеми призначеного лікування, відсутність контролю БА (FEV1 < 70 % на тлі адекватної фармакотерапії, у т. ч. важка форма БА), СС захворювання, при яких можливі ускладнення при використанні адреналіну (епінефрину), застосування антагоністів β-адренорецепторів (β-блокаторів), в т. ч. місцевих, інгібіторів АПФ (для лікування АГ, ІХС), важкі кардіоваскулярні захворювання, наявність в анамнезі анафілактичного шоку при проведенні алерген-СІТ, діти молодше 3 років, системні захворювання, ЦД, некомпенсований тиреотоксикоз, ІМ давністю до 1 року, персистуюче пошкодження слизової оболонки ротової порожнини (виразки, ерозії), персистуюче захворювання пародонту, відкрита рана в порожнині рота, недавня екстракція зуба, інші хірургічні маніпуляції в порожнині рота, гінгівіт, що супроводжується кровоточивістю ясен; захворювання порожнини рота (стоматит, глосит), важкі запальні захворювання слизової оболонки ротової порожнини (червоний плоский лишай, мікози та ін.); г. або хр. захворювання ШКТ (ГЕРХ, гастрит, виразкова хвороба, ентерит, коліт, гепатит тощо); підвищена чутливість до допоміжних речовин ЛЗ; вік старше 55 років, шкірні захворювання, хр. інфекційні захворювання, маловиражені шкірні проби з алергенами, неефективність попередньої алерген-СІТ (якщо така проводилась), вагітність та грудне вигодовування, загострення основного алергічного захворювання, загострення будь-якого супутнього захворювання, будь-які інтеркурентні захворювання в ст. загострення, прийом інгібіторів MAO в комбінації з симпатоміметиками, вакцинація; недостатнє розуміння хворим необхідності алерген-СІТ та його недисциплінованість, значна тривалість алергічного захворювання (10 років і більше), відстрочені позитивні шкірні проби з алергенами, наявність проявів неспецифічної гіперреактивності, сенсibiliзація до харчових, лікарських, хімічних алергенів; виражена гіперчутливість до 5 і більше алергенів; наявність анафілактичних р-цій при попередній алерген-СІТ.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ (МІКСТ-АЛЕРГЕНИ) ГРУПИ ПИЛКУ РОСЛИН У ВИГЛЯДІ ДРАЖЕ	ТОВ "Імунолог", Україна	драже у конт.	1000PNU	№15	460,00	

	НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ (МІКСТ-АЛЕРГЕНИ) ГРУПИ ПИЛКУ РОСЛИН У ВИГЛЯДІ ДРАЖЕ	ТОВ "Імунолог", Україна	драже у конт.	0,2PNU, 2PNU, 20PNU, 200PNU, 1000PNU	№75	920,00	
--	---	-------------------------	---------------	--------------------------------------	-----	--------	--

• **Мікст-алергени побутові (Mixt-allergena domestica)**

Фармакотерапевтична група: V01AA03 - алергени домашнього пилу.

Основна фармакотерапевтична дія: алергени побутові мають специфічну активність; активною речовиною побутових алергенів є протеїново-полісахаридний комплекс, який дозволяє діагностувати у хворого наявність сенсibiliзації до даного алергену та застосовувати його в подальшому для проведення СІТ; введення алергенів у сенсibiliзованих осіб у дозах, що поступово зростають (СІТ) призводить до формування феномену імунологічної толерантності, що клінічно проявляється зменшенням або повним зникненням основних проявів алергічного захворювання (явищ алергічного риніту, БА).

Показання для застосування ЛЗ: СІТ підвищеної чутливості (алергії) до відповідних побутових алергенів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують р/ос або сублінгвально; проведення СІТ мікст-алергенами побутовими у вигляді драже призначається лікарем-алергологом і має проводитись амбулаторно; схема проведення алерген-СІТ: драже з контейнера №1 (вміст алергенів по білковому азоту 0,2 PNU) застосовувати таким чином: 1-й день - 1 драже, у 2-й - 2 драже, у 3-й - 3 драже, у 4-й - 4 драже, у 5-й - 5 драже; прийом драже з контейнера №2 (вміст алергенів по білковому азоту 2,0 PNU) розпочинати ч/з день після застосування останніх драже з контейнера №1: у 1-й день - 1 драже, у 3-й день - 2 драже, у 5-й - 3 драже, у 7-й - 4 драже, на 9-й - 5 драже; прийом драже з контейнера №3 (вміст алергенів по білковому азоту 20,0 PNU) розпочинати ч/з 2 дні після застосування останніх драже з контейнера №2: у 1-й день - 1 драже, на 3-й день - 2 драже, на 6-й - 3 драже, на 9-й - 4 драже, на 12-й - 5 драже; прийом драже з контейнера №4 (вміст по білковому азоту 200,0 PNU) розпочинати ч/з тижд. після застосування останніх драже з контейнера №3: у 1-й тижд. - 1 драже, у 2-й тижд. - 2 драже, у 3-й тижд. - 3 драже, у 4-й тижд. - 4 драже, у 5-й тижд. - 5 драже, приймати у понеділок кожного тижня; прийом драже з контейнера №5 (вміст по білковому азоту 1000,0 PNU) розпочинати через 2 тижні після застосування останніх драже з контейнера №4: застосовувати по 1 драже 1 р/2 тижні (у кожен понеділок другого тижня); у наступному драже з контейнера №5 приймати (якщо лікар не порадить інакше) 1 р/міс. по 2 драже у 2-й понеділок кожного міс. протягом 3 років і більше; схема проведення алерген-СІТ дітям з 3 років відповідає схемі проведення алерген-СІТ дорослим; тривалість алерген-СІТ визначає лікар-алерголог; зазвичай максимальний ефект алерген-СІТ розвивається через 1-2 роки після її початку; оптимальним терміном проведення алерген-СІТ є 3-5 років; якщо АСІТ не дає ефекту протягом року - її припинити.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кашель, утруднене дихання, бронхоспазм, чхання, закладення/свербіж носа, подразнення горла; висипання, почервоніння обличчя, кропив'янка, набряки, свербіж; нудота, блювання, біль у шлунку/животі, діарея; головний біль, сонливість; збудження; почервоніння очей, сльозотеча; артралгії; анафілактичні р-ції; загальна слабкість, підвищення t⁰ тіла, відчуття жару у всьому тілі, свербіж ротової порожнини, набряк слизової оболонки ротової порожнини, язика.

Протипоказання до застосування ЛЗ: тяжкі імунопатологічні стани та імунодефіцити, онкологічні захворювання, тяжкі психічні розлади, г. інфекції та хр. у фазі загострення, соматичні захворювання з порушенням ф-ції відповідних органів і систем, неможливість дотримання пацієнтом схеми призначеного лікування, відсутність контролю БА (FEV1 <70 % на тлі адекватної фармакотерапії, у т. ч. тяжка форма БА), СС захворювання, при яких можливі ускладнення при застосуванні адреналіну (епінефрину); застосування антагоністів β-адренорецепторів (β-блокаторів), у т. ч. місцевих, інгібіторів АПФ (для лікування АГ або ІХС), важкі кардіоваскулярні захворювання, наявність в анамнезі анафілаксії при проведенні алерген-СІТ, діти до 3 років, системні захворювання, ЦД, некомпенсований тиреотоксикоз; ІМ давністю до 1 року, персистуюче пошкодження слизової оболонки ротової порожнини (виразки, ерозії), персистуюче захворювання пародонту, відкрита рана у порожнині рота, недавня екстракція зуба, інші хірургічні маніпуляції у порожнині рота, гінгівіт, що супроводжується кровоточивістю ясен, захворювання порожнини рота (стоматит, глосит); тяжкі запальні захворювання слизової оболонки ротової порожнини (червоний плескатий лишай, мікози), г. та хр. захворювання ШКТ (езофагіт, гастрит, виразкова хвороба, ентерит, коліт, гепатит); підвищена чутливість до допоміжних речовин ЛЗ; вік від 55 років, шкірні захворювання, хр. інфекційні захворювання, маловиражені шкірні проби з алергенами, неефективність попередньої алерген-СІТ (якщо така проводилася), вагітність та годування груддю, загострення основного алергічного захворювання, загострення будь-якого супутнього захворювання, будь-які інτερкурентні захворювання у стадії загострення, прийом інгібіторів MAO у комбінації із симпатоміметиками, вакцинація; недостатнє розуміння хворим необхідності алерген-СІТ та його недисциплінованість, значна тривалість алергічного захворювання (10 років і більше), відстрочені позитивні шкірні проби з алергенами, наявність проявів неспецифічної гіперреактивності, сенсibiliзація до харчових, лікарських, хімічних алергенів; виражена гіперчутливість до 5 і більше алергенів.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ (МІКСТ-АЛЕРГЕНИ) ПОБУТОВОЇ ГРУПИ У ВИГЛЯДІ ДРАЖЕ	ТОВ "Імунолог", Україна	драже у конт.	1000PNU	№15	490,00	

НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНІ (МІКСТ- АЛЕРГЕНІ) ПОБУТОВОЇ ГРУПИ У ВИГЛЯДІ ДРАЖЕ	ТОВ "Імунолог", Україна	драже у конт.	0,2PNU, 2PNU, 20PNU, 200PNU, 1000PNU	№75	980,00	
---	-------------------------	---------------	--	-----	--------	--

18.3.7. Лікарські засоби для діагностики туберкульозу

Після двомісячного віку перед виконанням щеплення БЦЖ дитині слід провести пробу Манту. Щеплення проводиться при негативному результаті проби. З метою раннього виявлення туберкульозу проба Манту з двома туберкуліновими одиницями (ТО) туберкуліну застосовується для всіх дітей з 12-місячного віку систематично раз на рік незалежно від попереднього результату.

У зв'язку з тим, що профілактичні щеплення можуть вплинути на чутливість до туберкуліну, при проведенні туберкулінодіагностики за віком її необхідно планувати до проведення профілактичних щеплень. У разі, якщо з тих або інших причин пробу Манту проводять після проведення профілактичних щеплень, туберкулінодіагностика повинна здійснюватися не раніше ніж через 1 місяць після щеплення.

● **Туберкулін (Tuberculin) ***

Фармакотерапевтична група: V04CF01 - діагностичні ЛЗ; ЛЗ для діагностики туберкульозу; туберкулін.

Основна фармакотерапевтична дія: алерген-туберкулопротеїн - викликає при здійсненні в/шкірної туберкулінової проби у інфікованого МБТ чи вакцинованого БЦЖ організму специфічну АР сповільненого типу у вигляді місцевої реакції - гіперемії та інфільтрату (папули).

Показання для застосування ЛЗ: здійснення в/шкірної туберкулінової проби Манту^{ВООЗ, БНФ} з 2 ТО 0,1 мл: для діагностики інфікування МБТ, а також для вирішення питання проведення щеплення БЦЖ.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/шкірно^{БНФ} (за Манту); потрібну кількість туберкуліну (0,2 мл) набирають одноразовим шпр. місткістю 1 мл з ціною поділки шкали 0,1 мл зі стерильною голкою № 08x40; на шпр. одягти стерильну голку для в/шкірного застосування № 04x13, випускають зайву кількість туберкуліну в стерильний тампон і в/шкірно вводять 0,1 мл; при правильній техніці введення в шкірі утворюється інфільтрат білого кольору діаметром приблизно 8 мм - «лимонна скоринка»; при наявності самоблокувальних шпр. можливий забір у шпр. 0,1 мл р-ну туберкуліну; розмір дози - 2 туберкулінові одиниці, які містяться в 0,1 мл стабілізуючого р-ника; результати проби Манту оцінювати через 72 год.; розмір папули вимірювати за допомогою прозорої міліметрової лінійки; реєструвати максимальний поперечний (по відношенню до осі руки) діаметр папули, зону гіперемії при цьому не враховувати, реакція вважається негативною при наявності уколочної реакції (0-1 мм); сумнівною - при наявності папули 2-4 мм, або гіперемії будь-яких розмірів; позитивною - при наявності папули від 5 мм та більше; гіперергічною вважається реакція при утворенні папули 17 мм і більше у дітей та підлітків, 21 мм і більше у дорослих, а також незалежно від розміру папули наявність везикуло-некротичної реакції, лімфангоїту та регіонарного лімфаденіту

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нездужання, підвищення т^отіла; біль, болюча чутливість/дискомфорт у місці введення ін'єк. одразу після ін'єк.; головний біль; АР; біль/набряк у кінцівці, висип.

Протипоказання до застосування ЛЗ: шкірні захворювання; г., хр. інфекційні та соматичні захворювання у період загострення; алергічні стани (БА, ідіосинкразії з вираженими шкірними виявами, ревматизм у г. та підгострій фазах); епілепсія; наявність тяжкої АР до компонентів ЛЗ або виникнення тяжкої реакції шкіри при попередньому проведенні проби Манту; наявність карантину через інфекційне захворювання у дитячому колективі; проводити діагностичну пробу Манту не раніше 1 міс. після зникнення вищевказаних клінічних симптомів або закінчення карантину через інфекційне захворювання у дитячому колективі; особи із заздалегідь відомою гіперчутливістю (тип I) до діючої речовини або до допоміжних речовин.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БІОЛІК ТУБЕРКУЛІН ППД-Л	АТ "БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 0,6мл (6доз), 1мл (10доз), 3мл (30доз) або комп.: в амп. по 1мл (10доз), 5шпр. з голк. д/витяг., 5голк. д/введ.	2 ТО/доза	№10; №1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БІОЛІК ТУБЕРКУЛІН ППД-Л	АТ "БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 0,6мл (6доз), 3шпр. з голк. д/витяг., 3голк. д/введен.	2 ТО/доза	№1	187,20	
	БІОЛІК ТУБЕРКУЛІН ППД-Л	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 0,6мл (6доз); компл.: в амп. по 1мл (10доз), 5шпр. з голк. д/витяг., 5голк. д/введ.	2 ТО/доза	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

	БІОЛІК ТУБЕРКУЛІН ППД-Л	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл (10доз)	2 ТО/доза	№10	1300,00	
	БІОЛІК ТУБЕРКУЛІН ППД-Л	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 0,6мл (6доз), 3шпр. з голк. д/витаг., 3голк. д/введ.	2 ТО/доза	№1	144,00	
	БІОЛІК ТУБЕРКУЛІН ППД-Л	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 3мл (30доз)	2 ТО/доза	№10	3750,00	
	ТУБЕРКУЛІН ППД RT 23 SSI	ТОВ "ЛЮМ'ЄР ФАРМА" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника Ей Джей Вакцинес Ей/Ес, Данія), Україна	р-н д/ін'єк. по 1,5мл (15доз), у фл. з 15шпр. в конт. чар/уп. у кор.	2 ТО/0,1мл	№1	975,00	
II.	ТУБЕРКУЛІН ППД RT 23 SSI	Ей Джей Вакцинес Ей/Ес, Данія	р-н д/ін'єк. по 1,5мл (15доз), у фл.	2 ТО/0,1мл	№1, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	

18.3.8. Адренергічні лікарські засоби-невідкладна допомога при анафілаксії

- **Епінефрин (Epinephrine)** * (див. п. 2.13.1. розділу "КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

19. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ

19.1. Антинеопластичні засоби

19.1.1. Алкілюючі засоби

19.1.2. Антиметаболіти

19.1.3. Лікарські засоби рослинного походження, в т.ч. напівсинтетичні

19.1.4. Цитотоксичні антибіотики

19.1.5. Сполуки платини

19.1.6. Моноклональні антитіла

19.1.7. Інгібітори протеїнази

19.1.8. Інші антинеопластичні засоби

19.2. Лікарські засоби, що використовуються для гормональної терапії злоякісних новоутворень

19.2.1. Гормони та їх аналоги

19.2.1.1. Прогестерони

19.2.1.2. Аналоги гонадотропін-релізінг гормона

19.2.2. Антагоністи гормонів та подібні лікарські засоби

19.2.2.1. Антиестрогени

19.2.2.2. Антиандрогени

19.2.2.3. Інгібітори ферментів

19.2.2.4. Інші антагоністи гормонів та подібні лікарські засоби

19.3. Імуномодулюючі засоби

19.3.1. Колонієстимулюючі фактори

19.3.2. Інтерферони

19.3.3. Глюкокортикостероїди

19.3.4. Вакцини, що застосовуються для профілактики і лікування злоякісних новоутворень

19.4. Інші імуносупресанти

19.5. Засоби супроводу, що застосовуються в онкології

19.1. Антинеопластичні засоби

Антинеопластичні засоби мають як протипухлинну дію, так і здатність токсично діяти на нормальні тканини. Тому при призначенні певного засобу завжди приймають до уваги співвідношення можливої користі й ризику розвитку токсичних реакцій.

Протипухлинні засоби поділяють на кілька груп, кожна з яких характеризується специфічною протипухлинною активністю, місцем дії та токсичністю. Знання їх метаболізму та шляхів екскреції дуже важливе, оскільки при онкологічному захворюванні може порушуватися фармакокінетика препарату й збільшуватися його токсичність.

В теперішній час засоби для лікування злоякісних новоутворень застосовують переважно в комбінації – у вигляді поліхіміотерапії за спеціальними схемами, рідко у вигляді монотерапії. Зазвичай комбінації токсичніші, аніж окремі препарати, але мають переваги через збільшення протипухлинного ефекту, зниження розвитку резистентності до лікарських засобів та збільшення тривалості життя при лікуванні певних пухлин. Проте в деяких клінічних ситуаціях лікування лише одним препаратом залишається методом вибору.

19.1.1. Алкілюючі засоби

Вони порушують структуру ДНК, утворюючи ковалентний зв'язок з нуклеотидами та поперечні зшивки між нитками ДНК, й тим самим пригнічують ділення клітин. Додатково до звичайних побічних ефектів, властивих всім цитотоксичним засобам, алкілюючі препарати при довготривалому застосуванні викликають сильне пригнічення гаметогенезу й, у поєднанні з променевою терапією, помітно збільшують частоту виникнення вторинних пухлин та лейкозів. Частота виникнення та ступінь тяжкості побічної дії варіює залежно від дози препарату, що застосовується, показань, при яких застосовується, та комбінації ліків, з якими застосовується мелфалан. Для визначення частоти виникнення побічної дії застосовується така класифікація: дуже часто => 1/10, часто => 1/100 та < 1/10, нечасто => 1/1000 та < 1/100, рідко => 1/10,000 та < 1/1000, дуже рідко < 1/10,000.

● Ломустин (Lomustine)

Фармакотерапевтична група: L01AD02 - антинеопластичні засоби; алкілюючі сполуки; похідні нітрозосечовини.

Основна фармакотерапевтична дія: ломустин і/або його метаболіти порушують функцію ДНК, РНК та пригнічують синтез ДНК; діє як алкілюючий агент, як інгібітор кількох етапів синтезу нуклеїнових кислот та як інгібітор репарації одноланцюгових розривів ДНК.

Показання для застосування ЛЗ: паліативна терапія, як доповнення до інших методів лікування, або ж у стандартних схемах комбінованої терапії з іншими хіміотерапевтичними препаратами при: пухлинах мозку (первинні та метастатичні); пухлинах легень (особливо дрібноклітинна карцинома); хворобі Ходжкіна (резистентна

до традиційної хіміотерапії); злоякісній меланомі^{БНФ} (з метастазами); як засіб другої лінії для лікування неходжкінської лімфоми.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос, рекомендована разова доза для пацієнтів з нормально функціонуючим кістковим мозком, у якості єдиного хіміотерапевтичного засобу, 120-130 мг/м² кожні 6 або 8 тиж.^{БНФ} (можна розподілити дозу на 3 дні, 40 мг/м²/день); зменшити дозування при застосовуванні з іншими ЛЗ, що пригнічують функцію кісткового мозку або якщо рівень лейкоцитів у крові нижче 3×10⁹/л або тромбоцитів нижче 75×10⁹/л; не призначати повторно, поки вміст формених елементів у циркулюючій крові не відновиться до прийнятних значень (тромбоцити 100×10⁹/л, лейкоцити 4×10⁹/л); вміст формених елементів в крові перевіряти щотижня; до закінчення 6-тиж. терміну наступну дозу не призначають; лікування проводять доти, доки є терапевтичний ефект; наступні дози підбирати залежно від відповіді системи кровотворення на попередню дозу; у разі відсутності ефекту після 1 або 2 курсів лікування ефективність подальшого застосування малоімовірна; не слід частіше 1 разу на 6 тижнів; доза для дітей 120-130 мг/м² кожні 6-8 тижнів, коригується за тими ж критеріями, що і доза для дорослих; лікування онкологічних захворювань (крім пухлин мозку) у дітей проводити лише у виняткових ситуаціях за життєвими показаннями.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: токсичність щодо системи кровотворення, пригніченням кісткового мозку, зазвичай розвивається ч/з 4-6 тижн. після застосування, залежить від дози, зберігається на рівні 80-100,000/мм³; ч/з 5-6 тижн. розвивається лейкопенія (4-5,000 мм³), що триває 1-2 тижні; гематологічна токсичність може мати кумулятивний характер; кумулятивна мієлосупресія, г.лейкоз, мієлодиспластичний с-ром; лейкопенія; анемія; тромбоцитопенія; збільшення трансміназ, білірубіну, лужної фосфатази у крові; нудота і блювання, анорексія; токсична дія на печінку, холестатична жовтяниця, стоматит, діарея; апатія, порушення координації, втрата орієнтації, загальмованість, дизартрія, сплутаність свідомості, заїкання; інтерстиціальна пневмонія, фіброз легені, легенева інфільтрація; зменшення розмірів нирки, прогресуюча азотемія, ниркова недостатність, алопеція, атрофія зорового нерву, порушення зору, сліпота, канцерогенез, мутагенез, незворотне безпліддя у чоловіків.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препаратів нітрососечовини; нечутливість пухлини до препаратів нітрососечовини; тяжка форма депресії кісткового мозку; тяжка ниркова недостатність; целіакія або алергія на пшеницю; одночасне застосування вакцини проти жовтої лихоманки або інших живих вакцин пацієнтам з ослабленим імунітетом.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЛОМУСТИН МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за маркування первинної упаковки, вторинне пакування, контроль/випробування серії та за випуск серії)/Хаупт Фарма Амареґ ГмБХ (виробник, що відповідає за виробництво лікарського з, Німеччина/Німеччина	капс. у конт.	40мг	№20	12473,38	30,72/€

• **Дакарбазин (Dacarbazine) ***

Фармакотерапевтична група: L01AX04 - антинеопластичні засоби; алкілюючі сполуки.

Основна фармакотерапевтична дія: алкілюючий цитостатичний засіб триазенової структури; механізм дії полягає у пригніченні росту клітин (що не пов'язано з клітинним циклом) та в інгібуванні синтезу ДНК; має алкілюючий ефект та може включатися в інші цитостатичні механізми; не має антинеопластичного ефекту, але в результаті мікросомального N-деметилування він швидко перетворюється на 5-аміно-імідазол-4-карбоксамід та метильний катіон, які зумовлюють алкілюючу дію дакарбазину.

Показання для застосування ЛЗ: злоякісна метастазуюча меланома^{ВООЗ БНФ}, у складі комбінованої терапії: хвороба Ходжкіна^{ВООЗ БНФ}, прогресуючі саркоми м'яких тканин^{БНФ} (крім мезотеліоми та саркоми Капоші) у дорослих.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати в/в; при злоякісній меланомі: при монотерапії - 200-250 мг/м² поверхні тіла у вигляді в/в ін'єкції 1 р/добу протягом 5 діб, повторні курси - кожні 3 тижні; як альтернативу в/в болюсній ін'єкції можна вводити способом короткотривалої інфузії (протягом 15-30 хв); як в/в інфузію у дозі 850 мг/м² 1 р/добу і потім 1 раз кожні 3 тижні; хвороба Ходжкіна - 375 мг/м² поверхні тіла на добу (в/в) кожні 15 діб у комбінації з доксорубіцином, блеомицином та вінбластином (ABVD режим дозування); саркома м'яких тканин у дорослих - 250 мг/м² на добу в/в (1-5 днів) у комбінації з доксорубіцином кожні 3 тижні (ADIC); тривалість лікування лікар визначає індивідуально для кожного випадку, враховуючи тип та стадію захворювання, комбінована терапія, побічні ефекти та лікувальний ефект, які спричиняє дакарбазин тощо; при хворобі Ходжкіна зазвичай рекомендується провести 6 циклів ABVD комбінованої терапії; у випадку саркоми м'яких тканин та злоякісної меланоми тривалість лікування визначається ефективністю дакарбазину та толерантністю до нього пацієнта.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія, панцитемія, агранулоцитоз; анафілактичні р-ції; головний біль, погіршення зору, сплутаність свідомості, сонливість, судоми, парестезія обличчя; припливи; анорексія, нудота і блювання, діарея; гепатоцелюлярний некроз, обструкція печінкових вен, збільшення активності печінкових ферментів; порушення ф-ції нирок, ниркова недостатність; алопеція, гіперпігментація, фотосенсибілізація, еритема, кропив'янка, макулопапульозний висип; грипоподібні симптоми (підвищення t°, біль у м'язах і загальна стомлюваність), запалення у місці введення; інфекції; паравенозне введення може призвести до місцевого болю і некрозу.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до дакарбазину або до будь-якої іншої складової препарату; вагітність і період годування груддю; тяжка печінкова і ниркова недостатність, лейкопенія та/або тромбоцитопенія; у пацієнтів із супутнім проведенням вакцинації проти жовтої лихоманки або з супутнім застосуванням фотемустину.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДАКАРБАЗИН	Венус Ремедіс Лімітед, Індія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	200мг, 500мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДАКАРБАЗИН МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії)/Онкомед меньюфекчерінг, а.с. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, маркування та контроль серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (в, Німеччина/Чеська Республіка/Німеччина	пор. д/приг. р-ну д/ін'єк. або інфуз. у фл.	100мг	№10	1932,92	31,38/€
	ДАКАРБАЗИН МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії)/Онкомед меньюфекчерінг, а.с. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, маркування та контроль серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (в, Німеччина/Чеська Республіка/Німеччина	пор. д/приг. р-ну д/ін'єк. або інфуз. у фл.	200мг	№10	4239,72	31,38/€
	ДАКАРБАЗИН МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії)/Онкомед меньюфекчерінг, а.с. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, маркування та контроль серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (в, Німеччина/Чеська Республіка/Німеччина	пор. д/приг. р-ну д/інфуз. у фл.	500мг	№1	878,60	31,38/€
	ДАКАРБАЗИН МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії)/Онкомед меньюфекчерінг, а.с. (виробництво "in bulk",	пор. д/приг. р-ну д/інфуз. у фл.	1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

		первинне та вторинне пакування, маркування та контроль серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмБХ (в, Німеччина/Чеська Республіка/Німеччина				
--	--	---	--	--	--	--

● **Іфосфамід (Ifosfamide) ***

Фармакотерапевтична група: L01AA06 - антинеопластичні засоби. Алкілюючі сполуки, аналоги азотистого іприту.

Основна фармакотерапевтична дія: цитотоксична речовина з групи оксазафосфоринів; хімічно споріднений з азотистим іпритом і є синтетичним аналогом циклофосфаміду; активується у печінці завдяки мікосомальним ферментам, трансформуючись у 4-гідрокси-іфосфамід, що перебуває у рівновазі зі своїм таутомером альдоіфосфамідом, який спонтанно деградує до акролеїну і алкілюючого метаболіту ізоіфосфаміду-лост; акролеїн спричиняє уротоксичний ефект іфосфаміду; цитотоксичний ефект є наслідком взаємодії між його алкілюючими метаболітами і ДНК; переважна точка атаки - це фосфодіефірні містки ДНК; результатом алкілювання є розрив і зчеплення поперечних зв'язків ниток ДНК; у клітинному циклі перенесення через фазу G₂ сповільнюється; цитотоксичний ефект не характерний для певної фази клітинного циклу, однак він характерний для клітинного циклу; не можна виключати перехресну резистентність, головним чином зі структурно спорідненими цитостатичними речовинами, такими як циклофосфамід та а інші алкілюючі речовини; відомо, що пухлини, які можуть бути резистентними до циклофосфаміду чи рецидивувати після лікування циклофосфамідом, часто відповідають на лікування іфосфамідом.

Показання для застосування ЛЗ: комбінована хімотерапія поширених пухлин яєчок II-IV ст ^{БНФ}. згідно з класифікацією TNM (семіном і несеміном), що недостатньо реагували або взагалі не реагували на первинну хімотерапію; паліативна комбінована хімотерапія цисплатином/іфосфамідом (без додаткових комбінованих препаратів) карциноми шийки матки IV В ст. ^{БНФ} за класифікацією FIGO (якщо проведення радикального лікування хірургічним шляхом або радіаційної терапії неможливе), як альтернатива паліативної променевої терапії; паліативна терапія поширеного резистентного чи рецидивуючого раку молочної залози ^{БНФ}; монотерапія або комбінована хімотерапія у пацієнтів із неоперабельними або метастатичними пухлинами - недрібноклітинна бронхіальна карцинома ^{БНФ}; комбінована хімотерапія дрібноклітинної бронхіальної карциноми ^{БНФ}; монотерапія або комбінована хімотерапія рабдоміосаркоми або остеосаркоми ^{БНФ} при неефективності стандартного лікування, інших сарком м'яких тканин при неефективності хірургічної і радіаційної терапії; комбінована хімотерапія при неефективності первинної цитостатичної терапії саркоми Юінга ^{БНФ}; комбінована хімотерапія пацієнтів із високозлоякісними неходжкінськими лімфомами ^{БНФ}, що недостатньо реагували або взагалі не реагували на первинну терапію, рецидивуючими пухлинами; хвороба Ходжкіна ^{БНФ}, насамперед з прогресуючим перебігом або на початку рецидиву (тривалість повної ремісії менше 1 р.), після невдалого проведення первинної хімотерапії або радіохімотерапії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: доза підбирається індивідуально ^{БНФ}; доза та тривалість лікування, а також інтервали між курсами лікування залежать від показань, схеми комбінованого лікування, індивідуальних потреб пацієнта з урахуванням загального стану здоров'я, ф-ції органів і картини крові; фракційне застосування препарату є найбільш поширеним для проведення монотерапії у дорослих пацієнтів; фракційне введення: 1,2-2,4 г/м² поверхні тіла (до 60 мг/кг маси тіла) на добу протягом 5 днів поспіль у вигляді в/в інфузії протягом періоду від 30 хв. до 2 год., залежно від об'єму введення; пролонгована інфузія: 5 г/м² поверхні тіла (=125 мг/кг маси тіла), у вигляді високої одноразової дози шляхом 24-год. пролонгованої інфузії; загальна доза на цикл не повинна перевищувати 8 г/м² поверхні тіла (=200 мг/кг маси тіла); готовий до застосування р-н не повинен перевищувати концентрацію 4 %; цикли терапії можна повторювати кожні 3-4 тижні; інтервали між циклами залежать від відновлення картини крові та усунення побічних р-цій або супутніх симптомів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції, пневмонія, сепсис (септичний шок); вторинні пухлини, рак сечовивідних шляхів, мієлодиспластичний синдром, г. лейкоїзм, г. лімфоцитарний лейкоз, лімфома (неходжкінська лімфома), саркома, нирковоклітинна карцинома, рак цитовидної залози, прогресування існуючого злоякісного захворювання; мієлосупресія, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія, анемія; гематотоксичність, агранулоцитоз, фебрильна нейтропенія, гемолітичний уремичний синдром, дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові, гемолітична анемія, анемія новонароджених, метгемоглобінемія; реакції гіперчутливості; анафілактичний шок; ангіоневротичний набряк, анафілактична реакція, імуносупресія, кропив'янка; синдром недостатньої секреції антидіуретичного гормону; метаболічний ацидоз, анорексія; гіпонатріємія, затримка води; гіпокаліємія; синдром лізису пухлини, гіпокальціємія, гіпофосфатемія, гіперглікемія, полідипсія; галюцинації, депресивний психоз, дезорієнтація, збудження, сплутаність свідомості; панічна атака, кататонія, манія, параноя, делірій, брадифренія, мутизм, зміни психічного стану, ехолоалія, логорея, персеверація, амнезія; токсичні прояви з боку ЦНС, енцефалопатія, в'ялість; сонливість, розлади пам'яті, запаморочення, периферична нейропатія; мозочковий синдром, судоми; кома, полінейропатія; нейротоксичність (дизартрія, епілептоїдний статус, синдром зворотної задньої лейкоенцефалопатії, лейкоенцефалопатія, екстрапірамідні порушення, астериксис, апраксія, дизестезія, гіпестезія, парестезія, невралгія, порушення ходи, нетримання анального сфінктера); порушення зору; неясність зору, кон'юнктивіт, подразнення ока; глухота, зниження слуху, вертіго, шум у вухах; кардіотоксичність (шлуночкова аритмія, шлуночкова екстрасистолія, надшлуночкова аритмія, надшлуночкова екстрасистолія, СН); аритмія (шлуночкова фібриляція, шлуночкова тахікардія, надшлуночкова фібриляція, тріпотіння передсердь, передчасне скорочення передсердь), брадикардія, зупинка серця, ІМ, кардіогенний шок, блокада лівої ніжки пучка Гіса, блокада правої ніжки пучка Гіса, перикардальний випіт, крововилив у міокард, стенокардія, лівошлуночкова недостатність, кардіоміопатія, застійна кардіоміопатія, міокардит, перикардит, міокардальна депресія, пальпітація, зниження фракції викиду, зміни на електрокардіограмі (сегмент ST, сегмент T, QRS-комплекс); артеріальна гіпотензія, ризик кровотечі; флебіт; емболія легеневої артерії, тромбоз глибоких вен, синдром протікання капілярів, васкуліт, АГ, гіпотензія, припливи; інтерстиціальний пневмоніт, хр. інтерстиціальний

пульмонарний фіброз (що маніфестує як пульмонарний фіброз), набряк легень; дихальна недостатність, г. респіраторний синдром, легенева гіпертензія, алергічний альвеоліт, пневмоніт, плевральний випіт, бронхоспазм, диспное, гіпоксія, кашель; нудота, блювання; діарея, стоматит, запор; панкреатит; тифліт, коліт, ентероколіт, кишкова непрохідність, крововилив у ШКТ, виразкування слизових оболонок, біль у животі, гіперсекреція слини; розлади функції печінки, гепатотоксичність; блискавичний гепатит, вазооклюзивне захворювання печінки, тромбоз портальної вени, цитолітичний гепатит, холестаза; алопеція; папульозні висипи, дерматит; токсичний епідермальний некроліз, синдром Стівенса – Джонсона, синдром долонно-підшовної еритродизестезії, дерматит у ділянці опромінення, некроз шкіри, набряк обличчя, петехії, висипання, макулярні висипання, свербіж, еритема, гіперпігментація шкіри, гіпергідроз, розлади з боку нігтів; рахіт, остеомаліяція; рабдоміоліз, затримка росту, міалгія, артралгія, біль у кінцівках, спазми м'язів; гематурія, мікрогематурія, макрогематурія, геморагічний цистит, ниркова дисфункція, порушення структури нирок; нефропатія, канальцева дисфункція; нетримання сечі; гломерулярна дисфункція, канальцевий ацидоз, протеїнурія; синдром Фанконі; г. ниркова недостатність, хр. ниркова недостатність, тубулоінтерстиціальний нефрит, нейрогенний нецукровий діабет, фосфатурія, аміноацидурія, поліурія, енурез, відчуття неповного випорожнення сечового міхура; порушення сперматогенезу; азооспермія, олігоспермія; недостатність функції яєчників, аменорея, зниження рівня естрогену у крові; безпліддя, передчасна менопауза, порушення функції яєчників, збільшення рівня гонадотропіну у крові; гіпераміноацидурія; затримка росту плода; підвищена реакція на опромінення; гарячка; нейтропенічна лихоманка, слабкість; втомлюваність; нездужання, мультиорганна недостатність, у тому числі з летальним наслідком, погіршення загального стану, реакції у місці введення, у тому числі набряки, запалення, біль, еритема, хвороблива чутливість, свербіж, біль у грудях, набряк, запалення слизових оболонок, біль, підвищення температури тіла, озноб.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до іфосфаміду або до будь-якого з його метаболітів та інших компонентів препарату; тяжкі порушення ф-ції кісткового мозку (особливо пацієнтам, які попередньо проходили лікування цитотоксичними препаратами чи радіаційну терапію); запалення сечового міхура; порушення ф-ції нирок та/або обструкція сечовивідних шляхів; г.інфекція.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ІФОСФАМІД	Венус Ремедіс Лімітед, Індія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІФОСФАМІД АМАКСА	Стадафарм ГмбХ (вторинне пакування, контроль серії/якості, випуск серії)/Тимоорган Фармаціе ГмбХ (виробництво розчину bulk, первинне та вторинне пакування, контроль серії/якості), Німеччина/Німеччина	р-н д/інфуз. у фл. по 25мл, 50мл	40 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ХОЛОКСАН® 1 Г	Бакстер Онколоджі ГмбХ, Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	1387,02	25,49/\$
	ХОЛОКСАН® 2 Г	Бакстер Онколоджі ГмбХ, Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	2г	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ХОЛОКСАН® 500 МГ	Бакстер Онколоджі ГмбХ, Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	500мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Мелфалан (Melphalan) ***

Фармакотерапевтична група: L01AA03 - антинеопластичні засоби. Алкілюючі сполуки.

Основна фармакотерапевтична дія: біфункціональна алкілююча сполука; утворення проміжних сполук вуглецю з кожної із двох біс-2-хлоретильних груп забезпечує алкілювання шляхом ковалентного зв'язування з 7-азотом гуаніну в ДНК, перехресне зв'язування двох ланцюгів молекули ДНК, що призводить до порушення реплікації клітин.

Показання для застосування ЛЗ: шляхом регіональної артеріальної перфузії: локалізована малігнізована меланома кінцівок, локалізована саркома м'язих тканин кінцівок^{БНФ}; в/в введення самостійно або в комбінації з іншими цитостатиками: множинна мієлома^{БНФ} (у середніх або високих терапевтичних дозах); пізні стадії карциноми яєчників; IV стадія нейробластоми; р/ос: множинна мієлома; пізні стадії аденокарциноми яєчників; карцинома молочної залози (окремо або у комбінації з іншими препаратами має значний терапевтичний ефект у пацієнтів на пізніх стадіях раку молочної залози); істинна поліцитемія^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: за винятком випадків, коли показана регіонарна перфузія, призначений лише для в/в введення; в/в^{БНФ}: множинна мієлома: монотерапія або у комбінації з іншими цитостатиками на інтермітуючій основі по 8-30 мг/м² поверхні тіла з інтервалом між застосуванням від 2 до 6 тижнів; додатково в терапії можливе призначення преднізолону; при монотерапії стандартна в/в доза 0,4 мг/кг маси тіла (16 мг/м² поверхні тіла), повторювана з інтервалом, необхідним для відновлення функції кісткового мозку (1 раз у 4 тижні); при призначенні високих доз застосовують разові в/в дози 100-240 мг/м² поверхні тіла (2,5-6,0 мг/кг маси тіла), але дози, що перевищують 140 мг/м² поверхні тіла, застосовують з одночасною трансплантацією аутологічного кісткового мозку; карцинома яєчників (пізні стадії): при монотерапії в/в 1 мг/кг маси тіла (40 мг/м² поверхні тіла) з

інтервалом у 4 тижні; при комбінованому застосуванні з іншими цитостатиками в/в доза 0,3-0,4 мг/кг маси тіла (12-16 мг/м² поверхні тіла) з інтервалом 4-6 тижнів; злоякісна меланома - гіпертермічні регіонарні перфузії застосовують як допоміжну терапію при хірургічних втручаннях на ранніх стадіях та як паліативне лікування при пізніх, але локалізованих формах захворювання; саркома м'яких тканин - гіпертермічні регіонарні перфузії застосовують при лікуванні всіх стадій локалізованої саркоми м'яких тканин, зазвичай у поєднанні з хірургічними методами лікування, часто призначають у поєднанні з актиноміцином D; IV стадія нейробластоми у дітей: від 100 до 240 мг/м² поверхні тіла (інколи розподілені на 3 послідовні дні) у поєднанні з трансплантацією аутологічного кісткового мозку окремо або в комбінації з променевою терапією та/або іншими цитостатиками; p/os^{БНФ}: множинна мієлома: 0,15 мг/кг маси тіла на добу за кілька прийомів протягом 4 днів, повторні цикли - через 6 тижнів; разом з преднізолоном може бути більш ефективним; при тривалості лікування, що перевищує 1 рік, покращання результатів не відбувається; аденокарцинома яєчників (пізні стадії): 0,2 мг/кг маси тіла на добу, у розподіленій дозі протягом 5 днів, цикл повторювати кожні 4-8 тижнів або після відновлення показників периферичної крові; карцинома молочних залоз: 0,15 мг/кг маси тіла або 6 мг/м² поверхні тіла протягом 5 днів, цикл повторювати кожні 6 тижнів; при появі ознак токсичного впливу на кістковий мозок дозу зменшити; істинна поліциємія: 6-10 мг/добу протягом 5-7 днів, після чого призначати 2-4 мг/добу до досягнення задовільного ступеня ремісії^{БНФ}; підтримуюча терапія по 2-6 мг 1 р/тиждень.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: пригнічення кісткового мозку, лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія; гемолітична анемія; реакції гіперчутливості, анафілактичний шок, кропив'янка, набряк, шкірні висипання, свербіж, інтерстиціальний пневмоніт і фіброз легенів (включаючи летальні випадки); нудота, блювання, діарея, стоматит; відхилення у лабораторних показниках функції печінки, гепатит та жовтяниця, венооклюзивні захворювання; алопеція; макулопапульозний висип та свербіж; м'язова атрофія, м'язовий фіброз, міалгія, підвищення рівня креатинфосфокінази крові; с-м міжфасційного простору; м'язовий некроз, рабдоміоліз; тимчасове значне підвищення рівня сечовини в крові; скороминучі відчуття тепла та/або пощипування в місці введення, лихоманка; азооспермія, аменорея; тромбоз глибоких вен і емболія легеневої артерії; вторинний ГМЛ і МДС.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату або до будь-якого його компонента, годування груддю.

Визначена добова доза (DDD): парентерально/перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АЛКЕРАН™	ГлаксоСмітКляйн Мануфактуринг С.П.А., Італія	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч.	50мг	№1	4118,52	26,90/\$
	АЛКЕРАН™	Екселла ГмБХ і Ко. КГ, Німеччина	табл., вкриті п/о у фл.	2мг	№1	2101,92	26,16/\$
	МЕЛП СПАЛ 50	СП Акур Лабс Пвт. Лтд., Індія	ліоф. д/р-ну д/ін'ек. у фл. з розч.	50мг	№1	3850,00	26,93/\$

• **Темозоломід (Temozolomide) ***

Фармакотерапевтична група: L01AX03 - антинеопластичні засоби. Алкілуєчі сполуки.

Основна фармакотерапевтична дія: триазен, при фізіологічних значеннях рН піддається швидкому хімічному перетворенню на активний монометил триазеноїмідазол карбоксамід (МТІК); цитотоксичність МТІК зумовлена, в першу чергу, алкілуванням гуаніну в положенні O⁶ і додатковим алкілуванням у положенні N⁷; цитотоксичні ураження, що виникають внаслідок цього, включають механізм аберантного відновлення метилового залишку.

Показання для застосування ЛЗ: вперше виявлена мультиформна гліобластома у складі комбінованого лікування із застосуванням радіотерапії і наступної монотерапії у дорослих^{БНФ}; злоякісна гліома у формі мультиформної гліобластоми або анапластичної астроцитоми при наявності рецидиву або прогресування захворювання після стандартної терапії у дітей віком від 3-х років та дорослих^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: пор. для р-ну д/інф. вводити тільки шляхом в/в інфузії, капс. - р/os; дорослим із уперше виявленою мультиформною гліобластомою застосовують в комбінації з фокальною радіотерапією (комбінована фаза), після чого проводять 6 циклів монотерапії темозоломідом (фаза монотерапії); при комбінованій фазі застосовують у дозі 75 мг/м² на добу протягом 42 днів одночасно з проведенням фокальної променевої терапії (60 Гр за 30 сеансів); зниження дози не рекомендується; рішення про відстрочення або переривання прийому ЛЗ визначається щотижня залежно від гематологічних та негематологічних критеріїв токсичності; застосування у зазначеній дозі може бути продовжено з 42 днів до 49 днів при наявності умов: абсолютна кількість нейтрофілів $\geq 1,5 \times 10^9$ /л; кількість тромбоцитів $\geq 100 \times 10^9$ /л; КЗТ: негематологічна токсичність ≤ 1 ступеня (за винятком алопеції, нудоти та блювання); прийом препарату перервати або припинити зовсім при наявності критеріїв гематологічної та негематологічної токсичності (абсолютна кількість нейтрофілів $\geq 0,5$ та $< 1,5 \times 10^9$ /л (переривання), $< 0,5 \times 10^9$ /л (припинення); кількість тромбоцитів ≥ 10 та $< 100 \times 10^9$ /л (переривання), $< 10 \times 10^9$ /л (припинення); КЗТ: негематологічна токсичність (за винятком алопеції, нудоти та блювання), ступінь 2 (переривання), КЗТ, ступінь 3 або 4 (припинення); ч/з 4 тижні після завершення комбінованої фази лікування призначають 6 циклів монотерапії; доза під час циклу 1 монотерапії - 150 мг/м² 1 р/добу протягом 5 днів з подальшим 23-денною перервою; доза циклу 2 підвищується до 200 мг/м² /добу, якщо КЗТ: негематологічна токсичність під час циклу 1 становила ≤ 2 ст. (за винятком алопеції, нудоти та блювання), абсолютна кількість нейтрофілів $\geq 1,5 \times 10^9$ /л, кількість тромбоцитів $\geq 100 \times 10^9$ /л; якщо підвищення дози не відбулося у циклі 2, у

наступних циклах дозу також не підвищують; якщо доза підвищувалася, застосовують у дозі 200 мг/м²/добу протягом перших 5 днів кожного наступного циклу, за винятком випадку розвитку токсичності; припиняють застосовувати, якщо рівень дози -1 (100 мг/м²) продовжує супроводжуватися неприйнятною токсичністю або якщо ступінь 3 негематологічної токсичності (за винятком алопеції, нудоти та блювання) повторюється після зниження дози; рецидивуюча або прогресуюча злоякісна гліома у дорослих та дітей віком від 3 років: цикл терапії - 28 днів; пацієнтам, яким раніше не проводилася хіміотерапія, призначають 1 р/добу у дозі 200 мг/м² протягом 5 днів з наступною 23-денною перервою; пацієнтам, яким раніше проводили хіміотерапію, початкова доза - 150 мг/м² 1 р/добу протягом 5 днів; у циклі 2 дозу можна підвищити до 200 мг/м² 1 р/добу протягом 5 днів за умови відсутності гематологічної токсичності.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота, блювання, запор, анорексія, головний біль, втома, судороги; інфекція, фарингіт, кандидоз ротової порожнини; *Herpes simplex*, *Herpes zoster*, грипоподібні симптоми; фебрильна нейтропенія, тромбоцитопенія, анемія, лейкопенія; лімфопенія, петехії; Кушингоїд; гіперглікемія, збільшення/зменшення маси тіла, підвищення рівня лужної фосфатази; неспокій, депресія, емоційна лабільність, безсоння; галюцинації, амнезія, ажитація, апатія, розлади поведінки, депресія; геміпарез, афазія, порушення рівноваги, сонливість, сплутаність свідомості, запаморочення, погіршення пам'яті, погіршення концентрації уваги, дисфазія, неврологічні розлади, нейропатія, периферійна нейропатія, парестезія, порушення мовлення, тремор, геміплегія, атаксія, порушення координації, порушення ходи, гіперестезія, епілептичний статус сенсорні розлади; дефект поля зору, нечіткість зору, диплопія; зниження гостроти зору, біль в очах, сухість очей; погіршення слуху, дзвін у вухах, глухота, вертиго, біль у вухах, крововилив, тромбоз глибоких вен, набряк ніг; легенева емболія, набряк, крововилив у мозок, гіпертензія, периферійний набряк; задишка, кашель, пневмонія, синусит, закладеність носа, інфекції верхніх відділів дихальних шляхів, бронхіт; стоматит, діарея, диспепсія, дисфагія, сухість у роті, здуття живота, нетримання калу, гастроінтестинальні розлади, гастроентерит, геморої; висип, алопеція; сухість шкіри, свербіж, еритема, дерматит, порушення пігментації, посилена пітливість, м'язова слабкість, артралгія, м'язово-скелетний біль, міалгія, міопатія, біль у спині; нетримання сечі, дизурія; вагінальна кровотеча, менорагія, аменорея, вагініт, біль у молочних залозах; АР, лихоманка, променеве ураження, біль, зміна смакових відчуттів, астенія, набряк обличчя, біль, погіршення самопочуття, тремтіння, дентальні розлади, підвищення рівня АЛТ, підвищення рівня печінкових ферментів, ГГТ, АСТ. *Перелік р-цій в постмаркетинговий період:* інфекція цитомегаловірусу, реактивація інфекцій як цитомегаловірус, гепатит В, герпетичний менингоенцефаліт; тривала панцитопенія, апластичанемія, мієлодиспластичний с-ром, вторинне злоякісне новоутворення, включаючи мієлоїдну лейкемію, нецукровий діабет, інтерстиціальний пневмоніт/пневмоніт, фіброз легень, респіраторна недостатність, підвищення рівня ферментів печінки, гіпербілірубінемія, холестаза, гепатит, ураження печінки, печінкова недостатність, токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона; р-ція на препарат з еозинofilією та системними симптомами (DRESS).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до темозоломіду, інших компонентів препарату або до дакарбазину; тяжка форма мієлосупресії.

Визначена добова доза (DDD): перорально/парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ГЛІОЗОМІД	ЕйГен Фарма Лімітед (виробництво ГЛЗ, пакування, тестування, випуск серії)/Мілмаунт Хелскеа Лтд (первинне і вторинне пакування), Ірландія/Ірландія	капс. у саше в пач.	20мг	№1x5	1067,50	26,46/€
	ГЛІОЗОМІД	ЕйГен Фарма Лімітед (виробництво ГЛЗ, пакування, тестування, випуск серії)/Мілмаунт Хелскеа Лтд (первинне і вторинне пакування), Ірландія/Ірландія	капс. у саше в пач.	100мг	№1x5	3812,50	26,46/€
	ГЛІОЗОМІД	ЕйГен Фарма Лімітед (виробництво ГЛЗ, пакування, тестування, випуск серії)/Мілмаунт Хелскеа Лтд (первинне і вторинне пакування), Ірландія/Ірландія	капс. у саше в пач.	180мг	№1x5	6100,00	26,46/€
	ГЛІОЗОМІД	ЕйГен Фарма Лімітед (виробництво ГЛЗ, пакування, тестування, випуск серії)/Мілмаунт Хелскеа Лтд (первинне і вторинне пакування), Ірландія/Ірландія	капс. у саше в пач.	250мг	№1x5	7167,50	26,46/€

	Ірландія/Ірландія					
ЗОЛОТЕМ-140	Аккорд Хелскеа Лімітед (відповідальний за випуск серії, первинне та вторинне пакування)/Інтас Фармасьютикалз Лімітед (виробництво готового лікарського засобу, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості серії; виробництво готового лікарського з, Велика Британія/Індія	капс. у фл.	140мг	№5, №20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЗОЛОТЕМ-180	Аккорд Хелскеа Лімітед (відповідальний за випуск серії, первинне та вторинне пакування)/Інтас Фармасьютикалз Лімітед (виробництво готового лікарського засобу, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості серії; виробництво готового лікарського з, Велика Британія/Індія	капс. у фл.	180мг	№5, №20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТЕМОДАЛ®	Оріон Фарма (виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка та контроль якості)/Шерінг-Плау Лабо Н.В. (первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії), Фінляндія/Бельгія	капс. у саше в кор.	20мг, 100мг, 140мг, 180мг, 250мг,	№1x5, №1x20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТЕМОДАЛ®	Оріон Фарма (виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка та контроль якості)/Шерінг-Плау Лабо Н.В. (первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії), Фінляндія/Бельгія	капс. у саше в кор.	20мг	№1x5	751,59	26,79/\$
ТЕМОДАЛ®	Оріон Фарма (виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка та контроль якості)/Шерінг-Плау Лабо Н.В. (первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії), Фінляндія/Бельгія	капс. у саше в кор.	100мг	№1x5	3757,96	26,79/\$
ТЕМОДАЛ®	Бакстер Онколоджи ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування та контроль якості)/Шерінг-Плау Лабо Н.В. (вторинне пакування та дозвіл на випуск серії), Німеччина/Бельгія	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	100мг	№1	8574,30	26,79/\$
ТЕМОМЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (виробник, що відповідає за вторинну упаковку, контроль/випробування серії, дозвіл на випуск серії)/Хаупт Фарма Амарег	капс. у фл.	5мг, 20мг, 100мг	№5, №20	відсутня у реєстрі ОВЦ	

	ГмБХ (відповідають за виробництво нерозфасованої продукції, первинну упаковку, контро, Німеччина/Німеччина/Італія					
ТЕМОМЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за вторинну упаковку, контроль/випробування серії, дозвіл на випуск серії)/Хаупт Фарма АмареГ ГмБХ (відповідають за виробництво нерозфасованої продукції, первинну упаковку, контро, Німеччина/Німеччина/Італія	капс. у фл.	20мг	№5	1505,41	30,72/€
ТЕМОМЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за вторинну упаковку, контроль/випробування серії, дозвіл на випуск серії)/Хаупт Фарма АмареГ ГмБХ (відповідають за виробництво нерозфасованої продукції, первинну упаковку, контро, Німеччина/Німеччина/Італія	капс. у фл.	100мг	№20	4946,34	30,72/€
ТЕМОМЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за вторинну упаковку, контроль/випробування серії, дозвіл на випуск серії)/Хаупт Фарма АмареГ ГмБХ (відповідають за виробництво нерозфасованої продукції, первинну упаковку, контро, Німеччина/Німеччина/Італія	капс. у фл.	140мг	№5	6912,59	30,72/€
ТЕМОМЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за вторинну упаковку, контроль/випробування серії, дозвіл на випуск серії)/Хаупт Фарма АмареГ ГмБХ (відповідають за виробництво нерозфасованої продукції, первинну упаковку, контро, Німеччина/Німеччина/Італія	капс. у фл.	180мг	№5	8909,55	30,72/€
ТЕМОМЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за вторинну упаковку, контроль/випробування серії, дозвіл на випуск серії)/Хаупт Фарма АмареГ ГмБХ (відповідають за виробництво нерозфасованої продукції, первинну упаковку, контро, Німеччина/Німеччина/Італія	капс. у фл.	250мг	№5	12350,49	30,72/€

		ГмбХ (відповідають за виробництво нерозфасованої продукції, первинну упаковку, контро, Німеччина/Німеччина/Італія					
--	--	---	--	--	--	--	--

● **Хлорамбуцил (Chlorambucil) ***

Фармакотерапевтична група: L01AA02. Антинеопластичні засоби. Алкілюючі сполуки.

Основна фармакотерапевтична дія: ароматичне похідне азотистого іприту, діє як біфункціональний алкілюючий агент; порушує реплікацію ДНК, спричиняє апоптоз клітини завдяки накопиченню цитозольного р53 та подальшої активації промотора апоптозу (Вах); цитотоксичний ефект зумовлений самою сполукою та основним метаболітом, фенілоцтовим іпритом.

Показання для застосування ЛЗ: хвороба Ходжкіна^{ВООЗ,БНФ}, деякі форми неходжкінської лімфоми^{ВООЗ,БНФ}, хронічний лімфоцитарний лейкоз^{ВООЗ,БНФ}, макроглобулінемія Вальденстрема^{ВООЗ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: паліативна монотерапія на пізній стадії хвороби Ходжкіна - дорослим і дітям 0,2 мг/кг/добу протягом 4-8 тижнів; монотерапія при неходжкінській лімфомі - дорослим і дітям початкова доза 0,1-0,2 мг/кг/добу протягом 4-8 тижнів, підтримуюча терапія проводиться зі зменшеною добовою дозою або інтермітуючими курсами лікування; при лікуванні хворих з пізньою стадією неходжкінської лімфоцитарної лімфоми немає різниці в отриманому результаті після проведення комбінованої хіміотерапії або застосування монотерапії; лікування хр. лімфоцитарного лейкозу дорослих починається лише після появи клінічних симптомів або ознак порушення ф-ції кісткового мозку (але не при недостатності кісткового мозку) за даними аналізу периферичної крові у дозі 0,15 мг/кг/добу до моменту, доки загальний лейкоцитоз не зменшується до 10 000 на 1 мкл, лікування відновити через 4 тижні після закінчення першого курсу та продовжувати у дозі 0,1 мг/кг/добу; хворі з ознаками недостатності кісткового мозку повинні лікуватися преднізолоном, до початку лікування хлорамбуцилом потрібно отримати докази регенерації кісткового мозку; макроглобулінемія Вальденстрема - 6-12 мг/добу до появи лейкопенії, потім лікування продовжувати протягом тривалого часу у дозі 2-8 мг/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: г. вторинні гематологічні зляжкісні новоутворення (особливо лейкоз і мієлодиспластичний с-м), головним чином після тривалого лікування; анемія, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія, панцитопенія або супресія кісткового мозку; р-ції гіперчутливості, такі як кропив'янка та ангіоневротичний набряк; судоми у педіатричних пацієнтів із нефротичним с-мом; судоми парціальні та/або генералізовані при отримуванні препарату у щодених терапевтичних дозах або у вигляді пульс-терапії високими дозами хлорамбуцилу; рухові розлади, включаючи тремор, посмикування м'язів та міоклонію за відсутності судом, периферична нейропатія; тяжкий інтерстиціальний легеневи фіброз, інтерстиціальна пневмонія, шлунково-кишкові захворювання, нудота, блювання, діарея, поява виразок на слизовій оболонці рота; гепатотоксичність, жовтяниця; висипання; с-м Стівенса - Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, асептичний цистит, аменорея, азооспермія, гарячка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: доброякісні новоутворення; гіперчутливість до хлорамбуцилу або будь-якої з допоміжних речовин; не застосовувати, якщо спостерігалась резистентність до препарату при попередньому застосуванні; можливі перехресні р-ції гіперчутливості між хлорамбуцилом та іншими алкілюючими речовинами.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЛЕЙКЕРАН™	Екселла ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина	табл., вкриті п/о у фл.	2мг	№25	1763,91	25,10/\$

● **Циклофосфамід (Cyclophosphamide) ***

Фармакотерапевтична група: L01AA01 - антинеопластичні засоби; алкілювальні сполуки, аналоги азотистого іприту.

Основна фармакотерапевтична дія: антинеопластичний засіб класу оксазафосфоринів; активація відбувається за допомогою мікросомальних ензимів у печінці, де він перетворюється на 4-гідрокси-циклофосфамід, який знаходиться у рівновазі з його таутомером - альдофосфамідом, які піддаються конверсії в неактивні та активні метаболіти (особливо фосфораміду іприт і акролеїн); цитотоксична дія базується на взаємодії між його алкілюючими метаболітами і ДНК, що призводить до розриву та перехресного з'днання поперечних зв'язків ниток ДНК та ДНК-білків; у клітинному циклі сповільнюється перебіг фази G2; цитотоксична дія неспецифічна для фази клітинного циклу, але специфічна для всього клітинного циклу; акролеїн не має антинеопластичної активності, однак він відповідає за уротоксичну побічну дію; обговорюється його імуносупресивна дія; не можна виключати перехресну резистентність, особливо із цитостатиками подібної структури, такими як, іфосфамід та з іншими алкілюючими речовинами.

Показання для застосування ЛЗ: пор. д/р-ну д/ін'єк: хіміотерапія перерахованих нижче пухлин у комбінації з іншими антинеопластичними засобами^{БНФ}; індукція ремісії і консолідуюча терапія при г. лімфобластному лейкозі^{ВООЗ, БНФ}; індукція ремісії при хворобі Ходжкіна; неходжкінські лімфоми^{ВООЗ, БНФ} (залежно від гістологічного типу і від стадії захворювання також у вигляді монотерапії); хр. лімфоцитарний лейкоз^{БНФ} після відсутності ефективності стандартної терапії; індукція ремісії при плазмоцитомі (також у комбінації з преднізолоном); ад'ювантна терапія раку молочної залози^{ВООЗ} після резекції пухлини або мастектомії; паліативна терапія поширеного раку молочної залози; поширений рак яєчників^{ВООЗ}; дрібноклітинний рак легенів; саркома Юінга^{БНФ}; нейробластома^{ВООЗ,БНФ}; рабдоміосаркома у дітей^{БНФ}; остеосаркома; підготовка перед аlogenною трансплантацією кісткового мозку^{БНФ} при:

тяжких апластичних анеміях у вигляді монотерапії або у комбінації з антитромбоцитарним глобуліном; г. мієлоїдному і г. лімфоцитарному лейкозі у комбінації з опроміненням усього тіла або бусульфаном; хр. мієлоїдному лейкозі у комбінації з опроміненням усього тіла або бусульфаном; прогресуючі аутоімунні захворювання: тяжкі прогресуючі форми люпус-нефриту^{БНФ} і гранулематозу Вегенера; табл.: у рамках режиму комбінованої хіміотерапії з іншими антинеопластичними лікарськими засобами: ад'ювантна терапія з приводу раку молочної залози після резекції пухлини або мастектомії; паліативна терапія з приводу метастатичного раку молочної залози; аутоімунні захворювання з небезпечним для життя прогресуванням, а саме тяжкі прогресуючі форми вовчакового нефриту та гранулематозу Вегенера.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в інфузія; індукція ремісії і консолідаційна терапія при г. лімфоцитарному лейкозі: застосовувати дітям і дорослим залежно від різних груп ризику у рамках різних комплексів поліхіміотерапії; типове дозування у дорослих - 650 мг/м² площі поверхні тіла (ППТ) у комбінації з цитарабіном і меркаптопурином; хр. лімфоцитарний лейкоз: 600 мг/м² ППТ у день 6-й у комбінації з вінкристином і преднізоном або 400 мг/м² ППТ у дні 1-й та 5-й, також у комбінації з вінкристином і преднізоном, повторювати кожні 3 тижні; хвороба Ходжкіна: 650 мг/м² ППТ у дні 1-й та 8-й у комбінації з вінкристином, прокарбазином і преднізоном («СОРР-протокол»); неходжкінські лімфоми (НХЛ): залежно від гістологічного типу і стадії захворювання у вигляді монотерапії або у комбінації з іншими антинеопластичними ЛЗ; НХЛ з низьким ступенем малігнізації: 600-900 мг/м² ППТ у день 1-й у вигляді монотерапії або у комбінації з кортикостероїдами; повторювати кожні 3-4 тижні; НХЛ з середнім чи високим ступенем малігнізації: 750 мг/м² ППТ у день 1-й у комбінації з доксорубіцином, вінкристином і преднізоном («СНОР-протокол»); повторювати кожні 3-4 тижні; плазмоцитома: 1000 мг/м² ППТ у день 1-й у комбінації з преднізоном; повторювати кожні 3 тижні; поліхіміотерапія, ефективність якої доведена для лікування плазмоцитоми - «VBMCP-протокол»: 400 мг/м² ППТ у день 1-й у комбінації з мелфаланом, кармустином, вінкристином і преднізоном; повторювати кожні 5 тижнів; рак молочної залози: ад'ювантна і паліативна терапія раку молочної залози у комбінації з іншими цитостатиками: 2 протоколи, ефективність яких доведена: «CMF-протокол»: 600 мг/м² ППТ у дні 1-й та 8-й у комбінації з метотрексатом і 5-фторурацилом; повторювати кожні 3-4 тижні; «CAF-протокол»: 500 мг/м² ППТ у день 1-й у комбінації з доксорубіцином і 5-фторурацилом; повторювати кожні 3-4 тижні; поширений рак яєчників: 750 мг/м² ППТ у день 1-й у комбінації з цисплатином; повторювати кожні 3 тижні; 500-600 мг/м² ППТ у день 1-й у комбінації з карбоплатином; повторювати кожні 4 тижні; дрібноклітинний рак легенів: у комбінації з іншими антинеопластичними ЛЗ: «CAV-протокол»: 1000 мг/м² ППТ у день 1-й у комбінації з доксорубіцином і вінкристином; повторювати кожні 3 тижні; саркома Юїнга: поліхіміотерапія, ефективність якої при саркомі Юїнга доведена, є «VACA-протокол»: 500 мг/м² ППТ 1 р/тиждень у комбінації з вінкристином, доксорубіцином та актиноміцином D; остеосаркома: у рамках комплексної поліхіміотерапії для неoad'ювантної (передопераційної) та ад'ювантної (післяопераційної) терапії; протокол Мультиінституціонального дослідження остеосаркоми (MIOS) як приклад ад'ювантної терапії: 600 мг/м² ППТ на добу у день 2-й, 13-й, 26-й, 39-й і 42-й тижні лікування у комбінації з блеоміцином, актиноміцином D, доксорубіцином, цисплатином і метотрексатом; нейробластома: залежно від стадії захворювання і віку пацієнта застосовувати у рамках різних хіміотерапевтичних протоколів: «OPES-протокол»: 600 мг/м² ППТ у день 1-й у комбінації з вінкристином, цисплатином і теніпозидом; повторювати кожні 3 тижні; рабдоміосаркома у дітей: залежно від стадії захворювання і гістологічного типу у різних протоколах комплексної поліхіміотерапії; типове дозування для пацієнтів на III стадії (після операції наявний макроскопічний залишок пухлини) і IV (віддалені метастази) - 10 мг/кг маси тіла протягом 3-х послідовних днів з багаторазовим повторенням у комбінації з вінкристином та актиноміцином D («VAC-протокол»); підготовка перед аlogenною трансплантацією кісткового мозку при г. мієлоїдному і г. лімфобластному лейкозах: 60 мг/кг маси тіла на добу 2 дні поспіль у комбінації з опроміненням усього тіла чи бусульфаном; підготовка перед аlogenною трансплантацією кісткового мозку при хр. мієлоїдному лейкозі: 60 мг/кг маси тіла на добу 2 дні поспіль у комбінації з опроміненням усього тіла чи бусульфаном; підготовка перед аlogenною трансплантацією кісткового мозку при тяжкій апластичній анемії: для підготовки без опромінення усього тіла, від якого зазвичай відмовляються при тяжкій апластичній анемії: 50 мг/кг маси тіла на добу 4 дні поспіль у вигляді монотерапії або у комбінації з антитимоцитарним глобуліном; при наявності анемії Фанконі добову дозу зменшити з 50 до 35 мг/кг маси тіла на добу 4 дні поспіль; тяжкі прогресуючі форми люпус-нефриту, гранулематозу Вегенера: при в/в введенні початкова доза 500-1000 мг/м² ППТ; табл.: ад'ювантна терапія з приводу раку молочної залози, паліативна терапія з приводу метастатичного раку молочної залози: «Типовий» протокол CMF: 100 мг/м² ППТ у дні 1-14 циклі терапії у комбінації з метотрексатом та 5-фторурацилом; цикл повторювати кожні 4 тижні; тяжкі прогресуючі форми вовчакового нефриту та гранулематозу Вегенера: 1-2 мг/кг MT (2 мг/кг при гранулематозі Вегенера) щоденно; для p/os пульс-терапії застосовувати такі ж з дозування, що й для відповідного в/в застосування (спочатку 500-1000 мг/м² ППТ).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: підвищений ризик і тяжкість пневмоній (включаючи летальні наслідки), бактеріальні, грибові, вірусні, протозойні, паразитарні інфекції, реактивація латентних інфекцій, включаючи вірусний гепатит, туберкульоз, вірус Джона Канінгема із прогресивною багатовогнищевою лейкоенцефалопатією (летальні наслідки), Pneumocystis jirovecii, оперізуючий лишай, Strongyloides, сепсис, септичний шок (летальні наслідки); г. лейкоз, г. промієлоцитарний лейкоз; мієлодиспластичний с-м; лімфома (неходжкінська лімфома); саркоми; нирково-клітинна карцинома; рак ниркової миски; рак сечового міхура; рак сечовивідних шляхів; рак щитовидної залози; вторинні злоякісні новоутворення, пов'язані з лікуванням; канцерогенний ефект у потомства; с-м лізису пухлини; розвиток основних злоякісних утворень; мієлосупресія, панцитопенія, нейтропенія, агранулоцитоз, гранулоцитопенія, тромбоцитопенія (ускладнена кровотечею), лейкопенія, анемія, нейтропенічна гарячка, лімфопенія, гемолітичний уремічний с-м (з тромботичною мікроангіопатією), с-м дисемінованої внутрішньосудинної коагуляції, зниження рівня гемоглобіну; імуносупресія, анафілактичний шок, анафілактичні/анафілактоїдні р-ції (летальні наслідки), р-ції гіперчутливості; водна інтоксикація, с-м неадекватної секреції антидіуретичного гормону; гіонатріємія, затримка води, анорексія, підвищення/зниження рівня глюкози крові; сплутаність свідомості; енцефалопатія, судоми, запаморочення, с-м задньої зворотної лейкоенцефалопатії, мієлопатія, периферична нейропатія, полінейропатія, невралгія, дизестезія, гіпестезія, парестезія, тремор, порушення смакових відчуттів, гіпогевзія, паросмія; нечітке бачення, порушення зору, кон'юнктивіт, підвищена сльозотеча; глухота, погіршення слуху, шум у вухах; зупинка серця, шлуночкова фібриляція, шлуночкова тахікардія, кардіогенний шок, ексудативний перикардит (що прогресує до

блокади серця), міокардіальна кровотеча, ІМ, застійна СН, СН (летальні наслідки), лівошлуночкова недостатність, лівошлуночкова дисфункція, кардіоміопатія, міокардит, перикардит, кардит, фібриляція передсердь, надшлуночкова аритмія, шлуночкова аритмія, брадикардія, тахікардія, прискорене серцебиття, подовження QT-інтервалу на ЕКГ, зменшення фракції викиду; легенева емболія, венозний тромбоз, васкуліт, периферична ішемія, АГ припливи, гарячі припливи, зниження АТ; пневмоніт, інтерстиціальна пневмонія, легенева венооклюзійна хвороба, с-м г. ДН, інтерстиціальна хвороба легень у вигляді легеневого фіброзу, ДН (летальні наслідки), облітеруючий бронхіоліт, організуюча пневмонія, алергійний альвеоліт, респіраторний дистрес-с-м, легенева гіпертензія, набряк легенів, плевральний випіт, бронхоспазм, диспное, гіпоксія, кашель, закладеність носа, дискомфорт у носі, ротоглотковий біль, ринорея, чхання; геморагічний ентероколіт, шлунково-кишкова кровотеча, г. панкреатит, коліт, ентерит, тифліт, утворення виразок на слизовій оболонці, стоматит, діарея, нудота, блювання, запор, абдомінальний біль, абдомінальний дискомфорт; венооклюзійна хвороба печінки, холестатичний гепатит, цитолітичний гепатит, гепатит, холестаза, гепатотоксичність із печінковою недостатністю, печінкова енцефалопатія, асцит, гепатомегалія, жовтяниця, підвищення рівня білірубіну у крові, розлади ф-ції печінки, підвищення рівня ферментів печінки (АСТ, АЛТ, лужної фосфатази крові, гамма-глутамілтрансферази); токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона, мультиформна еритема, долонно-підшовна еритродизестезія, дерматит опроміненої ділянки, еритема у ділянці опромінення, токсичні висипання на шкірі, кропив'янка, дерматит, висипи, пухирі, свербіж, еритема, знебарвлення шкіри та нігтів, ураження нігтів, алопеція, набрякання обличчя, гіпергідроз; г. некроз скелетних м'язів, склеродермія, м'язові спазми, міалгія, артралгія; ниркова недостатність, некроз ниркових канальців, розлади ниркових канальців, порушення ф-ції нирок, токсична нефропатія, геморагічний цистит, геморагічний уретрит, некроз сечового міхура, виразковий цистит, субуретральна кровотеча, набряк стінки сечового міхура, інтерстиційне запалення сечового міхура, фіброз і контрактура сечового міхура, гематурія, нефрогенний нецукровий діабет, цистит, атипів епітеліальні клітини сечового міхура, підвищення рівня креатиніну, азоту сечовини крові, підвищення рівня сечової кислоти; безпліддя, недостатність та розлади ф-ції яєчників, розлади овуляції, аменорея, олігоменорея, атрофія яєчків, азооспермія, олігоспермія, зниження рівня естрогену у крові, підвищення рівня гонадотропіну у крові; внутрішньоутробна загибель плода, вади розвитку плода, затримка розвитку плода, ембріональна токсичність (міелосупресія, гастроентерит); поліорганна недостатність, погіршення загального фізичного стану, гриппоподібне захворювання, гарячка, набряк, біль у грудях, мукозит, астенічні стани, озноб, слабкість, головний біль, р-ції у місці ін'єкції/інфузії, інший біль, запалення привушної залози; зростання рівня ЛДГ, зростання рівня СРБ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: відома гіперчутливість до циклофосфаміду або до інших компонентів препарату; тяжкі порушення ф-ції кісткового мозку (міелосупресія, особливо у пацієнтів, які перед тим проходили лікування цитотоксичними ЛЗ та/або радіотерапією); запаленням сечового міхура (цистит), непрохідність сечовидільних шляхів; активні інфекції; вагітність, годування груддю.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕНДОКСАН®	Бакстер Онколоджи ГмбХ (випуск серії)/Грасфарма, С.Л.(виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка)/Гаупт Фарма Амарег ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка), Німеччина/Іспанія/Німеччина	табл., вкриті ц/о у бл.	50мг	№10x5	1129,09	25,09/\$
	ЕНДОКСАН® 1 г	Бакстер Онколоджи ГмбХ, Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1г	№1	987,14	27,89/\$
	ЕНДОКСАН® 200 мг	Бакстер Онколоджи ГмбХ, Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	200мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕНДОКСАН® 200 мг	Бакстер Онколоджи ГмбХ, Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	200мг	№10	2342,36	27,89/\$
	ЕНДОКСАН® 500 мг	Бакстер Онколоджи ГмбХ, Німеччина	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	500мг	№1	495,24	27,89/\$
	ЦИКЛОФОСФАМІД САНДОЗ®	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг.КГ (вторинна упаковка, контроль та випуск серії)/Джянгсу Хенгруї Медіцин Ко., Лтд. (виробництво нерозфасованої продукції, первинна	пор. д/р-ну д/ін'єк. або інфуз. у фл.	500мг	№1, №2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

		упаковка)/Умфорана Лабор фюр Аналітік унд Ауфтрагсфоршунг ГмБХ&Ко.КГ (контроль серії)/Лабор ЛС С, Австрія/Китай/Німеччина/Ні меччина			
--	--	--	--	--	--

● **Бендамустин (Bendamustine) ***

Фармакотерапевтична група: L01AA09 - Протипухлинний препарат, алкілююча сполука.

Основна фармакотерапевтична дія: протипухлинний препарат з біфункціональною алкілюючою активністю; антинеопластичний та цитотоксичний ефект пов'язаний з утворенням перехресних зшивок молекул одноланцюгової і дволанцюгової ДНК внаслідок алкілювання, в результаті цього порушується матрична функція ДНК та її синтез; володіє додатковими антиметаболічними властивостями (ефектом пуринового аналога); не демонструє або демонструє незначною мірою перехресну резистентність в людських пухлинних клітинних лініях з різними механізмами стійкості, це частково пояснюється взаємодією з ДНК, яке, порівняно з іншими алкілюючими засобами, триває довше (була виявлена тільки часткова перехресна резистентність з іншими алкілюючими ЛЗ, такими як циклофосфамід, кармустин або цисплатин); не існує повної перехресної резистентності з антрациклінами або алкілатами; профіль активності проявлявся в клітинах пухлини людини та відрізнявся від такого у інших алкілюючих засобів.

Показання для застосування ЛЗ: терапія першої лінії хр. лімфоцитарної лейкоїї^{БНФ} (стадія В та С за класифікацією Binet), коли не прийнятна комбінована терапія з флударабіном; монотерапія індолентних неходжкінських лімфом^{БНФ} при прогресуванні хвороби під час або через 6 міс. після лікування ритуксимабом чи терапії, що містила ритуксимаб; терапія першої лінії у комбінації з преднізоном множинної мієломи^{БНФ} (за класифікацією Дьюрі-Сальмона II стадія з прогресуванням або III стадія) у пацієнтів віком понад 65 років, для яких неприйнятна трансплантація стовбурових клітин і в яких наявна клінічна нейропатія на момент встановлення діагнозу, коли не прийнятне застосування талідоміду чи бортезоміду.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в введення протягом 30-60 хв.; монотерапія хронічної лімфоцитарної лейкоїї: 100 мг/м² в 1-й і на 2-й день курсу, курс повторюють кожні 4 тижні; монотерапія індолентних неходжкінських лімфом, рефрактерних до ритуксимабу: 120 мг/м² в 1-й і на 2-й день курсу, курс повторюють кожні 3 тижні; множинна мієлома: 120-150 мг/м² в 1-й і на 2-й день курсу, в дозі 60 мг/м² щодня з 1-го по 4-й день курсу з преднізолоном в/в або p/os, курс повторюють кожні 4 тижні; лікування необхідно припинити, якщо в периферичній крові кількість лейкоцитів <3x10⁹/л і/або кількість тромбоцитів <75 x10⁹/л; лікування можна продовжити при підвищенні кількості лейкоцитів до > 4x10⁹/л та тромбоцитів >100 x10⁹/л.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гематологічні (лейкопенія, тромбоцитопенія), шкірна токсичність (алергічні реакції), конституційні симптоми (гарячка), шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання); інфекція, включаючи опортуністичні інфекції (наприклад герпес оперізувальний, цитомегаловірус, гепатит В), пневмоцистна пневмонія, сепсис, первинна атипова пневмонія; синдром лізису пухлини, мієлодиспластичний синдром, г. мієлоїдна лейкоїя; анафілактична реакція, анафілактичний шок, анафілактоїдна реакція, реакції гіперчутливості; головний біль, безсоння, запаморочення, сонливість, афонія, порушення смаку, парестезія, периферична сенсорна нейропатія, антихолінергічний синдром, неврологічні розлади, атаксія, енцефаліт; серцеві функціональні розлади, такі як серцебиття, стенокардія, аритмія, випіт у порожнину перикарда, ІМ, СН, тахікардія, миготлива аритмія; гіпотензія, гіпертензія, г. циркулярна (судинна) недостатність, флебіт, легенева дисфункція, фіброз легенів, нудота, блювання, діарея, запор, стоматит, геморагічний езофагіт, шлунково-кишкова кровотеча; еритема, дерматит, свербіж, макулопапульозний висип, гіпергідроз, с-м Стівенса-Джонсона, р-ція на ЛЗ з еозинофілією та системними симптомами (DRESS синдром); токсичний епідермальний некроліз; аменорея, безпліддя; печінкова недостатність, запалення слизових оболонок, слабкість, пірексія, біль, гарячка, дегідратація, анорексія, поліорганна недостатність; зменшення гемоглобіну, підвищення креатиніну та сечовини, підвищення рівня АСТ/АЛТ, ЛФ, рівня білірубину, гіпокаліємія; ниркова недостатність, кропив'янка, с-м лізису пухлини та анафілаксію.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до бендамустину гідрохлориду і/або манітолу; період годування груддю; тяжка печінкова недостатність (рівень білірубину >3,0 мг/дл); жовтяниця; тяжке пригнічення кісткового мозку і виражені зміни кількості формених елементів у крові (зменшення кількості лейкоцитів до <3 x10⁹/л і/або тромбоцитів <75 x10⁹/л); хірургічне втручання менш ніж за 30 днів до початку лікування; інфекції, особливо ті, які супроводжуються лейкопенією; період вакцинації проти жовтої лихоманки.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БЕМУСТІН	Панацея Біотек Лтд., Індія	ліоф. пор. д/ін'єк. у фл.	100мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БЕНДАМУСВІСТА	Сінтон с.р.о. (відповідальний за випуск серії)/Сінтон Хіспанія, С.Л. (дільниця, що відповідає за пакування, контроль якості, випуск серії)/Джі І Фармасьютікалс, Лтд (вторинне	пор. п/приг. конц. д/приг. р-ну д/інфуз. у фл.	25мг	№1	1550,00	33,97/€

	пакування)/онкомед меньюфекчерінг а.с. (виробництво, пакування), Чеська Республіка/Іспанія/Болгарі я/Чеська Республіка					
БЕНДАМУСВІСТА	Сінтон с.р.о. (відповідальний за випуск серії)/Сінтон Хіспанія, С.Л. (дільниця, що відповідає за пакування, контроль якості, випуск серії)/Джі І Фармасьютікалс, Лтд (вторинне пакування)/онкомед меньюфекчерінг а.с. (виробництво, пакування), Чеська Республіка/Іспанія/Болгарі я/Чеська Республіка	пор. п/приг. конц. д/приг. р- ну д/інфуз. у фл.	100мг	№1	5850,00	33,97/€
БЕНДАМУСТИН - ВІСТА	Сіндан Фарма С.Р.Л., Румунія	пор. п/приг. конц. д/приг. р- ну д/інфуз. у фл. по 25мг	2,5 мг/мл	№1	1550,00	32,21/€
БЕНДАМУСТИН - ВІСТА	Сіндан Фарма С.Р.Л., Румунія	пор. п/приг. конц. д/приг. р- ну д/інфуз. у фл. по 100мг	2,5 мг/мл	№1	5850,00	32,21/€
БЕНТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	25мг, 100мг	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
БЕНТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	25мг	№1	2200,00	26,34/\$
БЕНТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	100мг	№1	6800,00	26,34/\$
РИБОМУСТИН	Сенексі-Лаборатор Тиссен С.А. (виробник готової лікарської форм (всі стадії виробництва, вторинна упаковка))/Онкотек Фарма Продукціон ГмбХ (виробник готової лікарської форм (всі стадії виробництва, вторинна упаковка))/Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ (вто, Бельгія/Німеччина/Німеччи на	пор. п/приг. конц. д/приг. р- ну д/інфуз. у фл.	25мг, 55мг, 100мг, 220мг	№1, №5, №10, №20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИБОМУСТИН	Сенексі-Лаборатор Тиссен С.А. (виробник готової лікарської форм (всі стадії виробництва, вторинна упаковка))/Онкотек Фарма Продукціон ГмбХ (виробник готової лікарської форм (всі стадії виробництва, вторинна упаковка))/Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ (вто, Бельгія/Німеччина/Німеччи на	пор. п/приг. конц. д/приг. р- ну д/інфуз. у фл.	25мг	№1	4091,53	29,20/€
РИБОМУСТИН	Сенексі-Лаборатор Тиссен С.А. (виробник готової лікарської форм (всі стадії виробництва, вторинна упаковка))/Онкотек Фарма	пор. п/приг. конц. д/приг. р- ну д/інфуз. у фл.	100мг	№1	15058,91	29,20/€

		Продукціон ГмбХ (виробник готової лікарської форм (всі стадії виробництва, вторинна упаковка))/Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ (вто, Бельгія/Німеччина/Німеччи на					
--	--	--	--	--	--	--	--

19.1.2. Антиметаболіти

Антиметаболіти (антагоністи природних метаболітів) включаються до складу молекул нуклеїнових кислот, які заново синтезуються в ядрі, або ж необоротно взаємодіють з життєво важливими ферментами клітин, порушуючи нормальне ділення клітин.

- **Гемцитабін (Gemcitabine) ***

Фармакотерапевтична група: L01BC05 - Антинеопластичні засоби. Антиметаболіти. Структурні аналоги піримідину.

Основна фармакотерапевтична дія: проявляє значну цитотоксичну дію на різні види людських клітин раку та культивовані мишачі клітини раку; має клітинно-фазову специфічність, знищуючи клітини, що проходять фазу синтезу ДНК (S-фаза), за певних умов блокує проходження клітин через межу фази G1/S; є піримідиновим антиметаболітом, метаболізується внутрішньоклітинно під впливом нуклеозидкінази до активних дифосфатних (dFdCDP) і трифосфатних (dFdCTP) нуклеозидів; цитотоксична дія гемцитабіну зумовлена інгібуванням синтезу ДНК двома активними метаболітами-дифосфатним і трифосфатним нуклеозидами; дифосфатний нуклеозид інгібує рибонуклеотидредуктазу, яка каталізує р-ції, внаслідок чого утворюються дезоксинуклеозидтрифосфати (dCTP) для синтезу ДНК, що спричиняє зменшення концентрації дезоксинуклеозидів узагалі і особливо концентрації dCTP; dFdCTP конкурують з dCTP при побудові ДНК; зменшення внутрішньоклітинної концентрації dCTP посилює приєднання трифосфатних нуклеозидів до ланцюга ДНК; іпсилон ДНК-полімерази неспроможні усунути гемцитабін і відновлювати ланцюги ДНК, що синтезуються; після приєднання внутрішньоклітинних метаболітів гемцитабіну до ланцюгів ДНК, які синтезуються, долучається один додатковий нуклеотид, що призводить до повного інгібування подальшого синтезу ДНК (приховане закінчення ланцюга) і запрограмованої загибелі клітини, відомої як апоптоз.

Показання для застосування ЛЗ: рак жовчних проток; локально рецидивуючий чи метастатичний рак сечового міхура у комбінації з цисплатином^{БНФ}; неоперабельний, локально рецидивуючий чи метастатичний рак молочної залози після попередньої ад'ювантної/неoad'ювантної хіміотерапії у комбінації з паклітакселом^{БНФ}, перед хіміотерапією призначається антрациклін, якщо немає протипоказань; локально прогресуючий чи метастатичний недрібноклітинний рак легень у комбінації з цисплатином як препарат першої лінії лікування, а для лікування пацієнтів літнього віку та пацієнтів із другим функціональним статусом як монотерапія^{БНФ}; локально прогресуюча чи метастатична епітеліальна карцинома яєчників у комбінації з карбоплатином; рецидив епітеліальної карциноми яєчників після періоду ремісії, що становив не менше 6 місяців, після попередньої терапії у першій лінії препаратами платини^{БНФ}; локально прогресуюча чи метастатична аденокарцинома підшлункової залози^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосування у дорослих: рак сечового міхура: комбіноване застосування - рекомендована доза - 1000 мг/м², вводити шляхом в/в 30-хв. інфузії у 1-й, 8-й і 15-й дні кожного 28-денного циклу у комбінації з цисплатином, що дається рекомендованою дозою 70 мг/м² у 1-й день після гемцитабіну або в 2-й день кожного 28-денного циклу; потім цей 4-тижневий цикл повторюється; рак підшлункової залози - рекомендована доза 1000 мг/м², в/в вливання впродовж 30 хв. 1 р/тиждень впродовж 7 тижнів, після чого - тижнева перерва; наступні цикли складаються зі щотижневих інфузій впродовж 3 тижнів поспіль з перервою кожного 4-го тижня; рак легенів недрібноклітинний: монотерапія - рекомендована доза - 1000 мг/м² вводити шляхом 30-хв. в/в інфузії 1 р/тиждень впродовж 3 тижнів, після чого робиться однотижнева перерва; чотири тижневий цикл повторюється; комбіноване застосування - рекомендована доза - 1250 мг/м² поверхні тіла, в/в інфузія впродовж 30 хв. у 1-й та 8-й дні кожного 21-денного циклу; цисплатин вводити рекомендованою дозою 75-100 мг/м² 1 р/3 тижні циклу; рак молочної залози: комбіноване застосування - паклітаксел (175 мг/м²) вводити у 1-й день впродовж 3-год. в/в інфузії, після нього вводити гемцитабін (1250 мг/м²) впродовж 30-хв. в/в інфузії у 1-й і 8-й дні кожного 21-денного циклу; рак яєчників: комбіноване застосування - рекомендовано вводити гемцитабін 1000 мг/м² шляхом 30-хв. в/в вливання у 1-й та 8-й дні 21-денного циклу; у 1-й день циклу після гемцитабіну вводити карбоплатин у дозі, що забезпечує AUC 4 мг/мл/хв; рак жовчних проток: монотерапія - рекомендована доза - 1000 мг/м², в/в впродовж 30 хв.; інфузію проводити 1 р/тиждень 3 тижні поспіль, потім 1 тиждень перерва; цей 4-тижневий цикл повторювати, комбіноване застосування - цисплатин 70 мг/м² у 1-й день циклу шляхом в/в інфузії, далі вводити гемцитабін у дозі 1250 мг/м², в 1-й та 8-й дні кожного 21-денного циклу шляхом 30-хв. в/в інфузії; цей 3-тижневий цикл повторювати; перед кожним введенням перевіряти кількість тромбоцитів, лейкоцитів і гранулоцитів, абсолютна кількість гранулоцитів перед початком циклу повинна становити не менше 1500(x10⁶/л), а тромбоцитів - 100000 (x10⁶/л).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота, блювання, підвищення рівня печінкових трансаміназ (АлАт, АсАт), лужної фосфатази, протеїнурія і гематурія (приблизно у 50 % пацієнтів); ядуха (у 10-40 % пацієнтів, найчастіше у хворих на рак легенів); алергічні шкірні реакції (приблизно у 25 % пацієнтів, зі свербжею - у 10 % пацієнтів); лейкопенія (нейтропенія III ступеня у 19,3 % хворих; IV ступеня - у 6 % хворих), тромбоцитопенія, анемія, фебрильна нейтропенія; тромбоцитоз; анафілактичні р-ції; анорексія; головний біль, безсоння, сонливість; порушення мозкового кровообігу, с-м зворотної задньої енцефалопатії; аритмії (переважно суправентрикулярні аритмії), СН, ІМ; артеріальна гіпотензія, набряки, клінічні ознаки периферичних васкулітів та гангрени; с-м підвищеної проникності капілярів; кашель, риніт, інтерстиціальний пневмоніт, бронхоспазм (зазвичай транзиторний і легкого ступеня, проте в окремих випадках може бути необхідна парентеральна терапія), набряк легенів, г. респіраторний дистрес-синдром у дорослих; блювання, нудота, діарея, стоматит і виразки ротової порожнини, запор, ішемічний коліт; підвищення рівня білірубіну; серйозні явища гепатотоксичності, включаючи

печінкову недостатність та летальні випадки, підвищення активності гамма-глутамілтрансферази (ГГТ); алергічні шкірні висипання, часто зі свербіжем, алопеція, шкірний свербіж, посилене потовиділення, тяжкі шкірні реакції, включаючи десквамацію і бульозні висипання, виразки на шкірі, утворення везикул і уражень шкіри, лущення шкіри, токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона; біль у спині, міалгія; гематурія, протеїнурія легкого ступеня, ниркова недостатність, гемолітико-уремічний с-м; грипоподібні симптоми (найчастіше спостерігаються підвищення t° тіла, головний біль, озноб, міалгія, астенія та анорексія; також повідомлялося про кашель, риніт, нездужання, підвищене потовиділення і порушення сну); набряк/периферичний набряк, включаючи набряк обличчя (у більшості випадків набряки регресують після припинення лікування); підвищення температури тіла, астенія, озноб; р-ції у місці введення (переважно легкого ступеня).

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин; період годування груддю, дитячий вік.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ГЕМЦИТАБІН-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	200мг, 1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	ВІЗГЕМ	Венус Ремедіс Лімітед, Індія	ліоф. д/р-ну д/інфуз.у фл.	200мг, 1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ГЕМАТІКС	"Венус Ремедіс Лімітед", Індія	ліоф. д/р-ну д/інфуз.у фл.	200мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ГЕМІТА	Фрезеніус Кабі Онкологджи Лімітед, Індія	ліоф. д/р-ну д/інфуз.у фл.	200мг, 1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ГЕМТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	ліоф. д/р-ну д/інфуз.у фл.	1г	№1	1897,10	21,22/\$
	ГЕМТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	ліоф. д/р-ну д/інфуз.у фл.	200мг	№1	497,72	21,22/\$
	ГЕМЦИБІН	Сіндан Фарма СРЛ/Актавіс Італія С.п.А., Румунія/Італія	ліоф. д/р-ну д/інфуз.у фл.	200мг	№1	256,39	27,79/\$
	ГЕМЦИБІН	Сіндан Фарма СРЛ/Актавіс Італія С.п.А., Румунія/Італія	ліоф. д/р-ну д/інфуз.у фл.	1000мг	№1	850,00	27,79/\$
	ГЕМЦИБІН	Актавіс Італія С.п.А., Італія	ліоф. д/р-ну д/інфуз.у фл.	2000мг	№1	1530,00	27,79/\$
	ГЕМЦИМЕДА	Актавіс Італі С.п.А., Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 25мл у фл.	40 мг/мл	№1	2363,70	28,89/€
	ГЕМЦИМЕДА	Актавіс Італі С.п.А., Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мг у фл.	40 мг/мл	№1	611,94	28,89/€
	ГЕМЦИТАБІН	РУП "Белмедпрепарати", Республіка Білорусь	ліоф. д/р-ну д/інфуз.у фл.	1000мг	№1	639,15	27,01/\$
	ГЕМЦИТАБІН "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрія	конц. д/р-ну д/інфуз. у фл. по 50мл	40 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ГЕМЦИТАБІН "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрія	конц. д/р-ну д/інфуз. у фл. по 25мл	40 мг/мл	№1	1011,84	23,97/\$
ГЕМЦИТАБІН "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрія	конц. д/р-ну д/інфуз. у фл. по 5мл	40 мг/мл	№1	230,90	23,97/\$	
ГЕМЦИТАБІН АККОРД	Інтас Фармасьютікалс Лімітед (виробництво, контроль якості, первинне та вторинне пакування)/Аккорд Хелскеа Лімітед (вторинне пакування, відповідальний випуск серії), Індія/Велика Британія	конц. д/р-ну д/інфуз. у фл. по 2мл, 10мл, 15мл,20мл	100 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ГЕМЦИТАБІН АМАКСА	АкВіда ГмбХ (сертифікація та випуск серії; вторинне	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	1000мг	№1	1588,78	28,79/€	

	пакування)/Актавіс Італія С.п.А. (виробництво in bulk, первинне пакування, контроль серії)/Венус Фарма ГмбХ (вторинне пакування), Німеччина/Італія/Німеччина					
ГЕМЦИТАБІН АМАКСА	АкВіда ГмбХ (сертифікація та випуск серії; вторинне пакування)/Актавіс Італія С.п.А. (виробництво in bulk, первинне пакування, контроль серії)/Венус Фарма ГмбХ (вторинне пакування), Німеччина/Італія/Німеччина	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	200мг	№1	373,83	28,79/€
ГЕМЦИТАБІН МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Спеціальпрепарате мбХ (виробник, що відповідає за вторинне пакування, нанесення захисної плівки на флакон (необов'язкове) та за випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробник, що відповідає за виробництво готової лікарськ, Німеччина/Німеччина/Німеччина	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	200мг	№1	308,46	27,54/€
ГЕМЦИТАБІН МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Спеціальпрепарате мбХ (виробник, що відповідає за вторинне пакування, нанесення захисної плівки на флакон (необов'язкове) та за випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробник, що відповідає за виробництво готової лікарськ, Німеччина/Німеччина/Німеччина	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	1000мг	№1	1349,53	27,54/€
ГЕМЦИТАБІН МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Спеціальпрепарате мбХ (виробник, що відповідає за вторинне пакування, нанесення захисної плівки на флакон (необов'язкове) та за випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробник, що відповідає за виробництво готової лікарськ, Німеччина/Німеччина/Німеччина	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	1500мг	№1	2120,69	27,54/€
ГЕМЦИТАБІН-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А., Італія	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	200мг	№1	500,00	27,67/€
ГЕМЦИТАБІН-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А., Італія	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	1000мг	№1	1700,00	27,67/€
ГЕМЦИТАБІН-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А., Італія	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	2000мг	№1	3000,00	27,67/€
СТРИГЕМ	МАЙЛАН ЛАБОРАТОРІЗ ЛІМІТЕД (OTL), Індія	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	200мг, 1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦИТАФІН	Емкур Фармасьютікалс	пор. д/р-ну	1000мг	№1	відсутня у реєстрі	

	Лтд, Індія	д/інфуз. у фл.			ОВЦ
ЦИТОГЕМ®	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	200мг, 1г	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ

- **Гідроксикарбамід (Hydroxycarbamide) *** (див. п. 13.2. розділу "ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: L01XX05 - Інші антинеопластичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: протипухлинний препарат, точний механізм протирадикальної дії препарату не з'ясований, але вважається, що вона пов'язана з пригніченням синтезу ДНК; володіє генотоксичністю і є імовірним міжвидовим канцерогеном, що означає канцерогенний ризик для людини

Показання для застосування ЛЗ: лікування пацієнтів, хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію (ХМЛ) БНФ : як фаза лікування до ІТК (інгібітори тирозинкінази) до підтвердження злиття BCR-ABL з негайною потребою у терапії через високий вміст лейкоцитів і тромбоцитів; як паліативна допомога пацієнтам у бластній фазі з лейкоцитозом та тромбоцитозом. Лікування раку шийки матки у комбінації із променевою терапією.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: капс. ковтати цілими, не розжовуючи; усі схеми дозування препарату мають ґрунтуватися на фактичній або ідеальній масі тіла хворого (залежно від того, яка з них є меншою); лікування слід починати за 7 днів до початку терапії опроміненням; якщо рівень лейкоцитів падає нижче $2,5 \times 10^9$ /л або ж кількість тромбоцитів менше 100×10^9 /л, терапію припинити до встановлення нормальних показників крові; достатній період для досягнення антинеопластичного ефекту - 6 тижнів; якщо відзначається прогресування захворювання, застосування препарату потрібно негайно припинити, якщо спостерігається відповідний терапевтичний ефект, лікування продовжують на необмежений термін; безперервний режим підходить для лікування хронічного мієлоїдного лейкозу - слід призначати у дозі 20-30 мг/кг маси тіла на добу; переривчастий режим є більш задовільним для лікування раку шийки матки - слід призначати разово у дозі 80 мг/кг кожні 3 дні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: рак шкіри, пригнічення кісткового мозку, зменшення кількості CD4 лімфоцитів, лейкопенія, тромбоцитопенія, зменшення к-ті тромбоцитів, анемія, анорексія, гаїюцинація, дезорієнтація, судоми, запаморочення, периферична нейропатія, сонливість, головний біль, фіброз легень, набряк легень, дифузна легенева інфільтрація, інтерстиціальна хвороба легень, пневмоніт, альвеоліт, алергічний альвеоліт, кашель, панкреатит, нудота, блювання, діарея, стоматит, запор, мукозит, дискомфорт у шлунку, диспепсія, біль у шлунку, мелена, гепатотоксичність, підвищення рівня печінкових ферментів, холестаза, гепатит, шкірний васкуліт, дерматоміозит, алопеція, макулопапульозні висипання, папульозні висипання, відшаровування шкіри, атрофія шкіри, шкірні виразки, еритема, гіперпігментація шкіри, атрофія нігтів, системний і шкірний червоний вовчак, дизурія, підвищення рівня креатиніну крові, підвищення рівня сечової кислоти в крові, підвищення рівня сечовини в крові, гарячка, астения, озноб, нездужання, азооспермія, олігоспермія, гангрена; випадки панкреатиту і гепатотоксичності (інколи з летальним наслідком), а також тяжкої периферичної нейропатії відзначені у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримували гідроксикарбамід сумісно з антиретровірусними препаратами.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого іншого компонента препарату; пригнічена функція кісткового мозку (вміст лейкоцитів менше $2,5 \times 10^9$ /л, тромбоцитів - менше 100×10^9 /л) або наявність тяжкої форми анемії.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ГІДРОКСИКАРБАМІД ТЕВА	ТОВ Тева Оперейшнз Поланд/Тева Чех Індастріз с.р.о., Польща/Чеська Республіка	капс. у п/е пак. та конт.	500мг	№100	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ГІДРОКСИКАРБАМІД ВІСТА	Дева Холдінг А.Ш., Туреччина	капс. у бл.	500мг	№10x10	1500,00	30,40/€
	ГІДРОКСИСЕЧОВИНА МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Спеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за вторинне пакування, маркування первинної упаковки, контроль/випробування серії та за випуск серії)/Хаупт Фарма Амарег ГмБХ (виробник, що відповідає за виробництво лікарського з, Німеччина/Німеччина	капс. у бл.	500мг	№10x10	1757,20	31,38/€

- **Децитабін (Decitabine)**

Фармакотерапевтична група: L01BC08 - Антинеопластичні засоби. Антиметаболіти.

Основна фармакотерапевтична дія: аналог деоксинуклеозиду цитидину, у малих дозах селективно інгібує ДНК-метилтрансферази, в результаті чого відбувається гіпометилування промоторної ділянки генів, що призводить до реактивації гена-супресора пухлин, індукції клітинної диференціації або старіння з подальшою запрограмованою загибеллю клітин; у високих концентраціях ($>10^{-4}$ М) є цитотоксичним.

Показання для застосування ЛЗ: мієлодиспластичний синдром (МДС), включаючи лікований і нелікований, рецидивуючий та вторинний МДС усіх підтипів; вперше діагностована або вторинна г.мієлоїдна лейкоемія у пацієнтів віком від 65 років, які згідно з класифікацією ВООЗ не підлягають стандартній хімотерапії^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити шляхом в/в інфузії, необов'язково ч/з центральний венозний катетер; **3-денний режим дозування при лікуванні МДС:** вводити 3 дні поспіль у фіксованій дозі 15 мг/м^2 площі поверхні тіла тривалістю 3 год. або більше кожні 8 год. (всього 9 доз за цикл); цикл повторюється кожні 6 тижн. в залежності від клінічної відповіді пацієнта та токсичності, що спостерігається; загальна добова доза не повинна перевищувати 45 мг/м^2 , загальна доза за цикл не повинна перевищувати 135 мг/м^2 . **5-денний режим дозування при лікуванні МДС:** вводити у дозі 20 мг/м^2 поверхні тіла шляхом в/в інфузії тривалістю більше 1 год. протягом 5 послідовних днів (загалом 5 доз у циклі); загальна добова доза не має перевищувати 20 мг/м^2 , загальна доза за цикл не має перевищувати 100 мг/м^2 ; цикл необхідно повторювати кожні 4 тижні, в залежності від клінічної відповіді пацієнта та токсичності, що спостерігається; у випадку пропускання чергової дози лікування має бути відновлено якомога швидше; даний режим дозування можна проводити в амбулаторних умовах; **г. мієлоїдна лейкоемія:** вводити у дозі 20 мг/м^2 поверхні тіла шляхом в/в інфузії тривалістю понад 1 год. впродовж 5 послідовних днів (5 доз у циклі); загальна добова доза не має перевищувати 20 мг/м^2 , загальна доза за цикл не має перевищувати 100 мг/м^2 ; у випадку пропускання чергової дози лікування має бути відновлено якомога швидше; цикл необхідно повторювати кожні 4 тижні, залежно від клінічної відповіді пацієнта та токсичності, що спостерігається; рекомендується проведення щонайменше 4 циклів лікування, однак, досягнення повної або часткової ремісії може потребувати більше часу/

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперчутливість, включаючи анафілактичну р-цію; пірексія, анемія та тромбоцитопенія, лейкопенія, панцитопенія, пневмонія, нейтропенія, фебрильна нейтропенія, інфекції сечовивідних шляхів, ін. інфекції (вірусні, бактеріальні, грибові), септичний шок, сепсис, синусит; головний біль, носова кровотеча, діарея, блювання, нудота, стоматит; г. фебрильний нейтрофільний дерматоз (с-м Світа).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; вагітність; період годування груддю.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДЕЦИСАН	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд., Індія	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл. з розч.	50мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Капецитабін (Capecitabine) ***

Фармакотерапевтична група: L01BC06 - Антинеопластичні засоби. Антиметаболіти. Структурні аналоги піримідину.

Основна фармакотерапевтична дія: нецитотоксичне похідне фторпіримідину карбамату, попередник цитотоксичної сполуки - 5-фторурацилу (5-ФУ); активується в декілька ферментних етапів; фінальне перетворення до 5-ФУ відбувається під дією тимідинфосфорилази у тканині пухлини та у здорових тканинах організму, проте як правило на низькому рівні; метаболізм 5-ФУ анаболічним шляхом блокує р-цію метилування дезоксирибидилової к-ти до тимідилової к-ти, т.ч. перешкоджаючи синтезу ДНК; вбудовування 5-ФУ також пригнічує синтез РНК та протеїнів; може спричиняти дефіцит тимідину, що сприяє незбалансованому росту та загибелі клітин; впливи на ДНК та РНК більш виражені у клітинах з більш інтенсивною проліферацією і з вищим рівнем метаболізму 5-ФУ.

Показання для застосування ЛЗ: рак ободової кишки, в ад'ювантній терапії після хірургічного лікування раку III стадії^{БНФ} (стадія С за Дьюком); метастатичний колоректальний рак^{БНФ}; препарат для першої лінії лікування розповсюдженого раку шлунка, у комбінації з препаратами на основі платини^{БНФ}; місцевий розповсюджений чи метастатичний рак молочної залози, у поєднанні з доцетакселом після неефективної хімотерапії, що включає препарати антрациклінового ряду; місцевий розповсюджений чи метастатичний рак молочної залози, як монотерапія після неефективної хімотерапії, що включає таксани і препарати антрациклінового ряду, або при наявності протипоказання до терапії антрациклінами^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос, не пізніше ніж ч/з 30 хв після вживання їжі, ковтаючи цілими та запиваючи водою; монотерапія: рак ободової кишки, колоректальний рак, рак молочної залози: початкова добова доза в якості ад'ювантної терапії - 2500 мг/м^2 поверхні тіла у вигляді 3-тижневих циклів: щодня протягом 2 тижн., після чого тижнева перерва; сумарну добову дозу розподіляють на 2 прийоми (по 1250 мг/м^2 поверхні тіла зранку і ввечері); рекомендована загальна тривалість ад'ювантної терапії у пацієнтів з раком ободової кишки III ст. - 6 міс.; комбінована терапія: рак молочної залози: у комбінації з доцетакселом рекомендована початкова доза - по 1250 мг/м^2 2 р/добу протягом 2 тижн. з подальшою тижневою перервою (у поєднанні з доцетакселом 75 мг/м^2 1 раз у 3 тижні у вигляді в/в інфузії); рак ободової кишки, колоректальний рак, рак шлунка: при комбінованому лікуванні початкову дозу зменшити до $800\text{-}1000 \text{ мг/м}^2$ 2 р/добу протягом 2 тижн. з наступною тижневою перервою до 625 мг/м^2 2 р/добу при безперервному застосуванні; при комбінації з іринотеканом (200 мг/м^2 в день) початкова доза - 800 мг/м^2 2 р/добу протягом 2 тижн. з подальшою тижневою перервою; протиблювотні засоби та премедикацію для забезпечення адекватної гідратації призначають пацієнтам, які отримують капецитабін у комбінації з цисплатином чи оксаліплатином перед введенням цисплатину відповідно до інструкції для застосування цисплатину та оксаліплатину.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: діарея, блювання, нудота, стоматит, біль у животі; шлунково-кишкові кровотечі, запори, біль у верхніх відділах живота, диспепсія, метеоризм, сухість у роті; кишкова

непрохідність, асцит, ентерит, гастрит, дисфагія, біль у нижніх відділах живота, езофагіт, абдомінальний дискомфорт, гастроєзофагеальна рефлюксна хвороба, коліт, кров у фекаліях; герпес (вірусна інфекція), назофарингіт, інфекції нижніх дихальних шляхів; сепсис, інфекції сечових шляхів, целюліт, тонзиліт, фарингіт, кандидоз ротової порожнини, грип, гастроентерит, грибоквіа інфекція, інфекція, абсцес зубів; ліпома; анемія, нейтропенія; фебрильна нейтропенія, панцитопенія, гранулоцитопенія, тромбоцитопенія, лейкопенія, гемолітична анемія, збільшення міжнародного нормалізованого співвідношення (МНО)/подовження протромбінового часу; р-ції підвищеної чутливості; анорексія; дегідратація, зменшення маси тіла; ЦД, гіпокаліємія, розлади апетиту, знижене харчування, гіпертригліцеридемія; безсоння, депресія; сплутаність свідомості, гострий тривожний стан з р-цією паніки, депресивний настрій, зниження лібідо; головний біль, загальмованість, запаморочення, парестезії, висипання, алопеція, еритема, порушення пам'яті, атаксія, синкопе, розлади балансу, чутливі розлади, периферична нейропатія; токсична лейкоенцефалопатія; сльозоточивість, кон'юнктивіт, подразнення органів зору; зниження гостроти зору, диплопія; стеноз слізної протоки, розлади рогівки, кератит, точковий кератит; запаморочення, біль у вухах; нестабільна стенокардія, стенокардія, ішемія/інфаркт міокарда, фібриляція передсердь, аритмія, тахікардія, синусова тахікардія, відчуття серцебиття; фібриляція шлуночків, подовження інтервалу QT, піруетна шлуночкова тахікардія, брадикардія, вазоспазм; гіпербілірубінемія, відхилення рівня функціональних печінкових тестів; жовтяниця; печінкова недостатність та холестатичний гепатит; с-м долонно-підшовної еритродизестезії; висипання, алопеція, еритема, сухість шкіри, свербіж, гіперпігментація шкіри, макулярне висипання, злизування шкіри, дерматит, порушення пігментації, порушення з боку нігтів; утворення пухирів та виразок на шкірі, висипання, кропив'янка, р-ції фоточутливості, еритема долонь, набряк обличчя, пурпура, оборотний променевий с-м; шкірний червоний вовчак; тяжкі шкірні р-ції, такі як с-м Стівенса-Джонсона і токсичний епідермальний некроліз; біль у кінцівках, біль у спині, артралгія; набряк суглобів, біль у кістках, біль обличчя, ригідність опорно-рухової системи, слабкість у м'язах; гідронефроз, нетримання сечі, гематурія, ніктурія, підвищення рівня креатиніну крові; вагінальні кровотечі; слабкість, астенія; гіпертермія, периферичні набряки, нездужання, біль у грудній клітці; набряк, лихоманка, грипоподібні с-ми, озноб, підвищення температури тіла. *При комбінованій терапії можливе додавання таких ускладнень:* оперізувальний лишай, інфекції верхніх дихальних шляхів, риніт, інфекції; ейтропенічна гарячка; пригнічення кісткового мозку, фебрильна нейтропенія; гіпонатріємія, гіпомагніємія, гіпокальціємія, гіперглікемія; неспокій; парестезії та дизестезії, нейротоксичність, тремор, невралгія, гіпестезія; сухість очей, біль в очах, порушення зору; дзвін у вухах, зниження слуху; АГ, тромбоз/емболія; припливи, артеріальна гіпотензія, гіпертензивний криз, гіперемія, флебіт; ангіна, дизестезія глотки; гикавка, фаринголарингеальний біль, дисфонія; виразки слизової оболонки ротової порожнини, здуття живота, біль у роті, ректальна кровотеча, дизестезії ротової порожнини, парестезії ротової порожнини, гіпестезія ротової порожнини, дискомфорт у животі; відхилення рівня функціональних печінкових тестів; алопеція, порушення з боку нігтів; гіпергідроз, еритематозні висипання, кропив'янка, нічна підвищена пітливість; артралгії, міалгії, біль у кінцівках; біль у щелепах, м'язові спазми, тризм, слабкість у м'язах; протеїнурія, зниження кліренсу креатиніну нирками, дизурія; ГН внаслідок зневоднення; загальмованість, чутливість до підвищеної температури; запалення слизових оболонок, больові відчуття, озноб, грипоподібні симптоми, інфузійні р-ції, р-ції у місці введення, біль у місці інфузії, біль у місці ін'єкції; забій. У разі контакту з подрібненими чи розламаними таблетками капецитабіну повідомлялося про такі побічні р-ції: подразнення очей, набряк очей, висип на шкірі, головний біль, парестезія, діарея, нудота, подразнення шлунка та блювання.

Протипоказання до застосування ЛЗ: тяжкі, у т.ч. неочікувані р-ції на лікування фторпіримідіном в анамнезі; гіперчутливість до капецитабіну або до будь-якого компонента препарату, або фторурацилу; відома повна відсутність активності дигідропіримідиндегідрогенази (ДГД); вагітність та годування груддю; тяжка лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія; тяжкі порушення ф-ції печінки; тяжка ниркова недостатність (кліренс креатиніну < 30 мл/хв); нещодавнє або супутнє лікування бривудіном; застосування будь-якого ЛЗ, що застосовують в комбінації.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АПСИБИН	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд (Виробничий відділ - 7), Індія	табл., вкриті п/о у бл.	150мг	№10x6	416,00	27,69/\$
	АПСИБИН	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд (Виробничий відділ - 7), Індія	табл., вкриті п/о у бл.	150мг	№10x1	416,00	28,18/\$
	АПСИБИН	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд (Виробничий відділ - 7), Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x12	2730,00	27,69/\$
	АПСИБИН	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд (Виробничий відділ - 7), Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x1	2730,00	28,18/\$
	КАКСІТА	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x12	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАПЕНЕКС	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл. та конт.	150мг, 500мг	№10x3, №10x6;	відсутня у реєстрі ОБЦ	

				№60		
КАПЕТАЗОН	РЕЛАЙНС ЛАЙФ САЙНСЕС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД (ПЛАНТ 6), Індія	табл., вкриті п/о у бл.	150мг, 500мг	№10x6, №10x12	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КАПЕЦИБЕКС 150	Інтас Фармасьютикалз Лімітед (виробництво готового лікарського засобу, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості серії; виробництво готового лікарського засобу, первинне та вторинне пакування, контроль якості серії (альтернативний виробник)), Індія/Велика Британія/Італія	табл., вкриті п/о у бл.	150мг	№10x3, №10x12	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КАПЕЦИБЕКС 150	Інтас Фармасьютикалз Лімітед (виробництво готового лікарського засобу, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості серії; виробництво готового лікарського засобу, первинне та вторинне пакування, контроль якості серії (альтернативний виробник)), Індія/Велика Британія/Італія	табл., вкриті п/о у бл.	150мг	№10x6	650,00	26,81/\$
КАПЕЦИБЕКС 500	Аккорд Хелскеа Лімітед (відповідальний за випуск серії, первинне та вторинне пакування)/Інтас Фармасьютикалз Лімітед (виробництво готового лікарського засобу, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості серії; виробництво готового лікарського з, Велика Британія/Індія/Італія/Велик а Британія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x3, №10x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КАПЕЦИБЕКС 500	Аккорд Хелскеа Лімітед (відповідальний за випуск серії, первинне та вторинне пакування)/Інтас Фармасьютикалз Лімітед (виробництво готового лікарського засобу, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості серії; виробництво готового лікарського з, Велика Британія/Індія/Італія/Велик а Британія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№x10x12	3000,00	26,81/\$
КАПЕЦИТАБІН АККОРД	Інтас Фармасьютикалз Лімітед/Аккорд Хелскеа Лтд/Аккорд Хелскеа Польска/Астрон Ресьюрч Лімітед/АЛС Лабораторіс (ЮК) Лімітед/ЛАБОРАТОРІ ФУНДАСІО ДАУ, Індія/Велика Британія/Польща/Велика Британія/Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	150мг, 300мг, 500мг	№60, №120	відсутня у реєстрі ОВЦ	

КАПЕЦИТАБІН АМАКСА	Лабораторіос Нормон С.А., Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	150мг	№10x6	540,00	30,52/€
КАПЕЦИТАБІН АМАКСА	Лабораторіос Нормон С.А., Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x12	3270,00	30,52/€
КАПЕЦИТАБІН КРКА	Інтас Фармасьютикалз Лімітед (відповідальний за виробництво "in bulk", первинну упаковку, вторинну упаковку)/Фармакар Преміум Лтд. (відповідальний за контроль серії)/КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за вторинну упаковку; відповідальний за випуск сер, Індія/Мальта/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	150мг, 500мг	№10x3, №10x6, №10x12	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КАПЕЦИТАБІН КРКА	Інтас Фармасьютикалз Лімітед (відповідальний за виробництво "in bulk", первинну упаковку, вторинну упаковку)/Фармакар Преміум Лтд. (відповідальний за контроль серії)/КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за вторинну упаковку; відповідальний за випуск сер, Індія/Мальта/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	150мг	№10x6	519,68	30,57/€
КАПЕЦИТАБІН КРКА	Інтас Фармасьютикалз Лімітед (відповідальний за виробництво "in bulk", первинну упаковку, вторинну упаковку)/Фармакар Преміум Лтд. (відповідальний за контроль серії)/КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за вторинну упаковку; відповідальний за випуск сер, Індія/Мальта/Словенія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x12	2292,71	30,57/€
КАПЕЦИТАБІН ШИЛПА	Шилпа Медікеа Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл. та фл.	150мг, 500мг	№60, №120	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КАПЕЦИТАБІН- ВІСТА	Ремедіка Лтд, Кіпр	табл., вкриті п/о у бл.	150мг	№10x6	520,00	26,93/€
КАПЕЦИТАБІН- ВІСТА	Ремедіка Лтд, Кіпр	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x12	2950,00	26,93/€
КАПОНКО	Релайенс Лайф Сайнсес Пвт. Лтд., Індія	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10, №100, №120	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КСЕЛОДА®	Екселла ГмБХ енд Ко. КГ (виробництво нерозфасованої продукції, випробування контролю якості)/Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд (первинне та вторинне пакування, випробування контролю якості, випуск серії)/Рош Фарма АГ (випробування контролю якості), Німеччина/Швейцарія/Німе	табл., вкриті п/о у бл.	150мг	№10x6	1762,00	26,71/\$

	चना					
КСЕЛОДА®	Екселла ГмбХ енд Ко. КГ (виробництво нерозфасованої продукції, випробування контролю якості)/Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд (первинне та вторинне пакування, випробування контролю якості, випуск серії)/Рош Фарма АГ (випробування контролю якості)/Шанхай Рош Фармасью, Німеччина/Швейцарія/Німеччина/Китай	табл., вкриті п/о у бл.	500мг	№10x12	5115,00	26,71/\$
ЦЕНТРАБІН®	Інтас Фармасьютікалс Лімітед (виробництво, первинне та вторинне пакування)/Фармакеа Преміум Лтд (контроль та випуск серії), Індія/Мальта	табл., вкриті п/о у бл.	150мг, 300мг, 500мг	№10x6, №10x12	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Метотрексат (Methotrexate)**

Фармакотерапевтична група: L01BA01 - Антинеопластичні засоби. Антиметаболіти. Структурні аналоги фолієвої кислоти.

Основна фармакотерапевтична дія: антагоніст фолієвої к-ти, належить до цитотоксичних засобів класу антиметаболітів, діє під час S-фази клітинного циклу і конкурентно інгібує фермент дигідрофолатредуктазу, запобігаючи відновленню дигідрофолату до тетрагідрофолату, що є необхідним для синтезу ДНК та реплікації клітин; оскільки проліферація злоякісних тканин швидша за норму, метотрексат може порушувати їхній розвиток, не завдаючи незворотної шкоди нормальним тканинам.

Показання для застосування ЛЗ: онкологічні захворювання^{БНФ}: хоріокарцинома, г. лімфоцитарний лейкоз^{ВООЗ}, неходжкінська лімфома^{ВООЗ}, рак молочної залози^{ВООЗ}, табл.: підтримуюча терапія г. лімфолейкозу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити в/м, в/в (шляхом болюсних ін'єкцій або інфузій), інтратекально, в/артеріально та інтравентрикулярно; дози визначають залежно від маси або площі поверхні тіла пацієнта, за винятком випадків інтратекального та інтравентрикулярного введення, коли максимальна доза не повинна перевищувати 15 мг, а максимальна рекомендована концентрація складає 5 мг/мл; високі дози (більше 100 мг) зазвичай вводять шляхом в/в інфузій тривалістю не більше 24 год.; у вигляді монотерапії або у поєднанні з іншими цитотоксичними засобами застосовується для лікування широкого спектру онкологічних захворювань; дози і схеми лікування можуть значно варіювати; лейкоз: 3,3 мг/м² у комбінації з іншими цитостатиками 1 р/день протягом 4-6 тижнів; 2,5 мг/кг кожні 2 тижні; 30 мг/м²/тиждень - підтримуюча терапія; інтенсивна терапія високими дозами 1-12 г/м² поверхні тіла (в/в протягом 1-6 год.) кожні 1-3 тижні; 20 мг/м² у комбінації з іншими цитостатиками 1 р/тиждень; неходжкінська лімфома: комбінована терапія 500-2000 мг/м² поверхні тіла з інтервалами 1 або 3 тижні; 7500 мг/м² поверхні тіла в/в 1 р/тиждень; рак молочної залози: 40 мг/м² в/в у комбінації з іншими цитостатиками у день 1, або 1 та 3, або 1 та 8, або 3 рази на рік; метотрексат є частиною курсу хіміотерапії за схемою CMF (циклофосфан + адриаміцин + 5-фторурацил), протягом якого доза метотрексату зазвичай складає 40 мг в/в у дні 1 та 8, курс лікування повторюється із інтервалом у 3 тижні; хоріокарцинома: 15-30 мг щодня протягом 5 днів, повторення курсів з інтервалами 1 тижд. і більше; можна застосовувати р/ос у дозах до 30 мг/м², вищі дози вводити парентерально.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тромбоцитопенія, лейкопенія, стоматит, біль у животі, анорексія, нудота і блювання (особливо протягом перших 24-48 год.), головний біль, втома, сонливість, парестезії; зниження кліренсу креатиніну, збільшення активності печінкових ферментів (АЛТ, АСТ), ЛФ, білірубину, зниження кліренсу креатиніну; інтерстиціальний пневмоніт, альвеоліт, які можуть мати летальний наслідок; екзантема, еритема, свербіж, оперізуючий лишай; анемія, панцитопенія, мієлосупресія, агранулоцитоз; опортуністичні інфекції, які можуть бути летальними, сепсис; нокардіоз, гістоплазмоз, криптококовий мікоз, розсіяне ураження вірусом простого герпесу, цитомегаловірусні інфекції; злоякісні новоутворення, синдром лізису пухлини; мегалобластна анемія, апластична анемія, еозинофілія, нейтропенія, лімфаденопатія, лімфопроліферативні розлади; АР, анафілактичний шок, алергічний васкуліт, лихоманка, імуносупресія, гіпогаммаглобулінемія; ЦД; депресія, коливання настрою, мінущі розлади чутливості; судоми, енцефалопатія/лейкоенцефалопатія (у разі парентерального застосування), геміпарез, запаморочення, сплутаність свідомості, парез, розлади мови, включаючи дизартрію, афазію, мієлопатія (після люмбального застосування), незвичайне краніальне сенсорне сприйняття, міастенія, біль у кінцівках, порушення смаку, г.асептичний менінгіт з менінгіальним с-ромом, збільшення тиску спинномозкової рідини після інтратекального введення; в/в введення може призвести до г.енцефаліту, г.енцефалопатії з летальним наслідком; затуманення зору, помутніння зору, тяжка дизопія, періорбітальний набряк, блефарит, слъозотеча, світлобоязнь, кон'юнктивіт, мінуща сліпота, втрата зору; гіпотонія, ексудативний перикардит, тампонада перикарду, перикардит; васкуліт, артеріальний тромбоз, тромбоз судин головного мозку, тромбофлебіт, тромбоз глибоких вен, тромбоз вен сітківки і легенева емболія; легеневий фіброз, плеврит, фарингіт, зупинка дихання, хр. інтерстиціальне обструктивне захворювання легень, астмоподібні реакції з кашлем, задишкою, патологічним результатом тесту легеневої функції, пневмоцистна пневмонія; ШКК, панкреатит, ентерит, гінгівіт, мелена, блювання кров'ю, неінфекційний перитоніт; жирові перетворення печінки, хр. фіброз печінки, цироз печінки, зниження сироваткового альбуміну, гепатотоксичність, г.гепатит, поновлення хр.гепатиту, г.некроз печінки, печінкова недостатність, реактивація гепатиту В, загострення гепатиту С; випадіння волосся, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний

некроліз, герпетиформні висипання, світлочутливість, кропив'янка, посилення пігментації шкіри, порушення загоєння ран, акне, виразки шкіри, синці, еритема, нодульоз, болісні ерозії псоріазу, посилення пігментації нігтів, оніхолізіс, збільшення ревматичних вузлів, фурункульоз, телеангіктазія, г. параніхія; артралгія/міалгія, остеопороз, перелом; тяжка нефропатія, ниркова недостатність, цистит з виразкою, порушення сечовипускання, дизурія, олігурія, анурія, гіперурикемія, підвищення концентрації сечовини, креатиніну в сироватці крові, азотемія, гематурія, протеїнурія; вроджені вади плода, аборт, смерть плода; вагінальні виразки та запалення, порушення менструального циклу, порушення овогенезу/сперматогенезу, імпотенція, безпліддя, втрата лібідо, минуща олігоспермія, виділення з піхви, розлади циклу, гінекомастія; при інтратекальному застосуванні: г.хімічний арахноїдит, підгостра мієлопатія, хр. лейкоенцефалопатія; при в/в - г.енцефаліт, г.енцефалопатія з летальним наслідком; при в/м застосуванні - місцеві ПР, формування стерильного абсцесу, руйнування жирової тканини.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до метотрексату або до інших компонентів препарату; значні порушення функції печінки (рівень білірубіну > 85,5 мкмоль/л); зловживання алкоголем; порушення функції нирок (кліренс креатиніну < 20 мл/хв); порушення з боку системи кровотворення (гіпоплазія кісткового мозку, лейкопенія, тромбоцитопенія, виражена анемія); тяжкі, г.або хр.інфекції (туберкульоз, ВІЛ); стоматит, виразки слизової оболонки ротової порожнини або травного тракту; період вагітності, годування груддю; вакцинація живими вакцинами у період лікування; імунодефіцит.

Визначена добова доза (DDD): перорально/парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	МЕТОДЖЕКТ®	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за вторинне пакування, маркування, контроль/випробування серії та за випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробник, що відповідає за виробництво лікарського засобу, первинне, Німеччина/Німеччина/Німеччина/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 0,45мл, 0,55мл, 0,60мл у шпр. з голк. в бл.	50 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	МЕТОДЖЕКТ®	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за вторинне пакування, маркування, контроль/випробування серії та за випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробник, що відповідає за виробництво лікарського засобу, первинне, Німеччина/Німеччина/Німеччина/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 0,15мл у шпр. з голк в бл.	50 мг/мл	№1	365,51	29,01/€
	МЕТОДЖЕКТ®	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за вторинне пакування, маркування, контроль/випробування серії та за випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробник, що відповідає за виробництво лікарського засобу, первинне, Німеччина/Німеччина/Німеччина/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 0,20мл у шпр. з голк в бл.	50 мг/мл	№1	406,12	29,01/€

МЕТОДЖЕКТ®	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (виробник, що відповідає за вторинне пакування, маркування, контроль/випробування серії та за випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробник, що відповідає за виробництво лікарського засобу, первинне, Німеччина/Німеччина/Німе ччина/Німеччина	р-н д/ін'ек. по 0,25мл у шпр. з голк в бл.	50 мг/мл	№1	446,73	29,01/€
МЕТОДЖЕКТ®	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (виробник, що відповідає за вторинне пакування, маркування, контроль/випробування серії та за випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробник, що відповідає за виробництво лікарського засобу, первинне, Німеччина/Німеччина/Німе ччина/Німеччина	р-н д/ін'ек. по 0,30мл у шпр. з голк в бл.	50 мг/мл	№1	527,95	29,01/€
МЕТОДЖЕКТ®	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (виробник, що відповідає за вторинне пакування, маркування, контроль/випробування серії та за випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробник, що відповідає за виробництво лікарського засобу, первинне, Німеччина/Німеччина/Німе ччина/Німеччина	р-н д/ін'ек. по 0,35мл у шпр. з голк в бл.	50 мг/мл	№1	649,79	29,01/€
МЕТОДЖЕКТ®	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (виробник, що відповідає за вторинне пакування, маркування, контроль/випробування серії та за випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробник, що відповідає за виробництво лікарського засобу, первинне, Німеччина/Німеччина/Німе ччина/Німеччина	р-н д/ін'ек. по 0,40мл у шпр. з голк в бл.	50 мг/мл	№1	731,01	29,01/€
МЕТОДЖЕКТ®	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (виробник, що відповідає за вторинне пакування, маркування, контроль/випробування серії та за випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробник, що відповідає за виробництво лікарського засобу, первинне, Німеччина/Німеччина/Німе ччина/Німеччина	р-н д/ін'ек. по 0,50мл у шпр. з голк в бл.	50 мг/мл	№1	812,24	29,01/€

	що відповідає за виробництво лікарського засобу, первинне, Німеччина/Німеччина/Німеччина/Німеччина					
МЕТОТАБ	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (Виробник, що відповідає за маркування первинної упаковки, вторинне пакування, контроль/випробування серії та за випуск серії)/Екселла ГмБХ (Виробник, що відповідає за виробництво готової дозованої форми,, Німеччина/Німеччина/Німеччина	табл. у фл.	2,5мг; 7,5мг; 10мг	№30, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МЕТОТАБ	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (Виробник, що відповідає за маркування первинної упаковки, вторинне пакування, контроль/випробування серії та за випуск серії)/Екселла ГмБХ (Виробник, що відповідає за виробництво готової дозованої форми,, Німеччина/Німеччина/Німеччина	табл. у фл.	2,5мг	№100	460,84	30,72/€
МЕТОТАБ	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (Виробник, що відповідає за маркування первинної упаковки, вторинне пакування, контроль/випробування серії та за випуск серії)/Екселла ГмБХ (Виробник, що відповідає за виробництво готової дозованої форми,, Німеччина/Німеччина/Німеччина	табл. у фл.	7,5мг	№30	491,56	30,72/€
МЕТОТАБ	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (Виробник, що відповідає за маркування первинної упаковки, вторинне пакування, контроль/випробування серії та за випуск серії)/Екселла ГмБХ (Виробник, що відповідає за виробництво готової дозованої форми,, Німеччина/Німеччина/Німеччина	табл. у фл.	10мг	№30	522,28	30,72/€
МЕТОТРЕКАТ	РУП "Белмедпрепарати", Республіка Білорусь	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МЕТОТРЕКАТ	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х.	табл. у конт.	2,5мг	№50	283,24	25,60/\$

"ЕБЕВЕ"	Нфг. КГ (випуск серії)/Салютас Фарма ГмбХ (випуск серії)/Гаупт Фарма Амареґ ГмбХ (виробництво in bulk, упаковка, тестування), Австрія/Німеччина/Німеччина					
МЕТОТРЕКСАТ "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (випуск серії)/Салютас Фарма ГмбХ (випуск серії)/Гаупт Фарма Амареґ ГмбХ (виробництво in bulk, упаковка, тестування), Австрія/Німеччина/Німеччина	табл. у конт.	5мг	№50	491,23	25,60/\$
МЕТОТРЕКСАТ "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (випуск серії)/Салютас Фарма ГмбХ (випуск серії)/Гаупт Фарма Амареґ ГмбХ (виробництво in bulk, упаковка, тестування), Австрія/Німеччина/Німеччина	табл. у конт.	10мг	№50	672,35	25,60/\$
МЕТОТРЕКСАТ "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (повний цикл виробництва)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (тестування)/Лабор Л+С АГ (тестування), Австрія/Австрія/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 1мл, у фл.; по 0,75мл, 1мл, 1,5мл, 2мл у шпр. з голк. та сервет.	10 мг/мл	№1, №5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МЕТОТРЕКСАТ "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (повний цикл виробництва)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (тестування)/Лабор Л+С АГ (тестування), Австрія/Австрія/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 5мл, у фл. в кор.	10 мг/мл	№1	188,38	25,60/\$
МЕТОТРЕКСАТ "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (повний цикл виробництва)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (тестування)/Лабор Л+С АГ (тестування), Австрія/Австрія/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл, 10мл у фл.	100 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МЕТОТРЕКСАТ "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (повний цикл виробництва)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (тестування)/Лабор Л+С АГ (тестування), Австрія/Австрія/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 50мл у фл.	100 мг/мл	№1	3061,59	25,60/\$
МЕТОТРЕКСАТ АККОРД	Інтас Фармасьютікалз Лімітед (виробництво, контроль якості, первинне та вторинне пакування)/АККОРД ХЕЛСКЕА ЛІМІТЕД (випуск серії)/Аккорд Хелскеа Лімітед (вторинне пакування), Індія/Велика Британія/Велика Британія	р-н д/ін'єк. по 2мл, 20мл, 40мл у фл.	25 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
МЕТОТРЕКСАТ	Оріон Корпорейшн	табл. у фл.	2,5мг	№30	161,13	26,90/€

ОΡΙОН	(виробник, що здійснює виробництво за повним циклом; виробник, що здійснює випуск серії), Фінляндія						
МЕТОТРЕКАТ ОΡΙОН	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює виробництво за повним циклом; виробник, що здійснює випуск серії), Фінляндія	табл. у фл.	2,5мг	№100	268,73	26,90/€	
МЕТОТРЕКАТ ОΡΙОН	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює виробництво за повним циклом; виробник, що здійснює випуск серії), Фінляндія	табл. у фл.	10мг	№100	відсутня у реєстрі ОВЦ		
МЕТОТРЕКАТ ОΡΙОН	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює виробництво за повним циклом; виробник, що здійснює випуск серії), Фінляндія	табл. у фл.	10мг	№30	349,43	26,90/€	
МЕТОТРЕКАТ- ТЕВА	Фармахеми Б.В., Нідерланди	р-д д/ін'єк. по 2мл, 10мл у фл.	25мг/мл; 100мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ		

• **Пеметрексед (Pemetrexed)**

Фармакотерапевтична група: L01BA04 - Антиметаболіти. Структурні аналоги фолієвої к-ти.

Основна фармакотерапевтична дія: антифолат різноспрямованої дії, пригнічує тимідилатсинтетазу (TS), дегідрофолатредуктазу (DHFR), гліцинамід-рибонуклеотид-формілтрансферазу (GARFT), які є основними фолатзалежними ферментами для біосинтезу тимідину та пуринових нуклеотидів *de novo*; транспорт його до клітин відбувається за рахунок редукованого переносника фолатів та транспортних систем мембранного протеїну, що зв'язує фолати; потрапивши до клітини, швидко трансформується в поліглутаматні форми за допомогою ензиму фолілполіглутаматсинтетази, які акумулюються в клітинах і є навіть більш сильними інгібіторами TS і GARFT; метаболіти поліглутамату мають більш тривалий в/клітинний період напіввиведення, що приводить до більш тривалої дії препарату в малігнізованих клітинах.

Показання для застосування ЛЗ: злоякісна нерезектабельна плевральна мезотеліома у комбінації з цисплатином; місцеворозповсюджений або метастатичний недрібноклітинний неплоскоклітинний рак легенів у першій лінії хіміотерапії в комбінації з цисплатином; як монотерапія для лікування хворих на місцеворозповсюджений або метастатичний недрібноклітинний неплоскоклітинний рак легенів у другій лінії хіміотерапії^{БНФ}; для підтримуючого лікування (як монотерапія) хворих на місцеворозповсюджений або метастатичний недрібноклітинний неплоскоклітинний рак легенів, у яких не було прогресування захворювання після хіміотерапії препаратами платини^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: у комбінації із цисплатином: рекомендована доза 500 мг/м² площі поверхні тіла (ППТ) у вигляді в/в інфузії протягом 10 хв. у перший день кожного 21-денного циклу; рекомендована доза цисплатину становить 75 мг/м² ППТ у вигляді інфузії протягом 2 год. приблизно через 30 хв. після завершення інфузії пеметрекседу у перший день кожного 21-денного циклу; пацієнт повинен отримувати адекватну протиблювотну терапію, належну гідратацію пацієнта слід проводити до або/та після введення цисплатину; **застосування як монотерапії:** лікування недрібноклітинного раку легенів (НДРЛ) після попередньо проведеної хіміотерапії - рекомендована доза 500 мг/м² ППТ у вигляді в/в інфузії протягом 10 хв. в перший день кожного 21-денного циклу; **режим премедикації:** з метою зниження частоти та тяжкості р-цій з боку шкіри застосовувати кортикостероїди за день до призначення пеметрекседу, в день його призначення та в день після його введення; доза кортикостероїду має бути еквівалентна 4 мг дексаметазону р/ос двічі на день.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: супресія кісткового мозку, що проявляється у вигляді анемії, нейтропенії, лейкопенії та тромбоцитопенії, а також шлунково-кишкова токсичність, що проявляється як анорексія, тошнота, блювання, діарея, запор, зневоднення; фарингіт, мукозит і стоматит; ниркова токсичність, підвищення рівня трансаміназ, алопеція, слабкість, дегідратація, висипання, інфекція/сепсис; с-м Стивенса-Джонсона, токсичний епідермальний некролізис; сенсорна нейропатія, порушення смакових відчуттів; втома.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату або до його компонентів; період годування груддю; супутнє застосування вакцини проти жовтої лихоманки.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ПЕМЕТРЕКСЕД	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків"	ліоф. д/приг. р-ну д/інфуз. у	500мг	№1	6500,00	

		(виробництво з продукції in bulk фірми-виробника Цзяньсу Ханьсо Фармасьютикал Груп Ко., Лтд., Китай), Україна	фл.				
II.	АЛІМТА	Елі Ліллі енд Компані (виробництво за повним циклом)/Ліллі Франс (маркування та вторинна упаковка, контроль та випуск серії)/Вайанекс С.А. (виробництво дозованої форми, первинна упаковка, контроль), США/Франція/Греція	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	500мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КАРЖЕСТ	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд (Виробничий відділ - 7), Індія	пор. ліоф. д/приг. конц. д/р-ну д/інфуз. у фл.	100мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КАРЖЕСТ	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд (Виробничий відділ - 7), Індія	пор. ліоф. д/приг. конц. д/р-ну д/інфуз. у фл.	500мг	№1	7000,00	24,71/\$
	ПЕМЕТРЕКСЕД - ВІСТА СОЛЮТ	онкомед мануфакторінг а.с. (Виробництво, первинне пакування, контроль якості)/Сінтон Хіспанія, С.Л. (Контроль якості, випуск серії)/Сінтон с.р.о. (Контроль якості, випуск серії)/Джі І Фармасьютикалс Лтд (Вторинне пакування)/Квінта-Аналітіка с.р.о. (Контроль, Чеська Республіка/Іспанія/Чеська Республіка/Болгарія/Чеська Республіка / Чеська Республіка	конц. д/приг. р-ну д/інфуз. по 40мл у фл.	25 мг/мл	№1	10900,00	28,91/€
	ПЕМЕТРЕКСЕД - ВІСТА СОЛЮТ	онкомед мануфакторінг а.с. (Виробництво, первинне пакування, контроль якості)/Сінтон Хіспанія, С.Л. (Контроль якості, випуск серії)/Сінтон с.р.о. (Контроль якості, випуск серії)/Джі І Фармасьютикалс Лтд (Вторинне пакування)/Квінта-Аналітіка с.р.о. (Контроль, Чеська Республіка/Іспанія/Чеська Республіка/Болгарія/Чеська Республіка / Чеська Республіка	конц. д/приг. р-ну д/інфуз. по 4мл у фл.	25 мг/мл	№1	2200,00	28,91/€
	ПЕМЕТРЕКСЕД - ВІСТА СОЛЮТ	онкомед мануфакторінг а.с. (Виробництво, первинне пакування, контроль якості)/Сінтон Хіспанія, С.Л. (Контроль якості, випуск серії)/Сінтон с.р.о. (Контроль якості, випуск серії)/Джі І Фармасьютикалс Лтд (Вторинне пакування)/Квінта-Аналітіка с.р.о. (Контроль, Чеська Республіка/Іспанія/Чеська Республіка/Болгарія/Чеська Республіка / Чеська Республіка	конц. д/приг. р-ну д/інфуз. по 20мл у фл.	25 мг/мл	№1	5500,00	28,91/€

	Республіка/Іспанія/Чеська Республіка/Болгарія/Чеська Республіка / Чеська Республіка						
ПЕМЕТРЕКСЕД АКСОРД	Інтас Фармасьютікалз Лімітед (виробництво, контроль якості, первинне та вторинне пакування)/Аксорд Хелскеа Лімітед (відповідальний за випуск серії, вторинне пакування)/Фармадокс Хелскеа Лтд. (Контроль якості серії), Індія/Велика Британія/Мальта	пор. д/конц. д/р-ну д/інфуз. у фл.	100мг, 500мг, 1000мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ПЕМЕТРЕКСЕД КРКА	Натко Фарма Лтд. (виробництво, первинне та вторинне пакування)/КРКА, д.д., Ново место (контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю, стерильність), випуск серії; вторинне пакування)/КРКА - Фарма д.о.о. (контроль серії (фізичні та хімічні методи конт, Індія/Словенія/Хорватія	пор. д/приг. конц. д/р-ну д/інфуз. у фл.	100мг, 500мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ПЕМЕТРЕКСЕД-ВІСТА	онкомед мануфакторінг а.с. (виробництво та первинне пакування лікарського засобу)/Джі І Фармасьютікалс, Лтд. (вторинне пакування лікарського засобу)/Сінтон Хіспанія, С.Л. (контроль якості, відповідальний за випуск серії)/Сінтон с.р.о. (контроль якості, ві, Чеська Республіка/Болгарія/Іспанія/Чеська Республіка	пор. ліоф. д/приг. конц. д/р-ну д/інфуз. у фл.	100мг	№1	2200,00	32,21/€	
ПЕМЕТРЕКСЕД-ВІСТА	онкомед мануфакторінг а.с. (виробництво та первинне пакування лікарського засобу)/Джі І Фармасьютікалс, Лтд. (вторинне пакування лікарського засобу)/Сінтон Хіспанія, С.Л. (контроль якості, відповідальний за випуск серії)/Сінтон с.р.о. (контроль якості, ві, Чеська Республіка/Болгарія/Іспанія/Чеська Республіка	пор. ліоф. д/приг. конц. д/р-ну д/інфуз. у фл.	500мг	№1	5500,00	26,49/€	
ПЕМЕТРЕКСЕД-ВІСТА	онкомед мануфакторінг а.с. (виробництво та первинне пакування лікарського засобу)/Джі І Фармасьютікалс, Лтд. (вторинне пакування лікарського засобу)/Сінтон Хіспанія, С.Л. (контроль якості, відповідальні за випуск серії)/Сінтон с.р.о. (контроль якості, від, Чеська Республіка/Болгарія/Іспанія/Чеська Республіка	пор. ліоф. д/приг. конц. д/р-ну д/інфуз. у фл.	1000мг	№1	10900,00	27,67/€	
ПЕМЕТРЕКСЕД-МБ	РЕЛАЙНС ЛАЙФ	ліоф. д/приг. р-	100мг,	№1	відсутня у реєстрі		

	САЙНСЕС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД, Індія	ну д/інфуз. у фл.	500мг		ОВЦ	
ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЕВА	ПЛІВА Хрватска д.о.о. (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії)/Фармахеми Б.В. (виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка, контроль якості), Хорватія/Нідерланди	ліоф. д/приг. р-ну д/інфуз. у фл.	100мг	№1	2624,84	26,09/€
ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЕВА	ПЛІВА Хрватска д.о.о. (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії)/Фармахеми Б.В. (виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка, контроль якості), Хорватія/Нідерланди	ліоф. д/приг. р-ну д/інфуз. у фл.	500мг	№1	6561,71	26,09/€
ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЕВА	ПЛІВА Хрватска д.о.о. (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії)/Фармахеми Б.В. (виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка, контроль якості), Хорватія/Нідерланди	ліоф. д/приг. р-ну д/інфуз. у фл.	1000мг	№1	13123,69	26,09/€
ПЕМЕТРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	100мг, 500мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Тегафур (Tegafur)**

Фармакотерапевтична група: L01BC03 - Антинеопластичні засоби. Антиметаболіти. Аналози піримідину.

Основна фармакотерапевтична дія: має протипухлинну дію, за біологічними ознаками нагадує 5-фторурацил; його можна розглядати як транспортну форму 5-фторурацилу, що утворюється в організмі внаслідок активації тегафuru мікросомальними ферментами печінки; метаболіт довго циркулює в організмі, забезпечуючи т.ч. високу ефективність препарату; у процесі метаболізму 5-фторурацилу утворюється 5-фтор-2'-дезоксиридин-5'-монофосфат, який значно зменшує активність тимідилсинтетази, у таких умовах створюється дефіцит тимідин-5'-монофосфату (який можна вважати специфічним попередником ДНК), що зупиняє процес поділу клітин, у т.ч. злоякісних; інший метаболіт 5-фторурацил-5-фторуридин-5'-трифосфат включається до ланцюга РНК та заміщує урацил, що супроводжується також і порушеннями дії РНК; спричиняє більш виражені порушення біосинтезу, ніж 5-фторурацил, т.ч. діє не тільки як транспортна форма 5-фторурацилу, а й самостійно; в основі цитостатичного ефекту - його здатність втручатися у метаболізм РНК повільно зростаючих пухлинних клітин (з невеликою проліферацією); має також протизапальну та аналгетичну дію, зменшує свербіж.

Показання для застосування ЛЗ: рак товстої та прямої кишки, шлунка, молочної залози, рак шийки матки, шкірні лімфоми.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос за 1 год. до або після їди; монотерапія: добова доза - 20-30 мг/кг маси тіла (1,2-1,6 г або 3-4 капс.), але може досягти 2 г (5 капс.); дозу поділити на 2 прийоми кожні 12 год. або 2-4 р/добу; курсова доза - 30-40 г; тривалість лікувального курсу 28 днів, інтервал між курсами – 7 днів; у схемах комбінованої терапії та як доповнення при променевої терапії застосовувати в дозі, яка дорівнює або менша за дозу, що застосовується при монотерапії; хіміопроменева терапія раку шийки матки: 800-1200 мг 2 р/день; залежно від індивідуальної переносимості хіміопроменевої терапії добову дозу збільшувати від 800 до 1200 мг за 2 прийоми протягом курсу лікування (12-20 мг/кг/добу при середній масі пацієнта 60 кг).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: пригнічення кровотворення, анемія, тромбоцитопенія, лейкопенія; реакції підвищеної чутливості; дегідратація; запаморочення, сонливість, втрата нюху, зміни смаку; нудота, блювання, анорексія, діарея, кишкові коліки; стоматит; порушення функції печінки; дерматит з макулопапульозними висипаннями, свербіж; випадіння волосся, пошкодження нігтів, сухість шкіри; підвищення рівня АлАТ і АсАТ; симптоми лейкоенцефаліту; фебрильна нейтропенія; стенокардія; інтерстиціальна пневмонія; в особливо важких випадках розвивається виразковий езофагофарингіт, дуоденіт або виразка ДПК; г.панкреатит, г.гепатит; порушення функції нирок.

Противпоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату; термінальна стадія хвороби; г.профузні кровотечі; тяжкі функціональні порушення печінки та/або нирок; лейкопенія (менше 3×10^9 /л), тромбоцитопенія (менше 100×10^9 /л), анемія (рівень Hb менше 30 од.).

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ФТОРАФУР®	АТ "Гріндекс", Латвія	капс. тверді у конт.	400мг	№100	2684,95	26,85/€

• **Тіогуанін (Tioguanine)**

Фармакотерапевтична група: L01BB03 - Антинеопластичні та імуномодулюючі засоби. Антиметаболіти. Структурні аналоги пурину.

Основна фармакотерапевтична дія: сульфгідрильний аналог гуаніну та діє як пуриновий антиметаболіт; активується до свого нуклеотиду - тіогуанілової к-ти; метаболіти тіогуаніну гальмують *de novo* синтез пуринів і взаємоперетворення пуринових нуклеотидів; також інкорпорується у нуклеїнові кислоти та ДНК (дезоксирибонуклеїнову кислоту), і вважається, що це зумовлює його цитотоксичність.

Показання для застосування ЛЗ: лейкоз (г. мієлобластний лейкоз та г. лімфобластний лейкоз)^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос: звичайна доза 60-200 мг/м²/добу^{БНФ}, для дітей - таке ж дозування, з корекцією дози відповідно до площі поверхні тіла.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: пригнічення кісткового мозку, стоматит, захворювання ШКТ, некротичний коліт, венооклюзивні захворювання печінки: гіпербілірубінемія, гепатомегалія, збільшення маси тіла у зв'язку з затримкою рідини та асцитом; портальна гіпертензія: спленомегалія, варикозне розширення вен стравоходу та тромбоцитопенія; підвищення рівня печінкових ферментів, ЛФ в крові та гамма-глутамілтрансамінази, жовтяниця, портальний фіброз, вузликоса регенеративна гіперплазія, пеліоз печінки; оклюзивні захворювання вен печінки в короткостроковій циклічній терапії; некроз печінки; гіперурикемія; гіперурикозурія і уратна нефропатія; фотосенсибілізація, порушення електролітного балансу, атаксія, висипання, шум у вухах, серцево-судинні порушення, глухота та окулогірні кризи.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів ЛЗ; зважаючи на серйозність показань, абсолютних протипоказань немає.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЛАНВІС™	Екселла ГмБХ і Ко. КГ, Німеччина	табл. у фл.	40мг	№25	4159,77	24,88/\$

• **Флударабін (Fludarabine) ***

Фармакотерапевтична група: L01BB05 - Антинеопластичні засоби. Антиметаболіти. Структурні аналоги пурину.

Основна фармакотерапевтична дія: містить водорозчинний фторований нуклеотидний аналог противірусного засобу відарабіну, 9-β-D-арабінофуранозиладеніну (ара-А), який є відносно стійким до дезамінування аденозиндезаміназою; швидко дефосфорилується до 2Ф-ара-А, який поглинається клітинами та потім усередині клітин фосфорилується дезоксицитидинкіназою до активного трифосфату, 2Ф-ара-АТФ; цей метаболіт інгібує рибонуклеотидредуктазу, ДНК-полімерази, α-, δ- та ε-ДНК-примази і ДНК-лігазу, інгібуючи т.ч. синтез ДНК; відбувається часткове інгібування РНК-полімерази II та, як наслідок, зниження синтезу білка; дія на ДНК, РНК та синтез білка сприяє інгібуванню росту клітин та інгібування синтезу ДНК є домінуючим фактором у цьому процесі.

Показання для застосування ЛЗ: лікування В-клітинного хр. лімфолейкозу (ХЛЛ) у пацієнтів із достатнім резервом кісткового мозку^{БНФ}; терапію першого ряду здійснювати тільки у пацієнтів з прогресуючим захворюванням, стадії III/IV за Райя (стадія С за Біне) або стадії I/II за Райя (стадія А/В за Біне), при яких пацієнт має симптоми, пов'язані із захворюванням, або ознаки прогресуючого захворювання.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в; рекомендована доза 25 мг/м² площі поверхні тіла щодня протягом 5 днів поспіль кожні 28 днів; рекомендується проводити лікування до досягнення максимальної відповіді на терапію (зазвичай потрібно 6 курсів), після чого препарат відмінити.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції/опортуністичні інфекції (зокрема реактивація латентних вірусних інфекцій, спричинених вірусами Herpes zoster і Епштейна-Барра, або прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія), пневмонія; лімфопроліферативні захворювання, асоційовані з вірусом Епштейна-Барра у пацієнтів з ослабленим імунітетом; мієлодиспластичний с-м та г. мієлоїдний лейкоз (що головним чином асоціюється із попередньою, одночасною або подальшою терапією алкілюючими агентами, інгібіторами топоізомерази або променевою терапією); пригнічення ф-ції кісткового мозку (нейтропенія, тромбоцитопенія, анемія), мієлосупресія (може бути тяжкою і кумулятивною); аутоімунні захворювання (включаючи аутоімунну гемолітичну анемію, тромбоцитопенічну пурпуру, синдром Еванса, набуту гемофілію, пемфігус); анорексія, с-м лізису пухлини (включаючи ниркову недостатність, метаболічний ацидоз, гіперкаліємію, гіпокальціємію, гіперурикемію, гематурію, уратну кристалурію, гіперфосфатемію); периферична нейропатія, сплутаність свідомості, кома, ажитація, судомні напади, геморагічний інсульт, лейкоенцефалопатія, синдром г. токсичної лейкоенцефалопатії, синдром оборотної задньої лейкоенцефалопатії; порушення зору, неврит зорового нерва, зорова нейропатія і сліпота; СН, аритмія; кашель, легенева токсичність (включаючи фіброз легенів, пневмоніт, задишку), легенева кровотеча; блювання, діарея, нудота, стоматит, шлунково-кишкові кровотечі, відхилення рівнів панкреатичних ферментів; відхилення рівнів печінкових ферментів; шкірні висипання, рак шкіри, токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайєлла), с-м Стівенса-Джонсона; геморагічний цистит; пропасниця, стомлюваність, слабкість, набряки, мукозит, озноб, нездужання.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату, ниркова недостатність із кліренсом креатиніну < 30 мл/хв.; декомпенсована гемолітична анемія.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
--	-------------------	-----------------	---------------	-----------	----------------------	----------------	-----------------------------

II.	ФЛУДАБІН 50 / FLUDABINE 50	ЮНІТЕД БІОТЕЧ (П) ЛІМІТЕД, Індія	ліоф. д/ін'єк. у фл.	50мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФЛУДАМЕДА	Актавіс Італі С.п.А., Італія	конц. д/р-ну д/ін'єк. або інфуз. по 2мл у фл.	25 мг/мл	№1	1359,10	28,89/€
	ФЛУДАРАБІН-БЕЛМЕД	РУП "Белмедпрепарати", Республіка Білорусь	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	50мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФЛУДАРАБІН-ВІСТА	Сіндан Фарма С.Р.Л., Румунія	пор. д/приг. р-ну д/ін'єк. або інфуз. у фл.	50мг	№1	2400,00	30,26/€
	ФЛУДАРАБІНУ ФОСФАТ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ, Ф. США	Зідус Хоспіра Онколоджі Прайвет Лімітед (контроль якості діючої речовини; контроль якості допоміжних речовин; контроль якості компонентів; виробництво лікарського засобу; проміжний контроль якості; контроль якості при випуску та дослідженні стабільності; , Індія/Австралія/Австралія	пор. ліоф. д/ін'єк. у фл.	50мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

● **Фторурацил (Fluorouracil) ***

Фармакотерапевтична група: L01BC02 - Антинеопластичні засоби. Антиметаболіти. Структурні аналоги піримідину.

Основна фармакотерапевтична дія: протипухлинний засіб з групи антиметаболітів; як антагоніст піримідину порушує синтез ДНК і т.ч. інгібує поділ клітин; сам фторурацил не має антинеопластичної активності, протипухлинна дія проявляється в організмі після ферментної трансформації фторурацилу в фосфорильовані форми - 5-фторуридин і 5-фтордезоксифторуридин.

Показання для застосування ЛЗ: р-н д/ін'єкц. та конц. д/р-ну д/ін'єк.: прогресуючий або метастатичний колоректальний рак^{вооз,бнф}; прогресуючий рак шлунка^{вооз,бнф}; прогресуючий рак підшлункової залози^{вооз,бнф}; прогресуючий та/або метастатичний рак молочної залози^{вооз,бнф}; плоскоклітинний рак голови та шиї^{вооз,бнф}; неоперабельні місцевопрогресуючі пухлини у пацієнтів, які раніше не отримували лікування; локальний рецидив та віддалені метастази; р-н д/ін'єкц.: ад'ювантна хіміотерапія раку товстої кишки на стадії III (T1-4 N1-2) після попереднього проведення лікувальної резекції первинної пухлини; ад'ювантна хіміотерапія раку прямої кишки на стадіях II (T3-4) і III (T1-4 N1-2) після попереднього проведення лікувальної резекції первинної пухлини; прогресуючий рак стравоходу^{бнф}; ад'ювантна терапія первинного інвазивного раку молочної залози.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: *конц. д/р-ну д/ін'єк.:* загальна добова доза для дорослих не повинна перевищувати 1 г; початкова терапія при щоденному застосуванні: як в/в інфузія 15 мг/кг, або 600 мг/м², протягом 4 год. щодня до початку виникнення побічних ефектів, як в/в ін'єкція: повільне в/в (від 2 до 3 хв) введення 12 мг/кг, або 480 мг/м², на 1, 2 і 3-й день; якщо ознаки токсичності не спостерігаються, застосовувати 6 мг/кг, або 240 мг/м², на 5, 7 і 9 день; початкова терапія на щотижневій основі: повільне введення в/в 15 мг/кг, або 600 мг/м², 1 раз/тиждень; підтримуюча терапія: як тільки ремісія буде досягнута, або після зменшення побічних ефектів, а саме при подальшому збільшенні кількості лейкоцитів до 3000 - 4000/мкл, тромбоцитів до 80000 - 100000/мкл: 5-10 мг/кг або 200-400 мг/м² в/в раз на тиждень; колоректальний рак: в/в інфузії - добова доза 15 мг/кг маси тіла (600 мг/м² поверхні тіла), але не більше 1 г/інфузію; в/в ін'єкції: 12 мг/кг маси тіла (480 мг/м² поверхні тіла) щодня протягом 3 днів, при відсутності ознак токсичних ефектів можна продовжувати вводити препарат у дозі 6 мг/кг маси тіла (240 мг/м² поверхні тіла) у 5-й, 7-й і 9-й дні курсу; для підтримуючої терапії вводять у дозі 5-10 мг/кг маси тіла (200-400 мг/м² поверхні тіла) 1 раз/тиждень; рак молочної залози: у комбінації з іншими хіміопрепаратами в/в по 10-15 мг/кг маси тіла (400-600 мг/м² поверхні тіла) у 1-й і 8-й дні курсу тривалістю 28 діб; можна вводити шляхом безперервних 24-год. в/в інфузій, при цьому звичайна доза становить 8,25 мг/кг маси тіла (350 мг/м² поверхні тіла); *р-н д/ін'єк.:* при монотерапії 370-400 мг/м² ППТ (але в деяких випадках значно вищі дози) вводять з різними інтервалами, використовуючи різні способи введення; у комбінації з іншими цитостатиками фторурацил вводять (у більшості випадків) 500-600 мг/м² ППТ в/в у певний час за відповідною схемою комбінованої хіміотерапії; прогресуючий або метастатичний колоректальний рак - застосовують різні протоколи лікування та дозування; протокол з повторенням курсів лікування двічі на місяць: кожні два тижні протягом 2 послідовних днів (1 та 2 днів циклу) після в/в інфузії 200 мг/м² кальцію фолінату тривалістю 2 год. вводять болюсну ін'єкцію фторурацилу у дозі 400 мг/м² з подальшою інфузією фторурацилу у дозі 600 мг/м² протягом 22 год.; протокол з повторенням курсів лікування щотижня: 1 раз/тиждень після в/в інфузії 500 мг/м² кальцію фолінату тривалістю 2 год. вводять фторурацил у дозі 500 мг/м² шляхом в/в болюсної ін'єкції через годину після початку інфузії кальцію фолінату, цикл складається з 6 щотижневих процедур з подальшою перервою тривалістю 2 тижні; протокол з повторенням курсів лікування щомісяця: протягом 5 послідовних днів після введення болюсної ін'єкції кальцію фолінату (20 мг/м² ППТ) вводять фторурацил у дозі 425 мг/м² шляхом в/в болюсної ін'єкції; повторення курсу кожні 4-5 тижнів; ад'ювантна хіміотерапія раку товстої кишки на стадії III (T1-4 N1-2) після попереднього проведення лікувальної резекції первинної пухлини: протокол з повторенням курсів щотижня - 1 раз/тиждень протягом 6 тижнів після в/в інфузії кальцію фолінату (у дозі 500 мг/м² ППТ) тривалістю 2 год. вводять фторурацил у дозі 500 мг/м² ППТ шляхом в/в болюсної ін'єкції через годину після початку інфузії кальцію фолінату, рекомендується 6 циклів з 2-тижневим інтервалом між курсами лікування, незалежно від корекції доз або перерв у

лікуванні, яке не повинно тривати довше одного року; протокол лікування з низькою дозою фолінової кислоти - протягом 5 послідовних днів безпосередньо після болюсної ін'єкції кальцію фолінату (20 мг/м²) вводять фторурацил у дозі 425 мг/м² шляхом в/в болюсної ін'єкції протягом 6 циклів терапії, цикли терапії повторюються після 4 і 8 тижнів, а потім через кожні 5 тижнів; ад'ювантна хіміотерапія раку прямої кишки на стадіях II (Т3-4) і III (Т1-4 N1-2) після попереднього проведення лікувальної резекції первинної пухлини - під час променевої хіміотерапії фторурацил застосовують до початку променевої терапії в дозі 500 мг/м² ППТ шляхом в/в болюсної ін'єкції з 1-го по 5-й день на 1-му та 5-му тижні лікування, під час подальшої променевої терапії фторурацил застосовують в тій самій дозі з 1-го по 3-й день на 9-му та 13-му тижні лікування і потім на 4-му і 8-му тижні після завершення променевої терапії у дозі 450 мг/м² ППТ шляхом в/в болюсної ін'єкції з 1-го по 5-й день; прогресуючий рак підшлункової залози - монохіміотерапія у разовій добовій дозі 400-500 мг/м² ППТ шляхом в/в болюсної ін'єкції або у дозі 1000 мг/м² ППТ у вигляді в/в довготривалої інфузії; прогресуючий рак шлунка - монохіміотерапія або в рамках комбінованої хіміотерапії у разовій добовій дозі 500-600 мг/м² ППТ у вигляді в/в болюсної ін'єкції; прогресуючий рак стравоходу - у комбінації з цисплатином вводять шляхом 24-год. безперервної інфузії в дозі 1000 мг/м² ППТ з 1-го по 5-й день циклу лікування, повторюють кожні 3-4 тижні; метастатичний рак молочної залози - у складі комбінованої хіміотерапії шляхом в/в введення разової добової дози 500-600 мг/м² ППТ; ад'ювантна терапія первинного інвазивного раку молочної залози - в складі комбінованої хіміотерапії застосовують у разовій добовій дозі 500-600 мг/м² ППТ; Плоскоклітинний рак голови та шиї - неоперабельні місцевопрогресуючі пухлини у пацієнтів, які раніше не отримували лікування: у складі комбінованої променевої хіміотерапії (променева терапія плюс цисплатин/фторурацил) застосовують у дозі 1000 мг/м² ППТ шляхом 24-год. безперервної інфузії з 1-го по 5-й день курсу лікування (повторення курсу кожні 3-4 тижн.), локальний рецидив та віддалені метастази: залежно від загального стану та за наявності супутніх захворювань застосовують у дозі 1000 мг/м² площі поверхні тіла шляхом 24-год. безперервної інфузії з 1-го по 5-й день курсу лікування в комбінації з цисплатином, повторення курсу кожні 3 тижні, або з 1-го по 4-й день курсу лікування в поєднанні з карбоплатином, повторення курсу кожні 3 тижні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: пропасниця, інфекції, сепсис; мієлосупресія (один з дозолімітуючих побічних ефектів), нейтропенія та тромбоцитопенія (обидві від середнього до вкрай тяжкого ступеня тяжкості), лейкопенія, анемія, носові кровотечі, імуносупресія, фебрильна нейтропенія, агранулоцитоз, панцитопенія; імуносупресія зі збільшенням частоти інфекцій, генералізовані АР, анафілаксія, анафілактичний шок; гіперурикемія, сплутаність свідомості; ністагм, головний біль, запаморочення, симптоми хвороби Паркінсона, пірамідні симптоми, ейфорія, сонливість; дисгезія, периферична нейропатія, симптоми лейкоенцефалопатії, включаючи атаксію, що є оборотною після негайного припинення; проблеми з мовленням, г. мозочковий синдром, дизартрія, сплутаність свідомості, дезорієнтація, міастенія, афазія, судоми або кома у пацієнтів, які отримують високі дози, та у пацієнтів з дефіцитом дигідропіримідиндегідрогенази, гіперамоніємічна енцефалопатія; надмірна слюзотеча і стеноз слізних каналів, нечіткість зору, порушення руху очей, неврит зорового нерва, диплопія, зниження гостроти зору, світлобоязнь, кон'юнктивіт, запалення повік; ектропіон, спричинений утворенням рубців, та фіброз слізних залоз; порушення ЕКГ, характерні для ішемії, біль в грудній клітці, схожий на стенокардію, аритмія, ІМ, ішемія міокарда, міокардит, СН, дилатативна кардіоміопатія та кардіогенний шок, зупинка серця та раптової серцевий летальний наслідок, перикардит; гіпотонія, церебральна ішемія, ішемія кишкової та периферична ішемія, с-м Рейно, тромбоемболія, тромбоз, бронхоспазм; мукозит (стоматит, фарингіт, езофагіт, проктит), анорексія, водяниста діарея, нудота, блювання (можуть лікуватися за допомогою протиблювальних та протидіарейних засобів, відповідно), зневоднення, сепсис, шлунково-кишкові виразки та кровотеча, відторгнення некротичних мас; печінковий цитолітичний с-м, некрози печінки (часом летальні), склероз жовчних шляхів, холецистит; алопеція, повільне загоєння ран, дерматит, зміни шкіри (зокрема сухість шкіри, тріщини, ерозії, еритема, висипання), свербіж, фоточутливість, шкірні алергічні р-ції, пігментація, гіперпігментація або депігментація у вигляді смуг поблизу вен, зміни нігтів (наприклад дифузна поверхнева пігментація синього кольору, гіперпігментація, дистрофія нігтів), біль та потовщення нігтьової платини (пароніхія) та оніхоліз); с-м долонно-підшовної еритродизестезії; некроз носових кісток, м'язова слабкість; ниркова недостатність, гіперурикемія; підвищення рівня загального тироксину (Т₄) і загального трийодтироніну (Т₃) в сироватці крові без підвищення вільного Т₄ і тиреотропіну без клінічних ознак гіпертиреозу; порушення сперматогенезу та овуляції; виснаження, загальна астенія, втомлюваність, апатія, пропасниця; відзначалися поодинокі випадки збільшення протромбінового часу при комбінованому застосуванні фторурацилу і варфарину.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до фторурацилу або до будь-якого з компонентів препарату, значні відхилення кількості формених елементів у крові, пригнічення функції кісткового мозку, особливо після променевої терапії або лікування іншими протипухлинними препаратами, кровотечі, тяжкі порушення ф-ції печінки та/або нирок, тяжкі інфекційні захворювання (напр., оперізувальний лишай, вітряна віспа), стоматити, виразки слизової оболонки рота і ШКТ, псевдомембранозний ентероколіт, мієлосупресія, тяжка діарея, сильне виснаження (кахексія), рівень білірубіну у плазмі крові > 85 мкмоль/л, у період лікування фторурацилом необхідно уникати вакцинації живими вакцинами, період вагітності або годування груддю; не застосовується для лікування доброякісних пухлин; не застосовується одночасно з бривудином, соривудином або з їх аналогами.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ФТОРУРАЦИЛ-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл, 10мл у фл. в	50 мг/мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	

			конт. чар/уп.				
II.	5-ФТОРУРАЦИЛ "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ. (повний цикл виробництва)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (контроль/випробування серії)/Лабор Л + С АГ (контроль/випробування серії), Австрія/Австрія/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл, 10мл, 100мл в амп. та фл.	50 мг/мл	№1, №5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	5-ФТОРУРАЦИЛ "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ. (повний цикл виробництва)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (контроль/випробування серії)/Лабор Л + С АГ (контроль/випробування серії), Австрія/Австрія/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 20мл у фл.	50 мг/мл	№1	477,85	25,84/\$
	5-ФУ	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина	р-н д/ін'ек. по 5мл у фл.	50 мг/мл	№1	100,05	32,74/€
	5-ФУ	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина	р-н д/ін'ек. по 100мл у фл.	50 мг/мл	№1	1000,06	32,74/€
	5-ФУ	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина	р-н д/ін'ек. по 10мл у фл.	50 мг/мл	№1	150,08	32,74/€
	5-ФУ	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина	р-н д/ін'ек. по 20мл у фл.	50 мг/мл	№1	300,03	32,74/€
	ФЛУОРОУРАЦИЛ-ВІСТА	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина	р-н д/ін'ек. по 5мл у фл.	50 мг/мл	№1	185,00	28,71/€
	ФЛУОРОУРАЦИЛ-ВІСТА	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина	р-н д/ін'ек. по 10мл у фл.	50 мг/мл	№1	280,00	28,71/€
	ФЛУОРОУРАЦИЛ-ВІСТА	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина	р-н д/ін'ек. по 20мл у фл.	50 мг/мл	№1	460,00	28,71/€
	ФЛУРА-5	Венус Ремедіс Лімітед, Індія	р-н д/ін'ек. по 5мл у фл.	50 мг/мл	№1	55,18	22,99/\$
	ФЛУРА-5	Венус Ремедіс Лімітед, Індія	р-н д/ін'ек. по 10мл у фл.	50 мг/мл	№1	89,68	22,99/\$
	ФЛЮОРОУРАЦИЛ МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (виробник, що відповідає за вторинне пакування, маркування, контроль/випробування серії та за випуск серії)/Онкомед меньюфекчерінг, а.с. (виробник, що відповідає за випуск форми in bulk, маркування, перви, Німеччина/Чеська Республіка/Німеччина	р-н д/ін'ек. по 100мл у фл.	50 мг/мл	№1	1075,29	
	ФЛЮОРОУРАЦИЛ МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (виробник, що відповідає за вторинне пакування, маркування,	р-н д/ін'ек. по 5мл у фл.	50 мг/мл	№1	112,38	28,09/€

	контроль/випробування серії та за випуск серії)/Онкомед меньюфекчерінг, а.с. (виробник, що відповідає за випуск форми in bulk, маркування, перви, Німеччина/Чеська Республіка/Німеччина					
ФЛЮОРОУРАЦИЛ МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за вторинне пакування, маркування, контроль/випробування серії та за випуск серії)/Онкомед меньюфекчерінг, а.с. (виробник, що відповідає за випуск форми in bulk, маркування, перви, Німеччина/Чеська Республіка/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 10мл у фл.	50 мг/мл	№1	215,06	30,72/€
ФЛЮОРОУРАЦИЛ МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за вторинне пакування, маркування, контроль/випробування серії та за випуск серії)/Онкомед меньюфекчерінг, а.с. (виробник, що відповідає за випуск форми in bulk, маркування, перви, Німеччина/Чеська Республіка/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 20мл у фл.	50 мг/мл	№1	399,39	30,72/€
ФТОРУРАЦИЛ АККОРД	Аккорд Хелскеа Лімітед(відповідальний за випуск серії; вторинне пакування)/Інтас Фармасьютікалс Лімітед (виробництво, контроль якості, первинне та вторинне пакування), Велика Британія/Індія	р-н д/ін'єк. по 5мл, 10мл, 20мл, 50мл, 100мл у фл.	50 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Цитарабін (Cytarabine) ***

Фармакотерапевтична група: L01BC01 - Антинеопластичні засоби. Антиметаболіти. Структурні аналоги піримідину.

Основна фармакотерапевтична дія: антибластичний засіб, що пригнічує синтез ДНК; також має антивірусні та імуносупресорні властивості; основною дією - пригнічення синтезу дезоксицитидину (як антиметаболіт, що залежить від клітинного циклу, він пригнічує синтез ДНК під час S-фази мітозу), хоча пригнічення цитидилових кіназ та включення сполуки до нуклеїнових кислот можуть також відігравати роль у цитостатичній та цитотоксичній дії; завдяки своїй цитотоксичній дії викликає, дозозалежне руйнування клітин у проліферуючих тканинах.

Показання для застосування ЛЗ: досягнення та підтримка ремісії при г. нелімфобластних лейкозах у дорослих^{БНФ} та дітей; г. лімфоцитарний лейкоз, хр.мієлобластний лейкоз^{ВООЗ,БНФ} (бластний криз); профілактика, лікування лейкозного менінгіту^{ВООЗ,БНФ} інтратекально у вигляді монотерапії або у комбінації з іншими препаратами (метотрексат, гідрокортизон); монотерапія або у комбінації з іншими антинеопластичними засобами, кращі результати зазвичай досягаються при комплексному лікуванні; лейкоз з високим ризиком ускладнень, рефрактерний лейкоз та рецидив г. лейкозу незалежно від супутнього застосування протипухлинних хімотерапевтичних засобів високими дозами препарату; у складі комбінованої терапії (LSA2L2) неходжкінських лімфом у дітей^{ВООЗ,БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати у комбінації з іншими цитотоксичними засобами, використовуючи різні схемами дозування; можна вводити шляхом в/в інфузії або ін'єкції, п/ш (лише р-н для ін'єк. з концентрацією 20 мг/мл) або інтратекально; стандартна доза для п/ш - 20-100 мг/м² поверхні тіла залежно від показань та режиму дозування; дозування для дорослих, індукція ремісії при тривалому застосуванні:

рекомендована доза для болюсної ін'єкції - 2 мг/кг маси тіла на добу протягом 10 днів; у разі відсутності терапевтичного ефекту та появи ознак токсичності дозу можна збільшити до 4 мг/кг маси тіла на добу, застосування такої дози можна продовжувати до появи терапевтичної відповіді або ознак токсичності; дозу 0,5-1 мг/кг маси тіла на добу можна вводити шляхом інфузії протягом не більше 24 год.; ч/з 10 днів дозу можна збільшити максимум до 2 мг/кг маси тіла на добу та застосовувати до появи ознак токсичності або до досягнення ремісії; переривчаста терапія: в/в протягом 5 днів поспіль у дозах 3-5 мг/кг маси тіла на добу, лікування повторюють після перерви, що триває 2 - 9 днів; такий режим лікування слід продовжувати до появи ознак токсичності або досягнення ремісії; стандартну дозу можна поступово збільшити, якщо немає ознак токсичності і не спостерігається ремісія за умов стандартного режиму дозування; підтримуюче дозування - ремісію, що була досягнута із застосуванням цитарабіну та/або інших препаратів, можна підтримувати, застосовуючи 1-2 в/в або п/ш введення на тиждень у дозі 1 мг/кг маси тіла; при хіміотерапії високими дозами вводять із розрахунку 2-3 г/м² поверхні тіла шляхом в/в інфузії тривалістю 1-3 год. кожні 12 год. протягом 1-6 днів; застосування у вигляді монотерапії шляхом інтратекального введення або у комбінації з метотрексатом (15 мг/м²) та гідрокортизоном (15 мг/м²) залежить від конкретного випадку; дози цитарабіну, що застосовують при монотерапії з інтратекальним введенням, знаходяться у межах від 5 до 75 мг/м² і зазвичай становлять 30 мг/м² кожні 4 дні, поки показники спинномозкової рідини не досягнуть норми (з наступним додатковим лікуванням); терапія неходжкінських лімфом у дітей та дорослих - застосовують різні схеми лікування, залежно від стадії захворювання і гістологічного типу пухлини.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: побічні ефекти при лікуванні цитарабіном є дозозалежними; анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія, мегалобластоз, а також зниження кількості ретикулоцитів; вірусні, бактеріальні, грибові, паразитичні або сапрофітні інфекційні ураження будь-якої локалізації; с-м цитарабіну (гарячка, міалгія, біль у кістках, зрідка болі у грудній клітці, макулопапульозний висип, кон'юнктивіт та загальна слабкість); сепсис, утворення целюліту у місці ін'єкції, абсцес печінки; лентіго; пригнічення ф-ції кісткового мозку, анемія, мегалобластоз, лейкопенія, гранулоцитопенія, тромбоцитопенія, ретикулоцитопенія, кровотечі; алергічний набряк, анафілаксія; анорексія, гіперурикемія; перикардит, синусова брадикардія, аритмія; нейротоксичність, неврит, запаморочення, головний біль; дисфункція головного мозку і мозочка з такими проявами як сплутаність свідомості, дизартрія, ністагм, судомні напади (при інтратекальному введенні), периферична нейропатія, нейротоксичність; параплегія, некротизуюча лейкоенцефалопатія, квадриплегія (при інтратекальному введенні); оборотний геморагічний кон'юнктивіт (з такими проявами як фотофобія, печія або біль в очах, порушення зору, виражена сльозотеча; може супроводжуватися висипом), кератит; пневмонія, задишка, інтерстиціальний пневмоніт, раптовий респіраторний дистрес-синдром, який прогресує до набряку легенів, біль у горлі; запалення або утворення виразок у ротовій порожнині та анусі, запалення слизових оболонок, утворення виразок у стравоході, стоматит, анорексія, дисфагія, абдомінальний біль, нудота, блювання, діарея, езофагіт, кістозний пневматоз кишечника, некротизуючий коліт, перфорація ШКТ, нудота, блювання після інтратекального застосування, перитоніт; ниркова недостатність, затримка сечі; еритема, бульозний дерматит, кропив'янка, васкуліт, алопеція (оборотні), пігментація шкіри, панікуліт у місці ін'єкції, виразки на шкірі, свербіж, печіння і біль у долонях і підшвах, нейтрофільний екзокринний гідраденіт; міалгія, артралгія, інколи рабдоміоліз; біль у грудях, гарячка, тромбоз флебіт у місці ін'єкції, гіперурикемія, підвищення рівнів печінкових ферментів (оборотні), печінкова дисфункція, жовтяниця; при інтратекальному введенні - нудота, блювання, гарячка, системна токсичність; при високих дозах - гематологічна токсичність (панцитопенія), сепсис, інтерстиціальний пульмоніт; порушення концентрації, дизартрія, атаксія, тремор, ністагм, головний біль, сплутаність свідомості, запаморочення, кома, абсцеси печінки, пошкодження печінки з гіпербілірубінемією, с-м Бадда-Кіарі (тромбоз печінкових вен) та панкреатит, токсична дія на рогівку, геморагічний кон'юнктивіт, кардіоміопатія з летальним наслідком, шкірний висип із подальшою десквамацією, алопеція, можливі аменорея та азооспермія.

Противопоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; медикаментозне пригнічення діяльності кісткового мозку (за умов оцінки ризику та очікуваної користі); вагітність, лактація; розчинник, що містить бензиловий спирт як консервант, не можна використовувати для відновлення ліофілізату у таких випадках: в/в лікування високими дозами, інтратекальне лікування і лікування немовлят, лікування дітей віком до 3 років.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АЛЕКСАН®	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (повний цикл виробництва)/Лабор ЛС СЕ & Ко.КГ (тестування)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (тестування), Австрія/Німеччина/Австрія	р-д д/ін'єк. та інфуз. по 5мл у фл.	20 мг/мл	№1	172,79	25,60/\$
	АЛЕКСАН®	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (повний цикл виробництва)/Лабор ЛС СЕ & Ко.КГ (тестування)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ	р-д д/ін'єк. та інфуз. по 40мл у фл.	50 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	(тестування), Австрія/Німеччина/Австрія					
АЛЕКСАН®	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (повний цикл виробництва)/Лабор ЛС СЕ & Ко.КГ (тестування)/МППЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (тестування), Австрія/Німеччина/Австрія	р-д д/ін'єк. та інфуз. по 10мл у фл.	50 мг/мл	№1	330,80	25,60/\$
АЛЕКСАН®	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (повний цикл виробництва)/Лабор ЛС СЕ & Ко.КГ (тестування)/МППЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (тестування), Австрія/Німеччина/Австрія	р-д д/ін'єк. та інфуз. по 20мл у фл.	50 мг/мл	№1	705,67	25,60/\$
ЦИТАРАБІН	Венус Ремедіс Лімітед, Індія	р-д д/ін'єк. по 1мл, 10мл у фл.	100 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦИТОЗАР®	Актавіс Італія С.п.А., Італія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000мг	№1	856,60	26,77/\$
ЦИТОЗАР®	Актавіс Італія С.п.А., Італія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	100мг	№1	481,84	26,77/\$

19.1.3. Лікарські засоби рослинного походження, в т.ч. напівсинтетичні

• **Вінкристин (Vincristine) ***

Фармакотерапевтична група: L01CA02 - антинеопластичні засоби; алкалоїди рослинного походження та інші препарати природного походження.

Основна фармакотерапевтична дія: алкалоїд рослини барвінку (*Vinca rosea* Linn); антибластомна та цитотоксична дія вінкристину пов'язана з порушенням утворення мікротрубочок та мітотичного веретена, а також порушенням синтезу ДНК та РНК у клітинах.

Показання для застосування ЛЗ: г. лейкози^{ВООЗ, БНФ}, лімфогранулематоз^{ВООЗ}, неходжкінські лімфоми (всі гістологічні підтипи і клінічні стадії)^{ВООЗ, БНФ}, ретикулосаркома, лімфосаркома, ембріональна рабдоміосаркома^{ВООЗ}, нейро-ектодермальні пухлини (медулобластома, нейробластома^{ВООЗ}), пухлина Вільмса^{ВООЗ}, саркома Юінга^{ВООЗ}, саркоми кісток, рак молочної залози, дрібноклітинний рак легенів^{БНФ}, множинна міелома, ретинобластома, ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура при резистентності до спленектомії і короткострокового лікування адренкортикостероїдами.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити винятково в/в; при застосуванні як монотерапії вводити з інтервалом в 1 тижд., при застосуванні у комбінації з іншими протипухлинними препаратами частота введення залежить від протоколу; дорослим: 1,4 мг/м²-1,5 мг/м² поверхні тіла 1 р/тижд.; максимальна доза - 2 мг/м²; тривалість курсу лікування - 4-6 тижнів, курсова доза не має перевищувати 10—12 мг/м²; діти: 1,4—2 мг/м² поверхні тіла 1 раз/тиждень, дозу препарату для дітей розраховують з урахуванням маси тіла: для дітей з масою 10 кг і менше початкова доза має становити 0,05 мг/кг 1 раз/тиждень.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: вторинні злоякісні новоутворення у пацієнтів, які одержували вінкристин у комбінації з іншими цитотоксичними препаратами з доведеною канцерогенністю; оборотний тромбоцитоз, тяжке пригнічення ф-ції кісткового мозку, анемія, лейкопенія і тромбоцитопенія; р-ції гіперчутливості, включаючи анафілаксію, анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк, алергічні реакції; задишка, бронхоспазм, гостра дихальна недостатність; неврологічна токсичність, невралгія і міалгія (в т. ч. невралгія трійчастого нерва і тестикулярний больовий с-м, біль у гортані, слинних залозах, кістках, спині, кінцівках), кома, обвисла ступня, дизурія, периферична нейропатія (змішана сенсорно-моторна), сенсорні порушення, парестезії, втрата глибоких сухожильних рефлексів, порушення ходи, хода з шарканням, м'язова слабкість, атаксія, параліч, ураження черепно-мозкових нервів (парез/параліч), слабкість м'язів гортані, хрипкість і парез голосових зв'язок (у т. ч. потенційно небезпечний для життя двобічний парез голосових зв'язок), птоз, невропатія зорового нерва, екстраокулярна нейропатія, минуща сліпота, диплопія та атрофія зорового нерва, судоми з гіпертензією, лейкоенцефалопатія, токсичний вплив на центральну нервову систему, що може проявлятися депресією, збудженням, порушення сну, безсонням, сплутаністю свідомості, психозами і галюцинаціями, загострення супутніх неврологічних захворювань; вестибулярні і слухові ускладнення з боку 8 пари черепно-мозкових нервів (часткова або тотальна глухота - постійна або яка виникає періодично; проблеми з рівновагою, включаючи запаморочення, ністагм і вертиго; стенокардія та ІМ (у хворих, які одержували комбіновану хімотерапію, що включала вінкристин і яким раніше застосовували опромінення середостіння), АГ та гіпотензія, аритмія; бронхоспазм і задишка; нудота, блювання, афтозний стоматит, виразки у ротовій порожнині, запори, спазми та біль у животі, зниження апетиту, втрата маси тіла, анорексія, діарея, паралітичний ілеус (особливо у дітей), запалення слизової оболонки рота, кишковий некроз та/чи перфорації, панкреатит; функціональна кишкова непрохідність (парез кишечника), особливо у маленьких дітей; венооклюзивна хвороба печінки (особливо у дітей), підвищення рівня печінкових ферментів; алопеція (оборотна після припинення

застосування вінкристину), висипання; поліурія, дизурія і затримка сечі як результат атонії сечового міхура, гіперурикемія, сечокисла нефропатія, СНСАГ с-м (с-м неналежної секреції антидіуретичного гормону), нетримання сечі; необоротна безплідність після хіміотерапевтичного лікування із застосуванням вінкристину є більш поширеною у чоловіків, ніж у жінок; азооспермія, аменорея; подразнення у місці ін'єкції, відчуття печіння, еритема, гарячка, флебіт, біль, целюліт, некроз, головний біль, слабкість.

Протипоказання до застосування ЛЗ: інтратекальне застосування препарату заборонено; підвищена чутливість до вінкристину сульфату або до однієї з допоміжних речовин, демієлінізуюча форма с-му Шарко-Марі, г. порушення ф-ції печінки, мієлосупресія (пригнічення кісткового мозку), неврологічні захворювання, запори та непрохідність кишечника (особливо у дітей), променева терапія на ділянку печінки, нейро'язові розлади, бактеріальні та вірусні інфекції; не можна вводити під час або безпосередньо після введення вакцин, що містять живі віруси.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ВІНКРИСТИН-МІЛІ	Венус Ремедіс Лімітед, Індія	р-д д/ін'єк. по 1мл у фл.	1 мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВІНКРИСТИН-МІЛІ	Венус Ремедіс Лімітед, Індія	р-д д/ін'єк. по 1мл у фл.	1 мг/мл	№1	111,00	26,70/\$
	ВІНКРИСТИН-ТЕВА	Фармахеми Б.В., Нідерланди	р-д д/ін'єк. по 5мл у фл.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВІНКРИСТИН-ТЕВА	Фармахеми Б.В., Нідерланди	р-д д/ін'єк. по 1мл у фл.	1 мг/мл	№1	104,78	27,22/\$
	ВІНКРИСТИН-ТЕВА	Фармахеми Б.В., Нідерланди	р-д д/ін'єк. по 2мл у фл.	1 мг/мл	№1	194,59	27,22/\$

● **Вінорельбін (Vinorelbine) ***

Фармакотерапевтична група: L01CA04 - антинеопластичні засоби; алкалоїди рослинного походження та інші препарати природного походження.

Основна фармакотерапевтична дія: алкалоїд барвінку з молекулярною дією, направленою на динамічну рівновагу тубуліну у мікротубулярному апараті клітин; інгібує полімеризацію тубуліну і зв'язує переважно мітотичні мікротубули, у високих дозах впливає на аксональні мікротубули; блокує мітоз на G2-M фазі, внаслідок чого спричиняє загибель клітин у інтерфазі або при продовженні мітозу.

Показання для застосування ЛЗ: монотерапія для пацієнтів з метастазуючим раком молочної залози^{БНФ} (IV стадія), після неефективної хіміотерапії, яка включала антрациклін чи таксани, або якщо така хіміотерапія не підходить для лікування; недрібноклітинний рак легень III, IV стадії^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: інтратекальне введення не допускається; вводити лише в/в шляхом повільного болюсного вливання (5-10 хвилин), після розведення у 20-50 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду чи 5 % р-ну глюкози або короткою інфузією (протягом 20-30 хвилин) після розведення у 125 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду чи 5 % розчину глюкози; після закінчення введення препарату необхідно провести інфузію як мінімум 250 мл 0,9 % розчину натрію хлориду з метою очищення вени від залишків препарату.; вводити в дозі 25-30 мг/м² поверхні тіла 1 раз/тиждень; при застосуванні у комбінації з ін. цитостатичними засобами точну дозу вінорельбіну визначати згідно з протоколом лікування, але зазвичай вводити у такій самій дозі (25-30 мг/м² поверхні тіла), але через більші проміжки часу, наприклад у 1-й і 5-й дні або 1-й і 8-й дні курсу тривалістю 3 тижні; поширений або метастатичний рак молочної залози: 25-30 мг/м² поверхні тіла 1 раз/тиждень, максимальна разова доза - 35,4 мг/м² поверхні тіла.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР (реакції з боку шкіри, р-ції з боку дихальних шляхів); системні алергічні р-ції (анафілаксія, анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк, анафілактоїдні р-ції; бактеріальні, вірусні або грибкові інфекції різної локалізації; тяжкий сепсис із недостатністю внутрішніх органів; септицемія; ускладнена септицемія, летальна септицемія; нейтропенічний сепсис (з потенційним летальним результатом); пригнічення функції кісткового мозку, що проявляється переважно нейтропенією (ступінь III: 24,3 %, та ступінь IV: 27,8 % при монотерапії), анемія (ступінь III-IV: 7,4 % при монотерапії), лейкопенія; тромбоцитопенія (ступінь III-IV: 2,5 %), фебрильна нейтропенія, нейтропенічний сепсис із потенційним летальним результатом у 1,2 % випадків), панцитопенія; гіпонатріємія; синдром неадекватної секреції антидіуретичного гормону (СНСАДГ), анорексія; неврологічні порушення (ступінь III: 2,6 %; С4: 0,1 %), запор (ступінь III - IV: 2,7 % при монотерапії, ступінь III - IV: 4,1 % при комбінованій терапії), зниження глибоких сухожильних рефлексів; парестезія з сенсорними і моторними симптомами; паралітична непрохідність кишечника, слабкість нижчих кінцівок; синдром Гійєна-Барре; ішемічні захворювання серця, подібні до стенокардії, транзиторні зміни електрокардіограми, ІМ іноді з летальним наслідком; тхікардія, відчуття серцебиття і порушення ритму серця; артеріальна гіпотензія, АГ, відчуття припливів і відчуття холоду в кінцівках; тяжка гіпотензія, колапс; задишка, бронхоспазм (ці р-ції можуть виникати як через кілька хвилин після введення препарату, так і через кілька годин); інтерстиціальне захворювання легень іноді зі смертельним результатом; дихальна недостатність; блювання (ступінь III-IV: 2,2 % при монотерапії), діарея, стоматит, езофагіт, анорексія; паралітична непрохідність кишечника; панкреатит; патологічні показники ф-ції печінки без кланічних симптомів (підвищення рівня загального білірубину, ЛФ, АСТ, АЛТ); алопеція; р-ції з боку шкіри (висипання, свербіж, кропив'янка, еритема з локалізацією на долонях і підшвах); міалгія, артралгія; біль у щелепі; підвищення рівня креатиніну; підвищена втомлюваність, гарячка, біль різної локалізації (зокрема біль у грудях та біль у місці пухлини), почервоніння у місці ін'єкції, астенія, біль у місці

ін'єкції, відчуття печіння у місці ін'єкції, порушення пігментації у місці ін'єкції, флебіт у місці ін'єкції; некроз у місці ін'єкції, целюліт.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до вінорельбіну або до інших алкалоїдів барвінку, або до будь-якої з допоміжних речовин; інтратекальне введення; кількість нейтрофілів $<1500/\text{мм}^3$ тяжка наявна або нещодавно перенесена інфекція (протягом останніх 2 тижнів); к-ть тромбоцитів $<100\ 000/\text{мм}^3$ ($100 \times 10^9/\text{л}$); тяжка печінкова недостатність, не пов'язана з процесом розвитку пухлини; комбіноване застосування з вакциною проти жовтої гарячки; пацієнти репродуктивного віку, які не користуються ефективними контрацептивними засобами; вагітність, період годування груддю; не рекомендується у поєднанні з іншими живими атенуєваними вакцинами, у комбінації з фенітоїном та ітраконазолом.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ВЕЛБІМЕДА	Актавіс Італі С.п.А., Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	10 мг/мл	№1	2355,60	28,89/€
	ВЕЛБІМЕДА	Актавіс Італі С.п.А., Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 1мл у фл.	10 мг/мл	№1	644,30	28,89/€
	ВІНОРЕЛЬБІН - ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А./Сіндан Фарма С.Р.Л., Італія/Румунія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	10 мг/мл	№1	1999,91	23,77/\$
	ВІНОРЕЛЬБІН - ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А./Сіндан Фарма С.Р.Л., Італія/Румунія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 1мл у фл.	10 мг/мл	№1	649,92	23,77/\$
	ВІНОРЕЛЬБІН "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (повний цикл виробництва)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (тестування)/Лабор ЛС СЕ & Ко.КГ (тестування), Австрія/Австрія/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 1мл у фл.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ВІНОРЕЛЬБІН "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (повний цикл виробництва)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (тестування)/Лабор ЛС СЕ & Ко.КГ (тестування), Австрія/Австрія/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	10 мг/мл	№1	1495,70	27,69/\$
	НАВІРЕЛ	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (пакування, маркування та випуск серії)/онкомед меньюфекчерінг а.с. (виробництво "in bulk", контроль серій), Німеччина/Чеська Республіка	конц. д/приг. р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	10 мг/мл	№1	2346,05	27,93/€
	НАВІРЕЛ	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (пакування, маркування та випуск серії)/онкомед меньюфекчерінг а.с. (виробництво "in bulk", контроль серій), Німеччина/Чеська Республіка	конц. д/приг. р-ну д/інфуз. по 1мл у фл.	10 мг/мл	№1	469,21	27,93/€

• **Доцетаксел (Docetaxel) ***

Фармакотерапевтична група: L01CD02 - антинеопластичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: сприяє об'єднанню тубуліну у стабільні мікротрубочки та інгібуванні їхнього розпаду, що веде до значного зниження рівня вільного тубуліну; зв'язування доцетакселу з мікротрубочками не

змінює кількість протофіламентів; порушує мікротубулярну мережу, яка відіграє важливу роль для реалізації вітальних функцій клітини під час мітозу та в інтерфазі; показав цитотоксичність щодо різних пухлинних клітин, а також до клітин щойно видалених пухлин; досягає значних концентрацій у міжклітинній рідині і забезпечує високу тривалість життя клітин; виявляє активність щодо деяких (хоча і не всіх) клітинних ліній, у яких відбувається експресія р-глікопротеїну, що кодується геном медикаментозної полірезистентності.

Показання для застосування ЛЗ: у комбінації з доксорубіцином і циклофосфамідом для ад'ювантної терапії хворих з операбельним раком молочної залози з/без ураження лімфовузлів^{БНФ}; у комбінації з доксорубіцином для лікування хворих з місцевопрогресуючим або метастатичним раком молочної залози^{БНФ}, які раніше не отримували цитотоксичну терапію з приводу цього захворювання; як монотерапія для лікування хворих з метастатичним раком молочної залози після неефективної цитотоксичної терапії, яка включала антрациклін або алкілувальний препарат^{БНФ}; у комбінації з трастузумабом для лікування хворих з метастатичним раком молочної залози з підвищеною експресією HER-2 пухлинними клітинами^{БНФ}, які раніше не отримували хіміотерапію з приводу метастазів; у комбінації з капецитабіном для лікування хворих з місцевопрогресуючим або метастатичним раком молочної залози після неефективної терапії, яка включала антрациклін^{БНФ}; лікування хворих з місцевопрогресуючим або метастатичним недрібноклітинним раком легень після неефективної хіміотерапії, у комбінації з цисплатиною лікування хворих з неоперабельним, місцевопрогресуючим або метастатичним недрібноклітинним раком легень^{БНФ}, якщо попередня хіміотерапія з приводу цього стану не проводилася; у комбінації з преднізоном або преднізолоном для лікування хворих з метастатичним, стійким до кастрації раком передміхурової залози^{БНФ}; у комбінації з андроген-деприваційною терапією (АДТ), з преднізоном або преднізолоном чи без них, показаний для лікування пацієнтів із метастатичним гормоночутливим раком передміхурової залози^{БНФ}; у комбінації з цисплатином і 5-фторурацилом для лікування хворих з метастатичною аденокарциномою шлунка, в тому числі аденокарциномою гастроезофагального відділу^{БНФ}, які попередньо не отримували хіміотерапію з приводу метастазів; у комбінації з цисплатином та 5-фторурацилом для індукційної терапії хворих на місцевопрогресуючу сквамозно-клітинну карциному голови та шиї^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити інфузійно протягом 1 год. кожні 3 тижні; для ад'ювантної терапії операбельного раку молочної залози з/без ураження лімфатичних вузлів рекомендована доза доцетакселу - 75 мг/м², яку вводять ч/з 1 год. після застосування доксорубіцину (50 мг/м²) та циклофосфаміду (500 мг/м²) кожні 3 тижні, всього 6 циклів; для лікування місцевопрогресуючого або метастатичного раку молочної залози доза доцетакселу для монотерапії - 100 мг/м²; як терапію першої лінії доцетаксел 75 мг/м² застосовують у комбінації з доксорубіцином (50 мг/м²); у комбінації з трастузумабом (щотижня) застосовують у рекомендованій дозі 100 мг/м² кожні 3 тижні; у комбінації з капецитабіном (1250 мг/м² 2 р/день протягом 2 тижн. з подальшою 1-тижн. перервою) застосовують в дозі 75 мг/м² кожні 3 тижні; при лікуванні пацієнтів з недрібноклітинним раком легень, які раніше не отримували хіміотерапію, доза 75 мг/м², одразу після чого вводять цисплатин 75 мг/м² протягом 30-60 хв.; пацієнтам, у яких раніше хіміотерапія препаратами на основі платини виявилася неуспішною, монотерапія доцетакселом у дозі 75 мг/м²; метастатичний кастраційно-резистентний рак передміхурової залози: рекомендована доза доцетакселу - 75 мг/м², при цьому безперервним курсом призначається також преднізон або преднізолон 5 мг 2 р/день р/ос; метастатичний гормоночутливий рак передміхурової залози: рекомендована доза доцетакселу становить 75 мг/м² кожні 3 тижні протягом 6 циклів, преднізон або преднізолон можуть прийматися безперервно по 5 мг перорально 2 рази н/добу; аденокарцинома шлунка: рекомендована доза доцетакселу - 75 мг/м², яку вводять інфузійно протягом 1 год., після чого призначають цисплатин 75 мг/м² інфузійно протягом 1-3 год. (обидва препарати застосовують лише в 1-й день циклу); негайно після закінчення введення цисплатину починають інфузію 5-фторурацилу (750 мг/м²/добу), що продовжується безперервно 5 діб; цикл повторюється кожні 3 тижні; для індукційної хіміотерапії неоперабельної місцевопрогресуючої сквамозноклітинної плоскоклітинної карциноми голови та шиї (СККГШ) доза - 75 мг/м², що вводиться інфузійно протягом 1 год., одразу після чого в 1-й день циклу призначають цисплатин 75 мг/м² інфузійно протягом 1-3 год.; негайно після закінчення введення цисплатину починають інфузію 5-фторурацилу (750 мг/м²/добу), яка продовжується безперервно 5 діб; у такому режимі препарати призначають кожні 3 тижні протягом 4 циклів; для індукційної хіміотерапії місцевопрогресуючої СККГШ (технічно нерезектабельної, з низькою імовірністю проведення хірургічного лікування або необхідністю застосування органозберігаючого підходу) рекомендована доза - 75 мг/м², яку вводять інфузійно протягом 1 год., одразу після чого в 1-й день циклу призначають цисплатин 100 мг/м² інфузійно протягом 0,5-3 год.; негайно після закінчення введення цисплатину починають інфузію 5-фторурацилу (1000 мг/м²/добу), яка продовжується безперервно 4 доби; в такому режимі препарати призначають кожні 3 тижні протягом 3 циклів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: Зведені дані профілю безпеки препарату для всіх показань: р-ції гіперчутливості, як правило, розвиваються протягом декількох хв. після початку інфузії доцетакселу і за ступенем тяжкості коливалися від легких до помірних (почервоніння шкіри, висипання (зі свербжем шкіри або без нього), відчуття стиснення у грудях, біль у спині, задишка, гарячка або озноб, артеріальна гіпотензія і/або бронхоспазм або генералізовані висипання/еритеми); розвиток тяжких периферійних нейротоксичних р-цій вимагає зменшення дози препарату, парестезія, дизестезія або больові відчуття, в тому числі відчуття печіння; загальна слабкість; висипання, в тому числі локалізовані на стопах та кистях рук (включаючи тяжкий долонно-подошовний синдром), а також на руках, обличчі або грудній клітці, свербіж, р-ції у місці введення препарату; інфекційні захворювання (у тому числі сепсис і пневмонія, летальні - у 1,7 % випадків), інфекції, асоційовані з нейтропенією, нейтропенія, анемія, фебрильна нейтропенія, тромбоцитопенія, периферична сенсорна нейропатія, периферична моторна нейропатія, дисгевзія; аритмія, СН; артеріальна гіпотензія, АГ, геморагічні ускладнення; задишка; стоматит, діарея, нудота, блювання, запори, біль у животі, шлунково-кишкові кровотечі; алопеція; шкірні р-ції, ураження нігтів, міалгія, артралгія; периферичні набряки, рідше - плевральний чи перикардальний випіт, асцит та збільшення маси тіла, затримка рідини в організмі, астенія, біль, гарячка; підвищений рівень білірубину крові, ЛФ, АЛТ, АСТ; безсоння, головний біль, підвищена сльозоточивість, кон'юнктивіт; біль у кістках; біль у спині; носові кровотечі; фаринголарингеальний біль; назофарингіт, оніхолісис. Дані постмаркетингового спостереження: випадки розвитку другого первинного злоякісного захворювання, пригнічення ф-ції кісткового мозку та інші гематологічні побічні ефекти, розвиток с-му дисемінованого

внутрішньосудинного згортання крові, часто в асоціації із сепсисом або поліорганною недостатністю, анафілактичний шок (іноді летальний), рідкісні випадки розвитку судом або минулої втрати свідомості під час інфузії препарату, випадки минулих порушень зору (спалахи, миготіння світла перед очима, скотоми), випадки кістоподібного набряку макули (КНМ), ототоксичність, погіршення і/або втрати слуху, ІМ; у комбінованих схемах разом з доксорубіцином, 5-фторурацилом та/або циклофосфамідом, повідомлялося про випадки розвитку шлуночкових аритмій, в тому числі шлуночкової тахікардії (частота невідома), іноді летальної; розвиток венозних тромбоемболічних порушень; гострий респіраторний дистрес-синдром, інтерстиціальної пневмонії/пневмоніту, інтерстиціальне захворювання легень, фіброз легень та дихальної недостатності, які іноді були летальними; ентероколіт, коліту, ішемічний коліт та нейтропенічний ентероколіт, розвиток кишкової непрохідності та обструкції кишечника; дисфункції нирок та ниркова недостатність, випадки т. шкірних побічних р-цій, таких як с-м Стівенса – Джонсона, токсичний епідермальний некроліз та гострий генералізований екзентематозний пустульоз; гіпонатріємія, гіпомагніємія та гіпокальціємія; міозит.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-яких допоміжних речовин, вихідний рівень нейтрофілів <1500 клітин/мм³, тяжкі порушення ф-ції печінки; враховувати протипоказання для застосування інших ЛЗ, які призначаються в комбінації.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ДОЦЕТАКСЕЛ-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. по 0,5мл, 2мл, 3мл у фл. в конт. чар/уп. з розч.	40 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	ДОКСТОРЕД	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд (Виробничий відділ - 7), Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 4мл у фл.	20 мг/мл	№1	1100,00	28,18/\$
	ДОКСТОРЕД	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд (Виробничий відділ - 7), Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 1мл у фл.	20 мг/мл	№1	450,00	28,18/\$
	ДОЦЕТ	Венус Ремедіс Лімітед, Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 0,5мл, 2мл, 3мл у фл. з розч.	40 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДОЦЕТАКСЕЛ	МАЙЛАН ЛАБОРАТОРІЗ ЛІМІТЕД (OTL), Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 0,5мл, 2мл у фл. з розч.	40 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДОЦЕТАКСЕЛ	РУП "Белмедпрепарати", Республіка Білорусь	конц. д/р-ну д/інфуз. по 2мл у фл.	20 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДОЦЕТАКСЕЛ	РУП "Белмедпрепарати", Республіка Білорусь	конц. д/р-ну д/інфуз. по 4мл у фл.	20 мг/мл	№1	1158,08	27,01/\$
	ДОЦЕТАКСЕЛ	РУП "Белмедпрепарати", Республіка Білорусь	конц. д/р-ну д/інфуз. по 1мл у фл.	20 мг/мл	№1	361,45	27,01/\$
	ДОЦЕТАКСЕЛ "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 2мл, 8мл, 16мл у фл.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДОЦЕТАКСЕЛ АККОРД	Інтас Фармасьютікалс Лімітед (виробництво, контроль якості, первинне та вторинне пакування)/Аккорд Хелскеа Лімітед (вторинне пакування; відповідальний за випуск серії)/Фармадокс Хелскер Лтд. (контроль якості серії)/Весслінг Хангері Кфт. (контроль якості с, Індія/Велика Британія/Мальта/Угорщина/Польща	конц. д/р-ну д/інфуз. по 1мл, 4мл, 8мл у фл.	20 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

ДОЦЕТАКСЕЛ АМАКСА	АкВіда ГмБХ (контроль серії, сертифікація та випуск серії; первинне та вторинне пакування, виробництво in bulk)/Венус Фарма ГмБХ (вторинне пакування)/Самянг Біофармас'ютікелз Корпорейшн (виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль серії), Німеччина/Німеччина/Республіка Корея	конц. д/р-ну д/інфуз. по 1мл, у фл.	20 мг/мл	№1	1207,04	29,02/€
ДОЦЕТАКСЕЛ АМАКСА	АкВіда ГмБХ (контроль серії, сертифікація та випуск серії; первинне та вторинне пакування, виробництво in bulk)/Венус Фарма ГмБХ (вторинне пакування)/Самянг Біофармас'ютікелз Корпорейшн (виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль серії), Німеччина/Німеччина/Республіка Корея	конц. д/р-ну д/інфуз. по 4мл у фл.	20 мг/мл	№1	3696,55	29,02/€
ДОЦЕТАКСЕЛ АМАКСА	АкВіда ГмБХ (контроль серії, сертифікація та випуск серії; первинне та вторинне пакування, виробництво in bulk)/Венус Фарма ГмБХ (вторинне пакування)/Самянг Біофармас'ютікелз Корпорейшн (виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль серії), Німеччина/Німеччина/Республіка Корея	конц. д/р-ну д/інфуз. по 8мл у фл.	20 мг/мл	№1	4906,54	28,79/€
ДОЦЕТАКСЕЛ КРКА	Інтас Фармас'ютикалз Лімітед (відповідальний за виробництво "in bulk", первинну та вторинну упаковку)/Весслінг Угорщина Кфт.(відповідальний за контроль серії)/КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за вторинну упаковку та випуск серії), Індія/Угорщина/Словенія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 8мл у фл.	20 мг/мл	№1	3107,60	29,45/€
ДОЦЕТАКСЕЛ КРКА	Інтас Фармас'ютикалз Лімітед (відповідальний за виробництво "in bulk", первинну та вторинну упаковку)/Весслінг Угорщина Кфт.(відповідальний за контроль серії)/КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за вторинну упаковку та випуск серії), Індія/Угорщина/Словенія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 1мл у фл.	20 мг/мл	№1	414,37	29,45/€
ДОЦЕТАКСЕЛ КРКА	Інтас Фармас'ютикалз Лімітед (відповідальний за	конц. д/р-ну д/інфуз. по 4мл	20 мг/мл	№1	984,23	29,45/€

	виробництво "in bulk", первинну та вторинну упаковку)/Весслінг Угорщина Кфт.(відповідальний за контроль серії)/КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за вторинну упаковку та випуск серії), Індія/Угорщина/Словенія	у фл.				
ДОЦЕТАКСЕЛ- ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А., Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 4мл у фл.	20 мг/мл	№1	2500,00	27,67/€
ДОЦЕТАКСЕЛ- ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А., Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 7мл у фл.	20 мг/мл	№1	4000,00	27,67/€
ДОЦЕТАКСЕЛ- ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А., Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 1мл у фл.	20 мг/мл	№1	800,00	27,67/€
ДОЦЕТАКСЕЛ-ТЕВА	Актавіс Італі С.п.А., Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 1мл, 4мл, 7мл у фл.	20 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Етопозид (Etoposide) ***

Фармакотерапевтична група: L01CB01 - Антинеопластичні та імунomodulatory засоби. Алкалоїди рослинного походження та ін. препарати природного походження. Похідні подофілотоксину.

Основна фармакотерапевтична дія: напівсинтетичний похідний подофілотоксину; чинить виражену цитотоксичну дію, яка значною мірою залежить від доз і схеми лікування; впливає на ф-цію топоізомерази II (ферменту, що розрізає ДНК) і інгібує синтез ДНК у термінальній фазі, в результаті утворюються одониткові і двониткові розриви у ДНК; цитотоксична дія залежить від концентрації і тривалості експозиції етопозиду; блокує мітоз, спричиняючи загибель клітин у S-фазі і ранній G₂-фазі клітинного циклу; не спричиняє накопичення клітин на стадії метафази.

Показання для застосування ЛЗ: дрібноклітинний рак легенів^{ВООЗ, БНФ}, несеміомна карцинома яєчка^{ВООЗ, БНФ}, г. мієломоноцитарний і мієлоцитарний лейкоз (ГМЛ, підтипи М4 або М5 за класифікацією FAB), у складі комбінованої терапії у разі неефективності індукційної терапії; паліативна терапія недрібноклітинного раку легенів, реіндукційна терапія хвороби Ходжкіна, індукційна терапія неходжкінської лімфому^{БНФ} і г. мієлоцитарного лейкозу, індукційна і реіндукційна терапія хоріокарцином.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити лише шляхом повільної в/в інфузії (протягом 30-60 хв.) у дозі 60-120 мг/м² поверхні тіла на добу протягом 5 днів; курси лікування повторюють з інтервалами не менше 10-20 днів; при лікуванні негематологічних онкологічних захворювань інтервали між курсами мають бути не менше 21 дня; дозування модифікувати відповідно до мієлосупресивних ефектів інших препаратів у комбінації, або результатів попередньої променевої терапії або хіміотерапії; розпочинати новий курс терапії лише якщо кількість нейтрофілів не є меншою за 1500/мм³ (1,5 × 10⁹/л), а кількість тромбоцитів - за 100 000/мм³ (100 × 10⁹/л), окрім випадків падіння показників, викликаних новоутвореннями.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: вторинний г. лейкоз (з/ без передлейкозною фазою); пропасниця, сепсис; мієлосупресія (і з летальним наслідком), лейкопенія, тромбоцитопенія, зниження рівня Hb, кровотечі внаслідок тяжкої мієлосупресії, анемія, нейтропенія; анафілактичні реакції (з такими проявами, як озноб, припливи крові до обличчя, тахікардія, задишка, бронхоспазм, артеріальна гіпотензія, ангіоневротичний набряк); гіперурикемія, метаболічний ацидоз; запаморочення, симптоми нейротоксичності (у т.ч. сонливість, підвищена втомлюваність); периферична нейропатія; у деяких пацієнтів відзначається дія на ЦНС; повідомлялося про випадки судом (епізодично пов'язані з алергічними р-ціями); сплутаність свідомості, гіперкінезія, акінезія, транзиторна кіркова сліпота; неврит зорового нерва, слезотеча; ІМ, аритмія, біль у ділянці серця; нестійка систолічна гіпотензія, що супроводжує швидке в/в введення; апное зі спонтанним відновленням дихання після закінчення лікування етопозидом; раптові летальні р-ції, пов'язані з бронхоспазмом; кашель, ларингоспазм і ціаноз; інтерстиціальний пневмоніт/легеневий фіброз; нежить, пневмонія; біль у ділянці живота, запор, нудота, блювання, анорексія; запалення слизових оболонок ротової порожнини (включаючи стоматит та езофагіт), дисфагія, дисгевзія, діарея; гепатотоксичність, підвищення рівнів печінкових ферментів (оскільки у печінці досягаються високі концентрації етопозиду, він може порушувати ф-цію печінки внаслідок кумуляції); підвищення рівня сечовини та креатиніну, підвищення рівнів білірубину; оборотна алопеція (інколи повне випадання волосся), зміни пігментації шкіри; висипи, кропив'янка, свербіж; набряк обличчя і язика, посилене потовиділення; долонно-підшовний с-м; аменорея, ановуляторні цикли, зниження фертильності, гіпоменорея, азооспермія; астенія, загальне нездужання; екстравазація (у т.ч. реакції з боку прилеглих м'яких тканин, набряк, біль, запалення сполучної тканини та некроз шкіри), флебіти.

Противопоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до етопозиду або до інших компонентів ЛЗ, виражена дисфункція печінки, тяжкі порушення ф-ції нирок (кліренс креатиніну < 15 мл/хв), виражене пригнічення ф-ції кісткового мозку, внутрішньоартеріальне або внутрішньопорожнинне (у плевральну, черевну або інші порожнини) введення; вагітність, період годування груддю, г. інфекції; застосування вакцини від жовтої лихоманки або інших живих вакцин у період лікування препаратом для пацієнтів із імуносупресією.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕТОПОЗИД	ПАТ "Київмедпрепарат" (пакування з in bulk фірми-виробника "Фрезеніус Кабі Онколоджи Лімітед", Індія), Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл у фл.	20 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	ЕТОПОЗИД	Сіндан Фарма СРЛ, Румунія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	20 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕТОПОЗИД "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг.КГ. (повний цикл виробництва)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (тестування)/Зейберсдорф Лабор ГмбХ (тестування), Австрія/Австрія/Австрія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 2,5мл, 5мл, у фл.	20 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕТОПОЗИД "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг.КГ. (повний цикл виробництва)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (тестування)/Зейберсдорф Лабор ГмбХ (тестування), Австрія/Австрія/Австрія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл у фл.	20 мг/мл	№1	487,12	23,97/\$
	ЕТОПОЗИД "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг.КГ. (повний цикл виробництва)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (тестування)/Зейберсдорф Лабор ГмбХ (тестування), Австрія/Австрія/Австрія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 20мл у фл.	20 мг/мл	№1	561,24	23,97/\$
	ЕТОПОЗИД АМАКСА	Стадафарм ГмбХ (контроль якості, вторинне пакування, маркування, випуск серій)/Тимоорган Фармаціе ГмбХ (виробництво розчину bulk, первинне та вторинне пакування, контроль якості), Німеччина/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 25мл у фл.	20 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕТОПОЗИД АМАКСА	Стадафарм ГмбХ (контроль якості, вторинне пакування, маркування, випуск серій)/Тимоорган Фармаціе ГмбХ (виробництво розчину bulk, первинне та вторинне пакування, контроль якості), Німеччина/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	20 мг/мл	№10	3300,04	29,40/€
	ЕТОПОЗИД-МІЛІ	Венус Ремедіс Лімітед, Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 2,5мл, 5мл у фл.	20 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЕТОПОЗИД-МІЛІ	Венус Ремедіс Лімітед, Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл у фл.	20 мг/мл	№1	320,00	26,70/\$	
ЕТОПОЗИД-ТЕВА	Фармахемі Б.В., Нідерланди	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	20 мг/мл	№1	186,97	27,22/\$	

ЕТОПОЗИД-ТЕВА	Фармахеми Б.В., Нідерланди	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл у фл.	20 мг/мл	№1	309,98	27,22/\$
ФІТОЗИД КАБІ	Фрезеніус Кабі Онколоджи Лімітед, Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл у фл.	20 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Іринотекан (Irinotecan) ***

Фармакотерапевтична група: L01XX19 - антинеопластичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: є напівсинтетичним похідним камптотечину; протипухлинний лікарський засіб, що виступає специфічним інгібітором ДНК-топоізомерази I; під дією карбоксил-естерази у більшості тканин іринотекан метаболізується до сполуки SN-38, що є більш активною щодо очищеної топоізомерази I та більш цитотоксичною порівняно з іринотеканом відносно ряду ліній пухлинних клітин людини та мишей; пригнічення ДНК-топоізомерази I під дією іринотекану чи SN-38 призводить до пошкодження одного ланцюга ДНК, що блокує реплікаційну вилку та призводить до цитотоксичної дії; було встановлено, що такий цитотоксичний ефект є залежним від часу та є специфічним до S-фази клітинного циклу; пригнічує активність ацетилхолінестерази.

Показання для застосування ЛЗ: поширений колоректальний рак: у комбінації з 5-фторурацилом та фолінієвою к-тою ^{БНФ} пацієнтам, які не отримували попередньої хіміотерапії для лікування поширеного захворювання; як монотерапія пацієнтам, яким встановлений режим лікування із застосуванням 5-фторурацилу виявився неефективним ^{БНФ}; у комбінації з цетуксимабом для лікування метастатичного колоректального раку з диким типом гена KRAS, що експресує рецептори до епідермального фактора росту пацієнтам, які раніше не отримували лікування від метастатичного раку або для яких цитотоксичне лікування із застосуванням іринотекану, виявилося неефективним; у комбінації з 5-фторурацилом, фолінієвою к-тою та бевацизумабом як терапія першої лінії пацієнтам із метастатичними карциномами товстої або прямої кишки; у комбінації з капецитабіном (з додаванням бевацизумабу або без нього) як терапія першої лінії пацієнтам із метастатичним колоректальним раком ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для лікування дорослих; монотерапія (пацієнтам, які раніше отримували лікування): рекомендована доза - 350 мг/м² поверхні тіла, в/в інфузія тривалістю 30-90 хв. ч/з кожні 3 тижні; комбінована терапія (пацієнтам, які раніше не отримували лікування): у комбінації з 5-фторурацилом та фолінієвою к-тою ч/з кожні 2 тижні, рекомендована доза - 180 мг/м² поверхні тіла, в/в інфузія тривалістю 30-90 хв. з подальшим введенням фолінієвої к-ти або 5-фторурацилу; зазвичай іринотекан застосовують у таких самих дозах, що і в останніх циклах попередньої схеми з його застосуванням.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: найпоширеніші - відстрочена діарея (виникає більше ніж ч/з 24 год. після введення препарату) та розлади з боку крові, включаючи нейтропенію, анемію і тромбоцитопенію, фебрильна нейтропенія; інфекції, зниження апетиту; транзиторний гострий холінергічний с-м тяжкого ступеня, діарея, блювання, нудота, зневоднення, біль у животі, запор; алопеція (оборотна); запалення слизових оболонок, пропасниця, астенія; підвищення рівня креатиніну в крові, підвищення рівня АЛТ і АСТ, білірубину, ЛФ в крові; р-ції підвищеної чутливості, анафілактичні р-ції; АГ; фебрильна нейтропенія; біль, сепсис, розлади з боку прямої кишки, кандидомікоз ШКТ, гіпомагніємія, висип, симптоми з боку шкіри, порушення ходи, сплутаність свідомості, головний біль, синкопе, припливи, брадикардія; інфекції сечовивідних шляхів, біль у грудях, підвищення гаммаглутамілтрансферази, крововиливи, с-м лізису пухлини, серцево-судинні захворювання (стенокардія, зупинка серця, ІМ, ішемія міокарда, розлади з боку периферичних судин, судинні захворювання) і тромбоемболічні явища (артеріальний тромбоз, ішемічний інсульт, порушення мозкового кровообігу, глибокий тромбофлебіт, емболія судин нижньої кінцівки, легенева емболія, тромбофлебіт, тромбоз і раптовий летальний наслідок); скорочення м'язів або судоми; розлади мовлення; псевдомембранозний коліт парестезії, перфорація кишечника, кишкова непрохідність, шлунково-кишковий крововилив, виразковий коліт, ішемічний коліт; ілеус; задишка, гикавка; порушення ф-ції нирок і г. ниркова недостатність; гіпотензія; стеатогепатит; стеатоз печінки; сепсис; грибка/вірусна інфекція; симптоматичне/безсимптомне підвищення рівня ферментів підшлункової залози; шкірні р-ції; р-ції у місці інфузії.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої р-ни або до будь-якого з допоміжних компонентів ЛЗ; хр. запальні захворювання кишечника та/або його обструкція; період вагітності/годування груддю; рівень білірубину вище верхньої межі норми > ніж у 3 рази; тяжка недостатність кісткового мозку; стан здоров'я за індексом ВООЗ >2; супутнє лікування звіробоем; застосування живих атенуєваних вакцин; тяжка нейтропенія (менше 1,5 × 10⁹/л).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ІРИНОТЕКАН	ПАТ "Київмедпрепарат" (пакування з in bulk фірми-виробника Фрезеніус Кабі Онколоджи Лімітед, Індія), Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	20 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ІРИНОТЕКАНУ ГІДРОХЛОРИД	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (виробництво з продукції in bulk фірми-виробника	конц. д/р-ну д/інфуз. по 2мл у фл.	20 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

		Квілу Фармацевтікал (Хайнань) Ко., Лтд., Китай), Україна					
	ІРИНОТЕКАНУ ГІДРОХЛОРИД	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (виробництво з продукції in bulk фірми-виробника Квілу Фармацевтікал (Хайнань) Ко., Лтд., Китай), Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	20 мг/мл	№1	700,00	
II.	ВІЗИРИН	Венус Ремедіс Лімітед, Індія	р-н д/ін'єк. по 5мл у фл.	20 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ІРИНОВІСТА	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	20 мг/мл	№1	1350,00	29,83/€
	ІРИНОВІСТА	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 15мл у фл.	20 мг/мл	№1	3950,00	29,83/€
	ІРИНОВІСТА	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз по 25мл у фл.	20 мг/мл	№1	5450,00	29,83/€
	ІРИНОСИНДАН	Актавіс Італія С.п.А./Сіндан Фарма СРЛ, Італія/Румунія	конц. д/приг. р-ну д/інфуз. по 2мл, 15мл, 25мл у фл.	20 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ІРИНОСИНДАН	Актавіс Італія С.п.А./Сіндан Фарма СРЛ, Італія/Румунія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	20 мг/мл	№1	569,90	27,89/\$
	ІРИНОТЕКАН АМАКСА	АкВіда ГмбХ (контроль серії та випуск серії; виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль серії)/Венус Фарма ГмбХ (вторинне пакування), Німеччина/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	20 мг/мл	№1	1775,71	28,79/€
	ІРИНОТЕКАН АМАКСА	АкВіда ГмбХ (контроль серії та випуск серії; виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль серії)/Венус Фарма ГмбХ (вторинне пакування), Німеччина/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 15мл у фл.	20 мг/мл	№1	4299,02	28,79/€
	ІРИНОТЕКАН АМАКСА	АкВіда ГмбХ (контроль серії та випуск серії; виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль серії)/Венус Фарма ГмбХ (вторинне пакування), Німеччина/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 2мл у фл.	20 мг/мл	№1	841,12	28,79/€
	ІРИНОТЕКАН МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціалпрепарате мбХ (виробник, що відповідає за маркування первинної упаковки, вторинне пакування, контроль/випробування серії та за випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробник, що відповідає за виробництво лікарсько, Німеччина/Німеччина	конц. д/приг. р-ну д/інфуз. по 2мл у фл.	20 мг/мл	№1	1075,29	30,72/€
ІРИНОТЕКАН МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше	конц. д/приг. р-ну д/інфуз. по	20 мг/мл	№1	1736,37	27,56/€	

	Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за маркування первинної упаковки, вторинне пакування, контроль/випробування серії та за випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробник, що відповідає за виробництво лікарсько, Німеччина/Німеччина	5мл у фл.				
ІРИНОТЕКАН МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за маркування первинної упаковки, вторинне пакування, контроль/випробування серії та за випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробник, що відповідає за виробництво лікарсько, Німеччина/Німеччина	конц. д/приг. р-ну д/інфуз. по 15мл у фл.	20 мг/мл	№1	3665,67	27,56/€
ІРИНОТЕКАН ШИЛПА	Шилпа Медікеа Лімітед, Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 15мл у фл.	20 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ІРИНОТЕКАН-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А., Італія	конц. д/приг. р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	20 мг/мл	№1	1400,00	26,26/€
ІРИНОТЕКАН-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А., Італія	конц. д/приг. р-ну д/інфуз. по 15мл у фл.	20 мг/мл	№1	4000,00	26,26/€
ІРИНОТЕКАН-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А., Італія	конц. д/приг. р-ну д/інфуз. по 25мл у фл.	20 мг/мл	№1	5500,00	26,26/€
ІРИТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	20 мг/мл	№1	1631,45	27,19/\$
ІРИТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 2мл у фл.	20 мг/мл	№1	815,72	27,19/\$
ІРІНО СПАЛ 100	СП Акур Лабс Пвт. Лтд., Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	20 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ІРІНО СПАЛ 40	СП Акур Лабс Пвт. Лтд., Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 2мл у фл.	20 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ІРІНОТЕЛ	Фрезеніус Кабі Онколоджи Лімітед, Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 2мл, 5мл у фл.	20 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КАМПТОМЕДА	Гаупт Фарма Вольфратшаузен ГмбХ, Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 15мл у фл.	20 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
КАМПТОМЕДА	Гаупт Фарма Вольфратшаузен ГмбХ, Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 2мл у фл.	20 мг/мл	№1	1208,00	28,89/€
КАМПТОМЕДА	Гаупт Фарма Вольфратшаузен ГмбХ, Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	20 мг/мл	№1	2565,08	28,89/€

• **Паклітаксел (Paclitaxel) ***

Фармакотерапевтична група: L01CD01 - Антинеопластичні та імунomodуючі засоби. Таксани.

Основна фармакотерапевтична дія: антимітоген рослинного походження, що діє на мікротрубочковий апарат клітини; стимулює складання мікротрубочок з димерів тубуліну і стабілізує мікротрубочки внаслідок пригнічення

деполімеризації, що спричинює пригнічення нормального процесу динамічної реорганізації мережі мікротрубочок, що важливо для клітинних функцій на етапі мітозу та інтерфази клітинного циклу; спричиняє утворення аномальних структур або «зв'язок» мікротрубочок упродовж клітинного циклу, а також множинних «зірок» з мікротрубочок під час мітозу.

Показання для застосування ЛЗ: рак яєчників (препарат першої лінії для лікування раку яєчників, а також у комбінації з цисплатином при поширеній формі хвороби або при залишкових пухлинах (розміром більше 1 см) після лапаротомії; препарат другої лінії метастатичного раку, якщо стандартна терапія препаратами платини виявилася неефективною)^{БНФ}; рак молочної залози (ад'ювантна лікування пацієнтів з ураженням лімфатичних вузлів після стандартної комбінованої терапії антрациклінами або циклофосфамідами; первинна хіміотерапія місцевопоширеного або метастатичного раку молочної залози)^{БНФ} у комбінації з антрациклінами або у поєднанні з трастузумабом у разі виявленої імуногістохімічним методом надекспресії онкопротеїну HER-2 (3+) або ж при наявності протипоказань до терапії антрациклінами; монотерапія метастатичного раку молочної залози у хворих, після неефективної стандартної терапії)^{БНФ}; поширений недрібноклітинний рак легенів (комбінована хіміотерапія з цисплатином у разі неможливості застосування хірургічного лікування та/або променевої терапії)^{БНФ}; саркома Капоші у хворих на СНІД (у разі неефективності попередньої терапії ліпосомальними антрациклінами)^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: як препарат першої лінії раку яєчників: у дозі 175 мг/м² поверхні тіла вводити шляхом в/в вливання тривалістю 3 год., потім вводити цисплатин у дозі 75 мг/м², інтервал між курсами лікування - 3 тижні; паклітаксел у дозі 135 мг/м² поверхні тіла вводити у вигляді 24-год. в/в інфузії, потім вводити цисплатин у дозі 75 мг/м², інтервал між курсами лікування - 3 тижні; як препарат другої лінії раку яєчників рекомендується вводити у дозі 175 мг/м² поверхні тіла шляхом 3-год. в/в інфузій, зазвичай призначати не більше 4-х курсів з інтервалами 3 тижні; ад'ювантна хіміотерапія раку молочної залози: призначати після терапії антрациклінами або циклофосфамідами, вводити у дозі 175 мг/м² поверхні тіла шляхом 3-год. в/в інфузій, 4 курси з інтервалами 3 тижні; хіміотерапія першої лінії раку молочної залози: при застосуванні у комбінації з доксорубіцином (50 мг/м² поверхні тіла) вводити через 24 год. після доксорубіцину; рекомендована доза 175 мг/м² поверхні тіла, вводити шляхом 3-год. в/в інфузій, інтервал між курсами лікування - 3 тижні, при комбінованому застосуванні вводити за попередньою схемою; хіміотерапія другої лінії раку молочної залози - 175 мг/м² поверхні тіла шляхом 3-год. в/в інфузій, інтервал між курсами лікування - 3 тижні; хіміотерапія поширеного недрібноклітинного раку легенів - 175 мг/м² поверхні тіла шляхом 3-год. в/в інфузій, потім застосовувати цисплатин у дозі 80 мг/м² поверхні тіла, інтервал між курсами лікування - 3 тижні; хіміотерапія саркоми Капоші у хворих на СНІД - 135 мг/м² поверхні тіла шляхом 3-год. в/в інфузій через кожні 3 тижні або 100 мг/м² поверхні тіла шляхом 3-год. в/в інфузій через кожні 2 тижні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: пригнічення ф-ції кісткового мозку (тромбоцитопенія; анемія), периферична нейропатія; р-ції гіперчутливості (артеріальна гіпотензія, що вимагає терапевтичного втручання; ангіоневротичний набряк, порушення ф-ції дихання, що вимагають застосування бронходилататорів, генералізована кропив'янка; незначні р-ції гіперчутливості, головним чином припливи та висипання), місцеві р-ції (локальний набряк, біль, еритема та індурація, випадкова екстравазація може спричинити целюліт); брадикардія, кардіоміопатія, асимптоматична вентрикулярна тахікардія, артеріальна гіпотензія, тромбоз, тромбоз флєбіт; нудота, блювання, діарея, мукозити, непрохідність кишечника, перфорація, ішемічний коліт, псевдомембранозний коліт, езофагіт, запор, панкреатит, підвищення (у 5 р. і більше порівняно з нормою) рівня АСТ, ЛФ і білірубіну, некроз печінки, печінкова енцефалопатія; артралгія, міалгія; інфекції (переважно сечового тракту і верхніх відділів дихальних шляхів, включаючи простий герпес, оральний кандидоз, фарингіт, риніт), у поодиноких випадках - з летальним наслідком; застуда; синуси; тяжкі інфекції; назофарингіт; вірусні інфекції; катетер-асоційована інфекція; грибкова інфекція; оперізувальний герпес; інфекції у місці ін'єкції; септичний шок; пневмонія; перитоніт; сепсис); метастази (можуть проявлятися симптомами болю), некроз пухлини; мієлосупресія, тяжка нейтропенія, анемія, тромбоцитопенія, тяжка лейкопенія, кровотечі, лімфопенія, нейтропенічна гарячка, тяжка анемія, фебрильна нейтропенія, панцитопенія, г. мієлоїдний лейкоз, мієлодиспластичний синдром; анорексія, зниження апетиту, гіпокаліємія, втрата/збільшення маси тіла, гіпофосфатемія, затримка рідини, гіпоальбумінемія, полідипсія, гіперглікемія, гіпокальціємія, гіпоглікемія, гіпонатріємія, синдром лізису пухлини; безсоння, депресія, тривожність, занепокоєння, сплутаність свідомості; нейротоксичні ефекти (переважно периферична нейропатія), парестезія, сонливість, депресія, тяжка нейропатія (переважно периферична нейропатія), нервозність, безсоння, порушення мислення, гіпокінезія, порушення ходи, гіпестезія, спотворення смаку, сенсорні порушення, сонливість, моторна нейропатія (що виявляється у помірно вираженій слабкості дистальних м'язів), полінейропатія, арефлексія, дискінезія, гіпоревлексія, невралгія, втрата чутливості, поступальне запаморочення, невропатичний біль, тремор, вегетативна нейропатія (що призводить до паралітичної непрохідності кишечника та ортостатичної гіпотензії), великі епілептичні напади («grand mal»), судоми, енцефалопатія, запаморочення, головний біль, атаксія; підвищена слюзоточивість, випадання волосся брів або вій; сухий кератокон'юнктивіт; сухість очей; послаблення зору; дефект поля зору; подразнення очей; біль в очах; зниження гостроти зору; кон'юнктивіт; свербіж очей; кератит; ураження зорового нерва та/або порушення зору (миготлива скотома), особливо у пацієнтів, які одержували дози вище рекомендованих; макулярний набряк; фотопсія; плаваючі помутніння у склістому тілі; біль у вухах, ототоксичні ураження, втрата слуху, шум у вухах, вертиго; брадикардія, тахікардія, підвищене серцевиття, непритомність, застійна СН, ІМ, атріовентрикулярна блокада і непритомність, кардіоміопатія, безсимптомна шлуночкова тахікардія, тахікардія у поєднанні з бігемінією, аритмія, екстрасистоля, СН, зупинка серця, дисфункція лівого шлуночка, фібриляція передсердь, надшлуночкова тахікардія, артеріальна гіпотензія, вазодилатація (припливи), лімфедема, АГ, тромбоз, тромбоз флєбіт, холодні кінцівки, ортостатична гіпотензія, шок, флєбіти; носова кровотеча, біль у ділянці глотки-стравоходу, риніт, ринорея, продуктивний кашель, задишка напруги, закладеність пазух, зниження дихальних шумів, алергічний риніт, охриплість голосу, закладеність носа, сухість слизової оболонки носа, свистяче дихання, легенева емболія, тромбоемболія легеневої артерії, інтерстиціальна пневмонія, дихальна недостатність, емболія легеневої артерії, фіброз легенів, інтерстиціальний пневмоніт, задишка, плевральний випіт, кашель, легенева гіпертензія; стоматит, біль у животі, біль у верхній частині живота, біль внизу живота, сухість у роті, виразки у роті, мелена, диспепсія, здуття живота, диспепсія, гастроєзофагеальна рефлюксна хвороба, оральна гіпестезія, дисфагія, метеоризм, глосалгія, сухість у роті, біль у яснах, рідкі випорожнення, біль у порожнині рота, ректальна кровотеча, обструкція кишечника,

перфорація кишечника, мезентеріальний тромбоз, асцити, нейтропенічний коліт, гіпогідратація; алопеція; транзиторні незначні зміни нігтів і шкіри; сухість шкіри; акне; зміна кольору нігтів; болючість нігтьового ложе; болючість шкіри; реакції фоточутливості; порушення пігментації; захворювання шкіри; підвищена пітливість; оніхомадезис; генералізовані висипання; дерматит; надмірне нічне потовиділення; вітиліго; гіпотрихоз; відчуття дискомфорту, пов'язане з нігтями; макулопапульозні висипання; пошкодження шкіри; набряклість обличчя; свербіж; висипання; еритема; набряк; синдром Стівенса-Джонсона; епідермальний некроліз; мультиформна еритема; ексфоліативний дерматит; кропив'янка; оніхолізіс (пацієнтам, які одержують паклітаксел, необхідно носити одяг з довгими рукавами і довгі штани для захисту від сонця рук і ніг), фолікуліт; склеродермія; біль у кінцівках, біль у кістках, судоми в ногах, міастенія, біль у спині, біль у грудній клітці, вітиліго, м'язова слабкість, біль у шиї, у паху, спазми м'язів, кістково-м'язовий біль, дискомфорт у кінцівках, системний червоний вовчак; дизурія, часте сечовипускання, гематурія, ніктурія, поліурія, нетримання сечі, ниркова недостатність; стомлюваність; гіпертермія; астенія, зниження працездатності; гриппоподібні захворювання; загальне нездужання; загальмованість; гіперпірексія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до паклітакселу або до будь-якого іншого компонента препарату; нейтропенія до початку лікування (початкова кількість нейтрофілів $<1,5 \times 10^9/\text{л}$, у разі саркоми Капоші у хворих на СНІД кількість нейтрофілів $<1 \times 10^9/\text{л}$), тромбцитопенія ($<100 \times 10^9/\text{л}$); супутні тяжкі неконтрольовані інфекції у хворих на саркому Капоші; тяжкі порушення ф-ції печінки.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ПАКЛІТАКСЕЛ-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл, 16,7мл, 35мл, 41,7мл, 43,4мл, 50мл у фл.	6 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	МІТОТАКС®	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд (Виробничий відділ - 7), Індія	р-н д/ін'єк. по 41,7мл у фл.	6 мг/мл	№1	1924,45	26,81/\$
	МІТОТАКС®	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд (Виробничий відділ - 7), Індія	р-н д/ін'єк. по 5мл у фл.	6 мг/мл	№1	342,10	26,81/\$
	МІТОТАКС®	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд (Виробничий відділ - 7), Індія	р-н д/ін'єк. по 16,7мл у фл.	6 мг/мл	№1	801,90	26,81/\$
	МІТОТАКС-М	БАЙОЛІЗ ФАРМА КОРПОРЕЙШН, Канада	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл, 16,7мл, 50мл у фл.	6 мг/мл	№1, №4, №5, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НЕОТАКСЕЛ	Венус Ремедіс Лімітед, Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл, 16,67мл, 25мл, 35мл, 41,7мл у фл.	6 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ПАКЛІВІСТА	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 16,7мл у фл.	6 мг/мл	№1	1510,00	31,53/€
	ПАКЛІВІСТА	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 25мл у фл.	6 мг/мл	№1	2510,00	31,53/€
	ПАКЛІВІСТА	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 50мл у фл.	6 мг/мл	№1	3300,00	31,53/€
	ПАКЛІВІСТА	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	6 мг/мл	№1	610,00	31,53/€
ПАКЛІМЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціалпрепарате мбХ (виробник, що відповідає за вторинне пакування, маркування, нанесення захисної плівки (опціонально), контроль/випробування	конц. д/р-ну д/інфуз. по 16,7мл у фл.	6 мг/мл	№1	1307,04	31,12/€	

	серії і за випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробник, що відповідає за , Німеччина/Німеччина/Корея /Німеччина/Німеччина/Німе ччина					
ПАКЛІМЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Спеціальпрепарате мбХ (виробник, що відповідає за вторинне пакування, маркування, нанесення захисної плівки (опціонально), контроль/випробування серії і за випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробник, що відповідає за , Німеччина/Німеччина/Корея /Німеччина/Німеччина/Німе ччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 50мл у фл.	6 мг/мл	№1	3485,44	31,12/€
ПАКЛІМЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Спеціальпрепарате мбХ (виробник, що відповідає за вторинне пакування, маркування, нанесення захисної плівки (опціонально), контроль/випробування серії і за випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробник, що відповідає за , Німеччина/Німеччина/Корея /Німеччина/Німеччина/Німе ччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	6 мг/мл	№1	479,25	31,12/€
ПАКЛІТАКСЕЛ	РУП "Белмедпрепарати", Республіка Білорусь	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл, 16,7мл у фл.	6 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПАКЛІТАКСЕЛ "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (повний цикл виробництва)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (тестування)/Лабор ЛС СЕ & Ко. КГ (тестування)/Зейберсдорф Лабор ГмбХ (тестування), Австрія/Австрія/Німеччина/ Австрія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 25мл, 35мг у фл.	6 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПАКЛІТАКСЕЛ "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (повний цикл виробництва)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (тестування)/Лабор ЛС СЕ & Ко. КГ (тестування)/Зейберсдорф Лабор ГмбХ (тестування), Австрія/Австрія/Німеччина/ Австрія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 16,7мл у фл.	6 мг/мл	№1	1152,83	25,60/\$
ПАКЛІТАКСЕЛ "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (повний цикл виробництва)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (тестування)/Лабор ЛС СЕ & Ко. КГ (тестування)/Зейберсдорф	конц. д/р-ну д/інфуз. по 50мл у фл.	6 мг/мл	№1	3170,43	25,60/\$

	Лабор ГмбХ (тестування), Австрія/Австрія/Німеччина/Австрія					
ПАКЛІТАКСЕЛ "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (повний цикл виробництва)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (тестування)/Лабор ЛС СЕ & Ко. КГ (тестування)/Зейберсдорф Лабор ГмбХ (тестування), Австрія/Австрія/Німеччина/Австрія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	6 мг/мл	№1	374,87	25,60/\$
ПАКЛІТАКСЕЛ АККОРД	Інтас Фармасьютикалз Лімітед (виробництво готового лікарського засобу, виробництво bulk, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості серії)/Аккорд Хелскеа Лтд. (вторинне пакування; відповідальний за випуск серії), Індія/Велика Британія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл, 16,7мл, 50мл у фл.	6 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПАКЛІТАКСЕЛ АКТАВІС	Сіндан Фарма СРЛ/Актавіс Італія С.п.А., Румунія/Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 25мл у фл.	6 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПАКЛІТАКСЕЛ АКТАВІС	Сіндан Фарма СРЛ/Актавіс Італія С.п.А., Румунія/Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 43,33мл у фл.	6 мг/мл	№1	1190,00	27,79/\$
ПАКЛІТАКСЕЛ АКТАВІС	Сіндан Фарма СРЛ/Актавіс Італія С.п.А., Румунія/Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 50мл у фл.	6 мг/мл	№1	1547,00	27,79/\$
ПАКЛІТАКСЕЛ АКТАВІС	Сіндан Фарма СРЛ/Актавіс Італія С.п.А., Румунія/Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	6 мг/мл	№1	340,45	27,79/\$
ПАКЛІТАКСЕЛ АКТАВІС	Сіндан Фарма СРЛ/Актавіс Італія С.п.А., Румунія/Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 16,7мл у фл.	6 мг/мл	№1	712,38	27,79/\$
ПАКЛІТАКСЕЛ АМАКСА	АкВіда ГмбХ (контроль та випуск серії; виробництво in bulk, первинне пакування, вторинне пакування, контроль серії)/Самянг Біофармас'ютікелз Корпорейшн (виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування)/Онкотек Фарма Продукціон ГмбХ (виробництво in bul, Німеччина/Республіка Корея/Німеччина/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 16,7мл у фл.	6 мг/мл	№1	1495,32	28,79/€
ПАКЛІТАКСЕЛ АМАКСА	АкВіда ГмбХ (контроль та випуск серії; виробництво in bulk, первинне пакування, вторинне пакування, контроль серії)/Самянг Біофармас'ютікелз Корпорейшн (виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування)/Онкотек Фарма Продукціон ГмбХ (виробництво in bul, Німеччина/Республіка Корея/Німеччина/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 50мл у фл.	6 мг/мл	№1	3551,40	28,79/€

ПАКЛІТАКСЕЛ АМАКСА	АкВіда ГмбХ (контроль та випуск серії; виробництво in bulk, первинне пакування, вторинне пакування, контроль серії)/Самянг Біофармас'ютікелз Корпорейшн (виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування)/Онкотек Фарма Продукціон ГмбХ (виробництво in bul, Німеччина/Республіка Корея/Німеччина/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	6 мг/мл	№1	560,74	28,79/€
ПАКЛІТАКСЕЛ-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А., Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 16,7мл у фл.	6 мг/мл	№1	1500,00	27,67/€
ПАКЛІТАКСЕЛ-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А., Італія	конц. д/р-ну д/інфуз.по 25мл у фл.	6 мг/мл	№1	2500,00	27,67/€
ПАКЛІТАКСЕЛ-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А., Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 43,33мл у фл.	6 мг/мл	№1	3000,00	27,67/€
ПАКЛІТАКСЕЛ-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А., Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	6 мг/мл	№1	600,00	27,67/€
ПАКЛІТАКСЕЛ-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А., Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 50мл у фл.	6 мг/мл	№1	6620,00	27,67/€
ПАКЛІТАКСЕЛ-МБ	БАЙОЛІЗ ФАРМА КОРПОРЕЙШН, Канада	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл, 16,7мл, 50мл у фл.	6 мг/мл	№1, №5, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПАКЛІТАКСЕЛ-МБ	БАЙОЛІЗ ФАРМА КОРПОРЕЙШН, Канада	конц. д/р-ну д/інфуз.по 25мл, у фл.	6 мг/мл	№4	10000,00	26,27/\$
ПАКЛІТАКСЕЛ-МБ	БАЙОЛІЗ ФАРМА КОРПОРЕЙШН, Канада	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	6 мг/мл	№1	1327,81	28,87/\$
ПАКЛІТАКСЕЛ-МБ	БАЙОЛІЗ ФАРМА КОРПОРЕЙШН, Канада	конц. д/р-ну д/інфуз. по 16,7мл у фл.	6 мг/мл	№1	1674,19	28,87/\$
ПАКЛІТАКСЕЛ-МБ	БАЙОЛІЗ ФАРМА КОРПОРЕЙШН, Канада	конц. д/р-ну д/інфуз. по 25мл у фл.	6 мг/мл	№1	2500,00	26,27/\$
ПАКЛІТАКСЕЛ-МБ	БАЙОЛІЗ ФАРМА КОРПОРЕЙШН, Канада	конц. д/р-ну д/інфуз.по 50мл у фл.	6 мг/мл	№4	28865,36	24,86/\$
ПАКЛІТАКСЕЛ-ТЕВА	Фармахемі Б.В./АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Нідерланди/Угорщина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 16,7мл у фл.	6 мг/мл	№1	1381,08	26,31/\$
ПАКЛІТАКСЕЛ-ТЕВА	Фармахемі Б.В./АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Нідерланди/Угорщина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 50мл у фл.	6 мг/мл	№1	3600,01	26,31/\$
ПАКЛІТАКСЕЛ-ТЕВА	Фармахемі Б.В./АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Нідерланди/Угорщина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	6 мг/мл	№1	479,04	26,31/\$
ПАКЛІТЕРО®	ГЕТЕРО ЛАБЗ ЛІМІТЕД, Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 6,7мл у фл.	6 мг/мл	№1	1818,16	23,00/\$
ПАКЛІТЕРО®	ГЕТЕРО ЛАБЗ ЛІМІТЕД, Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 50мл у фл.	6 мг/мл	№1	5654,34	23,00/\$

ПАКЛІТЕРО®	ГЕТЕРО ЛАБЗ ЛІМІТЕД, Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	6 мг/мл	№1	760,52	23,00/\$
ПАКЛІХОП	Гленмарк Дженераікс С.А., Аргентина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл, 50мл у фл.	30мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
СТРИТОКСОЛ	МАЙЛАН ЛАБОРАТОРІЗ ЛІМІТЕД (ОТЛ), Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл, 16,7мл, 50мл у фл.	6 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТАКСОМЕДА	Гаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	6 мг/мл	№1	1030,72	23,97/€
ТАКСОМЕДА	Гаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 16,7мл, у фл.	6 мг/мл	№1	1500,10	28,89/€
ТАКСОМЕДА	Гаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 50мл у фл.	6 мг/мл	№1	5265,95	28,89/€

• **Топотекан (Topotecan) ***

Фармакотерапевтична група: L01XX17 - антинеопластичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: протипухлинна активність полягає в пригніченні топоізомерази-I-ферменту, що бере безпосередню участь у реплікації ДНК; пригнічує топоізомеразу-I шляхом стабілізації ковалентного комплексу ферменту і розщепленої нитки ДНК, що є проміжною ланкою каталітичного механізму; клітинними наслідками пригнічення топоізомерази-I топотеканом є індукція протеїнасоційованих поодиноких розривів ланцюга ДНК.

Показання для застосування ЛЗ: ліоф. д/р-ну д/інфуз.: монотерапія: метастатичний рак яєчників після першої лінії хіміотерапії або подальшої терапії, якщо не було досягнуто позитивного ефекту, рецидивуючий дрібноклітинний рак легенів у пацієнтів, яким проведення повторної хіміотерапії першої лінії не може бути рекомендовано; у комбінації з цисплатином: рецидивуючий рак шийки матки після променевої терапії, а також хворим зі стадією IV-B^{ННФ}; капс: монотерапія у пацієнтів з рецидивним дрібноклітинним раком легенів, яким не показано повторне лікування препаратами першої лінії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рак яєчників та дрібноклітинний рак легенів: при початковому курсі лікування рекомендована доза - 1,5 мг/м² поверхні тіла у вигляді в/в інфузії протягом 30 хв. 1 раз/день протягом 5 днів поспіль із перервою 3 тижні; у разі доброї переносимості лікування продовжити, доки буде прогресувати хвороба; для проведення повторних курсів не можна застосовувати, доки рівень нейтрофілів не досягне $\geq 1 \times 10^9$ /л, тромбоцитів - $\geq 100 \times 10^9$ /л і Нв ≥ 9 г/дл (після гемотрансфузії, якщо це необхідно); для лікування пацієнтів з тяжкою нейтропенією (кількість нейтрофілів $\leq 0,5 \times 10^9$ /л) протягом 7 і більше днів або тяжкою нейтропенією, що супроводжується пропасницею чи проявами інфекції, або для пацієнтів, лікування яких було відкладено ч/з нейтропенію, обрано зменшення дози топотекану, дозу зменшувати на 0,25 мг/м²/добу до 1,25 мг/м²/добу (за необхідності послідовно зменшувати дозу до 1,0 мг/м²/добу); при рівні тромбоцитів у процесі лікування нижче 25×10^9 /л, дозу топотекану зменшувати аналогічно; рак шийки матки: при початковому курсі лікування рекомендована доза - 0,75 мг/м² поверхні тіла, щоденно у вигляді 30-хв. в/в інфузії у 1-й, 2-й та 3-й день; у 1-й день після введення дози призначають цисплатин у вигляді в/в інфузії у дозі 50 мг/м² поверхні тіла; такий режим лікування повторюється ч/з 21 день протягом 6 курсів або доки буде прогресувати хвороба; для проведення повторних курсів не можна застосовувати препарат, доки рівень нейтрофілів не досягне $\geq 1,5 \times 10^9$ /л, тромбоцитів - $\geq 100 \times 10^9$ /л і гемоглобін - ≥ 9 г/дл (після гемотрансфузії, якщо це необхідно); якщо для лікування пацієнтів, у яких розвинулась тяжка нейтропенія (кількість нейтрофілів менше $0,5 \times 10^9$ /л) протягом 7 і більше днів, або для пацієнтів з тяжкою нейтропенією, що супроводжується гарячкою чи проявами інфекції, або для пацієнтів, лікування яких було відкладено ч/з нейтропенію, необхідне зменшення дози топотекану, то її зменшують на 20 % до 0,60 мг/м² поверхні тіла для наступних курсів (або до 0,45 мг/м² поверхні тіла/добу в подальшому); для лікування пацієнтів, рівень тромбоцитів яких став менше 25×10^9 /л, рекомендується зменшувати дозу топотекану аналогічно; капс: рекомендована початкова доза - 2,3 мг/м² поверхні тіла кожного дня протягом 5 днів поспіль кожен 21-й день; наступні дози при лікуванні пацієнтів, у яких розвинулась діарея III або IV ст. дозу зменшити на 0,4 мг/м² поверхні тіла/добу, при діарей II ст. може знадобитися таке ж зменшення дози.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції, сепсис; анемія, фебрильна нейтропенія, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія, панцитопенія; анорексія; інтерстиціальні захворювання легенів, диспное, кашель, носові кровотечі; діарея, нудота, блювання, біль у животі, запор, діарея, анорексія, стоматит, мукозит; випадки нейтропенічного коліту; гіпербілірубінемія; алопеція, свербіж; астенія, втомлюваність, гіпертермія, нездужання; гіперчутливість, включаючи висипання, анафілактичні реакції, ангіоневротичний набряк, кропив'янка; гіпербілірубінемія, підвищення рівня АСТ, АЛТ; тяжка кровотеча (асоційована з тромбоцитопенією); запалення м'язів, випотівання рідини із судин, запалення слизових оболонок.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до топотекану та/або його компонентів в анамнезі, вагітність, годування груддю, тяжка супресія кісткового мозку перед початком першого курсу лікування (вихідний рівень нейтрофілів $< 1,5 \times 10^9$ /л, рівень тромбоцитів $< 100 \times 10^9$ /л).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ГІКАМТИН™	ГлаксоСмітКляйн Мануфактуринг С.п.А. (виробництво за повним циклом)/Каталент ЮК Пекеджинг Лімітед (вторинне пакування), Італія/Велика Британія	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	4мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГІКАМТИН™	ГлаксоСмітКляйн Мануфактуринг С.п.А., Італія	капс. тверді у бл.	0,25мг; 1мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТОПОТЕКАН	Сіндан Фарма СРЛ, Румунія	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	1мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТОПОТЕКАН	Сіндан Фарма СРЛ, Румунія	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	4мг	№1	997,33	26,81/\$
	ТОПОТЕКАН АККОРД	Інтас Фармасьютікалз Лімітед (виробництво готового лікарського засобу, первинне, вторинне пакування, контроль якості серії)/Аккорд Хелскеа Лімітед (відповідальний за випуск серії; вторинне пакування), /Велика Британія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 1мл, 4мл у фл.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТОПОТЕКАН АККОРД, КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІНФУЗІЙ, 1 МГ/МЛ / ТОПОТЕКАН ACCORD 1 MG/ML CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION	Інтас Фармасьютікалз Лімітед (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, контроль стабільності та експорт на дільницю випуску серії)/Аккорд Хелскеа Лімітед (дільниця випуску серії; вторинне пакування)/Аккорд Хелскеа Польска Сп. з.о.о. (д, Індія/Велика Британія/Польща/Велика Британія/Угорщина/Угорщина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 4мл, 5мл у скл. фл. з проб.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

19.1.4. Цитотоксичні антибіотики

Широко застосовують для лікування пухлин. Механізм дії полягає в інгібуванні синтезу ДНК у зв'язку зі зв'язуванням з ДНК та індукції одно- та дволанцюгових розривів, а також із взаємодією з ДНК-залежними ферментами, перш за все, з топоізомеразами II та I.

Багато цитотоксичних антибіотиків мають радіоміметичну активність, тому їх слід поєднувати з променевою терапією.

Даунорубіцин, доксорубіцин та ідарубіцин – антрациклінові антибіотики. Мітоксантрон та епірубіцин – синтетичні похідні антрацикліну. Блеоміцин відносять до групи флеоміцинів, дактиноміцин – до групи актиноміцинів.

● **Блеоміцин (Bleomycin) ***

Фармакотерапевтична група: L01DC01 - антинеопластичні засоби; цитотоксичні антибіотики та споріднені препарати.

Основна фармакотерапевтична дія: являє собою лужну водорозчинну суміш структурно споріднених глікопептидних антибіотиків з цитостатичною активністю; дія пояснюється інтерналізацією у одинарні та подвійні ланцюги ДНК, що спричиняє утворення в них одно- та дволанцюгових розривів, внаслідок цього блокується синтез ДНК і поділ клітин; діє на РНК і синтез білків, проте меншою мірою; найважливішим фактором, який визначає селективність дії блеоміцину на різні тканини, є внутрішньоклітинна інактивація; має низьку мієлотоксичність, не спричиняє імуносупресії і не є нейро- та кардіотоксичним.

Показання для застосування ЛЗ: плоскоклітинний рак ^{ВНО} голови та шиї ^{ВООЗ}, стравоходу і шийки матки ^{ВООЗ}, хвороба Ходжкіна ^{ВООЗ} і неходжкінські лімфоми ^{ВООЗ,БНФ}, рак яєчка ^{ВООЗ,БНФ} (несеїномні та сеїномні пухлини), паліативна внутрішньоплевральна терапія злоякісного плеврального випоту ^{ВООЗ}, рак шкіри ^{ВООЗ}, рак щитовидної залози; рак легень (особливо, первинний або метастатичний сквамозний рак); нейроглоїома.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: ліоф. д/р-ну д/ін'єк. (15 МО): вводиться в/в, в/м, в/артеріально або в/плевральну, а також п/ш; загальна доза не повинна перевищувати 400×10^3 МО (225×10^3 МО/м² поверхні тіла); плоскоклітинний рак - вводять шляхом в/м або в/в ін'єкцій у дозі $10-15 \times 10^3$ МО/м² поверхні тіла 1 раз/тиждень або вводять шляхом в/в інфузій тривалістю 6-24 год. у дозі $10-15 \times 10^3$ МО/м² поверхні тіла на добу 4-7 днів поспіль

кожні 3-4 тижні; хвороба Ходжкіна і неходжкінські лімфоми - в/м або в/в ін'єкції у дозі $5-10 \times 10^3$ МО/м² поверхні тіла 1 раз/тиждень, через ризик розвитку анафілактичних реакцій початкову дозу для хворих на лімфому можна знизити до $2-3 \times 10^3$ МО, у разі відсутності г. реакції на введення подальшу терапію можна продовжити у звичайній дозі; рак яєчка (несеміномні та семіномні пухлини) - в/м або в/в ін'єкційно у дозі $10-15 \times 10^3$ МО/м² поверхні тіла 1-2 рази/тиждень або шляхом в/в інфузій тривалістю 6-24 год. у дозі $10-20 \times 10^3$ МО/м² поверхні тіла на добу 5-6 днів поспіль кожні 3-4 тижні; паліативна внутрішньоплевральна терапія злоякісного плеврального випоту - при монотерапії вводять в/плеврально одноразово у дозі до 60×10^3 МО, детальна інформація щодо лікування міститься у спеціальній літературі; пор. д/р-ну д/ін'єкц.(15мг): застосовують у складі комбінованої системної хіміотерапії злоякісних пухлин; дозування проводиться у хіміотерапевтичному режимі, блеоміцин застосовується кожного тижня, протягом 2 тижнів або з щомісячними перервами; застосовується в/артеріально по 5 - 15 мг при пухлинах голови та шиї; в/в, в/м та п/ш по 15-20 мг (10 мг/м^2), при в/м введенні добу дозу ділять на 2 окремі дози, при п/ш застосуванні добу дозу застосовують у вигляді безперервної інфузії; внутрішньопорожнинно (інтраплеврально): 60 мг (при злоякісних випотах у 50 - 100 мл р-ну); інтрасерцево (15 - 60 мг у 20 - 30мл р-ну); інтраперитонеально (60 - 90мг), максимальна доза для пацієнтів 18 - 60 років складає 400 мг, для 60 - 70 років - 200-300мг, 70 - 80 років - 150 - 200мг; старше 80 років - 100мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інтерстиціальна пневмонія, пневмофіброз, пневмоніт, плеврит із больовим синдромом; шок; ризик кровотеч; гіпертермічна реакція; інфузійні р-ції та місцеві р-ції (інтраплевральне введення - локальний біль, артеріальна гіпотензія з летальним наслідком; в/в ін'єкція: флебіти та тромбози (при перевищенні швидкості в/в введення), артеріальна гіпотензія та венозна оклюзія; в/м введення - ущільнення тканин в місці введення, постін'єкційні абсцеси); алергічні та анафілактоїдні р-ції, висипи, утворення пухирців на шкірі, свербіж, кропив'янка з підвищеною температурою; р-ції ідіосинкразії негайного типу; гіпертрофічні зміни шкіри, почервоніння, ущільнення шкіри, склеродермія, гіперпигментація шкіри, Scratch dermatitis, гіперкератоз; гіперстезія і набрякання дистальних (нігтьових) фаланг пальців, стрії, зміна форми і кольору нігтів, алопеція, кон'юнктивіт, вульвіт; цереброваскулярні порушення, включаючи церебральні артеріїти, ангіалгії; слабкість, головний біль, запаморочення; токсична дія на судини, інсульт, ІМ, тромботична мікроангіопатія, с-м Рейно; нудота, блювання, втрата апетиту, діарея, стоматит, у т.ч. ангулярний, гепатотоксична дія, гепатоцелюлярні uszkodження; порушення сечовипускання (дизурія, олігурія, болюче сечовипускання, полакіурія, відчуття залишкової сечі, затримка сечі та ін.); інфекційні захворювання та зменшення маси тіла (при тривалому застосуванні).

Противопоказання до застосування ЛЗ: абсолютні: гіперчутливість до блеоміцину та до подібного препарату (лептоміцину), порушення ф-ції легень або дифузійний фіброз легеневої тканини на рентгенограмі грудної клітки, г. інфекції легень, тривала променева терапія грудної клітки та ділянки навколо неї, г. ниркова недостатність, анурія або олігурія; уремія, СН, атаксія-телеангіектазія (с-м Луї-Бар), період вагітності і годування груддю, дитячий вік; відносні: ниркова недостатність; серцеві захворювання з ризиком розвитку СН; захворювання легень з вираженим порушенням дихання за рестриктивним типом; особи віком старше 70 років; наявність герпесу zoster.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	БЛЕОЦИН-С	ТОВ "Люм'єр Фарма" (виробництво з продукції in bulk фірми-виробника Ніппон Каяку Ко., Лтд., Такасакі Планта, Японія), Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	15000 МО	№1	1300,00	
II.	БЛЕОЦИН	Ніппон Каяку Ко., Лтд., Такасакі Планта, Японія	пор. д/р-ну д/ін'єк. в амп. або у фл.	15мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Даунорубіцин (Daunorubicin) ***

Фармакотерапевтична група: L01DB02 - цитотоксичні а/б і споріднені препарати; антрацикліни і споріднені сполуки.

Основна фармакотерапевтична дія: цитотоксична дія зумовлена його здатністю інгібувати синтез ДНК, РНК і білків пухлинних клітин; механізм дії заснований на інтеркаляції антрацикліну між сусідніми парами підстав подвійної спіралі ДНК, що перешкоджає її розкручуванню для подальшої реплікації.

Показання для застосування ЛЗ: індукція ремісії при г. мієло- і лімфолейкозі^{ВООЗ, БНФ}, лікування г. мієло- і лімфолейкозу у дітей^{БНФ} у складі комбінованої терапії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: тільки в/в; дорослі: 40-60 мг/м² через день протягом курсу (до 3-х ін'єкцій) до індукції ремісії; г. мієлоїдний лейкоз: рекомендована доза - 45 мг/м²; г. лімфоцитарний лейкоз: рекомендована доза - 45 мг/м²; діти: віком від 2 років - максимальна сумарна доза - 300 мг/м²; віком до 2 років або з площею тіла менше 0,5 м² - 10 мг/кг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції, крововиливи, розлади з боку ШКТ, зниження апетиту, випадіння волосся; шкірний висип або свербіж, набряк, підвищена t^o тіла або озноб, анафілактичні та анафілактоїдні р-ції; кардіоміопатія (клінічно проявляється як задишка, ціаноз, набряк (периферичний, серцевий), збільшення печінки, асцит, плеврит і відкрита застійна СН), ендоміокардіальний фіброз, ішемія міокарда (стенікардія) та ІМ, перикардит/міокардит, суправентрикулярна тахіаритмія (синусова тахікардія, передчасні скорочення шлуночків, блокада серця); шок, кровотеча, припливи; тканинна гіпоксія; депресія кісткового мозку, лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія, гранулоцитопенія; нейтропенія; нудота, блювання, мукозит/стоматит (у т.ч.

біль, відчуття печіння, еритема, утворення ерозій та виразок, кровотечі, інфекції), біль у животі, печія, езофагіт, ротоглоточний кандидоз, анорексія, діарея, ураження слизових оболонок шлунково-кишкового тракту, тенезми; дегідратація, г. гіперурикемія; нефротичний с-м, гіперурикемія або сечокисла нефропатія, пов'язана з підвищеним утворенням сечової к-ти (біль у суглобах, у нижній частині спини або у боку), червонувате забарвлення сечі, цистит; аменорея, азооспермія; аплазія; випадання волосся (оборотне), контактний дерматит, еритема, гіперчутливість до опроміненої шкіри (ремісія побічних ефектів променевої терапії), гіперпигментація шкіри та нігтів, кропив'янка, панікуліт, целюліт; зміна показників ЕКГ, перехідні висоти у сироватці білірубину, аспартат амінотрансферази (AST) і лужної фосфатази; головний біль, опортуністичні інфекції; лихоманка, перивенозна екстравазація (негайний локальний біль, печіння, тяжкий целюліт, болюча виразка і некроз тканин), некроз тканини у місці введення, флебіт у місці введення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до даунорубіцину, антрациклінів або допоміжної речовини; вітряна віспа або оперізувальний лишай (або пацієнтам, які хворіли ними нещодавно); персистентна мієлосупресія; тяжка інфекція; тяжкі порушення ф-ції печінки або нирок; міокардіальна недостатність; нещодавно перенесений ІМ; тяжкі форми аритмії; не застосовувати в/м; не застосовувати, якщо раніше вже була застосована сумарна максимальна доза даунорубіцину гідрохлориду (500-600 мг/м² для дорослих, 300 мг/м² для дітей віком від 2 р., 10 мг/кг маси тіла для дітей віком до 2 р.) або інших кардіотоксичних антрациклінів.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДАУНОБЛАСТИНА	Актавіс Італія С.п.А., Італія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	20мг	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

● **Доксорубіцин (Doxorubicin) ***

Фармакотерапевтична група: L01DB01 - антинеопластичні та імунотропні засоби; цитотоксичні а/б та споріднені сполуки.

Основна фармакотерапевтична дія: принцип дії пов'язаний зі здатністю зв'язуватися з ДНК та пригнічувати синтез нуклеїнових кислот; проникає в середину клітини, безпосередньо в наволядерцевий хроматин; спостерігається швидке пригнічення синтезу нуклеїнових кислот та мітотичної активності, а також поява хромосомних аберацій.

Показання для застосування ЛЗ: послаблення симптомів при ряді неопластичних патологій, у тому числі при лікуванні раку молочної залози^{вооз, бнф}, легень, сечового міхура^{вооз, бнф}, щитовидної залози^{вооз}, яєчників^{вооз, бнф}, остеосаркоми та саркоми м'яких тканин, лімфоми Ходжкіна та неходжкінських лімфом^{вооз, бнф}, нейробластоми, пухлини Вільмса, г. лімфобластного лейкозу^{вооз}, г. мієлобластної лейкемії^{вооз, бнф}, виявляє позитивний ефект у разі поверхневого раку сечового міхура при інтравезикальному введенні як після трансуретральної резекції (профілактичне лікування), так і з терапевтичною метою.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовується в/в та інтравезикально; монотерапія: дорослі - доза 60-75 мг/м² поверхні тіла в/в інфузією з 21-денним інтервалом; дозу можна вводити у вигляді разової дози або розподілити на 2-3 щоденних введення; діти - доза 30 мг/м²/добу в/в протягом 3-х днів поспіль; повторювати курс через кожні 4 тижні; сумарна доза при в/в введенні не повинна перевищувати 550 мг/м² поверхні тіла незалежно від схеми застосування; поліхіміотерапія - доза 25-50 мг/м² кожні 3-4 тижні з іншими мієлосупресивними засобами та доза 60-75 мг/м² з іншими мієлодепресивними засобами; в/в вводиться протягом 5-10 хв; зовнішнє інтравезикальне введення: 30-50 мг на інстиляцію з інтервалом від 1 тижн. до 1 міс.; інтравезикальне введення не призначають при проліферуючих пухлинах, що проникають у м'язовий шар стінок сечового міхура; вводять у концентрації 1 мг/мл ч/з катетер і залишати у сечовому міхурі на 1-2 год.; після інфузії пацієнта перевернути для збільшення площі дії р-ну на сечовий міхур і слизову оболонку сечового міхура; щоб уникнути небажаного розведення препарату сечею, пацієнтів попередити, щоб вони не вживали рідину протягом 12 год. до інфузії і випорожнилися після закінчення інфузії.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекція, сепсис, септицемія, г. нелімфоцитарний лейкоз, г. мієлоїдний лейкоз, лейкопенія, нейтропенія, анемія, тромбоцитопенія, септичний шок, кровотеча, тканинна гіпоксія або смерть; анафілактична реакція, анафілактичний шок; зниження апетиту, втрата ваги, зневоднення, гіперурикемія, анорексія, кон'юнктивіт, кератит, підвищена сльозоточивість; застійна СН, кардіотоксичність, яка може проявлятися у вигляді тахікардії, в тому числі надшлуночкової тахікардії та змін на ЕКГ, АВблокада, тахіаритмія, блокада ніжок пучка Гіса, асимптоматичне зменшення фракції викиду лівого шлуночка; емболії, шок, геморагія, тромбофлебіт, флебіт, припливи крові; запалення слизової оболонки/стоматит, діарея, блювання, нудота, коліт; езофагіт, біль у животі; кровотеча у ШКТ, ерозивний гастрит, коліт, зміна кольору слизової оболонки; еритродизестезія долонь і підшов, алопеція, кропив'янка, висипання, місцева токсичність, гіперпигментація шкіри і нігтів, фотосенсибілізація, свербіж, гіперчутливість шкіри до опромінення, запалення шкіри; подразнення міхура, гематурія, геморагічний цистит, некроз стінки сечового міхура, зниження ємкості сечового міхура; хроматурія, аменорея, олігоспермія, азооспермія; підвищена температура, астенія, гарячка, реакції у місці введення, дискомфорт, тяжкий целюліт; зміни рівнів трансаміназ, підвищення/втрата маси тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до доксирубіцину або до інших компонентів препарату, інших антрациклінів чи антрацендіонів; при в/в введенні: персистуюча мієлосупресія; тяжка печінкова недостатність; нещодавно перенесений ІМ; тяжка аритмія; тяжка СН; попереднє лікування максимальними кумулятивними дозами доксорубіцину, даунорубіцину, епірубіцину, ідарубіцину та/або іншими антрациклінами та антрацендіонами; при інтравезикальному введенні: інфекції сечовивідного тракту; запалення сечового міхура; гематурія.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АДРИБЛАСТИН ШВИДКОРОЗЧИННИЙ	Актавіс Італія С.п.А., Італія	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл. з розч.	10мг	№1	513,38	27,02/\$
	АДРИБЛАСТИН ШВИДКОРОЗЧИННИЙ	Актавіс Італія С.п.А., Італія	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	50мг	№1	1188,87	27,02/\$
	ДОКСОРУБІЦИН "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (повний цикл виробництва)/Лабор ЛС СЕ & Ко. КГ (тестування)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (тестування)/Зейберсдорф Лабор ГмбХ (тестування), Австрія/Німеччина/Австрія/Австрія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл, 25мл, 50мл, 100мл у фл.	2мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДОКСОРУБІЦИН АККОРД	Інтас Фармасьютікалс Лімітед (виробництво, контроль якості, первинне та вторинне пакування)/Аккорд Хелскеа Лімітед (відповідальний за випуск серії, вторинне пакування), Індія/Велика Британія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл, 10мл, 25мл, 50мл, 100мл у фл.	2 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДОКСОРУБІЦИН АМАКСА	Стадафарм ГмбХ (контроль якості, вторинне пакування, маркування, випуск серій)/Тимоорган Фармаціе ГмбХ (виробництво розчину bulk, заповнення, контроль якості, первинне та вторинне пакування), Німеччина/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 5мл, 25мл, 75мл у фл.	2 мг/мл	№2, №5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДОКСОРУБІЦИН АМАКСА	Стадафарм ГмбХ (контроль якості, вторинне пакування, маркування, випуск серій)/Тимоорган Фармаціе ГмбХ (виробництво розчину bulk, заповнення, контроль якості, первинне та вторинне пакування), Німеччина/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 75мл у фл.	2 мг/мл	№1	1300,86	34,79/€
	ДОКСОРУБІЦИН АМАКСА	Стадафарм ГмбХ (контроль якості, вторинне пакування, маркування, випуск серій)/Тимоорган Фармаціе ГмбХ (виробництво розчину bulk, заповнення, контроль якості, первинне та вторинне пакування), Німеччина/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 5мл у фл.	2 мг/мл	№1	150,23	34,79/€
	ДОКСОРУБІЦИН АМАКСА	Стадафарм ГмбХ (контроль якості, вторинне пакування, маркування, випуск серій)/Тимоорган Фармаціе ГмбХ (виробництво розчину bulk, заповнення, контроль якості, первинне та вторинне пакування), Німеччина/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 25мл у фл.	2 мг/мл	№1	448,94	34,79/€

		якості, первинне та вторинне пакування), Німеччина/Німеччина					
ДОКСОРУБІЦИН-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А./Сіндан Фарма С.Р.Л., Італія/Румунія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 75мл у фл.	2 мг/мл	№1	1500,00	23,81/\$	
ДОКСОРУБІЦИН-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А./Сіндан Фарма С.Р.Л., Італія/Румунія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 100мл у фл.	2 мг/мл	№1	1900,00	23,81/\$	
ДОКСОРУБІЦИН-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А./Сіндан Фарма С.Р.Л., Італія/Румунія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл	2 мг/мл	№1	270,00	35,35/\$	
ДОКСОРУБІЦИН-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А./Сіндан Фарма С.Р.Л., Італія/Румунія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл у фл.	2 мг/мл	№1	300,00	23,81/\$	
ДОКСОРУБІЦИН-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А./Сіндан Фарма С.Р.Л., Італія/Румунія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 25мл у фл.	2 мг/мл	№1	745,00	35,35/\$	
ДОКСОРУБІЦИН-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А./Сіндан Фарма С.Р.Л., Італія/Румунія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 50мл у фл.	2 мг/мл	№1	900,00	32,21/\$	
ДОКСОРУБІЦИН-ТЕВА	Фармахемі Б.В., Нідерланди	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл, 10мл, 25мл у фл.	2 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ		
ДОПОЛО	НАТКО ФАРМА ЛІМІТЕД, Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. ліпосом. по 10мл у фл.	2 мг/мл	№1	2600,00	24,12/\$	
ДОПОЛО	НАТКО ФАРМА ЛІМІТЕД, Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. ліпосом. по 25мл у фл.	2 мг/мл	№1	6240,00	24,12/\$	

● **Епірубіцин (Epirubicin) *** [1]

Фармакотерапевтична група: L01DB03 - цитотоксичні антибіотики та споріднені препарати. Антрацикліни та споріднені сполуки.

Основна фармакотерапевтична дія: виявляє активність щодо широкого спектра експериментальних пухлин, включаючи лейкемії L1210 і P388, саркоми SA 180 (тверда та асцитна форма), (SA 180, солідні та асцитичні форми), меланома, рак молочної залози, рак легенів Lewis, рак товстої кишки.

Показання для застосування ЛЗ: лікування широкого спектра новоутворень, включаючи рак молочної залози^{БНФ}, злоякісні лімфоми, саркоми м'яких тканин, рак шлунка, рак печінки, підшлункової залози, прямої кишки, рак шийно-лицьової ділянки, рак легенів, рак яєчників, лейкемію; в/міхурове введення показане при лікуванні поверхневого раку сечового міхура^{БНФ} (перехідноклітинний рак, карцинома *in situ*) та для профілактики рецидиву після трансуретральної резекції.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати в/в та внутрішньоміхурово^{БНФ}; при стандартному дозуванні при монотерапії рекомендована доза для дорослих - 60-90 мг/м² площі поверхні тіла, яка вводиться в/в протягом 5-10 хв. з інтервалами у 21 день, відповідно до стану крові/кісткового мозку; при монотерапії у високих дозах у пацієнтів, які раніше не отримували лікування, при дрібноклітинному раку легенів вводити 120 мг/м² в 1 день кожні 3 тижні; при недрібноклітинному раку легенів (епідермоїдний, сквамозний та аденокарцинома) - 135 мг/м² в 1 день або 45 мг/м² в 1, 2, 3 дні кожні 3 тижні; при ад'ювантній терапії раку молочної залози на початкових стадіях рекомендовані дози від 100 мг/м² до 120 мг/м² кожні 3-4 тижні, в/в ін'єкція протягом 5-10 хв. або в/в інфузія протягом не більше 30 хв.; застосування нижчих доз (60-75 мг/м² або 105-120 мг/м² у схемах дозування для високих доз) рекомендовано пацієнтам зі зниженим резервом кісткового мозку внаслідок попереднього лікування із застосуванням хіміотерапії та/або променевої терапії, пацієнтам літнього віку, пухлинною інфільтрацією кісткового мозку; загальну дозу на цикл можна розділити для прийому протягом 2-3 послідовних днів; при лікуванні перехідноклітинної папілярної карциноми рекомендовано проведення щотижневих в/міхурових інстиляцій по 50 мг, які повторюються протягом 8 тижнів; при розвитку місцевої токсичності знизити дозу до 30 мг; при лікуванні карциноми *in situ* дозу можна підвищити до 80 мг; для профілактики рецидиву після трансуретральної резекції поверхневих пухлин рекомендовано проведення щотижневих інстиляцій по 50 мг, протягом 4 тижнів, після чого інстиляція тієї ж дози 1 раз/місяць триває до повного року.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції, г.лімфолейкоз, г. мієлопоетична лейкемія, мієлосупресія (лейкоцитопенія, гранулоцитопенія, нейтропенія, фебрильна нейтропенія, анемія), тромбоцитопенія; анафілаксія; анорексія, дегідратація; гіперурикемія; запаморочення; застійна СН (задишка, набряк, гіпертрофія печінки, асцити, набряк легенів, плевральний випіт, ритм галопу), кардіотоксичність (зміни на ЕКГ, аритмії, кардіоміопатія), шлуночкова тахікардія, брадикардія, АВ-блокада, міжшлуночкова блокада; припливи крові; флебіт, тромбофлебіт; шок, тромбоемболічні явища (емболія легенів); мукозит, езофагіт, стоматит, блювання, діарея, нудота; алопеція; кропив'янка; червоне забарвлення сечі протягом одного або двох днів після введення; аменорея, азооспермія; еритема у місці інфузії, нездужання, астенія, гарячка, озноб; зміни рівня трансаміназ; хімічний цистит, іноді геморагічний, відчуття печіння, полакіурія після внутрішньоміхурового

введення; частота невідома: септичний шок, сепсис, пневмонія; кровотеча і тканинна гіпоксія у результаті міелосупресії; кон'юнктивіт, кератит; ерозія слизової оболонки порожнини рота, виразковий стоматит, біль у роті, печіння слизової оболонки, кровотеча з рота та пігментація щік; місцева токсичність, висипання, свербіж, зміни на шкірі, еритема, припливи, гіперпігментація шкіри і нігтів, фоточутливість, гіперчутливість опроміненої шкіри (ремісія побічних ефектів променевої терапії); флебосклероз, місцевий біль, тяжкий целюліт, некроз тканини після випадкового перивенозного введення, безсимптомні перепади фракції викиду лівого шлуночка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активної речовини або до будь-якої допоміжної речовини, інших антрациклінів та антраценедіонів; період годування груддю; активна депресія ф-ції кісткового мозку внаслідок раніше проведених курсів лікування із застосуванням інших протипухлинних засобів або радіотерапії; **в/в** введення протипоказано пацієнтам з: кардіоміопатіями, нещодавно перенесеним ІМ, тяжкою аритмією, нестабільною стенокардією, персистуючою міелосупресією; тяжким порушенням ф-ції печінки; наявною г. генералізованою інфекцією; попереднім лікуванням максимальними кумулятивними дозами епірубіцину та/або іншими антрациклінами та антрацендіонами; **в/міхурове** введення протипоказано пацієнтам з інфекціями сечовивідних шляхів, інвазивною пухлиною, що проростає у сечовий міхур, запаленням сечового міхура та пацієнтам з гематурією; особлива увага потрібна у разі труднощів у проведенні катетеризації (зокрема, уретральна непрохідність, викликана значним внутрішньоміхуровим новоутворенням).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕПІРУБІЦИН - ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А./Сіндан Фарма С.Р.Л., Італія/Румунія	р-н д/ін'єк. по 10мл, 100мл у фл.	2 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕПІРУБІЦИН - ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А./Сіндан Фарма С.Р.Л., Італія/Румунія	р-н д/ін'єк. по 25мл у фл.	2 мг/мл	№1	1000,00	30,24/€
	ЕПІРУБІЦИН - ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А./Сіндан Фарма С.Р.Л., Італія/Румунія	р-н д/ін'єк. по 50мл у фл.	2 мг/мл	№1	1900,00	30,24/€
	ЕПІРУБІЦИН - ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А./Сіндан Фарма С.Р.Л., Італія/Румунія	р-н д/ін'єк. по 5мл у фл.	2 мг/мл	№1	400,00	30,24/€
	ЕПІРУБІЦИН "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (повний цикл виробництва)/Лабор Л+С АГ (контроль/випробування серії)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (контроль/випробування серії), Австрія/Німеччина/Австрія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 50мл, 100мл у фл.	2 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕПІРУБІЦИН "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (повний цикл виробництва)/Лабор Л+С АГ (контроль/випробування серії)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (контроль/випробування серії), Австрія/Німеччина/Австрія	конц. д/р-ну д/інфуз. 5мл у фл.	2 мг/мл	№1	204,79	25,84/\$
	ЕПІРУБІЦИН "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (повний цикл виробництва)/Лабор Л+С АГ (контроль/випробування серії)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (контроль/випробування серії), Австрія/Німеччина/Австрія	конц. д/р-ну д/інфуз. 25мл у фл.	2 мг/мл	№1	754,31	25,60/\$
	ЕПІРУБІЦИН АМАКСА	Стадафарм ГмбХ (контроль якості, вторинне пакування, маркування,	р-н д/ін'єк. по 5мл у фл.	2 мг/мл	№1	250,98	34,79/€

	випуск серій)/Тимоорган Фармаціє ГмбХ (виробництво розчину bulk, заповнення, контроль якості, первинне та вторинне пакування), Німеччина/Німеччина					
ЕПІРУБІЦИН АМАКСА	Стадафарм ГмбХ (контроль якості, вторинне пакування, маркування, випуск серій)/Тимоорган Фармаціє ГмбХ (виробництво розчину bulk, заповнення, контроль якості, первинне та вторинне пакування), Німеччина/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 100мл у фл.	2 мг/мл	№1	3200,88	34,79/€
ЕПІРУБІЦИН АМАКСА	Стадафарм ГмбХ (контроль якості, вторинне пакування, маркування, випуск серій)/Тимоорган Фармаціє ГмбХ (виробництво розчину bulk, заповнення, контроль якості, первинне та вторинне пакування), Німеччина/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 10мл у фл.	2 мг/мл	№1	500,19	34,79/€
ЕПІРУБІЦИН АМАКСА	Стадафарм ГмбХ (контроль якості, вторинне пакування, маркування, випуск серій)/Тимоорган Фармаціє ГмбХ (виробництво розчину bulk, заповнення, контроль якості, первинне та вторинне пакування), Німеччина/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 25мл у фл.	2 мг/мл	№1	800,66	34,79/€
ЕПІРУБІЦИН МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Спеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (Виробництво "in bulk", пакування, маркування та контроль серії)/Мед-ІКС-Пресс ГмбХ (маркування та вторинне пакування, Німеччина/Німеччина/Німеччина/Чеська Республіка	р-н д/ін'єк. по 50мл у фл.	2 мг/мл	№1	1485,83	27,93/€
ЕПІРУБІЦИН МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Спеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (Виробництво "in bulk", пакування, маркування та контроль серії)/Мед-ІКС-Пресс ГмбХ (маркування та вторинне пакування, Німеччина/Німеччина/Німеччина/Чеська Республіка	р-н д/ін'єк. по 5мл у фл.	2 мг/мл	№1	273,71	27,93/€
ЕПІРУБІЦИН МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Спеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та	р-н д/ін'єк. по 100мл у фл.	2 мг/мл	№1	4652,21	23,86/€

	випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (Виробництво "in bulk", пакування, маркування та контроль серії)/Мед-ІКС-Пресс ГмбХ (маркування та вторинне пакування, Німеччина/Німеччина/Німеччина/Чеська Республіка					
ЕПІРУБІЦИН МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (Виробництво "in bulk", пакування, маркування та контроль серії)/Мед-ІКС-Пресс ГмбХ (маркування та вторинне пакування, Німеччина/Німеччина/Німеччина/Чеська Республіка	р-н д/ін'єк. по 10мл у фл.	2 мг/мл	№1	547,41	27,93/€
ЕПІРУБІЦИН МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (Виробництво "in bulk", пакування, маркування та контроль серії)/Мед-ІКС-Пресс ГмбХ (маркування та вторинне пакування, Німеччина/Німеччина/Німеччина/Чеська Республіка	р-н д/ін'єк. по 25мл у фл.	2 мг/мл	№1	821,12	27,93/€
ЕПІРУБІЦИН-ТЕВА	Фармахеми Б.В., Нідерланди	р-н д/ін'єк. або інфуз. по 10мл у фл.	2 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЕПІРУБІЦИН-ТЕВА	Фармахеми Б.В., Нідерланди	р-н д/ін'єк. або інфуз. по 5мл у фл.	2 мг/мл	№1	197,94	26,89/\$
ЕПІРУБІЦИН-ТЕВА	Фармахеми Б.В., Нідерланди	р-н д/ін'єк. або інфуз. по 25мл у фл.	2 мг/мл	№1	703,27	26,89/\$
ЕПІСІНДАН	Сіндан Фарма СРЛ (виробництво за повним циклом)/Актавіс Італія С.п.А. (виробництво за повним циклом)/Тюмурган Фармаці ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції; контроль серії), Румунія/Італія/Німеччина	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	10мг, 50мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
СТРИБІЦИН	МАЙЛАН ЛАБОРАТОРІЗ ЛІМІТЕД (OTL), Індія	р-н д/ін'єк. по 25мл, 100мл у фл.	2 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Ідарубіцин (Idarubicin) ***

Фармакотерапевтична група: L01DB06 - цитотоксичні а/б та споріднені препарати; антрацикліни та споріднені сполуки.

Основна фармакотерапевтична дія: антрациклін-глікозид, який вбудовується між ланцюгами ДНК, взаємодіє з ферментом топоізомеразою II та пригнічує синтез нуклеїнових кислот; має більш високу активність порівняно з даунорубіцином; менш високі рівні перехресної резистентності порівняно з доксорубіцином та даунорубіцином, більш високий терапевтичний індекс, ніж для даунорубіцину та доксорубіцину; мутагенна, тератогенна, потенційна канцерогенна дія; головний метаболіт (ідарубіцинол) також має протипухлинну активність та суттєво менш кардіотоксичний порівняно з ідарубіцином.

Показання для застосування ЛЗ: в/в: г. мієлоїдна лейкемія у дорослих^{БНФ}, для індукції ремісії у пацієнтів, які раніше не отримували лікування, або у пацієнтів з рецидивами або рефрактерним перебігом захворювання; як препарат другої лінії для лікування рецидивів г. лімфобластної лейкемії у дорослих^{БНФ} та дітей; для лікування г. мієлоїдної лейкемії у поєднанні з цитарабіном для індукції ремісії як препарат першої лінії терапії у дітей; капс.: поширений рак молочної залози - після безрезультатної хіміотерапії препаратами першої лінії, не включаючи терапію антрациклінами^{БНФ}; г. нелімфобластна лейкемія^{БНФ} у дорослих - для індукції ремісії у пацієнтів, які раніше не отримували лікування, або у пацієнтів із рецидивами або рефрактерним перебігом захворювання у випадках, коли не можна застосовувати ін'єкційну форму ідарубіцину; у схемах комбінованого лікування, поєднуючи з іншими цитотоксичними ЛЗ.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовується в/в та р/ос; вводити в/в повільно, протягом 5-10 хв; доза розраховується, враховуючи площу поверхні тіла; г. мієлоїдна лейкемія - дорослі: 12 мг/м²/добу в/в щоденно протягом 3 днів у комбінації з цитарабіном або 8 мг/м²/добу в/в щоденно протягом 5 днів окремо чи у комбінації з ін. препаратами; діти: 10-12 мг/м²/добу в/в протягом 3 днів у поєднанні з цитарабіном; г. лімфобластна лейкемія - дорослі: при застосуванні у вигляді монотерапії 12 мг/м² в/в щоденно протягом 3 днів; діти: при застосуванні у вигляді монотерапії 10 мг/м² в/в щоденно протягом 3 днів; *капс:* при монотерапії г. нелімфобластної лейкемії рекомендована доза дорослим - 30 мг/м² на добу впродовж 3 днів; у комбінації з іншими протилейкемічними засобами - від 15 до 30 мг/м² на добу впродовж 3 днів; при монотерапії поширеного раку молочної залози рекомендована доза - 45 мг/м², розраховану дозу застосовувати в один день або розділяють на 3 послідовні дні (15 мг/м²/добу); терапію повторювати кожні 3-4 тижні, залежно від гематологічних показників; дозування 35 мг/м² у вигляді однократної дози можна застосовувати у комбінації з іншими хіміотерапевтичними засобами, приймаючи до уваги дозу інших цитотоксичних засобів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції, сепсис, септицемія; вторинна лейкемія (г. мієлоїдна лейкемія та мієлодиспластичний с-м); анемія, тяжка лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія; анафілаксія; анорексія, дегідратація; гіперурикемія; церебральна геморагія; брадикардія, синусова тахікардія, тахіаритмія, безсимптомне зниження фракції викиду лівого шлуночка, застійна СН, кардіоміопатії, локальний флебіт, тромбофлебіт, кровотеча, відхилення на ЕКГ (неспецифічні зміни сегменту ST), ІМ, шок, перикардит, міокардит, АВ-блокада та блокада ніжки пучка Гіса, тромбоемболія, припливи; нудота, блювання, мукозит/стоматит, діарея, біль у животі або відчуття пекучого болю, кровотеча ШКТ, кишкові коліки, езофагіт, коліт (тяжкий ентероколіт/нейтропенічний ентероколіт з перфорацією), ерозії або виразки шлунка; підвищення активності ферментів печінки та рівня білірубіну; алопеція, висипання, свербіж, гіперчутливість опроміненої шкіри (реактивація побічних ефектів променевої терапії), гіперпигментація шкіри та нігтів, кропив'янка, запалення підшкірної клітковини, некроз тканин, акральна еритема; забарвлення сечі у червоний колір протягом 1-2 днів після введення; лихоманка, головний біль, озноб; стоматит, утворення виразок слизових оболонок, дегідратація внаслідок важкого блювання та діареї; ризик перфорації товстої кишки; флебіт/тромбофлебіт; гіперурикемія; частота невідома: панцитопенія, с-м лізису пухлини, місцева р-ція.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до ідарубіцину або до будь-яких інших компонентів препарату та до інших антрациклінів чи антрацендіонів; тяжка печінкова, ниркова недостатність, неконтрольовані інфекції, тяжка кардіоміопатія, нещодавно перенесений ІМ, тяжкі аритмії, персистуюча мієлосупресія, попереднє лікування максимальними кумулятивними дозами ідарубіцину та/або іншими антрациклінами та антрацендіонами; період годування груддю; під час вагітності цей засіб можна використовувати тільки після ретельного зважування користі й потенційних ризиків.

Визначена добова доза (DDD): перорально/парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЗАВЕДОС	Актавіс Італія С.п.А. (вторинне пакування, тестування при випуску серії, випуск серії)/НерФарма С.р.Л. (виробництво "in bulk", первинне пакування), Італія/Італія	капс. у фл.	10мг	№1	5287,38	22,03/\$
	ЗАВЕДОС®	Актавіс Італія С.п.А., Італія	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	5мг	№1	2708,99	27,09/\$
	ІДАРУБІЦИН ЕБЕВЕ®	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (повний цикл виробництва)/Лабор ЛС СЕ & Ко. КГ (тестування), Австрія/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. у фл. по 5мл, 10мл; 20мл у фл.	1 мг/мл	№5; №1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІДАРУБІЦИН ЕБЕВЕ®	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (повний цикл виробництва)/Лабор ЛС СЕ & Ко. КГ (тестування), Австрія/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. у фл. по 5мл у фл.	1 мг/мл	№1	2132,10	27,43/\$
	ІДАРУБІЦИН	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х.	конц. д/р-ну	1 мг/мл	№1	4264,20	27,43/\$

ЕБЕВЕ®	Нфг. КГ (повний цикл виробництва)/Лабор ЛС СЕ & Ко. КГ (тестування), Австрія/Німеччина	д/інфуз. у фл. по 10мл у фл.				
--------	--	------------------------------	--	--	--	--

• **Мітоксантрон (Mitoxantrone) ***

Фармакотерапевтична група: L01DB07 - антінеопластичні засоби; антрацикліни та споріднені сполуки.

Основна фармакотерапевтична дія: похідний антрацендіону; зв'язується з ядерною ДНК; чинить цитотоксичний ефект як на проліферуючі, так і непроліферуючі клітини людини, тобто його дія не залежить від фази клітинного циклу; блокує клітинний цикл у G2-фазі, що призводить до збільшення клітинної РНК і поліплодії. *In vitro* мітоксантрон інгібує проліферацію В-клітин, Т-клітин та макрофагів і порушує представлення антигену, а також секрецію гамма-інтерферону, фактора некрозу пухлини альфа та інтерлейкіну-2.

Показання для застосування ЛЗ: метастатичний рак молочної залози, неходжкінська лімфома^{БНФ}, г. мієлоїдний лейкоз у дорослих^{БНФ}, у комбінованій терапії індукції ремісії при бластному кризі при лікуванні хр. мієлоїдної лейкемії; у комбінації з кортикостероїдами для паліативного лікування прогресуючого гормон-резистентного раку передміхурової залози; для лікування пацієнтів з високою активністю рецидивуючого розсіяного склерозу, що супроводжується швидкою втратою дієздатності, при неможливості застосування альтернативних терапевтичних засобів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовується в/в; метастатичний рак молочної залози, неходжкінська лімфома: при монотерапії рекомендована первинна доза 14 мг/м² площі поверхні тіла шляхом разової в/в інфузії, яку можна повторювати кожну 21 добу; при лікуванні пацієнтів зі знизженими резервами кісткового мозку початкову дозу рекомендується знизити до 12 мг/м² або нижче; наступні дози і час їх введення визначають залежно від ступеня і тривалості мієлосупресії; при проведенні наступних курсів терапії зазвичай можна повторити введення попередньої дози, якщо через 21 добу кількість лейкоцитів і тромбоцитів повернулася до нормальних рівнів; при метастатичному раку молочної залози свою ефективність підтвердили комбінації мітоксантрону з ін. цитотоксиками, включаючи циклофосфамід та 5-фторурацил або метотрексат та мітоміцин С; ЛЗ використовується в різних комбінаціях для лікування неходжкінської лімфоми, проте, наразі ці дані є обмеженими, отже, конкретні схеми порекомендувати неможливо; застосування мітоксантрону в якості складової частини комбінованої терапії в початковій дозі від 7-8 до 10-12 мг/м² в залежності від комбінації та частоти використання підтвердило свою ефективність; при застосуванні мітоксантрону в комбінації з ін. мієлосупресивними засобами слід зменшити його початкову дозу на 2-4 мг/м² поверхні тіла порівняно з рекомендованою дозою при монотерапії; г. мієлоїдний лейкоз: при монотерапії рецидиву для індукування ремісії 12 мг/м² площі поверхні тіла шляхом разової в/в дози щоденно впродовж 5 діб поспіль (всього 60 мг/м²), при комбінованій терапії доза для індукування становить 12 мг/м² щоденно в дні 1-3 шляхом в/в інфузії та 100 мг/м² цитарабіну протягом 7 діб шляхом безперервної 24-годинної інфузії в дні 1-7; лікування бластної кризи при (хр.) мієлоїдному лейкозі - застосування разової дози при рецидиві: становить від 10 до 12 мг/м² площі поверхні тіла шляхом разової в/в дози щоденно впродовж 5 діб поспіль (всього 50-60 мг/м²); поширений кастраційно-резистентний рак передміхурової залози: рекомендована доза від 12 до 14 мг/м² шляхом короткої в/в інфузії кожну 21 добу в комбінації з низькими р/ос дозами кортикостероїдів; розсіяний склероз: 12 мг/м² площі поверхні тіла у вигляді короткої (приблизно 5-15 хв.) в/в інфузії, яку можна повторювати кожні 1-3 міс.; максимальна сукупна доза, отримана протягом життя, не має перевищувати 72 мг/м², якщо мітоксантрон застосовують повторно, коригування дози має ґрунтуватися на ступені та тривалості пригнічення функції кісткового мозку.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекція (включаючи летальні наслідки), інфекція сечовивідних шляхів, ВДШ, опортуністичні, пневмонія, сепсис; г. мієлоїдний лейкоз, мієлодиспластичний с-м, г. лейкоз; анемія, нейтропенія, лейкопенія; тромбоцитопенія, гранулоцитопенія, патологічна кількість лейкоцитів; мієлосупресія, недостатність кісткового мозку; анафілаксія/ анафілактоїдні р-ції (включаючи шок); анорексія; коливання маси тіла, с-м лізису клітин пухлини; сонливість, неврит, судоми, головний біль; тривожність, сплутаність свідомості, парестезія; зміна кольору склери; застійна СН, ІМ (включаючи летальні випадки); аритмія, відхилення у результатах ЕКГ, зменшення фракції викиду лівого шлуночка, синусова брадикардія; кардіоміопатія; синці, крововилив, гіпотензія; задишка, риніт; нудота, блювання, зміни смакових відчуттів, закреп, діарея, стоматит, біль у шлунку, крововиливи ШКТ, запалення слизових оболонок, панкреатит; підвищення рівнів АСТ, гепатотоксичність; алопеція; еритема, ураження нігтів, висип, зміна кольору шкіри, некроз шкіри (після екстравазації); підвищення рівня креатиніну в сироватці, азоту сечовини в крові, токсична нефропатія, зміна кольору сечі, аменорея; астенія, втома, пірексія; набряк, екстравазація, дисгевзія, раптовий летальний наслідок; частота невідома: кон'юнктивіт, порушення сперматогенезу.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до ЛЗ або до інших компонентів препарату, годування груддю; не можна використовувати у лікуванні розсіяного склерозу у вагітних жінок.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	МІТОКСАНТРОН "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг.КГ (повний цикл виробництва)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (тестування)/Лабор ЛС СЕ & Ко. КГ (тестування),	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл у фл.	2 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

	Австрія/Австрія/Німеччина					
МІТОКСАНТРОН "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг.КГ (повний цикл виробництва)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (тестування)/Лабор ЛС СЕ & Ко. КГ (тестування), Австрія/Австрія/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	2 мг/мл	№1	2191,50	27,69/\$

19.1.5. Сполуки платини

• Цисплатин (Cisplatin) *

Фармакотерапевтична група: L01XA01 - антинеопластичні засоби, сполуки платини.

Основна фармакотерапевтична дія: неорганічна сполука, яка містить важкий метал - платину; зв'язується з усіма основами ДНК, особливо атомами N-7 гуаніну та аденіну, та інгібує синтез ДНК внаслідок формування перехресних зв'язків всередині ниток ДНК і між ними; синтез білку та РНК також пригнічуються, проте меншою мірою; підвищує імуногенність пухлин; онколітична дія порівнянна з дією алкілюючих речовин; має імуносупресивні та антибактеріальні властивості й підвищує чутливість до опромінення; дія на клітини не залежить від фази циклу.

Показання для застосування ЛЗ: поширені або метастатичні злоякісні пухлини, зокрема рак яєчка^{ВООЗ,БНФ} (як паліативний засіб та у комплексі лікувальної поліхіміотерапії), рак яєчника (III і IV стадій)^{ВООЗ,БНФ}, карцинома сечового міхура^{ВООЗ,БНФ}, плоскоклітинна епітеліома голови та шиї^{БНФ} (як паліативний засіб); застосовують у вигляді монотерапії або у комбінації з іншими антинеопластичними засобами^{БНФ}; рак легенів, цервікальні пухлини^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дози визначають залежно від нозології, очікуваної р-ції на терапію, та з огляду на те, застосовується цисплатин у вигляді монотерапії чи як складова комбінованої хіміотерапії; для дорослих та дітей при монотерапії рекомендуються такі схеми лікування: одноразове введення 50-120 мг/м² поверхні тіла кожні 3-4 тижні; щоденне введення 15-20 мг/м² поверхні тіла протягом 5 днів з повторенням курсів кожні 3-4 тижні; при комбінованій хіміотерапії зазвичай призначають у дозі 20 мг/м² поверхні тіла або більше кожні 3-4 тижні, р-н для інфузій можна вводити лише шляхом в/в краплинної інфузії, вводять протягом 6-8 год.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гематологічні (лейкопенія, тромбоцитопенія та анемія), ШКТ (анорексія, нудота, блювання та діарея), розлади слуху (слухові порушення), ниркові розлади (ниркова недостатність, нефротоксичність, гіперурикемія) та лихоманка; ототоксична дія, інфекції, сепсис; вторинна лейкемія; лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія (Кумбс-позитивна гемолітична анемія), гемоліз; пригнічення ф-ції кісткового мозку (агранулоцитоз та/або апластична анемія); р-ції підвищеної чутливості (висипання, кропив'янка, еритема, свербіж), ангіоневротичний набряк, анафілактичні р-ції; артеріальна гіпотензія, тахікардія, задишка, бронхоспазм, набряк обличчя і пропасниці; імуносупресія; підвищення рівня амілази у сироватці крові, неадекватна секреція антидіуретичного гормону; гіпонатріємія, гіпомагніємія, гіпокальціємія, гіпофосфатемія та гіпокаліємія з м'язовими спазмами та/або змінами ЕКГ внаслідок ураження ниркової системи; гіперхолестеринемія, підвищення концентрації заліза у крові, дегідратація, гіперурикемія, тетанія; периферична нейропатія (двобічна і сенсорна), втрата смакової або тактильної ф-ції, ретробульбарний неврит із втратою зору і порушеннями церебральних функцій (сплутаність свідомості, невиразне мовлення, кіркова сліпота, втрата пам'яті, параліч); розвиток симптому Лермітта, автономної нейропатії і мієлопатії спинного мозку; ураження головного мозку (випадки г. цереброваскулярних ускладнень, церебральний артеріт, оклюзія сонної артерії, енцефалопатія), конвульсії, лейкоенцефалопатія, с-м оборотної задньої лейкоенцефалопатії, судоми; цереброваскулярні ускладнення, геморагічний інсульт, ішемічний інсульт, втрата смаку, арефлексія; втрата зору; набряк диска зорового нерва, ретробульбарний неврит, порушення зору та кольоросприйняття, розпливчатий зір, набряк диска зорового нерва, пігментація сітківки; порушення слуху, шум у вухах та/або порушення слуху, глухота і порушення роботи вестибулярного апарату у комбінації із системними запамороченнями (вертиго), втрата здатності до нормального спілкування; аритмія, брадикардія, тахікардія та інші зміни ЕКГ; АГ, ІМ, зупинка серця, тяжка ішемічна хвороба серця, порушення серцевої діяльності; флебіти у місці ін'єкції; розвиток васкулярних порушень (церебральна, міокардіальна ішемія, порушення периферичної циркуляції крові, подібні до с-му Рейно), тромботична мікроангіопатія (гемолітичний уремічний с-м); задишка, пневмонія, недостатність дихальної системи, легенева емболія; металеві відкладення на яснах, стоматит, діарея; підвищення рівнів сироваткових трансаміназ, зниження рівня альбуміну, підвищення білірубіну крові, еритема, виразки на шкірі у місці ін'єкції; спазм у м'язах; порушення сперматогенезу, овуляції, аменорея, азооспермія, болюча гінекомастія; лихоманка, трансудація у місці ін'єкції, гикавка, неспокій, астенія, слабкість, втома, озноб.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до цисплатину або до інших препаратів, які містять платину або будь-який компонент препарату, в анамнезі; порушення ф-ції нирок (кліренс креатиніну <60 мл/хв); дегідратація організму (для запобігання розвитку серйозних порушень ф-ції нирок необхідна перед- і постгідратація); пригнічення ф-ції кісткового мозку; порушення слуху; нейропатія, спричинена лікуванням цисплатином; період вагітності та годування груддю; застосування разом з вакциною проти жовтої лихоманки і проведення профілактичної терапії фенітоїном.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЦИСПЛАТИН	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х.	конц. д/р-ну	1 мг/мл	№1	868,76	26,78/\$

"ЕБЕВЕ"	Нфг.КГ (повний цикл виробництва)/Лабор ЛС СЕ & Ко. КГ (тестування)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (тестування)/Зейберсдорф Лабор ГмбХ (тестування), Австрія/Німеччина/Австрія/ Австрія	д/інфуз. по 100мл у фл.				
ЦИСПЛАТИН "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг.КГ (повний цикл виробництва)/Лабор ЛС СЕ & Ко. КГ (тестування)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (тестування)/Зейберсдорф Лабор ГмбХ (тестування), Австрія/Німеччина/Австрія/ Австрія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 20мл	0,5 мг/мл	№1	107,97	26,78/\$
ЦИСПЛАТИН "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг.КГ (повний цикл виробництва)/Лабор ЛС СЕ & Ко. КГ (тестування)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (тестування)/Зейберсдорф Лабор ГмбХ (тестування), Австрія/Німеччина/Австрія/ Австрія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 50мл	0,5 мг/мл	№1	215,93	26,78/\$
ЦИСПЛАТИН "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг.КГ (повний цикл виробництва)/Лабор ЛС СЕ & Ко. КГ (тестування)/МПЛ Мікробіологішес Прюфлабор ГмбХ (тестування)/Зейберсдорф Лабор ГмбХ (тестування), Австрія/Німеччина/Австрія/ Австрія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 100мл	0,5 мг/мл	№1	431,58	26,78/\$
ЦИСПЛАТИНА АККОРД	Інтас Фармасьютікалз Лімітед (виробництво ГЛЗ, первинне та вторинне пакування, контроль якості серії)/Аккорд Хелскеа Лімітед (вторинне пакування; відповідальний за випуск серії), Індія/Велика Британія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл, 25мл у фл.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЦИСПЛАТИНА АККОРД	Інтас Фармасьютікалз Лімітед (виробництво ГЛЗ, первинне та вторинне пакування, контроль якості серії)/Аккорд Хелскеа Лімітед (вторинне пакування; відповідальний за випуск серії)/Астрон Резьорч Лімітед (контроль якості серій)/Фармадокс Хелскеа Лтд. (контро, Індія/Велика Британія/Велика Британія/Мальта/Угорщина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 50мл у фл.	1 мг/мл	№1	450,00	27,08/\$
ЦИСПЛАТИНА АККОРД	Інтас Фармасьютікалз Лімітед (виробництво ГЛЗ,	конц. д/р-ну д/інфуз. по	1 мг/мл	№1	900,00	27,08/\$

	первинне та вторинне пакування, контроль якості серії)/Аккорд Хелскеа Лімітед (вторинне пакування; відповідальний за випуск серії)/Астрон Резьорч Лімітед (контроль якості серій)/Фармадокс Хелскеа Лтд. (контроль, Індія/Велика Британія/Велика Британія/Мальта/Угорщина	100мл у фл.				
ЦИСПЛАТИН-МІЛІ	Венус Ремедіс Лімітед, Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 20мл, 50мл у фл.	0,5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЦИСПЛАТИН-МІЛІ	Венус Ремедіс Лімітед, Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 100мл у фл.	0,5 мг/мл	№1	237,00	26,70/\$
ЦИСПЛАТИН-ТЕВА	Фармахемі Б.В., Нідерланди	конц. д/р-ну д/інфуз. по 50мл у фл.	0,5 мг/мл	№1	189,23	27,07/\$
ЦИСПЛАТИН-ТЕВА	Фармахемі Б.В., Нідерланди	конц. д/р-ну д/інфуз. по 100мл у фл.	0,5 мг/мл	№1	403,23	27,79/\$
ЦИСПЛАТИН-ТЕВА	Фармахемі Б.В., Нідерланди	конц. д/р-ну д/інфуз. по 20мл у фл.	0,5 мг/мл	№1	99,90	27,07/\$
ЦИСПЛАТИН-ТЕВА	Фармахемі Б.В., Нідерланди	конц. д/р-ну д/інфуз. по 100мл у фл.	1 мг/мл	№1	618,61	27,79/\$

● **Карбоплатин (Carboplatin) ***

Фармакотерапевтична група: L01XA02 - антинеопластичні засоби; сполуки платини.

Основна фармакотерапевтична дія: є цитотоксичним комплексом платини, що вступає в р-цію з нуклеофільними ділянками ДНК; через утворення міжспіральных і внутрішньоспіральных зшивок у ДНК, а також зшивок ДНК-білок пригнічується синтез ДНК, РНК і білків; протипухлинна дія не є специфічною щодо фаз клітинного циклу.

Показання для застосування ЛЗ: як монотерапія або в комбінації з ін. антинеопластичними засобами для лікування епітеліального раку яєчників і дрібноклітинного раку легенів^{БНФ}

Список застосування та дози ЛЗ: дорослим пацієнтам, які раніше не лікувалися, за умови нормальної ф-ції нирок (тобто коли кліренс креатиніну > 60 мл/хв) вводити у дозі 400 мг/м² поверхні тіла шляхом разової короткої в/в інфузії, тривалість введення від 15 до 60 хв.; наступний курс терапії призначати не раніше ніж через 4 тижні, та/або поки вміст нейтрофілів не буде становити 2×10^9 /л, а вміст тромбоцитів - 100×10^9 /л; пацієнтам, які належать до групи ризику (яким раніше призначали препарати з активною мієлосупресивною дією та/або променевою терапією, а також хворим із загальним поганим станом здоров'я - загальний стан по Зуброду (шкала ECOG) 2-4 або індекс Карновського менше 80), призначати у початковій дозі 300-320 мг/м² поверхні тіла; низькі дози препарату можна призначати у разі застосування у комбінації з ін. протипухлинними препаратами; у пацієнтів з кліренсом креатиніну < 60 мл/хв виникає підвищений ризик розвитку мієлосупресії; оптимальне застосування карбоплатину з ін. мієлосупресивними препаратами вимагає коригування доз залежно від використаного режиму і схеми лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекційні ускладнення, іноді з летальним наслідком, пневмонія; вторинні злоякісні новоутворення; тромбоцитопенія, лейкопенія, нейтропенія, пригнічення ф-ції кісткового мозку; анемія, фебрильна нейтропенія, кровотеча, іноді з летальним наслідком, гемолітико-уремічний с-м; р-ції гіперчутливості до карбоплатину, гарячка без відомої причини, р-ції анафілактичного типу, іноді з летальним наслідком (набряк обличчя, задишка, тахікардія, низький АТ, кропив'янка, анафілактичний шок, бронхоспазм); гіпомагніємія, зміна концентрації натрію (гіпонатріємія), гіпокальціємія, гіпокаліємія, підвищення активності лужної фосфатази, рівня АСТ, сечовини, креатиніну, загального білірубину, зниження кліренсу креатиніну, зневоднення, анорексія, с-м лізису пухлини; периферичні нейропатії, судоми, парестезії, зниження остеосхожильних рефлексів, сенсорні порушення, дисгевзія, г. порушення мозкового кровообігу, іноді з летальним наслідком, с-м зворотної задньої лейкоенцефалопатії (СЗЗЛ); порушення зору; субклінічне зниження гостроти слуху, шум у вухах, гіпоакузія; серцево-судинні розлади, СН, іноді летальна, у поєднанні з емболією та г. порушенням мозкового кровообігу; геморагічні ускладнення, артеріальна гіпертензія та гіпотензія, судинна емболія, іноді з летальним наслідком, кровотечі, крововиливи; розлади дихання, інтерстиціальні захворювання легень, задишка, кашель, бронхоспазм, пневмосклероз, фіброз легенів зі стискаючим болем у грудях та задишкою; нудота, блювання, біль у животі, діарея і запори, анорексія, шлунково-кишкові кровотечі, стоматит, коліки, запалення слизової оболонки порожнини рота, панкреатит; тяжкі порушення ф-ції печінки; захворювання шкіри, алопеція, еритема, висипання, свербіж, кропив'янка; захворювання опорно-рухового апарату; уrogenітальні порушення, підвищення рівнів сечовини, креатиніну в сироватці крові, а також зниження кліренсу креатиніну нижче 60 мл/хв; гематурії, гемолітико-уремічний синдром, поява набряків, болісне, утруднене сечовипускання; азооспермія та аменорея; відчуття загального нездужання, астенія, озноб без ознак інфекції, головний біль;

печіння, біль, набряк, почервоніння шкіри у місці ін'єкції, екстравазація, некроз внаслідок екстравазації; зниження ниркового кліренсу креатиніну, підвищення рівня азоту сечовини та сечової кислоти у крові, порушення показників з боку печінки (підвищення рівнів загального білірубіну, ЛФ, АСТ), електролітні розлади (зниження рівнів калію, кальцію, магнію, натрію).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до карбоплатину та до ін. препаратів, що містять платину, в анамнезі; тяжке пригнічення ф-ції кістковомозкового кровотворення в анамнезі; тяжкі порушення ф-ції нирок (кліренс креатиніну менше 30 мл/хв), крім випадків, коли, на думку лікаря і пацієнта, можливі переваги лікування переважають над ризиками; порушення слуху; пухлини, що кровоточать, та ін. значні крововтрати; одночасне застосування вакцини проти жовтої гарячки; г. інфекції.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	КАРБО СПАЛ 150	СП Акур Лабс Pvt. Ltd., Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 15мл у фл.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КАРБО СПАЛ 450	СП Акур Лабс Pvt. Ltd., Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 45мл у фл.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КАРБОПА	Інтас Фармасьютикалз Лімітед (виробництво готового лікарського засобу, первинне та вторинне пакування, контроль якості серії)/Аккорд Хелскеа Лімітед (вторинне пакування; відповідальний за випуск серії)/Астрон Резьорч Лімітед (контроль якості серії)/Фармад, Індія/Велика Британія/Велика Британія/Мальта/Угорщина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл, 15мл, 45мл, 60мл у фл.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КАРБОПЛАТИН	Венус Ремедіс Лімітед, Індія	р-н д/ін'єк. по 5мл, 45мл у фл.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КАРБОПЛАТИН "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл, 60мл у фл.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КАРБОПЛАТИН "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 45мл у фл.	10 мг/мл	№1	1102,04	25,60/\$
	КАРБОПЛАТИН "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 15мл у фл.	10 мг/мл	№1	517,57	25,60/\$
	КАРБОПЛАТИН АМАКСА	Стадафарм ГмбХ (контроль якості, вторинне пакування, випуск серій, маркування)/Тимоорган Фармаціє ГмбХ (виробництво розчину bulk, заповнення, контроль якості, первинне та вторинне пакування), Німеччина/Німеччина	р-н д/інфуз. по 45мл у фл.	10 мг/мл	№1	1590,91	29,40/€
	КАРБОПЛАТИН АМАКСА	Стадафарм ГмбХ (контроль якості, вторинне пакування, випуск серій, маркування)/Тимоорган Фармаціє ГмбХ (виробництво розчину bulk, заповнення, контроль якості, первинне та вторинне пакування),	р-н д/інфуз. по 60мл у фл.	10 мг/мл	№1	2454,55	29,40/€

	Німеччина/Німеччина					
КАРБОПЛАТИН АМАКСА	Стадафарм ГмбХ (контроль якості, вторинне пакування, випуск серій, маркування)/Тимоорган Фармаціе ГмбХ (виробництво розчину bulk, заповнення, контроль якості, первинне та вторинне пакування), Німеччина/Німеччина	р-н д/інфуз. по 5мл у фл.	10 мг/мл	№1	345,45	29,40/€
КАРБОПЛАТИН АМАКСА	Стадафарм ГмбХ (контроль якості, вторинне пакування, випуск серій, маркування)/Тимоорган Фармаціе ГмбХ (виробництво розчину bulk, заповнення, контроль якості, первинне та вторинне пакування), Німеччина/Німеччина	р-н д/інфуз. по 15мл у фл.	10 мг/мл	№1	845,45	29,40/€
КАРБОПЛАТИН МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробництво "in bulk", первинне пакування та контроль серій), Німеччина/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз по 15мл у фл.	10 мг/мл	№1	1075,29	30,72/€
КАРБОПЛАТИН МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробництво "in bulk", первинне пакування та контроль серій), Німеччина/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз по 45мл у фл.	10 мг/мл	№1	1935,52	30,72/€
КАРБОПЛАТИН МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробництво "in bulk", первинне пакування та контроль серій), Німеччина/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 60мл у фл.	10 мг/мл	№1	2734,31	30,72/€
КАРБОПЛАТИН МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробництво "in bulk", первинне пакування та контроль серій), Німеччина/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	10 мг/мл	№1	367,07	24,47/€
КАРБОПЛАТИН МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування,	конц. д/р-ну д/інфуз. по 100мл у фл.	10 мг/мл	№1	4404,81	24,47/€

	маркування, контроль та випуск серії)/Онкотек Фарма Продакшн ГмБХ (виробництво "in bulk", первинне пакування та контроль серій), Німеччина/Німеччина					
КАРБОПЛАТИН-ТЕВА	Фармахеми Б.В., Нідерланди	конц. д/р-ну д/інфуз. по 45мл у фл.	10 мг/мл	№1	1153,84	27,79/\$
КАРБОПЛАТИН-ТЕВА	Фармахеми Б.В., Нідерланди	конц. д/р-ну д/інфуз. по 60мл у фл.	10 мг/мл	№1	1554,02	27,79/\$
КАРБОПЛАТИН-ТЕВА	Фармахеми Б.В., Нідерланди	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	10 мг/мл	№1	233,16	27,79/\$
КАРБОПЛАТИН-ТЕВА	Фармахеми Б.В., Нідерланди	конц. д/р-ну д/інфуз. по 15мл у фл.	10 мг/мл	№1	437,14	27,79/\$
КАРБОПЛАТИН-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А., Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 45мл у фл.	10 мг/мл	№1	2030,76	28,77/€
КАРБОПЛАТИН-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А., Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 60мл у фл.	10 мг/мл	№1	2200,00	28,77/€
КАРБОПЛАТИН-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А., Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	10 мг/мл	№1	353,18	28,77/€
КАРБОПЛАТИН-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А., Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 15мл у фл.	10 мг/мл	№1	816,72	28,77/€
КАРБОХОП	Гленмарк Дженерікс С.А., Аргентина	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	150мг, 450мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
СТРИКАРБ	МАЙЛАН ЛАБОРАТОРІЗ ЛІМІТЕД (OTL), Індія	р-н д-інфуз. по 5мл, 15мл, 45мл, 60мл у фл.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Оксаліплатин (Oxaliplatin) ***

Фармакотерапевтична група: L01XA03 - антинеопластичні засоби; сполуки платини.

Основна фармакотерапевтична дія: проявляє широкий спектр як цитотоксичності *in vitro*, так і протипухлинної активності *in vivo* на різних моделях пухлин, включаючи моделі колоректального раку людини; також проявляє активність *in vitro* і *in vivo* на різних моделях пухлин, стійких до цисплатину; у комбінації з 5-фторурацилом спостерігалася синергічна цитотоксична дія; дослідження механізму дії оксаліплатину, хоча він ще недостатньо вивчений, підтверджує гіпотезу про те, що біотрансформовані водні похідні оксаліплатину взаємодіють із ДНК шляхом утворення між- і внутрішньоланцюгових поперечних зв'язків і пригнічують синтез ДНК, що спричиняє цитотоксичність і протипухлинний ефект.

Показання для застосування ЛЗ: у комбінації з 5-фторурацилом та фоліновою к-тою: лікування метастатичного колоректального раку^{БНФ}, для ад'ювантної терапії колоректального раку III стадії^{БНФ} (стадія С за класифікацією Дьюка) після повного видалення первинної пухлини.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: тільки дорослим, розведений у 250-500 мл 5 % р-ну глюкози (50 мг/мл), для отримання концентрації не менше 0,2 мг/мл вводити у центральну або периферичну вену протягом 2-6 год.; рекомендована доза при призначенні ад'ювантної терапії 85 мг/м² в/в, цю ж дозу вводять повторно кожні 2 тижні протягом 12 циклів (6 міс.); рекомендована доза при лікуванні метастатичного колоректального раку 85 мг/м² в/в, яку вводять повторно кожні 2 тижні до припинення прогресування захворювання або до появи ознак непереносимої токсичності; оксаліплатин слід завжди вводити раніше, ніж фторопіримідини, наприклад перед введенням 5-фторурацилу: водити у вигляді 2-6-год. в/в інфузії, розведеним у 250-500 мл 5 % р-ну глюкози (50 мг/мл), для отримання концентрації від 0,2 до 0,7 мг/мл; 0,7 мг/мл відповідає найвищій концентрації, що застосовується у клінічній практиці при дозі оксаліплатину 85 мг/м²; оксаліплатин переважно вводять у комбінації з безперервною інфузією 5-фторурацилу; оксаліплатин слід завжди вводити раніше, ніж 5-фторурацил; для схеми лікування, що повторюється кожні два тижні, рекомендується режим дозування у вигляді болюсного введення 5-фторурацилу та безперервної інфузії 5-фторурацилу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції; риніт, г. респіраторні інфекції, фебрильна нейтропенія/нейтропенічний сепсис; анемія, нейтропенія, тромбоцитопенія, лейкопенія, лімфопенія, фебрильна нейтропенія, імуноалергічна тромбоцитопенія, гемолітична анемія; алергія, АР, анорексія, гіперглікемія, гіпокаліємія, гіпернатріємія, дегідратація, гіпокальціємія, метаболічний ацидоз; депресія, безсоння, нервозність; периферична сенсорна нейропатія, сенсорні розлади, порушення смаку, головний біль, запаморочення, неврит рухового нерва, менінгізм, дизартрія, синдром оборотної задньої лейкоенцефалопатії (PRES)**; кон'юнктивіт,

розлади зору; тимчасове зниження гостроти зору, розлади поля зору, оптичний неврит, тимчасова втрата зору, проходить після припинення терапії; ототоксичність, глухота; кровотеча, гіперемія, тромбоз глибоких вен, емболія легеневих судин, АГ, припливи, тромбоемболія; диспное, кашель, носова кровотеча, гикавка, емболія легеневої артерії, г. інтерстиційні захворювання легень, іноді летальний, легеневий фіброз; нудота, діарея, блювання, стоматит/мукозит, біль у животі, запор, диспепсія, гастроєзофагеальний рефлюкс, гастроінтестинальна кровотеча, ректальна кровотеча, парез кишечника, обструкція кишечника, коліт, включаючи діарею, спричинену *Clostridium difficile*, діарея, панкреатит; розлади з боку шкіри, алопеція; ексфолюація шкіри (наприклад долонно-підшовний синдром), еритематозний висип, висип, гіпергідроз, розлади з боку придатків шкіри; біль у спині, артралгія, біль у кістках, гематурія, дизурія, часті та болісні позиви до сечовипускання; втомлюваність, гарячка, астения, біль, реакція у місці ін'єкції; підвищення рівня ензимів печінки, ЛФ, білірубину, ЛДГ, збільшення маси тіла (при ад'ювантній терапії), підвищення рівня креатиніну, втрата маси тіла (при метастазах); синдром обструкції синусоїдів печінки; г. тубулярний некроз, г. інтерстиційний нефрит і г. ниркова недостатність, дисеміноване внутрішньосудинне зсідання крові (ДВЗ-синдром); гемолітичний уремійний синдром; аутоімунна панцитопенія; панцитопенія; вторинна лейкемія; септичний шок, включаючи летальні випадки; рабдоміоліз, включаючи летальні випадки.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до оксаліплатину або до допоміжної речовин в анамнезі; період годування груддю; мієлосупресія (кількість нейтрофілів $<2 \cdot 10^9/\text{л}$ та/або тромбоцитів $<100 \cdot 10^9/\text{л}$) до початку першого курсу лікування; периферична сенсорна нейропатія з функціональними порушеннями до початку першого курсу лікування; виражене порушення функції нирок (кліренс креатиніну <30 мл/хв).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ОКСАЛІПЛАТИН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (виробництво з продукції in bulk фірми-виробника Квілу Фармацевтікал (Хайнань) Ко., Лтд., Китай), Україна	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	50мг	№1	660,00	
	ОКСАЛІПЛАТИН	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (виробництво з продукції in bulk фірми-виробника Квілу Фармацевтікал (Хайнань) Ко., Лтд., Китай), Україна	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	100мг	№1	910,00	
II.	ЕЛОКСАТИН®	Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ, Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл, 20мл у фл.	5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МЕДАКСА	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (виробник, що відповідає за випуск серії, вторинне пакування, маркування, контроль/випробування серій)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробник, що відповідає за випуск форми in bulk, первинне пакування, кон, Німеччина/Німеччина	пор. ліоф. д/приг. р-ну д/інфуз. у скл. фл.	50мг	№1	977,52	27,93/€
	МЕДАКСА	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (виробник, що відповідає за випуск серії, вторинне пакування, маркування, контроль/випробування серій)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробник, що відповідає за випуск форми in bulk, первинне пакування, кон, Німеччина/Німеччина	пор. ліоф. д/приг. р-ну д/інфуз. у скл. фл.	100мг	№1	1955,04	27,93/€

МЕДАКСА	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (виробник, що відповідає за випуск серії, вторинне пакування, маркування, контроль/випробування серій)/Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробник, що відповідає за випуск форми in bulk, первинне пакування, кон, Німеччина/Німеччина	пор. ліоф. д/приг. р-ну д/інфуз. у скл. фл.	150мг	№1	2534,05	27,85/€
ОКСА 100	Емкур Фармасьютікалс Лтд., Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 20мл у фл.	5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ОКСА 50	Емкур Фармасьютікалс Лтд., Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл у фл.	5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ОКСАЛІПЛАТИН	РУП "Белмедпрепарати", Республіка Білорусь	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	50мг, 100мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ОКСАЛІПЛАТИН АМАКСА	АкВіда ГмбХ (контроль серії, сертифікація та випуск серії; виробництво in bulk, первинне пакування, контроль серії)/Венус Фарма ГмбХ (вторинне пакування, контроль серії)/Самянг Біофармас'ютікелз Корпорейшн (виробництво in bulk, первинне та вторинне пакува, Німеччина/Німеччина/Республіка Корея	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл у фл.	5 мг/мл	№1	1028,04	28,79/€
ОКСАЛІПЛАТИН АМАКСА	АкВіда ГмбХ (контроль серії, сертифікація та випуск серії; виробництво in bulk, первинне пакування, контроль серії)/Венус Фарма ГмбХ (вторинне пакування, контроль серії)/Самянг Біофармас'ютікелз Корпорейшн (виробництво in bulk, первинне та вторинне пакува, Німеччина/Німеччина/Республіка Корея	конц. д/р-ну д/інфуз. по 20мл фл.	5 мг/мл	№1	1962,62	28,79/€
ОКСАЛІПЛАТИН АМАКСА	АкВіда ГмбХ (контроль серії, сертифікація та випуск серії; виробництво in bulk, первинне пакування, контроль серії)/Венус Фарма ГмбХ (вторинне пакування, контроль серії)/Самянг Біофармас'ютікелз Корпорейшн (виробництво in bulk, первинне та вторинне пакува, Німеччина/Німеччина/Республіка Корея	конц. д/р-ну д/інфуз. по 40мл у фл.	5 мг/мл	№1	3738,32	28,79/€
ОКСАЛІПЛАТИН/ OXALIPLATIN	Аккорд Хелскеа Лімітед (вторинне пакування; дільниця випуску серії)/Аккорд Хелскеа Польска Сп. з о. о.	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл, 20мл у фл.	5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

	(дільниця випуску серії)/Астрон Ресьюрч Лімітед (дільниця контролю якості/тестування)/ДЕМО С.А. (вторинне пакування)/Інтас Фармасьютикалс Лімітед (вироб, Велика Британія/Польща/Велика Британія/Греція/Індія/Італія /Угорщина					
ОКСАЛІПЛАТИНО АККОРД ХЕЛСКЕА 50	Аккорд Хелскеа Лімітед (вторинне пакування, відповідальний за випуск серії)/Інтас Фармасьютикалз Лімітед (виробництво готового лікарського засобу, первинне пакування, контроль якості серії), Велика Британія/Індія	пор. д/р-ну д/інфуз. у фл.	50мг	№1	1000,00	26,81/\$
ОКСАЛІПЛАТИН-ТЕВА	Фармахеми Б.В., Нідерланди	конц. д/р-ну д/інфуз. по 4мл, 10мл, 20мл, 40мл у фл.	5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ОКСАЛІПЛАТИН-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А., Італія	пор. д/приг. р-ну д/інфуз. у фл.	50мг	№1	1000,00	27,67/€
ОКСАЛІПЛАТИН-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А., Італія	пор. д/приг. р-ну д/інфуз. у фл.	100мг	№1	2000,00	27,67/€
ОКСОЛ	Венус Ремедіс Лімітед, Індія	р-н д/ін'ек. по 25мл, 50мл у фл.	2 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
СОКСПЛАТ	МАЙЛАН ЛАБОРАТОРІЗ ЛІМІТЕД (OTL), Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл, 20мл, 40мл у фл.	5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

19.1.6. Моноклональні антитіла

- **Бевацизумаб (Bevacizumab)**

Фармакотерапевтична група: L01XC07 - антинеопластичні та імуномодулюючі засоби; антинеопластичні засоби; інші антинеопластичні засоби; моноклональні а/т.

Основна фармакотерапевтична дія: рекомбінантне гуманізоване моноклональне а/т, отримане за допомогою ДНК-технології у клітинах яєчників китайського хом'ячка; зв'язується з фактором росту ендотелію судин (VEGF), ключовим фактором васкулогенезу та ангіогенезу, пригнічуючи зв'язування VEGF з його рецепторами Flt-1 (VEGFR-1) та KDR (VEGFR-2) на поверхні ендотеліальних клітин; нейтралізація біологічної активності фактора росту ендотелію судин призводить до зниження васкуляризації пухлин, нормалізує не уражені пухлиною судини, пригнічує утворення нових судин у пухлині, пригнічуючи ріст пухлини; прогресування метастатичного захворювання гальмується, знижується проникність мікросудинного русла.

Показання для застосування ЛЗ: метастатичний колоректальний рак у комбінації з хіміотерапією на основі похідних фторпіримідину; метастатичний рак молочної залози: перша лінія лікування у комбінації з паклітакселом, перша лінія лікування у комбінації з капецитабіном; розповсюджений нерезектабельний, метастатичний чи рецидивуючий недрібноклітинний рак легень, за винятком переважно неплоскоклітинного раку легень, в якості першої лінії лікування у комбінації з хіміотерапією на основі похідних платини; розповсюджений нерезектабельний, метастатичний або рецидивуючий неплоскоклітинний недрібноклітинний рак легень з EGFR-активуючими мутаціями (EGFR - рецептор епідермального фактора росту) у дорослих пацієнтів у якості першої лінії лікування у комбінації з ерлотинібом; розповсюджений та/чи метастатичний нирково-клітинний рак у дорослих в якості першої лінії терапії у комбінації з інтерфероном альфа-2а; розповсюджений (стадії III B, III C і IV за класифікацією Міжнародної федерації акушерства та гінекології FIGO) епітеліальний рак яєчників, фаллопієвої труби і первинний рак очеревини у дорослих пацієнтів в якості першої лінії терапії у комбінації з карбоплатином і паклітакселом; лікування першого рецидиву епітеліального раку яєчників, фаллопієвої труби і первинного раку очеревини, чутливого до лікування препаратами платини у комбінації з карбоплатином і гемцитабіном або карбоплатином та паклітакселом у дорослих пацієнтів, які не отримували попередню терапію бевацизумабом або іншими інгібіторами VEGF, або засобами, дія яких направлена на VEGF^{BHФ}; лікування рецидивуючого епітеліального раку яєчників, фаллопієвої труби і первинного раку очеревини, резистентного до лікування препаратами платини у комбінації з паклітакселом, топотеканом або пегільованим ліпосомальним доксорубіцином у дорослих, які отримали не більше двох попередніх режимів хіміотерапії і які не отримували попередньої терапії бевацизумабом або іншими інгібіторами VEGF чи препаратами, дія яких направлена на

VEGF; лікування персистоючого, рецидивуючого або метастатичного раку шийки матки у комбінації з паклітакселом і цисплатином або, альтернативно, паклітакселом і топотеканом у дорослих пацієнтів, які не можуть отримувати терапію препаратами платини; лікування рецидивуючої гліобластоми (ступеня IV за ВООЗ), як монотерапія після попередньої терапії темозоломідом.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: метастатичний колоректальний рак - 5 мг/кг або 10 мг/кг 1 р/2 тижні чи 7,5 мг/кг або 15 мг/кг 1 р/3 тижні в/в інфузійно; метастатичний рак молочної залози - 10 мг/кг 1 р/2 тижні чи 15 мг/кг 1 р/3 тижні в/в інфузійно; неплоскоклітинний недрібноклітинний рак легень у комбінації з хіміотерапією на основі похідних платини: перша лінія лікування - комбінація з похідними платини протягом 6 курсів лікування з наступною монотерапією до появи ознак прогресування захворювання - 7,5 мг/кг чи 15 мг/кг 1 р/3 тижні в/в; розповсюджений та/чи метастатичний нирково-клітинний рак - 10 мг/кг 1 р/2 тижні в/в; епітеліальний рак яєчників, фаллопієвої труби і первинний рак очеревини: перша лінія лікування - комбінація з карбоплатином і паклітакселом до 6 курсів лікування з наступним застосуванням бевацизумабу в якості монотерапії до прогресування основного захворювання або протягом максимально 15 міс., або до розвитку неприйнятної токсичності; рекомендована доза 15 мг/кг 1 р/3 тижні в/в; лікування рецидиву захворювання - у комбінації з карбоплатином та гемцитабіном протягом від 6 до 10 курсів лікування або у комбінації з карбоплатином і паклітакселом протягом від 6 до 8 курсів лікування з наступним застосуванням бевацизумабу довгостроково в якості монотерапії до прогресування захворювання, рекомендована доза - 15 мг/кг 1 р/кожні 3 тижні в/в; лікування резистентного до дії препаратів платини рецидивуючого захворювання в поєднанні з одним з таких препаратів: паклітаксел, топотекан (при застосуванні щотижня) або пегільований ліпосомальний доксорубіцин, рекомендована доза - 10 мг/кг маси тіла 1 р/2 тижні в/в; в комбінації з топотеканом (у дні 1-5, кожні 3 тижні), рекомендована доза - 15 мг/кг маси тіла 1 р/3 тижні; лікування неплоскоклітинного недрібноклітинного раку легень з EGFR-активуючими мутаціями у комбінації з ерлотинібом: рекомендована доза становить 15 мг/кг маси тіла 1 р/кожні 3 тижні в/в інфузійно до прогресування захворювання; рак шийки матки: рекомендована доза - 15 мг/кг 1 р/кожні 3 тижні в/в у комбінації з одним з таких режимів хіміотерапії: паклітаксел і цисплатин або паклітаксел і топотекан; рецидивуюча гліобластома: рекомендована доза - 10 мг/кг кожні 2 тижні в/в інфузійно.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: слабкість, астенія, діарея, біль у животі, розвиток протеїнурії; сепсис, флегмона, абсцес, запалення п/ш клітковини, інфекції, інфекції сечовивідних шляхів, некротизуючий фасцит; фебрильна нейтропенія, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія, анемія, лімфопенія; гіперчутливість, інфузійні р-ції; анорексія, гіпомагніємія, гіпонатріємія, зневоднення; периферична сенсорна нейропатія, дизартрія, головний біль, дисгевзія, порушення мозкового кровообігу, непритомність, сонливість, с-м зворотної задньої енцэфалопатії, гіпертензивна енцэфалопатія; розлади з боку очей, підвищена слюзотеча; застійна СН, надшлуночкова тахікардія; АГ, тромбоемболія (венозна, артеріальна), кровотеча, тромбоз глибоких вен, розшарування артерій та аневризми; задишка, риніт, носова кровотеча, кашель, легенева кровотеча /кровохаркання, тромбоемболія легеневої артерії, гіпоксія, дисфонія; ректальна кровотеча, стоматит, запор, діарея, нудота, блювання, перфорація ШКТ, перфорація кишечника, ілеус, непрохідність кишечника, ректовагінальна нориця, розлади ШКТ, прокталгія; ускладнення загоєння рани, ексфолюативний дерматит, сухість шкіри, порушення забарвлення шкіри, с-м долонно-підшовної еритродизестезії; артралгія, міалгія, нориця, м'язова слабкість, біль у спині; протеїнурія; недостатність яєчників, біль в ділянці таза; зниження маси тіла; астенія, слабкість, гіпертермія, біль, запалення слизової оболонки, загальмованість; частота невідома: ниркова тромботична мікроангіопатія, легенева гіпертензія, перфорація носової перегородки, виразки ШКТ, перфорація жовчного міхура, остеонекроз щелепи, остеонекроз з локалізацією поза нижньою щелепою, аномалії плода.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до бевацизумабу або до будь-якого іншого компонента ЛЗ, гіперчутливість до лікарських засобів на основі клітин яєчників китайського хомячка або до інших рекомбінантних людських чи гуманізованих а/т, вагітність.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АВАСТИН®	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд (виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування, вторинне пакування, випробування контролю якості та випуск серії)/Рош Діагностикс ГмБХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування, вторинне пакування, випробу, Швейцарія/Німеччина/США /Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 16мл у фл.	25 мг/мл	№1	31188,00	26,71/\$
	АВАСТИН®	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд (виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування,	конц. д/р-ну д/інфуз. по 4мл у фл.	25 мг/мл	№1	8020,00	26,71/\$

	вторинне пакування, випробування контролю якості та випуск серії)/Рош Діагностикс ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування, вторинне пакування, випробу, Швейцарія/Німеччина/США /Німеччина					
ЗІРАБЕВ	Фармація і Апджон Компані ЛЛС (зберігання АФІ, виробництво, первинне пакування, тестування при випуску, вторинне пакування та маркування, випуск серії)/Ваєт БіоФарма Дівіжн оф Ваєт Фармасаеутикалс ЛЛС (тестування при випуску серії, тестування при досліджен, США/США/Ірландія/Бельгія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 4мл, 16мл у фл.	25 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Ритуксимаб (Rituximab) *** (див. п. 18.2.4. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: L01XC02 - антинеопластичні засоби; моноклональні а/т.

Основна фармакотерапевтична дія: генно-інженерні химеричні моноклональні а/т миші/людини, що є глікозилітованим Іg із послідовностями з постійного домена ІgG1 людини і легких і важких ланцюгів змінних доменів миші; а/т виробляються культурою суспензії клітин ссавців (ячничками китайського хом'яка) і очищаються за допомогою афінної хроматографії й іонообміну із застосуванням особливих процедур інактивації і видалення вірусів; специфічно зв'язується з трансмембранним антигеном CD20, неглікозилітованим фосфопротейном, розташованим на пре-В-лімфоцитах і зрілих лімфоцитах; CD20 розташований на нормальних і злоякісних В-клітинах, але відсутній на стовбурових гемопоетичних клітинах, про-В-клітинах, здорових плазматичних клітинах та здорових клітинах інших тканин; після зв'язування з а/т, CD20 не інтерналізується і не видаляється із клітинної мембрани в навколишнє середовище; CD20 не циркулює в плазмі у вигляді вільного а/г і тому не конкурує за зв'язування з а/т; можливі механізми клітинного лізису включають комплемент-залежну цитотоксичність і а/т-залежну клітинну цитотоксичність; зв'язування ритуксимабу з а/г CD20 на В-лімфоцитах індукує загибель клітин внаслідок апоптозу.

Показання для застосування ЛЗ: неходжкінські лімфоми: монотерапія пацієнтів з фолікулярними лімфомами III-IV ст., які є резистентними до хіміотерапії^{БНФ}, або знаходяться у стадії другого або подальших рецидивів після хіміотерапії; лікування CD20-позитивної дифузної В-великоклітинної неходжкінської лімфоми у комбінації з хіміотерапією^{БНФ} за схемою СНОР (циклофосфамід, доксорубіцин, вінкрисдин, преднізолон); лікування раніше нелікованої фолікулярної лімфоми III-IV ст. в комбінації з хіміотерапією; підтримуюча терапія фолікулярних лімфом після отримання відповіді на індукційну терапію^{БНФ}; лікування раніше нелізованого і рецидивуючого/рефрактерного хр. лімфолейкозу у комбінації з хіміотерапією^{БНФ}; РА: лікування тяжкого РА (активна форма) у дорослих у комбінації з метотрексатом при неефективності або непереносимості лікування ін. хворобо-модифікуючими протиревматичними препаратами, у тому числі лікування одним чи кількома інгібіторами фактору некрозу пухлини^{БНФ}; лікування тяжких форм активного грануломатозу з поліангіітом (грануломатоз Вегенера) і мікроскопічним поліангіітом у комбінації з глюкокортикоїдами з метою індукції ремісії у дорослих пацієнтів^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: конц. д/р-ну д/інфуз. 100 мг/10 мл застосовується в/в, р-н д/ін'єкц. 1400 мг/11,7 мл; п/ш; в/в інфузії вводять ч/з окремий катетер; перед введенням проводити премедикацію жарознижувального та антигістамінного засобу, ГК; перевіряти етикетки лікарського засобу, щоб переконатися, що пацієнту вводять саме ту лікарську форму (для в/в або п/ш введення), яка була йому призначена; рекомендована початкова швидкість інфузії становить 50 мг/год., надалі її можна збільшувати на 50 мг/год. кожні 30 хв., максимальна швидкість 400 мг/год.; комбінована терапія: фолікулярна неходжкінська лімфома: у комбінації з хіміотерапією для індукційного лікування раніше не лікованих пацієнтів або пацієнтів з рецидивуючими/рефрактерними фолікулярними лімфомами - в/в 375 мг/м² поверхні тіла на цикл (із наступним введенням п/ш 1400 мг на цикл, якщо це передбачено схемою лікування) із загальною тривалістю лікування до 8 циклів; раніше не лікованим хворим, у яких була отримана відповідь на індукційну терапію - в/в 375 мг/м² поверхні тіла (п/ш 1400 мг) 1 р/2 міс. (починаючи через 2 міс. після останньої дози індукційної терапії) до прогресування захворювання або впродовж максимального періоду тривалістю 2 роки; хворим з рецидивом/рефрактерним захворюванням, у яких була отримана відповідь на індукційну терапію - в/в 375 мг/м² поверхні тіла (п/ш 1400 мг) 1 р/3 міс. (починаючи через 3 міс. після останньої дози індукційної терапії) до прогресування захворювання або впродовж максимального періоду тривалістю 2 роки; монотерапія: рекомендована доза при застосуванні у монотерапії для індукційного лікування дорослих пацієнтів з фолікулярними лімфомами III-IV ст., які є резистентними до хіміотерапії або знаходяться у стадії другого або подальшого рецидиву після хіміотерапії, 375 мг/м² поверхні тіла, що вводяться у вигляді в/в інфузії 1 р/тиждень протягом 4 тижнів; рекомендована доза при повторному лікуванні як монотерапії пацієнтів, у яких була отримана відповідь на попередню монотерапію ритуксимабом з приводу рецидивуючої/рефрактерної фолікулярної лімфоми, - 375 мг/м² поверхні тіла, що вводяться у вигляді в/в інфузії 1

р/тиждень протягом 4 тижнів; дифузна В-великоклітинна неходжкінська лімфома: застосовувати у комбінації з хіміотерапією за схемою СНОР, рекомендована доза в/в 375 мг/м² поверхні тіла (із наступним введенням п/ш 1400 мг на цикл, якщо це передбачено схемою лікування) - вводиться в 1 день кожного циклу 8-циклової хіміотерапії після в/в введення кортикостероїдного компонента схеми СНОР; рекомендована доза у комбінації з хіміотерапією для раніше не лікованих хворих і хворих з рецидивуючим/рефрактерним хр. лімфолейкозом - в/в 375 мг/м² поверхні тіла - вводиться в 0 день першого циклу з наступним введенням в/в у дозі 500 мг/м² поверхні тіла або п/ш 1600 мг (якщо це передбачено схемою лікування) - вводиться в 1 день кожного наступного циклу протягом всього 6 циклів; рекомендована доза при РА - 1000 мг в/в, наступне введення у дозі 1000 мг проводиться через 2 тижні; грануломатоз з поліангіітом і мікроскопічним поліангіітом: рекомендована доза з метою індукції ремісії гранулематозу з поліангіітом і мікроскопічним поліангіітом становить 375 мг/м² поверхні тіла, що вводиться у вигляді в/в інфузії 1 р/тиждень протягом 4 тижнів (всього 4 інфузії).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: бактеріальні/ вірусні інфекції, бронхіт, сепсис, пневмонія, фебрильна інфекція, оперізуючий лишай, інфекції дихальних шляхів, грибкові інфекції, інфекції невідомої етіології, г. бронхіт, синусит, гепатит В, серйозні вірусні інфекції, пневмоцистна пневмонія, спричинена *Pneumocystis jirovecii*, прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія; нейтропенія, лейкопенія, фебрильна нейтропенія, тромбоцитопенія, анемія, панцитопенія, гранулоцитопенія, порушення згортання крові, апластична анемія, гемолітична анемія, лімфаденопатія, транзиторне підвищення рівня IgM в сироватці крові, пізня нейтропенія; інфузійні р-ції, ангіоневротичний набряк, підвищена чутливість, анафілаксія, с-м лізису пухлини, с-м вивільнення цитокінів, р-ція по типу сироваткової хвороби, гостра оборотна тромбоцитопенія, пов'язана з інфузією; гіперглікемія, зниження маси тіла, периферичні набряки, набряки обличчя, підвищення активності ЛДГ, гіпокальціємія; депресія, нервовість; парестезії, гіпестезії, тривога, безсоння, вазодилатація, запаморочення, неспокій, спотворення смаку, периферична нейропатія, параліч лицевого нерва, краніальна нейропатія, втрата іншої чутливості; порушення слюзовиділення, кон'юнктивіт, тяжка втрата зору; дзвін у вухах, біль у вухах, втрата слуху; ІМ, аритмія, фібриляція передсердь, тахікардія, порушення з боку серця, лівошлуночкова недостатність, суправентрикулярна/ шлуночкова тахікардія, стенокардія, ішемія міокарда, брадикардія; тяжкі захворювання серця, СН; АГ, ортостатична гіпотонія, артеріальна гіпотензія, васкуліт (переважно шкірний), лейкоцитокластичний васкуліт; бронхоспазм, захворювання дихальної системи, біль у грудній клітці, задишка, збільшення кашлю, нежить, БА, облітеруючий бронхіоліт, ураження легень, гіпоксія, інтерстиціальне захворювання легень, ДН, легеневі інфільтрати; нудота, блювання, діарея, абдомінальний біль, дисфагія, стоматит, запор, диспепсія, анорексія, подразнення в горлі, здуття живота, перфорація ШКТ; свербіж, висипання, алопеція, кропив'янка, пітливість, нічна пітливість, розлади з боку шкіри, тяжкі бульозні шкірні р-ції, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайєлла); м'язовий гіпертонус, міалгія, болі в суглобах/ спині/ шиї; ниркова недостатність, гарячка, озноб, астенія, головний біль, біль у пухлині, припливи, нездужання, с-м застуди, слабкість, тремтіння, поліорганна недостатність, біль у місці інфузії; зниження рівня IgG; частота невідома: пізня нейтропенія, г. оборотна тромбоцитопенія, пов'язана з інфузією, краніальна нейропатія, втрата іншої чутливості, втрата слуху, легеневі інфільтрати; токсичний вплив на кров, нейтропенічна інфекція, інфекція сечовивідних шляхів, сенсорний розлад, гіпертермія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин чи білків миші; активні тяжкі інфекції; виражений імунодефіцит; тяжка СН (IV ФК за класифікацією Нью-Йоркської асоціації кардіологів [NYHA]) або тяжкі декомпенсовані захворювання серця.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	РИТУКСИМ	ТОВ "Люм'єр Фарма" (виробництво з продукції in bulk виробника: Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія; Рош Діагностикс ГмбХ, Німеччина), Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл у фл. в чарун.уп.	10 мг/мл	№2	10660,00	
	РИТУКСИМ	ТОВ "Люм'єр Фарма" (виробництво з продукції in bulk виробника: Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія; Рош Діагностикс ГмбХ, Німеччина), Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. по 50мл у фл. в кор.	10 мг/мл	№1	26580,00	
II.	МАБТЕРА®	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, випробування контролю якості, випуск серії), Швейцарія	р-н д/ін'єк. по 11,7мл у фл.	1400мг/11,7мл	№1	32890,18	25,34/\$
	МАБТЕРА®	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд	конц. д/р-ну	10 мг/мл	№2	11223,88	25,56/\$

	(вторинне пакування, випробування контролю якості, випуск серії)/Рош Діагностикс ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування, вторинне пакування, випробування контролю якості, випуск серії)/Дженентек Інк. (виробни, Швейцарія/Німеччина/США /Німеччина/Німеччина	д/інфуз. по 10мл у фл.				
МАБТЕРА®	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд (вторинне пакування, випробування контролю якості, випуск серії)/Рош Діагностикс ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування, вторинне пакування, випробування контролю якості, випуск серії)/Дженентек Інк. (виробни, Швейцарія/Німеччина/США /Німеччина/Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 50мл у фл.	10 мг/мл	№1	27981,78	25,56/\$
РЕДДИТУКС	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 50мл у фл.	10 мг/мл	№1	13288,00	25,00/\$
РЕДДИТУКС	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл у фл.	10 мг/мл	№1	2928,00	25,00/\$
РИКСАТОН	Сандоз ГмбХ - Бізнес підрозділ технологічна розробка та виробництво біологічних лікарських засобів Шафтенау (БТДМ ДПС) (виробник, що відповідає за випуск серії)/Лек фармацевтична компанія д.д. (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, Австрія/Словенія/Німеччина /Швейцарія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 10мл, 50мл у фл.	10 мг/мл	№1, №2, №3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТРУКСИМА	СЕЛЛТРИОН Інк. (Виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, випробування стабільності)/Біотек Сервісес Інтернешнл Лтд (Виробник, відповідальний за випуск серії)/ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС (Випробування контролю якості при випуску, вторинне пакування, Республіка Корея/Велика Британія/Угорщина/Угорщина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 50мл у фл.	10 мг/мл	№1	15969,98	26,27/\$

• **Трастузумаб (Trastuzumab)**

Фармакотерапевтична група: L01XC03 - антинеопластичні засоби, моноклональні а/т.

Основна фармакотерапевтична дія: рекомбінантне гуманізоване моноклональне а/т, яке належить до класу IgG₁, до рецептора 2 епідермального фактора росту людини; а/т специфічно зв'язується з позаклітинним доменом рецептору 2 епідермального фактора росту людини (HER2); інгібує проліферацію пухлинних клітин людини з гіперекспресією HER2; є медіатором антитілозалежної клітинної цитотоксичності.

Показання для застосування ЛЗ: лікування хворих на метастазуючий рак молочної залози з пухлинною гіперекспресією HER2: у вигляді монотерапії^{БНФ}, якщо пацієнти вже одержали одну або більше схем хіміотерапії з приводу метастатичної стадії захворювання; у комбінації з паклітакселом або доцетакселом, якщо пацієнти ще не одержували хіміотерапію з приводу метастатичної стадії захворювання; у комбінації з інгібітором ароматази у пацієнтів у постменопаузі з метастатичним раком молочної залози з гормон-позитивним рецепторним статусом, які ще не одержували хіміотерапію з приводу метастатичної стадії захворювання; лікування хворих з ранніми стадіями раку молочної залози з пухлинною гіперекспресією HER2^{БНФ}: після проведення хірургічного втручання; завершення хіміотерапії (неoad'ювантною чи ад'ювантною) та (якщо це може бути застосовано) променевої терапії; у комбінації з паклітакселом або доцетакселом після ад'ювантною хіміотерапії доxorубіцином і циклофосфамідом; у комбінації з ад'ювантною хіміотерапією, до складу якої входить доцетаксел і карбоплатин; у комбінації із неoad'ювантною хіміотерапією із подальшим застосуванням трастузумабу для лікування місцево-поширеного (в тому числі запального) раку молочної залози або пухлин >2 см в діаметрі; у комбінації з капецитабіном чи в/в 5-фторурацилом і цисплатином показаний для лікування пацієнтів з HER2-позитивною метастатичною аденокарциномою шлунка чи гастроезофагеального з'єднання, які раніше не отримували хіміотерапію з приводу метастатичного захворювання^{БНФ}; застосовувати лише у пацієнтів з метастатичним раком шлунка із пухлинною гіперекспресією HER2, тобто із рівнем експресії 2+, визначеним за методом імуногістохімічного аналізу (ІГХ), та позитивним результатом аналізу за методом FISH або за методом гібридизації зі сріблом in situ (SISH), або із рівнем експресії 3+ за результатами валідованого ІГХ аналізу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: ліоф. д/конц. д/р-ну д/інфуз. тільки в/в крап.; р-н д/ін'єкц. - лише п/ш; метастатичний рак молочної залози - однотижнева схема: при монотерапії та комбінованій терапії навантажувальна доза 4 мг/кг у вигляді 90-хв. в/в крап. інфузії, підтримуючі дози 2 мг/кг/тижд.; якщо навантажувальна доза переносилася добре, то можна вводити у вигляді 30-хв. інфузії; під час кожного введення спостерігати пацієнта на предмет появи ознобу, лихоманки та інших інфузійних р-цій; у випадку появи інфузійних р-цій інфузію переривають; після зникнення симптомів інфузію можна відновити; в якості альтернативи щотижневому застосуванню, при монотерапії, а також у випадку комбінації рекомендується введення 1р/3 тижн., навантажувальна доза: 8 мг/кг маси тіла, через 3 тижні ввести в дозі 6 мг/кг маси тіла; далі підтримуюча доза: 6 мг/кг маси тіла кожні 3 тижн.; вводять у вигляді інфузії протягом 90 хв., якщо навантажувальна доза переносилася добре, можна вводити у вигляді 30-хв. в/в інфузії; ранні стадії раку молочної залози: застосовують до виникнення рецидиву хвороби або протягом 52 тижнів; при щотижневому застосуванні початкова доза 4 мг/кг; в подальшому вводять по 2 мг/кг щотижня; застосування 1р/3 тижні: навантажувальна доза: 8 мг/кг, підтримуюча доза: 6 мг/кг; першу підтримуючу дозу вводять через 3 тижні після початкової дози; розповсюджений рак шлунка або рак гастроезофагеального з'єднання - застосування 1р/3 тижн.: навантажувальна доза: 8 мг/кг; ч/з 3 тижн. вводять у дозі 6 мг/кг маси тіла; підтримуюча доза: 6 мг/кг, повторюючи введення з 3-тижн. інтервалами; р-н д/ін'єкцій: рекомендована доза для п/ш введення - 600 мг/5 мл незалежно від маси тіла пацієнта, протягом 2-5 хв. кожні 3 тижн.; пацієнтів з метастатичним раком молочної залози тривалість лікування повинна тривати до прогресування захворювання; у пацієнок з ранніми стадіями раку молочної залози тривалість лікування повинна становити 1 рік або до рецидиву захворювання, залежно від того, що відбудеться раніше.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кардіотоксичність, інфузійні реакції, гематотоксичність, інфекції та побічні р-ції з боку легень; СН класу II-IV за NYHA; гіперчутливість; лейкопенія, нейтропенія, фебрильна нейтропенія, анемія, тромбоцитопенія; назофарингіт, цистит, оперізуючий лишай, грип, синусит, шкірні інфекції, риніт, інфекції ВДШ, інфекції сечовидільних шляхів, фарингіт; прогресуюча злоякісна неоплазія, прогресуюча неоплазія; збільшення/ чи втрата маси тіла, знижений апетит, анорексія, гіперкаліємія, синдром лізису пухлини; безсоння, тривожність, депресія, порушення мислення; тремор, запаморочення, головний біль, парестезія, гіпостезія, дисгевзія, порушення смакових відчуттів, АГ, периферична нейропатія, запаморочення, сонливість; посилене слизовиділення, кон'юнктивіт, сухість очей; глухота; лімфедема, припливи крові, артеріальна гіпотензія, вазодилатація; тріпотіння передсердь, нерегулярне серцебиття, зниження фракції викиду, застійна СН, надшлуночкова тахіаритмія, кардіоміопатія, відчуття серцебиття; свистяче дихання, задишка, кашель, ринорея, носова кровотеча, ротоглотковий біль, БА, розлади з боку легень, плевральний випіт, пневмонія, пневмоніт; біль у животі, діарея, набряк губи, нудота, блювання, диспепсія, стоматит, запор, сухість у роті, геморої, панкреатит; гепатит, чутливість печінки при пальпації, гепатоцелюлярні порушення, жовтяниця; еритема, висипання, набряк обличчя, алопеція, долонно-підшовна дизестезія, токсичний вплив на нігті, розлади з боку нігтів, акне, сухість шкіри, п/ш крововиливи, гіпергідроз, макулопапульозний висип, свербіж, ломкість нігтьових пластинок (оніхоклазія), дерматит, кропив'янка; артралгія, ригідність м'язів, міалгія, артрит, біль у спині/ кістках/ шиї/ кінцівках, скелетно-м'язовий біль, спазми м'язів; порушення з боку нирок; мастит, мастодинія; астенія, біль у грудній клітці, озноб, втомлюваність, симптоми грипу, інфузійні р-ції, біль, лихоманка, периферичні набряки, запалення слизових оболонок; нездужання, набряк; частота невідома: запалення п/ш клітковини, бешиха, нейтропенічний сепсис, сепсис, менінгіт, бронхіт, гіпопротромбінемія, лейкемія, імунна тромбоцитопенія, анафілактичні р-ції, анафілактичний шок, гіперкаліємія, млявість, паранеопластична мозочкова дегенерація, парез, атаксія, набряк мозку, млявість, кома, церебрально-васкулярні порушення, набряк диска зорового нерва, крововиливи у сітківку, мадароз, кардіогенний шок, перикардальний випіт, перикардит, брадикардія, ритм галопу, тахікардія, інтерстиційна хвороба легень (легеневі інфільтрати, фіброз легень, ДН, зупинка дихання, г. набряк легень, г. респіраторний дистрес, пневмонія, бронхоспазм, гіпоксія, набряк гортані, ортопноє, пневмоніт, задишка при навантаженні, гикавка, г. респіраторний дистрес-с-м, респіраторний дистрес-с-м, зниження насиченості киснем, дихання Чейна - Стокса), гастрит, печінкова недостатність, ангіоневротичний набряк, оніхорексіс, с-м Стівенса - Джонсона, мембранозний гломерулонефрит, гломерулонефropатія, ниркова недостатність, дизурія, розвиток а/т проти трастузумабу.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до трастузумабу, мишачих білків, гіалуронідази або до будь-яких інших компонентів препарату; супутнє застосування антрациклінів; тяжка задишка у спокої, зумовлена метастазами в легенях або супутніми захворюваннями або задишка, яка вимагає застосування додаткової оксигенотерапії.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ТРАСТУМАБ	ТОВ "ЛЮМ'ЄР ФАРМА" (виробництво із продукції in bulk виробника: Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія; Рош Діагностикс ГмбХ, Німеччина), Україна	ліоф. д/конц. д/р-ну д/інфуз. у фл.	150мг	№1	12500,00	
II.	ГЕРЗУМА®	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС (контроль якості, вторинне пакування)/СЕЛЛТРІОН Інк. (виробництво in-bulk, первинне пакування та зберігання, вторинне пакування, контроль якості, тестування при випуску серії, випуск серії), Угорщина/Республіка Корея	ліоф. д/конц. д/р-ну д/інфуз. у скл. фл. з розч. та без	150мг, 440мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ГЕРЦЕПТИН®	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд (Виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування, випробування контролю якості; вторинне пакування, випробування контролю якості, випуск серії)/Дженентек Інк. (Виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування)/Рош Ді, Швейцарія/США/Німеччина	ліоф. д/конц. д/р-ну д/інфуз. у фл.	150мг	№1	13159,25	26,32/\$
	ГЕРЦЕПТИН®	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд (Вторинне пакування, випробування контролю якості, випуск серії; розчинник)/Дженентек Інк. Виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування, випробування контролю якості (тільки стерильність та механічні включення), Швейцарія/США	ліоф. д/конц. д/р-ну д/інфуз. у фл. з розч.	440мг	№1	35713,18	26,32/\$
	ГЕРЦЕПТИН®	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд (виробництво нерозфасованої продукції, пакування, випробування контролю якості, випуск серії), Швейцарія	р-н д/ін'ек. у фл.	600мг/5мл	№1	32555,42	25,48/\$
	ОГІВРІ	Біокон Лімітед/МакДермот Лабораторіз Лімітед Т/А Майлан Дублін Байолоджи/ДіЕйчЕль СЕПЛАЙ ЧЕЙН (Італі) Ес.пі.Ей./Чарлз Рівер Лабораторіз Едінбург Лімітед/Чарлз Рівер Лабораторіз Айрленд Лімітед/Холоджік Лімітед Т/А Тепнел Фарма Сервісез, Індія/Ірландія/Італія/Велик	пор. д/конц. д/р-ну д/інфуз. у фл.	150мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

	а Британія/Ірландія/Велика Британія				
ОГІВРІ	Біокон Лімітед/МакДермот Лабораторіз Лімітед Т/А Майлан Дублін Байолоджи/ДіЕйчЕль СЕПЛАЙ ЧЕЙН (Італі) Ес.пі.Ей. / Чарлз Рівер Лабораторіз Айрленд Лімітед/Чарлз Рівер Лабораторіз Едінбург Лімітед/Холоджік Лімітед Т/А Тепнел Фарма Сервісез, Індія/Ірландія/Італія/Ірландія/Велика Британія/Велика Британія	пор. д/конц. д/р-ну д/інфуз. у фл.	150мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
ОНТРУЗАНТ	Патеон Італія С.п.А. (виробництво, контроль якості для валідації виробничого процесу та комерційних серій (стерильність), тестування стабільності для клінічної серії (тест на цілісність закриття флакону))/ Біоген (Данія) (тестування стабільності для кліні, Італія/Данія/Франція/Ірландія/США/Ірландія/Бельгія/Італія	пор. д/конц. д/р-ну д/інфуз. у фл.	150мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
ОНТРУЗАНТ/ONTRUZANT®	Патеон Італія С.п.А. (виробництво, контроль якості для валідації виробничого процесу (PVR-process validation run) та комерційних серій (стерильність), тестування стабільності для клінічної серії (CCIT – Container Closure Integrity Test, тест на цілісність, Італія/Франція/Ірландія/Італія/США/Ірландія/Бельгія/Данія	пор. д/конц. д/р-ну д/інфуз. у фл.	150мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ
ТРАЗИМЕРА	Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ (зберігання АФІ, дозування АФІ у етиленвінілацетатні пакети і повторне заморожування, виробництво, пакування, маркування, тестування при випуску серії, випуск серії)/Пфайзер Ірландія Фармасьютікалз (тестування при випуску, Бельгія/Ірландія/Велика Британія	пор. д/конц. д/р-ну д/інфуз. у фл.	150мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ

• **Цетуксимаб (Cetuximab)**

Фармакотерапевтична група: L01XC06 - антинеопластичні засоби; моноклональні а/т.

Основна фармакотерапевтична дія: химерне моноклональне а/т класу IgG1, специфічна дія якого спрямована на рецептори епідермального фактора росту (EGFR); EGFR залучений до сигнального каскаду, який регулює життєздатність клітин, клітинний цикл, ангиогенез, процеси міграції клітин та клітинні інвазії/метастазування; афінність зв'язування цетуксимабу з EGFR приблизно в 5-10 разів вища за афінність зв'язування з ендогенними лігандами; блокує зв'язування ендогенних лігандів з EGFR, що призводить до інгібування функціонування рецепторів; індукуює інтерналізацію EGFR, що може призводити до негативної регуляції EGFR; сенсibiliзує цитотоксичні імунні ефекторні клітини по відношенню до EGFR-експресуючих пухлинних клітин (антитіло-залежна клітинно-опосередкована цитотоксичність, ADCC); не зв'язується з іншими рецепторами, що належать до сімейства HER; білковий продукт протоонкогену RAS (саркома щурів) є центральним низхідним трансдуктором

сигналу від EGFR; у пухлинах активація RAS за участю EGFR сприяє EGFR-опосередкованому зростанню проліферації, життєздатності та продукуванню проангіогенних факторів; цетуксимаб інгібує проліферацію та індукує апоптоз пухлинних клітин людини, які експресують EGFR; інгібує вироблення ангіогенних факторів клітинами пухлин та блокує міграцію ендотеліальних клітин; інгібує експресію ангіогенних факторів пухлинними клітинами та спричиняє зменшення неоваскуляризації та метастазування пухлин.

Показання для застосування ЛЗ: лікування пацієнтів з метастатичним колоректальним раком з RAS дикого типу та експресією рецепторів епідермального фактора росту EGFR: а) у комбінації з хіміотерапією на основі іринотекану або тривалих інфузій 5-фторурацилу/фолінової кислоти та оксаліплатину як перша лінія терапії; б) у вигляді монотерапії у випадку неефективної попередньої хіміотерапії на основі оксаліплатину та іринотекану, а також при непереносимості іринотекану; лікування пацієнтів з плоскоклітинним раком голови та шиї: а) у комбінації з променевою терапією для лікування локально-поширених форм як перша лінія терапії; б) у комбінації з хіміотерапією на основі сполук платини для лікування рецидивуючих та/або метастатичних пухлин; в) у вигляді монотерапії рецидивуючих або метастатичних пухлин у випадку неефективної попередньої хіміотерапії^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять в/в за допомогою інфузійної системи, інфузійного або шприцевого насоса; першу дозу вводити протягом 120 хв., наступні щотижневі інфузії вводити протягом 60 хв., швидкість інфузії не повинна перевищувати 10 мг/хв; під час інфузії та протягом щонайменше 1 год. після її завершення пацієнти повинні перебувати під ретельним медичним наглядом із забезпеченням доступу до реанімаційного обладнання; щонайменше за 1 год перед першою інфузією пацієнтам провести премедикацію антигістамінними препаратами та кортикостероїдами; за усіма показаннями вводять 1 р/тиждень; початкова доза 400 мг/м² площі поверхні тіла, в подальшому по 250 мг/м² площі поверхні тіла щотижнево; для лікування метастатичного колоректального раку у комбінації з хіміотерапією, а також у вигляді монотерапії; перед першою інфузією підтвердити дикий статус генів RAS (KRAS та NRAS) за допомогою валідованих методів у кваліфікованих лабораторіях; супутні ЛЗ не повинні вводитися раніше ніж через 1 год. після завершення інфузії; лікування локально-поширеного плоскоклітинного раку голови та шиї застосовують у комбінації з променевою терапією; рекомендується розпочинати лікування за тиждень до початку променевої терапії та продовжувати її до кінця терміну променевої терапії; для лікування рецидивуючого та/або метастатичного плоскоклітинного раку голови та шиї застосовують у комбінації з хіміотерапією на основі сполук платини, після чого проводять підтримуючу монотерапію цетуксимабом до прогресування основного захворювання; хіміотерапію не можна розпочинати раніше ніж ч/з 1 год. після завершення інфузії цетуксимабу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпомagneмія, дегідратація, спричинена діареєю або мукозитом, гіпокальціємія, анорексія; головний біль; асептичний менінгіт; кон'юнктивіт, блефарит, кератит; тромбоз глибоких вен; емболія легеневої артерії, інтерстиціальні захворювання легень; діарея, нудота, блювання; підвищення рівня печінкових ферментів (АСТ, АЛТ, ЛФ); шкірні реакції, с-м Стівенса-Джонсона/токсичний епідермальний некроліз; легкі, помірні та тяжкі інфузійні р-ції, мукозит, слабкість, у деяких випадках летальні наслідки.

Противпоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість на цетуксимаб III або IV ступеня за критеріями СТСАЕ; комбінація цетуксимабу з хіміотерапією із застосуванням оксаліплатину протипоказана пацієнтам з мутаціями або невідомим статусом генів RAS; перед тим, як розпочати комбіновану терапію врахувати протипоказання для застосування супутніх хіміотерапевтичних засобів або променевої терапії.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕРБІТУКС	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмБХ і Ко. КГ (виробництво готового лікарського засобу, первинне пакування, контроль якості)/Мерк КГаА (виробництво готового лікарського засобу, первинне та вторинне пакування, маркування, контроль якості та випуск серій)/Мерк Се, Німеччина/Німеччина/Італія	р-н д/інфуз. по 100мл у фл.	5 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕРБІТУКС	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмБХ і Ко. КГ (виробництво готового лікарського засобу, первинне пакування, контроль якості)/Мерк КГаА (виробництво готового лікарського засобу, первинне та	р-н д/інфуз. по 20мл у фл.	5 мг/мл	№1	5886,37	27,21/\$

		вторинне пакування, маркування, контроль якості та випуск серій)/Мерк Се, Німеччина/Німеччина/Італія				
--	--	--	--	--	--	--

• **Брентуксимаб ведотин (Brentuximab vedotin)**

Фармакотерапевтична група: L01XC12 - антинеопластичні засоби; інші антинеопластичні засоби; моноклональні а/т.

Основна фармакотерапевтична дія: кон'югат а/т з ЛЗ, який доставляє антинеопластичного агента до CD30-позитивних пухлинних клітин, що призводить до їх апоптотичної загибелі; зв'язування кон'югата з рецептором CD30 на оболонці клітини призводить до інтерналізації комплексу кон'югат-білок CD30 (ADC-CD30), який переміщується у лізосомний відділ клітини; всередині клітини в процесі протеолітичного розщеплення виділяється монометил ауристатин Е - єдина активна сполука; зв'язування монометил ауристатину Е з тубуліном призводить до розриву мікротубулярної сітки всередині клітини, індукує зупинку клітинного циклу та спричинює апоптоз (загибель) CD30-позитивної пухлинної клітини.

Показання для застосування ЛЗ: рецидивна або рефрактерна форма CD30-позитивної лімфоми Ходжкіна у дорослих: після аутологічної трансплантації стовбурових клітин; після принаймні двох попередніх ліній терапії, якщо аутологічна трансплантація стовбурових клітин або поліхіміотерапія не розглядається як лікувальна опція^{БНФ}; CD30-позитивна лімфома Ходжкіна за наявності підвищеного ризику рецидиву або прогресування захворювання після аутологічної трансплантації стовбурових клітин у дорослих; рецидивна або рефрактерна системна анапластична великоклітинна лімфома у дорослих^{БНФ}; CD30-позитивна Т-клітинна лімфома шкіри після щонайменше 1 курсу попередньої системної терапії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза становить 1,8 мг/кг в/в інфузійно протягом 30 хв. кожні 3 тижн.; пацієнти з рецидивною або рефрактерною лімфомою Ходжкіна або системною анапластичною великоклітинною лімфомою, що досягли стабілізації захворювання або кращої відповіді на лікування, мають пройти 8-16 циклів лікування (протягом 1 року); у пацієнтів з лімфомою Ходжкіна за наявності підвищеного ризику рецидиву або прогресування захворювання після аутологічної трансплантації стовбурових клітин лікування розпочинати після нормалізації стану після аутологічної трансплантації стовбурових клітин на підставі клінічної оцінки; такі пацієнти мають пройти до 16 циклів лікування; пацієнти з Т-клітинною лімфомою шкіри мають пройти до 16 циклів лікування; рекомендована початкова доза для повторного курсу лікування для пацієнтів із рецидивною або рефрактерною формою лімфоми Ходжкіна або системною анапластичною великоклітинною лімфомою, які раніше відповіли на терапію становить 1,8 мг/кг у вигляді в/в інфузії протягом 30 хв. кожні 3 тижні; альтернативно, лікування можна розпочинати із останньої переносимої дози; загальну дозу (мл) для подальшого розведення розраховують виходячи із маси тіла пацієнта; дозу (мг/кг) x масу тіла пацієнта (кг)/ концентрацію розведеного вмісту фл. (5 мг/мл); якщо маса тіла перевищує 100 кг, для розрахунку дози брати показник 100 кг; максимальна рекомендована доза 180 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції, інфекція ВДШ, оперізуючий герпес (Herpes zoster), пневмонія, простий герпес, кандидоз ротової порожнини, пневмоцистна пневмонія (Pneumocystis jiroveci pneumonia), стафілококова бактеріємія, цитомегаловірусна інфекція або її реактивація, сепсис/септичний шок; нейтропенія, анемія, тромбocитопенія, фебрильна нейтропенія; анафілактичні р-ції; гіперглікемія, с-м лізису пухлини; периферична сенсорна/ моторна нейропатія, запаморочення, демієлінізуюча полінейропатія; кашель, диспное; нудота, діарея, блювання, запор, абдомінальний біль, г. панкреатит; підвищення рівнів АЛТ/АСТ; висипання, свербіж; алопеція, с-м Стівенса – Джонсона/токсичний епідермальний некроліз; артралгія, міалгія, біль у спині, втомлюваність, безсоння, пірексія, реакції, пов'язані з інфузією, озноб; зниження маси тіла; наявність а/т до брентуксимабу ведотину; частота невідома: прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до ЛЗ; одночасне застосування брентуксимабу ведотину з блеоміцином (призводить до розвитку легеневої токсичності).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АДЦЕТРИС®	БСП Фармасьютікалз С.П.А. (виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка)/П'єр Фабр Медикамент Продакшн (виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка)/Делфарм Новара С.р.л. (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії)/Такеда Австрія Гм, Італія/Франція/Італія/Австрія/Велика Британія	пор. д/конц. д/р-ну д/інфуз. у фл.	50мг	№1	93009,46	30,12/€

19.1.7. Інгібітори протеїнази

• **Вемурафеніб (Vemurafenib)**

Фармакотерапевтична група: L01XE15 - антинеопластичні засоби; інгібітори протеїнкінази.

Основна фармакотерапевтична дія: інгібітор серин-треонінкінази, що кодується геном BRAF, мутації в гені BRAF призводять до конститутивної активації білків BRAF, що може спричинити проліферацію клітин у разі відсутності асоційованих факторів росту.

Показання для застосування ЛЗ: монотерапія нерезектабельної або метастатичної меланоми, в клітинах якої виявлено мутацію BRAF V600^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос; табл. ковтати цілими, запиваючи водою, не розжовувати або розламувати, приймати разом з їжею або без їжі, але слід уникати приймати послідовно обидві денні дози натщесерце; рекомендована доза 960 мг (4 табл. по 240 мг) 2р/добу; добова доза - 1 920 мг; інтервал між прийомами має становити не менше 4 год.; терапію рекомендується продовжувати до початку прогресування хвороби або появи неприйнятих ознак токсичності.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: артралгія, слабкість, висипи, р-ція фоточутливості, нудота, алопеція і свербіж; фолікуліт; плоскоклітинна карцинома шкіри, себорейний кератоз, папілома шкіри; базально-клітинна карцинома, нова первинна меланома; плоскоклітинна карцинома нешкірної локалізації; прогресування існуючої хр. мієломоноцитарної лейкемії, аденокарцинома підшлункової залози; нейтропенія; саркоїдоз; зниження апетиту, головний біль, порушення смаку; параліч сьомої пари черепно-мозкових нервів, запаморочення; периферичний набряк, астенія; увеїт; оклюзія вени сітківки; васкуліт; кашель; діарея, блювання, запор; панкреатит; крахення печінки; реакція фоточутливості, актинічний кератоз, висип, макуло-папульозний висип, папульозний висип, свербіж, гіперкератоз, еритема, алопеція, сухість шкіри, сонячний опік; с-м долонно-підшовної еритродизестезії, панікуліт (у т. ч. вузлова еритема), фолікулярний кератоз; токсичний епідермальний некроліз, синдром Стівенса-Джонсона; медикаментозний висип з еозинофілією і системним ураженням (DRESS-синдром); артралгія, міалгія, біль у кінцівках, скелетно-м'язовий біль, біль у спині; артрит, контрактура Дюпюїтрена; підшовний фасціальний фіброматоз; г. інтерстиціальний нефрит, г. тубулярний некроз; слабкість, гіпертермія, периферичний набряк, астенія; підвищення рівня ГГТ, АЛТ, ЛФ, білірубину, зниження маси тіла, подовження інтервалу QT, підвищення рівня креатиніну в крові; підвищення рівня АСТ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до вемурафенібу та інших компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЗЕЛБОРАФ®	Дельфарм Мілано, С.Р.Л. (виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування, вторинне пакування, випробування контролю якості)/Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд (випуск серії), Італія/Швейцарія	табл., вкриті п/о у бл.	240мг	№8x7	46590,44	24,51/\$

● **Гефїтїніб (Gefitinib) ****

Фармакотерапевтична група: L01XE02 - Інгібітори протеїнкінази.

Основна фармакотерапевтична дія: селективний низькомолекулярний інгібітор тирозинкінази рецепторів епідермального фактора росту і ефективний засіб лікування пацієнтів з пухлинами з активуючими мутаціями доменів тирозинкінази РЕФР незалежно від лінії терапії; клінічно значуща активність у пацієнтів з пухлинами зі встановленою відсутністю мутацій РЕФР не спостерігалася.

Показання для застосування ЛЗ: Лікування дорослих пацієнтів з місцеворозповсюдженим або метастатичним недрібноклітинним раком легень (НДКРЛ) з активуючими мутаціями РЕФР-ТК (тирозинкінази рецепторів епідермального фактора росту).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза - 250 мг 1 р/добу; у разі пропуску дози її слід прийняти, як тільки пацієнт про це згадає; якщо до прийому наступної дози залишилося менше 12 год., не слід приймати пропущену дозу та не слід приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. У разі тяжкої діареї або побічних р-цій з боку шкіри можливе тимчасове (до 14 діб) переривання курсу терапії, після чого застосування препарату поновлюють у дозі 250 мг; якщо пацієнти після тимчасового припинення терапії погано переносять лікування, застосування гефїтїнібу слід відмінити і розглянути альтернативні методи лікування; приймають перорально, незалежно від прийому їжі, приблизно в один і той самий час кожного дня, табл. можна ковтати цілою, запиваючи водою, або, якщо не вдається проковтнути цілу табл., її можна розчинити у воді (негазованій).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: Анорексія легкого або помірного ступеня тяжкості; кон'юнктивіт, блефарит і сухість очей, переважно легкого ступеня тяжкості; оборотна ерозія рогівки, інколи у поєднанні з неправильним ростом вій; кератит; кровотечі (носова кровотеча і гематурія); інтерстиціальне захворювання легень, часто тяжке (3-4 ступеня), можливі летальні випадки; діарея, переважно легкого або помірного ступеня тяжкості; блювання, переважно легкого або помірного ступеня тяжкості; нудота, переважно легкого ступеня тяжкості; стоматит, переважно легкого ступеня тяжкості; дегідратація внаслідок діареї, нудота, блювання або анорексія; сухість у роті, переважно легкого ступеня тяжкості; панкреатит; перфорація ШКТ; підвищення рівня АЛТ, АСТ, переважно незначне або помірне; підвищення рівня білірубину, переважно незначне або помірне; гепатит; шкірні р-ції, переважно легкого або помірного ступеня тяжкості; пустульозний висип, іноді свербіж із сухістю шкіри, включаючи тріщини шкіри на фоні еритеми; зміни нігтів; алопеція; АР, включаючи ангіоневротичний набряк і кропив'янку; бульозні стани, в т. ч. токсичний епідермальний некроліз, с-ром Стівенса - Джонсона і мультиформна еритема; шкірний васкуліт; асимптоматичне підвищення креатиніну крові у

лабораторних аналізах; протеїнурія; цистит; геморагічний цистит; астенія, переважно легкого ступеня тяжкості; гарячка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин, годування груддю.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ГЕФІТІНІБ-ВІСТА	Сінтон Хіспанія, С.Л. (дільниця, що відповідає за повний цикл виробництва)/Квінта - Аналітіка с.р.о. (дільниця, що відповідає за контроль якості (фізико-хімічний))/Джі І Фармасьютікалс, Лтд (дільниця, що відповідає за пакування), Іспанія/Чеська Республіка/Болгарія	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№10х3	9200,00	32,78/€
	ГЕФІТІНІБ АЛВОГЕН	Фармадокс Хелскеа Лтд. (вторинне пакування, тестування, випуск серії)/Лабормед-Фарма С.А. (випуск серії)/Лотус Фармасьютікал Ко., Лтд. (виробництво форми in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль якості, тестування стабільності), Мальта/Румунія/Тайвань	табл., вкриті п/о у бл.	250мг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Ерлотиніб (Erlotinib)**

Фармакотерапевтична група: L01XE03 - антинеопластичні засоби; інгібітори протеїнкінази.

Основна фармакотерапевтична дія: потужно інгібує внутрішньоклітинне фосфорилування рецепторів епідермального фактора росту HER1/EGFR (HER1 - рецептор епідермального фактора росту людини 1 типу/EGFR - рецептор епідермального фактора росту); HER1/EGFR експресується на поверхні як нормальних, так і ракових клітин; інгібування фосфотирозину EGFR зупиняє ріст ліній пухлинних клітин та/або призводить до їх загибелі.

Показання для застосування ЛЗ: перша лінія лікування пацієнтів з місцевопоширеним або метастатичним недрібноклітинним раком легень з EGFR-активуючими мутаціями; підтримуюче лікування пацієнтів з місцево поширеним або метастатичним недрібноклітинним раком легень (НДКРЛ) з EGFR-активуючими мутаціями і стабільним перебігом захворювання після хіміотерапії першої лінії; лікування місцевопоширеного або метастатичного недрібноклітинного раку легень після неефективної однієї або більше схем хіміотерапії; лікування метастатичного раку підшлункової залози, у комбінації з гемцитабіном^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: метастатичний недрібноклітинний рак легень - 150 мг 1 р/добу^{БНФ} за 1 год або через 2 год після прийому їжі; рак підшлункової залози - 100 мг 1 р/добу^{БНФ} за 1 год або через 2 год після прийому їжі в комбінації з гемцитабіном; якщо у пацієнта протягом перших 4-8 тижн. лікування не з'являються висипання, розглянути питання щодо подальшої терапії; при необхідності корекції дози, дозу зменшувати поетапно по 50 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тяжкі інфекції (з/без нейтропенії, пневмонія, сепсис, запалення п/ш клітковини); анорексія; кон'юнктивіт, сухий кератокон'юнктивіт; задишка, кашель; діарея (може призвести до дегідратації, гіпокаліємії, ниркової недостатності), нудота, блювання, стоматит, біль у животі, диспепсія, метеоризм, зниження маси тіла, ШКТ кровотечі/ перфорації; висипання (вугреподібний дерматит), свербіж, сухість шкіри; втомлюваність; депресія, головний біль, нейропатія; алопеція; втомлюваність, озноб, гарячка; кератит, кон'юнктивіт, зміни з боку вій (вростання вій, надмірний ріст, потовщення вій), перфорації рогівки, утворення виразок рогівки, увеїт; носові кровотечі, серйозне інтерстиціальне захворювання легень (з летальними наслідками); порушення функції печінки (підвищення АЛТ, АСТ, білірубину), печінкова недостатність; сухість шкіри, пароніхія, фолікуліт, акне/вугреподібний дерматит, тріщини шкіри, гірсуїтизм, зміни з боку брів, ламкість та втрата нігтів, р-ції з боку шкіри легкого ступеню тяжкості (гіперпігментація, с-м долонно-підшовної еритродизестезії, с-м синдром Стівенса-Джонсона/токсичний епідермальний некроліз); ниркова недостатність, нефрит, протеїнурія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до ерлотинібу або до будь-якого компонента препарату.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕРЛОТИНІБ АЛВОГЕН	РЕМЕДІКА ЛТД, Кіпр	табл., вкриті п/о у бл.	100мг, 150мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕРЛОТИНІБ-ТЕВА	Сіндан Фарма СРЛ (виробництво за повним циклом; контроль серії (тільки фізико-хімічні показники)), Румунія	табл., вкриті п/о у бл.	25мг, 100мг, 150мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕРЛОТОКС	РЕЛАЙНС ЛАЙФ САЙНСЕС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД (ПЛАНТ 6), Індія	табл., вкриті п/о у бл.	25мг, 100мг, 150мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕРТІНОБ	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина	табл., вкриті п/о у бл.	100мг, 150мг	№15x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТАРЦЕВА®	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія (виробництво нерозфасованої продукції, випробування контролю якості, випуск серії, пакування)/Іверс-Лі АГ (пакування)/Дельфарм Мілано, С.Р.Л. (виробництво нерозфасованої продукції, пакування, випробування контролю якості), Швейцарія/Швейцарія/Італія	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x3	37186,51	25,56/\$
	ТАРЦЕВА®	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія (виробництво нерозфасованої продукції; пакування; випробування контролю якості; випуск серії)/Іверс-Лі АГ (пакування)/Дельфарм Мілано, С.Р.Л. (виробництво нерозфасованої продукції, пакування, випробування контролю якості), Швейцарія/Швейцарія/Італія	табл., вкриті п/о у бл.	150мг	№10x3	44812,07	25,56/\$

● **Іматиніб (Imatinib) ***

Фармакотерапевтична група: L01XE01 - антинеопластичні засоби; інші антинеопластичні засоби; інгібітори протеїнкінази.

Основна фармакотерапевтична дія: є низькомолекулярним інгібітором протеїн-тирозинкінази, що значно пригнічує активність тирозинкінази (ТК) Vcr-Abl, та деякі рецепторні ТК: Kit рецептор фактора стовбурових клітин, закодований c-Kit протоонкогеном, рецептори домену дискоїдину (DDR1 та DDR2), рецептор колонієстимулювального фактора (CSF-1R) і рецептори тромбоцитарного фактора росту альфа і бета (РТФР-альфа і РТФР-бета); пригнічує клітинні процеси, опосередковані активацією цих рецепторних кіназ. Є інгібітором протеїнтирозинкінази, який сильно пригнічує тирозинкіназу Vcr-Abl *in vitro*, на клітинному та *in vivo* рівнях; вибірково пригнічує проліферацію і стимулює апоптоз у позитивних Vcr-Abl клітинних лініях, а також у щойно уражених лейкомічних клітинах у пацієнтів з наявністю в лейкоцитах філадельфійської хромосоми при хронічному позитивному мієлолейкозі (Rh⁺) та з гострою лімфобластною лейкоемією. *In vivo* сполука виявляє протипухлинну активність при монотерапії на моделі Vcr-Abl-позитивних клітин пухлини у тварин; є сильним інгібітором рецептора тирозинкінази відносно тромбоцитарного фактора росту (ТФР) і фактора ембріональної клітини (ФЕК), c-Kit і пригнічує ТФР- та ФЕК-опосередковані зміни з боку клітин. *In vitro* іматиніб пригнічує проліферацію і стимулює апоптоз у клітинах шлунково-кишкової стромальної пухлини (ГІСТ), що виражається в активації мутації *Kit*; інгібує сигнал до проліферації клітин, що супроводжують дезактивованій ТФР та діяльність Vcr-Abl тирозинкінази.

Показання для застосування ЛЗ: дорослі та діти: уперше діагностована позитивна (Ph⁺) (з наявністю в лейкоцитах філадельфійської хромосоми (vcr-abl)) хр. мієлоїдна лейкоемія (ХМЛ)^{ПМД}, для яких трансплантація кісткового мозку не розглядається як перша лінія терапії; Ph⁺ ХМЛ у хр. фазі після невдалої терапії інтерфероном альфа або у фазі акселерації, або у фазі бластної кризи захворювання^{БНФ}; у складі хіміотерапії уперше діагностованої позитивної г. лімфобластної лейкоемії (Ph+ГЛЛ)^{БНФ} з наявністю в лейкоцитах філадельфійської хромосоми (діти тільки табл.); дорослі: як монотерапія г. лімфобластної лейкоемії (Ph+ГЛЛ) у стадії рецидиву^{БНФ}

або яка важко піддається лікуванню; мієлодиспластичні/мієлопроліферативні захворювання (MDS/MPD), пов'язані з перебудовою гена рецептора тромбоцитарного фактора росту (ТФР); гіпереозинофільний с-м (ГЕС) та/або хр. еозинофільна лейкемія (ХЕЛ)^{БНФ} з перебудовою генів FIP1L1-PDGFR α ; Kit (CD117)-позитивні неоперабельні та/або метастатичні злоякісні гастроінтестинальні стромальні пухлини (ГІСТ); ад'ювантна терапія дорослих з високим ризиком рецидиву Kit (CD117)-позитивних злоякісних гастроінтестинальних стромальних пухлин (ГІСТ) після резекції; неоперабельна випираюча дерматофібросаркома, (dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP)), та рецидивуюча та/або метастатична дерматофібросаркома (DFSP), яка не може бути видалена хірургічним шляхом^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дози 400 або 600 мг призначають 1 р/добу, дозу 800 мг призначають по 400 мг 2 р/добу, вранці і ввечері; хр. мієлолейкоз (ХМЛ) у дорослих: рекомендована доза 400 мг/добу^{БНФ}; хр. фаза ХМЛ визначається, якщо задовольняються усі з таких критеріїв: бластів < 15 % у крові та кістковому мозку, базофілів у периферичній крові < 20 %, тромбоцитів > 100 x 10⁹/л; рекомендована доза для пацієнтів у фазі акселерації (будь-який з таких критеріїв: бластів \geq 15 %, але < 30 % у крові або в кістковому мозку, бластів та пролімфоцитів \geq 30 % у крові або в кістковому мозку (за умови, що бластів < 30 %), базофілів у периферичній крові \geq 20 %, тромбоцитів < 100 x 10⁹/л незалежно від лікування) 600 мг/добу^{БНФ}; рекомендована доза для пацієнтів з бластним кризом (кількість бластів \geq 30 % у крові або в кістковому мозку або за наявністю екстремедулярних проявів захворювання, крім гепатоспленомегалії) 600 мг/добу^{БНФ}; для дітей з ХМЛ у хр. та прогресуючій фазі та фазі акселерації рекомендована доза 340 мг/м² на добу^{БНФ} (МДД 800 мг), 1 р/добу або розділити на 2 прийоми - вранці та ввечері; немає досвіду застосування дітям віком до 2 років; г. лімфобластна лейкемія з позитивною філадельфійською хромосомою в лейкоцитах (Ph+ ГЛЛ): дорослі - 600 мг/добу^{БНФ}; діти- 340 мг/м² (МДД 600 мг) (тільки табл.); для дорослих з рецидивуючою або рефрактерною Ph+ ГЛЛ монотерапія в дозі 600 мг/добу є безпечною, ефективною і може проводитись, доки хвороба не почне прогресувати; мієлодиспластичні/мієлопроліферативні захворювання (MDS/MPD): рекомендована доза 400 мг/добу; гіпереозинофільний с-м та/або хр. еозинофільна лейкемія (ГЕС/ХЕЛ): рекомендована доза 100 мг/добу; підвищення дози зі 100 мг до 400 мг розглядати для пацієнтів, у яких не спостерігається побічних реакцій, і якщо відповідь на лікування недостатньо ефективна; Kit (CD117)-позитивні неоперабельні та/або метастатичні злоякісні гастроінтестинальні стромальні пухлини (ГІСТ) для ад'ювантної терапії дорослих з високим ризиком рецидиву Kit (CD117)-позитивних злоякісних гастроінтестинальних стромальних пухлин (ГІСТ) після резекції: рекомендована доза 400 мг/добу^{БНФ}; дані щодо впливу збільшення дози із 400 мг до 600 мг або 800 мг для пацієнтів, у яких хвороба прогресує на тлі низьких доз, обмежені; рекомендована доза для ад'ювантного лікування дорослих після резекції стромальних шлунково-кишкових пухлин - 400 мг/добу; оптимальну тривалість лікування не встановлено; неоперабельна випираюча дерматофібросаркома (dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) та рецидивуюча та/або метастатична дерматофібросаркома (DFSP), яка не може бути видалена хірургічним шляхом: рекомендована доза 800 мг/добу^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: оперізуючий/простий герпес, назофарингіт, пневмонія, синусит, целюліт, інфекція ВДШ, грип, інфекція сечовивідних шляхів, гастроентерит, сепсис, грибкова інфекція, реактивація гепатиту В, с-м лізису пухлини, крововилив/некроз пухлини, анафілактичний шок; нейтропенія, тромбоцитопенія, анемія, панцитопенія, фебрильна нейтропенія, тромбоцитопенія, анемія, панцитопенія, фебрильна нейтропенія, лімфопенія, пригнічення кісткового мозку, еозинофілія, лімфаденопатія, гемолітична анемія, тромботична мікроангіопатія, анорексія, підвищений/знижений апетит, гіпокаліємія, гіпофосфатемія, дегідратація, подагра, гіперурикемія, гіперкальціємія, гіперглікемія, гіпонатріємія, гіперкаліємія, гіпомагніємія, збільшення/зменшення маси тіла, підвищений рівень креатиніну, ЛДГ, ЛФ, амілази крові, гіпербілірубінемія, гепатит, жовтяниця, печінкова недостатність, некроз печінки; безсоння, депресія, зниження лібідо, тривожність, сплутана свідомість, головний біль, запаморочення, парестезія, гіпестезія, мігрень, сонливість, синкопе, периферична нейропатія, погіршення пам'яті, ішіас, с-м неспокійних ніг, тремор, с-м Рейно, тромбоз/емболія, церебральний крововилив, підвищення ВТ, набряк головного мозку, судоми, неврит зорового нерва, крововилив у скловидне тіло, підвищене слюзовиділення, кон'юнктивіт, сухість очей, затьмарення зору, біль в очах, крововилив у кон'юнктиву, склеру, сітківку, блефарит, макулярний набряк, катаракта, глаукома, набряк диска зорового нерва, вертиго, шум у вухах, втрата слуху, АГ гіпотензія, серцебиття, тахікардія, застійна СН, набряк легень, аритмія, фібриляція передсердь, зупинка серця, ІМ, стенокардія, перикардіальний випіт, перикардит, тампонада серця; задишка, носова кровотеча, кашель, біль у глотці та гортані, фарингіт, плевральний біль, випіт, фіброз легень, легенева гіпертензія, легенева кровотеча, ГДН, інтерстиціальна хвороба легень, біль у грудях, загальне нездужання; сухість у роті, стоматит, хейліт, дисфагія, нудота, відрижка, блювання, диспепсія, біль у животі, метеоризм, гастроєзофагеальний рефлюкс, запор, діарея, езофагіт, гастрит, виразка шлунка, шлунково-кишкова кровотеча, асцит, панкреатит, коліт, кишкова непрохідність/обструкція, перфорація ШКТ, дивертикуліт, судинна екстазія астрального відділу шлунка; періорбітальний набряк, набряк обличчя, дерматит/екзема/висипання, свербіж, сухість шкіри, еритема, алопеція, нічна пітливість, р-ція фоточутливості, пустульозний висип, посилена пітливість, кропив'янка, екхімоз, підвищена схильність до утворення синців, гіпотрихоз, гіпопігментація шкіри, ексфолювативний дерматит, ламкість нігтів, зміна забарвлення нігтів, фолікуліт, петехії, псоріаз, пурпура, гіперпігментація шкіри, бульозні висипання, с-м Світа, ангіоневротичний набряк, мультиформна еритема, лейкоцитокластний васкуліт, с-м Стівенса-Джонсона, г. генералізований екзематозний пустульоз, синдром пальмарно-плантарної еритродизестезії, ліхеноїдний кератоз, червоний плоский лишай, токсичний епідермальний некроліз; м'язові спазми, слабкість та судоми, міалгія, артралгія, біль у кістках, набряк/скутість у суглобах та м'язах, артрит, рабдоміоліз/міопатія, асептичний некроз/некроз головки стегна, затримка росту в дітей; нирковий біль, гематурія, г. та х. ниркова недостатність; гінекомастія, менорагія, нерегулярний менструальний цикл, статева дисфункція, біль у сосках, геморагічна кіста жовтого тіла/ яєчника, еректильна дисфункція, набряк мошонки; підвищення t^o тіла, анасарка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до імаїнібу або будь-якого іншого компонента препарату.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ГЛІВЕК®	Новартіс Фарма Штейн АГ/Новартіс Фарма Продакшн ГмБХ, Швейцарія/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	100мг, 400мг	№10x6, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕГІТИНІД	Паб'яницький фармацевтичний завод Польфа АТ, Польща	капс. тверді у бл.	100мг, 400мг	№30, №60, №120	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІМАТЕРО®	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	100мг, 400мг	№10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІМАТЕРО®	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x1	4729,80	26,28/\$
	ІМАТЕРО®	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№10x1	5255,33	26,28/\$
	ІМАТИНІБ ГРІНДЕКС	АТ "Гріндекс", Латвія	капс. тверді у бл.	100мг	№10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІМАТИНІБ ГРІНДЕКС	АТ "Гріндекс", Латвія	капс. тверді у бл.	100мг	№10x12	2684,95	26,85/€
	ІМАТИНІБ ГРІНДЕКС	Ремедика ТОВ, Кіпр	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№10x3	4995,00	24,82/€
	ІМАТИНІБ МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за випуск серії)/Паб'яницький фармацевтичний завод ПОЛЬФА АТ (виробник, що відповідає за виробництво лікарського засобу, первинну та вторинну упаковку, контроль якості та випуск с, Німеччина/Польща	капс. у бл.	100мг, 400мг	№15x4, №10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІМАТИНІБ-ВІСТА	Сіндан Фарма С.Р.Л., Румунія	капс. у бл.	400мг	№10x3	4210,00	35,35/€
	ІМАТИНІБ-ВІСТА	Сіндан Фарма С.Р.Л., Румунія	капс. у бл.	100мг	№10x3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІМАТИНІБ-ВІСТА	Сіндан Фарма С.Р.Л., Румунія	капс. у бл.	100мг	№10x12	4340,00	35,35/€
	МАТІНА®	Фармакеа Преміум Лтд (контроль та випуск серій)/Інтас Фармасьютикалс Лімітед (виробництво, первинне та вторинне пакування), Мальта/Індія	табл., вкриті п/о у бл.	100мг, 400мг	№30, №60, №120	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НЕОПАКС®	Інтас Фармасьютикалз Лімітед (виробник, відповідальний за виробництво " in bulk", первинне та вторинне пакування)/КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за вторинне пакування; виробник, відповідальний за контроль серії, випуск серії)/КРКА-ФАРМА, Індія/Словенія/Хорватія	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x6	1877,75	28,34/€	
НЕОПАКС®	Інтас Фармасьютикалз Лімітед (виробник, відповідальний за виробництво " in bulk", первинне та вторинне	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x12	2935,48	28,34/€	

	пакування)/КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за вторинне пакування; виробник, відповідальний за контроль серії, випуск серії)/КРКА-ФАРМА, Індія/Словенія/Хорватія					
НЕОПАКС®	Інтас Фармасьютикалз Лімітед (виробник, відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування)/КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за вторинне пакування; виробник, відповідальний за контроль серії, випуск серії)/КРКА-ФАРМА, Індія/Словенія/Хорватія	табл., вкриті п/о у бл.	100мг	№10x1	313,15	29,45/€
НЕОПАКС®	Інтас Фармасьютикалз Лімітед (виробник, відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування)/КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за вторинне пакування; виробник, відповідальний за контроль серії, випуск серії)/КРКА-ФАРМА, Індія/Словенія/Хорватія	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№10x1	1386,63	29,45/€
НЕОПАКС®	Інтас Фармасьютикалз Лімітед (виробник, відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування)/КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за вторинне пакування; виробник, відповідальний за контроль серії, випуск серії)/КРКА-ФАРМА, Індія/Словенія/Хорватія	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№10x3	4159,06	28,34/€
НЕОПАКС®	Інтас Фармасьютикалз Лімітед (виробник, відповідальний за виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування)/КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за вторинне пакування; виробник, відповідальний за контроль серії, випуск серії)/КРКА-ФАРМА, Індія/Словенія/Хорватія	табл., вкриті п/о у бл.	400мг	№10x6	6567,16	28,34/€
РЕДИВЕК	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд (Виробничий відділ - 7), Індія	капс. тверді у бл.	100мг	№10x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РЕДИВЕК	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд (Виробничий відділ - 7), Індія	капс. тверді у бл.	400мг	№10x3	2400,00	28,18/\$

• **Лапатиніб (Lapatinib) ****

Фармакотерапевтична група: L01XE07 - Антинеопластичні та імуномодулюючі засоби. Інгібітори протеїнкінази.

Основна фармакотерапевтична дія: інгібітор внутрішньоклітинних доменів тирозинкінази рецепторів EGFR (ErbB1) та HER2 (ErbB2) (розрахункові значення K_i^{app} 3 нМ та 13 нМ відповідно) з повільним відокремленням від цих рецепторів (період напіввиведення ≥ 300 хв); інгібує ріст пухлинних клітин, керованих ErbB, *in vitro* та в різних моделях на тваринах.

Показання для застосування ЛЗ: рак молочної залози з гіперекспресією HER2 (ErbB2): у складі комбінованої терапії з капецитабіном для пацієток з розповсюдженим або метастатичним раком, який прогресує на попередній терапії трастузумабом у комбінації з антрациклінами та таксанами у зв'язку з метастатичною хворобою; у складі комбінованої терапії з трастузумабом у пацієток із метастатичним, гормон-негативним раком, що прогресує після трастузумаб-вмісної хіміотерапії; у складі комбінованої терапії з інгібітором ароматази для жінок у постменопаузальному періоді із метастатичним, гормон-позитивним раком, яким не призначена хіміотерапія; пацієтки в реєстраційному дослідженні не були попередньо ліковані трастузумабом або інгібіторами ароматази; немає даних щодо ефективності цієї комбінації у порівнянні з трастузумабом в комбінації з інгібітором ароматази у вказаній групі пацієток.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: у комбінації з капецитабіном: рекомендована доза лапатинібу становить 1250 мг (5 таб.) 1 р./добу щодня, рекомендована доза капецитабіну - 2000 мг/м²/добу за 2 прийоми (кожні 12 годин) кожного дня з 1-го по 14-й день 21-добового циклу лікування, приймати капецитабін з їжею або протягом 30 хв п'їди; у комбінації з трастузумабом: рекомендована доза лапатинібу становить 1000 мг (4 таб.) 1 р. н/добу щодня, рекомендована доза трастузумабу - 4 мг/кг маси тіла як в/в навантажувальна доза, потім 2 мг/кг маси тіла в/в 1 р. н/тижд.; у комбінації з інгібітором ароматази: рекомендована доза 1500 мг (6 таб.) 1 р. н/добу щодня, при застосуванні лапатинібу з альтернативним інгібітором ароматази необхідно ознайомитися з інструкцією для медичного застосування цього препарату.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції гіперчутливості, включаючи анафілаксію, анорексія, безсоння, головний біль; зниження фракції викиду лівого шлуночка, шлуночкові аритмії/ torsades de pointes, подовження інтервалу QT на ЕКГ, відчуття припливів, носова кровотеча, кашель, задишка, інтерстиціальні захворювання легень/пневмоніт, легенева АГ; діарея, що може спричинити дегідратацію, нудота, блювання, диспепсія, стоматит, запор, біль в шлунку; гіпербілірубінемія, гепатотоксичність; висип (включаючи акнеформний дерматит) сухість шкіри, долонно-підшовна еритродизестезія, alopecia, свербіж; ураження нігтів, включаючи параніхії; серйозні шкірні р-ції, включаючи с-м Стівенса -Джонсона (ССД) та токсичний епідермальний некроліз; біль в кінцівках, біль у спині, артралгія; слабкість, запалення слизової оболонки (мукозит), астенія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: Гіперчутливість до будь-якого компонента препарату.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ТАЙВЕРБ™	Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед/Глаксо Веллком С.А. (додатковий виробник для пакування та випуску серії), Велика Британія/Іспанія	табл., вкриті п/о у бл. та фл.	250мг	№70, №84	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Пазопаніб (Pazopanib)**

Фармакотерапевтична група: L01XE11 - антинеопластичні засоби; інгібітори протеїнкінази.

Основна фармакотерапевтична дія: потужний багатомішеневий інгібітор тирозинкінази (ITK) рецепторів фактора росту ендотелію судин (Vascular Endothelial Growth Factor Receptors, VEGFR)-1, -2 і -3, рецепторів тромбоцитарного фактора росту (Platelet-Derived Growth Factor Receptors, PDGFR)- α і - β та рецептора фактора стовбурових клітин (с-KIT), для яких IC₅₀ препарату становить 10, 30, 47, 71, 84 та 74 нмол/мл відповідно; дозозалежно інгібує ліганд-індуковане аутофосфорилування рецепторів VEGFR-2, с-Kit та PDGFR- β у клітинах; інгібує VEGF-індуковане VEGFR-2 фосфорилування в легенях, ангиогенез у різних експериментальних моделях та ріст множинних ксенотрансплантатів пухлини.

Показання для застосування ЛЗ: лікування місцево розповсюдженої та/або метастатичної нирковоклітинної карциноми (НKK)^{БНФ}; лікування пацієнтів з розповсюдженою саркомою м'яких тканин^{БНФ}, які попередньо отримували хіміотерапію, за винятком пацієнтів зі стромальною пухлиною ШКТ або ліпосаркомою.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза для лікування нирковоклітинної карциноми та саркоми м'яких тканин 800 мг р/ос1 р/день^{БНФ}; лікування триває до прогресування захворювання або до розвитку неприйнятної токсичності; приймати поза прийомами їжі (принаймні за 1 год. до їди або ч/р 2 год. після неї) не розжовуючи та запивати водою; якщо черговий прийом препарату пропущений, його не потрібно приймати менш ніж за 12 год. до наступного прийому; зміни дозування - як при збільшенні, так і при зменшенні дози - виконуються поетапно, з «кроком» у 200 мг^{БНФ}, враховуючи індивідуальну переносимість, щоб забезпечити належний нагляд за побічними реакціями; доза не повинна перевищувати 800 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції (з/ без нейтропенії), інфекції ясен, інфекційний перитоніт; пухлинна біль; нейтропенія, тромбоцитопенія, лейкопенія, тромботична мікроангіопатія (тромботична тромбоцитопенічна пурпура, гемолітичний уремічний с-м), поліцитемія; гіпотиреоїдизм, зниження апетиту, анорексія, гіперальбумінемія, дегідратація, гіпофосфатемія, гіпомагніємія, безсоння; запаморочення, дисгевзія (агевзія, гіпогевзія), головний біль, летаргія, парестезія, периферична сенсорна нейропатія, гіпоестезія, ішемічний інсульт, транзиторні ішемічні атаки, церебральний інфаркт, сонливість, с-м задньої оберненої енцефалопатії/ задньої оберненої лейкоенцефалопатії; відшарування/розрив сітківки, знебарвлення вій, погіршення зору, дисфункція серця (дисфункція лівого шлуночка, СН, облітеруюча кардіоміопатія), брадикардія, ІМ, поліморфна шлуночкова тахікардія типу «пірует» (Torsade de pointes); АГ, венозні тромбоемболічні ускладнення (тромбоз глибоких вен, легеневої тромбоз), приливи, прилив крові до обличчя (почервоніння обличчя), кровотечі, гіпертонічний криз; кашель, дисфонія, носові кровотечі, легенева емболія, кровохаркання, легеневі кровотечі,

диспное, пневмоторакс, гикавка, орофарингеальний біль, бронхіальна кровотеча, ринорея, інтерстиціальне захворювання легенів /пневмоніт; діарея, нудота, біль у животі, блювання, диспсія, стоматит, метеоризм, здуття живота, сухість у роті, виразки ротової порожнини, часті випорожнення, кровотеча ШКТ, ректальна/анальна кровотеча, перфорація товстої кишки, кровотечі ротової порожнини, фістула ШКТ, блювання кров'ю, випорожнення з домішками крові, гемороїдальна кровотеча, перфорація клубової кишки, мелена, кровотеча стравоходу, панкреатит, перитоніт, ретроперитонеальна кровотеча, кровотеча з верхніх ділянок ШКТ, порушення печінкової функції, гіпербілірубінемія, гепатотоксичність, жовтяниця, медикаментозно індуковане ураження печінки, печінкова недостатність; зміна кольору волосся, висипання, алопеція, с-м долонно-підшовний еритродизестезії, гіпопигментація шкіри, еритема, свербіж, депігментація шкіри, сухість шкіри, гіпергідроз, р-ції фоточутливості, ексфоліативний висип, порушення з боку нігтів, запалення шкіри, висипання везикулярні/папульозні/ еритематозні/ генералізовані/ макулярні/ сверблячі, свербіж генералізований, еритема долонь, виразки шкіри; біль у скелетно-м'язовій системі, міальгія, м'язові спазми, артралгія; протеїнурія, кровотеча сечовивідного тракту; менорагія, метрорагія, вагінальна кровотеча; підвищена втомлюваність, хибні результати огляду вуха, горла, носа, астенія, запалення слизової оболонки, набряк (периферичний набряк, набряк очей, локалізований набряк та набряк обличчя), біль у грудях, озноб; порушення слизової оболонки; підвищення рівнів АЛТ, АСТ, зменшення маси тіла; зміна рівня холестерину крові, підвищення рівня креатиніну/ білірубину крові, зменшення кількості білих кров'яних клітин (включаючи зменшення рівня нейтрофілів та лейкоцитів), зменшення рівня тромбоцитів, збільшення рівня ліпази крові, підвищення АТ, збільшення рівня тиреоїдних гормонів/ гамма-глутамілтрансферази/ сечовини крові, подовження інтервалу QT на ЕКГ, підвищення рівня амілази крові, зменшення рівня глюкози/ альбуміну/ магнію крові, підвищення діастолічного/ систолічного тиску крові, аномальні тести щитовидної залози, аномальні печінкові проби, підвищення рівня печінкових ферментів/ трансаміназ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до пазопанібуну та будь-якого компоненту препарату.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ВОТРИЄНТ™	Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед (виробник нерозфасованої продукції)/Глаксо Веллком С.А. (виробник для пакування та випуску серії), Велика Британія/Іспанія	табл., вкриті п/о у фл.	200мг	№30	21102,89	26,83/\$
	ВОТРИЄНТ™	Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед (виробник нерозфасованої продукції)/Глаксо Веллком С.А. (виробник для пакування та випуску серії), Велика Британія/Іспанія	табл., вкриті п/о у фл.	400мг	№30	33618,31	26,83/\$

• **Сорафеніб (Sorafenib)**

Фармакотерапевтична група: L01XE05 - протипухлинний препарат, інгібітор протеїнкіназ.

Основна фармакотерапевтична дія: мультикіназний інгібітор, що демонструє антипроліферативні та антиангіогенні властивості *in vitro* та *in vivo*; пригнічує ріст пухлини людських пухлинних ксенотрансплантантів шляхом пригнічення ангиогенезу пухлин. Сорафеніб пригнічує активність внутрішньоклітинних кіназ, присутніх в пухлинній клітині (CRAF, BRAF, V600E BRAF, с-KIT та FLT-3) та судинної системи пухлини (CRAF, VEGFR-2, VEGFR-3 та PDGFR-β). RAF кінази є серин/треоніновими кіназами, в той час як с-KIT, FLT-3, VEGFR-2, VEGFR-3 та PDGFR-β є рецепторними тирозинкіназами.

Показання для застосування ЛЗ: розповсюджений нирково-клітинний рак; гепатоцелюлярна карцинома; місцеворозповсюджений або метастатичний, прогресуючий, диференційований рак щитовидної залози, рефрактерний до лікування радіоактивним йодом^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована добова доза 400мг 2 р/добу^{БНФ} у проміжках між вживанням їжі (щонайменше за 1 год до прийому їжі або через 2 год після їжі); лікування продовжують доти, доки відзначається клінічна ефективність препарату або до появи тяжких токсичних р-цій; модифікація дози також залежить від розвитку р-цій токсичності^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ішемія, ІМ; кровотечі; АГ; долонно-підшовний с-м, висипання, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз; перфорації ШКТ; подовження інтервалу QT; медикаментозний гепатит; пригнічення супресивної дії ТТГ при ДРЩЗ; діарея, втомлюваність, інфекційні захворювання, алопеція, долонно-підшовний с-м; фолікуліт, лейкопенія, нейтропенія, анемія, тромбоцитопенія; р-ції гіперчутливості, шкірні р-ції, кропив'янка, анафілактичні р-ції; ангіоневротичний набряк; гіпотироїдизм/гіпертироїдизм; анорексія, гіпофосфатемія, гіпокальціємія, гіпокаліємія, гіпонатріємія, гіпоглікемія, дегідратація; депресія, периферична сенсорна нейропатія, дисгевзія, оборотня лейкоенцефалопатія, енцефалопатія, тиніт, застійна СН, подовження інтервалу QT; кровотеча, шлунковокишкову, дихальних шляхів, крововилив у мозок, гіпертензія, приливи, гіпертонічний криз; ринорея, дисфонія, стани, подібні до інтерстиціального захворювання легень, пневмоніт, променевиї пневмоніт, г. дихальна недостатність; діарея, нудота, блювання, запор, стоматит, сухість у ротовій порожнині, глосалгія, диспсія, дисфагія,

гастроезофагеальна рефлюксна хвороба,панкреатит, гастрит, перфорації шлунково-кишкового тракту;підвищення рівня білірубину та жовтяниця, холецистит, холангіт,медикаментозний гепатит;артралгія,міальгія, спазми м'язів,рабдоміоліз; ниркова недостатність, протеїнурія,нефротичний синдром;еректильна дисфункція,гінекомастія;астенія, грипоподібне захворювання, запалення слизової оболонки;зниження маси тіла, підвищення рівня амілази, підвищення рівня ліпази,транзиторне підвищення рівня трансаміназ,транзиторне підвищення рівня лужної фосфатази у крові, відхилення від норми показників МНВ, відхилення від норми рівня протромбіну.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до сорафенібу або до будь-якої із допоміжних речовин препарату, одночасне призначення з карбоплатином та паклітакселом хворим з плоскоклітинним раком легенів.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	НЕКСАВАР®	Байер АГ/Байер Хелскер Мануфактурінг С.Р.Л., Німеччина/Італія	табл., вкриті п/о у бл.	200мг	№28x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Сунітиніб (Sunitinib)**

Фармакотерапевтична група: L01XE04 - антинеопластичні засоби; інгібітори протеїнкінази.

Основна фармакотерапевтична дія: одночасно інгібує багато рецепторів тирозинкінази, що беруть участь у рості пухлини, патологічному ангиогенезі, а також метастазуванні раку; інгібітор рецепторів тромбоцитарних факторів росту, рецепторів судинного ендотеліального фактора росту, рецепторів фактора росту стовбурових клітин, рецепторів Fms-подібної тирозинкінази-3, рецепторів колонійстимулюючого фактора, а також рецепторів гліального нейротрофічного фактора; основний метаболіт виявляє подібну активність, аналогічну активності сунітинібом.

Показання для застосування ЛЗ: прогресуюча нирковоклітинна карцинома (НКК); гастроінтестинальна стромальна пухлина (ГСП); ад'ювантна терапія нирковоклітинної карциноми (НКК), із високим ризиком рецидивуючої НКК після нефректомії; прогресуючі нейроендокринні пухлини підшлункової залози (НППЗ) пацієнтів з неоперабельним, місцево розповсюдженим або метастатичним захворюванням.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза для лікування стромальних пухлин травного тракту та метастатичних нирковоклітинних карцином 50 мг р/ос 1 р/добу протягом 4 тижн. з подальшим періодом відпочинку тривалістю 2 тижн. (схема 4/2), що загалом складає один цикл лікування тривалістю 6 тижн.; можлива корекція дози з кроком по 12,5 мг препарату, добова доза не повинна перевищувати 75 мг або бути меншою за 25 мг; для лікування нейроендокринних пухлин підшлункової залози рекомендована доза 37,5 мг р/ос 1 р/добу; максимальна доза - 50мг/день^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: вірусні інфекції (назофарингіт та герпес ротової порожнини), респіраторні інфекційні захворювання (bronхіт, інфекція нижніх дихальних шляхів, пневмонія та інфекція дихальних шляхів), абсцеси (абсцес кінцівки, анальний абсцес, абсцес ясен, абсцес печінки, абсцес підшлункової залози, абсцес промежини, периректальний абсцес, ректальний абсцес, підшкірний абсцес та абсцес зуба), грибові інфекції (кандидоз стравоходу, кандидоз ротової порожнини), інфекції сечовидільних шляхів, інфекції шкіри (флегмона та інфекції шкіри), сепсис (сепсис та септичний шок); некротичний фасциїт, бактеріальні інфекції (абсцес черевної порожнини, абдомінальний сепсис, дивертикуліт та остеомієліт); тромбоцитопенія, анемія, лейкопенія; часто: лімфопенія; нечасто: панцитопенія; тромботична мікроангіопатія (тромботична тромбоцитопенічна пурпура, гемолітико-уремічний синдром); гіперчутливість; ангіоневротичний набряк; гіпотиреоз; гіпертиреоз; тиреоїдит; зниження апетиту, анорексія; дегідратація, гіпоглікемія; синдром лізису пухлини; безсоння; депресія;запаморочення, головний біль, порушення сприйняття смаку (дисгевзія, агезія та порушення сприйняття смаку), головний біль; периферична невралгія, парестезія, гіпестезія, гіперестезія; внутрішньочерепний крововилив, інсульт, транзиторна ішемічна атака; синдром оборотної задньої енцефалопатії; періорбітальний набряк, набряк повік, посилена слізозотеча; ішемія міокарда(гострий коронарний с-м, стенокардія, нестабільна стенокардія, оклюзія коронарної артерії), зменшення/відхилення від норми фракції викиду; нечасто: застійна СН, ІМ(г. ІМ, безсимптомний ІМ), СН, кардіоміопатія, перикардальний випіт, подовження інтервалу QT на електрокардіограмі; недостатність лівого шлуночка, шлуночкова тахікардія типу пірует; артеріальна гіпертензія; тромбоз глибоких вен, припливи, гіперемія; кровотеча з пухлини; задишка, носова кровотеча, кашель; емболія легеневої артерії, плевральний випіт, гемоптизис, задишка при фізичному навантаженні, біль у роті та горлі (а також у горлі та гортані), закладеність носа, сухість слизової носа; легенева кровотеча, дихальна недостатність; стоматит (та афтозний стоматит), біль у животі (у верхніх та нижніх відділах), блювання, діарея; диспепсія, нудота, запор; ГЕРХ, дисфагія, шлунково-кишкова кровотеча, езофагіт, здуття живота, дискомфорт у животі, ректальна геморагія, кровотеча з ясен, виразки у роті, прокталгія, хейліт, геморой, глосодинія, біль у роті, сухість у роті, метеоризм, дискомфорт у роті, відрижка; шлунково-кишкова (та кишкова) перфорація, панкреатит, анальна нориця; нечасто: печінкова недостатність, холецистит (та акалькульозний холецистит), порушення функції печінки; гепатит; зміна кольору шкіри та порушення пігментації, жовтушність шкіри, с-м долонно-підшовної еритродизестезії, висипання (псоріазоподібний дерматит, ексфолюативний висип, висип, еритематозний висип, фолікулярний висип, генералізований висип, макулярний висип, макулопапульозний висип, папульозний висип та висип зі свербжем), зміна кольору волосся, сухість шкіри; лущення шкіри, шкірні реакції (та розлади з боку шкіри), екзема, пухирі; еритема, алопеція, акне, свербіж, гіперпігментація шкіри, ураження шкіри, гіперкератоз, дерматит, ураження нігтів (та зміна кольору); мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, гангренозна піодермія, токсичний епідермальний некроліз; біль у кінцівках, артралгія, біль у спині; кістково-м'язовий біль, м'язові спазми, міалгія, слабкість у м'язах; остеонекроз щелепи, нориця; рабдоміоліз, міопатія; ниркова недостатність, г. ниркова недостатність, хроматурія, протеїнурія; кровотеча із сечовидільних шляхів; нефротичний синдром; запалення слизової оболонки, підвищена втомлюваність (та

загальна слабкість), набряк (набряк обличчя, набряк та периферичний набряк), гарячка; біль у грудній клітці, біль, грипоподібне захворювання, озноб; порушення загоєння.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до сунітінібу малату або до компонентів препарату.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	СУТЕНТ	Пфайзер Італія С. р. л., Італія	капс. у бл.	12,5мг	№7x4	28314,07	28,75/\$
	СУТЕНТ	Пфайзер Італія С. р. л., Італія	капс. у бл.	25мг	№7x4	56628,14	28,75/\$
	СУТЕНТ	Пфайзер Італія С. р. л., Італія	капс. у бл.	50мг	№7x4	113256,28	28,75/\$
	СУТЕНТ	Пфайзер Італія С. р. л., Італія	капс. у бл.	37,5мг	№7x4	відсутня у реєстрі ОВЦ	

19.1.8. Інші антинеопластичні засоби

- **Бортезоміб (Bortezomib) ***

Фармакотерапевтична група: L01XX32 - антинеопластичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: інгібітор протеасом, пригнічує хімотрипсиноподібну дію протеасоми 26S, що спричиняє гальмування протеолізу і викликає каскад р-ції, що призводить до апоптозу; високоселективний до протеасоми; при концентрації 10 μM не пригнічує жоден із великої кількості перевічених рецепторів та протеаз, і є більше ніж у 1500 разів селективним до протеасоми, ніж для наступних переважних ензимів; дисоціює протеасому з t_{1/2} 20 хв. і показує, що її пригнічення є оборотним; впливає на ракові клітини багатьма шляхами, включаючи зміну регуляторного білка, що контролює розвиток циклу клітини та активацію фактору ядра NF-κB; пригнічення протеасоми призводить до зупинки циклу клітини та апоптозу; NF-κB - це фактор транскрипції, активація якого необхідна для багатьох аспектів розвитку пухлини, включаючи ріст та виживання клітини, ангіогенез, взаємодію клітина-клітина та метастазування; при мієломі впливає на здатність клітин мієломи взаємодіяти з мікросередовищем кісткового мозку; цитотоксичний до багатьох типів ракових клітин, ракові клітини більш схильні до апоптозу, спричиненого бортезомібом, ніж нормальні клітини; *in vivo* викликає уповільнення росту багатьох експериментальних людських пухлин, включаючи множинну мієлому; підвищує диференціацію та активність остеобластів та пригнічує ф-цію остеокластів; ці ефекти спостерігаються у пацієнтів з множинною мієломою, які одночасно хворіли на остеолітичну хворобу на пізній стадії та застосовували бортезоміб.

Показання для застосування ЛЗ: множинна мієлома, у складі комбінованої терапії з мелфаланом та преднізоном^{БНФ}, у пацієнтів, які раніше не отримували лікування та яким не можна проводити високодозову хімотерапію з трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин^{БНФ} (терапія першої лінії); прогресуюча множинна мієлома, як монотерапія, або у складі комбінованої терапії з пегільованим ліпосомальним доксорубіцином або дексаметазоном, у пацієнтів, які отримали щонайменше одну лінію терапії та перенесли трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин або які не є кандидатами для проведення трансплантації^{БНФ} (терапія другої лінії); множинна мієлома, у складі комбінованої терапії з дексаметазоном або дексаметазоном та талідомідом^{БНФ}, у пацієнтів, які раніше не отримували лікування та які є кандидатами для проведення високодозової хімотерапії з трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин (індукційна терапія); мантийноклітинна лімфома, у складі комбінованої терапії з ритуксимабом, циклофосфамідом, доксорубіцином та преднізоном, у пацієнтів, які раніше не отримували лікування та які не є кандидатами для проведення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: *Не застосовувати інтратекально!* Застосовувати тільки в/в або п/ш., прогресуюча множинна мієлома (пацієнти, які отримали щонайменше одну лінію терапії): монотерапія: рекомендована початкова доза для дорослих 1,3 мг/м² площі поверхні тіла в/в або підшкірно 2 р/тижд. протягом 2 тижнів (1-й, 4-й, 8-й та 11-й дні) з наступною 10-денною перервою (12-21-й дні), цей 3-тижневий період вважається циклом лікування; між введеннями послідовних доз має пройти не менше 72-х год; у випадку досягнення повної клінічної відповіді рекомендується проведення 2-х додаткових циклів лікування, при досягненні часткової відповіді рекомендується продовження терапії не більше 8 циклів; комбінована терапія: з пегільованим ліпосомальним доксорубіцином: рекомендована доза бортезомібу як при монотерапії, пегільований ліпосомальний доксорубіцин застосовується у дозі 30 мг/м² на 4й день циклу лікування шляхом 1-годинної в/в інфузії після ін'єкції бортезомібу; з дексаметазоном: рекомендована доза бортезомібу як при монотерапії, дексаметазон застосовується р/ос у дозі 20 мг у 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 8-й, 9-й, 11-й та 12-й дні циклу лікування; нелікована множинна мієлома у пацієнтів, які не підлягають трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин: у комбінації з мелфаланом та преднізоном - вводити в/в або п/ш у комбінації з р/ос мелфаланом та р/ос преднізоном протягом дев'яти 6-тижневих циклів лікування; у циклах 1-4 вводити 2/тиждень (1-й, 4-й, 8-й, 11-й, 22-й, 25-й, 29-й та 32-й дні), у циклах 5-9 вводити 1 р/тиждень (1-й, 8-й, 22-й та 29-й дні); мелфалан та преднізон слід застосовувати р/ос у 1-й, 2-й, 3-й та 4-й день першого тижня кожного циклу; нелікована множинна мієлома у пацієнтів, які підлягають трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (індукційна терапія): у комбінації з дексаметазоном: рекомендована доза як при монотерапії, дексаметазон слід застосовувати р/ос у дозі 40 мг у 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 8-й, 9-й, 10-й та 11-й дні циклу лікування бортезомібом; комбінована терапія з дексаметазоном та талідомідом: рекомендована доза бортезомібу становить 1,3 мг/м² площі поверхні тіла в/в або п/ш 2 р/тиждень протягом 2 тижнів (1-й, 4-й, 8-й та 11-й дні) з наступною 17-денною перервою (12-28-й дні), дексаметазон слід застосовувати р/ос у дозі 40 мг у 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 8-й, 9-й, 10-й та 11-й дні циклу лікування бортезомібом; талідомід слід застосовувати перорально у дозі 50 мг/добу у 1-14-й дні циклу, при переносимості препарату дозу збільшувати до 100 мг/добу у 15-28-й дні циклу, у подальшому доза може бути збільшена до 200 мг/добу, починаючи з другого циклу; нелікована мантийноклітинна лімфома у комбінації з ритуксимабом,

циклофосфамідом, доксорубіцином та преднізоном (схема лікування VcR-CAP): рекомендована доза бортезомібу становить 1,3 мг/м² площі поверхні тіла в/в або п/ш 2 р/тиждень впродовж 2 тижнів (1-й, 4-й, 8-й та 11-й дні) з подальшою 10-денною перервою (12-21-й дні). Цей 3-тижневий період вважається циклом лікування; застосовувати 6 циклів лікування; ЛЗ, які застосовують шляхом в/в інфузій у 1-ий день кожного 3-тижневого циклу лікування: ритуксимаб у дозі 375 мг/м², циклофосфамід - 750 мг/м², доксорубіцин - 50 мг/м²; преднізон- р/ос 100 мг/м² у 1, 2, 3, 4 та 5 дні кожного циклу лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: оперізувальний лишай (включаючи дисемінований та з оч. ускладненнями), пневмонія, простий герпес, грибова інфекція; інфекції, бактеріальні інфекції, вірусні інфекції, сепсис (включаючи септичний шок), бронхопневмонія, герпесвірусна інфекція*, герпетичний менінгоенцефаліт, бактеріємія (включаючи стафілококову), ячмінь, грип, запалення підшкірної клітковини, інфекції, пов'язані з пристроєм введення, інфекції шкіри, вушні інфекції, стафілококова інфекція, зубна інфекція; менінгіт (включаючи бактеріальний), вірусна інфекція Епштейна-Барр, генітальний герпес, тонзиліт, мастоїдит, поствірусний с-м втоми; злоякісна пухлина, плазмочитарна лейкемія, нирково-клітинна карцинома, пухлинне розростання, грибоподібний мікоз, доброякісне новоутворення; тромбоцитопенія, нейтропенія, анемія; лейкопенія, лімфопенія; панцитопенія, фебрильна нейтропенія, коагулопатія, лейкоцитоз, лімфаденопатія, гемолітична анемія; с-м дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові, тромбоцитоз, с-м підвищеної в'язкості крові, тромбозопатія, тромбоцитопенічна пурпура, інші хвороби крові та кровотворних органів, геморагічний діатез, лімфоцитарна інфільтрація; ангіоневротичний набряк, гіперчутливість; анафілактичний шок, амілоїдоз, імунокомплексно-опосередковані реакції III типу; с-м Кушинга, гіпертиреоз, порушення секреції антидіуретичного гормону; гіпотиреоз; зниження апетиту; зневоднення, гіпокаліємія, гіпонатріємія, порушення рівня глюкози крові, гіпокальціємія, порушення рівня ферментів; с-м лізису пухлини, погіршення стану пацієнта, гіпомагніємія, гіпофосфатемія, гіперкаліємія, гіперкальціємія, гіпернатріємія, порушення рівня сечової кислоти, ЦД, затримка рідини; гіпермагніємія, ацидоз, порушення електролітного балансу, гіперволемія, гіпохлоремія, гіповолемія, гіперхлоремія, гіперфосфатемія, метаболічні розлади, недостатність вітамінів групи В, недостатність вітаміну В₁₂, подагра, збільшення апетиту, непереносимість алкоголю; розлади настрою, тривожний розлад, розлади сну; психічний розлад, галюцинації, психотичний розлад, сплутаність свідомості, збудження; суїцидальні ідеї, розлад адаптації, делірії, зниження лібідо; нейропатії, периферична сенсорна нейропатія, дизестезія, невралгія; рухова нейропатія, втрата свідомості (в т.ч. синкопе), запаморочення, дисгевзія, летаргія, головний біль; тремор, сенсорно-рухова периферична нейропатія, дискінезія, порушення координації та рівноваги, втрата пам'яті (без деменції), енцефалопатія, с-м оборотної задньої енцефалопатії, нейротоксичність, судомні розлади, постгерпесна невралгія, розлади мовлення, с-м неспокійних ніг, мігрень, ішіас, розлади уваги, порушення рефлексів, паросмія; крововилив у мозок, внутрішньочерепний крововилив (у т.ч. субарахноїдальний), набряк мозку, транзиторна ішемічна атака, кома, порушення вегетативної нервової системи, вегетативна нейропатія, параліч черепно-мозкового нерва, параліч, парез, пресинкопе, синдром ураження мозкового стовбура, цереброваскулярний розлад, ураження нервових корінців, психомоторна гіперактивність, здавлення спинного мозку, інші когнітивні розлади, моторні дисфункції, інші розлади нервової системи, радикуліт, слинотеча, гіпотонія; набряк очей, порушення зору, кон'юнктивіт; оч. кровотечі, інфекції повік, запалення очей, диплопія, сухість очей, подразнення очей, оч. біль, збільшення слъзозовидлення, виділення з очей; ураження рогівки, екзофтальм, ретиніт, скотома, інші хвороби очей (та щопівк), набутий дакриоденіт, фотофобія, фотопсія, нейропатія зорового нерва, різні ступені погіршення зору (до сліпоти); вертиго; дизакузія (у т.ч. тиніт), послаблення слуху (до глухоти), дискомфорт у вухах; вушна кровотеча, вестибулярний нейроніт, інші захворювання вуха; тампонада серця, кардіопульмональний шок, фібриляція серця (у т.ч. передсердь), СН (у т.ч. лівого та правого шлуночків), аритмія, тахікардія, відчуття серцебиття, стенокардія, перикардит (у т.ч. перикардальний ексудат), кардіоміопатія, дисфункція шлуночків, брадикардія; тріпотіння передсердь, ІМ, атріовентрикулярна блокада, СС розлади (у т.ч. кардіогенний шок), тріпотіння-мерехтіння, нестабільна стенокардія, порушення клапанів серця, недостатність коронарної артерії, зупинка синусового вузла; гіпотензія, ортостатична гіпотензія, гіпертензія; порушення мозкового кровообігу, тромбоз глибоких вен, кровотеча, тромбоз флебіт (у т.ч. поверхневий), судинний колапс (у т.ч. гіповолемічний шок), флебіт, припливи крові, гематома (у т.ч. паранефральна), порушення периферичного кровообігу, васкуліт, гіперемія (включаючи очну); емболія периферичних судин, лімфатичний набряк, блідість, еритромелалгія, розширення судин, знебарвлення судин, венозна недостатність; диспное, носова кровотеча, інфекції Н/ВДШ, кашель; легенева емболія, плевральний випіт, набряк легенів (включаючи гострий), легеневий внутрішньоальвеолярний крововилив, бронхоспазм, хронічне обструктивне захворювання легенів, гіпоксемія, погіршення прохідності дихальних шляхів, гіпоксія, плеврит, гикавка, ринорея, дисфонія, свистяче дихання; легенева недостатність, гострий респіраторний дистрес-с-м, апное, пневмоторакс, колапс легенів, легенева гіпертензія, кровохаркання, гіпервентиляція легенів, ортопное, пневмоніт, респіраторний алкалоз, тахіпное, фіброз легенів, бронхіальні розлади, гіпокапія, інтерстиційна пневмонія, інфільтрація легенів, відчуття стискання у горлі, сухість у горлі, збільшення секреції ВДШ, подразнення горла, кашльовий с-м ВДШ; нудота та блювання, діарея, запор, шлунково-кишкова кровотеча (у т.ч. слизових оболонок), диспепсія, стоматит, здуття живота, орофарингеальний біль, біль у животі (у т.ч. шлунково-кишковий та біль у ділянці селезінки), захворювання ротової порожнини, метеоризм; панкреатит (у т.ч. хронічний), блювання з домішками крові, набрякання губ, шлунково-кишкова непрохідність (у т.ч. непрохідність тонкого кишечника, ілеус), дискомфорт у животі, виразки у ротовій порожнині, ентерит, гастрит, кровотеча з ясен, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, коліт (у т.ч. спричинений *Clostridium difficile*), ішемічний коліт, запалення ШКТ, дисфагія, с-м подразнення кишечника, інші шлунково-кишкові розлади, обкладений язик, розлад шлунково-кишкової моторики, захворювання слинних залоз; г. панкреатит, перитоніт, набряк язика, асцит, езофагіт, хейліт, нетримання калу, атонія сфінктера заднього проходу, фекалома, шлунково-кишкові виразки та перфорації, гіпертрофія ясен, мегаколон, ректальні виділення, утворення пухирців у ротоглотці, біль у губах, періодонтит, анальна тріщина, зміна ритму випорожнень, прокталгія, аномальні випорожнення; порушення рівнів печінкових ферментів; гепатотоксичність (у т.ч. розлади печінки), гепатит, холестаза; печінкова недостатність, гепатомегалія, с-м Бадда-Кіарі, цитомегаловірусний гепатит, печінковий крововилив, холелітіаз; висипання, свербіж, еритема, сухість шкіри; мультиформна еритема, кропив'янка, гострий фебрильний нейтрофільний дерматоз, токсичні шкірні висипання, токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона, дерматит, хвороби волосся, петехії, екхімоз, подразнення шкіри, пурпура,

затвердіння шкіри, псоріаз, гіпергідроз, нічне потіння, пролежні, акне, пухирі, порушення пігментації шкіри; шкірні р-ції, лімфоцитарна інфільтрація Джесснера, с-м долонно-підшовної еритродизестезії, підшкірний крововилив, сітчасте ліведо, індурація шкіри, папули, реакції фоточутливості, себорея, холодний піт, інші розлади шкіри, еритроз, виразки шкіри, захворювання нігтів; м'язово-скелетний біль; м'язові спазми, біль у кінцівках, м'язова слабкість; посмикування м'язів, набрякання суглобів, артрит, скутість суглобів, міопатії, відчуття тяжкості; рабдоміоліз, дисфункція скронєво-нижньощелепного суглоба, фістула, суглобовий випіт, біль у щелепі, захворювання кісток, інфекції та запалення м'язово-скелетної системи та сполучної тканини, синовіальна кіста; ниркова недостатність; г. ниркова недостатність, хр. ниркова недостатність, інфекції сечовивідних шляхів, ознаки та симптоми розладів сечовивідних шляхів, гематурія, затримка сечі, розлади сечовипускання, протейнурія, азотемія, олігурія, полакіурія; подразнення сечового міхура; вагінальна кровотеча, генітальний біль, еректильна дисфункція; тестикулярні розлади, простатит, розлади молочних залоз у жінок, чутливість придатків яєчок, запалення придатків яєчок, біль у ділянці таза, виразки вульви; аплазія, мальформації ШКТ, іхтіоз; пірексія, втома, астенія; набряки (у т.ч. периферичні), озноб, біль, гарячка; порушення загального фізичного здоров'я, набряк обличчя, реакції у місці ін'єкції, захворювання слизових оболонок, біль у грудній клітці, порушення ходи, відчуття холоду, екстравазація, ускладнення, пов'язані з катетером, відчуття спраги, дискомфорт у грудній клітці, відчуття зміни t° тіла, біль, пов'язаний з ін'єкцією; летальний наслідок (включаючи раптовий), поліорганна недостатність, кровотечі у місці введення, грижа (у т.ч. хіатальна), погіршення загоєння, запалення, флебіт у місці ін'єкції, болючість, виразка, подразнення, некардіальний біль за грудниною, біль у місці введення катетера, відчуття чужорідного тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до бортезомібу, бору або будь-якого з допоміжних компонентів, г. дифузні інфільтративні легеневі та перикардіальні захворювання.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БОРТЕЗОВІСТА	Онкомед Мануфактурінг а.с. (виробництво, пакування)/Сінтон Хіспанія, С.Л. (відповідальний за випуск серії)/Сінтон с.р.о. (відповідальний за випуск серії)/Джі І Фармасьютікалс Лтд (вторинне пакування), Чеська Республіка/Іспанія/Чеська Республіка/Болгарія	пор. д/приг. р-ну д/ін'ек. у фл.	1мг	№1	3560,00	32,40/€
	БОРТЕЗОВІСТА	Онкомед Мануфактурінг а.с. (виробництво, пакування)/Сінтон Хіспанія, С.Л. (відповідальний за випуск серії)/Сінтон с.р.о. (відповідальний за випуск серії)/Джі І Фармасьютікалс Лтд (вторинне пакування), Чеська Республіка/Іспанія/Чеська Республіка/Болгарія	пор. д/приг. р-ну д/ін'ек. у фл.	3,5мг	№1	6160,00	32,40/€
	БОРТЕЗОВІСТА	Онкомед Мануфактурінг а.с. (виробництво, пакування)/Сінтон Хіспанія, С.Л. (відповідальний за випуск серії)/Сінтон с.р.о. (відповідальний за випуск серії)/Джі І Фармасьютікалс Лтд (вторинне пакування), Чеська Республіка/Іспанія/Чеська Республіка/Болгарія	пор. д/приг. р-ну д/ін'ек. у фл.	2,5мг	№1	3400,00	27,84/€
	БОРТЕЗОМІБ	ТОВ "Фармідея", Латвія	пор. ліоф. д/приг. р-ну д/ін'ек. у фл.	3,5мг	№1	5011,20	33,41/€
	БОРТЕЗОМІБ АЛВОГЕН	СІНТОН ХІСПАНІЯ, С. Л. (хіміко/фізичне та мікробіологічне тестування, відповідає за випуск серії)/Онкомед	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	1мг	№1	3900,00	34,72/€

	мануфактуринг а.с. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, тестування випущеної серії)/ІТЕСТ плюс, с.р.о. (мікробіологічне тестування, Іспанія/Чеська Республіка/Чеська Республіка/Болгарія/Німеч чина						
БОРТЕЗОМІБ АЛВОГЕН	СІНТОН ХІСПАНІЯ, С. Л. (хіміко/фізичне та мікробіологічне тестування, відповідає за випуск серії)/Онкомед мануфактуринг а.с. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, тестування випущеної серії)/ІТЕСТ плюс, с.р.о. (мікробіологічне тестування, Іспанія/Чеська Республіка/Чеська Республіка/Болгарія/Німеч чина	пор. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	3,5мг	№1	9400,00	34,72/€	
БОРТЕЗОМІБ- ВІСТА	Сіндан Фарма С.Р.Л, Румунія	пор. д/приг. р- ну д/ін'ек. у фл.	3,5мг	№1	7500,00	24,81/\$	
БОРТЕЗОМІБ-ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина	ліоф. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	3,5мг	№1	5344,66	31,41/€	
БОРТЕЗОМІБ-ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина	ліоф. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	1мг	№1	1772,87	31,26/€	
БОРТЕЗОМІБ-ТЕВА	Сіндан Фарма СРЛ, Румунія	ліоф. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	3,5мг	№1			відсутня у реєстрі ОВЦ
БОРТЕКСА САН	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд., Індія	ліоф. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	3,5мг	№1			відсутня у реєстрі ОВЦ
БОРТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	ліоф. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	3,5мг	№1	16948,62	26,48/\$	
БРЕЦЕР	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд (Виробничий відділ - 7), Індія	ліоф. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	3,5мг	№1	5409,47	24,82/\$	
ВЕЛКЕЙД®	БСП Фармасьютикалз С.п.А. (виробництво, первинна упаковка та контроль якості)/Г'ер Фабр Медикамент Продакшн (виробництво, первинна упаковка та контроль якості)/Янссен Фармацевтика НВ (вторинна упаковка, контроль якості та випуск серії), Італія/Франція/Бельгія	ліоф. д/р-ну д/ін'ек. у фл. в бл. упак.	3,5мг	№1	18486,75	24,65/\$	
ВЕЛКЕЙД®	БСП Фармасьютикалз С.п.А. (виробництво, первинна упаковка та контроль якості)/Янссен Фармацевтика НВ (вторинна упаковка, контроль якості та випуск серії), Італія/Бельгія	ліоф. д/р-ну д/ін'ек. у скл. фл. в бл. упак.	3мг	№1	18030,85	25,66/\$	
НАМІБОР®	онкомед мануфактуринг а.с. (виробництво, пакування, контроль при	ліоф. д/р-ну д/ін'ек. у фл.	1мг	№1	3208,89	32,09/€	

		випуску серій)/ГЕ Фармасьютікалс Лтд (вторинне пакування)/Сінтон Хіспанія С.Л. (фізичні/хімічні та мікробіологічні випробування при випуску серій, випуск серій)/Сінтон, с.р.о. (фізичні/хіміч, Чеська Республіка/Болгарія/Іспанія/Чеська Республіка/Чеська Республіка/Чеська Республіка/Німеччина					
	НАМІБОР®	онкомед мануфактурінг а.с. (виробництво, пакування, контроль при випуску серій)/ГЕ Фармасьютікалс Лтд (вторинне пакування)/Сінтон Хіспанія С.Л. (фізичні/хімічні та мікробіологічні випробування при випуску серій, випуск серій)/Сінтон, с.р.о. (фізичні/хіміч, Чеська Республіка/Болгарія/Іспанія/Чеська Республіка/Чеська Республіка/Чеська Республіка/Німеччина	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	3,5мг	№1	4047,56	32,91/€

• **Анагрелід (Anagrelide)**

Фармакотерапевтична група: L01XX35 - антинеопластичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: пригнічує експресію факторів транскрипції, серед яких GATA-1 та FOG-1, що відіграють роль при мегакаріоцитопоезі, цим самим знижуючи утворення тромбоцитів; сповільнює дозрівання мегакаріоцитів, зменшенням їх розміру та щільності.

Показання для застосування ЛЗ: показаний для зниження рівня тромбоцитів пацієнтам з високим ризиком розвитку ЕТ; гр.ризик: вік від 60 років; кількість тромбоцитів понад $1000 \times 10^9/\text{л}$; наявність в анамнезі тромбоемболії та порушень кровообігу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована початкова доза 1 мг на добу або 0,5 мг 2 р/добу р/ос протягом 1 тижня; через 1 тижд. дозу можна змінювати індивідуально, доводити до мінімальної ефективної, яка буде достатньою для зниження/підтримання кількості тромбоцитів на рівні нижче $600 \times 10^9/\text{л}$, а в ідеалі - на рівні від $150 \times 10^9/\text{л}$ до $400 \times 10^9/\text{л}$; збільшення дози не має перевищувати 0,5 мг/добу протягом 1 тижня; максимально разова доза не має перевищувати 2,5 мг; у перший тижд. лікування вимірювання к-сті тромбоцитів слід проводити кожні 2 дні до моменту досягнення постійної дози; результат лікування спостерігається та підтримується із застосуванням дози 1-3 мг на добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анемія, панцитопенія, тромбоцитопенія, геморагія, підшкірний крововилив; затримка рідини, набряк, втрата маси тіла/ збільшення маси тіла; депресія, амнезія, сплутаність свідомості, безсоння, парестезія, гіпестезія, нервовість, сухість у роті, мігрень, дизатрія, сонливість, порушення координації; двоїння в очах, порушення зору; шум у вухах; тахікардія, часте серцебиття, шлуночкова тахікардія типу «пірует», СН із застійними явищами, фібриляція передсердь, надшлуночкова тахікардія, аритмія, ГА, втрата свідомості, ІМ, кардіоміопатія, перикардіальний випіт, стенокардія, постуральна гіпотензія, вазодилатація, дво-направлена тахікардія; легенева гіпертензія, пневмонія, пульмонарний інфільтрат, плевральний випіт, диспное, носова кровотеча, інтерстиціальне захворювання легень, включно з пульмонітом та алергічним альвеолітом; діарея, блювання та біль у животі, нудота, метеоризм, шлунково-кишкові геморагії, панкреатит, анорексія, розлад травлення, запор, коліт, гастрит, кровоточивість ясен; підвищення рівня печінкових ферментів, гепатит; висип, алопеція, свербіж, зміна кольору шкіри, сухість шкіри; артралгія, міалгія, біль у спині; Імпотенція, ниркова недостатність, ніктурія, тубулоінтерстиціальний нефрит; втома, біль у грудях, гарячка, озноб, тривожність, слабкість, грипоподібний синдром, біль, астенія; підвищення рівня креатиніну в крові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до анагреліду або компонентів ЛЗ; середній або тяжкий ступінь печінкової недостатності; середній або тяжкий ступінь ниркової недостатності (КлКр < 50 мл/хв).

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
-------------------	-----------------	---------------	-----------	----------------------	----------------	-----------------------------

II.	АГРЕЛІД	Фармасайнс Інк., Канада	капс. у фл.	0,5мг	№50	3142,76	27,09/\$
	АНАГРЕЛІД АЛВОГЕН	СІНТОН ХІСПАНІЯ, С.Л. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, хіміко-фізичне тестування, відповідає за випуск серії)/Роттендорф Фарма ГмбХ (вторинне пакування)/КВІНТА- АНАЛІТИКА с.р.о. (хіміко- фізичне тестування), Іспанія/Німеччина/Чеська Республіка	капс. тверді у пл.	0,5мг	№100	1297,00	28,33/€
	АНАГРЕЛІД АЛВОГЕН	СІНТОН ХІСПАНІЯ, С.Л. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, хіміко-фізичне тестування, відповідає за випуск серії)/Роттендорф Фарма ГмбХ (вторинне пакування)/КВІНТА- АНАЛІТИКА с.р.о. (хіміко- фізичне тестування), Іспанія/Німеччина/Чеська Республіка	капс. тверді у пл.	1мг	№100	2464,00	28,33/€

• **Аспарагіназа (Asparaginase)**

Фармакотерапевтична група: L01XX02 - антинеопластичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: каталізує гідроліз аспарагіну до аспарагінової кислоти і аміаку. В результаті руйнування аспарагіну, спричиненого аспарагіназою, синтез білка в лімфобластних клітинах пухлини порушується, при цьому зберігається більшість здорових клітин але може також бути токсичною для здорових клітин, які швидко діляться і залежать певною мірою від екзогенного надходження аспарагіну. Внаслідок перепаду концентрації аспарагіну в поза- і внутрішньосудинному просторі рівні аспарагіну в позасудинному просторі зменшуються, зокрема в спинномозковій рідині.

Показання для застосування ЛЗ: у комбінованій антинеопластичній терапії для лікування терапії г.лімфобластного лейкозу^{ВООЗ БНФ} у дітей від народження до 18 років та дорослих.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі і діти віком від 1 року: рекомендована доза аспарагінази для в/в введення 5000 ОД/м² площі поверхні тіла 1р/3 дні; діти від народження до 12 місяців: діти віком до 6 місяців: 6700 ОД/м² площі поверхні тіла; діти віком від 6 до 12 місяців: 7500 ОД/м² площі поверхні тіла; добову дозу розчиняють до кінцевого об'єму у 50-250 мл 0,9 % розчину натрію хлориду; розведений р-н аспарагінази вводять краплинно протягом 0,5-2 годин; не слід вводити болусно!

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції; дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові, анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія; р-ції гіперчутливості, почервоніння шкіри, висипання, артеріальна гіпотензія, набряк/ангіоневротичний набряк, кропив'янка, утруднене дихання; р-ції гіперчутливості, бронхоспазм, анафілактичний шок; вторинний гіпотиреоз, гіпаратиреодизм; гіперглікемія, гіпоальбумінемія; гіпоглікемія, зниження апетиту, втрата маси тіла; гіперурикемія, гіперамоніємія; діабетичний кетоацидоз; депресія, галюцинації, сплутаність свідомості; неврологічні симптоми, включаючи збудження, запаморочення і сонливість; головний біль; ішемічний інсульт, с-м зворотної задньої лейкоенцефалопатії, судоми, порушення свідомості, кома; тремор; тромбоз, тромбоз кавернозного синуса, тромбоз глибоких вен, кровотеча; діарея, нудота, блювання, абдомінальний біль; г. панкреатит; геморагічний панкреатит, некротизуючий панкреатит, паротит; псевдокісти підшлункової залози, панкреатит з можливим летальним наслідком; печінкова недостатність з можливим летальним наслідком, некроз клітин печінки, випадки холестази, жовтяниця; жирова дистрофія печінки; набряк, стомленість; біль (у спині, у суглобах); підвищення рівнів трансаміназ, білірубину, лужної фосфатази, холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїнів дуже низької щільності (ЛПДНЩ), ліпопротеїніпази, сечовини, аміаку, лактатдегідрогенази (ЛДГ) в крові; зниження рівнів антитромбіну III, фібриногену, холестерину, ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), загального білка в крові; підвищення рівнів амілази, ліпази, відхилення від норми показників електроенцефало-грами (ЕЕГ) (зниження активності альфа-хвиль, підвищення активності зета- і дельта-хвиль).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини, до будь-якого природного (непегільованого) препарату аспарагінази *E. coli* або до будь-якої допоміжної речовини; панкреатит; тяжкі порушення функції печінки (рівень білірубину > 3 разів вищий від верхньої межі норми; рівень трансаміназ > 10 разів вищий від верхньої межі норми); коагулопатія (гемофілія) в анамнезі; панкреатит, тяжкі кровотечі або тяжкий тромбоз після лікування аспарагіназою в анамнезі.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АСПАРАГІНАЗА 10	Медак Гезельшафт фюр	пор. д/р-ну	10000 МО	№1	відсутня у реєстрі	

000 МЕДАК	клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за маркування, вторинне пакування та за випуск серії)/Кіова Хакко Кірін Ко., Лтд. (Виробник, що відповідає за виробництво готової дозованої форми та первинне пакування), Німеччина/Японія	д/ін'єк. у фл.			ОВЦ	
АСПАРАГІНАЗА 10 000 МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за маркування, вторинне пакування та за випуск серії)/Кіова Хакко Кірін Ко., Лтд. (Виробник, що відповідає за виробництво готової дозованої форми та первинне пакування), Німеччина/Японія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	10000 МО	№5	12654,05	25,00/€
АСПАРАГІНАЗА 5 000 МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за маркування, вторинне пакування та за випуск серії)/Кіова Хакко Кірін Ко., Лтд. (Виробник, що відповідає за виробництво готової дозованої форми та первинне пакування), Німеччина/Японія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	5000 МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АСПАРАГІНАЗА 5 000 МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за маркування, вторинне пакування та за випуск серії)/Кіова Хакко Кірін Ко., Лтд. (Виробник, що відповідає за виробництво готової дозованої форми та первинне пакування), Німеччина/Японія	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	5000 МО	№5	9040,39	25,00/€
ОНКОНАЗЕ 10 /ONCONASE 10	ЮНІТЕД БІОТЕЧ (П) ЛІМІТЕД, Індія	ліоф. д/ін'єк. у фл.	10000 МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ОНКОНАЗЕ 5 /ONCONASE 5	ЮНІТЕД БІОТЕЧ (П) ЛІМІТЕД, Індія	ліоф. д/ін'єк. у фл.	5000 МО	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
СПЕКТРИЛА	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за маркування вторинне пакування та за випуск серії)/Рентшлер Біофарма СЕ (виробник, що відповідає за виробництво готової лікарської форми, первинне пакування, випробування/контро, Німеччина/Німеччина	пор. д/конц. д/р- ну д/інфуз. у фл.	10000 МО	№5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
СПЕКТРИЛА	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає	пор. д/конц. д/р- ну д/інфуз. у фл.	10000 МО	№1	22615,74	32,31/€

		за маркування вторинне пакування та за випуск серії)/Рентшлер Біофарма СЕ (диробник, що відповідає за виробництво готової лікарської форми, первинне пакування, випробування/контро, Німеччина/Німеччина					
--	--	--	--	--	--	--	--

● **Пегаспаргаза (Pegaspargase)**

Фармакотерапевтична група: L01XX24 - антинеопластичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: у хворих на г.лейкемію, особливо лімфатичну лейкемію, виживання злоскісних клітин залежить від екзогенного джерела L-аспарагіну; нормальні клітини, навпаки, здатні синтезувати L-аспарагін, і на них меншою мірою впливає його швидке видалення при лікуванні ферментом L-аспарагіназою, це унікальний терапевтичний підхід, що базується на метаболічному дефекті у синтезі L-аспарагіну у деяких видів злоскісних клітин.

Показання для застосування ЛЗ: як компонент антинеопластичної комбінованої терапії для реіндукції при г. лімфатичному лейкозі^{БНФ} (ГЛЛ) у дітей і дорослих пацієнтів з відомою гіперчутливістю до нативних L-аспарагіназ.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза 2500 МО (еквівалент 3,3 мл р-ну) на м² площі поверхні тіла кожні 2 тижні; діти з площею поверхні тіла ≥ 0,6 м² одержують 2500 МО (еквівалент 3,3 мл р-ну) на 1 м² площі поверхні тіла кожні 2 тижні, діти з площею поверхні тіла < 0,6 м² одержують 82,5 МО (еквівалент 0,1 мл р-ну) на 1 кг маси тіла; як компонент комбінованої терапії, можна вводити в/в (краплинно протягом 1-2 год. у 100 мл 0,9 % р-ну NaCl або у 5 % р-ну глюкози, що вводиться інфузійно) або в/м (об'єм, що вводиться в одному місці ін'єкції, не має перевищувати 2 мл у дітей і 3 мл у дорослих; при введенні об'єму, що перевищує 2 мл, дозу розподілити і вводити у кількох місцях ін'єкції) для індукції ремісії, консолідації ремісії або підтримуючої терапії.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: підвищення рівня амілази у крові, мієлосупресія, порушення синтезу білків, кровотеча, дисеміноване внутрішньосудинне згортання або тромбоз, інсульт, судоми, головний біль, втрата свідомості, гемолітична анемія, збудження, депресія, галюцинації, сплутаність свідомості, сонливість, зміни на ЕЕГ, виникнення коми, виникнення с-му зворотної задньої лейкоенцефалопатії, легкий тремор пальців, зниження апетиту, нудота, блювання, спазми в животі, діарея і зменшення маси тіла, г. панкреатит, розлади екзокринної функції підшлункової залози, паротит; псевдокісти підшлункової залози, панкреатит із летальним наслідком, панкреатит із супутнім г. паротитом, г. ниркова недостатність, шкірні АР, токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайелла), порушення ендокринної функції підшлункової залози з діабетичним кетоацидозом, гіперосмолярна гіперглікемія, тимчасовий вторинний гіпотиреоз, зниження рівня глобуліну, гіпаратиреоїдизм, зміни рівня ліпідів у крові, підвищення у крові рівня азоту сечовини, гіперурикемія, гіперамоніємія, біль у місці ін'єкції, набряк, підвищення t^o тіла, біль у спині, суглобах, животі, АР, бронхоспазм, тахікардія, зниження тиску крові до анафілактичного шоку, зміни результатів печінкових проб, ожиріння печінки, гіпоальбумінемія, набряки, холестаза, жовтяниця, гепатоцелюлярна та печінкова недостатність з потенційно летальним наслідком.

Протипоказання до застосування ЛЗ: панкреатит (включаючи панкреатит в анамнезі), г.геморагічні ускладнення у зв'язку з попереднім лікуванням L-аспарагіназою, гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин, протипоказаний пацієнтам, у яких раніше розвивалися тяжкі АР(кропив'янка, бронхоспазм, артеріальна гіпотензія, набряк гортані або інші тяжкі побічні ефекти після застосування пегаспаргази), наявність в анамнезі серйозного тромбозу при попередньому застосуванні L-аспарагінази.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ОНКАСПАР	Екселід Інк., США	р-н д/ін'єк., по 5мл у фл.	750 МО/мл	№1	60630,03	29,87/€
	ОНКАСПАР	Авіста Фарма Солжшнс Інк./Біохем Лабор фюр біологіше унд хеміше Аналітик ГмбХ/ЕйчДабл'юВай Фарма Сервісез ГмбХ (раніше ЕйчДабл'юВай Аналітик ГмбХ)/Екселід, Інк. (раніше Сігма-Тау ФармаСорс, Інк.)/Лабор Л+С АГ/Лабораторії Серв'е Індастрі/Ліофілізейшн Серві, США/Німеччина/Німеччина /США/Німеччина/Франція/США	пор. д/р-ну для ін'єк./інфуз. у фл.	750 МО/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

● **Венетоклак (Venetoclax) ****

Фармакотерапевтична група: L01XX52 - Інші антинеопластичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: селективний інгібітор В-клітинної лімфоми (BCL)-2 - антиапоптозного білка; надлишкова експресія білка BCL-2 спостерігається у лейкемічних клітинах пацієнтів із хронічним лімфоцитарним (лімфоїдним) лейкозом (ХЛЛ), де вона виступає посередником у забезпеченні виживання клітин пухлини і пов'язана з резистентністю до хіміотерапії; венетоклак зв'язується безпосередньо з борозенкою зв'язування ВНЗ білків BCL-2, замінюючи проапоптозні білки (як, наприклад, ВІМ), що містять ВНЗ-мотив, і запускає процес підвищеної проникності зовнішньої мітохондрійної мембрани (МОМР), активацію каспаз та запрограмовану смерть клітин.

Показання для застосування ЛЗ: В комбінації з обінутузумабом для лікування дорослих пацієнтів з попередньо не лікованим хронічним лімфоцитарним (лімфоїдним) лейкозом (ХЛЛ); в комбінації з ритуксимабом показаний для лікування дорослих пацієнтів з ХЛЛ, які попередньо отримали щонайменше одну лінію терапії; як монотерапія при ХЛЛ у пацієнтів із делецією 17р хромосоми або мутацією гена TP53, яким не підходить лікування інгібітором В-клітинного рецептора або для яких таке лікування виявилось неефективним та у пацієнтів за відсутності делеції 17р або мутації гена TP53, якщо хіміотерапія та лікування інгібітором В-клітинного рецептора виявилися неефективними.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Початкова доза венетоклаксу 20 мг 1 р/добу протягом 7 днів, дозу слід поступово підвищувати до добової дози 400 мг протягом 5 тижнів; 5-тижнева схема титрування розроблена для поступового зниження пухлинного навантаження (об'єму пухлини) і зниження ризику виникнення синдрому лізису пухлини (СЛП). Курс лікування венетоклаксом у поєднанні з обінутузумабом складається з 12 циклів, кожен цикл триває 28 днів: перші 6 циклів венетоклак приймають в комбінації з обінутузумабом, а наступні 6 циклів приймають лише венетоклак. Обінутузумаб застосовують за такою схемою: 100 мг в 1-й день 1-го циклу, 900 мг в 1-й або 2-й день 1-го циклу 1; надалі - 1000 мг на 8-й та 15-й день 1-го циклу, а також в 1-й день кожного з наступних 28-денних циклів (всього 6 циклів). Фаза титрування дози венетоклаксу за 5-тижневою схемою починається на 22-й день 1-го циклу та продовжується до 28-го дня 2-го циклу. Після завершення титрування рекомендована доза венетоклаксу становить 400 мг 1 р/добу, починаючи з 1-го дня 3-го циклу з обінутузумабом і до останнього дня 12-го циклу. Доза венетоклаксу в комбінації з ритуксимабом після фази титрування: рекомендована доза венетоклаксу в комбінації з ритуксимабом складає 400 мг 1 р/добу; ритуксимаб призначають після завершення 5-тижневої фази титрування дози і отримання добової дози венетоклаксу 400 мг протягом 7 днів; ритуксимаб вводиться в/в у першу добу кожного з 6 циклів терапії із розрахунку по 375 мг/м² поверхні тіла для першого циклу та 500 мг/м² поверхні тіла для циклів 2-6. кожен цикл триває 28 днів; венетоклак приймають протягом 24 місяців, починаючи з 1-го дня 1-го циклу лікування ритуксимабом. Для монотерапії після фази титрування рекомендована доза венетоклаксу складає 400 мг 1 р/добу; лікування продовжують до моменту прогресування захворювання або до настання у пацієнта непереносимості лікування. Застосування венетоклаксу може призводити до швидкого зменшення пухлини, а тому спричиняє ризик розвитку СЛП у початковій 5-тижневій фазі титрування. Зміни рівня електролітів, сумісні з СЛП, що потребують швидкого лікування, можуть виникати вже ч/з 6-8 год. після прийому першої дози венетоклаксу і при кожному збільшенні дози.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: Кашель, інфекції ВДШ, пневмонія, нейтропенія, анемія, лімфопенія, фебрильна нейтропенія; сепсис, інфекція сечовивідних шляхів; гіперкаліємія, гіперфосфатемія, гіпокальціємія; с-ром лізису пухлини, гіперурикемія, гіпокаліємія; діарея, блювання, нудота, закрел; втомлюваність; гарячка, периферичний набряк; головний біль, біль у спині; підвищення рівня креатиніну в крові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: Гіперчутливість до будь-якого активного або неактивного компонента препарату; одночасне застосування з сильними інгібіторами СУРЗА на початку лікування і протягом фази титрування дози; одночасне застосування з ЛЗ, що містять звіробій.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ВЕНКЛІКСТО	Еббві Айрленд НЛ Б.В. (виробництво лікарського засобу, тестування)/Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко. КГ (виробництво, пакування та тестування проміжного екструдату венетоклаксу; первинне та вторинне пакування, випуск серії готового лікарського засобу), Ірландія/Німеччина	табл. вкриті п/о у бл.	10мг	№2x7	1775,68	25,80/\$
	ВЕНКЛІКСТО	Еббві Айрленд НЛ Б.В. (виробництво лікарського засобу, тестування)/Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко. КГ (виробництво, пакування та тестування проміжного екструдату венетоклаксу; первинне та вторинне пакування, випуск серії готового лікарського засобу),	табл. вкриті п/о у бл.	50мг, 100мг	№1x7, №2x7	відсутня у реєстрі ОВЦ	

	Ірландія/Німеччина					
ВЕНКЛІКСТО	Еббві Айрленд НЛ Б.В. (виробництво лікарського засобу, тестування)/Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко. КГ (виробництво, пакування та тестування проміжного екструдату венетоклаксу; первинне та вторинне пакування, випуск серії готового лікарського засобу), Ірландія/Німеччина	табл. вкриті п/о у бл. в кор.	100мг	№4x7x4	163377,2 3	25,80/\$

19.2. Лікарські засоби, що використовуються для гормональної терапії злоякісних новоутворень

19.2.1. Гормони та їх аналоги

Гормональна терапія сьогодні набуває все більшого значення при лікуванні таких гормонозалежних злоякісних новоутворень, як рак молочної залози, рак простати та ендометрію. Гормональні препарати також застосовують для лікування окремих солідних пухлин, а саме: раку нирок, карциноїду, меланоми та ін. Гормональна терапія призначається на досить тривалий термін (роки), потребує змін залежно від клінічної ситуації, дозволяє купірувати симптоматику, запобігти рецидиву захворювання, покращити якість та продовжити тривалість життя хворих. Під час гормональної терапії слід контролювати стан місця локалізації первинної пухлини, шляхів лімфовідтоку та типових місць віддаленого метастазування з метою раннього виявлення рецидиву захворювання. У випадках первинного хірургічного лікування раку молочної залози необхідно операційний матеріал (а саме видалену тканину злоякісного новоутворення) дослідити на наявність рецепторів до естрогену та прогестерону.

19.2.1.1. Прогестерони

- **Медроксипрогестерон (Medroxyprogesterone)** (див. п. 11.6.1. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: G03DA02 - гестагени.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний прогестин, за своєю структурою нагадує ендогенний гормон прогестерон; пригнічує синтез гіпофізарних гонадотропних гормонів (фолікулостимулюючого гормону та лютеїнізуючого гормону); знижує рівні адренкортикотропного гормону та гідрокортизону в крові; рівня циркулюючого тестостерону та циркулюючого естрогену (внаслідок пригнічення синтезу фолікулостимулюючого гормону і ферментної індукції редукази у печінці, що призводить до збільшення кліренсу тестостерону і, як наслідок, до зниження перетворення андрогенів в естрогени); має протипухлинну активність; при застосуванні у високих дозах (p/os або в/м) ефективний при паліативному лікуванні злоякісних гормонозалежних новоутворень.

Показання для застосування ЛЗ: рецидивуючий та/або метастатичний рак молочної залози^{БНФ}; рецидивуючий та/або метастатичний рак ендометрія^{БНФ} ^{ВООЗ}; рецидивуючий та/або метастатичний рак нирок^{БНФ}; метастатичний рак передміхурової залози.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рецидивуючий та/або метастатичний рак молочної залози: початкова доза 500-1000 мг/добу в/м протягом 28 днів; після цього перевести на підтримуючий графік застосування дози 500 мг 2 р/тиждень, доки спостерігається відповідь на лікування; рецидивуючий та/або метастатичний рак ендометрія^{ВООЗ} або нирок: рекомендована початкова доза 400^{ВООЗ} -1000 мг/тиждень в/м; якщо протягом декількох тижнів або місяців спостерігається покращення і захворювання стабілізувалося, підтримувannya покращення може бути можливим при застосуванні меншої дози - 400 мг 1 р/місяць; метастатичний рак передміхурової залози: початкова доза 500 мг в/м 2 р/тиждень протягом 3 місяців, підтримуюча доза 500 мг 1 р/тиждень.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: рак молочної залози; анемія, розлади з боку системи крові; гіперчутливість до препарату; анафілактична реакція, анафілактоїдна реакція, ангіоневротичний набряк; підвищення/зниження апетиту; тривала ановуляція; нервозність; депресія, зниження лібідо; безсоння; аноргазмія; головний біль; запаморочення; судоми, сонливість; мігрень, параліч, синкопе; припливи; емболія та тромбоз; диспное; емболія легеневої артерії; біль у животі, відчуття дискомфорту в животі; нудота, здуття живота; ректальна кровотеча; порушення функції печінки; жовтяниця; алопеція, акне, висип; гірсутизм, кропив'янка, свербіж, хлоазма; набута ліподистрофія, склеродермія, дерматит, екхімоз, стрії; біль у спині, біль у кінцівках; артралгія, спазми м'язів; виділення з піхви, болісність молочних залоз, інфекції сечостатевої системи. Нечасто: аномальні маткові кровотечі (нерегулярні, значні, незначні, кровомазання), галакторея, тазовий біль, диспареунія, пригнічення лактації; вульвовагінальна сухість, кіста яєчника, передменструальний с-м, вагініт, аменорея, масталгія, кров'янисті виділення з сосків, відсутність відновлення репродуктивної функції, відчуття симптомів як при вагітності; затримка рідини, астенія; пропасниця, підвищена втомлюваність, реакції в місці ін'єкції, персистенція атрофії/вдавнення/втягнення в місці ін'єкції, вузли/ущільнення в місці ін'єкції, біль/болісність у місці ін'єкції; збільшення/зменшення маси тіла; зниження щільності кісткової маси, зниження толерантності до глюкози.

Протипоказання до застосування ЛЗ: встановлена або ймовірна вагітність; недиагностована вагінальна кровотеча; тяжке порушення функції печінки; відома гіперчутливість до діючої речовини (медроксипрогестерону ацетату) або інших компонентів ЛЗ; активний тромбофлебіт, наявність тромбоемболічних розладів на даний час або в анамнезі, цереброваскулярне захворювання.

Визначена добова доза (DDD): парентерально (депо) - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДЕПО-ПРОВЕРА®	Пфайзер Менюфектуринг Бельгія НВ, Бельгія	сусп. д/ін'єк., по 3,3мл у фл.	150 мг/мл	№1	296,55	26,96/\$

19.2.1.2. Аналоги гонадотропін-релізинг гормону

- **Гозерелін (Goserelin) *** (див. п. 11.7. розділу "АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: L02AE03 - аналоги гонадотропін-релізинг гормону.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний аналог природного ЛГ-РГ; при постійному застосуванні інгібує виділення гіпофізом ЛГ, що веде до зниження кон-ції тестостерону в сироватці крові у чоловіків і кон-ції естрадіолу в сироватці крові у жінок, даний ефект оборотний після відміни терапії; на первинній стадії може спричинити тимчасове збільшення кон-ції тестостерону в сироватці крові у чоловіків і ко-ції естрадіолу в сироватці крові у жінок; на ранніх стадіях терапії у жінок можуть виникати вагінальні кровотечі різної тривалості та інтенсивності, які є р-цією на вилучення естрогенів і мають припинитися самостійно; у чоловіків приблизно до 21 дня після введення першої капс. концентрація тестостерону знижується до кастраційних рівнів і залишається зниженою при постійному лікуванні, тобто при введенні кожні 28 днів (3,6 мг) або кожні 3 міс. (10,8 мг), таке зниження у більшості хворих приводить до регресу пухлини передміхурової залози і симптоматичного поліпшення, дані свідчать, якщо у виключних обставинах повторне введення препарату через 3 місяці не відбувається, кон-ція тестостерону лишається на кастраційному рівні у більшості пацієнтів ще протягом до 16 тижнів; у жінок кон-ція естрадіолу в сироватці знижується приблизно до 21-го дня після введення першої капс. і при постійному лікуванні (при введенні кожні 28 днів) для дозування 3,6 мг та протягом 4 тижнів після введення першого депо для дозування 10,8 мг, залишається до завершення періоду лікування, це зниження призводить до позитивного ефекту при гормонально залежних формах раку молочної залози, ендометріозі та фібромах матки, це також спричиняє потоншення ендометрія і виникнення аменореї у більшості пацієток; у комбінації з препаратами заліза спричиняє аменорею, що призводить до підвищення рівня Hb та поліпшення відповідних гематологічних параметрів у жінок з фібромами матки і супутньою анемією, така комбінація дасть додатково 10 г/л збільшення кон-ції Hb порівняно з терапією тільки препаратами заліза.

Показання для застосування ЛЗ: рак передміхурової залози: метастатичний рак простати; місцево-розповсюджений рак простати як альтернатива хірургічної кастрації; як ад'ювантна терапія до променевої терапії у пацієнтів з високим ризиком локалізованого або місцево-розповсюдженого раку простати; як неоад'ювантна терапія, що передуює променевої терапії у пацієнтів з високим ризиком локалізованого або місцево-розповсюдженого раку простати^{БНФ}; як ад'ювантна терапія до радикальної простатектомії у пацієнтів з місцево-розповсюдженим раком простати та високим ризиком прогресування захворювання^{БНФ}; чутливий до гормонального впливу рак молочної залози^{БНФ} у жінок у період пре- та перименопаузи; як альтернатива хіміотерапії в рамках стандартного лікування жінок у період перед/перименопаузи із естроген-рецептор позитивним раннім раком молочної залози; полегшує симптоми, включаючи біль, зменшення розміру та кількості ендометріальних ушкоджень^{БНФ}; попереднє потоншення ендометрію^{БНФ} перед його хірургічною абляцією або резекцією; поліпшення гематологічного статусу хворих на анемію із фібромами і зменшення симптомів, включаючи біль, як допоміжний засіб при хірургічному втручанні з метою полегшення операційної техніки і зниження втрат крові при операції; при екстракорпоральному заплідненні^{БНФ} для десенсибілізації гіпофіза при підготовці до стимуляції суперовуляції.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі чоловіки- 10,8 мг п/ш в передню черевну стінку кожні 3 місяці^{БНФ}; дорослі жінки -10,8 мг вводять п/ш в передню черевну стінку кожні 12 тижнів; або 3,6 мг вводять п/ш у передню черевну стінку кожні 28 днів^{БНФ}; фіброми матки: жінкам з анемією, спричиненою фібромою матки, у комбінації з препаратами заліза можна вводити до 3 місяців перед хірургічним втручанням; тривалість введення препарату при онкологічних захворюваннях коригує лікар індивідуально для кожного хворого, ендометріоз та фіброма матки: лікування має тривати 6 місяців, для потоншення ендометрія препарат призначати на 4-8 тижнів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: пухлина гіпофіза; дегенерація фіброматозних вузлів у жінок з фібромою матки; р-ції гіперчутливості; анафілактичні р-ції, крововиливи у гіпофіз, зниження толерантності до глюкози, гіперкальціємія, порушення лібідо, психічні розлади, зміни настрою, в т.ч. депресія; парестезія, компресія спинного мозку, головний біль, СН, ІМ, припливи жару, коливання АТ, пітливість, акне; висипання, облісіння; біль у кістках; артралгія; обструкція сечоводів; зниження потенції; сухість у піхві; зміни розміру молочних залоз; гінекомастія; чутливість молочних залоз; кіста яєчника; кровотеча після відміни; р-ції у місці введення (почервоніння, біль, набряк, геморагії); втрата мінеральної щільності кісток, збільшення маси тіла, с-м гіперстимуляції яєчників (при застосуванні у комбінації з гонадотропінами), збільшення пухлини в об'ємі, болісна пухлина; знижена щільність кісткової тканини, збільшення маси тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до гозереліну або до інших аналогів ЛГ-РГ (лютеїнізуючого гормону - релізинг гормону), період вагітності або годування груддю, дитячий вік.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,129 мг (підшкірний імплант)

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ГОЗЕРЕЛІН	АМВ ГмБХ (виробництво)	імплантат у	3,6мг; 10,8мг	№3	відсутня у	

АЛВОГЕН	"in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії, відповідає за випуск серії)/Єврофінс БіоФарма Продакт Тестінг Мюнхен ГмбХ (мікробіологічне тестування)/Синерджі Хеалс Аллерсхаузен ГмбХ (стерилізація)/ББФ Стерілізейшнсервіз , Німеччина/Німеччина/Німеччина	шпр.-аплік.			реєстрі ОБЦ	
ГОЗЕРЕЛІН АЛВОГЕН	АМВ ГмбХ (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії, відповідає за випуск серії)/Єврофінс БіоФарма Продакт Тестінг Мюнхен ГмбХ (мікробіологічне тестування)/Синерджі Хеалс Аллерсхаузен ГмбХ (стерилізація)/ББФ Стерілізейшнсервіз , Німеччина/Німеччина/Німеччина	імплантат у шпр.-аплік.	3,6мг	№1	82,42	34,72/€
ГОЗЕРЕЛІН АЛВОГЕН	АМВ ГмбХ (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії, відповідає за випуск серії)/Єврофінс БіоФарма Продакт Тестінг Мюнхен ГмбХ (мікробіологічне тестування)/Синерджі Хеалс Аллерсхаузен ГмбХ (стерилізація)/ББФ Стерілізейшнсервіз , Німеччина/Німеччина/Німеччина	імплантат у шпр.-аплік.	10,8мг	№1	57,33	34,72/€
ЗОЛАДЕКС	АстраЗенека ЮК Лімітед, Велика Британія	капс. для п/ш введ. прол. дії у шпр.-аплік.	3,6мг	№1	71,18	26,30/\$
ЗОЛАДЕКС	АстраЗенека ЮК Лімітед, Велика Британія	капс. для п/ш введ. прол. дії у шпр.-аплік.	10,8мг	№1	71,18	26,30/\$

- **Лейпрорелін (Leuprorelin)** * (див. п. 7.6.1.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: L02AE02 - аналоги гонадотропін-рилізінг гормону.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний агоніст гонадотропін-рилізінг гормону; більш активний, ніж природний гормон; короткочасно стимулює рецептори гонадореліну гіпофіза з подальшим довготривалим пригніченням їх активності; зворотно пригнічує виділення гіпофізом лютеїнізуючого гормону (ЛГ) та фолікулостимулюючого гормону (ФСГ), знижує концентрацію тестостерону в крові у чоловіків та естрадіолу - у жінок; спричиняє десенситизацію рецепторів після короткочасної початкової стимуляції, після першої в/м ін'єкції протягом 1-го тижня тимчасово підвищується концентрація статевих гормонів як у чоловіків, так і у жінок (фізіологічна реакція) та концентрація кислоти фосфатази плазми, яка відновлюється на 3-4-й тиждень лікування; після першого введення препарату приблизно до 21-го дня у чоловіків знижується концентрація тестостерону до кастраційних рівнів і залишається зниженою при постійному лікуванні, у жінок - концентрація естрадіолу, яка при постійному лікуванні залишається на рівні, який спостерігається після оваріоектомії або у постменопаузі; це зниження приводить до позитивного ефекту - уповільнює виникнення та розвиток гормонозалежних пухлин (фіброміоми матки, раку передміхурової залози); після припинення лікування відновлюється фізіологічна секреція гормонів.

Показання для застосування ЛЗ: лікування гормонозалежного поширеного раку передміхурової залози та лікування локалізованого раку передміхурової залози високого ризику ^{БНФ} і місцево-поширеного раку передміхурової залози у комбінації з опроміненням ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: порошок: 45 мг застосовувати у вигляді п/ш ін'єкції 1р/6 міс, введений р-н утворює депо препарату, що забезпечує постійне вивільнення лейпрореліну ацетату протягом 6 міс.; 22,5 мг призначати у вигляді п/ш ін'єкції 1 р/3 міс., введений р-н утворює депо препарату, що забезпечує постійне вивільнення лейпрореліну ацетату протягом 3-х міс.; 7,5 мг призначати у вигляді п/ш ін'єкції 1 р/міс., введений р-н

утворює депо препарату, що забезпечує постійне вивільнення лейпрореліну ацетату протягом одного місяця; застосовувати у складі неoad'ювантної або ад'ювантної терапії одночасно з опроміненням при лікуванні локалізованого раку передміхурової залози високого ризику і місцево-поширеного раку передміхурової залози; реакцію на лікування контролювати шляхом спостереження за клінічними проявами хвороби і вимірювання рівня простатоспецифічного антигену (ПСА) у сироватці крові; імплант: 3,6 мг вводити п/ш 1 р/міс., 5 мг вводити п/ш 1 р/3 місяці.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: назофарингіт, інфекція сечовивідних шляхів, локальні шкірні інфекції; загострення ЦД; аномальні сни, депресія, зниження лібідо; запаморочення, головний біль, гіпестезія, безсоння, розлади смаку та розлади нюху, вертиго, аномальні мимовільні рухи; подовження інтервалу QT; відчуття припливів, підвищений/знижений АТ, непритомність, колапс; ринорея, задишка; нудота, діарея, гастроентерит/коліт, запор, сухість у роті, диспепсія, блювання, метеоризм, відрижка; синці, еритема, свербіж, нічне потовиділення, липкий піт, підвищене потовиділення, алопеція, шкірні висипання; артралгія, болі у кінцівках, біль у м'язах, тремтіння, слабкість, біль у спині, спазми м'язів; порушення частоти сечовиділення, труднощі при сечовипусканні, дизурія, ніктурія, олігурія, спазм сечового міхура, наявність крові у сечі, збільшення частоти сечовипускання, затримка сечі; болючість у грудних залозах, атрофія яєчка, біль у яєчках, безпліддя, гіпертрофія грудних залоз, еректильна дисфункція, зменшення розмірів статевого члена, гінекомастія, імпотенція, розлади з боку яєчок, біль у грудних залозах; втома, відчуття печіння у ділянці уколу, парестезія у ділянці уколу, нездужання, біль, синці та жалючі відчуття у ділянці уколу, свербіж у місці уколу, затвердіння в місці ін'єкції, летаргія, біль, підвищена температура, виразка у місці уколу, некроз у місці уколу; зміни у загальному аналізі крові, анемія; підвищений вміст КФК у крові, збільшення часу згортання крові, підвищений вміст АЛТ, підвищений вміст тригліцеридів у крові, збільшений протромбіновий час, збільшена маса тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до лейпрореліну ацетату, інших агоністів гонадотропін-рилізінг гормону (ГнРГ) або до будь-якої з допоміжних речовин; пацієнтам, які до цього пройшли орхієктомію; протипоказаний жінкам і дітям.

Визначена добова доза (DDD): парентерально (депо) - 0,134 мг., парентерально (імплант) - 60 мг

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕЛІГАРД 22,5 МГ	Астеллас Фарма Юроп Б.В. (відповідальний за вторинну упаковку та випуск серії)/Толмар Інк. (відповідальний за виробництво шприца А, шприца Б, кінцеву упаковку та контроль якості)/Канджин біоФарма ЛЛС. (відповідальний за виробництво шприца Б), Нідерланди/США/США	пор. д/приг. р-ну для п/ш ін'єк. у шпр. з розч.	22,5мг	№1	56,65	28,64/€
	ЕЛІГАРД 45 МГ	Астеллас Фарма Юроп Б.В. (відповідальний за вторинну упаковку та випуск серії)/Толмар Інк. (відповідальний за виробництво шприца А, шприца Б, кінцеву упаковку та контроль якості)/Канджин біоФарма ЛЛС. (відповідальний за виробництво шприца Б), Нідерланди/США/США	пор. д/приг. р-ну для п/ш ін'єк. у шпр. з розч.	45мг	№1	43,37	28,64/€
	ЕЛІГАРД 7,5 МГ	Астеллас Фарма Юроп Б.В. (відповідальний за вторинну упаковку та випуск серії)/Толмар Інк. (відповідальний за виробництво шприца А, шприца Б, кінцеву упаковку та контроль якості)/Канджин біоФарма ЛЛС. (відповідальний за виробництво шприца Б), Нідерланди/США/США	пор. д/приг. р-ну для п/ш ін'єк. у шпр. з розч.	7,5мг	№1	67,99	28,64/€
	ЛЕЙПРОРЕЛІН САНДОЗ®	Евер Фарма Йена ГмбХ (виробництво "in bulk",	імплантат у шпр.	3,6мг; 5мг	№1, №3, №6	відсутня у реєстрі OBLЦ	

		пакування, випуск серії, вторинне пакування)/ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг.КГ (випуск серії)/Сандоз ГмБХ – Виробнича дільниця Антиінфекційні ГЛЗ та Хімічні операції Кундль (АІХО ГЛЗ Кундль) (Випуск серії), Німеччина/Австрія/Австрія					
	ЛЕЙПРОРЕЛІН САНДОЗ®	Евер Фарма Йена ГмБХ (виробництво "in bulk", пакування, випуск серії, вторинне пакування)/ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг.КГ (випуск серії)/Сандоз ГмБХ – Виробнича дільниця Антиінфекційні ГЛЗ та Хімічні операції Кундль (АІХО ГЛЗ Кундль) (Випуск серії), Німеччина/Австрія/Австрія	імплантат у шпр.	5мг	№1	27,96	27,84/\$

● **Трипторелін (Triptorelin)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: L02AE04 - аналоги гонадотропін-релізинг гормону.

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний декапептид, аналог природного гонадотропін-релізинг гормону (ГнРГ), який вивільняє гонадотропін; спостерігається початкове та тимчасове збільшення рівнів циркулюючого ЛГ, ФСГ та тестостерону у чоловіків/самців та естрадіолу у жінок/самок; тривале та безперервне введення триптореліну призводить до зниження секреції ЛГ та ФСГ і пригнічення тестикулярного та оваріального стероїдогенезу.

Показання для застосування ЛЗ: лікування високоризикованого локалізованого або місцевопоширеного раку передміхурової залози у поєднанні з радіотерапією^{БНФ}; лікування місцевопоширеного або метастатичного раку передміхурової залози^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування високоризикованого локалізованого або місцевопоширеного раку передміхурової залози у поєднанні з радіотерапією^{БНФ}; лікування місцевопоширеного або метастатичного раку передміхурової залози^{БНФ} - рекомендовану дозу 22,5 мг триптореліну вводять кожні 6 міс. (кожні 24 тижні) у вигляді одноразової в/м ін'єкції; 11,25 мг триптореліну вводять кожні 3 міс. у вигляді одноразової в/м ін'єкції; рак передміхурової залози - в/м ін'єкція одним шприцом, що відповідає 3,75 мг триптореліну, здійснюють 1 р/4 тижні.^{БНФ}

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперчутливість, анафілактичний шок, анафілактична р-ція; зниження апетиту, затримка рідини, розлади сну, безсоння, зміни настрою, зниження лібідо, депресія, афективна лабільність, тривожність, втомлюваність, депресія, дезорієнтація, сплутаність свідомості, головний біль, запаморочення, дисгевзія, гіпестезія, непритомність, розлади пам'яті, порушення уваги, парестезія, тремор, сухість очей, погіршення/порушення зору; вертиго, відчуття серцебиття, гарячі припливи, АГ, емболія, диспноє, носова кровотеча, нудота, біль у животі, дискомфорт у животі, здуття живота, діарея, сухість у роті, метеоризм, виразковий стоматит, блювання, акне, гіпергідроз, себорея, алопеція, сухість шкіри, гірсутизм, оніхолісис, свербіж, висип, ангіоневротичний набряк, кропив'янка, артралгія, м'язові спазми, біль у кінцівках, біль у спині, міалгія, м'язова слабкість, порушення з боку скелетно-м'язової системи, остеопороз, перелом; патології молочних залоз, диспареунія, генітальна кровотеча (включаючи вагінальну кровотечу, кровотечу відміни), с-м гіперстимуляції яєчників, гіпертрофія яєчників, тазовий біль, вульвовагінальна сухість, біль у грудях, кровотеча при статевому акті, цистоцеле, порушення менструального циклу (включаючи дисменорею, метрорагію та менорагію), кіста яєчника, виділення з піхви; аменорея; астенія, р-ції в місці ін'єкції (включаючи біль, набряк, еритему та запалення), периферичний набряк, лихоманка, відчуття нездужання; збільшення/зменшення маси тіла, підвищення рівня лужної фосфатази в крові; церебральна ішемія, крововилив у центральну нервову систему, ішемія міокарду, подовження інтервалу QT, нетримання сечі; ринофарингіт, тромбозитоз; анорексія; ЦД, подагра, гіперліпідемія, підвищений апетит.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до триптореліну, полімеру гліколевої та молочної кислот, декстрану або до будь-якої допоміжної речовини; гонадотропін-релізинг гормону, інших аналогів агоністів GnRH або до будь-якої іншої допоміжної речовини; період вагітності або годування груддю.

Визначена добова доза (DDD): парентерально (депо) - 0,134 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ДЕКАПЕПТИЛ ДЕПО	Феррінг ГмБХ (відповідальний за виробництво готового продукту, первинну	пор. д/сусп. д/ін'єк. у шпр. з розч.	3,75мг	№1	58,45	32,07/€

	упаковку, контроль якості та випуск серії)/Феррінг-Лечива, а.с. (відповідальний за вторинну упаковку), Німеччина/Швейцарія					
ДИФЕРЕЛІН®	ІПСЕН ФАРМА БІОТЕК (порошок: виробництво та пакування, вторинне пакування, контроль якості та випуск лікарського засобу; розчинник: вторинне пакування та випуск серії)/ІПСЕН ФАРМА БІОТЕК (порошок: гамма-випромінювання)/СТЕРІД ЖЕНІКС ІТАЛІЯ С.П.А. (порошок:, Франція/Франція/Італія/Франція	пор. д/сусп. д/ін'єк. прол. вивіл. у фл. з розч., шпр. та 2голк.	3,75мг	№1	97,27	30,25/€
ДИФЕРЕЛІН®	ІПСЕН ФАРМА БІОТЕК (порошок: виробництво та пакування, вторинне пакування, контроль якості та випуск лікарського засобу; розчинник: вторинне пакування та випуск серії)/ІПСЕН ФАРМА БІОТЕК (порошок: гамма-випромінювання)/СТЕРІД ЖЕНІКС ІТАЛІЯ С.П.А. (порошок:, Франція/Франція/Італія/Франція	пор. д/сусп. д/ін'єк. прол. вивіл. у фл. з розч., шпр. та 3голк.	11,25мг	№1	89,87	30,80/€
ДИФЕРЕЛІН®	Дебіофарм Рісерч енд Мануфакчурінг С.А. (виробництво, первинне пакування, контроль якості та випробування на стабільність: порошок)/ЗІГФРІД ХАМЕЛЬН ГмбХ (виробництво, первинне пакування та контроль якості: розчинник)/ІПСЕН ФАРМА БІОТЕК (вторинне пакування, Швейцарія/Німеччина/Франція/Франція	пор. д/сусп. д/ін'єк. прол. вивіл. у фл. з розч., шпр. та 2голк.	22,5мг	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

19.2.2. Антагоністи гормонів та подібні лікарські засоби

19.2.2.1. Антиестрогени

- **Тамоксифен (Tamoxifen)** * [ПМД]

Фармакотерапевтична група: L02BA01 - антагоністи гормонів та аналогічні препарати, антиестрогенні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: потужний нестероїдний антагоніст естрогенів, може мати часткові або повні агоністичні властивості, залежно від тканин організму; у людини спостерігається переважно антиестрогенний ефект, який пояснюється зв'язуванням тамоксифену з гормонзв'язувальним доменом рецептора естрогенів і блокуванням дії естрадіолу.

Показання для застосування ЛЗ: ад'ювантна хіміотерапія після первинного лікування раку молочної залози ^{вооз бнф}; метастатичний рак молочної залози та рак ендометрія у жінок ^{вооз бнф}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована добова доза тамоксифену для дорослих - 20 мг ^{вооз бнф}, у разі поширеного раку дози можуть бути збільшені до 30 мг або 40 мг/добу; МДД тамоксифену - 40 мг; об'єктивний терапевтичний ефект зазвичай відзначається після 4-10 тижнів лікування, однак при наявності метастазів у кістках позитивний ефект може досягатися лише після кількох місяців терапії; для ад'ювантної терапії раннього гормон-рецептор позитивного підтипу раку молочної залози рекомендована тривалість лікування становить щонайменше 5 років, оптимальна тривалість терапії тамоксифеном дотепер не встановлена.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: бульозний пемфігоїд; загострення захворювання; гіперкальціємія; проліферативні зміни в ендометрії (поліпи і рак ендометрія); транзиторна анемія, лейкопенія,

тромбоцитопенія; агранулоцитоз, нейтропенія, панцитопенія; р-ції гіперчутливості, ангіоневротичний набряк; гіперкальциємія у пацієнтів з кістковими метастазами (на початку лікування); затримка рідини в організмі, збільшення рівня тригліцеридів в сироватці крові, анорексія; тяжка гіпертригліцеридемія, що іноді супроводжується панкреатитом; депресія, втрата лібідо у чоловіків; запаморочення, головний біль; зниження гостроти зору, помутніння рогівки, розвиток катаракт і ретинопатії; оптична нейропатія, неврит зорового нерва (у поодиноких випадках втрата зору); припливи крові до обличчя, ішемічні цереброваскулярні події, судоми нижніх кінцівок, тромбоз, інсульт; венозна тромбоемболія: мікросудинний тромбоз, тромбоз глибоких вен та тромбоемболія легеневої артерії; інтерстиціальний пневмоніт; нудота, блювання, запор, діарея; зміна рівня печінкових ензимів, жирова інфільтрація печінки, цироз, жировий гепатоз; прохолестаза, гепатит, жовтяниця, некротичний гепатит, гепатоцелюлярні ураження, печінкова недостатність; шкірні висипання (поодинокі випадки розвитку мультиформної еритеми, с-му Стівенса-Джонсона або бульозного пемфігоїду); алопеція, р-ції гіперчутливості, ангіоневротичний набряк; шкірний васкуліт, червоний вовчак шкіри; міалгія, судоми ніг; вагінальні виділення, порушення менструального циклу та пригнічення менструацій у період пременопаузи, вагінальні кровотечі; генітальний свербіж, збільшення розмірів маткових фіброїдів, проліферативні зміни ендометрія (неоплазія ендометрія, гіперплазія та поліпи, зрідка ендометріоз); рак ендометрія, імпотенція у чоловіків, кістозний набряк яєчників, саркома матки (переважно змішані мюллерівські злоякісні пухлини), вагінальні поліпи; хр. гематопорфірія; припливи жару, біль у кістках та в ділянці ураженої тканини; зміни ліпідного профілю сироватки крові, підвищення активності печінкових ферментів, еритема довкола уражень шкіри, міома матки, хр. гематопорфірія, втома, р-кції опромінення; втрата смакової чутливості, розлади апетиту.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до тамоксифену або до інших компонентів препарату, тяжка тромбоцитопенія, лейкопенія, тяжка гіперкальціємія, одночасне застосування анастразолу та тамоксифену, вагітність, годування груддю.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 20 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ТАМОКСИФЕН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у конт. в кор. та бл.	10мг; 20мг	№60; №10x6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТАМОКСИФЕН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	10мг	№10x6	6,59	
	ТАМОКСИФЕН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у конт.	10мг	№60	6,59	
	ТАМОКСИФЕН-ЗДОРОВ'Я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. у бл.	20мг	№10x3	5,83	
II.	ТАМОКСИФЕН "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (випуск серії, тестування)/Гаупт Фарма Амарег ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, тестування)/Салютас Фарма ГмбХ (випуск серії, тестування), Австрія/Німеччина/Німеччина	табл. у конт.	20мг	№30	11,95	28,54/\$

● **Тореміфен (Toremifene)** ^{[1][МД]}

Фармакотерапевтична група: L02BA02 - антиестрогенні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: нестероїдний похідний трифенілетилену; зв'язується з рецепторами естрогену і надає естрогеноподібний, антиестрогенний (або одночасно) ефект, залежно від тривалості лікування, статі, органу-мішені; при лікуванні тореміфеном хворих на рак молочної залози в постменопаузі було виявлено помірне зниження сироваткового холестеролу і ЛПНЩ; конкурентно зв'язується з естрогенрецепторами і гальмує естрогенопосередковану стимуляцію синтезу ДНК і клітинну реплікацію; у високих дозах естрогеннезалежний протипухлинний ефект; протипухлинний ефект на рак молочної залози опосередкований антиестрогенною дією, проте інші механізми (зміни в експресії онкогенів, секреція чинників зростання, індукція апоптозу і вплив на кінетику клітинного циклу) також справляють протипухлинний ефект.

Показання для застосування ЛЗ: гормонозалежний метастатичний рак молочної залози у постменопаузі ^{БНФ} у якості препарату першої лінії; профілактика та лікування дисгормональних гіперплазій молочної залози; не рекомендований пацієнтам з естрогенрецепторнегативними пухлинами.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дисгормональні гіперплазії молочної залози: рекомендована доза - 20 мг/добу; естрогенозалежний рак молочної залози: для першої лінії гормонотерапії рекомендована доза 60 мг на добу ^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: рак ендометрія; тромбоцитопенія, анемія, лейкопенія; втрата апетиту; депресія; безсоння; запаморочення; головний біль; короточасне помутніння рогівки; вертиго; припливи крові; тромбоемболічні епізоди; диспное; нудота, блювання; запор; підвищення рівнів трансаміназ; жовтяниця; гепатит, стеатоз печінки; підвищена пітливість; висип, свербіж; алопеція; маткові кровотечі, вагінальні виділення; гіпертрофія ендометрія; поліпи ендометрія; гіперплазія ендометрія; підвищена втомлюваність, набряк; збільшення маси тіла; р-ції гіперчутливості.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперплазія ендометрія в анамнезі та виражена печінкова недостатність; гіперчутливість до тореміфену або до будь-якої з допоміжних речовин; препарат протипоказаний пацієнтам із природженим або набутиим подовженням інтервалу QT; порушеннями електролітного балансу, особливо невідкоригованою гіпокаліємією; клінічно значущою брадикардією; клінічно значущою СН зі зниженням фракції викиду лівого шлуночка; симптоматичними аритміями в анамнезі, не рекомендується для застосування разом з препаратами, що подовжують інтервал QT.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 60 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ФАРЕСТОН	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює всі виробничі стадії, виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Кусум Фарм" (виробник, що здійснює вторинне пакування, контроль якості та ви, Фінляндія/Україна	табл. у фл.	60мг	№30	27,50	31,45/€
	ФАРЕСТОН	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює всі виробничі стадії, виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Кусум Фарм" (виробник, що здійснює вторинне пакування, контроль якості та ви, Фінляндія/Україна	табл. у фл.	60мг	№60	29,19	34,68/€
II.	ФАРЕСТОН	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює всі виробничі стадії, виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії), Фінляндія	табл. у фл.	20мг	№30	40,91	34,45/€

• **Фулвестрант (Fulvestrant)**

Фармакотерапевтична група: L02BA03 - антагоністи гормонів та аналогічні засоби, антиестрогенні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: конкурентний антагоніст естрогенових рецепторів (ER), спорідненість до яких порівняна з естрадіолом; блокує трофічну дію естрогенів, не проявляючи часткової агоністичної (естрогеноподібної) активності; механізм дії пов'язаний з негативною регуляцією рівня білків естрогенових рецепторів.

Показання для застосування ЛЗ: лікування раку молочної залози з естрогенпозитивними рецепторами, місцевопоширеного або з метастазами у жінок у постменопаузі ^{БНФ}: які раніше не отримували гормональну терапію; у разі рецидиву хвороби під час чи після ад'ювантної антиестрогенної терапії або прогресування хвороби під час антиестрогенної терапії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі жінки (включаючи осіб літнього віку): рекомендована доза 500 мг з інтервалом 1 місяць, через 2 тижні після першої ін'єкції вводиться додаткова доза 500 мг ^{БНФ}; вводити у вигляді двох послідовних, повільних (1-2 хв на ін'єкцію), в/м ін'єкцій по 5 мл, по одній у кожну сідницю (сідничну область).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції сечовивідних шляхів; р-ції гіперчутливості, анафілактичні р-ції; анорексія; головний біль; припливи, венозна тромбоемболія; нудота, блювання, діарея; підвищення рівнів печінкових ферментів (АЛТ, АСТ, ЛФ), підвищення рівнів білірубину, печінкова недостатність, гепатит, підвищення рівнів ГГТ; висип; біль у суглобах та скелетних м'язах, біль у спині; вагінальна кровотеча, вагінальний кандидоз, лейкорейя; астенія, р-ції у місці ін'єкції, периферична нейропатія, ішіас, геморагії у місці ін'єкції, гематоми у місці ін'єкції, невралгія; зниження кількості тромбоцитів.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату або будь-якої з допоміжних речовин; вагітність і лактація; тяжка печінкова недостатність.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 8,3 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ФАЗЛОДЕКС	Веттер Фарма-Фертигун ГмБХ та Ко. КГ (Виробник лікарського засобу "in bulk", первинна упаковка, візуальний контроль, контроль якості за показниками: опис, ідентифікація, кількісне визначення фулвестранту, продукти деградації, об'єм ін'єкції в контейнерах, Німеччина/Велика Британія	р-н д/ін'єк. по 5мл у шпр. в конт. чар/уп. з 2голк. «BD SafetyGlide™»	250мг/5мл	№2	266,55	26,19/\$
	ФАЛВАКС	Д-р Редді'с Лабораторіс Лімітед, Виробнича дільниця - 9, Індія	р-н д/ін'єк. по 5мл у шпр. з 2голк. в конт. чар/уп.	250мг/5мл	№2	54,98	27,00/\$
	ФУЛВЕДЖЕКТ	К.Т. Ромфарм Компані С.Р.Л., Румунія	р-н д/ін'єк. по 5мл у шпр. в бл. та 2голк.	250мг/5мл	№2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

19.2.2.2. Антиандрогени

Всі антиандрогени інгібують дію андрогенів на органи-мішені шляхом конкуренції з ними за зв'язування з рецепторами. Комплекс «антиандроген -- рецептор» не здатний специфічно зв'язуватися з хроматином та ініціювати синтез специфічних андрогензалежних білків у клітині. Серед антиандрогенів виділяють речовини з чистим, або істинним, антиандрогенним ефектом (вони мають лише здатність блокувати рецептори андрогенів) і речовини з подвійною дією (мають, окрім здатності блокувати андрогенні рецептори, прогестагенну та антигонадотропну активність).

Чисті антиандрогени (бікалутамід, флутамід) блокують рецептори андрогенів як у простаті, так і в гіпоталамусі. У зв'язку з цим, відбувається стимуляція осі «гіпоталамус – гіпофіз -- сім'яники» і, як наслідок, -- гіперплазія клітин Лейдига. У чоловіків при цьому підвищується $S_{пл}$ тестостерону та естрадіолу, що викликає гінекомастію. Підвищення $S_{пл}$ ендogenous тестостерону з часом може повністю знизити антиандрогенний ефект ЛЗ. Тому, за допомогою чистих антиандрогенів, не можна досягнути повної нейтралізації трофічної дії ендogenous андрогенів на простату.

Антиандрогени подвійної дії (ципротерон), крім антиандрогенних якостей, мають антигонадотропну активність. Порівняно з чистими антиандрогенами, ципротерон одночасно знижує $S_{пл}$ андрогенів та блокує дію андрогенів на рівні рецепторів простати. В результаті цього, він дає ефекти, схожі на хірургічну кастрацію. Завдяки гестагенній активності, ципротерон не викликає напливів гарячки, на відміну від аналогів ГРГ.

- **Бікалутамід (Bicalutamide) ***

Фармакотерапевтична група: L02BB03 - антиандрогенні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: нестероїдний антиандроген, що не має іншого впливу на ендокринну систему; зв'язується з андрогенними рецепторами, не активізуючи експресію генів і завдяки цьому пригнічує активність андрогенів; результатом цього пригнічення є регресія пухлин передміхурової залози.

Показання для застосування ЛЗ: лікування раку передміхурової залози у комбінації з терапією аналогами рилізінг-фактора лютеїнізуючого гормону чи хірургічною кастрацією (50 мг); як монотерапію, та як ад'ювантну терапію у поєднанні з радикальною простатектомією або променевою терапією пацієнтам з місцево-розповсюдженим раком передміхурової залози у разі високого ризику прогресування захворювання ^{БНФ}; місцеворозповсюджений неметастатичний рак передміхурової залози, якщо хірургічна кастрація або інші медичні втручання є неприйнятними чи не можуть бути застосовані (150 мг) ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування розповсюдженого раку простати у комбінації з аналогами рилізінг-фактора лютеїнізуючого гормону (РФЛГ) або хірургічною кастрацією - для дорослих чоловіків звичайна добова доза - 50 мг 1 р/добу; лікування починають щонайменше за 3 дні до початку прийому аналога ЛГРГ або одночасно із хірургічною кастрацією ^{БНФ}; монотерапія, та як ад'ювантна терапія у поєднанні з радикальною простатектомією або променевою терапією пацієнтам з місцеворозповсюдженим раком передміхурової залози у разі високого ризику прогресування захворювання - 150 мг 1 р/добу ^{БНФ}, лікування місцево-розповсюдженого неметастатичного раку передміхурової залози, коли хірургічна кастрація або інші медичні втручання є неприйнятними чи не можуть бути застосовані - 150 мг 1 р/добу ^{БНФ}, приймати тривало, принаймні до 2 років або до появи ознак прогресування захворювання.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анемія, гіперчутливість, ангіоневротичний набряк, кропив'янка, зменшення апетиту, зниження лібідо, депресія, запаморочення, сонливість, пролонгація QT-інтервалу, ІМ, СН, припливи, інтерстиціальна легенева хвороба, біль у животі, запор, нудота, диспепсія, метеоризм, гепатотоксичність, жовтяниця, підвищення активності трансаміназ, печінкова недостатність, висип, алопеція, гірсутизм/відновлення росту волосся, сухість шкіри, р-ція підвищеної чутливості до світла, свербіж, гематурія, гінекомастія та болючість молочних залоз, еректильна дисфункція, астения, набряк, біль у грудях, збільшення маси тіла, фотосенсибілізація.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату чи будь-яких допоміжних речовин ЛЗ; дитячий вік, жіноча стать, одночасне лікування терфенадином, астемізолом або цизапридом.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 50 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АРЕКЛОК®	Коцак Фарма Ілац ве Кімія Санай А.С. (всі стадії виробничого процесу, окрім випуску серії)/АТ "Гріндекс" (виробник, який відповідає за випуск серії, включаючи контроль серії/випробування), Туреччина/Латвія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10х3	35,80	26,85/€
	БІКАЛУТАМІД-ВІСТА	Сінтон Хіспанія С.Л., Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10х3	50,00	32,78/€
	БІКАЛУТАМІД-ВІСТА	Сінтон Хіспанія С.Л., Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	150мг	№10х3	27,78	32,78/€
	БІКАЛУТАМІД-ТЕВА	Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд., Ізраїль	табл., вкриті п/о у бл.	50мг, 150мг	№7х4, №10х3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БІКАТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг, 150мг	№10х1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БІКАТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№10х3	66,67	24,97/\$
	БІКАТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	150мг	№10х3	34,44	24,97/\$
	БІКУЛІД	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у фл.	50мг	№50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БІКУЛІД	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у бл.	50мг	№15х2	35,08	27,09/\$
	КАЛУМІД	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№15х2, №15х6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	КАСОДЕКС	Корден Фарма ГмбХ (виробник, відповідальний за виробництво "in bulk", контроль якості)/АстраЗенека ЮК Лімітед (виробник, відповідальний за первинне та вторинне пакування, випуск серії), Німеччина/Велика Британія	табл., вкриті п/о у бл.	50мг	№14х2	37,44	27,05/\$
	КАСОДЕКС	Корден Фарма ГмбХ (відповідальний за виробництво "in bulk", контроль якості)/АстраЗенека ЮК Лімітед (відповідальний за первинне та вторинне пакування, випуск серії), Німеччина/Велика Британія	табл., вкриті п/о у бл.	150мг	№14х2	25,99	28,49/\$

• **Флутамід (Flutamide)**

Фармакотерапевтична група: L02BB01 - Антинеопластичні та імунотулюючі лікарські засоби. Лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях ендокринної системи. Антагоністи гормонів та аналогічні засоби. Антиандрогенні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: антиандрогенний препарат з нестероїдною структурою; блокує андрогенні рецептори клітин-мішеней у передміхуровій залозі, гіпоталамусі і гіпофізі та інгібує біологічні ефекти ендогенних андрогенів, проте не пригнічує дію на андрогенопосередковану секрецію гонадотропін-рилізінг гормону (ГТРГ) гіпоталамусом або не впливає на чутливість гіпофіза до ГТРГ, це призводить до підвищення вмісту гонадотропних гормонів (лютеїнізуючого і фолікулоstimулюючого), унаслідок чого відбувається стимуляція гіперпродукування тестостерону.

Показання для застосування ЛЗ: табл. (250 мг): лікування місцевопоширеного або метастазуючого раку простати як засіб монотерапії (з або без орхідектомії) або в комбінації з агоністами лютеїнізуючого гормону рилізінг-гормону ЛГРГ у хворих, яким раніше не призначали ніякого лікування, або лікування хворих, які не реагують чи у яких розвинулась резистентність до гормональної терапії або її непереносимість з метою досягнення максимальної андрогенної блокади ^{БНФ}; у комбінованій терапії - як один із засобів для лікування локально обмеженого раку простати В2 - С2 (Т2b - Т4), для зменшення об'єму пухлини, посилення контролю над пухлиною та збільшення періоду між загостреннями хвороби.;табл. (125 мг): лікування жінок з функціональною гіперандрогенією, яка супроводжується порушеннями оваріально-менструального циклу, гірсутизмом, с-мом склерополікістозних яєчників та безпліддям.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл. (250 мг): по 250 мг (1 табл.) 3 р/добу ^{БНФ} кожні 8 год.; добова доза - 750 мг: у складі комбінованої терапії з агоністами ЛГРГ прийом флутаміду можна розпочинати за 3 доби до початку терапії агоністами ЛГРГ; при застосуванні променевої терапії флутамід призначають за 8 тижн. до її початку, продовжують протягом усього курсу або за 12 тижнів перед простатектомією; табл. (125 мг): жінкам з гіперандрогенними станами призначають по 125 мг (1 табл.) 3 р/добу протягом 3 - 6 місяців.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: оперізувальний герпес; лімфедема, анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія, метгемоглобінемія, екхімози; підвищення апетиту, анорексія; безсоння, депресія, тривожність; запаморочення, головний біль, сонливість; вовчакоподібний с-м; нечіткість зору; припливи, гіпертензія, подовження інтервалу QT, СС розлади; диспное, пневмонія, кашель; діарея, нудота, блювання, підвищення апетиту, неспецифічні скарги на функціонування ШКТ, печія, запор, порушення ф-ції ШКТ, біль у ділянці шлунка, розлади шлунка, виразкоподібні болі, стоматит, диспепсія, коліт; гепатит, жовтяниця, збільшення показників печінкових проб, тяжкий токсичний гепатит, некроз печінки та печінкова енцефалопатія; збільшення рівня сечовини та креатиніну в крові, зміна кольору сечі на зелений; свербіж, підшкірні крововиливи, фоточутливість, висипання, алопеція, оборотні зміни структури волосся, втрата волосся; свербіж, підшкірні крововиливи, кропив'янка, екхімоз, фоточутливість; гінекомастія і/або біль у ділянці грудних залоз, галакторея, зниження лібідо, зменшення спермоутворення, зміни молочних залоз, на початку монотерапії флутамідом можливе збільшення рівня тестостерону у плазмі, яке має оборотний характер, біль у грудях; новоутворення у грудних залозах у чоловіків; підвищена втомлюваність, набряки, слабкість, тривожність, спрага, біль за грудниною, гарячка; м'язові спазми; транзиторне порушення ф-ції печінки.

Протипоказання до застосування ЛЗ: 250мг: гіперчутливість до препарату або будь-яких його компонентів; тяжка печінкова недостатність (базовий рівень печінкових ферментів оцінити до початку лікування), дитячий вік (18р.); 125мг: гіперандрогенія органічного походження (пухлини яєчників та кори надниркових залоз).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,75 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ФЛУТАФАРМ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	0,25г	№10x5	39,00	
	ФЛУТАФАРМ® ФЕМІНА	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	0,125г	№10x5	39,60	
II.	ФЛУТАМІД	Оріон Корпорейшн, Фінляндія	табл. у бл.	250мг	№21x4	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФЛУТАН	Медокемі ЛТД (Центральний Завод), Кіпр	табл. у бл.	250мг	№10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФЛУТАН	Медокемі ЛТД (Центральний Завод), Кіпр	табл. у бл.	250мг	№10x10	47,62	31,43/€

● **Ципротерон (Cyproterone)**

Фармакотерапевтична група: G03HA01 - гормони статевих залоз та препарати, які застосовують при патології статевої сфери, антиандрогени.

Основна фармакотерапевтична дія: гормональний препарат з антиандрогенною дією, який конкурентно пригнічує вплив андрогенів на андрогенозалежні органи-мішені, захищає передміхурову залозу від впливу андрогенів, що виробляються в статевих залозах та/або корі надниркових залоз; має центральну інгібуючу дію; антигонадотропний ефект зумовлює зниження синтезу тестостерону в яєчках, зменшує статевий потяг і потенцію; після відміни препарату ці ефекти зникають; при застосуванні високих доз можливе незначне зростання рівня пролактину; на даний час клінічний досвід та результати проведених епідеміологічних досліджень не дають підстав припускати підвищення частоти розвитку пухлин печінки у людей, але статеві стероїди можуть сприяти росту деяких гормонозалежних тканин та пухлин.

Показання для застосування ЛЗ: для застосування виключно чоловікам: для зниження статевого потягу при статевих відхиленнях ^{БНФ}, для паліативної терапії метастазуючого або локально прогресуючого неоперабельного раку передміхурової залози, якщо лікування аналогами лютеїнізуючого рилізінг-гормону (ЛРГ) або оперативне втручання виявилися недостатніми або протипоказаними ^{БНФ}; початково для зменшення припливів жару, які можуть бути спричинені зростанням рівня тестостерону в сироватці на початку лікування агоністами ЛРГ або після орхіектомії ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: табл. (50 мг або 100 мг) приймати після вживання їжі, запиваючи невеликою кількістю рідини; МДД - 300 мг: для зниження статевого потягу при гіперсексуальності та статевих відхиленнях: початкова доза 50 мг 2 р/добу ^{БНФ}, дозу можна підвищити до 100мг 2 р/добу (200 мг) або на короткий період часу до 100мг 3 р/добу (300 мг); після досягнення задовільного результату терапевтичний ефект підтримувати за допомогою мінімальної дози, достатнім є прийом 25мг 2р/добу (50 мг/добу), призначати підтримуючу дозу або відмінити препарат поступово, добова доза з інтервалом у кілька тижнів зменшується на 50мг або 25мг.;

паліативна терапія метастазуючого або локально прогресуючого неоперабельного раку передміхурової залози без орхіектомії або лікування агоністами ЛРГ: по 100мг 2-3 р/добу (200-300 мг); ^{БНФ} початково для запобігання виникненню небажаних вторинних явищ та ускладнень, які можуть бути спричинені зростанням рівня тестостерону в сироватці на початку лікування агоністами ЛРГ: монотерапія: по 100мг 2 р/добу (200 мг) протягом 5-7 днів, після цього протягом 3-4 тижнів по 100мг 2 р/добу (200 мг) у комбінації з агоністом ЛРГ у рекомендованій дозі ^{БНФ}; для усунення припливів у пацієнтів під час лікування агоністами ЛРГ або після орхіектомії: 50-150 мг/добу зі збільшенням дози у разі необхідності до 100мг 3 р/добу (300 мг); ^{БНФ} парентерально: призначений тільки для в/м ін'єкцій, робити їх дуже повільно; для зниження сексуального потягу при патологічних відхиленнях у статевій сфері у чоловіків: 1 ампл. (300 мг ципротерону ацетату) вводять кожні 10-14 днів у вигляді глибокої в/м ін'єкції; у виняткових випадках, якщо ефект від лікування недостатній, можна вводити 2 ампл. (600 мг ципротерону ацетату) кожні 10-14 днів, бажано по одній ампл. в правий та лівий сідничний м'яз, зменшення дози або припинення прийому препарату повинно відбуватися поступово; лікування неоперабельного раку передміхурової залози: 1 ампл. (300 мг) вводять щотижня у вигляді глибокої в/м ін'єкції, при поліпшенні стану або ремісії захворювання не змінювати призначену дозу препарату або припиняти лікування; початково для зменшення припливів жару: 300 мг вводять одноразово у вигляді глибокої в/м ін'єкції.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: доброякісні та злоякісні пухлини печінки, менінгіоми; анемія; дещо підвищений рівень пролактину, знижений рівень кортизолу; р-ції гіперчутливості; збільшення (набряк) або зменшення маси тіла; підвищення рівня цукру крові у хворих на ЦД; зниження лібідо, еректильна дисфункція; депресія, тимчасовий стан неспокою, пригнічений настрій, тимчасовий стан неспокою, зниження статевого потягу; легенева мікроемболія, вазовагальні р-ції, тромбоемболічні явища; задишка; ІХС; нудота/ блювання, внутрішньочеревний крововилив; гепатотоксичні р-ції, жовтяниця, гепатит, печінкова недостатність; висипання; остеопороз; зворотне пригнічення сперматогенезу, гінекомастія, тактильна чутливість сосків; втомлюваність, миттєва загальна байдужість, припливи жару, посилене потовиділення, р-ції в місці ін'єкції; головний біль.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до будь-якого з компонентів ЛЗ; захворювання печінки; с-м Дубіна-Джонсона, с-м Ротора; пухлини печінки в даний час або в анамнезі; менінгіома в даний час або в анамнезі; встановлені злоякісні захворювання або підозра на їх наявність; тяжка хр. депресія; тромбоемболічні явища в даний час або в анамнезі; дитячий та підлітковий вік до завершення пубертатного періоду; тяжкі форми ЦД із судинними ускладненнями; серпоподібноклітинна анемія.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,1 г., парентерально - 0,1 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АНДРОФАРМ®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 3мл в ампл. у бл.	100 мг/мл	№3x1	122,22	
	АНДРОФАРМ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	50мг, 100мг	№30, №50, №60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АНДРОФАРМ®	ПАТ "Фармак", Україна	табл. у бл.	50мг	№10x2	45,00	
II.	АНДРОКУР® ДЕПО	Байер АГ, Німеччина	р-н олійн. д/ін'єк. по 3мл в ампл. у бл.	100 мг/мл	№3	відсутня у реєстрі ОБЦ	

19.2.2.3. Інгібітори ферментів

• Анастрозол (Anastrozole) *

Фармакотерапевтична група: L02BG03 - антагоністи гормонів та споріднені засоби, інгібітори ароматази.

Основна фармакотерапевтична дія: потужний та високоселективний нестероїдний інгібітор ароматази; у жінок у постменопаузальному періоді естрадіол продукується шляхом перетворення у периферійних тканинах андростендіону в естрон за допомогою комплексу ферменту ароматази, естрон далі перетворюється на естрадіол; зниження рівня циркулюючого естрадіолу виявляє терапевтичний ефект у жінок, хворих на рак молочної залози; не має прогестагенної, андрогенної або естрогенної активності, не впливає на секрецію кортизолу та альдостерону.

Показання для застосування ЛЗ: ад'ювантне лікування інвазивного раку молочної залози з позитивними показниками рецепторів гормонів на ранніх стадіях у жінок у постменопаузальному періоді; ад'ювантного лікування інвазивного раку молочної залози з позитивними показниками рецепторів гормонів на ранніх стадіях у жінок у постменопаузальному періоді, яким було проведено ад'ювантну терапію тамоксифеном протягом 2-3 років; лікування поширеного раку молочної залози з позитивними показниками рецепторів гормонів у жінок у постменопаузальному періоді ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі, включаючи жінок літнього віку - по 1 мг внутрішньо 1 р/добу ^{БНФ}, при інвазивному раку молочної залози з позитивними показниками рецепторів гормонів на ранніх стадіях у жінок у постменопаузальному періоді рекомендована тривалість ад'ювантного ендокринного лікування становить 5 років.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анорексія, гіперхолестеринемія; гіперкальціємія (з підвищенням або без підвищення рівня паратиреоїдного гормону); головний біль; сонливість, зап'ястий тунельний с-м, розлади чутливості (включаючи парестезію, втрату смаку та зміни смакових відчуттів); припливи; нудота, діарея, блювання; підвищення рівнів лужної фосфатази, АЛТ та АСТ; підвищення рівнів γ-ГТ та білірубину, гепатит; висип, стоншення волосся (алопеція), АР, кровив'язка, еритема поліморфна, анафілактоїдна реакція, шкірний васкуліт (в т.ч. випадки пурпури Шенлейна-Геноха); с-м Стівенса-Джонсона, ангіоневротичний набряк;

артралгія/порушення рухливості в суглобах, артрит, остеопороз; біль у кістках, міалгія; с-м клацаючого пальця; сухість піхви, вагінальна кровотеча; астенія.

Противказання до застосування ЛЗ: вагітність та годування груддю; гіперчутливість до препарату або до будь-якої з допоміжних речовин.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 1 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АНАСТРОЗОЛ-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (пакування із форми "in bulk" виробництва ГЕНЕФАРМ С.А., Греція), Україна	табл., вкриті п/о у бл.	1мг	№14x2, №14x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	АККАСТРОЛ®	Ремедика ТОВ, Кіпр	табл., вкриті п/о у бл.	1мг	№14x2	33,56	26,85/€
	АНАСТРОЗОЛ	ГЕНЕФАРМ СА, Греція	табл., вкриті п/о у бл.	1мг	№14x2, №14x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АНАСТРОЗОЛ - ВІСТА	Сінтон Хіспанія С.Л. (виробництво (повний цикл), включаючи випуск серії)/Сінтон БВ (виробник, відповідальний за випуск серії)/Роттендорф Фарма ГмБХ (пакування)/МПФ Б.В. (пакування), Іспанія/Нідерланди/Німеччина/Нідерланди	табл., вкриті п/о у бл.	1мг	№14x2	23,21	35,35/€
	АНАСТРОЗОЛ АМАКСА	СТАДАФАРМ ГмБХ (випуск серії)/Хаупт Фарма Мюнстер ГмБХ (виробництво готової лікарської форми, первинне та вторинне пакування, контроль серії/якості), Німеччина/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	1мг	№10x3, №10x10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АНАСТРОЗОЛ САНДОЗ®	Салютас Фарма ГмБХ (виробництво "in bulk", пакування, випуск серії; вторинне пакування), Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	1мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АНАТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	1мг	№10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АНАТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	1мг	№10x3	33,00	24,97/\$
	АРИМІДЕКС	АстраЗенека Фармасьютикалс ЛП (виробник лікарського засобу "in bulk")/АстраЗенека ЮК Лімітед (виробник, відповідальний за пакування та випуск серії), США/Велика Британія	табл., вкриті п/о у бл.	1мг	№14x2	32,92	27,05/\$
	ЕГІСТРОЗОЛ	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС/Сінтон Хіспанія, С.Л., Угорщина/Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	1мг	№28, №30, №90	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ФЕМІЗЕТ	Фрезеніус Кабі Онколоджи Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	1мг	№14x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Екземестан (Exemestane) ***

Фармакотерапевтична група: L02BG06 - антагоністи гормонів та аналогічні засоби. Інгібітори ароматази.

Основна фармакотерапевтична дія: необоротний стероїдний інгібітор ароматази, подібний за своєю структурою до природної речовини андростендіону; блокує утворення естрогенів шляхом інгібування ароматази; у постменопаузі знижує концентрацію естрогенів у сироватці крові, починаючи з дози 5 мг; максимальне зниження

(> 90 %) досягається при застосуванні дози 10 - 25 мг; у пацієнок у постменопаузі з діагнозом рак молочної залози, які отримували 25 мг щоденно, загальний рівень ароматази знижувався на 98%; не має прогестогенної та естрогенної активності; виявляється лише незначна андрогенна активність (при застосуванні високих доз); при багаторазовому введенні доз протягом доби не впливає на синтез кортизолу та альдостерону у надниркових залозах, що підтверджує вибірковість дії, тому немає необхідності у замісній терапії глюкокортикоїдами та мінералокортикоїдами; незначне підвищення рівнів лютеїнізуючого та фолікулостимулюючого гормонів у сироватці відмічається навіть при низьких дозах; цей ефект розвивається за принципом зворотного зв'язку, на рівні гіпофіза.

Показання для застосування ЛЗ: ад'ювантна терапія у жінок з інвазивним раком молочної залози ранніх стадій з позитивною пробою на естрогенові рецептори у період постменопаузи після 2-3 років початкової ад'ювантної терапії тамоксифеном^{БНФ}; лікування поширеного раку молочної залози у жінок з природнім чи індукованим постменопаузним статусом, у яких виявлено прогресування хвороби після терапії антиестрогенами, не була продемонстрована ефективність у^{БНФ} пацієнок з негативною пробою на естрогенові рецептори.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі та пацієнтки похилого віку - приймати по 25 мг/добу^{БНФ} щоденно, бажано після їди; у пацієнок, із раком молочної залози на ранніх стадіях, лікування необхідно продовжувати до завершення п'ятирічної послідовної ад'ювантної гормональної терапії або до виникнення рецидиву пухлини чи нової контрлатеральної пухлини; у пацієнок з поширеним раком молочної залози лікування продовжувати, поки прогресія пухлини очевидна.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: лейкопенія; тромбоцитопенія; зниження кількості лімфоцитів; гіперчутливість; анорексія; депресія, безсоння; головний біль, запаморочення; с-м карпального каналу, парестезія; сомноленція; припливи; біль у животі, нудота; блювання, діарея, запор, диспепсія; підвищені рівні печінкових ферментів, підвищені рівні білірубину в крові, підвищені рівні лужної фосфатази в крові; гепатит, холестатичний гепатит; підвищена пітливість; алопеція, висипання, кропив'янка, свербіж; гострий генералізований екзантематозний пустульоз; біль у суглобах та м'язово-скелетний біль; перелом, остеопороз; біль, підвищена втомлюваність; периферичний набряк, астенія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активного інгредієнта або до будь-якого іншого компонента ЛЗ; жінкам у передменопаузальному періоді, у період вагітності або годування груддю.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 25 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АРОМАЗИН	Пфайзер Італія С.р.л., Італія	табл., вкриті ц/о у бл.	25мг	№15x2	36,49	25,17/\$
	АРОМАЗИН	Пфайзер Італія С.р.л., Італія	табл., вкриті ц/о у бл.	25мг	№20x5	39,18	27,02/\$
	ЕКЗЕМАРИН	ЕйГен Фарма Лімітед (всі стадії процесу виробництва)/Мілмаунт Хелскеа Лтд (первинне і вторинне пакування), Ірландія/Ірландія	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№10x3	14,93	28,33/€
	ЕКЗЕМЕВІСТА	Сінтон БВ (відповідальний за випуск серії)/Сінтон Хіспанія, С.Л. (повний цикл виробництва)/Роттендорф Фарма ГмбХ (вторинне пакування), Нідерланди/Іспанія/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№10x3	34,00	32,40/€
	ЕКЗЕМЕСТААН АККОРД 25	Інтас Фармасьютикелс Лімітед (виробництво готового лікарського засобу, первинна, вторинна упаковка, контроль якості серії)/Аккорд Хелскеа Лімітед (вторинне пакування, відповідальний за випуск серії), Індія/Велика Британія	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№15, №90, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕКЗЕМЕСТААН АККОРД 25	Інтас Фармасьютикелс Лімітед (виробництво готового лікарського засобу, первинна, вторинна упаковка,	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№15x2	20,00	26,81/\$

		контроль якості серії)/Аккорд Хелскеа Лімітед (вторинне пакування, відповідальний за випуск серії), Індія/Велика Британія					
	ЕКЗЕМЕСТАН - ВІСТА	Сіндан фарма С.Р.Л, Румунія	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№10x10	24,93	22,02/€
	ЕКЗЕМЕСТАН - ВІСТА	Сіндан фарма С.Р.Л, Румунія	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№10x3	30,00	32,21/\$
	ЕКЗЕМЕСТАН ГРІНДЕКС	ТОВ "Мілмоунт Хелскеар" (альтернативна дільниця, на якій проводиться первинне пакування; альтернативна дільниця, на якій проводиться вторинне пакування; альтернативна дільниця, на якій проводиться первинне та вторинне пакування)/ЕірГен Фарма Лімітед (пов, Ірландія/Ірландія	табл., вкриті п/о у бл.	25мг	№10x3	21,48	26,85/€

• **Летрозол (Letrozole) ***

Фармакотерапевтична група: L02BG04 - засоби, що застосовуються для гормональної терапії. Антагоністи гормонів та аналогічні засоби. Інгібітори ароматази.

Основна фармакотерапевтична дія: нестероїдний інгібітор ароматази (інгібітор біосинтезу естрогену); протипухлинний; у випадках, коли ріст пухлинної тканини залежить від наявності естрогенів, усунення опосередкованого ними стимулюючого впливу є передумовою пригнічення росту пухлини; у жінок у постменопаузі естрогени утворюються переважно за участі ферменту ароматази, який перетворює андрогени, що синтезуються у надниркових залозах (у першу чергу андростендіон і тестостерон), на естрон та естрадіол; за допомогою специфічної інгібіції ферменту ароматази можна досягти пригнічення біосинтезу естрогенів у периферичних тканинах і в пухлинній тканині; пригнічує ароматазу шляхом конкурентного зв'язування з субодиноцею цього ферменту - гемом цитохрому P450, що призводить до зниження біосинтезу естрогенів у всіх тканинах; не змінює концентрацію лютеїнізуючого та фолікулоstimулюючого гормонів, тиреотропного гормону, T₄ і T₃; порушення синтезу стероїдних гормонів у надниркових залозах не виявлено.

Показання для застосування ЛЗ: ад'ювантна терапія гормонопозитивного раку молочної залози на ранніх стадіях у жінок у постменопаузальний період^{БНФ}; розширена ад'ювантна терапія раку молочної залози на ранніх стадіях у жінок у постменопаузальний період, яким була проведена стандартна ад'ювантна терапія тамоксифеном протягом 5 років;^{БНФ} терапія першої лінії гормонозалежного поширеного раку молочної залози у жінок у постменопаузі^{БНФ}; лікування поширених форм раку молочної залози у жінок у постменопаузі (природної або спричиненої штучно), які отримували попередню терапію антиестрогенами^{БНФ}; неоад'ювантна терапія у жінок у постменопаузі з локалізованим гормонопозитивним HER-2-негативним раком молочної залози, яким не підходить хіміотерапія і не показано невідкладне хірургічне втручання^{БНФ}; ефективність препарату для пацієнок з гормононегативним раком молочної залози не доведена.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза (у т.ч. для пацієнок літнього віку) 2,5 мг 1 р/добу щоденно^{БНФ}; в ад'ювантній та розширеній ад'ювантній терапії лікування має тривати протягом 5 р. або поки не настане рецидив захворювання; у хворих із метастазами терапію продовжувати до тих пір, доки ознаки прогресування захворювання не стануть очевидними; в умовах неоад'ювантного лікування терапію продовжувати протягом 4-8 місяців, щоб досягнути оптимального зменшення пухлини.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції сечовидільної системи; біль у пухлинних вогнищах; лейкопенія; анафілактичні р-ції; гіперхолестеринемія; зниження/підвищення апетиту; депресія, тривожність (включаючи нервозність), дратівливість; головний біль, запаморочення; сонливість, безсоння, погіршення пам'яті, дизестезія (включаючи парестезію, гіперстезію), порушення смакових відчуттів, інсульт, зап'ястковий тунельний с-м; катаракта, подразнення ока, затьмарення зору; посилене серцебиття; тахікардія, випадки ішемії міокарда (в т.ч. виникнення або погіршення перебігу стенокардії, стенокардію, що вимагає хірургічного втручання, ІМ та ішемію міокарда); гарячі припливи; АГ; тромбофлебіт (тромбофлебіт поверхневих та глибоких вен); легенева емболія, артеріальний тромбоз, цереброваскулярний інфаркт; задишка, кашель; нудота, блювання, диспепсія, запор, діарея, біль у животі; стоматит, сухість у роті; підвищення рівня печінкових ферментів, гіпербілірубінемія, жовтяниця; гепатит; посилене потовиділення; алопеція, висипання (в т.ч. еритематозні, макулопапулярні, псоріатичні та везикулярні висипання), сухість шкіри; свербіж, кропив'янка; токсичний епідермальний некроліз, мультиформна еритема, ангіоневротичний набряк; артралгія; біль у м'язах, біль у кістках, остеопороз, переломи кісток, артрит; тендиніт, розрив сухожилля, с-м «клацаючого пальця»; підвищена частота сечовипускання; вагінальна кровотеча, вагінальні виділення або сухість, біль у молочних залозах; стомлюваність (включаючи астенію, нездужання); периферичний набряк, біль у грудях; підвищення t°, сухість слизових оболонок, відчуття спраги, генералізований набряк; збільшення/зменшення маси тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якого іншого компонента ЛЗ; ендокринний статус, характерний для передменопаузального періоду; вагітність, період годування груддю, жінки репродуктивного віку.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 2,5 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЛСТРОМАРА®	ПАТ "Фармак", Україна	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№10х3	33,83	
II.	АРАЛЕТ	Генефарм СА, Греція	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№10х3	14,93	28,33/€
	ЕТРУЗИЛ	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС (відповідальний за випуск серії)/Сінтон Хіспанія С.Л. (відповідальний за повний цикл виробництва, включаючи випуск серії), Угорщина/Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№10х9	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕТРУЗИЛ	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС (відповідальний за випуск серії)/Сінтон Хіспанія С.Л. (відповідальний за повний цикл виробництва, включаючи випуск серії), Угорщина/Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№10х3	33,47	26,48/\$
	ЛЕТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№10х1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛЕТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№10х3	26,67	24,97/\$
	ЛЕТРОВІСТА	Сінтон Хіспанія, С.Л., Іспанія	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№10х3	15,00	31,37/€
	ЛЕТРОЗОЛ - ВІСТА	Сіндан Фарма С.Р.Л., Румунія	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№10х10	24,93	22,02/\$
	ЛЕТРОЗОЛ - ВІСТА	Сіндан Фарма С.Р.Л., Румунія	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№10х3	27,70	22,02/\$
	ЛЕТРОЗОЛ АМАКСА	Стадафарм ГмбХ (випуск серії)/Хаупт Фарма Мюнстер ГмбХ (виробництво, пакування та контроль якості), Німеччина/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№10х10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛЕТРОЗОЛ АМАКСА	Стадафарм ГмбХ (випуск серії)/Хаупт Фарма Мюнстер ГмбХ (виробництво, пакування та контроль якості), Німеччина/Німеччина	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№10х3	15,00	29,40/€
	ЛЕТРОЗОЛ КРКА	Інтас Фармасьютикалз Лімітед (відповідальний за виробництво "in bulk", первинну упаковку, вторинну упаковку)/КРКА Польща Сп. з о.о. (відповідальний за вторинну упаковку)/Престиж Промоушен Веркауфсфоердерунг & Вербесервіс ГмбХ (відповідальний за вторинну , Індія/Польща/Німеччина/Німеччина/Словенія/Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№10х9	13,23	30,95/€
	ЛЕТРОЗОЛ КРКА	Інтас Фармасьютикалз Лімітед (відповідальний за	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№10х3	13,51	30,95/€

	виробництво " in bulk", первинну упаковку, вторинну упаковку)/КРКА Польща Сп. з о.о. (відповідальний за вторинну упаковку)/Престиж Промоушен Веркауфсфоердерунг & Вербесервіс ГмБХ (відповідальний за вторинну , Індія/Польща/Німеччина/Ні меччина/Словенія/Угорщин а					
ЛЕТРОЗОЛ КРКА	Інтас Фармасьютікалз Лімітед (відповідальний за виробництво " in bulk", первинну упаковку, вторинну упаковку)/КРКА Польща Сп. з о.о. (відповідальний за вторинну упаковку)/Престиж Промоушен Веркауфсфоердерунг & Вербесервіс ГмБХ (відповідальний за вторинну , Індія/Польща/Німеччина/Ні меччина/Словенія/Угорщин а	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№10x6	19,71	28,34/€
ЛЕТРОЗОЛ-ТЕВА	Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серій)/АТ Фармацевтичний завод ТЕВА (первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серій), Ізраїль/Угорщина	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№10x3	14,78	26,62/\$
ФЕМАРА®	Новартіс Фарма Штейн АГ, Швейцарія	табл., вкриті п/о у бл.	2,5мг	№10x3	74,22	26,08/\$

19.2.2.4. Інші антагоністи гормонів та подібні лікарські засоби

- **Дегарелікс (Degarelix)** ^[ПМД]

Фармакотерапевтична група: L02BX02 - антагоністи гормонів та аналогічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: селективний антагоніст гонадотропін-релізинг гормону, що конкурентно й оборотно зв'язується з рецепторами гіпофізарного гонадотропін-релізинг гормону (ГнРГ), знижує вивільнення гонадотропінів, лютеїнізуючого гормону (ЛГ) та фолікулостимулювального гормону, знижує секрецію тестостерону яєчками; карцинома простати є андрогенчутливою та відповідає на лікування, яке видаляє джерело андрогенів; на відміну від агоністів ГнРГ, блокатори гонадотропін-релізинг гормону не індукують викид ЛГ з подальшим викидом тестостерону/стимуляцією росту пухлини, потенційним загостренням с-мів після початку терапії.

Показання для застосування ЛЗ: лікування дорослих чоловіків із розповсюдженим гормонозалежним раком передміхурової залози ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лише для п/ш введення у ділянку живота; початкова доза - 240 мг у вигляді двох послідовних п/ш ін'єкц. по 120 мг кожна; підтримуюча доза - 1 р/міс. по 80 мг ^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анемія, нейтропенічна гарячка; гіперчутливість, анафілактичні реакції; збільшення маси тіла, гіперглікемія/ЦД, підвищення рівня холестерину, зниження маси тіла, зниження апетиту, зміна рівня кальцію в крові; безсоння, депресія, зниження лібідо; запаморочення, головний біль; зниження розумової діяльності, гіпестезія; затьмарення зору; серцеві аритмії (у т.ч. фібриляція передсердь), серцебиття, подовження інтервалу QT; ІМ, СН; припливи, артеріальна гіпертензія, вазовагальна реакція (включаючи гіпотензію); диспное; діарея, нудота; запор, блювання, абдомінальний біль, дискомфорт у ділянці живота, сухість у роті; підвищення рівнів печінкових трансаміназ; підвищення рівня білірубіну, підвищення рівня лужної фосфатази; гіпергідроз (у тому числі нічна пітливість), висипання; кропив'янка, вузликове висипання, алопеція, свербіж, еритема; кістково-м'язовий біль, дискомфорт; остеопороз/остеопенія, артралгія, м'язова слабкість, м'язові спазми, набряк/скутість суглобів; полакіурія, невідкладний позив до сечовипускання, дизурія, ніктурія, ниркова недостатність, нетримання сечі; гінекомастія, атрофія яєчок, еректильна дисфункція; тестикулярний біль, біль у грудях, тазовий біль, подразнення в ділянці статевих органів, порушення еякуляції; р-

ції у місці ін'єкц.; озноб, гарячка, підвищена втомлюваність, грипоподібний стан; нездужання, периферичний набряк.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до дегареліксу або до будь-якого іншого компонента препарату; не призначений для застосування жінкам та дітям.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 2,7 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ФІРМАГОН	Феррінг ГмБХ (виробник готового продукту, відповідальний за первинне пакування, контроль якості та випуск серії)/Феррінг-Лечива, а.с. (відповідальний за вторинне пакування), Німеччина/Чеська Республіка	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч., 1адапт., 1голк. д/введ. та 1стерж. порш.	80мг	№1	155,46	32,90/€
	ФІРМАГОН	Феррінг ГмБХ (виробник готового продукту, відповідальний за первинне пакування, контроль якості та випуск серії)/Феррінг-Лечива, а.с. (відповідальний за вторинне пакування), Німеччина/Чеська Республіка	пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч., 2адапт., 2голк. д/введ. та 2стерж. порш.	120мг	№2	92,61	32,90/€

19.3. Імуномодулюючі засоби

19.3.1. Колонієстимулюючі фактори

- **Ленограстим (Lenograstim)**

Фармакотерапевтична група: L03AA10 - колонієстимулюючі фактори.

Основна фармакотерапевтична дія: належить до групи цитокінів - біологічно активних протеїнів, які регулюють ріст і диференціацію клітин; рекомбінантний людський гранулоцитарний колонієстимулюючий фактор (Г-КСФ); Г-КСФ є фактором, що стимулює клітини-попередники нейтрофілів, про що свідчить збільшення кількості колонієутворюючих одиниць селезінки (CFU-S) та колонієутворюючих одиниць гранулоцитопоезу та моноцитопоезу (CFU-GM) у периферичній крові; здатен стимулювати проліферацію ендотеліальних клітин; призводить до мобілізації у периферичну кров клітин-попередників гемопоєзу; збільшення кількості нейтрофілів є дозозалежним у діапазоні доз від 1 до 10 мкг/кг/добу; повторне введення препарату в рекомендованих дозах додатково збільшують кількість нейтрофілів у крові; нейтрофіли, що утворюються під впливом препарату, мають нормальні хемотаксичні властивості та фагоцитарну активність.

Показання для застосування ЛЗ: дорослим, підліткам та дітям віком старше 2 років з метою: зменшення тривалості нейтропенії у пацієнтів (з немієлоїдними злоякісними новоутвореннями), яким проводилася мієлосупресивна терапія з подальшою трансплантацією кісткового мозку (ТКМ) і які знаходяться у групі підвищеного ризику розвитку тривалої тяжкої нейтропенії^{БНФ}; зменшення тривалості тяжкої нейтропенії і пов'язаних з нею ускладнень у пацієнтів, яким проводилася стандартна цитотоксична хіміотерапія, асоційована з підвищеним ризиком виникнення фебрильної нейтропенії; мобілізації у периферичну кров аутологічних стовбурових клітин-попередників (АСКП) як у хворих, так і у здорових донорів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити шляхом п/ш ін'єкції або в/в інфузії; рекомендована доза 150 мкг (19,2 млн МО)/м²/на добу^{БНФ}, що терапевтично еквівалентно 5 мкг (0,64 млн МО)/кг/добу, у випадках: трансплантації периферичних стовбурових клітин або кісткового мозку, стандартної цитотоксичної хіміотерапії, мобілізації АСКП після хіміотерапії; можна застосовувати пацієнтам, площа поверхні тіла яких не перевищує 1,8 м²; для мобілізації АСКП вводять окремо у рекомендованій дозі 10 мкг (1,28 млн МО)/кг/на добу; дорослі: при трансплантації периферичних стовбурових клітин або кісткового мозку: щоденно у рекомендованій дозі 150 мкг (19,2 млн МО)/м²/добу у вигляді 30-хв в/в інфузії у 0,9 % р-ні NaCl або у вигляді п/ш ін'єкції; першу дозу вводять не раніше ніж через 24 год. після трансплантації кісткового мозку, якщо необхідно, можна безперервно застосовувати впродовж щонайбільше 28 днів; стандартна цитотоксична хіміотерапія: щоденно у рекомендованій дозі 150 мкг (19,2 млн МО)/м²/добу^{БНФ} у вигляді п/ш ін'єкції; першу дозу вводять не раніше ніж через 24 год. після проведення цитотоксичної хіміотерапії, якщо необхідно, можна безперервно застосовувати впродовж щонайбільше 28 днів; мобілізація АСКП: після проведення хіміотерапії вводити щоденно у рекомендованій дозі 150 мкг (19,2 млн МО)/м²/добу^{БНФ} у вигляді п/ш ін'єкції з 1-го по 5-й день після завершення хіміотерапії, залежно від протоколу хіміотерапії, що застосовувався для мобілізації, введення препарату продовжувати до проведення останнього сеансу лейкофорезу; при мобілізації АСКП за допомогою одного ленограстиму, вводити щоденно у рекомендованій дозі 10 мкг (1,28 млн МО)/м²/добу у вигляді п/ш ін'єкції впродовж 4-6 днів; лейкофорез проводити між 5-м і 7-м днем від початку введення препарату; для пацієнтів, яким не проводилася інтенсивна хіміотерапія, часто достатньо одного сеансу лейкофорезу для отримання мінімально необхідної кількості клітин ($\geq 2,0 \times 10^6$

CD34⁺ клітин/ кг); діти: доза для дітей віком старше 2 років та підлітків така ж, як і у дорослих, якщо препарат використовується для зменшення тривалості нейтропенії після мієлосупресивної терапії з наступною ТКМ або після цитотоксичної хіміотерапії; щодо застосування дорослих доз у дітей для мобілізації у периферичну кров аутологічних стовбурових клітин-попередників (АСКП) існують дуже обмежені дані, 34 мільйони МО/мл можна вважати найбільш прийнятним дозуванням для дітей, площа поверхні тіла яких не перевищує 1,8 м².

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекційно-запальні ураження порожнини рота, сепсис та інфекція, підвищення t°тіла, діарея, біль у животі, блювання, нудота, висипання, алопеція та головний біль, біль, біль у кістках, біль у спині, астенія; підвищення рівня ЛДГ, лейкоцитоз, тромбоцитопенія; збільшення розмірів селезінки, розрив селезінки; с-м підвищеної проникності капілярів; набряк легень, інтерстиціальна пневмонія, утворення легневих інфільтратів, легневий фіброз; шкірний васкуліт, г. фебрильний нейтрон-фільний дерматоз (с-м Світа), вузликова еритема, гангренозна піодермія, токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайєлла); гломерулонефрит; м'язово-скелетний біль; р-ції у місці ін'єкційного введення; АР, анафілактичний шок; підвищення рівнів АСТ/АЛТ, підвищення рівня лужної фосфатази.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до ЛЗ та його компонентів; не застосовувати з метою інтенсифікації цитотоксичної хіміотерапії, тобто перевищувати стандартні дози цитостатиків та змінювати режими дозування, оскільки він може зменшувати мієлотоксичність, але не впливає на інші токсичні ефекти цитостатиків; одночасне застосування з цитотоксичною хіміотерапією; мієлоїдні злоякісні новоутворення, хворим віком до 55 років з г.мієлолейкозом *de novo*, або з гострим мієлолейкозом *de novo* і нормальною цитогенетикою, тобто t (8;21), t (15;17) і inv (16).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,35 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ГРАНОЦИТ® 34	Санофі Вінтроп Індастрія (вторинне пакування, контроль якості та випуск серій ліофілізату та розчинника)/Шугаї Фарма Мануфактуринг Ко. Лтд (виробництво ліофілізату, первинне пакування, контроль якості)/Гаупт Фарма Ліврон (виробництво розчинника, первинне, Франція/Японія/Франція	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у скл. фл. з розч.	33,6млн.МО (263мкг)	№5	2229,52	24,45/\$

• **Філграстім (Filgrastim) ***

Фармакотерапевтична група: L03AA02 - Імуностимулятори. Колонієстимулюючі фактори. Філграстім.

Основна фармакотерапевтична дія: людський гранулоцитарний колонієстимулюючий фактор (Г-КСФ); має таку саму біологічну активність, як і ендогенний людський Г-КСФ, і від останнього відрізняється лише тим, що являє собою неглікозильований білок з додатковим N-кінцевим залишком метіоніну; філграстім виділяють з клітин бактерії *Esheria coli*, до складу генетичного апарату яких введено ген, кодуючий білок Г-КСФ; регулює утворення функціонально активних нейтрофілів та їх вихід у кров з кісткового мозку, філграстім значно збільшує число нейтрофільних гранулоцитів у периферичній крові вже протягом перших 24 год. після введення і одночасно призводить до деякого збільшення числа моноцитів; значно зменшує частоту, тяжкість та тривалість нейтропенії у хворих після хіміотерапії цитостатиками або мієлоаблативної терапії з подальшою пересадкою кісткового мозку; активує клітини-попередники гемоцитів периферичної крові (КПГПК); стабільно збільшує число нейтрофільних гранулоцитів у периферичній крові та знижує частоту інфекційних ускладнень; стимулює *in vitro* проліферацію ендотеліальних клітин людини.

Показання для застосування ЛЗ: скорочення тривалості нейтропенії і зменшення частоти фебрильної нейтропенії у хворих, які отримують цитотоксичну хіміотерапію з приводу злоякісних захворювань (за винятком хр.мієлолейкозу і мієлодиспластичного с-му); скорочення тривалості нейтропенії у хворих, що отримують мієлоаблативну терапію з наступною трансплантацією кісткового мозку; мобілізація периферичних стовбурових клітин крові (ПСКК); тяжка вроджена, періодична або ідіопатична нейтропенія^{БНФ} (абсолютна кількість нейтрофільних гранулоцитів 0,5x10⁹/л) у дітей і дорослих; зменшення ризику бактеріальних інфекцій при стійкій нейтропенії (абсолютна кількість нейтрофілів 1,0x10⁹/л) у пацієнтів з розгорнутою стадією ВІЛ-інфекції у разі неефективності інших засобів контролю нейтропенії^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: нейтропенія у хворих, які отримують цитотоксичну хіміотерапію з приводу злоякісних захворювань: рекомендована добова доза 0,5 млн МО/кг (5 мкг/кг) маси тіла 1 р/добу у вигляді п/ш ін'єкцій або в/в інфузій протягом 30 хв; першу дозу вводити не раніше ніж через 24 год. після курсу цитотоксичної хіміотерапії; застосовують, поки загальна кількість нейтрофілів у клінічному аналізі крові не перевищить очікуваний рівень і не досягне норми; після хіміотерапії з приводу солідних пухлин, лімфом і лімфолейкозу тривалість лікування до досягнення вказаних значень становить до 14 днів; після індукційної і консолідаційної терапії г. мієлоїдного лейкозу тривалість лікування може бути значно збільшена (до 38 днів) залежно від виду, дози та схеми застосованої цитотоксичної хіміотерапії^{БНФ}; хворі, які отримують мієлоаблативну терапію з подальшою трансплантацією кісткового мозку: рекомендована початкова доза 1 млн МО/кг (10 мкг/кг) маси тіла на добу у вигляді нетривалої в/в інфузії протягом 30 хв або тривалої п/ш або в/в інфузії протягом 24 год.^{БНФ}; першу дозу вводити не раніше ніж через 24 год. після проведення цитотоксичної хіміотерапії, і не пізніше ніж

через 24 год. після трансплантації кісткового мозку; мобілізація периферичних стовбурових клітин крові (ПСКК) у пацієнтів, які одержують міелосупресивну або міелоаблативну терапію з подальшою аутологічною трансфузією ПСКК: для мобілізації ПСКК при монотерапії рекомендована доза 1 млн МО/кг (10 мкг/кг) маси тіла/добу протягом 5-7 діб поспіль у вигляді тривалої п/ш інфузії протягом 24 год.^{БНФ}; проводять 1-2 сеанси лейкоферезу на 5-ту та 6-ту добу; для мобілізації ПСКК після міелосупресивної хімотерапії рекомендована доза 0,5 млн МО/кг (5 мкг/кг) маси тіла на добу щодня^{БНФ}, починаючи з першого дня після завершення курсу хімотерапії і доти, доки кількість нейтрофілів не переїде очікуваний мінімум і не досягне норми; лейкоферез проводити протягом періоду зростання АКН з $<0,5 \times 10^9/\text{л}$ до $>5 \times 10^9/\text{л}$; хворим, які не отримували інтенсивної хімотерапії, проводять 1 сеанс лейкоферезу; мобілізація ПСКК у здорових донорів перед аlogenною трансплантацією ПСКК: рекомендована доза 1 млн МО/кг (10 мкг/кг) маси тіла/добу протягом 4-5 діб поспіль^{БНФ}; лейкоферез проводять з 5 доби і за необхідності продовжують до 6 доби з метою отримання 4×10^6 CD34+ клітин/кг маси тіла реципієнта; довготривала терапія для збільшення кількості нейтрофілів і зменшення частоти і тривалості інфекційних ускладнень у дітей та дорослих з тяжкою спадковою, періодичною або ідіопатичною нейтропенією (ТХН); спадкова нейтропенія - рекомендована початкова доза 1,2 млн МО/кг (12 мкг/кг) маси тіла на добу шляхом одноразової п/ш ін'єкції або дрібними дозами; ідіопатична і періодична нейтропенія - рекомендована початкова доза 0,5 млн МО/кг (5 мкг/кг) маси тіла на добу одноразово або дрібними дозами^{БНФ}; зниження ризику бактеріальних інфекцій та лікування стійкої нейтропенії у пацієнтів з розгорнутою стадією ВІЛ-інфекції: відновлення кількості нейтрофілів - рекомендована початкова доза 0,1 млн МО/кг (1 мкг/кг) маси тіла/добу зі збільшенням дози до 0,4 млн МО (4 мкг/кг) маси тіла/добу шляхом одноразової п/ш ін'єкції до нормалізації кількості нейтрофілів (АКН $> 2,0 \times 10^9/\text{л}$)^{БНФ}; підтримання нормальної кількості нейтрофілів - підтримуюча доза 300 мкг/добу 2-3 р/тиждень за альтернативною схемою (через добу), може бути необхідна індивідуальна корекція дози і тривале застосування для підтримання середньої кількості нейтрофілів $> 2 \times 10^9/\text{л}$.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: Р-ції алергічного типу: анафілаксія, шкірний висип, кропив'янка, ангіоєдему, диспное, артеріальну гіпотензія; збільшення концентрацій ЛФ, лактатдегідрогенази, сечової кислоти, головний біль, васкулярні розлади, синдром підвищеної проникності капілярів, кашель, біль у горлі, інфільтрати в легенях, нудота/блювання, запор, анорексія, діарея, мукозит, збільшення концентрацій g-глутамілтрансферази, алопеція, шкірний висип, с-м Світа, шкірний васкуліт, біль у грудях, біль в кістках і м'язах, загострення ревматоїдного артриту, розлади сечовипускання, втома, загальна слабкість, невизначений біль.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливістю до гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора людини або інших компонентів ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,35 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ФІЛСТИМ®	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА" (виробництво, первинне та вторинне пакування, випуск серій), Україна	р-н д/ін'єк. по 1,6мл у шпр. в бл.	0,3 мг/мл	№1	609,98	
	ФІЛСТИМ®	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА" (виробництво, первинне та вторинне пакування, випуск серій), Україна	р-н д/ін'єк., по 1мл у шпр. в бл.	0,3 мг/мл	№1	800,31	
II.	ГРАСТИМ®	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Індія	р-н д/ін'єк., по 1мл у фл. в кор.	0,3 мг/мл	№1	541,33	24,59/\$
	ГРАСТИМ®	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Індія	р-н д/ін'єк., по 1мл у шпр. в кор.	0,3 мг/мл	№1	541,33	26,64/\$
	ЗАРСІО®	Сандоз ГмбХ – Бізнес підрозділ технологічна розробка та виробництво біологічних лікарських засобів Шафтенау (БТДМ ДПС) (відповідальний за виробництво, пакування, контроль серії та випуск серії)/Ай Ді Ті Біологіка ГмбХ (відповідальний за виробництво, пакув, Австрія/Німеччина	р-н д/ін'єк. або інфуз. по 0,5мл у шпр. з голк. в бл.	600 мкг/мл	№1	419,44	26,50/\$
	ЗАРСІО®	Сандоз ГмбХ – Бізнес підрозділ технологічна розробка та виробництво біологічних лікарських засобів Шафтенау (БТДМ ДПС) (відповідальний за	р-н д/ін'єк. або інфуз. по 0,5мл у шпр. з голк. в бл.	600 мкг/мл	№5	640,76	25,60/\$

	виробництво, пакування, контроль серії та випуск серії)/Ай Ді Ті Біологіка ГмБХ (відповідальний за виробництво, пакув, Австрія/Німеччина					
ЗАРСІО®	Сандоз ГмБХ – Бізнес підрозділ технологічна розробка та виробництво біологічних лікарських засобів Шафтенау (БТДМ ДПС) (відповідальний за виробництво, пакування, контроль серії та випуск серії)/Ай Ді Ті Біологіка ГмБХ (відповідальний за виробництво, пакув, Австрія/Німеччина	р-н д/ін'єк. або інфуз. по 0,5мл у шпр. з голк. в бл.	960 мкг/мл	№5	599,18	26,50/\$
ЗАРСІО®	Сандоз ГмБХ – Бізнес підрозділ технологічна розробка та виробництво біологічних лікарських засобів Шафтенау (БТДМ ДПС) (відповідальний за виробництво, пакування, контроль серії та випуск серії)/Ай Ді Ті Біологіка ГмБХ (відповідальний за виробництво, пакув, Австрія/Німеччина	р-н д/ін'єк. або інфуз. по 0,5мл у шпр. з голк. в бл.	960 мкг/мл	№1	599,18	27,46/\$
НІВЕСТИМ	ХОСПІРА ЗАГРЕБ Д.О.О. (випуск серії, виробництво "in bulk", контроль серії у процесі виробництва, тестування випущеної серії, тестування стабільності, тестування стерильності, первинне та вторинне пакування)/SGS Лаб Саймон СА (контроль якості, тестування, Хорватія/Бельгія/Чеська Республіка	р-н д/ін'єк. або інфуз., по 0,2мл, 05мл у шпр. в бл.	120мкг/0,2мл; 300мкг/0,5мл; 480мкг/0,5мл	№1, №5, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ТЕВАГРАСТИМ	Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд. (виробництво за повним циклом; контроль якості)/Тева Фарма Б.В. (дозвіл на випуск серії)/ЗАТ СІКОР Біотех (контроль якості), Ізраїль/Нідерланди/Литва	р-н д/ін'єк. або інфуз. по 0,5мл у скл. шпр. з голк.	300мкг/0,5мл	№1	671,93	26,86/\$
ТЕВАГРАСТИМ	Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд. (виробництво за повним циклом; контроль якості)/Тева Фарма Б.В. (дозвіл на випуск серії)/ЗАТ СІКОР Біотех (контроль якості), Ізраїль/Нідерланди/Литва	р-н д/ін'єк. або інфуз. по 0,8мл у скл. шпр. з голк.	480мкг/0,8мл	№1	629,93	26,86/\$

19.3.2. Інтерферони

Мають протипухлинний ефект при певний видах лімфом та солідних пухлинах

- **Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b) *** ^[ПМД] (див. п. 18.1.2.1.1. розділу "ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: L03AB05 - імуностимулятор.Інтерферон альфа-2b.

Основна фармакотерапевтична дія: протівірусна, імунomodуюча, антипроліферативна дія - зв'язування зі специфічними рецепторами на поверхневій мембрані клітини та ініціювання комплексу послідовних внутрішньоклітинних реакцій, пов'язаних з індукцією ряду ферментів і реалізацією клітинних ф-цій, а саме з

пригніченням реплікації вірусу в інфікованій клітині та зниженням проліферації клітин пухлини, з реалізацією імуномодулюючих процесів, таких як підсилення фагоцитарної активності макрофагів, збільшення специфічної цитотоксичності лімфоцитів до клітин-мішеней.

Показання для застосування ЛЗ: у комплексній терапії при: злоякісній меланомі^{БНФ}, увеальній меланомі, нирковоклітинній карциномі^{БНФ}, поверхнево локалізованому раку сечового міхура, раку яєчника та молочної залози, саркомі Капоші на тлі ВІЛ-інфекції^{БНФ}, хронічному мієлолейкозі, волосатоклітинному лейкозі^{БНФ}, неходжкінських лімфомах, базальноклітинній карциномі, Т-клітинній лімфомі шкіри^{БНФ} (грибоподібному мікозі), папіломатозі гортані.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: папіломатоз гортані: по 3 млн МО/м² п/ш 3 р/тижд.(ч/з день) протягом 6 міс. та більше; дозу коригувати з урахуванням переносимості препарату; злоякісна меланома: на доповнення до хірургічного лікування і для індукції ремісії в/в по 20 млн МО/м² (інфузія 20 хв), 5 р/тижд. протягом 4 тижн.; підтримуюча терапія - п/ш по 10 млн МО/м² 3 р/тижд. (ч/день) протягом 48 тижнів; увеальна меланома: парабульбарно щодня по 1 млн МО 10 днів; повторні 10-денні введення проводяться через 20 днів двічі; загальний курс 48 тижнів; саркома Капоші: наступні схеми лікування: в/м щодня протягом 10 днів по 3 млн МО на ін'єкцію; лікування поєднують з монохіміотерапією проспидином; повторні курси - 1 р/міс. 6 міс.; в/в крапельно 30 хв по 50 млн МО (30 млн. МО/м²) щоденно 5 днів або з інтервалом 1 день, після чого необхідно мінімум 9-денна перерва до початку нового 5-денного курсу; тривалість лікування визначає лікар; хр.мієлоїдна лейкокемія: п/ш по 3 млн МО/м² на добу щоденно або 1 раз на 2 дні, поступово збільшуючи дозу до 5 млн МО/м² на добу щоденно або 1 раз на 2 дні під наглядом лікаря до досягнення повної гематологічної ремісії (кількість лейкоцитів у периферичній крові не більше 10×10⁹/л) або протягом 18 міс., волосатоклітинна лейкокемія: в/м або п/ш по 2-3 млн МО/м² до досягнення ремісії, потім 3 р/тижд.(ч/з день) до 12 міс.; неходжкінські злоякісні лімфоми: в/м по 3 млн МО 3 р/тижд. протягом 12-18 міс. як підтримуюча терапія при досягненні ремісії, отриманої внаслідок застосування хіміотерапії; Т-клітинна лімфома у стадії виразкування: інтрадермальна по 1 – 2 млн МО (розчинених в 0,5 мл води для ін'єкції) 3 р/тиждень протягом 4 тижнів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: Фарингіт, вірусна інфекція, бронхіт, синусит, простий герпес, риніт, бактеріальна інфекція, пневмонія, сепсис; лейкопенія, тромбоцитопенія, лімфаденопатія, лімфопенія, апластична анемія, істинна еритроцитарна аплазія, ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура, тромбоцитарна пурпура; саркоїдоз, загострення саркоїдозу, системний червоний вовчак, васкуліт, ревматоїдний артрит (виникнення або загострення), с-м Фогта - Коянаги - Харада, гострі р-ції підвищеної чутливості, в тому числі кропив'янка, ангіоневротичний набряк, бронхоспазм, анафілактична р-ція; гіпотиреоз, гіпертиреоз, діабет, загострення діабету; анорексія, гіпокальціємія, зневоднення, гіперурикемія, спрага, гіперглікемія, гіпертригліцеридемія, підвищений апетит; депресія, безсоння, страх, емоційна лабільність, збудження, нервозність, сплутаність свідомості, порушення сну, зниження лібідо, суїцидальні думки, суїцид, спроби самогубства, агресивна поведінка (іноді направлена на оточуючих), психоз, в тому числі галюцинаторний, думки про вбивство людини, зміна психічного стану, манія, біполярний розлад; запаморочення, головний біль, порушення концентрації, сухість у роті, тремор, парестезія, гіпестезія, мігрень, припливи, сонливість, порушення смаку, периферична невротія, цереброваскулярний крововилив, цереброваскулярна ішемія, епілептичний напад, синдром порушення свідомості, енцефалопатія, мононевротія, кома; зниження гостроти зору, кон'юнктивіт, патології зору, порушення з боку слізних залоз, біль в очних яблуках; крововилив у сітківку ока, ретинопатія (в тому числі макулярний набряк), обструкція вени чи артерії сітківки, неврит зорового нерва, набряк диска зорового нерва, втрата гостроти зору або полів зору, «ватні» плями на сітківці, серозне відшарування сітківки; запаморочення, шум у вухах, погіршення або втрата слуху; серцебиття, тахікардія, перикардит, кардіоміопатія, ІМ, серцева ішемія, застійна СН, перикардіальний випіт, аритмія; АГ, периферична ішемія, гіпотензія, задишка, кашель, носова кровотеча, респіраторні порушення, закладеність носа, ринорея, сухий непродуктивний кашель, легенева інфільтрація, пневмонія, фіброз легень, легенева АГ; нудота/блювання, абдомінальний біль, діарея, стоматит, диспепсія, виразковий стоматит, біль у правому верхньому квадранті живота, глосит, гінгівіт, запор, діарея, панкреатит, ішемічний коліт, виразковий коліт, кровоточивість ясен, періодонтальні, дентальні порушення, пігментація язика; гепатомегалія, гепатотоксичність (в тому числі з летальним наслідком); алопеція, свербіж, сухість шкіри, висип, підвищене потовиділення, псоріаз (поява або загострення), макулопапульозний висип, еритематозний висип, екзема, еритема, захворювання шкіри, с-м Стівенса - Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, мультиформна еритема; міалгія, артралгія, м'язово-скелетний біль, артрит, рабдоміоліз, міозит, судоми м'язів ніг, біль у спині; часті сечовипускання, НН, нефротичний синдром; аменорея, біль у молочних залозах, дисменорея, менорагія, порушення менструального циклу, вагінальні розлади; запалення у місці введення, АР у місці введення, втома, озноб, лихоманка, грипозні симптоми, астенія, роздратованість, біль у грудях, нездужання, біль/некроз у місці введення, набряк обличчя, зниження маси тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату; тяжкі СС захворювання (неконтрольована застійна серцева недостатність, нещодавно перенесений ІМ, тяжкі форми аритмії); псоріаз; виражені порушення ф-ції печінки та/або нирок, включаючи метастази; епілепсія та інші захворювання ЦНС (у т. ч. функціональні); хронічний гепатит на тлі прогресуючого або декомпенсованого цирозу печінки; хронічний гепатит у хворих, які отримують або нещодавно отримали терапію імунодепресантами; аутоімунний гепатит або інші аутоімунні захворювання в анамнезі; наявність у пацієнта дисфункції щитовидної залози; наявність тяжких вісцеральних порушень у пацієнтів з саркомою Капоші; комбінована терапія з телбівудином; пригнічення мієлоїдного ростка кровотворення; комбінована терапія з рибавірином.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 2 млн ОД.

Торговельна назва:

Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.

I.	АЛЬФАРЕКІН®	ТОВ "Науково-виробнича компанія "Інтерфармбіотек", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в касет. з розч. та без	1млн.МО; 3млн.МО; 5млн.МО; 9млн.МО; 18млн.МО	№1, №5, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АЛЬФАРЕКІН®	ТОВ "Науково-виробнича компанія "Інтерфармбіотек", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в касеті	1млн.МО	№10	170,26	
	АЛЬФАРЕКІН®	ТОВ "Науково-виробнича компанія "Інтерфармбіотек", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в касеті	3млн.МО	№10	122,09	
	АЛЬФАРЕКІН®	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (пакування з форми "in bulk" фірми-виробника ТОВ "Науково-виробнича компанія "Інтерфармбіотек", Україна)/ПАТ "Галичфарм" (виробник розчинника), Україна/Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. у касеті з розч. та без	1млн.МО	№1, №5, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	Альфарекін®/Alphaekin® Інтерферон альфа-2b рекомбінантний людини	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (фасування з форми "in bulk" фірми-виробника ТОВ "Науково-виробнича компанія "Інтерфармбіотек", Україна), Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. та без	3млн.МО; 5млн.МО; 9млн.МО; 18млн.МО	№1, №5, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	Альфарекін®/Alphaekin® Інтерферон альфа-2b рекомбінантний людини	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (фасування з форми "in bulk" фірми-виробника ТОВ "Науково-виробнича компанія "Інтерфармбіотек", Україна), Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	3млн.МО	№10	123,31	
	ЛАФЕРОБІОН®	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. та амп. в бл. з розч. та без	1000000МО; 3000000МО; 6000000МО; 18000000МО	№5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛАФЕРОБІОН®	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в бл.	1000000 МО	№5x2	69,64	
	ЛАФЕРОБІОН®	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в бл.	3000000 МО	№5x2	51,07	
	ЛАФЕРОН-ФАРМБІОТЕК®	ТОВ "Науково-виробнича компанія "Інтерфармбіотек", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. та без	1млн.МО; 3млн.МО; 5млн.МО; 6млн.МО; 9млн.МО; 18млн.МО	№1, №5, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЛАФЕРОН-ФАРМБІОТЕК®	ТОВ "Науково-виробнича компанія "Інтерфармбіотек", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в кор.	1млн.МО	№10	46,27	
ЛАФЕРОН-ФАРМБІОТЕК®	ТОВ "Науково-виробнича компанія "Інтерфармбіотек", Україна	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з амп. розч.	3млн.МО	№10	31,46		
II.	БІОФЕРОН	Біосідус С.А., Республіка Аргентина	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	3млн.МО	№1	242,94	
	БІОФЕРОН	Біосідус С.А., Республіка Аргентина	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	5млн.МО	№1	199,84	

19.3.3. Глюкокортикостероїди

- **Дексаметазон (Dexamethasone) *** (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: паліативне лікування ^{вооз бнф} лейкемії та лімфоми у дорослих; г. лейкемія у дітей; гіперкальціємія при злоякісних захворюваннях; набряк ^{бнф} головного мозку внаслідок первинної або метастатичної пухлини головного мозку.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н д/ін'єк. призначають дорослим та дітям від народження; р-н д/ін'єк. призначають в/в (за допомогою ін'єкції або інфузії з р-м глюкози або р-м натрію хлориду) та в/м; дозу визначати індивідуально відповідно до захворювання конкретного пацієнта, передбаченого періоду лікування, переносимості кортикоїдів і реакції організму; рекомендована середня початкова добова доза для в/в чи в/м введення 0,5-9 мг/добу, при необхідності дозу можна збільшити; початкові дози застосовують до появи клінічної реакції, а потім дозу поступово зменшують до найнижчої клінічно ефективної дози; дози для дітей - рекомендовані дози від 0,02-0,3 мг/кг/добу за 3-4 ін'єкції (0,6-9 мг/м² площі поверхні тіла/добу), рекомендована доза для р/ос застосування при замісній терапії: 0,02 мг/кг маси тіла або 0,67 мг/м² площі поверхні тіла на добу за 3 прийоми.

- **Преднізолон (Prednisolone) *** (див. п. 7.4.1. розділу "ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: г. гемолітична анемія, лімфогранулематоз^{ВООЗ}, гранулоцитопенія, тромбоцитопенічна пурпура^{БНФ}, панмієлопатія, агранулоцитоз, вроджена еритроїдна гіопластична анемія, г. лімфо^{ВООЗ БНФ} - і мієлоїдний лейкоз^{ВООЗ}, мієломна хвороба^{ВООЗ}, різні форми лейкомії^{ВООЗ БНФ}; рак легень^{ВООЗ} (у комбінації з цитостатиками), гіперкальціємія на тлі онкологічних захворювань, для профілактики та усунення нудоти, блювання при цитостатичній терапії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі - при г. станах і в якості замісної терапії ЛЗ призначати у дозі 20-30 мг/добу р/ос з поступовим переходом на підтримуючу добову дозу в 5-10 мг, при необхідності початкова доза може становити 15-100 мг/добу, а підтримуюча доза - 5-15 мг/добу; діти - початкова доза ЛЗ 1-2 мг/кг/добу і розподіляється на 4-6 прийомів, а підтримуюча доза - 300-600 мкг/кг/добу; для лікування дорослих добова доза - 4-60 мг в/в або в/м; діти - в/м (глибоко в сідничний м'яз) суворо за показаннями і під контролем лікаря: дітям віком від 6-12 років - 25 мг/добу, віком від 12 років - 25-50 мг/добу, тривалість застосування та кількість введень препарату визначається індивідуально. Лікування припиняти повільно, поступово знижуючи дозу.

19.3.4. Вакцини, що застосовуються для профілактики і лікування злоякісних новоутворень

- **БЦЖ-вакцина (BCG vaccine) ***

Фармакотерапевтична група: L03AX03 - інші імуностимулятори.

Основна фармакотерапевтична дія: неспецифічний чинник активації клітинної ланки імунітету, застосовують при лікуванні неінвазивних форм раку сечового міхура (T_a - неінвазивна папілярна карцинома, T_{is} - карцинома *in situ*, плоскопухлинна, T₁ - пухлина з поширенням на субепітеліальну пластину), для профілактики рецидивів неінвазивної форми раку сечового міхура після оперативного видалення пухлини; збільшує кількість гранулоцитів, моноцитів/макрофагів, Т-лімфоцитів, продукцію цитокінів TNF-α, INF-γ та інтерлейкінів; стимулює виникнення запального процесу в стінці сечового міхура, який захищає організм від розвитку захворювання, а також стимулює імунну систему пацієнта.

Показання для застосування ЛЗ: лікування епітеліальних, неінвазивних форм раку сечового міхура та для профілактики рецидивів після оперативного втручання епітеліального раку, обмеженого виключно слизовою оболонкою (неінвазивна папілярна карцинома (T_a); епітеліального раку, локалізованого у власній пластині слизової оболонки (не м'язовій) сечового міхура (T₁); раку *in situ* (карцинома *in situ*, плоскопухлинна) (T_{is}).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вмісту 1 фл. достатньо дорослому для однієї інстиляції у сечовий міхур; за стандартною схемою лікування препарат інсталюють 1 р/тижд. протягом 6 тижн. поспіль як індукційна терапія; у випадку виявлення рецидиву пухлини поновити шеститижневий курс; після чотиритижневої перерви рекомендується проведення підтримуючого курсу, для підтримуючої терапії інстилювати 1 дозу препарату 1 р/тижд. протягом 3 тижнів через 3, 6, 12, 18, 24, 30 і 36 міс., розпочинаючи з першого дня лікування, повний 3-річний цикл лікування (індукційний курс + підтримуючий курс) становить загалом 27 інстиляцій у сечовий міхур; профілактика рецидивів: в/міхурову інстиляцію виконувати не раніше 14 діб після взяття біоптату з пухлини або слизової оболонки сечового міхура, трансуретральної електрорезекції пухлини (ТУР) або після травматичної катетеризації, оскільки у разі наявності травми, коли палички БЦЖ потрапляють у кров, можуть розвинутися ускладнення - розвиток міліарного туберкульозу, навіть сепсис; препарат вводиться до сечового міхура за допомогою уретрального катетера, лубриканти, що полегшують введення катетера через уретру в сечовий міхур, не повинні містити туберкулостатиків, перед призначенням пацієнтові курсу в/міхурових інстиляцій БЦЖ виконати пробу Манту (РТ, РPD) з метою перевірки рівня імунологічної відповіді організму пацієнта, коли шкірна реакція є надто сильною або перевищує 1 см у діаметрі відмовитися від запланованої імунотерапії; після завершення 6-тижневого курсу знову зробити пробу Манту з метою оцінки впливу лікування на загальну імунологічну реактивність.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота; біль у животі, діарея; блювання, кишкова фістула, перитоніт, диспепсія, метеоризм, запалення сліпої кишки, туберкульоз привушної слинної залози, туберкульоз печінки, туберкульоз сліпої кишки, черевний абсцес сліпої кишки, цистит, запалення (гранулематоз) сечового міхура, гематурія, часте сечовипускання з почуттям дискомфорту та болю, дизурія; подразнення сечового міхура, імперативні позиви до сечовипускання, нетримання сечі, патологічні результати аналізу сечі; інфекції сечовивідної системи, контрактура сечового міхура, затримка сечі, непрохідність сечовивідних шляхів, піурія (лейкоцитурія); ниркові абсцеси; ГНН, запалення нирок, туберкульоз нирок, туберкульоз сечового міхура, міхурово-сечовивідний рефлюкс, ніктурія, безсимптомний гранулематозний простатит; запалення придатків яєчок (епідидиміт), запалення яєчок (орхіт); симптоматичний гранулематозний простатит; запалення та абсцес яєчок і придатків яєчок, що не реагує на лікування протисухотними препаратами, запалення шкіри голівки статевого члена і внутрішнього листка крайньої плоті, простатит, дисфункція ерекції, дискомфорт у дільниці зовнішніх жіночих статевих органів; t° < 38,5 °C, слабкість, грипоподібні симптоми (нездужання, гарячка, пропасниця), загальний дискомфорт; тремтіння, стійке підвищення t° > 38,5 °C; зниження АТ; біль у грудній клітці, периферичний набряк, гранулематоз (спостерігається у різних органах: аорта, придаток яєчка, ШКТ, нирки, печінка, лімфовузли, черевна порожнина, передміхурова залоза, селезінка, кістки), поліорганна недостатність, септичний шок, м'язовий біль; артрити, болі у суглобах; запалення кісткового мозку, інфекція кісткового мозку,

абсцеси великого поперекового м'язу, артропатія, кістково-суглобні інфекції, мієлосупресія, запалення хребта, туберкульоз хребта, біль у спині, інфікування паличками БЦЖ; БЦЖ-сепсис; інфекція паличками БЦЖ імплантантів та навколишніх тканин (напр., інфекція протезу аорти, кардіостимулятора, протезу стегна або коліна), інфекція післяопераційної рани, вовчанка, анемія, цитопенія, зниження кількості тромбоцитів; генералізоване збільшення лімфовузлів, запалення шийних лімфовузлів; запалення регіонарних лімфовузлів, кріоглобулінемія, хвороба Рейтера (кон'юнктивіт, асиметричний артрит дрібних суглобів); реакція гіперчутливості, хвороба Мікуліча, пневмонія, спричинена паличками БЦЖ, гранулематоз легень; кашель; бронхіт, задишка, нежить, запалення горла, обширне пошкодження альвеол, гнійний плеврит; гепатит; висипання, абсцеси, дерматози; облісіння, надмірне потовідділення, інфекція судин, фістули у судинах, мікотична аневризма, геморагічний васкуліт (хвороба Шенлейна-Геноха), кардіотоксичність, запалення судинної оболонки та сітківки, запалення роговиці, кон'юнктивіт, запалення судинної оболонки яблука ока, запаморочення, гіпестезія, парестезія, сонливість, головний біль, гіпертонія, невралгія, астенія, анорексія, підвищена концентрація печінкових ензимів; рівень специфічного антигену передміхурової залози (ПСА), втрата маси тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: протипоказана наступним особам: з АР на діючі або допоміжні речовини; із вродженим або набутим дефектом імунної системи; що проходять лікування імуносупресантами (наприклад, цитостатиками чи опроміненням та кортикостероїдами); із сухотами в активній формі або іншим захворюванням, що вимагає лікування туберкулозостатиками; із маніфестною інфекцією сечовивідних шляхів, поки не буде отримано стерильного посіву сечі; вагітним жінкам, жінкам з підозрою на вагітність або в період годування груддю; дітям

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ОНКО БЦЖ 100 / ONKO BCG® 100 ПРЕПАРАТ ДЛЯ ІМУНОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА РАК СЕЧОВОГО МІХУРА	"БІОМЕД-ЛЮБЛІН" Витвурня Суровіч і Щейонек Спупка Акційна/ПОЛЬФАРМА С.А. Фармасьютікал Воркс (виробник розчинника), Польща/Польща	пор. д/приг. сусп. д/введ. у сечов. міхур в амп. або фл. з розч.	100мг	№1, №5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ОНКО БЦЖ 50 / ONKO BCG® 50 ПРЕПАРАТ ДЛЯ ІМУНОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА РАК СЕЧОВОГО МІХУРА	"БІОМЕД-ЛЮБЛІН" Витвурня Суровіч і Щейонек Спупка Акційна/ПОЛЬФАРМА С.А. Фармасьютікал Воркс (виробник розчинника), Польща/Польща	пор. д/приг. сусп. д/введ. у сечов. міхур в амп. або фл. з розч.	50мг	№1, №5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

19.4. Інші імуносупресанти

• **Талідомід (Thalidomide)**

Фармакотерапевтична група: L04AX02 - імуносупресанти.

Основна фармакотерапевтична дія: інгібує фактор росту ендотелію судин (VEGF) і β-фібробластів; у пацієнтів з множинною мієломою чинить імуномодулюючу, протизапальну дію та потенційно непластичний ефект; механізм дії пов'язаний з пригніченням ангіогенезу та утворенням фактора некрозу пухлин (TNF-α), зниженням модуляції адгезивних молекул поверхні окремих клітин (ICAM-1, VCAM-1 і E-селектину), втягнених у міграцію лейкоцитів, стимуляція первинних Т-клітин (спричиняючи розповсюдження, синтез цитокінів і цитотоксичність) і відхилення у співвідношенні від допоміжних Т-клітин до цитотоксичних Т-клітин, інгібує виробництво інтерлейкіну 12, дія також пов'язана з підвищенням рівня інтерлейкіну-2 і γ-інтерферону, зниження фагоцитозу поліморфноядерних лейкоцитів.

Показання для застосування ЛЗ: множинна мієлома у разі неефективності стандартної терапії ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р/ос перед сном ^{БНФ}, враховуючи седативний ефект ЛЗ; у дорослих початкова доза 200 мг/добу ^{БНФ} з підвищенням дози на 100 мг кожний тижд. до максим. добової дози 800 мг з урахуванням переносимості та токсичності; однак через токсичність у середньому доза зазвичай залишається нижче 400 мг/добу, залежно від переносимості, токсичності та ефективності можна застосовувати нижчі підтримуючі дози (25-100 мг/добу) ^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: бронхіт, грибоквий дерматит, інфекції, кандидоз ротової порожнини, фарингіт, риніт, синусит; с-м лізису пухлини; анемія, еозінофілія, гемолітичний уремичний с-м, лейкопенія, лімфаденопатія, нейтропенія, тромбоцитопенія, тромботична мікроангіопатія; р-ції гіперчутливості; гіпотиреоз; анорексія, гіперглікемія, гіперліпідемія, гіпоглікемія, затримка рідини, підвищений апетит; збудження, сплутаність свідомості, депресія, зменшення лібідо, безсоння, зміни настрою, нервозність; парестезія, головний біль, тремор, сонливість, запаморочення, епілепсія, гіперестезія, зап'ястковий сухожильний с-м, порушення координації руху, млявість, відсутність координації, нейропатія, оніміння у ногах, седативний ефект, пароксизм, непритомність, дизестезія, цереброваскулярні події; світлобоязнь, зниження зору, втрата зору; зниження слуху, глухота, шум у вухах, вертиго; брадикардія, тахікардія, аритмії, венозний тромбоз, ортостатична гіпотензія, тромбоемболічні ускладнення, артеріальний тромбоз, стенокардія, фібриляція шлуночків, СС розлади, хр. СН, ІМ, відчуття серцебиття, перикардит, плевроперикардит, тромбоз глибоких вен, фібриляція передсердь; бронхоспазм, задишка, закладеність носа, емболія легеневої артерії, порушення дихання, пневмонія, інтерстиціальне захворювання легень, бронхопневмопатія; біль у животі, запор, діарея, сухість у роті, метеоризм, кишкова непрохідність, нудота, гіпертрофія навколоушної залози, блювання, зубний біль, сухість у роті,

шлунково-кишкова перфорація, префорація дивертикулів, перитоніт; акне, алопеція, сухість шкіри, еритема, екзантема, ексфолювативний дерматит, ураження нігтів, лихеноїдні зміни у роті, свербіж, висипання, бульозні шкірні реакції, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, фотосенсибілізація, підвищена пітливість, набряк шкіри, г. генералізований екзентематозний пустульоз, кропив'янка, гіперемія, уртикарія; асептичний некроз, біль у спині, біль у кістках, судоми ніг, м'язова слабкість, міалгія, біль у шиї, ригідність м'язів шиї; альбумінурія, гематурія, ниркова недостатність, минуща олігурія, нетримання сечі; імпотенція, зниження ф-ції яєчників, порушення менструального циклу, вторинна аменорея; тератогенність (вроджені дефекти, фокомелія); тромботична тромбоцитопенічна пурпура, лімфопенія, панцитопенія; астенія, біль у ділянці грудей, озноб, набряк нижніх кінцівок, набряк обличчя, втомлюваність, гарячка, нездужання, біль, периферичні набряки, тахіфілаксії, слабкість; бактеріальний менінгіт; хибнопозитивний тест ф-ції печінки, підвищення активності печінкових ферментів, підвищення рівня аспарататамінотрансферази, збільшення маси тіла, підвищення рівня амілази в крові, підвищення рівня тригліцеридів, збільшення концентрації вірусу імунодефіциту в крові, відхилення від норми показників ф-ції печінки.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до компонентів препарату, виражена нейтропенія (вміст нейтрофілів < 0,75×10⁹/л), наявність в анамнезі токсичного епідермального некролізу (ТЕН), с-му Стівенса-Джонсона, ексфолювативного дерматиту; протипоказаний жінкам репродуктивного віку, які не застосовують або нездатні застосовувати адекватні протизаплідні засоби, а також жінкам репродуктивного віку, у яких можливе лікування менш токсичними препаратами; протипоказаний чоловікам, які не застосовують адекватні протизаплідні засоби (латексний презерватив).

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	МІРИН 100	Ліпомед АГ, Швейцарія	табл., в/о у бл.	100мг	№10x3	відсутня у реєстрі OBLЦ	
	МІРИН 50	Ліпомед АГ, Швейцарія	табл., в/о у бл.	50мг	№10x3	відсутня у реєстрі OBLЦ	

19.5. Засоби супроводу, що застосовуються в онкології

- **Епоетин альфа (Epoetin alfa) ***

Фармакотерапевтична група: В03ХА01 - засоби, що впливають на систему крові і гемопоез; антианемічні препарати; інші антианемічні препарати; еритропоетин.

Основна фармакотерапевтична дія: глікопротеїновий гормон, що продукується нирками у відповідь на гіпоксію та відіграє ключову роль у процесі вироблення еритроцитів; бере участь у всіх етапах еритропоезу, головним чином впливаючи на дозрівання еритроїдних клітин у еритроцити; після зв'язування еритропоетину з рецептором на поверхні клітини відбувається активація сигнальної трансдукції, що запобігає апоптозу та стимулює проліферацію еритроїдних клітин; складається із послідовності 165 амінокислот аналогічно еритропоетину людини; функціональні властивості цих епоетинів не відрізняються; молекулярна маса епоетину альфа становить 32000 -40000 дальтон; є фактором росту, який переважним чином стимулює продукування еритроцитів.

Показання для застосування ЛЗ: Лікування анемії та зниження об'єму необхідних гемотрансфузій у дорослих пацієнтів, які отримують хіміотерапію з причини немієломої пухлини, злоякісної лімфоми або множинної мієломи та у яких підвищений ризик трансфузії^{БНФ}, оцінений за загальним станом пацієнта (у т.ч. СС стан, існуюча анемія до початку хіміотерапії); для збільшення кількості аутологічної крові у межах предепозитної програми перед значними хірургічними втручаннями^{БНФ}; лікування застосовують лише пацієнтам із помірними проявами анемії (рівень гемоглобіну 10-13 г/дл (6,2-8,1 ммоль/л), відсутність залізодефіциту), якщо збирання аутологічної крові неможливе або недостатнє, або якщо очікувана потреба у крові для переливання є дуже високою (4 або більше доз крові для жінок та 5 або більше - для чоловіків); дорослим пацієнтам із легким та середнім ступенем анемії (гемоглобін у межах 10-13 г/дл при відсутності залізодефіциту) перед проведенням обширних ортопедичних операцій з очікуваним середнім ступенем втрати крові (900 -1800 мл крові) для зменшення потреби в алогених гемотрансфузіях та полегшення відновлення системи еритропоезу^{БНФ}. Лікування симптоматичної анемії, пов'язаної з хронічною нирковою недостатністю на гемодіалізі та на перитонеальному діалізі^{БНФ}. Лікування тяжкої анемії ниркового походження, що супроводжується клінічними симптомами, у дорослих пацієнтів із нирковою недостатністю, які ще не проходили гемодіалізу^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати п/ш (у кінцівки або у передню стінку живота, максимальний об'єм п/ш введення в одну ділянку - 1 мл; за необхідності застосування більших об'ємів - у кілька ділянок), в/в (тривалість введення 1-5 хв залежно від дози препарату, не можна застосовувати у вигляді в/в інфузій або змішувати з іншими ЛЗ; пацієнтам, які перебувають на ГД, болюсну ін'єкцію можна ввести прямо під час процедури через придатний для цього венозний порт у лінії діалізу або після закінчення процедури ГД через фістулу катетера з наступним введенням 10 мл ізотонічного натрію хлориду для промивання системи та належного розподілу препарату у кровообігу); пацієнтам з анемією, викликану хіміотерапією: п/ш, Нб слід контролювати шляхом підбору дози, беручи до уваги, що його рівень має перебувати в межах від 10 г/дл (6,2 ммоль/л) до 12 г/дл (7,5 ммоль/л), постійного рівня гемоглобіну вище 12 г/дл (7,5 ммоль/л) слід уникати, терапію продовжувати протягом одного місяця після припинення хіміотерапії відповідно до рекомендованої схеми; початкова доза для лікування анемії у даної групи пацієнтів становить 150 ОД/кг 3 р/тиждень, як альтернатива - 450 ОД/кг п/ш 1 р/тиждень; дорослим при участі у програмі відбору аутологічної крові перед хірургічними операціями: в/в після закінчення кожної процедури відбору крові; при середньому ступеню анемії (рівень гематокриту 33-39 %), коли потрібно ≥ 4 одиниць крові, необхідно проводити лікування епоетином альфа у дозі 600 ОД/кг 2 р/тиждень протягом 3 тижнів до хірургічного втручання; дорослим, які підлягають елективній

ортопедичній хірургії: п/ш 600 ОД/кг 1р/тиждень протягом 3 тижнів, які передують операції (21-й, 14-й та 7-й день перед операцією), та у день операції; у разі, коли за медичними показаннями необхідно скоротити передопераційний період менше ніж до 3-х тижнів, призначати щоденно у дозі 300 ОД/кг протягом 10 послідовних днів до операції, у день операції та протягом 4 днів після операції, якщо при проведенні гематологічних аналізів передопераційного періоду Нb досягає 15 г/дл або вище, застосування ЛЗ повністю припинити; рекомендовано адекватне забезпечення залізом (200 мг на добу перорально) протягом усього курсу терапії, призначення препаратів заліза слід розпочинати якомога раніше, навіть за кілька тижнів до початку програми відбору аутологічної крові.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тромбоцитемія, антитілозалежна істинна еритроцитарна аплазія, тромбоцитемія, анафілактичні р-ції, р-ції гіперчутливості, головний біль, судоми, головний біль, крововиливи у мозок, цереброваскулярний інсульт, гіпертензивна енцефалопатія, транзиторна ішемічна атака, ретинальний тромбоз, ІМ, глибокий тромбоз вен, АГ, глибокий тромбоз вен, артеріальний тромбоз, гіпертензивний криз, емболія легень, нудота, діарея, висип, ангіоневротичний набряк, кропив'янка, артралгія, міалгія, гостра порфірія, пірексія, озноб, грипоподібний стан, гарячка, відсутність відповіді на лікування, периферичні набряки, наявність антитіл до еритропоєтину, тромбоз шунта, включаючи обладнання для діалізу.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату, розвиток істинної еритроцитарної аплазії (PRCA) внаслідок лікування будь-яким еритропоєтином, неконтрольована гіпертензія, протипоказання, пов'язані з програмою відбору аутологічної крові серед пацієнтів, які лікуються епоєтином альфа, тяжкі коронарні, периферійно-артеріальні, каротинні або церебрально-судинні захворювання, а також нещодавно перенесений ІМ або інсульт у пацієнтів, які підлягають великому плановому ортопедичному хірургічному втручанню, але не брали участі у програмі відбору аутологічної крові, неможливість застосування адекватної антитромботичної профілактики хірургічним пацієнтам.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 1 тис ОД.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕПОБІОКРИН	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	р-н д/ін'ек. в амп. в бл.	1000МО, 2000МО, 4000МО, 10000МО	№5х1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕПОБІОКРИН	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	р-н д/ін'ек. у шпр. в бл.	1000 МО	№5х1	166,23	
	ЕПОБІОКРИН	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	р-н д/ін'ек. у шпр. в бл.	2000 МО	№5х1	96,60	
	ЕПОБІОКРИН	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	р-н д/ін'ек. у шпр. в бл.	4000 МО	№5х1	92,65	
	ЕПОБІОКРИН	ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна	р-н д/ін'ек. у шпр. в бл.	10000 МО	№5х1	77,84	
II.	БІНОКРИТ®	Сандоз ГмбХ - БП Шафтенау (відповідальний за випуск серії)/Ай Ді Ті Біологіка ГмбХ (відповідальний за виробництво, пакування, контроль серії), Австрія/Німеччина	р-н д/ін'ек., по 0,5мл; 0,6мл; 0,75мл; 0,8мл; 1мл у шпр. з голк. в конт. бл/уп.	16,8мкг/мл; 84мкг/мл; 336мкг/мл	№1х1, №3х2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	БІНОКРИТ®	Сандоз ГмбХ - БП Шафтенау (відповідальний за випуск серії)/Ай Ді Ті Біологіка ГмбХ (відповідальний за виробництво, пакування, контроль серії), Австрія/Німеччина	р-н д/ін'ек., по 0,4мл у шпр. з голк. в конт. бл./уп.	84мкг/мл (4000МО)	№3х2	228,26	26,91/\$
	БІНОКРИТ®	Сандоз ГмбХ - БП Шафтенау (відповідальний за випуск серії)/Ай Ді Ті Біологіка ГмбХ (відповідальний за виробництво, пакування, контроль серії), Австрія/Німеччина	р-н д/ін'ек., по 1мл у шпр. з голк. в конт. бл/уп.	16,8мкг/мл (2000МО)	№3х2	228,26	26,64/\$
	БІНОКРИТ®	Сандоз ГмбХ - БП Шафтенау (відповідальний за випуск серії)/Ай Ді Ті Біологіка ГмбХ	р-н д/ін'ек., по 0,5мл, 0,75мл, 1мл у шпр. з голк. в	336мкг/мл (4000МО)	№1х1	150,74	26,91/\$

	(відповідальний за виробництво, пакування, контроль серії), Австрія/Німеччина	конт. бл/уп.				
ГЕМАКС	БІОСІДУС С.А. (виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування; контроль якості, випуск серії)/Норфачем (вторинне пакування), Республіка Аргентина/Литва	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	1000 МО	№1	195,17	27,14/\$
ГЕМАКС	БІОСІДУС С.А. (виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування; контроль якості, випуск серії)/Норфачем (вторинне пакування), Республіка Аргентина/Литва	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	2000 МО	№1	117,27	27,14/\$
ГЕМАКС	БІОСІДУС С.А. (виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування; контроль якості, випуск серії)/Норфачем (вторинне пакування), Республіка Аргентина/Литва	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	3000 МО	№1	105,68	27,14/\$
ГЕМАКС	БІОСІДУС С.А. (виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування; контроль якості, випуск серії)/Норфачем (вторинне пакування), Республіка Аргентина/Литва	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	4000 МО	№1	107,08	27,14/\$
ГЕМАКС	БІОСІДУС С.А. (виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування; контроль якості, випуск серії)/Норфачем (вторинне пакування), Республіка Аргентина/Литва	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	10000 МО	№1	118,38	27,14/\$
ГЕМАКС	БІОСІДУС С.А. (виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування; контроль якості, випуск серії)/Норфачем (вторинне пакування), Республіка Аргентина/Литва	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	20000 МО	№1	86,86	27,14/\$
ГЕМАКС	БІОСІДУС С.А. (виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування; контроль якості, випуск серії)/Норфачем (вторинне пакування), Республіка Аргентина/Литва	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл.	40000 МО	№1	74,32	27,14/\$
ЕМАВЕЙЛ	Шеньян Саншайн	р-н д/ін'єк., по	2000 МО/мл	№1	160,00	

	Фармасьютікал Ко., Лтд., Китай	1мл у шпр.				
ЕМАВЕЙЛ	Шеньян Саншайн Фармасьютікал Ко., Лтд., Китай	р-н д/ін'єк., по 1мл у шпр.	3000 МО/мл	№1	160,00	24,62/\$
ЕМАВЕЙЛ	Шеньян Саншайн Фармасьютікал Ко., Лтд., Китай	р-н д/ін'єк., по 1мл у шпр.	4000 МО/мл	№1	160,00	
ЕМАВЕЙЛ	Шеньян Саншайн Фармасьютікал Ко., Лтд., Китай	р-н д/ін'єк., по 1мл у шпр.	1000 МО/мл	№1	118,50	
ЕПРЕКС	Сілаг АГ, Швейцарія	р-н д/ін'єк. по 0,5мл, 1мл у шпр. з голк. та захсн. прист. Protec TM	2000ОД/0,5мл; 40000ОД/0,5мл	№6		відсутня у реєстрі ОБЦ

● **Епоетин бета (Epoetin beta)**

Фармакотерапевтична група: В03ХА01 - антианемічні препарати.

Основна фармакотерапевтична дія: глікопротеїд, фактор стимуляції мітозу і гормон диференціювання, сприяє утворенню еритроцитів із клітин-попередників; отриманий методом генної інженерії, за своїм амінокислотним і вуглеводним складом ідентичний еритропоетину, виділеному із сечі хворих на анемію; після в/в і п/ш введення збільшує кількість еритроцитів, ретикулоцитів і Hb, а також швидкість включення ⁵⁹Fe у клітини, специфічно стимулює еритропоєз, не впливаючи на лейкопоєз; фактор росту, що первинно стимулює продукцію еритроцитів; рецептори до еритропоетину можуть бути експресовані також на поверхні різних пухлин.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматична анемія у хворих із хр. НН у дорослих і дітей; профілактика анемії у недоношених новонароджених, які народилися з масою тіла 750-1500 г до 34-го тижня вагітності; симптоматична анемія у пацієнтів із немієлоїдними злоякісними пухлинами, які отримують хіміотерапію; збільшення об'єму аутологічної крові, призначеної для подальшої аутогемотрансфузії^{БНФ}; необхідно взяти до уваги зареєстрований ризик виникнення тромбоемболічних явищ; застосування згідно з цим показанням показане лише пацієнтам з анемією середнього ступеня тяжкості (Hb 100-130 г/л (6,21-8,07 ммоль/л) без дефіциту заліза), якщо процедури консервування крові відсутні або недостатні, а планове крупне елективне хірургічне втручання може потребувати більшого об'єму крові (≥4 одиниць для жінок або ≥5 одиниць для чоловіків).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: анемія у пацієнтів із хр. НН^{БНФ}: провести індивідуальну оцінку клінічного клінічного перебігу захворювання та загального стану пацієнта; застосовують в/в або п/ш до досягнення рівня Hb не >120 г/л (7,5 ммоль/л); при в/в введенні препарат вводять 2 хв., хворим, які перебувають на ГД - ч/з артеріовенозний шунт у кінці сеансу діалізу; уникати підвищення Hb більш ніж на 20 г/л (1,25 ммоль/л) за 4 тижні; при підвищенні рівня Hb більш ніж на 20 г/л (1,25 ммоль/л) за 4 тижн. дозу зменшують, якщо швидкість приросту рівня Hb перевищує 20 г/л (1,25 ммоль/л) за 1 міс. або якщо рівень Hb збільшується і досягає 120 г/л (7,45 ммоль/л), дозу зменшити на 25 %; якщо рівень Hb продовжує зростати - лікування припиняють до тих пір, поки рівень Hb не зменшиться, потім продовжують лікування у дозі меншій на 25 % від попередньої дози; лікування проводять в 2 етапи: перший а) при п/ш введенні - початкова доза - 20 МО/кг 3 р/тижд., при необхідності дозу збільшують поетапно (не частіше 1 р. протягом 4 тижн.) на 20 МО/кг 3 р/тижд.; б) при в/в введенні - спочатку - 40 МО/кг 3 р/тижд., ч/з 4 тижня. дозу можна збільшити до 80 МО/кг 3 р/тижд., при необхідності дозу збільшувати на 20 МО/кг 3 р/тижд. з місячним інтервалом; незалежно від методу введення, максимальна доза не вище 720 МО/кг/тижд.^{БНФ}; другий - для підтримки цільового показника Hb (100-120 г/л) дозу спочатку зменшити вдвічі від попередньої, згодом підтримуючу дозу коригують індивідуально, застосовують з інтервалом в 1 або 2 тижн.; а) при п/ш введенні - тижневу дозу вводять у вигляді однієї ін'єк. на тижд. або розподіляють цю дозу на 3 або 7 введень на тижд.; при стабілізації стану на фоні одноразового введення на тижд. можна перейти на одноразове введення з двотижневим інтервалом, у цьому випадку може бути потрібне підвищення дози; для дітей доза залежить від віку, чим менший вік дитини, тим більш вищі дози потрібні; лікування довготривале; профілактика анемії у недоношених новонароджених: п/ш, у дозі 250 МО/кг 3 р/тижд.; лікування розпочинають якомога раніше з 3-го дня життя, тривалість курсу - 6 тижнів^{БНФ}; лікування симптоматичної анемії, індукованої хіміотерапією, у хворих з онкологічними захворюваннями: п/ш, пацієнтам з анемією (Hb ≤100 г/л (6,2 ммоль/л)); початкова доза - 30 000 МО/тиждень (450 МО/кг/тижд.), одноразово або тижневу дозу можна розподіляти на 3 або 7 введень^{БНФ}; цільовий діапазон Hb - 100-120 г/л (6,2-7,5 ммоль/л); уникати стійкого підвищення рівня Hb - > 120 г/л (7,5 ммоль/л); при підвищенні Hb на 10 г/л (0,62 ммоль/л) ч/з 4 тижн. - терапію продовжити в тій же дозі; при підвищенні Hb менш ніж на 10 г/л (0,62 ммоль/л) ч/з 4 тижн. - дозу подвоїти, при відсутності підвищення Hb на 10 г/л (0,62 ммоль/л) ч/з 8 тижн. - лікування припинити, оскільки відповідь на терапію малоймовірна^{БНФ}; лікування продовжити протягом 4 тижн. після закінчення хіміотерапії; максимальна тижнева доза - не вище 60 000 МО^{БНФ}; при досягненні необхідного рівня Hb, індивідуального для кожного пацієнта, дозу зменшити на 25-50 %, підтримуючи Hb на потрібному рівні; якщо рівень Hb перевищив 120 г/л (7,5 ммоль/л)^{БНФ}, дозу зменшити на 25-50%, якщо рівень Hb перевищує 130 г/л (8,1 ммоль/л), лікування тимчасово припинити, при зниженні рівня Hb до 120 г/л (7,5 ммоль/л) лікування поновити у дозі, меншій на 25 % від попередньої дози; при зростанні рівня Hb більш ніж на 20 г/л (1,3 ммоль/л) ч/з 4 тижн. дозу препарату зменшити на 25-50 %; при необхідності у подальшому застосовувати таку дозу, щоб рівень Hb не перевищував 130 г/л; при підготовці хворих до забору аутологічної крові для наступної аутогемотрансфузії: в/в (протягом приблизно 2 хв.) або п/ш, 2 р/тижд. протягом 4 тижн.; коли показник гематокриту у хворого (> 33 %) дозволяє здійснити забір крові, вводять наприкінці процедури; протягом усього курсу лікування гематокрит не має перевищувати 48 %; дозу визначає хірургічна бригада індивідуально, залежно від того, який об'єм крові буде взят у хворого і від його еритроцитарного резерву; максимальна доза не вище 1600 МО/кг/тижд. при в/в введенні і 1200 МО/кг/тижд. при п/ш введенні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіпертонічний криз; АТ, головний біль, тромбоз шунта; тромбоцитоз, тромбоемболічні події, зниження рівня феритину в сироватці крові, висип, свербіж, кропив'янка, реакції у місці ін'єкції, анафілактоїдні реакції, грипоподібні симптоми, пов'язані із лікуванням епоетином бета, такі як гарячка, озноб, головний біль, біль у кінцівках, нездужання, і/або біль у кістках, с-м Стівенса - Джонсона, епідермальний некроліз.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до епоетину β; погано неконтрольована АГ; ІМ або інсульт протягом попереднього міс., нестабільна стенокардія, підвищений ризик тромбозу глибоких вен (при венозній тромбоемболії в анамнезі) - при призначенні для збільшення об'єму аутологічної крові для аутогемотрансфузії.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 1 тис ОД.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	РЕКОРМОН®	Рош Діагностикс ГмБХ (виробництво нерозфасованої продукції, вторинне пакування, випробування контролю якості, випуск серії)/Веттер Фарма-Фертигунг ГмБХ і Ко КГ (виробництво нерозфасованої продукції)/Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд (Виробництво нерозфасованої продукції, Німеччина/Німеччина/Швейцарія)	р-н д/ін'єк. у шпр. з голк. 27G1/2 в конт. чар/уп.	2000МО/0,3мл	№3x2	115,72	21,01/\$
	РЕКОРМОН®	Рош Діагностикс ГмБХ (виробництво нерозфасованої продукції, вторинне пакування, випробування контролю якості, випуск серії)/Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд (випробування контролю якості), Німеччина/Швейцарія	р-н д/ін'єк. у шпр. з голк. 27G1/2 в конт. чар/уп.	30000МО/0,6мл	№4x1	138,22	20,70/\$
	РЕКОРМОН®	Рош Діагностикс ГмБХ (виробництво нерозфасованої продукції, вторинне пакування, випробування контролю якості, випуск серії)/Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд (випробування контролю якості), Німеччина/Швейцарія	р-н д/ін'єк. у шпр. з голк. 27G1/2 в конт. чар/уп.	30000МО/0,6мл	№1x1	138,23	24,51/\$

• **Кальцію фолінат (Calcium folinate) ***

Фармакотерапевтична група: V03AF03 - засоби, що застосовуються для усунення токсичних ефектів протипухлинної терапії.

Основна фармакотерапевтична дія: кальцієва сіль 5-формілтетрагідрофолієвої к-ти; є активним метаболітом фолієвої к-ти і важливим коферментом, необхідним для синтезу нуклеїнових к-т; кальцію фолінат і антагоністи фолатів конкурують за один мембранний транспортер, завдяки чому стимулюється відтік антагоністів фолатів; захищає клітини від дії антагоністів фолієвої к-ти завдяки поповненню зниженого резерву фолатів в організмі; є джерелом відновленого тетрагідрофолату, може обходити блокаду антагоністів фолатів і служити джерелом різних коферментних форм фолієвої к-ти; застосовують як біохімічний модулятор для підвищення цитотоксичної активності 5-фторурацилу; 5-фторурацил інгібує тимідилатсинтазу (ключовий фермент, який бере участь у біосинтезі піримідину), а кальцію фолінат посилює інгібування тимідилатсинтази завдяки збільшенню внутрішньоклітинного запасу фолатів, унаслідок чого стабілізується комплекс 5-фторурацил-тимідилатсинтаза і підвищується цитотоксична активність.

Показання для застосування ЛЗ: для зменшення токсичності і для протидії антагоністам фолієвої кислоти, таким як метотрексат, в цитотоксичній терапії та при передозуванні у дорослих і дітей ("кальціумфолінатний захист"); у складі комбінованої цитотоксичної терапії з 5-фторурацилом

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити в/в або в/м, не допускається інтратекальне застосування; кальціумфолінатний захист при терапії метотрексатом: вводити парентерально пацієнтам із с-мом мальабсорбції або іншими шлунково-кишковими захворюваннями, коли не гарантована кишкова абсорбція, дози понад 25-50 мг

необхідно вводити лише парентерально, кальціумфолінатний захист є необхідним у разі застосування метотрексату у дозах понад 500 мг/м² поверхні тіла і доцільним - при дозах метотрексату 100-500 мг/м² поверхні тіла, зазвичай кальцію фолінат вводити у дозі 15 мг^{вооз БНФ} (6-12 мг/м² поверхні тіла) ч/з 12-24 год (не пізніше ніж ч/з 24 год) після початку інфузії метотрексату^{БНФ}, потім такі ж дози кальцію фолінату вводити кожні 6 год протягом 72 год, ч/з 48 год після початку інфузії метотрексату вимірювати залишкову концентрацію метотрексату в крові; якщо вона менша за 0,5 мкмоль/л, терапію кальцію фолінатом припинити, якщо ж концентрація метотрексату перевищує 0,5 мкмоль/л, захисну терапію необхідно продовжити та інтенсифікувати, вводити у зазначених дозах кожні 6 год ще 48 год або до досягнення концентрації метотрексату < 0,05 мкмоль/л: при концентрації метотрексату ≥ 0,5 мкмоль/л - у дозі 15 мг/м² поверхні тіла; при концентрації метотрексату ≥ 1,0 мкмоль/л - у дозі 100 мг/м² поверхні тіла; при концентрації метотрексату ≥ 2,0 мкмоль/л - у дозі 200 мг/м² поверхні тіла; комбінована терапія у поєднанні з 5-фторурацилом^{вооз БНФ} - схема з повторенням курсів кожні два тижні: у перший і другий дні курсу вводити кальцію фолінат у дозі 200 мг/м² поверхні тіла шляхом двогодинної в/в інфузії, потім - 5-фторурацил 400 мг/м² поверхні тіла шляхом в/в болюсної ін'єкції і 5-фторурацил у дозі 600 мг/м² поверхні тіла шляхом 22-годинної в/в інфузії протягом наступних 2 днів, кожні два тижні у день 1 та 2.; схема з повторенням курсів щотижня: кальцію фолінат вводять у дозі 20 мг/м² поверхні тіла шляхом в/в болюсної ін'єкції або у дозі 200-500 мг/м² поверхні тіла шляхом двогодинної в/в інфузії; 5-фторурацил у дозі 500 мг/м² поверхні тіла вводити шляхом в/в болюсної ін'єкції в середині або у кінці інфузії кальцію фолінату; схема з повторенням курсів щомісяця: у перші 5 днів курсу щодня вводити кальцію фолінат у дозі 20 мг/м² поверхні тіла шляхом в/в болюсної ін'єкції або у дозі 200-500 мг/м² поверхні тіла шляхом двогодинної в/в інфузії, а потім одразу ж вводять 5-фторурацил у дозі 425 або 370 мг/м² поверхні тіла шляхом внутрішньовенної болюсної ін'єкції; кальцію фолінат як антидот антагоністів фолієвої кислоти триметрексату, триметоприму і піриметаміну - профілактика токсичних ефектів триметрексату: кальцію фолінат вводити щодня під час лікування триметрексатом і ще протягом 72 год після введення останньої дози триметрексату; кальцію фолінат можна вводити в/в 5-10 хвилин у дозі 20 мг/м² поверхні тіла кожні 6 год (добова доза 80 мг/м² поверхні тіла) або приймати р/ос по 20 мг/м² поверхні 4 р/добу через рівні проміжки часу; лікування передозування триметрексату: у разі передозування (яке можливе при дозах триметрексату понад 90 мг/м² поверхні тіла без супутнього застосування кальцію фолінату) терапію триметрексатом припинити і вводити в/в кальцію фолінат у дозі 40 мг/м² поверхні тіла кожні 6 год протягом трьох днів; профілактика токсичних ефектів триметоприму: після припинення терапії триметопримом вводити кальцію фолінат у дозі 3-10 мг/добу до нормалізації гематологічних показників; профілактика токсичних ефектів піриметаміну: при терапії високими дозами піриметаміну або тривалому лікуванні низькими дозами призначати супутню терапію кальцію фолінатом у дозах від 5 до 50 мг/добу, залежно від кількості формених елементів у периферичній крові.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: збільшення частоти епілептичних нападів, гарячка, АР (кропив'янка, анафілактоїдні р-ції), безсоння, ажитація і депресія; шлунково-кишкові розлади при застосуванні кальцію фолінату у високих дозах; недостатність кісткового мозку, включаючи летальні випадки; гіперамоніємія; запалення слизових оболонок (стоматит, хейліт); с-м долонно-підшовної еритродизестезії; нудота, блювання, тяжка діарея і дегідратація, що вимагають госпіталізації пацієнта, у поодиноких випадках навіть з летальним наслідком.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до кальцію фолінату або до інших компонентів препарату, перніціозна анемія або інші види анемії, зумовлені дефіцитом вітаміну В₁₂.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 60 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КАЛЬЦІУ ФОЛІНАТ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 3мл, 5мл в амп. у пач.	10 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КАЛЬЦІУ ФОЛІНАТ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у кор.	10 мг/мл	№100	192,00	
	КАЛЬЦІУ ФОЛІНАТ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 5мл, в амп. у бл.	10 мг/мл	№5x1	201,60	
	КАЛЬЦІУ ФОЛІНАТ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 3мл в амп. у кор.	10 мг/мл	№100	220,00	
	КАЛЬЦІУ ФОЛІНАТ	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 3мл в амп. у бл.	10 мг/мл	№5x1	232,00	
II.	КАЛЬЦІУМФОЛІНАТ "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (дозвіл на випуск серії)/Гаупт Фарма Вольфратшаузен ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинна і вторинна упаковка, контроль серії),	р-н д/ін'єк., по 3мл у фл.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

	Австрія/Німеччина						
КАЛЬЦІУМФОЛІНАТ "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (дозвіл на випуск серії)/Гаупт Фарма Вольфратшаузен ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинна і вторинна упаковка, контроль серії), Австрія/Німеччина	р-н д/ін'єк., по 20мл у фл.	10 мг/мл	№1	165,91	25,60/\$	
КАЛЬЦІУМФОЛІНАТ "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (дозвіл на випуск серії)/Гаупт Фарма Вольфратшаузен ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинна і вторинна упаковка, контроль серії), Австрія/Німеччина	р-н д/ін'єк., по 10мл у фл.	10 мг/мл	№1	166,07	25,60/\$	
КАЛЬЦІУМФОЛІНАТ "ЕБЕВЕ"	ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ (дозвіл на випуск серії)/Гаупт Фарма Вольфратшаузен ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинна і вторинна упаковка, контроль серії), Австрія/Німеччина	р-н д/ін'єк., по 5мл у фл.	10 мг/мл	№1	171,47	25,60/\$	
КАЛЬЦІЮ ФОЛІНАТ - ВІСТА	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина	р-н д/ін'єк. по 100мл у фл.	10 мг/мл	№1	136,20	33,97/€	
КАЛЬЦІЮ ФОЛІНАТ - ВІСТА	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина	р-н д/ін'єк. по 50мл у фл.	10 мг/мл	№1	151,20	33,97/€	
КАЛЬЦІЮ ФОЛІНАТ - ВІСТА	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина	р-н д/ін'єк. по 35мл у фл.	10 мг/мл	№1	154,29	33,97/€	
КАЛЬЦІЮ ФОЛІНАТ - ВІСТА	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина	р-н д/ін'єк. по 20мл у фл.	10 мг/мл	№1	171,00	33,97/€	
КАЛЬЦІЮ ФОЛІНАТ - ВІСТА	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина	р-н д/ін'єк. по 10мл у фл.	10 мг/мл	№1	222,00	33,97/€	
КАЛЬЦІЮ ФОЛІНАТ - ВІСТА	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина	р-н д/ін'єк. по 5мл у фл.	10 мг/мл	№1	252,00	33,97/€	
ЛЕЙКОВОРИН АМАКСА	Стадафарм ГмбХ (контроль якості, вторинне пакування, маркування, випуск серії)/Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ (виробництво розчину bulk, наповнення, первинне та вторинне пакування, контроль якості), Німеччина/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 100мл у фл.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ		
ЛЕЙКОВОРИН АМАКСА	Стадафарм ГмбХ (контроль якості, вторинне пакування, маркування, випуск серії)/Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ (виробництво розчину bulk, наповнення, первинне та вторинне пакування, контроль якості), Німеччина/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 50мл у фл.	10 мг/мл	№1	156,01	29,40/€	

ЛЕЙКОВОРИН АМАКСА	Стадафарм ГмбХ (контроль якості, вторинне пакування, маркування, випуск серії)/Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ (виробництво розчину bulk, наповнення, первинне та вторинне пакування, контроль якості), Німеччина/Німеччина	р-н д/ін'єк. по 20мл у фл.	10 мг/мл	№1	180,02	29,40/€
ЛЕЙКОВОРИН-ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА/Фармахеми Б.В., Угорщина/Нідерланди	р-н д/ін'єк., по 20мл у фл.	10 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ЛЕЙКОВОРИН-ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА/Фармахеми Б.В., Угорщина/Нідерланди	р-н д/ін'єк., по 50мл у фл.	10 мг/мл	№1	154,71	27,93/\$
ЛЕЙКОВОРИН-ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА/Фармахеми Б.В., Угорщина/Нідерланди	р-н д/ін'єк., по 30мл у фл.	10 мг/мл	№1	185,04	27,93/\$
ЛЕЙКОВОРИН-ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА/Фармахеми Б.В., Угорщина/Нідерланди	р-н д/ін'єк., по 10мл у фл.	10 мг/мл	№1	223,58	27,93/\$
ЛЕЙКОВОРИН-ТЕВА	АТ Фармацевтичний завод ТЕВА/Фармахеми Б.В., Угорщина/Нідерланди	р-н д/ін'єк., по 5мл у фл.	10 мг/мл	№1	291,35	27,93/\$
ЛЕЙКОФОЗИН	Сіндан Фарма СРЛ/Актавіс Італія С.п.А., Румунія/Італія	р-н д/ін'єк., по 10мл у фл.	10 мг/мл	№1	124,14	26,31/\$
ЛЕЙКОФОЗИН	Сіндан Фарма СРЛ/Актавіс Італія С.п.А., Румунія/Італія	р-н д/ін'єк., по 3мл у фл.	10 мг/мл	№1	324,78	26,31/\$

● **Динатрію фолінат (Sodium folinate) ***

Фармакотерапевтична група: V03AF06 - препарати, що застосовуються для усунення токсичних ефектів протипухлинної терапії.

Основна фармакотерапевтична дія: фолінієва к-та являє собою формільну похідну тетрагідрофолієвої к-ти і відповідно - активну форму фолієвої к-ти; бере участь у різноманітних процесах метаболізму, включаючи синтез пуринів, синтез піримідинових нуклеотидів і метаболізм амінокислот; біохімічні підстави для методу "терапії порятунку" динатрію фолінатом з метотрексатом:служить пре-редукованим джерелом фолату Н4, внаслідок чого метотрексат може обійти блокаду дигідрофолатредуктази антагоністами фолієвої к-ти та стати джерелом різних коферментних форм фолієвої к-ти; біохімічне обґрунтування для комбінування динатрію фолінату і 5-фторурацилу таке: фторурацил *inter alia* інгібує синтез ДНК шляхом зв'язування з тимідилатсинтазою; внаслідок сполучення динатрію фолінату з фторурацилом утворюється потрійний комплекс, що складається з тимідилатсинтети, 5-фтордезоксидуринмонофосфату і 5,10-метилентетрагідрофолату; це призводить до тривалого блокування тимідилатсинтети та підсиленням інгібування біосинтезу ДНК, що сприяє підсиленню цитотоксичності порівняно з монотерапією фторурацилом.

Показання для застосування ЛЗ: для зменшення токсичності та нейтралізації дії антагоністів фолієвої к-ти (таких як метотрексат) при проведенні цитотоксичної терапії та при їхньому передозуванні у дорослих і дітей; у комбінації з 5-фторурацилом при проведенні цитотоксичної терапії. *Зверніть увагу!* Постійно високих серологічних рівнів метотрексату можна також очікувати і при терапії метотрексатом у низьких дозах, зокрема при плевральних випотах, асциті, нирковій недостатності і недостатньому вживанні рідини протягом терапії метотрексатом.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують нерозведеним для в/в ін'єкцій або розведеним для в/в інфузій; не застосовувати інтратекально; р-н розводять у 0,9 % р-ні натрію хлориду, сумісний із з 5-фторурацилом, після змішування р-н може зберігатися 72 год при t° 20-25 °С; застосовують наступні режими: 1) тижневий режим: а) помірно висока доза 5-фторурацилу - 500 мг/м² фолінієвої к-ти (546,5 мг/м² динатрію фолінату) у вигляді в/в інфузії протягом 2-х год. і 600 мг/м² фторурацилу у вигляді болюсної ін'єкц. ч/з 1 год. після початку проведення інфузії динатрію фолінату; проводити 1 раз/тижд. протягом 6 тижн. (1 цикл); повторити цикл після двотижневої перерви в лікуванні, кількість циклів буде залежати від реакції пухлини; дози 5-фторурацилу коригують залежно від ступеня токсичності; б) висока доза 5-фторурацилу - 500 мг/м² фолінієвої к-ти у вигляді в/в інфузії протягом 1-2 год. з наступним застосуванням 2600 мг/м² 5-фторурацилу у вигляді інфузії протягом 24 год.; повторювати 1 р/тижд. протягом 6 тижн. (1 цикл); повторити цикл після двотижневої перерви у лікуванні; кількість циклів залежатиме від реакції пухлини на лікування; дози 5-фторурацилу змінюють залежно від рівня токсичності, що спостерігається; 2) місячний режим: а) помірно-висока доза динатрію фолінату - 200 мг/м² фолінієвої к-ти щодня з наступним застосуванням 370 мг/м² 5-фторурацилу кожного дня, обидва препарати вводяться в/в у вигляді болюсних ін'єкцій; повторювати протягом 5 днів (1 цикл); повторити цикл ч/з 4 тижн., 8 тижн. і кожні 5 тижн.; кількість циклів залежить від реакції пухлини на лікування; дози 5-фторурацилу змінюють у кожному наступному циклі, залежно від ступеня токсичності;б) низька доза динатрію фолінату - 20 мг/м² фолінієвої к-ти щодня з наступним застосуванням 425 мг/м² 5-фторурацилу щодня, обидва препарати вводяться в вигляді болюсних ін'єк.; повторювати протягом 5 днів (1 цикл); повторити цикл ч/з 4 тижн., 8 тижн. і кожні 5 тижн. після цього; кількість циклів залежатиме від реакції пухлини на лікування; профілактичне застосування динатрію фолінату розпочинають, не очікуючи результатів моніторингу рівня метотрексату в крові, і потім спосіб застосування

визначають відповідно до рівня метотрексату в крові; після застосування динатрію фолінату може застосовуватися доза метотрексату більше 100 мг/м²; не існує єдиних рекомендацій щодо дозування та способу застосування динатрію фолінату як антидоту при терапії метотрексатом у високих дозах; початок лікування - застосовують не пізніше ніж ч/з 18-30 год після початку в/в введення метотрексату; закінчення лікування - не раніше ніж ч/з 72 год після початку в/в введення метотрексату, після закінчення лікування рівень метотрексату має бути < 10⁻⁷ моль/л, краще - < 10⁻⁸ моль/л, надмірне введення динатрію фолінату може зменшити ефективність метотрексату, при недостатньому введенні динатрію фолінату можуть спостерігатись токсичні побочні ефекти при проведенні терапії метотрексатом у високих дозах.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР, у тому числі анафілактоїдні/ анафілактичні реакції та кропив'янка, безсоння, збудження і депресія після високих доз, збільшення частоти нападів епілепсії, шлунково-кишкові розлади після високих доз, недостатність ф-ції кісткового мозку, в тому числі з летальним наслідком, піретичні реакції після введення шляхом ін'єкцій, гіперамоніємія, долонно-підшовна еритродізестезія, мукозити, зокрема стоматит і хейліт з летальними випадками, блювання і нудота, діарея високого ступеня токсичності і зневоднення організму, що вимагають госпіталізації, і можуть призводити до летального наслідку.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів ЛЗ; у комбінації з 5-фторурацилом не застосовувати при наявності протипоказань до застосування флюороурацилу, зокрема під час вагітності та годування груддю та при тяжкій діарейі; у комбінації з 5-фторурацилом не можна починати або продовжувати пацієнтам, у яких спостерігаються симптоми шлунково-кишкової токсичності будь-якого ступеня тяжкості, доки ці симптоми не будуть повністю усунені, пацієнтам з діареєю знаходитись під ретельним наглядом до її повного усунення, оскільки діарея може спричинити швидке клінічне погіршення, що призводить до летального наслідку; не призначений для лікування перніціозної анемії або інших видів анемії, зумовлених дефіцитом вітаміну В₁₂, може спостерігатися гематологічна ремісія, неврологічні прояви прогресують.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 60 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	СОДІОФолІН	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії)/Хаупт Фарма Волфратшаусен ГмБХ (виробництво "in bulk", первинне пакування та контроль серії), Німеччина/Німеччина	р-н д/ін'єк. або інфуз. по 2мл у фл.	50 мг/мл	№1	233,91	27,85/€
	СОДІОФолІН	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії)/Хаупт Фарма Волфратшаусен ГмБХ (виробництво "in bulk", первинне пакування та контроль серії), Німеччина/Німеччина	р-н д/ін'єк. або інфуз. по 4мл у фл.	50 мг/мл	№1	234,61	27,93/€
	СОДІОФолІН	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії)/Хаупт Фарма Волфратшаусен ГмБХ (виробництво "in bulk", первинне пакування та контроль серії), Німеччина/Німеччина	р-н д/ін'єк. або інфуз. по 8мл у фл.	50 мг/мл	№1	234,61	27,93/€

• **Месна (Mesna)**

Фармакотерапевтична група: V03AF01 - засоби, що застосовуються для усунення токсичних ефектів протипухлинної терапії.

Основна фармакотерапевтична дія: механізм дії препарату спрямований на зменшення уротоксичних ефектів гідроксиметаболітів оксазафосфоринів, а з іншого боку - на формування нетоксичних адитивних сполук з акролеїном; ці реакції сприяють регіональній детоксикації в нирках та еферентних сечовивідних шляхах.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика токсичної дії оксазафосфоринів (іфосфамід, циклофосфамід, трофосфамід) на сечовивідні шляхи^{БНФ}, у пацієнтів групи високого ризику - після променевої терапії органів малого таза, з циститом після попереднього лікування оксазафосфоридами або розладами з боку сечовивідних шляхів в анамнезі.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити шляхом в/в ін'єк. дорослим у дозі, що становить 20 % від відповідної дози оксазафосфоринів, під час «0» (час введення оксазафосфорида), ч/з 4 год. і ч/з 8 год.; якщо іфосфамід вводити шляхом тривалої інфузії, бажано додати месну 400 мг в/в болюсно (20 % від дози іфосфаміду) в момент часу «0» (початок інфузії) з подальшим введенням препарату в дозах до 100 % від відповідної дози іфосфаміду у випадку тривалої інфузії; уроректорний ефект підтримувати протягом ще 6-12 год. після завершення інфузії іфосфаміду шляхом застосування препарату в дозах до 50 % від відповідної дози іфосфаміду; тривалість застосування препарату залежить від тривалості лікування оксазафосфоридами.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: фарингіт; лімфаденопатія; панцитопенія, лейкопенія, лімфопенія, тромбоцитопенія, еозинофілія; анафілаксія, р-ції гіперчутливості; зниження апетиту, відчуття зневоднення; безсоння, нічні кошмари; запаморочення, сонливість, головний біль, млявість; запаморочення, парестезія, гіперестезія, синкопе, гіпоестезія, порушення уважності; судоми; кон'юнктивіт, фотофобія, затуманення зору; періорбітальний набряк; серцебиття; зміни на ЕКГ, тахікардія; припливи; АГ або гіпотензія; кашель, закладеність носа, біль у плеврі, сухість у роті, бронхоспазм, диспное, дискомфорт у гортані, носова кровотеча; респіраторний дистрес, гіпоксія, зниження насичення киснем, тахіпное, кровохаркання; нудота, діарея, колики, абдомінальний біль; подразнення слизових оболонок, здуття, констипація, пекучий біль (за грудиною, в епігастрії), кровоточивість ясен; стоматит, погіршення смакових відчуттів; зростання рівня трансаміназ; гепатит, зростання рівня гамма-глутамілтрансферази та лужної фосфатази крові; висипання; свербіж, гіпергідроз; кропив'янка, с-ром Стівенса-Джонсона, мультиформна еритема, медикаментозна висипання, утворення виразок та/або бульозний висип/пухирі, ангіоневротичний набряк, висипання, відчуття печіння, токсичний епідермальний некроліз, фоточутливість, еритема; артралгія, біль у спині, міалгія, біль у кінцівках, біль у щелепі; дизурія; ГНН; місцеві інфузійні р-ції (висипання та свербіж, гарячка, грипоподібні р-ції, біль, почервоніння, кропив'янка, набряк, тромбофлебіт), озноб, знесилення, біль у грудях, виснаження; набряк обличчя, периферичний набряк, астенія; лабораторні ознаки дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові, подовження протромбінового часу, подовження активованого часткового тромбoplastинового часу.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини ЛЗ.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	МЕСНА	Стадафарм ГмбХ (вторинне пакування, контроль серії/якості, випуск серій)/Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ (виробництво розчину bulk, первинне та вторинне пакування, контроль серії/якості), Німеччина/Німеччина	р-н д/ін'єк., по 4мл в амп., по 10мл, 50мл у фл.	100 мг/мл	№10, №1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	УРОМІТЕКСАН® 400 МГ	Бакстер Онколоджи ГмбХ, Німеччина	р-н д/ін'єк., по 4мл в амп. у конт. чар/уп.	100 мг/мл	№5x3	2162,31	24,03/\$

- **Ондансетрон (Ondansetron) *** (див. п. 3.6. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: нудота і блювання, що спричинені цитотоксичною хіміотерапією та променевою терапією; профілактика та лікування післяопераційних нудоти і блювання^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування нудоти і блювання, спричинені хіміотерапією та променевою терапією: еметогенна хіміотерапія та променева терапія - дорослим в/в або в/м 8 мг у вигляді повільної ін'єк. безпосередньо перед лікуванням; для профілактики відстроченого або тривалого блювання після перших 24 год. р/ос або per rectum^{БНФ}; високоеметогенна хіміотерапія - у вигляді одноразової дози 8 мг в/в або в/м безпосередньо перед хіміотерапією; дози понад 8 мг (до 16 мг)^{БНФ} лише у вигляді в/в інфузії на 50-100 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду або іншого відповідного р-ника, тривалість інфузії - не <15 хв.; одноразову дозу більшу за 16 мг застосовувати не можна; для високоеметогенної хіміотерапії 8 мг в/в повільно або в/м (не < ніж 30 секунд) безпосередньо перед хіміотерапією з подальшим дворазовим в/в або в/м введенням 8 мг ч/з 2 та 4 год^{БНФ} або постійною інфузією 1 мг/год. протягом 24 год.; ефективність при високоеметогенній хіміотерапії підвищується додатковим одноразовим в/в введенням дексаметазону натрію фосфату у дозі 20 мг перед хіміотерапією; для профілактики відстроченого або тривалого блювання після перших 24 год. р/ос або per rectum застосування препарату; дітям від 6 міс. до 17 років дозу розраховують за площею поверхні тіла або масою тіла^{БНФ}; вводити безпосередньо перед хіміотерапією шляхом разової в/в ін'єкції у дозі 5 мг/м², в/в доза не має перевищувати 8 мг, ч/з 12 год.розпочинати р/ос застосування препарату, яке може тривати ще 5 днів; не перевищувати дозу для дорослих; розрахунок дози згідно з масою тіла дитини - вводять безпосередньо перед хіміотерапією шляхом

разової в/в ін'єк. у дозі 0,15 мг/кг; в/в доза не має перевищувати 8 мг; у перший день можна ввести ще 2 в/в дози з 4-год. інтервалом; ч/з 12 год. можна розпочинати пероральне застосування препарату, яке може тривати ще 5 днів, табл: вибір режиму дозування визначається вираженістю еметогенної дії протипухлинної терапії та встановлюється індивідуально; сироп: 8 мг ондансетрону (10 мл сиропу) за 1-2 год. до початку проведення цитостатичної хіміотерапії або променевої терапії з наступним прийомом 8 мг кожні 12 год. протягом не більше 5 днів^{БНФ}; при високоеметогенній хіміотерапії разова доза становить 24 мг (30 мл)^{БНФ} одночасно з дексаметазоном внутрішньо в дозі 12 мг за 1-2 год. до початку проведення хіміотерапії; для профілактики відстроченого або тривалого блювання після перших 24 год. рекомендується застосування сиропу в дозі 8 мг (10 мл) 2 р/добу протягом не більше 5 днів^{БНФ}.

- **Тропісетрон (Tropisetron)** (див. п. 3.6. розділу "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Показання для застосування ЛЗ: запобігання нудоті і блюванню, що виникають внаслідок протипухлинної хіміотерапії; усунення нудоти і блювання, що виникають у післяопераційний період; запобігання нудоті і блюванню, що виникають після гінекологічних інтраабдомінальних хірургічних втручань; з метою досягнення оптимальної величини співвідношення «ефект/ризик» застосування препарату слід призначати пацієнткам, в анамнезі яких є відомості щодо розвитку післяопераційної нудоти і блювання.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дітям від 2 років рекомендована доза 0,2 мг/кг (0,2 мл/кг); МДД 5 мг; у перший день, за короткий проміжок часу до застосування протипухлинної хіміотерапії, рекомендується в/в вводити препарат: у вигляді інфузії після розведення загальноживаними р-нами для інфузій, або у вигляді повільної ін'єкції (не менше 1 хв.); потім, з 2-го по 6-й день призначати внутрішньо у вигляді р-ну; одразу ж після розведення апельсиновим соком відповідної кількості тропісетрону, що міститься в ампулі, приймати зранку, за 1 год. до вживання їжі. Дорослим рекомендується у вигляді 6-денного курсу по 5 мг/добу; у перший день призначати в/в за короткий проміжок часу до застосування протипухлинної хіміотерапії: у вигляді інфузій (після попереднього розведення), або у вигляді повільної ін'єкції (не менше 1 хв.); потім, з 2-го по 6-й день призначати внутрішньо у вигляді капсул. Якщо застосування одного тропісетрону чинить недостатню протиблювальну дію, лікувальний ефект препарату можна посилити призначенням дексаметазону.

- **Мєбіфон (Mebifon)**

Фармакотерапевтична група: L01XX - Антинеопластичні препарати. M05BA - Засоби, що впливають на структуру і мінералізацію кісток.

Основна фармакотерапевтична дія: препарат з групи бісфосфонатів, структурний аналог природного пірофосфату; пригнічує деструкцію кісток та чинить протипухлинну дію, виражену аналгетичну дію (біль у кістках зменшується або зникає), покращує загальний стан і фізичну активність хворих; нормалізує рівень іонізованого кальцію в сироватці крові хворих на рак молочної залози та інших локалізацій - нирок, легенів, передміхурової залози, на меланому з метастазами в кістки і лімфопрліферативні захворювання з ураженням кісток; не пригнічує систему кровотворення, імуногенез та імунну відповідь; не пригнічує систему кровотворення, імуногенез та імунну відповідь, незначною мірою змінює показники системи зсідання та протизсідання крові.

Показання для застосування ЛЗ: злоякісні пухлини молочної, передміхурової залози та легенів з метастазами у кістки; гіперкальціємія, зумовлена злоякісними пухлинами; меланома, лімфопрліферативні захворювання з ураженням кісток.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають у вигляді монотерапії та у складі схем протипухлинної хіміотерапії при злоякісних пухлинах, вводять дорослим в/в краплинно у дозі 300 мг (1 ампл.) у 200 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду 1 р/добу, протягом 30-40 хв; курс лікування - 5 днів, курсова доза - 1,5 г; кількість курсів від 1 до 6-ти залежно від перебігу захворювання, схеми та ефективності лікування; інтервал між курсами не менше 3-х тижнів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анемія, тромбоцитопенія, лейкопенія, головний біль, запаморочення, парестезія, занепокоєність, сплутаність свідомості, кон'юнктивіт, увеїт, склерит, епісклерит, нудота, блювання, анорексія, діарея, запор, біль у животі, диспепсія, диспное, бронхоспазм, свербіж, висипання, біль у кістках, міалгія, артралгія, генералізований біль, м'язові спазми, остеонекроз щелепи, атиповий перелом стегнової кістки, АГ, артеріальна гіпотензія, порушення ритму (фібриляція та тріпотіння передсердь), ГНН, гематурія, реакції гіперчутливості, ангіоневротичний набряк, гарячка, грипоподібні стани (включаючи підвищену втомлюваність, озноб, нездужання, припливи), гіпофосфатемія, підвищення рівня креатиніну і сечовини в крові, гіпокальціємія, гіпомагніємія, гіпокаліємія, гіперкаліємія, гіпернатріємія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до бісфосфонатів та до інших компонентів препарату, інсульт, ІМ в анамнезі (не раніше ніж за 6 міс. до початку терапії), декомпенсована СН, активний туберкульоз, тяжкі порушення функції печінки та нирок, рівень тромбоцитів у крові нижче $100 \times 10^9 / \text{л}$.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	МЕБІФОН®	ПАТ "Фармак", Україна	р-н д/ін'єк. по 20мл в ампл. у пач. та бл.	15 мг/мл	№5, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	

- **Кислота золєдронєва (Zoledronic acid) *** (див. п. 8.7.3.1. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")

Фармакотерапевтична група: M05BA08 - засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток. Бісфосфонати.

Основна фармакотерапевтична дія: належить до бісфосфонатів, що специфічним чином діють на кісткову тканину; є одним із найпотужніших інгібіторів остеокластичної кісткової резорбції; селективна дія базується на високій спорідненості з мінералізованою кістковою тканиною; інгібує кісткову резорбцію без негативного впливу на

формування, мінералізацію та механічні властивості кісток; крім інгібіції остеокластної кісткової резорбції, чинить пряму протипухлинну дію на культивовані клітини м'єломи та раку молочної залози людини завдяки інгібіції проліферації клітин та індукції апоптозу, що вказує на те, що золедронові к-та може мати антиметастатичні властивості. Інгібує остеобластну кісткову резорбцію, що зменшує ріст пухлини та має антиангіогенну і протибольову дію; інгібує остеобластну проліферацію, цитостатична дія, проапоптостатична дія на пухлинні клітини, синергічний цитостатичний ефект з іншими протипухлинними ліками, антиадгезивна та антиінвазивна дія.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика симптомів, пов'язаних з ураженням кісткової тканини (патологічні переломи, компресія хребетного стовбура, ускладнення після хірургічних втручань і променевої терапії або гіперкальціємія, обумовлена злоякісною пухлиною), у пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями на пізніх стадіях; лікування гіперкальціємії, обумовленої злоякісною пухлиною ^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: готовий розчин для інфузій вводять у вигляді одноразової в/в інфузії протягом щонайменше 15 хв. ^{БНФ}; для профілактики симптомів, пов'язаних з ураженням кісткової тканини, у пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями на пізніх ст. дорослим рекомендована доза 4 мг кожні 3-4 тижні; пацієнтам необхідно щоденне призначення препаратів кальцію р/ос у дозі 500 мг і 400 МО вітаміну D на добу ^{БНФ}; рішення про лікування пацієнтів має враховувати, що початок ефекту від лікування настає ч/з 2-3 міс.; лікування гіперкальціємії, обумовленої злоякісною пухлиною дорослим рекомендована доза 4 мг у вигляді одноразової інфузії ^{БНФ}; перед введенням і під час введення препарату необхідно забезпечити достатню гідратацію пацієнта; лікування гіперкальціємії, обумовленої злоякісною пухлиною, у пацієнтів з тяжкими порушеннями ф-ції нирок, після ретельної оцінки ризику застосування препарату та очікуваної користі; клінічний досвід застосування препарату пацієнтам із рівнем креатиніну в сироватці крові > 400 мкмоль/л, або > 4,5 мг/дл, відсутній; пацієнтам з гіперкальціємією, обумовленою злоякісною пухлиною, з із рівнем креатиніну в сироватці крові < 400 мкмоль/л, або < 4,5 мг/дл, корекція дози не потрібна; профілактика симптомів, пов'язаних з ураженням кісткової тканини, у пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями на пізніх стадіях: на початку лікування препаратом пацієнтів з множинною м'єломою або метастатичним ураженням кісток внаслідок солідої пухлини визначити рівень креатиніну в сироватці крові і КлКр; рекомендована доза препарату пацієнтам з початковим рівнем КлКр (мл/хв.) > 60 складає 4 мг; 50-60 мл/хв - 3,5 мг; 40-49 мл/хв - 3,3 мг; 30-39 мл/хв - 3 мг; після початку терапії рівень креатиніну в сироватці крові слід вимірювати перед введенням кожної дози, у разі порушення ф-ції нирок лікування відмінити; терапію слід відновлювати у тій же дозі, що й до переривання лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анемія; тромбоцитопенія, лейкопенія; панцитопенія, головний біль, парестезії, запаморочення, смакові розлади, гіпостезія, гіперстезія, тремор, сонливість; епілептичні напади, заціпеніння та тетанія (вторинні до гіпокальціємії), занепокоєність, розлади сну; сплутаність свідомості, кон'юнктивіти; помутніння зору, склерит та запалення очниці; увеїт; епісклерит, нудота, блювання, анорексія; діарея, запор, абдомінальний біль, диспепсія, стоматити, сухість у роті, диспное, кашель, бронхоконстрикція; інтерстиціальна хвороба легенів, свербіж, висипання (включаючи еритематозні та макулярні висипання), підвищена пітливість, біль у кістках, міалгія, артралгія, генералізований біль; м'язові судоми, остеонекроз щелепи; остеонекроз зовнішнього слухового проходу (несприятливі реакції, типові для бісфосфонатів), АГ, фібриляція передсердь, артеріальна гіпотензія, що спричинює синкопе та циркуляторний колапс; брадикардія, серцева аритмія (вторинна до гіпокальціємії), ниркові порушення; ГНН, гематурія, протеїнурія; набутий с-м Фанконі; р-ції гіперчутливості; ангіоневротичний набряк; гарячка, грипоподібний стан (включаючи стомленість, озноб, нездужання і припливи, гарячку, міалгію, головний біль, біль у кінцівках, нудоту, блювання, діарею та артралгію, артрит, асоційований із опуханням суглобів); р-ції у місці ін'єкції (включаючи біль, подразнення, припухлість, затвердіння), астенія, периферичний набряк, біль у грудях, збільшення маси тіла, анафілактичні р-ції/шок, кропив'янка; артрити та набряки суглобів як симптоми гострофазної р-ції; гіпофосфатемія; підвищення рівня креатиніну і сечовини в крові, гіпокальціємія; гіпомагніємія, гіпокаліємія; гіперкаліємія, гіпернатріємія; погіршення функції нирок, переломи стегнової кістки.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до золедронові к-ти, інших бісфосфонатів або будь-яких допоміжних речовин, що входять до складу ЛЗ; вагітність, період годування груддю.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 4 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЗОЛЕДРОНОВА КИСЛОТА	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. в амп. по 5мл у бл.	0,8 мг/мл	№5x1, №5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЗОЛЕДРОНОВА КИСЛОТА	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. в амп. по 5мл у бл.	0,8 мг/мл	№1x1	1500,00	
	ЗОЛЕДРОНОВА КИСЛОТА-ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. у фл. по 5мл в конт. чар/уп.	0,8 мг/мл	№1x1	1000,00	
	МЕТАКОС®	АТ "Фармак" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника Synthop Hispania, S.L., Іспанія на виробничій дільниці Sothema, Марокко),	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	4мг/5мл	№1	845,00	

		Україна					
	МЕТАКОС®	ПАТ "Фармак" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника Synthon Hispania, S.L., Іспанія на виробничій дільниці Sothema, Марокко), Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	4мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	БЛАЗТЕР® - Н	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	4мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДЕЗТРОН	Актавіс Італія С.п.А., Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	0,8 мг/мл	№1	712,38	27,07/\$
	ЗОЛАНДО	ЮСВ Прайвіт Лімітед, Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	4мг/5мл	№1	1500,00	24,80/\$
	ЗОЛАЦИД	ТОВ "Фармідея", Латвія	конц. д/приг. р- ну д/інфуз. по 5мл у фл.	4мг/5мл	№4, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЗОЛАЦИД	ТОВ "Фармідея", Латвія	конц. д/приг. р- ну д/інфуз. по 5мл у фл.	4мг/5мл	№1	1336,32	29,76/€
	ЗОЛЕДРО-ДЕНК 4 МГ/5 МЛ	Хамельн Фармацевтикалс ГмБХ, Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. у фл.	4мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЗОЛЕДРОНАТ МЕДАК	Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мБХ (виробник, що відповідає за маркування, вторинне пакування, контроль/випробування серії, випуск серії)/Санохемія Фармацойтіка АГ (виробник, що відповідає за випуск готової лікарської форми, первинне пакув, Німеччина/Австрія/Австрія	р-н д/інфуз. по 100мл у фл.	4мг/100мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЗОЛЕДРОНОВА КИСЛОТА	РУП "Бєлмедпрепарати", Республіка Білорусь	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	4мг	№1	3080,94	27,01/\$
	ЗОЛЕДРОНОВА КИСЛОТА АККОРД	Аккорд Хелскеа Лімітед (вторинне пакування, відповідальний за випуск серії)/Інтас Фармасьютикалз Лімітед (виробництво готового лікарського засобу, стерилізація, первинне та вторинне пакування, контроль якості серій готового лікарського засобу)/Астрон Резь, Велика Британія/Індія/Велика Британія/Угорщина/Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	4мг/5мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЗОЛЕДРОНОВА КИСЛОТА-ВІСТА	Актавіс Італія С.п.А., Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. у фл.	4мг/5мл	№1	700,00	28,77/€
	ЗОЛЕМЕДА	Актавіс Італі С.п.А., Італія	конц. д/р-ну д/інфуз. у фл. по 5мл	4мг/5мл	№1	1822,25	28,89/€
	ЗОЛЕНДРОВІСТА	Сотема (виробництво, пакування)/Сінтон БВ (відповідальний за випуск серії)/Сінтон Хіспанія, С.Л.	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	4мг/5мл	№1	1875,00	35,35/€

	(відповідальний за випуск серії), Марокко/Нідерланди/Іспанія					
ЗОЛТА	Лабораторіос Нормон С.А., Іспанія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	4мг/5мл	№1	1630,09	27,07/€
ЗОЛТЕРО	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	конц. д/р-ну д/інфуз. у фл. по 5мл	4мг/5мл	№1	2100,00	26,85/\$
ЗОМЕТА®	Новартіс Фарма Штейн АГ/Фрезеніус Кабі Австрія ГмБХ (виробництво, первинне пакування; візуальний контроль стерилізованих флаконів для виробника Фрезеніус Кабі Австрія ГмБХ, Грац; контроль якості за показником "Бактеріальні ендотоксини" для виробника Фрезе, Швейцарія/Австрія/Австрія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	4мг/5мл	№1	2730,00	28,10/€
МОНТЕРОН	Фармасайнс Інк., Канада	конц. д/р-ну д/інфуз. по 5мл у фл.	4мг/5мл	№1	1106,40	

• **Кислота ібандронова (ibandronic acid) (див. п. 8.7.3.1. розділу "РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ")**

Фармакотерапевтична група: M05BA06 - засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток; бісфосфонати.

Основна фармакотерапевтична дія: високоактивний азотовмісний бісфосфонат, який селективно діє на кісткову тканину і специфічно пригнічує активність остеокластів та не має прямого впливу на формування кісткової тканини; не впливає на процес поповнення пулу остеокластів, пригнічує кісткову резорбцію, *In vivo* ібандронова кислота попереджає кісткову деструкцію, спричинену експериментально блокадою ф-ції статевих залоз, ретиноїдами, пухлинами та екстрактами пухлин, в/в введення ЛЗ призводить до зниження рівнів сироваткового С-телопептиду альфа-ланцюга колагену типу I протягом 3-7 днів від початку лікування і до зниження рівня остеокальцину протягом 3 місяців.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика скелетних пошкоджень (патологічні переломи, ураження кісткової тканини, що потребують променевої терапії чи хірургічного лікування) у хворих на рак молочної залози і метастатичним ураженням кісткової тканини^{БНФ}; лікування гіперкальціємії при злоякісних новоутвореннях^{БНФ} з або без метастазів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: профілактика скелетних пошкоджень у пацієнтів з раком молочної залози і метастатичним ураженням кісток: рекомендована доза - 6 мг^{БНФ} після попереднього розведення в 100 мл 0,9 % ізотонічного розчину натрію хлориду чи 100 мл 5 % розчину глюкози, препарат вводиться в/в краплинно протягом 15 хв 1 р/3-4 тижні^{БНФ}; лікування гіперкальціємії при злоякісних новоутвореннях^{БНФ}: після проведення адекватної гідратації 0,9 % розчином натрію хлориду (9 мг/мл), пацієнтам з остеолітичними кістковими метастазами потрібні менші дози, ніж пацієнтам з гуморальним типом гіперкальціємії, для більшості пацієнтів з тяжкою гіперкальціємією (альбумін-коригований кальцій сироватки крові ≥ 3 ммоль/л або ≥ 12 мг/дл) 4 мг є достатньою одноразовою дозою^{БНФ}, пацієнтам із помірною гіперкальціємією (альбумін-коригований кальцій сироватки крові < 3 ммоль/л або < 12 мг/дл) 2 мг є ефективною дозою^{БНФ}, найвища доза, яка застосовувалася в клінічних дослідженнях, є 6 мг; підвищений рівень кальцію в сироватці крові знижується до нормального рівня протягом 7 днів; середній час до рецидиву (повторне збільшення концентрації альбумін-коригованого кальцію сироватки крові до рівня > 3 ммоль/л) 18-19 днів при дозах 2 і 4 мг, середній час до рецидиву при введенні 6 мг становив 26 днів; перорально рекомендується застосовувати по 1 табл. (50 мг) 1 р/добу^{БНФ}; пацієнтам не можна лежати протягом 60 хв. після прийому препарату.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції; цистит, вагініт, кандидоз ротової порожнини; доброякісні новоутворення шкіри; анемія, патологічна зміна крові; гіперчутливість, бронхоспазм, ангіоневротичний набряк, анафілактична реакція/шок; загострення астми; розлади з боку паразитовидних залоз; гіпокальціємія; гіпофосфатемія; розлади сну, тривожність, лабільність емоційної сфери; головний біль, запаморочення, дисгевзія (спотворення смаку); цереброваскулярні розлади, пошкодження нервового корінця, амнезія, мігрень, невралгія, гіпертензія, гіперестезія, навколоротова парестезія, паросмія; катаракта; запалення ока; глухота; блокада ніжки пучка Гіса; ішемія міокарда, СС розлади, відчуття серцебиття; фарингіт; набряк легень, стридор; діарея, блювання, диспепсія, шлунково-кишковий біль, розлади з боку зубів; гастроентерит, гастрит, виразкування ротової порожнини, дисфагія, хейліт; холелітіаз; розлади з боку шкіри, екхімоз; висипання, алопеція; с-м Стівенса-Джонсона, мультиформна еритема, бульозний дерматит; остеоартрит, міалгія, артралгія, порушення з боку суглобів, біль в кістках; атипові підвертальний та діафізарний переломи стегнової кістки; остеонекроз щелепних кісток, остеонекроз зовнішнього слухового проходу; затримка сечі, кісти нирок; біль у ділянці таза; підвищення температури тіла, грипоподібні симптоми, периферичний набряк, астенія, спрага; гіпотермія; збільшення рівня гамма-глутамілтрансферази, збільшення рівня креатиніну, збільшення рівня ЛФ, зниження маси тіла; пошкодження, біль у місці ін'єкції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до ібандронової к-ти чи до будь-якого іншого компонента препарату; гіпокальціємія; захворювання стравоходу зі сповільненням спорожнення стравоходу (стриктура, ахалазія); неспроможність перебувати у вертикальному положенні (стояти чи сидіти) протягом щонайменше 60 хв.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 5 мг., парентерально - 6 мг (курсова доза)

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ІБАНДРОНОВА КИСЛОТА - ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. по 6мл у фл. в конт. чар/уп.	1 мг/мл	№5x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІБАНДРОНОВА КИСЛОТА - ФАРМЕКС	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна	конц. д/р-ну д/інфуз. по 6мл у фл. в пач.	1 мг/мл	№1	1427,89	
II.	БОНДРОНАТ®	Рош Діагностикс ГмБХ, Німеччина	конц. д/р-ну д/інфуз. по 6мл у скл. фл.	6мг/6мл	№1	2597,00	20,59/\$
	БОНДРОНАТ®	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд (виробництво нерозфасованої продукції, випробування контролю якості, випуск серії, первинне та вторинне пакування)/Іверс-Лі АГ (первинне та вторинне пакування)/Пенн Фармасьютикал Сервісез Лтд (виробництво нерозфасованої продукції, в, Швейцарія/Швейцарія/Велика Британія	табл. вкриті п/о у бл.	50мг	№7x4	11,94	26,70/\$
	ІБАНДРОНОВА КИСЛОТА - ВІСТА	Сотема (виробництво, пакування)/Сінтон Хіспанія, С.Л. (контроль якості, випуск серії), Марокко/Іспанія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 6мл у фл.	1 мг/мл	№1	1935,00	35,35/€
	ІБАНДРОНОВА КИСЛОТА АККОРД	Інтас Фармасьютикалз Лімітед (виробництво готового ЛЗ, первинне, вторинне пакування, контроль якості)/Аккорд Хелскеа Лімітед, Індія/Велика Британія	конц. д/р-ну д/інфуз. по 2мл, 6мл у фл.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІБАНДРОНОВА КИСЛОТА-ВІСТА	Сінтон Хіспанія, С.Л., Іспанія	таб., вкриті п/о у бл.	50мг	№10x3	8,00	35,35/€

• **Кислота клодронова (Clodronic acid)**

Фармакотерапевтична група: M05BA02 - засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток.

Основна фармакотерапевтична дія: хімічно належить до бісфосфонатів, аналог природного пірофосфату; бісфосфонати мають виражену спорідненість до мінералізованих тканин, зокрема кісток, вони пригнічують осадження фосфату кальцію, блокуючи його перетворення на гідроксиапатит, затримують агрегацію кристалів апатиту у більшій кристали і сповільнюють розчинення кристалів такого типу; фармакологічні дози препарату запобігають зменшенню міцності кісток; дозозалежно інгібує резорбцію кісткової тканини, при цьому не має шкідливого впливу на мінералізацію чи інші якісні аспекти кісткової тканини; пригнічує активність остеокластів, знижуючи концентрацію кальцію в сироватці крові та екскрецію кальцію і гідроксипроліну з сечею; запобігає втраті кісткової маси, обумовленої метастазами у тазовий та поперековий відділи хребта при раку молочної залози у жінок у перед- та постменопаузі; при первинному раку молочної залози знижує появу кісткових метастазів.

Показання для застосування ЛЗ: остеоліз, спричинений кістковими метастазами солідної пухлини (рак молочної залози, рак простати, рак щитоподібної залози) або гематологічною неоплазією (напр., плазмцитомою); гіперкальціємія, спричинена екстенсивними кістковими метастазами або деструкцією кісток, внаслідок злюкисної пухлини без кісткових метастазів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Добова доза -1600 мг, при застосуванні вищих доз частину дози, що перевищує 1600 мг, рекомендується приймати окремо (як другу дозу); одноразову добову дозу та першу дозу з двох (при застосуванні препарату 2р/добу) приймати ранком натщесерце, запиваючи склянкою води;

гіперкальціємія, пов'язана із малігнізацією: вводити в/в, якщо застосовується р/ос терапія, використовується висока початкова доза, що становить 2400 мг-3200 мг/добу, залежно від індивідуальної відповіді на терапію, її можна знижувати поступово до 1600 мг/добу; остеоліз, пов'язаний із малігнізацією: початкова рекомендована доза 1600 мг/добу, у разі клінічної необхідності дозу можна підвищити, проте не рекомендується перевищувати добову дозу 3200мг/добу, у разі розвитку гіпокальціємії дозу знизити відповідно до індивідуальних потреб.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: безсимптомна гіпокальціємія, симптоматична гіпокальціємія, підвищення рівня паратиреоїдного гормону у сироватці, асоційоване зі зниженням рівня кальцію у сироватці крові, підвищення рівня лужної фосфатази у сироватці крові, діарея, нудота, блювання, підвищення рівня трансаміназ, зазвичай у межах норми, підвищення рівня трансаміназ, що удвічі перевищує межі норми, не пов'язане з порушенням ф-ції печінки, р-ція гіперчутливості, виражена у вигляді шкірної р-ції, увеїти, підвищення рівня креатиніну в сироватці крові та протеїнурія, ураження нирок тяжкого ступеня, розвиток остеонекрозу щелепи у пацієнтів, які раніше отримували лікування амінобісфосфонатами, інтенсивні болі у кістках, суглобах та/чи м'язовий біль; респіраторні розлади, розлади з боку грудної клітки, органів середостіння типів субтрохантерні та діафізарні переломи стегнової кістки; остеонекроз зовнішнього слухового проходу.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого з компонентів препарату; одночасна терапія іншими бісфосфонатами.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БОНЕФОС®	Байер Оу, Фінляндія	табл., вкриті п/о у бл.	800мг	№10х6	відсутня у реєстрі ОВЦ	

● **Кислота памідронова (Pamidronic acid)**

Фармакотерапевтична група: M05BA03 - засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток; бісфосфонати.

Основна фармакотерапевтична дія: сильнодіючий інгібітор резорбції кісткової тканини, яка здійснюється остеокластами; зв'язується з фосфатом кальцію (гідроксіапатитом) і чинить інгібуючу дію на утворення і розчинення мінерального компонента кісткової тканини; пригнічує міграцію попередників остеокластів у кісткову тканину та їх перетворення на остеокласти, які спричиняють резорбцію кісток; протидіє остеолізу, спричиненому злоякісними пухлинами, знижує вираженість гіперкальціємії в онкологічних хворих і спричинених нею клінічних проявів; запобігає або сповільнює розвиток змін кістяка та їх наслідків (переломи, компресія спинного мозку, гіперкальціємія, застосування променевої терапії і хірургічних втручань), знижує вираженість болю, спричиненого ураженням кісток; сповільнює розвиток кісткових метастазів, стабілізує існуючі зміни, сприяє розвитку у цих ділянках остеосклерозу.

Показання для застосування ЛЗ: метастази злоякісних пухлин у кістках та мієломна хвороба; гіперкальціємія, зумовлена злоякісними пухлинами; хвороба Педжета (деформуючий остеїт).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: концентрат для інфузій перед введенням додатково розвести р-ном для інфузій, який не містить кальцію (наприклад, 0,9 % розчином натрію хлориду або 5 % розчином глюкози), концентрація в інфузійному розчині не повинна перевищувати 90 мг/250 мл, отриманий внаслідок цього розчин вводити в/в повільно шляхом інфузії, швидкість інфузії препарату не повинна перевищувати 60 мг/год (1 мг/хв); дозу, що становить 90 мг і міститься у 250 мл інфузійного розчину, вводити протягом 2 год; для пацієнтів з мієломною хворобою і при гіперкальціємії, зумовленій злоякісними пухлинами, не рекомендується перевищувати дозу 90 мг, і вводити її у 500 мл інфузійного розчину більше 4 год.; метастази злоякісних пухлин у кістках і мієломна хвороба - застосовувати у дозі 90 мг 1 р/міс.; хворим, які отримують хіміотерапію з інтервалом 1 раз на 3 тижн. у дозі 90 мг; метастази у кістках - 90 мг/2 год кожні 4 тижні, розчин для інфузій - 90/250 мг/мл, швидкість інфузії - 45 мг/год; множинна мієлома - 90 мг/4 год кожні 4 тижні, розчин для інфузій - 90/500 мг/мл; швидкість інфузії - 22,5 мг/год; гіперкальціємія, зумовлена злоякісними пухлинами - сумарна доза, яка застосовується протягом курсу лікування, залежить від початкового рівня кальцію у сироватці крові пацієнта, сумарну дозу можна вводити як протягом одноразової інфузії, так і за допомогою кількох інфузій, що здійснюються протягом 2-4 послідовних днів; максимальна курсова доза препарату (і для першого, і для наступних курсів лікування) 90 мг; істотне зниження концентрації кальцію у сироватці крові, як правило, спостерігається ч/з 24-48 год після введення ЛЗ, а нормалізація цього показника - протягом 3-7 днів; хвороба Педжета - рекомендований курс лікування становить у сумарній дозі від 180 до 210 мг, які вводити в одиничних дозах або 30 мг 1 р/тижд. 6 тижнів поспіль, або 60 мг кожні 2 тижні протягом 6 тижнів; якщо використовувати уніфіковані дози 60 мг, то рекомендується лікування розпочинати з початкової дози 30 мг з подальшими 60 мг раз на 2 тижні (тобто загальна доза - 210 мг), кожна доза 30 мг або 60 мг повинна бути розведена в 125 мл або 250 мл 0,9 % р-ну хлориду натрію відповідно, і швидкість введення не повинна перевищувати 60 мг/год (1 мг/хв), цей курс або підвищені рівні дозування відповідно до тяжкості захворювання, аж до максим. загальної дози 360 мг (у вигляді розділених доз 60 мг) можна повторювати кожні 6 міс. до досягнення ремісії захворювання, і якщо відбувається рецидив.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: реактивація Herpes simplex і Herpes zoster, анемія, тромбоцитопенія, лімфоцитопенія; лейкопенія, АР, включаючи анафілактоїдні реакції, бронхоспазм/задишка, набряк Квінке; симптоматична гіпокальціємія (парестезія, тетанія, м'язові спазми), головний біль, безсоння, сонливість; судоми, збудження, запаморочення, летаргія; сплутаність свідомості, зорові галюцинації; кон'юнктивіт; увеїт (ірит, іридоцикліт); склерит, епісклерит, ксантопсія; орбітальне запалення; АГ; артеріальна гіпотензія, лівошлуночкова недостатність (задишка, набряк легенів) або застійна СН (набряки) внаслідок гіперволемії; фібриляція передсердь; г. респіраторний дистрес-синдром, інтерстиціальне захворювання легенів; нудота, блювання, анорексія, біль у животі, діарея, запор, гастрит; диспепсія; висипання; свербіж; транзиторний біль у кістках, артралгія, міалгія; м'язові спазми; атипичні підвертельні та діафізарні переломи стегнової кістки; остеонекроз зовнішнього слухового проходу (побічна реакція, притаманна класу бісфосфонатів); остеонекроз

щелепи; ГНН; фокально-сегментарний гломерулосклероз, включаючи руйнівний варіант, нефротичний с-м; ускладнення вже наявних захворювань нирок, гематурія, розлади ниркових каналців, тубулоінтерстиціальний нефрит, гломерулонефropатія, пропасниця і грипоподібні симптоми, що рідко супроводжуються нездужанням, ознобом, відчуттям підвищення втомлюваності і припливами; р-ції у місці введення препарату (біль, почервоніння, набряклість, затвердіння, флебіт, тромбофлебіт), генералізований біль; гіпокальціємія, гіпofосфатемія; гіпокаліємія, гіпомангіємія, підвищення КлКр в сироватці крові; зміни функціональних печінкових проб, підвищення к-ції сечовини у сироватці крові; гіперкаліємія, гіпернатріємія; випадки остеонекрозу (щелепи) були зареєстровані, в основному, в онкологічних хворих, які лікувалися препаратами, що пригнічують резорбцію кісток; випадки остеонекрозу щелепи, в основі яких лежать пухлини (прогресуючий рак молочної залози, множинна мієлома), зустрічаються частіше.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату або інших бісфосфонатів; тяжка ниркова недостатність (КлКр <30 мл/хв).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 60 мг (курсва доза)

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ПАМІРЕДИН	Фармасайнс Інк., Канада	ліоф. д/р-ну д/інфуз. у фл.	90мг	№1	644,87	27,25/\$

• **Фентаніл (Fentanyl) ***

Фармакотерапевтична група: N02AB03 - аналгетики; опіоїди; похідні фенілпіперидину.

Основна фармакотерапевтична дія: знеболювальна і седативна дія, синтетичний аналгетик, який переважно взаємодіє з μ -опіоїдними рецепторами.

Показання для застосування ЛЗ: тяжкий хр. біль у дорослих, які потребують безперервного тривалого застосування опіоїдів; довготривала терапія тяжкого хр.болю у дітей віком від 2 років, які отримують лікування опіоїдними анальгетиками.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначений для трансдермального застосування, дози препарату підбираються індивідуально залежно від стану пацієнта і повинні регулярно оцінюватися після аплікації пластиру, застосовувати найнижчу ефективну дозу; при першому застосуванні дозу ЛЗ підбирати залежно від режиму застосування опіоїдних аналгетиків, брати до уваги стан пацієнта, масу тіла, вік, ступінь виснаження та рівень переносимості опіоїдів, пацієнти з толерантністю до опіоїдних аналгетиків - дозу можна титрувати, збільшуючи або зменшуючи на 25 мкг/год^{БНФ}, для досягнення найнижчої ефективної дози залежно від відповіді на лікування та додаткових вимог до знебоління; пацієнти, які раніше не приймали опіоїди - підбирати найнижчу початкову дозу опіоїдів негайного вивільнення (морфін, гідроморфон, оксикодон, трамадол та кодеїн) для титрувати її, поки не буде досягнута доза, еквівалентна 25 мкг/год, потім можна перевести на застосування пластиру у дозуванні 25 мкг/год; у разі коли на початку лікування немає можливості застосовувати пероральні опіоїдні ЛЗ та використання пластиру є єдиним варіантом для лікування пацієнтів, які раніше не приймали опіоїди, застосовують найменшу дозу - 25 мкг/год; для пацієнтів, які в даний час приймають опіоїдні анальгетики, початкову дозу ЛЗ потрібно визначати з огляду на добову дозу попередніх анальгетиків; початкову оцінку максимального аналгетичного ефекту препарату не можна зробити менш ніж $\frac{1}{3}$ 24 год застосування пластиру, цей проміжок часу зумовлений поступовим підвищенням концентрації фентанілу в сироватці крові після першої аплікації; для успішного переходу з одного препарату на інший попередню знеболювальну терапію відмінюють поступово після аплікації початкової дози пластиру; пластир замінювати кожні 72 год; зазвичай за один раз дозу збільшують на 25 мкг/год^{БНФ}, необхідно враховувати стан пацієнта і потребу в додатковому знеболюванні (p/os доза морфіну 90 мг/добу приблизно відповідає дозі фентанілу 25 мкг/год), для досягнення дози понад 100 мкг/год. можна одночасно застосовувати кілька пластирів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперчутливість, анафілактичний шок, анафілактична / анафілактоїдна р-ція, анорексія, безсоння, депресія, тривога, сплутаність свідомості, галюцинації,ажитація, дезорієнтація, ейфорія, сонливість, запаморочення, головний біль, тремор, парестезія, гіпестезія, судоми (зокрема, клонічні судоми та великий епілептичний напад), амнезія, пригнічення свідомості, втрата свідомості, розмитість зору, звуження зіниць, вертиго, відчуття серцебиття, тахікардія, брадикардія, ціаноз, АГ, артеріальна гіпотензія, диспное, пригнічення дихання, респіраторний дистрес-с-м, апное, гіповентиляція, брадипное, нудота, блювання, запор, діарея, сухість у роті, біль у животі, біль у верхній частині живота, диспепсія, кишкова непрохідність, часткова кишкова непрохідність, гіпергідроз, свербіж, висип, еритема, екзема, алергічний дерматит, шкірні р-ції, дерматит, контактний дерматит, м'язові спазми, посмикування м'язів, затримка сечі, еректильна дисфункція, сексуальна дисфункція, втома, периферичні набряки, астенія, нездужання, відчуття холоду, реакція у місці застосування, грипоподібний стан, відчуття зміни температури тіла, р-ція гіперчутливості у місці введення, с-м відміни, пірексія, дерматит у місці застосування, екзема в місці застосування.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до фентанілу або до будь-якого компонента; г. або післяопераційний біль, $\frac{1}{3}$ неможливість титрування дози при короткочасному застосуванні та через ризик розвитку тяжкої або загрозованої для життя ДН, тяжка ДН; пацієнтам, які не є опіоїдостійкими; пацієнтам з г. або тяжкою астмою; пацієнтам з кишковою непрохідністю; лікування болю помірного ступеня.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
--	-------------------	-----------------	---------------	-----------	----------------------	----------------	-----------------------------

II.	ДЮРОГЕЗІК®	Янссен Фармацевтика НВ, Бельгія	пласт. т/д у пак. в кор.	25мкг/год, 50мкг/год, 75мкг/год, 100мкг/год	№1х5	відсутня у реєстрі ОБЦ
	ФЕНТАВЕРА 100 МКГ/ГОД	Асіно АГ (випуск серії)/Луїе Фарма АГ (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості та випуск серії), Німеччина/Німеччина	пласт. т/д у саше в кор.	100мкг/год	№1х5	відсутня у реєстрі ОБЦ
	ФЕНТАВЕРА 12 МКГ/ГОД	Асіно АГ (випуск серії)/Луїе Фарма АГ (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості та випуск серії), Німеччина/Німеччина	пласт. т/д у саше в кор.	12мкг/год	№1х5	відсутня у реєстрі ОБЦ
	ФЕНТАВЕРА 25 МКГ/ГОД	Асіно АГ (випуск серії)/Луїе Фарма АГ (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості та випуск серії), Німеччина/Німеччина	пласт. т/д у саше в кор.	25мкг/год	№1х5	відсутня у реєстрі ОБЦ
	ФЕНТАВЕРА 50 МКГ/ГОД	Асіно АГ (випуск серії)/Луїе Фарма АГ (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості та випуск серії), Німеччина/Німеччина	пласт. т/д у саше в кор.	50мкг/год	№1х5	відсутня у реєстрі ОБЦ
	ФЕНТАВЕРА 75 МКГ/ГОД	Асіно АГ (випуск серії)/Луїе Фарма АГ (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості та випуск серії), Німеччина/Німеччина	пласт. т/д у саше в кор.	75мкг/год	№1х5	відсутня у реєстрі ОБЦ
	ФЕНТАНІЛ М САНДОЗ®	Гексал АГ, Німеччина	т/д пласт. у пак. в кор.	25мкг/год, 50мкг/год, 75мкг/год, 100мкг/год	№1х5	відсутня у реєстрі ОБЦ

● **Апрепітант (Aprepitant)**

Фармакотерапевтична група: А04АD12- протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту.

Основна фармакотерапевтична дія: селективний антагоніст рецепторів нейрокініну 1 (NK₁) з високим ступенем спорідненості з речовиною людини Р (Р-нейропептид із сімейства тахікінінів); у 3000 разів селективніший відносно рецепторів NK₁, ніж відносно іншого ферменту, переносника іонного каналу і локалізації рецепторів, включаючи допамінові і серотонінові рецептори, які є об'єктами для проведення терапії нудоти і блювання, спричинених хіміотерапією; антагоністи NK₁-рецепторів унаслідок дії на ЦНС гальмують блювальний рефлекс, спричинений цитотоксичними хіміотерапевтичними препаратами, такими як цисплатин; проникає в мозок і зв'язується з NK₁-рецепторами мозку; дія на ЦНС досить тривала, він пригнічує гостроту і уповільнену фазу блювального рефлексу, спричиненого цисплатином, і збільшує протиблювальну активність антагоніста 5HT₃-рецепторів ондансетрону і кортикостероїду дексаметазону.

Показання для застосування ЛЗ: у складі комбінованої терапії: профілактика г. та відстроченої нудоти та блювання, пов'язаних з проведенням протиракової хіміотерапії на основі цисплатину з високим еметогенним ризиком у дорослих; профілактика нудоти та блювання, пов'язаних з використанням протиракової хіміотерапії з помірним еметогенним ризиком у дорослих^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо протягом 3 днів як частину схеми, що включає кортикостероїд і антагоніст 5-HT₃; рекомендована доза - 125 мг за 1 год. до хіміотерапії (день 1-й) і 80 мг 1 р/добу вранці на (день 2-й і 3-й)^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кандидоз, стафілококова інфекція, фебрильна нейтропенія, анемія, р-кції гіперчутливості, включаючи анафілактичні р-ції, зниження апетиту; полідипсія, тривожність; дезорієнтація, ейфоричний настрій, головний біль; запаморочення, сонливість; когнітивні розлади, летаргія, дисгевзія; кон'юнктивіт; дзвін у вухах, пальпітація; брадикардія; СС порушення, припливи, гикавка; біль у

роголотці, чхання, кашель, постназальний затік, подразнення гортані; запор, диспепсія; відрижка, нудота, блювання, ГЕРХ, абдомінальний біль, сухість у роті, метеоризм; перфорація дуоденальної виразки, стоматит, здуття живота, тверді випорожнення, нейтропенічний коліт, висип, акне; р-ція фоточутливості, гіпергідроз, себорея, враження шкіри, сверблячий висип, с-м Стівенса-Джонсона/токсичний епідермальний некроліз; свербіж, кропив'янка, м'язова слабкість, м'язові спазми, дизурія; полакіурія; підвищена втомлюваність; астенія, нездужання; набряк, дискомфорт в ділянці грудної клітки, порушення ходи; підвищення АЛТ; підвищення АСТ, підвищення рівня лужної фосфатази; позитивний тест сечі на еритроцити, зниження рівня натрію в крові, зменшення маси тіла, зменшення кількості нейтрофілів, наявність глюкози в крові, посилення діурезу.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого компонента ЛЗ; одночасне застосування з пімозидом, терфенадином, астемізолом і цизапридом.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 165 мг., парентерально - 150 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕМЕНД®	Алкермес Фарма Айеленд Лтд (виробництво нерозфасованої продукції та контроль якості)/Мерк Шарп і Доум Б.В. (первинне/вторинне пакування та дозвіл на випуск серії), Ірландія/Нідерланди	капс. у бл.	125мг + 80мг	комбі-уп. №3 (№1 + №2)	1679,24	28,05/\$

20. ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ

• Ретинол (Retinol) **

Фармакотерапевтична група: А11СА01- Прості препарати вітаміну А. Ретинол (вітамін А).

Основна фармакотерапевтична дія: належить до групи жиророзчинних вітамінів; відновлює нормальну концентрацію ретинолу в організмі; відіграє важливу роль у синтезі білків, ліпідів, мукополісахаридів, регулює баланс мінералів; забезпечує процеси фоторецепції; бере участь у синтезі зорового пурпуру - родопсину, що міститься в паличках сітківки; модулює процеси диференціювання епітеліальних клітин, бере участь у розвитку секреторних залоз, процесах кератинізації, регенерації слизових оболонок і шкіри; необхідний для нормального функціонування ендокринних залоз і росту організму, тому що є синергістом соматомединів; впливає на поділ імунотетентних клітин, синтез факторів специфічного (Ig) і неспецифічного (інтерферон, лізоцим) захисту організму від інфекційних та інших захворювань, стимулює мієлопоєз; підвищує рівень глікогену в печінці, стимулює продукцію трипсину і ліпази; інгібує фотохімічні вільнорадикальні р-ції та окислювання цистеїну; активує включення сульфатів у компоненти сполучної тканини, хрящів, кісток; забезпечує потребу в сульфocereброзидах та мієліні, забезпечуючи проведення і передачу нервових імпульсів; має протипухлинну дію, що не поширюється на неепітеліальні пухлини

Показання для застосування ЛЗ: А-авітаміноз та А-гіповітаміноз^{ВООЗ, БНФ}; пігментний ретиніт, ксерофтальмія^{БНФ}, гемералопія, екзематозні ураження повік, поверхневий кератит, ураження рогівки, кон'юнктивіт, піодермія; обмороження, опіки, рани, іхтіоз, фолікулярний дискератоз, старечий кератоз, туберкульоз шкіри, псоріаз, деякі форми екземи; комплексна терапія рахіту, колагенозів, гіпотрофій; у складі комплексної терапії г. респіраторних захворювань, які проходять на тлі ексудативного діатезу, г. та хр. бронхолегеневих захворювань; запальних, ерозивно-виразкових уражень кишечника, цирозу печінки

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо ч/з 10-15 хв. після їди; вища разова доза вітаміну А для дорослих 50000 МО, ММД - 100000 МО, терапевтичні дози при авітамінозах легкого та середнього ступеня тяжкості для дорослих до 33000 МО/добу; при захворюваннях шкіри, а також при пігментному ретиніті, ксерофтальмії, гемералопії добова доза 50000-100000 МО; при ураженнях поверхні шкіри (виразки, опіки, обмороження) уражені ділянки після гігієнічного очищення змазати р-ном і прикрити марлевою пов'язкою (5-6 р/добу, зі зменшенням кількості аплікацій до однієї залежно від епітелізації); дітям старше 7 років призначають по 3000-6000 МО/добу в залежності від характеру та перебігу захворювання; разова доза для дітей старше 7 років 5000 МО; вища добова доза для дітей старше 7 років 20000 МО. Одночасно препарати призначати внутрішньо. Для профілактики утворення конкрементів профілактичні дози встановлювати, виходячи з добової потреби організму людини у вітаміні А. Термін лікування - від 10 днів до 1 місяця.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тривалий прийом великих доз може спричинити розвиток гіпервітамінозу А; астения, швидка втомлюваність, сонливість, млявість, дратівливість, головний біль, втрата сну, судоми, дискомфорт, внутрішньоочна гіпертензія, порушення зору; втрата апетиту, зменшення маси тіла, нудота, блювання; загострення захворювань печінки, збільшення активності трансаміназ та лужної фосфатази, гепатотоксичні явища, портальна гіпертензія; олигоменорея; полакіурія, ніктурія, поліурія; гемолітична анемія; зміни на рентгенограмах кісток, розлад ходи, болючість кісток нижніх кінцівок; АР/реакції гіперчутливості - тріщини шкіри губ, жовто-оранжеві плями на підшвах, долонях, у ділянці носогубного трикутника, підшкірний набряк; в окремих випадках у перший день застосування можуть виникати сверблячі плямисто-папульозні висипання, що потребують відміни препарату; свербіж, еритема та висипання, сухість шкіри, сухість у роті, підвищення t°, гіперемія обличчя з подальшим луценням; випадання волосся, порушення менструального циклу, біль у животі/шлунку, афти, фоточутливість, гіперкальціємія; зі зменшенням дози або при тимчасовій відміні ЛЗ побічні явища зникають самостійно; при захворюваннях шкіри застосування високих доз ЛЗ після 7-10 днів лікування може супроводжуватися загостренням місцевої запальної реакції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату, г. і хр. нефрит, СН (II-III ст.) у стадії декомпенсації, жовчокам'яна хвороба, хр.панкреатит, гіпервітаміноз А, передозування ретиноїдів, гіперліпідемія, ожиріння, хр. алкоголізм, саркоїдоз (у т.ч. у анамнезі).

Визначена добова доза (DDD): перорально - 50 тис ОД.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ВІТАМІН А	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	капс. м'які у бл.	33000МО, 100000МО	№30, №20, №60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВІТАМІН А	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	капс. м'які у бл.	100000 МО	№10x5	0,39	
	ВІТАМІН А	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	капс. м'які у бл.	33000 МО	№10x5	0,92	
	ВІТАМІН А-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	капс. м'які у бл.	33000МО, 100000МО	№10, №20, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РЕТИНОЛУ АЦЕТАТ	АТ "ВІТАМІНИ", Україна	р-н нашк. та орал., олійн. у фл. по 10мл	34,4 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РЕТИНОЛУ	ПАТ "Вітаміни", Україна	р-н нашк. та орал.,	34,4 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

АЦЕТАТ		олійн. у фл. по 10мл				
РЕТИНОЛУ АЦЕТАТ (ВІТАМІН А)	ПрАТ "Технолог", Україна	р-н олійн. орал., по 10мл у скл. або полім. фл.	34,4 мг/мл	№1	9,45	

• **Піридоксин (Pyridoxine)** ^[ГІМД]

Фармакотерапевтична група: А11НА02 - прості препарати вітамінів. Піридоксин.

Основна фармакотерапевтична дія: в організмі фосфорилується в піридоксаль-5-фосфат - кофермент реакцій декарбоксілювання і переамінування амінокислот; бере активну участь у метаболізмі триптофану, метіоніну, цистеїну, глутамінової к-ти та інших амінокислот, обміні гістаміну; відіграє важливу роль у транспорті амінокислот ч/з клітинну мембрану; бере участь у синтезі білка, ферментів, порфіринів, гемоглобіну, простагландинів, в обміні серотоніну, катехоламінів, вітаміну В₆; покращує утилізацію ненасичених жирних кислот, нормалізує ліпідний обмін при атеросклерозі (знижує рівень холестерину і ліпідів), покращує скоротність міокарда, сприяє перетворенню фолієвої кислоти в її активну форму, стимулює гемопоєз; при атеросклерозі і ЦД знижує рівень глікозильованого гемоглобіну; чинить діуретичну дію, сприяє зниженню підвищеного АТ; потенціює дію діуретиків; при депресіях стимулює утворення норепінефрину і серотоніну; зв'язується з фібриногеном і специфічними аміногрупами на поверхні тромбоцитів, інгібує їх агрегацію.

Показання для застосування ЛЗ: гіпо- та авітаміноз вітаміну В₆ ^{вооз бнф}; комплексне лікування токсикозу вагітних, атеросклерозу, анемії ^{вооз бнф} (у т.ч. сидеробластої), лейкопенії, хвороб нервової системи (радикуліти, неврити, невралгії, паркінсонізм, хвороба Літтла), депресії інволюційного віку, себореєподібного та несекторейного дерматиту, оперізувального лишая, нейродерміту, псоріазу, ексудативного діатезу, при виведенні із запою і с-мі похмілля; повітряна та морська хвороби, хвороба Мен'єра; піридоксинзалежні судоми; попереджує або зменшує токсичні ефекти (особливо при поліневритах) при лікуванні ПТП ^{вооз, бнф, гмд}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/м, в/в або п/ш у випадках, коли р/ос прийом не можливий; гіповітаміноз В₆: добова доза 50-100 мг (1-2 мл) за 1-2 введення, курс лікування - 3-4 тижні; сидеробластна анемія: в/м у добовій дозі 100 мг (2 мл) 2 р/тиждень, одночасно приймати фолієву к-ту, рибофлавін, вітамін В₁₂; депресії інволюційного віку: в/м у дозі 200 мг (4 мл)/добу, курс лікування - 20-25 ін'єкцій; застосування препаратів групи ізоніазиду: добова доза 5-10 мг (0,1-0,2 мл) протягом усього курсу лікування ізоніазидом; передозування препаратів групи ізоніазиду: на кожен 1 г передозованого препарату вводять в/в 1 г (20 мл) піридоксину зі швидкістю 0,5 г/хв; при передозуванні ізоніазиду понад 10 г піридоксин вводять в/в 4 г (80 мл), а потім в/м - по 1 г (20 мл) кожні 30 хв; загальна добова доза - 70-350 мг/кг; токсикоз вагітних: в/м по 50 мг (1 мл)/добу; курс лікування - 10-20 ін'єкцій; піридоксинзалежна анемія (макроцитарна, гіпохромна з підвищенням рівня заліза у плазмі крові): добова доза 50-200 мг (1-4 мл); курс лікування - 1-2 місяці; піридоксинзалежний с-м, включаючи піридоксинзалежні судоми: в/в або в/м у дозі 50-500 мг (1-10 мл)/добу, в/в вводять зі швидкістю 50 мг/хв; курс лікування - 3-4 тижні; паркінсонізм: в/м у дозі 100 мг (2 мл)/добу, курс лікування 20-25 днів, ч/з 2-3 місяці - повторний курс або за іншою схемою: в/м у початковій добовій дозі 50-100 мг (1-2 мл), потім щоденно дозу збільшують на 50 мг (1 мл) і доводять до 300-400 мг (6-8 мл)/добу одноразово, лікування здійснюється курсами в 12-15 днів; інші показання: добова доза 50-100 мг (1-2 мл) за 1-2 введення; діти: гіповітаміноз В₆: 1-2 мг/кг маси тіла на добу, курс лікування - 2 тижні; піридоксинзалежні судоми: в/м або в/в струминно зі швидкістю 50 мг/хв у дозі 50-100 мг (1-2 мл)/добу; максимальні дози для дітей не встановлені; передозування препаратів групи ізоніазиду: на кожен 1 г передозованого препарату вводять в/в 1 г (20 мл) піридоксину; якщо доза ізоніазиду невідома, піридоксин вводять із розрахунку 70 мг/кг маси тіла; максимальна доза - 5 г (100 мл).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тахікардія, біль у ділянці серця; головний біль, запаморочення, сонливість, збудження, порушення координації, парестезії, оніміння в кінцівках, поява відчуття стискання в кінцівках - симптом «панчох і рукавичок», втрата свідомості і розвиток судом при швидкому в/в введенні; утруднене дихання; нудота, біль в епігастральній ділянці, печія, підвищення шлункової секреції; зниження рівня фолієвої кислоти; р-ції гіперчутливості, анафілактичний шок, кропив'янка, висипання, свербіж, гіперемія шкіри, дерматит, набряк Квінке, фотосенсибілізація; пригнічення лактації в лактогенний період (іноді використовують для лікувального ефекту); зміни у місці введення, включаючи гіперемію, свербіж, печіння в місці ін'єкцій; слабкість, гарячка.

Противказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату; виразкова хвороба шлунка і ДПК; захворювання печінки, що перебігають з тяжкою функціональною недостатністю; ІХС.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0.16 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	ПІРИДОКСИН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В6-ДАРНИЦЯ)	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у конт. чар/ уп.	50 мг/мл	№5x2	10,49	
	ПІРИДОКСИНУ ГІДРОХЛОРИД	АТ "Лубнифарм", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл в пач.	50 мг/мл	№10	11,78	
	ПІРИДОКСИНУ ГІДРОХЛОРИД - ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у бл.	50 мг/мл	№5x2, №10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ПІРИДОКСИНУ ГІДРОХЛОРИД - ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у кор.	50 мг/мл	№10	13,86	

ПІРИДОКСИНУ ГІДРОХЛОРИД (ВІТАМІН В6)	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у пач.	50 мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ПІРИДОКСИНУ ГІДРОХЛОРИД (ВІТАМІН В6)	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у кор.	50 мг/мл	№100	11,20	
ПІРИДОКСИНУ ГІДРОХЛОРИД (ВІТАМІН В6)	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у бл.	50 мг/мл	№5x2	11,29	

• **Тіамін (Thiamine)**

Фармакотерапевтична група: А11DA01 - прості препарати вітаміну В₁. Тіамін (вітамін В₁).

Основна фармакотерапевтична дія: синтетичний препарат водорозчинного вітаміну В₁; в організмі у результаті процесів фосфорилювання перетворюється на кокарбоксілазу, яка є коферментом багатьох ферментативних реакцій; відновлює дефіцит вітаміну В₁, який відіграє важливу роль в обміні речовин і нервово-рефлекторній регуляції, впливає на проведення нервового збудження у синапсах, виявляє гангліоблокуючий і курареподібний ефект.

Показання для застосування ЛЗ: гіпо- та авітаміноз В₁ ^{ВООЗ, БНФ} (у т. ч. у пацієнтів, які знаходяться на зондовому харчуванні, ГД, страждають с-мом мальабсорбції); у складі комплексної терапії: неврити, поліневрити, радикуліт, невралгія, периферичний парез та параліч, нейропатії (діабетичні, алкогольні), енцефалопатія (у т. ч. енцефалопатія Верніке-Корсакова), неврастенії, хр. ураження печінки, міокардіодистрофія, виразкова хвороба шлунка та ДПК, атонія кишечника, ендартеріїт, дерматози (екзема, atopічний дерматит, піодермія, псоріаз, червоний плесканий лишай) з нейтрофічними змінами і порушеннями обміну речовин.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/м дорослим (глибоко у м'яз) у дозі 25-50 мг (0,5-1 мл) 1 р/добу, щоденно; введення розпочинають з малих доз - не більше 25 мг (0,5 мл 5 % р-ну) і тільки за умови доброї переносимості вводять вищі дози - 50 мг (1 мл 5 % розчину); курс лікування - 10-30 ін'єкцій; енцефалопатія Верніке-Корсакова: по 50-100 мг (1-2 мл 5 % р-ну) 2 р/добу до клінічного поліпшення; дітям старше 8 років - по 12,5 мг (0,25 мл 5 % р-ну) 1 р/добу; курс лікування - 10-30 ін'єкцій.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тахікардія, відчуття серцебиття, колапс; головний біль, запаморочення, занепокоєння, парестезії; ураження зорового нерва; утруднене ковтання та дихання, задишка; нудота, кишкові геморагії; висипання, свербіж, дерматит, гіперемія, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, бронхоспастичний с-м із судомами, анафілактичний шок; порушення активності ферментів печінки; підвищене протовідлягання, озноб, тремор, загальна слабкість, набряки, гарячка; явище синаптоплегії - здатність тіаміну утворювати комплекси з різними медіаторами може супроводжуватися зниженням АТ, виникненням серцевих аритмій, порушенням скорочення скелетних м'язів (в т. ч. дихальних), пригніченням ЦНС; тіамін сприяє виробленню резистентності стафілококів до а/б, гіперкоагуляція, порушення пуринового обміну.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату, алергічні захворювання, ідіосинкразія, передклімактеричний і клімактеричний періоди у жінок.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 50 мг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ТІАМІНУ ХЛОРИД (ВІТАМІН В1)	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у пач.	50 мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТІАМІНУ ХЛОРИД (ВІТАМІН В1)	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у бл.	50 мг/мл	№5x2	3,20	
	ТІАМІНУ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В1-ДАРНИЦЯ)	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у конт. чар/уп.	50 мг/мл	№5x2	2,98	
	ТІАМІНУ ХЛОРИД-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у бл.	50 мг/мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ТІАМІНУ ХЛОРИД-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у бл. або кор.	50 мг/мл	№10x1, №10	3,93	

• **Токоферол (Tocopherol) ****

Фармакотерапевтична група: А11НА03 - прості препарати вітамінів. Токоферол (вітамін Е).

Основна фармакотерапевтична дія: жиророзчинний вітамін, має високу антиоксидантну (захисає різні ендогенні речовини організму від окиснення) і радіопротекторну дію, уповільнює перекисне окислення ліпідів, бере участь у процесах тканинного дихання, біосинтезі гема і білків, обміні жирів та вуглеводів, проліферації клітин та інших найважливіших процесах клітинного метаболізму; покращує споживання тканинами кисню; чинить ангіопротекторну дію, впливаючи на тонус і проникність судин, стимулюючи утворення нових капілярів; імуномодулюючий ефект токоферолу зумовлений стимуляцією Т-клітинного та гуморального імунітету; є незамінним для нормальних репродуктивних процесів: запліднення, розвитку плода, формування та функціонування статевої системи.

Показання для застосування ЛЗ: у складі комплексної терапії для попередження порушень ембріонального розвитку плода, вегетативних розладів, як допоміжний засіб у гормональному лікуванні порушень менструального циклу, при загрозі переривання вагітності, при нейросенсорних розладах слуху, у лікуванні деяких випадків пародонтопатій (парадонтоз) та ендокринних розладів (захворювань щитовидної залози, ЦД); атрофічні процеси в слизовій оболонці дихальних шляхів і травної системи; неврастенія при станах, що супроводжуються виснаженням, м'язова дистрофія та атрофія м'язів (різного характеру та генезу); дегенеративні та проліферативні зміни у суглобах та фіброзній тканині хребта і великих суглобів, суглобні і сухожильно-м'язові контрактури (контрактури Дюпюїтрена), системні захворювання сполучної тканини (РА, дерматоміозит, ревматизм і фіброзит); вторинна слабкість м'язів та міопатія при хронічному артриті, м'язова слабкість внаслідок частих рецидивів дискогенних блокад; у комбінації з вітаміном А при безплідді у чоловіків; розлади харчування, синдром мальабсорбції, аліментарна анемія; у складі антиоксидантної терапії та терапії хронічного гепатиту; пластична індурація пеніса, крауроз вульви, склеродермія, екзема, баланіт; ураження спинного мозку (бічний аміотрофічний склероз), периферичних судин, атеросклероз судин, міокардіодистрофія, гіпертонічна хвороба; алергічні та виразкові ураження шкіри, псоріаз; діти - гемолітична жовтяниця немовлят, підвищена проникність капілярів у дітей грудного віку, гіпотрофія, рахіт, порушення розвитку, ЮРА, склеродермія, гіпохромна анемія

Спосіб застосування та дози ЛЗ: комплексна антиоксидантна терапія: 200-400 мг 1-2 р/добу; для попередження патології ембріонального розвитку, вроджених аномалій плода: 100-200 мг 1 р/добу у І триместрі вагітності; при загрозі переривання вагітності: 100-150 мг на добу 14 днів; при аборті та погіршенні внутрішньоутробного розвитку плода: 100-150 мг щоденно або через день у перші 2-3 місяці вагітності; при порушеннях менструального циклу у комплексному лікуванні: 300-400 мг ч/з день, починаючи з 17-го дня циклу (повторити 5 циклів); при порушеннях менструального циклу у разі застосування препарату до початку гормональної терапії: 100 мг 1-2 р/добу протягом 2-3 місяців; при РА: 100-300 мг/добу щоденно протягом кількох тижнів; при м'язових дистрофіях, хворобах нервово-м'язового та сухожильно-суглобового апарату: 100 мг 1-2 р/добу 30-60 дн., повторний курс - через 2-3 міс.; при неврастенії з виснаженням - 100 мг 1 р/добу; при деяких ендокринних розладах: 300-500 мг/добу; при атросклерозі, міокардіодистрофії, захворюваннях периферичних судин: 100 мг/добу, курс 20-40 днів з повторним лікуванням через 3-6 міс.; при терапії серцево-судинних захворювань: 50-100 мг 1-2 р/добу, курс 1-3 тижні; при аліментарній анемії: 300 мг/добу 10 дн.; при хронічному гепатиті: 300 мг/добу тривало; при деяких пародонтопатіях: 200-300 мг/добу; при хворобах шкіри: 100-200 мг (50-100 мг)/добу 20-40 днів; при пластичній індурації пеніса: 300-400 мг/добу протягом кількох тижнів, потім за призначенням лікаря; при порушеннях сперматогенезу та потенції у чоловіків: 100-300 мг/добу + гормонотерапія 30 дн.; при гемолітичній жовтяниці немовлят, підвищеній проникності капілярів у дітей грудного віку, гіпотрофії, рахіті, порушеннях розвитку, гіпохромній анемії, захворюваннях сполучної тканини - склеродермії, ЮРА: 5-10 мг/добу, курс лікування визначає лікар індивідуально

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: посилення гіпотромбінемії, зорові розлади, запаморочення, нудота, розвиток шлунково-кишкових кровотеч, діарея, біль у шлунку, збільшення печінки, креатинурія, розлади травлення, підвищена втомлюваність, загальна слабкість, головний біль, АР, включаючи шкірні висипи, свербіж, почервоніння шкіри та підвищення t°.

Противпоказання до застосування ЛЗ: підвищена індивідуальна чутливість до діючої речовини та до будь-яких компонентів ЛЗ, тяжкий кардіосклероз, г. ІМ, тиреотоксикоз, гіпервітаміноз Е, капс. - дитячий вік до 12 років

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛУ АЦЕТАТ (ВІТАМІН Е)	ПрАТ "Технолог", Україна	р-н олійн. орал. по 20мл у фл.	50 мг/мл	№1	3,25	
	АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛУ АЦЕТАТ (ВІТАМІН Е)	ПрАТ "Технолог", Україна	р-н олійн. орал. по 20мл у фл.	100 мг/мл	№1	2,10	
	АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛУ АЦЕТАТ (ВІТАМІН Е)	ПрАТ "Технолог", Україна	р-н олійн. орал. по 20мл у фл.	300 мг/мл	№1	1,08	
	ВІТАМІН Е	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	капс. м'які у бл. в пач.	100мг, 400мг	№10, №20, №30, №40, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВІТАМІН Е	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	капс. м'які у бл. в пач.	100мг	№20x3	1,73	
	ВІТАМІН Е	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	капс. м'які у бл.	100мг	№10	2,05	
	ВІТАМІН Е	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	капс. м'які у бл. в пач.	100мг	№10x5	2,09	
	ВІТАМІН Е	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	капс. м'які у бл. в пач.	200мг	№10x3	2,01	

	ВІТАМІН Е	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	капс. м'які у бл.	200мг	№10	21,38	
	ВІТАМІН Е	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	капс. м'які у бл.	400мг	№10x3	1,37	
	ВІТАМІН Е-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	капс. м'які у бл.	100мг, 200мг, 400мг	№10, №20, №30, №50, №60		відсутня у реєстрі ОБЦ
II.	ВІТАМІН Е 200-САНОФІ	АТ "Санека Фармасьютикалз", Словацька Республіка	капс. м'які у фл.	200мг	№30		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ВІТАМІН Е 400-САНОФІ	АТ "Санека Фармасьютикалз", Словацька Республіка	капс. м'які у фл.	400мг	№30		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ВІТАМІН Е-САНОФІ	АТ "Санека Фармасьютикалз", Словацька Республіка	капс. м'які у фл.	100мг	№30		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ЕНАТ 100	Мега Лайфсайенсіз Паблік Компані Лімітед, Таїланд	капс. м'які у бл.	100 МО	№10x3		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ЕНАТ 200	Мега Лайфсайенсіз Паблік Компані Лімітед, Таїланд	капс. м'які у бл.	200 МО	№10x3		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ЕНАТ 400	Мега Лайфсайенсіз Паблік Компані Лімітед, Таїланд	капс. м'які у бл.	400 МО	№10x3		відсутня у реєстрі ОБЦ

● **Кислота аскорбінова (Ascorbic acid)** *[тільки таблетки]*

Фармакотерапевтична група: А11GA01 - прості препарати аскорбінової кислоти (вітаміну С). Аскорбінова кислота (вітамін С).

Основна фармакотерапевтична дія: аскорбінова кислота належить до групи водорозчинних вітамінів; бере участь в окисно-відновних реакціях, у багатьох процесах обміну - в регуляції вуглеводного обміну, обміну ароматичних амінокислот, тироксину, перетворення фолієвої кислоти на фолінієву, у синтезі катехоламінів, стероїдних гормонів, інсуліну, є необхідною складовою частиною у процесі зсідання крові, синтезу колагену, проколагену, регенерації сполучної та кісткової тканин, синтезі ліпідів та білків, процесах клітинного дихання; регулює проникність капілярів (пригнічує гіалуронідазу); бере участь у всмоктуванні заліза та синтезі гемоглобіну; за участю вітаміну С відбувається інактивація вільних радикалів, що запобігає ушкодженню мембран клітин (лімфоцитів), внаслідок перекисного окислення, така дія спричиняє цілий ряд імуномодуючих ефектів - посилює хемотаксис, синтез та вивільнення інтерферону, покращує міграцію лімфоцитів; підвищує неспецифічну та імунну резистентність організму; має антидотні властивості; в організмі людини не синтезується; недостатне надходження з їжею призводить до розвитку гіпо- або авітамінозу.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика та лікування дефіциту вітаміну С; цинга^{ВООЗ, БНФ}, кровотечі (маткові, легеневі, носові, печінкові), геморагічні діатези, кровотечі як с-м променевої хвороби, різні інтоксикації та інфекційні захворювання, нефропатія вагітних, аддісоновий криз, передозування антикоагулянтів, переломи кісток і в'ялогранулюючі рани, різні дистрофії, підвищене мозкове напруження і важка фізична праця; забезпечення підвищеної потреби організму у вітаміні С у період росту, вагітності або годування груддю (табл., драже).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: *в/в струминно або крапл. і в/м;* в/в струминно вводити протягом 1-3 хв.; для в/в крапл. введення разову дозу розчинити у 50-100 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду і вводити повільно в/в зі швидкістю 30-40 крапл. за хв.; в/м вводити глибоко у м'яз; дорослим і дітям віком від 12 років - 50-150 мг/добу; при отруєннях добову дозу можна підвищувати до 500 мг; максимальна разова доза - 200 мг, добова - 1 г; дітям до 12 років призначати в/в у добовій дозі 5-7 мг/кг маси тіла у вигляді 5 % р-ну (0,5-2 мл); зазвичай для дітей добові дози становлять: у віці до 6 міс. - 30 мг, 6-12 міс. - 35 мг, 1-3 роки - 40 мг, 4-10 років - 45 мг, 11-12 років - 50 мг. МДД- 100 мг; *внутрішньо*, після їжі, дорослим та дітям від 14 років: з метою профілактики - 50-100 мг/добу, дітям від 3 до 14 років - 50 мг/добу; з метою лікування: дорослим та дітям від 14 років - 50-100 мг 3-5 р/добу, дітям від 3 до 7 років - 50-100 мг 2-3 р/добу, дітям віком 7-10 років - 100 мг 2-3 р/добу, дітям віком 10-14 років - 100-150 мг 2-3 р/добу; вагітним і жінкам після пологів та при низькому рівні вітаміну С у грудному молоці - 300 мг/добу 10-15 днів, потім для профілактики 100 мг/добу протягом усього періоду годування груддю.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тромбоцитоз, гіперпротромбінемія, тромбоутворення, еритроцитопенія, нейтрофільний лейкоцитоз, у хворих із недостатністю глюкозо-6-фосфатдегідрогенази кров'яних тілець може спричинити гемоліз еритроцитів, гемолітична анемія; головний біль, відчуття втоми, порушення сну, підвищення збудливості ЦНС, порушення сну; подразнення слизової оболонки травного тракту, печія, нудота, діарея, блювання, спазми шлунка; гіпероксальтурія; пошкодження гломерулярного апарату нирок, кристалурія, формування ниркових каменів з оксалату кальцію, уратних, цистинових, НН; р-ціі гіперчутливості, бронхоспазм, анафілактичний шок; шкірні висипання, гіперемія шкіри, екзема, свербіж, набряк Квінке, кропив'янка,

підвищення t° тіла, зміни в місці введення; гіпервітаміноз С, пригнічення функції інсулярного апарату підшлункової залози (гіперглікемія, глюкозурія) і синтезу глікогену аж до появи ЦД, затримка натрію і рідини, порушення обміну цинку і міді; зниження проникності капілярів, погіршення трофіки тканин; АГ, дистрофія міокарда, підвищення АТ, розвиток мікроангіопатій; при в/в введенні можливе відчуття жару, озноб; загроза переривання вагітності.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена індивідуальна чутливість до аскорбінової кислоти або до будь-якого з допоміжних компонентів препарату, ЦД, підвищене згортання крові, тромбоз, схильність до тромбозів, тромбофлебіт, СКХ (в т.ч. гіпероксалурія), тяжка ниркова недостатність, тяжкі захворювання нирок, прогресуючі злоякісні захворювання, гемохроматоз, таласемія, поліцитемія, лейкемія, сидеробластна анемія, серпоподібноклітинна анемія, дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази; непереносимість фруктози, синдром мальабсорбції глюкози-галактози

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,2 г., парентерально - 0,2 г., перорально - дитяча добова доза не визначена, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АСКОРБІНКА®-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. зі смак. м'яти в етикет.	25мг	№10	4,50	
	АСКОРБІНКА®-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. зі смак. полун. в етикет.	25мг	№10	4,50	
	АСКОРБІНКА®-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. зі смак. лимона в етикет.	25мг	№10	4,50	
	АСКОРБІНКА®-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. зі смак. дині в етикет.	25мг	№10	4,50	
	АСКОРБІНКА®-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. зі смак. манго в етикет.	25мг	№10	4,50	
	АСКОРБІНКА®-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. зі смак. тутті-фрутті в етикет.	25мг	№10	4,50	
	АСКОРБІНКА®-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. зі смак. банана в етикет.	25мг	№10	4,50	
	АСКОРБІНКА®-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. в етикет.	25мг	№10	4,50	
	АСКОРБІНКА®-КВ	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. зі смак. апельс. в етикет.	25мг	№10	4,50	
	АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. жув. у бл.	50мг	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	АТ "Лубнифарм", Україна	табл. жув. у бл. в пач.	50мг	№10x5	1,12		
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	АТ "Лубнифарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп.	50 мг/мл	№10	5,43		
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у пач.	50мг/мл, 100мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ		
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у бл.	50 мг/мл	№5x2	5,52		
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у кор.	50 мг/мл	№100	5,52		
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у бл.	100 мг/мл	№5x2	3,35		
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	ПрАТ "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. укор.	100 мг/мл	№100	3,35		
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	драже. у бл. та конт. в пач. та без	50мг	№10, №10x3, №160	відсутня у реєстрі ОВЦ		
АСКОРБІНОВА	АТ "КИЇВСЬКИЙ	драже. у конт.	50мг	№160	0,39		

КИСЛОТА	ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна					
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	драже. у бл.	50мг	№50	0,55	
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	ПрАТ "Технолог", Україна	драже у конт.	50мг	№50	0,75	
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. у конт.	25мг	№100	13,16	
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. у конт.	25мг	№50	7,48	
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контр. якості, вип. серії), Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл, 2мл в амп. у пач. та бл.	50 мг/мл	№5x2, №10x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контр. якості, вип. серії), Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у пач.	50 мг/мл	№10	4,75	
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/ ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії вир-ва, контр. якості, вип. серії), Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у пач.	50 мг/мл	№10	6,32	
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА- ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у конт. чар/уп.	50 мг/мл	№5x2	4,87	
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА- ДАРНИЦЯ	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у конт. чар/уп.	100 мг/мл	№5x2	2,67	
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА- ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у бл.	50мг/мл, 100мг/мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА- ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у кор. або бл.	50 мг/мл	№10, №10x1	5,53	
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА- ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у кор. або бл.	100 мг/мл	№10, №10x1	3,88	
ВІТАМІН С	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. жув. у бл.	500мг	№8x3, №8x7	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ВІТАМІН С	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл. жув. зі смак. апельс. у бл.	500мг	№8x3, №8x7	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ВІТАМІН С 500	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. жув. у бл. та конт. зі смак. перс. та лимона	500мг	№10, №30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ВІТАМІН С 500	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. жув. у бл. та конт. в пач. та без	500мг	№10, №20, №100, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ	

ВІТАМІН С 500	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. жув. у конт.	500мг	№30	0,45	
ВІТАМІН С 500	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	табл. жув. у бл. в пач.	500мг	№10x1	0,58	
ВІТАМІН С 500	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. жув. з апельс. смак. у бл. та конт. в пач.	500мг	№10x3, №30x1		відсутня у реєстрі ОБЦ
ВІТАМІН С 500	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. жув. з апельс. смак. у бл.	500мг	№10	0,33	
ВІТАМІН С 500	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	табл. жув. з апельс. смак. у конт.	500мг	№30	0,36	
ВІТАМІН С 500 АПЕЛЬСИНОВИЙ	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	табл. жув. у бл.	500мг	№10x10, №12x2		відсутня у реєстрі ОБЦ
ВІТАМІН С 500 АПЕЛЬСИНОВИЙ	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна	табл. жув. у бл.	500мг	№10x2	0,30	

● **Кислота нікотинова (Nicotinic acid)** [тільки таблетки]

Фармакотерапевтична група: С04АС01 - периферичні вазодилататори. Нікотинова к-та та її похідні.

Основна фармакотерапевтична дія: нікотинова кислота (вітамін РР) і її амід є простетичною групою ферментів - кодегідрози І (дифосфопіридиннуклеотиду - НАД) і кодегідрози ІІ (трифосфопіридиннуклеотиду - НАДФ), які здійснюють перенесення водню в окисно-відновних реакціях, а також перенесення фосфату; беручи участь в обміні речовин, тканинному диханні, процесах синтезу, нікотинова кислота нормалізує вміст ліпопротеїдів і тригліцеридів у крові; має вазодилатуючий вплив на рівні преартеріол та артеріол (у т. ч. головного мозку), чим поліпшує мікроциркуляцію; чинить слабку антикоагулянтну дію (підвищує фібринолітичну активність крові), має дезінтоксикаційні властивості завдяки посиленню дезінтоксикаційної функції печінки та нирок; ліквідує дефіцит вітаміну РР.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика та лікування пелагри (авітаміноз вітаміну РР); ішемічні порушення мозкового кровообігу; спазм судин кінцівок (облітеруючий ендартеріїт, хвороба Рейно); спазм судин нирок; спазми судин головного мозку; рани, виразки, рани, виразки, що тривалий час не загоюються; ускладнення ЦД (діабетична полінейропатія, мікроангіопатія); захворювання печінки (г. та хр. гепатити); неврит лицьового нерва; гіпоацидний гастрит, ентероколіт, коліт; атеросклероз^{БНФ}; інтоксикації різного генезу: професійні, алкогольні, медикаментозні (похідними аніліну, барбітуратами, протитуберкульозними засобами, сульфаніламидами).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим і дітям віком від 15 років в/в (повільно), в/м і п/ш; при пелагрі: в/в або в/м по 10 мг (1 мл) 1-2 р/добу; курс лікування - 10-15 днів; ішемічні порушення мозкового кровообігу: в/в (повільно) 10 мг (1 мл); інші показання: п/ш або в/м по 10 мг (1 мл) 1 р/день протягом 10-15 днів; вищі дози при в/в введенні: разова - 100 мг (10 мл), добова - 300 мг (30 мл); внутрішньо^{БНФ}: при пелагрі дорослим по 100 мг 2-4 р/добу протягом 15-20 днів; дітям з 12 років - по 50 мг 2-3 р/добу; при інших захворюваннях дорослим по 50 мг (до 100 мг) 1-2 р/добу, дітям з 12 років - по 25 мг 2 р/добу; вищі дози для дорослих: разова - 100 мг, добова - 500 мг; вищі дози для дітей: разова - 50 мг, добова - 200 мг; при атеросклерозі (при відсутності побічних ефектів) разову дозу можна поступово збільшити до 500 мг-1 г^{БНФ}, а добову - до 2-3 г.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: відчуття припливів, що може супроводжуватись задишкою, тахікардією, серцебиттям, потінням, ознобом, набряками, відчуттям поколювання і печіння; значне зниження АТ, ортостатична гіпотензія, колапс, головний біль, запаморочення, парестезії, гіперемія шкіри обличчя та верхньої частини тулуба з відчуттям поколювання і печії, АР (у т. ч. висипання, виснажливий свербіж, кропив'янка), сухість шкіри і слизової оболонки очей; набряк сітківки очей; аритмії, акантоз, гіперпигментація, гіперкератоз, судоми, діарея, нудота, блювання, анорексія, загострення виразки шлунка, амбліопія, жовтяниця, гіперурикемія, жирова дистрофія печінки, порушення функції печінки, підвищення рівнів глюкози (зниження толерантності), сечової кислоти, АСТ, аспартатамінотрансферази, ЛДГ і лужної фосфатази у крові, гіпофосфатемія, зниження кількості тромбоцитів, подовження протромбінового часу, безсоння, міалгія, зниження АТ, риніт, затуманення зору, набряк повік, міопатія, екзофоліативний дерматит, рабдоміоліз (при застосуванні з ловастатином), болісність, припухлість у місці п/ш і в/м ін'єкцій

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до компонентів препарату, виразкова хвороба шлунка та ДПК (у ст.загострення), подагра, гіперурикемія, тяжка печінкова недостатність (у т. ч. цироз), тяжкі форми АГ та атеросклерозу (в/в введення), декомпенсований ЦД, нещодавній ІМ, раптове зниження периферичного судинного опору в анамнезі, СКХ.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,2 г., перорально - 0,2 г.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	КИСЛОТА НІКОТИНОВА	ПрАТ "Технолог", Україна	табл. у конт.	50мг	№50	1,29	
	НИКОТИНОВА КИСЛОТА-	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у	10 мг/мл	№5x2	83,36	

ДАРНИЦЯ		конт. чар/уп.				
НИКОТИНОВА КИСЛОТА-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	10 мг/мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
НИКОТИНОВА КИСЛОТА-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл. або кор.	10 мг/мл	№10x1, №10	83,36	

• **Ергокальциферол (Ergocalciferol)**

Фармакотерапевтична група: А11СС01 - препарати вітаміну D та його аналогів.

Основна фармакотерапевтична дія: регулює обмін фосфору і кальцію в організмі, сприяє їх всмоктуванню в кишечнику за рахунок збільшення проникності його слизової оболонки і адекватному депонуванню в кістковій тканині; дія посилюється при одночасному надходженні сполук кальцію і фосфору; відноситься до групи вітамінів, розчинних у оліях.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика та лікування гіповітамінозу D^{ВООЗ, БНФ}, рахіту, при захворюваннях кісток, зумовлених порушенням обміну кальцію (різні форми остеопорозу, остеомаляція), при порушеннях функцій парашитовидних залоз^{ВООЗ}, (тетанія), туберкульозі шкіри та кісток, псоріазі, системному червоному вовчаку (СЧВ) шкіри і слизових оболонок.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо^{ВООЗ, БНФ} під час їди; 1 мл р-ну містить 50000 МО; 1 крапл. з очної піпетки або дозуючого пристрою містить близько 1400 МО; рахіт - по 1400-5600 МО/добу протягом 30-45 днів; після досягнення лікувального ефекту переходять на профілактичне призначення по 500 МО/добу до досягнення дитиною 3-річного віку; у літні місяці роблять перерву у прийомі; для профілактики рахіту у новонароджених та дітей грудного віку призначають вагітним та матерям-годувальницям; при вагітності з 30-32 тижнів - 1400 МО/добу протягом 6-8 тижнів; матерям-годувальницям - по 500-1000 МО/добу з перших днів годування і до початку його призначення дитині; з метою профілактики доношеним дітям призначають із 3-ого тижня життя; недоношеним та дітям, які знаходяться на штучному вигодовуванні, близнюкам, дітям, які перебувають у несприятливих екологічних і побутових умовах, призначають із 2-ого тижня життя; для профілактики рахіту можна призначати різними методами: фізіологічний метод - щоденно доношеним дітям, протягом 3-х років, за винятком 3-х літніх місяців - по 500 МО/добу (курсова доза на рік - 180000 МО); курсовий метод - щоденно дитині по 1400 МО протягом 30 днів на 2-6-10-му місяці життя, у подальшому - до 3-річного віку по 2-3 курси на рік з інтервалами у 3 місяці (курсова доза на рік - 180000 МО); недоношеним дітям добова профілактична доза може бути збільшена до 1000 МО щоденно протягом першого півріччя життя; у подальшому - по 1400-2800 МО/добу протягом місяця 2-3 р/рік з інтервалами 3-4 місяці; лікування туберкульозного вовчаку у дорослих - 100000 МО/добу, дітям до 16 років добова доза від 25000 до 75000 МО (за 2 прийоми); курс лікування - 5-6 міс.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: при довготривалому застосуванні високих доз можливі: реакції гіперчутливості, у т.ч. висипання, кропив'янка, свербіж; головний біль, вертиго, порушення сну, роздратування, депресії; гіперфосфатемія, підвищення у сечі рівня кальцію (можливий кальциноз внутрішніх органів); анорексія, втрата апетиту, діарея, нудота, блювання; біль у кістках; протеїнурія, циліндрурія, лейкоцитурія; загальна слабкість, пропасниця.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату; гіпервітаміноз D; активна форма туберкульозу легень; виразкова хвороба шлунка та ДПК; г. та хр. захворювання печінки та нирок; органічні захворювання серця та судин у ст. декомпенсації; підвищений рівень кальцію та фосфору в крові та сечі; саркоїдоз; СКХ.

Визначена добова доза (DDD): перорально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЕРГОКАЛЬЦИФЕРОЛ	АТ "Вітаміни", Україна	р-н орал., олійн. по 10мл у фл. скл. або полім.	1,25 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕРГОКАЛЬЦИФЕРОЛ	ПАТ "Вітаміни", Україна	р-н орал., олійн. по 10мл у фл. скл. або полім.	1,25 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕРГОКАЛЬЦИФЕРОЛ (ВІТАМІН D2)	ПрАТ "Технолог", Україна	р-н орал., олійн. по 10мл у фл.	1,25 мг/мл	№1	18,00	

• **Ціанкообаламін (Cyanocobalamin) ***

Фармакотерапевтична група: В03ВА01- антианемічні засоби, препарати вітаміну В₁₂.

Основна фармакотерапевтична дія: ціанкообаламін активує обмін вуглеводів, білків та ліпідів, бере участь у синтезі лабільних груп, в утворенні холіну, метіоніну, нуклеїнових кислот, креатину, сприяє накопиченню в еритроцитах сполук з сульфгідрильними групами; стимулює функцію кісткового мозку, що необхідно для нормобластичного еритропоезу; сприяє нормалізації порушених функцій печінки та нервової системи, активує систему згортання крові, в високих дозах спричиняє підвищення тромбoplastичної активності та активності протромбіну; знижує концентрацію холестерину в крові; підвищує здатність тканин до регенерації.

Показання для застосування ЛЗ: злоякісні, постгеморагічні та залізодефіцитні анемії; апластичні анемії у дітей, анемії аліментарного характеру; анемії спричинені токсичними речовинами і ЛЗ, анемії, пов'язані з дефіцитом вітаміну В₁₂^{БНФ}, незалежно від причин дефіциту (резекція шлунка, глистні інвазії, порушення процесу всмоктування з кишечника^{БНФ}, вагітність); поліневрити, невралгії трійчастого нерва, радикуліт, каузалгія, мігрень, діабетичні неврити, аміотрофічний боковий склероз, ДЦП, хвороба Дауна, алкогольний делірій, дистрофії у дітей,

після перенесених інфекційних захворювань, при спру (разом з фолієвою кислотою), захворювання печінки (гепатити, цироз, хвороба Боткіна), променева хвороба, псоріаз, герпетичний дерматит, нейродерміт, фотодерматоз; порушення дозрівання еритроцитів (гіперхромна макроцитарна мегалобластна анемія, перніціозна анемія та інші макроцитарні анемії) та/або неврологічні розлади (фунікулярний мієлоз - захворювання спинного мозку), дефіцит вітаміну В₁₂ внаслідок довготривалої нестачі поживних речовин (сувора вегетеріанська дієта), порушення всмоктування їжі (мальабсорбція через недостатнє утворення внутрішнього фактора), захворювання клубової кишки (наприклад целиакії), спадкового порушення транспортування вітаміну В₁₂.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/м, п/ш або в/в, при фунікулярному мієлозі і аміотрофічному боковому склерозі *також інтралюмбально*; дорослі: В₁₂-дефіцитні анемії - 100-200 мкг ч/з день до досягнення ремісії; симптоми фунікулярного мієлозу і макроцитарні анемії з ушкодженням нервової системи - разова доза 400-500 мкг і більше; 7 днів, а потім - з інтервалами 5-7 днів; у тяжких випадках вводять у спинномозковий канал, починаючи з разової дози 15-30 мкг, при кожній наступній ін'єкції дозу збільшують (50, 100, 150, 200 мкг); інтралюмбально кожні 3 дні, всього на курс - 8-10 ін'єкцій; в період ремісії при відсутності явищ фунікулярного мієлозу для підтримуючої терапії по 100 мкг 2 р/місяць, при наявності неврологічних симптомів - по 200-400 мкг 2-4 рази протягом місяця; постгеморагічні та залізодефіцитні анемії - 30-100 мкг 2-3 р/тиждень; при боковому аміотрофічному склерозі, енцефаломієліті, неврологічних захворюваннях з болювим с-мом вводять у зростаючих дозах від 200 до 500 мкг на ін'єкцію (при покращенні - 100 мкг/добу); курс лікування - 14 днів; при травмах периферичних нервів 200-400 мкг 1 раз у 2 дні протягом 40-45 днів; при гепатитах і цирозах печінки по 15-30 мкг/добу або 100 мкг ч/з день протягом 25-40 днів; при діабетичній невропатії, спру, променевої хвороби вводять 60-100 мкг щоденно протягом 20-30 днів; при дефіциті вітаміну В₁₂ для лікування - в/м і в/в по 1 мг кожний день протягом 1-2 тижнів, підтримуюча доза - 1-2 мг в/м або в/в від 1 р/тиждень до 1 р/місяць; при постгеморагічних та залізодефіцитних анеміях - по 30-100 мкг 2-3 р/тиждень; при апластичних анеміях - по 100 мкг до настання клініко-гематологічного покращення; при анеміях аліментарного характеру - по 30 мкг протягом 15 днів; при дистрофіях у дітей раннього віку, хворобі Дауна і ДЦП по 15-30 мкг ч/з день; при гепатитах і цирозах печінки - по 15-30 мкг/добу або по 100 мкг ч/з день протягом 25-40 днів; *перорально*, дорослим з гематологічними та додатковими тяжкими неврологічними порушеннями підтримуюча терапія - 1-2 табл./добу; дорослим з окремими тяжкими неврологічними порушеннями підтримуюча терапія - 1-2 табл./добу; дорослим з гематологічними та/або неврологічними порушеннями початкова терапія - 2 табл. 2 р/добу, підтримуюча терапія - 1-2 табл./добу; дорослим без гематологічних та неврологічних порушень початкова терапія - 1-2 табл. 2р/добу, підтримуюча терапія - 1-2 табл./добу; дорослим після постгастректомії або ін. резорбцій/які дотримуються дієти початкова/підтримуюча терапія - 1-2 табл./добу, табл. ковтати цілими, не розжовуючи, запиваючи достатньою кількістю води, бажано зранку натще

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперкоагуляція, тахікардія, біль у ділянці серця, головний біль, запаморочення, нервові збудження, акне, бульозні висипання, нудота, пітливість, порушення пуринового обміну, АР, включаючи шкірні реакції, кропив'янка, екзантема, екзантематозний висип, висипання, свербіж, дерматит, набряки (в т.ч. Квінке), порушення дихання (в т.ч. приступ ядухи), анафілактичний шок, анафілактоїдні реакції, нудота, пітливість, порушення пуринового обміну, нездужання, гарячка, лихоманка, гіперемія, свербіж, біль, ущільнення та некроз у місці ін'єкції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату; еритремії, еритроцитоз; новоутворення, за винятком випадків, що супроводжуються мегалобластичною анемією та дефіцитом вітаміну В₁₂; г. тромбоемболічні захворювання; стенокардія напруження високого функціонального класу; підвищена чутливість на тютюнову амбліопію або ретробульбарний неврит при перніціозній анемії або на будь-який інший стан, який вимагає детоксикації ціаніду.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 20 мкг.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ЦІАНОКОБАЛАМІН (ВІТАМІН В12)	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у бл.	0,5 мг/мл	№5x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЦІАНОКОБАЛАМІН (ВІТАМІН В12)	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у пач.	0,5 мг/мл	№10	0,11	
	ЦІАНОКОБАЛАМІН (ВІТАМІН В12)	ПАТ "Галичфарм", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у конт. чар/уп.	0,5 мг/мл	№10x1	0,05	
	ЦІАНОКОБАЛАМІН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В12-ДАРНИЦЯ)	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у конт. чар/уп.	0,2 мг/мл	№5x2	0,30	
	ЦІАНОКОБАЛАМІН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В12-ДАРНИЦЯ)	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна	р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у конт. чар/уп.	0,5 мг/мл	№5x2	0,14	
II.	В 12 АНКЕРМАН	Артезан Фарма ГмБХ і Ко. КГ, Німеччина	табл. в/о у бл.	1мг	№10x5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Альфакальцидол (Alfacalcidol)**

Фармакотерапевтична група: А11СС03 - вітаміни; препарати вітаміну D та його аналогів; альфакальцидол

Основна фармакотерапевтична дія: є високоефективним активним метаболітом вітаміну D₃, що регулює обмін кальцію та фосфору; дуже швидко трансформується у кальцитріол у печінці і таким чином підвищує його рівень у крові; це спричиняє підвищення абсорбції кальцію та фосфору у кишечнику, збільшення їх реабсорбції у нирках,

підсилення мінералізації кісток, зниження рівня паратиреоїдного гормону у крові; у пацієнтів з порушенням 1-альфа-гідроксилування у нирках, яке виникає з віком, прийом альфакальцидолу сприяє достатньому утворенню кальцитріолу, що нейтралізує дефіцит D-гормону; відновлює позитивний кальцієвий баланс, внаслідок чого знижується інтенсивність резорбції кістки, що сприяє зменшенню частоти розвитку переломів; збільшує мінеральну щільність кістки; при курсовому застосуванні препарату спостерігається послаблення кісткового та м'язового болю, пов'язаного з порушенням фосфорно-кальцієвого обміну, поліпшується координація рухів та підтримка рівноваги, збільшується сила м'язів, унаслідок чого знижується частота падінь.

Показання для застосування ЛЗ: постменопаузальний остеопороз; остеопороз, пов'язаний з лікуванням ГК; розм'якшення кісток у літньому віці (остеомаліяція) як наслідок недостатнього всмоктування, наприклад у випадку мальабсорбції та постгастректомічного с-му; з метою суттєвого зменшення частоти падінь серед людей літнього віку; при гіпопаратиреозі або гіпофосфатемічному (вітамін D-резистентному) рахіті/остеомаліяції може бути показана ^{БНФ} додаткова терапія із застосуванням альфакальцидолу, якщо рівень кальцію у плазмі крові < 2,2 ммоль/л; захворювання, які супроводжуються порушенням 1-альфа-гідроксилування у нирках, що у свою чергу зумовлюють порушення метаболізму вітаміну D ^{БНФ} (наприклад: ниркова остеодистрофія зі зниженням всмоктування кальцію та рівнем кальцію у плазмі менше 2,2 ммоль/л (< 8,8 мг/100 мл), яка може виникати як наслідок порушення функції нирок без або із проведенням діалізу, а також на початку при стані після трансплантації нирки).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймають внутрішньо; тривалість курсу визначається лікарем індивідуально і залежить від характеру захворювання й ефективності терапії; в окремих випадках препарат застосовують протягом усього життя; початкова доза для дорослих становить 1 мкг/добу ^{БНФ}, пацієнтам з більш тяжким захворюванням кісток призначають вищі дози: 1 - 3 мкг/добу. Дітям старше 6 років з масою тіла 20 кг і вище (які здатні проковтнути капс.) - 1 мкг/добу ^{БНФ} (крім випадків ниркової остеодистрофії); для пацієнтів із гіпопаратиреозом доза має бути знижена після досягнення нормального рівня кальцію в крові (2,2 - 2,6 ммоль/л; 8,8 - 10,4 мг/100 мл) або коли добуток концентрацій кальцій × фосфат у плазмі крові дорівнює 3,5 - 3,7 (ммоль/л)

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперкальціємія, гіперкальціурія; гіперфосфатемія, з метою попередження якої пацієнту можна призначити інгібітори абсорбції фосфатів (такі як сполуки алюмінію); тахікардія, слабкість, головний біль, запаморочення, сонливість; гетеротопічна кальцифікація (рогівка та кровоносні судини), яка зникає після припинення застосування препарату; незначне підвищення ліпопротеїнів з високою густиною у плазмі крові; у пацієнтів з вираженими порушеннями функції нирок можливий розвиток гіперфосфатемії; шкірні АР (свербіж) та анафілактичний шок; гіперчутливість; гіперкальціємія також асоціюється з такими реакціями як гіперкальціурія, ектопічна кальцифікація, ураження нирок та серця

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату, арахісу, сої; гіперчутливість до вітаміну D та прояви інтоксикації вітаміном D; рівень кальцію у плазмі крові вище 2,6 ммоль/л, добуток концентрацій кальцію і фосфату у плазмі крові більший ніж 3,7 (ммоль/л)², алкалоз з рівнем рН венозної крові понад 7,44 (лактат-алкалозний с-м, с-м Бернетта); метастатична кальцифікація; гіперкальціємія або гіпермагніємія; підвищена чутливість до аналогів вітаміну D

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	АЛЬФА ДЗ	Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд. (контр. якості, вир-к, який відповідає за перв. та втор. пак., випуск серії)/ Каталент Німеччина Ебербах ГмБХ (вир-к, який відпов. за вир-во in bulk)/ Тева Чех Індастріз с.р.о. (втор. пак.), Ізраїль/Німеччина/Чеська Республіка	капс. м'які у конт.	0,25мкг; 0,5мкг; 1мкг	№30, №60	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Холекальциферол (Colecalciferol)**

Фармакотерапевтична група: А11СС05 -препарати вітаміну D та його аналогів. Холекальциферол

Основна фармакотерапевтична дія: це природна форма вітаміну D, що утворюється у тварин і людей, порівняно з вітаміном D₂ характеризується активністю, вищою на 25 %, необхідний для функціонування паращитовидних залоз, кишечника, нирок і кісткової системи, відіграє істотну роль в абсорбції кальцію і фосфатів з кишечника, у транспорті мінеральних солей і в процесі кальцифікації кісток, регулює виведення кальцію і фосфатів нирками, бере участь у функціонуванні імунної системи, що впливає на виробництво лімфокінів; метаболізується у печінці і нирках, перетворюючись в активний метаболіт - кальцитріол, який з'єднується з білком-носієм і транспортується до органів-мішеней (кишечник, кістки, нирки).

Показання для застосування ЛЗ: профілактика рахіту; лікування та/або профілактика дефіциту вітаміну D₃ ^{БНФ} у груп високого ризику: період інтенсивного росту, вагітність, годування груддю, прийом протисудомних препаратів тощо, які не мають розладів всмоктування; профілактика / підтримуюче лікування остеопорозу, в поєднанні з препаратами кальцію, ЛЗ, що пригнічують остеокластичну резорбцію або стимулюють формування кісткової тканини; профілактика рахіту у недоношених новонароджених дітей; профілактика дефіциту вітаміну D₃ ^{БНФ} при мальабсорбції: стеаторея, непрохідність жовчних шляхів, хронічні захворювання тонкого кишечника, цироз, стан після резекції шлунку та/або тонкого кишечника, малорухливий спосіб життя пацієнтів літнього віку; лікування рахіту та остеомаліяції; ідіопатичний або післяопераційний гіпопаратиреоз, псевдогіпопаратиреоз, лікування гіпопаратиреозу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосувати р/ос, профілактика рахіту: рекомендована доза - 500 МО/добу, немовлятам в перший рік життя: 400-1000 МО/добу; дітям віком від 1 року, жінкам у період вагітності та годування груддю - 400 МО/добу; профілактика дефіциту вітаміну D₃ ^{БНФ} у пацієнтів груп високого ризику, які не мають розладів всмоктування - 500 МО/добу (р-н олійний - 160 МО/добу); підтримуюче лікування остеопорозу: рекомендована доза - 1000 МО/добу, профілактика рахіту у недоношених новонароджених дітей: близько 1000

МО вітаміну D₃/добу; профілактика дефіциту вітаміну D₃ при мальабсорбції - 3000-5000 МО/добу (р-н олійний - 2800-5000 МО/добу); лікування рахіту та остеомаляції - близько 1000-5000 МО віт D₃/добу; лікування гіпопаратиреозу: 10000-20000 МО/добу; профілактика остеопорозу: 400-1000 МО/добу; профілактичне призначення вітаміну D₃ з метою профілактики рахіту дітям раннього віку: доношені здорові діти - рекомендована профілактична доза 500 МО/добу, починаючи з 2-го місяця життя щоденно; доношені діти з групи ризику рахіту - рекомендована профілактична доза 500-1000 МО/добу, починаючи з 2-3-го тижня життя щоденно; недоношені діти - рекомендована профілактична доза 500-1000 МО/добу, починаючи з 2-3-го тижня життя; загальна рекомендована доза для лікування дефіциту вітаміну D₃ у дітей, у т. ч. немовлят становить 2-10 крапель (близько 1000-5000 МО вітаміну D₃) на добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: аритмія, гіпертензія, втрата апетиту, нудота, блювання, запор, коліки (включаючи загострення колік), сухість у ротовій порожнині, метеоризм, абдомінальний біль, спазми, діарея, диспепсія, головний біль, сонливість, порушення психіки, депресії, підвищення рівня кальцію в крові і/або в сечі, СКХ та кальцифікація тканин, уремія, поліурія, реакції гіперчутливості, у тому числі кропив'янка, висипання, свербіж, анафілактоїдні реакції, сильні АР на олію арахісову (капс. по 20000 МО), ангіоневротичний набряк, набряк гортані, міалгія, артралгія, м'язова слабкість, кон'юнктивіт, фоточутливість, гіперкальціємія, гіперкальціурія, гіперхолестеринемія, втрата маси тіла, полідипсія, посилене потовиділення, панкреатит, підвищення активності амінотрансфераз, зниження лібідо, виникнення ринореї, гіпертермії, сухості у роті, гіпервітаміноз D (гіперкальціємія).

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до вітаміну D, арахісу, сої або до будь-якого з компонентів препарату, гіперкальціємія та/або гіперкальціурія, гіпервітаміноз D, саркоїдоз, ниркова недостатність, нефролітіаз, туберкульоз, псевдогіпопаратиреоз, рідкісна спадкова непереносимість фруктози, глюкозо-галактозна мальабсорбція або сахарозо-ізомальтозна недостатність, ідіопатична гіперкальціємія вонороджених, СКХ; додатковий прийом вітаміну D (можливе передозування)

Визначена добова доза (DDD): перорально - 20 мкг., перорально для ЛЗ КОЛЕДАН - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АКВАВІТ-Д3	ПрАТ "Технолог", Україна	р-н орал. по 10мл у фл. з пр.-крап.	375 мкг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВІДЕІН	АТ "КІЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	капс. м'які у бл.	12,5мкг; 25мкг	№10х3	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВІДЕІН	АТ "КІЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	капс. м'які у бл.	12,5мкг	№10х6	1,81	
	ВІДЕІН	АТ "КІЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна	капс. м'які у бл.	25мкг	№10х6	1,57	
	ВІТАМІН D3	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	крап. орал., р-н по 8мл у фл.-крап.	15000 МО/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	АКВАДЕТРИМ® ВІТАМІН D3	Медана Фарма Акціонерне Товариство, Польща	р-н водн. д/перор. застос. по 10мл у фл.-крап.	15000 МО/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	Д3 КРАПЕЛЬКА	ТОВ Тева Оперейшнз Поланд, Польща	крап. орал., р-н по 10мл у фл.-крап.	4000 МО/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ДЕКРИСТОЛ® 20000 МО	мібе ГмБХ Арцнайміттель (перв. та втор. пак., контр. серії та вип. серії)/ Кетелент Джермані Ебербах ГмБХ (вир-во та випуск "in bulk")/ Свісс Капс АГ (вир-во та випуск "in bulk"), Німеччина/Швейцарія	капс. м'які у бл.	20000 МО	№10, №20, №50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КОЛЕДАН	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина	крап. орал., р-н по 10мл у фл.-крап.	15000 МО/мл	№1	96,86	28,12/\$
	ТРИДЕВІТА	С.М.Б. Технологі СА, Бельгія	р-н орал., олійн. по 10мл у пл.	2400 МО/мл	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

21. ВАКЦИНИ ТА АНАТОКСИНИ

21.1. Монокомпонентні вакцини та анатоксини

21.1.1. Бактеріальні вакцини та анатоксини

- 21.1.1.1. Вакцини для профілактики туберкульозу
- 21.1.1.2. Вакцини для профілактики гемофільної інфекції типу b
- 21.1.1.3. Вакцини для профілактики пневмококової інфекції
- 21.1.1.4. Вакцини для профілактики черевного тифу
- 21.1.1.5. Анатоксини для профілактики правця
- 21.1.1.6. Анатоксини для профілактики дифтерії

21.1.2. Вірусні вакцини

- 21.1.2.1. Вакцини для профілактики гепатиту В
- 21.1.2.2. Вакцини для профілактики поліомієліту
 - 21.1.2.2.1. Інактивована поліомієлітна вакцина
 - 21.1.2.2.2. Оральна поліомієлітна вакцина
- 21.1.2.3. Вакцини для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи
 - 21.1.2.3.1. Вакцини для профілактики кору
 - 21.1.2.3.2. Вакцини для профілактики епідемічного паротиту
 - 21.1.2.3.3. Вакцини для профілактики краснухи
- 21.1.2.3.4. Вакцини для профілактики вітряної віспи
- 21.1.2.4. Вакцини для профілактики грипу
- 21.1.2.5. Вакцини для профілактики гепатиту А
- 21.1.2.6. Вакцини для профілактики папіломавірусної інфекції
- 21.1.2.7. Вакцини для профілактики кліщового енцефаліту
- 21.1.2.8. Вакцини для профілактики сказу
- 21.1.2.9. Вакцина для профілактики ротавірусної інфекції
- 21.1.2.10. Вакцини для профілактики жовтої лихоманки

21.2. Комбіновані вакцини та анатоксини

21.2.1. Анатоксини для профілактики дифтерії та правця

21.2.2. Вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюку

- 21.2.2.1. Вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюку з цільноклітинним кашлюковим компонентом
- 21.2.2.2. Вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюку з ацелюлярним кашлюковим компонентом
- 21.2.2.3. Вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюку з ацелюлярним кашлюковим компонентом та зменшеним вмістом дифтерійного анатоксину

21.2.3. Вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент), поліомієліту

- 21.2.3.1. Вакцини для профілактики дифтерії, кашлюку (ацелюлярний компонент), поліомієліту, правця
- 21.2.3.2. Вакцини для профілактики дифтерії зі зменшеним вмістом антигену, кашлюку (ацелюлярний компонент), поліомієліту, правця

21.2.4. Вакцини для профілактики дифтерії, гемофільної інфекції типу b, кашлюку (ацелюлярний компонент), поліомієліту, правця

21.2.5. Вакцини для профілактики дифтерії, гемофільної інфекції типу b, кашлюку (ацелюлярний компонент), поліомієліту, правця, гепатиту В

21.2.6. Вакцини для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи

21.2.7. Вакцини для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи та вітряної віспи,

21.2.8. Вакцини для профілактики пневмококової інфекції та гемофільної інфекції

21.2.9. Вакцини для профілактики гепатиту А та гепатиту В

21.1. Монокомпонентні вакцини та анатоксини

21.1.1. Бактеріальні вакцини та анатоксини

21.1.1.1. Вакцини для профілактики туберкульозу

Згідно з наказом МОЗ України від 16.09.2011 № 595 (зі змінами, що затверджені наказами МОЗ України від 11.08.2014 № 551, від 26.09.2016 № 996, від 18.05.2018 № 947) вакцинації підлягають усі новонароджені, що не мають до цього протипоказань. Вакцинація проводиться на 3-5-у добу життя дитини (не раніше 48-ої години після народження) вакциною для профілактики туберкульозу (далі - БЦЖ). Недоношених дітей щеплюють після досягнення дитиною маси тіла ≥ 2500 г. Діти, які не були щеплені в пологовому стаціонарі, підлягають обов'язковій вакцинації в закладах охорони здоров'я.

Дітям, яким не виповнилося два місяці, щеплення проти туберкульозу проводять без попередньої проби Манту. Після двомісячного віку перед виконанням щеплення дитині слід провести пробу Манту. Щеплення проводиться при негативному результаті проби. Діти, щеплені БЦЖ, у яких не сформувався рубчик, проте є достовірне підтвердження проведення щеплення, не підлягають повторній вакцинації.

- **Вакцина для профілактики туберкульозу, жива, атенуйована (*Tuberculosis, live attenuated*)** *

Фармакотерапевтична група: J07AN01- Tuberculosis vaccines

Основна фармакотерапевтична дія: являє собою живі мікобактерії штаму БЦЖ-1, які розмножуються в організмі щепленого, сприяють розвитку тривалого імунітету до туберкульозу.

Показання для застосування ЛЗ: активна специфічна профілактика туберкульозу^{БНФ, ВООЗ}. При проведенні імунізації на території України слід керуватися діючими наказами МОЗ України щодо проведення профілактичних щеплень.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: потрібно ознайомитися з національними рекомендаціями стосовно необхідності проведення туберкулінової проби перед введенням БЦЖ вакцини; згідно діючого Календаря профілактичних щеплень в Україні, щепленню для профілактики туберкульозу підлягають усі новонароджені діти, що не мають до цього протипоказань; вакцинація проводиться на 3 - 5 - ту добу життя дитини (не раніше 48-ї год. після народження) вакциною для профілактики туберкульозу (далі - БЦЖ). *БЦЖ вакцина SSI Вакцина для профілактики туберкульозу, Статенс Серум Інститут, Данія:* для одного щеплення стерильним шприцем набирають: для вакцинації новонароджених та немовлят віком до 12 міс. - 0,1 мл рочиненої вакцини (2 дози для вакцинації новонароджених та немовлят віком до 12 міс.), випускають у стерильний ватний тампон 0,05 мл, щоб витіснити повітря та підвести поршень шприца під потрібне градування - 0,05 мл^{БНФ, ВООЗ}; для вакцинації дорослих та ревакцинації дітей віком від 12 міс. і старше стерильним шприцем набирають - 0,2 мл рочиненої вакцини (2 дози для вакцинації дорослих та ревакцинації дітей віком від 12 міс. і старше), потім випускають в стерильний ватний тампон 0,1 мл, щоб витіснити повітря та підвести поршень шприца під потрібне градування - 0,1 мл^{БНФ}; застосовують виключно в/ш. *Вакцину БЦЖ 10, "БІОМЕД-ЛЮБЛІН" Витвурня Суровіч і Щепйонек Спупка Акційна (виробник вакцини), Польща, ПОЛЬФАРМА С.А. Фармасьютікал Воркс (виробник розчинника), Польща:* разова профілактична доза становить у дозі 0,05 мг в об'ємі 0,1 мл; вакцину потрібно розвести в 1 мл ізотонічного р-ну натрію хлориду (0,9 %); для одного щеплення стерильним шприцем набирають 0,2 мл (2 дози) рочиненої вакцини, потім частину її випускають ч/з голку, щоб витіснити і підвести поршень шприца під потрібне градування - 0,1 мл; вводять суворо в/ш у зовнішню верхню 1/3 частину лівого плеча попередньої обробки шкіри 70 % р-ном спирту. *ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА /BCG VACCINE FREEZE-DRIED, ББ-НЦІПХ Лтд., Болгарія:* Дітям до 1 року вводити 0,05 мл, в інших випадках - 0,1 мл в/ш^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: загальні розлади та реакції в місці введення: підвищена t° , головний біль; ускладнення після вакцинації та ревакцинації БЦЖ відмічаються рідко та, зазвичай, носять місцевий характер: п/ш холодні абсцеси; виразки 10 мм та більше в діаметрі на місці в/ш введення; лімфаденіти регіонарних лімфатичних вузлів (пахвових, шийних, надключичних і підключичних) при збільшенні вузла > 1 см у фазі інфільтрації; абсцедування, кальцинації; келоїдні рубці розміром 10 мм та більше на місці загоєної вакцинальної реакції; остити, дисемінована БЦЖ-інфекція (при вродженому імунodefіциті); протягом кількох місяців після щеплення іноді збільшення підпахвинних лімфатичних вузлів; у рідкісних випадках - гнійний лімфаденіт, що має доброякісний перебіг, проходить самостійно; р-ції гіперчутливості; Апноє у передчасно народжених немовлят у строк ≤ 28 тижнів вагітності). **Реакція на введення:** на місці в/ш введення розвивається специфічна р-ція у вигляді папули розміром 5-10 мм в діаметрі; у новонароджених нормальна р-ція на щеплення з'являється ч/з 4-6 тижн.; р-ція піддається зворотньому розвитку протягом 2-3 міс., іноді у більш тривалі терміни; поступово розвивається місцева специфічна р-ція у вигляді інфільтрата, папули, пустули, виразки, розміром до 10 мм в діаметрі; у 90-95% вакцинованих на місці щеплення повинен утворитися поверхневий рубчик до 10 мм в діаметрі.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого компоненту вакцини; маса тіла при народженні менше 2500 г; немовлятам, що народилися від матерів, інфікованих ВІЛ до виключення ВІЛ-інфекції у дитини; новонародженим з підозрою на вроджені імунні порушення; немовлятам, народженим від матерів, які в 3-му триместрі вагітності лікувалися такими ЛЗ, як моноклональні антитіла проти TNF-альфа; ВІЛ-інфікованим особам (безсимптомне носійство ВІЛ, клінічні стадії I, II, III та IV); пацієнтам з первинними або вторинними імунodefіцитами (у т.ч. гамма-інтерферон-дефіцитними чи з синдромом Di George-a); під час променевої терапії; пацієнтам, які отримували ГКС під час імуносупресивної терапії (у т.ч. моноклональними антитілами проти TNF-альфа); злоякісні захворювання крові та новоутворення (лейкоз, хвороба Ходжкіна, лімфома або інші пухлини ретикулоендотеліальної системи); після трансплантації стовбурових клітин кісткового мозку та після пересадки органів; вагітність; ускладнення на попереднє введення вакцини БЦЖ (лімфаденіт, холодний абсцес, виразка

шкіри більше 10 мм у діаметрі, келоїдний рубець, БЦЖ-остит, генералізована БЦЖ-інфекція); генералізована БЦЖ-інфекція, БЦЖ-остит, виявлені у інших дітей у сім'ї; дефекти системи фагоцитозу (хр.грануломатозна хвороба, дефіцит адгезії лейкоцитів); тубінфікування та туберкульоз в анамнезі; позитивна та сумнівна реакція Манту; вагітність, лактація. **Щеплення треба відкласти у випадку:** г. захворювання, що супроводжується лихоманкою; загострення хр.захворювання; пацієнтам з важкими захворюваннями (внутрішньоутробна інфекція, гнійно-септичні захворювання, гемолітична хвороба новонароджених середньої тяжкості та тяжкою формами, важкі ураження нервової системи з вираженою неврологічною симптоматикою, генералізовані шкірні ураження, тощо); вакцинація відкладається до закінчення проявів захворювання. **Ревакцинація:** н/р і дітям з келоїдними рубцями та волчаночною інфекцією на місці ін'єкції.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БЦЖ вакцина SSI Вакцина для профілактики туберкульозу	Статенс Серум Інститут, Данія	пор. д/сусп. д/ін'єк. у фл. з розч.	0,75мг	№5, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА /BCG VACCINE FREEZE-DRIED	ББ-НЦІПХ Лтд., Болгарія	пор. д/приг. сусп. для в/ш ін'єк. в амп. по 1мг (20доз) з розч.	50 мкг/доза	№20	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЖИВА, СУХА БЦЖ 10	"БИОМЕД-ЛЮБЛІН" Витвурня Суровіц і Щепйонек Спулка Акційна (виробник вакцини)/ПОЛЬФАРМА С.А. Фармасьютікал Воркс (виробник розчинника), Польща/Польща	пор. д/приг. сусп. для в/ш ін'єк. в амп. по 0,5мл (10доз) з розч.	50 мкг/доза	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

21.1.1.2. Вакцини для профілактики гемофільної інфекції типу b

(також див. п. 2. розділу «ВАКЦИНИ ТА АНАТОКСИНИ»)

Вакцинація дітей для профілактики інфекції, спричиненої паличкою *Haemophilus influenzae* тип b (далі - Hib-вакцина), відповідно до Календаря профілактичних щеплень України, може проводитись моновакцинами та комбінованими вакцинами, що містять Hib-компонент. Щеплення для профілактики Hib-інфекції слід проводити за схемою 2-4-12 місяців. Вакцинація проводиться дітям до 4 років 11 місяців 29 днів. У старшому віці вакцинація проти Hib-інфекції проводиться лише особам з групи ризику.

- **Вакцина для профілактики гемофільної інфекції типу b, очищена, кон'югована (*Haemophilus influenzae* B, purified antigen conjugated) ***

Фармакотерапевтична група: J07AG01 - *Haemophilus influenzae* B vaccines.

Основна фармакотерапевтична дія: вакцина складається з очищеного капсульного полісахариду (PRP) Hib, ковалентно зв'язаного з правцевим протеїном; одна імунізуюча доза вакцини (0,5 мл) містить не менше 10 мкг очищеного капсулярного полісахариду *Haemophilus influenzae* типу b, ковалентно зв'язаного з ~25 мкг правцевого анатоксину.

Показання для застосування ЛЗ: для активної імунізації проти захворювань, спричинених *Haemophilus influenzae* типу b (менінгіту, септицемії, флегмони, артриту, епіглотиту тощо), у дітей віком від 2 місяців.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: ХІБЕРИКС™/HIBERIX™ Вакцина для профілактики захворювань, збудником яких є *Haemophilus influenzae* типу b, "GlaxoSmithKline Biologicals s.a." Бельгія: призначена для в/м введення, проте, хворим з тромбоцитопенією чи кровотечами вакцину слід вводити п/ш; первинна вакцинація: дітям віком до 13 місяців: три дози по 0,5 мл кожна з інтервалом між введенням дози не менше 4 тижнів, першу дозу слід призначити дітям віком від 2 місяців життя; дітям віком від 13 місяців: одна доза по 0,5 мл. Вторинна вакцинація: після первинної вакцинації, протягом якої введено одну або три дози вакцини ХІБЕРИКС™ разом з вакциною Інфанрикс, слід призначити додаткову (четверту) дозу вакцини з Hib-кон'югатом; дітям, яким було введено протягом первинної вакцинації вакцину ХІБЕРИКС™, можна призначити вторинну вакцинацію препаратом ХІБЕРИКС™ або іншими вакцинами з Hib-кон'югатом. Відповідно, вакцину ХІБЕРИКС™ можна призначити для вторинної вакцинації дітей, у яких первинну вакцинацію проводили іншими вакцинами з Hib-кон'югатом. ВАКЦИНА КОН'ЮГОВАНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЗБУДНИКОМ ЯКИХ Є HAEMOPHILUS INFLUENZAE ТИПУ B, СЕРУМ ІНСТИТУТ ІНДІЇ ПВТ. ЛТД., Індія: дітям дошкільного віку вводити однократну дозу 0,5 мл в/м в передньолатеральну частину стегна; дітям старшого віку, дорослим - у дельтоподібний м'яз. При проведенні імунізації на території України щодо схем імунізації, протипоказань та взаємодії з іншими медичними імунобіологічними препаратами слід керуватися діючими наказами МОЗ України.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: місцеві р-ції: почервоніння, припухлість, ущільнення та біль у місці введення вакцини; загальні р-ції (підвищення t°, втрата апетиту, неспокій, дратівливість та безперервний плач), блювота, діарея, сонливість; АР, кропив'янка, висип, свербіння, набряк обличчя і набряк гортані, анафілактичні та анафілактоїдні р-ції, ангіоневротичний набряк; гіпотонічно-гіпореспонсивний епізод, судомою (з або без лихоманки), синкопе або судинні р-ції на ін'єкцію вакцини; апное у передчасно народжених немовлят (≤ 28 тижнів гестації); розповсюджена припухлість кінцівки, в яку введена вакцина, індурація в місці введення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини, до будь-якої з допоміжних речовин, до правцевого протеїну або формальдегіду (який може бути присутнім у кожній дозі у слідових кількостях); відома

гіперчутливість, що виникла після попередньої ін'єкції кон'югованої вакцини проти *Haemophilus influenzae* типу b; вакцинацію потрібно відкласти у випадку захворювання з підвищенням t° і г. захворювання.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ВАКЦИНА КОН'ЮГОВАНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЗБУДНИКОМ ЯКИХ Є НАЕМОРИЛИС INFLUENZAE ТИПУ В	СЕРУМ ІНСТИТУТ ІНДІЇ ПВТ. ЛТД., Індія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	10мкгPRP/доза	№50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ХІБЕРИКС™/НІВЕРІХ™ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЗБУДНИКОМ ЯКИХ Є НАЕМОРИЛИС INFLUENZAE ТИПУ В	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	0,5мл/доза	№100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ХІБЕРИКС™/НІВЕРІХ™ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЗБУДНИКОМ ЯКИХ Є НАЕМОРИЛИС INFLUENZAE ТИПУ В	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. у шпр. та 2голк.	0,5мл/доза	№1	324,49	27,22/\$

21.1.1.3. Вакцини для профілактики пневмококової інфекції

- **Вакцина пневмококова, очищена полісахаридна кон'югована (*Pneumococcus, purified polysaccharides antigen conjugated*)**

Фармакотерапевтична група: J07AL02 - Pneumococcal vaccines

Основна фармакотерапевтична дія: вакцина містить капсульні пневмококові полісахариди декількох типів, які кон'юговані з білком-носієм; зумовлює утворення функціональних антитіл до пневмококів тих серотипів, що входять до складу вакцини, після первинної вакцинації.

Показання для застосування ЛЗ: активна імунізація для попередження інвазивних захворювань, пневмонії та гострого середнього отиту, спричинених *Streptococcus pneumoniae*, у дітей віком від 6 тижнів; активна імунізація для попередження інвазивних захворювань та пневмонії, спричинених *Streptococcus pneumoniae*, у дорослих та осіб літнього віку; застосування вакцини має базуватись на офіційних рекомендаціях із урахуванням ризику інвазивних захворювань та пневмонії у різних вікових групах та супутніх основних захворювань, а також варіабельності епідеміології серотипів у різних географічних зонах.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: ПРЕВЕНАР® 13/PREVENAR® 13 Вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована, Ваєт Фармасаеутикалс, Велика Британія, Пфайзер Ірленд Фармасаеутикалс, Ірландія, Бакстер Фармасаеутикал Солюшинс ЛЛС, США, Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ, Бельгія: вводити в/м у передньолатеральну поверхню стегна у немовлят або дельтовидний м'яз плеча у дітей та дорослих. Немовлята віком від 6 тижнів до 6 місяців: при первинній вакцинації трьома дозами рекомендований курс імунізації складається з чотирьох доз по 0,5 мл кожна; первинна вакцинація у немовлят складається з трьох доз; першу дозу звичайно вводять у віці 2 міс.; інтервал між дозами становить не менше 1 міс.; четверту дозу (ревакцинація) рекомендується вводити у віці 11-15 міс.; при первинній вакцинації двома дозами першу дозу можна вводити, починаючи з 2-місячного віку, другу - ч/з 2 місяці; третю дозу (ревакцинація) рекомендується вводити у віці 11-15 місяців^{БНФ}. Недоношеним немовлятам (гестаційний вік <37 тижнів) рекомендується проводити курс імунізації, що складається з чотирьох доз по 0,5 мл; курс первинної імунізації складається з трьох доз: першу дозу застосовують у віці 2 міс., а подальші з інтервалом принаймні 1 міс. між дозами; першу дозу дозволяється застосовувати, починаючи з віку шість тижнів, четверту дозу (бустер-ін'єкцію) рекомендується застосовувати у віці від 11 до 15 місяців. Немовлятам віком 7-11 міс. - дві дози, по 0,5 мл кожна, з інтервалом між дозами не менше 1 міс., третю дозу рекомендується вводити на другому році життя; діти віком 12-23 місяців - дві дози, по 0,5 мл кожна, з інтервалом між дозами не менше 2 міс.; діти та підлітки віком 2 - 17 років - одна доза - 0,5 мл.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: підвищення t°, озноб, підвищена збудливість, почервоніння, набряк, біль, свербіж, обмеження рухів, лімфаденопатія у місці введення, зниження апетиту, сонливість, порушення сну, головний біль; блювання, діарея, нудота; висип, кропив'янка, багатоформна еритема; апное у глибоко недоношених дітей (≤ 28 тижнів вагітності); артралгія, міалгія; р-ції гіперчутливості (набряк обличчя, задишка, бронхоспазм); судоми (включаючи фебрильні), анафілактична/анафілактоїдна р-ція, включаючи шок, ангіоневротичний набряк; гіпотонічно-гіпореспонсивний епізод.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючих речовин, до будь-якої з допоміжних речовин або до дифтерійного анатоксину; г.тяжкі фебрильні захворювання.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ПРЕВЕНАР® 13/PREVENAR® 13 ВАКЦИНА ПНЕВМОКОКОВА ПОЛІСАХАРИДНА КОН'ЮГОВАНА (ТРИНАДЦЯТИВАЛЕ НТНА АДСОРБОВАНА)	Ваєт Фармасаеутикалс/Пфайзер Ірленд Фармасаеутикалс/Бакстер Фармасаеутикал Солюшинс ЛЛС/Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ, Велика Британія/Ірландія/США/Бельгія	сусп. д/ін'єк. у шпр. та 1 голк. в конт. у кор.	0,5мл/доза	№1	1289,5 0	24,33/\$

21.1.1.4. Вакцини для профілактики черевного тифу

- **Вакцина для профілактики черевного тифу, очищена полісахаридна (Typhoid, purified polysaccharide antigen)**

Фармакотерапевтична група: J07AP03 - Typhoid vaccines

Основна фармакотерапевтична дія: вакцина містить очищений Vi-капсулярний полісахарид *Salmonella typhi* (Ty2 штам) та забезпечує імунітет проти черевного тифу ч/з 2-3 тижні після щеплення; тривалість імунітету не менше 3 років; рівень серопротекції складає 90% після першого щеплення; вакцина не забезпечує захист проти збудника *Salmonella paratyphi A* або *B*.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика черевного тифу у дорослих та дітей^{БНФ} віком старше 2 років, осіб, які від'їжджають в ендемічні регіони, емігрантів, медичного персоналу та військовослужбовців. Необхідність проведення щеплення повинна бути обґрунтованою.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вакцинація проводиться одноразово, однією дозою (0,5 мл); ревакцинація рекомендована кожні 3 роки, якщо є ризик захворювання; вакцинальна доза однакова для дорослих і дітей^{БНФ}; вводиться п/ш або в/м.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: протягом 48 год. після введення вакцини можливий розвиток місцевої р-ції (болючість, почервоніння, ущільнення, набряк м'яких тканин у місці ін'єкції); лихоманка; анафілактичні/анафілактоїдні р-ції, в т.ч. шок, сироваткова хвороба; вазовагальне синкопе у відповідь на ін'єкцію; головний біль; БА; нудота, блювання, діарея, болі в животі; свербіж, висип, кропив'янка алергічного генезу; артралгія, міалгія; втома, нездужання.

Протипоказання до застосування ЛЗ: Гіперчутливість до будь-якого компонента вакцини або р-ція на попереднє введення вакцини чи препарату аналогічного складу; лихоманка; щеплення слід відкласти до повного одужання; протипоказання на введення вакцини визначаються в кожному конкретному випадку з урахуванням переліку протипоказань до щеплень згідно з діючими нормативним документом МОЗ України.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ТІФІМ ВІ® / ТУРНІМ VІ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЧЕРЕВНОГО ТИФУ ПОЛІСАХАРИД НА РІДКА	Санофі Пастер (повний цикл виробництва, контроль якості, заповнення, вторинне пакування, випуск серії)/Санофі-Авентіс Прайвіт Ко. Лтд. (вторинне пакування)/САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА (стерилізуюча фільтрація, заповнення шприців, контроль якості (стерильність, Франція/Угорщина/Франція	р-н д/ін'єк. по 0,5мл (1доза) у шпр. з гол. в станд.- експорт. упак. в кор.	25 мкг/доза	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТІФІМ ВІ® / ТУРНІМ VІ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЧЕРЕВНОГО ТИФУ ПОЛІСАХАРИД НА РІДКА	Санофі Пастер (повний цикл виробництва, контроль якості, заповнення, вторинне пакування, випуск серії)/Санофі-Авентіс Прайвіт Ко. Лтд. (вторинне пакування)/САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА (стерилізуюча фільтрація, заповнення шприців, контроль якості (стерильність, Франція/Угорщина/Франція	р-н д/ін'єк. по 0,5мл (1доза) у шпр. з гол. в кор.	25 мкг/доза	№1	451,20	24,33/\$
	ТІФІМ ВІ® / ТУРНІМ VІ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЧЕРЕВНОГО	Санофі Пастер (повний цикл виробництва, контроль якості, заповнення, вторинне пакування, випуск серії)/Санофі-Авентіс Прайвіт Ко. Лтд., Платформа	р-н д/ін'єк. по 0,5мл (1доза) у шпр. з гол.	25 мкг/доза	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

ТИФУ ПОЛІСАХАРИД НА РІДКА	логістики та дистрибуції у м. Будапешт (Вторинне пакування, випуск серії)/САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА (стерилізу, Франція/Угорщина/Франція				
---------------------------------	---	--	--	--	--

21.1.1.5. Анатоксини для профілактики правця

(також див. п. 2. розділу «ВАКЦИНИ ТА АНАТОКСИНИ»)

- **Правцевий анатоксин (Tetanus toxoid)**

Фармакотерапевтична група: J07AM01 - Tetanus vaccines

Основна фармакотерапевтична дія: Введення препарату у відповідності із затвердженою схемою вакцинації викликає формування специфічного імунітету проти правця; складається з очищеного правцевого анатоксину, адсорбованого на гелі алюмінію гідроксиду.

Показання для застосування ЛЗ: Активна імунізація проти правця, яка проводиться в межах планових щеплень; екстрена специфічна профілактика правця. Активну планову імунізацію дітей проти правця здійснюють препаратами, що містять правцевий анатоксин, відповідно до календаря щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України та інструкцій щодо їх застосування.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити п/ш у підлопаткову ділянку тіла, разова доза 0,5 мл однакова для дітей та дорослих; при активній плановій імунізації повний курс вакцинації для дорослих складається з 2-х щеплень по 0,5 мл з інтервалом 30-40 діб і ревакцинації ч/з 6-12 міс. тією ж дозою; при скороченій схемі повний курс імунізації включає одноразову вакцинацію у подвійній дозі (1,0 мл), ревакцинацію ч/з 1-2 роки дозою 0,5 мл та в подальшому кожні 10 років дозами 0,5 мл; активну планову імунізацію дітей здійснюють відповідно до календаря щеплень та інструкцій щодо їх застосування; щодо схем імунізації при проведенні щеплення на території України слід керуватися чинними наказами МОЗ України щодо профілактичних щеплень. При травмах, пораненнях, ранах, що не загоюються, якщо є загроза захворювання на правець (відповідно до стану повторної вакцинації пацієнта) застосовують лише вакцину проти правця або вакцину проти правця у комбінації з протиправцевим імуноглобуліном людини; призначення засобів для екстреної імунопрофілактики правця здійснюється диференційовано залежно від наявності документального підтвердження про щеплення або даних імунологічного контролю напруженості протиправцевого імунітету, та враховуючи характер травми; проведене щеплення реєструють в установлених облікових формах із зазначенням назви препарату, дати щеплення, дози, номера серії, р-ції на щеплення.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нездужання, підвищення t° ; в місці введення болючість, почервоніння, набряк; кропив'янка, поліморфний висип, свербіж; міалгія, артралгія; артеріальна гіпотензія; лімфаденопатія, тромбоцитопенія; нудота; головний біль, розвиток плечового неврити та с-рому Гійєна-Барре; потенційний ризик апное у передчасно народжених дітей (≤ 28 тижнів гестації) і, зокрема, у дітей, які мають в анамнезі незрілість дихальної системи.

Протипоказання до застосування ЛЗ: Активна планова імунізація проти правця: тяжкі ускладнення від попередньої дози АДП, АДП-М, АП-анатоксину у вигляді анафілактичної р-ції або токсичної еритеми; АР на будь-який компонент анатоксину; органічні прогресуючі захворювання нервової системи, гідроцефалія та гідроцефальний с-ром у ступені декомпенсації, епілепсія, епілептичний с-ром із судомами частіше одного нападу за 6 міс.; довготривалі і тяжкі захворювання (вірусні гепатити, туберкульоз, менінгіти, міокардити, дифузні хвороби сполучної тканини і інше) - щеплення проводять індивідуально ч/з 6-12 міс. після одужання; порушення мозкового кровообігу, судоми частіше як 1 раз на 6 місяців; анемії: протипоказанням до щеплень у хворих є рівень гемоглобіну нижче 80 г/л; онкологічні захворювання; г.захворювання або загострення хр. захворювання. Планові вакцинації анатоксином відкладаються до закінчення гострих проявів захворювання та загострення хр. захворювань і проводяться після одужання або під час ремісії хр. захворювання; вроджені комбіновані імунодефіцити, первинна гіпогаммаглобулінемія; імуносупресивна терапія. **Екстрена специфічна профілактика правця:** гіперчутливість на будь-який компонент препарату. Застосування специфічних засобів екстреної профілактики правця: наявність в анамнезі підвищеної чутливості до відповідного лікарського засобу; в першій половині вагітності протипоказано введення АП-анатоксину та ППС; в другій половині вагітності протипоказано введення ППС.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АП-БІОЛІК	АТ "БІОЛІК", Україна	сусп. д/ін'єк. по 0,5мл, 1мл в амп. у пач.	0,5мл/доза	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АП-БІОЛІК	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	сусп. д/ін'єк. по 1мл в амп. у пач.	1мл/2دوزи	№10	1500,00	
	АП-БІОЛІК	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	сусп. д/ін'єк. по 0,5мл в амп. у пач.	0,5мл/1доза	№10	800,00	

21.1.1.6. Анатоксини для профілактики дифтерії

- **Дифтерійний анатоксин (Diphtheria toxoid) ***

Фармакотерапевтична група: J07AF01 - Diphtheria vaccines

Основна фармакотерапевтична дія: складається з очищеного дифтерійного анатоксину, адсорбованого на гелі алюмінію гідроксиду; введення препарату у відповідності із затвердженою схемою викликає формування специфічного імунітету проти дифтерії.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика дифтерії у дітей віком від 6 років та дорослих.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити в/м у в/зовнішній квадрант сідниці чи передньо-зовнішню частину стегна, або п/ш у підлопаткову ділянку 0,5 мл (разова доза); щеплення можливо проводити одночасно з щепленням проти поліомієліту; при проведенні імунізації на території України слід керуватися діючими наказами МОЗ; АД-М-Біолік слід застосовувати в осередках дифтерії для імунізації осіб, щеплених згідно з Календарем профілактичних щеплень, якщо після останнього щеплення проти дифтерії пройшло не менше року; у разі коли особи підлягають ревакцинації у поточному році та для імунізації нещеплених осіб слід застосовувати препарати з дифтерійним компонентом відповідно до віку пацієнта.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: загальні розлади: підвищення t° , нездужання; порушення у місці введення (болючість, гіперемія, набряк); АР (набряк Квінке, кропивниця, поліморфний висип), незначне загострення алергічних захворювань, головний біль.

Протипоказання до застосування ЛЗ: тяжкі ускладнення від попередньої дози у вигляді анафілактичної р-ції або токсичної еритеми; АР на будь-який компонент анатоксину; органічні прогресуючі захворювання нервової системи, епілепсія, епілептичний с-м із судомами не рідше ніж 2 р/місяць; г.захворювання або загострення хр.захворювання; вроджені комбіновані імунodefіцити, первинна гіпогаммаглобулінемія; імуносупресивна терапія.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АД-М-Біолік	АТ "БІОЛІК", Україна	сусп. д/ін'єк. в амп. по 0,5мл, 1мл у пач.	0,5мл/доза	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АД-М-Біолік	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	сусп. д/ін'єк. в амп. по 0,5мл у пач.	0,5мл/доза	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АД-М-Біолік	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	сусп. д/ін'єк. в амп. по 1мл у пач.	1мл/2دوزи	№10	99,00	

21.1.2. Вірусні вакцини

21.1.2.1. Вакцини для профілактики гепатиту В

Вакцинації для профілактики гепатиту В підлягають усі новонароджені. Для вакцинації дітей проти гепатиту В використовується схема: 0 (перша доба) - 2-6 місяців життя дитини.

Якщо мати новонародженого HBsAg «-» (негативна), що документально підтверджено, вакцинацію дитини можливо розпочати протягом перших місяців життя або одночасно зі щепленням проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту. У разі поєднання імунізації зі щепленням проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту рекомендуються схеми: 2-4-6-18 місяців життя або 2-4-9 місяців життя. Новонародженим з масою тіла < 2000 г, що народилися від HBsAg «-» (негативних) матерів, вакцинація проводиться при досягненні дитиною ваги 2000 г або при досягненні віку 1 місяць. Якщо новонароджена дитина у тяжкому стані, то її імунізацію слід проводити після покращення стану перед випискою з лікарні.

Якщо мати новонародженого HBsAg «+» (позитивна), дитині роблять щеплення за схемою: 0 (перша доба) - 2-6 місяців життя дитини. Перша доза вакцини вводиться в перші 12 годин життя дитини незалежно від маси тіла. Разом з вакцинацією, але не пізніше 1-го тижня життя, в іншу ділянку тіла рекомендовано вводити специфічний імуноглобулін проти гепатиту В з розрахунку 40 МО/кг маси тіла та не менше 100 МО. Якщо маса новонародженої дитини < 2000 г, то вакцинація проводиться обов'язково, але введена доза вакцини не зараховується як доза первинної імунізації; після досягнення дитиною віку 1 місяць вакцинація має бути проведена серією із трьох введень вакцин 0-1-6 (0 – дата першого введення вакцини, мінімальний інтервал між першим та другим щепленнями – 1 місяць, між другим та третім щепленнями - 5 місяців).

Якщо в матері новонародженої дитини не визначений HBsAg статус, щеплення дитини проводиться обов'язково в перші 12 годин життя з одночасним дослідженням статусу матері за HBsAg. У разі отримання позитивного результату в матері профілактика гепатиту В проводиться, як у випадку щеплення дитини, народженої від HBsAg «+» (позитивної) матері. Не слід повторно розпочинати серію вакцинації, якщо була пропущена доза вакцини, незалежно від того, скільки часу минуло. Необхідно ввести дози вакцини, яких не вистачає, за графіком з дотриманням мінімальних інтервалів.

- **Вакцина для профілактики гепатиту В (Hepatitis B, purified antigen) *** [ПМД]

Фармакотерапевтична група: J07BC01 - Hepatitis vaccines

Основна фармакотерапевтична дія: містить очищений поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg), адсорбований на солях алюмінію (адьювант), вироблена за технологією рекомбінантної ДНК в культурі дріжджових клітин; стимулює утворення специфічних гуморальних антитіл проти HBsAg (основного поверхневого антигену вірусу гепатиту В); титр антитіл проти HBsAg, вищий за 10 МО/л, корелює з достатнім ступенем імунного захисту проти інфекції, викликаной вірусом гепатиту В.

Показання для застосування ЛЗ: специфічна активна імунізація з метою профілактики захворювання, викликаного відомими підтипами HBV у пацієнтів будь-якого віку^{БНФ,ВООЗ} для яких існує ризик інфікування; у зонах з низькою ендемічністю гепатиту В рекомендується імунізувати новонароджених дітей, підлітків та осіб, що складають групи підвищеного ризику інфікування: медичні працівники; співробітники міліції, пожежних бригад, військовослужбовці; пацієнти, яким проводилось переливання крові; особи, які проживають у спеціальних

установах, та персонал, який їх обслуговує; особи, у яких підвищений ризик захворюваності пов'язаний з їхньою сексуальною орієнтацією; наркомани, які використовують наркотики у вигляді ін'єкцій; особи, які виїжджають у зони з високою ендемічністю гепатиту В; діти, матері яких є носіями вірусу гепатиту В; уродженці зон з високою ендемічністю гепатиту В; пацієнти із серповидноклітинною анемією; пацієнти, що чекають на трансплантацію органів та тканин; особи з хр. захворюваннями печінки або особи, які належать до групи ризику розвитку хр. захворювання печінки (носії вірусу гепатиту С, особи, які зловживають алкоголем); особи, що знаходяться в сімейних (побутових та статевих) контактах з представником будь-якої з наведених вище груп та з пацієнтами, хворими на гепатит В у г. чи хр. формі; усі інші особи, які в силу своєї діяльності чи способу життя можуть бути інфіковані HBV. У зонах з середньою чи високою частотою захворюваності на гепатит В, де існує ризик інфікування для більшої частини населення, вакцинацію необхідно проводити всім новонародженим, дітям та підліткам. При проведенні імунізації на території України щодо схеми застосування, протипоказань та взаємодії з іншими лікарськими засобами слід керуватися діючими наказами МОЗ України стосовно профілактичних щеплень. За допомогою імунізації вакциною можна також попередити гепатит D, оскільки гепатит D не виникає при відсутності інфекції, викликаній HBV.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: ЕНДЖЕРИКС™-В/ЕНГЕРИХ™-В Вакцина для профілактики вірусного гепатиту В, рекомбінантна, GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Бельгія: вводити в/м у ділянку дельтоподібного м'язу у дорослих та дітей або у передньобочкову ділянку стегна у новонароджених, немовлят та дітей молодшого віку^{БНФ}; доза 20 мкг (1,0 мл) рекомендується для дорослих^{БНФ} (віком 20 років і старше); також може використовуватися з метою імунопрофілактики пацієнтів віком від 11 років і старше, включаючи підлітків віком 15 років, шляхом введення 2 доз вакцини за схемою, наведеною нижче, в ситуаціях з низьким ризиком інфікування гепатитом В та забезпечення отримання пацієнтом цього двохдозового курсу вакцинації; доза 10 мкг (0,5 мл) рекомендується для н/народжених, дітей^{БНФ, ВООЗ} та осіб віком до 19 років. При первинній імунізації всіх осіб: схема імунізації, згідно з якою другу дозу вводять ч/з 1 міс., а третю - ч/з 6 міс. після першої (0, 1 та 6 міс.)^{БНФ} забезпечує оптимальний рівень імунітету на 7 міс. і високі титри антитіл; при прискореній схемі, згідно з якою другу ін'єкцію проводять ч/з 1 міс. після першої, третю - ч/з 2 міс. після першої (0, 1 і 2 міс.) імунітет виникає швидше і вакцинація переноситься краще; згідно з цією схемою, можливе застосування четвертої дози ч/з 12 міс. у випадку, коли титри антитіл після третьої дози є нижчими, ніж після застосування схеми 0, 1, 6 міс. У виключних випадках у дорослих, коли необхідно швидко одержати імунітет (для мандрівників у високоендемічні зони, що проходять курс щеплення з метою профілактики захворювання на гепатит В) за місяць до виїзду, другу ін'єкцію роблять ч/з 7 днів після першої, третю - ч/з 21 день після першої (0, 7 і 21 день); при застосуванні цієї схеми рекомендовано проведення четвертої дози ч/з 12 міс. після першої. Особи віком від 11 до 15 років включно: доза 20 мкг може застосовуватися у осіб віком від 11 до 15 років включно згідно зі схемою 0, 6 міс.^{БНФ}; у цьому випадку необхідний рівень імунітету проти вірусу гепатиту В може не бути досягнутий до другої дози; т.ч., зазначену схему слід застосовувати лише у ситуаціях низького ризику інфікування HBV протягом курсу вакцинації та при забезпеченні отримання пацієнтом двохдозового курсу вакцинації^{БНФ}; якщо зазначені умови забезпечити неможливо (пацієнти, що знаходяться на гемодіалізі, мандрівники в високоендемічні регіони та у випадку тісного контакту з інфікованими особами) слід використовувати трьохдозову схему, або прискорену схему дозою 10 мкг. Немовлята, матері яких є носіями вірусу гепатиту В: імунізацію таких новонароджених вакциною (10 мкг) необхідно починати при народженні; можна застосовувати дві схеми імунізації: або в 0, 1, 2 і 12 міс., або в 0, 1 і 6 міс.; використання першої схеми забезпечує більш швидку імунну відповідь. ЕУВАКС В/ЕУВАХ В Вакцина для профілактики гепатиту В рекомбінантна рідка, ЕлДжі Лайф Сайенсис Лтд., Корея: одна педіатрична доза (0,5 мл) для імунізації новонароджених та дітей віком до 15 років містить 10 мкг HBsAg; одна доза (1,0 мл) для імунізації дітей віком від 16 років та для дорослих містить 20 мкг HBsAg; вводити в/м у ділянку дельтоподібного м'язу у дорослих та дітей старшого віку або у передньо-латеральну поверхню стегна (середня її третина) у новонароджених, немовлят та дітей молодшого віку; процес імунізації складається із введення трьох доз вакцини згідно з наступною схемою: 1 доза - вибрана дата; 2 доза - ч/з 1 місяць після введення першої дози; 3 доза - ч/з 6 міс. після введення першої дози; у певних групах населення (новонароджені від матерів, інфікованих вірусом гепатиту В, особи з підозрою на інфікування вірусом або ті, хто подорожує у регіони з високим рівнем захворюваності) можна використати схему вакцинації, яка передбачає проведення трьох щеплень з інтервалом між наступними щепленнями в 1 місяць (0, 1 та 2 місяці); така схема передбачає введення бустерної дози ч/з 12 міс. після першого щеплення; введення бустерної дози вакцини (відповідно до вікового дозування) може бути показано пацієнтам, які перебувають на гемодіалізі та пацієнтам з імунодефіцитами, оскільки у цієї категорії пацієнтів захисний рівень антитіл (> 10 МО/мл) може бути не досягнутий після первинної імунізації.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль, почервоніння у місці введення, ущільнення місця введення, набряк, болючість, запалення, гематома, лихоманка, грипоподібні симптоми; відчуття дискомфорту, втомлюваність, нездужання; біль у животі, діарея, анорексія, блювання, нудота; безсоння, нервовість, дратівливість, безперервний пронизливий крик, сонливість; еритема, макуло-папульозний висип, свербіж, червоний плескатий та рожевий лишай; кандидоз, риніт; неонатальна жовтяниця, тимчасове підвищення трансаміназ; м'язова слабкість, міалгія, артралгія; головний біль, запаморочення, тромбоцитопенія; р-ції гіперчутливості, ангіоневротичний набряк, анафілаксія, АР, включаючи анафілактоїдні р-ції та імітацію сироваткової хвороби; неврит зорового нерва, лицевий параліч, с-м Гієна-Барре, погіршення перебігу розсіяного склерозу; неврити лімфаденопатія, гіпестезії, парастезії, менінгіт, параліч, конвульсії, енцефаліти, енцефалопатії, нейропатії, гіпотензія, васкуліт.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого її компонента, в т.ч. до дріжджів, пацієнтам з р-цією гіперчутливості на попереднє введення вакцини; г. захворювання, підвищена t° тіла; ВІЛ-інфекція не є протипоказанням до вакцинопрофілактики гепатиту В. Еувакс В не застосовується дітям при клінічних стадіях III та IV ВІЛ-інфекції та середньої тяжкості та тяжкій імуносупресії. Як і для інших вакцин, застосування вакцин пацієнтам з г. захворюваннями, що супроводжуються лихоманкою, слід відкласти. Наявність легкої інфекції не є протипоказанням.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЕНДЖЕРИКС™-В/ENGERIX™-В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНА НТНА	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	сусп. д/ін'єк. у монодоз. фл. та шпр. по 1мл (1доза д/дор.); 0,5мл (1доза д/діт.)	20 мкг/мл	№1, №25	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЕНДЖЕРИКС™-В/ENGERIX™-В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНА НТНА	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	сусп. д/ін'єк. у монодоз. фл. по 0,5мл (1доза д/діт.)	20 мкг/мл	№10	1339,15	27,05/\$
	ЕНДЖЕРИКС™-В/ENGERIX™-В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНА НТНА	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	сусп. д/ін'єк. у монодоз. фл. по 1мл (1доза д/дор.)	20 мкг/мл	№10	1523,68	24,26/\$
	ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНАНТНА РІДКА	ЕлДжі Кем, Лтд., Корея	сусп. д/ін'єк. у фл. по 0,5мл в пач.	10мкг/доза; 20мкг/доза	№1, №10, №20	відсутня у реєстрі ОБЦ	

21.1.2.2. Вакцини для профілактики поліомієліту

(також див.п. 2. розділу «ВАКЦИНИ ТА АНАТОКСИНИ»)

Вакцинація дітей для профілактики поліомієліту проводиться за віком 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців, 18 місяців, 6 років та 14 років. Інактивована вакцина для профілактики поліомієліту (далі - ІПВ) застосовується для перших двох щеплень, а при протипоказаннях до введення оральної поліомієлітної вакцини (далі - ОПВ) - для всіх наступних щеплень за Календарем.

Вакцина ОПВ застосовується для 3-6-го щеплень (щеплення за віком - 6 місяців, 18 місяців, 6 років та 14 років) за відсутності протипоказань до ОПВ.

Вакцина ІПВ може бути застосована для 3-6-го щеплень як окремо, так і у складі комбінованих вакцин.

Дітям, які перебувають у сімейному оточенні, дитячих закладах закритого типу з ВІЛ-інфікованими або з особами, яким протипоказано введення ОПВ, щеплення проводиться виключно ІПВ-вакциною.

Щеплення дітей з порушенням Календаря призначаються лікарем з такого розрахунку, щоб дитина встигла одержати чотириразове щеплення проти поліомієліту до 17 років 11 місяців 29 днів. У разі неможливості отримати 4 дози вакцини проти поліомієліту дитиною до 17 років 11 місяців 29 днів вводять стільки доз, скільки дитина встигне отримати до виповнення їй вказаного віку.

Для проведення першого та другого щеплення незалежно від віку використовується інактивована вакцина проти поліомієліту. Особам, старшим 18 років, вакцинація проводиться за епідемічними показаннями.

21.1.2.2.1. Інактивована поліомієлітна вакцина

- **Вакцина для профілактики поліомієліту, тривалентна, інактивована (Poliomyelitis, trivalent, inactivated, whole virus)***

Фармакотерапевтична група: J07BF03 - Poliomyelitis vaccines

Основна фармакотерапевтична дія: містить поліовіруси трьох типів 1, 2 і 3 та культивована на клітинній культурі та інактивована формальдегідом; ч/з 1 міс. після 3-ої дози первинної вакцинації рівень серопротекції складає 100 % для поліовірусів типів 1 та 3, і від 99 % до 100 % - для поліовірусу типу 2; у дітей молодшого віку перша бустерна доза (4-а доза) призводить до високого зростання титрів з рівнем серопротекції від 97,5 % до 100 % для всіх типів поліовірусів; ч/з 4-5 років після ревакцинації рівень захисту для всіх трьох типів поліовірусів складає 94-99 %; у дорослих вакцинованих осіб введення першої бустерної дози супроводжується вторинною імунною відповіддю; імунітет зберігається не менше 5 років після четвертої ін'єкції.

Показання для застосування ЛЗ: Профілактика поліомієліту у немовлят, дітей починаючи з 2-х місячного віку та дорослих з метою первинної вакцинації та ревакцинації (введення бустерних доз). При проведенні імунізації пацієнтів на території України слід керуватися чинними наказами МОЗ України.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: ІМОВАКС ПОЛІО, ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПОЛІОМІЄЛІТУ ІНАКТИВОВАНА РІДКА, Санофі Пастер., Франція, вводиться в/м або п/ш; місце ін'єкції: для немовлят та дітей раннього віку - середня третина передньоблатеральної ділянки стегна, для підлітків та дорослих - у дельтоподібний м'яз; разова імунізуюча доза - 0,5 мл. Діти: схема дозування відповідно до рекомендацій: 2 ін'єкції з інтервалом два місяці - одна у віці 2 місяців і одна у віці 4 місяців (первинна вакцинація), після цього проводиться перша ревакцинація у віці 11 міс. Інші схеми дозування відповідно до чинних національних рекомендацій слід використовувати за необхідності та з дотриманням рекомендацій ВООЗ: з віку 6 тижнів або з віку 2 міс. вводяться 3 послідовні дози вакцини Імовакс Поліо по 0,5 мл з інтервалом 1 або 2 міс., перша ревакцинація проводиться ч/з 6-12 міс. після отримання останньої дози первинної вакцинації. Будь-які подальші бустерні дози вакцини (які будуть вводитися у дитячому, підлітковому або дорослому віці) слід застосовувати відповідно до чинних національних рекомендацій. Дорослі: схема дозування відповідно до рекомендацій: у невакцинованих раніше дорослих необхідно призначити 2 послідовні дози по 0,5 мл з інтервалом у 2 місяці, після цього проводиться перша ревакцинація ч/з 8-12 міс. після отримання першої дози первинної вакцинації. Інші схеми дозування відповідно до чинних національних рекомендацій слід використовувати за необхідності та з дотриманням рекомендацій ВООЗ: раніше не вакцинованим дорослим необхідно призначити 2 послідовні дози по

0,5 мл з інтервалом 1 міс. або, бажано, 2 міс., перша ревакцинація проводиться ч/з 6-12 міс. після отримання останньої дози первинної вакцинації.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль, почервоніння, набряк у місці введення, лихоманка, транзиторне підвищення t° ; сонливість, дратівливість, неспокій, патологічний плач, головний біль, втрата апетиту; АР, включаючи анафілактичні та анафілактоїдні р-ції, ангіоедема, висип, кропив'янка; ізольовані або фебрильні судоми, транзиторна та помірна парестезія; лімфаденопатія; тимчасові артралгія, міалгія; у дуже недоношених дітей (народжених на ≤ 28 -му тижні вагітності) - апное.

Протипоказання до застосування ЛЗ: Відома гіперчутливість до будь-якого компонента вакцини, вакцини аналогічного складу, до будь-якої допоміжної речовини, або до неоміцину, стрептоміцину, поліміксину В; загальні тимчасові протипоказання до будь-якої вакцинації: захворювання з підвищенням температури тіла або гостре захворювання; в такому разі вакцинацію необхідно відкласти.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ІМОВАКС ПОЛІО® ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПОЛІОМІЄЛІТУ ІНАКТИВОВАНА РІДКА	Санофі Пастер (повний цикл виробництва, випуск серії)/Санофі-Авентіс Прайвіт Ко. Лтд., Платформа логістики та дистрибуції у м. Будапешт (Вторинне пакування, випуск серії)/САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА (заповнення шприців, контроль якості (стерильність)), Франція/Угорщина/Франція	сусп. д/ін'ек. у фл. в кор. або станд.-експорт. упак.	5мл/10доз	№1, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІМОВАКС ПОЛІО® ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПОЛІОМІЄЛІТУ ІНАКТИВОВАНА РІДКА	Санофі Пастер (повний цикл виробництва, випуск серії)/Санофі-Авентіс Прайвіт Ко. Лтд., Платформа логістики та дистрибуції у м. Будапешт (Вторинне пакування, випуск серії)/САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА (заповнення шприців, контроль якості (стерильність)), Франція/Угорщина/Франція	сусп. д/ін'ек. у шпр. з 1голк. або 2голк. в кор. або станд.-експорт. упак.	0,5мл/1доза	№1	192,00	27,08/\$

21.1.2.3. Вакцини для профілактики вітряної віспи

(також див.п. 2. розділу «Вакцини та анатоксини»)

- **Вакцина для профілактики вітряної віспи, жива атенуйована (*Varicella vaccine, live attenuated*)**

Фармакотерапевтична група: J07BK01- Varicella zoster vaccines

Основна фармакотерапевтична дія: препарат живого атенуйованого (ослабленого) вірусу (штам Ока) вітряної віспи, отриманого шляхом культивування штаму вірусу в диплоїдній культурі клітин людини MRC-5; доза вакцини 0,5 мл (після розчинення) містить не менш, ніж $10^{3,3}$ бляшкоутворюючих одиниць (БУО, PFU) атенуйованого вірусу вітряної віспи; у сприйнятливих осіб викликає послаблену клінічно безсимптомну форму вітряної віспи; наявність антитіл є показником захисту; обмеженого захисту від вітряної віспи можна досягти за допомогою вакцинації, яка зроблена не пізніше, ніж ч/з 72 год. після того, як людина контактувала з хворим на вітряну віспу.

Показання для застосування ЛЗ: активна імунізація проти вітряної віспи здорових осіб (починаючи з 9-місячного віку); імунізація з метою зниження ризику ускладнень від вітряної віспи пацієнтів з групи ризику захворювання на вітряну віспу (пацієнти з лейкемією, що отримують імуносупресивну терапію (включаючи ГКС) при лікуванні злоякісних пухлин, серйозні хр. захворювання (ХНН, аутоімунні захворювання, колагенози, тяжка БА), особи, яким заплановано проведення трансплантації органів).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: одна імунізуюча доза 0,5 мл, п/ш у верхню ділянку плеча (зона дельтоподібного м'яза) або передню частину стегна; здоровим дітям віком від 9 місяців до 12 років (включно) для досягнення оптимального рівня захисту проти вітряної віспи слід застосовувати 2 дози вакцини; бажано застосувати другу дозу принаймі ч/з 6 тижн. після першої, але не раніше, ніж ч/з 4 тижн. після першої дози; підліткам та дорослим віком від 13 років та старшим 2 дози з інтервалом між ними принаймі 6 тижн. і ні за яких обставин не раніше, ніж ч/з 4 тижн. після першої дози; для пацієнтів групи ризику можуть бути застосовані такі ж схеми вакцинації, як і для здорових осіб; цим пацієнтам рекомендується періодично оцінювати рівень антитіл до вірусу вітряної віспи після вакцинації для визначення тих пацієнтів, яким така ревакцинація буде корисною.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль, почервоніння, набряк у місці введення, лихоманка з температурою; лімфаденопатія; інфекція ВДШ, фарингіт; дратівливість, головний біль, сонливість; кон'юнктивіт, кашель, риніт; нудота, блювання, біль у животі, діарея; висип, свербіж, кропив'янка, артралгія, міалгія, лихоманка, втома, нездужання; оперізувальний лишай, тромбоцитопенія, гіперчутливість, анафілактичні реакції; енцефаліт, порушення мозкового кровообігу, церебеліт, симптоми церебеліта (транзиторне порушення ходи, перехідна атаксія), судоми, васкуліт (у т.ч. хвороба Шенлейна-Геноха, с-м Кавасакі); поліморфна еритема.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до неоміцину або до іншого компоненту вакцини; гіперчутливість після попереднього введення вакцини проти вітряної віспи; вагітність, годування груддю; г.важка лихоманка; важкий гуморальний або клітинний імунodefіцит (первинний або набутий імунodefіцит з загальною кількістю лімфоцитів менше $1,2 \times 10^9/\text{л}$; інші ознаки дефіциту клітинного імунітету (лейкемія, лімфома, патологічні порушення крові, з клінічними проявами ВІЛ-інфекції); пацієнти, що отримують імуносупресивні препарати, включаючи високі дози ГКС; пацієнти з важким комбінованим імунodefіцитом, агамаглобулінемією і СНІДом або симптоматичною ВІЛ-інфекцією або відповідним до віку дитини до 12 міс. відсотком CD4 + Т-лімфоцитів: CD4 + <25%; діти віком від 12-35 міс.: CD4 + <20%; діти віком від 36-59 міс.: CD4 + < 15%; слід уникати настання вагітності не менше ніж 1 міс. після вакцинації.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ВАРИПРИКС™/VARILRIX™ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ВІТРЯНОЇ ВІСПИ ЖИВА АТЕНУЙОВАНА	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	ліоф., д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	1 доза	№1, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	

21.1.2.4. Вакцини для профілактики грипу

Вакцини для профілактики грипу відповідають рекомендаціям ВООЗ щодо складу вакцин кожного епідемічного сезону грипу для Північної півкулі. Вони одночасно містять антигени штамів вірусу грипу, а саме: А(Н1N1), А(Н3N2) та В.

- **Вакцина для профілактики грипу, інактивована, розщеплений вірус або поверхневий антиген (Influenza, inactivated, split virus or surface antigen)**

Фармакотерапевтична група: J07BB - Influenza vaccines

Основна фармакотерапевтична дія: формує розвиток специфічного імунітету до епідемічно актуальних штамів вірусу грипу; серопротекція розвивається протягом 2-3 тижнів; тривалість імунітету після вакцинації залежить від вакцинного штаму і, як правило, триває від 6 до 12 місяців після щеплення. Віруси грипу постійно змінюються, тому склад вакцини різних років також може бути різним; для забезпечення належного захисту проти грипу треба повторювати щеплення кожного року перед початком епідемічного сезону.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика грипу у дорослих і дітей, починаючи з 6-місячного віку^{БНФ}; **ІНФЛУЕНЗА ВАКСІН:** профілактика грипу, викликаного вірусами грипу підтипів А і В, у дорослих та дітей віком від 9 років.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: ВАКСІГРИП® ТЕТРА / VAXIGRIP TETRA, Спліт-вакцина для профілактики грипу чотирьохвалентна, інактивована, Санофі Пастер С.А., Франція: вводити в/м або глибоко п/ш, дорослим та дітям з 36-ти місячного віку в дельтоподібний м'яз, дітям з 6-ти до 35-ти місячного віку в передньо-латеральну поверхню стегна (або дельтоподібний м'яз, якщо його м'язова маса є достатньою); дорослі: одна доза 0,5 мл; діти віком від 6 місяців до 17 років - одна доза 0,5 мл; дітям віком до 9 років, які раніше не вакцинувалися, другу дозу вакцини 0,5 мл потрібно ввести після першої з інтервалом щонайменше 4 тижні; діти віком до 6 місяців: безпека та ефективність застосування вакцини Ваксігріп® Тетра не встановлені. **ДжіСі Флю/ГС FLU® Вакцина для профілактики грипу (розщеплений віріон, інактивований)**, Грін Крос Корпорейшн, Корея: в/м, імунізації однією дозою необхідні кожен рік: діти віком 6 міс. -3 років - 0,25 мл (7,5мкг); діти віком 3-8 років - доза 0,5 мл (15мкг); діти віком 9 років та дорослі - доза 0,5 мл (15мкг); діти молодше 9 років, які раніше не були щеплені або не були інфіковані грипом, повинні бути щеплені 2 рази з інтервалом не менше ніж 4 тижні у вищезазначеній дозі. **ДЖІСІ ФЛЮ КВАДРИВАЛЕНТ/ГС FLU QUADRIVALENT, Вакцина для профілактики грипу (розщеплений віріон, інактивований):** діти віком від 6 міс. та дорослі: одна доза 0,5 мл; дітям віком до 9 років, які раніше не вакцинувалися, другу дозу вакцини 0,5 мл потрібно ввести після першої з інтервалом щонайменше 4 тижні; вакцину вводити в/м, рекомендованим місцем для в/м ін'єкції дітям віком від 6-35 міс. є передньолатеральна ділянка стегна (або дельтовидний м'яз, якщо м'язової маси достатньо), для введення дітям віком від 36 місяців та дорослим - дельтовидний м'яз. **ІНФЛУВАК®/ІНФЛУВАК® Вакцина для профілактики грипу, поверхневий антиген, інактивована, Abbott Biologicals B.V., Нідерланди:** дорослим в/м або глибоко п/ш - 0,5 мл; дітям віком від 36 міс. до 18 років - 0,5 мл; дітям віком від 6 до 35 міс. можна вводити по 0,25 мл або 0,5 мл; дітям, які ніколи не були попередньо щеплені проти грипу, рекомендовано ввести другу дозу з інтервалом щонайменше у 4 тижні^{БНФ}; дітям молодшого віку вводити в передньолатеральну частину стегна; **ІНФЛУЕНЗА ВАКСІН:** вакцину вводять в/м в ділянку дельтоподібного м'яза плеча; дорослим та дітям віком від 9 років—0,5 мл (одна доза); щеплення на території України проводяться згідно з вимогами чинних наказів МОЗ України.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: почервоніння, набряк, біль, екхімоз, свербіж, затвердіння у місці введення, головний біль, дратівливість, плаксивість, неспокій; пітливість; міалгія, артралгія, гарячка, нездужання, озноб, стомлюваність, сонливість, запаморочення, посилене серцебиття; тимчасові тромбоцитопенія, лімфаденопатія; АР, ангіоневротичний набряк, шок; васкуліт; тимчасові розлади ЦНС та периферичної нервової системи, невралгія, парестезія, плечовий радикуліт; фебрильні судоми, неврологічні порушення (енцефаломієліт, неврит, с-м Гійена-Барре); васкуліт, асоційований у дуже рідких випадках із транзиторним порушенням ф-ції нирок; свербіж, кропив'янка, висип, генералізована еритема; грипозний синдром, ринорея, закладення носа, відчуття тяжкості в грудній клітці, блювота, діарея, нудота; мігрень, порушення сну.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючих речовин, до допоміжної або до залишкової речовини (яєць, овальбуміну, неоміцину сульфату, формальдегіду, цетилтриметиламонію броміду, полісорбату 80, гентаміцину, натрію дезоксихолату, октоксинолу-9); імунізацію слід відкласти при: захворюваннях, що супроводжуються підвищеною t°, або г. інфекційних захворюваннях, загостреннях хр. захворювань; гострих,

серйозних, або активних захворюваннях серця, судин, нирок, печінки; г.респіраторних захворюваннях або інших активних інфекційних захворюваннях, у періоді одужання; особам: у яких була лихоманка або симптоми алергії (генералізований висип) на попереднє щеплення; у яких спостерігалися судоми впродовж 1 року перед щепленням; з с-мом Гійена-Барре протягом 6 тижн. після попередньої вакцинації проти грипу або з неврологічними розладами; у яких діагностовано імунодефіцитне захворювання; стан яких є незадовільним для проведення щеплення, окрім випадків зазначених вище; період вагітності.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ВАКСІГРИП® ТЕТРА / VAXIGRIP TETRA СПЛІТ-ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГРИПУ ЧОТИРЬОХВАЛЕНТНА, ІНАКТИВОВАНА	Санофі Пастер (повний цикл виробництва, заповнення, первинне та вторинне, контроль якості, випуск серії)/САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА (заповнення, первинне та вторинне пакування, контроль якості)/Санофі-Авентіс Прайвіт Ко. Лтд., Платформа логістики та дистриб, Франція/Франція/Угорщина/Бельгія	сусп. д/ін'ек. у шпр. без голк. в кор.	0,5мл	№1	230,21	27,60/\$
	ВАКСІГРИП® ТЕТРА / VAXIGRIP TETRA СПЛІТ-ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГРИПУ ЧОТИРЬОХВАЛЕНТНА, ІНАКТИВОВАНА	Санофі Пастер (повний цикл виробництва, заповнення, первинне та вторинне, контроль якості, випуск серії)/САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА (заповнення, первинне та вторинне пакування, контроль якості)/Санофі-Авентіс Прайвіт Ко. Лтд., Платформа логістики та дистриб, Франція/Франція/Угорщина/Бельгія	сусп. д/ін'ек. у шпр. з голк. в кор.	0,5мл	№1	230,21	27,60/\$
	ДЖІСІ ФЛЮ/ГС FLU ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГРИПУ (РОЗЩЕПЛЕНИЙ ВІРІОН, ІНАКТИВОВАНИЙ)	Грін Кросс Корпорейшн, Корея	сусп. д/ін'ек. у шпр. з голк. у бл.	0,25мл; 0,5мл	№1, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДЖІСІ ФЛЮ/ГС FLU ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГРИПУ (РОЗЩЕПЛЕНИЙ ВІРІОН, ІНАКТИВОВАНИЙ)	Грін Кросс Корпорейшн, Корея	сусп. д/ін'ек. у шпр. з голк. у бл.	0,5мл	№10	1850,00	27,31/\$
	ІНФЛУВАК® (INFLUVAC®) ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГРИПУ, ПОВЕРХНЕВИЙ АНТИГЕН, ІНАКТИВОВАНА	Абботт Біолоджікалз Б.В., Нідерланди	сусп. д/ін'ек. у однораз. шпр.	0,5мл	№1, №10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ІНФЛУЕНЗА ВАКСІН	Хуалан Біолоджікал Бактерін Ко., Лтд., Китайська Народна Республіка	сусп. д/ін'ек. у фл. зі скл. в кор.	0,5мл/доза	№10	1280,00	25,92/\$

21.1.2.5. Вакцини для профілактики гепатиту А

(також див. п. 2. розділу «ВАКЦИНИ ТА АНАТОКСИНИ»)

- **Вакцина для профілактики гепатиту А, інактивована (Hepatitis A, inactivated, whole virus)**

Фармакотерапевтична група: J07BC02 - Hepatitis vaccines.

Основна фармакотерапевтична дія: містить інактивованій за допомогою формальдегіду вірус гепатиту А, культивованій у диплоїдних клітинах людини, адсорбованій на гідроксиді алюмінію; стимулює специфічну імунну відповідь, на основі індукції антитіл проти вірусу гепатиту А (HAV); у 99 % вакцинованих отримана сероконверсія ч/з 30 днів після введення першої дози вакцини; встановлена рання і швидка сероконверсія після введення однієї дози вакцини у 79% вакцинованих на 13-й день, 86,3% - на 15-й день, 95,2% - на 17-й день і 100 % - на 19-й день, тобто цей часовий інтервал був коротший середньоінкубаційного періоду для вірусу гепатиту А; вакцинація 80 % популяції призводить до припинення спалахів захворювання за період 4 - 8 тижнів.; для гарантії тривалого імунного захисту ч/з 6-12 міс. після проведення первинної вакцинації повинна проводитися бустерна вакцинація.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика гепатиту А у дорослих і дітей віком від 12 місяців^{БНФ, ВООЗ}; активна імунізація осіб, які входять до груп ризику інфікування вірусом гепатиту А: мандрівники, особи, які подорожують у регіони з високою поширеністю гепатиту А; військовослужбовці збройних сил та які направляються в регіони з підвищеною ендемічністю або в регіони що мають підвищений ризик інфікування вірусом гепатиту А; особи, для яких існує ризик захворювання на гепатит А ч/з їх професійну діяльність, або для яких існує підвищений ризик передачі захворювання (персонал дитячих дошкільних закладів, медсестри, лікарі, молодший медичний персонал у лікарнях та інших ЛПУ, особливо у гастроентерологічних та педіатричних відділеннях, робітники, які обслуговують системи каналізації та водоочисні споруди, працівники громадського харчування та продовольчих складів, та інші категорії; особи, що перебувають у групі підвищеного ризику ч/з свою статеву поведінку; хворі на гемофілію; особи, які використовують ін'єкційні наркотики, які контактують з інфікованими людьми, певні групи населення, для яких відомий високий рівень захворюваності на гепатит А; особи з хр. захворюваннями печінки або для яких існує підвищений ризик розвитку хр. захворювань печінки.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: щодо схеми застосування, протипоказань та взаємодії з іншими ЛЗ, керуватися діючими наказами МОЗ України щодо проведення профілактичних щеплень. Вакцина *Хаврикс™-1440 / Хаврикс™-720, GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Бельгія*: в/м, дорослим та дітям старшого віку вводять у ділянку дельтоподібного м'яза, дітям молодшого віку - у передньо-бокову ділянку стегна; первинна вакцинація: дорослим віком 19 років та старше застосовують одноразову дозу вакцини Хаврикс™ 1440 (1,0 мл суспензії); дітям від 1 року та підлітків до 18 років включно для первинної імунізації застосовують одноразову дозу вакцини Хаврикс™ 720 (доза для дітей) (0,5 діл суспензії)^{БНФ}. Після первинної вакцинації препаратами Хаврикс™ 1440 (доза для дорослих) або Хаврикс™ 720 (доза для дітей) для гарантії тривалого імунного захисту рекомендується вводити бустерну дозу вакцини, яку необхідно ввести в будь-який час між 6 місяцями і 5 роками після введення першої дози, але краще між 6 і 12 місяцями після введення першої дози вакцини^{БНФ}; хворим з тромбоцитопенією або порушеннями згортання крові вакцину слід вводити з обережністю, що пов'язано з підвищеним ризиком виникнення кровотечі після в/м введення препарату.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль, почервоніння, індурація у місці ін'єкції, втомлюваність; підвищення t°, головний біль, дратівливість, сонливість; втрата апетиту, діарея, нудота, блювота; міалгія або артралгія, обмеження скелетно-м'язової рухливості, нездужання, озноб; анафілаксія, АР, включаючи анафілактоїдні р-ції та р-ції, що імітують сироваткову хворобу, висип, кропив'янка, свербіж; васкуліти, судоми, парестезія, с-ром Гійєна-Барре, поперечний мієліт, невралгічна аміотрофія; ангіоневротичний набряк, поліморфна еритема; інфекції ВДШ, грипоподібні симптоми, риніт; тимчасове збільшення показників ф-ції печінки.

Протипоказання до застосування ЛЗ: відома гіперчутливість до будь-якого компонента вакцини, р-ція на попереднє введення вакцини, при проведенні імунізації на території України слід керуватися діючими наказами МОЗ України щодо профілактичних щеплень.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ХАВРИКС™ 1440 ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ А	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	сусп. д/ін'єк. у фл. або шпр. з голк. в кор.	1мл (1доза д/дор.)	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ХАВРИКС™ 720 ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ А	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	сусп. д/ін'єк. у фл. або шпр. з голк. в кор.	0,5мл (1доза д/діт.)	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

21.1.2.6. Вакцини для профілактики папіломавірусної інфекції

- **Вакцина для профілактики захворювань, що викликаються папіломовірусом (тип 16, 18) (Papillomavirus vaccine (human types 16, 18))**

Фармакотерапевтична група: J07BM02 - вакцина для профілактики захворювань, що викликаються вірусом папіломи людини (типи 16, 18).

Основна фармакотерапевтична дія: рекомбінантна вакцина, виготовлена з високоочищених неінфекційних вірусоподібних часток (ВПЧ) основного L1 білка оболонки ВПЛ 16 і 18 типів; вірусоподібні частки не містять вірусної ДНК, тому не можуть інфікувати клітини або бути причиною раку даної локалізації; містить ад'ювант AS04, який продемонстрував здатність викликати вищий та тривалий рівень імунної відповіді у порівнянні з вакциною, що містить ті ж самі антигени з гідроксидом алюмінію (Al(OH)₃) у якості ад'юванту.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика персистоючої інфекції, передпухлинних уражень аногенітальної зони (шийки матки, вульви, піхви та ануса) та раку шийки матки^{БНФ}, що спричиняється певними онкогенними типами вірусу папіломи людини (ВПЛ) у осіб жіночої та чоловічої статі починаючи з 9-ти річного віку^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/м в область дельтоподібного м'яза; разова доза 0,5 мл і є однаковою для дітей та дорослих; починаючи з 9-річного віку та до 14 років на момент першої ін'єкції вакцину можна

застосовувати відповідно до дводозового або тридозового графіка; починаючи з 15-річного віку та старше рекомендується лише тридозовий графік вакцинації; незалежно від віку особи; у разі введення другої дози у період до 5-ти місяців після першої дози, завжди призначається третя доза^{БНФ}. Щеплення на території України здійснюється згідно з вимогами діючих наказів МОЗ України у галузі вакцинопрофілактики.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції в місці введення (біль, почервоніння, набряк, ущільнення, місцева парестезія), лімфаденопатія; головний біль, міалгія, артралгія; шлунково-кишкові порушення (нудота, блювання, діарея, біль у животі); свербіж, висипання, кропив'янка; втома, лихоманка; інфекції ВДШ, запаморочення; АР та анафілактичні та анафілактоїдні р-ції, ангіоневротичний набряк (набряк Квінке); неприємний запах, вазовагальна р-ція на ін'єкційне введення, що інколи супроводжується тоніко-клонічними рухами.

Протипоказання до застосування ЛЗ: відома гіперчутливість до діючих речовин або до будь-якого компонента вакцини; тяжкі ускладнення від попередньої дози вакцини у вигляді анафілактичної р-ції; введення вакцини слід відкласти особам з лихоманкою.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ЦЕРВАРИКС™ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЩО ВИКЛИКАЮТЬСЯ ВІРУСОМ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ ТИПІВ 16 ТА 18	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	сусп. д/ін'єк. у фл. з проб. в кор.	0,5мл/доза	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЦЕРВАРИКС™ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЩО ВИКЛИКАЮТЬСЯ ВІРУСОМ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ ТИПІВ 16 ТА 18	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	сусп. д/ін'єк. у шпр. з голк. в кор.	0,5мл/доза	№1	837,01	27,20/\$

- **Вакцина для профілактики захворювань, що викликаються папіломовірусом (тип 6, 11, 16, 18) (Papillomavirus vaccine (human types 6, 11, 16, 18))**

Фармакотерапевтична група: J07BM01 - Вакцина для профілактики захворювань, викликаних вірусом папіломи людини (типу 6, 11, 16, 18).

Основна фармакотерапевтична дія: ад'ювантна неінфекційна рекомбінантна квадривалентна вакцина, виготовлена з вірусоподібних часток (ВПЧ) високого ступеню очищення основного капсидного білка (L1) вірусу папіломи людини (ВПЛ) типів 6, 11, 16 та 18; білки L1 продукуються шляхом роздільної ферментації культурою дріжджових клітин (*Saccharomyces cerevisiae* CANADE 3C-5 (Штам 1895)) за технологією рекомбінантної ДНК та утворюють ВПЧ шляхом самоскладання; ВПЧ для кожного типу очищуються та адсорбуються на аморфному ад'юванті у вигляді алюмінію гідроксифосфат сульфату; ВПЧ не містять ДНК вірусу, тому не інфікують клітини, не здатні до репродукції або не можуть викликати захворювання.

Показання для застосування ЛЗ: дівчатам та жінкам у віці від 9 до 45 років для попередження захворювань, які викликаються ВПЛ 6, 11, 16, 18 типів: рак шийки матки, вульви, піхви^{БНФ}, рак анального каналу, спричинений ВПЛ типів 16 та 18; генітальних кондилом^{БНФ}, спричинених ВПЛ типів 6 та 11 та інфекцій і наступних передракових або диспластичних станів^{БНФ}, спричинених ВПЛ типів 6, 11, 16 та 18; цервікальна внутрішньоепітеліальна неоплазія 2 та 3 ст.(CIN 2/3) та аденокарциноми шийки матки *in situ* (AIS); цервікальна внутрішньоепітеліальна неоплазія 1 ст.(CIN 1); внутрішньоепітеліальна неоплазія вульви 2 та 3 ст.(VIN 2/3); внутрішньоепітеліальна неоплазія піхви 2 та 3 ст.(VaIN 2/3); внутрішньоепітеліальна неоплазія вульви 1 ст.(VIN 1) та внутрішньоепітеліальна неоплазія піхви 1 ст.(VaIN 1); внутрішньоепітеліальна неоплазія анального каналу (AIN) 1, 2, 3 ст.; дівчатам та жінкам у віці від 9 до 26 років для попередження цервікальної внутрішньоепітеліальної неоплазії (CIN), що пов'язана з ВПЛ типів 31, 33, 52 та 58, або аденокарциноми шийки матки *in situ* (AIS); хлопчикам та чоловікам у віці від 9 до 26 років для попередження захворювань та інфекцій, спричинених ВПЛ типів 6, 11, 16 та 18: рак анального каналу, спричинений ВПЛ типів 16 та 18; генітальні кондиломи (*Condiloma acuminata*), спричинені ВПЛ типів 6 та 11; для попередження передракових та диспластичних станів, спричинених ВПЛ типів 6, 11, 16 та 18^{БНФ}: внутрішньоепітеліальної неоплазії анального каналу (AIN) 1, 2 та 3 ст.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: діти віком від 9 до 13 років включно: в/м дві дози по 0,5 мл: 0 та 6 міс.; якщо другу дозу вводять раніше, ніж ч/з 6 міс. після першої, то слід обов'язково ввести третю дозу^{БНФ}; альтернативно можна застосовувати за трьохдозовою схемою (0,5 мл: 0, 2 та 6 місяців), другу дозу слід вводити принаймні ч/з 1 міс. після першої, а третю - як мінімум ч/з 3 міс. після другої дози; всі три дози слід вести протягом 1 року. Діти віком від 14 років і дорослі: застосовувати за трьохдозовою схемою (0,5 мл: 0, 2 та 6 міс.); другу дозу вводити принаймні ч/з 1 міс. після першої, а третю - як мінімум ч/з 3 міс. після другої дози; всі три дози слід вести протягом 1 року^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: еритема, біль, набряк, гематома, свербіж, целюліт у місці ін'єкції; головний біль; нудота, блювання; біль в кінцівках, лихоманка; ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура, лімфаденопатія, аутоімунна гемолітична анемія; р-ції гіперчутливості, включаючи анафілактичні/анафілактоїдні р-ції, кропив'янка; запаморочення, слабкість, нездужання, артралгія, міалгія, астения, озноб, бронхоспазм; г.дисемінований енцефаломієліт, с-м Гійєна-Барре, синкопе, тоніко-клонічні судоми.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючих речовин або до будь-якого компоненту вакцини, включаючи тяжкі АР на дріжджі; застосування вакцини потрібно відкласти у пацієнтів з г.

захворюваннями, що супроводжуються лихоманкою; наявність легкої інфекції (незначна інфекція ВДШ або субфебрильна t°), не є протипоказанням для вакцинації.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ГАРДАСИЛ/ GARDASIL® ВАКЦИНА ПРОТИ ВІРУСУ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ (ТИПІВ 6, 11, 16, 18) КВАДРИВАЛЕНТНА РЕКОМБІНАНТНА	Мерк Шарп і Доум Б.В. (вторинне пакування, дозвіл на випуск серії)/Мерк Шарп і Доум Корп. (виробництво нерозфасованої продукції, контроль якості та первинне пакування), Нідерланди/США	сусп. д/ін'єк. у фл. в кор. або шпр. з голк. конт. комір/уп.	0,5мл/доза	№1, №6, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГАРДАСИЛ/ GARDASIL® ВАКЦИНА ПРОТИ ВІРУСУ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ (ТИПІВ 6, 11, 16, 18) КВАДРИВАЛЕНТНА РЕКОМБІНАНТНА	Мерк Шарп і Доум Б.В. (вторинне пакування, дозвіл на випуск серії)/Мерк Шарп і Доум Корп. (виробництво нерозфасованої продукції, контроль якості та первинне пакування), Нідерланди/США	сусп. д/ін'єк. у фл. в кор. або шпр. з голк. конт. комір/уп.	0,5мл/доза	№1	2426,48	26,96/\$

21.1.2.7. Вакцини для профілактики кліщового енцефаліту

- **Вакцина для профілактики кліщового енцефаліту, інактивована (Encephalitis, tick borne, inactivated, whole virus) ****

Фармакотерапевтична група: J07BA01 - Вакцини проти енцефаліту. Інактивована вірусна вакцина проти кліщового енцефаліту.

Основна фармакотерапевтична дія: вакцина містить вірус кліщового енцефаліту (штам Neudörfli), адсорбований на гідроксиді алюмінію, вирощений на культурі фібробластних клітин курячих ембріонів (клітинах CEF); ефект вакцини полягає в індукуванні достатньо високої концентрації антитіл для забезпечення захисту від вірусу кліщового енцефаліту; коефіцієнт захисту 99 % при відсутності статистичних значущих відмінностей між віковими групами у правильно вакцинованих осіб; коефіцієнт захисту має щонайменше таку саму величину після перших двох щеплень з наступною стандартною або швидкою вакцинацією, тобто до завершення базового курсу вакцинації третім щепленням; в осіб, які мали нерегулярну вакцинацію, коефіцієнт захисту значно нижчий; вакцинація індукує статистично еквівалентні титри нейтралізуючих антитіл до вірусу KE проти Європейського, Сибірського та Далекосхідного штамів вірусу KE.

Показання для застосування ЛЗ: вакцина 0,5 мл показана для активної (профілактичної) імунізації осіб віком від 16 років проти кліщового енцефаліту (KE); вакцина 0,25 мл показана для активної (профілактичної) імунізації дітей віком від 1 до 15 років проти кліщового енцефаліту (KE); вакцинація проводиться відповідно до офіційних рекомендацій стосовно необхідності і часу проведення вакцинації проти KE.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: схема первинної вакцинації однакова для всіх осіб і складається з трьох щеплень вакциною 0,5 мл для осіб віком від 16 років або 0,25 мл для дітей віком від 1 до 15 років; перше та друге щеплення проводиться з інтервалом в 1-3 місяці; якщо потрібно швидко набути імунітет, друге щеплення можна провести ч/з два тижні після першого; після введення перших двох доз досягається достатній захист протягом сезону активності кліщів-переносників; третє щеплення проводиться ч/з 5-12 місяців після другого, очікується, що після введення третьої дози захист триватиме щонайменше 3 роки; щоб виробити імунітет до початку сезонної активності кліщів, яка припадає на весну, перше і друге щеплення бажано проводити у зимові місяці, ідеальним є завершення курсу вакцинації третім щепленням протягом того ж сезону активності кліщів або щонайменше до початку наступного сезону активності. Бустер-дози: для осіб віком від 1 року першу бустер-дозу вводити ч/з 3 роки після третього щеплення; наступні бустер-дози вводити кожні 5 років після останньої бустер-дози; для осіб віком від 60 років інтервали введення бустер-доз не повинні перевищувати трьох років; подовження інтервалів між будь-якими дозами (при застосуванні схеми первинної вакцинації та при проведенні ревакцинацій) може спричинити недостатній захист вакцинованих осіб проти інфекції, проте у разі перерваного графіку вакцинації принаймні двох попередніх щеплень застосування однієї дози «навздогін» є достатнім для продовження графіка.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: зниження апетиту, втома, нездужання, неспокій, порушення сну, головний біль; нудота, блювання, біль у животі; міалгія, гарячка, р-ції у місці ін'єкції (набряк, ущільнення, еритема, свербіж); лімфаденопатія, артралгія, озноб; розлади чутливості, запаморочення, вертиго; діарея, диспепсія; кропив'янка; поодинокі: оперізувальний герпес (спровокований у раніше інфікованих пацієнтів); преципітація або погіршення перебігу аутоімунних розладів (розсіяного склерозу), анафілактична р-ція; демієлінізуючі розлади (г.розсіяний енцефаломієліт, с-ром Гієна-Барре, мієліт, поперечний мієліт), енцефаліт, судоми, асептичний менінгіт, менінгізм, порушення чутливості та порушення рухової ф-ції (параліч/парез лицьового нерва, параліч/парез, неврит, гіпестезія, парестезія), невралгія, неврит зорового нерва, запаморочення; погіршення зору, фотофобія, біль в оці; шум у вухах; тахікардія; задишка; висип (еритематозний, макуло-папульозний), свербіж, дерматит, еритема, гіпергідроз; біль у спині, набряк суглобів, біль у шії, м'язово-скелетна скутість (у т.ч. скутість у шийному відділі хребта), біль у кінцівках; порушення ходи, озноб, гриппоподібне захворювання, загальна слабкість, набряк, порушення рухливості у суглобі у місці ін'єкції такі як біль в суглобі, виникнення вузликів і запалення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючої речовини, будь-якої допоміжної речовини або залишків речовин, що використовуються у процесі виробництва (формальдегід, неоміцину, гентаміцину, протамінсульфату); слід враховувати імовірність перехресних АР з іншими (крім неоміцину та гентаміцину)

аміноглікозидами; тяжка гіперчутливість до яєць, курячих білків (анафілактична р-ція після внутрішнього вживання яєчного білка) може зумовити тяжкі АР у сенсibiliзованих осіб; вакцинацію проти КЕ слід відкласти, якщо людина страждає на г. захворювання помірної тяжкості або тяжке захворювання (з підвищенням t° тіла або без).

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ФСМЕ-ІМУН ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ КЛІЩОВОГО ЕНЦЕФАЛІТУ КУЛЬТУРАЛЬНА ІНАКТИВОВАНА ОЧИЩЕНА СОРБОВАНА	Бакстер АГ (виробництво продукту у формі in bulk; наповнення шприців; контроль якості)/Пфайзер Менюфекчуринг Австрія ГмбХ (контроль якості)/Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ (пакування; маркування; випуск серії), Австрія/ Австрія/Бельгія	сусп. д/ін'ек. у однораз. шпр. по 0,5мл з окрем. голк. в бл.	2,4мкг/0,5мл (1доза д/дор.)	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ФСМЕ-ІМУН ДЖУНІОР ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ КЛІЩОВОГО ЕНЦЕФАЛІТУ КУЛЬТУРАЛЬНА ІНАКТИВОВАНА ОЧИЩЕНА СОРБОВАНА	Бакстер АГ (виробництво продукту у формі in bulk; наповнення шприців; контроль якості; пакування; маркування)/Пфайзер Менюфекчуринг Австрія ГмбХ (контроль якості; випуск серії)/Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ, Австрія/Австрія/Бельгія	сусп. д/ін'ек. у однораз. шпр. по 0,25мл з окрем. голк. в бл.	1,2мкг/0,25мл (1доза д/діт.)	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	

21.1.2.8. Вакцини для профілактики сказу

- **Вакцина антирабічна, інактивована (Rabies, inactivated, whole virus) * ****

Фармакотерапевтична група: J07BG01 - Rabies vaccines

Основна фармакотерапевтична дія: містить вірус сказу, вирощений на клітинній культурі, інактивований бета-пропіолактоном; індукує розвиток імунітету проти вірусу сказу; рівень сироваткових антирабічних антитіл $\geq 0,5$ МО/мл, що відповідно до рекомендацій ВООЗ вважається захисним, досягається після введення 3 доз на 0-й, 7-й та 28-й (або 21-й) день; імунітет підтримується за допомогою введення бустерних доз.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика сказу у дорослих та дітей; використовується з профілактичною або лікувально-профілактичною метою^{БНО}, як для проведення первинної імунізації, так і для ревакцинації.

Профілактична імунізація: особи, які мають високий ризик зараження вірусом сказу: персонал діагностичних, дослідницьких або виробничих лабораторій, які працюють з вірусом сказу; особи, які часто піддаються ризику контакту із вірусом сказу, такі як: ветеринари та асистенти, дресировальники тварин; особи, які або ч/з свою професійну діяльність, або у зв'язку із хобі контактують з такими видами тварин, як собаки, коти, лисиці, єнотовидні собаки, куниці, летючі миші або іншими видами, у яких може бути сказ (єгері, мисливці, працівники лісових господарств, спелеологи і таксидермісти); особам, що виконують роботи з відлову і утримання бездомних тварин; працівникам притулків для утримання тварин. **Лікувально-профілактична імунізація:** особам, що зазнали укусів, подряпин, ослизнення хворими або підозрюваними щодо захворювання на сказ тварин; за наявності навіть найменшого ризику зараження необхідно якомога раніше провести лікувально-профілактичну імунізацію; лікувально-профілактичні заходи включають - місцеву неспецифічну обробку місця ураження, пасивну імунізацію антирабічними імуноглобулінами (АІГ) та вакцинацію - в залежності від типу ураження та стану тварини.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: антирабічна допомога складається з місцевої обробки рани, введення антирабічної вакцини або одночасного застосування антирабічного імуноглобуліну та вакцини; імунізуюча доза - 0,5 мл. ВЕРОРАБ, вакцина антирабічна інактивована суха, Санофі Пастер С.А., Франція, ЗАТ "Санофі-Авентіс", Угорщина: одна імунізуюча доза складає 0,5 мл вакцини в/м; дітям та дорослим застосовують однаковий режим дозування; схема проведення щеплень визначається згідно з обставинами та наявністю попередніх щеплень проти сказу в анамнезі та антирабічного імунного стану пацієнта; первинна імунізація, на підставі рекомендацій ВООЗ, проводиться 3-ма дозами вакцини по 0,5 мл за схемою: 0-й, 7-й та 28-й день; дозу, передбачену на 28-й день, можливо ввести на 21-й день; рекомендовано проводити ревакцинацію та регулярні серологічні тести з метою оцінки стану сероконверсії пацієнта; кожна бустерна доза полягає у введенні однієї дози вакцини - 0,5 мл; **лікувально-профілактична імунізація:** вакцинація неімунізованих осіб: п'ять доз вакцини по 0,5 мл вводять на 0-й день, 3-й, 7-й, 14-й та 28-й день або схема 2-1-1 (чотири дози по 0,5 мл вакцини: одна доза вводиться в дельтоподібний м'яз правої руки та ще одна доза вводиться у дельтоподібний м'яз лівої руки на 0-й день, а потім по одній дозі вводять у дельтоподібний м'яз на 7-й та 21-й дні). ІНДІРАБ, вакцина антирабічна очищена, інактивована: 0,5 мл в/м; **профілактична імунізація:** схема щеплення: перша доза - день 0, потім 7й, 28й день; перша ревакцинація ч/з 1 рік, подальша ревакцинація кожні 5 років; **лікувально-профілактична імунізація у невакцинованих осіб:** схема щеплення: доза 0,5 мл в Д0, Д3, Д7, Д14 і Д28, з урахуванням категорії ушкодження. РАБІПУР® РСЕС АНТИРАБІЧНА ВАКЦИНА В.Р., КАЙРОН БЕРІНГ ВАКЦИНС ПРИВАТ ЛТД., Індія, рекомендована доза 1 мл. Вводити в/м: дорослим та дітям старшого віку - в дельтоподібний м'яз, дітям молодшого віку та немовлятам - в передньолатеральну поверхню стегна; схема проведення щеплення визначається згідно з обставинами та наявністю попередніх щеплень проти сказу в анамнезі. **Профілактична**

імунізація: первинна імунізація - ін'єкції по 0,5 мл на 0-й, 7-й, 21-й і 28-й день; перша ревакцинація ч/з 1 рік після первинної вакцинації, з подальшими ревакцинаціями ч/з кожні 5 років. **Лікувально-профілактична імунізація:** лікувально-профілактичні заходи включають місцеву неспецифічну обробку ран, імунізацію та, у разі потреби, пасивну імунізацію антирабичним імуноглобуліном; заходи залежать від типу контакту або ураження, стану тварини та імунного статусу пацієнта щодо сказу; рекомендації ВООЗ щодо проведення лікувально-профілактичної імунізації у невакцинованих осіб: схема щеплення - доза 0,5 мл в дні 0, 3, 7, 14 і 28, в/м з урахуванням категорії ушкодження.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль, еритема, свербіж, ущільнення, гематоми, набряк в місці ін'єкції; лихоманка, нездужання, астенія, грипopodobний с-м; аденопатія/лімфаденопатія; шкірні АР (висип, свербіж, набряк); головний біль, запаморочення, сонливість; біль у животі, нудота, діарея, блювота; міалгія, артралгія, м'язова слабкість, озноб, помірне підвищення t° ; кропив'янка, ериматозний, макулопапульозний висип, ангіоедема, задишка; анафілактичні р-ції, набряк Квінке, р-ції по типу сироваткової хвороби; енцефалопатія, парестезії, порушення зору, втрата слуху, судоми; апное у глибоко недоношених дітей (народжених на 28 тижні вагітності або раніше).

Протипоказання до застосування ЛЗ: профілактична імунізація (пре-експозиційна імунізація): відома гіперчутливість до будь-якого компоненту вакцини, поліміксину В, стрептоміцину, неоміцину чи будь-якого іншого антибіотику того ж класу, до попередньої імунізації вакциною; вагітність; імунізацію слід відкласти у випадку лихоманки або г.захворювання або неінфекційного захворювання чи загострення хр.хвороби. Зважаючи на летальність у разі інфікування вірусом сказу, протипоказань до лікувально-профілактичної імунізації немає.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	ІНДІРАБ ВАКЦИНА АНТИРАБІЧНА ОЧИЩЕНА, ІНАКТИВОВАНА	ТОВ "Фарма Лайф" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Бхарат Біотек Інтернешнл Лімітед, Індія), Україна	ліоф. пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. в панелі	2,5МО/0,5мл (1доза)	№10	3720,00	
	ІНДІРАБ ВАКЦИНА АНТИРАБІЧНА ОЧИЩЕНА, ІНАКТИВОВАНА	ТОВ "Фарма Лайф" (пакування із форми in bulk фірми-виробника Бхарат Біотек Інтернешнл Лімітед, Індія), Україна	ліоф. пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч. в панелі	2,5МО/0,5мл (1доза)	№1	385,00	
II.	ВЕРОРАБ® / VERORAB ВАКЦИНА АНТИРАБІЧНА ІНАКТИВОВАНА СУХА	Санофі Пастер (повний цикл виробництва, контроль якості, вторинне пакування, випуск серії)/Санофі-Авентіс Прайвіт Ко. Лтд. (вторинне пакування)/САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА (повний цикл виробництва, контроль якості розчинника в шприцах)/ГАУПТ ФАРМА ЛІВРОН (пов, Франція/Угорщина/Франція	пор. д/сусп. д/ін'єк. у фл. з розч. в карт. упак. або станд.-експорт. упак.	1 доза	№1, №5, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ВЕРОРАБ® / VERORAB ВАКЦИНА АНТИРАБІЧНА ІНАКТИВОВАНА СУХА	Санофі Пастер (повний цикл виробництва, контроль якості, вторинне пакування, випуск серії)/Санофі-Авентіс Прайвіт Ко. Лтд. (вторинне пакування)/САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА (повний цикл виробництва, контроль якості розчинника в шприцах)/ГАУПТ ФАРМА ЛІВРОН (пов, Франція/Угорщина/Франція	пор. д/сусп. д/ін'єк. у фл. з розч. в карт. упак.	1 доза	№1	412,80	27,17/\$
	ВЕРОРАБ® / VERORAB ВАКЦИНА АНТИРАБІЧНА ІНАКТИВОВАНА СУХА	Санофі Пастер (повний цикл виробництва, контроль якості, вторинне пакування, випуск серії)/Санофі-Авентіс Прайвіт Ко. Лтд., Платформа логістики та дистрибуції у м. Будапешт (вторинне пакування, випуск серії)/САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА (повний цикл виробницт, Франція/Угорщина/Франція	пор. д/сусп. д/ін'єк. у фл. з розч. в карт. упак. або станд.-експорт. упак.	1 доза	№1, №5, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РАБІПУР® РСЕС	КАЙРОН БЕРІНГ ВАКЦИНС	ліоф. д/р-ну	1мл/доза	№5	відсутня у	

АНТИРАБІЧНА ВАКЦИНА В.Р.	ПРИВАТ ЛТД., Індія	д/ін'єк. у фл. з розч.		реєстрі ОБЦ
-----------------------------	--------------------	---------------------------	--	-------------

21.1.2.9. Вакцина для профілактики ротавірусної інфекції

- **Вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива атенуйована (Rota virus, live attenuated)**

Фармакотерапевтична група: J07BH01 - Rota virus diarrhea vaccines.

Основна фармакотерапевтична дія: моновалентна вакцина для профілактики ротавірусного гастроентериту, яка містить живий ослаблений вірус, отриманий зі штаму ротавірусу людини; ефективна при гастроентеритах викликаних ротавірусом найбільш поширених генотипів і проти ротавірусу непоширених генотипів; після застосування двох доз вакцини захисна ефективність її зберігалася протягом першого та другого років життя дитини.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика гастроентериту, що викликається ротавірусом^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для р/ос застосування; курс вакцинації складається з двох доз; перша доза може бути призначена дитині, починаючи з віку 6 тижн.; інтервал між застосуванням першої і другої дози повинен бути не менше 4 тижн.; курс вакцинації слід закінчити до досягнення дитиною віку 24 тижн.^{БНФ}; може бути призначена за тими ж показаннями і недоношеним дітям, дотримуючись такого самого дозування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: діарея, дратівливість; метеоризм, біль у животі; дерматит; інвагінація, кров'янисті випорожнення, гастроентерити з виділенням вакцинного вірусу у немовлят з тяжким комбінованим імунodefіцитом; апное у недоношених немовлят (народжених ≤ 28 тижнів вагітності).

Протипоказання до застосування ЛЗ: відома гіперчутливість після попереднього застосування вакцини або до будь-якого з компонентів вакцини; наявність в анамнезі інвагінації; неусунена вроджена вада розвитку ШКТ (дивертикул Меккеля); рідкісні спадкові проблеми непереносимості фруктози, глюкозо-галактозна мальабсорбція або з цукрозо- і мальтозна недостатність; тяжкий комбінований імунodefіцит (SCID); введення вакцини повинно бути відкладено в осіб з г.захворюваннями, що супроводжуються лихоманкою; проте, наявність незначних інфекцій (звичайна застуда) не є протипоказанням для проведення імунізації; в осіб, що страждають на діарею, блювання. При проведенні імунізації на території України щодо протипоказань також слід керуватися діючими наказами МОЗ України.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	РОТАРИКС™/ROTARIX™ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ РОТАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	сусп. орал. у орал. аплікат. або тубах	1,5 мл/доза	№1, №5	відсутня у реєстрі ОБЦ	

21.1.2.10. Вакцина для профілактики жовтої лихоманки

- **Вакцина для профілактики жовтої лихоманки (жива атенуйована) (Yellow fever, live attenuated) ****

Фармакотерапевтична група: J07BL01 - Вакцина для профілактики жовтої лихоманки (жива атенуйована).

Основна фармакотерапевтична дія: Жива атенуйована вакцина; у здорових осіб виникає безсимптомна інфекція, в результаті чого утворюються специфічні В- і Т-клітини та з'являються специфічні циркулюючі антитіла; захисний імунітет виникає приблизно ч/з 10 днів після вакцинації, триває щонайменше 10 років і може зберігатися протягом усього життя.

Показання для застосування ЛЗ: Для активної імунізації проти жовтої лихоманки осіб: які подорожують до ендемічного регіону, здійснюють транзитну поїздку ч/з нього або проживають у ньому; які подорожують до будь-якої країни, для в'їзду в яку необхідно пред'явити інформацію щодо вакцинації; які контактують з потенційно зараженими матеріалами (співробітники лабораторій).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Первинна вакцинація: дорослі та діти віком від 9 місяців: однократна доза 0,5 мл розчиненої вакцини; дітям віком від 6 місяців до 9 місяців вакцинація проти жовтої лихоманки не рекомендована, за винятком особливих обставин, у відповідності до офіційних рекомендацій, у цьому випадку доза є такою самою, як і у дітей від 9 місяців та у дорослих. Вакцину слід застосовувати не менше ніж за 10 днів до відвідування ендемічної зони, оскільки захисний імунітет може бути досягнутий лише після того, як мине як мінімум 10 днів. Повторна вакцинація: очікується, що тривалість захисту після введення однієї однократної дози 0,5 мл препарату становить як мінімум 10 років і може продовжуватися протягом усього життя; деяким пацієнтам, у яких відмічається недостатня імунна відповідь після первинної вакцинації, може бути потрібна ревакцинація із застосуванням однієї дози 0,5 мл. Ревакцинація може бути також необхідною залежно від офіційних рекомендацій місцевих органів охорони здоров'я, як умова в'їзду в деякі країни. Бажано вводити вакцину п/ш; в/м ін'єкція може бути проведена, якщо це відповідає чинним офіційним рекомендаціям. Рекомендованими місяцями для в/м ін'єкції є передньолатеральна частина стегна у дітей віком до 12 місяців, передньолатеральна поверхня стегна (або дельтоподібний м'яз, якщо його м'язова маса є достатньою) у дітей віком від 12 місяців до 35 місяців або дельтоподібний м'яз у дітей віком від 36 місяців і дорослих.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: Дратівливість, плач (характерні для педіатричної популяції), підвищення t° тіла (у дітей раннього віку), астения, біль/хвороблива чутливість, еритема, гематома, ущільнення, набряк, папула в місці ін'єкції, грипоподібне захворювання; сонливість (характерна для педіатричної популяції), головний біль; запаморочення, парестезія; втрата апетиту (характерна для педіатричної популяції), блювання, нудота, біль у животі, діарея; міалгія, артралгія, риніт; лімфаденопатія; анафілактоїдна р-ція, включаючи ангіоневротичний набряк; висипання, свербіння, кропив'янка; випадки розвитку нейротропного захворювання (так

званого НЗ-ВЖЛ), у т.ч. з летальним наслідком, протягом 30 днів після вакцинації (може проявлятися такими симптомами: висока t° тіла з головним болем, з можливим подальшим прогресуванням до сплутаності свідомості, летаргії, енцефаліту, енцефалопатії або менінгіту); інші неврологічні ознаки та симптоми, в т.ч. судоми, с-ром Гійєна - Барре та вогнищеві неврологічні симптоми; випадки розвитку вісцеротропного захворювання (так званого ВЗ-ВЖЛ, попередня назва - «фебрильна поліорганна недостатність») після вакцинації препаратом та іншими вакцинами проти жовтої лихоманки, деякі з цих випадків були летальними. Поява ознак і симптомів відбувалася протягом 10 днів після вакцинації; початкові ознаки та симптоми не є специфічними та можуть проявлятися такими симптомами: підвищення t° тіла, міалгія, підвищена втомлюваність, головний біль та артеріальна гіпотензія, які можуть прогресувати до дисфункції печінки з жовтяницею, цитолізу м'язів, тромбоцитопенії, та ГНН або ДН.

Протипоказання до застосування ЛЗ: Р-ція гіперчутливості на компоненти курячих яєць (курячий білок) або на будь-які компоненти вакцини; тяжкі р-ції гіперчутливості (анафілактична реакція) після отримання дози будь-якої вакцини проти жовтої лихоманки в минулому; імуносупресія, незалежно від того, чи є вона вродженою, ідіопатичною або набутою в результаті терапії системними стероїдами (в більш високих дозах, ніж стандартні дози стероїдів для місцевого або інгаляційного застосування), радіотерапії або застосування цитотоксичних ЛЗ; дисфункція тимуса в анамнезі (включаючи тимому, тимектомію); симптомна ВІЛ-інфекція; безсимптомна ВІЛ-інфекція, якщо вона супроводжується ознаками порушення ф-ції імунної системи; дітям віком до 6 місяців; тяжке фебрильне захворювання.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	СТАМАРИЛ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЖОВТОЇ ЛИХОМАНКИ (ЖИВА АТЕНУЙОВАНА)	Санофі Пастер (повний цикл виробництва, заповнення, ліофілізація, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії, контроль якості та випуск серії розчинника)/САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА (повний цикл виробництва, первинне пакування, контроль якості, Франція/Франція/Угорщина	пор. д/сусп. д/ін'єк. у фл. а з розч. у шпр. з 1голк. або 2голк. (окремо)	1000МО/доз	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СТАМАРИЛ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЖОВТОЇ ЛИХОМАНКИ (ЖИВА АТЕНУЙОВАНА)	Санофі Пастер (повний цикл виробництва, заповнення, ліофілізація, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії, контроль якості та випуск серії розчинника)/САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА (повний цикл виробництва, первинне пакування, контроль якості, Франція/Франція/Угорщина	пор. д/сусп. д/ін'єк. у фл. а з розч. у шпр. з 1голк. (окремо)	1000МО/доз	№1	465,50	25,60/\$

21.2. Комбіновані вакцини та анатоксини

21.2.1. Анатоксини для профілактики дифтерії та правця

- **Правцево-дифтерійний анатоксин (*Tetanus toxoid, combinations with diphtheria toxoid*)**

Фармакотерапевтична група: J07AM51 - Tetanus vaccines

Основна фармакотерапевтична дія: складається із суміші очищених дифтерійного та правцевого анатоксинів; введення препарату у відповідності із затвердженою схемою викликає формування специфічного імунітету проти дифтерії та правця.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика дифтерії та правця^{BOO3} у дітей відповідно до офіційних рекомендацій Національного календаря профілактичних щеплень.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: АДП-Біолік, ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна: може бути застосована у віці від 3 міс. до 6 років 11 міс. 29 днів з інтервалом між першою та другою дозою не менше 1 міс., та з інтервалом не менше 9 міс. між другою і третьою дозою; скорочення інтервалів не допускається; в разі необхідності збільшення інтервалів вакцинації, чергове щеплення слід проводити в найближчий можливий термін, який визначається станом дитини; рекомендованим місцем введення для немовлят і дітей молодшого віку є переважно передньо-латеральна поверхня стегна (середня її третина), у дітей старшого віку (> 3-х років) - в найбільш щільну частину дельтоподібного м'язу (м'язовий виступ на плечі, у верхній третині) глибокого в/м у дозі 0,5 мл. АДП-М-Біолік, ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна: глибоко в/м в ділянку дельтоподібного м'язу 0,5 мл (разова доза). При проведенні імунізації на території України слід керуватися діючими нормативними документами МОЗ України. **Вакцина для профілактики дифтерії та правця, адсорбована, із зменшеним вмістом антигену, БАЙОЛОДЖІКАЛ І. ЛІМІТЕД, Індія:** в/м в дельтоподібний м'яз; рекомендується щеплення двома дозами вакцини по 0,5 мл з інтервалом не менше 4-х тижнів та наступною третьою ін'єкцією ч/з 6-12 міс. після другої дози; бустерну дозу вводять одноразово кожні 10 років. ДІФТЕТ ДТ ВАКЦИНА дифтерії та правця вакцина (адсорбована)/DIFTEТ DT VACCINE Diphtheria and tetanus vaccine (adsorbed), ББ-НЦІПХ Лтд., Болгарія: три в/м ін'єкції по 0,5 мл з мінімальним 4-х тижневим інтервалом між дозами складають первинну серію вакцинації дітей^{BOO3}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль, гіперемія, набряк, інфільтрат в місці ін'єкції; підвищення t° , слабкість, дратівливість; лімфаденопатія; АР в т.ч. анафілактичний шок, анафілактоїдні р-ції, незначне загострення алергічних захворювань; порушення сну, головний біль, артеріальна гіпотензія; задуха; нудота, діарея; поліморфний висип, кропив'янка, свербіж, відчуття печіння шкіри, набряк Квінке; апное у недоношених дітей, що народились на ранніх строках вагітності (≤ 28 тижн.); після введення вакцини, що містить правцевий анатоксин випадки розвитку плечового неврити та с-му Гійєна-Барре; судомні р-ції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: тяжкі поствакцинальні ускладнення на введення попередньої дози вакцини (анафілактичні р-ції, токсична еритема, інфекційно-алергічний енцефаліт); АР на будь-який компонент або на попереднє введення вакцини; епілепсія, епілептичний с-ром із судомами не рідше 2 р/місяць; г.захворювання або загострення хр.захворювання; вроджені комбіновані імунодефіцити, первинна гіпогаммаглобулінемія; імуносупресивна терапія.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
I.	АДП-Біолік	АТ "БІОЛІК", Україна	сусп. д/ін'єк. в амп. у пач.	0,5мл/доза; 1мл/2دوزи	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АДП-Біолік	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	сусп. д/ін'єк. в амп. у пач.	0,5мл/доза	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АДП-Біолік	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	сусп. д/ін'єк. в амп. у пач.	1мл/2دوزи	№10	112,00	
	АДП-М-БІОЛІК	АТ "БІОЛІК", Україна	сусп. д/ін'єк. в амп. у пач.	0,5мл/доза; 1мл/2دوزи	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АДП-М-БІОЛІК	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	сусп. д/ін'єк. в амп. у пач.	0,5мл/доза	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АДП-М-БІОЛІК	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	сусп. д/ін'єк. в амп. у пач.	1мл/2دوزи	№10	180,00	
II.	ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ ТА ПРАВЦЯ АДСОРБОВАНА (ПЕДІАТРИЧНА) DIPHTHERIA AND TETANUS VACCINE ADSORBED (PAEDIATRIC)	СЕРУМ ІНСТИТУТ ІНДІЇ ПВТ. ЛТД., Індія	сусп. д/ін'єк., в амп. та фл. у пач.	0,5мл/доза, 5мл/10доз, 10мл/20доз	№50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ ТА ПРАВЦЯ, АДСОРБОВАНА, ІЗ ЗМЕНШЕНИМ ВМІСТОМ АНТИГЕНУ	БАЙОЛОДЖІКАЛ І. ЛІМІТЕД, Індія	сусп. д/ін'єк., по 5мл у фл. в пач.	0,5мл/доза	№24	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДІФТЕТ ДТ ВАКЦИНА дифтерії та правця вакцина (адсорбована) / DIFTEТ DT VACCINE Diphtheria and tetanus vaccine (adsorbed)	ББ-НЦІПХ Лтд., Болгарія	сусп. д/ін'єк., по 5мл у фл. в кор.	0,5мл/доза	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	

21.2.2. Вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюку

Для вакцинації дітей проти кашлюку на першому році життя можуть використовуватися вакцини як з ацелюлярним (далі – АаКДП), так і з цільноклітинним (далі – АКДП) кашлюковим компонентом. Перенесений кашлюк в анамнезі не є протипоказанням до вакцинації проти даної хвороби.

21.2.2.1. Вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюку з цільноклітинним кашлюковим компонентом

- **Вакцина для профілактики кашлюку, інактивована, цільноклітинна, у комбінації з дифтерійним та правцевим анатоксинами (Pertussis, inactivated, whole cell, combinations with toxoids) ***

Фармакотерапевтична група: J07AJ51 - кашлюкова інактивована цільноклітинна вакцина, комбінована з анатоксинами.

Основна фармакотерапевтична дія: комбінована вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, що складається з очищених дифтерійного та правцевого анатоксинів та очищених антигенів збудника кашлюку; введення препарату у відповідності із затвердженою схемою викликає формування специфічного імунітету проти кашлюку, дифтерії та правцю.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика дифтерії, правця та кашлюку у дітей відповідно до рекомендацій Національного календаря профілактичних щеплень.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вакцинація АКДП-Біолік проводиться за віком у 3 місяці (перше щеплення), 4 місяці (2-е щеплення), 5 місяців (3-є щеплення) та 18 місяців (4-е щеплення). Інтервал між 1-им і 2-им, 2-им і 3-ім щепленнями АКДП-Біолік становить щонайменше 1 місяць. Інтервал між 3-ім і 4-ім щепленнями повинен становити не менше 12 місяців. Скорочення інтервалів не допускається. У разі необхідності збільшення інтервалів вакцинації, чергове щеплення слід проводити в найближчий можливий термін, який визначається станом дитини. Вакцинація АКДП-Біолік проводиться дітям до 6 років 11 місяців 29 днів. Щеплення дітей до 7 років поза строком Календаря призначаються лікарем з такого розрахунку, щоб дитина встигла одержати чотириразове щеплення АКДП-Біолік до 6 років 11 місяців і 29 днів. При цьому інтервал між першою та другою, другою та третьою дозою вакцини не повинен бути менше 1 місяця, а інтервал між третьою та четвертою дозою - не менше 6 місяців. Дітям старше 7 років щеплення проводять АДП-М згідно Інструкції про застосування. Якщо дитина має протипоказання до застосування вакцини АКДП-Біолік вакцинацію можна проводити АДП-анатоксином згідно з Інструкцією про застосування. Вакцина АКДП-Біолік призначена для глибокого в/м введення. Рекомендованим місцем введення для немовлят і дітей молодшого віку є переважно передньо-латеральна поверхня стегна (середня її третина), а у дітей старшого віку (> 3-х років) рекомендується вводити вакцину в дельтоподібний м'яз у дозі 0,5 мл (разова доза).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: в перші дві доби після щеплення можуть розвинутися загальні та місцеві р-ції: нездужання, підвищення t° ; болючість, гіперемія, набряк, інфільтрат у місці введення; судоми (звичайно пов'язані з підвищенням t°), епізоди пронизливого крику; набряк Квінке, загострення алергічних захворювань, системні р-ції типу анафілактичного шоку; кропив'янка, поліморфний висип; можливо апное у недоношених дітей, що народились на ранніх строках вагітності (< 28 тижнів); після введення вакцини, що містить правцевий анатоксин зафіксовані випадки розвитку плечового невриту та с-му Гійєна-Барре.

Протипоказання до застосування ЛЗ: тяжкі ускладнення від попередньої дози АКДП-Біолік у вигляді анафілактичної реакції або токсичної еритеми; АР на будь-який компонент препарату; г. захворювання або загострення хр. захворювання; вроджені комбіновані імунodefіцити, первинна гіпогаммаглобулінемія; імуносупресивна терапія; судоми в анамнезі (вакцинація проводиться АДП або вакциною з ацелюлярним кашлюковим компонентом).

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
І.	АКДП-БІОЛІК	АТ "БІОЛІК", Україна	сусп. д/ін'єк. по 0,5мл, 1мл в амп. у пач.	0,5мл/доза, 1мл/2دوزи	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	АКДП-БІОЛІК	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	сусп. д/ін'єк. по 1мл в амп.	1мл/2دوزи	№10	200,00	
	АКДП-БІОЛІК	ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна	сусп. д/ін'єк. по 0,5мл в амп.	0,5мл/доза	№10	57,94	

21.2.2.2. Вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюку з ацелюлярним кашлюковим компонентом

- **Вакцина для профілактики кашлюку, очищений антиген, у комбінації з дифтерійним та правцевим анатоксинами (Pertussis, purified antigen, combinations with toxoids) ***

Фармакотерапевтична група: J07AJ52 - Pertussis vaccines.

Основна фармакотерапевтична дія: комбінована вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, що складається з очищених дифтерійного та правцевого анатоксинів, а також трьох очищених антигенів збудника кашлюку, адсорбованих на гідрооксиду алюмінію; введення препарату у відповідності із затвердженою схемою викликає формування специфічного імунітету проти кашлюку, дифтерії та правця.

Показання для застосування ЛЗ: вакцина Інфанрикс™ - активна первинна імунізація проти дифтерії, правця і кашлюку у дітей віком від 2 місяців; показана також у вигляді бустерної дози для дітей, які раніше були імунізовані трьома або чотирма дозами вакцини для профілактики дифтерії, правця та кашлюку з ацелюлярним (АаКДП) або з цільноклітинним (АКДП) кашлюковим компонентом. Вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку, адсорбована, з цільноклітинним кашлюковим компонентом, СЕРУМ ІНСТИТУТ ІНДІЇ ПВТ. ЛТД., Індія показана для первинної імунізації немовлят від 6 тижн. та дітей дошкільного віку. Щеплення дітей на території України здійснюється згідно з вимогами діючих наказів МОЗ України щодо профілактичних щеплень.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: ІНФАНРИКС™/INFANRIX™, ГлаксосмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія: для глибокого в/м введення, рекомендована доза вакцини 0,5 мл; курс первинної вакцинації складається з трьох доз на першому році життя з наступним введенням бустерної дози на другому та шостому році життя. *Вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку, адсорбована, з цільноклітинним кашлюковим компонентом, СЕРУМ ІНСТИТУТ ІНДІЇ ПВТ. ЛТД., Індія:* для первинної імунізації рекомендовано щеплення трьома окремими дозами по 0,5 мл з інтервалом у 4-6 тижн.; першу дозу слід вводити приблизно у 6-тижневому віці; ревакцинацію дозою по 0,5 мл ч/з 12 міс. після первинної імунізації та у віці від 4-х до 6-ти років.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: почервоніння, припухлість, затвердіння у місці ін'єкції, лихоманка, дратівливість, неспокій, пронизливий крик, сонливість, втрата апетиту, діарея, блювання; свербіж, висипання, кропивниця; головний біль, кашель, бронхіт; лімфаденопатія, дифузний набряк кінцівок, у яку здійснювалася ін'єкція, що іноді розповсюджується на найближчий суглоб; тромбоцитопенія; АР (включаючи анафілактичні та анафілактоїдні), ангіоневротичний набряк; колапс або шокоподібний стан (гіпотонічні -

гіпореспонсивні епізоди), судоми протягом 2-3-х днів після вакцинації; апное у недоношених немовлят (раніше 28 тижн.гестації).

Протипоказання до застосування ЛЗ: відома гіперчутливість до будь-якого компоненту вакцини; особам, у яких виникли ознаки гіперчутливості після попереднього введення вакцини для профілактики дифтерії, правця і кашлюку з цільноклітинними компонентами; протипоказаний для щеплення дітей, у яких виникла енцефалопатія невідомої етіології протягом 7 днів, після попереднього щеплення вакциною, що містила кашлюковий компонент: у цьому випадку курс вакцинації слід продовжити вакциною з дифтерійним і правцевими компонентами; в анамнезі епілепсія, захворювання нервової системи і судоми; гостре інфекційне захворювання (навіть якщо дитина вже видужує) або підвищення t.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ ТА КАШЛЮКУ, АДСОРБОВАНА, З ЦІЛЬНОКЛІТИННИМ КАШЛЮКОВИМ КОМПОНЕНТОМ	СЕРУМ ІНСТИТУТ ІНДІЇ ПВТ. ЛТД., Індія	сусп. д/ін'ек. по 5мл у фл. пач.	0,5мл/доза	№50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНФАНРИКС™ КОМБІНОВАНА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ, КАШЛЮКУ АЦЕЛЮЛЯРНА ОЧИЩЕНА ІНАКТИВОВАНА РІДКА	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	сусп. д/ін'ек. у шпр. з 1 або 2голк. у конт. в кор.	0,5мл/доза	№1	600,17	28,20/\$

21.2.2.3. Вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюку з ацелюлярним кашлюковим компонентом та зменшеним вмістом дифтерійного анатоксину

- **Вакцина, для профілактики дифтерії, із зменшеним вмістом анатоксину, правця, кашлюку з ацелюлярним компонентом ((*Pertussis, inactivated, whole cell, combinations with toxoids*)) ***

Фармакотерапевтична група: J07AJ52 - Комбіновані бактеріальні вакцини.

Основна фармакотерапевтична дія: містить дифтерійний анатоксин і правцевий анатоксин та кашлюкові антигени, адсорбовані на солях алюмінію; введення препарату згідно затверджених рекомендацій викликає формування специфічного імунітету проти дифтерії, правця, кашлюку. У дітей віком від 11 до 18 років без попередньої вакцинації проти кашлюку та відсутністю вакцинації проти дифтерії та правця протягом попередніх 5 років одна доза вакцини індукувала імунну відповідь проти кашлюку та всі суб'єкти були захищені проти правця та дифтерії.

Показання для застосування ЛЗ: бустерна імунізація (ревакцинація) проти дифтерії, правця і кашлюку осіб, починаючи з 4-х річного віку.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначена для глибоко в/м введення в ділянку дельтоподібного м'яза; рекомендується одноразове введення вакцини у дозі 0,5 мл, призначати починаючи з 4-річного віку, згідно з офіційними рекомендаціями та/або згідно з існуючою медичною практикою бустерної імунізації комбінованими вакцинами, що містять знижений вміст антигенів, проти дифтерії та правця для дорослих, коли необхідна ревакцинація проти кашлюку; повторні щеплення проти дифтерії, правця та кашлюку мають проводитися ч/з проміжки часу, визначені офіційними рекомендаціями (як правило, ч/з кожні 10 років); на основі даних у дорослих дві додаткові дози вакцини проти дифтерії та правця рекомендовано для введення ч/з 1 та 6 місяців після першої дози для максимального збільшення вакцинальної відповіді проти дифтерії та правця.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: р-ції в місці введення вакцини, включаючи біль, почервоніння, ущільнення, набряк кінцівки, в яку вводилась вакцина (іноді включаючи суміжний суглоб), стерильний абсцес; підвищення t^o, грипоподібне захворювання, підвищена втомлюваність, збудливість, сонливість, головний біль, порушення уваги, запаморочення, непритомність, анорексія, діарея, блювання, нудота, шлунково-кишкові розлади, інфекції ВДШ, фарингіт, кашель; кон'юнктивіт, лімфаденопатія, гіпергідроз, свербіння, висипання, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, артралгія, міальгія, скутість суглобів та опорно-рухового апарату; АР, в т.ч. анафілактичні та анафілактоїдні; гіпотонічно-гіпореспонсивні епізоди, судоми (з гарячкою або без неї); астенія; р-ції з боку ЦНС або ПНС, в т.ч. висхідний параліч або с-м Гійєна-Барре.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого компоненту вакцини або реакція на попереднє введення препарату; енцефалопатія невідомої етіології впродовж 7 днів, після попереднього щеплення вакциною, що містила кашлюковий компонент; тимчасова тромбоцитопенія або неврологічне ускладнення після попередньої імунізації проти дифтерії та/або правця; г. захворювання, що супроводжуються лихоманкою; наявність незначної інфекції не є протипоказанням.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БУСТРИКС™ КОМБІНОВАНА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ, КАШЛЮКУ (АЦЕЛЮЛЯРНИЙ КОМПОНЕНТ) (АДСОРБОВАНА, ЗІ ЗМЕНШЕНИМ ВМІСТОМ АНТИГЕНІВ)	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	сусп. д/ін'єк. по 1 дозі у шпр. з 2 голк. в конт. у кор.	0,5мл/доза	№1	427,99	27,05/\$

21.2.3. Вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент), поліомієліту

21.2.3.1. Вакцини для профілактики дифтерії, кашлюку (ацелюлярний компонент), поліомієліту, правця

- **Вакцина для профілактики дифтерії, кашлюку, поліомієліту, правця (Diphtheria-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus) ***

Фармакотерапевтична група: J07CA02 - Комбіновані бактеріальні та вірусні вакцини.

Основна фармакотерапевтична дія: комбінована вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюка (ацелюлярний компонент) (DTPa) та поліомієліту (IPV). Містить дифтерійний анатоксин, правцевий анатоксин, очищені кашлюкові антигени та три типи інактивованих вірусів поліомієліту; ч/з 1 місяць після курсу первинної вакцинації більше ніж 99% вакцинованих немовлят розвивають серозахисний титр антитіл до антигенів правця та дифтерії; ч/з 1 місяць після 3-дозового курсу первинної вакцинації немовлята були серопозитивними за трьома кашлюковими компонентами і загальні рівні відповіді на кожен із трьох окремих кашлюкових антигенів були 94%; ч/з 1 місяць після первинної вакцинації загальна серопозитивність для кожного з трьох серотипів вірусів поліомієліту (типи 1, 2, 3) становила 99,5%.

Показання для застосування ЛЗ: ІНФАНРИКС™ ІПВ: для активної первинної імунізації проти дифтерії, правця, кашлюку і поліомієліту у дітей віком від 2 місяців та показана також у вигляді бустерної (ревакцинуючої) дози для дітей, які раніше були імунізовані антигенами дифтерії, правця, кашлюку (DTP) і поліомієліту. Тетраксим: для комплексної профілактики дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту для курсу первинної імунізації немовлят у віці 2 місяці та 4 місяці; для ревакцинації у віці 11 місяців та 6 років; для ревакцинації дітей у віці від 11 до 13 років, які не були щеплені у віці 6 років вакциною з вмістом кашлюкового компонента в концентрації 25 мкг (аК).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: ІНФАНРИКС™ ІПВ, GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Бельгія: для глибокого в/м введення, немовлятам - передньо - бокова ділянка стегна; дітям більш старшого віку - у дельтоподібний м'яз плеча; одна імунізуюча доза - 0,5 мл^{БНФ}; режим первинної вакцинації складається з трьох доз на першому році життя і може починатися з віку від 2 міс. Між послідовними дозами слід дотримуватися інтервалу не менше 1 міс. Після завершення режиму первинної вакцинації слід витримати інтервал не менше 6 міс. для введення бустерної дози.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль, почервоніння, набряк, ущільнення, везикули в місці ін'єкції, набряк всієї ін'єкційної кінцівки іноді і прилеглого суглобу, лихоманка, нездужання, астения; втрата апетиту; дратівливість, ненормальний плач, неспокій; головний біль, сонливість; нудота, блювання, діарея; алергічний дерматит, висипка, АР (включаючи анафілактичні та анафілактоїдні реакції), свербіж, ангіоневротичний набряк, кропивниця; лімфаденопатія; кашель, бронхіт; тромбоцитопенія; колапс, шокоподібний стан (гіпотонічно-гіпореспонсивні епізоди), судоми (з або без лихоманки) протягом 2-3 днів після вакцинації; апное; апное у недоношених дітей, що народилися на ранніх строках вагітності (≤ 28 тижнів).

Протипоказання до застосування ЛЗ: відома гіперчутливість до будь-якого компоненту вакцини, (в т. ч. до неоміцину, поліміксину, стрептоміцину або формальдегіду) гіперчутливість після попереднього введення вакцин для профілактики дифтерії, правця, кашлюка, або інактивованих вакцин для профілактики поліомієліту; в анамнезі енцефалопатія невідомої етіології, що мала місце в межах 7 днів після попереднього щеплення вакциною, що містила кашлюковий компонент; прогресуюча енцефалопатія; призначення вакцини повинно бути відкладене у осіб з г. захворюваннями, що супроводжуються t°; наявність незначної інфекції не є протипоказанням.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ІНФАНРИКС™ ІПВ КОМБІНОВАНА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ, КАШЛЮКА (АЦЕЛЮЛЯРНИЙ КОМПОНЕНТ) ТА ПОЛІОМІЄЛІТУ	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	сусп. д/ін'єк. у однораз. шпр. з голк. в конт.	0,5мл/доза	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНФАНРИКС™ ІПВ КОМБІНОВАНА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ, КАШЛЮКА (АЦЕЛЮЛЯРНИЙ КОМПОНЕНТ)	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	сусп. д/ін'єк. у однораз. шпр. з голк. в	0,5мл/доза	№1	712,40	27,22/\$

ТА ПОЛІОМІЄЛІТУ		конт.				
ТЕТРАКСИМ®/TETRAХІМ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ, КАШЛЮКУ (АЦЕЛЮЛЯРНИЙ КОМПОНЕНТ) ТА ПОЛІОМІЄЛІТУ АДСОРБОВАНА, ІНАКТИВОВАНА, РІДКА	Санофі Пастер (повний цикл виробництва, контроль якості, вторинне пакування, випуск серії)/Санофі- Авентіс Прайвіт Ко. Лтд. (втор. Пак.), Франція/Угорщина	сусп. д/ін'єк. у шпр. з голк. (або 2-ма окрем. голк.), в кор.	0,5мл/доза	№1	552,96	24,85/\$
ТЕТРАКСИМ®/TETRAХІМ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ, КАШЛЮКУ (АЦЕЛЮЛЯРНИЙ КОМПОНЕНТ) ТА ПОЛІОМІЄЛІТУ АДСОРБОВАНА, ІНАКТИВОВАНА, РІДКА	Санофі Пастер (повний цикл виробництва, контроль якості, вторинне пакування, випуск серії)/Санофі- Авентіс Прайвіт Ко. Лтд., Платформа логістики та дистрибуції у м. Будапешт (втор. Пак., випуск серії), Франція/Угорщина	сусп. д/ін'єк. у шпр. з голк. (або 2-ма окрем. голк.), в кор.	0,5мл/доза	№1	відсутня у реєстрі ОБЦ	

21.2.3.2. Вакцини для профілактики дифтерії, кашлюку (ацелюлярний компонент), правця, зі зменшеним вмістом антигену, поліомієліту

- **Вакцина для профілактики дифтерії, кашлюку, поліомієліту, правця (Diphtheria-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus) ***

Фармакотерапевтична група: J07CA02 - Bacterial and viral vaccines, combined

Основна фармакотерапевтична дія: комбінована вакцина містить дифтерійний анатоксин, правцевий анатоксин, три очищені кашлюкові антигени, адсорбовані на солях алюмінію, а також інактивовані поліовіруси трьох типів; індукують вищий рівень серопротекції та більший рівень титру протидифтерійних та протиправцевих антитіл у дітей та підлітків порівняно з дорослими.

Показання для застосування ЛЗ: бустерна імунізація (ревакцинація) проти дифтерії, правця, кашлюку і поліомієліту в осіб віком від 3 років. Вакцина Бустрикс Поліо не показана для первинної імунізації.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначена для глибокого в/м введення в ділянку дельтоподібного м'яза; рекомендується одноразове введення вакцини у дозі 0,5 мл; вакцина *Бустрикс™ Поліо* може призначатися, починаючи з 3-х річного віку, згідно з офіційними рекомендаціями та/або існуючою медичною практикою застосування вакцин, що містять зменшений вміст антигенів проти дифтерії, правця, кашлюка у комбінації з антигенами проти поліомієліту. Повторна вакцинація проти дифтерії, правця та поліомієліту повинна проводитись у термін, визначений згідно з офіційними рекомендаціями (як правило, ч/з кожні 10 років).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: Біль, почервоніння, набряк, крововилив, свербіж, ущільнення тканин в місці введення вакцини, виражений набряк кінцівки, в яку вводилась вакцина (іноді включаючи суміжний суглоб, стерильний абсцес; підвищення t°, лихоманка > 39 °C), скутість суглобів; сонливість, порушення уваги, головний біль, підвищена збудливість; лімфаденопатія; порушення сну, апатія; інфекції ВДШ, сухість у горлі, фарингіт; кон'юнктивіт, герпес ротової порожнини; анорексія, діарея, блювання, біль у животі, нудота; підвищена втомлюваність, запаморочення; міалгія, артралгія; парестезія, гіпергідроз, свербіння, астма; АР, в т.ч. анафілактичні та анафілактоїдні р-ції; гіпотонічно-гіпореспонсивні епізоди, судоми (з гарячкою або без неї); кропив'янка, ангіоневротичний набряк; р-ції з боку ЦНС або ПНС, в т.ч. висхідний параліч або навіть параліч дихальної мускулатури (с-м Гієна-Барре).

Протипоказання до застосування ЛЗ: відома гіперчутливість до будь-якого компоненту вакцини (в т.ч. до неоміцину або поліміксину), особам, що показали ознаки гіперчутливості після попереднього введення вакцин для профілактики дифтерії, правця, кашлюку або інактивованих вакцин для профілактики поліомієліту; енцефалопатія невідомої етіології, що мала місце в межах 7 днів після попереднього щеплення вакциною, що містила кашлюковий компонент; транзиторна тромбоцитопенія або неврологічні ускладнення після попереднього введення протидифтерійної та/або протиправцевої вакцини; г.захворювання, що супроводжуються лихоманкою; наявність легкої інфекції не є протипоказанням.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	БУСТРИКС™ ПОЛІО КОМБІНОВАНА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ, КАШЛЮКУ (АЦЕЛЮЛЯРНИЙ КОМПОНЕНТ) ТА	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	сусп. д/ін'єк. по 1 дозі у шпр. з 2голк. в	0,5мл/доза	№1	513,31	27,22/\$

ПОЛІОМІЄЛІТУ (ІНАКТИВОВАНА) (АДСОРБОВАНА, ЗІ ЗМЕНШЕНИМ ВМІСТОМ АНТИГЕНІВ)	КОНТ.					
---	-------	--	--	--	--	--

21.2.4. Вакцини для профілактики дифтерії, гемофільної інфекції типу b, кашлюку (ацелюлярний компонент), поліомієліту, правця

- **Вакцина для профілактики дифтерії, гемофільної інфекції типу b, кашлюку, поліомієліту, правця (*Diphtheria-Hemophilus influenzae B-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus*)**

Фармакотерапевтична група: J07CA06 - Bacterial and viral vaccines, combined

Основна фармакотерапевтична дія: містить полісахарид *Haemophilus influenzae* типу b та суспензію дифтерійного та правцевого анатоксинів, ацелюлярного компоненту кашлюку, інактивованого вірусу поліомієліту, адсорбована алюмінієм гідроксидом дигідратом. Імунна відповідь після первинної вакцинації: для антигенів дифтерії і правця - 100 % рівень серопротекції (0,01 МО/мл); для кашлюку, понад 88 % дітей молодшого віку ч/з 1 місяць після завершення первинного курсу імунізації досягли зростання титрів антитіл кашлюкового анатоксину або ФГА в 4 рази; щонайменше 99 % дітей після первинної вакцинації мали захисний титр проти поліомієліту.

Показання для застосування ЛЗ: активна імунізація проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та інвазивних інфекцій, спричинених *Haemophilus influenzae* типу b у дітей, починаючи з 2-х місячного віку^{БНФ}; первинна імунізація немовлят; ревакцинація дітей, яким раніше проводилась вакцинація проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту та захворювань, збудником яких є *Haemophilus influenzae* типу b.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: ІНФАНРИКС™ ІПВ ХІВ/Infanrix™ IPV Hib, GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Бельгія: вводити глибокого в/м в передньолатеральну ділянку стегна; схема первинної вакцинації включає 3 дози вакцини, що вводяться в першому півріччі життя і можуть призначатися з 2-місячного віку дитини; між дозами слід витримувати інтервал не менше 1 міс.^{БНФ}. Бустерна доза рекомендована протягом другого року життя, не раніше ніж ч/з 6 міс. після закінчення схеми первинної вакцинації. ПЕНТАКСИМ (PENTAXIM), Sanofi Pasteur S.A., Франція: курс первинної вакцинації складається із введення трьох доз вакцини по 0,5 мл з інтервалом 1-2 міс.; бустерна доза вводиться на 2-му році життя; рекомендовано в/м введення; немовлятам та дітям молодшого віку - передньо-латеральна ділянка стегна (с/з), для дітей старшого віку - дельтоподібний м'яз. Щеплення дітей на території України здійснюється згідно з вимогами діючих наказів МОЗ України.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: почервоніння, біль, набряк, ущільнення у місці ін'єкції, гіпертермія (лихоманка), набряк, з розповсюдженням на одну або обидві нижні кінцівки; блювота, діарея; втрата апетиту; знервованість (дратівливість), аномальний плач, порушення сну; інфекції ВДШ, кашель, бронхіт, ринорея; судоми, гіпотонічні р-ції або гіпотонічно-гіпореспенсивний с-м; висип, кропив'янка, свербіж, дерматит; набряк обличчя, ангіоедема, анафілактичні р-ції (набряк Квінке, шок), лімфаденопатія, тромбоцитопенія; потенційні побічні р-ції (несприятливі події, які були зареєстровані з іншими вакцинами, що містять один або кілька антигенних компонентів аналогічних Пентаксиму) після введення вакцини, що містить правцевий анатоксин, випадки розвитку плечового невриту та с-му Гійєна-Барре; апное у недоношених дітей, що народилися на ранніх строках вагітності (≤ 28 тижнів).

Протипоказання до застосування ЛЗ: відома гіперчутливість до будь-якого компоненту вакцин для профілактики кашлюку (ацелюлярної або цілюноклітинної), або р-ція, що загрожує життю після попереднього введення вакцини, або вакцини, яка містить ті ж самі діючі речовини чи використовуються в процесі виробництва і можуть бути присутні у слідових кількостях; прогресуюча енцефалопатія, енцефалопатія, що виникла протягом 7 днів після введення попередньої дози будь-якої вакцини, що містить кашлюковий компонент (ацелюлярний або цілюноклітинний); у випадку лихоманки або г. захворювання вакцинацію необхідно відкласти.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ІНФАНРИКС™ ІПВ ХІВ / INFANRIX™ IPV HIB КОМБІНОВАНА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ, КАШЛЮКУ (АЦЕЛЮЛЯРНИЙ КОМПОНЕНТ), ПОЛІОМІЄЛІТУ ТА ЗАХВОРЮВАНЬ, ЗБУДНИКОМ ЯКИХ Є НАЕМОФІЛУС ІNFLUENZAE ТИПУ В	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	сусп. (ДТРА-ІРV) д/ін'єк. по 0,5мл у однораз. шпр. з 2голк. та ліоф. (Hib) у фл.	0,5мл/доза	№1	870,58	27,05/\$
	ПЕНТАКСИМ® ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ, КАШЛЮКУ (АЦЕЛЮЛЯРНИЙ КОМПОНЕНТ), ПОЛІОМІЄЛІТУ ІНАКТИВОВАНА ТА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙ, СПРИЧИНЕНИХ НАЕМОФІЛУС ТИПУ В КОН'ЮГОВАНА, АДСОРБОВАНА	Санофі Пастер/САНОФІ С.П.А./Санофі-Авентіс Прайвіт Ко. Лтд., Франція/Італія/Угорщина	пор. Hib типу b у фл. та сусп. д/ін'єк. по 0,5мл у шпр. з прикр. голк. (або 2-ма окрем. голк.)	0,5мл/доза	№1	763,20	24,85/\$

21.2.5. Вакцини для профілактики дифтерії, гемофільної інфекції типу b, кашлюку (ацелюлярний компонент), поліомієліту, правця, гепатиту В

- **Вакцина для профілактики дифтерії, гемофільної інфекції типу b, кашлюку, поліомієліту, правця, гепатиту В (*Diphtheria-Hemophilus influenzae B-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus-Hepatitis B*)***

Фармакотерапевтична група: J07CA09 - Bacterial and viral vaccines, combined

Основна фармакотерапевтична дія: комбінована вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент), гепатиту В, поліомієліту та захворювань, збудником яких є *Haemophilus influenzae* типу b. ГЕКСАКСИМ: ефективність вакцини 96,7 % при повному курсі первинної вакцинації та 98,5 % для ревакцинації (незалежно від первинної вакцинації). ІНФАНРИКС ГЕКСА: ефективність вакцинації проти інвазивних захворювань, викликаних Hib, шляхом використання комбінованих аКДП і Hib вакцин (п'ятивалентних та шестивалентних, у т.ч. вакцин, які містять антиген Hib вакцини Гексаксим становила 96,7 % після курсу первинної вакцинації і 98,5 % після введення бустерної дози (незалежно від первинної вакцинації); ефективність вакцинації антигенами ацелюлярного компонента кашлюку (аК), що містяться у вакцині Гексаксим, для профілактики найбільш тяжкої, типової форми кашлюку (≥ 21 день пароксизмального кашлю) - 3-дозовий курс первинної вакцинації у країні з високою ендемічною захворюваністю виявлено необхідність застосування бустерної дози вакцини дітям молодшого віку, починаючи з 6-тижневого віку.

Показання для застосування ЛЗ: для первинної та бустерної імунізації дітей з метою профілактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту В, поліомієліту та захворювань, збудником яких є *Haemophilus influenzae* типу b; вакцину слід використовувати згідно з офіційними рекомендаціями нормативних документів щодо проведення профілактичних щеплень, діючих на території України.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: ІНФАНРИКС ГЕКСА™: режим первинної вакцинації складається з введення глибоко в/м 2х або 3х доз по 0,5 мл, які необхідно ввести згідно з офіційними рекомендаціями; вакцину можна розглядати для бустерної вакцинації, якщо антигенний склад відповідає офіційним рекомендаціям країни, але рекомендовано введення як мінімум однієї дози Hib-кон'югованої вакцини; між дозами повинен бути інтервал в 1 міс.; введення вакцини відповідно до графіку Розширеної програми імунізації (у віці 6-ти, 10-ти, 14-ти тижнів), може бути використане тільки, якщо вакцинований при народженні отримав дозу вакцини для профілактики гепатиту В; якщо вакцинований при народженні отримав дозу вакцини для профілактики гепатиту В то, вакцина може бути використана як заміна для додаткових доз вакцини для профілактики гепатиту В у віці від 6 тижнів, якщо до цього віку необхідно введення другої дози вакцини для профілактики гепатиту В, в цьому випадку необхідно використовувати моновалентну вакцину для профілактики гепатиту В. Гексаксим: курс первинної вакцинації складається з 2х доз (які вводяться з інтервалом не менше ніж 8 тижнів) або 3х доз (які вводяться з інтервалом у не менше ніж 4 тижні) відповідно до офіційних рекомендацій, при цьому можуть використовуватися усі схеми вакцинації, в т.ч. Розширена програма імунізації ВООЗ з щепленням у віці 6, 10, 14 тижнів, незалежно від того, чи вводилася дитині доза вакцини проти гепатиту В одразу після народження або ні; у випадку коли дитині вводилася доза вакцини проти гепатиту В одразу після народження, Гексаксим можна використовувати для введення додаткових доз вакцини проти гепатиту В, починаючи з 6-тижневого віку; якщо друга доза вакцини проти гепатиту В має бути введена раніше цього віку, необхідно використовувати моновалентну вакцину проти гепатиту В. **Бустерна вакцинація:** після 2-дозового курсу первинної вакцинації вакциною Гексаксим необхідно ввести одну бустерну дозу препарату; після 3-дозового курсу первинної вакцинації вакциною слід ввести одну бустерну дозу препарату; бустерні дози мають вводитися не менше ніж ч/з 6 місяців після останньої дози курсу первинної вакцинації, з виконанням вимог офіційно затверджених рекомендацій нормативних документів щодо проведення профілактичних щеплень, діючих на території України; щеплення виконувати шляхом в/м ін'єкції, бажано використовувати передньолатеральну поверхню верхньої частини стегна у немовлят та дітей молодшого віку, починаючи з 6-тижневого віку, та дельтоподібний плечовий м'яз у дітей старшого віку, починаючи з 15-місячного віку.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль, почервоніння, місцева припухлість, ущільнення у місці ін'єкції, набряк всієї кінцівки, в яку зроблено щеплення, іноді з залученням сусідніх суглобів; лихоманка, гіпертермія, втомлюваність; втрата апетиту дратівливість, безперервний крик, неспокій; блювання, діарея; сонливість, судоми; кашель, інфекції ВДШ, бронхіт; АР (включаючи анафілактичні та анафілактоїдні р-ції), висип, свербіж, кропив'янка, дерматит, ангіоневротичний набряк; лімфаденопатія, тромбоцитопенія; колапс або шокоподібний стан (гіпотонічно-гіпореактивний епізод); апное у передчасно народжених немовлят (≤ 28 тижнів гестації).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до основних компонентів або до будь-якої з допоміжних/залишкових речовин в т.ч. поліміксину, неоміцину, стрептоміцину та формальдегіду та особам, що мали ознаки гіперчутливості після попереднього введення вакцин для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту В, поліомієліту або захворювань, збудником яких є *Haemophilus influenzae* типу b (Hib); енцефалопатія невідомої етіології в межах 7 днів після попередньої вакцинації з кашлюкововмісною вакциною; за цих обставин вакцинацію проти кашлюку слід припинити і курс вакцинації слід продовжити вакцинами для профілактики дифтерії, правця, гепатиту В, інактивованою поліомієлітною вакциною та вакциною для профілактики захворювань, що викликаються збудником *Haemophilus influenzae* типу b; неконтрольовані неврологічні розлади або неконтрольована епілепсія; г.захворюванн, що супроводжується лихоманкою; наявність незначної інфекції не є протипоказанням.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ГЕКСАКСИМ® / HEXAXIM ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ, КАШЛЮКУ (АЦЕЛЮЛЯРНИЙ КОМПОНЕНТ), ГЕПАТИТУ В РЕКОМБІНАНТНА, ПОЛІОМІЄЛІТУ ІНАКТИВОВАНА ТА ЗАХВОРЮВАНЬ, СПРИЧИНЕНИХ НАЕМОРНІЛУС ТИПУ В, КОН'ЮГОВАНА, АДСОРБОВАНА, РІДКА	Санофі Пастер С.А. (повний цикл виробництва, випуск серії)/Санофі- Авентіс Прайвіт Ко. Лтд., Платформа логістики та дистрибуції у м. Будапешт (вторинне пакування, випуск серії), Франція/Угорщина	сусп. д/ін'єк. по 0,5мл в шпр. та фл. з 1голк. або 2голк. (окремо) в кор. або станд.-експ. упак.	0,5мл/доза	№1, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНФАНРИКС ГЕКСА™/INFANRIX HEXA™ КОМБІНОВАНА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ, КАШЛЮКУ (АЦЕЛЮЛЯРНИЙ КОМПОНЕНТ), ГЕПАТИТУ В, ПОЛІОМІЄЛІТУ ТА ЗАХВОРЮВАНЬ, ЗБУДНИКОМ ЯКИХ Є НАЕМОРНІЛУС INFLUENZAE ТИПУ В	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	сусп. (DTPa- HBVIPV) д/ін'єк. по 0,5мл у однораз. шпр. з 2голк. та ліоф. (Hib) у фл.	0,5мл/доза	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ІНФАНРИКС ГЕКСА™/INFANRIX HEXA™ КОМБІНОВАНА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ, КАШЛЮКУ (АЦЕЛЮЛЯРНИЙ КОМПОНЕНТ), ГЕПАТИТУ В, ПОЛІОМІЄЛІТУ ТА ЗАХВОРЮВАНЬ, ЗБУДНИКОМ ЯКИХ Є НАЕМОРНІЛУС INFLUENZAE ТИПУ В	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	сусп. (DTPa- HBVIPV) д/ін'єк. по 0,5мл у однораз. шпр. з 2голк. та ліоф. (Hib) у фл.	0,5мл/доза	№1	967,44	27,05/\$

21.2.6. Вакцини для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи

Відповідно Календаря щеплень, вакцинація для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи проводиться у віці 12 місяців. Друге щеплення - у віці 6 років.

Перенесене захворювання на кір, епідемічний паротит чи краснуху не є протипоказанням до щеплення.

Дітям, що не були вакциновані проти кору, паротиту чи краснухи за віком у 12 місяців та в 6 років, щеплення починають робити у будь-якому віці до 17 років 11 місяців 29 днів. Дитина має отримати 2 дози з дотриманням між ними мінімального інтервалу введення.

Для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи при виникненні осередку (наявність контактних осіб) цих інфекцій проводять вакцинацію в перші три дні від моменту контакту.

Якщо минуло більше трьох днів від моменту контакту, особам, у яких відсутні клінічні прояви захворювання, з метою забезпечення імунітету на майбутнє у разі неінфікування, проводять вакцинацію негайно (якомога раніше). Рішення про проведення щеплення за таких обставин приймають лікуючий лікар та пацієнт на підставі оцінки ризиків та переваг.

За наявності епідемічних показань, пов'язаних із можливим ризиком інфікування у випадку контакту дитини з джерелом інфекції, дозволяється введення дози вакцини у віці від 6 місяців. У такому випадку введена доза (нульова) не зараховується як перша доза вакцинації за віком. Подальші планові щеплення проводяться згідно з Календарем профілактичних щеплень, з дотриманням інтервалу між нульовою дозою та подальшими плановими щепленнями не менше одного місяця.

Дорослим за відсутності протипоказань, що наведені в інструкції із застосування вакцини, роблять щеплення без обмежень за віком, якщо вони не хворіли на вказані інфекції та/або не мають зазначеного в медичній документації підтвердження введення двох доз вакцини, або мають негативні результати лабораторного обстеження щодо наявності специфічних антитіл IgG».

- **Вакцина комбінована для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи, жива атенуйована (Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated) ***

Фармакотерапевтична група: J07BD52 - Протівірусні вакцини. Комбінована вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи, жива атенуйована.

Основна фармакотерапевтична дія: жива комбінована вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи, що являє собою ліофілізований комбінований препарат атенуйованих штамів вірусів кору, епідемічного паротиту і краснухи, одержаних шляхом розмноження в культурі клітин курячих ембріонів (віруси

епідемічного паротиту і кору) або в диплоїдних клітинах людини (вірус краснухи). Антитіла до вірусу кору були виявлені у 95-98% раніше серонегативних вакцинованих осіб, антитіла до вірусу епідемічного паротиту у 96,1% і до вірусу краснухи у 99,3%.

Показання для застосування ЛЗ: для активної імунізації з метою профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи^{БНФ} за схемою, передбаченою діючим національним календарем профілактичних щеплень.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: ПРІОРИКС™ (PRIORIX™), GlaxoSmithKline Biologicals s.a., застосовується одноразова доза розчиненої вакцини (0,5 мл) для імунізації дітей віком старше 12 місяців; вакцину потрібно вводити згідно з рекомендованим графіком відповідно до офіційних рекомендацій; призначений для п/ш ін'єкцій, однак можна вводити в/м^{БНФ}. М-М-РВАКСПРО, вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи жива, Мерк Шарп і Доум Б.В.: особам віком 12 міс. або старше^{БНФ} слід вводити першу дозу в обраний день, другу дозу - щонайменш, ч/з 4 тижні після введення першої дози у відповідності до офіційних рекомендацій; другу дозу призначають особам, у яких з будь-якої причини не спостерігалось відповіді на першу дозу; вакцину можна вводити немовлятам віком 9-12 міс. у відповідності до офіційних рекомендацій або у випадку, коли ранній захист є необхідним (дитячий садок, ситуації епідемії, поїздка до регіону з високим розповсюдженням кору); таким немовлятам слід провести повторну вакцинацію у віці 12-15 міс.; відповідно до офіційних рекомендацій слід розглянути питання введення додаткової дози вакцини, що містить штами вірусу кору, вводити в/м або п/ш дітям молодшого віку в передньолатеральну зону стегна, дітям старшого віку, підліткам, дорослим в дельтоподібну зону. При проведенні імунізації на території України щодо схем імунізації, протипоказань та взаємодії з іншими медичними препаратами слід керуватися діючими наказами МОЗ України. М-М-Р II ВАКЦИНА ПРОТИ КОРУ, ПАРОТИТУ ТА КРАСНУХИ ВІРУСНА, ЖИВА/М-М-Р® II MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE, Мерк Шарп і Доум Корп, Патеон Мануфактурінг Сервісез Ел.Ел.Сі, США: для первинної вакцинації дітей рекомендований вік 12 - 15 міс.; вакцину потрібно вводити п/ш в дозі 0,5 мл^{БНФ}; ревакцинацію до вступу дитини до початкової школи; дітям, яким першу вакцинацію повели у віці до 12 міс., потрібно другу дозу вакцини ввести у віці 12-15 міс., після чого слід провести ревакцинацію до вступу дитини до початкової школи. ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ КОРУ, ПАРОТИТУ ТА КРАСНУХИ, ЖИВА, АТЕНУЙОВАНА, Серум Інститут Індії Пвт. Лтд., Індія: разову дозу вакцини 0,5 мл вводять глибоко п/ш.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: почервоніння, біль, набряк, припухлість, шкірна р-ція, крововилив в місці ін'єкції; нездужання, слабкість, t°, лихоманка; висипи; запаморочення, бронхоспазм, інфекції ВДШ та НДШ, пневмонія, пневмоніт; назофарингіт, кашель, ринорея, середній отит, глухота; лімфаденопатія; збільшення привушних слинних залоз, ангіоневротичний набряк; анорексія; дратівливість, підвищена збудливість, безпричинний плач, безсоння, головний біль; кон'юнктивіт, ретиніт, парез ока, неврит зорового нерву, парестезія, поліневрит, поліневропатія, синкопе; фебрильні та аферильні судоми; АР, анафілактоїдна р-ція, анафілаксія, кропив'янка; панікуліт, пурпура, поліморфна еритема, індурація шкіри, с-м Стівенса-Джонсона, свербіж; артрит, артралгія, міалгія; діарея, блювання, нудота; менінгіт, короподібний с-м, паротитоподібний с-м (включаючи орхіт, епідеміт і паротит), підгострий склерозуючий панцефаліт, енцефаліт з включенням тілець кору, церебаліт, церебалітоподібні с-ми (включаючи транзиторні порушення ходи, транзиторну атаксію), с-м Гієна-Барре, поперечний мієліт, периферичний неврит; тромбозитопенія, тромбозитопенічна пурпура, васкуліт (включаючи пурпуру Геноха-Шенлейна і с-м Кавасакі); гострий геморагічний набряк немовлят.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до неоміцину або будь-якого іншого компонента вакцини (перенесений контактний дерматит щодо неоміцину не є протипоказанням); гіперчутливість після попереднього введення вакцини проти кору, епідемічного паротиту, краснухи; тяжкі форми імунodefіциту (первинний або вторинний імунodefіцити); незважаючи на це, комбіновані вакцини для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи можуть бути введені особам із безсимптомною ВІЛ-інфекцією без негативних наслідків для їх хвороби; вагітність, крім того, слід уникати вагітності не менше ніж 1 міс. після вакцинації; діти з активною формою туберкульозу, що не отримують лікування; дискразія крові, лейкомія, лімфома будь-якого типу або інші злоякісні новоутворення, які впливають на гематопоезичну та лімфатичну системи; поточна імуносупресивна терапія (включаючи високі дози кортикостероїдів); введення вакцини слід відкласти для осіб з лихоманкою; проте, присутність незначних інфекцій, таких як застуда, не повинно призводити до відкладення вакцинації.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ КОРУ, ПАРОТИТУ ТА КРАСНУХИ, ЖИВА, АТЕНУЙОВАНА (ЛІОФІЛІЗОВАНА) / MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VACCINE LIVE, ATTENUATED (FREEZE-DRIED)	Серум Інститут Індії Пвт. Лтд., Індія	пор. ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. по 1, 2, 5 та 10доз з розч.	0,5мл/доза	№50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	М-М-Р II ВАКЦИНА ПРОТИ КОРУ, ПАРОТИТУ ТА КРАСНУХИ ВІРУСНА, ЖИВА / М-М-Р® II MEASLES, MUMPS AND	Мерк Шарп і Доум Корп. (виробництво вакцини in bulk, контроль якості та первинне пак., вторинне пак., дозвіл на випуск	пор. ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у фл. з розч.	0,5мл/доза	№10	відсутня у реєстрі ОВЦ	

RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE	серії вакцини та розка)/Патеон Мануфекчурінг Сервісез Ел.Ел.Сі. (виробництво розчинника in bulk, контроль якості та перви, США					
М-М-РВАКСПРО® ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ КОРУ, ЕПІДЕМІЧНОГО ПАРОТИТУ ТА КРАСНУХИ ЖИВА	Мерк Шарп і Доум Б.В. (вторинне пак., випуск серії вакцини та розчинника)/Мерк Шарп і Доум Корп. (виробник вакцини in bulk та первинне пакування), Нідерланди/США	пор. д/сусп. д/ін'єк. у фл. з розч. з голк. або без	0,5мл/доза	№1, №10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПРІОРИКС™ / PRIORIX™ КОМБІНОВАНА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ КОРУ, ЕПІДЕМІЧНОГО ПАРОТИТУ ТА КРАСНУХИ	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у монодоз. та мультидоз. фл. з розч. в амп.	0,5мл/доза	№100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
ПРІОРИКС™ / PRIORIX™ КОМБІНОВАНА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ КОРУ, ЕПІДЕМІЧНОГО ПАРОТИТУ ТА КРАСНУХИ	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	ліоф. д/р-ну д/ін'єк. у монодоз. фл. з розч. у шпр. та 2голк.	0,5мл/доза	№1	289,74	27,05/\$

21.2.7. Вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи та вітряної віспи

- **Вакцина комбінована для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи та вітряної віспи, жива атенуйована (Measles, combinations with mumps, rubella and varicella, live attenuated) ****

Фармакотерапевтична група: J07BD54 - Комбінована вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи та вітряної віспи, жива атенуйована.

Основна фармакотерапевтична дія: Жива комбінована вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи та вітряної віспи є ліофілізованим комбінованим препаратом атенуйованих вірусів кору (штам Schwarz), епідемічного паротиту (штам RIT 4385, який є похідним від штаму Jeryl Lynn), краснухи (штам Wistar RA 27/3) та вітряної віспи (штам OKA), одержаних шляхом розмноження в культурі клітин курячих ембріонів (віруси епідемічного паротиту і кору) та в диплоїдних клітинах людини MRC-5 (віруси краснухи та вітряної віспи); переважна більшість вакцинованих проти вітряної віспи після контакту з «диким» вірусом були або повністю захищені, або у них розвинулася більш легка форма вітряної віспи (під час спалахів вітряної віспи).

Показання для застосування ЛЗ: Для активної імунізації з метою профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи та вітряної віспи у дітей віком від 9 місяців до 12 років включно.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Для забезпечення оптимального захисту від кору, епідемічного паротиту, краснухи та вітряної віспи дітям віком від 9 місяців до 12 років включно слід застосовувати 2 дози вакцини; між дозами слід дотримуватися інтервалу не менше 6 тижнів. Альтернативно, у відповідності до діючих офіційних рекомендацій: можна вводити одну дозу вакцини дітям, які вже отримали одну дозу іншої вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) та/або одну дозу іншої вакцини проти вітряної віспи; можна вводити одну дозу вакцини з подальшим введенням однієї дози іншої вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) та/або однієї дози іншої вакцини проти вітряної віспи. Вводити п/ш або в/м в ділянку дельтоподібного м'яза або передньо-латеральну частину стегна; бажано вводити п/ш пацієнтам з тромбоцитопенією або порушеннями згортання крові.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: Біль, почервоніння, набряк в місці введення, лихоманка; плач, підвищена збудливість, дратівливість, безсоння; інфекції ВДШ, риніт, кашель, бронхіт, середній отит; лімфаденопатія, збільшення привушних слинних залоз; анорексія, діарея, блювання; фебрильні судоми; висип; сонливість, нездужання, втома; рідко: менінгіт, опоясуючий лишай, короподібний с-ром; с-ром, подібний до епідемічного паротиту (в т.ч. орхіт, епідидиміт та паротит); тромбоцитопенія, тромбоцитопенічна пурпура; АР (включаючи анафілактичні та анафілактоїдні р-ції); енцефаліт, порушення мозкового кровообігу, церебеліт, церебелітоподібні с-томи (в т.ч. транзиторне порушення ходи та транзиторна атаксія), с-дром Гена-Баре, поперечний мієліт, периферичний неврит; васкуліт (включаючи пурпуру Шенлейна-Геноха та с-ром Кавасакі); багатоморфна еритема, висип, схожий на вітряну віспу; артралгія, артрит.

Противопоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до неоміцину або до будь-якого іншого компоненту вакцини; гіперчутливість на попереднє застосування вакцини для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи та/або вітряної віспи; тяжка форма гуморального або клітинного імунодефіциту (первинного чи набутого), наприклад, важким комбінованим імунодефіцитом, агаммаглобулінемією і СНІД або симптоматичною ВІЛ-інфекцією або віковим відсотком CD4 + Т-лімфоцитів у дітей віком до 12 міс.: CD4 + <25%; у дітей віком від 12-35 міс.: CD4 + <20%; у дітей віком від 36-59 міс.: CD4 + <15%; вагітним жінкам, слід уникати вагітності не менше ніж один місяць після вакцинації; первинні чи вторинні імунодефіцити; при г. захворюваннях, що супроводжується лихоманкою, вакцинацію слід відкласти.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ПРІОРИКС-ТЕТРА™ КОМБІНОВАНА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ КОРУ, ЕПІДЕМІЧНОГО ПАРОТИТУ, КРАСНУХИ ТА ВІТРЯНОЇ ВІСПИ, ЖИВА АТЕНУЙОВАНА	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	ліоф. пор. д/ін'єк. у фл. з розч. в шпр. та амп. з голк. або без у вакуум. стерильн. упак.	0,5мл/доза	№1, №10, №20, №50, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	

21.2.8. Вакцини для профілактики пневмококової інфекції та гемофільної інфекції

- **Вакцина для профілактики пневмококової інфекції, очищена полісахаридна, та гемофільної інфекції, кон'югована (*Pneumococcus purified polysaccharides antigen and Haemophilus influenzae, conjugated*)**

Фармакотерапевтична група: J07AL52 - Pneumococcal vaccines. Вакцина для профілактики пневмококової інфекції. Пневмококовий очищений полісахаридний антиген та Haemophilus influenzae, кон'югована.

Основна фармакотерапевтична дія: вакцина для профілактики пневмококової інфекції (полісахаридний антиген) та нетипованої гемофільної інфекції, кон'югована, адсорбована; містить пневмококовий полісахарид серотипів 1, 5, 6В, 7F, 9V, 14, 23F та пневмококовий полісахарид серотипів 4, 18С та 19F; адсорбований на фосфаті алюмінію, кон'югований з протеїном D (отриманим з нетипованого штаму *Haemophilus influenzae*), з протеїном правцевого анатоксину та протеїном дифтерійного анатоксину.

Показання для застосування ЛЗ: активна імунізація немовлят і дітей віком від 6 тижнів до 5 років для профілактики пневмококової інфекції, викликаній серотипами *Streptococcus pneumoniae* 1, 4, 5, 6В, 7F, 9V, 14, 18С, 19F та 23F і перехресно-реактивним серотипом 19А (включаючи сепсис, менінгіт, пневмонію, бактеріємію та г.середній отит), та г. середнього отиту, викликаного нетипованою *Haemophilus influenzae*. Застосування вакцини повинно визначатися на основі офіційних рекомендацій з урахуванням ризику пневмококових захворювань у дітей різних вікових груп, а також варіабельності епідеміологічних даних у різних географічних зонах.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять в/м; перевага надається введенню вакцини в передньоплатеральну ділянку стегна немовлятам або в дельтоподібний м'яз руки дітям старшого віку. Немовлята віком від 6 тижнів до 6 міс. - первинна схема вакцинації, що включає 3 дози; рекомендована схема вакцинації, що забезпечує оптимальний захист, включає 4 дози по 0,5 мл кожна. Первинна схема для немовлят включає 3 дози з інтервалом не менше 1 міс. між дозами; першу дозу можна вводити вже у віці 6 тижнів, 4-а (бустерна) доза рекомендується не раніше ніж ч/з 6 міс. після 3-ої дози та може застосовуватись з 9 міс. (бажано у віці між 12 та 15 міс.). Первинна схема вакцинації, що включає 2 дози: альтернативно, у разі введення вакцини у рамках стандартної програми імунізації немовлят, може застосовуватись схема, що включає 3 дози по 0,5 мл кожна; 1-у дозу можна вводити вже у віці 6 тижнів, 2-у дозу вводять ч/з 2 міс.; бустерна доза рекомендується не раніше ніж ч/з 6 міс. після останньої дози первинної схеми вакцинації та може застосовуватись з 9 міс. **Недоношені немовлята з терміном гестації щонайменше 27 тижнів:** рекомендована серія імунізації для забезпечення оптимального захисту складається з 4 доз по 0,5 мл кожна; первинна схема для немовлят складається з 3-х доз, перша з яких зазвичай вводиться у 2 міс., з інтервалом щонайменше 1 міс. між дозами; рекомендується бустерна доза щонайменше ч/з 6 місяців після останньої дози первинної вакцинації. Раніше невакциновані немовлята старше ≥ 7 місячного віку: немовлята віком 7 - 11 міс.: схема вакцинації включає 2 дози по 0,5 мл з інтервалом не менше 1 міс. між дозами; третя доза рекомендується на другому році життя з інтервалом не менше ніж 2 міс. між дозами; діти віком 12 місяців - 5 років: схема вакцинації включає 2 дози по 0,5 мл з інтервалом не менше 2 міс. між дозами. Щеплення дітей на території України здійснюється згідно з вимогами діючих наказів МОЗ України щодо схем імунізації, протипоказань та взаємодії з іншими лікарськими засобами.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль, почервоніння, набряк, затвердіння, гематома у місці ін'єкції, набрякання кінцівки, лихоманка; сонливість, дратівливість, втрата апетиту, нудота, діарея, блювота, головний біль; плач, апное у дуже недоношених немовлят (≤ 28 тижнів гестації); судоми (включаючи фебрильні); АР (алергічний дерматит, атопічний дерматит, екзема), анафілаксія, ангіоневротичний набряк, висип, кропив'янка; гіпотонічно-гіпореспонсивний епізод; с-м Кавасакі.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до діючих та допоміжних речовин вакцини або будь-якого білку-носія; призначення вакцини повинно бути відкладене у осіб з г. захворюваннями, що супроводжуються лихоманкою; однак, наявність легких незначних проявів інфекційних захворювань, таких як застуда, не є підставою для відкладання вакцинації.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	СИНФЛОРИКС™ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПНЕВМОКОКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ (ПОЛІСАХАРИДНИЙ АНТИГЕН) ТА НЕТИПОВАНОЇ ГЕМОФІЛЬНОЇ	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	сусп. д/ін'єк. у однораз. шпр. з голк. або без; монодоз. та мультидоз.	0,5мл/доза, 1мл/2доза	№1, №10, №100	відсутня у реєстрі ОБЦ	

ІНФЕКЦІЇ, КОН'ЮГОВАНА, АДСОРБОВАНА		фл.			
---------------------------------------	--	-----	--	--	--

21.2.9. Вакцини для профілактики гепатиту А та гепатиту В

- **Вакцина комбінована для профілактики гепатиту А та гепатиту В (Hepatitis A, hepatitis B, combinations)**

Фармакотерапевтична група: J07BC20 - Hepatitis vaccines

Основна фармакотерапевтична дія: комбінована вакцина викликає індукцію імунітету проти вірусів гепатитів А та В шляхом стимулювання синтезу специфічних антитіл анти-HAV та анти-HBs; суміш препаратів очищеного інактивованого вірусу гепатиту А (HAV) та очищеного поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg), що окремо абсорбуються на гідроксиді алюмінію та алюмінію фосфаті. Вірус гепатиту А одержують у диплоїдній культурі клітин людини MRC5. HBsAg одержують методом генної інженерії у культурі дріжджових клітин.

Показання для застосування ЛЗ: вакцинація нещеплених дітей (від 1 року та старше), підлітків та дорослих з метою профілактики захворювання на гепатити А та В.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/м в ділянку дельтоподібного м'яза верхньої кінцівки дорослим та дітям старшого віку, дітям до 3-х років - в передньо-латеральну ділянку стегна^{БНФ}; рекомендована доза для дітей (від 1 року та старше), підлітків та дорослих - 1,0 мл. *Схема первинної вакцинації дітей віком від 1 року до 15 років:* стандартний курс первинної вакцинації включає введення двох доз, першу з яких вводять у вибраний день, другу - у проміжку між шостим та дванадцятим місяцями після введення першої дози. Захист проти захворювання на гепатит В формується після введення другої дози. *Дорослі та підлітки віком від 16 років та старше:* стандартний курс первинної вакцинації за допомогою вакцини складається з 3 доз. Першу дозу вводять у вибраний день, другу - ч/з міс., а третю - ч/з 6 міс. в після першої дози. У виключних випадках дорослі, які збираються в подорож ч/з 1 міс. або пізніше, та не можуть завершити первинну вакцинацію за схемою 0, 1, 6 міс., можуть бути імунізовані за схемою 0, 7, 21 день; при використанні цієї схеми рекомендується введення четвертої дози вакцини ч/з 12 міс. після введення першої дози^{БНФ}; специфічні антитіла зберігаються до 15 років після завершення вакцинації.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль, почервоніння, припухлість в місці введення, стомлюваність, нездужання, лихоманка; головний біль, сонливість, дратівливість, втрата апетиту, діарея, нудота, блювання; інфекції ВДШ; лімфаденопатія; запаморочення, гіпостезія, парестезія, гіпотензія; висип, свербіж, кропив'янка, міалгія, артралгія, артрит, м'язова слабкість; грипоподібні симптоми, озноб, тромбоцитопенія, тромбоцитопенічна пурпура, васкуліти; анафілаксія, АР, включаючи анафілактоїдні реакції та реакції, подібні до сироваткової хвороби; менінгіти, енцефаліти, енцефалопатії, неврити, нейропатії, паралічі, судоми; ангіоневротичний набряк, червоний плоский лишай, поліморфна еритема; синкопе або вазовагальні реакції на ін'єкцію.

Протипоказання до застосування ЛЗ: відома гіперчутливість до будь-якого компоненту або неоміцину що входить до складу вакцини; особам, у яких після першого введення вакцини або моновалентних вакцин для профілактики гепатитів А та В з'явилися ознаки гіперчутливості; введення вакцини повинно бути відкладено у осіб з г. захворюваннями, що супроводжуються лихоманкою.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОБЦ.

Торговельна назва:

	Торговельна назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Офіційний курс обміну, у.о.
II.	ТВІНРИКС™ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТІВ А (ІНАКТИВОВАНА) І В (АДСОРБОВАНА)	ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія	сусп. д/ін'єк. у шпр. по 1 дозі з голк.	1мл/доза	№1	704,81	27,20/\$

