

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я
України

№ _____

Зміни
до Показників безпеки харчових продуктів «Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження»

Доповнити новою таблицею 4 такого змісту:

«Таблиця 4

**Максимально допустимі рівні залишків кокцидіостатиків та гістомоностатиків
(що застосовувались тваринам для боротьби з кокцидіозом)
у харчових продуктах тваринного походження**

№ з/п	Діюча речовина	Залишковий індикатор	Види тварин	Максимально допустимі рівні залишків	Цільові тканини	Застереження
1	Decoquinat Декоквінат	Декоквінат	Кури-бройлери на відгодівлі	1 000 мкг/кг	Печінка	Відсутні
				1 000 мкг/кг	Шкіра і жир у природних	

					співвідношеннях	
				800 мкг/кг	Нирки	
				500 мкг/кг	М'язи	
2	Maduramycin ammonium Мадураміцин	Мадураміцин амонію	Кури-бройлери на відгодівлі	150 мкг/кг	Печінка	Не застосовувати принаймні за три дні до забою
				150 мкг/кг	Шкіра і жир у природних співвідношеннях	
				100 мкг/кг	Нирки	
				30 мкг/кг	М'язи	
3	Monensin (as monensin sodium) Монензин (як монензин натрію)	Монензин натрію	Молодняк курей-несучок (до 16 тижня), кури-бройлери на відгодівлі, індики (до 16 тижня)	25 мкг/кг	Шкіра і жир	Не застосовувати принаймні за один день до забою. Небезпечно для коней. Уникати одночасного прийому з тіамуліном
				8 мкг/кг	Печінка	
				8 мкг/кг	Нирки	
				8 мкг/кг	М'язи	
4	Narasin Наразин	Наразин	Кури-бройлери на відгодівлі	50 мкг/кг	Печінка, нирки, м'язи, шкіра і жир	Небезпечно для коней, індиків та кролів
5	Nicarbazin Нікарбазин	Динітро-карбанілід (DNC)	Кури-бройлери на відгодівлі	15 000 мкг/кг	Печінка	Небезпечно для коней, індиків та кролів. Не застосовувати принаймні за один день до забою.
				6 000 мкг/кг	Нирки	
				4 000 мкг/кг	М'язи	
				4 000 мкг/кг	Шкіра і жир	
6	Robenidine hydrochloride Робенідин	Робенідину гідрохлорид	Кролі	100 мкг/кг	Шкіра і жир	Відсутні
				200 мкг/кг	Печінка	
				200 мкг/кг	Нирки	

				100 мкг/кг	М'язи	
			Кури-бройлери на відгодівлі	800 мкг/кг	Печінка	Не застосовувати принаймні за п'ять днів до забою
				350 мкг/кг	Нирки	
				200 мкг/кг	М'язи	
				1 300 мкг/кг	Шкіра і жир	
			Індики	400 мкг/кг	Печінка	Не застосовувати принаймні за п'ять днів до забою
				200 мкг/кг	Нирки	
				200 мкг/кг	М'язи	
				400 мкг/кг	Шкіра і жир	
7	Salinomycin sodium Саліноміцин	Саліноміцин натрію	Кури-бройлери на відгодівлі, молодняк курей-несучок (до 12 тижня)	150 мкг/кг	Печінка	Небезпечно для коней та індиків. Уникати одночасного прийому з тіамуліном
				40 мкг/кг	Нирки	
				15 мкг/кг	М'язи	
				150 мкг/кг	Шкіра і жир	
8	Semduramicin sodium Семдураміцин	–	Кури-бройлери на відгодівлі	–	–	Не застосовувати за п'ять днів до забою

».

**Генеральний директор
Директорату громадського здоров'я
та профілактики захворюваності**

Ірина РУДЕНКО